

Auserlesene Heilformeln

aus

dem Gebiete

der

Kinder - Krankheiten.

Uebersetzung des Heiligen

des Evangeliums

des Heiligen Evangeliums

hur
inne
mes
ziel
Um
Bre
Blat

R
S
MS.
löf
M

R
O
MS.
löf

R
O
A
MS.
löf
rer
tel

R
P
vii

Angina membranacea. Kroup.

—

In der ersten Periode der Krankheit Blutentziehung, nach derselben ein Brechmittel, dann Calomel innerlich. Zur Unterstützung Blasenpflaster und warmes Bad. — In der zweiten Periode ebenfalls Blutentziehung, hauptsächlich Calomel, allein, oder nach den Umständen mit Goldschwefel, Campher. Dann Senega, Brechmittel zur Beförderung des Auswurfs. Auch hier Blasenpflaster und warme Bäder.

R. Vin. stibiat. ℥β,
Syr. Althaeae ℥j.
MS. Alle halbe Stunde einen Theelöffel. (Für ein Kind von 3—4 Monaten.)

Wendt.

R. Vin. stibiat. ℥β,
Oxymell. squill. ℥ij.
MS. Alle 10 Minuten einen Theelöffel. (Für einen Säugling.)

R. Tart. stibiat. gr. iij,
Oxymell. Squill. ℥j,
Aq. fontan. ℥ij.
MS. Alle halbe Stunde einen Eßlöffel. (Für ein Kind von 3 Jahren bei Kroup. Die Brechmittel müssen hier stark seyn.)

Sachse.

R. Pulv. rad. Ipecacuanhae gr. viij,

Oxymell. squill.,
Syr. Chamomill. āā ℥β,
Vin. stibiat. ℥ij.

MS. Alle halbe Stunde einen Theelöffel. (Für ein Kind von 7 Wochen bei Kroup.)

Osann.

R. Sulphur. aur. Antim. ℥j,
Tart. stibiat. gr. iij,
Syr. Senegae,
Aq. font. āā ℥β.

MS. Umgeschüttelt $\frac{1}{2}$ stündlich 2 Theelöffel. (Für ein Kind von 1 $\frac{1}{2}$ Jahren bei Kroup. Es wurde die halbe Portion ausgebraucht, ehe Erbrechen eintrat.)

Sachse.

R. Calomelan. gr. viij-xij-xvj,
Magnes carb. ℥ij,
Pulv. gummos. ℥ij.
M. f. Pulv. divid. in viij. part. aequal.

S. 1—2stündlich ein Pulver.

R Calomelan. gr. i-ij,
Sacchar. alb.)β.
M. f. Pulv. dent tal. dos. No. xij.
S. 1—2stündlich ein Pulver.

R Syr. Seneg. ℥iij,
— *Ammoniac.* ℥j.
MS. Ein Pulver mit 2 Theelöffeln voll eingerührt.
Sachse.

R Hydrargyr. oxydulat. nigr.
gr. vj,
Magnes. carbonic.
Sacchar. lact. āā ℥j.
M. f. Pulv. divid. in part. aeq. No. vj.
MDS. Zweistündlich ein Pulver.
Schenk.
(Hufeland's Journ. Bd. 62.)

Zugleich giebt er zweistündl.
10—20 Tropfen *Vinum stibiat.*,
und läßt von folgendem Liniment
einreiben:

R Ungt. mercurial. ℥β,
Liniment. camphor. ℥j.
MS. Eine Erbse grofs in die Luft-
röhre einzureiben.

R Cupr. sulphuric. gr. iij,
Sacchar. alb. gr. vj.
M. f. Pulv. dent. tal. dos. No. ij.
S. Anfangs ein Pulver auf Ein-
mal, und wenn Erbrechen er-
folgt ist, so löset man das an-
dere in 12 Theelöffeln Wasser
auf, und giebt von dieser Auf-
lösung alle 1—2 Stunden ei-
nen Theelöffel voll. (Bei Kroup
2—3jähriger Kinder.)
Serlo.

R Cupr. sulphuric. gr. i-β-ij,
Succi Liquir. inspiss.
Sacchar. alb. āā)j.

M. f. Pulv. divid. in part. aeq.
No. viij.

S. Anfangs alle Viertelstunde,
später alle 1½—2 Stunden ein
Pulver. (Für Kinder von 1—7
Jahren.)

R Cupr. sulphuric. gr. v,
Decoct. rad. Althaeae ℥iβ,
Syr. Althaeae ℥β.
MS. Stündlich einen Theelöffel
voll.

Korting.

R Calomelan. gr. j,
Sulphur. aurat. Antimon.
gr. β,
Pulv. gummosi)β.

M. f. Pulv. dent. tal. dos. No. vj.
S. 1—2stündlich ein Pulver.
Wendt.

R Rad. Senegae ℥j,
Coq. c. *Aq. comm.* s. q.
In Colatur. ℥iv.
solve

Sal. Ammoniac. depur.)j,
Extr. Liquirit.)ij.

MS. Stündlich ½ Eßlöffel. (Für
ein Kind von 4 Monaten.)
Sachse.

R Rad. Senegae ℥j,
Calomelan. gr. ij,
Sacchar alb.)β.

M. f. Pulv. dent. tal. dos. No. vj.
S. Stündlich ein Pulver mit *Syr.*
Senegae zu nehmen.
Sachse.

R Rad. Senegae
— *liquirit.* āā ℥ij,
coq. c. *Aq. fervid.* ℥viij, ad
reman. ℥iv, Colatur. adde
Sal. Ammoniac. ℥j,
Syr. flor. Rhoeados ℥j.

MS. Stündlich 1 Kinderlöffel.
Sachse.

℞ *Sulphur. stibiat. rub.* gr. iij,
Camphor. trit. gr. iv,
Mucil. Gumm. mimos. ℥β,
Syr. Althaeae ℥j.

MS. Ungeschüttelt alle 2 Stunden 2 Theelöffel.

(Bei stärkeren Graden des Uebels wird die Gabe des Kermes verdoppelt.)

Albers. Sachse.

℞ *Aq. Foenicul.* ℥j,
Camphor. c. Gumm. mimos. trit. gr. iij,
Ammon. carb. pyr. - oleos. gr. iv,
Syr. Althaeae ℥β.

MS. 2stündlich einen Theelöffel.
 (Für ein Kind von 1½ Jahren.)
 Wolff.

℞ *Camphor.* gr. vj,
Ammon. carb. pyr. oleos.)β,
Mucil. Gumm. mimos.
Syr. Althaeae āā ℥vj,
Aq. Foenicul. ℥iv.

MS. Zweistündlich ½ Eßlöffel.
 (Für ein Kind von 6—8 Jahren.)
 Wolff.

℞ *Aq. Foenicul.* ℥iv,
Vin. stibiat. ℥j,
Extr. Hyoscyam. ℥β-j,
Syr. Althaeae ℥iβ.

MS. Halbstündlich einen Theelöffel. (Auf 12 Gaben für Kinder von 2—4 Jahren. Es entstand keine Betäubung)

v. Tribolet.

(Hufeland's Journ. Bd. 43.)

℞ *Aq. Foenicul.* ℥vij,
Kal. carbonic.)ij,
Extr. Senegae)j,
Syr. Senegae ℥j.

MS. Stündlich ½ Eßlöffel voll.
 (Alternatim mit Calomel.)
 Hellwig.

℞ *Kal. sulphur.* ℥j,
Pulv. rad. Althaeae)j,
Extr. Liquirit.)ij.
 M. f. Pilul. 60.

Consp. *Pulv. rad. Irid. florent.*
 d. in vitro bene clauso.

S. Kindern von 1—2 Jahren stündlich oder zweistündlich 1, Kindern von 3—4 Jahren 2—3 Pillen mit einem Bissen Apfel- oder Pflaumenmufs.

Senf.

℞ *Kal. sulphurat.* gr. xviii,
Butyr. de Cacao ℥ij,
Sacchar. alb. ℥iij,
Ol. Amygdal. dulc. ℥β.

MS. Zweistündlich 1—2 Theelöffel.
 Chaufsier.

℞ *Sacchar. alb.* ℥iβ,
 Solve leni calore in *Aq. Foenicul.* ℥vj,
 adde

Kali sulphurat.,)β-j.

MS. Zweistündlich einen Theelöffel. (Für Kinder von 1—4 Jahren.)

Chaussier.

℞ *Kal. sulphurat.* ℥β,
Aq. Rosar. ℥β.

Solv. divid. in vj part. aeq. d. in vitr.

S. Jedesmal die Hälfte in einem Eßlöffel arabischem Gummi zu nehmen.
 Pfaff.

℞ *Kali sulphurat.* ℥β,
Aq. flor. Sambuci ℥j,
Syr. Althaeae ℥ij.

MS. Zweistündlich einen Kinderlöffel. (Für ein halbjähriges Kind.)
 Stiebel.

Lentin's Heilart des Kroup:

Zuerst gab er ein Klystir, und gleich darauf ein Emeticum, um die im Magen noch vorhandenen Speisen auszuleeren, und durch die Anstrengung selbst, jene noch im Entstehen begriffene Stockung von Blut und Lymphe, welche zu der Ausschwitzung Gelegenheit giebt, zu zertheilen. Zeigte sich nun der Kroup als häutiger, so liefs er gleich Blutegel ansetzen, und verordnete ein Fufsbad und Umschläge aus Flanell, der in warmes Wasser getaucht ist; die Blutegel liefs er bis zur Besserung des Athems, des Pulses und bis zum Bleichwerden der Lippen saugen. Darauf legte er ein Vesicatorium auf den Brustknochen, und gab innerlich das *Elixir. pector. Reg. Daniae* (Ph. Würtemberg.), dessen Hauptbestandtheil der *Liquor Ammonii anisatus* ist.

℞ *Elixir. pect. Dan.* ʒij.

S. 1-2stündlich 15—20 gtt.
mit einem Theelöffel von folgender Mischung:

℞ *Syr. rad. Seneg.* ʒiij,
— *Gumm. ammoniac.* ʒj.

Zugleich liefs er folgende Salbe in den Hals einreiben:

℞ *Ungt. neapolit.* ʒj,
— *alb. Camphor.* ʒiβ.
M.

℞ *Moschi* gr. β—j,
Calomelan. gr. ij—v,
Sacchar. alb. ʒβ.

M. terend. f. pulv. dent. tal. dos.
No. viij.

S. Stündlich ein Pulver.
Wigand.

℞ *Ungt. pomad.* ʒj,
Mercur. praecip. alb. ʒj.

MS. Täglich dreimal in den Hals
einzureiben.

Lentin.

℞ *Mercur. praecip. alb.*
Camphor. āā ʒj,
Ungt. pomad. ʒvj.

MS. Halbstündlich eine Haselnufs
grofs in den Hals einzu-
reiben.

Hecker.

℞ *Argent. nitr. crystallis.* ʒj,
Aq. destillat. ʒj.

SS. Mit einem kameelhaarnen
Pinsel die ganze, den Schlund
bekleidende Membran 1—2mal
zu bestreichen.

Mackenzie.

Aphthae. Schwämmchen.

Bei Indigestion durch Ueberladung des Magens, schlechte, verdorbene Milch etc., Brechmittel oder einen abführenden Saft, dann örtliche Mittel. Erstrecken sich die Aphthen tief in den Speisekanal, dann schleimige Mittel, Emulsionen etc. Bei brandiger Entartung innerlich und äusserlich Antiseptica und Excitantia.

℞ *Borac.* ʒβ,
Sacchar. alb. ʒj.
M. f. Pulv.

DS. Zweimal täglich eine Messerspitze voll in die Zunge des Kindes einzureiben, auch auf die Brustwarze der Mutter zu streuen. Kluge.

℞ *Aq. Salviae*
Mell. rosat. āā ʒβ,
Borac. ʒβ.

MS. Pinselsaft. Wendt.

℞ *Succ. sempervir. tect.* ʒij,
Aq. Plantagin. ʒij,
Borac. ʒj.

MS. Pinselsaft. Lentin.

℞ *Mell. rosat.* ʒβ,
Mucil. sem. Cydonior. ʒj.

MS. Pinselsaft. Gölis.

℞ *Acid. sulphur. dilut.* gutt.
^{xxx,}
Syr. Moror. ʒj.

MS. Zum Pinseln. Henke.

℞ *Alumin.* ʒj-ʒj,
Aq. Rosar. ʒij.

MS. Zum Auspinseln.
Lattmann. Ficinus.

℞ *Aq. Calc.*
Syr. simpl. āā ʒβ.

MS. Pinselsaft. Wendt.

℞ *Aq. Calc.* ʒij,
Mucil. Gumm. mimos. ʒβ,

Syr. Bals. indic. ʒj.

MS. Pinselsaft. Berends.

℞ *Aq. oxymuriat.*
Syr. Moror. āā ʒj.

MS. Zum Pinseln. Kopp.

℞ *Spirit. Cochlear.* ʒüβ,
Succ. Citr.
Mucil. sem. Cydonior.
Syr. Moror. āā ʒβ.

MS. Zum Pinseln. Harke.

℞ *Zinc. sulphur. gr. v,*
solve in
Decoct. Salviae. ʒiv.

MS. Zum Auswaschen des Mundes. Henke.

℞ *Camphor. gr. iv,*
Mucil. Gumm. mimos.
Syr. Althaeae āā ʒβ.

Misc. terend. invic. et sensim
adde
Aq. flor. Aurant. ʒj.

S. Zweistündlich 1 Theelöffel.
(Für Kinder in der ersten Lebensperiode, bei böartigen Aphthen.) Wendt.

℞ *Extr. Chin. frig. parat.* ʒj,
Pulv. Gumm. Mimos. ʒij,
Aq. flor. Tiliae ʒij,
Spir. mur.-aether ʒβ,
Syr. cort. Citr. ʒj.

MS. Stündlich 2 volle Theelöffel
(Ebendasselbst.) Wendt.

℞ *Extr. Chin. frig. parat.*
— *lign. Campech.* āā ʒj,
Borac. ʒβ,
Decoct. Salep. tenuior. ʒiv,
Syr. Althaeae ʒj.

MS. Stündlich ein Theelöffel.
(Ebendasselbst.) Lentin.

Asthma Millari.

Die Heilung dieser Krankheit erfordert eine frühzeitige und thätige Anwendung der krampfstillenden oder flüchtigen Reizmittel. Es gehören dahin die *Asa foetida* innerlich und in Klystiren, der Moschus, der Hirschhorngest, das Cajeputöl, die Zinkblumen, warme aromatische Kräuterbäder, Einreibungen von flüchtigen Linimenten, mit Zusätzen von Cantharidentinctur, Campher etc.

℞ *Asae foetid. depur.* ʒij,
 solve in
Liq. Amm. acetic. ʒj,
 adde
Aq. Menth. crisp. ʒiij,
Syr. Croc. ʒβ.

MS. Alle 2—1 Stunde 1 Thee-
 oder Eßlöffel, nach dem Alter
 des Kindes. Millar.

℞ *Asae foetid. dep.* ʒij,
Aq. Valerian. ʒij,
Gumm. mimos. q. s.
Syr. Croc. ʒβ.

MS. Anfangs halbstündlich, spä-
 terhin alle 2 Stunden einen
 Kinderlöffel. Vogel.

℞ *Asae foetid.* ʒβ
Moschi genuin. gr. viij,
Mucil. Gumm. mimos. ʒβ,
 misc. terend. invic. adde
Aq. flor. Tiliae ʒiijβ,
Sacchar. alb. ʒij.

MS. Stündlich einen Theelöffel.
 Wendt.

℞ *Asae foetid. depur. gr. vj-*
vij,
Infus. flor. Chamomill. ʒj,
Gumm. Mimos. q. s. ad sub-
actionem.

S. Zum Klystir. (Für ein ganz
 kleines Kind.) Tourtual.

℞ *Asae foetid.* ʒβ,
Infus. rad. Valerian. (ex
 ʒij-iiij) ʒiv,
Gumm. arabic. q. s. ad sub-
actionem.

MS. Zu 2 Klystiren. (Für ein
 2—3jähriges Kind.
 Wendt.

℞ *Asae foetid.* ʒij,
Vitell. ovor. No. ij.
Ol. Chamomill. aether. gutt.
vi-viij,
 tere cum
Aq. Chamomill. ʒiβ.

MS. Zu 4 Klystiren, alle 3 Stun-
 den eins mit einer Tasse war-
 men Kamillenthee.

Casper.

℞ *Moschi orient. gr. vj,*
Sacchar. alb. ʒiij,
 Misc. terendq invic., adde
Aq. flor. Tiliae ʒiij,
Mucil. Mimos. ʒij.

MS. Stündlich 1 Eßlöffel. (Für
 ein Kind von 2—3 Jahren.)
 Wendt.

℞ *Moschi orient. gr. vi,*
Ammon. carbonic. gr. iv,
Sacchar. alb. ʒiij,
 Misc. terendo, adde
Aq. flor. Chamomill. ʒiβ.

MS. Stündlich einen vollen Theelöffel. (Für einen Säugling.)
Wendt.

℞ *Moschi orient.* gr. ix,
Sulphur. stibiat. aurant.
Zinc. oxydat. alb. āā gr. iij,
Sacchar. alb. ʒβ.

M. f. Pulv. divid. in part. vj.

S. Zweistündlich ein Pulver.
Hinze.

℞ *Rad. Valerian.*

— *Serpentar.* āā ʒij,

Inf. Aq. fervid. s. q. per ½
hor. Colatur ʒiv refr. adde

Liquor. Ammon. pyr.-oleos.
)ij,

Moschi orient. gr. viij,

Tinct. Ambræ ʒij,

Syr. flor. Aurant. ʒβ.

MS. Halbstündlich 2 volle Theelöffel.
Wendt.

℞ *Aq. flor. Chamomill.* ʒij,
Liq. Ammon. pyr.-oleos. ʒβ,
Syr. flor. Aurant. ʒβ.

MS. Stündlich einen Theelöffel.
(Für Kinder im 1sten Lebensjahre.)
Wendt.

℞ *Liq. Ammon. anisat.* ʒj,

Aq. Foenicul.

Syr. Althææ āā ʒj.

Sulphur. stibiat. aurant. gr. iv,

Tinct. Opii simpl. gutt. vj.

MS. Umgeschüttelt alle halbe Stunde einen Theelöffel. (Für ein Kind von 2 Jahren.)

℞ *Aq. flor. Chamomill.* ʒij,

Liq. C. C. succinic. gutt. viij,

Laud. liquid. Sydenh. gutt. j,

Tinct. Castor. gutt. vj,

Mucil. Gumm. arabic.

Syr. Diacod. āā ʒβ.

MS. Stündlich einen Theelöffel.
(Für Kinder von 4—12 Monaten.)
Gölis.

℞ *Liq. C. C. succinic.*

Liq. Amm. anisat. āā)j,

Moschi. optim. gr. iij,

Aq. Foenicul. ʒβ,

Syr. emulsiv. ʒj.

MS. Wohlumgeschüttelt 1—2 stündlich 1 Theelöffel. (Für ganz kleine Kinder.)
Tourtual.

℞ *Flor. Zinc.*

Moschi āā gr. ij,

Sacchar. alb.)β.

M. f. Pulv. dent. tal. dos. No. vj.
in charta cerata.

S. Zweistündlich 1 Pulver. (Für ein Kind von 2 Jahren.)
Tourtual.

℞ *Ol. Cajeput.* gutt. vj,

Sacchar. alb. q. s.

Aq. Foenicul. ʒij,

Tinct. Castor.)j,

Syr. Cort. Aurant. ʒβ.

MS. Zweistündlich einen Theelöffel.

℞ *Lapid. Cancror.* ʒβ,

Sulphur. stibiat. aurant.

gr. iv,

Extr. Hyoscyam. gr. ij,

Sacchar. alb. ʒij.

M. f. Pulv.

S. Zweistündlich einen Theelöffel.
Urban.
(Hufel. Journ. 1830.)

℞ *Spirit. Angelic. comp.* ʒij,

Mixtur. oleos.-balsamic. ʒβ,

Liq. Ammon. caustic.

Tinct. Opii simpl. āā ʒβ.

MS. In die Brust und das Rückgrath einzureiben. Wendt.

℞ *Ol. Nucist.* ℥β,
 — *Hyoscyam. coct.* ℥vj,
 leni calore liquatis. adde
Ol. animal.-aether.
 — *Cajeput.* āā ℥β.
 M. f. Linimentum.
 S. In den Leib einzureiben.
 Vogt.

℞ *Sapon. medic. ras.* ℥ij,
Camphor. trit. ℥j,
Liq. Ammon. vinos. ℥β,
Ol. Rorismarin. gutt. xv.
 MS. Alle drei Stunden einen
 Theelöffel voll einzureiben.
 Hufeland.

℞ *Spirit. camphor.*
 — *Angelic.* āā ℥j,
Tinct. Cantharid. ℥j,
Liq. Ammon. caustic. ℥ij,
Aq. Coloniens. ℥ij.
 MS. In Brust und Rückgrath ein-
 zureiben.
 Casper.

℞ *Spec. aromatic.* ℥j,
Herb. Rutae
Rad. Calam. aromatic. āā
 ℥β.
 M. f. Spec. divid. in vj part. aeq.
 S. Ein Paket zum Bade.
 Wendt.

Asphyxia neonatorum.

Bei dem apoplektischen Zustande ist schnelle Durchschneidung der Nabelschnur, und das Ausfliessen lassen von Blut aus dem, dem Kinde angehörigen Ende, das nöthigste und wichtigste Heilmittel. Es passen ferner leichte Brechmittel, reizende Klystire aus warmem Wasser oder Kamillenaufguss mit Wein, Essig, Salz, Seife etc.; das Reiben des Körpers mit gewärmten Tüchern, Bürsten, das Einblasen der Luft durch die Nase und den Mund in die Lungen. Sehr wirksam ist auch das Auftröpfeln von kaltem Wasser, Wein, Aether auf die Herzgrube, und die Bäder mit Wein, aetherischen Oelen etc.

Liegt das Kind im Zustande der Ohnmacht, so darf die Nabelschnur nicht sogleich unterbunden und abgeschnitten werden. Man sucht den Uebergang des Blutes, von der Mutter zum Kinde zu, zu befördern. Dabei werden die schon genannten Mittel ohne Zeitverlust in Anwendung gebracht.

A e u f s e r l i c h.

1) Klystire aus Kamillen, Hafergrütze etc. (1 kleine Tasse) mit $\frac{1}{2}$ Loth Seife, $\frac{1}{2}$ - 1 Theelöffel Salz, $\frac{1}{2}$ Eßlöffel Weinessig, 1-2 Eßlöffel Honig oder *Oxymel simplex*.

2) Bäder von 28° R. mit Wein oder Brantwein (etwa den 8. — 10. Theil) oder mit 6 Tropfen *Oleum Rosmarini* (Mende). Man hält Brust und Oberbauchgegend des Kindes so weit aus dem Bade hervor, dafs man Wein oder Schwefeläther von einer gewissen Höhe darauf herabfallen lassen kann.

I n n e r l i c h.

1) Kamillenthee mit etwas Wein, 10—15 Tropfen, oder *Aether sulphuricus*, 2 Tropfen.

2) Brechmittel aus *Oxymel Squillae*, alle 5—10 Minuten einen Theelöffel, oder aus *Vinum stibiatum*, zu 4—5 Tropfen.

Crusta lactea.

Bei der Behandlung ist vorzüglich darauf zu sehen, dafs alle Hindernisse, welche einer zweckmäfsigen Ernährung entgegenstehen, gewissenhaft beseitigt werden. Als Arzneimittel passen die Mercurialien und Antimonialien, der Schwefel, die *Herba Jaceae* etc. Aeuferlich hat man zu verhüten, dafs nichts Zweckwidriges geschehe, namentlich hat man sich vor Bleipräparaten in Acht zu nehmen.

℞ *Aethiop. miner. s. antim.*

gr. β - v,

Magnes. alb. gr. iv,

Sacchar. alb. β.

M. f. Pulv. dent. tal. dos. No. xij.

S. Zweimal täglich ein Pulver.

(Für ein Kind von 6 Monaten bis 5—6 Jahren.)

Hufeland.

℞ *Aethiop. mineral.* gr. iβ-viij,

Herb. Viola tricolor. gr. iv-x,

Sacchar. lact. gr. iij-vj.

M. f. Pulv. dent. tal. dos. No. xij.

S. Dreimal täglich ein Pulver.

Kopp.

℞ *Calomelan.*

Sulphur. stibiat. aurant. āā

gr. iv,

Sacchar. alb. ʒij.

M. f. Pulv. divid. in part. xij.

S. Dreimal täglich ein Pulver.

Wendt.

℞ *Herb. Jaceae* ʒiij,

Sem. Foenicul. ʒj,

Sacchar. lact. ʒij.

M. f. Pulv.

S. Täglich dreimal eine Messerspitze.

Haase.

℞ *Pulv. hb. Jaceae*

Sacchar. lact. āā ʒiij,

Sulphur. praecip.

Magn. carbonic. āā ʒij.

M. f. Pulv.

S. Tägl. 4mal eine Messerspitze.

Jahn.

℞ *Herb. Jaceae* ʒij,

Stipit. Dulcamar. ʒj,

Inf. c. Ag. fervid. g. s. per

¼ hor. *Colatur.* ʒiij

adde

Vin. stibiat. ʒj,

Syr. Althaeae ʒβ.

MS. Dreistündl. I Kinderlöffel.

Jahn.

℞ *Magnes. carbonic.*
Sacchar. alb. āā ʒij,
Flor. Sulphur. ʒj.
MS. Dreimal tägl. $\frac{1}{2}$ Theelöffel.
Gölis.

℞ *Sulphur. praecipit.* ʒβ,
Magnes. carbonic. ʒj,
Sem. Foenicul. ʒβ,
Sacch. lact. ʒiβ.
M. f. Pulv.
S. 4mal tägl. eine Messerspitze.
Haase.

℞ *Hydrargyr. muriatic.*
corrosiv. gr. xij,
Aq. destillat. ʒvj.
MS. Waschwasser. (Mit diesem
Wasser werden die mit Aus-
schlag behafteten Stellen 2mal
täglich benetzt; nach 4 Wochen
soll vollständige Heilung ein-
treten.) v. Wedekind.

℞ *Ungt. rosat.* ʒj,
Zinc. oxydat. alb. ʒj,
Mercur. praecip. alb. ʒj.
M. f. Ungt.
S. Auf die exulcerirten Stellen
zu legen. Wendt.

℞ *Calcar. sulphurat.* ʒij,
solve in
Deci. Althaeae ʒij.
S. Den Ansprung öfters damit
zu waschen. Hahnemann.

℞ *Butyr. rec. non salit.* ʒj,
Flor. Zinc. ʒβ,
Opii subtilissim. pulv. gr. vj.
M. f. Ungt.
S. Auf die leidenden Stellen zu
streichen. Henke.

Dentitio difficilis.

Bei starkem Orgasmus der Säfte passen leichte
Ableitungen der Säfte durch Calomel, milde Laxanzen,
Saturationen, saure Fußbäder, Klystire. Mehrt sich
der Trieb nach dem Kopfe, dann muß man Blut ent-
leeren, kalte Umschläge machen, s. Encephalitis.
Oertlich pafst am besten kaltes Wasser.

℞ *Calomelan.* gr. iij,
Pulv. gummos. ʒij,
M. f. Pulv. divid. in xij
part. aeq.
S. 2—3mal tägl. 1 Pulver.
Wendt.

℞ *Infus. Senn. compos.*
Syr. mannat. āā ʒj.
MS. Stündlich einen vollen Thee-
löffel. Wendt.

℞ *Succ. Citr. rec. par.* ʒβ,
Kal. carbonic. q. s. ad per-
fect. saturat.
Aq. destillat. ʒij,
Syr. Althaeae. ʒβ.
MS. Stündlich einen Kinderlöffel.
Wendt.

℞ *Flor. Zinc.* gr. vj,
Lapid. Cancror. ppt. ʒβ,
Sacchar. alb. ʒiβ.
M. f. Pulv. divid. in xij part.
S. Zweistündlich ein Pulver. (Bei
Krämpfen aus Zahnreiz.)

℞ *Flor. Zinc.*
Calomelan. āā gr. β,
Sacchar. alb. γβ.
 M. f. Pulv. dent. tal. dos. vj.
 S. Zweistündl. ein Pulver. (Bei
 Krämpfen aus Zahnreiz.)
 Hufeland.

Diarrhoea.

Ist das Kind übrigens munter und kräftig, sind die Ausleerungen selten und nicht zu flüssig, ist keine fieberhafte Hitze zugegen, ist die Zunge belegt, so passen Salmiak, *Tinct. Rhei. aquos.* in schleimigen Vehikeln. Auch nützen hier oft Brechmittel. Bei mehr catarrhalischen Durchfällen erzeugt sich ein *Infus. rad. Ipecacuanhae* sehr wirksam. Ist die Diarrhoe nicht von schadhaften Stoffen abhängig, und mit grosser Schwäche, vorwaltender Nervosität, heftigen Unterleibskrämpfen verbunden, dann empfiehlt sich das *Extr. nucis Vomicae*. Ist der Durchfall sehr häufig, fällt das Kind im Gesichte sehr ein, und fiebert es heftig, dann Blutegel auf den Leib, erweichende Umschläge, und innerlich schleimige, einhüllende Mittel. — In mehr chronischen Fällen passen aromatische, bittere Mittel, gewürzhafte Einreibungen, Bäder etc.

℞ *Aq. Foenicul.* ℥ij,
Sal. Ammoniac. ℥j,
Tinct. Rhei aquos. ℥ij,
Syr. Chamomill. ℥iv.

MS. Theelöffelweise. (Für 1jäh-
 rige Kinder.) Gölis.

℞ *Sal. Ammoniac.* γβ-j,
Aq. Foenicul. ℥ij,
Syr. emulsiv. ℥vj.

MS. 2stündl. 1 Theelöffel. (Für
 Säuglinge.) Hufeland.

℞ *Decoct. Salep. tenuior.* ℥iij,
Tinct. Rhei aquos. ℥ij,
Aq. Cinnamom. s. ℥β,
Sacchar. alb. ℥ij.

MS. 2stündl. 2 Theelöffel. (Für
 Säuglinge.) Wendt.

℞ *Tinct. Rhei. aquos.* ℥iβ,
Liq. Ammon. pyr.-oleos. ℥ij,
Aq. Cinnamom. ℥iβ,
Syr. Althaeae ℥vj.

MS. Alle 1½ Stunden 1 Thee-
 löffel. (Für ein Kind von einem
 Jahre.) Vogt.

℞ *Gumm. Mimos. pulv.* ℥j,
 solve in
Aq. Foenicul. ℥j,
 adde

Conch. ppt. ℥β,
Syr. Althaeae ℥j.

MS. Umgeschüttelt 2stündl. einen
 Theelöffel. Phöbus.

℞ *Pulv. rad. Ipecacuanh.* ℥j,

Oxymell. squill.
Syr. rub. Idaei
Aq. font. aa ʒβ.
 MS. Alle 10—15 Minuten einen
 Theelöffel. (Für Kinder im
 ersten Jahre.) Hufeland.

℞ *Pulv. rad. Ipecacuanh.* ʒj,
Tart. stibiat. gr. j,
Oxymell. squill.
Syr. rub. Idaei aa ʒβ,
Aq. font. ʒj.
 MS. Umgeschüttelt alle 10 Min.
 einen Thee- bis Kinderlöffel.
 (Für Kinder von 1—6 Jahren.)
 Hufeland.

℞ *Camphor. subact.* gr. β,
Decoct. Althaeae ʒij,
Laud. liquid. Sydenh. gutt.
 i-ij.
 MS. 1—2ständl. einen Theelöffel.
 (Für Kinder von 1—2 Jahren
 bei katarrhalischer Diarrhoe.)
 Gölis.

℞ *Rad. Valerian.* ʒβ,
 — *Colomb.* ʒj,
 inf. *Aq. fervid.* q. s. Colatur. ʒv
 adde
Camphor. subact. gr. j,
Laud. liquid. Sydenh. gutt.
 ij-ijj,
Syr. cort. Aurant. ʒβ,
 MS. 2—3ständlich einen Kinder-
 löffel. (Für ein 4jähriges Kind
 bei Durchfall mit Verdacht von
 Würmern.) Gölis.

℞ *Rad. Ipecacuanh.* ʒβ.
 infund. *Aq. fervid.* q. s. Colatur.
 ʒiv adde
Mucil. Gumm. Mimos. ʒüj,
Syr. Althaeae ʒβ.
 MS. 2ständlich ein Kinder-Efs-
 löffel.

℞ *Pulv. rad. Ipecacuanh.* gr. iij,
Pulv. Gumm. Mimos.
Magnes. carbonic. aa ʒβ,
Sacchar. alb. ʒj.
 M. f. Pulv. divid. in xij part. aeq.
 S. 2ständl. ein Pulver.
 Vogler.

℞ *Extr. nuc. Vomic.* gr. i-ii,
Mucil. Gumm. Mimos. ʒβ,
Aq. destillat. ʒüj,
Syr. emulsiv. ʒvj.
 MS. 2ständl. 1 Theelöffel. (Für
 Kinder von 1—3 und 3—8
 Jahren.) Barez.

℞ *Ol. Amygd. dulc. rec. express.*
Pulv. Gumm. arabic,
Syr. Amygd. aa ʒij,
Aq. Cinnamom. s. ʒβ,
Aq. Foenicul. ʒj.
 MS. Stündlich einen Theelöffel.
 (Für einen Säugling.)
 Richter.

℞ *Aq. flor. Tiliae*
Mucil. Gumm. Mimos. aa ʒiβ.
 MS. Stündlich 2 volle Theelöffel.
 Wendt.

℞ *Gumm. arabic.* ʒβ-j,
 solve in
Aq. fervid. ʒüj.
 S. Zum Getränk. Hokes.

℞ *Ol. Amygd. dulc.* ʒüj,
Gumm. arabic. ʒj,
Aq. Cerasor. nigr. ʒj,
Syr. opiat. ʒij.
 MS. Stündlich 1 Theelöffel.
 Richter.

℞ *Semin. Papaver.* ʒβ,
Aq. destillat. ʒvj,
 f. l. a. emulsio, cui adde
Aq. Amygd. amarar. ʒij-iv,
Sacchar. alb. ʒüj.
 MS. 2ständlich 1 Theelöffel.
 Wendt.

℞ *Aq. oxymuriatic.* ʒij-iv-vj,
Aq. destillat. ʒiβ,
Mucil. Gumm. Mimos.
Syr. simplic. aa ʒvj.
 M. d. in vitro, charta nigro in-
 voluto.
 S. Alle 1½ Stunde einen Thee-
 löffel. (Für Kinder von 1—3
 und 3—5 Jahren.) Kopp.

℞ *Cort. Cascarill.* ʒiij,
coq. c. *Aq. font.* q. s. per $\frac{1}{2}$ hor.
sub finem coct. adde

Pulv. rad. Salep. ʒj,
Colatur ʒvj adde

Liq. Ammon. anisat. ʒβ-j,
Syr. Cinnam. ʒβ.

MS. 2stündl. einen Eßlöffel. (Für
Kinder in den ersten Lebens-
jahren.) Vogt.

℞ *Pulv. cort. Cascarill.* ʒβ,
Inf. c. *Aq. bullient.* ʒv,
digere per $\frac{1}{4}$ hor. vase clauso,
cola; residuum pulverat. coq. c.
Aq. font. q. s. ad reman. ʒiij,

Liquor. colat. misce et adde

Tinct. aromat. ʒj,

Mucil. Gumm. Mimos. ʒβ.

MS. Alle 2 Stunden einen Eß-
löffel. Richter.

℞ *Extr. Cascarill.* ʒj,
Aq. Foenicul. ʒij.

MS. 3stündl. 1 Theelöffel. (Für
Neugeborne.) Jörg.

℞ *Extr. Cascarill.* ʒij,
— *Colomb.* ʒβ.

Aq. Chamomill. ʒiv,

Gumm. arabic. ʒiij,

Syr. cort. Aurant. ʒj.

MS. Kindern von 2 — 3 Jahren
2stündl. 1 Theelöffel, älteren
1 Kinderlöffel.

℞ *Extr. Colomb.* ʒj,
Decoct. Salep. tenuior. ʒiij,
Elaeos. Foenicul. ʒij.

MS. Stündlich 2 volle Theelöffel.
Wendt.

℞ *Extr. Colomb.* ʒij,
Aq. Cinnamom. s. ʒij,
Spir. sulphur.-aether. ʒj,
Tinct. Rhei aquos. ʒβ.

MS. Täglich 3mal einen Kinder-
löffel. Richter.

℞ *Extr. Dulcamar.* gr. viij,
Decoct. Althaeae ʒiij,

Laud. liquid. Sydenh. gutt. ij,
Syr. Althaeae ʒβ.

MS. Stündlich einen Theelöffel.
Gölis.

℞ *Cort. Chin. reg.* ʒβ,
inf. *Aq. fervid.* q. s. per $\frac{1}{4}$ hor.
in Colatur. ʒiij
solve

Extr. Ligni Campechien. ʒj,

Aq. Cinnamom.

Syr. flor. Aurant. āā ʒβ.

MS. Stündlich einen Kinderlöffel.
Wendt.

℞ *Rad. Calam. arom.* ʒβ,
inf. in s. q. *Aq. fervid.* per $\frac{1}{2}$ hor.
in Colatur. ʒiij
solve

Pulv. Gumm. Mimos. ʒj,

Sacchar. alb. ʒij.

MS. Stündlich einen Kinderlöffel.
(Für einen Säugling.)
Wendt.

℞ *Rad. Calam. arom.* ʒij,
— *Caryophyllat.* ʒβ,
inf. *Aq. fervid.* q. s. per $\frac{1}{4}$ hor.
Colatur. ʒvj refrig. adde
Essent. cort. Aurant. ʒj,
Tinct. Rhei vinos. ʒij,
Syr. cort. Aurant. ʒj.

MS. 2stündl. einen Kinder-Eß-
löffel voll. Henke.

℞ *Rad. Colomb.* ʒβ,
— *Salep.* ʒβ,
coq. c. *Aq. font.* per $\frac{1}{4}$ hor. Co-
latur. ʒiij adde
Syr. Chamomill. ʒβ.

MS. Stündlich einen Kinderlöffel.
(Für ein 2jähriges Kind.)
Gölis.

℞ *Decoct. Salep.* (ex gr. viij) ʒij,
Laud. liq. Sydenh. gutt. ij,
Pulv. rad. Colombo gr. viij-x,
Syr. Chamomill. ʒβ.

MS. Umgeschüttelt stündlich ei-
nen Kinderlöffel. Gölis.

℞ *Decoct. Althaeae* (ex ʒj) ʒij,
Gumm. Mimos. ʒij,
Ferr. muriatic. ʒβ,
Syr. Althaeae ʒvj.

MS. Wohlungeschüttelt stündlich
 2 Theelöffel. v. Pommer.

℞ *Liquor. Ferr. muriatic.* ʒβ,
Aq. Cinnamom. ʒiβ,
Syr. Althaeae ʒβ.

MS. Stündlich 2 Theelöffel.

℞ *Pulv. rad. Jalap.* gr. i-iiij,
Nuc. moschat. gr. β-j,
Elacos. Foenicul. gr. v.

M. f. Pulv. dent. tal. dos. xij.
 S. 2—3mal täglich ein Pulver.
 Rauch.

℞ *Amyl.* ʒβ.

DS. $\frac{1}{2}$ —1 Theelöffel mit etwas
 kaltem Wasser anzurühren,
 dann eine Tasse heisses Was-
 ser hinzu zu gießen, aufwallen
 und durchseihen zu lassen. Zum
 Klystir.

℞ *Ol. Nucist.* ʒiβ,
 — *Hyoscyam. coct.* ʒi,
 leni calore liquat. admisc.
Ol. Rorismarin. ʒj.

S. Theelöffelweise in den Unter-
 leib einzureiben. Vogt.

℞ *Ol. Nucist.* ʒβ,
 — *Hyoscyam. coct.* ʒvj,
 leni calore liquat. admisc
Ol. animal. aether.
 — *Cajepul.* āā ʒβ.

M. f. Liniment.
 S. In den Leib einzureiben.
 Vogt.

℞ *Ol. Nucist.*

Ungt. simpl. āā ʒij,
 leni calore liquat. et refriger-
 atis adde

Tinct. Opii. s. ʒβ,
Mixtur. oleos.-balsamic. ʒj.

MS. In den Unterleib einzurei-
 ben. Wendt.

Encephalitis exsudatoria.

Die erste Indication ist, den Entzündungszustand
 im Allgemeinen zu vermindern, und die Intensität der
 arteriellen Erregung in der sensiblen Sphäre herabzu-
 stimmen. Dazu Blutentziehung, Anwendung der Kälte
 auf das leidende Organ, und Ableitung der Säfte durch
 Abführmittel, namentlich Calomel, Klystire etc. Bei
 schon zu Stande gekommenem Extravasat *Digitalis*
 mit Kalomel, *Liq. Kali acetic* etc.; bei Krämpfen
 Moschus, Blasenpflaster etc. Zuletzt kalte Sturzbäder.

℞ *Calomelan.* gr. viij-xij-xvj,
Magnes. carbonic. ʒij,
Pulv. gummos. ʒij.

M. f. Pulv. divid. in viij part aeq.

S. 1—2stündl. ein Pulver.

Wendt.

℞ *Calomelan.* gr. xij,

Rad. Jalap. tost.

— *Liquirit.* āā ʒj.

M. f. Pulv. divid. in xij part. aeq.

S. 2stündlich ein Pulver.

Gölis.

℞ *Kal. tartaric.* ℥iij,
Decoct. Hordei ℥iij,
Syr. Althaeae ℥j.
 MS. 2stündl. einen Eßlöffel.
 Wendt.

℞ *Magnes. sulphur.* ℥ij,
Mann. elect. ℥j,
 solve in
Emuls. Amygdal. ℥iv.
 MS. 2stündlich 1 Eßlöffel.
 Wendt.

℞ *Infus. Senn. compos.* ℥iij,
Sal. mirabil. Glauber. ℥vj,
Syr. Rhei ℥j.
 MS. Kindern von 1—2 Jahren
 2stündl. einen Theelöffel, den-
 nen von 3—4 Jahren 1 Kin-
 der- und älteren einen Eßlöffel.

℞ *Syr. de Spina cervina* ℥ij.
 S. 1—2stündl. einen Theelöffel.

℞ *Aq. destillat. s.* ℥ij,
Liq. Kal. acetic.
Syr. Mann. āā ℥j.
 MS. 2stündl. einen Eßlöffel.
 Wendt.

℞ *Calomel.* gr. ij,
Nitr. depurat. gr. v,
Rad. Liquirit. ℥β.
 M. f. Pulv. dent. tal. dos. viij.
 S. Größern Kindern (6—10 Jah-
 ren) alle zwei Stunden 1, klei-
 neren $\frac{1}{2}$. Fischer.

℞ *Calomelan.* gr. iv,
Pulv. hb. Digital. gr. ij,
Sacchar alb. ℥ij.
 M. f. Pulv. divid. in xij part.
 S. 2stündl. ein Pulver. (Für ei-
 nen Säugling.) Wendt.

℞ *Calomelan.* gr. xij,
Pulv. hb. Digital. gr. iij,
Sacchar. alb. ℥ij.

M. f. Pulv. divid. in xij part.
 S. Für ein Kind von $1\frac{1}{2}$ —3 Jah-
 ren. Wendt.

℞ *Flor. Arnic.* ℥β,
 Inf. per $\frac{1}{2}$ hor. *Aq. fervid.* vas.
 claus. Colatur. ℥vj refriger. adde
Syr. Cort. Aurant. ℥β,
Spirit. nitr. dulc. gutt. vj.
 MS. 2stündlich einen Löffel voll.
 (Für ein Kind unter 2 Jahren.)
 Gölis.

℞ *Infus. flor. Arnic.* (ex ℥j)
 ℥iv,
Syr. Menth. ℥vj,
Aether. Vitriol. gutt. x.
 MS. Stündlich 1 Eßlöffel. (Für
 ein älteres Kind.)
 Gölis.

℞ *Moschi*
Calomelan. āā gr. viij,
Sacchar. alb. ℥iv.
 M. f. Pulv. divid. in viij part
 S. 2stündlich ein Pulver.
 Wendt.

℞ *Moschi* gr. vj,
Sacchar. alb. ℥iij,
 Misc. terendo invicem et adde.
Aq. flor. Tiliae ℥iij,
Mucil. Gumm. Mimos. ℥ij.
 MS. Alle zwei Stunden einen
 Eßlöffel. Wendt.

℞ *Ungt. Hydrargyr. ciner.* ℥j.
 S. Binnen 24 Stunden in belie-
 bigen Zwischenräumen in die
 Nähe des Kopfes einzureiben.

Erysipelas neonatorum.

Ist die Rose neu, so werden sogleich Bluteigel um die Entzündungsgeschwulst gelegt, und leichte Abführungen gegeben. Auch wird Calomel gegeben, um so entschiedener wässrige Stühle zu erzeugen. Hat die Entzündung einen so hohen Grad erreicht, daß sie zur brandigen Entartung neigt, so passen Calomel und Campher, *Chinium sulphuricum*, die China. Aeußerlich wird *Spirit. camphoratus* sehr gelobt.

℞ *Infus. Senn. compos.* ℥j,
Syr. mannat. ℥β.

MS. Theelöffelweise.
Wendt.

℞ *Kali tartarici* ℥ij,
Aq. destillat. s. ℥ij,
Syr. Rhei,
Extr. Taraxac. āā ℥β.

MS. Stündlich einen Kinderlöffel.
Wendt.

℞ *Calomelan.* gr. vj,
Sacchar. alb. ℥ij.

M. f. Pulv. divid. in part. aequal.
xij.
S. 3stündl. ein Pulver.

℞ *Calomelan.*
Camphor. subact. āā gr. β,
Sacchar. alb. ℥β.

M. f. Pulv. dent. tal. dos. No. viij
in chart. cerata.
S. 2stündl. 1 Pulver. Carus.

℞ *Chinii sulphuric.* gr. ʒ,
Sacchar. alb. ℥β.

M. f. Pulv. dent. tal. dos. No. xij.
S. 2—3mal täglich ein Pulver.
John Miles.
(The London Medical
Repository, 1824.)

℞ *Extr. Chin. reg. frigid. par.* ℥j,
Pulv. Gumm. Mimos. ʒij,
Aq. flor. Tiliae ℥iij,
Spirit. muriatico-aether. ℥β,
Syr. cort. Citr. ℥j.

MS. Stündlich 2 Theelöffel.
Wendt.

℞ *Spirit. camphor.* ℥j.

S. In die entzündeten Stellen
einzureiben.
Lodemann.

Exanthemata acuta.

Die Behandlung der akuten Exantheme richtet sich vornehmlich nach dem Charakter des begleitenden Fiebers. Ist dasselbe entzündlicher Natur, so passen Blutentleerungen, kühlende Abführmittel, Calomel, Nitrum, ableitende Klystire. — Ist gastrische Compli-

cation zugegen, so giebt man Brechmittel, Abführmittel, Salmiak, *Tartarus stibiatus* in refracta dos. — Später *Liquor Ammonii acetici*, *Vinum stibiatum* etc. — Bei nervösen Exanthemen empfehlen sich *Excitantia*, Opium, Moschus, *Liq. C. C. succinici*, *Rad. Angelicae*, *Serpentariae* etc.; ferner die China, der Campher, innerlich und in Klystiren, aromatische Bäder. — Bei zurückgetretenen, je nach dem Vitalitätszustande, antiphlogistische oder excitirende Mittel, Einwickelungen von Senf, von heißem Brantwein etc. Die Behandlung der einzelnen Formen s. unten.

℞ *Mann.* ʒβ,
 solve in
Infus. folior. Senn. (ex ʒj) ʒij,
Natr. sulphuric. ʒβ.
 MS. Stündlich 2 Eßlöffel.
 Radius.

℞ *Natr. sulphuric.* ʒj,
Aq. Chamomill. ʒv,
Syr. mannat. ʒij.
 MS. Kindern von 1—2 Jahren
 2stündlich ein Kinder-, von 3—
 5 Jahren ein Eßlöffel.
 Fischer.

℞ *Infus. Senn. compos.* ʒiiij,
Sal. mirab. Glauber. ʒvj,
Syr. cort. Citr. ʒj.
 MS. Wie vorher. Fischer.

℞ *Mann. elect.* ʒij,
Sal. mirab. Glaub. ʒj,
Aq. destillat. ʒvij.
 MS. Kinder- und Eßlöffelweise.
 Radius.

℞ *Pulp. Tamarind.* ʒj,
 coq. in s. q. *Aq.* per ¼ hor.
 in Colatur. ʒiv solve
Sal. amar. ʒij,
Syr. mannat. ʒj.
 MS. 2stündlich 1 Eßlöffel. (Für
 ein Kind von 2 Jahren.)
 Wendt.

℞ *Pulp. Tamarind.* ʒij,
 coq. in s. q. *Aq. fervid.* per ½ hor.
 Colatur. ʒvj adde
Syr. mannat. ʒj.
 MS. Stündlich 1—2 Eßlöffel.
 (Für ein Kind von 3—5 Jah-
 ren.)
 Wendt.

℞ *Sal. ammoniac.* ʒj,
Decoct. Althaeae ʒiiij,
Syr. Violar. ʒj,
Vin. stibiat. ʒβ.
 MS. 2stündlich einen kleinen Eß-
 löffel.
 Wendt.

℞ *Kali nitric.* ʒi-ʒij,
Aq. flor. Sambuc. ʒiv,
Syr. rub. Idaei ʒj.
 MS. 2stündlich 1 Kinder-Eßlöffel
 voll. (Für Kinder von 2—5
 Jahren.)
 Henke.

℞ *Kal. nitric.* ʒij,
Aq. flor. Sambuc. ʒiiij,
Spirit. Minderer.
Syr. Althaeae āā ʒvj,
Vin. stibiat. ʒβ.
 MS. Stündlich einen Eßlöffel.

℞ *Amygdal. dulc. excort.* ʒβ,
 f. c. *Aq. flor. Sambuc.* ʒiv
 l. a. emulsio,
 cui adde
Nitr. depurat. ʒj-ij.
 MS. 2stündl. 1 Kinder-Eßlöffel.
 Henke.

℞ *Liquor. Ammon. acetic.* ℥β,
Vin. antimon. ℥iβ,
Aq. flor. Sambuc. ℥iij,
Syr. Althaeae ℥β.

MS. 2stündlich 1 Eßlöffel.
 Hufeland.

℞ *Liquor. Ammon. acetic.* ℥ij-℥j,
Vin. antimon. ℥j,
Aq. Menth. crisp. ℥vj,
Syr. Rub. Idaei ℥j.

MS. 1½stündl. 1 Theelöffel. (Für
 ein Kind von 6 Monaten.)
 Vogt.

℞ *Liquor. Ammon. acetic.* ℥iij,
Kal. tartaric. ℥j,
Aq. flor. Sambuc. ℥iij,
Spirit. nitr. dulc. ℥j,
Oxymell. squill. ℥iij,
Syr. Liquirit. ℥iij.

MS. Stündlich einen Eßlöffel.
 Hufeland.

℞ *Kali tartaric.* ℥j,
Vin. Antimon. ℥β,
Aq. Foenicul. ℥j,
Oxymell. squill.
Syr. Liquirit. āā ℥β.

MS. 2stündlich 1—2 Theelöffel.
 (Für ein 1—1½jähriges Kind.)

℞ *Kali tartaric.* ℥iij,
Aq. destillat. ℥iij,
Vin. stibiat. ℥j,
Liquor. Ammon. acetic. ℥iij,
Syr. Althaeae ℥j.

MS. Stündlich einen Kinderlöffel.
 Vogt.

℞ *Tart. stibiat. gr.* β-ij,
Aq. destillat. ℥β,
Syr. Violar. ℥j.

MS. Stündlich einen Theelöffel.
 (Für Kinder von ½ Jahre bis
 4—8 Jahren.) Ellisen.
 (Hufeland's Journ. Bd. 56.)

℞ *Acid. muriat.* ℥β,
Aq. Rub. Idaei ℥iv,
Syr. Rub. Idaei ℥iβ.

MS. 2stündlich einen Eßlöffel.

℞ *Acid. sulphuric. dilut.* ℥β,
Aq. Rub. Idaei ℥iv,
Syr. Rub. Idaei ℥iβ.

MS. 2stündlich einen Eßlöffel.

℞ *Infus. Valerian.* (e ℥β) ℥vj,
Aether. sulphur. ℥β,
Liq. Ammon. acetic. ℥β,
Syr. Chamomill. ℥j.

MS. 2stündlich einen Eßlöffel.
 Berends.

℞ *Acid. sulphuric. dilut.* ℥j,
Syr. Cerasor. ℥ij.

MS. Bis zur angenehmen Säure
 unter das Getränk zu mischen.

℞ *Camphor. gr.* vj,
Mucil. Gumm. Mimos.
Syr. simpl. āā ℥j.

Misce terendo invicem et adde
Emuls. Amygdal. ℥iv.

MS. 2stündl. 1 Eßlöffel. (Für
 Kinder in der zweiten Lebens-
 periode.) Wendt.

℞ *Aq. Meliss.* ℥iij,
Tinct. Opii crocat. gutt. viij-
 xij,
Mucil. Mimos.
Syr. cort. Aurant. āā ℥β.

MS. 2stündl. 1 Eßlöffel.
 Wendt.

℞ *Flor. Zinc. gr.* j,
Laud. liquid. Sydenh. gutt. j,
Sacchar. alb. ℥j.

M. f. Pulv. dent. tal. dos. No. vj.
 S. 3stündl. ½-1 Pulver. (Für 2—
 6jährige Kinder.)
 Hufeland.

℞ *Liq. C. C. succinic.* gutt. 60.
Moschi c. Sacchar. alb. trit.

gr. vj,
Tinct. Opii crocat. gutt. xv,
Aq. flor. Sambuc. ℥v,
Syr. Amygdalar. ℥j.

MS. ½-1stündl. 1 Kinderlöffel.
 Hufeland.

℞ *Moschi opt.* gr. iij-iv,
tere exactiss. c.

Aq. Foenicul. ℥vj,
adde

Liq. C. C. succ. ℥j,
Syr. Papav. Rhoad. ℥j.

MS. Stündlich 1 Theelöffel. (Für ein Kind von 6 Monaten.)
Vogt.

℞ *Liq. C. C. succinic.* gutt. xxx,
Moschi gr. iij,
Tinct. Opii crocat. gutt. x,
Syr. Althaeae ℥iβ.

MS. 2stündlich 1 Thee- bis Kinderlöffel. (Für Kinder von 2—4—6 Jahren.)
Richter.

℞ *Flor. Arnic.* ℥iβ,
Inf. in s. q. *Aq. fervid.* per ½ hor.
Colatur. ℥v
refrigerat. adde

Tinct. Opii crocat. ℥β,
Pulv. Gumm. Mimos.
Sacchar. alb. āā ℥ij.

MS. Stündlich 1 Eßlöffel.
Wendt.

℞ *Rad. Angelic.* ℥iij,
Inf. in s. q. *Aq. fervid.* per ½ hor.
Colatur. ℥vj
adde

Liq. ammon. acetic. ℥β,
Camphor. gr. vj,
Syr. cort. Aurant. ℥j.

MS. Stündlich 1 Kinderlöffel.
Henke.

℞ *Rad. Angelic.* ℥ij,
— *Arnic.* ℥β.

Inf. *Aq. fervid.* q. s. digere per ½ hor. Colatur. ℥v refrigerat.
adde

Moschi optim. gr. iv,
Camphor. gr. ij,
Gummi Mimos. ℥j,
Elaeos. Foenicul. ℥iij.

MS. Stündlich 1 Kinderlöffel.
Casper.

℞ *Rad. Serpent.* ℥iβ-ij.
Inf. in s. q. *Aq. fervid.* per ½

hor. Colatur. ℥iv refrigerat.
adde

Spir. sulphur.-aether. ℥ij,
Syr. flor. Aurant. ℥j.

MS. 2stündl. ein Eßlöffel.
Wendt.

℞ *Cort. Chin. fusc.* ℥β.

Coq. c. *Aq. comm.* ℥xij,
sub finem coct. infund.

Rad. Serpentar. ℥ij,
ad Colatur. ℥vj, cui adde
Syr. cort. Aurant. ℥j.

MS. Stündlich 1 Eßlöffel.
Henke.

℞ *Rad. Serpentar.* ℥ij.

Inf. *Aq. fervid.* q. s. per ½ hor.
in Colatur. ℥iv solve

Extr. Chin. frig. parat. ℥j-iβ,
Syr. flor. Aurant. ℥j.

MS. 2stündlich 1 Eßlöffel.
Henke.

℞ *Aether-phosphor.* ℥ij.

d. in Vitro, epist. vitreo munit.
S. 1—2—3 Tropfen alle 2 Stunden mit etwas Haferschleim.
Wendt.

℞ *Cort. Chin.* ℥β-j,

coq. c. *Aq. font.* s. q. Sub finem
coct. infund.

Rad. Valerian. ℥iβ-ij.

Colatur. ℥viiij refrigerat. adde

Spir. sulphur.-aether. ℥β-j,
Syr. flor. Aurant. ℥j.

MS. 2stündlich 3 volle Eßlöffel
voll.
Henke.

℞ *Cort. Chin.* ℥j,

coq. c. s. q. *Aq.* per ½ hor. Colatur. ℥viiij, adde

Pulv. Gumm. Mimos. ℥ij.
Misce solvendo.

S. Den ¼ Theil 3—4 täglich mit ½ Tasse Wasser zum Klystir.
Wendt.

℞ *Pulv. semin. Sinapeos* ℥iv-vj.

MS. In einen Topf mit kochendem Wasser zu schütten, ¼ Stunde lang digeriren zu lassen, und dann trockene Decken darin zu tauchen, und die Kinder damit einzuhüllen.

A. Variolae.

Aufser den oben angegebenen Kurregeln, ist hier noch der kalten Luft, der kalten Waschungen des Gesichts, und des Betupfens der Pusteln mit einer Auflösung von Höllenstein zu erwähnen.

℞ *Argent. nitric. crystallis.* gr. xv,
Aq. destillat. ℥j.

S. Zum Betupfen der Pusteln, mittelst eines Pinsels.

B. Scarlatina.

Gerne complicirt sich mit diesem Exanthem ein entzündliches Kopfleiden, und es tritt dann die Kur des *Hydrocephalus acutus*, s. *Encephalitis exsudatoria*, ein. — Auch macht die begleitende Angina besondere Vorschriften nöthig; man muß ihre Heftigkeit durch Blutentziehungen, passende Gurgelwasser und Einspritzungen zu mäßigen suchen. Der oft zurückbleibende Hydrops verlangt, wenn er ein acutus ist, die antiphlogistische Methode in ihrer ganzen Ausdehnung, zeigt er sich aber als chronicus, so passen die scharfen, diuretischen Mittel. — Als Prophylactica gegen Scharlach hat man Belladonna und Efsigwaschungen empfohlen.

℞ *Ammon. carbonic.* ℥ij,
Aq. destillat. ℥v,
Syr. Althaeae ℥j.

MS. $\frac{1}{2}$ —2ständl. 1 Eßlöffel.
Strahl.

℞ *Mucil. sem. Cydonior.* ℥ij,
Kal. nitric. ℥j,
Oxymell. simpl. ℥iβ.

MS. Theelöffelweise, langsam zu verschlucken. (Gegen die Angina.)
Fischer.

℞ *Kal. nitric.* ℥j,
solve in
Decoct. Hordei ℥viiij,
Syr. Moror. ℥j.

MS. Zum Gurgeln. Wendt.

℞ *Kali nitric.* ℥ij,
Aq. flor. Sambuc. ℥j,
Acet. Vin. ℥ij,
Mell. depur. ℥j.

MS. Zum Gurgeln.

℞ *Kal. nitric.*
Sacchar. alb. āā ℥ij.

MS. Etwas davon auf der Zunge schmelzen, und über die entzündeten Theile hinfließen zu lassen.
Devees.

℞ *Infus. flor. Sambuc.* ℥viiij,
Liq. Ammon. acet.
Mell. rosat. āā ℥j.

MS. Zum Gurgeln. Wendt.

℞ *Spirit. Minderer.* ℥vj,
Sal. Ammoniac. ℥j,
Mell. rosat. ℥j.

MS. Alle Viertelstunde eine kleine
 Spritze voll, etwa 2 Loth, er-
 wärmt in den Hals einzuspritzen.
 Fischer.

℞ *Borac.* ℥ij,
 solve in
Aq. Salviae ℥ij,
 adde
Tinct. Myrrhae ℥ij,
Mell. depurat. ℥j.

MS. Pinselsaft. (Bei brandiger
 Bräune.) Wendt.

℞ *Borac.* ℥ij,
Decoct. Hord. ℥vj,
Mell. rosat. ℥ij.

MS. Gurgelwasser.
 Wendt.

℞ *Cort. Chin.* ℥j,
 coq. in s. q. *Aq.* per $\frac{1}{2}$ hor. Co-
 latur refrig. ℥viiij adde
Spirit. Cochlear. ℥β,
Tinct. Myrrhae ℥ij,
Mell. rosat. ℥j.

MS. Gurgelwasser.
 Wendt.

℞ *Hb. Salviae*
 — *Scordii* āā ℥β.
 Inf. *Aq. comm. fervid.* q. s.
 Colatur. ℥iiij adde
Acid. muriatic. ℥iβ,
Syr. Moror. ℥iβ.

MS. Gurgelwasser.
 Wendt.

℞ *Zinc. sulphur.* ℥j,
Aq. Salviae. ℥ij,
Mell. rosat. ℥j.

MS. Pinselsaft. Wendt.

℞ *Aq. oxymur.* ℥ij-iv-vj,
 — *Rub. Idaei* ℥iβ,
Mucil. Gumm. Mimos.
Syr. Althaeae āā ℥vj.

M. d. in Vitro, charta nigra in-
 voluto.

S. Alle $1\frac{1}{2}$ — 1 Stunde einen Thee-
 löffel. (Für Kinder von 3—5
 Jahren.) Kopp.

℞ *Aq. oxymuriat.*
Syr. Rub. Idaei āā ℥iv.

MS. Auf ein Glas Gerstenschleim
 einen starken Eßlöffel voll zu
 nehmen. (Als durstlöschendes
 Getränk.) Fischer.

℞ *Aq. oxymuriatic.* ℥ij,
Syr. Moror. ℥x,
Aq. Rosar. ℥ij.

MS. Die kranken Theile damit
 zu bepinseln, und nachher den
 Saft theelöffelweise verschluk-
 ken zu lassen. Kopp.

℞ *Calomelan.* gr. viij-xvj,
Pulv. hb. Digital. gr. ij-iv,
Pulv. gummos. ℥ij.

M. f. Pulv. divid. in viij part. aeq.
 S. 2stündlich ein Pulver. (Bei
Hydrops acutus nach Schar-
 lach.) Wendt.

℞ *Hb. Digital.* gr. viij-β.
 Inf. in s. q. *Aq.* per $\frac{1}{2}$ hor.
 Colatur. ℥iiij adde

Liq. Kali acetic.
Syr. Althaeae āā ℥β-j.
 MS. 2stündl. 1 Kinder- bis Eß-
 löffel. Wendt.

℞ *Liquor. Kal. acetic.*
Syr. mannat. āā ℥j,
Aq. destillat. ℥ij.

MS. 2stündl. einen Eßlöffel. (Al-
 ternatim mit Calomel.)
 Wendt.

℞ *Acet. squill.* ℥j,
Kal. carb. q. s. ad Saturat.
Aq. Petroselin. ℥v,
Elaeos. Juniper. ℥ij.

MS. 2stündl. $\frac{1}{2}$ - 1 Eßlöffel. (Bei
Hydrops chronicus.)
 Wendt.

℞ *Rad. Helenii* ℥j.
 Inf. in *Aq. fervid.* per $\frac{1}{2}$ hor.

Colatur. ζ iv adde
Kali carbonic.
Acet. squillit. saturat. $\zeta\beta$,
Syr. flor. Aurant. $\zeta\beta$.
 MS. 2stündl. 1 Eßlöffel.
 Wendt.

R *Infus. rad. Ipecacuanh.*
 (e. $\gamma\beta$ - $\zeta\beta$) ζ vj,
Spirit nitr.-aether. γ j- ζ j,
Succ. insp. Juniper. ζ j.
 MS. 2stündlich einen Eßlöffel.
 Wendt.

R *Rad. Squill.*
Fol. Digital. $\alpha\alpha$ gr. iij,
Ol. Juniper. gutt. vj,
Tart. boraxat.
Rad. Liquirit. $\alpha\alpha$ ζ j,
Cort. Cinnamom. gr. vj.
 M. divid. in xij part. aeq.
 S. 3—4mal täglich ein Pulver.
 (Pulv. diuretic. Ph. Paup.)

R *Rad. Squill.* gr. iij-vj,
Cort. Cinnam. $\zeta\beta$,
Sacchar. alb. ζ ij β .
 M. f. Pulv. divid. in xij part.
 S. 3—4mal täglich ein Pulver.
 (Für ein 5—8jähriges Kind.)

R *Extr. Belladonn.* gr. iij,
Aq. destillat. ζ j,
Spir. Vin. rect. γ j.
 MS. Täglich zweimal so viel
 Tropfen, als das Kind Jahre
 zählt. Hufeland.

R *Extr. Belladonn.* gr. iv,
Aq. Cinnamom. c. V. ζ ij.
 MS. Jedem Kinde vor dem Früh-
 stücke 1 Tropfen mehr, als es
 Jahre zählt. Zench.

R *Extr. Belladonn.* gr. j,
Aq. Cinnam. $\zeta\beta$.
 MS. Kindern von 1 Jahre Früh
 und Abends 2—3 Tropfen, äl-
 teren auf jedes Jahr 1 Tropfen
 mehr. (Man soll niemals über
 12 Tropfen steigen.)
 Berndt.

R *Extr. Belladonn.* gr. j,
Aq. flor. Aurant. ζ iv,
Spirit. Vin. rect. ζ j,
Syr. simpl. $\zeta\beta$.
 MS. Jüngern Kindern $\frac{1}{2}$, älteren
 1 Theelöffel 2mal täglich.
 Pittschaff. Gumpert.

C. Morbilli.

R *Vin. Antimon.*
Oxymell. squill. $\alpha\alpha$ ζ ij.
 MS. Kindern von 1 Jahre Mor-
 gens und Abends 10 Tropfen,
 und mit jedem Jahre 5 Tropfen
 mehr zu geben. (Als Prophy-
 lacticum gegen Masern.)
 Wildberg.

R *Flor. Sulphur.* $\zeta\beta$,
Sacchar. alb. ζ j.
 M. f. Pulv.
 S. 2—3mal täglich 2 Messer-
 spitzen bis $\frac{1}{2}$ Theelöffel, nach
 dem Alter des Kindes. (Als
 Prophylacticum.)
 Tourtual.

R *Morsul. Antimon. Kunkel.*
 $\zeta\beta$,
 dent. tal dos. 24.
 S. Morgens 1—2 Stück. (Gegen
 Psorophthalmie nach Masern.)
 Casper.

D. G a s t r o m a l a c i a.

℞ *Acid. pyro-lignos rectific.* ʒj-ij,
Aq. flor. Naphae ʒij,
Syr. emulsiv. ʒj.
 MS. Stündlich 1—2 Theelöffel.
 Pitschaft.

℞ *Extr. Opi aquos.* gr. ¼,
Aq. destillat. ʒiij.
 S. 2stündl. einen Theelöffel.
 Cruveilhier.

℞ *Decoct. Althaeae* (e ʒj) ʒij,
Gumm. Mimos. ʒij,
Ferr. muriat. ʒβ,
Syr. Althaeae ʒvj.
 MS. Wohlungeschüttelt alle Stunden 2 Theelöffel.
 v. Pommer.

℞ *Liquor. Ferr. mur.* ʒβ,
Aq. Cinnamom. ʒiβ,
Syr. Althaeae ʒβ.
 MS. Stündl. 2 Theelöffel.
 Camerer.

Helminthiasis.

Für die ärztliche Behandlung der Wurmkrankheit bietet sich eine doppelte Heilanzeigen dar. Erstens müssen die Würmer entfernt, und zweitens ihre fernere Erzeugung verhütet werden. Der ersten Indication entsprechen abführende und solche Mittel, welche die Würmer idiosyncratisch angreifen und tödten. Die zweite Indication erreicht man durch tonische und stärkende Mittel, welche die Entartung der Säfte verhüten, und eine bessere Nutrition herbeiführen. — Treten durch den Wurmreiz einzelne krankhafte Erscheinungen auf, die durch das Ergriffenseyn der andern Systeme bedingt sind, so passen beruhigende, krampfstillende Mittel, Saturationen, *Flor. Zinci* etc, ableitende Klystire, Umschläge auf den Leib.

℞ *Pulv. rad. Jalap.* ʒij-ʒj,
Calomelan. ʒj-ij,
Extr. Hyoscyam. gr. ij,
Elaeos. Citr. ʒij.
 M. divid. in part. aeq. x.
 S. Früh und Abends ein Pulver.
 (Für Kinder von 3—6 Jahren,
 bei Ascariden) Wendt.

℞ *Calomelan.* gr. iij,
Pulv. rad. Jalap.
Elaeos. Citr. āā ʒβ.

M. f. Pulv.
 S. Auf einmal zu nehmen. (Für
 Kinder von 6—8 Jahren.)
 Henke.

℞ *Folior. Senn.*
Rad. Rhei. āā ʒij.
 Inf. *Aq. fervid.* q. s. diger. per
 ¼ hor. in Colatur. ʒiv
 solve
Mann. elect. ʒj,
Magnes. sulphur. ʒij.

- MS. 2stündl. einen kleinen Efs-
löffel. Wendt.
- ℞ *Extr. Filic. aether.* ʒβ,
Pulv. rad. Filic. q. s.
M. f. Pilul. No. x.
- S. In 2 Portionen Abends zu ver-
brauchen.
- ℞ *Extr. Filic. aether.* ʒβ,
Mell. rosat. ʒβ.
- MS. Die Hälfte auf einmal, und
nach einer halben Stunde die
andere.
- ℞ *Extr. nuc. Jugland.* ʒij,
Aq. Cinnamom. ʒβ,
Mell. despumat. ʒj.
- MS. Täglich 3mal 30—60 Tropfen.
Fischer.
- ℞ *Ferr. sulphur. cryst.* gr. j-ij,
Rad. Jalap. gr. iv,
— *Valerian.*
Kali sulphuric. depur. āā ʒβ,
Sem. Cinae ʒj.
- M. f. Pulv. dent. tal. dos. No. xij.
- S. Täglich 5—6mal ½ Pulver
mit Syrup angerührt. (Für Kin-
der von 6—8 Jahren.)
Richter.
- ℞ *Pulv. flor. Tanacet.*
— *Sem. Santonic.* āā ʒj,
Ferr. sulphuric. ʒij,
Ol. Valerian. gutt. x.
- M. terend. et divid. in part. aeq. x.
- S. Täglich dreimal ein Pulver in
Pomeranzenblüthentheee. (Für
Kinder von 10 Jahren.)
Rosenstein.
- ℞ *Ferr. sulphur. pulv.* ʒiβ,
Pulv. Sem. Cinae ʒijj,
— *Sacchar. alb.* ʒiβ,
Mucil. Gumm. tragac. q. s.
ut f. Trochisci No. 60.
- S. Täglich 3mal 2 Stück. (Für
Kinder von 8 Jahren.)
Phöbus.
- ℞ *Sacchar. alb.* ʒvj,
coq. c. *Aq. comm.* q. s. ad con-

- sistent. tabulandi.
adde
- Amygd. dulc. excortic.* ʒβ,
Ferr. sulphuric. crystall. ʒj,
Rad. Jalap. ʒβ,
Sem. Cinae ʒβ,
Ol. Tanacet. gutt. xx.
M. f. Morsuli No. 30.
- S. Täglich 3mal ein Stück. (Für
Kinder von 4 Jahren.)
Phöbus.
- ℞ *Hb. Absynthii* ʒij,
Rad. Valerian. ʒβ,
inf. *Aq. fervid.* q. s. Colatur. ʒvj
adde
Syr. cort. Aurant. ʒj.
- MS. 2stündl. einem 5—8jährigen
Kinde einen Efslöffel.
Richter.
- ℞ *Flor. Tanac.* ʒβ,
Pulv. rad. Valerian. ʒij,
— *Jalapae* ʒij,
Kal. sulphuric. ʒij,
Oxymell. squill. q. s. ut f.
Electuar.
- S. Täglich 2mal einen Theelöffel.
Bremsen.
- ℞ *Baryt. muriat.* ʒβ,
Aq. destillat. ʒj,
Syr. Rub. Idae. ʒiβ.
- MS. Täglich 2, 3—4mal einen
Theelöffel, nach dem Alter.
(Gegen Askariden.)
Buchholz.
- ℞ *Helminthochort.* ʒj
Ichthyocoll. ʒβ,
coq. c. *Aq. comm.* q. s. ad reman.
Colatur. ʒiv in qua solve
Sacchar. albiss. ʒj.
- Repon. in loco frigido, ut in Ge-
latinam abeat.
- S. Theelöffelweise.
Sundelin.
- ℞ *Helminthochort.* ʒij,
coq. c.
Aq. font. ʒvj,
Colatur. ʒiv adde
Mell. despumat. ʒj.

MS. ℞ II inf. p S MS. ℞ P C S M. f. S. 3 ℞ F M. S. M ℞ J S. ℞ M ℞ S. ℞ S. ℞ S. ℞ S.

MS. Tägl. 3mal 2 Eßlöffel voll.
Schubarth.

R. Helminthochort. ʒij,
inf. per $\frac{1}{4}$ hor. in *Aq. fervid.* ʒvj
Colatur. adde
Syr. Mell. ʒj.

MS. Eßlöffelweise den Tag über.
Chaussier.

R. Pulv. rad. Valerian. ʒj,
Calomelan. gr. iij,
Sacchar. alb. ʒj.
M. f. Pulv. divid. in iv-vj part.
S. 3mal tägl. ein Pulver.

R. Pulv. rad. Valerian. ʒβ,
— — *Jalapae* ʒij.
M. f. Pulv. divid. in viij part.
aequal.
S. Morgens nüchtern ein Pulver.
Störck.

R. Pulv. rad. Jalap.
Limat. Mart. āā ʒj,
Pulv. rad. Valerian. ʒiij.
RoobDauci. q. s. ut f. Electuar.
S. Theelöffelweise.

R. Pulv. rad. Valerian.
Sem. Cinae āā ʒj,
Calomelan. gr. ij,
Sacchar. alb. ʒij.
M. f. Pulv. divid. in iv part.
S. Zweimal tägl. 1 Pulver.
Gölis.

R. Semin. Cinae ʒij,
Rad. Jalapae
Sacchar. alb. āā ʒj.
M. divid. in vj part.
S. 3ständl. ein Pulver.
Schubarth.

R. Semin. Cin. ʒij,
Pulv. rad. Jalap. ʒβ,
— — *Valerian.* ʒj,
Oxymell. squill. q. s. ut f.
Electuar.
S. Alle 2—3 Stunden 1 Thee-
löffel voll. Störck.

R. Pulv. rad. Valerian. ʒiβ,
— — *Jalap.* ʒj,
Sem. Cin. ʒβ,
Kal. tartaric. ʒij,
Oxymell. squill. ʒvj,
Syr. commun. q. s. ut f.
Electuar.

S. 4mal tägl. 1 Theelöffel.
Hufeland.

R. Pulv. sem. Cinae ʒv,
— *rad. Jalap.* ʒj,
Chocolat. pulv. ʒiij,
Mucil. Gumm. Mimos. q. s.
ut f. trochisci No. 30.
S. Täglich 4mal 2—3 Stück zu
geben. (Für ein Kind von 10
Jahren.) Vogt.

R. Sem. Cinae
Chocolat. pulv. āā ʒij,
Sacchar. alb. ʒβ,
Mucil. Gumm. Tragac. q. s.
ut f. trochisci No. 30.
S. 3ständlich 4—6 Stück. (Für
Kinder von 4—6 Jahren.)
Fleisch.

R. Sem. Cinae
Rad. Valerian. āā ʒij,
inf. et diger. c. *Aq. fervid.*
Colatur. ʒiv refriger. adde
Extr. nuc. Jugland.
Liquor. anodyn. Hoffm.
Tinct. cort. Aurant. āā ʒj,
Syr. cort. Aurant. ʒβ.
MS. 2ständl. 1 Kinder-Eßlöffel.
Henke.

R. Aq. Calc. ʒiv,
DS. Eine Tasse, mit Zusatz von
Haferschleim, zum Klystir. (Ge-
gen Askariden.)
Hufeland.

R. Rad. Allii rec. ʒβ,
conc. inf.
Aq. bullient. ʒβ,
Colatur. adde
Asae foetid. in Vitell. ovor.
solut. ʒij.
MS. Zu 2 Klystiren.
Richter.

℞ *Helminthochort.*
Rad. Valerian.
Sem. Cinae āā ʒij.

MS. Mit 2 Tassen heissen Wassers zu übergießen, die Colatur zum Klystir. Fleisch.

℞ *Fell. Taur. insp.*
Elaeos. Absynth. āā ʒij,
Mell. commun. ʒvj,
Infus. hb. Absynth. (e ʒβ) ʒv.

S. Zu 2 Klystiren. Richter.

℞ *Infus. Sem. Santonic.* (ex ʒij)
 ʒiβ,
Mercur. sublimat. corros.
 gr. $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{4}$,

Mucil. Gumm. Mimos. ʒij.
 MS. In warmem Wasser erwärmt, zum Klystir. (Gegen Askariden, bei Kindern von 6 bis 7 Jahren.) Kopp.

℞ *Asae foetid.* ʒβ,
Infus. rad. Valerian. (ʒij-
 ij) ʒiv,
Gumm. arabic. q. s. ad sub-
 actionem.

S. Zu 2 Klystiren. (Für ein 2-
 3jähriges Kind.)

℞ *Ungt. Althaeae* ʒij,
Ol. Petrae ʒij,
Ol. Absynth. aether. ʒβ.

MS. In die Nabelgegend einzu-
 reiben. Dornblüth.

℞ *Extr. nuc. Jugland.*
Fell. Taur. āā ʒiv,
Adip. suill. ʒj,

leni calore mixtis et refrigeratae
 adde

Ol. Tanacet. gr. xv.
 M. f. Ungt.

S. In den Unterleib einzureiben.
 Dörffurt.

℞ *Ungt. Althaeae* ʒj,
Fell. Taur. rec.
Sapon. venet. āā ʒiij,
Petrol. ʒij,
Sal. vol. C. C. ʒβ,
Camphor. ʒj,
Ol. Tanacet. ʒβ.

MS. 3mal täglich 1 Theelöffel
 voll einzureiben. Hufeland.

℞ *Succ. Citr. rec. express.* ʒj,
 Saturat
Kal. carbonic.
 adde

Aq. destillat. ʒiv,
 — *Amygd. amar.* ʒβ-j,
Syr. flor. Aurant. ʒβ.

MS. Stündlich 1 Eßlöffel voll.
 (Bei fieberhaften Bewegungen
 durch Zahneiz.) Wendt.

℞ *Flor. Zinc.* gr. β,
Calomelan. gr. j,
Sacchar. alb. ʒβ.
 M. dent. tal. dos. xij.
 S. 2stündl. 1 Pulver.

Hydrocephalus chronicus.

Die Indicationen für die Behandlung des Wasser-
 kopfs sind: 1) den Andrang der wässrigen Flüssigkeit
 abzuleiten, und den Excretionsorganen zuzuführen;
 2) die Thätigkeit des Gefäßsystems hervorzurufen, da-
 mit die extravasirte Flüssigkeit so bald als möglich
 wieder aufgenommen werde.

℞ *Aq. Petroselin.* ℥iv,
Elaeosacchar. Junip. ℥ij,
Syr. Althaeae ℥β.

MS. 2stündl. einen Eßlöffel.
Wendt.

℞ *Aq. Petroselin.*
Syr. de Rheo āā ℥j,
Spir. mur.-aether. ℥β.

MS. Stündlich einen Theelöffel.
Wendt.

℞ *Folior. Senn.* ℥j,
inf. in s. q. *Aq.* per $\frac{1}{4}$ hor.
Colatur. ℥iij adde
Syr. mannat.

Oxymell. squill. āā ℥β.

MS. Stündlich 1 Theelöffel.
Wendt.

℞ *Rad. Levistic.* ℥ij-℥β,
inf. *Aq. fervid.* s. q. per $\frac{1}{2}$ hor.
Colatur. ℥vj refriger. adde
Spir. nitr.-aether. ℥j-℥j,
Syr. flor. Aurant. ℥β.

MS. 2stündl. 1 Eßlöffel.
Hufeland.

℞ *Pulv. hb. Majoran.* ℥ij,
Calomelan. gr. vj.
M. f. Pulv.

S. Niesepulver. Wendt.

Induratio Telae cellulosae.

℞ *Aq. oxymuriatic.* ℥ij,
Syr. simpl. ℥β.

MS. 2stündl. einen Theelöffel.
Heyfelder.

℞ *Calomelan.* gr. $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$,
Sacchar alb. ℥^{ss}.

M. f. Pulv. dent. tal. dos. No. xij.

S. 2mal tägl. ein Pulver. (Dabei
aromatische Bäder, und folgende
Salbe.)

℞ *Ungt. mercurial.* ℥β.

S. Den vierten Theil täglich in
die indurirten Stellen einzurei-
ben. Berliner Charité.

Intertrigo.

℞ *Infus. hb. Salviae* (e ℥ij) ℥ij,
Syr. simpl. ℥j.

M. Damit angefeuchtete Lapp-
chen auf die wunden Stellen
zu legen. Kluge.

℞ *Flor. Zinc.* ℥β,
Sem. Lycopod. ℥β.
M. f. Pulv.

S. Streupulver. (Die Menge des
Zinkkalkes hat hier nichts Be-

stimmtes; je mehr man zusetzt,
um so schneller trocknen die
wunden Stellen, aber um so
leichter Suppression.) Vogt.

℞ *Flor. Zinc.*
Sem. Lycopod. āā gr. xv,
Ungt. rosat. ℥β.
M. f. Ungt.

S. Salbe. Hufeland.

N o m a.

℞ *Acid. muriat.*
Mell. rosat. āā ℥β.

MS. Pinselsaft.
Klaatsch.

℞ *Acid. pyro-lignos.* ℥iβ,
Mell. rosat. ℥j.

MS. Pinselsaft.
Sundelin.

Ophthalmia neonatorum.

Im ersten Stadium kalte Ueberschläge, im 2ten warme Fomente, anfangs von einer milden, schleimigen Flüssigkeit, später von Sublimat-Auflösung. Bei hoher Intensität einen Blutegel an das untere Augenlid; dabei Einreibungen von *Ungt. mercuriale*. Ist alle Röthe geschwunden, so passt eine schwache Auflösung des *Lapis divinus* und des *Zincum sulphuricum*.

℞ *Extr. Opii aquos.* ʒj,
Decoct. capit. Papav. ʒvj.
MS. Lauwarm das Auge damit auszuwaschen.

Beck.

℞ *Merc. sublimat. corrosiv.* gr. j,
Aq. destillat. ʒx.
MS. Lauwarm zum Foment.
Jüngken.

℞ *Lapid. divin.* gr. j-ij,
Alum ov. j.
terent. invic. donec evanuerit
omnis tenacitas.
S. Täglich 2—3mal ein Tropfen
in das Auge zu träufeln.
Jüngken.

℞ *Zinc. sulphur.* gr. ¼,
Aq. destillat. ʒβ.
MS. Wie vorher.
Jüngken.

℞ *Aq. Rosar.* ʒij
Mucil. sem. Cydon. ʒβ,
Acet. saturnin. gutt. viij-x,
Spir. camphor. gutt. xv-xx.
MS. 6-8mal tägl. einige Tropfen
in's Auge fallen zu lassen.
v. Siebold.

℞ *Extr. saturnin.* ʒj,
Aq. destillat. ʒvj.
DS. Gewärmt mit einem Schwam-
me öfters an die Augen zu brin-
gen.

℞ *Alumin.* gr. ij,
Aq. Rosar. ʒj.
MS. Zum Waschen der Augen.
(Im 2ten und 3ten Stadium.)

℞ *Zinc. sulphuric.* ʒj,
Extr. Saturn. ʒβ,
Spirit. camphor. ʒij,
Aq. destillat. ʒx.
MS. 3—6mal tägl. die Augen
zu waschen.
I. A. Schmidt.

℞ *Zinc. sulphur.* gr. j,
Aq. destillat. ʒj.
MS. Zum Waschen.
Saunders.

℞ *Zinc. sulphuric.* gr. j-iv,
Aq. Opii ʒiβ-iiij.
MS. Täglich 1—3mal 1 Tropfen
auf den Augapfel zu bringen.
(Bei Trübungen der Cornea in
Folge der Teraxis neonatorum.)
v. Ammon.

℞ *Mercur. praecip. alb.* gr. ij-iv,
Flor. Zinc. gr. vj-viiij,
Extr. Ratanh. gr. x-xij,
Butyr. insuls. ʒj-ij.
M. f. ungt.

S. Die Augenlider mehrmals
täglich damit zu bestreichen.
(Im 3. Stadio der Optht. neo-
natorum.)

Ritterich.

A
kender
lind re
besond
in Sal
grofser

℞ *Ext*
Aq.
MS. Tä
täglie
gen,
Photo

℞ *Bor*
Aq.
MS. Zi
kann
Borax

℞ *Bor*
Aq.
Aq.
MS. D
feuch
seln,
werde
dafs n
Dabei
Pulve
cutae

Medizin.
kunde

℞ *Ungt. cerei* ʒij,
Mercur. praecip. rubr. gr. v-x,
Laud. liquid. Sydenh. gutt. v-x.
 M. f. ungt.

S. Abends mittelst der Finger auf
 die Augenlider zu streichen.
 Dzondi.

Ophthalmia scrophulosa.

Aufser den allgemeinen, gegen die Dyskrasie wirkenden Mitteln (S. Scrophulosis), passen örtlich gelind reizende, mischungsverändernde, oxydirende Mittel, besonders die aus der Klasse der Mercurialien, sowohl in Salben, als Auflösung. Auch ist die Kälte hier von grossem Nutzen.

℞ *Extr. Conii* ʒj,
 solve in
Aq. Cinnamom. ʒβ.
 MS. Täglich 3mal 5 Tropfen, und
 täglich um 5 Tropfen zu steigen,
 bis zu 20 — 30. (Bei
 Photophobie.)
 Kopp. Schindler.

℞ *Borac.* ʒβ-j,
Aq. destillat. ʒvj-vij.
 MS. Zum Foment. (Allmählig
 kann man die Quantität des
 Borax verstärken.)
 Jüngken.

℞ *Borac.* ʒij,
Aq. destillat. ʒiv,
Aq. Lauro-ceras. ʒij-iiij.
 MS. Damit Kompressen zu befeuchten,
 und so oft zu wechseln, dafs sie
 niemals trocken werden. Man achte
 darauf, dafs nichts in den Mund
 kommt. Dabei Morgens und Abends
 1 Pulver aus 1—2 Gran *Hb. Cicutae*
 und $\frac{1}{2}$ —1 Gran *Calomel.*
 Bonorden.
 Medizin. Zeit. v. Verein f. Heilkunde
 in Preussen, Nr. 35.

℞ *Hydrargyr. muriat. corros.*
 gr. j,
Aq. destillat. ʒvij-ix.
 MS. Morgens und Abends eine
 halbe Stunde lang mit Kompressen
 überzuschlagen.
 Jüngken.

℞ *Mercur. praecip. alb.* gr. ij-iv,
Ungt. cerei ʒj-ij.
 MS. Augensalbe.
 ℞ *Aur. oxymuriat.* gr. ij,
Aq. destillat. ʒvj.
 MS. Augenwasser.
 Fischer.

℞ *Mercur. praecipit. rub.* ʒβ,
Ungt. cerei. ʒiiij,
Acet. saturnin.
Tinct. Opii croc. āā ʒβ.
 MS. Morgens und Abends eine
 Erbse gros zwischen die Augenlider
 gebracht.
 Bonorden.

℞ *Tart. stibiat.* ʒj,
Axung. porc. ʒij.
 MS. Morgens und Abends so viel
 als eine Bohne beträgt, in den
 Nacken einzureiben.
 Jüngken.

Pyrosiss.

Gegen diesen Zufall wendet man gewöhnlich säuretilgende Mittel, absorbirende Erden, Magnesia, Krebsaugen etc. an. Allein der Magen ist ein lebendiges Organ, durch dessen verstimmte Vitalität die Absonderung eines krankhaften Magensaftes bedingt wird, und es ist deshalb die Anwendung dieser Mittel zu beschränken, und nur in Verbindung mit solchen Stoffen zu gestatten, welche die Thätigkeit des Magens erhöhen, wohin die gelind reizenden und stärkenden Mittel gehören.

℞ *Conch. ppt.* gr. v,
Elaeosacch. Foenicul. ꝰβ.
 M. f. Pulv. dent. tal. dos. xij.
 S. Täglich 4mal 1 Pulver. (Für ein Kind von 3—4 Jahren.)
 Richter.

℞ *Conch. ppt.* gr. ij,
Sacchar. alb. ꝰj.
 M. f. Pulv. dent. tal. dos. xij.
 S. Täglich 3mal 1 Pulver. (Für ein Kind von 1 Jahre.)

℞ *Rad. Rhei* ꝰj-ij
 diger. p. hor. c. *Aq. fervid.* ꝰv
 in Colatur. solve
Kal. carbonic. e Tartar. ꝰβ-j,
Syr. cort. Aurant. ꝰβ.
 MS. 3ständl., nach dem Alter,
 ½-1 Eßlöffel.
 Richter.

℞ *Aq. flor. Tiliae* ꝰij,
Ol. Amygd. dulc. rec. ꝰβ,
Gumm. arabic. ꝰij
 f. l. a. emulsio in qua solve
Kal. carbonic. ꝰj,
Syr. Althaeae ꝰβ.
 M. ½-1ständl. 1 Theelöffel.
 Richter.

℞ *Lapid. Cancror.*
Tinct. Rhei aquos.
Croc. orient. āā ꝰβ,
Syr. Rhei ꝰvj,

Aq. Foenicul. ꝰj.
 MS. Umgeschüttelt alle ¼-1 Stunde
 1 Theelöffel.
 Richter.

℞ *Lapid. Cancror.* ꝰij,
Sacchar. alb. ꝰij,
Macid. ꝰj.
 MS, Täglich einigemal eine Messerspitze mit Wasser.
 Schubarth.

℞ *Magnes. carbonic.* ꝰij,
Rad. Irid. florent. ꝰj,
Sem. Anis.
Sacchar. alb. āā ꝰj,
Croc. gr. x.
 MS. 2—3mal tägl. eine Messerspitze. (Für ein halbjähriges Kind.)
 Hufeland.

℞ *Magnes. carb.* ꝰj,
Pulv. rad. Rhei
 — *rad. Irid. flor.* āā ꝰj,
Ol. Foenicul. gutt. ij.
 M. f. Pulv.
 MS 3—4mal tägl. eine Messerspitze. (Für Säuglinge.)
 Ribke.

℞ *Aq. Foenicul.* ꝰiv,
Magnes. carbonic. gr. xv,

Laud
 Sy
 MS.
 Kin
 von
 R M
 P
 C
 S
 S. T
 R M
 P
 A
 S
 MS.
 wei
 R S
 M
 S
 S. A
 gro
 R S
 O
 S
 MS.
 die I
 table
 fen,
 wied
 und
 Eise
 reib

Laud. liquid. Syd. gutt. ij,
Syr. Althaeae ℥β.

MS. Ungeschüttelt 2stündlich 1
Kinderlöffel. (Für ein Kind
von 2 Jahren.)

Gölis.

℞ *Magnes. carbonic.* ℥iij,
Pulv. semin. Anis. ℥ij,
Croc. ℥β,
Syr. Rhei q. s. ut f. Electuar.

S. Theelöffelweise.

Richter.

℞ *Magnes. carb.* ℥ij,
Pulv. rad. Rhei ℥j,
Aq. Foenicul. ℥iβ,
Syr. Rhei ℥β.

MS. Ungeschüttelt, theelöffel-
weise.

Berends.

℞ *Sapon. medic.* ℥β,
Magnes. carb.
Sem. Foenicul. āā ℥ij.

S. 4—5mal täglich eine Bohne
grofs zu nehmen.

Jahn.

℞ *Sapon. medic.* ℥j,
Ol. Amygd. ℥j,
Syr. Althaeae ℥iβ.

MS. 3mal tägl. 1—2 Theelöffel.

Richter.

℞ *Extr. cort. Aurant.* ℥j,
Aq. Foenicul. ℥ij.

MS. 3stündl. 1 Theelöffel voll.
Jörg.

℞ *Extr. cort. Aur.* ℥ij,
Aq. Menth. pip.
Tinct. Rhei vin. āā ℥j.

MS. Täglich 3—4mal einen Thee-
löffel.

Richter.

℞ *Extr. cort. Aurant.*
— *Chin.* āā ℥j,

Aq. Foenicul.

— *Chamomill.* āā ℥β,

Tinct. Valerian. anodyn. ℥j,

Syr. Cinnamom. ℥j.

MS. 2stündl. 1—2 Theelöffel.

Henke.

℞ *Extr. Fumar.*

— *Taraxac.*

— *Trifol. fibrin.* āā ℥j,

Aq. Cinnamom. ℥iij,

Tinct. Rhei aquos. ℥ij-iiij,

Syr. cort. Aurant. ℥j.

MS. Zweistündl. 2 Theelöffel.
(Für Kinder in den ersten Le-
bensjahren.)

Henke.

R h a c h i t i s.

Bei der ärztlichen Behandlung bietet sich zunächst die Heilanzeigen dar, der gesunkenen Thätigkeit des irritablen Lebens in der allgemeinen Ernährung aufzuhelfen, und die Normalität in der Reproduction der Knochen wieder herbeizuführen. Dazu passen die gewürzhaften und adstringirenden Mittel aus dem Pflanzenreiche, das Eisen, ferner das *Ol. Jecoris Aselli*, gewürzhafte Einreibungen, aromatische Bäder, eine stärkende Diät.

℞ *Ferr. oxydulat. nigr.* gr. xij,
Elaeos. Macid. ℥ij.
M. divid. in xij part. aeq.
S. 3mal täglich 1 Pulver.
Wendt.

℞ *Ferr. oxydulat. nigr.*
Cass. Cinnam. āā ℥β,
Sacchar. ℥vj,
Mucil. Gumm. Tragac. q. s.
ut f. trochisc. 30.
S. Täglich 3mal 1—2 Stück.

℞ *Pulv. antihect. scroph.* ℥j,
Pulv. Liquirit. ℥ij,
Limatur. Mart.
Resin. Guajac. āā gr. xv.
M. f. Pulv.
DS. 2mal täglich eine Messerspitze.
Gölis.

℞ *Limatur. Mart.* gr. iij-xij,
Conch. ppt.
Elaeos. flavedin. Citr. āā ℥β.
M. f. Pulv. divid. in vj part. aeq.
S. Täglich 2mal 1 Pulver.
Berends.

℞ *Limatur. Mart.*
Conch. ppt.
Cort. Cinnam. āā gr. viij,
Sacchar. alb. ℥iv.
M. divid. in part. aequal. viij.
S. Täglich 2mal 1 Pulver.
Tourtual.

℞ *Limatur. Mart.*
Rad. Rhei
Cinnam. acut. āā gr. j,
Magnes. carb. gr. ij,
Sacchar. alb. ℥β.
M. dent. tal. dos. vj.
S. 2mal täglich 1 Pulver.

℞ *Vin. Mart.* ℥β,
— *Antimon.* ℥j.
MS. Täglich 4mal 20 Tropfen
mit etwas spanischem Weine
zu geben.
Tourtual.

℞ *Tinct. Ferri pomat.*
— *aromat.* āā ℥iβ.
MS. Zu 10, 15—30 Tropfen 3mal
täglich.
Tourtual.

℞ *Rad. Galang.*
— *Rhei opt.* āā ℥j.
Inf. *Aq. fervid.* q. s. per $\frac{1}{4}$ hor.
in Colatur. ℥vj solve
Flor. sal. Ammoniac. mart.
gr. viij,
Elaeosacch. Ment. pip. ℥β.
MS. 3ständl. 1 Eßlöffel.
Wendt.

℞ *Ol. jecor. Aselli* ℥ij.
S. Kindern von 2 Jahren täglich
1 Theelöffel, 3—6jährigen $\frac{1}{2}$
Eßlöffel und älteren 1 Eßlöffel
2mal täglich.
Osberghans.

℞ *Ol. jecor. Asell.* ℥j,
Liq. Kal. carb. ℥ij,
Ol. Calam. arom. gutt. iij,
Syr. cort. Aur. ℥j.
MS. Morgens und Abends 1—2
Theelöffel.

℞ *Rad. Rub. tinct.* ℥β,
Pulv. aromatic. ℥ij,
Sacchar. alb. ℥vj.
M. f. Pulv.
S. Amal tägl. 1 Theelöffel mit
Fenchelthee. Wendt.

℞ *Flor. sal. Ammoniac. mart.*
gr. xxiv,
Pulv. rad. Rub. tinct. ℥iij,
Elaeos. Foenicul. ℥j.
M. divid. in part. aeq. xij.

S. 3mal tägl. 1 Pulver.
Wendt.

℞ *Rad. Rub. tinct.* ℥β,
coq. in s. q. *Aq.* per $\frac{1}{4}$ hor.
Colatur. ℥vj refr. adde
Tinct. aromat. ℥j-ij,
Syr. cort. Aurant. ℥β.

MS. 2stündl. 1 Eßlöffel.
Richter.

℞ *Rad. Rub. tinct.* ℥β,
Sal. Tartar. ℥β.
Coq. c. *Aq. font.* ℥xx. Colatur.
adde
Extr. Mart. pomat. gr. xx,
Syr. cort. Aurant. ℥j.

MS. 3stündl. 1 Eßlöffel.
Plenck.

℞ *Rad. Rub. tinct.* ℥ij,
coq. c. *Aq. font.* q. s. Colatur.

℥v refriger. adde
Aq. Cinnamom. c. Vin. ℥j,
Syr. Absynthii ℥vj.

MS. 2stündlich 1 Eßlöffel.
Feiler.

℞ *Spec. aromat.* ℥iiij-iv,
Rad. Rub. tinct. ℥j.

M. f. spec. dent. tal. dos. No. vj.
S. Ein Paket zum Bade.
Wendt.

℞ *Medull. oss. Taur.* ℥iiij,
liquat. et depur. post refrigerat.
adde
Mixtur. oleoso - balsamic.
℥iβ,
Balsam. indic. nigr. ℥iiij.

MS. Zum Einreiben in den Rück-
grath, Thorax, die Gelenke.
Wendt.

Scrophulosis.

℞ *Calomelan.* gr. β-j,
Sulphur. stibiat. gr. β-j,
Sacchar. alb.)β.
M. f. Pulv. dent. tal. dos. No. xij.
S. 2mal tägl. 1 Pulver.
Plummer.

℞ *Hydrargyr. oxydulat. nigr.*
gr. j-ij,
Magnes. carbonic.
Sacchar. Lact. āā)j.
M. f. Pulv. divid. in part. viij.
S. 3—4mal täglich ein Pulver.
Wendt.

℞ *Aethiop. miner. s. antim.*
gr. β-v,
Magnes. alb. gr. iv,
Sacchar. alb.)β.

M. f. Pulv. dent. tal. dos. No. xij.
S. 2mal tägl. 1 Pulver. (Für ein
Kind von 6 Monaten—5 Jah-
ren.) Hufeland.

℞ *Aethiop. antim.* gr. j-ij,
Extr. Cicut. gr. β-j,
Pulv. rad. Rhei gr. ij-iv,
Sacchar. alb.)β.
M. f. Pulv. dent. tal. dos. No. xij.
S. 3mal tägl. 1 Pulver.

℞ *Pulv. Pueror.* (Ph. Paup.))β,
Aethiop. miner. gr. β,
Pulv. hb. Digital. gr. $\frac{1}{4}$.
M. dent. tal. dos. xij.
S, 2mal tägl. 1 Pulver. (Für Kin-
der unter 1 Jahre.)
Hufeland.

℞ *Aethiop. antim.* ʒβ-iβ,
Lapid. Cancr. ppt. ʒj,
Elaeos. Foenicul. ʒij.
 M. f. Pulv.
 S. 3mal tägl. eine Messerspitze.
 Berends.

℞ *Resin. Guajac. nat.*
Aethiop. antimon.
Magnes. carb.
Sacchar. alb. āā ʒβ,
Pulv. rad. Rhei ʒj.
 M. f. Pulv.
 S. 2—3mal eine Messerspitze.
 (Für Kinder von 2—3 Jahren.)
 Jüngken.

℞ *Resin. Guajac. nat.*
Aethiop. antim. āā ʒj,
Pulv. rad. Rhei.
Magnes. carb.
Sacchar. alb. āā ʒβ.
 MS. 2—3mal einen Theelöffel
 voll. (Für Kinder von 4—6
 Jahren.)
 Jüngken.

℞ *Aethiop. antim.* ʒβ-j,
Rad. Rhei ʒj,
Hb. Cicut. ʒβ,
Fol. Senn. ʒiij-ʒβ,
Conch. ppt.
Sem. Foenicul. āā ʒiij.
 M. f. Pulv.
 S. Morgens und Abends $\frac{1}{2}$ —gan-
 zen Theelöffel.
 Bonorden.

℞ *Antimon. crud. subtiliss.*
pulv.
Lapid. Cancr. ppt. āā ʒj,
Pulv. rad. Jalap. ʒβ,
Sacchar. alb. ʒiβ.
 M. divid. in xij part.
 S. 3mal tägl. 1 Pulver.
 Wendt.

℞ *Antim. crud.* ʒij,
Elaeos. flaved. Citr. ʒβ,
Cort. Cinnam. gr. xv. f. c.
Mucil. Mimos. trochisci 24.
 S. 2—3mal täglich ein Plätzchen.
 Fleisch.

℞ *Jodin.* gr. v,
Kal. hydrojod. ʒβ,
Aq. destillat. ʒij.
 MS. Kindern unter 7 Jahren
 täglich zweimal 2 Tropfen, bis
 5 langsam steigend; bei Kin-
 dern über 7 Jahren kann man
 bis zu 16 Tropfen steigen. Das
 Vehikel ist ein halb Bierglafs
 Zuckerwasser.
 Lugol.

℞ *Baryt. mur.* ʒβ,
Aq. destillat. ʒj.
 MS. Kindern bis zum 3. Jahre
 5—20, älteren 10—30 Tropfen
 3—4mal täglich.
 Hufeland.

℞ *Baryt. mur.* ʒβ,
Aq. destillat. ʒj,
Vin. stibiat. ʒij.
 MS. 3stündl. 10—15 Tropfen.
 Wendt.

℞ *Baryt. muriat.*
Ferr. mur. āā ʒβ,
Aq. Ment. pip. ʒj,
Syr. cort. Aurant. ʒj.
 MS. Kindern von 2—3 Jahren
 3stündlich 8—10, von 4 bis 6
 Jahren 12—15 und älteren 20
 Tropfen.
 Fischer.

℞ *Baryt. muriat.*
Extr. Conii mac. āā ʒj,
Aq. Cinnam. s. ʒβ.
 MS. 3—4mal täglich 10—20

Tropfen. (Für Kinder von 7
— 9 Jahren.)

Phöbus.

℞ *Calcar. mur.* ʒij,
Tinct. Calam. ʒj.

MS. 20 — 30 Tropfen einigemal
täglich.

Niemann.

℞ *Carb. animal.* gr. β-ij,
Pulv. rad. Liquir. ʒβ.

M. dent. tal. dos. xij.
S. 2mal tägl. 1 Pulver trocken
zu verschlucken.

Weise.

℞ *Spong. tost.* ʒj,
Conch. ppt.
Aethiop. miner. āā ʒβ,
Elaeos. Anisi ʒj.

M. f. Pulv. dent. tal. dos. No. vj.
S. 2mal tägl. ½ Pulver. (Für
Kinder von 8 — 10 Jahren.)

Phöbus.

℞ *Spong. tost.*
Sal. Ammoniac. āā ʒβ,
Hb. Cicut. gr. iv,
Sulphur. aur. Ant. gr. j,
Elaeos. Foenicul. ʒβ.

M. dent. tal. dos. xij.

S. 2mal täglich größeren Kin-
dern ein, kleineren ½ Pulver.

Fischer.

℞ *Carb. Spong.* ʒij,
Pulv. hb. Digital. gr. ij,
Elaeos. Foenicul. ʒj.

M. f. Pulv. divid. in xij part. aeq.

S. 3mal tägl. 1 Pulver. (Für
Kinder von 6 — 8 Jahren.)

Rust.

℞ *Chlor. Calc.* ʒj,

Aq. destillat. ʒvj,
Syr. simpl. ʒβ.

MS. 3ständl. 1 Eßlöffel.

Cima.

℞ *Kali caustic.* ʒβ,
Aq. flor. Aurant. ʒj.

MS. Kindern von 2 bis 3 Jahren
8 — 12, 4 bis 5jährigen 15, und
noch älteren 20 Tropfen 4mal
täglich.

Wetz.

℞ *Aur. oxymuriat.* gr. j-ij,
Aq. flor. Aur. ʒj.

MS. 2ständlich 10 Tropfen mit
etwas Wasser, und bis auf 20
zu steigen.

Wendt.

℞ *Aur. oxymur.* gr. iv,
Aq. Amygd. amar. ʒβ,
Aq. flor. Tiliae ʒjβ.

MS. Täglich 4mal 20 Tropfen
mit Wasser.

Wendt.

℞ *Infus. hb. Digit.* (e ʒβ) ʒiij,
Vin. stibiat. ʒj,
Syr. Althaeae ʒj.

MS. 2ständl. 1 Kinderlöffel. (Bei
floriden Subjecten.)

Wendt.

℞ *Aq. Amygd. amar.* ʒij,
Vin. stibiat. ʒj.

MS. 3ständl. 12 — 15 Tropfen mit
etwas Wasser. (Bei Phthisis
tuberculosa skrophulöser Indi-
viduen von 5 — 6 Jahren.)

Tourtual.

℞ *Extr. Gramin. liquid.* ʒvj,
Extr. Taraxac. ʒij,
Tinct. Rhei aquos.

Aq. Menth. pip.
Syr. cort. Aur. āā ʒβ.

MS. Säuglingen 3stündl. 1 Theelöffel, Kindern von 2—3 Jahren 1 Kinder- und älteren einen Eßlöffel voll.

Fischer.

℞ *Liq. Kal. acetic.*
Syr. Cichor. āā ʒi,
Extr. Gramin. ʒiiij,
Vin. stibiat. ʒiiij,
Sapon. stibiat. ʒj.

MS. 2stündl. 1—2 Theelöffel.
Schäffer.

℞ *Calomelan.*
Sulphur. aurat. Ant. āā gr. j,
Pulv. hb. Cicut. gr. iij,
— *rad. Rhei* gr. v,
Sacchar. alb. ʒβ.
M. dent. tal. dos. xij.

MS. Kindern unter einem halben Jahre 2mal tägl. $\frac{1}{2}$, älteren ein ganzes Pulver.

Fischer.

℞ *C. C. rasp.*
Nuc. moschat.
Bacc. Laur. āā ʒj,
Pulv. Liquirit. ʒvj.
M. f. Pulv.

MS. Kindern unter 1 Jahre $\frac{1}{2}$, 2 bis 3jährigen 1 Theelöffel 2mal täglich.

Gölis.

℞ *Calomelan.*
Sulphur. aur. Ant. āā gr. j,
Extr. Conii macul. gr. j,
Sacchar. alb. ʒj.
M. dent. tal. dos. xij.

S. Kindern bis zu 2 Jahren 2 mal täglich ein halbes, älteren ein Pulver zu geben.

Fischer.

℞ *Extr. Conii mac.*
Pulv. hb. Conii āā ʒβ.
M. f. Pilul. 60.

S. Früh und Abends 1 Pille, und alle 2 Tage mit einer zu steigen.
Störck.

℞ *Extr. Cicut. gr.* viij,
Aq. Foenicul. ʒiv,
Liq. Kali acetic. ʒiβ,
Oxymell. squill. ʒij.

MS. Stündlich 1 Kinderlöffel voll.
Gölis.

℞ *Extr. Cicut. gr.* iij-vj,
Aq. Meliss. ʒij,
Tinct. Rhei vinos. ʒj.

MS. Täglich 3mal einen halben Eßlöffel voll.

Hecker.

℞ *Resin. Guajac. gr.* v,
Aethiop. antim. gr. iij,
Pulv. hb. Digit. gr. $\frac{1}{4}$,
Sacchar. alb. ʒβ.

M. dent. tal. dos. xij.

S. Für Kinder von 7 Jahren täglich 3mal, für eins von 4 Jahren 2mal 1 Pulver.

Hufeland.

℞ *Calomelan.*
Sulphur. aur. Ant. āā gr. j,
Resin. Guajac. ʒβ,
Extr. Conii mac. gr. ij,
Rad. Liquirit. ʒβ.

M. dent. tal. dos. xij.

S. Zweimal täglich ein Pulver.
(Für Kinder von 10 Jahren.)
Vogt.

℞ *Aq. Menth. crisp.* ʒiiij,
Tinct. Rhei aquos.
Liq. Kali acetic. āā ʒj,
Sacchar. alb. ʒβ.

MS. Zweimal tägl. 1 Eßlöffel.
Wendt.

℞ *Tinct. Rhei aquos.* ℥iβ,
Liq. Kali acetic. ℥β.

MS. Zweimal tägl. 80 Tropfen.
Tode.

℞ *Extr. cort. Peruv.*
Aq. Cinnam. v. āā ℥j,
Tinct. Rhei aquos. ℥vj.

MS. Früh und Abends 70 Tropfen
in Thee.

℞ *Cort. Chin.* ℥j,
— *Aurant.* ℥ij,
Macid. ℥j

c. c. M. Mit $\frac{1}{2}$ Quart (℥j) weissen
Franzwein zu übergießen, nach
48 Stunden durchzuseihen und
auszupressen.

MS. Täglich 3mal $\frac{1}{2}$ —2 Eß-
löffel. (Für Kinder von 2—6
Jahren.)

Hufeland.

℞ *Ungt. Althaeae* ℥j,
Fell. Taur. rec.
Sap. venet. āā ℥iij,
Petrol. ℥ij,
Sal. C. C. ℥β,
Camphor. ℥j.

MS. Täglich 3mal 1 Theelöffel
voll einzureiben.
Hufeland.

℞ *Fel. Taur.* ℥iv,
Sal. culinar. ℥vj,
Ol. nuc. Jugland. ℥j.

Diger. leni calore. f. liniment.

S. Zum Einreiben in den Unter-
leib.

Roncalli.

℞ *Fell. Taur. rec.* ℥ij,
Ammon. carb. pyr.-oleos. ℥β,
Aq. destillat. ℥ij,
Spir. vin. saponat. ℥iij.

MS. Tägl. 3mal erwärmt in den
Unterleib einzureiben.

Vogt.

Stomacace.

Im Anfange gelinde Abführmittel, später kräftig
reizende, antiseptische Mittel, wie Campher, China, Mi-
neralsäuren. Aeußerlich passen die Salzsäure, der
Alaun, *Zincum sulphuricum* etc.

℞ *Pulp. Tamarind* ℥β.
Coq. in s. q. Aq. per $\frac{1}{2}$ hor.
in Colatur. ℥iv
solve

Magnes. sulphur. ℥j-ij,
Syr. Mannae ℥j.

MS. 2stündl. 1 kleinen Eßlöffel
voll.

Wendt.

℞ *Pulp. Cassiae* ℥j,
Acid. tart. ℥j-℥β,
Aq. flor. Tiliae ℥iij,
Syr. Mannae ℥j.

MS. 2stündl. 1 Eßlöffel.

Wendt.

℞ *Dcti. Salep. tenuior.* ℥iv,
Elix. acid. Haller. ℥β-j,

Syr. Rub. Idaei ℥j.
MS. 2stündl. ein Eßlöffel voll.
Wendt.

℞ *Camphor.* gr. iv,
Mell. despumat. ℥β.
Misc. terend. invic.
adde
Aq. Melissae ℥iijβ.
MS. 2stündl. 1 Eßlöffel.
Wendt.

℞ *Mell. ros.* ℥ij,
Acid. mur. ℥ij.
MS. Pinselsaft.
van Swieten.

℞ *Alumin. crud.* ℥j,
Aq. Salviae ℥iβ,
Mell. crud. ℥β.
MS. Zum Pinseln.
Wendt.

℞ *Zinc. sulphur.* ʒj,
Mucil. Mimos.
Syr. Moror. āā ℥j.
MS. Pinselsaft.
Wendt.

℞ *Decoct. Althaeae* (℥ij) ℥viiij,
Acid. muriat. ℥iβ,
Mell. crud. ℥β.
MS. Mundwasser.
Wendt.

20

4

20

4

t.

5viiij,

4

t.

20

4

20

4

20

4

Ala

4

4

4

20

4

