

Menstruatio anomala. Fehlerhafte monatliche Reinigung.

1) *Menstruatio difficilis.* Dysmenorrhoe.

A. Die Constitution ist mehr plethorisch als spastisch, das Subject robust, es findet ein Ueberwiegen der arteriellen Thätigkeit statt.

Kur. Allgemeine und örtliche Blutentziehungen, Abführungen durch Mittelsalze, *Tartarus boraxatus*, verdünnende Getränke, laue Bäder, vegetabilische Diät.

℞ *Semin. Papav. alb.* ℥β,
Aquae commun. ℥vj,
f. l. a. Emulsio.

adde
Olei Amydal. dulc. ℥j,
Pulv. Gummi Arabic. ℥ij,
Extr. Hyoscyam. vj — viij,

MDS. Stündlich einen Eßlöffel.

℞ *Pulp. Tamarind.* ℥ij.
Coq. c. *Aq. Font.* q. s. per
 $\frac{1}{4}$ hor. ad Colatur ℥x.

in qua solve
Magnes. sulphur. ℥j,
Syrup rub. Idaei ℥iβ.

MDS. Zweistündlich eine halbe Tasse voll.

℞ *Kali natronato-tart.* ℥j,
Natri carbonic. acidul. ℥ij,
Elaeosacchar. Foenicul. ℥β.

M. f. Pulv.

DS. Stündlich einen reichlichen Eßlöffel bis zur Wirkung.

℞ *Tamarind.* ℥ij,
Coq. c. *Aq. commun.* ℥xij.
ad Colatur ℥viij.

In q. solv.

Tart. boraxat. ℥j,
Elaeosacchar. Citr. ℥β.

MDS. Zweistündlich einen Eßlöffel voll.

℞ *Natri boraci,*
Aq. Amydal. amar. āā ℥j,
Aq. Melissae ℥iv.

DS. Stündlich einen Eßlöffel.
Pitschaft.

B. Die Erscheinungen gehören weniger dem Gefäß- als dem Nervensystem an; die Constitution der Kranken ist spastisch, hysterisch.

Kur. Anwendung der, die Sensibilität direct herabstimmenden, oder antagonistisch dieselbe in den Geschlechtstheilen durch vermehrte Erregung anderer Organe herabsetzenden Heilmittel. Zu den ersteren gehören die Halbbäder, Dampfbäder und Injectionen von Kamillen, Valeriana und Bilsenkraut-Absud, desgleichen Klystire, Einreibungen von Opiatsalben in die Kreuzgegend, Cataplasmen auf die *regio hypogastrica* und innerlich Opium in kleinen Gaben, Emulsionen, Valeriana etc. Zu der zweiten Klasse sind zu rechnen die reizenden Fußbäder, die flüchtig reizenden Einreibungen in die Kreuzgegend, die Beförderungsmittel der Transpiration und Sinapismen in die Unterschenkel.

℞ *Aq. Menth. piperit.* ℥iv,
 — *Cinnamom.* ℥β,
Tinct. Castorei,
 — *Valerian. aeth.* āā ℥j,
Syrup. Papav. alb. ℥iij.
 MDS. Alle halbe bis eine Stunde einen Eßlöffel voll.

Zugleich:

℞ *Liniment. volatil. Camphorat.* ℥j,
Tinct. Opii crocat. ℥β.
 MDS. Zum Einreiben auf den Unterleib.

M. J. Schmidt.

℞ *Elixir. Proprietat. Paracels.* ℥iv,
Aq. foetid. antihyst. ℥iij,
 — *Chamomill.* ℥iv.
 MDS. Morgens und Abends einen Eßlöffel.

Heim.

℞ *Morphii acetic.* gr. j.
 solve in
Olei Olivar. gutt. x.
 adde
Pulv. Rad. Ipecacuanh. gr. ij,
Extr. Hyoscyam. gr. iv,
Micæ Pan. alb. ℥j,
Mell. despumat. q. s.
 u. f. Boli 6.
 S. Alle drei Stunden 1 Stück.
 Brera.

℞ *Croci* ℥viiij,
Flor. Aurant. ℥β,
Chamomill. vulg. ℥iβ.
 C. m. f. Spec.
 DS. Einen gehäuften Eßlöffel voll mit 3 Tassen Wasser anzubrühen. Berends.

℞ *Flor. Chamomill.*
 — *Sambuc.* āā ℥iβ.
 C. MDS. Mit Wasser angebrüht zum Hineinsetzen. Berends.

℞ *Calomel.* gr. j,
Castorei gr. iij,
Croci orient. gr. ij,
Sacch. alb. ℥j.
 M. f. Pulv. dent. tal. dos. 3.
 S. Abends ein Pulver mit Kamillenthee.

℞ *Olei Amygd. dulc.* ℥ij,
Mucil. G. Arabic. ℥vj,
 m. exactissime et adde
Decoct. Rad. Salep ℥x,
Tinct. Opii spl. ℥j — ℥β.
 MDS. Stündlich zwei Eßlöffel. Richter.

℞ *Ol. Hyoscyami,*
 — *Papav. alb.* āā ℥β,
Spir. Sal. Ammoniac.
Liq. C. C. succinat.
Laud. liquid. Sydenh. āā ℥ij,
 M. f. Liniment.
 DS. Zweistündlich einen Theelöffel einzureiben. Stark.

2) *Menstruatio retenta.* Amenorrhoe.

A. Durch Störungen in der Reproduction, entweder in Folge anderer Krankheiten, oder in Folge der Lebensweise. — Hier Vermeidung aller reizenden, das Geschlechtssystem besonders in Anspruch nehmenden Mittel, durch *Aloë, Gummata ferulacea, Sabina etc.* Anfangs resolvirende, abführende, später gelind stärkende, die Reproduction und den Tonus der Muskelfaser befördernde Mittel.

℞ *Calomel. gr. vj,*
Extr. Cicut. ℥β,
Extr. Hyoscyam. ℥j,
Rad. Rhei ℥β.

M. f. Pilul. 30.
S. Dreistündlich 1 Stück.

℞ *Ferri jodat. ℥ij,*
Alcohol.
Aq. dest. āā ℥ij,

MDS. Früh und Abends einen
Eßlöffel.

Perquin.

℞ *Ferri jodat. ℥β,*
Croc. pulv. ℥β,
Sacch. alb. ℥iv,

M. f. Trochisci 120.
S. 6—10 Stück täglich.
Perquin.

℞ *Ferri jodat. ℥iβ,*
Adip. Suill. ℥j.

M. f. Unguent.
DS. Haselnußgrofs in den inneren oberen Theil des Schenkels einzureiben.

Perquin.

B. Bei gleichzeitiger Schwäche des Geschlechtssystems, welche durch Schloffheit der inneren und äusseren Genitalien, sehr geringe Temperatur derselben, gänzlich mangelnde Geschlechtsneigung sich zu erkennen giebt, müssen auch aufser der allgemeinen, mehrere örtlich das Geschlechtssystem in Anspruch nehmende Mittel zur Anwendung kommen.

℞ *Croc. pulv.*
Myrrhae
Sulphur. depurat. āā ℥j,
Fell. Tauri inspiss. q. s.
u. f. Pilul. 150. Consp. *Pulv. Croci.*

DS. Ein bis zweimal täglich
12 Stück.

G. A. Richter.

℞ *Galban. depurat.*
Rad. Valerian.
Croc. pulv. āā ℥j,
Extr. Millefol. q. s.
u. f. Boli 15.

Consp. *Pulv. Croci.*
S. Dreimal täglich 1 Stück.

℞ *Extr. Aloës aquos. ℥j,*
Extract. Myrrh.
Croci āā ℥j,
Ammon. muriat. ferruginos. ℥ij.
Galbani ℥iij,

M. f. Pilul. gr. ij. Consp. *Pulv. Croci.*

S. Früh und Abends 3 Stück.
Clarus.

℞ *Ferri ammoniat. subtiliss. pulv. ℥iijβ,*
Cortic. Cinnam. ℥β,
Sacch. albissimi. q. s.

ad consist. tab. coct. F. rotul 40.
S. Zweimal täglich 2—3 Stück.
Tode.

℞ *Terebinthin. venet.* ʒij,
Croci orient.
Pulv. hb. Rut. āā ʒj,
M. f. Pilul. 72.
S. Täglich zweimal 6 Stück.
Guibert.

℞ *Sabinae Pulv.* ʒij,
Ferri pulverat. ʒj,
Extr. Aloës aquos. ʒj,
Mucil. Gum. Tragacanth. ʒij,
M. f. Pilul. gr. 2.
S. Zwei bis dreimal täglich 3—
4 Stück.
Radius.

℞ *Pulv. Hb. Sabinae* ʒij,
Extr. Sabin. q. s.
M. f. c. pauxill. *Gummi Tra-*
gacanth. Pilul. 60.
S. Zwei- bis dreimal täglich 4—
5 Stück.

℞ *Gummi Ammoniaci* ʒij,
Aloës lucid.
Ferri oxydulat. nigr. āā ʒβ,
Extr. Taraxaci q. s.
u. f. Pilul. 90. Consp. *Pulv. Croc.*
DS. Dreimal täglich 3 Stück.
Carus.

℞ *Hb. Sabinae* ʒvj,
Aq. commun. fervidae. q. s.
digere per hor. in Cola-
tura ʒvj.
solve
Boracis ʒj,
Sacchari albissimi ʒvj.
MDS. Dreimal täglich einen Efs-
löffel.
Kopp.

℞ *Croci pulverisati* gr. vj,
Cinnamom. gr. iij,
Magnes. ustae gr. viij,
Syrup. Cortic. Aurant. q. s.
u. f. Bolus Consp. *Pulv.*
Cinnam.
S. Auf Einmal zu nehmen.
Richard.

℞ *Camphor. trit.* gr. vj,
Flor. Arnicae ʒβ,
Sal Ammoniac. ʒij,
Sacch. alb. ʒvj,
M. f. Pulv. d. ad vitrum.
S. Drei bis viermal täglich einen
Theelöffel.
Berends.

℞ *Aloës* ʒβ—i,
Ferri pulv. ʒij,
Mucil. G. Tragacanth. q. s.
u. f. Pilul. gr. iij.
Consp. *Pulv. Cinnamom.*
DS. Täglich 1—3 Stück.
Radius.

℞ *Aloës* ʒij,
Asae foetid. ʒiβ,
Ferri sulphuric. ʒiij,
Croci,
Macidis āā gr. xv,
Olei succin. gutt. xx,
Syrup. Artemis. q. s.
u. f. Pilul. pond. gr. ij.
S. Einen Abend um den andern
oder alle Abend 4—8 Stück.
Pilulae benedictae Fulleri, von
Radius vereinfacht.

℞ *Aloës* ʒj,
Ferri pulverati ʒij.
Sulph. stib. aurant. ʒβ,
Calomelan. ʒj,
Ol. Sabin. aeth. gutt. xx.
M. f. c. *Syrup. Alth.* q. s.
Pilul. gr. iij, d. in vitr.
S. Abends 2 Stück zu nehmen.
Weikard.

℞ *Ferri oxydulati,*
Rad. Colomb. āā ʒj,
Cort. Aurant. ʒβ,
— *Cinnamom.* ʒj.
M. f. Pulv. divid. in part. aequal. 9.
S. Täglich 3 Pulver zu nehmen.
Pulveres tonico-martiales
Brerae.

- ℞ *Ferri pulverati* ℥β,
Gummi Ammoniac.
Sapon. Antimon. āā ℥ij.
 M. f. Pilul. gr. iij.
 S. Täglich zweimal 3—4 Stück.
 (Bei gleichzeitiger Stockung
 im Unterleibe.) Jahn
- ℞ *Rad. Hellebor. nigri,*
Summitat. Millefol.
Flor. Chamomill. āā ℥β,
Rad. Gramin. ℥iβ,
Semin. Anis. stellat. ℥ij.
 C. MDS. Zum Aufgufs.
 Jahn.
- ℞ *Aq. Lactuc. viros.* ℥iij,
Kali hydrobromic. gr. xij—
 xvij,
Syrup Althaeae ℥j.
 S. Innerhalb 24 Stunden zu ver-
 brauchen.
 Magendie.
- ℞ *Ferri sulphur.-crystalliat.,*
Extr. Myrrhae,
Galbani āā ℥iij,
Syrup. Cortic. Aurant. q. s.
 u. f. Pilulae 210.
 S. Alle drei Stunden 6—10 St.
 Kämpf.
- ℞. *Extr. Hellebor. nigr.*
 — *Myrrhae aquos.* āā ℥j,
Hb. Cardui benedict. q. s.
 u. f. Pilul. gr. 1. Consp. *Pulv.*
Lycopod.
 S. Täglich zweimal 4 Stück.
 Bacher.

C. Bei mehr entzündlicher Natur der *retentio mensium* passt die oben bei der ersten Art der Dysmenorrhoe angegebene Behandlung. Auch kann man hier nach Beseitigung der ersten entzündlichen Erscheinungen, zur Anwendung des Borax schreiten.

- ℞ *Boracis* ℥ij,
Flaved. Cort. Aurant.
Elaeosacch. Foenicul. āā ℥jβ,
Sacch. alb. ℥iij.
 M. f. Pulv.
 S. Täglich dreimal zwei Thee-
 löffel. Stark.

- ℞ *Tinct. Ferri muriat.*
 — *Aloës comp.* āā ℥β,
 — *Castor.* ℥ij.
 MDS. Dreimal täglich 1 Eßlöffel.
 Clarke.

- ℞. *Extr. Sabinæ,*
 — *Aloës aquos.* āā gr. x,
Oxyd. nigr. Mangan. gr. xiv,
 M. f. ope Mell. Bol. 6.
 S. Den Tag über zu verbrauchen.
Boli emmenagogi Brerae.

- ℞ *Ferri oxydulat. gr.* xv,
Extr. Sabin. gr. vj.
 M. f. ope Mellis Bol. 8.
 S. Den Tag über zu verbrauchen.
Boli emmenagogi martiales
Brerae.

- ℞ *Tinct. Kali hydrojodici* ℥β,
 DS. Zu 8, 10, bis 12 Tropfen in
 einem Eßlöffel Melissenwasser
 täglich ein- bis zweimal.
 Carus.

- ℞ *Spirit. Salis Ammoniaci*
caustic. ℥ij,
 DS. Einen reichlichen Eßlöffel
 in ein Bad zu mischen und
 darin 20 Minuten weilen zu
 lassen. Carus.

- ℞ *Liquor. Ammon. caustici* ℥iv,
Lactis Vaccin. ℥iv.
 MDS. Einigemal täglich 2 Eß-
 löffel voll in die Mutterscheide
 zu spritzen.
 Lavagna.

- ℞ *Boracis,*
Nitri depurati āā ℥j,
Magnes. alb. ℥iβ,
Sacchar. alb. ℥ij.
 M. f. Pulv.
 DS. Stündlich einen Theelöffel.
 Sprögel.

3) *Menses nimii.*

A. Bei vorherrschender productiver Thätigkeit des Uteringeschäftes, aber bei deutlichen Zeichen hämorrhoidalischer Zustände in der Gegend der breiten Mutterbänder ist die Blutung nicht zu stören. Man verordne ein antiphlogistisches Regimen, Ruhe und den Gebrauch gelinder Abführmittel aus Mittelsalzen, Tamarinden etc. Auch können Blutentleerungen nöthig werden.

B. Bei allgemein und örtlich aufgeregter Sensibilität mit großer Schwäche passen Säuren, Ratanha etc. in Verbindung mit antispasmodischen Mitteln.

℞ *Elixir. acid. Hall.* ℥ijβ,
Laud. liquid. Sydenh. ℥β,
Tinct. Cinnamom. ℥j.
 MDS. Alle halbe bis eine Stunde
 25—50 Tropfen.
 Most.

℞ *Acid. phosphoric. sicc.*
Pulv. Cort. Chin. fusc.
Extr. Cascarill. āā ℥j,
Conch. praeparat. gr. xv,
Ferri pulverat. gr. xxxv.
 M. f. c. pauxill. *Gumm. Mimos.*
Pilul. 140. Consp. Pulv. Cinnam.
 S. Dreimal täglich 10 Pillen.
 Wurzer.

℞ *Acid. phosphoric. dilut.* ℥ij,
Decoct. Salep tenuior. ℥vj,
Syrup. Rub. Idae ℥j.
 MDS. Zweistündlich 1 Eßlöffel.
 Wendt.

℞ *Elixir. Vitriol. Mynsicht.* ℥β,
Tinct. Castorei. ℥ij,
 — *Opii crocat.* ℥j.
 MDS. Zu 20—30 Tropfen.
 Richter.

℞ *Extr. Chin. frigid. parat.* ℥β,
 — *Ratanhae* ℥j,
Mixtur. sulphur. acid. ℥β,
Aq. Rub. Idae ℥vj,
Syrup. Croci ℥j.
 MDS. Alle drei Stunden 1 Eß-
 löffel. Sinogowitz.

℞ *Magnes. alb.*
Bol. Armen.
Elaeosacchar. Macid. āā ℥ij,
Rad. Rhei elect. ℥j.
 M. f. Pulv.
 S. Dreimal täglich 1 Theelöffel.
 Rust.

C h l o r o s i s.

Die Hauptanzeige bei der Behandlung ist, theils die Sanguification und Bildungsthätigkeit auf ihren normalen Standpunkt zu führen, theils die Richtung der Bildungsthätigkeit auf das Geschlechtssystem und die Menstrualfunction zu berücksichtigen und etwanige

hier sich entgegenstellende Hindernisse zu beseitigen. Man erforsche die veranlassenden Ursachen, nehme namentlich, ehe man zu den bekannten tonischen Mitteln greift, auf Krankheiten des Lymphsystems und einzelner Unterleibsorgane — eine oft nicht genug beachtete Ursache der Chlorose Rücksicht, — und gehe erst, nachdem dieser Anzeige Genüge geschehen, zu der rein stärkenden Heilmethode über.

℞ *Flor. Sal. Ammon. mart.*
Galbani āā ʒj,
Asae foetid. ʒij,
Castorei ʒj.
M. f. c. *Tinct. Valer.* Pilul. gr. iij.
S. Morgens und Abends 2—3 St.
Berends.

℞ *Flor. Sal. Ammon. mart.* ʒj.
solve in
Aq. Cinnamom. vinos. ʒβ.
MDS. Viermal täglich 12—40
Tropfen.

℞ *Ferri oxydulat.*
Rad. Colomb. āā ʒj,
Cort. Aurant. ʒβ,
— *Cinnamom.* ʒj.
M. f. Pulv. divid. in 9 part. aeq.
S. Dreimal täglich 1 Pulver.
Brera.

℞ *Aloës* ʒβ—j,
Ferri pulverati ʒij,
Mucil. G. Tragacanth. q. s.
u. f. Pilul. gr. iij. Consp.
Pulv. Cinnamom.
S. Täglich zweimal 1—3 Stück.
Radius.

℞ *Ferri chlor.* ʒij—ʒj,
Aq. destillat. ʒj.
MDS. Täglich zwei- bis dreimal
20 Tropfen.
Radius.

℞ *Summitatum Absinth.* ʒiij,
Corticis Cinnamomi,
Ferri pulverat. āā ʒij,

Inf. c. Vin. optim. ℥ iij,
post hor. 24 Cola.
MDS. Tägl. 2—4 Eßlöffel zu
nehmen. Brera.

℞ *Tinct. Ferri acetic. aeth.* ʒiij,
— *Cortic. Aurant.* ʒiv,
— *Macid.* ʒij.
MDS. Alle 2 Stunden 40 Tropf.
Vogt.

℞ *Ferri sulph.-crystallizat.* ʒj,
Extr. Myrrhae,
Galb. depurat. āā ʒiij,
Syrup. Cortic. Aurant. q. s.
u. f. Pilul. 210.
S. Alle drei Stunden 6 Stück.
Kämpfs Rothe-Backen-Pillen.

℞ *Rad. Zingiber. incis.* ʒij,
Ferri pulverat. ʒj,
Rad. Armorac. ras. ʒiij,
Vin. Gallic. alb. ℥ ij,
Macerat per hor. 12 Cola.
DS. Viermal täglich $\frac{1}{2}$ bis 1 Tasse.
Augustin.

℞ *Oxyd. Manganes. nigr.* gr. ij
Magnes. ust. ʒβ,
M. f. Pulv. Dent. Tal. dos. 6.
S. Dreistündlich 1 Pulver.
Brera.

℞ *Extr. Sabinæ,*
— *Aloës aquos.* āā gr. x,
Oxyd. Mangan. nigr. gr. xiv,
M. f. ope Mellis Boli 6.
S. Den Tag über zu verbrauchen.
Brera.

℞ *Fol. Taxi baccat.*
Ferri carb. āā ʒj,
Secal. cornut. ʒij,
Fol. digital.-purp. ʒβ,
Syrup. Amygdalar. q. s.
 u. f. Pilul. 250.

S. Täglich zweimal 8 Stück mit Sabinathee.

C. G. Neumann.

Eine jede Bleichsucht, bei welcher noch nicht Wassersucht und hektisches Fieber vorhanden, soll durch diese Formel gehoben werden.

℞ *Glob. tart. mart. pulv.* ʒβ - ij.
 D. in quadrupl. S. Eine Portion mit einem Quart Wasser, bis zur Auflösung gekocht, dem Bade heizumischen.

℞ *Sapon. medicati,*
G. Asae foetidae,
 — *Ammoniaci* āā ʒiβ,
Extr. Trifol. fibrin ʒiij,
 — *Aloës aquos.* ʒj,
Sulph. aurati Antimon. ʒj,
Aq. Foenicul. q. s.
 u. f. Pilul. gr. 2.

DS. Dreimal täglich 10—15 Pillen.
 Richter.

℞ *Lign. Quassiae,*
Sacchar. alb. āā ʒj.
Flor. Sal. Ammon. gr. x.
 M. f. Pulv. Dent. Tal. dos. 24.
 DS. Viermal täglich 1 Pulver.
 Richter.

℞ *Extr. Cortic. Peruviani* ʒij,
Gummi Myrrhae,
Sal. mart. āā ʒj.
Olei Cinnamom. gutt. iv.
 M. f. Pilul. 40.

S. Morgens und Abends 2 Pillen.
 Leake.

℞ *Pulv. Cort. Chinae,*
 — — *Aurant.*
 — *Rad. Gentian.* āā ʒβ,
 — *Cort. Cinnamom.* ʒij.

inf. cum
Vin. bon. alb. Rhenan. ũ. ij,
 stent. in digest. per 24 hor. Cola.
 DS. Zwei- bis dreimal ein kleines Weinglas voll.
 Richter.

℞ *Extr. Cort. Angustur.*
 — *Flor. Chamom.* āā ʒij,
Ferri pulverat. ʒj — iβ,
Pulv. Rad. Colomb. q. s.
 u. f. Pilul. gr. 2.

DS. Dreimal täglich 8—10 Pillen.
 Hecker.

℞ *Ferri pulverat.* ʒij,
Sacchar. albi ʒβ,
Cort. Cascarill.
 — *Cinnamom.* āā ʒj,
 M. f. Pulv. det. in scatul.
 S. Viermal täglich 1 Theelöffel.
 Richter.

℞ *Ferri sulph.* ʒβ — iβ,
Aq. Salviae ʒiv.
Mucil. G. Mimos. ʒβ,
 DS. Zum Einspritzen.
 Berends.

℞ *Alumin. crud.* gr. xv,
Aq. Menth. crisp. ʒiv,
Tinct. Cinnamom. ʒiij,
Syrup. Papav. ʒj.
 MS. Alle $\frac{1}{4}$ bis $\frac{1}{2}$ Stunde 1 Eßlöffel.
 Rust.

℞ *Olei Caryophyll.* gutt. x,
Naphth. Vitriol. ʒj,
 MS. Alle $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ Stunde 10—15 Tropfen.
 Thilenius.

℞ *Hb. Sabinæ* ʒiβ,
 Coq. c. *Aq. font.* s. q. ad Colatur. ʒxij.
 MDS. Zum Einspritzen.
 Kopp.

℞ *Rad. Ratanh.*
 — *Tormentill.*
Cort. Querc. āā ʒβ,
 C. m. f. Spec. div. in part. aeq. 6.
 S. Eine Portion mit 2 Weinglä-
 sern heissen Wassers aufzu-
 gießen und dann einzuspritzen.
 Vogt.

℞ *Extr. Chinae* ʒij,
 — *Opii* gr. xij,
Olei Sabinæ ʒiβ,
Ungt. Hyoscyam. ʒj.
 M. exactissime.
 DS. Früh und Abends zwei Kaf-
 feelöffel voll in den Unterleib
 einzureiben.

Kopp.

℞ *Empl. aromat.* ʒj,
Olei Sabin. ʒj,
Pulv. Sabin. ʒij.

Malaxentur. DS. Auf den Unter-
 leib zu legen. Kopp.

Leucorrhoea. Weisser Fluß.

Um das passende Verfahren bei der Leukorrhoe ausfindig zu machen, ist zunächst eine sorgfältige Ausmittelung des ganzen Krankheitszustandes nothwendig.

A. Ist die Leukorrhoe Folge einer im Uebermaasse thätigen Reproduktion, so ist die Beschränkung dieser abnormen Produktivität die erste Bedingung. Hier sind daher Regulirung der Diät, hinlängliche Bewegung, Entziehung stark nährender Getränke und Speisen, Berücksichtigung der Darmfunktionen, die grösste Reinlichkeit, Fluß- und Seebäder etc. die Hauptmomente der Kur.

B. Hängt die Leukorrhoe von bloß örtlicher Erregung ab, so hat man zu unterscheiden, ob dabei noch wirklich eine vermehrte arterielle Thätigkeit statt findet, oder ob diese bereits aufgehört und dem Zustande der Atonie Platz gemacht hat. Im ersteren Falle paßt eine antiphlogistische Diät, im zweiten muß man den Schwächezustand zu beseitigen suchen, was durch den Gebrauch der roborirenden Mittel, der *Amara*, *Aetherea*, des Eisens, bei gleichzeitiger kräftiger und nahrhafter Diät erzielt wird. Bei großer örtlich gesunkener Lebensthätigkeit und dadurch profus gewordener Absonderung der Schleimhaut muß man aber auch zugleich solche Mittel anwenden, die theils direkt, theils indirekt die Sekretion zu beschränken im Stande sind. Dahin gehören nun Einspritzungen von reinem oder

mit Milch versetztem Kalkwasser, die mit *Aq. Saturnina*, *Aq. Phagedaenica* vermischte Abkochung der Mohnköpfe, die Auflösungen des Alauns, des Zink-, Eisen- und Kupfervitriols (3j auf ℥ j), die Abkochungen der Eichen-, Ulmen- oder Weidenrinde, die Aufgüsse der *Hb. Absinth.*, *Serpylli*, die allgemeinen Bäder mit Eisen, aromatischen Kräutern etc.

℞ *Semin. Cannab. sativ.* ʒvj,
Gummi Arabic. ʒj,
Aq. Petroselin. ʒv.
f. l. a. Emuls. Colat. adde
Syrup. Althaeae ʒj.
MDS. Stündlich 1 Eßlöffel.
Choulant.

℞ *Sem. Cannab. sativ.* ʒiij - vj,
Amygd. amarar. ʒ.
cont. et tere cum *Aq. font.* ℥ 2.
f. Emuls. adde
Syrup. Papav. alb. ʒij.
S. Den Tag über zu verbrauchen.

℞ *Rad. Rhei* ʒj,
Bol. Armen.
Magnes. carb.
Elaeosacchar. Macid. āā ʒij,
M. f. Pulv.
DS. Dreimal täglich 1 Theelöffel.
Rust.

℞ *Magnes. sulphuric.* ʒj,
Rad. Ipecacuanh. gr. iij,
Sacchar. alb. ʒviij,
Olei Anis. gutt. vij — xij.
M. f. Pulv. det. ad vitr.
S. Täglich zwei- bis viermal
1 Messerspitze.
Vogler.

℞ *Pulv. rad. Ratanhae* ʒvj,
coq. c. *Aq. font.* xxiv.
Colatur. ʒviiij. adde
Extr. Ratanhae ʒij — iij.
MS. Zweistündlich 2 Eßlöffel.
Kopp.

℞ *Styrac. liq. purif.* ʒj,
Pulv. rad. Liquir. q. s.
u. f. Boli pond. gr. 6 — 8.

Consp. Pulv. Cinnamom.
S. Früh und Abends 3 Stück,
allmählig auf 6 zu steigen.
L'Heritier.

℞ *Catechu,*
Alumin. crud. āā ʒj,
Extr. Gent. q. s.
u. f. Pilul. gr. 2.
Consp. Pulv. Cinnamom.
S. Dreistündlich 4 Stück.
Hufelands Lieblinlingsmittel
gegen weissen Fluß.

℞ *Extr. Cortic. Peruv.* ʒiij,
— — *Cascarill.* ʒj,
— *Lign. Campech.*
Succi Liquir. inspiss. āā ʒij,
Mucil. Cydonior q. s.
u. f. Electuar.
S. Dreimal täglich 1 Theelöffel.
Kämpf.

℞ *Bals. Copaiv.*
Olei Terebinth. rectific.
— *Succin. rect.* āā ʒj.
MS. Täglich dreimal 30 — 60
Tropfen auf Zucker zu nehmen,
und ein halb Glas Rothwein
nachzutrinken.
Das *Elixir balsamicum* der
Franzosen.

℞ *Terebinthin.* ʒij,
Sapon. medical. ʒiij,
Pulv. rad. Alth. q. s.
u. f. Pilul. gr. 4.
Consp. sem. Lycopodii.
S. Zweimal täglich 5 Stück.
Guibert.

℞ *Ferri muriatici*,
Aloës,
Extr. Marrub. āā ʒβ,
As. foetid. ʒiβ.
 M. f. Pilul. gr. 2. Consp. *sem. Lycop.*
 S. Dreimal täglich 4—5 Stück.
 Whytt.

℞ *Terebinth.* ʒj,
Cort. Cascarill. ʒij,
Rad. Rhei. q. s.
 u. f. Pilul. gr. 2.
 S. Dreimal täglich 5—10 Stück.
 Mellin.

℞ *Vini Bordogalens.* ℥. j,
Ferri jodati ʒβ.
 DS. Früh und Abends 1 Eßlöffel.
Vinum Ferri hydriodati Perquini.

℞ *Ferri jodati* ʒij,
Alcoholi,
Aquae dest. āā ʒij.
 MS. Früh und Abends 1 Eßlöffel.
Tinctura Ferri hydriodati Perquini.

℞ *Ferri jodat.* gr. cxv,
Chocolatae ℥. j,
 M. f. Past.
 S. Anfänglich eine halbe, später
 1 Tasse voll.
Chocolata cum Ferrohydriodato Perquini.

℞ *Ferri oxydulat. fusc.* ʒj,
Cort. Cascarill.
Extr. Lign. Campechiens.
sicc. āā ʒjβ.
 M. f. cum Extr. Gent. rubr. s. q.
 Pilul. gr. 2. Consp. *sem. Lycopod.*
 S. Dreimal täglich 5—10 Stück.
 Sundelin.

℞ *Ferri jodat.* ʒβ,
Pulv. Croci ʒij,
Sacchar. alb. ʒiv.
 M. f. Trochisci 120.
 S. 8—10 Stück täglich, später
 alle 4 Tage um ein Plätzchen
 gestiegen.
Trochisci cum Ferrohydriodato Perquini.

℞ *Ferri jodat.* ʒβ,
Aq. dest. ℥. ij.
 DS. Zur Einspritzung, täglich
 mehrere Male.
Aqua hydrjodata Perquini.

℞ *Ferri subcarbonici* ʒij,
Extr. Liquir. s. q.
 u. f. Pilul. 60. Consp. *Pulv. Liquir.*
 S. Täglich 2—4 Stück, und täg-
 lich um 2 Stück zu steigen,
 bis auf 10. Foy.

℞ *Ferri alcoholisat.*
Conch. praep.
Cort. Cinnamom. āā gr. viij,
Succhar. alb. ʒiv.
 M. f. Pulv. divid. in part. aeq. viij.
 MS. Früh und Abends 1 Pulver.
 Gegen schleimige Ausflüsse
 aus den Geburtstheilen kleiner
 Mädchen. Tourtual.

℞ *Ferri pulv.*,
Pulv. Chocolat. āā ʒj,
 — *Croci* ʒij,
Mucil. Gummi Tragacanth.
 q. s. u. f. Rotul. gr. 12.
 S. Täglich 3—4 Stück.
 Bally.

℞ *Ferri sulphur.-crystalliat.*
Kino āā ʒiβ,
Terebinth. laricin.
Extr. Gentian. āā ʒiij,
 M. f. c. *Pulv. rad. Liquirit.*
 Pilul. 270.
 S. Viermal täglich 10 Stück.
 Walch.

℞ *Myrrhae elect.* ʒiβ,
Ferri sulphuric. ʒiij,
Pulv. rad. Tormentill. ʒij,
Mucil. Gummi Mimos. q. s.
 u. f. Pilul. gr. 2. Consp. *Cinnam.*
 S. Täglich viermal 7 Stück.
 Wendt.

℞ *Sabin.* ʒij,
Ferri pulv. ʒj,
Extr. Aloës aq. ʒj,
Mucil. G. Tragacanth. ʒij,
 M. f. Pilul. gr. 2. Consp. *Pulv.*
Cinnam.
 S. Zwei- bis dreimal täglich 3
 bis 4 Stück. RADIUS.

℞ *Ferri sulph.-crystall.*
Catechu,
Terebinth. coct.
Extr. Gentian. āā ʒj.
M. f. Pilul. 120. Consp. Pulv.
Cinnam.

S. Drei- bis viermal täglich 3
bis 6 Stück. Henschel.

℞ *Pulv. Catechu,*
Elaeosacch. Caryoph. āā ʒij.
 solv. in
Vin. Gallic. rubr. ʒvj,
DS. Umgeschüttelt zweistündlich
1 Eßlöffel.

℞ *Extr. Bistort.* ʒβ,
Pulv. Myrrhae,
Ferri sulphuric. āā ʒβ,
 M. f. Pilul. gr. 2.
S. Alle drei Stunden 6 Pillen.
Horn.

℞ *Ferri sulphuric.* q. s.
excandescat in crucibulo, do-
nec massa ex fusco rubra ap-
pareat; hujus massae in Pulv.
redact. ʒj.
 solve in
Vini de Madeira ʒj.
MDS. Zweistündlich 15—20 Tr.
Arcanum Weigelii.

℞ *Ferri sulphuric.-crystall.* ʒj,
Extr. Gentian. q. s.
u. f. Pilul. 120. Consp. Pulv.
Cinnam.
S. Alle zwei Stunden 1 Pille,
und in sechs Tagen zu 8 Pil-
len pro dosi steigend.
Horn.

℞ *Alumin.*
Ammon. muriat. mart.
Pulv. aromat.
Extr. Chin. frig. parat. āā ʒβ,
Olei Cinnam. aeth. gutt. xij,
M. f. Pilul. gr. 2. Consp. *Cinnam.*
D. in vitro. S. Morgens und
Abends 15—20 Pillen.
Formey.

℞ *Extr. Aloës aq.*
 — *Myrrhae aq.* āā ʒβ,
 solve in
Liq. Terrae foliat. Tart. ʒij,
MS. Täglich dreimal 2 Theelöffel.
Brendel.

℞ *Gummi Kino,*
Myrrhae,
Extr. Marrub. alb. āā ʒij,
Vitriol. Mart. ʒj,
 M. f. Pilul. gr. 2.
S. Dreimal täglich 8 Stück.
Weitz.

℞ *Myrrhae,*
Ammoniac.
Ferri oxydul. nigr. āā ʒij,
Rad. Valer.
 — *Rhei* ʒijβ,
 M. f. c. Extr. Fumar. s. q.
 Pilul. gr. 3.
S. Dreimal täglich 4 Pillen.
Bluff.

℞ *Extr. Gent.*
 — *Absinth.* āā ʒjβ,
Pulv. Cort. Cascarill.
 — *Hb. Absinth.* āā s. q.
 u. f. Pilul. gr. iij.
S. Dreimal täglich 3—5 Stück.
Steinberger.

℞ *Secal. cornut.* ʒj,
Coq. c. Aq. font. s. q.
ad Colatur. ʒviij.
 adde
Syrup. Croci ʒj.
MS. In zwei Tagen zu verbrauchen.
Bazzoni.

℞ *Cort. adstring. Brasil.* ʒj-ʒβ.
f. Pulv. dent. tal. Dos. xij.
S. Drei- bis viermal täglich
1 Pulver mit Wasser.
Merrem.

℞ *Cort. adstring. Brasil.* ʒj,
Coq. c. Aq. font. ʒxvj,
ad Colatur. ʒviij.

MS.
℞
S.
T
℞
M.
S. I
℞
S. I
P
d
n
℞
SS.
℞
SS.
℞

Hydrometra. Wassersucht der nicht schwangeren Gebärmutter.

Die Behandlung der Gebärmutter-Wassersucht muß zunächst auf Entleerung des angesammelten Wassers gerichtet sein. Wo nicht gleichzeitige Schwangerschaft vorhanden, wo das Wasser wirklich in der Gebärmutter-Höhle stagnirt und sich durch Fluctuation zu erkennen giebt, wird die Entleerung durch den Muttermund zu befördern sein. Es geschieht dies, wo keine Verwachsung statt findet, am besten durch die Einführung einer geknüpften Sonde, entweder frei oder in einer Troikarröhre verborgen; wo hingegen der Muttermund verwachsen gefunden wird, durch Einbringung eines dünnen, etwas gebogenen und hinlänglich langen Troikars.

Die innere Behandlung hat einen dreifachen Zweck: 1) den Ursachen der Wasseranhäufung zu begegnen; 2) dem Abgange des Wassers, wenn es durch den Muttermund nicht statt finden kann, andere Wege durch Vermehrung sonstiger Excretionen anzuweisen; 3) der erneuerten Wasseranhäufung durch Verbesserung der allgemeinen Constitution Schranken zu setzen.

℞ *Liq. Ammon. acetic.*,
— *Kali acetic.*,
Oxymell. Squill. āā ʒiβ.
MS. Zwei- bis dreistündlich 1—
2 Eßlöffel. Jahn.

℞ *Ammon. carb. sicc.* ʒj—ʒβ,
Acid. nitr. pur. q. s. ad saturat.
Aq. destill. ʒij—iij,
Syrup. Alth. ʒj,
MS. Zweistündlich 1 Eßlöffel.
Berends.

℞ *Fol. Digital. purp.* ʒj,
Kali nitr. ʒj,
M. f. Pulv. divid. in 10 part. aeq.
S. Drei- bis vierstündlich 1 Pulv.
Brera.

℞ *Pulv. fol. Digital.* ʒj,
Extr. Cent. minor. ʒj.
M. f. Pilul. 40. Consp. *sem. Lycop.*
S. Anfangs 2, später 4—6 Pillen
täglich.
J. A. Schmidt.

℞ *Pulv. lb. Digital.*
Rad. Squill. āā ʒβ,
Extr. Gentian. ʒj,
Olei Junip. gutt. viij.
M. f. c. *Syrup simpl.* q. s.
Pilul. 12. Consp. *sem. Lycopod*
S. Dreimal täglich 1 Pille.
Pearson.

℞ *Fol. Digital. purp.* ℥j,
Rad. Calam. aromat. ℥iij,
inf. *Aq. ferv. s. q. ad Colat.* ℥v.
Tart. boraxat.
Succi Junip. āā ℥iβ.
MS. Zweistündlich 1 Eßlöffel.
Sundelin.

℞ *Tart. dep.* ℥j,
Borac. ℥j,
Decoct. Petroselin. ℥vj,
Oxymell. Squill. ℥ij.
MS. Stündlich 1 Eßlöffel.
Sachtleben.

℞ *Vin. stibiat.* ℥j,
— *squillit.* ℥iij.
MS. Alle zwei bis drei Stunden
50—100 Tropfen.
Lentin.

℞ *Inf. rad. Levistici* ℥vj (ex
℥iij—vj) ℥vj,
Tart. boraxat. ℥β,
Spir. muriat. aeth. ℥β—j,
Roob. Junip. ℥j.
MS. Zweistündlich 1 Eßlöffel.
Trauttsch.

℞ *Rad. Squill.*
Folior. Digital. purp. āā gr. j,
Olei Junip. gutt. ij,
Tart. boraxat.
Rad. Liquirit. āā ℥j,
Cort. Cinnamom. gr. ij.
M. f. Pulv. dent. tal. Dos. 4.
S. Zweimal täglich 1 Pulver.
Hufeland.

℞ *Gummi Ammoniac.*
Sapon. medicat.
Rad. Rhei āā ℥ij,
M. f. Pilul. gr. 3. Consp. *sem. Lycop.*
S. Dreimal täglich 6—10 Stück.
Tissot.

℞ *Tinct. Digital.* ℥iij,
— *Scillae* ℥j.
MS. Vierstündlich 30 Tropfen.
Horn.

℞ *Extr. Lactuc. viros.* ℥ij,
Trae Digital. purp. ℥β,
Aq. Cinnamom. vinos. ℥iβ.
DS. Alle zwei Stunden 30—50 Tr.
Schneider.

℞ *Trae Scill. kalin.* ℥j.
S. Dreimal täglich 10—30 Tropf.
Hufeland.

℞ *Gummi Guttæ,*
Hb. Digital.
Rad. Squill.
Sulph. Ant. aurat.
Extr. Pimpinellæ āā ℥β.
M. f. Pilul. gr. 2. Consp. *sem. Lycop.*
DS. Zwei- bis dreistündlich 1 Pille.
Heim.

℞ *Rad. Helen.* ℥j.
Coq. c. *Aq. ferv. s. q. ad Colat.* ℥iv.
adde
Kali carb. acet. Squill. sa-
tural ℥β,
Syrup. flor. Aurant ℥β.
MS. Zweistündlich 1 Eßlöffel.
Wendt.

℞ *Extr. Hellebor. nigr.*
— *Myrrh. aquos.* āā ℥j,
Hb. Card. benedict. q. s.
u. f. Pilul. gr. 1. Consp. *sem. Lycop.*
DS. Täglich zweimal 4 Stück.
Bacher.

℞ *Aur. chlor. natron.* gr. ij,
Aq. destill. ℥j,
MS. Zweistündlich 10 Tropfen.
Grötzner.

℞ *Terebinth. venet.,*
Sapon. medic.,
Rad. Rhei āā ℥j,
Syrup. simpl. s. q. u. f. Elect.
S. Dreimal täglich 1 Theelöffel.
Berends.

℞ *Petrolei rectific.* ℥β,
Olei Terebinth. ℥j,
Spir. Junip. ℥iv.
MS. Täglich dreimal erwärmt
einzureiben.
Vogt.

R Petrol. dep. ℥iβ,
Ungt. nervin. ℥j.
M. f. Ungt.

S. Zum Einreiben. Radius.

R Sapon. Terebinth. ℥β,
Aq. Menth. pip. ℥ij,
Spir. Camphor. ℥j,
Trae Opii simpl. ℥üj.

MS. Aeufserlich. Blasius.

R Veratrin. gr. iv,
Axung. porc. ℥j.
M. f. Ungt.

S. Täglich zweimal Haselnufs-
groß einzureiben.
Magendie.

Intumescencia et induratio uteri. An- schwellung und gutartige Verhärtung der Gebärmutter.

Die Behandlung dieser Geschwülste hat den Zweck:
1) das innerhalb der erweiterten Gefäße stockende Blut
durch gelind die Cirkulation beschleunigende Mittel in
Umlauf zu setzen; 2) die erweiterten Gefäße selbst
zu ihrem natürlichen Durchmesser zurückzuführen; 3)
die etwaigen Ausschwitzungen in das umliegende Zell-
gewebe durch Erhöhung der Resorption zu beseitigen.
Zur Erfüllung dieser Indicationen dienen zunächst die
abführenden Mineralwässer, die seifenhaltigen Pflanzen-
extrakte, Schwefel, *Antimonialia*, *Mercurialia*, *Ci-
cuta*, *Aq. Laurocerasi u. s. w.* Aeufserlich passen al-
kalische Bäder, Seifenbäder, Einreibungen von Jodsalbe,
künstliche Ableitungen u. s. w.

R Carb. animal. ℥j,
Ferri subcarb.
Sacchar. alb. āā ℥ij.

M. f. Pulv. div. in part. aeq. 10.

S. Täglich drei- bis viermal

1 Pulver, allmählig steigend.
Clarus.

R Carbon. animal. ℥β,
Ungt. Digital. ℥vj,
M. f. Ungt.

S. Salbe.

Radius.

R Calomel. gr. vj,
Extr. Hyoscyam. ℥j,
— Conii macul. ℥β,
Rad. Rhei ℥β.

M. f. Pilul. 30.

S. Dreistündlich 1 Pille.

Thaer.

R Ferri bromat. ℥j,
Extr. Liquir. q. s.
u. f. Pilul. 60. Consp. Pulv. Cinnam.

S. Früh und Abends 1—2 Pillen.

Werneck.

℞ *Ferri iodat.* ʒj,
Natri bromat. ʒβ,
Extr. Liquir. s. q.
 f. Pilul. gr. 2. Consp. *Cinnam.*
 S. Früh und Abends 1—3 Pillen.
 Werneck.

℞ *Hb. Conii mac.* ʒij,
Extr. Conii s. q.
 f. Pilul. gr. 2. Consp. *Lycop.*
 S. Täglich dreimal 1—20 Pillen.
 Berends.

℞ *Ungt. Hydrarg. cinerei* ʒij,
Jodi ʒiij.
 M. f. Ungt.
 S. Zum Einreiben.

℞ *Ungt. Hydr. cin.* ʒβ,
Sapon. domest. ʒij,
Camph. ʒβ.
 M. f. Ungt.
 S. Zum Einreiben.
 Schreyer.

℞ *Sapon. venet.* ʒβ,
Extr. Cicut. ʒij,
Aethiop. Antimon. ʒj,
Fell. Tauri inspiss. ʒβ.
 M. f. Pilul. gr. 2.
 S. Täglich drei- bis viermal 8
 bis 10 Pillen. Pezold.

℞ *Tart. boraxat.* ʒβ,
Extr. Gramin. ʒij,
Aq. font. ʒvj.
 MS. Zweistündlich 1—2 Eßlöffel.
 Richter.

℞ *Sapon. venet.* ʒij,
Extr. tarax. ʒβ,
Trac Rhei aq. ʒij,
Aq. Menth. piperit. ʒviij,
Syrup. Cortic. Aurant. ʒβ.
 MS. Zweistündl. eine halbe Tasse.
 Richter.

℞ *Tart. tartarisat.*
Extr. Taraxaci āā ʒβ,
Mellis ʒj,
Aq. Flor. Chamomill. ʒiv.
 MS. Zweistündlich 1 Eßlöffel.
 Jahn.

℞ *Rad. Squill.* ʒiij,
 Coq. c.
Lixiv. caust. q. s.
 ad mucilag. Col. adde
Adip. Suill. q. s.
 u. f. Ungt.
 S. Zum Einreiben.
 Hufeland.

℞ *Calomel.* ʒβ,
Sulph. stib. aurant. ʒj,
Extr. Calend.
 — *Conii maculat.* āā ʒij.
 M. f. Pilul. gr. 2. Consp. *Lycop.*
 S. Dreimal täglich ʒ Stück.
 Rust.

Scirrhus et Carcinoma Uteri.

Für die dynamische Behandlung des Scirrhus gelten folgende Indicationen:

- 1) die veranlassenden, noch fortwirkenden Ursachen aufzuheben und zu entfernen;
- 2) die mit dem Scirrhus stets verbundene Entzündung zu mindern und ihrem Charakter gemäß zu behandeln;

3) endlich ist von den Mitteln vorzüglich Gebrauch zu machen, welche die Reproduction in den kleinen Gefäßen herabsetzen, und die bei ähnlichen chronischen Entzündungen so wohlthätig zu wirken pflegen. Hierher gehören: die Mercurialien, innerlich und äußerlich, *Extr. Cicutae*, die *Belladonna*, *Aqua Laurocerasi* etc. etc.

℞ *Flor. Calendul.* ʒiij,
c. c. s. q. ad Colatur. ʒv.
Syrup. Cort. Aurant. ʒβ.
MDS. Dreimal täglich 2 Eßlöffel.
Westring.

℞ *Summitat. Calendul. recent.*
ʒj—iβ,
Coq. c. *Lact. vaccin.* ℥ ij,
ad Colat. ʒviij.
S. Täglich zu verbrauchen.
Stein.

℞ *Extr. Calendul.*
— *Conii macul.*
Ferri oxydul. fusc. āā ʒij,
Pulv. Flor. et Hb. Calend. ʒiβ.
M. f. Pilul. gr. 2. Consp. *Lycopod.*
S. Dreimal täglich 5 Stück.
Rust.

℞ *Extr. Con. macul.* ʒij,
Hb. Conii ʒβ.
M. f. Pilul. gr. 2.
S. Anfangs dreimal täglich 1 Pille,
und später mehr.

℞ *Extr. Con. macul.* ʒβ,
Aq. Laurocer. ʒβ.
SS. Dreimal täglich 8—10 Tropfen
und mehr.

℞ *Ferri oxydul. fusc.,*
Hb. Calend.
Extr. Calend. āā ʒj.
M. f. c. mucil. *G. mimos. pauxill.*
Pilul. 90. Consp. *Cinnamom.*
S. Dreimal täglich 5—6 Stück.

℞ *Extr. Bellad.* gr. ij,
Aq. Laurocer. ʒij.
S. Täglich dreimal 40—50 Tropf.

℞ *Resin. Guajac.*
As. foetid.
Extr. Con. macul. āā ʒj,
— *Aconiti* ʒβ,
Calomel. gr. xv.
M. f. Pilul. gr. 2. Consp. *Lycop.*
S. Morgens und Abends 5 bis
10 Pillen.

℞ *Ferri carb.* gr. iv,
Elaeosacchar. Macid. ʒβ.
M. f. Pulv. dent. tal. dos. 12.
S. Täglich viermal 1 Pulver.
Rust.

℞ *Elixir. acid. Haller.* ʒij,
Aq. Lauroceras. ʒj.
MS. Dreimal täglich 25—40 Tropf.
in einer Tasse Wasser-
Most.

℞ *Trae Jodi* ʒij.
S. Morgens und Abends 10 Tropf.
Hannemann.

℞ *Morph. acetic.* gr. iv,
Ungt. Hydr. ciner.
— *simpl.* āā ʒij.
M. f. Ungt.
S. Zweimal täglich in die Schaam-
gegend eine Erbse groß ein-
zureiben.
v. Hildenbrand.

℞ *Jodi puri* gr. $\frac{1}{4}$ —j—j $\frac{1}{4}$,
Kali hydriod. gr. iβ—ij—ijβ,
Aq. dest. ʒviij.
SS. Täglich $\frac{2}{3}$ zu verbrauchen,
später die ganze Portion.
Lugol.

℞ *Jodi* ʒj,
Kali hydriod. ʒij,
Aq. dest. ʒviij.

SS. 6 Tropfen früh und Nachmittags in einem Glase Zuckerwasser, wöchentlich um 2 Tropfen bis auf 30 zu steigen.
Lugol.

℞ *Auri oxyd.* gr. j—ij.
S. Mit Speichel in die großen Schaamlefzen einzureiben.
Westring.

℞ *Decoct. Alth.* ʒviij,
Acidi hydrocyanici (Vauq.)
gutt. xxx.
MS. Zum Einspritzen.
Brera.

℞ *Acid. hydrocyan.* (Magend.)
ʒiij—ʒβ,
Aq. Lactuc. ʒ j.
MS. Umgeschüttelt zum Waschen oder Einspritzen.
Magendie.

℞ *Auri chlor. natronati*
gr. iij—iv,
Axung. porc. ʒβ.
M. exactissime f. Ungt.
S. Salbe. Grötzner.

℞ *Auri chlorat. natron.*
gr. xv—xx,
Caerat. spl. ʒβ.
M. exactissime.
S. Zum Einreiben.
L. W. Sachs.

℞ *Hb. Belladonnae* ʒj,
Ebull. c. *Aq. font.* q. s.
ad Colat. ʒ ij.
cui refr. adde
Aq. Lauroceras. ʒiij.
MS. Viermal täglich einzuspritz.
Brera.

H y d r o p s o v a r i i.

℞ *Kali hydriod.* ʒj,
Aq. dest. ʒj.
SS. Täglich dreimal 15, allmählig bis 25 Tropfen zu nehmen.
Elliotson.

℞ *Ungt. Hydrarg. ciner.* ʒij,
Jodi ʒiij.
M. f. Ungt.
S. Zum Einreiben.
Jahn.

H y p e r t r o p h i e d e r O v a r i e n.

℞ *Carbon. animal.* ʒj,
Ferri subcarb.
Sacchar. alb. āā ʒij.
M. f. Pulv. divid. in 10 part. aeq.
S. Täglich drei bis viermal
1 Pulver in steigender Gabe.
Clarus.

Schmerzhafte Anschwellung der Brüste und Milchknoten.

℞ *Extr. Belladonn.* ʒij,
Aq. Lauroceras. ʒij,
Aeth. sulph. ʒj.

MS. Die umgeschüttelte Flüssigkeit zweimal in die Brust bis zur Achselhöhle einzureiben.
Ranque.

℞ *Sal. Ammon. dep.*
Sapon. hisp.
Hb. Hyoscyam. āā ʒβ,
Semin. Lin. cont. ʒiβ.
Aq. ferv. q. s.
u. f. Cataplasma.

S. Zu Umschlägen.
Vogler.

℞ *Extr. Con. macul.* ʒj,
— *Hyoscyam.* ʒβ,
Pulv. Hb. Bellad. ʒj,
Liq. Ammon. acetic. q. s.
u. f. Catapl. tenue.

S. Die Hälfte auf Leder gestrichen aufzulegen.
Richter.

℞ *Empl. Cicut.*
— *Hyoscyam.*
— *Mercur.* āā ʒij,
— *diachyl. e. Gummi* ʒij.
M. f. Emplastr.

S. Auf die Brüste zu legen.
Most.

℞ *Resin. Elem.* ʒij,
Cerae alb. ʒj.
Len. ign. liquefact.
admisce

Extr. Bellad. spirit. ʒix.
S. Pflaster. Planche.

℞ *Spermat. Cet.* ʒj,
Cerae alb. ʒij,
Galban. ʒβ,
Olei Samb. q. s.
u. f. Emplastr.

S. Warm aufzulegen.
Bate.

℞ *Sev. cervini*
Cerae alb.
Spermat. Ceti āā ʒβ,
Olei amygd. dulc. ʒiβ.
M. f. l. a. Ceratum.

S. Als Pflaster auf die Brüste zu legen.
Most.

℞ *Ammon. muriat. pulv.* ʒj,
Trae spir. Ror. mar. ʒj.
SS. Lauwarme Compressen damit zu befeuchten.
Brera.

℞ *Ammon. muriat.* ʒβ,
Spirit. frument. ʒij,
Aq. font. ʒxvj — xx.
SS. Mittelst Compressen die Brüste zu bähnen.
Vogler.

℞ *Rad. Bryon.* ʒij,
Flor. Sambuc. ʒj,
Gummi Ammoniac. ʒβ,
Ammon. mur. crud. ʒij,
Hb. Conii macul. ʒij,
Acet. crud. q. s.
u. f. coquend. Cataplasma.
S. Auf die Geschwulst zu legen.
Plenk.

Scirrhus et Carcinoma Mammae.

℞ *Calomel.* gr. vj,
Extr. Cicut. ʒβ,
— *Hyoscyam.* ʒj,
Pulv. Rad. Rhei ʒβ.
M. f. Pilul. 30.

R. Dreistündlich 1 Stück.
Thaer.

℞ *Extr. Calend.*
— *Cicut.*
Ferri oxydat. fusc. āā ʒij,
Pulv. Hb. et Flor. Cal. ʒiβ.
M. f. Pilul. gr. 2. Consp. *Lycop.*
S. Dreimal täglich 5 Stück.
Rust.

℞ *Sapon. venet.* ʒβ,
Extr. Cicut. ʒij,
Aethiop. antimonial. ʒj,
Fell. Tauri inspiss. ʒβ.
M. f. Pilul. gr. 2. Consp. *Lycop.*
S. Täglich drei- bis viermal 8
bis 10 Pillen.
Pezold.

℞ *Ferri jodat.* ʒj,
Natr. bromat. ʒβ,
Extr. Liquir. q. s.
u. f. Pilul. gr. 2. Consp. *Lycop.*
S. Früh und Abends 1—3 Pillen.

℞ *Jodi* ʒj,
Kali hydriodici ʒij,
Aq. destill. ʒvij.
SS. Sechs Tropfen früh u. Abends
in 1 Glase Zuckerwasser.
Lugol.

℞ *Calomel.* ʒβ,
Sulphur. stib. aurant. ʒj,
Extr. Calendul.
— *Conii macul.* āā ʒij.
M. f. Pilul. gr. 2. Consp. *Lycop.*
S. Dreimal täglich 5 Stück.
Rust.

℞ *Extr. Con. macul.* ʒij,
Hb. Conii ʒβ.
M. f. Pilul. gr. 2. Consp. *Lycop.*
S. Anfangs dreimal täglich 1 Pille-
später mehr.
Berends.

℞ *Extr. Cicut.* ʒβ,
Aq. Lauroceras. ʒβ.
SS. Dreimal täglich 8—16 und
mehr Tropfen.

℞ *Ferri bromat.* ʒi,
Extr. Liquir. q. s.
u. f. Pilul. 60.
S. Früh und Abends 1—2 Pillen.
Werneck.

℞ *Extr. Bellad.* gr. ij,
Aq. Laurocer. ʒij.
SS. Täglich dreimal 40—50 Trpf.

℞ *Carb. animal.* gr. ij—iij,
Pulv. Rad. Liquir. ʒβ.
M. f. Pulv. dent. tal. dos. 6.
S. Morgens und Abends 1 Pulv.
Weise.

℞ *Cinnabar. fact.* ʒij,
Ciner. solear. ustar. gr. viij,
Sang. Dracon. gr. xij,
Arsenic. alb. gr. 40.
M. f. Pulv. subtiliss.
S. Mit Speichel gemischt anzu-
wenden.
Das Côme'sche Mittel.

℞ (A) *Cinnab. fact.* ʒβ,
Ciner. solear. vetust. gr. iij,
Sang. Dracon. gr. iv,
Arsenic. alb. ʒβ.
M. f. Pulv. subtiliss.
S. *Pulvis arsenicalis.*

℞ (B) *Bals. indic. nigr.*
Extr. Con. macul. āā ʒj,
Plumb. acetic. ʒj,
Tinct. Opii crocat. ʒβ,
Ungt. cerei ʒj.
 M. f. Ungt.

S. *Ungt. narcotico-halsamic.*
 (Von A werden 2 Gran mit
 ʒj der Salbe gemischt, damit
 Charpie bestrichen und das Ge-
 schwür bis 2 Linien über seinen
 Rand hinaus bedeckt.)
 Hellmund.

℞ *Extr. Calend.*
 — *Con. macul.* āā ʒiij,
Aq. Lauroceras. ʒij,
Trae Opii simpl. ʒβ.

MS. Mittelst Charpie auf die of-
 fene Stelle zu legen.
 Rust.

℞ *Hydr. mur. corros.* gr. ij—iv,
Aq. Lauroceras. ʒij.
 SS. Zum Verbande.
 Horn.

℞ *Succ. rec. express. Calen-*
dul. ʒj—iβ,
Butyr. rec. insuls. ʒj.
 M. f. Ungt.

S. Täglich dreimal damit zu ver-
 binden. Stein.

℞ *Flor. Calendul.* ʒiij,
Coq. c. Aq. font. ʒv,
 ad remanent. ʒiij.
Colatur. adde
Extr. Calendul. ʒj,
Picis liquid. ʒij,
Acid. lign. ʒβ,
Gummi mimos. q. s.

MS. Zum Verbande.
 Knod. v. Helmenstreit.

℞ *Extr. Con. macul.* ʒj,
 — *Hyoscyam.* ʒβ,
Pulv. Hb. Bellad. ʒj,
Liq. Ammon. acetic. q. s.
 u. f. Catapl. tenue.

S. Die Hälfte auf Leder ge-
 strichen aufzulegen.
 A. G. Richter.

℞ *Flor. Calend.*
Hb. —
 — *Conii mac.* āā ʒj.
 Inf. c. *Aq. ferv.* q. s.
 dig. per ½ hor. vase clauso
 Colat. ʒ. ij. adde
Liquor. Ferri muriatic. ʒβ,
Aq. Lauroceras. ʒvj.
 MS. Mittelst Lämpchen aufzulegen.

Abortus (s. auch Metrorrhagie).

Die Behandlung der Frühgeburt ist nach den ver-
 schiedenen Ursachen einzuleiten. Wo das Absterben
 der Frühgeburt vorhergegangen ist, ist eine nur pas-
 sive Behandlung erforderlich; bei Frühgeburten durch
 gewaltsame Trennung der Placenta ist die Berücksich-
 tigung der Blutung der wichtigste Gegenstand der
 Behandlung (s. Metrorrhagie). Was endlich die Be-

handlung der Frühgeburten durch zu zeitig erwachende Contractionen betrifft, so ist hier die strengste geistige und körperliche Ruhe und die Anwendung von Mitteln, die den Erethismus im Gefäß- und Nervensystem mindern (namentlich kleine Gaben Opium) angezeigt und anzuempfehlen.

℞ *Castor.* gr. xvij,
Kali nitric. depur. ʒβ—j,
Sacchar. alb. ʒj.
 M. f. Pulv. divid. in 6 part.
 S. Dreistündlich 1 Pulver in
 Haferschleim.
 Berends.

℞ *Rad. Ipecacuanh.* gr. ij—iv,
Sacchar. alb. ʒj.
 M. f. Pulv. divid. in 4 part.
 S. Alle Stunde 1 Eßlöffel.
 Ribke.

℞ *Plumb. oxydat. acet.* gr. xvj,
Tinct. Opii ʒj,
Acid. acet. dilut. ʒij,
Aq. destill. ʒij.
 MS. Vierstündlich 1 Eßlöffel.
 Laidlaw.

℞ *Opii* gr. ʒ,
Nitr. depur. gr. iij,
Sacchar. alb. ʒβ.
 M. f. Pulv.
 S. ¼—½stündlich 1 Pulver.
 Weikard.

℞ *Chinin. sulphuric.* gr. x—xv,
Acid. phosphor. sicc. ʒij,
Pulv. Rad. Rhei ʒiv,
Extr. Cent. minor. ʒij.
 M. f. Pilul. 60. Consp. *Cinnam.*
 S. Täglich zwei- bis dreimal 3,
 4—6 Stück.
 Radius.

Wehen (*dolores ad partum*).

1) Zu heftige Wehen.

Man entferne die Ursachen, reibe am Muttermunde Opiatsalben und *Ol. Hyoscyam.* ein, lasse bei Vollblütigkeit zur Ader, gebe innerlich etwas *Liquor anodynus*, *Tinct. Thebaic.* etc.

℞ *Opii puri* gr. β,
Nitr. depur. gr. v—viiij.
 M. f. Pulv. disp. tal. dos. 6.
 S. ¼—½stündlich 1 Pulver.
 Wigand.

℞ *Tinct. Castor.* ʒj,
 — *Thebaic.* ʒβ.
 MS. ½—2stündlich 15 Tropfen.
 Mapps.

℞ *Tart. depurat.*
Nitr. depur. āā ʒj,
Opii pur. ʒij,
Aq. font. ʒiiij,
Syrup. Papav. alb. ʒij.
 MS. Stündlich 1 Eßlöffel.
 Vogler.

℞ *Opii puriss.* gr. ij,
Rad. Ipecacuanh. gr. j,
Sacchar. alb. ʒviiiij.
 f. Pulv. divid. in 8 part. aequal.
 S. ½ stündlich 1 Pulver mit Chamillentheee und 15 Tropfen
Liq. anodyn. Most.

℞ *Extr. Belladonn.* gr. vj,
Ungt. rosat. ʒβ.
 MS. ¼ — ½ stündlich 1 Bohne grofs
 einzureiben. Mandt.

℞ *Extr. Belladonn.* ʒij,
 Dilue c. aequal. quantit.
Aq. destill.
 dein admisce
Axung. porc. dep. ʒj.
 MS. Wie das vorige.
 Chaussier.

℞ *Ol. Hyoscyam.*
 — *Papav. alb.* āā ʒβ,
Spir. Sal. Ammoniac.
Liq. C. C. succinic.
Laud. liquid. Sydenham. āā ʒij.
 M. f. Liniment.
 S. Alle Stunde 1 Kaffeelöffel
 einzureiben.

2) N a c h w e h e n .

Sind keine Verletzungen (Zerreissen des Dammes, unterdrückte Lochien etc.) Ursache, so gebe man *Antispasmodica*, *Opium*, *Ipecacuanha*, *Liq. C. C. succ.* und Sorge für Warmhalten und Beförderung der Diaphorese.

℞ *Acid. hydrocyan.* gutt. ij,
Syrup. simpl. ʒij.
 MS. Anderthalbstündlich 1 Theelöffel.
 v. dem Busch.

℞ *Tinct. Castor.* ʒj,
 — *Thebaic.* ʒβ.
 MS. Alle halbe bis zwei Stunden
 15 Tropfen. Mappes.

℞ *Castor.* gr. iij,
Rad. Valerian.
Sacchar. alb. āā ʒj.
 M. f. Pulv. dent. tal. dos. 4.
 S. Vierstündlich 1 Pulver.
 Richter.

℞ *Tinct. Opii s.* gutt. xx,
Spir. nitr.-aether. ʒj,
Aq. Flor. Aurant. ʒvj.
 MS. Zweistündlich 1 Eßlöffel.
 Formey.

℞ *Liq. C. C. succin.*
 — *anodyn.*
Tinct. Castor. āā ʒj.
 MS. Halbstündlich 15—20 Tropfen im Chamillentheee.
 Most.

3) Z u s c h w a c h e W e h e n .

Hier muß mau durch zweckmäßige dynamische Verstärkung der Geburtsthätigkeit zu wirken suchen.

Es geschieht dies durch die den Uterus erregenden Mittel, namentlich durch *Inf. Cort. Cinnamom.*, *Meliss.* mit etwas Wein, *Secale Cornutum*, *Tinct. Cinnamom.*, *Borax*, Einreibungen von flüchtigem Lini-
mente etc.

℞ *Borac.* ʒj,
Croci ʒβ,
Ol. Cass. Cinnam. gutt. ij.
M. f. Pulv. divid. in 2 partes.
S. Stündlich 1 Pulver.
Wedel.

℞ *Borac.* gr. xv—xx,
Nitr. depur. gr. iv—v,
Elaeosacch. Foenicul. gr. x.
M. f. Pulv. dent. tal. dos. 8.
MS. Alle anderthalb Stunden
1 Pulver, bis sie verbraucht
sind; ist dann noch keine
Wirkung erfolgt, macht man
eine Pause von 3—6 Stunden,
und giebt dann erst wieder
von Neuem. Mehr als 6 Pul-
ver sind nie nöthig, meist aber
schon 2 bis 3 hinreichend.
Wigand.

℞ *Secal. cornut. cont.* ʒβ,
inf. Alcohol. Vin. ʒvj.
Stent. in digestionem per quadri-
dium, tunc liquor coletur et
servetur.
S. Kaffeelöffelweise.
Carus.

℞ *Cort. Chin. reg.*
Rad. Valerian. āā ʒij.
Coq. c. *Aq. font.* s. q.
Colatur. ʒvj
adde
Naphthae Vitriol. ʒij,
Tinct. Cinnam. ʒj.
MS. Ein- bis zweistündlich 1 bis
1½ Eßlöffel.
Wigand.

℞ *Secal. cornut. pulv.* ʒβ,
Sacchar. alb. ʒij,
Aq. Cinnam. ʒj.
MS. Wohl umgeschüttelt auf
drei Male von 10 zu 10 Minu-
ten zu nehmen. Devees.

℞ *Secal. cornut.* ʒj,
Coq. c. *Aq. font.* ad ʒvj,
Syrup. rub. Idaei ʒβ.
MS. Auf dreimal in einer Zeit
von 1½ Stunden zu nehmen.
Prescot. Schneider.

℞ *Secal. cornut.* gr. vj—ʒβ,
Opii gr. ¼—½.
Sacch. alb. ʒβ.
M. f. Pulv. dent. tal. dos. 4.
S. Alle zwei Stunden 1 Pulver
in etwas Wein. Atlee.

Enuresis der Wöchnerinnen.

℞ *Pulv. Canthar.* gr. iij,
Camphor. trit. ʒβ,
Sapon. venet. ʒj.
M. f. l. a. Pilul. 40. Consp. *Pulv.*
Cinnamom.
S. Täglich 3 Pillen.
v. Siebold.

℞ *Alumin.* gr. x,
Gummi arab. ʒβ.
M. f. Pulv. dent. tal. dos. 6.
S. Viermal täglich 1 Pulver.
Selle.

℞ *Inf. Lact. viros.* ℥iij,
Tinct. Rhei aquos. ℥j,
Extr. Quassiae ℥β,
Tinct. Canthar. ℥j,
 — *Guajac. volat.* ℥ij,
Roob Juniper. ℥ij.

MS. Zweistündlich 1 Eßlöffel in
 einer halben Tasse Wachholder-
 thee. Oesterlein.

℞ *Liq. nerv. Teerbom.* ℥iij,
Tinct. Cantharid. ℥j.

MS. Auf das Kreuz und Mittel-
 fleisch einzureiben.

Lentin.

℞ *Pulv. Canthar. subt. pulv.* ℥j,
Ferri pulverat. ℥ij,
Succ. Liquirit. ℥j.

M. f. Pilul. gr. 1. Consp. *Lycop.*
 S. Täglich viermal 3—4 Stück.
 Meissner.

℞ *Ol. Lavandul.*
Ol. Macid. destillat. āā ℥ij,
Butyr. Cacao ℥j.

MS. Zum Einreiben in die Blasen-
 gegend. Bluff.

℞ *Tinct. Canthar.*
Bals. Peruvian. āā ℥iij.

MS. Täglich viermal 24 Tropfen
 in Wein zu nehmen.

Kopp.

℞ *Hb. Sabin.* ℥ij,
 inf. *Aq. fervid.* ℥v.

Stent. in digest. per $\frac{1}{4}$ hor.
 Colatur. adde

Camphor. trit. gr. ij—vj.

S. Stündlich 1 Eßlöffel.

Horn.

Wunde Brustwarzen.

℞ *Hb. Salviae* ℥ij,
 inf. c. *Aq. font.* q. s.
 Colatur. ℥ij.
 adde

Syrup. nigr. domestic. ℥j.

MS. Ein Leinwandlappchen da-
 mit zu befeuchten und auf die
 Brustwarzen zu legen.

Kluge.

℞ *Sem. Lycopod.*
Flor. Zinc. āā ℥β,
Ungt. rosal. ℥j.

M. f. Ungt.

S. Zum Bestreichen.

℞ *Ol. Cacao* ℥iij,
Bals. peruv. ℥j.

MS. Zum Bepinseln.

M. J. Schmidt.

℞ *Bals. peruv.* ℥j,
 tere c. *Vitell. Ov.* j.
 adde

Spirit. Serpylli ℥iij.

MS. Ungeschüttelt die Warzen
 damit zu bestreichen und dann
 mit folgendem Pulver zu be-
 streuen:

℞ *Pulv. Cort. Chin.* ℥j,
 — *G. arabic.* ℥ij.

M. f. Pulv. subtiliss.

Jörg.

℞ *Gall. turc.* ℥vj,
 inf. c. *Vin. alb.* ℥vj.

Stent. p. 24 hor. in digest. leni.

S. Dreimal täglich eine damit
 befeuchtete Compresse aufzule-
 gen und eine trockene darüber
 zu legen. Vom 6. Monate der
 Schwangerschaft an.

(Vorbeugung gegen schmerzhaft
 e Warzen.) Strahl.

℞ *Ostr. praep.* ʒj,
Gummi arabic. ʒij,
Mastich. elect. ʒj.
M. f. Pulv. subtil.
S. Zum Bestreuen. Vogler.

℞ *Gummi arabic.* ʒij,
Balsam. peruv. ʒj,
Ol. Amygd. ʒiβ,
Aq. Rosar. ʒj.
MS. Zum Waschen. Müller.

℞ *Balsam. indic. nigr.* ʒj,
Vitell. Ov. ij,
Spirit. Lavandul. ʒij.
MS. Zum Bepinseln. Jörg.

℞ *Borac.* ʒj,
Vitell. Ovor.
Album. Ovor. āā ʒij—iiij,
Ol. Amygd. rec. ʒj,
Bals. peruv. ʒiβ—ij.
MS. Täglich drei- bis viermal
etwas einzureiben. Harlefs.

℞ *Balsam. nigr.* ʒβ,
Butyr. Cacao ʒij.
MS. Dünn auf ein feines Stückchen
Leinwand zu schmieren und
aufzulegen. Ribke.

℞ *Mercur. subl. corrosiv.*
gr. ij—iiij.
Aq. Rosar. ʒj.
MS. Lauwarm mit einem leinenen
Läppchen aufzulegen, und
vor dem Saugen mit Milch
oder Wasser abzuwaschen.
v. Wedekind.

℞ *Bals. peruv.*
Tinct. Thebaic.
Butyr. de Cacao. āā ʒiβ.
MS. Mit Charpie aufzulegen.
Mappes.

℞ *Alumin. depur.* ʒj—ij,
Gummi arabic. ʒβ,
M. f. Pulv. subtiliss.
S. Streupulver. Vogt.

℞ *Extr. Opii aquos.* gr. j,
Aq. Calc. ust.
Ol. Amygd. dulc. āā ʒiij.
MS. Oefsters aufzustreichen.
Sibergandi.

Sterilität. Unfruchtbarkeit.

℞ *Pulv. Sabin.* ʒiij,
Extr. — ʒij,
— *Liquirit.* ʒβ.
M. f. Pilul. 150. Consp. *Pulv.*
Rad. Alth.
S. Zweistündlich 3 Stück.
Gegen Unfruchtbarkeit der
Frauen in Folge vorhandenen
Torpor der Geschlechtstheile
oder Mangels an Geschlechtslust.
Bisweilen wurden der Masse 12
bis 15 Tropfen *Ol. Sabin.* zuge-
setzt. Kopp.

℞ *Pulv. Sabin.* ʒβ,
Ferri oxydulat. ʒiβ,
Ol. Sabin. gutt. xxx,
Extr. Sabin.
— *Liquir.* āā ʒij.
M. f. Pilul. 200. Consp. *Lycop.*
D. ad vitr.
S. Um 10, 4 und 6 Uhr und vor
dem Schlafengehen jedesmal
7 Stück.
(Gegen höhere Grade der
vorerwähnten Zustände.) Kopp.

N y m p h o m a n i e.

℞ *Aq. Lauroceras.*
— *Saturn. Goulard.* āā ℥ij,
— *Rosar.* ℥ij.
MS. Zum Waschen und Befeuch-
tung der Compresse.
Liquor. anterethist. Hufeland.

Das Waschen und Fomentiren der Geschlechtstheile mit diesem Liquor muß lange fortgesetzt werden. Auch ist ein Zusatz von einigen Unzen Weinessig sehr zweckmäsig.

H y s t e r i e.

Bei der Behandlung der Hysterie verdienen namentlich 2 Punkte eine besondere Berücksichtigung; 1) Feststellung einer zweckmäßigen Lebensordnung und Diät; 2) Vermeidung einer bloß symptomatischen und palliativen Behandlung. Es ist zuweilen die Krankheit zwar eine bloße Kette von Symptomen aufgeregter Sensibilität, allein das Bedingende derselben ist vielmehr die Störung der Reproduction, und es gebührt daher der Digestion und Sanguification die erste Rücksicht bei der Behandlung. Finden sich daher, wie dies häufig der Fall ist, in Folge früherer scrophulöser Zustände, Auftreibungen der Unterleibsgeweide, verschleimter Zustand des Darmkanals, fehlerhafte Gallenbereitung, Obstruction etc., so muß durch zweckmäßige Anwendung resolvirender Mittel, des *Extr. Tarax.*, *Sapon.*, *Chelidon.*, der Mittelsalze mit *Rheum*, der *Antimonialien* etc. zunächst der Beseitigung der abnormen Zustände des Darmkanals Zweck der Behandlung sein. Gleichermassen kann aber auch das Gefäßsystem selbst Sitz der Krankheit sein; die Blutbereitung ist bei Hysterischen oft sehr reichlich, das Blut dick, es zeigen sich Congestionen nach Brust und Hirn etc. Hier muß nun das Heilverfahren zunächst gegen die Abnormitäten des Gefäßsystems gerichtet sein. Dazu dienen mäsig Blutentziehungen, wenig nährnde, mehr vegetabilische Diät, reichliches säuerliches Getränk, hinlängliche Bewegung, öftere blande Abführungen, Gebrauch von Mineralwässern. Liegen den Störungen der Reproduction krankhafte

Zustände der Geschlechtsfunctionen zu Grunde, so müssen auch diese ihrer Natur nach behandelt werden. Erst nachdem man alle diese Rücksichten genommen, ist ein auf Minderung der Symptome allein hinzielendes Verfahren zulässig.

℞ *As. foetid.* ℥ij,
Ammon. carb. pyr.-oleos.
Castor. āā ℥β,
Opii gr. vj.
 M. f. Pilul. gr. 2. Consp. *Lycop.*
 S. Täglich zwei bis dreimal
 10 Stück. *Rosenstein.*

℞ *As. foetid.* ℥β.
 solve in
Liq. Ammon. acetic. ℥j.
 DS. Täglich viermal 40 bis 50
 Tropfen. *Clarus.*

℞ *Semin. Citr.* ℥ij,
Aq. font. v. j.
 f. l. a. Emulsio. Colatur. adde
Sacchar. alb. ℥ij.
 MS. Alle 2 Stunden eine halbe
 Tasse. *v. Hildenbrand.*

℞ *Galban.*
Sapon. medic. āā ℥ij.
 M. f. Pilul. gr. 2. Consp. *Lycop.*
 S. Täglich zweimal 6 — 10 Stück.

℞ *Infus. Rad. Valerian.*
 (ex ℥ij) ℥vj,
Liq. Ammon. carb. aquos. ℥j,
Syrup. Althaeae ℥β.
 MS. Alle Stunde 1 Eßlöffel voll.
 Schubarth.

℞ *Fol. Senn.* ℥iβ,
Summitat. Millefol. ℥iij,
Sem. Carv. cont. ℥ij.
 inf. *Aq. fervid.* q. s. ad Colat. ℥iij.
Natr. phosphor.
Syrup. mannat. āā ℥β.
 MS. Die Hälfte auf einmal, dann
 stündlich 1 Löffel bis zur Wir-
 kung. *Sundelin.*

℞ *Infus. Flor. Arnic.* (e ℥iij) ℥vj.
 S. Zum Bähnen.
 (Gegent hysterische Verschlie-
 fsung der Augenlider.)
 Bär.

℞ *Castor. pulv.* gr. xv,
Myrrhae
Galban. dep. āā ℥β,
As. foetid. ℥j.
 M. f. c. *Tinct. Valerian.* q. s.
 Pilul. gr. 2.
 S. Dreimal täglich 3 — 8 Stück.
 (*Sydenham's* antihysterische
 Pillen.)

℞ *As. foetid.* ℥ij.
 tere c.
Decoct. cap. Papav. v. j.
 Colatur.
 S. Zu vier Klystiren.

℞ *Ferri muriatici*
Aloës
Extr. Marub. āā ℥β,
As. foetid. ℥iβ.
 M. f. Pilul. gr. 2. Consp. *Lycop.*
 S. Täglich dreimal 4 — 3 Stück.
 Whytt.

℞ *Lactucarii* ℥j,
Mucil. Gummi mimos. q. s.
 ad subact.
 Perfecete unitis affunde
Aq. font. ℥vj,
Syrup. rub. Idaei ℥β.
 MS. Alle 2 Stunden 2 Eßlöffel.
 v. Hildenbrand.

℞ *Rad. Valerian.*
 — *Caryophyllat.*
Hb. Menth. pip.
Fol. Aurant. āā ℥vj.
 C. MS. Auf 1 — 2 Eßlöffel 2 — 3
 Tassen kochendes Wasser ge-

gossen, die Nacht hindurch zuge-
deckt stehen gelassen, abge-
seht, und früh und Abends die
Hälfte kalt getrunken.
Hufeland.

℞ *As. foetid. dep.*
Pulv. Rad. Valerian. āā ʒij,
Ol. Valerian. gutt. x,
Extr. Valerian. q. s.
u. f. Pilul. 120.
S. Dreimal täglich 8—10 Stück.
Schubarth.

℞ *Rad. Rhei*
Magnes. carb. āā gr. xxiv,
Castor. gr. vj.
M. f. Pulv.
DS. Auf Einmal.
(Bei hysterischen Anfällen
von Magensäure.)
Richter.

℞ *As. foetid.* ʒij,
Castor. ʒβ,
Extr. Chamomill. q. s.
u. f. Pilul. 120.
S. Alle 3 Stunden 10 Pilleu.
Schubarth.

℞ *As. foetid.* ʒβ,
Liq. Ammon. acetic.
Syrup. Croci āā ʒiij,
Aq. Ment. pip. ʒiβ.
MS. In zwei Hälften.
(Die zweite eine halbe Stunde
nach der ersten zu nehmen.)
Richter.

℞ *Spirit. matrical.* ʒiij,
Trae As. foetid.,
Trae Opii simpl. āā ʒβ.
MDS. Auf die Herzgrube einzu-
reiben.
Richter.

℞ *Trae Valerian. aeth.* ʒij,
Extr. Hyoscyam. ʒj.
MS. Alle Stunden 15 Tropfen mit
Pfeffermünzthee.

℞ *Gummi Galban.* ʒj,
— *Asae foetid.* ʒiβ,
— *Myrrhae* ʒvj,
Rad. Valerian. ʒij,
— *Angelic.* ʒβ,
— *Zedariae* ʒij,
Hb. Ment. pip. ʒiβ,
— *Serpylli*
Flor. Chamomill.
Semin. Cumin. āā ʒj,
Castor. Moscov. ʒj.
C. C. infunde c. *Spir. Vin.*
rectificatissimi ℥ iβ.
Stent. in vase bene clauso per
2½ hor.
Tunc adde
Aq. font. q. s.
u. f. Colatur. ℥ iij.
Serva in vitro bene clauso.
DS. Täglich viermal 60—80
Tropfen auf Zucker zu nehmen.
Heim.

℞ *Elect. e Senn.* ʒvj—x,
Acid. tart. ʒij,
Sacchar. alb. ʒj,
Aq. Flor. Aurant. ʒij,
Aether. sulphuric. ʒβ.
MS. Alle 1—2 Stunden 1 Efs-
löffel bis zur Wirkung.
(Gegen Hysterie mit Ver-
stopfung.)
Richter.

℞ *Spirit. nitr. dulc.*
Trae Thebaic. āā ʒij.
DS. Alle zwei Stunden 20—25
Tropfen.
Stark.

℞ *Extr. Hyoscyam.* ʒj,
solve in
Liq. Ammon. succinic. ʒj.
MS. Zu 16 Tropfen und mehr.
Richter.

℞ *Trae Rhei aq.* ʒj,
Elix. visceral. Hoffm.
Trae Cort. Aurant. āā ʒβ,
— *Castorei,*
Naphthae Vitriol. āā ʒj.
MDS. Alle drei Stunden 1 Thee-
löffel.
Bode.

℞

MD
o

℞

MD
S.
g

℞

MD

℞

MD

Ge
Hi
mi
Be
Pu

℞

M
S.
I

℞ *Ol. Hyoscyam.*
 — *Chamomill. coct.* āā ʒiβ,
Liq. Ammon. carb.
 — *C. C. succinic.*
Trae Opii croc. āā ʒij,
Ol. succin. ʒj,
 — *Menth. pip.* ʒβ.
 MDS. Einen Eßlöffel in den Bauch
 oder die Herzgrube einzureiben.
 Richter.

℞ *Carbonei sulphural.* ʒij,
Aether. sulphuric. ʒj.
 MD. ad. vitr. bene clausum.
 S. Tropfenweise auf Zucker zu
 geben. Lampadius.

℞ *Tinct. Rhei aquos.* ʒijj,
 — *Castor.* ʒij,
Syrup. Mann. ʒj,
Spirit. sulphur.-aether. ʒβ.
 MDS. Eßlöffelweise. Wie vorher.
 Richter.

℞ *Tinct. Castor.*
Spirit. sulphur.-aeth. āā ʒij.
 MDS. Im Anfall zu 60 Tropfen.
 Richter.

℞ *Castor. gr.* x,
Tinct. Opii crocat. gutt. xx,
Aq. Menth. pip. ʒijj,
Syrup. Chamomill. ʒijj.
 MDS. Alle Viertelstunde 1 Eßs-
 löffel. Richter.

℞ *Rad. Valerian.* ʒj,
Cort. Chin. fusc. ʒij,
Sal. C. C. ʒj,
Syrup. Croci. q. s.
 u. f. l. a. Elect.
 S. Theelöffelweise.
 (Gegen hysterisches Kopfweh,
 Migräne.) Grant.

℞ *As. foetid. in Vitell. Ov. so-*
lut. ʒβ—j,
Infus. Flor. Chamomill. ʒvj.
 MS. Zum Klystir.
 Richter.

℞ *Ol. Valerian. aether.* ʒj,
Aether. acetic. ʒβ.
 MS. Stündlich 10—15 Tropfen.
 Schneider.

Metrorrhagie. Mutter-Blutfluss.

1) Blutfluss der nicht schwangeren Gebärmutter.

A. Metrorrhagia synochica.

Ruhe, horizontale Lage, kühle Luft, säuerliche
 Getränke, *Cremor Tartari* mit *Nitrum*, *Digitalis*,
 Himbeer- oder Zitroneneis, später säuerliche Abführ-
 mittel aus *Pulv. Tamarind.*, *Tart. tartarisat.* etc.
 Bei starken, robusten Personen, mit vollem, hartem
 Pulse etc. Aderlass.

℞ *Opii pur.* gr. ʒ,
Nitr. depurat. gr. iij,
Sacchar. alb. ʒβ.
 M. f. Pulv. dent. tal. dos. 12.
 S. Alle Viertel- bis halbe Stunde
 1 Pulver. Weikard.

℞ *Hb. Digital.* gr. j,
Tart. depurat.
Sacchar. alb. āā ʒβ.
 M. f. Pulv. dent. tal. dos. 12.
 S. Zwei- bis dreimal täglich 1 Pulv.
 mit Wasser. Most.

℞ *Kino* ℥ij,
Fol. Digital. ℥j.
 M. f. Pulv. div. in 10 part.
 S. Alle anderthalb Stunden 1 Pulv.
 Brera's *Pulveres deprimentes et adstringentes.*)

℞ *Aq. Cerasor.* ℥iv,
Tinct. Flor. Papav. ℥β—℥vj,
Syrup. Flor. Papav. ℥vj.
 MS. Stündlich 1 Eßlöffel.
 Vogel.

B. Metrorrhagia erethistica.

Herabstimmung der allgemeinen Blutbewegung und Verminderung der gesteigerten Sensibilität. Bei kräftigen, blutreichen Naturen kleiner Aderlass, dann Säuren mit bittern Extracten, krampfstillenden Zusätzen etc. Aeußerlich aromatische Umschläge auf die Geburtstheile, ähnliche Injectionen in die Vagina, Klystire mit Opium.

℞ *Castor. moscovit.* gr. iv,
Rad. Ipecacuanh. gr. ij,
Opii pur. gr. j,
Elaeosacchar. Cinnam. ℥ij.
 M. f. Pulv. divid. in part. aeq. 12.
 S. Alle Viertel-, halbe, bis eine Stunde 1 Pulver.
 Most.

c. m. f. Spec.
 S. Mit drei Schoppen Brantwein und einem Schoppen Essig wie die vorigen zubereitet.
 Vogt.

℞ *Flor. Lavendul.*
 — *Chamomill.*
Hb. Serpyll.
 — *Menth. crisp.* āā ℥j,
Caryophyllor. aromat. ℥iv.
 c. c. m. f. Spec.

℞ *Extr. Opii aquos.* gr. i—ij,
Vitell. Ov. ij,
Aq. commun. ℥iv.
 MS. Zum Klystir.
 Vogt.

DS. In ein Säckchen lose zu binden und mit einem Maafs Brantwein langsam auf Kohlen zu erwärmen. Sobald der Brantwein die Kräuter gehörig ausgezogen hat und hinlänglich erwärmt ist, werden Flanelltücher in denselben getaucht und warm übergelegt.
 Vogt.

℞ *Tinct. Opii croc.* ℥β—j,
Lact. Vaccin. ℥vj,
Ol. Chamomill. coct. ℥β.
 MS. Zum Klystir.
 Vogt.

℞ *Elixir. acid. Haller.* ℥ij,
Tinct. Opii crocat. ℥β,
Naphthae acetic. ℥j,
Aq. rub. Idaei ℥v,
Syrup. rub. Idaei ℥j.
 MDS. Zweistündl. 1 Eßlöff. voll.
 Vogt.

℞ *Cort. Chin. fusc.* ℥iij,
 — *Cinnamom.*
Hb. Salviae
Caryophyll. aromat. āā ℥β.

℞ *Elix. Vitriol. Mynsicht.* ℥β,
Trae Castor. ℥ij,
 — *Opii crocat.* ℥j.
 MDS. Zu 20—30 Tropfen.
 Richter.

℞ *Aether. acetic.* ʒiβ,
Tinct. Cinnamom. ʒiβ,
Aq. Cinnamom. ʒiij,
Syrup. Cort. Aurant. ʒj.

MDS. Alle Viertelstunde 1 Efs-
 löffel. Schneider.

℞ *Aq. Cerasor. nigr.* ʒiiβ,
Tinct. Cinnamom. ʒβ,
Sal. Absinth. ʒj,
Succ. Citr. rec. express.
Laud. liquid. Sydenh. āā
 gutt. 40.
Syrup. rub. Idaei ʒj.

MDS. Stündlich 1 Efslöffel.

℞ *Acid. phosphor. dilut.* ʒβ,
Aq. Cinnamom. ʒv,
Naphthae Vitriol. ʒij,
Syrup. Papav. rhoead. ʒiβ.

MDS. Zweistündlich 1 Efslöffel.
 Vogt.

℞ *Elixir. acid. Haller.* ʒijβ,
Laud. liquid. Sydenh. ʒβ,
Tinct. Cinnamom. ʒj.

MDS. Alle halbe bis 1 Stunde
 25—50 Tropfen in Schleim.
 Soll spezifisch wirken. Most.

C. Metrorrhagia paralytica.

Sie erfordert Mineralsäuren in grossen Gaben, *Tinct. Cinnamom.*, Naphthen, Kino, Alaun, Ratanha, *Secale cornutum*, *Decoctum Chinae*, Eisen, kräftige Weine etc. Als äussere Mittel sind zu empfehlen: äussere Reibungen des Leibes mit der flachen Hand oder mit geistigen Flüssigkeiten, adstringirende Injectionen, das Tamponiren, die Anwendung der Kälte etc.

℞ *Kino pulv.* ʒiβ,
 tere c.
Aq. destillat. ʒiiiβ,
Spirit. sulphur.-aeth. ʒβ,
Tinct. Cinnamom. ʒj,
Syrup. Cinnamom. ʒβ.

MS. Umgeschüttelt stündlich 1
 Efslöffel.

℞ *Extr. Rad. Ratanh.*
Pulv. Catechu āā ʒβ,
Alumin. dep. gr. iv
Rad. Liquirit. ʒβ.

M. f. Pulv. dent. tal. dos. 1ʒ.
 S. Drei- bis viermal täglich 1
 Pulver. Vogt.

℞ *Alumin.* ʒij.
 solve in
Aq. Menth. piperit. ʒij,
Tinct. Cinnamom. ʒβ,
Syrup. Capit. Papav. ʒj.

MS. Anfangs stündlich, später
 alle 2—3 Stunden 1 Efslöffel.
 Plenck.

℞ *Pulv. Sabin.*
 — *Chin. fusc.* āā ʒiij,
 inf. c. *Aq. fervid.* q. s. ad Co-
 latur. ʒvj.
 adde

Syrup. Cinnamom. ʒj.
 MS. Alle 2 Stunden 1 Efslöffel.
 Kopp.

℞ *Secale cornut. gr.* vj—x,
Sacchar. alb. ʒβ.
 M. f. Pulv. dent. tal. dos. vj.
 S. S. Alle 10 Minuten 1 Pulver.
 Löwenhard.

℞ *Alumin. crud.* ʒj,
Gummi mimos. ʒβ.
 M. f. Pulv. divid. in 4 part. aeq.
 S. Dreistündlich 1 Pulver.
 P. Frank.

℞ *Alumin. crud.*
G. Kino āā gr. v—x.
 M. f. Pulv. Dent. tal. dos. 12.
 MS. Zwei- bis dreistündl. 1 Pulv.

℞ *Opii* gr. iv,
Cort. Cinnamom. ʒj,
Alumin. crud. ʒj.
 M. f. Pulv. d. in 4 part. aeq.
 S. Alle vier Stunden 1 Pulver.
 Jahn.

℞ *HB. Alumin.* ʒj,
Ser. lact. ℥ ij.
 S. v. Tassenweise den Tag über
 zu verbrauchen.

℞ *Sabin.* ʒβ,
Cort. Cinnamom. ʒij.
Inf. Aq. fervid. q. s.
 ad Colatur. ʒvj.
 S. Stündlich 1 Eßlöffel.
 Kopp.

℞ *Secal. cornut.* ʒj.
Coq. e. Aq. font. ad ʒvj.
 adde
Syrup. Rub. Idaei ʒβ.
 MS. Auf dreimal in einer Zeit
 von anderthalb Stunden zu
 nehmen. Prescott.

℞ *Acid. phosphor. pur.* ʒj,
Tinct. Cinnamom. ʒij.
 MS. Stündlich 30 Tropfen in
 Zuckerwasser.
 Burdach.

℞ *Mixtur. sulph.-acid.* ʒj,
Tinct. Opii croc. ʒj,
 — *Cinnamom.* ʒijj.
 MS. Anderthalbstündlich 30—40
 Tropfen mit Haferschleim.
 Jahn.

℞ *Ol. Cinnamom.* gutt. x,
Aether. sulphur. ʒβ.
 MS. Alle halbe bis Viertelstunde
 — 15 Tropfen in Thee oder
 Wein.

℞ *Mixtur. sulphuric.-acid.* ʒj,
Tinct. Opii crocat. ʒj,
 — *Cinnamom.* ʒij.
 MS. Stündlich 20 Tropfen in ver-
 süßstem Haferschleim.
 Richter.

℞ *Bol. armen.*
Rad. Rhei
Magnes. carb. āā ʒj.
 M. f. Pulv. divid. in 12 part. aeq.
 S. Dreimal täglich 1 Pulver.

℞ *Extr. cortic. Salicis* ʒi℥,
Alumin. ʒβ—j,
Aq. Cinnamom. ʒv,
Syrup. Rub. Idaei ʒj.
 MS. Alle halbe Stunde 2 Eß-
 löffel. Osiander.

℞ *Aq. Menth. piperit.*
 — *Meliss.* āā ʒijj,
Trae Cinnamom. ʒ℥,
Lap. haematit. ʒij,
Syrup. Meliss. ʒj.
 MS. Alle Viertelstunde 3 Eßlöffel.
 Van Swieten.

℞ *Rad. Tormentill.*
Cort. Chin. āā gr. j,
Sacchar. alb. ʒβ.
 M. f. Pulv. deut. tal. dos. 12.
 DS. Stündlich 1 Pulver.
 Bergius.

℞ *Ferri ammonat.*
Alumin.
Pulv. aromat.
Extr. Cort. peruv. āā ʒ℥,
Ol. Cinnam. gutt. xij.
 M. f. Pilul. gr. 2. Consp. *Cinnam.*
 D. in vitro.
 S. Früh und Abends 5—10 Stück.
 Formey.

℞ *Plumb. oxyd. acetic.* gr. v,
Opii pur. ꝓβ,
Extr. Millefol.
Rad. Liquirit. āā ꝓβ.
 M. f. Pilul. 60.
 S. Alle 4—6 Stunden 3 Stück.
 Jah n.

℞ *Plumb. oxyd. acetic.* gr. xvj,
Tinct. Opii ꝓj,
Acid. acetic. ꝓij,
Aq. destillat. ꝓij.
 MS. Alle 4 Stunden 1 Eßlöffel.
 Laidlaw.

℞ *Alumin.* ꝓj,
Sacchar. Lact. ꝓβ,
Cinnamom. acut. ꝓij.
 M. f. Pulv. divid. in part. 8.
 S. Täglich 1 Pulver mit 1½ ℥
 Milch bis zum Gerinnen zu
 kochen. Die mit hinreichen-
 dem Zucker versüßte Colatur
 wird kalt zur Hälfte Vormit-
 tags, zur anderen Hälfte Nach-
 mittags getrunken.
 Osiander.

℞ *Ol. Caryophyll.* gutt. x.
 solve in
Aether. sulphur. ꝓj,
 MDS. Alle Viertel- bis halbe
 Stunde 10—15 Tropfen.
 Thilenius.

℞ *Plumb. acet.* gr. vix,
Rad. Alth. pulv.
Extract. Polygal. amar.
 āā ꝓj.
 M. f. Pilul. 60. Consp. *Pulv.*
Semin. Lycopod.
 DS. Dreimal täglich 4 Stück.
 Kopp.

℞ *Limatur. Mart.* ꝓβ,
Rad. Colomb. xiv,
Rad. Rhei
Cort. Cinnamom. āā ꝓij,
Extract. Absinth. q. s.
 n. f. Pilul. gr. 2.
 Consp. *Pulv. Cass. Cinnamom.*
 DS. Drei- bis viermal täglich
 10 Stück. Weikard.

℞ *Rad. Ratanh.* ꝓj,
 coq. c.
Aq. font. ꝓxvj ad Colat. ꝓviij,
 adde
Mixtur. aromatic.-acid. ꝓij,
Syrup. Cinnamom. ꝓj.
 MDS. Zweistündlich 1 Eßlöffel.

℞ *Cortic. Chinin. fusc.* ꝓj.
 coq. c.
Aq. font. s. q. ad Colat. ꝓvj.
 adde
Tinct. sulphur.-acid. ꝓij,
Syrup. Cort. Aurant. ꝓj.
 MDS. Zweistündlich 1 Eßlöffel.

℞ *Cort. adstringent. brasil.* ꝓβ,
 coq. c.
Aq. font. s. q. ad Colat. ꝓviij,
 sub fin. coct. adde
Hb. Sabin. ꝓβ.
 Colatur. refrigerat. adde
Syrup. Cort. Aurant. ꝓj.
 MDS. Zweistündlich 1 Eßlöffel.
 Merrem.

Besonders bei Gebärmutter-
 Blutflüssen in Folge von *Carci-*
noma uteri, gerühmt.

℞ *Alumin. crud.* gr. xv.
 solve in
Aq. Ment. crisp. ꝓiv.
 adde
Tinct. Cinnamom. ꝓij,
Syrup. Cinnamom. ꝓj.
 MDS. Alle viertel- bis halbe
 Stunde 1 Eßlöffel. Rust.

℞ *Alumin. crud.* gr. i—ij,
Cort. Cinnamom.
Cort. Cascarill. āā gr. v—x.
Sacchar. Lact. ꝓβ.
 M. f. Pulv. Dent. tal. Dos. 12.
 S. Zweistündlich 1 Pulver.
 Mursinna.

℞ *Limatur. Mart.*
Sacchar. alb. āā ꝓβ,
Cort. Cinnamom. ꝓj—ij.
 M. f. Pulv.
 DS. Zweimal täglich 40—60
 Gran. Weikard.

R Ferrisulphur. -cryst. ʒβ—ʒj.
solve in

Aq. Salv. ʒiv,
Mucil. Gummi Miwos. ʒβ.

MDS. Zum Einspritzen.
Berends.

R Cort. Cascarill.
Extract. Ligni Campechian.
āā ʒiβ,

Ferri oxydat. fusc. ʒj,
Extract. Gentian. q. s.
u. f. Pilul. gr. 2.

Consp. *Pulv. Cass. Cinnamom.*
DS. Dreimal täglich 5—10 Stück.
Sundelin.

R Gummi Kino ʒβ,
Opii pur. gr. ij,
Elaeosacchar. Cinnam. ʒj.
M. f. Pulv. divid. in part. aeq. 6.
DS. Zweistündlich 1 Pulver.
Sundelin.

R Fol. Uvae Ursi ʒiβ,
Summitat. Millefol. ʒj.
coq. c.
Aq. font. xiiij ad Colat. ʒ. ij.
sub fin. coct. adde
Rad. Liquirit. ʒj,
Colatur. refrigerat. adde
Syrup. Cinnamom. ʒij.

MDS. In zwei Tagen zu ver-
brauchen. Sundelin.

R Ferrisulphur. ʒj,
Extract. Gentian. q. s.
u. f. Pilul. 120. Consp. *Pulv.*
Consp. Cass. Cinnamom.

DS. Zweistündlich 1 Pille und
in 6 Tagen zu 8 Pillen p. d.
steigend. Horn.

R Catechu ʒj,
Alumin. crud. ʒβ
Extract. Gentian. q. s.
u. f. Pilul. gr. 2.

Consp. *Pulv. Cass. Cinnamom.*
DS. Dreistündlich 4 Stück.
Hufeland.

R Lap. haematit. ʒj,
Cort. Cinnamom. ʒj,
Sacchar. alb. ʒij.

M. f. Pulv. Det. ad scatul.
DS. Alle 2 Stunden 1 Theelöffel
mit Kamillentheee. Stark.

R Vitriol. Cupri usti. ʒiv,
Sang. Dracon. ʒi,
Spirit. Vin. rft. ʒxvj.

Digere in vase vitreo clauso in
balneo Arenae per dies 4, agi-
tando aliquoties in die. Liqueur
decantetur.

S. 40—60 Tropfen täglich mit
einer Unze Wasser und 1 Unze
Rothwein zu gebrauchen.
Bischoprick.

R Alumin. crud. ʒj.
solve in
Aq. Rosar. ʒiv.
adde

Opii pur. ʒβ,
Mucil. Gummi Mimos. ʒiij.
MDS. Umgeschüttelt zum Ein-
spritzen. Rust.

R Hb. Sabin. ʒiβ.
coq. c.
Aq. font. s. q. ad Colat. ʒvj.
S. Zum Einspritzen. Kopp.

R Extract. Opii aquos. ʒij.
solve in
Aq. Rosar. ʒviiij,
Acet. plumbic. ʒj,
Mucil. Semin. Cydonior. ʒj.
MDS. Zum Einspritzen.
Richter.

R Cupri sulphur. gr. vj,
Aq. Laurocer. ʒiij,
Mucilag. Gummi Mimos. ʒij.
MDS. Zum Einspritzen.
Formey.

R Rad. Ratanh. ʒj.
coq. c.
Aq. font. ʒ. ij ad Colat. ʒviiij.
Refrigeratae adde

Extract. Ratanh. ʒβ,
Tinct. Catechu
Tinct. Chin. spl. āā ʒiβ.

MDS. Einen länglich runden
Schwamm mit dieser Mixtur
stark befeuchtet in die Scheide

zu bringen und möglichst lange
darin liegen zu lassen.

Kopp.

℞ *Gallar. turric. pulv.* ʒβ.

coq. c.

Aq. font. s. q. ad Colat. ʒviii.

adde

Alumin. crud. ʒij.

MDS. Zum Einspritzen.

Kortum.

℞ *Rad. Tormentill.*

— *Ratanh.*

Cort. Querc. āā ʒβ.

Concis. M. f. Species.

DS. Morgens und Abends den
6. Theil mit 2 Weingläsern Heiß-
wasser gekocht zum Klystir.

Vogt.

℞ *Extract. Chin. fusc.* ʒij,

Extract. Opii gr. xij,

Ol. Sabin. ʒiβ,

Unguent. Hyoscyam. ʒj.

M. exactissimi.

S. Morgens und Abends 2 Kaffee-
löffel voll in den Unterleib zu
reiben.

Kopp.

℞ *Linplastr. aromat.* ʒj,

Ol. Sabin. ʒj,

Pulv. Ib. Sabin. ʒij.

MDS. Auf den Unterleib zu legen.

Kopp.

Krankheiten der Schwangeren und Wöchnerinnen.

1) Krankhafte Zustände in den Verdauungsorganen während der Schwangerschaft.

A. Ueblichkeit, Magenkrampf und Erbrechen.

Bei der Behandlung sind folgende Regeln zu be-
achten: — 1) Man sorge für hinlängliche Unterhaltung
der natürlichen Darmausleerungen durch erweichende
Klystire, blande Abführmittel, Mittelsalze. 2) Man
mache vorzüglich von äußern Heilmitteln Gebrauch,
und vermeide bei Anordnung der inneren zu volumi-
nöse Gaben. 3) Man ordne eine passende Diät an.
4) Wird die Ernährung auf dem gewöhnlichen Wege
ganz unmöglich, so ist zu nährenden Bädern aus Milch
oder Malzdekot, zu Lavements aus Fleischbrühe und
Eigelb zu schreiten.

Im Uebrigen richtet sich das Heilverfahren nach
der verschiedenen Entstehung des Uebels. Bei krank-
haft gesteigerter Sensibilität passen die Antispasmodica
und Nervina, Opium, Hyoscyamus, Valeriana, *Liq. C. C.*
succinic. etc. innerlich und äußerlich, nebenbei Einrei-
bungen von Opiatsalben, Cataplasmen, laue Bäder, Ma-
genpflaster etc. Bei entzündlichen oder plethorischen

Zuständen hingegen wirken Venäsectionen, Blutegel an die Magengegend, gelind abführende Mittelsalze, kühlendes Verhalten, Fußbäder etc. sehr wohlthätig.

℞ *Essent. Ambrae* ʒj,
Elixir. Vitriol. Mynsicht. ʒij.
MS. Drei- bis viermal täglich
20—30 Tropfen. Waiz.

℞ *Nuc. moschat.* gr. iij—iv,
Sacchar. alb. ʒj.
M. f. Pulv. dent. tal. dos. 6.
S. Täglich 3—4 Pulver in Wasser.
Vogel.

℞ *Magist. Bismuth.* gr. ij—iij,
Magnes. alb. gr. iv,
Elaeosacchar. Anisi gr. v,
Rad. Ipecacuanh. gr. ʒ.
M. f. Pulv. dent. tal. dos. 12.
S. Viermal täglich 1 Pulver.
Kopp.

℞ *Ol. Hyoscyam.*
— *Papav. alb.* āā ʒiβ,
Liq. C. C. succinic.
Laud. liquid. Sydenh. āā ʒiij.
M. f. Ungt.
S. Zum Einreiben in die Magen-
gegend. Kämpf.

℞ *Aq. Menth. piperit.*
Tinct. Rhei aquos. āā ʒj,
Trae Thebaic. ʒβ,
Spirit. sulphur.-aether ʒβ.
MS. Zweistündlich 1 Eßlöffel.
Siemerling.

℞ *Opii pulv.* gr. j,
Ol. Amygdal. dulc. ʒj,
Gummi Mimos. pulv. q. s.
u. f. c. *Aq. Flor. Aurant.* ʒiij
l. a. Emulsio.
S. Stündlich 1 Eßlöffel.
Reil.

℞ *Tinct. Opii crocat.*
Aether. acetic. āā ʒj,
Aq. destillat. ʒv,
Syrup. Flor. Aurant. ʒj.
MS. Alle 2—1 Stunde ½—1 Eß-
löffel. Sundelin.

℞ *Tinct. Rhei aquos.* ʒj,
Elixir. visceral. Hoffm.
— *Cort. Aurant.* āā ʒβ,
— *Castor.*
Naphthae Vitriol. āā ʒj.
MS. Alle 3 Stunden 1 Theelöffel.
Bode.

℞ *Tinct. Cort. Aurant.* ʒβ,
— *Castor.* ʒij.
MS. Drei- bis viermal täglich
50 Tropfen in Wasser.
Vogel.

℞ *Mixtur. River.* ʒiβ,
Tinct. Thebaic. ʒβ.
MS. Alle 3 Stunden 25—30 Tro-
pfen in Melissenthee.
Starek.

℞ *Spirit. Rorismar.* ʒj,
Ol. Anisi gutt. vj.
MS. Auf Löschpapier getropfelt
auf die Magengegend zu legen.
Vogel.

℞ *Natr. carbonic. acidul.* ʒij,
Acid. Tartar. ʒj,
Sacchar. alb. ʒiij.
M. f. Pulv.

DS. Theelöffelweise während des
Aufbrausens zu nehmen.

℞ *Sem. Hyoscyam.* ʒj,
Amygdal. dulc. excort. ʒβ.
f. c. *Aq. Cerasor.* ʒviiij
l. a. Emulsio.
Colatur. adde
Magnes. ust. ʒj,
Sacchar. albiss. ʒvj.
MS. Ungeschüttelt alle 2—1
Stunde 1 Eßlöffel.
Emulsio Amygd. comp.
Ph. Hannov.

ge
abs
und
for
℞
S.
M
℞
MS
℞
MS
℞
MS
℞
S.
S
r
C
J

B. Säureerzeugung, Sodbrennen.

Der Säureerzeugung und dem Sodbrennen liegen gewöhnlich gastrische Zustände, übermäßige Gallenabsonderung etc. zum Grunde, weshalb sie ausleerende und späterhin absorbirende und roborirende Mittel erfordern.

℞ *Magnes. carbonic.* ʒj,
Rad. Ipecacuanh. gr. iij,
Sacchar. alb. ʒviij,
Ol. Anisi gutt. vij — xij.
 M. f. Pulv. d. in vitro.
 S. Täglich zwei- bis viermal 1
 Messerspitze voll. Vogler.

℞ *Elixir. acid. Haller.* ʒβ,
Decoct. Salep. ʒv,
Syrup. Rub. Idae ʒiβ.
 MS. Während des Anfalls alle
 halbe Stunde 1 Eßlöffel.
 Seiler.

℞ *Kali carb.* ʒiiij,
Extr. Absinth. ʒij,
Aq. Menth. piperit. ʒiiij.
 MS. Im Anfall Eßlöffelweise.
 Richter.

℞ *Ol. Tartari per deliqui.* ʒβ,
Aq. Foenicul. ʒiiij.
 MS. Morgens und Abends 1 Eß-
 löffel. Stark.

℞ *Pulv. Lign. Quassiae* ʒj,
Magnes. carb. ʒiiij.
 M. f. Pulv.
 S. Nach Bedürfnis 1 Theelöffel
 voll in kaltem Wasser zu neh-
 men. Tode.

℞ *Sapon. medicat.* ʒij,
Extr. Lign. Quassiae
Fell. Tauri inspiss. aa ʒj,
Extr. Cort. Aurant. ʒij.
 M. f. Pilul. gr. 2. Consp. *Cinnam.*
 DS. Im Anfalle 8 Pillen.
 Richter.

℞ *Magnes. carbonic.* ʒj,
Aq. Menth. crisp. ʒiiij,
Syrup. Cort. Aurant. ʒβ.
 MS. Umgeschüttelt alle 2 Stun-
 den 1 Eßlöffel. Berends.

℞ *Chocolat.* ʒij,
Magnes. calcinat. ʒj,
Sacchar. alb. ʒv.
 M. f. Trochisc. pond. gr. 24.
 DS. Im Anfalle 1—2 Stück.
 Chevalier.

℞ *Natr. carbonic. acid.* ʒiijβ,
Extr. Gentian. ʒβ,
Aq. Menth. piperit. ʒv,
Trae Rhei aquos. ʒvj,
Spirit. sulphur.-aether. ʒβ.
 MS. Alle 2 Stunden 1 Eßlöffel.
 Vogt.

C. Diarrhoe, Verstopfung und Kolik.

Im Anfange der Diarrhoe passen gelind diaphoretische Mittel, schleimige Getränke, Emulsionen, Kataplasmen, zuweilen mild ausleerende Mittel. Stärkere Grade erfordern oft, bei entzündlichen Zuständen, kleine Blutentleerungen, ölige Mittel, kleine Dosen Calomel

und Ipecacuanha, Lavements von Amylum etc. — Bei krankhaft erregter Sensibilität das Opium, auch in Verbindung mit Ipecacuanha, und bei atonischen Zuständen die Zimmt- oder Cascarillenrinde, die Colombo etc.

Bei der Verstopfung ist zunächst auf passende Diät zu sehen; vegetabilische Kost, reichliches Getränk, öftere Bewegung in freier Luft reichen oft allein zur Beseitigung hin. Außerdem ist noch von abführenden Mitteln (Saidschützer Bitterwasser mit heißer Milch etc.) und erweichenden Klystiren Gebrauch zu machen.

Die Kolik erfordert bei vollsaftigen, zu Anhäufung des Blutes in dem Pfortadersystem geneigten Personen, und bei entzündlichem Charakter der Krankheit, allgemeine und örtliche Blutentziehungen, kühlende, abführende Mittel, *Emulsio oleoso-salina* etc. Sind hingegen die Nerven krankhaft gereizt, so wirken krampfstillende und beruhigende Mittel sehr wohlthätig.

R Amygdal. dulc. excort.
Semin. Papav. alb. āā ʒβ,
Mucil. Gummi arabic. ʒij,
tere affund. sens.
Aq. Flor. Sambuc. ʒxij.
f. l. a. Emulsio.
adde
Syrup. Papav. alb. ʒβ.
MS. Halbe Theetassenweise.
Richter.

R Tinct. Rhei aquos. ʒj,
Aq. Flor. Chamomill. ʒij,
Ol. amygdal. c. s. q.
Vitell. Ov. subact.
Syrup. opiat. āā ʒvj.
MS. Alle halbe Stunde 1 Efs.
löffel.
Richter.

R Decoct. Salep. (ʒβ) ʒviiij,
Ammon. muriatic. ʒj,
Tinct. Rhei aquos. ʒj,
Laudan. liquid. Sydenh. ʒj,
Syrup. Diacodii ʒj.
S. 1—2 Stunden 1 Efslöffel.
Stark.

R Cort. Cascarill. ʒij.
Coq. c. Ay. q. s. ad. ʒiv.
Colatur. adde
Spirit. nitr.-aether. ʒj,
Syrup. Flor. Aurant. ʒβ.
MS. Zweistündlich 1 Efslöffel.
Jahn.

R Extr. Cascarill.
— *Colomb. āā* ʒiβ,
Aq. Ment. piperit. ʒv,
Trae Cinnamom. ʒj,
Syrup. Cortic. Aurant. ʒj.
MS. Zweistündlich 1 Efslöffel.
Vogel.

R Ol. Olivar. ʒj,
— *Menth. piperit.*
— *Carv. āā* ʒj,
Tinct. Opii crocat. ʒβ.
MS. Erwärmt in den Unterleib
einzureiben.
Henke.

R O
G
A
E
S
MS.
R G
F
K
C
M.
S. D.
R C
O
K
M.
S. A
R E
A
S
T
MS.
R F
E
S. 3
me
R N
E
DS.
ne
R I
C
heifs
Pflau
Stun
seihe
S. A

℞ *Ol. Amygdal. dulc.* ʒβ,
Gummi Mimos. ʒβ,
Aq. Foenicul. ʒiij,
Extr. Opii aquos. gr. ij,
Syrup. emulsiv. ʒj.
 MS. Zweistündlich 1 Eßlöffel.
 Hufeland.

℞ *Gummi arabic.*
Flor. Chamomill. āā gr. xv,
Rad. Rhei gr. iv,
 — *Ipecacuanh.* gr. ½,
Croc. orient. gr. ij.
 M. f. Pulv. dent. tal. dos. 6.
 S. Dreistündlich 1 Pulver.
 Richter.

℞ *Cort. Cascarill.* gr. x,
Opii pur.
Rad. Ipecacuanh. gr. ½.
 M. f. Pulv. dent. tal. dos. 6.
 S. Alle 3 Stunden 1 Pulver.
 Brera.

℞ *Extr. Colomb.* ʒij,
Aq. Cinnamom. s. ʒij,
Spirit. sulphur.-aether. ʒj,
Tinct. Rhei aquos. ʒj.
 MS. Dreimal täglich 1 Eßlöffel.
 Richter.

℞ *Pulv. Fol. Senn.* ʒj,
Extr. Taraxac. (Rhei) q. s.
 u. f. Pilul. 30.
 S. 3—6 Stück Abends zu nehmen.
 Hufeland.

℞ *Natr. phosphoric.* ʒj,
Elaeosacchar. Macid. ʒij.
 M. f. Pulv.
 DS. Auf zweimal mit ungesalzener
 Fleischbrühe zu nehmen.
 Sundelin.

℞ *Fol. Sennae* ʒβ—j.
 Giefse diese mit einer Tasse
 heißer Brühe von gebacknen
 Pflaumen auf, lasse sie eine halbe
 Stunde an einem Orte kochen,
 seihe durch.
 S. Auf Einmal zu nehmen.
 Radius.

℞ *Rad. Colomb.* ʒβ,
 Coq. ex *Aq.* ʒx ad Colatur. ʒvj.
 sub finem coct. adde
Cort. Cascarill. ʒvj.
 Colatur. admisce
Trae Cort. Aurant. ʒij,
Syrup. Cinnamom. ʒj.
 MS. Alle 3 Stunden einen reich-
 lichen Eßlöffel voll.
 Berends.

℞ *Rad. Colomb.* gr. x,
Lap. Cancror. gr. vj,
Rad. Rhei gr. iij.
 M. f. Pulv. dent. tal. dos. 6.
 S. Täglich dreimal 1 Stück.
 Brera.

℞ *Amyli* ʒj—ij,
Aq. fervid. ʒvj—viij.
 Solut. refriger. adde
Laud. liquid. Sydenh. ʒj—ʒβ.
 S. Klystir.

℞ *Amyli.* ʒj,
Extr. Opii aquos. gr. j—iβ,
Aq. fervid. ʒiv.
 S. Zum Klystir. Vogt.

℞ *Acid. tart.* ʒij,
Sacchar. alb. ʒj,
Aq. Flor. Aurant. ʒij,
Aether. acetic. ʒβ,
Electuar. lenitiv. ʒvj—x.
 MS. Umgeschüttelt alle Stunde
 1 Eßlöffel.
 Heim.

℞ *Tartar. natronat.* ʒj,
Natr. carbonic. acidul. ʒij,
Elaeosacchar. Foenicul. ʒβ.
 M. f. Pulv.
 S. Stündlich einen reichlichen
 Theelöffel.
 Sundelin.

℞ *Fol. Sennae* ʒβ—ij.
 Giefse sie Abends mit einer hinreichenden Menge kalten Wassers auf, lasse sie die Nacht über ziehen, seihe am folgenden Morgen durch, und bereite den Kaffee mit dem abgegossenen Wasser. (Abführender Kaffee.)
 RADIUS.

℞ *Mann.* ʒj,
 solve in
Aq. Foenicul. ʒiv,
 adde
Tinct. Rhei aquos. ʒj.
 MS. Eßlöffelweise.
 Hecker.

℞ *Ol. amygd. dulc. rec. express.* ʒβ,
Gummi Mimos. ʒβ,
Aq. Foenicul. ʒiij,
Mannae elect. ʒβ,
Syrup. emulsiv. ʒj,
 M. f. Emulsio.
 S. Eßlöffelweise.
 Hufeland.

℞ *Infus. Fol. Senn.* (ʒij) ʒv,
Gummi Mimos. ʒiβ,
Ol. amygd. ʒβ.
 M. f. Emulsio in adde
Sacchar. alb. ʒβ.
 MS. Alle 2 Stunden 1 Eßlöffel.
 RADIUS.

℞ *Ol. Ricin.* ʒj,
Vitell. Ov. ij.
 terend. sensim misce c.
Aq. Foenicul. ʒvj.
 M. f. Emulsio in qua solve
Extr. Hyoscyam. gr. vi,
Syrup. capit. Papav. ʒβ.
 S. Stündlich 1 Eßlöffel.

℞ *Extr. Chamomill.* ʒj,
Kali tartar. ʒj,
Aq. Chamomill. ʒiv.
 MS. Alle 2—3 Stunden 1 Eßlöffel.

℞ *Tinct. Rhei aquos.* ʒiβ,
Natr. sulphur. ʒiij,
Aq. Ment. piperit. ʒiij.
 MS. Alle 2 Stunden 2 Eßlöffel voll.
 Richter.

℞ *Ol. Ricin.*
Syrup. Amygdal. āā ʒj,
Vitell. Ov. j,
Tinct. Rhei aquos. ʒij.
 MS. Auf Einmal zu nehmen.
 Hecker.

℞ *Gummi* ʒij,
Vitell. Ovor. ʒiij,
Aq. destillat. ʒiij,
Tinct. Thebaic. ʒj—ʒβ,
Ol. Amygd. dulc.
Syrup. Papav. alb. āā ʒj.
 MS. Alle halbe Stunde 1 Eßlöffel.
 Jahn.

℞ *Extr. Hyoscyam.*
Pulv. Hb. Hyoscyam. āā gr. x.
 M. f. Pilul. gr. j.
 S. Alle Stunde 1 Pille.
 Hufeland.

℞ *Ol. Amygd. dulc.* ʒij,
Mucil. Gummi arabic. ʒvj.
 M. exact. et adde
Aq. Chamomill. ʒx,
Tinct. Thebaic. ʒj—ʒβ.
 MS. Stündlich 2 Eßlöffel.
 Richter.

℞ *Pulv. Castor.* gr. x,
Tinct. Opii crocat. gutt. xx,
Aq. Ment. piperit. ʒiij,
Syrup. Flor. Chamomill. ʒiij.
 MS. Alle Viertelstunde 1 Eßlöffel.
 Richter.

℞ *Ur*
Ca
La
 MS. Z
 leib.

℞ *Li*
Ol
Ti
 MS. 2

℞ *Hi*
Ca
 Coq

Ol
 MS. I

℞ *E*
V
A
 MS. 2

℞ *E*
O
S
A
S

MS. I
 der

℞ *O*
S
 MS.
 au

℞ *O*
O
 MS.
 rei

℞ *S*
A
 MS.

2) Krankhafte Zustände im Gefäßsystem.

A. Kongestionen.

Die während der Schwangerschaft entstehenden Kongestionen erfordern dieselbe Behandlung, welche die specielle Therapie auch für ähnliche Zufälle außer der Schwangerschaft vorschreibt. Es sind demnach allgemeine oder örtliche Blutentziehungen, kühlende Abführmittel etc. auch hier angezeigt.

℞ *Kali nitric.* ʒj—iβ,
Gummi arabic. ʒij,
Sacchar. alb. ʒj.
M. f. Pulv.

DS. Täglich drei- bis viermal 1
Theelöffel.

℞ *Flor. Sulphur.* ʒβ,
Tart. depurat. ʒj,
Elaeosacchar. Citr. ʒvj.
M. f. Pulv.

S. Zwei- bis dreimal täglich 1
Theelöffel.

℞ *Kali nitric.* ʒβ,
Tartar. depurat. ʒvj,
Sacchar. alb. ʒβ.
M. f. Pulv.

S. Zwei- bis dreimal täglich 1
Theelöffel. Richter.

℞ *Kali nitric.*
— *sulphurici depur.* āā ʒij,
Tart. depurat. ʒj.
M. f. Pulv.

S. Alle 2—3 Stunden 1 Thee-
löffel.

℞ *Pulp. Tamarind.* ʒβ,
Past. Althaeae ʒij.
inf. cum
Aq. font. feruid. ℥ ij.
Stent. ad solut.

S. Zum Getränk.

Richter.

B. Blutungen. (s. Metrorrhagie.)

C. Varices.

Die Behandlung muß sich nach den, den jedesmaligen Fällen zum Grunde liegenden, Ursachen richten. Bei Vollaftigkeit des Körpers und Blutanhäufungen im Pfortadersystem paßt ein antiphlogistisches Verfahren, bei hartnäckigen Obstruktionen, stärkere Abführungen etc. Erst nach Berücksichtigung dieser verschiedenen Ursachen kann man gegen die Erschlaffung und Ausdehnung der äußern Venen durch äußere Mittel wirken.

℞ Co
R
Coq.

H

S
S

MS.

bef
leg

ursä
dure
sion
örtli
tel,
sen
die
rect.
vern
nen.
Fom
Füß
das
zend
mel

idiop
zügl
tel
leria
foet
beso
der,
Sina

Krär
chur
burt

R Cort. Chin.

Rad. Tormentill. āā ʒj.

Coq. c. *Vin. rubr.* s. q.
sub finem coct. inf.

Hb. Cicutae ʒj.

Colatur. & l. adde

Sacchar. Saturni ʒβ,

Spirit. formicar. ʒiv.

MS. Zum Waschen und damit
befeuchtete Kompressen aufzu-
legen. Dür.

R Acet. Vin. ʒvj,

Ammon. marialic. ʒiij.

MS. Zur Bähung.

Richter. Tode.

3) K r ä m p f e.

Die Behandlung der Krämpfe muss sich nach den ursächlichen Bedingungen der Zufälle richten. Bei den durch Ueberfüllung der Hirngefäße bedingten Convulsionen sind starke allgemeine, und nöthigenfalls auch örtliche Blutentziehung, eines der entscheidendsten Mittel, um die drohende Gefahr abzuwenden. Nächst diesen Blutentleerungen sind vorzüglich alle Mittel, welche die Anhäufungen des Blutes in den Hirngefäßen, direct, durch vermehrte Contraction, und indirect durch vermehrten Zudrang zu andern Theilen hindern können, von Wichtigkeit. Es gehören dahin die kalten Fomentationen über den Kopf, die Einwickelung der Füße in mit Senfabkochung getränkte Flanelltücher, das Auflegen von Sinapismen auf die Waden, die reizenden Klystire, und die stärkeren Gaben von Calomel und Nitrum.

Wird die Entstehung von Convulsionen aber durch idiopathisches Nervenleiden bedingt, so sind dann vorzüglich die mehr auf das Nervensystem wirkenden Mittel angezeigt. Dahin gehören als innere Mittel: *Valeriana*, *Ipecacuanha*, *Opium*, *Castoreum*, *Trae Asae foetid.*, *Liq. C. C. succ.*, die Naphthen und ganz besonders der Moschus. Aeußerlich passen laue Bäder, Klystire von *Valeriana* mit *Asae foetid.*, *Opium*, *Sinapismen*, *Frictionen* etc.

Uebrigens unterlasse man bei allen Arten von Krämpfen niemals die geburtshilffliche innere Untersuchung, um sich von der vielleicht beginnenden Geburtsthätigkeit zu vergewissern.

℞ *Aether. Vitriol.* ʒj,
Aq. Cinnamom. ʒij.
MS. Alle halbe Stunde 1 Eßlöffel.
Hecker.

℞ *Ol. Chamomill.* ʒβ,
Spirit. mur.-aether. ʒj.
MS. Zehn Tropfen pro Dosi.
Heim.

℞ *Asae foetid.* ʒij.
ter. c. Vitell. Ov.
adde
Aq. Meliss. ʒv,
Syrup. Croci ʒj.
MS. Alle Stunde 1 Eßlöffel.
Richter.

℞ *Flor. Zinci*
Extr. Hyoscyam. āā ʒj,
Magnes. carb. ʒj,
Sacchar. Lact. ʒv.
M. f. Pulv. divid. in 10 part.
S. Zweistündlich 1 Pulver.
Vogler.

℞ *Castor.* gr. iij—vj,
Rad. Valerian. minor.
Sacchar. alb. āā ʒj.
M. f. Pulv. dent. tal. Dos. 6.
S. Ein Pulver pro Dosi.
Richter.

℞ *Tinct. Opii simpl.*
Spirit. sulphur.-aeth. āā ʒj,
Liq. Ammon. succinic. ʒij.
MS. Zu 15—25 Tropfen.
Richter.

℞ *Opii pur.*
Pulv. Rad. Ipecacuanh. āā
gr. vj,
Liq. C. C. succinic. ʒv,
Aq. Valerian. ʒv,
Syrup. Chamomill. ʒβ.
MS. Ungeschüttelt alle 2 Stun-
den 1 Eßlöffel.
Vogt.

℞ *Aether. Vitriol.*
Tinct. Valerian. aeth. āā ʒij,
— *Thebaic.* ʒj.
MS. Alle halbe Stunde 15—20
Tropfen.
Hecker.

℞ *Asae foetid.* ʒj,
Ammon. carb. pyro-oleos.
gr. v,
Opii pur. gr. ij,
Tinct. Castor. ʒβ.
MS. Zu 30—40 Tropfen pro
Dosi.
Richter.

℞ *Tinct. Asae foetid.* ʒβ,
— *Castor.*
Aether. sulphur. āā ʒij,
Tinct. Opii crocat. ʒj.
MS. Zu 60 Tropfen.
Richter.

℞ *Liq. Ammon. succinic.*
Spirit. sulphur.-aeth. āā ʒij.
MS. Alle Viertel bis 1 Stunde
10, 15—20 Tropfen.
Eller.

℞ *Tinct. Castor. aether.* ʒj,
— *Valerian.*
Liq. C. C. succinic. āā ʒβ.
MS. Alle 1—½ Stunde 20—30
Tropfen.

℞ *Opii pulv.* gr. iij,
Zinc. oxydat. ʒj,
Liq. Ammon. succinic. ʒij,
Mucil. Gummi Mimos. ʒj,
Syrup. Amygd. ʒij.
MS. Ungeschüttelt stündlich 1
Theelöffel.

℞ *Tinct. Opii crocat.* ʒβ,
— *Castor.* ʒij,
Aq. Chamomill. ʒiv,
Syrup. Cinnamom. ʒij.
MS. Alle 2 Stunden 1 Eßlöffel.
Vogt.

℞ *Mosch. opt.* ʒβ—ʒβ,
Elaeosacchar. Cinnam. ʒij.

M. f. Pulv. subtiliss.
terend. adde sensim.

Aq. Cinnamom. ʒviiij,
Syrup. Cort. Aurant. ʒj.

MS. Umgeschüttelt alle 1—2
Stunden 2 Eßlöffel.

Richter.

℞ *Moschi* gr. vj—xij,
Castor. gr. xij—xxiv,
Asae foetid. ʒβ.

M. f. c. s. q. *Tinct. Valerian.*
Pilul. 24. Consp. *Lycopod.*

S. Gegen Abend, Nachts und
Morgens 4 Pillen.

Berends.

℞ *Spirit. Angelic. comp.* ʒiv,
Liq. Ammon. vinos. ʒj.

MS. Zum Einreiben.

Vogt.

℞ *Mosch. c. Sacchar. trit.* ʒij,
Ammon. carb. pyro-oleos.

ʒβ—j,

Aq. Meliss. ʒvj,
Syrup. Amygdal. ʒj.

MS. Umgeschüttelt alle 1—2
Stunden 1 Eßlöffel.

Richter.

℞ *Kali carbonic. e Tart.* ʒiiij.

solve in

Aq. Chamomill.

— *Cinnamom. s.* āā ʒiiij.
adde

Syrup. Cap. Papav. ʒj.

MS. Alle 1— $\frac{1}{2}$ Stunde abwech-
selnd mit dem Folgenden 1
Eßlöffel.

℞ *Asae foetid.* ʒij—iiij,

Vitell. Ov. j,

Ol. Hyoscyam. coct. ʒij.

tere c.

Inf. Rad. Valerian. (ʒβ) ʒiv.

MS. Zu 2 Klystiren mit 1 Tasse
warmer Milch.

Casper.

℞ *Moschi* gr. j,

Extr. Hyoscyam. gr. $\frac{1}{2}$,

Ammon. carb. pyro-oleos.

gr. iv,

Elaeosacchar. Valerian. ʒj.

M. f. Pulv. dent. tal. Dos. 6.

S. Stündlich 1 Stück mit Wasser.

Remer.

℞ *Aether. sulphuric.* ʒj,

Moschi gr. ij.

MS. Auf Einmal in warmem
Wasser.

Jahn.

℞ *Tinct. Opii simpl.* ʒij.

DS. Alle 1— $\frac{1}{2}$ Stunde abwech-
selnd mit dem Vorigen ʒ—15
Tropfen.

(Dabei eröffnende Seifenkly-
stire mit Zusatz von ʒj—ij *Kal.*
carb. e Cin. Clavell., 1—2 Mal
täglich 1 warmes Bad mit eini-
gen Unzen *Kali carb. crud.*
oder ʒiiij—v *Liq. Kali caust.*)

Stütz.

Putrescenz der Gebärmutter.

℞ *Hb. Rutae*

Flor. Chamomill. āā ʒβ,

Bacc. Laur. cont. ʒij.

inf. c. *Aq. fervid.* ℥. ij.

Stent. in digest. vase clauso per

$\frac{1}{4}$ hor.

Colatur. adde

Tinct. Myrrhae ʒβ,

Mell. Rosar. ʒj.

S. Lauwarm täglich 2—3mal zu
6 Loth vorsichtig einzuspritzen.

(Man läßt die Kranke auf den
Rücken mit erhöhtem Steifse
legen.)

J. A. Schmidt.

Milchstockung in den Brüsten.

℞ *Magnes. alb.* ℥iij,
Pulv. Cort. Aurant. ℥β,
Pulv. Semin. Foenicul.
Sacchar. alb. āā ℥j.
M. f. Pulv. Det. ad scatulam.
S. Morgens und Abends 2 Theelöffel voll in Wasser zu nehmen.
Hufeland.

℞ *Rad. Foenicul.*
— *Petroselin.*
— *Liquirit.* āā ℥j,
Hb. Aneth.
— *Cerefol.*
— *Foenicul.* āā ℥β,
Semin. Aneth.
— *Foenicul.*
— *Anis.* āā ℥ij.
C. C. M. f. Species.
S. Zwei bis drei Eßlöffel auf 2 Pfund Wasser zum Thee.
Bergius.

℞ *Rad. Foenicul.* ℥vij,
— *Liquirit.*
Hb. Aneth.
— *Cerefol.* āā ℥β,
Semin. Anis. ℥ij.

C. C. M. f. Species.

S. Zwei Eßlöffel voll mit 1 Kanne Wasser einige Mal aufwallen, dann an einer warmen Stelle eine halbe Stunde ziehen zu lassen und täglich mit etwas Milch zu verbrauchen.
Radius.

℞ *Rad. Foenicul.*
Sem. Foenicul. āā ℥ij.
C. C. M. f. Species.
DS. Zwei bis drei Eßlöffel voll mit einer Kanne Wasser einige Mal aufwallen zu lassen.
Radius.

Diese sehr einfache Vorschrift hat Radius sehr gute Dienste geleistet, selbst wenn die Species stärker gekocht wurden. Bei guten Digestionsorganen kann man Milch nehmen lassen, und — wo sie zu haben ist — frische Fenchelwurzel.

die

Nach dem welche Muttertrahid des halb die wie gekel

quem erwä Geträ allein noth tiker Gebu Beru