



ant pulveres, nisi in aqua penitus solubiles, cum alias mechanice lædant. Si vero velis, ut vellicent, pulveres quidem ingredi possunt, sed tamen tenuissimi. Instillantur ægris in dorso cubantibus. 2<sup>do</sup>. Forma liquoris pro lotione, e. g. post inflammationem sublatam, rubedine ex laxitate vasorum permanente, uti est solutio lythargirii. 3<sup>tio</sup>. Forma balnei, quod multiplex esse potest. 4<sup>to</sup>. Forma inunctionis, si ad tollendas maculas inungitur, v. g. unguentum mercurii præcipitati rubri. 5<sup>to</sup>. Forma cataplasmaticis emollientis, discutientis. 6<sup>to</sup>. Forma pulveris ophthalmici, qui insufflatur oculo, adeoque levigatissimus esse debet.

### §. III

#### *Selectus & divisio medicamentorum.*

Remediorum catervus apte dividitur in sex classes magis generales, quarum

I.

I. Continet *antiphlogistica* subdividenda

1<sup>mo</sup>. in antiphlogistica emollientia,

2<sup>do</sup>. in antiphlogistica solventia.

Illa tepida, hæc frigide adhibentur e. g. althæa, quæ ad priorem, scorzonera, quæ ad posteriorem subdivisionem pertinet.

II. Comprehendit *solventia*. Hæc subdividuntur

1<sup>mo</sup>. in resolventia simpliciter,

2<sup>do</sup>. in alternantia,

3<sup>tio</sup>. in mercurialia,

4<sup>to</sup>. in specifica, uti cicuta & aconitum.

III. Exhibet *antiseptica*, quæ dispescuntur

1<sup>mo</sup>. in acida vegetabilia,

2<sup>do</sup>. in acida mineralia, magis antiseptica,


3<sup>tio</sup>. in tonica,

4<sup>to</sup>. in adstringentia,

5<sup>to</sup>. in stimulantia,

6<sup>to</sup>. in medicamenta antiseptica ex prioribus composita.

IV.



- IV. Habet *evacuantia*, & quidem
- 1<sup>mo</sup>. emetica, tum mitiora, tum fortiora,
  - 2<sup>do</sup>. purgantia, quæ subdividuntur in purgantia antiphlogistica, in purgantia simpliciter talia, & in purgantia fortiora.
  - 3<sup>tio</sup>. sudorifera,
  - 4<sup>to</sup>. diuretica, tum emollientia, tum acria.
  - 5<sup>to</sup>. sialagoga.

NB. De emenagogis, fætum vel hæmorrhoides pellentibus & expectorantibus seorsim sermo erit.

V. Suppeditat *nervina*, quæ vel sunt nervina tonica, vel nervina anodina.

VI. Præbet *specifica*, v. g. specifica antiseptica, anthelmintica, &c.

#### §. IV.

##### *Formularum exemplaria.*

Sequuntur jam quædam formularum exemplaria, quibus postmodum indicatis in casibus

fibus uti licebit, aut saltem ad earum normam novas componere. Sparsa absque ordine exhibentur, qui cuique digerendus relinquitur.

*Formula.*

*Potus antiphlogisticus.*

R̄. Hord. mund. unc. ʒ. ʒ.  
coq. suff. quant. aquæ  
ad crepatur. usque,  
collat. libr. ʒ. ʒ. adde  
Nitr. pur. drach. ʒ. sem.  
fyr. acetos. citr. vel  
— acet. vel  
— ribesior. unc. ʒ. ʒ.

M. D. S. sumat omni  
bihorio vasculum unum,

NB. Signatura nunquam  
debet omitti, neque  
dies mensis, quo præ-  
scripta est formula. Cau-  
sa patet per se. Præ-  
terea scribatur legibili-  
ter, non facile per sig-

na, neque per abbrevia-  
tiones.

*Potus antibiliosus ecco-  
proticus.*

R̄. Hord. mund.  
Tamarind. enucl. aa.  
unc. ʒ. ʒ.  
coq. suff. quant. a-  
quæ ad crepat. hord.  
usque; collat. libr. ʒ. ʒ.  
adde

Sal. mirabil. Glaub.  
unc. semis.

fyr. ribesior. unc. ʒ. ʒ.

M. D. S. sumat omni bi-  
horio vasculum unum.

*Potus analepticus in pro-  
stratione virium.*

R̄. Decoct. hord. libr. ʒ.  
semis, vini rhenan. vel

E

au-



austriac. montan. unc.  
sex. sacchar. q. s. ut fiat  
potus acido - dulcis.  
Sign. sumat omni biho-  
rio uncias quatuor.

NB. quantitas & tempus  
excepto potu ordinario,  
nunquam arbitrio ægri  
committenda sunt, sed  
in formula exprimenda.

*Mixtura antiphlogistica.*

℞. Aquæ commun. unc.  
V. Nitr. pur. drach. i.  
semis. syr. acetos. citr.  
unc. i.

D. S. omni bihorio vas-  
cul. unum, superbi-  
bendo vascula duo potus  
ordinarii.

NB. Culpari potest ni-  
mis parca nitri dosis;  
putant enim aliqui, vim  
specifice refrigerantem  
ei inesse, ast errant;

nitrum est sal, & sti-  
mulat, sed mitius quam  
reliqua salia. Post ni-  
trum mitissimum sal est  
terra foliata tartari.

*Emulsum.*

℞. Amygdal. dulc. de-  
cort, unc. i.  
f. c. f. q. aquæ lege ar-  
tis emulsiō libr. i. se-  
mis, cui adde  
Nitr. pur. drach. i.  
syr. alth. unc. i. se-  
mis.

M. D. S.

Si emulsum campho-  
raturum habere velis,  
adde post nitrum  
Camphor. gran. VI.  
- X - XV.

*Emulsum*

*ex tempore parandum.*

℞. Pul. gum. arabic. unc.  
i. solv. in aquæ libr.  
i.

fiat

fun

Pot

℞.

c

P

q

l

M.

hor

NB

posi

besi

(\*

I. semis : dein adde  
olei olivar.

fyr. diacod. aa. unc.  
I. sem.

fiat conquassando emul-  
sum.

*Potus deobstruens in in-*  
*farctu hepatis.*

R̄. Fruct. cerasor. re-  
cent. libr. II. coque  
per  $\frac{1}{3}$  hor. in suff.  
quant. feri lactis; col-  
lat. libr. II. adde

Tartar. tartarif.  
drach. VI. fyr. ri-  
besior. unc. III.

M. D. S. sumat omni  
hora vasculum unum.

NB. loco cerasorum  
possunt sumi fructus ri-  
besiorum.

*Potus antisepticus in fe-*  
*bri putrida.*

R̄. Decoct. hord. libr. I.  
semis. spirit. vitriol.  
drach. VI. fyr. vio-  
lar. unc. III.

M. D. S. sumat omni  
bihorio uncias duas. (\*

*Potus aperiens*  
*in pertinaci quartana.*

R̄. Rad. gramin.

— taraxac. aa. libr.  
semis concis. contuf.  
coq. in suff. quant.  
aquæ per hor. collat.  
fortit. express. libr. I.  
adde

tartar. salub. drach.  
III. fyr. rad. V. ape-  
rient. unc. II.

E 2

M.

(\* Suadendum potius mihi videtur, ut in re medica  
nondum bene practici in dando spiritu vitrioli a  
minori dosi inciperent, & ad majorem, e. g. dra-  
chmas sex, vel unciam unam ascenderent.



M. D. S. omni biho-  
rio sumat vasculum u-  
num.

*Electuarium*

*in febre quartana.*

R̄. Extract. gramin. unc.  
III. terr. foliat. tar-  
tar. drach. III. syr.  
fumar. quant. satis,  
ut fiat electuarium  
molle.

*Pillulæ*

*egregie resolventes in  
eadem.*

R̄. Extr. fl. arnic. unc.  
semis. sulph. antim.  
aurat. secundæ  
præcip. drach. II.  
Elixir. stomach. temp.  
q. f. ut f. pill. gran.  
III. f. sumat bis de die  
duas.

NB. In alterantibus  
nunquam a plena dosi  
incipiendum.

*aliæ*

*in eodem casu.*

R̄. Extr. amaric. drach.  
VI. kerm. miner.  
Drach. semis. syr. fu-  
mar. q. f. ut f. pill.  
gran. III.  
f. sumat No. IV.

*Pillulæ*

*tonicæ in chlorosi.*

R̄. Limat. mart. non ru-  
big. Extract. centaur.  
min. gummi ammoni-  
ac. aa. Drach. II. syr.  
fumar. q. f. ut f. pill.

*aliæ.*

R̄. Extract. squill. drach.  
I. Gummi ammon.  
Drach. III. Oxymell.  
squillit. q. f. ut f.  
pill.

*Pi-*

*Pillulæ*

*in lue venerea, scrophu-  
lis &c.*

℞. Resin. Guajac. unc.  
fem. Extract. aconit.  
drach. I. Mercur. dulc.  
drach. femis. Essent.  
lignor. q. s. ut f. pill.

S. fumat initio tres,  
dein quatuor, tandem  
quinque.

*aliæ.*

℞. Extract. cicut. unc.  
femis.

— aconit. Drach. I.

mercur. sublim. cor-  
rosiv. dr. XV.

fyr. cinamon. q. s. ut f.  
pill. N<sup>o</sup>. 300.

Sig. fumat de die qua-  
tuor.

*aliæ.*

℞. Micæ panis alb.

drach. X. Eleofacch.  
menth. drach. II.  
Mercur. sublim. cor-  
ros. in aqua menth.  
solut. drach. I.

Misce exacte in morta-  
rio vitreo; fiunt inde  
pill. N<sup>o</sup>. 600.

*in eodem casu.*

℞. Tinct. guajac. nativ.  
cum tafia parat.  
libr. femis.

Mercur. sublim. cor-  
ros. gr. III.

Sign. fumat mane &  
vesperi cochleare unum  
superbibendo vasculum  
decocti hordei.

NB. Contra indicatur  
mercurius sublimatus  
corrosivus in pectore de-  
bili aut subinflammato,  
in hæmoptoe, plethora,





pariter in teneris, & infantibus, quibus panacea potius vel solutio Plenckiana, danda est, aut si infantes ubera adhuc fugunt, mercurius detur nutrici. Ergo sublimatus non indiscriminatim usum habere potest; respiciendus est morbi gradus, pars affecta, & corporis constitutio.

*Solutio aquosa mercurii.*

R̄. Aquæ cerasor. nigror. unc. VI.  
Syr. kermesin. unc. I.  
Mercur. sublim. corrosiv. gr. III.

M. S. Mane & vesperi sumat cochleare unum, superbibendo lac, vel decoctum hordei, vel tenuem schocoladam.

NB. Qui tasiā non ferunt, his solutio hæc aquosa convenit. Ad datur syrupus kermesinus vel menthæ ad impediendam cardilagiam.

*Pillulæ Plenckianæ.*

R̄. Mercur. viv. depuratis. Drach. I.

Gum. arabic. pulver.

Drach. II.

conterantur bene in mortario vitreo, & subterendo adde

syr. violar. cochlear. I.

Exacte inter se mixtis adde

Extract. cicut. drach. I.

Misce, fiant pill. gr. II. consperg. pulvere liquerit.

D. S. mane & vesperi sumat N<sup>o</sup>. I.

*Eva-*

*Evacuans sursum.*

R<sub>2</sub>. Pulv. rad. ipeca-  
chuan. gr. XXIV.  
Crem. tartar. scrup. I.  
M. f. Pulvis pro dosi.

NB. Non superbibatur potus copiosus, sed solum quantum ad deglutionem pulveris necesse est. Post singulum autem vomitum superbibat vasculum unum potus Thee, v. g. ex flor. sambucci, acaciæ, tiliæ, alias enim diluendo pulverem enervat. Verum potus theatus jam debet paratus in vasculo ante ægrum haberi.

*Infusum emeticum.*

R<sub>2</sub>. Pulv. rad. ipeca-  
chuan. crem. tart.  
aa. drach. I.

Infund. f. quant. aquæ  
ferv. vase clauso per  
horam; collat. unc. IV.  
adde

Oxymel squill. unc.  
semis.

M. D. pro dosi.

*Infusum vinosum emeticum.*

R<sub>2</sub>. Pulv. rad. ipecach.  
drach. II. infund. f.  
q. vini albi. stet in  
infusione calida per  
noctem.

Liquor decant. unc.  
IV. Detur usui.

NB. Potest infusum hoc  
saccharo edulcorari,  
sed nunquam eleosac-  
charo, quia nauseam  
tolleret.

*aliud.*

R<sub>2</sub>. Tartar. emetic. gr.  
IV.

E 4

Aquæ



Aquæ destill. simpl.  
libr. fem.

M. D. u. f. fumat om-  
ni quadrante horæ quar-  
tam partem.

*Pro robustiori.*

R̄. Pulv. rad. ipeca-  
chuan. gr. XXIV.  
Tart. emetic. gr. I.

M. f. pulvis pro dosi.

*Pro puero primum an-  
num mox egresso.*

R̄. Tartar. emetic. gr.  
semis. Aquæ destill.  
simpl. unc. IV. fyr.  
rubidæi, unc. semis.

M. D. S. fumat fem-  
per quartam partem,  
donec vomat.

*Scopo alternante, resol-  
vente, menstrua pellen-  
te, sudorifero, an-  
tispaslico.*

ʒ. Pulv. rad. ipecach.  
gr. II. sacch. alb.  
drach. II.

Terendo misce exactissi-  
me & divid. in doses  
No. VIII.

S. fumat omni trihorio  
dosin unam.

*Scopo alternante sudori-  
fero.*

R̄. Pulv. rad. ipecach-  
uan. gr. II.

Opii pur. gr. I.

Lap. cancror.

Sacchar. alb. aa.  
scrup. I.

M. divide in doses No.  
VI.

S. omni trihorio vel  
quatrihorio fumat dosin  
unam.

NB.

NB. additur saccharum  
& lapides cancrorum,  
ut facilius opium qua  
corpus oleosum subiga-  
tur.

*Purgantia,*  
*mitiora, eccoprotica, mi-*  
*norativa veteribus dicta.*

R̄. Sal amar. unc. I.  
vel drach. X.  
solv. in libr. I. fe-  
mis aquæ com-  
munis.

detur usui, ut omni  
media hora bibat vas-  
culum unum frigide.

NB. Frigide debent su-  
mi hi potus salini, quia  
alias sæpe vomituritio-  
nem excitant. Volunt  
non nulli has solutiones  
syrupo edulcorari, ve-  
rum magis inde nau-  
seosæ fiunt.

*aliud.*

R̄. Sal. mirabil. Glaub.  
drach. VI. solv. in  
libr. semis aquæ com-  
mun.

d. u.

*aliud*

*in diuturna obstructione*  
*alvi.*

R̄. Sal. amar. unc. I.  
semis. solv. in libr. I.  
juris carniū. sumat  
omni hora vasculum  
unum.

*Purgans antiphlogisticum.*

R̄. Pulp. cassiæ.

— tamar. aa. unc. I. fe-  
mis. crem. tartar.  
drach. III.

solv. suff. quant. aqu.  
calid. collat. libr. X.  
adde

syr. rosar. solut. unc.  
I. semis.



M. S. fumat omni hora vasculum unum.

*Antiphlogisticum antibiliosum.*

℞ Fruct. tamarind. enucl. rad. gramin. aa. unc. II. crem. tartar. drach. 3. III.

coq. s. q. aquæ per  $\frac{1}{4}$  hor. collat. libr. I. adde fyr. mannat. unc. I. semis.

S. fumat omni hora vasculum unum.

*aliud.*

*iis inserviens, qui fere semper alvo obstructa laborant, dum interim calida non ferant.*

℞ Pulp. tamarind. unc II. semis.

Pulv. fol. fen. s. ft. drach. I. semis.

crem. tartar. drach. III.

fyr. ribesior. unc. I.

Misc. s. electuar.

S. fumat omni bihorio cochleare unum majus.

NB. Potest & his electuarium lenitivum solum præscribi. Hæmorrhoidariis præcipue utile est, uti & iis, qui pillulis aloeticis sibi talem contraxere consuetudinem, qua non deponunt alvum, nisi sumpta pillula. Hi curantur 1<sup>mo</sup>. diæta refrigerante. 2<sup>do</sup>. pillulis omissis. 3<sup>tio</sup>. longo usu tamarindorum, cassiæ & mannæ.

*aliud.*

℞ Mann. calabrin. unc.

III.



III. crem. tartar. drach.

III.

solv. in suff. quant. aque calid. collat. unc.

X. adde

Syr. acetos. citr. unc.

I. semis.

S. sumat omni bihor. vasculum unum.

NB. Manna sola tum nauseosa est, tum raro purgat, ideo illi salia junguntur & grati syrupi. Præterea de manne usu notandum venit, illam pro infantibus & pueris in jusculo aut lacte solvi, adultis vero solam nunquam sufficere.

*Rheum.*

Rheum scopo stomachico & alvum simul leniter subducente masticatur.

Si in pulvere scopo purgante præscribatur, debet drachma præscribi; scopo tonico vero & simul lenissime alvum movente ad scrupulum vel grana XV. Quare hunc in scopum chloroticis, & leucoræa laborantibus sequenti modo præscribi solet.

R̄. Pulv. rhei.

— Myrobalan.

Fl. sal. ammon. martial. aa. drach. I.

Syr. cichor. c. rheo, q. s. ut f. pill. gr. III.

S. sumat omni bihor. quatuor.

*vel*

R̄. Extr. rhei.

Pulv. rhei.

fl. sal. ammon. mart. aa. drach. I.

Syr.



Syr. cichor. c.rh. q. f.  
ut f. pill. gr. III.

S. sumat omni die bis  
N<sup>o</sup>. tres.

*vel*

R<sub>2</sub>. Tinct. rhei aquos.  
vel tinct. rh. c. aq.  
menth.

*vel*

— c. aq. chamom.

*vel*

— c. aq. fænicul.  
parat. unc. IV.

D. u. sumat omni bi-  
horio cochleare unum  
majus.

*vel*

R<sub>2</sub>. Tinct. rh. aquos.  
cum duplo rh. parat.  
unc. IV.

vel additur parva quan-  
titas magnesiæ nitrî,  
quæ præcipue iis præ-  
scribitur, qui debili ven-

triculo & simul acido  
laborant.

*Purgans aloeticum.*

R<sub>2</sub>. Aloes succotr. gr.  
XXIV.

Elix. propr. dulc. q. f.  
ut f. l. a. pill. N<sup>o</sup>. VIII.  
dentur pro dosi.

*aliud.*

R<sub>2</sub>. Aloes succotr. gr. XX.  
Sacch. alb. scrup. II.  
terendo misce pro dosi.

NB. Aloes usus nun-  
quam diu protrahendus  
est, præcipue viris se-  
dentariis, cum ad hæ-  
morrhoides, uti etiam  
ad fluxum uterinum  
prædisponit. Si conve-  
niat unquam, certe ho-  
minibus pastaceis, leuco-  
phlegmaticis.

*aliud*

*aliud.*

R<sub>2</sub>. Pulv. jalap.  
 crem. tart. aa. drach.  
 semis.  
 Misce terendo.  
 S. pro dosi.

*aliud.*

R<sub>2</sub>. Resin. jalap. gr. X.  
 solv. in drach. II. spir.  
 anis.  
 Detur pro dosi.

NB. Uti resina jalappæ,  
 sic etiam resina scamonei  
 præscribitur.

*aliud.*

R<sub>2</sub>. Resin. jalap. gr. X.  
 —XV.  
 Solv. terendo in unc.  
 II. emulsi amygdal;  
 solutis adde  
 Sacchar. q. f. ad  
 grat.  
 Detur pro dosi.

*aliud.*

R<sub>2</sub>. Resin. jalap. pineis  
 subact. gr. X.-XV.  
 Sacch. alb. scrup. II.  
 Exacte terendo misce  
 & da pro dosi.

*Antiseptica.*

R<sub>2</sub>. Decoct. hord. libr. I.  
 spir. fal. acid. drach.  
 II.  
 Syr. kermes. unc. II.

M. D. S. fumat omni  
 hora vasculum.

*aliud.*

R<sub>2</sub>. Syr. acetos. citr. unc.  
 II.  
 spir. vitriol. drach. II.  
 M. D. u.

*aliud.*

R<sub>2</sub>. Pulv. cort. peruv.  
 unc. I. sem.  
 coq. pr.  $\frac{1}{4}$  hor, vel  
 per hor. vel. pr. 2.  
 hor. s. q. aquæ. col-  
 lat.





lat. unc. XIV. adde  
Syr. kermes. unc. I.  
femis.

D. S. omni bihorio vas-  
culum unum.

NB. Addi possent etiam  
drachmæ duæ spiritus  
vitrioli, aut spiritus fa-  
lis acidi.

*aliud.*

Ry. Pulv. cort. peruv.  
alkohol. unc. I.  
infund. f. q. aquæ  
frigid. infusion. pr.  $\frac{1}{4}$   
hor. continuo teren-  
do in mortario lapi-  
deo: stet dein affus.  
nova aqua adhuc in  
infusione frigida pr.  
24. hor. liquori de-  
cant. unc. XIV.  
adde  
Syr. kermes. unc. II.

M. D. S. omni bihorio  
vasculum unum.

NB. Hoc infusum frigi-  
dum corticis sæpe con-  
venit, dum pulverem  
aut etiam decoctum vel  
vomitu vel alvo rejici-  
unt ægri in nimia ir-  
ritabilitate. De ejus ef-  
ficacitate nemo amplius  
dubitabit, cum majo-  
rem certe habet ama-  
ritiem, quam ipsum de-  
coctum.

*aliud.*

Ry. Pulv. rad. arnic.  
scrup. I. — drach.  
sem. — scrup. II.

Dentur tales doses No  
XII.

NB. Radix arnicæ cer-  
tissime antiseptica in no-  
socomio nostro vien-

nenfi

nenſi homini ex nimia ſuppuratione tabido, cortice fruſtra ſuppeditato, ſanitatē reſtituit integram, conſumta omni die uncia una ſemis.

Convenit 1<sup>mo</sup>. in vera virium vitalium depreſſione febris putridæ. 2<sup>do</sup>. in diarrhæa febris putridæ, ubi eo melior, quod eam non ſimul & ſemel, verum moderando primum, tum demum ſupprimendo ſiſtat. 3<sup>to</sup>. in tabe ex nimia ſuppuratione. 4<sup>to</sup>. in dyſſenteriiſ putridiſ.

*aliud.*

℞. Pulv. rad. arnic. unc. I. infund. ſ. q. aquæ per  $\frac{1}{2}$  hor. ſub finem parum coque; collat. unc. XIV. adde

Syr. contrajerv. unc.

II.

M. D. S. ſumat omni bihorio vaſculum unum.

*aliud.*

℞. Fl. arnic. drach. I.

coq. pr.  $\frac{1}{4}$  hor. ſ. q.

aquæ. collat. unc.

XIV. adde

Syr. cort. aurant.

unc. I. ſem.

M. D. S. ſumat ab initio vaſculum unum.

NB. Flores tam infuſi quam decocti cardialgiam & vomitus excitant, uti & extractum, ſi in nimia doſi ſuppeditentur; hinc ſcopo reſolvente in febris quartana & paralyſi & parca quantitate incipiendum, ut ſolummodo ſumat omni bihorio

vaſ-



vasculum semis. Majori autem dosi dentur in soporosis, incipiendo scilicet ab unc. semis ad unciam unam vel etiam unam & semis. Si cardialgiam leviolem sentire incipiant, tunc dosi iterum imminuta successive descendimus.

*Succus.*

Ry. Hb. acetosif.  
— beccabung. aa. q.  
f.

ut inde exprimatur succus unc. IV, cui per subsidentiam clarific. adde

Syr. acetosif. unc. I.  
semis.  
m. d. u.

NB. Non nunquam sal medium additur. Eodem modo chærophyl-

lum, endivia, portulacca, cichoreum & taraxacum præscribitur: v.g.

Ry. Rad. taraxac. c. toto

Notandum. succos iis, qui debili laborant ventriculo, nunquam esse præscribendos, sed si indicantur, his conservas substitui.

*Cerevisia medicata.*

Ry. Raphan. rustic. rasi, nasturt. aquat.

brassic. rubr. conciss.  
aa. unc. II.

Semin. dauci leviter contus. drach. III.

Sacculo inclusa infunde in libr. II. cerevisif. per noctem frigide.

*alia.*

Ry. Sumitat. centaur. min. absynth. aa. mpl. I.  
fla-

flaved. cortic. au- longas cortice curatas.  
rant. drach. III.

*aliud.*

infunde sacco inclusa  
in cerevisiæ vel vini  
libr. III. frigide per no-  
ctem.

℞. Squill. recent. in ta-  
leol. sect. drach. III.

Pulv. cort. vvinteran.  
drach. II.

Salis tartar. unc. se-  
mis.

*Vinum medicatum.*

℞. Pulv. cortic. peruv.  
unc. II.

— lig. quassia.

— cortic. VVinter.

aa. unc. semis.

infunde cum vini rhe-  
nani libr. II. frigide per  
24. hor.

usus prioris.

mixta infunde frigide  
per plures dies in libr.  
IV. vini boni austriaci  
vel burgundici.

Medicamentum hoc e-  
gregie diureticum in hy-  
drope & stimulans quam  
maxime commodum.

*aliud*

*in chlorosi. &c.*

Sumat ter de die vas-  
culum unc. III. singu-  
lis vicibus decantando.

Egregium hoc est me-  
dicamentum post febres

℞. Limat. mart. non  
rubig. unc. semis.

F

Pulv.



Pulv. cort. peruv. unc. I. semis.  
 — — cinamom. drach. II.  
 infunde cum vini rhenani libr. II. ut prius.

*Species.*

Scopo prophylactico in pituitosis pulmonum morbis curatis loco Thee hollandici præscribuntur species ut plurimum sequentes :

Ry. Hb. veronic,  
 — salv.  
 — hyfop.  
 — millefol. aa. mpl. I.  
 concif. d. f. species pro Thee.

*Potus  
 antiphlogisticus Tissoti.*

Ry. Hord. mund. unc. II.  
 crem. tartar. drach. III.  
 coq. f. q. aquæ per  $\frac{1}{4}$

hor. collat. libr. VI.  
 detur usui.

Potus iste tepide sumptus in acutis, frigide in biliosis farralibus egregius & ubique facillime parandus est.

*Decoctum album*

*Sydenhamii.*

Ry. Mic. pan. unc. II.  
 Rasur. C. C. drach. II.

coq. f. q. aquæ per  $\frac{1}{4}$   
 hor. sub finem coct. adde  
 pulv. cort. cinam.  
 scrup. I.

stent parum in infusione. collat. libr. II. detur usui.

*Decoctum antidyssentericum  
 Deignieri.*

Ry. Cort. simarub. unc. femis.  
 coq. in libr. I. femis  
 aquæ

aquæ ad reman. libr. I.  
S. fumat omni trihorio  
partem tertiam.

*Potus ordinarius  
in lue.*

Ry. Rasur. lig. guajac.  
Rad. sarfa par.  
— chin. nodos. aa.  
unc. I.  
Rasur. liquer. unc.  
semis. pulv. femin.  
sænicul. dulc. drach.

Mixta dentur usui, ut  
domi mpl. I. coquatur.  
in libris II. aquæ per  
 $\frac{3}{2}$  hor.

NB. Interim mercurius  
interne exhiberi debet.

*Camphoratum  
in febribus exanthema-  
ticis.*

Ry. Camphor. pauxillo  
spiritu vini irrorat.  
gr. I.

Sacchar. alb. serup. I.  
terendo misce; & den-  
tur tales doses N<sup>o</sup>. VIII.  
S. fumat omni bihorio  
dosin unam.

NB. Etiam cum lapi-  
dibus cancrorum & sac-  
charo in pulverem teri  
potest camphora, sed  
facilius tamen, si prius  
irroretur spiritu vini.

*aliud.*

Ry. Camphor. mucilag.  
gum. arab. subact.  
gr. X.  
Syr. contrajerv. unc.  
I. semis.  
aquæ ceras. nigr. unc.  
V.

M. D. u.

*Gummiferulacea.*

Hæc solent in pillulis  
vel subacta vitello ovi  
vel soluta oxymelle squil-



litico aut aceto in mix-  
turis præscribi : e. g.

℞. Gum. amoniac.

— myrrh.

— aff. fætid. aa.

drach. I. femis.

Essentiæ myrrh. q. f.

ut f. l. a. pillul. gr. III.

*Expectorans.*

℞. Gum. amon. vi-

tel. ovi sub-

act. drach. I.

femis,

Aquæ puleg. unc.

V.

Syr. hyfop. unc. I.

M. D. u. f. fumat om-

ni bihorio cochleare

unum.

*Gummilacca.*

Scorbutici & venerei,

præcipue qui diutius cu-

ra mercuriali utuntur,

habitum fætidum & la-

xas ulcerofasque gingi-

vas habent; hinc illis

ad halitum corrigendum

pastilli, ad firmandas

vero gingivas remedi-

um ex gummilacca præ-

paratum præscribi solet.

e. g.

℞. Tinct. lacc. alu-

minof.

Syr. myrtill. aa.

unc. I. fem.

m. d. u.

*Extractum myrrhæ aquo-  
sum.*

In pulmonum morbis,

præcipue in phtyfi sæ-

pe præscribitur :

℞. Extr. myrrh. a-

quof. drach. I.

Sacch. cand. unc. I.

m. f. pulv.

S. fumat omni bihorio

cochleare unum.

No-

Nota

dium

ruler

fed

ria

mon

℞. I

m. c

iper

ad

℞.

m.

Sec



Notandum, hoc remedium in phtysi vera purulenta non convenire, sed solummodo in spuria sive in infarctu pulmonum pituitoso.

*aliud*

*scopo chyrurgico.*

R̄. Pulv. myrrh.

— mastic. aa. unc.

I.

m. d. u. offi carioso inspergendum.

*aliud*

*ad ulcera detergenda.*

R̄. Essent. myrrh.

mell. rosar. aa. unc.

I. semis.

infus. sumitat. ab-

synth. libr. I.

m. d. u.

*Epispastica.*

Scopus epispasticorum

debet esse mere excitans ibi, ubi & reliqua methodus excitans antiseptica adhibetur; hinc sane epispastica non conveniunt ægro, in quo vires vitæ exorbitant.

Locus applicandi optimus sunt furæ, vel femora interna, & omni sexta aut octava hora renovari debent.

R̄. Ferment. pan. libr. femis.

farin. femin. finap.

Sal. marin. aa. unc.

I. semis.

acet. fortiss. q. s. ut fiat epispasticum.

cavendum, ne laxis, scorbuticis, obesis applicetur, hi enim inde ulcera aut nunquam aut difficillime curanda acquirunt.





*Suffimigia.*

Pulvis grossus ad unam alteramve unciam pro suffimigio præscribitur ad tumores laxos frigidos pedum post morbos acutos vel hydro pes curatos remanente solum ex laxitate hydrope pedum. Modus suffimigia applicandi optimus est, si pes ita panno tegitur, ut infra liber maneat super fumum, dein eodem panno bene perfricetur, & demum unam alteramve horam in lecto exigat.

Adhibentur & suffimigia ad lustrandum aerem, multa vero eundem non corrigunt, sed solummodo odore nares nostras fallunt. Ut aer lustretur, requiritur mo-

tus & renovatio, quod obtinetur 1<sup>mo</sup>. viva flamma, 2<sup>do</sup>. ut fenestræ cum foribus aperiantur, 3<sup>tio</sup>. ventilatore, 4<sup>to</sup>. ut aer externus sit purus.

Optima lustratio esset, si cubile aere dephlogisticato impleri posset; bonum inde est, nitro in cubili detonato aerem purificare.

*Exemplar suffimigiæ.*

℞. Fl. benzoës.  
nitr. pur.  
sal. ammoniac. —  
drach. I. sem.  
pulv. bacc. junip. unc.  
I.

M. d. u.

*aliud.*

℞. Pulv. lign. rhod. unc.  
I. semis.  
nitr.

nitr. pur. unc. semis. rum succo citri, a-  
mastich. ceto, aquis selteranis

oliban. aa. drach. II. saturati, in actu effe-  
m. f. suffimigium. vescentiæ sumpti.

*Potio Riveriana.*

Ry. Aq. commun. unc. V.

spirit. vitriol. drach. II  
Hic liquor stet paratus  
in uno vasculo.

Ry. Aq. commun. unc. V.

sal. tartar. drach. II.  
hic liquor in altero.

damus de utroque li-  
quore vel unum statim  
post alterum, vel in a-  
ctu effervescentiæ unc.  
unam omni bihorio in  
vomitu hysterico & eti-  
am bilioso ob nimiam  
tenacitatem inani, cum  
hæc potio eandem sol-  
vat, & dein alvum mo-  
veat.

Huic quoque substitui  
possunt lapides cancro-

*In Leucophlegmatia.*

Ry. Theriac. diateff. drach.  
semis.

fl. sal. amon. martial.  
gr. X.

conserv. absynth. q. f.  
ut f. potus. Dentur  
tales No. VI.

S. fumat tres de die.

Notandum, in leuco-  
phlegmatia, chlorosi &  
inde restitantes mensi-  
bus cavendum esse a  
stimulantibus nimium,  
quia alias, si statim ag-  
grediaris acribus, ori-  
tur febris quam maxi-  
me periculosa. Hinc in-  
cipimus a salibus me-



diis adjecto rheo, ascendimus dein ad theriacam & hanc diatesaron, vel ad pillulas ex extractis amaris, & ultimo demum ad aloetica, myrrham, martialia. Cave quoque ab emenagogis, vel sic dictis *menses pellentibus*; indaga potius in causas & morbum, ob quem restitant, cura illum & menses redibunt.

Idem de lochiis.

Ecpolicorum, sive clasfis foetum pellentium exterminanda prorsus est.

*Balsama.*

Frequens horum bonusque usus, frequentior tamen peiorque abusus in phtysi & gonorrhæa; nam cadavera eorum, qui vera phty-

si mortui sunt, exhibent non ulcera solum forte balsamis consolidanda, sed margines circa circum inflammatos, atque adeo statum quasi peripnevmonicum, quem certe balsama ob stimulum augere debent.

Idem de usu balsamorum in gonorrhæa, quæ vera urethræ inflammatio est, a viru venereo inflammante. Felicior usque magis probata mendendi methodus est, quæ gonorrhæam curat diæta tenui refrigerante, medicamentis emollientibus, & leniter ecoproticis, e. g. electuario lenitivo.

*Exhibendi modi sunt:*

1<sup>mo</sup>. Dantur cum roob & syrups indicatis in electuariis,

2<sup>do</sup>

2<sup>do</sup>. in pillulis cum suff.  
quant. pulveris lique-  
rit.

3<sup>tio</sup>. in pulvere cum sac-  
charo, ita, ut guttæ  
IV. balsami excipian-  
tur drach. I. sacchari.

4<sup>to</sup>. Eleosaccharum hoc  
lacti mistum.

5<sup>to</sup>. in guttulis, soluta  
in liquore anodino  
minerali.

6<sup>to</sup>. Scopo chyrurgico  
detergente mixta cum  
melle.

7<sup>mo</sup>. subacta mucilagine  
vel syrupo, aquis mix-  
ta, in forma mixturæ.

8<sup>vo</sup>. forma enematis,  
uti est

*Enema Swietenii*

*in diarrhæa colliquativa.*

℞. Therebinth. vitell. ovi  
subact. drach. II.  
Theriac. andromach.  
unc. II.

lact. vaccin. libr. semis.

Injiciatur tale omni bi-  
horio.

NB. Etiam in tenesmo  
dyssentericorum lauda-  
tur hoc enema; sed ma-  
le, cum nimium stimu-  
let, & vellem, si opium  
indicatur, potius pu-  
rum solutum injicere.

*Diuretica.*

Diuretica potissimum ea  
sunt, quæ ex squilla,  
millepedibus, & extra-  
cto lactucæ virosæ pa-  
rantur. Priusquam ve-  
ro medendi formulas  
sistamus, quasdam per-  
curremus adnotationes  
practicæ. Nota ergo:

1<sup>mo</sup>. in hydrope alia a-  
liis esse diuretica.

2<sup>do</sup>. male omnem ope-  
ram

F 5



ram consumi in aquis educendis; nam causa sublata aquæ facili negotio per lenia diuretica evaporantur; hinc omnifitudio primum causam perscrutari oportet.

3<sup>to</sup>. a purgantibus drasticis abstinendum esse; nam cum cura hydropis admodum longa sit, nemo est, qui per tantum tempus, talia ferat, absque grandi virium jactura.

4<sup>to</sup>. nec diuretica validissima danda esse, sed solum lenia; me-

dicum enim verum causam auferre oportet, si fieri potuerit.

(\*

5<sup>to</sup>. cave a fiti; dentur potulenta, sed accommodata causæ.

6<sup>to</sup>. cave, ne accedat febris continua.

7<sup>mo</sup>. intermittentem ne timeas, quin imo utere illa, nam licet sæpe numero, tanquam medicatrice.

8<sup>vo</sup>. cave, ne nimium festines & remedia continuo mutes, nam curatio requirit menses.

De

---

(\* Adest adhuc fœmina in nosocomio viennensi laxa, debilis, hydropica, quæ cortice peruviano, liquore terræ foliatæ tartari & oxymelle curatur, & aderat ante annum alia, quæ in dispositione inflammatoria emollientibus junctis cum terra foliata tartari & oxymelle pariter curata est.

De duobus adhuc curandi adminiculis mentionem facere oportet, quæ non parum referunt ad felicem hydro-  
pici curam, de fasci-  
atione scilicet, & de in-  
cisione.

*Incisio* tunc fieri potest, quando morbus tantum gradum jam affecutus est, ut suffocationem metuas. Institui debet ad malleolos internos lanceola scindentissima, vulnusculeo minimo, & nunquam in utroque pede simul.

*Fasciæ & ligatura* artuum non debent adhiberi, nisi in hydrope topico, causa hydro-  
pici sublata, remanente adhuc tumore crurum. Fasciandum autem crus

est tempore matutino cum fascia absque margine replicato, & nunquam sola applicanda, sed semper simul lenia eccoprotica, tamarindinata exhibenda, ne alio in loco accumulatio aquarum fiat. Non nunquam aliud quoque adminiculum habemus, fessionem scilicet, qua in sella etiam dormiunt hydro-  
pici ad evitandam suffocationem.

*Remedia usitata.*

℞. Extr. squill. gr. I.  
nitr. pur.

facch. aa. gr. XV.

m. dent. tales doses No. VIII.

S. sumat quater de die dosin unam.

*aliud.*

*aliud.*

℞. aqu. petrosel. unc. V.  
liq. terr. foliat. tart.  
drach. IV.  
Extr. squillit. gr. VI.  
Syr. fænicul. unc. I.

M. d. f. fumat omni bi-  
horio vasculum unum.

*aliud.*

℞. Extr. squill. drach.  
femis.  
— rhei, drach. I. fe-  
mis.  
f. inde pill. gr. II.

S. fumat quater de die  
tres.

*aliud.*

℥. Pulv. squill. præp.  
drach. I.  
Extract. liquer. drach.  
II.  
f. inde pill. gr. III.

Sign. fumat quater de  
die tres.

NB. Illi, quibus squilla  
indicatur, cardilagiam  
non patiuntur; quibus  
vero cardilagia excita-  
tur, hi aut jam cura-  
ti sunt, aut illam non  
bene indicatam affu-  
munt, sive, quod idem  
est, hi ab hac non ex-  
periuntur vim diureti-  
cam.

Sunt, quibus præpara-  
ta ex squilla optatos  
effectus non præstant;  
his sæpe oximel colchi-  
cum summopere con-  
ducit. Exhibetur omni  
bihorio cochleare majus.

*Millepedes* & siccati in  
pulvere & vivi in suc-  
co dari consueverunt;  
sed ficcatorum pulvis  
plerumque iners est,  
hinc succus emulsus præ-  
scribatur.

℞.



℞. Milleped. viv. No. 100.

vel 200. emulge c. vini  
bon. austriac. suff.  
quant. collat. libr. I.  
adde

fyr. V. rad. aperient.

unc. II.

liq. anod. min. Hoff.

gutt. XV.

℞. fumat omni bihorio  
uncias duas.

*aliud diureticum.*

℞. sal. tartar. drac. II.

acet. squillit. q. s. ad  
perfectam saturat, cui  
adde

Roob juniper. unc.

I. femis.

Aq. Petrosel. unc. V.

m. d. u.

NB. Si millepedes ad  
pondus præscribuntur,  
datur uncia una pro  
succo emulgendo.

*aliud.*

Extractum lactucæ vi-  
rosæ egregium solvens  
salinum causas hydropis  
tollit, obstructions sci-  
licet post febres longas;  
cum coindicatis, præ-  
cipue vero cum sale  
medio & squilla præ-  
scribitur ab initio ad  
drachmas duas, dein  
tres & tandem ad un-  
ciam semis intra 24.  
horas absumendam,

℞. Extract. lactuc.

viros.

liq. terr. foliat. tartar.

aa. drach. II.

Oxymel. squill. unc.

I. femis.

Aq. petrosell. unc. V.

m. d. u.

*aliud.*

Cum non raro laxitas  
&





& debilitas causa hydropis fit, ad eam tollendam cortex, sed ob effectum, aquam accumulata[m] scilicet, sui ablotionem petentem combinatus cum squill. & terra foliata tartari datur.

℞. Decoct. cortic. peruvian. libr. I. femis.  
Oxymell. squill. unc. II.

terr. foliat. tartar. drach. III.

m. d. u.

S. sumat omni bihorio vasculum unciarum duarum.

Non nunquam si hydrops conjunctam habeat diathesin phlogisticam, diuretica junguntur decocto altheæ tepide fumendo.

℞. decoct. aith.

— gram. aa. libr. II.

nit. puri, drach. III.

Oxymell. squill. unc. II.

m. d. u.

#### *Cantharides.*

Tinctura cantharidum etiam inter diuretica refertur, sed raro diuresin movet, verum solum tenesimum ad matulam, quin plus excernatur. Melior ejus usus est in rabie canina in decocto emolliente ad guttas decem per nyctemorum. Nihilominus tamen hydropis per tincturam curati exempla habemus.

#### *Cura lactea.*

Varium lac esse solet, quod

quod pro diæta lactea  
 fuadetur : vaccinum, a-  
 fininum, caprinum, nu-  
 tricis, sed quaecunque  
 indicatur, recens esse  
 debet. Ab initio assu-  
 mat æger libram semis  
 vel libram integram per  
 nyctemorum, donec  
 assuescat, dein vero suc-  
 cessive ad majorem do-  
 sin ascendat. Reliqua  
 diæta sit antacida; con-  
 cedantur tamen carnes  
 teneriores & olera. Si  
 fieri potest, diæta ita  
 instituat, ut omnes  
 fere cibi ex lacte re-  
 centi parentur. Hæc  
 cura præcipue verno &  
 æstivo tempore institui-  
 tur, in nimia irritabili-  
 tate a nimis studiis,  
 feminis deperditione ni-  
 mia, in hysteria & hy-  
 pochondriasi sine ma-

terie, in morbis con-  
 vulsivis a plumbo; in  
 his enim præprimis cum  
 cortice usum habet infig-  
 nem. Cura lactea sæ-  
 pe etiam laudatur in  
 phtysi, sed male, cum  
 nimium nutriat, hinc e-  
 nim & febrim & inflam-  
 mationem auget.

Si lac cum cortice in-  
 dicatur, ita præscribi-  
 tur, ut duæ tertiæ par-  
 tes decocti corticis, &  
 una tertia lactis suman-  
 tur seorsim cocta.

Aqua calcis qua lython-  
 tripticum laudatur, pa-  
 riterque in scabie, can-  
 cro & phtysi renali,  
 sed semper cum lacte  
 misceri solet. Ab ini-  
 tio sumit æger intra 24.  
 horas uncias tres cum  
 æqua-



æquali portione lactis, dein ascendit usque ad integram utriusque libram.

*Antispasmodica.*

Antispasmodica præcipua hæc sunt: castoreum, moschus, valeriana filvestris, oleum animale Dipelii, spiritus cornu cervi, opium.

1<sup>mo</sup>. *Castoreum* datur in malo hysterico, hypochondriaco sine materie, & prophylactice ante ingressum paroxifimi. Sed quæri debet, an ferant ægri?

R̄. Essent. castor.

Liq. anod. min. Hoff.  
aa. drach. II.

M. d. f. ingruente paroxifimo guttas XX. fumat.

2<sup>do</sup>. *Moschus* datur in morbis convulsivis, epilepticis, tetano, epistotono, chorea S. Viti, mania nervosa ab hysteria orta, tussi convulsiva, in febre lenta, nervosa cum symptomatibus convulsivis scopo antispastico, in febre militari, pedechiali, in rabie canina, qua sudoriferum & excitans.

R̄. Mosch. optim. gr.  
III. — X.

Lap. cancor.

facch. alb. aa gr XV.  
terendo fiat pulvis,  
& dentur tales N<sup>o</sup>.  
XII.

S. fumat omni bihorio dosin unam.

3<sup>tio</sup>. *Radix valeriana filvestris* datur in morbis nervorum, hysteria, epi-

pilepsia, chorea S. Viti,  
febribus lentis nervosis,  
in febribus putridis sco-  
po antispastico excitan-  
te.

R̄. Pulv. rad. vale-  
rian. filv.  
scrup. I. — drach. sem.  
dentur tales doses No.  
XII.  
S. fumat omni trihorio  
dosin unam.

*aliud.*

*ex eadem.*

R̄. Rad. valerian. filv.  
unc. I.  
infund. f. q. aquæ fer-  
vid. per  $\frac{1}{2}$  horam: sub  
finem momento coque  
vase clauso: stet ad-  
huc in infus. calida per  
 $\frac{1}{2}$  hor. collat. unc. IV.  
adde

fyr. contrajerv. unc.  
I. semis.

m. d. u.

Egregium in febribus  
lentis nervosis, in sub-  
fultu & tremore reme-  
dium.

*aliud.*

R̄. Pulv. rad. valer. filv.  
unc. semis.  
Extr. amaric. drach.  
II.  
fyr. pæoniæ q. f. ut  
f. l. a. pil. gr. III.

S. fumat de die pillulas  
octo.

4<sup>to</sup>. *Opium* maxime  
antispasmodicum, si da-  
tur in substantia cum  
tripla sacchari aut lapi-  
dum cancrorum quan-  
titate, sed nunquam  
dandum in pletora &  
effectibus ab eadem de-  
pendentibus, non in in-  
flammatione, neque in  
biliosis per se, sed so-  
lum



lum ubi suspendenda irritabilitas.

*Anthelmintica.*

Talia sunt cortex peruvianus, limatura ferri, camphora, assa fætida, radix valerianæ silvestris, mercurialia, solutio plenkiana, semen fantonici, radix filicis maris, jalappa.

R̄. Pulv. femin. fantonic. drach. III.

— rad. jalap.

— vitriol. mart. ar-  
tific. aa. drach.

I.

conserv. nasturt. a-  
quat.

Oxymel. squill. aa.  
unc. I.

M. s. fumat omni biho-  
rio cochleare parvum  
caffee.

Extractum hellebori nigri pariter laudatur contra vermes. Datur a granis VI. ad grana X. infunditur a drach. I. ad III. cum libra semis aquæ ruthæ, & sic præstat medicamentum summe celebratum.

R̄. Extr. hellebor. nigr. drach. II. solv. in aqua ruth. libr. I. semis, cui adde

Syr. absynth. unc. I. m. d. s. fumat ter de die cochleare unum.

Extractum nucum juglandis immaturarum eam consistentiam adeptarum, ut per corticem ad nucleum usque acu absque sensu resistentiæ duri corporis transfodi possit, a Tifoto multum laudatur, ad



addita aqua cinnamomi  
vel vino.

℞. Extr. cort. virid.  
nucum juglant.  
drach. I.  
aq. cinnam. unc.  
femis.  
M. dentur infanti guttæ  
XXX.

*vel*

℞. Extr. cort. virid. nu-  
cum jugl. drach. II.  
aq. cinam. vel tanacet.  
unc. IV.  
fyr. absynth. unc. I.

M. D. S. fumat omni  
bihorio cochleare unum.

*vel*

℞. Extr. nuc. immatur.  
jugl. drach. II.  
folv. in vini tokajenf.  
unc. I. femis.

M. dentur guttæ XL.  
— L.

Lac alliatum medica-  
mentum vulgatissimum  
& certe egregium, præ-  
fertim si a reptatu lum-  
bricorum aut tæniæ con-  
vulsiones oriuntur.

℞. allii, drach. II.  
infund. in lact. libr. I.  
calide.


*in eodem casu.*

℞. olei olivar.  
succ. citr. aa. drach.  
VI.  
sacch. alb. drach. I.  
Detur pro haustu.

*aliud.*

℞. olei nucum jugl.  
vini Tokajenf. aa.  
unc. femis.

Ad præcavendam tæni-  
am vel etiam præsentis  
canibus cæsareis solet  
refina jalappæ oleo oli-  
varum subigi.

*aliud.*

R̄. stan. anglic. rasi.  
drach. semis.  
conferv. nasturt. aquat.  
q. s. ut f. bolus pro dosi.

Petroleum sæpe verme  
a perforatione avocet,  
si umbilico illinitur &  
simul etiam interne ad  
X. vel XX guttas fyrup-  
po vel vitello ovi sub-  
actum datur.

*aliud.*

R̄. Hydrarg. vivi unc. I.  
coq. in vase terreo  
per  $\frac{3}{4}$  hor. liquor. de-  
cant. libr. I. adde  
Oxymel. squill. unc. I.

*aliud.*

R̄. Rad. gramin. unc. IV.  
cort. aurant. siccat.  
drach. II.  
cort. cinnamom. gr.  
VIII.

coq. s. quant. aquæ per  
 $\frac{1}{2}$  hor. collat. libr. II. adde  
mercurii viv. unc. II.  
stent in loco calido per  
24. hor. vase clauso ter-  
reo, decant. liquor. adde  
Mell. rosar. unc. III.  
d. u.

Circa febrim vermino-  
sam notandum, quod  
ægri sæpe lumbricos  
excernant etiam in aliis  
morbis, quin febris ver-  
minosa adfit.

*Unguentum**contra pediculos.*

R̄. Sem. petroselin. pul-  
veris. unc. I.  
butyr. insuls. q. s. ut  
fiat unguent.

*Unguentum**ad Scabiem.*

R̄. Sulph. pulver. unc. I.  
pulv. rad. helleb. alb.  
spir.

spir. falis amon. aa.  
drach. II.  
axung. porcin. q. f. ut f.  
unguentum.

*Unguentum*

*volatile discutiens.*

Ry. olei olivar. unc. I.  
spir. fal. amon. drach.  
II.

m. conquassando f. un-  
guentum.

Egregium hoc unguen-  
tum in tumoribus rhev-  
maticis articulorum, hu-  
meri præcipue, si adda-  
tur tinctura canthari-  
dum.

*Vesicantia.*

Emplastrum vesicans  
fit, si drachm. III. em-  
plastri de meliloto ad-  
misceatur drachma una  
pulveris cantharidum;  
aliqui etiam camphoram

addunt ad impediendam  
urinæ suppressionem. Vi-  
debimus jam effectum  
vesicantium in homine  
sano, ut inde casus in-  
dicatos determinare pos-  
simus, cum, uti venæ-  
sectionum, ita vesican-  
tium plurimus detur ab-  
usus.

1<sup>mo</sup>. in homine sano  
primo mictum faciunt  
celeriores, sed non  
uberiores, minuunt  
quantitatem urinæ,  
eam stranguriosam ef-  
ficiunt, & demum  
mictum ipsum cruen-  
tum reddunt.

2<sup>do</sup>. alvum inhibent, &  
dein supprimunt, per  
suppressionem vero  
excitant tormina.

3<sup>to</sup>. post unam alteram-

ve





ve horam largam diaphoresin excitant, ita ut præter opium ad maxime diaphoretica pertineant.

4<sup>to</sup>. efficiunt sitim, æstum, cephalagiam, temulentiam, febrim.

5<sup>to</sup>. adhibitis vesicantibus pulsus non tantum celerior, sed & contractus magis ac fictitie debilis; quare cavendum, ne febrim adscribatur hæc fictitia pulsuum debilitas.

Hinc vesicantia non conveniunt in morbis plethoricis, in initiato humorum motu, neque in saburra primarum viarum, cum & urinam & alvum supprimant; non in apoplexia san-

guinea, angina inflammatoria, pleuritide vera, enteride, sed conveniunt in anginis rheumaticis, pleuritide spuria, rheumatica scilicet, judicanda largo sudore facta venæ sectione, vel etiam pro varia necessitate non facta.

Nocent vesicantia in morbo saburrali, profunt in vero languore virium, in expectata erysi cutanea, hinc in miliaribus, scabie retropressa sponte vel inepta arte, in morbis a serosa colluvie, paralytici ischiade, arthritide, ophtalmia serosa chronica, in urinæ incontinentia a laxitate & debilitate vesicæ.

Emulsa nitrosa & cam-

camphora, difficilem quidem mictum impediunt; sed notandum, vesicantia, dumodo indicata dentur, vix unquam urinam suppressere.

Loca applicationis sunt suræ, femora interna, brachia interna, locus interscapularis, retro aures, nucha, angulus maxillæ, locus dolens, caput, fibulæ, &c.

Moris est, ut repe-

titis vicibus avulsa epidermide ad eundem locum applicentur vesicantia, sed si non studio vehementer excitare velis, hic mos etiam in putridissima febre rejiciendus est.

Incommoda vesicantium sunt largæ suppurations, citæ gangrænescentiæ & ulcera, præcipue si locus vesicantibus tentatus decubitu prematur.

