



Dr. Helmut Bester

1949

Jv 1320 1781/a

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK
— Medizinische Abt. —
DUSSELDORF

V 3003

DISPENSATORIUM REGIUM ET ELECTORALE BORUSSO-BRANDENBURGICUM

JUXTA QUOD
IN PROUINCIIIS REGIIS ET ELECTORALIBUS


MEDICAMENTA
SIMPLICIA COMPARANDA,
ET
COMPOSITA PRAEPARANDA.

AUSPICIIS

SACRÆ REGIÆ MAJESTATIS
BORUSSIÆ &c. &c. &c.

CURA ET OPERA
REGII COLLEGII MEDICI SUPERIORIS

DENUO EDITUM, REUISUM, EMENDATUM
ET AUCTUM.



*Christian Friedrich Hollze
j. Colberg.*

CUM GRATIA ET PRIVILEGIO REGIO.

B E R O L I N I *A. Behncke 28/2 63.*
TYPEIS CHRISTIANI SIGISMUNDI SPENER,*Professor, Berlin.*
M D C C L V X X L

1781

George Washington

МУІЛОСТ АВІАЦІІ
ЗІСКОРДА ТА МІСІЯ
МІСІЕРІЇ ПІДАЧІ - ОСОБИСТ
ІСТОРИЧНОСТЬ
ІСТОРИЧНА КОЛЛЕКЦІЯ
ІСТОРИЧНА ФАКТОРІЯ
ІСТОРИЧНА КОЛЛЕКЦІЯ
ІСТОРИЧНА ФАКТОРІЯ

P R I V I L E G I U M
E T
M A N D A T U M R E G I U M
D E P U B L I C A N D O N O V O D I S P E N S A T O R I O &c.

F R I D E R I C U S W I L H E L M U S R E X B O R U S S I A E &c. &c. &c.

Nostras quum acciderit ad aures, Collegium nostrum Medicum Metropolitanum in distinctionem & prærogativam aliorum Collegiorum Medicorum Provincialium *) Superius clementissime a Nobis declaratum & constitutum, variis expensis, quæ in Librarium & Tabellarium hujus Collegii, rem graphiarum commerciumqye literarum erogantur, nimis gravatum esse, ut illas Nostra nova Constitutione Medicinali publicata & accrescentibus occupationibus Medico-Forensibus ex tenuibus suis redditibus & mulctis imposterum depromere minime valeat, clementissime decrevimus, dictum Nostrum Collegium Superius Medicum, ut eo melius subsistere & sumptibus tolerandis p̄ esse possit, certis quibusdam redditibus donare; Proinde vigore hujus Nostris Diplomatis, Monopolium trium a dicto Collegio edendorum Tractatum, Edicti nempe & Constitutionis nostræ Medicinalis, Novi Dispensatorii Medici & Taxæ medicamentorum huic clementissime concedimus, seria cum prohibitione, ne Bibliopolæ Nostræ territorii (neque illi, quibus antea concessum & licitum erat, priorem vendere Constitutionem Medicinalem & Dispensatorium) memoratos hos tres Tractatus typis alibi excudendi ac Exemplaria dolose & clanculum in Nostras Provincias ingrediendi præbeant anfam, sub pena Quingenorum Solidorum Imperialium

) (2

Fisco

*) Vid. p. 86. Edicti & Constitutionis Medicinalis, de 1725.

Fisco Nostro solvendorum; Porro serio mandamus omnibus Doctoribus Medicinæ, Medicis, Physicis tam Civitatum quam Provinciarum & Circulorum, Pharmacopœis, Venditoribus Materiæ medicæ (Aromatopolis vulgo dictis) Balneatoribus & Obstetricibus, in specie omnibus Chirurgis tam Præsidariis quam Castrensis, ut Novam Constitutionem medicinalem pro uno Solido Imperiali, quilibet Medicorum & Pharmacopœorum Nostri territorii ad suam notitiam & normam Dispensatorium pro duobus Solidis Imperialibus & Taxam medicamentorum pro sedecim sibi a Nostro Collegio Superiori Medico comparent grossis, nisi in mulctam viginti Solidorum Imperialium incurrere velint, quam dimidiam mulctæ deducta Quota Fifcali tam in Emolumentum Nostri Collegii Superioris Medici, quam in erogationem expensarum illius necessiarum (quarum ratio in posterum reddenda), alteram vero dimidiam ærario Nostro destinavimus pœnali. Mandamus itaque Nostro Officio Fifci clementissime simulque severe, ut invigilet, ne Nostrum Collegium Superius Medicum in suo a Nobis clementissime concesso turbetur Monopolio & in dolosos, fraudatores & refractarios animadvertat. Hæc est Nostra Voluntas. Sub Sigillo nostro Regio. Berolini d. 17. Decembr. 1725.

FRID. WILHELMUS.

[L.S.]

DE CREUTZ.

PRÆ-



Præfamen.

Numero exemplarium Dispensatorii Borusso Brandenbur-
gici 1726. editi, in usum verso, et penitus consumto,
necessitate ducimur de altera Editione cogitare.

Atque hæc quidem potior est ratio noui hujus laboris.
Altera non minoris est argumenti, vt ab inconcinnis & super-
fluis formulis veterum, quas majorum auctoritas nobis reli-
querat, officinas liberaremus.

Nemo nostrum inficias iuit unquam, officinas regni
Borusſici, majori, quam par erat, præscriptionum abundan-
tia huc vsque superbiisse, de qua damnum potius, quam
vtilitatem percepisse publicum vero verius est. Etenim com-

prehensu facile est, medicamina ex pharmacopoliis delata, majus acquirere debere pretium, quia Pharmacopœi majores sumtus in acquirendis tot formulis, quæ jure negliguntur hodie, impendere debebant inutiliter, ideoque reliquis, majus statuere pretium æquum duxerunt.

Hanc ob causam Pharmacopœis eam potius legem imponere justum nobis videtur, vt de acquirendis optimæ notæ simplicibus magis, quam de accumulando formularum faragine esse debeant solliciti, cum opinemur, quemlibet praxin medicam exercentem, ex tot simplicibus in officinis prostantiibus cum majori ægrotantium commodo formulam morbo præsenti conuenientem, fore præscripturum.

Simplicium autem vires exponere, aut formulis encomia addere non opus erat, quoniam illas in libris eorum, qui Materias Medicas conscripserunt, & quorum non exiguis est numerus, inuenire, hæc vero ex libris practicis eruere non poenitebit.

Hæc de opere in vniversum; pauca adhuc de Materia Medica nouæ huic Editioni præmissa, monere lubet. Vedit nempe Collegium Medicum, varios committi errores a Pharmacopœis in comparandis simplicibus, dum vel non genuina fatis & omnibus dotibus prædita, vel plane alia collegerunt,

vnum-

vnumque pro altero substituerunt; Sice.g. communiter prostat pro Pyrethri radice radix Ptarmicæ, nec aliam accipiunt Pharmacopolæ ab exteris; sic & in plantis indigenis sœpe vna alterae substituitur, quod potissimum inde venit, quia plantæ & ab iis defumendæ partes nondum fatis determinatæ fuerunt atque descriptæ. Consultum duximus itaque præmittere nouo huic Dispensatorio breuem Materiæ Medicæ conspectum, in quo simplicium origines & veræ determinations breuiter, &, quantum fieri potuit, accurate enumeratae sunt, additis, plantarum, in primis indigenarum, locis natalibus &, vbi necesse fuit, colligendi tempore. In determinandis & denominandis plantis &c. Linnæum sequuti sumus, cuius quippe Systema omnium maxime hodie in usu est.

Neque nimii fuimus in restringendo, neque in acumulando medicaminum numero, cum in utroque exceedere haud liceat. Non facile nouum medicamentum recepimus, nondum experientia fatis & usu comprobatum, nec iners pretiosum facile retinuimus, sed multum sœpe dandum fuit opinionibus temporisque rationi, & sic sœpe medicamentum denuo receptum est, quod fortassis non omnibus æque placabit, cui vero non solum vulgus, sed etiam multi Medici iisque eruditione & felici & rationali praxi clari affueti sunt,

ETIAM

&

& de quo saepe salutares viderunt effectus. Minime tamen tenentur Pharmacopole, omnia haec semper in praesto habere; sufficit in multis, ut rectam cognitionem eorum habeant, & in compositis praescriptam & communem praeparandi methodum.

Idcirco adjecimus in calce hujus operis Designationem eorum medicamentorum, quae semper in officinis pharmaceuticis, & genuina & bene praeparata inueniri debeant, aliam majorem pro majorum urbium, aliam vero minorem, pro minorum locorum officinis.



MATE-

MATERIA MEDICA.

ДО СЕМЯ ТАМ



AB.

ABIETIS *Turiones, (Resina).*

*Pinus abies LINN. Abies alba L. foemina C. BAUH. Germ. Weißtanne.
Arbor sativa.*

ABROTANI *Herba.*

*Artemisia Abrotanum L. Stabwurz,
Aberraute. Planta suffruticosa, hortensis.*

ABSYNTHII PONTICI f. *ROMANI* *Herba.*

*Artemisia Pontica L. Römischer Wermuth.
In calidioribus Germaniae provinciis spontanea; nobis hortensis.*

ABSYNTHII VULGARIS *Herba,*
Summitates.

*Artemisia Absinthium L. Wermuth.
In locis desertis, montosis spontanea,
sed datur quoque hortensis, qua magis succosa, cum prior exsucca, sed
fortior multoque amarior sit.*

AC.

ACACIÆ NOSTRATIS *Flores,*

*Fruclus maturi & immaturi,
Cortex radicis.*

Prunus spinosa L. Schleedorf, Schwarzerdorn, Fruticosa, nostra.

ACACIÆ VERÆ f. *ÆGYPTIACÆ,* *Succus (e fructu immatuero).*

Mimosa Senegal & Nilotica L. ægyptiacæ arboris, qua simul Gummi arabicum plorat.

ACETOSÆ officinalis, *Radix, Semen, Herba virens.*

Rumex Acetosa L. Ampferkraut, Sauerampfer. Planta in hortis, pratis, sylvis & montibus vulgatissima. Optime ex hortis colliguntur folia juniora molliora junioris plantæ. Semen fert aestate.

A

ACE-

AC.

ACETOSELLÆ Officinalis *Herba*
virens.

Oxalis Acetosella L. Sauerklee. Habitat in locis umbrosis humidiusculis, muscosis, Majo & Junio colligenda, vbi luxurians in humo spongioso. *Acetosella lutea corniculata* substituitur ex hortis, ante caulescentiam.

ACETUM VINI Berolinense, Grunebergense, Gallicum.

ACONITI *Herba* & *Radix*.

Aconitum Napellus L. Eisenhüttein. Planta hortensis, perennis. Colligenda radix junior, quæ caules nondum emisit, cum caulescens deterior, post feminis perfectionem emoriatur.

ADIANTHUM ALBUM, s. RUTA MURARIA (*Herba*)

Asplenium ruta muraria L. Steinraute, Mauerraute. Habitat ad muros, & inter saxa.

ADIANTHUM AUREUM, s. POLYTRICHUM (*Herba*)

Polytrichum commune L. Goldene Wiedethon. In sylvis & sterili solo frequentissimum.

ADIANTHUM NIGRUM s. CAPILLUS VENERIS (*Herba*)

Asplenium Adianthum nigrum L. Schwarz Frauenhaar. Ex Italia, Gallia.

AD.

ADIANTHUM RUBRUM offic.
(*Herba*).

Asplenium Trichomanes L. Rother Wiedethon. Ad arborum radices cum Polypodio, sed minus frequens, ex Hercynia & Thuringia e rimis petrarum collecta accedit.

AERUGO. Grünspan.

Crocus Cupri viridis.

AGARICUS. Lerchenschwamm.

Boletus Pini Laricis L. In Alpibus, Tyrolia, Salisburgia & Silesia superiori, tam in junioribus dense enatis, quam annosioribus Laricibus crescit; ad nos desertur Cortice exteriore nudatus, malleo satis percutius & mundus.

AGARICUS CHIRURGORUM.

Boletus igniarius, Feuerschwamm. Fungus ad Fagos & Betulas in umbrosis sparsim, sub finem astatis colligendus, cuius media pars exsiccata mallei ictibus tenerior redditur.

AGNI CASTI Semen (s. potius fructus semine impletus aromaticus).

Vitex Agnus castus L. Kneischbaum, Schafsmülle. Frutex in Italia sponte crescens.

AGRIMONIÆ *Herba*.

Agrimonia Eupatoria L. Ödermennig, Steinfraut. Nostra, perennis, ad vias publicas

AL.

publicas, in pratis, altioribus collibus & pinastretis frequens, estate & autumno floret; folia, planta nondum caudescens, leniter balsamica, non inodora, colligenda.

ALCIS CORNU & UNGULÆ.

Elendshorn, Elendsklauen.

Ceruus Alces L. Elendthier.

ALCHEMILLÆ Folia.

Alchemilla vulgaris L. Sinnau, Fraumantel, Löwenfuß. Nostra, perennis, in pratis irriguis & pinguibus; in Hercynia ad Bructerum copiosissima; folia post deflorescentiam Julio & Augusto, apud nos Junio & Julio colligenda.

ALKANNÆ veræ & Orientalis f.

LIGUSTRI AEGYPTIACI

Radix.

Lawsonia inermis L. Ägyptisch Färberholz. Planta ägyptiaca, male vulgo pro Anchusa habita.

ALKEKENGI BACCÆ.

Physalis Alkekengi L. Judenkirschen.

ALLII Bulbus recens.

Allium sativum L. Knoblauch. Hortensis, perennis.

ALNI Folia recentia & Cortex.

Betula Alnus L. Erle, Else, Ellern. Nostra, arborea.

ALOE Succotrina, Hepatica & Caballina.

AL.

Aloe perfoliata L. Aloe, Exotica, India. Est succus foliorum insipidatus pro diverso puritatis gradu diversimode appellatus. *Succotrina* optima, purissima, splendens, coloris ex rubro fusci, sub tritura crocei, haud ingrati odoris, magis gummosa; Minus pura *hepatica* & resinosa; *Caballina* impurissima, sordibus multis arenulisve permixta, nauseosi saporis & odoris; recrementum vero non, nisi veterinariis propinandum.

ALOES Lignum f. CALAMBAC
f. AGALLOCHUM.

ab arbore Indica *Aspalto - Agallocho* Adlerholz, colore & resina variante ad nos desertur.

ALSINE herba tota recentissima
(pro succo expresso).

Alpine media L. Hünerdarm. Nobis frequens, toto fere anno florens.

ALTHEÆ Radix, Folia.

Althaea officinalis L. Eibischkraut, Weißse Pappel. Planta perennis, in Marchiz prouinciis sparsum in viciniis Beliz, Quiliz, Closterfelde; in Thuringia partim maxima ex parte colligitur a rhizomis saepius lignosa satis ad fluuium Unstrut, partim, & certius, in hortis culta officinas nostras ingreditur.

ALUMEN officinale. Alum.

Alumen rupeum & crudum, vel depuratum primæ crystallisationis, cum preparatis, Alumine saccharato &

A 2

vfo.

AM.

vsto. Alumen *plumosum* in officinis modo est Amianthus, modo Inolithus, (Goldschmid: Spath) & ad medicamenta non pertinet.

AMBRA GRYSEA. Grauer Amber.

Ambra ambrosiaca L. Substantia cerea ex nigro cinerea, aqua innatans, accensa gratissimum odorem spargens, incerti originis, probabiliter succus mineralis insipissatus, induratus. Medicina carior, omnium maxime adulterata, sed nimis adhuc in usu.

AMMEOS Semen. Duplex.

- 1) *A. vulgare & Cretense* plantæ *Sison Amomum* L. f. *Ammi paruum* foliis Fœniculi C. B., rarius in hortis botanicis, copiose autem ex Insulis Maris ægei ad nos defertur.
- 2) *A. majus* dat *Ammi majus* L. quæ planta e semine deciduo in hortis se propagat; ex Italia alias accedit.

AMMONIACUM GUMMI, vid.
Gummi Ammoniacum.AMMONIACUM SAL vid. Sal
Ammoniacum.AMOMI Fruclus. Englisch Gewürz.
Myrtus Pimenta L.AMYGDALÆ DULCES ET
AMARÆ. Süße und bittere
Mandeln.

Amygdalus communis L. Arbor Europa australis & Orientalis.

AN.

AMYLUM. Stärke, Kraftmehl.
e Tritico.

ANCHUSÆ OFFIC. Radix,
Folia.

Anchusa tinctoria L. Rothe Ochsenzunge,
Exotica, Montpelientis.

ANETHI Semen & Herba.

Anethum graveolens L. Dill. In calidiori Europa sponte crescit; nobis hortensis vulgaris.

ANGELICÆ Radix & Semina.

Angelica Archangelica L. Angeliken,
Engelwurzel. In Alpibus & Silesia montibus spontanea, biennis; nobis semper hortensis & temperatarior.

ANIME (Resina).

Hymenaea Courbaril L. Americana,
arborea.

ANISI Semina.

Pimpinella Anisum L. Anis. E Thuringia Saxonica & Franconia accedit, sed in hortis nostris quoque colitur.

ANISI STELLATI Fruclus.
Eternanis.

Illicium anisatum L. Arbor incognita.
Ex India Orientali ad nos fertur.

ANONIS vid. Ononis.

ANTHORAE Radix.

Aconitum Anthora L. Giftheil. Planta perennis, radix napiformis obtusa, flores Augusto producens. Medicina-

AN.

mentum incertum suspecta affinitatis,
ideoque jure hodie negligitur.

ANTHOS Flores, vid. Rosmarinus.

ANTHIRRINI Herba.

Anthirrinum majus L. Löwenmaul.

ANTIMONIUM CRUDUM f.
STIBIUM Spiesglas. Ex
minera Antimonii.

Maxima quantitas ex Hungaria advehitur.

APII Radix, Semina. Sellery,
Zelleri.

Apii graeolentis L. varietas hortensis.
Spontanea ingratiior & haud visualis.

AQUILEGIAE Flores & Semina.

Aquilegia vulgaris L. Aketey, Glöckchen-
blume. Planta hortensis, perennis.

ARGENTUM CUPELLATUM,
FOLIATUM. Reines Faden-
und Blättgen-Silber.

ARGENTUM VIUUM, HY-
DRARGIRUM, MER-
CURIUS VIUUS. Quecksilber.

In Austria, Idria & Hungaria sordinis
reperitur & ad nos defertur.

ARISTOLOCHIAE LONGÆ
VERAE off. Radix.

Aristolochia longa L. Lange Österlujey-
wurzel.

Planta perennis in Europa australi sponte
crescens.

AR.

ARISTOLOCHIAE ROTUN-
DAE VERAЕ off. Radix.

Aristolochia rotunda L. Echte, runde
Österlujeywurzel. In Europa australi
perennis.

ARISTOLOCHIAE VULGARIS,
f. tenuis Radix, Folia.

Aristolochia Clematitis L. Gemeine
Österlujeywurzel. Hortensis, peren-
nis, luxurians.

ARMORACIAE Radix, vid. Ra-
phanus.

ARNICAE, Radix, Folia & Flores.

Arnica montana L. Gallkraut, Arnick,
Wölverley, Germanica, Plauenfis.
Hec vera est, cui vero in variis vrbi-
bus, Inula species substituitur. *Arni-
ca Schwedensis* Dispensatorii veteris
Inula Dysenterica L. (Dumrian,
Müffkenkraut) est longe diuersa.

ARSENICUM ALBUM. Weisser
Arsenic.

ARTEMISIAE Herba Florens.

Artemisia vulgaris L. Weißfuß, St. Jo-
hannisgürtel. Nostra, vulgatissima,
satiua & hortensis.

ARI Radix.
Arum maculatum L. Kronwurzel. Plan-
ta hortensis in Marchia, & extra ean-
dem in aliis regiis povinciis, solum
amat ferax, temperatum & umbrosum.
Verno tempore non effodienda, sed
estate, quando folia marcescere & bac-
ca maturescere incipiunt.

A 3

ASA

AS.

ASA FOETIDA (*Gummi Resina*).

Ferula Assa foetida L. Teufelsdreck, stinkender Asant. Asiatica, perennis.

ASA DULCIS vid. Benzoë.

ASARI Radix & Folia.

Asarum Europaeum L. Haselwurzel. In locis umbrosis, sylvis, perennis.

ASELLI vid. Millepedes.

ASPARAGI Radix, Turiones, Semen.

Asparagus officinalis L. Spargel. Hortensis, perennis, rarius spontanea.

ASPHALTUM f. BITUMEN JUDAICUM Judenpech.

E regionibus Orientalibus potissimum ad nos defertur; in mari mortuo generari & reperiri perhibetur.

ASPHODELI Radix. Goldwurzel.

Bulbus *Lilii Martagon* L. esculentus mucilagineus, hortensis.

AUENAE Semina excorticata.

Auena sativa L. Haaber, Hafer. Cerealis, annua.

AURANTII Flores (Naphæ), Folia, Poma matura & immatura, Cortex, Flauedo, Oleum.

Citrus Aurantium L. Pomeranzenbaum.

NB. Arboris sativæ, vulgaris, non sylvestris spinosæ.

AS.

AU.

AURIPIGMENTUM. Operment.

Pyrites Auripigmentum L.

AURUM FOLIATUM. Goldblätter.

AXUNGIAE recentes, non randidae.

Canis (Hundefett), *Castorei* (Biberfett) *Porci* (Schweinschmalz) *Viperarum* (Vipernfett), *Ursi* (Bärenfett).

B.

BALAUSTRORUM Flores.

Punica Granatum L. varietas sterilis flore pleno. Granatenbaum mit vollen Blumen. Arbor Asia & Europa meridionalis.

BALSAMITAE Folia.

Tanacetum Balsamita L. Est *Costus horrorum* f. *Salvia romana*, officinis nostris olim *Salvia major*. Folia radicaria ante caulescentiam colligenda.

BALSAMUS COPAIVAE.

Copaiferæ officinalis L. Arboris novæ Hispaniae & Insularum.

BALSAMUS DE MECCA, f.

OPOBALSAMUM f. BAL-

SAMUS DE GILEAD. Bal-

sam von Gilead.

Amyris Gileadensis L. Orientalis. Medicamentum plerumque adulteratum ad nos accedit. In Anglia officinis reperitur hodie sub nomine Balsami de Gilead, quem largitur in America septen-

B.A.

septentrionali copiose *Pinus Balsamea*
L. vulgo Balsamtanne.

BALSAMUS PERUUIANUS.

Peruvianischer Balsam.

Peruiferæ L. Arboris Americanæ.

BALSAMUS TOLUTANUS.

Toluiferæ balsamicæ L. Arboris Ameri-
canæ. Quoque valde adulteratur.

BARDANAE Radix. Kletten-

wurzel.

Arctium Lappa L. Planta biennis, non
rara, in falicetis ad vias, locisque ne-
glectis aliisque solo pingui & feraci
donatis crescit; radix vel sero autum-
no, vel primo statim vere colligenda
e plantis junioribus e semine deciduo
enatis, antequam nova protruserint ger-
mina.

BASILICI Herba.

a) *Ocimum citratum L. Citron Basilis-*
ckenkraut.

b) *Ocimum majus vulgare. Großes*
Basilikenkraut.

In hortis odoris & culinæ gratia quotan-

nis feritur.

BDELLIUM Gummi (Resina.)

Palmæ obscuræ arabicæ.

BECCABUNGAE Herba recens.

Veronica Beccabunga L. Bachbungen.
In palustribus fossis & locis hyeme in-
undatis humosis non rara.

BELLADONNAE Herba.

B.E.

Atropa Belladonna L. Tollbeeren, Wald-
nachschatten. Folia planta fruticosæ
luridæ, quæ apud nos in hortis qui-
busdam colitur, in Thuringia & Her-
cynia vero montosis & vmbrosis locis
spontanea est.

BELLIDIS MINORIS Flores

& herba.

Bellis perennis L. kleine Maßlieben, Gän-
seblümchen. Nostra, vulgarissima.

BENZOE f. ASA DULCIS

(Resina).

Croton Benzoë L. Benzoe. Ex India
Orientali venit, optima glebis lacteis
mixta pinguior, Mandel : Benzoe
dicta.

BERBERIS Radix, Cortex me-

dius, Baccæ.

Berberis vulgaris L. Berberißen. Mar-
chia indigena, sepibus, collibus, &
ad oras syluarum & pascuorum; aliis
satua.

BETONICAE Herba.

Betonica officinalis L. Betonicken. No-
stra, perennis, copiosa in pratis, syl-
uis, ericetis & collibus,estate & au-
tumno floret; Folia radicalia colli-
genda.

BETULAE Folia tenella, Cortex,

Aqua seu Succus ex arbore
stillans.

Betula alba L. Weiße Birken. Nostra,
arborea.

BIS-

BI.

BISTORTAE Radix.

Polygonum Bistorta L. Mutterwurzel,
Schlangenwurzel. Floret perennis in
paludosis, pratensis & turfosis, Ju-
nio & Julio.

BOLUS ARMENA.

Argilla Bolus L. Armenischer Bolus.

BONI HENRICI Herba recens.

Chenopodium bonus Henricus L. Stol-
zer Heinrich. Nostra, perennis, in
ruderatis, simetis, ad sepes, vias cir-
ca pagos.

BORRAGINIS Herba, Flores.

Borago officinalis L. Borragen, Bor-
retsch. Planta hortensis; recens pro su-
co expressio & usu medico; sicca iners.

BORAX. Borax.

Sal compositum ex alcali minerali & Sa-
le medio Sedatiuo.

BOTRYOS Folia, Semen.

Chenopodium Botrys L. Traubenkraut,
Romanischer, Schlesischer Thee. In
calidioribus Europaꝝ regionibus sponte-
nea est, ejusdem indolis cum *Botry*
mexicana (*Chenopodium Ambrosioi-*
des L.), quarum vtraque in hortis
seritur.

BOLETUS CERVINUS off.

Lycoperdon ceruinum L. Schweinstrüs-
seln, Hirschbrunst, in oder unter der
Erde; non Phallus foetidus. Est Fun-
gus totus compactus immaturus niger,
pro colorandis Balsamis quibusdam ex-
ficcatur.

BO.

BOVISTA f. CREPITUS LUPI,
Bovist.

Lycoperdon Bovista L. Fungus annuus
habitat in hortis, pasuis, campis &
collibus sterilibus ubique. Maturus
colligitur & puluerulentus.

BRANCAE VRSINAЕ Herba.

Acanthus Germanica. *Heracleum Sphon-*
dylum L. Bärenklau.

BRYONIAE Radix.

Bryonia alba L. Gichtrübe, Zaunrübe.
Planta indigena, sepiaria, scandens,
spontanea & plantata, radice magna
alba, carnosol-succosa fusiformi. Flo-
ret estate; Radix Aprili & Octobri
colligenda & in taleolos secca probe
desiccata contra vermes & cariem mu-
nienda.

BUGLOSSI officinalis Herba &
Flores.

Anchusa officinalis L. Ochsengunge. Plan-
ta recens in usum tracta virtutis quid
habet, sicca parum vel nihil.

C.

CACAO Nuclei.

Theobroma Cacao L. Cacaobaum. Ar-
buscula in Insulis & ad oras Americꝝ
meridionalis & Mexico culta.

CAJAPUT OLEUM. Cajaputöl.

Aromaticum in India orientali in maxi-
ma copia conficitur e fructibus *Myrti*
Leycadendræ L.

CA-

MATERIA MEDICA.

9

CA.

CALAMINARIS LAPIS, CAD- MIA FOSSILIS off.

Zincum Lapis Calaminaris W. Gallmey.
Ex officinis Goslariensis ad nos de-
fertur.

CALAMI AROMATICI s. ACO- RI VERO Radix.

Acorus Calamus L. Calmus. Nostra,
perennis; habitat in paludibus & ad
oras fluminum in terra spongiosa. Ju-
lio & Augusto floret; Autumno radi-
ces colligantur.

CALENDULAE Flores.

Calendula off. L. Ringelblumen, Gold-
blumen. Hortensis, perennis. Re-
centes flores valent; exsiccati nil vi-
rium habent.

CALX VIUA. Lebendiger, unge- lochter Kalk.

Tam e Lapide calcareo visto, quam e te-
stis ostrearum calcinatis.

CAMPHORA. Campher.

Laurus Camphora L. arbor Asiatica.
Campherbaum. Ex India orientali cru-
da adfertur, apud Batauos depuratur.

CANCRORUM CHELAE, LA- PIDES s. OCULI. Krebs- scheeren, Krebssteine, Krebs- augen.

Cancer Astacus L. Colliguntur copiose
in Marchia, maxima vero quantitas
ex Ukrania & Polonia ad nos ad-
fertur.

CA.

CANELLA ALBA. Weißer Zimmt. Cortex

Winteranæ Canellæ L. Arboris Ameri-
canæ. Datur duplex, crassior ligno-
fior, ignobilior, dilute spadiceo-al-
bicans, tenax & candidior, fragilior
qui *spurius*; tenuior, acrior, qui
verus.

CANNABIS Semen. Hanffamen.

Cannabis sativa. L. Nostra, annua,
sativa.

CANTHARIDES.

Meloe vesicatorius L. Spanische Fliegen.
Annis siccioribus Julio mense deva-
stant Fraxinum, Ligustrum, Capri-
folium & plures alias plantas.

CAPILLI VENERIS Herba, vid. Adianthus nigrum.

CARDAMOMUM MINUS. Car- damomlein.

Amomi Cardamomi L. Semina cum con-
ceptaculo. Reliquæ Cardamomi spe-
cies principiis & viribus parum sunt
diversæ.

CARDUI BENEDICTI Her- ba, Semen.

Centaurea Benedicta L. Benediktenkraut.
Spontanea in Europa calidiori; nobis
hortensis.

CARDUI MARIAE Semen.

Carduus Marianus L. Marien-Distel.
Calidioris Germaniae incola.

B

CA-

MATERIA MEDICA.

CA.

CARICAE s. FICUS. Feigen.

Ficus Carica L. Arbor Aficæ & Europæ meridionalis incola; apud nos in multis hortis colitur.

CARICIS Radix.

Carex arenaria L. Sandriedgras, Flugsandriedgras, Eiselpähden. In monticulis & devastatis, fabulo volatili teelis. Radix vere & autumno colligenda.

CARLINAЕ Radix.

Carlina acaulis L. Weisse Eberwurz. Per partem Germania temperata in locis montosis calcareis, soli meridiano expositis & ventis, magna copia nascentur, v. g. in Thuringia, Silesia, rel.

CARTHAMI Flores & Semina.

Carthamus tinctorius L. Safran, Wils der Safran. In hortis inter olera colitur, sed etiam e Germania cis- & transrhinana copiose ad nos peruenit.

CARUI Semen.

Carum Carui L. Karbe, Wiesenkümmel, Krahmkümmel. In pratis & paucis provinciorum valde luxuriat. Differt in officinis semen plantæ sativæ majus, maturius, magis aromaticum, & minus e planta spontanea in Thuringia, Misnia, rel. collectum, magisque mixtum seminibus maturis & imperfectis.

CARYOPHYLLATAE Radix.

Geum urbanum L. Benedictenwurzel, Nesskemwurzel, Garaffenwurzel. Ad sepes & in umbrosis frequens. Radix

CA.

bona & medica a plantis desumenda nondum floridis junioribus, quæ nec lignosa, nec cariosa est.

CARYOPHYLLI AROMATICI. Gewürznelken.

Calycæ florum arbustivæ Moluccanæ *Caryophylli aromatici* L.

CASCARILLAE Cortex. Cascarille.

Croton Cascarilla L. Arbor Americana.

CASSIA CARYOPHYLLATA. Cortex.

Myrti caryophyllatae L. Arboris in Zeylonia, Brasilia, Mexico, Jamaica & Madagascar nascentis.

CASSIA FISTULARIS. Silqua. Caßien Ndhlein.

Cassia fistula L. India orientalis arbor.

CASSIAE LIGNEAE Cortex. Mutterzimmet, Caßienrinde.

Laurus Cassia L. Arbor India orientalis. Datur in officinis duplex vel triplex;

1) Crassior, lignosior, tenuior, in canulas conuolutus.

2) tenuior, fragilior in cannulas conuolutus, magis aromaticus & gratus.

3) tenuior, fragilis, optimus, aromaticus, non conuolutus, sed secundum longitudinem divisus, quem & Bonische Caßie vocant.

CASTOREUM, Bibergeil.

Castor Fiber L. Optimum est, quod ex Russiæ provinciis aducitur; Castore-

CA.

Storum Americae Septentrionalis bonitate & viribus Russo multo est inferius. Quod ex Anglia accipimus in oblongis facculis omnium pessimum est, falso, omnibus dotibus destitutum.

CATAPUTIÆ MAJORIS Semen. vid. Ricini Semen.

CATECHU, TERRA CATECHU, TERRA JAPONICA. Cachou Gallorum.

Succus plantæ incognitæ Indiæ orientalis vid. Gleditsch Einleit. in d. Kenntniß der Arzten. Th. II. p. 511-520.

CENTAURII MINORIS Herba & Summitates.

Gentiana Centaurium L. Tausendgässchenkraut. Nostra, in pratis, pasuis & herbidis subsalsis Julio frequens, interdum quoque Augusto.

CEPÆ bulbis.

Allium Cepa L. Zwiebel. Hortensis, biennis.

CERA ALBA & FLAUA.

Cera apum (*Apis Mellifera*) Weiß und gelb Bienenwachs.

CERASORUM Fructus, Nuclei, Gummi.

Prunus Cerasus L. Kirschenbaum. Fruktus a Ceralo sativa fructu rotundo rubro & acido ejusque varietatibus (TOURNEF. Instit. p. 625.) defumatur; Nuclei a majore ac sylvestri fructu subdulci nigro colore (TOURNEF. Instit. p. 626.) Ar-

CE.

bor sylvestris potiorem partem frumentum largitur, quæ die rechte wilde schwarze Vogelskirsche appellatur.

CERUSSA ALBA. Bleichweiss, Schieferweiss.

Calx plumbi aceto facta.

CERUSSA CITRINA. Bleigelb.

Calx plumbi ad flauedinem calcinata.

CERUI CORNU & SEBUM, Hirschhorn und Hirschtaalg.

Ceruus Elaphus L.

CETI SPERMA vid. Sperma Ceti.

CHAEREFOLII f. CHAERO-PHYLLI offic. Herba recentans.

Scandix Cerefolium L. Körbelkraut, Gartenkörbel. Diuerso anni tempore sat in hortis floret, recentissima bona, sicca ignobile medicamentum.

Nota. Datur planta temula verna, quæ *SCANDIX ANTHRISCUS* L. facie ad *Chærefolium sativum* accedens, non tamen principiis & viribus.

CHAMÆDRYS Herba.

Teucrium Chamædrys L. Gamanderlein. In Misnia, Thuringia & Silegia luxuriat in apricis & montolis, saxosis & vineis. In hortis tamen cultur cum fructu.

CHAMAEPYTIS Herba.

Teucrium Chamaepytis L. Erdliefer, Gichtkraut, Idem valet ac de priori.

CH.

CHAMOMILLAE ROMANAЕ Flores.

Anthemis nobilis L. Römische Chamille, Hortensis nobis & perennis, aestate & autumno florens.

CHAMOMILLAE VULGARIS Flores.

Matricaria Chamomilla L. Chamillen, Feldchamillen, Hermetchen. Nostra, annua, inter Cerealia in vario solo certis annis luxuriat, magis vel minus odora.

CHEIRI Flores.

Cheiranthus Cheiri L. Gelbe Biolen, Hortensis e semine e Gallia, Italia, Belgia allato.

CHELIDONII MAJORIS Herba recens, Radix.

Chelidonium majus L. Schöllkraut. Nostra perennis, verna. Radix Martio, herba Aprili colligenda; aestate floret.

CHELIDONII MINORIS Herba recens.

Ranunculus Ficaria L. Scharbockskraut, Wild Lößelkraut, klein Schöllkraut. Tota planta Martio & Aprili pro succo exprimendo colligitur, sicca parum virtutis habet.

CHERMES vid. Kermes.

CHINAE f. CHINCHINAE CORTEX f. CORTEX PERUUIANUS. China oder Fieberrinde.

C I.

Cinchona officinarum L. Arbor Americæ meridionalis.

CHINAE Radix. China- oder Bokkenwurzel.

Smilax China L. Asiatica, Sarmentosa.

CICHOREI Herba & Radix.

Cichoreum Intybus L. Cichorien, Hirschlauff, Wegewart. Copiose ad vias & agrorum margines sativa, temperatarior, spontanea amarior, & radix lignosior. Aestate floret.

CICUTAE Herba.

1) *Conium maculatum* L. Cicuta major TOURN. Geleckter Schierling, Tollpörfel. rel. In hortis, ruderatis, simetis, paludosis, ad pagos & suburbia multis locis valde luxuriat.

2) *Cicuta virosa* L. Cicuta aquatica WEPFERI; Giftiger Wüsterich, Wasserschierling. Non confundenda cum priori specie multo mitiore. Hujus radice vtuntur ad emplastra quidam.

CINAE f. SANTONICI f. SANCTUM, ZEDOARIAE Semen, Wurmsamen, Zittwersamen.

Artemisia Contra L. Orientalis, sed semper fere variis quisquiliis permixta, rarius pura.

CINERES CLAUELLATI, Pottasche.

Alcali fixum vegetabile lignorum, impurum

C I.

putum, plus minus calcinatum, hinc, non nisi valde depuratum adhibendum.

Nota. Quod e Marchia Provinciis, optimum, e Russia plurimum, e Polonia interdum pessimum apportatur.

CINNABARIS NATIUA. Bergzinnober.

Hydrargyrum Cinnabaris L. S. N. Ex fodinis & fluviis Hungariae, Idriæ, Bohemiae & Germaniae &c. ad officinas peruenit.

CITRI Poma corumque Succus expressus, Cortex, Flauedo, Oleum.

Citrus medica L. Citronenbaum. Arbor Europa australis, sed sumantur ab arbore culta, non spinosa s. sylvestri; Hujus enim medulla magis acris & nauseosa, non acida, pura est, & cortex minus aromaticus, temperatus.

COCCIONELLA, Cochenille.

Coccus Caeti L. Insectum Caeti speciei adhærens, americanum.

COCCUS POLONICUS.

Ad radices secalis, Potentillæ annuæ & argenteæ, nec non Fragariae vesca in Russia australi & Polonia majori, in Marchia vero & Borussia proviniis Scleranthi potissimum radicibus inhærens reperitur.

COCHLEARIAE Herba recens, Semina.

C O.

Cochlearia officinalis L. Löffelkraut. Hortensis, annua & sativa, quæ mitior, maritima spontanea.

COLCHICI Radix recens.

Colchicum autumnale L. Zeitlosen. In pratis Misniae, Ducatus Halberstadiensis cæt. frequens. In Marchia hortensis.

COLOCYNTHIDIS Fructus.

Cucumis Colocynthis L. Coloquinten. E Syria, Aegyptio & Græcia parua sicca ad nos perueniunt:

COLOPHONIUM.

Resina Abietis & Pini. Plerumque etiam conficitur ex residuo Olei Therebinthiniæ.

COLUMBO f. CALUMBO Radix.

Zeylanica amara, Gentianæ rubræ aemula.

CONII Herba vid. CICUTA.

CONSOLIDÆ MAJORIS Radix.

Symphytum officinale L. Schwarzwurzel, Wallwurzel. Spontanea & vulgarissima, Junio & Julio in pratis paludosis, ad aggeres, fossas, & in sylvis umbrosis humectatis, pinguiore solo crescit.

CONSOLIDÆ SARACENICÆ Herba.

Solidago Saracenica L. Hohæ Goldruthe.

B 3

In

CO.

In Marchia hortensis, in sylvis vero montosis Thuringiae, Hercyniae, non rara. Loco Virga aurea sepius datur, principiis vero & viribus vere distincta. Planta florens Julio colligenda.

CONTRAJERUAE Radix.

Dorstenia Contrajerua L. Pernuvianische Giftwurzel. Peruviana, Mexicana.

CORALLIA RUBRA. Rothe Corallen.

Iris Nobilis L. S. N.

CORALLINA OFFICINALIS,

Muscus Corallinus. Corallen-Moos.

CORYANDRI Semen.

Coriandrum sativum L. Coriander. Ex agro Erfurtensi & Bambergensi ad nos defertur; in hortis nostris inter Daucum aliaque olera valde luxuriat.

CORNU CERUI vid. CERUI CORNU.

CORNUS OFFICINALIS. (Drupe)

Cornus mas L. Corneelbaum. Cornelius: Kirschen. Frutex, floret Martio & Octobri.

CREPITUS LUPI vid. Bovista.

CRETA ALBA. Weisse Kreide.

Calx Creta L. E Norwegia ad nos defertur.

CROCUS. Safran.

Stigmata Croci sativi autumnalis L. ex-

CU.

Corollam pendula. Austriaca & Anglica; in hortis boranicis & curiosorum apud nos colitur, perennis.

CUBEBAE. Cubeben.

Fructus *Piperis caudati* L. Ex India Orientali.

CUCUMERIS Succus & Semen.

Cucumis sativa L. Gurken. Sativa.

CUCUMERIS ASININI Fruclus recentes maturi, exque his coctione elicitus succus Elaterium dictus.

Momordica Elaterium L. Hortensis annua vel biennis pro varietate culturae. Rarioris usus.

CUCURBITAE Semen. Kürbis-samen.

Cucurbita Pepo L. Hortensis, sativa.

CULILAVAN Cortex.

Laurus Culilayan L. Arbor Indica orientalis.

CUMINI Semina. Langer Kümmel, Hafer-Kümmel.

Cuminum Cyminum L. Planta annua in Malta & Sicilia culta.

CUPRUM. Kupfer.

CURCUMAE Radix.

Curcuma longa L. Gurkumei, Gelbsafranwurzel. Planta arundinacea India Orientalis.

CUSCUTA vid. EPITHYMUM.

CY-

CY.

CYCLAMINIS officinalis Radix
recens.

Cyclamen Europaeum L. Schweinsbrod,
Saubrod. In Helvetia & Silsia mon-
tibus crescit.

CYDONIAE FRUCTUS.

Pyrus Cydonia L. Quitten, Quitten-
baum. Arbor hortensis; spontanea
varietas rarer, vel in provinciis paulo
temperatoribus.

CYNOGLOSSI Herba & Radix.

Cynoglossum officinale L. Hundszunge.
In ruderatis & ad vias ubique circa
pagos & in ipsis ericetis.

Nota. Radix & Herba recentes sumen-
da, secca parum virtutis habent.

**CYNOSBATI Fructus. Hage-
butten.**

Rosa canina L. Wilde Rosen. Fru-
tex in sepibus & dumetis frequens.

CYPERI LONGI Radix.

Cyperus longus L. Lange Cyperwurzel.
Planta calamaria in paludosis Italiz
& Galliz crescens & aestate florens.

CYPERI ROTUNDI, Radix.

Cyperus rotundus L. Runde Cyperwur-
zel. Perennis planta, in paludosis In-
dia, Syria, Aegypti & Persia crescens,
principiis & viribus priori maxime
affinis.

D.

DACTYLI. Datteln.

Drupa Palmæ Phœnicis L. calidioris
Climatis incolæ cultæ & spontaneæ.

DI.

DAUCI RETICCI Semen.

Athamanta annua L. Mohrenkummel.
Cretica, parce hortensis.

DAUCI VULGARIS Semina,
Radix.

Daucus Carotta L. Möhren; Mohr-
rüben, gelbe Rüben. Sativa, horten-
sis & arvensis.

DICTAMNI ALBI Radix.

Fraxinella austorum, Dictamnus albus
L. Weißer Diptam. In hortis qui-
busdam colitur; in Thuringia satis
copiose crescit, vnde ad nos venit,
sed tantum cortex, non integra ra-
dix, cum centrum sit lignosum atque
compactum.

DICTAMNI RETICCI Folia.

Origanum Dictamnus L. Cretischer
Diptam. Exotica, Europæa, peren-
nis. In hortis curiosorum circa fi-
nem aestatis floret; rareris usus.

DORONICI officinalis Radix secca.

Doronicum Pardalianches L. Gemsen-
wurzel. Floret vere. Radix vere &
autumno colligenda. Planta peren-
nis, hortensis.

DRACUNCULI Herba.

Artemisia Dracunculus L. Dragun.
Hortensis, perennis. Herba autumno
collecta, rareris usus.

DULCAMARAE Stipites vid. So-
lanum scandens.

EBU-

EB.

E.

EBULI Radicis Cortex, Folia, Flores, Baccæ.

Sambucus Ebulus L. Attich. Herba fruticosa, non rara, nobis sativa. Flores estate, radices sero autumno, baccæ autem Septembri colligantur.

ELATERIUM vid. CUCUMIS ASININUS.

ELEMI.

Resina Amyris Elemiferæ L. Arboris Americanæ.

ENDIUAE Herba & Semen.

Cichoreum Endiuia L. Endivieu. Plantæ hortensis annua vulgaris, in Palæstina & adjacentibus spontanea.

• **ENULAE** f. **HELENII** Radix.

Inula Helenium L. Alantwurzel. In hortis nostris colitur temperatoris Europæ incola.

EPITHYBUM officinarum. Thymfseide.

Cuscuta Europæa L. Parasitica varietas officinalis minor Thymo adnascens, Maro, Majoranæ aliquisque plantis aromaticis, vt & statura altiori variis cerealibus, leguminibus, fructibus & sepiibus.

EQUISETI Herba.

Equisetum aruense L. Käsensteert, Alferroßschwanz. In pratis & agris

ER.

ER.

frequens, vere florens; post messem colligenda est herba tota.

ERUCAE Semen.

Brassica Eruca L. Weißer Senf. Sativa extranea.

ERYNGII Radix.

Eryngium campestre L. Mannstreu, Laufdiestel. In campis cis- & trans Viadinis, Ducatus Magdeburgiæ, Halberstadie & traectus Salani frequens. Radices primo vere vel autuno colligantur.

ERYSIMI Herba recens.

Erysimum officinarum L. Wegsenf. Ad vias publicas, in sylvis, campis, pagis & suburbis luxuriat. Floret estate & autumno. Herba tota caulescens colligitur. Erronee satis in officinis occurrit sub nomine Verbenæ feminæ.

ESULAE radicis Cortex.

Olim sub nomine Esula majoris, hodie cortex radicis, non centrum lignosum iners, in ysu est, ab *Euphorbia Cyparissias* L. Wolfsmildch, desumitur.

EUPATORII Herba.

Eupatorium cannabinum L. Wasser- dosten, Kunigunden-Kraut. Copiosissima, ad oras syluarum, atque pratorum, palustrium, fossas & aggeres circa pagos, Iulio & Augusto florens. Herba florida & folia radicalia vicissim prostant.

EU-

EU.

EUPHORBIUM (Gummi Resina.)

Euphorbia officinalis L. Ex Aethiopia, India Orientali & aliis calidioribus Asia & Africae plagiis ex *Euphorbia Schadidacalli* Malabarorum, *Euphorbia Cerei* effigie, aliisque arborecentibus Euphorbiæ speciebus.

EUPHRASIAE Herba.

Euphrasia officinalis L. Augentrost. Nostra, annua, pratensis & syluatica. Herba florida æstate colligitur.

F.

FABARUM Flores.

Vicia Faba L. Saubohnen, Pferdebohnen. Satiua, annua. Datur Farina Fabarum in officinis, quæ vero ex Semine Phæcolorum præparatur.

FARFARÆ f. TUSSILAGINIS

Radix, Herba.

Tussilago Farfara L. Huslattich. Perennis, in locis Marchiæ argillofis campestribus & montanis frequens.

FEL BOUIS *inspissatum*. Ochsen-galle.

FERRUM, CHALYBS, MARS. Eisen, Stahl.

FILICIS Radix. Farrenkraut-wurzel.

Polypodium Filix, Mas & fæmina L. Planta communis in sylvis feraciorebus & ericetis.

FO.

FOENICULI Radix, Herba, Semina.

Anethum Fæniculum L. Fenchel. Semen e Misnia, Thuringia & Franconia adfertur. Radix in hortis nostris culta præstat carnosior præ illa, quam lignosiorum, annosam ad nos deferrunt; sic & herba in agro cineribus stercorato exculta.

FOENICULI AQUATICI f. PHELLANDRII Herba & Semen.

Phellandrium aquaticum L. Pferdesaat, Wasserfenchel. In fossis, paludosis, pratensisibus, & sylvaticis apud nos vulgatissima.

FOENUGRAECUM, Semen.

Trigonella Foenum græcum L. Bockshorn, Foenugrecum. E Thuringia & Franconia copiose ad nos peruenit.

FORMICAE cum aceruo.

Formica rufa L. Ameisen. Copiose in Berlinensis agri pinastretis colliguntur æstate.

FRAGARIAE Baccæ recentes & Herba.

Fragaria vesca L. Erdbeeren. Planta fere ubique spontanea. Hortensis culta maxime variat.

FRANGULAE CORTEX medius.

Rhamnus Frangula L. Faulbaum, Pulverholz. Vulgatissima e baccis deciduis

C

• FR.

duis in humidiusculis, sterilioribus & vmbrofis syluarum tractibus frequens.
Cortex vere & astate colligendus.

FRAXINI Cortex, Folia recentia.

Fraxinus excelsior L. Große Esche.
Arbor indigena syluarum nostrarum.

FULIGO SPLENDENS, Ruß.

FUMARIÆ Herba.

Fumaria offic. L. Erdrauch. Nostra,
annua; in campestribus, inter cerea-
lia, aruis & neglectis pagorum locis.
Florentem colligimus, sed melius ju-
niorem, succulentam, antequam cau-
les nimis tenaces evadant.

G.

GALANGAE (minoris) Radix.

Maranta Galanga L. Kleiner Galgant,
Asiatica, perennis.

GALBANUM (Gummi Resina.)

Bubon Gallanum L. Mutterharz, Afri-
cana, perennis.

GALII Summitates.

Galium verum L. Wallstroh, Unser lie-
ben Frauen Bettstroh. Planta nostra,
perennis, astate ubiuis fere locorum
florens.

GALLÆ TURCICÆ. Galläpfel.

Nidi Cyniphis Quercus Orientalis. E
Gracia & Hungaria advehuntur.

GAMBOGIA vid. Gummi Guttæ,

GE.

GENISTÆ Flores & Semen.

Spartium Scoparium L. Ginß, Pfrie-
menkraut, Hasengeiß. Nostra, pe-
rennis, in fabulosis, incultis & aspe-
ris vere florens.

GENTIANÆ ALBÆ Radix.

Laserpitium latifolium L. Weißer En-
zian, weiße Hirschwurzel. E monti-
culis Thuringia magna copia autumno
collecta, ad nos venit.

GENTIANAE RUBRAE Radix.

Gentiana lutea L. Enzian, Bitterwur-
zel. Rarius & agnus culturam fert,
ex Alpibus copiosissima ad nos venit.

GERANII (robertiani) Herba.

Geranium robertianum L. Ruprechts-
kraut, Storchschnabel. Planta per
maximam anni partem & copiose in
sylvis & ruderatis florens.

GLANDES QUERCINAE, Eicheln,
vid. Quercus.

GLYCIRRHIZA vid. Liquiritia.

GRAMINIS Radix.

Graswurzel, Quecken, Pähden. *Triti-
cum repens* L. vbique fere, perennis.
Ex agris pinguoribus collecta præstat.

GRANATI Poma, Cortex (Ma-
licorium dictus),

Punica Granatum L. Granatäpfelbaum.
Arbor Asia & Europa meridionalis.
Poma dulcia & acida cum succo a sa-
tiua in vnu sunt; Cortex e planta syl-
vestri

GR.

uestri & sativa flore simplici. Flores a varietate sativa flore pleno. vid. Balaustia.

GRANA CHERMES vid. Kermes.

GRANA PARADISI vid. PARADISI GRANA.

GRATIOLÆ Herba.

Gratiola officinalis L. Wildaurin, Gottes Gnadenkraut. Perennis, luxurians, in pratis ad oras fossasque pratenses, & in pascuis ripariis nimis frequens. Junio & Julio cum floribus colligenda.

GUAJACI Lignum, Cortex, Resina.

Guajacum officin. L. Franzosenholz, Bokkenholz, Arbor Americana.

GUMMI AMMONIACUM, Ammoniagummi.

Gummi-Resina Ammoniaci L. Plantæ exoticæ, africanaæ, vmbellataæ.

GUMMI ARABICUM, Arabisch Gummi, Gummi Senegal.

Mimosa Nilotica L. Arbor exotica.

GUMMI BDELLIUM vid. Bdellium.

GUMMI ELEMI vid. Elemi.

GUMMI GALBANUM vid. Galbanum.

GUMMI GUTTÆ s. GAMBOGIA.

Succus Cambogiae Guttæ L. Arboris Indiæ Orientalis.

GU.

GUMMI HEDERÆ vid. Hedera.

LACCÆ vid. Lacca.

LADANI vid. Ladanum.

MASTICHES vid. Mastiche.

MYRRHÆ vid. Myrrha.

OLIBANI vid. Olibanum.

OPOPANACIS vid. Opopanax.

SAGAPENI (Gummi Resina.)

Obscura, exotica, Persica.

SANDARACAE, Sandrac.

Resina *Iuniperi* speciei exotice obscuræ.

TACAMAHACAE, Tacmahaf.

Fagaræ oelandrae L. Arboris americanæ; ex America meridionali & Antillis adfertur.

TRAGACANTHÆ, Gummi Dragant.

Lacrymæ Astragali Tragacanthi L. humilis & spinosæ plantæ in Gallia mediterranea, Italia, Græcia insulis & Oriente. Electa pro officinis, reliqua pars ad artifices transit.

HA.

H.

HAEMATITES LAPIS. Blutstein.
Ferrum Haematites L.

HEDERAE ARBOREAE *Folia, Baccæ & Resina (Gummi Hederæ?)*

Hedera Helix L. Epheu, Baumwinde. Nostra, perennis & communis.

HEDERAE TERRESTRIS
Herba.

Glechoma hederacea L. Gundelreben, Gundermann. Nostra, perennis, valde luxurians. Mensibus vernis floret, dein tota æstate colligitur herba ex locis umbrosis, pinguioribus.

HELENIUM vid. Enula.

HELLEBORI ALBI *Radix.* Weiße Nieswurz.

Veratrum album L. Planta alpensis, perennis.

HELLEBORI NIGRI *Radix*
Schwarze Nieswurz.

Helleborus niger L. Hæc vera est, sed raro in officinis prostat, quin potius radices *Adonis veræ L.* sepius probac emanantur. Hortensis, perennis. Fibrae radicis tantum in usum trahendæ, non vero corpus lignosum earum, ut plurimum iners, centro carioso vel æstate destructio donatum.

HE.

HEPATICÆ (nobilis) Herba.

Anemone hepatica L. Edel Leberkraut. In locis umbrosis, nemorosis haud infrequens, perennis; Floret Martio & Apriili. Folia perfecta æstate colligenda.

HERNIARIAE Herba.

Hernaria glabra L. Harnkraut, Bruchkraut. Indigena, annua planta, agros, aggeres & pascua steriliora arida occupans, acricula. Floret æstate.

HIPPOCASTANI Cortex.

Aesculus Hippocastanum L. Fässcher, Ross-Castanienbaum. Exotica, Orientalis arbor, nunc vero plantatione &c. indigena facta. Cortex tam ramorum juniorum quam & præsertim fructuum maturorum, externus crassior, non vero nucleorum, in usu est.

HIRUDO officinarum. Blutigel.

Hirudo officinalis Raji L. in paludibus & fossis frequens.

HORDEI Semen mundatum, excorticatum & perlatum.

Hordeum distichum L. Gerste, Sommer- und Winter-Gerste. Planta sativa.

HYDRARGYRUM vid. Argentum viuum.

HY-

HY.

HYOSCYAMI NIGRI *Folia, Semen.*

Hyoscyamus niger L. Schwarzer Bissenskraut. In ruderatis, aruenibus & circa pagos & suburbia Iulio floret. Radix & folia radicalia a planta primo anno enascente desumuntur.

HYPERICI Herba & Flores.

Hypericum perforatum L. Sancto Johannis-Kraut. Nostra, perennis, in Ilyuis, campis, hortis passim. Aestate floret, quo tempore colligenda.

HYSSOPI. Herba.

Hyssopus officinalis L. Ysop. Hortensis, suffruticosa, communis; membranis astiuis florens,

I.

JALAPPAE Radix.

Planta Americana dubia. An *Mirabilis longiflora*. L.?

ICHTYOCOLLA s. COLLA PISCIIUM. Haufenblase.

Gluten excoctum ex variis membranis, aliisque partibus piscis Wolgauiæ. *Acipenseris Husonii* L. Haufen. Ex Russia australi, Sibiria & Pannonia.

IMPERATORIAE Radix.

Imperatoria Ostruthium L. Weiße Meisterwurzel. In Marchia hortensis, alias spontanea multis locis, cultura maxime multiplicatur.

IP.

IPECACUANHAE Radix, Tinct.
dianische Brechwurzel, Ruhrwurzel.

* *Viola Ipecacua* L. Americana.

* Genuina neque nigra, neque alba, sed cinerea seu fusca, gracilis, longa, tortuosa, nodosa esto, odoris vix ullius, saporis amaricantis, subadstringentis, quodammodo acris. In cortice sola vis est. Haud confundenda cum alia specie, quæ sepius pro illa venditatur, sed adulterina est, alba tenuis, lignosa, absque rugis & amarore.

IREOS FLORENTINAE Radix.

Iris Florentina L. Florentinische Blauwurzel. Hortensis, perennis. Ex Italia copiose assertur.

IREOS NOSTRATIS Radix.

Iris Germanica L. Blaue Schwerdtlilie. E Thuringia. Nobis hortensis, perennis, valde luxuriat cultura.

JUGLANDIS Nux, Folia, Cortex Fructus exterior.

Juglans regia L. Wallnussbaum. Arbor hortensis.

JUJUBÆ (Fructus). Rothe Brustbeeren.

Rhamnus Zizyphus L. In Gallia cultuntur, ex Italia potissimum sub nomine Zisola aduehuntur ex arbore sativa.

JU.

JUNIPERI Lignum, Baccæ.

Juniperus communis L. Wacholderstrauch. Nostra, fruticosa, in montibus frigidis & fabuletis aliisque sterilibus syluis.

K.

KERMES f. CHERMES Gra-
na, Succus.

Coccus Quercus Ilicis L. Species Gal-
larum, in Quercu Ilice juniore, ra-
misque nouellis, per partem Provin-
cia Gallia meridionalis, reperiunda.

L.

LACCA in granulis; in baculis;
in tabulis. Lack in Körnern,
Stocklack; Schellack.

Gummi Resina *Crotonis Lacciferi* L.
arboris Zeylanica.

LACTUCÆ Folia recentia, Se-
men.

Lactuca sativa L. Gartenlattich. Hor-
tenfis, annua.

LADANUM.

Resina *Cisti Cretici* L. Fruticis orien-
talis. Quod vulgo adfertur & in of-
ficiinis prostat, in gyros, cereorum ad
instar conuolutum, genuinum non est,
sed impurum terrenis heterogeneis
particulis mixtum. Verum Ladanum
perrarum est, in massas maiores, em-

JU.

LA.

plastri mollioris consistentia compa-
ctum & in vesicis ut plurimum inuolu-
tum, odoris fragrantioris est, coloris
obscurioris & Spiritu Vini rectificato
fere plenarie soluitur.

LAPATHI ACUTI Radix.

Rumex acutus L. Grindwurzel. No-
stra, perennis, in pascuis, pratis, ag-
geribus & agris estate floret. Radix
ante caulecentiam colligenda (non
lignosa).

LAUENDULÆ Flores.

Lauandula Spica L. Spife, Lavendel.
Spica florum & flores decidui in offi-
ciniis habentur, e planta majore Orien-
tali, vel minore Europæ.

LAURI Folia & Baccæ.

Laurus nobilis L. Lorbeerbaum. Arbor
in hortis nostris colitur. Maxima co-
pia foliorum e Carinthia, Carniola &
Istria accedit.

LEUISTICI Radix, Herba, Se-
mina.

Ligusticum Leuisticum L. Liebstöckel.
Hortensis, perennis.

LICHEN CINEREUS TER-
RESTRIS.

Lichen caninus L. Hundsmoos, Asch-
farbig Erdleberkraut. Vegetabile in
nostris ericetis & locis umbrosis repe-
riendum.

LI-

L I.

LICHEN ISLANDICUS L. f.
MUSCUS ISLANDICUS.
Islandisch Moos.

Varietas minor copiose crescit in Marchia pinastris; major in Bructero, Silesia, Misnia & Bohemia montibus altissimis.

LIGNUM ALOES vid. ALOE.

CAMPECHENSE f.
INDICUM. Campechien-
holz.

Hæmatoxylon Campechiense L.
Arbor Hispania Americæ.

GUAGACI vid. GUA-
JACUM.

JUNIPERI vid. JU-
NIPERUS.

NEPHRITICUM. Gries-
holz, Blauer Santel.

Guilandina Moringa L. Malabarica, Ceylonica arbor.

RHODIUM, Rosenholz,
Rhodiserholz.

An *Genista Canariensis* L.?

SANCTUM vid. GUA-
JACUM.

SANTALUM

1. *album*, Weiß Sandelholz,
incerta arboris.

L I.

2. *citrinum*, Gelb Sandelholz, arbo-
ris Indicæ nondum determinatae.
3. *rubrum*, Roter Sandel. Arboris
Indicæ quoque non satis determinatae.

LIGNUM SASSAFRAS vid. SAS-
SAFRAS.

LIGUSTRI FLORES.

Ligustrum vulgare L. Reinweide, Mund-
holz. Frutex spontaneus tam in Mar-
chiae provinciis, quam in hortis.

LILII ALBI Radix, Flores.

Lilium candidum L. Weiße Lilien. Asia-
tica, nobis hortensis, perennis.

LILIORUM CONUALLIORUM
Flores.

Conuallaria majalis L. Mayblumen, Li-
lien Convallien. In nemoribus um-
brosis certis locis humectatis abun-
dat.

LIMONIA vid. CITRUS.

LINARIÆ Herba.

Anthirrinum Linaria L. Leinkraut,
Harkraut, Frauenflachs. In solo
arenoso, in ericetis & ad sepes vias-
que reperitur;estate floret & colli-
gitur.

LINGUA CERUINA vid. SCO-
LOPENDRIUM.

LINI Semen.

Linum usitatissimum L. Lein, Flachs,
Planta culta.

LI-

L I.

LINI CATHARCTICI Herba.

Linum catharticum L. Purgierflachs,
Kleinh Leinfraut. Maxima copia æstate
& autumno vigens in pascuis & pratis
humentibus occurrit.

LIQUIRITIÆ f. GLYZYRRHI-
ZÆ Radix & Succus con-
densatus.

Glycyrhiza glabra L. Süßholz. In
Bambergia copiose culta ad nos venit.

LITHARGYRIUM, Silberglätte,
Goldglätte.

Recrementum Plumbi ex auri, argenti-
que purgatione. Ex officinis fusoriis
Hercynia accedit.

LITHOSPERMUM vid. MILIUM
SOLIS.

LOBELIÆ Radix.

Lobelia siphilitica L. Blaue Cardinals-
Blume. Ex America septentrionali
per Angliam accipimus; in quibusdam
hortis curiosorum æstate floret.

LUMBRICI TERRESTRES.
Regenwürmer.

Lumbricus laevis L.

LUPULI Coni f. Stroboli.

Humulus Lupulus L. Hopfen. In cer-
tis Marchiæ tractibus magno colitur
studio, in quibus præstat.

L Y.

LYCOPODII Puluis (Semen).

Lycopodium clavatum L. Bärlapp, Jo-
hannišgürtel. Muscus perennis in sil-
uis abiegnis frequens.

LYSIMACHIAE LUTEAE Herba
florens.

Lysimachia vulgaris L. Gelber Weide-
rich. In fossis & pratis vdis reperi-
tur, planta perennis, radice luxurians.
Julio & Augusto floret.

Nota. Male pro *Virga Aurea* sæpius in
officinis habetur.

LYSIMACHIAE PURPUREAE
Herba florens.

Lithrum Salicaria L. Brauner Weide-
rich. Floret Julio & Augusto.

M.

MACIS. Muscatenblüthe.

Inuolucrum Nucis Moschatæ vid. *Nux*
Moschata.

MAGNETIS Lapis. Magnet.

Ferrum (Magnes) attractorium L. In
ferri fodinis Saxoniæ reperitur.

MAJORANAE Herba.

Origanum Majorana L. Majoran, Hor-
tentis.

MA-

MA.

MALA varia s. POMA, imprimis
vero BORSDORFIANA
(Borsdorfer Äpfel), eorumque
Succus.

Pyrus Malus L. cum varietatibus.

MALUAE ARBOREAE seu
ROSEAE Flores.

Alcea rosea L. Stockrosen, Pappelrosen.
Hortensis.

MALUAE Radix, Herba, Flores
& Semen.

Malua rotundifolia L. Pappeln, Gänsepappeln, Käsepappeln. Ad sepes
& vias publicas copiose crescit.

MANNA vulgaris & electa.

Succus nativus Fraxini Orni L. Arboris Calabriæ.

MARI VERI Herba.

Teucrium Marum L. Räbenkraut. Suffruticosa, Italica, sed in nostris hortis quoque colitur.

MARRUBII ALBI Herba.

Marrubium vulgare L. Weißer Undorn.
Ad vias publicas sponte crescit perennis, altate florens.

MASTICHES. Mastix.

Resina Pistaciæ Lentisci L. Arboris orientalis.

MA.

MATRICARIAE Herba & Flores.

Matricaria Parthenium L. Mutterkraut.
Crescit in locis umbrosis, ruderatis
parce, & in hortis colitur.

MATRISYLUAE Herba.

Asperula odorata L. Waldmeister,
Sternleberkraut. Crescit in sylvis
umbrosis. Floret Mayo.

MECHOACANNAE ALBÆ Radix.

Convolvulus Americanus, Mechoacan
dictus L. Mat. Med. Weiße Jalappe,
Weisser Rhabarber, Indianische Zaun-
rübe.

Nota. Cae, ne cum Radice Bryoniae per-
mixtam accipias, quæ vero facile di-
stinguenda circulis crassioribus inter-
rioribus & majori albedine, neque
minus eo, quod manducata & deglu-
tita ardoris sensum in fauibus & sa-
liua copiosiorem secretionem excitet.

MECHOACANNA NIGRA vid.

JALAPPA.

MEL. MEL APUM. Honig.

Crudum, despumatum, virgincum.

MELILOTI Herba & Flores.

Trifolium Melilotus offic. L. Steins-
flee, Honigflee. In agris, pascuis &
pratis frequens.

MELISSAE Herba.

Melissa officinalis L. Melisse. In no-
stris hortis colitur.

D

ME-

ME.

MELONUM Semina.

Cucumis Melo L. Melone. Hortensis,
annua.

MENTHA AQUATICA vid. PU-
LEGIUM.

MENTHAE CRISPAE Herba.

Mentha crispa L. Krausenmünze. Horten-
sis, perennis; initio astatis florens, elo-
cis subhumidis, pinguibus colligenda.

MENTHAE PIPERITIS Herba.

Mentha Piperitis L. Pfeffermünze.
Anglicana, nobis hortensis, perennis.

MERCURIALIS Herba.

Mercurialis annua L. Bingelfkraut. In
locis neglectis & hortis oleraceis fa-
cile prouenit.

MERCURIUS vid. ARGENTUM
VIUUM.

MEI Radix.

Athamanta Meum L. Bärwurzel. Plan-
ta vmbellata in Thuringia & Hercy-
nia sponte & copiose cretens.

MEZERAEI Cortex radicis, Bac-
cæ (Semen Coccognidii).

Daphne Mezereum L. Kellerhals. In
sylvis Marchiæ nonr, Cassubia, Po-
lonia & ad oras Hercyniæ. In hor-
tis curiosorum Februario, Martio vel
Aprili floret; aestate perficit baccas.

MI.

MILII SOLIS Semen.

Lithospermum officinale L. Meerhirse,
Steinhirse. Nostra. Quod vero Se-
men Milii Solis vulgo adfertur e
Thuringia, genuinum non est, sed
ab alia, licet vicina, specie (*Lithosp.*
purpur. caeruleo) collecta. Nostra
species in rupibus calcareis Rüders-
dorfensibus frequens reperiunda.

MILLEFOLII Herba & Summi-
tates.

Achillæa Millefolium L. Schafgarbe.
Nostra, perennis, communis.

MILLEPEDES s. ASELLI.

Oniscus Asellus L. Kellersel, Keller-
würmer.

MINIUM. Mennig.

Plumbum ad calcem rubrum calcinatum.

MORSUS DIABOLI vid. Succisa.

MORI Fructus.

Morus nigra L. Schwarzer Maulbeer-
baum. Passim apud nos colitur.

MOSCHUS. Biesam.

Folliculus vmbilicalis excretorius ani-
malis *Moschi Moschiferi L.* (Bie-
samthier). Optimus e China, Ta-
tarica & India Orientali adfertur; mi-
nus bona e Bengalia & Russia; pe-
fissima & omnium maxime adulterata est,
quam ex Anglia adferunt.

Nota. *Magna fraus committitur cum*
hoc pretioso medicamento, saepe jam
in locis, ybi colligitur; cum san-
guine

MU.

guine enim & arena miscent. Detegendum hoc grumis majoribus spuriis, evaporatione fere plenaria, si verus est, remanstone vero pulueris arenosi, si fucatus fuerit, & futuris scepe in sacculis continentibus conspicuis.

MUSCUS ISLANDICUS vid.
Lichen Islandicus.

MYRRHA. Myrrhe.

Succus gummeo-resinosus plantæ obscuta arabica & athiopica.

MYRTI Folia recentia, Baccæ.

Myrtus communis L. Myrtenbaum. Nobis hortensis frutex, cuius patria Italia.

MYRTILLI Baccæ.

Vaccinium Myrtillus L. Heidelbeeren, Blaubeeren, Schwarze Beisingen. In ericetis & nemorosis crescit; Floret Majo.

N.

NAPELLUS vid. Aconitum.

NAPHE Flores. vid. Aurantium.

NAPI Radix recens & Semen.

Brassica Napus L. Steckrüben. Sativa.

NASTURTII AQUATICI Herba
virens.

Sisymbrium Naslurtium aquaticum L. Grunnenkresse, Wörnkresse. Ad riuulos puriores, scaturiginesque ubique fere apud nos crescit.

NA.

NASTURTII HORTENSIS Herba virens & Semen.

Lepidium sativum L. Kresse, Gartens Kresse. Satiua, hortensis.

NASTURTII INDICI Flores & Folia recentia.

Tropaeolum majus L. Indianische Kresse. Copiose in hortis nostris proueniunt.

NEPETAE Herba.

Nepeta Cataria L. Katzenminze. Circa pagos in ruderatis copiose floret aestate.

NEPHRITICUM LIGNUM vid.
Lignum Nephriticum.

NICOTIANAE Folia.

Nicotiana Tabacum L. Toback. Colitur in agris nostris.

NIGELLAE Semen.

Nigella sativa L. Schwarzkümmel. Inter olera colitur.

NITRUM. Salpeter.

Officina nostræ conficiunt.

NUMMULARIAE Herba.

Lysimachia Nummularia L. Pfennigkraut, Schlangenkraut. Crescit in humidioribus locis, floret copiose mensibus aestiuis.

NU.

NUX MOSCHATA f. **NUCISTA**, ejusque *Oleum expressum*.

Myristica Moschata L. Muscaten Nuss. Arbor Indiæ orientalis.

NUX JUGLANS vid. Juglans.

NUX VOMICA. Krähenaugen.

Strychnos Nux Vomica L. Asiatica, arborei.

NYMPHÆ ALBAE & LUTEAE
Flores & Radix.

Nymphæa alba & lutea L. Weiße und gelbe Seerblumen, Wasserrosen, Mümmelken. Crescit in fossis, lacubus, fluviis passim, & floret Iunio & Iulio. Radix ex vtraque planta, flores e lutea colligendi.

O.

OCYMUM vid. Basilicum.

OCULI CANCRORUM vid. Cancer.

OLIBANUM f. **THUS**. Weyrauch.

Gummi-Resina Arboris africanæ *Iuniperi* speciei, sed nondum satis determinatae.

OLIUÆ. Oliven. (*Fructus conditi; Oleum.*)

Olea Europæa L. Ölbaum; Olivenbaum. Europæ australis Arbor,

ON.

ONONIS *Radix, Herba.*

Ononis spinosa L. Stachelskraut, Haushedel. In campis luccis, aridis copiosa, agrorum & pratorum vi-

OPIUM. Mohnsaft, Opium.

Succus insipillatus Papaveris orientalis. Ex Oriente potissimum adferatur.

OPOBALSAMUM vid. Balsamus de Mecca.

OPOPANAX, *Gummi, Opopanax.*

Gummi Resina Pastinacæ Opopanacis L. Europæ australis.

ORCHIDIS f. **SATYRII** *Radix.*

*Orchis militaris & Morio** L. Knabenkraut. Spontanea in pratis humidis crevit.

OREOSELINI *Herba.*

Athamanta Oreoselinum L. Grundheil, Bergpetersilie. Crescit in locis arenosis versus meridiem sitis.

ORIGANI CRETICI *Herba f. potius Spicæ.*

Origanum Creticum L. Cretischer Do-sten, Spanischer Hopfen. Europæ australis, perennis.

ORI-

OR.

ORIGANI VULGARIS Herba.

Origanum vulgare L. Braune Dose,
Wohlgemuth. Crescit in sylvis, flo-
ret Iunio & Julio copiose.

ORYZÆ Semina decorticata.

Oryza sativa L. Reiß. Indica, cerea-
lis, annua.

OS SEPIAE. Weiß Fischbein
vulgo.

Sepia officinalis L. Piscis Oceani.

OSTREARUM TESTAE f. CON-
CHAE. Austerschaalen.

Ostrea edulis L. Ex Oceano.

OVI GALLINACEI Testæ calci-
natæ, Albumen, Vitellus. Ch-
erschaalen, Chweiß, Eyerdot-
ter.

OXYCOCCI Baccæ.

Vaccinium Oxycoccus L. Moosbeeren.
In locis nemorosis paludosis vere col-
ligendæ.

P.

POEONIAE Radix, Flores &
Semina.

Paeonia officinalis L. Päonie. Hor-
tentis, perennis. Varietas in foliis &
radice male mas & femina audit.

P.A.

PALMAE (*Oleum expressum*).

Cocos Nucifera L. Palmbaum. Arbor
Indica.

PAPAUERIS ALBI Capita &
Semina.

Papaver somniferum L. Weißer Mohn.
In hortis & agris colitur cum nigro.

PAPAUERIS ERRATICI f.
RHOEADOS Flores.

Papaver Rhoeas L. Weißer Mohn,
Kratschoren. Inter segetes frequens
plurimis locis.

PARADISI GRANA. Para-
diesföner.

Semina *Amomi Grana Paradisi* L. Plan-
ta Indiae orientalis.

PARALYSEOS Herba, Flores
(*Primula veris*).

Primula veris off. L. Schlüsselblume.
In pratis haud infrequens ficcioribus,
April & Mayo floret.

PAREIRAE BRAUAE Radix.

Cissampelos Pareira L. Brasilianische
Grieswurzel. Americana.

PARIETARIAE Herba.

Parietaria officinalis L. Glaskraut. Ad
oras syluarum in solo umbroso, pin-
gui, humectato; Floret Mayo &
Junio.

PA.

PE.

PASSULAE MAJORES. Große Rosinen.

Uva passa *Vitis Vinifera* L. Europa Australis.

PASSULAE MINORES. Kleine Rosinen, Corinthen.

Uva passa *Vitis apyrena* L. Orientalis.

PASTINACAE Semen.

Pastinaca sativa L. Pastinac, Hortensis, sativa.

PENTAPHYLLUM vid. Quinquefolium.

PERFOLIATAE Herba.

Bupleurum rotundifolium L. Durchwachs. Hortensis planta in agris Thuringia sponte crescens.

PERSICAE Flores & Fructus.

Amygdalus Persica L. Pfirsichbaum. In hortis colitur.

PERSICARIAE Herba.

Polygonum Hydropiper L. *Hydropiper offic.* Flehkraut, Wasserpfeffer. In locis palustribus, aestate exsiccatis, inundatis, fossis humosis frequens.

PERVINCA vid. Vinca Pervinca.

PERUVIANUS CORTEX vid. Chinchina.

PERUVIANUS BALSAMUS
vid. Balf. Peruv.

PETASITIDIS Radix.

Tussilago Petaites L. Pestilenzwurzel. In pratis humidis & ad fossas, ad flumina & aggeres in solo spongiofo humido non rara. Uberrima ad flumina Hercynia.

PETROLEUM (Italicum) album,
flavum.

Steindl. Bitumen liquidum.

PETROSELINI Radix, Herba,
Semina.

Apium Petroselinum L. Petersilien. In hortis colitur.

PHELLANDRIUM AQUATICUM vid. Foeniculum aquaticum.

PIMPINELLAE ALBÆ & NIGRAE Radix.

Pimpinella Saxifraga L. Weisse und schwarze Pimpinell. In pratis & pastuis, agrorum versuris & neglectis locis vulgaris.

PIMPINELLAE ITALICÆ & SANGUISORBAE Herba recens & Radix.

Sanguisorba officinalis L. Weisser Bibernell, Blutkraut. Floret astate & autumno, in pratis depressioribus humidi-

PI.

midinculis crescit. Est *Pimpinella Sanguisorba major officinarum*, distinguenda a *Poterio Sanguisorba minore*, *Italica vulgo*, *Weisse Pimpinelle*, quæ in collibus & apricis sylvarum, locis meridiei oppositis spontanea est, sed colitur quoque in hortis.

PINI *Turiones, Resina (Therbinthina communis).*

Pinus sylvestris L. *Kiehnbaum, Fichte, Kiefer. Arbor nostra. Ope ignis in peculiaribus fornacibus elicetur quoque ex eadem Pix liquida (Theer) & secca seu naualis (Pech).*

PINEAE f. NUCLEI PINI.
Pinten.

Pinus Pineæ L. Ex Italia advehuntur.

PIPER ALBUM & NIGRUM.
Schwarzer und weißer Pfeffer.

Piper nigrum L. Asiatica, Sarmentosa.

PIPER LONGUM. Langer Pfeffer.

Piper longum L. Asiatica, Sarmentosa.

PIPER HISPANICUM seu INDICUM. Spanischer oder Indianischer Pfeffer.

Capitum annum L. In quibusdam hortis colitur.

PISTACIÆ (Nuces). Pistaciæ.

Pistacia vera L. Arbor Orientalis.

PI.

PIX BURGUNDICA, vid. *Abies*.

PIX LIQUIDA & SICCA seu NAUALIS, vid. *Pinus*.

PLANTAGINIS ACUTI f. MINORIS Folia.

Plantago lanceolata L. Schmales Wegebreit. In gramineis & agris communis.

PLANTAGINIS MAJORIS seu VULGARIS Radix & Folia.

Plantago major L. Breitblättriger Wegebreit. Ut prior fere ubique in gramineis ad vias & agros reperiunda.

PLUMBUM, SATURNUS, Blei.

POLII MONTANI *Summitates.*

Teucrium montanum L. Bergposey. Exotica in Thuringia montolis crescens.

POLYGALAE AMARAE Radix & Herba.

Polygala amara L. Kleine Kreuzblume. In locis durioribus Nova Marchia occurrit.

POLYGONATI Radix vid. *Sigillum Salomonis.*

POLYGONI Herba.

Polygonum aviculare L. Blaufraut, Wegetritt. In agris & viis publicis fere ubique crescit.

PO-

P.O.

P.S.

POLYPODII Radix & Herba.

Polypodium vulgare L. Engelsüß. Plantam Parasiticam ex Hercynia, Franconia habemus.

POLYTRICHUM vid. Adianthum.

POMA vid. Mala.

POPULI Gemmæ s. Oculi.

Populus nigra L. Pappelbaum. Crescit ad littora fluviorum & floret in eunte vere; Gemmae hoc tempore colligendæ.

PORTULACAE Herba recens & Semen.

Portulaca oleracea L. Portulac. Hortensis, ex semine deciduo luxuriat.

PRIMULAE VERIS Flores vid. Paralyseos Herba.

PRUNELLAE Herba.

Prunella vulgaris L. Brunelle, Bräunheil, Gottheil. Fere ubique crescit, in gramineis & aruis.

PRUNA nostra, Gallica & Brignolensia, recentia, siccata & condita. Einheimische, Französische Pfauen und Prunellen.

Fructus arboris hortensis *Prunus domestica* L.

PRUNA SYLVESTRIA vid. Acacia.

PSYLLII Semen. Flöhsamen.

Plantago Psyllium L. In locis arenosis Marchiæ copiose crescit.

PTARMICAE Radix, Folia & Flores.

Achillea Ptarmica L. Weißer Dorant, weißer Bertram. Crescit in sylvis & pratis. Floret Iunio & Julio copiose. Male sub nomine Pyrethri datur plerumque.

PULEGII Herba.

Mentha Pulegium L. Poley. In quibusdam locis Marchiæ, cis- & trans Viadrinis in pascuis & ad fossas, littorae maris sponte crescit; ceterum copiose in hortis colitur.

PULMONARIA ARBOREA.

Lichen pulmonarius L. seu *Muscus querinus offic.* Baum- oder Lungen-Moos. Baumlungen-Kraut. In Fagetis & Quercetis Marchiæ Brandenburgicæ.

PULMONARIAE (maculosaæ) Herba.

Pulmonaria officinalis L. Gesleckt Lungenkraut. In sylvis umbrosis & solo spongioso, primo vere floret, folia dein prius magis adulta colliguntur.

PULSATILLAE NIGRICANTIS Herba.

Anemone pratensis L. Küchenschelle. In apicis sterilibus, aridis; floret Aprili.

PY-

P Y.

PYRETHRI Radix.

Anthemis Pyrethrum L. Echter Bertram, Zahnwurzel, Speichelwurzel, Johanniskraut. Planta exotica Europæ australis, non vero Germania. Genuina Radix, quæ ex Italia rarissime ad nos fertur, crassa & napiiformis est; sed diu iam non amplius in officinis genuina haberi potuit, verum semper accipiunt Pharmacopœa Ptarmicæ radicem multo aliam, repente, tenuem, minus aromaticam & acrem.

PYROLÆ Folia.

Pyrola rotundifolia L. Wintergrün. In sylvis acerofosis, & ericetis tristisque muscofo solo reperiunda.

Q.

QUASSIÆ LIGNUM.

Quassia amara L. Americanisch Bitterholz. Arbor americana.

QUERCUS Folia, Fructus (Glandes) & Cortex.

Quercus robur L. Eiche. Nostra, arborea.

QUINQUEFOLII Herba, Radix.

Potentilla reptans L. Fünffingerkraut. Nostra, Floret Julio frequentissima.

R.

RANARUM SPERMA. Froschlaich.

Rana temporaria L.

R A.

RAPÆ Radix recens & Semen.

Brassica Rapa L. Rübe, Feldrübe. Cultur in agris & hortis.

RAPHANI Radix recens.

Raphanus sativus L. Rettig. Hortensis, biennis.

RAPHANI RUSTICANI Radix recens.

Raphanus Rusticanus L. Meerrettig. Hortensis, autumno & hyeme præstans.

RHABARBARI Radix.

Rheum palmatum l. compactum L. Rhabarber. Planta Chinensis, Sibirica, E Russia accedit.

RHAMNI CATHARCTICI seu SPINÆ CERUINÆ Baccæ.

Rhamnus catharticus L. Kreuzbeeren, Hirschbeeren. Arbor passim in collibus, dumetis & sylulis crescens.

RHAPONTICI Radix.

Rheum Rhaponticum L. Rhapontic.

RHODIUM LIGNUM vid. Lignum Rhodium.

RIBIUM Baccæ conditæ.

Ribes rubrum L. Rothe Johannisbeeren. Hortensis, floret Aprili, baccaæ astate perficit.

E

RI-

R.I.

RICINI Semina (Oleum exprefsum.)

Ricinus communis L. Americana, arborea. Wunderbaum.

ROSÆ ALBÆ, PALLIDÆ & RUBRÆ, Flores.

Varietates sunt & ubique in hortis coluntur.

RORISMARINI Folia & Flores.
(vid. Anthos.)

Rosmarinus officinalis L. Rosmarin.
Hortensis.

RORISMARINI sylvestris Folia & Flores.

Ledum palustre L. Post, Wilder Rosmarin, Wanzenkraut. In paludosis crescit pinastrorum.

RUBIÆ TINCTORUM Radix.

Rubia tinctorum L. Färberrotthe. In Marchia paßim & Silesia inferiori colitur.

RUBI IDÆI Baccæ recentes & conditæ.

Rubus Idaeus L. Himbeeren. Planta indigena saxe sylvestris, sed plurimum in hortis colitur.

RUBI NIGRI Fructus.

Rubus fruticosus L. Brombeer. Fru-
tex in agris frequens, in solo pinguior-
i major.

R.U.

RUSCI Radix, Semina.

Ruscus aculeatus L. Mäusedorn. Europæ australis; in hortis floret Februario & Martio.

Nota. Addimus hic ante omissum OLEUM RUSCI, quod est Resina liquida empyreumatica Corticis BETULÆ ALBÆ L. vulgo audit Birken-Theer, Schwarzer Deggend, Thabsbert.

RUTÆ HORTENSIS Herba, Semina.

Ruta graveolens L. Raute, Weinraute. Hortensis, perennis. Floret aestate.

RUTÆ MURARIE Herba. vid. Adianthus album.

S.

SABADILLEOS Semen. Sabadillamen.

Planta exotica, obscura, an Veratri Species? Semina caustica.

SABINAE Folia s. Frondes sub Foliorum nomine.

Juniperus Sabina L. Sabebaum, Siebenbaum. Hortensis, fruticosa; in Siciliæ arenosis spontanea.

SACCHARA varia.

Parantur Berolini alibiue ex Saccharo farinaceo. Succi expressi plantæ juniores arundinaceæ Indiæ orientalis *Saccharum officinale* L. dictæ.

SA-

SA.

SAGAPENUM vid. Gummi Sapeni.

SAGO, SEGO, SAGOU. Sago, Indianischer Palmengries.

Est medulla Palma orientalis (*Cycas circinalis L.*) in scobem redacta.

SAL AMMONIACUM. Salmiac.

Factitium Magdeburgense. Ex acido Salis & Alcali vino.

SAL CATHARCTICUM ANGLICANUM commune, English Bittersalz.

Ex Acido Vitrioli cum terra muriatica.

SAL COMMUNE seu CULINARE, & GEMMAE Rüchensalz, Steinsalz.

Ex Acido Salis communis cum alcali fixo minerali.

SAL EPSOMENSE seu EBSHAMENSE. Epsomer Salz.

Ex acido vitriolico cum terra muriatica.

SAL MIRABILE GLAUBERI, Glaubers Wundersalz.

Magdeburgia nunc conficitur. Ex Acido vitrioli & alcali salis communis siue mineralis in officinis nostris paratur.

SA.

SAL SEDLIZENSE. Sedlicher und Seidschützer Salz.

Ex aquis Sedlizenibus crystallisatione paratur, ejusdem indolis & virtutis, ac Sal anglicum.

SALAB, SALEP Radix. Salapwurzel.

Orchis mascula L. Radix Persica vel Orientalis tuberosa e variis Orchidum speciebus ope aquæ feruida emollitis confecta & exsiccatione iterum indurata.

SALICARIAE Herba. vid. Ly simachia purpurea.

SALICIS FRAGILIS Cortex.

Salix fragilis L. Bruchweide. Nostra. Cortex ramorum annuorum vel biennium e stolonibus & virgis plantæ humilioris (non facile arboris annofioris).

SALICIS PENTANDRAE Cortex.

Salix pentandra L. Salix laurea. Loerbeerweide. De hujus Cortice idem tenendum ac de priore.

SALUIAE VULGARIS seu MIRONIS Folia & Flores.

Salvia officinalis L. Salben. Hortensis.

SALUIA MAJOR vid. Balsamita.

SA.

SAMBUCI Cortex mediis, Flores, Baccæ.

Sambucus nigra L. Hollunderbaum, Fließerbaum. Sativa & spontanea mensibus æstiuis florens.

SANDARACA vid. Gummi Sandrac.

SANGUIS DRACONIS. Drachenblut.

Resina vel ex *Dracæna Dracone* L. vel *Pterocarpus Dracone* L. Indica. Optima, quæ in parvis frustulis, foliis junceis vel palmæ involuta reperitur, species; impura & fucata, quæ in maiores massas compacta affertur.

SANGUISORBAE Radix & Herba vid. Pimpinella Italica.

SANICULÆ Herba.

Sanicula Europæa L. Sanikel. In sylvis nostris passim occurrit.

SANTALUM vid. Lignum Santali.

SANTONICI Semen vid. Cynæ Semen.

SAPO ALICANTICUS s. **HISPANICUS**, Alicantische oder Spanische Seife.

SAPO VENETUS, Venetianische Seife.

Ex Soda hispanica & oleo Oliuarum parentur.

SA.

SAPONARIAE Radix & Herba.

Saponaria officinalis L. Seifenkraut, Rothe Seifenwurzel.

Nota. Plerumque Saponariæ albæ, quæ vero non est Saponaria, sed *LYCHNIS DIOICA* L. radix hujus loco in officinis venditur, sed male, quare Pharmacopolæ admonentur, ne imposturum hunc errorem committant.

SARCOCOLLA, Fleischgummi.

Succus gummeo-refinosus induratus ex Persia adfertur & stillat ex fruticosa *Pencea Sarcocolla* L.

SASSAPARILLAE Radix.

Smilax Sassafrilla L. Americana, Sarmientoa.

SASSAFRAS Lignum, Cortex & Radix.

Laurus Sassafras L. Americana.

SATUREJAE Herba.

Satureja hortensis L. Saturey, Pfafferaut. Hortensis, annua.

SATYRII Radix.

Orchis Morio L. Knabenwurzel, vid. Orchis.

SAXIFRAGÆ ALBAE Herba & Radix.

Saxifraga granulata L. Weisser Steinbrech. Planta verna in elatioribus cam-

SC.

campestribus, tenuique cespite vestitis collibus circa Berolinum haud rara. Radicum bulboli sub nomine Seminis Saxifragæ in officinis siccii prostant, vere & autumno collecti, e plantis quæ caules nondum tulerunt. Pro Saxifragia sèpius in officinis occurrit *Cerastrum arvense*, sed minus recte.

SCABIOSÆ Herba & Flores.

Scabiosa arvensis L. *Apostemkraut*, *Scabiosen*. Planta perennis & viuax; crescit fere ubique in pratis elatiobus, agris, locis neglectis & viis publicis.

SCAMMONIUM.

Succus condensatus gummeo-resinosus, modo è radice, modo ex tota planta Orientali, *Convolvulus Scammoneum* L. dicta, in Aegypto, Syria & Palæstina præsertim indigena. Sèpius variis Succis plantarum analogarum, *Afclepiadis Syriacæ*, *Euphorbiæ*, aliorumque mixtus est. *Vulgare* est *Smyrnæum* cum varietatibus; *Aleppicum* hodie bonum, reliquis purius.

SCILLA vid. Squilla.

SCLAREÆ seu HORMINI
Herba tota.

Salvia Sclarœa L. *Muscatellerkraut*, *Scharleykraut*. *Hortensis annua* vel biennis.

SCOLOPENDRII Herba.

Asplenium Scolopendrium L. *Hirschjunge*.

SC.

SCORDII Herba.

Teucrium Scordium L. *Lachenknoblauch*. Crescit in paludosis ad fluvia Spree & Viadrum sitis, in terra humosa & valde spongiosa, reptata luxuriat inter radices caricis & arundines. Tripli facie occurrit planta, Julio & Augusto colligenda, vel florida vel adolescens.

SCORZONERAЕ Radix. Schlan-
genwurzel, Scorzonere.

Scorzonera hispanica L. In hortis sata temperata, spontanea, nostra, americana. Floret vere vel aestate; radices his temporibus collectæ e Thuringia ad nos perueniunt, a *Scorzonera latifolia* humili sunt defumta.

SCROPHULARIÆ Radix.

Scrophularia nodosa L. *Braunwurzel*. Communis planta in locis umbrosis, nemorosis, ad muros, sepes & fossas crescit, vere & aestate floret; Radix non lignoso-cariosa esto, sed junioris plantæ, quæ caules nondum emisit.

SECALIS Fruclus, farina.

Secale cereale L. *Rogggen*, *Rokken*, *Korn*. *Satiua*, *cerealis*.

SEDI MAJORIS & SEMPER-
UIUI Folia.

Sempervivum teetorum L. *Groß Hauslaub*. In muris antiquis & tectis dormorum rusticarum crescit.

SE.

SENECIO Herba recens.

Senecio vulgaris L. Krenzkraut, Vogelkraut. Fere ubique crescit, ante deflorescentiam colligenda.

SENEGAE Radix. Seneca.

Polygala Senega L. Virginische Klapverschlangenwurzel. Radix ex America meridionali adfertur, sed vires ejus plenarie supplent Bardana & Saponaria.

SENNAE Folia cum, vel sine foliulis. Senneshäätter.

Cassia Senna L. Orientalis, fruticosa. In Syria, Aegypto & Græcia sativa est, rarius in Sicilia & Maltha; tenera in hortis herba est.

SERPENTARIAE VIRGINIANAE Radix.

Aristolochia Serpentaria L. Virginianische Schlangen- oder Mutterwurzel. Ex prouinciis America septentrionalis radix exilis fibrosa aromatico-camphorata adportatur, sed saepe aliis mixtis defraudatur.

SERPYLLI Herba cum Floribus.

Thymus Serpyllum L. Feldkümmel, Quendel. In locis aridis & pinguisbus vulgatissima. Julio & Augusto floret.

SEVUM BOUINUM, CERUNUM, HIRCINUM. Rinds-, Hirsch- und Bockstalg.

Recentia, non rancida sint.

SI.

SIDERITIS Herba florens.

Sideritis hirsuta L. Weissenzies, Berufskraut, Gliedkraut. Crescit in pratis aridioribus ad margines, in collibus & locis elatioribus incultis, floret Julio & Augusto.

SIGILLI SALOMONIS seu POLYGONATI Radix.

Conuallaria Polygonatum L. Weißwurzel. Ad sepes & in sylvis crescit. Binæ species *uniflora* & *multiflora* radicem largiuntur officinis. Radix repens horizontalis, alba, geniculata & carnosæ, vere & autumno effodienda.

SILIQUA DULCIS. Johanniskroß.

Siliqua Ceratoniae *Siliqua* L. Arboris Europæ meridionalis.

SIMARUBÆ Cortex.

Quassia dioica L. Amerikanischer Gummibaum. Americana, arborea. Ex Insulis Charibæis, Jamaica, Curaçao &c. venit.

SINAPIS Semen album & rufum.

Sinapis alba & *nigra* L. Weißer und schwarzer Senf. Prior in hortis colitur, nigra, quæ arvensis, inter vicia agrorum numeratur.

SODA. Sodafalz.

Alcali fixum minerale Salis marini. Ex incineratione plantarum variæ generis maritimaru[m]. *Soda hispanica*, (*Barrillas*) e *Mesembryanthemo* latino *no-* *distoro* L. SO-

SO.

SOLANI SCANDENTIS seu
DULCAMARAE *Stipites &*
Cortex radicis caulisque cras-
fioris.

Solanum Dulcamara L. Bittersüß, M-
franken, Je länger, je lieber, Cres-
cit ad fossas & sepes.

SOLANI NIGRI *planta tota*
florida.

Solanum nigrum L. Nachtschatten, Sau-
kraut. In locis cultis crescit.

SONCHI LAEUIS *Herba recens.*

Sonchus oleraceus L. Hasenkohl, Gän-
sedistel. Planta annua ubique obuia
in cultis & satis, aestate & autumno
florens, quo tempore colligenda pro
succo expresso.

SORBI AUCUPARIAE *Baccæ,*
Fungus.

Sorbus aucuparia L. Ebereschen, Quitsch-
beeren. Passim spontanea crescit in
subhumidis Alnetis & umbrosis. *Fun-*
gus est *Boletus* sessilis inexplicatus,
etiam in aliis arboribus, tuberosus, co-
loris albi aut cani.

SPERMA CETI Wallrath.

Materia ex cerebro *Physeteris Macroce-*
phali L. (Walfisch) excocta, & ope-
lixivii alcalini &c. depurata.

SPIGELIÆ *Planta tota.*

Spigelia anthelmia. Americanisches Wurm-
kraut. Ex America meridionali adfertur.

SP.

SPINA CERUINA vid. *Rha-*
mnu catharticus.

SPINACHIAE *Herba recens.*

Spinacia oleracea L. Spinat. Hor-
tenfis, culta.

SPIRITUS FRUMENTI. Korn-
brandwein.

SPIRITUS VINI GALLICUS,
Franzbrandwein.

SPONGIA, Schwamm, Bade-
schwamm.

Spongia officinalis L. Ex Oceano.

SQUILLAE, SCILLAE Radix
seu Bulbus.

Scilla maritima L. Meerzwiebel. Exo-
tica, australis, maritima, perennis.
Cineribus assata, sicca ex Hispania,
Galliaque meridionali ad nos defertur.

STANNUM, JUPITER. Zinn.

Anglicanum purissimum f eligendum.

STAPHISAGRIAЕ Semen. Läß-
sesamen, Steffensköerner.

Delphinium Staphisagria L. Italica.

STIBIUM vid. Antimonium.

STOECHADOS ARABICAE
Flores.

Lauandula Stachys L. Exotica planta,
e Gallia maritima meridionali adfer-
tur. Sed facile sub itinere mucosæ
sunt flores.

STOE-

ST.

STOECHÁDOS CITRINAE

Flores.

Gnaphalium Stoechas vel arenarium L.
Gelbe Winterblumen, Flussblumen,
Weinblumen. Crescunt in locis ari-
dis, arenosis collibus & totaestate
florent.

STRAMMONII *Herba, Semina.*

Datura Stramonium L. Tollkraut,
Stechapfel. In ruderatis locis, circa
pagos & in ipsis hortis quotannis e
femine deciduo luxuriat.

STYRAX CALAMITA. Sto-
ray, Rother Storax.

Resina Styracis officinalis L. Arboris
Orientalis. Tres dantur Styracis
species

1) *Styrax in cannulis s. in lacrymis,*
quaꝝ vero rarissime reperitur in offi-
cinis.

2) *Styrax in Maffulis s. rubra.*

3) *Styrax vulgaris officinarum, leuior,*
impura, scobibus mixta.

STYRAX LIQUIDA. Flüssiger
Storax.

Debet esse Succus resinofus Arboris Ame-
ricæ septentrionalis *Liquidambar Sty-*
racifluæ L.; sed quaꝝ hodie ad nos
venit, massa est impura, s̄epe cum
Therebinthina mixta.

SU.

SUCCISÆ seu MORSUS DIA-
BOLI *Radix, Herba.*

Scabiosa Succisa L. Teufels Wbiß. In
pratis ficeis & humidis crescit, estate
& autumno floret. Folia Mayo &
Junio, Radix Aprili & Octobri, colli-
guntur, viribus Scabiosæ.

SUCCINUM seu ELECTRUM.

Agtstein, Bernstein.

Succinum electricum L. In Borussia &
Pomerania, vel ad littora maris Bal-
thici ejectum reperitur, vel e terra
effoditur.

SULPHUR caballinum, citrinum,
natuum & saclitium. Grauer
oder Rößschwefel, Gelber, Gegra-
bener und Krahmschwefel.SYMPHYTI *Radix vid. Consoli-*
da major.

T.

TABACUM *vid. Nicotiana.*TACAMAHACA *vid. Gummi*
Tacamahacæ.TAMARINDI *Fruclus s. Siliquæ*
(*Pulpa*).

Tamarindus Indica L. Tamarinden. Ar-
bor Indiæ Orientalis.

TA-

T.A.

TAMARISCI Cortex.

Tamarix Germanica. Tamariskenstrauß.
Frutex in Austria, Bauaria, Sveuia ad
tipas fluuiorum.

TANACETI Folia, Flores & Semina.

Tanacetum vulgare L. Gelber Rhein-
saren, Krautkraut, Wurmfräut. In
agris optimæ notæ eorumque versuris
syluisque cum Filice & Rubo reptatu
radicum magna spatia occupat.

TARAXACI Radix, Herba recens.

Leontodon Taraxacum L. Pfaffenröh-
lein, Löwenzahn, Butterblume. Fre-
quentissima. Radices Aprili & Octo-
bri, Folia Majo & Junio colligenda.

TARTARUS CRUDUS albus & cru-
ber. Weißer und rother Weinstein.

Est productum fermentationis vinoſa,
continens sal essentiale acidum vini,
cum oleofis & terrestribus particulis
permixtum, plus minus impurum.

TERRA JAPONICA, vid. Catechu.

THEA fusca & viridis. Teeboh,
Grüner Thee.

Thea Bohea & *T. viridis* L. Indicæ,
Chinenes. Sunt folia ab arbore in
varia ætate, cum stipulis & rudimen-
tis decerpta & varie exsiccata.

THEREBINTHINA COMMUNIS,
Gemeiner Terpenthin.

Resina *Pini sylvestris* L. vid. Pinus.

THEREBINTHINA DE CYPRO

seu CHIO, Cyprischer Terpenthin.
Pistacia Therebinthus L. Exotica.

T.H.

THEREBINTHINA VENETA ET
ARGENTORATENSIS. Vene-
discher und Straßburger Terpenthin.
Pinus Larix L.

THUS vid. Olibanum.

THYMI Herba cum floribus. Thymian.

Thymus vulgaris L. Planta sativa, per-
ennis, duplex, Junio saepius & autum-
no florens.

THYMELÆA vid. Mezeræum.

TILIÆ Flores, Folia, Cortex. Lin-
denblüthe.

Tilia Europæa L. Arbor vulgaris noti-
tia, inter nostrates florentes fere vlti-
ma. Et Carbones Tilia adhibentur.

TORMENTILLÆ Radix, Herba.

Tomentilla ereda L. Ruhewurzel, Blut-
wurzel, Tormentillwurzel. In erice-
tis, siccoribus & collibus apud nos
frequens.

TRAGACANTHA, vid. Gummi
Tragacanthæ.

TRAGOPOGON Radix.

Tragopogon officinale L. Haberwurzel.
In hortis colitur.

TRIFOLII FIBRINI vel AQUA-
TICI Herba & petioli.

Menyanthes trifoliata L. Bittersee,
Biebersee, Klappe. In pratis hu-
midis, paludosis luxuriat omnium
maxime, & maximam saepius sœnu
partem in paludosis constituit.

F

TRI-

TR.

• TRITICI Semina. Waihen.
Triticum hybernum & cestuum L. Cerealis, sativa.

TUNICAE Flores. Gartennelken.
Dianthus Caryophyllus L. Hortensis, varietas florē simplici & pleno. Petala sola atro rubentia odoratissima.

TUNICAE SYLVESTRIS Flores.
Dianthus Carthusianorum L. Wilde Nelken, Cartheuser-Nelken. Spontanea, arvensis.

TUSSILAGINIS Folia & Flores.
Tussilago Farfara L. Hufstattich, Brandtich. Copiosissima in agris & montibus argillosis, calcareis, campis humidiusculis limofisis, ad oras fluuiorum & flumentorum Comitatus Hohensteinensis & in viciniis subalpinis, ibi quam maxime luxuriat, vt Petafites.

TUTIA. Tutie.

Tutia grysea WALL. Est sublimatum Zinci ex Aurichalci fusione.

V. U.

VALERIANAE MAJORIS f.
 HORTENSIS Radix.

Valeriana Phu L. Großer Garten-Baldrian. Incola calidioris Europæ regionum, perennis; in hortis hinc inde colitur.

VALERIANAE MINORIS seu
 SYLVESTRIS Radix.

Valeriana officinalis L. Wilder Bald-

VA.

drian. Planta perennis, in montibus, collibus saxosis, præruptis syluisque siccoribus crescens optima; quæ vero in pratis humidis aut circa paludes & ad fossas crescit, vilior est.

Florent ambæ sub veris exitum, & minor tota æstate. Radix vtriusque vel triennis primo vere, & vel ante foliorum explicationem, vel sub ipsa, effodienda, umbra siccata, integra (non puluerisata) in vitris obturatis asseruanda.

VANILLA offic. Vanille. Vanille. Est fructus pulpa nigra repletus, folliculo longo angusto siliquoso similis, odoratissimus, aromatico-balsamicus, plantæ scandentis parasiticæ *Epidendron Vanilla L. Americanæ; Stanno munitus contra mucorem custoditur.*

VERBASCI Flores & Folia.

Verbascum Thapsus L. Wollkraut, Rö-nigskerze. In fabulosis, arenosis collibus & agris frequens, biennis.

VERBENAE Herba.

Verbena officinalis L. Eisenhart, Eis-enkraut. In ruderatis & neglegitis locis passim, circa vias & pagos, floret æstate.

VERMES MAJALES. Maywürmer.

Meloe majalis L. Ex classe Coleopterorum (mit halben Flügeldecken). In agris, pratis & collibus soli meridiano expositis reperiundæ, & mense Mayo tempestate calida, siccæ, cœloque sereno colligendæ, ea cum cœtela,

VE.

tela, vt forcipula, leniter absque pressione, ne mucilago perdatur, capta, statim olla vel vitro postea bene obturando immittantur. vid. Be-kanntmach. des specif. Mittels wider d. tollen Hundsbiss. Berlin 1777.

VERONICAE Herba tota, cum, vel sine floribus.

Veronica officinalis L. Ehrenpreis. In ericetis & paucis arenosis, campestribus & feracioribus, Junio & Julio colligenda.

VICTORIALIS LONGAE Radix.

Allium Victorialis L. Ullermannus Har- nisch. Crescit in Silesia montosis al- tioribus copiose; rarioris viss, tamen alliacea perennis bona radix bulbosa. Floret Julio.

VINCAE PERUINCAE Herba seu Folia.

Vinca minor L. Immergrün, Winter- grün. Perennis, repens, indigena & locis quibusdam satis certa umbrosis, spongiosis atque humidiusculis sylua- tis, ad radices collum. Floret Martio & Aprili, colligenda totaestate.

VINCETOXICI Radix.

Asclepias Vincetoxicum L. Schwal- benwurzel. In locis montosis, eri- cetis & circa colles fabulosas non rara. Floret estate, radices primo vere & autumno colligendæ.

VI.

VINA DULCIA & AUSTERA.

Ordinarium, Gallicum album & rubrum, Rhenanum, Hispani- cum. Landwein, weißer und ro- ther Franzwein, Rheinwein, Spa- niischer (süßer) Wein.

VIOLARUM Flores recentes, Fo- lia, Radix & Semina.

Viola odorata L. Märlviole. Sponta- nea & hortensis. Martio & Aprili floret, radix primo vere, folia estate cum seminibus colligenda.

VIRGAE AUREAE Herba.

Solidago virga aurea L. Heiden- oder heidnisch Wund-Kraut. Florida Au- gusto & Septembri in ericetis, macro- folo, collibus & fabulosis abundat. Non cum *Senecione Saracenica* con- fundenda.

VIRIDE AERIS vid. Aerugo.

VISCI Lignum & Folia e ramis ju- nioribus Januario & Februario deprompta.

Viscum album L. Mistel. Planta pa- rasitica ad varias arbores crescens, vissalis, quæ ad Quercum, Pinum & Betulam.

VITIS IDEAE Baccæ.

Vaccinium Vitis Idæa L. Preißelbe- ren. Copiose crescunt in ericetis et sterilibus.

VI.

VITRIOLUM ALBUM, Weißer,
oder Zinck-Vitriol.

Vitriolum Zinci WALL. Ex officinis
Goslariensis. Depuratur 4 — 5
vicibus; dein prima Crystallisatio su-
matur.

VITRIOLUM COERULEUM seu
DE CYPRO. Blauer, Kupfer-
Vitriol.

Vitriolum Cupri W. Facitium depura-
tissimum e laminae Cupri. Prima cry-
stallisatio.

VITRIOLUM VIRIDE seu MAR-
TIS. Grüner, Eisen-Vitriol.

Vitriolum Martis W. Aliquoties solu-
tum ex crystallisatione prima eligen-
dum.

ULMARIAE Flores, Radix & Herba.

Spiraea Ulmaria L. Geißbart, Johannis-
wedes. Ad fossas & margines palu-
strium; floret Junio & Julio.

ULMI Folia & Cortex ramorum
(Liber).

Ulmus campestris L. Ulmbaum, Rü-
stern. Spontanea & sativa, in syl-
vis & pagis. Floret Martio & Aprili.

URTICAE Herba tota florens.

Urtica urens & dioica L. Breunessel.
In locis neglectis ad sepes, & vi-
brosis pinguioribus syluarum, cum
Urtica minore, Heidenessel, in agris,
hortis & cultis reperiunda.

VI.

UU.

UUAE URSI Folia.

Arbutus Uva Ursi L. Bärentraube.
In Marchia electorali & noua, in syl-
uis trans Viadrinis & in primis ad Ca-
nalem publicum Sprevano - Viadri-
num (Friedrich - Wilhelms Graben
vulgo) copiose crescit, ut & in Po-
merania & Borussia quibusdam locis.
Floret Majo & Iunio.

W.

WINTERANUS CORTEX. Weiß-
ser Zimmet.

Winteraria aromatica L. Americana,
arborea.

Z.

ZEDOARIAE Radix. Zittwerwurzel.

Kämpferia rotunda L. Ex India Orien-
tali, vt longa, ejus varietas.

ZIBETHUM. Zibeth.

Substantia pinguis, unguinosa, fragran-
tissima ex folliculo peculiariter in infimo
ventre *Viueræ Zibethæ L.* animalis
Brafsiliensis, Guineensis & India Orientalis
reperiundo, desumpta. Sed vix
hodie unquam vera & genuina datur,
rarioris quoque usus, in Medicina vix
ullius.

ZINCUM Zinck. Goslariense Angli-
canum.

ZINGIBERIS Radix, Conditum.

Amomum Zingiber L. Ingwer. Asiatica.

PRÆ-

P R A E P A R A T A
E T
C O M P O S I T A.

ATLANTIS
COPPIA



ACETUM.

ACETUM.

Nobilissimum hoc est Chymia produc-
tum. Neque autem a vero aber-
rant, qui existimant, facile nos carere pos-
se cæteris aceris compositis, tot laudibus
a majoribus celebratis, si modo purissimum
fuerit hoc.

Docet autem multiplex experientia, arti-
fices aucto suo aciditatem conciliare ad-
ditione olei vitrioli. Ergo non possumus,
quoniam serio admoneamus Pharmacopeos, ne
recipient in officinis ullum vini acetum,
quod non prius probauerint, an sit purissi-
mum, absque dicto artificio paratum.

Solutur nempe cretae ea quantitas in aceto
destillato, quam recipere in sinu potest ace-
tum. Solutio haec, quando instillatur aceto,
crystalli selenitici se in fundum præcipi-
tant, si acetum oleo vitrioli sit mangonisa-
tum. Si vero maneat clarum & perspi-
cum, indicari potest sincerum.

ACETUM COLCHICUM.

R. Radicis colchici recentis succu-
lentae dissectæ, Vnciam vnam,
Aceti vni, Libram vnam.

Macera leni calore per biduum, & po-
stea cola cum expressione.

ACETUM CONCENTRATUM.

Acetum vini rigida hyeme, in vase
ligneo concrescat in glaciem, qua perfracta,
acetum in medio contentum decantetur.
Satis concentratum est, si eius drachma suf-
ficit ad saturationem falsi tartari scrupuli
vnius.

Eodem modo concentratur *Succus Citri*,
si ad tertiae partis remanentiam gelu
cogitur.

ACETUM DESTILLATUM, f.

SPIRITUS ACETI.

Aceti vini circiter quarta pars e cucur-
bita vitrea eliciatur destillatione per alem-
A . bicum

AC.

bicum vitreum, balnei calore. Haec phlegma est. Mutato tunc recipiente protrahatur destillatio, quam diu clarus nec empyreumaticus Spiritus prodit, qui seruetur.

ACETUM PROPHYLACTICUM.

Jure neglectum a practicis vidimus. Si autem quispiam aequum duxerit ad manus in pestilentia habere medicamentum, quod miasmatis vim infringere valeat; operaे premium nos facturos putamus, huius loco e Codice Medicamentario Paris: pag. 27. quod nomine: *Vinaigre des quatre Volleurs* venit, eam ob cauſam huic loco inferere, quoniam magnam in illo fiduciam posuerunt nonnulli, & ad experientiam prouocant pestis tempore remedium praebuisse efficacissimum.

Descriptio sequitur

R. Summitatum recentium,
absynthii maioris
minoris
roris marini
saluiae
menthae
rutae, ana vnciam
vniam & semis
Florum lauandulae siccatorum,
vncias duas
Allii, drachmas duas,
Calami aromatici,
Cinnamomi,
Caryophyllorum,
Nucis moschatae, ana drachmas
Aceti optimi, libras octo.

AC.

Macera calore solis vel igne arenae in matratio rite obturato per duodecim dies. Cola. Exprime fortiter & filtra. Tum adde

Camphorae spiritu vini solutae,
semi vnciam.

Nota. Neque vero præcipimus, ut Pharmacopœi illud medicamentum omni tempore in promptu habeant; sed, ut sciant præparare, si graffante morbo maligno optauerit vulgus hoc medicamentum.

ACETUM ROSARUM.

R. Florum rosarum sereno cœlo collectorum, & in umbra mediocriter siccatorum, libram dimidiā, Aceti vini optimi, libras tres.

Infundantur, stentque in lagena bene obturata, per octo dies; Colatura seruetur ad usum.

ACETUM RUBI IDAEI.

R. Baccarum Rubi Idaei, partem vnam,
Aceti vini, partes duas,
Infundantur in vitro commodo, & reponantur.

ACETUM RUTÆ.

Paretur ex summitatibus, vti Acetum rosarum. Sic quoque

ACETUM SAMBUCI FLORUM.

ACETUM LYTHARGYRII f.
SATURNINUM.

R. Lythargyrii subtilissime triti, libram vnam,
Aceti vini fortissimi, libras duas
Stent

AC.

Stent in infusione per aliquot dies, sanguis interdiu agitando, post macerationem residere sinito, & clarissimum seruetur pro vnu extero.

ACETUM SQUILLITICUM.

R. Scilla laminarum inter externum corticem & medullam medium exakte purgatarum, & in taleulos sectarum, vniciam vnam;

Soli aut remisso calori expónantur, donec marcescant, minutim scisse lagenæ indantur vitreæ, ac aceti vni optimi libra una affundatur, in vitro rite obturato macerentur per octo dies ad sufficientem extractionem; postea transcoletur, & lagenis diligenter occlusis afferuetur.

ACIDUM TARTARI, vjd.

CREMOR TARTARI.

AERIS FLORES.

Operiosem illam in Dispensatorio veteri compositionem iure omittimus, substituentes sequentem minori dispendio parandam.

Aerugo scilicet aceto destillato soluitur, digestioni committitur, per emporeticam filtratur, liquor filtratus, exhalatione prægressa, in crystallos cogitur, quæ, si non fatis puræ & Saphiri instar pellucidae, prima vice prodeunt, nouæ solutioni & crystallisationi ut antea committenda.

AE.

AES VSTUM.

Veteres laminas æris, sulphuris & salis partibus æquilibus stratificatas, in vase operculo clauso, iuncturisque lutatis, relictæ solum spiraculo, calcinabant igne sufficienti. Augustani alterutro eorum addito calcinationem instituunt, ac post calcinationem lauare & edulcorare iubent. Zwelfferus edulcorationi huic contradicit. Vtrobilbet autem modo paratum pro diuersitate intentionis & applicandi ratione, siue cum sale aut sulphure solo, siue cum vtroque iunctim, siue edulcoratum fuerit, siue non, usui erit.

Conficitur quoque modo vulgari, dum æris lamina in furno reuerberii vel sigulino tamdiu vruntur, donec conteri possunt, & in crocum quasi abeunt. Faciliori autem negotio idem labor absoluitur, si frusto cupri oblongo valde candescendi subito sulphuris fruitulum admouetur, vbi exemplo cuprum in superficie liquefcat, ac in crocum quasi conuersum in vas aqua frigida repletum delabetur.

AETHIOPS ALCALISATUS.

R. Mercurii vivi rite depurati, drachmam vnam
Lapidis cancrorum, drachmas duas.

Misceantur, adspergendo interdum aliquot aquæ guttulas, diurna trituratione, in qua, in aethiops paratione, omnino res sita est tota, in mortario lapideo, usque ad perfectam vniōnem, vt etiam microscopii ope globuli mercuriales non detegantur.

AE.

AETHIOPS ANTIMONIALIS.

R. Antimonii crudi subtilissime triti,
uncias duas,

Mercurii vivi purissimi, vnciam
vnam.

Misce. Terantur tam diu, donec omnis
mercurius penitus dispareat.

AETHIOPS MARTIALIS.

R. Limatura ferri purissimi, non ru-
biginofsi, quantum placet;

In vase vitro lato affundatur aquæ flu-
viatilis ad supereminentiam sex digito-
rum. Limatura quotidie sub aqua agite-
tur spatula lignea, obseruando simul, vt
aqua semper eadem quantitas superemineat.
Hoc per plures hebdomades continuato,
magna ferri pars in puluerem valde nigrum
faſelicit in aqua per aliquot minutæ ſuspen-
ſilem. Aqua illa turbida decantetur, vt
quieta demittat puluerem, qui ab aqua ſe-
paratus ſiccari celeriter debet atque vasis
clauſis feruari.

AETHIOPS MINERALIS.

R. Mercurii currentis probe aceto &
ſale depurati, a ſale rufus ab-

luti, ac optime exſiccati,
Florum ſulphuris, partes aequales.

Misceantur in mortario vitro, piftillo
perinde vitro, aut ligneo exacte mundo,
ſedulo piftillum circumrotando, ſubigantur,
donec mercurius floribus mixtus plane di-
ſpareat, nec vſquam eius quicquam, aut
veſtigium aliquod appareat; ſed ſollicita
ſubactus, & in puluerem tenuiſſimum iuſci-

AE.

AG.

coloris redactus, temporis tandem traſcu-
in nigerrimum vertatur.

AETHIOPS SACCHARATUS.

R. Sacchari albi, vncias duas,
Mercurii vivi, drachmas ſex,
Misce. Terantur exactiſſime.

AGARICUS CHIRURGORUM.

Agaricus pedis equini facie, in caudici-
bus quercuum antiquorum qui reperitur,
mense Auguſte vel Septembri colligatur,
& ſuperiori duriori ac inferiori filuſoſa
ſubtantia follicite cultri ope remoſis, me-
dia tenerior pars exſiccata tamdiu malleo
perfundatur, donec agaricus pellis inſtar
tupicapre inter digitos diduci queat; qnæ
in maiores & minores laminas diſcindatur
& in uſum ſeruari.

ALOE DEPURATA.

R. Aloës ſocotrinæ, quantum vis,
ſolue aqua fontana ſimplici (et
iam abſque coctione, vt quibus-
dam placet) ſolutam filtra, & in
balneo vaporoso exhalando ad
confiſtentiam pilularum iuſpiſſa.

ANTIMONIUM CRUDUM
PRÆPARATUM.

Antimonio crudo trito, & ſuper lapi-
dem levigato affundatur aqua, que dein,
ex repetita vafis ampli agitatione, polline
tenuiſſimo ſaturata effundatur, & quiescat,
vt ſubideat puluis ſubtilis. Puluis crassus,
que in aqua ſuſtinere nequit, iterum levi-
getur, & eodem traſcetur modo.

ANTI-

AN.

ANTIMONII CINNABARIS
ET BUTYRUM.

R. Antimonii crudi optime pulveri-
fati aut super marmore triti,
partes quinque,
Huic misce sollicite terendo
Mercurii sublimati corrosiui
partes duodecim,

Inde retortæ vitreæ capacis colli (si vis,
loricatae), stet in cella, aut loco frigido &
uvido diem vnum & alterum, orificio re-
tortæ aperto, tum applicato recipiente ca-
paci, iuncturis optime clausis, ex arena,
aut, quod melius, balneo sicco, igne sensim
graduato, enoca prius Butyrum, ac si in
collo, ob externum frigus nimium concre-
uerit, & obturationem colli minetur, ad-
mota caute pruna, liquefaciendo destilla-
tionem in vas recipiens promoue, sive
iusto ignis gradu Butyrum omne elice, quod
postmodum vel digerendo, vel rectificando,
in liquorem seu oleum resolute, ac post-
quam Mercurium viuum resuscitatum, qui
partim in collo retortæ suspensus, partim
cum butyro in recipientem relapsus, solli-
cite reparaueris, olei, seu butyri Antimonii
nomine serua.

Butyri proventu plane cessante, ignem
ad fortissimum gradum adauge, ut adscen-
dat *Cinnabaris antimonii*; que vero,
refrigeratis omnibus, reiecto prius sul-
phure cum ipsa sublimato, illaque ad-
harente, conterenda, aqua fontana abluen-
da, iterumque nouæ sublimationi sufficien-
da est.

AN.

ANTIMONIUM DIAPHORETI-
CUM SIMPLEX.

R. Antimonii crudi optimæ notæ,
partem vnam,
Nitri purissimi subtilissime pulve-
risati & bene siccati, partes tres.

Conterendo misce exacte, & in cruci-
bulo, capaci ignito detona successiue, vbi
omnis materia detonuerit, crucibulum rite
tege, ne quid carbonum illabatur, tum
aucto igne super impositis etiam crucibulo
prunis intenso, calcina per dimidium vnius
horæ liqua, ac in fluxu, aliquantisper, &
quamdiu poteris, serua. Cae autem, ne
nitrum fluens crucibulum perforando jactu-
ram materię, temporis, laboris & impen-
sarum pariat: Quamprimum igitur extra
crucibulum flamمام solito lucidiorem in
ipsius ambitu animaduerteris, affer ab
igne crucibulum ocyus, &, vti supra dictum,
in mortarium ferreum mundum calefactum
effunde, ac vbi induruerit, mox pistillo
calido in puluerem reduc, edulcora ac ser-
ua. Sic unica operatione Antimonium
diaphoreticum satis efficax ac tutum nan-
cisceris.

Amant quidam & laudant minus edul-
coratum seu non ablutum præ edulcorato,
ob insignes, quos experientia illorum com-
probat, effectus.

ANTIMONII REGULUS
MARTIALIS.

R. Chalybis frustulorum, calami scri-
ptorii erasitiem, ac dimidii digitii
longitudinem non excedentium,

A 3

aut

AN.

aut Limaturæ ferri non rubiginosi,
vncias quatuor.

Inde crucibulo valido satis capaci, ac
igne intenso furni anemii, aut follibus
audo, vrge, vt candescant, quibus tum
adde

* Antimonii crudi, grosse avella-
narum ad instar comminuti, vncias
nouem,

liquefcant vna, liquatis, vnciam
vnam cum dimidia

Nitri purissimi ac fccissimi
iniice, ac vbi aque instar fluxerint, in conum
effunde, bacillo ferreo identidem leniter per-
cutiendum, quo in fundum secedat regulus,
quem refrigeratum a scoriis separa, & in
puluerem redacti singulis vnciis, singulas
drachmas nitri puluerisati fccissimi atque
purissimi misce & colliqua, idque sepa-
ratis scoriis denuo repete, sic Regulum
obtinebis Martialem, optime depuratum,
& si encheiresi accurata processeris, prima
fusione stellatum.

ANTIMONII REGULUS MEDICINALIS.

R. Antimonii crudi optimi, vncias
quinque,
Salis tartari, vnciam vnam.

Trita in puluerem tenuem exaete misce,
ac in crucibulo carenti detona; post de-
tonationem auge ignem, vt fluant per ho-
ræ quadrantem, instar aquæ; exemptum po-
stea igne crucibulum quiescat & refrigere-

AN.

tur, sic scoriæ in superficie, regulus picei
coloris splendens, fracto crucibulo, in fun-
do reperietur, quem, a fragmentis & sco-
riis separatum, & subtilissime supra Por-
phyritem tritum, atque puluerem coloris
punici iam referentem, vase optime clau-
so, in loco sicco serua.

ANTIMONII VITRUM.

Fit calcinando Antimonium crudum sub-
tilissime puluerisatum, in sartagine plani
fundi terrea non vitreata, pistillo vitreo
vel ligneo continue agitando, tam diu, do-
nec non amplius vapores sulphureos emit-
tat, & in puluerem obscuræ cinereum con-
vertatur, quod Cinerem antimonii vocant.
Hunc in crucibulum immittas bene tectum,
& tam diu in fortiori igne detineas, usque
dum materia leuiter fluat, tuncque pauxil-
lum antimonii crudi puluerisati addas, quo
vitrum elegantiorem rubrum colorem nan-
ciscatur, tuncque super tabulam æream
prius calefactam effundas. In fusione bene
attendendum, ne carbonum quid in cruci-
bulum illabatur, ob timendam tunc re-
ductionem.

ANTIMONII VITRUM CE- RATUM.

Ceræ flavae drachmæ vni liquefactæ
in vase ferreo iniiciatur antimonii vi-
tri, subtilissime triti, vncia vna. De-
tineatur super lenem ignem, ad di-
midiam horam, spatula continuo agi-
tando. Effundatur post in chartam, &
frigefactum in puluerem conteratur.

AQUAE

AQ.

AQUAE DESTILLATAE
SIMPLICES.

Parantur aquæ officinales, aliæ per destillationem, aliæ siccus. Magnus est in officinis numerus aquarium flillatitiarum, sed magnam partem superuacanearum, quibus interdum aqua fontana bonæ notæ præstaret; multas itaque plane inertes omisimus, plures tamen retinere debuimus, non bene reiiciendas, quas vel necessitas, vel vulgi opinio & recepta confuetudo postulabant. Ratio destillationis iure Pharmacopoeorum dexterritati relinquitur. Sufficit tantum schema vnum alterumve adducere, secundum quod reliqua, mutatis tamen mutandis, parandæ sunt; licet etenim non negandum sit, aliquid discriminis habere pro diuersa vegetabilium, harumque partium indole, quatenus nempe herba quædam magis vel minus succulentæ, aliæ succo valde acri turgent, aliæ vero aromaticæ & odoriferæ sunt, ideoque plus vel minus aquæ affundendæ requirunt, vel maceratione opus habent, vel plane non macerandæ sunt, quod in florum destillatione notandum, quibus volatile principium inest, quod maceratione maximam partem auolaret. Genere notandum, quo parcior aqua additur speciebus, eo liquor flillatitius efficacior, ceteris paribus, & vice versa. Quoad vasa cuprea destillatoria, valde interest, illa stanno probe obducta adhibere, ne alias liquidum destillans noxam inde trahat. Porro aquæ destillatae simplices fine vino paratæ, vix in annum integræ manent, & hanc ob cauſam quotannis semel aut bis renovandæ.

AQUA ACACIAE FLORUM.

R. Florum acaciæ, quantum placet,

AQ:

Affuso aquæ fontanæ pondere triplo vel quadruplo, destilletur modico igne liquoris circiter dimidia pars, vel quovsque eius sapida qualitas & fragranția suadebit.

Simili modo destillantur mutatis mutandis

AQUA CARDUI BENEDICTI.

CERASORUM NIGRORUM
CINNAMOMI SINR VINO
CITRI E CORTICIBUS RECEN-
TIBUS

COCHLEARIAE

FOENICULI

HYSSOPI

LAUANDULÆ

LILIORUM ALBORUM

MAIORANAЕ

MELISSAE SINE VINO

MENTHÆ PIPERITIDIS, SINE VINO

NAPHAЕ SEU FLORUM AURAN-
TIORUM

PETROSELINI

POEONIAE FLORUM

PULEGII

ROSARUM CUM ET SINE SALE

RUTAE

SALVIAE

SAMBUCI ELORUM

TILIAE FLORUM

VERBENAE

VERONICAR

AQUAE DESTILLATAE SIM-
PLICES CUM VINO.

AQUA

AQ.

AQUA CINNAMOMICUM VINO.

R. Cinnamomi elēti, libram vnam,
Vini nostratis optimi, libras se-
decim.

Mixta infunde, macera per biduum, tunc
destilla ut antea.

AQUA CORTICUM AURAN-
TIORUM CUM VINO.

R. Corticum Aurantiorum recen-
tium, libram vnam,
incis affunde
Vini nostratis optimae notae, vel
Gallici, libras octo.

Infusa deſtillentur ad dimidiam.

Similem in modum parari poſſunt

AQUA CITRI CORTICUM CUM VINO
LILIORUM CONUALLIUM
MELISSÆ CUM VINO
MENTHÆ CUM VINO
VERONICÆ CUM VINO
ZEDOARIAE CUM VINO

AQUAE COMPOSITAE.

Circa aquas compositas in anteceſſum
notandum, ut ad illas, quæ Spiritum vini
requirunt, purum, riteque deplegmatum,
minime vero ab Effentiis, Extraclis, Tin-
eturis ac Solutionibus aliis abſtractitum,
qualitatibus specierum quibus adhibiti, pe-
regrinis forte inquinatum, adhibeant Phar-
macopœi, ne aquis hac ratione qualitatem
alienam, adeoque effectui illarum deside-
rato noxiā aliquam imprimant, & medi-
cantis intentionem eatenus turbent aut in-
tervertant.

AQ.

AQUA ANTHELMINTICA.

R. Radicis graminis canini, vnciam
dimidiam
Flauedenis corticum aurantiorum,
drachmam dimidiam
Canellæ albæ, scrupulum dimi-
dium

Coque in

Aqua fontanæ, libris octo, donec reman-
serit quarta pars: Cola & adde
Mercurii viii, vncias duas
iterum coque lenius in vase ferreo, recto,
agitando ſepiuſ Mercurium bacillo ligneo,
& denique decantetur aqua.

AQUA APOPLECTICA
LANGII.

R. Radicum aristolochiæ rotundæ,
Calami aromatici,
Iridis florentinæ, ana vnciam
vnam ſemis,
Herbarum Meliflæ,
Maioranæ,
Florum Rorismarini,
Liliorum conuallium, ana
manipulum vnum,
Seminis Fœniculi,
Pœoniæ, ana drachmam
vnam
Ligni Rhodii, drachmas duas
Corticis Thymiamatis, vnciam
ſemis,
Caryophillorum,
Cubebarum,
Nucifæ, ana drachmas tres,
Cardamomi,

Cinna-

DISPENSAT. REG. ET ELECTOR.

9

AQ.

Cinnamomi, ana drachmas duas,
Contusa infundantur in
Aquaæ Pulegii,
Florum Tiliæ,
Herbæ Melissæ,
Saluiæ, ana libravna.
Stent infusa octiduum, tum leni arenæ
calore vasis vitreis destillentur.

AQUA CALCIS VIUÆ.

R. Calcis viuæ nuper calcinatæ li-
bram semis,
huic sensim affunde
Aquaæ purissimæ, libras octo,
Ebullitione peracta vas agitetur, dein
subsidat calx, & aqua per chartam colata
in lagenis rite obturatis seruetur.

AQUA CEPHALICA CAROLI V.

IMPERATORIS.

R. Summitatum Maioranæ,
Melissæ,
Origani,
Florum Anthos,
Lavendulæ,
Liliorum conuallium,
Rosarum rubrarum,
Saluiæ, ana manipulos
quatuor,
Caryophillorum,
Nucis Moschatæ, ana vncias duas,
Cardamomi,
Cinnamomi,

AQ.

Cubebarum,
Granorum Paradisi,
Macis, ana vnciam semis,
Scissa & contusa grosso modo infunde in
Spiritus vini optimi, libris sex;
Stent per dies sex in loco calido, & postea
lege artis destillentur.

AQUA CINNAMOMI CY-
DONIATA.

R. Cinnamomi acuti, vncias quatuor,
Succi Cydoniorum, mensuras
duas semis;
destillentur lege artis e maris balneo.

AQUA COERULEA.

R. Aquaæ calcis viuæ, libram semis,
fontanæ destillatæ, libras
quatuor

Agitentur, & post horas duodecim filtren-
tur, aquæ filtratæ adde
Salis ammoniaci, drachmas duas,
Limaturæ Cupri, drachmam vnam;
Post duodecim horas filtretur, atque usui
seruetur.

AQUAE DIAPNOICAE.

R. Aquaæ foliorum recentium,
Scabiosæ,
Scordii,
Cardui benedicti,
Plantaginis, ana
Misce.

B

AQUA

AQ.

AQUA EMBRYONUM, seu
BALSAMUS EMBRYONUM.

R. Visci querni,
Radicum Paeoniae,
Seminis eiusdem, ana, vncias duas,
Herbae Carui,
Foeniculi,
Meliſſae,
Menthæ crisperæ,
Rorismarini,
Saluiæ cum floribus,
Florum Lauendulae, ana vncias
tres,
Tiliæ,
Tunicæ, ana libram vnam,
Caryophillorum,
Cinnamomi acuti,
Cubebarum,
Granorum Paradisi,
Nucis Moschatae,
Zedoariæ,
Zingiberis, ana vncias duas,
Macis, vnciam vnam semis,
Galangæ, drachmas sex,
Croci, drachmas duas,
Medullæ panis triticei a furno ad-
huc calentis, libras duas,
Scissa & contusa infundantur vini no-
stratis optimi libris decem,
Aquæ Borraginis,
Buglossæ, ana libris tribus,
Liliorum conuallium, libris
duabus,
Foeniculi,

AQ.

Aquaæ Fragorum,
Rofarum,
Verbenæ, ana libræ vni.

Stent in digestione biduum, postea de-
stillentur igne moderato balnei. Liquo-
ris affusi duæ circiter tertæ, residuo denuo
aquarum prædictarum sufficiens affundatur
quantitas, & igne paulo auctiori ad siccii-
tatem fere auocetur, pro Aqua embryo-
num secunda destillationis, in solamen pau-
perum fernanda.

AQUA FORTIS.

R. Vitrioli sponte in pulverem fa-
tiscentis, aut coquendo siccatai,
Nitri purissimi, ana libras duas.

Trita misceantur & destillentur per re-
tortam terream optime loricatam, lege
artis, igne aperto gradatim exhibito, in
recipientem valde capacem, iuncturis bene
lutatis, cui aquæ fontanæ tertia circiter,
respeculi ponderis Vitrioli nondum calfinati,
pars, antea fit infusa.

AQUA HUNGARICA, siue RE-
GINAE HUNGARIAE.

R. Herbæ & florum rorismarini re-
centium, libram vnam,
Meliſſæ recentis, vncias qua-
tuor,
Florum Lauendulae recentium li-
bram semis,
Spiritus vini rectificati, mensuras
duas,
Eliciatur leni destillatione mensura &
dimidia.

AQUA

AQ.

AQUA MASTICHINA.

R. Mastiches, vncias quatuor,
Nucum moschatarum, vnciam
vnam,

Contusis & per triduum in Spiritus vini
rectificati libra una maceratis, aquæ fontanæ
libræ quatuor addantur. Destilla ex vesica le-
ni igne, donec residuum sit librarum duarum.
Liquor lacteus prodiens seruetur ad usum.

AQUA OPHTHALMICA.

R. Aquæ florum rosarum,
sambuci, ana vncias
tres,
Sclopetariæ, vncias duas,
Sacchari Saturni,
Vitrioli albi, ana grana octo.
Misce.

AQUA OPHTHALMICA
ALIA.

R. Aluminis romani puluerisati, scrupu-
lios duos,
Albuminis oui, No. 1.
bene mixtis sensim addendo
Aquæ Rosarum, vncias octo,
Misce.

AQUA PHAGAEDAENICA.

R. Mercurii sublimati corrosiui, scrupu-
lios duos,
Aquæ calcis viuæ cum florum sambuci & rosarum anatica parte
præparatæ, Mensuram unam;
Misce, solue.

AQ.

AQUA PICEA, vulgo

Theer-Wasser.

R. Picis liquidæ, libras duas,
Aqua fluuiatilis, mensuras duas,

In vase ligneo agita bacillo ligneo, deinde
per duodecim horas subsidat pix, & aqua
decantetur.

AQUA REGIS seu REGIA.

R. Salis marini decrepitati, vnciam
vnam,
Aquæ fortis communis, vncias
quatuor.

Misce & ex retorta vitrea in arena ad
siccitatem usque destilla,
vel

R. Aquæ fortis communis, vncias
quatuor,
Salis ammoniaci, vnciam unam.

Misce simul, donec omne sal ammonia-
cum dissolutum sit; seruetur in vitro arcti-
fime clauso.

AQUA RAPHANI COM-
POSITA.

R. Herbae cochleariae recentis,
Radicis Raphani rusticani recentis,
Corticis aurantiorum recentium
ana libram unam,
Nucum moschatarum, vncias duas,
Spiritus vini, libras duas,
Aquæ communis, libras sex.

Euoca per destillationem libras quinque
vel sex.

B 2

AQUA

AQ.

AQUA STYPTICA EXTERNA.

R. Aluminis,
Vitrioli cœrulei, ana vncias tres,
Aquaæ fontanae, libras duas.

Coque tam diu, donec omnia sint soluta,
Colaturam filtra, & tunc adde

Olei vitrioli albi, drachmas duas,
Misce, serua.

AQUA THERIACALIS.

R. Theriacæ veteris, vncias tres,
Spiritus vini communis, libras tres,
Destillentur maris balneo ad tertias; Residuum colatum inspissetur pro Extracto theriacali.

AQUA VEGETO MINERALIS.

R. Aquæ destillatae communis libras duas,
Spiritus vini, vnciam vnam,
Aceti saturnini concentrati, seu
Extracti Saturni, vnciam semis,
Mixta in vitro serua.

AQUA VITAE STOMACHICA
EXTERNA.

R. Radicum calami aromatici,
Galangae,
Zedoariae,
Zinziberis, ana drachmam vnam,
Foliorum Menthae,
Seminis Carui,
Cumini,

AQ.

Seminis Fœniculi, ana drachmam
femis,

Cardamomi maioris,
Caryophyllorum, ana scrupulum
vnum,

Theriaceæ Andromachi, drachmas duas.

Infundantur subtilissime contusa in Spiritus
vini rectificati, libris duabus, stent in digestio-
ne ostium, tandem per lintum cum ex-
pressione aliquali colata, seruentur usui.

AQUA VULNERARIA, seu SCLO-
PETARIA, Gallis dicta:

L'EAU D'ARQUEBUSADE.

R. Herbarum suo quaque tempore
collectarum,
Aristolochiæ rotundæ,
Artemisiae,
Consolidæ Saracenicae,
Salviae minoris, ana ma-
nipulos quatuor,
Agrimoniae,
Alchimillæ,
Bellidis maioris,
minoris,
Betonicae,
Buglossi,
Fœniculi,
Hyperici,
Plantaginis maioris,
minoris,
Saniculae,
Scrophulariae,
Verbenæ, ana manipulos
duos.

Affun-

AQ.

Affundantur vini albi generosi, mensura decem, stent infusæ aliquamdiu vase optime clauso, tum artis lege, vasis vitreis e maris balneo destillentur.

AQUA VULNERARIA ALIA THEDII.

R. Aquae communis,
Aceti vini, ana vncias viginti
quatuor,
Spiritus vini, vncias quadraginta
octo,
vitrioli, vncias decem,
Sacchari albi, vncias sedecim.

Misce, digere per octo dies in balneo maris,
filtra.

ARCANUM DUPLICATUM.

Ex capite mortuo aquæ fortis, e vitrioli & nitri partibus æqualibus parata, conficitur. Affunditur illi copiosa aqua, donec omnis falsedo inde extracta sit. Solutions confundantur & quiescant, vt terra metallica soluta subsideat. Tunc liquor in aliud vas decantatione transfusus evaporetur ad cuticulam, cui adhuc tepido sensim adfundatur solutio cinerum clauellatarum aqua parata, donec cessauerit effervescentia. Addita tunc aquæ calidæ quarta vel quinta parte, liquor iterum refrigerationi & subsidentiæ committatur, filtretur, evaporetur, & ad crystallisationem in loco frigido reponatur. Crystallis supernatans liquor decantetur, iterumque evaporatus, perfectæ relinquatur crystallisationi. Collectæ crystalli, super inversum cibrum stratum posita, leniter exsiccantur,

AR.

ARCANUM TARTARI, seu TERRA FOLIATA TARTARI.

R. Salis tartari albissimi, libram vnam, Aceti vni fine Empyreumate de stillati fortissimi, quantum sufficit soluendo Sali tartari.

Abstrahē acetum destillatum, cucurbita fistili, vel retorta vitrea, quod acetum recuperatum omni aciditate destitutum erit. Affunde residuo in retorta sali denuo recens acetum destillatum, ac rursus reuoca, idque toties itera, donec acetum recuperatum aciditate sua nullatenus spoliatum, sed tale, quale fuit assulm stillet. Tunc ab affusione aceti cessa; remanebit in fundo retortæ materia nigra, quam spiritu vini solue, ac per emporteticam filtratam vasis terreis leni calore arenæ sicca, siccata Spiritu vini solue, & denuo exsicca, idque toties repeate, donec materia appareat alba & foliata, quæ arcani nomine aere humido in liquorem solubilis, venit.

AURUM FULMINANS.

R. Auri per antimoniū debite repurgati, quantum vis, solue illud in Aquæ Regis, ex aqua forti cum sale ammoniaco factæ, quantum sufficit. Solutum in vitro capaci, Spiritus Salis ammoniaci cum alcali aquosi, quantum opus, sensim & guttatum instillando præcipita, calamo subinde mouendo, ac rursus instillando, donec aurum sub forma pulueris præcipitatum, in fundo subsideat. Stet tantisper, donec liquor omnis clarescat, tum adhuc aliquot guttas Spiritus salis ammoniaci instilla, vt de præcipitatione plena certior sis. Liquorem tandem decanta, ac præcipitatum in

BA.

fundo residuum, affusa sepius aqua fluviali aut pluviali limpida calefacta elue, & ab omni acredine libera; tandem puluerem residuum charta emportetica exceptum ac humore superfluo exutum, calore aëris tepido exsicca, vitando solis & ignis cuiuscunque calorem, ob fulminandi periculum. Siccatum tere, verum non simul aut magna copia, sed parum tantum eius singulis vicibus, leniter, ne nimis incalscat, super porphyrite, aut in mortario vitro comine.

BACILLI LIQUIRITIAE CITRINI.

R. Radicis liquiritiae puluerisatae vniciam vnam,
iridis florentinae,
Amyli, ana vnciam semis,
Croci orientalis, scrupulos duos,
Sacchari albi, libram vnam,

Cum mucilagine gummi tragacanthæ fiat massa, ex qua formentur Bacilli.

BACILLI DE LIQUIRITIA ALBI.

R. Gummi arabici,
Specierum diaireos simplicium,
diatragacanthæ, ana vnciam semis,
Radicis liquiritiae,
Amyli, ana vnciam vnam.

Terantur omnia in polliaem subtilissimum; cui adde

Sacchari albi puluerisati, libras duas,

Mucilaginis tragacanthæ, quantum sufficit.

Fiat massa pro bacillis.

BALSAMUS ARCAEI.

R. Therebinthinae venetae,
Gummi elemi,
Seui ceruini, ana vncias duas,
Olei hyperici, vnciam vnam.

Gummi elemi in Therebinthina lenissimo igne soluitur, quibus successive adduntur seuum & Oleum hyperici in alio vase liquata, & fiat balsamus.

BALSAMUS COMMENDATORIS GALLORUM.

R. Radicis angelicae siccae concisae minutim, vnciam semis,
Florum hyperici siccorum, vnciam vnam,
Spiritus vini rectificati, libras duas,
& vncias quatuor.

Digere simul, sub sole vel balneo maris in vase clauso identidem agitando ad perfectam tinturam. In colatura expressa solue

Myrrhae electae,
Olibani, ana vnciam semis,

Digere ut supra. Tum

R. Styracis Calamitæ, vncias duas,
Benzoini amygdaloïdes, vncias tres,

Balsami Tolutani, vnciam vnam,
Aloes succotrinae, vnciam semis

adde, si vis
Ambræ cineritiae, grana sex.

Contrita

BA.

Conrita coniiciuntur in Tincturam supra dictam. Insolentur adhuc per quadraginta dies. Fiat colatura.

BALSAMUS LOCATELLI.

R. Cerae flavae, libram vnam,
Gummi olibani, vnciam vnam.

Lento igne liquefiant in Olei oliuarum optimi, libra vna semis, dein adde

Balsami Copaiuae, vncias duas,
Sanguinis Draconis,
Terrae Catechu, ana vnciam semis.

Agitando misce.

BALSAMUS MACIS.

R. Olei destillati macis, drachmam
vnam,

macis expressi, drachmas tres

Misce pro balsamo.

BALSAMUS MASTICINUS.

R. Mastichis puluerisati, vncias octo,
Spiritus vini rectificati, vncias triginta sex.

Destilla super alembico leni calore, ut detrahantur vnciae viginti quatuor. In hoc spiritu lenissima digestione solue

Pulueris subtilissimi mastichis electae, vncias quatuor.

Digere, filtra & sepone,

Nota. *Spiritus super mastichem abstractus debet esse rectificatissimus, quia aliter spem fallere posset.*

BA.

BALSAMUS NUCIS MOSCHATAE.

R. Olei nucistæ expressi, drachmas tres,
nucis moschatae destillati, drachmam vnam.

Misce, fiat lege artis balsamus.

BALSAMUS OPHTHALMICUS RUBER.

R. Butyri insulsi recentis, vncias tres
Cerae albae, drachmas sex.

Liquefactæ ceræ admisce butyrum; liquefac simul & adde frequenti & attenta tritura

Mercurii præcipitati rubri, drachmas duas & grana quatuor.

Misceantur exactissime.

BALSAMUS OPHTHALMICUS COMPOSITUS.

R. Balsami ophthalmici rubri, vncias quatuor,
Camphoræ, scrupulos duos,
Tutiae præparatae, drachmam vnam,
Olei oliuarum recentissimi, drachmam semis,

Exakte terendo bene misceantur.

PRO BALSAMIS SULPHURIS EX TEMPORE PARANDIS CORPUS.

Fit ex florum sulphuris, parte vna & olei amyg达尔um dulcium, partibus duabus.

In

BA.

In arena, igne moderato, vase mundo liquatis, donec in hepat quasi resoluta coēant. Ex qua hepatico massa per proportionatam additionem variorum oleorum vari parari possunt sulphuris balsami.

BALSAMUS SULPHURIS
AMYGDALATUS.

R. Florum sulphuris, vnciam vnam,
Olei amygdalarum dulcium, re-
center expressi, vncias sex.

Digerantur in arena, calore conuenienti,
donec flores soluantur. Eodem modo pa-
rantur, *Balsamus sulphuris anisatus, iu-*
niperatus, succinatus, therebinthinatus,
oleis cuique sui generis applicatis.

BALSAMUS VITAE EX-
TERNUS.

R. Saponis veneti siccatae triti,
Olei therebinthinae, ana libram
vnam,
Salis tartari, vncias duas,
Misce exacte.

BALSAMUS VITAE.

R. Olei stillatitii Lauendulae,
Maioranae,
Caryophillorum,
Macis,
Cinnamomi,
de Cedro, ana scru-
pulum vnum,
Succini albi,
Rutae, ana guttas
decem,

BA.

Balsami peruviani, drachmam semis,
Spiritus rosarum rectificatissimi,
vncias decem.

Mixta committantur frigidæ digestioni &
filtrantur per Gossypium.

Nota. Quibus cum Ambra placet, ad-
dere possunt

Ambrae gryseae, grana quindecim,
Moschi, grana decem.

BALSAMUS VULNERARIUS, vid.
ESSENTIA VULNERARIA.

BUTYRUM ANTIMONII.

vid. Antimonii butyrum.

BUTYRUM CACAO.

Fruitus Cacao leniter torreantur, excor-
corticati contundantur & exprimantur.

BUTYRUM MAIORANAЕ.

R. Foliorum Maioranae recentium,
vncias octo,
Butyri maialis, libram vnam.

Coquantur lenissimo igne folia contusa,
dein consumta humiditate colentur & ex-
primantur. Refrigeratis paululum adde

Olei maioranae destillati, guttas
triginta.

Misce.

CALOMELAS.

Est Mercurius dulcis sexies vel octies
sublimatus.

CAPUT

CA.

CAPUT MORTUUM VI-
TRIOLI.

Residuum est a destillatione spiritus e
retorta exemtum. Quod aqua pluia aut
fluviali coquendo edulcoratum, i. e. a sale
albo vomitio liberatum, ac exsiccatum,
vocatur

Terra vitrioli dulcis.

CASSIA EXTRACTA, seu
PULPA CASSIAE.

Hujus extrahendi modum, & beneficio
cochlearis per setaceum, affuso aqua cali-
dæ pauxillo transadigendi, ac in pulpam
cogendi, ne tyronibus quidem Pharmacopoeorum
ignotum, hic docere, adum for-
ret agere.

CERA ARBOREA.

R. Cerac citrinae, vncias quindecim,
Therebinthinae, vncias decem,
Pulueris Myrrhae,
Olibani,
Masticis,
Consolidæ maioris, ana
drachmas quinque,
Misce secundum artem.

CERA VIRIDIS.

R. Cerac citrinae, libram vnam,
Therebinthinae, vncias quatuor
semis,
Olei oliuarum,
Pulueris aeruginis, ana drachmas
quinque,
Misce.

CE.

CERATUM DE CUMINO.

R. Emplastri Diapalmae, vncias duo-
decim,
Cerae flauae,
Olei Chamomillae,
Anethi, ana vncias tres,
Philosophorum, vnciam se-
mis,
Pulueris Cumini subtilissimi, vni-
cias sex,
Misce, fiat artis lege Ceratum.

CERATUM LABIALE.

R. Succi uuarum maturarum,
Butyri recentissimi insulsi, ana
vncias quatuor,
Liquefiant, & super ignem carbonum le-
nissimum tamdiu agitantur, usque dum
aquosum succi uuarum, exhaluerit, tum
adde

Cerac albae, vnciam vnam,
Iterum liquefiant, & agitantur, vt fiat
Ceratum.

Si cui placuerit, ceratum hocce co-
lore rubro, flavo, aut alio tingen-
dum, addat vel Carmini optimi, vel
Radicis Alkanna, vel Curcumæ, quan-
tum placet.

CERATUM NUTRITUM,
vid. VNGUENTUM NUTRITUM.

C

CE-

CE.

CERATUM SATURNI.

R. Cerae citrinae, vncias quatuor,
Olei oliuarum, libram vnam,
solue leni igne & adde
Aqua fontanæ, vncias duodecim,
Extracti Saturni, vnciam vnam,
Misce exactissime & fiant Ceratum.

CEREOLI EXPLORATORII.

R. Cerae citrinae, vncias sex,
Olei oliuarum, vnciam vnam.
Hæc leni igne, vitato empyreumate, liquefacta, ab igne remoueantur: tunc tenuioris lintei hollandici, vel etiam holoserici panniculos, decem pollicum longitudine & duorum latitudine, leviter in cylindros conuolutos, massa adhuc feruidæ, spumanti & bullas in superficiem ferenti ita immerge, vt, si extraxeris, alterum latus tantum conuoluti huius lintei, liquore obductum tintillum reperiatur; refrigeratis pannis, singula frustula in sex partes aequales secantur, quorum unumquodque ad alteram extremitatem, pyramidatam habet figuram; super marmore tandem frustula polita & sapone delinita, primo digitis, & deinde ope corporis cuinsdam duri, e. g. vitri, conuoluuntur, ut cylindrum referant, & superficiem habeant perfecte planatam.

Massa debitam & idoneam habeat spissitudinem, & iustum caloris gradum, quando lintea ei immittuntur; quo cereoli eo magis leues fiant & formæ exactæ.

CE.

CEREOLI FALCKII.

R. Terebinthinae, drachmam vnam,
Gummi laccae optime puluerifati,
drachmam dimidiam,
Sufficienti ignis gradu liquentur & dein adde
Emplastrum mercurialis, vncias duas,
Mercurii dulcis, drachmam semis
præcipitati rubri, scru-
pulos duos.

Misce omnia probe agitando, ne separantur & a se discedant, & fiant Cereoli.

CEREOLI MITIGANTES.

R. Cerae flauae, libras duas,
Leni igne liquatæ admisce
Extracti Saturni, vnciam vnam,
Misce continua agitatione, & ex hac ab igne remota massa fiant Cereoli.

CHALYBIS LIMATURA
PRÆPARATA.

Ferri purissimi limatura in mortareo ferreo purissimo cuni pistillo ferreo contundatur, & diu terendo in puluerem subtilissimum redigatur ac bene cribretur. Seruetur in vase vitro fiscifimo bene obturato, ne accessu aëris humidæ in crocum seu rubiginem vertatur.

CINNABARIS ANTIMONII,
vid. ANTIMONII CINNABARIS.

CIN-

C.I.

CINNABARIS FACTITIA.

R. Sulphuris purissime electi, partem
vnam,

Liquefiat in vase ferreo, sat capaci
leni igne, sensim adiiciendo

Mercurii viui purissimi, antea ca
refacti, partes quinque.

Mercurio assidue spatula ferrea, optime
colum ligneum adaptetur, ne
magis emetetur, quæ tandem calida ad
hunc vasum redigatur, & ita sublima
tioni submitatur.

CINNABARIS NATIUÆ
PRÆPARATA.

Cinnabaris natuæ puræ, a re
crementis mineralibus purgatae,
& aqua bene lotae, quantum vis.

Teratur subtilissime, & sublimetur igne
fortissimo, quæ operatio, si opus videatur,
reiterari potest.

COLCOTHAR, vid. supra

CAPUT MORTUUM VITRIOLI

CONDITA.

Hæc parandi ars Dulciariis & Condito
ribus non cognota, Pharmacopœorum soler
tur raro relinqua. Schematicis tamen
locis geometram quasi delineandum duximus
condendi modum,

I. Cortices Aurantiorum & Citri recen
tium ab interiori albedine probe liberati,
diem unum atque alterum, aqua pura quo
tidie reiterata, macerentur, tum ad me

CO.

diocrem mollitem aqua fontana coquuntur,
cocti, ex aqua exempti, parumque siccati,
saccharo (aqua illa, in qua cortices decocti,
ad dissolutionem saccharati, nisi ingratis
mis sit amaroris, adhibita) soluto & ex
arte clarificato, ac ad debitam consisten
tiā cōcto, immērguntur, sicque condūn
tur & condūntur.

II. Fructus Berberum, Cerasorum acidō
rum, Ribum, condūntur: Saccharum cla
rificatum ad consistentiam tabulati coquen
do, postea, vbi parum refrixerit, fructus
debitē mundatos iniiciendo, & tamdiu re
linquendo, donec saccharum succo, fructus
vero vicissim saccharo imprægnentur, postea
fructus eximantur, & saccharum succo li
quatum ad spissiorem rursus consistentiam
coquendo redigatur, cui demum paululum
refrigerato fructus reddantur. Sicque con
dita seruentur.

III. Radices recentes, Calami aroma
tici, Cichorii, Eryngii, Pimpinellæ, Sa
tyrii, Scorzonera &c. prius mundatae & in
particulas scissæ, atque, donec mollescant,
aliquatenus aquæ immersæ, saccharo, aqua
prædictæ macerationi adhibita, soluto, cla
rificato & ad consistentiam debitam cōcto
imponuntur, denuo parumper coquendo,
idque toties repetendo, donec superflua
humiditas iterata inspissatione sensim eu
aporauerit.

Nota. Caro Citri, si pro Citrinato acci
piatur, Zingiber, Nux jndica &
Laduca Hispanica, exotica sunt, hinc
illorum præparandi & condiendi mo
dum docere, huius non est loci.

C 2

CON-





C.I.

CINNABARIS FACTITIA.

R. Sulphuris purissime electi, partem
vniam,

Liquefiat in vase ferreo, sat capaci
leni igne, sensim adiiciendo

Mercurii viui purissimi, antea ca
lefacti, partes quinque.

Agitentur assidue spatula ferrea, optime
mixtis operculum ligneum adaptetur, ne
massa inflammetur, quæ tandem calida ad
huc in puluerem redigatur, & ita sublima
tioni submittatur.

CINNABARIS NATIUÀ
PRÆPARATA.

R. Cinnabaris natuuae purae, a re
crementis mineralibus purgatae,
& aqua bene lotae, quantum vis.

Teratur subtilissime, & sublimetur igne
fortissimo, quæ operatio, si opus videatur,
reiterari potest.

COLCOTHAR, vid. supra
CAPUT MORTUUM VITRIOLI

CONDITA.

Hæc parandi ars Dulciariis & Condito
ribus non ignota, Pharmacopœorum soler
titæ merito relinquenda. Schematis tamen
loco generatim quasi delineandum duximus
condendi modum,

I. Cortices Aurantiorum & Citri recen
tium ab interiori albedine probe liberati,
diem unum atque alterum, aqua pura quo
tidie reiterata, macerentur, tum ad me

CO.

diocrem mollitiem aqua fontana coquantur,
cocti, ex aqua exempti, parumque fiscati,
faccharo (aqua illa, in qua cortices decocti,
ad dissolutionem facchari, nisi integrati ni
mis fit amaroris, exhibita) soluto & ex
arte clarificato, ac ad debitam consisten
tiæ cocto, immerguntur, sive condun
tur & conduntur.

II. Fructus Berberum, Cerasorum acidorum,
Ribium, conduntur: Saccharum clari
ficatum ad consistentiam tabulati coquen
do, postea, vbi parum refixerit, fructus
debitè mundatos iniiciendo, & tamdiu re
linquendo, donec saccharum succo, fructus
vero vicissim saccharo imprægnentur, postea
fructus eximantur, & saccharum succo li
quatum ad spissorem rursus consistentiam
coquendo redigatur, cui demum paululum
refrigerato fructus reddantur. Sicque con
dita feruentur.

III. Radices recentes, Calami aroma
tici, Cichorii, Eryngii, Pimpinellæ, Sa
tyrii, Scorzonera &c. prius mundatae & in
particulas scissæ, atque, donec mollescant,
aliquatenus aquæ immersæ, faccharo, aqua
prædictæ macerationi exhibita, soluto, clari
ficato & ad consistentiam debitam cocto
imponuntur, denuo parumper coquendo,
idque toties repetendo, donec superflua
humiditas iterata inspissatione sensim eu
aporauerit.

Nota. Caro Citri, si pro Citrinato acci
piatur, Zingiber, Nux ïndica &
Lactuca Hispanica, exotica sunt, hinc
illorum præparandi & condendi mo
dum docere, huius non est loci.

C 2

CON-

CO.

CONDITÆ NUCES IUGLANDIS.

Colligantur nuces tertio ante festum Joannis die, perforentur vndeque stylo, postea ocliduum in aqua fontana, bis quotidie recenti affusa, macerentur, tunc ad mollitatem usque coquantur, cinnamomo & caryophyllis stipentur & duplo sacchari clarificato, modo ante educto, condiantur.

Exotica quæ aliunde ad nos appontantur, ut rite se habeant, Pharmacoporum curæ & industria relinquentur.

CONFECTIO ALKERMES.

R. Sacchari albissimi,
Succi Pomorum Borsdorffiorum,
clarificati, & cum praedicto Saccharo
ad consistentiam mellis cocti,
Succi granorum Kermes Monspe-
liens. spissioris, ana libram unam,
Cinnamomi optimi puluerisati,
vinciam unam,
Foliorum auri, No: viginti,
Misce, fiat Electuarium,

Cui libet, singulæ libræ huius con-
fectionis addere potest Ambræ
gryseæ veræ, in sufficienti por-
tione succi Kermes distemperatæ,
drachmam semis,

Moschi optimi cum spiritu rosa-
rum diluti, scrupulum unum,

Et sic enascitur CONFECTIO ALKERMES
COMPLETA. vel CUM MOSCHO & AMBRA.

CO.

CONFECTA SACCHARATA.

Sub horum titulo, diuersæ species cata-
logo nostro sunt insertæ, quædam, quæ
melioris gratiæ ergo saccharo incrustantur,
aliæ, quæ commodioris conseruationis &
vñus ergo in forma secca saccharo conditæ
seruantur. De vtraque specie non est,
quod sigillatim, quoad parandi modum
moneamus, aut notemus: vtriusque con-
ficiendi modus Conditoribus & Pharmacopœis in commune quasi opificium cessit.
Id vnicum tantum circa incrustatorum con-
fectionem addendum: caudum nimirum
esse, ne in eorum præparatione candor &
finceritas exulent, aut locum lucri cedant
amori, indeque amylo potius, qua maiorem
partem, quam saccharo incrustentur.

CONSERUAE.

Conseruas Herbarum, Florum, Fructuum
conficiendi ratio cum fere coincidat, nec
nisi subiectorum pro diuersitate sacchari
ad miscendi proportio in nonnullis nonnihil
variet, id forte solum notandum veniet,
quod cum fructuum, herbarum & florum
præsertim, nonnulli, vti Rosarum, Buglossi,
Borraginis, Tunicae succulentiores sint, aliæ
sicciores, illorum singulis libris libræ duæ
Sacchari albissimi sufficient: his vero sac-
chari quantitas praedicta dimidia libra au-
genda, atque asperso stillatitæ, floribus
quibusque eongeneris, aquæ pauxillo inter-
pisandum mixtura promouenda sit.

Radices conseruandæ recentes succulentæ
minutissime concise, cucurbitæ vel ollæ fal-
tem vitreatæ, immisæ & coopertæ, in bal-
neo Maris per bihorium aut trihorium co-
quantur, donec mollescant, duriores præ-
fertim; tum refrigeratæ, in pulpam tun-
dendo

C.R.

dendo cum duplo facchari in conseruam redigantur.

Pulpa ac caro fructuum contusa per se-taceum traiicienda, tumque cum facchari albissimi sufficienti quantitate, quam iusta Electuarii consistentia indicabit, contun-dendo condienda.

CREMOR TARTARI.

R. Tartari albi integri, quantum vis, laua aliquoties, donec ab impuritate superfi-ciali probe liberatus sit, & aqua lotioni seruiens limpida ab illo defluat. Hunc grosse contusum vase figulinio optime vi-treato, desuperque operculato inde, ac affusa aqua fluuiali, aut pluiali, igne intenso per horam coque, tum ovi al-bumine solutionem feruentem secundum artem clarifica, remoto albumine cum fodiibus, quicquid solutum per mani-cam Hippocratis inclinando vas celer-time traice, aliamque rufus aquam re-fiduo nondum soluto Tartaro affunde, denuo coque & feruentem, vt prius, per manicam cola, idque tertia vice, si opus, repete, donec omnis Tartarus solutus sit, ac nil nisi arenulae & festuca restent. Solu-tiones omnes confunde, atque probe agitando misce, ac inter agitandum Tartarus refrigeratus pulueris aut arenæ subtilissimæ forma subsidebit. Hunc plene refrigeratum, vbi effusa aqua priori, aliquoties affusa recenti frigida laueris, absque ulteriori solutione, siccatum atque in subtilissimum pulverem la-vigatum, pro Cremore serua.

C.R.

CROCUS MARTIS APERITI-UUS STAHLII.

R. Scorias Reguli martialis primas, crasse contusas aut aëri loco vmbroso exposi-tas, in puluerem nigrum fatiscentes, cui aquæ communis quantitatem sufficien-tem affunde, quam bacillo agitando turba, ac post morulæ momentum, vbi crassior ad fundum secesserit pars, aquam in aliud vas transfundere, quæ, dum subtilissimus cum illa effusus puluis subsederit, paululum moræ quiescat, tum crassiori pulueri reaffundatur, denuoque agitan-do turbetur, rursus subsidente crassiore, tenuior priori aquæ iungatur, sic turban-do ac decantando continuetur, donec aqua turbata, subsidente paululum crassiore puluere non amplius turbetur, nec quicquam in illa adhuc fluctuare perci-piatur. Puluis sic elotus filtro ab aqua separatus, exsiccatus, & cum triplo Ni-tri purissimi deflagrando colliquatus ac edulcoratus pro Croco Martis aperiitu-feruetur.

Crassior in fundo residuus, siccatus & cum triplo nitri detonatus ac edulcoratus, pro Croco adstringente seruiet.

CROCUS MARTIS AD-STRINGENS.

Fiat, limatura martis subtilissimæ, quan-tum placet, in patella terrea non vitreata vehementissimo igne reuerberii in furno fi-gulinio, aut laterum potius, exponendo, & exactissime ad intensam usque rubedinem calcinando.

C 3

CRO-

CR.

CROCUS METALLORUM.

R. Antimonii & Nitri, ana quantum vis,
in puluerem redacta misce exacte, & in
crucibulo ignito detona successine ac in
massam redige puniceam, Hepatis no-
mine Chymicis notam. Hanc pulueri-
fata aqua calida pluries affusa edul-
cora, & per chartam emporeticam ab
aqua separatum puluerem in crucibulo
dенно aliquantis per calcina, tum pro
croco metallorum serua.

Aqua inde per filtrum separata exhalando
Nitrum præbet antimoniatum, seu, vt alii
vocant, *Anodinum minerale*.

CRYSTALLI TARTARI.

Tartarum modo supra in cremore educto
superficie tenus lotum, solutum, oui albu-
mine clarificatum, & aliquoties elotum,
denuo aqua limpidissima, strenue in vase
puro coquendo solue, per manicam puram
oculus in vas commodum & absque villa agi-
tatione quietum infunde ac in loco frigido
serua, & in crystallos coabit puras & ele-
gantes, vt non extreme candidas & pel-
lucentes, magis tamen, quam si ad extre-
mam albedinem lotus fuerit Tartarus, effi-
caces, vt & copiosiores: diutina enim illa
& sèpius repetita lotura plurimum & Tar-
tari & virtutis eluitur.

DECOCTA,

quia propter corruptionem in pharmaco-
poliis diu asseruari nequeunt, consultius est,
vt semper, quoties a Medicis præscribuntur,
recenter parentur. Medici vero, vt tem-
pori parcant, ne præsertim pauperibus in
quouis morbo nouam exhibere debeant præ-
scriptionem, non incongruum duximus, non-
nullas decoctorum formulas hic inserere.

DE.

DECOCTUM ALBUM.

R. Micæ panis albi,
Cornu cerui vstii, ana vnciam vnam,
Aquæ fontanæ, Libras tres,
Coquantur &

Colaturæ Libris duabus, adde vel
Sacchari albi, vel
Syrupi cuiusdam, quantum placet,

DECOCTUM PINI.

R. Turionum pini recentium, vncias
quatuor,
Incisis ac contusis affunde,
Aquæ fontanæ feruidæ, Libras
quinque.

Stent in vase fistili vitreato, & bene ob-
turato per noctem in loco calido, mane
ebulliant per semi horam. Colatura de-
tur ad usum.

DECOCTUM PROPHI-
LACTICUM.

R. Radicis graminis,
chinæ,
saflaparillæ, ana vncias
duas,
liquiritiae, vnciam vnam,
Ligni saflafras, vnciam vnam &
semis,
Seminis anisi, vnciam dimidiam.
Concise & contusæ species infundantur in
Aquæ fontanæ, Mensuris sex.
Coquantur per horam in vase bene clauso
& postea coletur.

DIA-

DI.

DIAGRYDIUM SULPHURATUM.

R. Scammonii puluerisati, quantum vis.
Extende super chartam bibulam, suppositis prunis, sulphure modico asperso fumantibus, suspensam, continue Scammonium versando ac mouendo, donec liquefcere incipiat ac albescat, quod tum debite sulphuratum commode seruetur.

ELAEOSACCHARA.

Hoc nomine venit saccharum in puluerem tritum, & oleo quodam essentiali, plus minus impragnatum, alterandi scopo, usui interno destinatum. Ne vero magna quantitate affluentur, sed potius recente semper praeparentur, notandum: Et sic oriuntur.

ELAEOSACCHARUM ANISI.

R. Sacchari albissimi, vnciam vnam,
Olei anisi destillati, guttas viginti,
Misce fiat puluis. Et pari ratione praeparantur

ELAEOSACCHARUM CARYOPHILLORUM,
CINNAMOMI,
FOENICULI,
MACIS, &c.

ELAEOSACCHARUM AURANTIORUM ET CITRI CORTICUM

Simili modo præparari potest, sed consultius & melius est, sacchari portionem, cortici pomorum aurantiorum vel citri recenti affricando, donec oleosa flauedinis substantia satis imprægnata videatur.

EL.

ELECTUARIUM DIACATHOLICUM.

R. Polypodii querni, libram semis.
Decoquatur in aqua communis, mensuris quatuor ad consumtionem media circiter partis, cuius colatura quantitate sufficienti extrahe

Pulpae *Cassiae*,
Tamarindorum, ana vncias quatuor.

Inspiffentur pulpae ad mellaginem fere, quibus adde probe subigendo,

Sacchari albissimi, libras quatuor.
Demum subsequentes pulueres subtilissime tritos & cibratos, nempe

Pulueris anisi
galangae,
rhabarbari selecti, ana vncias duas,
foliorum *Sennae* orientalis, vncias quatuor,
glycirrhizae, drachmas duas,
paulatim insperge, & misce pro Electuario.

ELECTUARIUM DIASCORIDIUM FRACASTORII.

R. Herbæ scordii, vncias duas,
dictamni cretici,
bistortæ,
Radicis gentianæ,
tormentillæ,
Cassia ligneæ acutissimæ,

Cin-

EL.

Cinnamomi,
Galbani,
Styracis Calamithæ, ana vnciam
semis,
Gummi arabici, vnciam vnam cum
dimidia,
Piperis longi,
Zingiberis, ana drachmas duas,
Opii thebaici depurati,
Seminis anisi, ana drachmam vnam
cum semisse,
Conservæ rosarum rubrarum, li-
bram vnam,
Mellis despumati, libras duas semis,
Vini generosi albi, libram semis.

Opium in vino solutum cæteris speciebus
bene puluerisatis & mixtis addatur, &
lege artis intime misceantur ad Electuarii
consistentiam.

ELECTUARIUM HIERAE PI-
CRAE SIMPLICIS.

R. Aloes Succotrinæ, vncias duo-
decim,

Afari,
Cinnamomi,
Croci,
Masticæ,
Spicæ indicæ,
Xylobalsami, aut ejus loco, ligni
aloes, ana drach-
mas sex,
Mellis despumati, libras quatuor
cum semisse.

Misce pulueres melli fere refrigerato pro
Electuario.

EL.

ELECTUARIUM HIERAE
COMPOSITAE CUM AGA-
RICO, SEU PRO CLY-
STERIBUS.

R. Specierum hierae simplicis sine
Aloe,
Agarici trochiscati, ana vnciam
semis,
Aloes illotæ, vnciam vnam,
Mellis despumati, vncias sex.
Misce fiat Electuarium.

ELECTUARIUM LENITIUUM.

R. Caricarum pinguium, libram vnam,
Foliorum Sennæ, sine foliis, vncias nouem,
Pulpaë Cassiæ,
prunorum gallicorum,
tamarindorum, ana li-
bram semis,
Seminis coriandri, vncias quatuor,
Radicis glycirrhizæ concifæ, vni-
cias tres,
Sacchari purissimi, libras duas
& semis.

Folia Sennæ cum semine coriandri in
puluerem redige, & per cibrum separa
vncias decem. Residuum cum caricis &
glyzirrhiza in quatuor libratum aquæ men-
tura coque ad dimidium. Dein cola &
exprime. Liquor expressus euaporet ad
remanentiam tertia partis, cui adde saccha-
rum, vt fiat Syrupus. Hunc syrnum
adde gradatim pulpis, & postremum im-
misce puluerem, cibro prius separatum.

ELEC-

EL.

ELECTUARIUM CONTRA
MORSUM CANIS RABIDI.

R. Meloum maiarium rite præparaturum, cum melle, in quo siti erant, adhærente, Número viginti quatuor,
Theriacæ, vncias duas,
Ligni Hebni, drachmas duas,
Radicis serpentariae virginianæ,
Limaturæ plumbi, ana drachmam
vniam,
Fungi Sorbi aucupariæ, grana vi-
ginti.

Hicce adhuc adde eiusdem mellis, ex quo meloës exempti sunt, & nisi Theriacæ quantitas sufficiens adesset, huius loco substitui potest Rob Sambuci.

Meloës hi maiales, priusquam mellì im-
mittuntur, cuivis viuō adhuc caput decer-
pitur, cum hac cautela, nequid liquoris sub tactu lenissimo huiusc insecti facile ef-
fluentis perdatur, sed simul mellì miscean-
tur. Tum e melle sumti, meloës cultro vel
alio instrumento, super lamellam seu orbem
minutissime conciduntur & attenuantur;
exteræ species in puluerem subtilissimum
rediguntur, tunc cum Theriaca & melle
intime miscentur ad consistentiam Electua-
rii & tunc massa hæc in vase sictili seu vitro
in loco temperato ad usum conseruatur.

Remedium hocce sane non contemne-
dum, iussi Regis nostri Augustissimi & pa-
trix patris Clementissimi, ita ipsi pretio
oblatum, absqueulla mutatione seu corre-
ctione publici iuris fecimus, quamquam
non ignoramus, virtutem & efficaciam hu-
ius remedii solum ab insecto, meloë scili-
cat, dependere.

EL.

ELECTUARIUM STOMA-
CHICUM.

R. Acori conditi, vncias tres,
Conseruae melissæ,
menthae, ana vncias
quatuor,
Caryophillorum, vniaciam semis,
Cinnamomi electi,
Zingiberis albi scindendo com-
minuti, ana vniaciam vnam,
Sacchari albissimi in sufficiente
quantitate aquæ rosarum dis-
soluti, vncias sex.

Misce fiat ex arte Electuarium.

ELIXIR ACIDUM DIPPELI,

f. HALLERI.

R. Olei vitrioli anglicani, vniaciam
vniam,
Spiritus vini rectificatissimi, vncias
sex.

Oleum vitrioli spiritui vini in vase vitro
satis capaci successive & guttatum quidem
admisceatur, & per interualla epistomio vi-
tro semper tegatur; dein tota quantitas
ita mixta absque digestione usui seruetur.

ELIXIR ANTISCORBUTICUM
AMARUM.

R. Herbac Absynthii,
Beccabungae,
Trifolii fibrini, ana vniaciam
semis,
Cochleariae recentis,
Nasturtii aquatici recentis,
ana vniaciam vnam,
Radi-

D

EL.

Radicum Enulae, drachmas tres,
Filicis, drachmas sex,
Corticu[m] Aurantiorum, drachmas
tres.

Incisis & contusis affunde
Spiritus Cochleariae,
Nasturtii, ana vncias
quinque,

Stent in digestione aliquamdiu, dein ex-
primantur & filtrantur.

**ELIXIR ANTISCORBUTICUM
TEMPERATUM.**

R. Extracti Trifolii fibrini,
Abfynthii,
Scordii,
Pomorum aurantiorum
viridium,
Cochleariae,
Martis pomati, ana vnciam
vnam,

Aquae Foeniculi,
Menthæ, ana vncias duo-
decim.

Misce, stent in leni digestione duodecim
horarum, ab igne remotis & refrigeratis
adde

Spiritus vini rectificati, vncias duo-
decim,
in quo guttatum & successiue instilla
Olei vitrioli, vnciam vnam.

Stent de nouo in digestione duodecim
horarum, dein coletur & seruetur.

EL.

ELIXIR PECTORALE.

R. Radicis Enulae,
Iridis florentinæ,
Scillæ, ana vncias duas,
Liquiritiae, vnciam vnam,
Gummi Ammoniaci electi, vncias
quatuor.

Myrrhæ,
Benzoes,
Styracis liquidæ,
Croci optimi, ana vnciam semis,
Seminis anisi, vnciam vnam &
semis.

Incisa & contusa digerantur per quatri-
duum cum

Spiritus vini rectificati libris qua-
tuor cum semisse,
Exprimantur & filtrantur.

Nota. Gummata seorsum extrahantur.

**ELIXIR PECTORALE
TEMPERATUM.**

R. Radicis Pimpinellæ albae, vnciam
semis,
Liquiritiae, vnciam vnam,
Enulae, drachmas duas,
Rhabarbari, drachmam
vnam,
Gummi ammoniaci,
Nitri depurati, ana drachmas tres,
Corticis cascarillæ, vncias duas,
Seminis anisi stellati, drachmas
tres,
Aquæ hyssopi, vncias quatuor-
decim,

Aquæ

EL.

Aquaeveronicae vinosae, vncias tres.

Stent in digestione fortiori, per quadraginta octo horas, tum species fortiser exprimantur, & Elixirium coletur & usui seruetur.

**ELIXIR PROPRIETATIS
CUM RHABARBARO.**

R. Aloes succotrinæ, drachmas sex,
Myrrhae rubrae electæ, drach-

mas duas,

Croci orientalis, drachmam vnam
cum semisse,

Rhabarbari optimi, vnciam semis.

Concisis & contusis in phiala capaci af-

funde

Vini maluatici generosi, vncias
octo,

Spiritus salis rectificati, vnciam
vnam,

Stent vase optime obturato in digestione,
loco tepido octiduum, tum filtretur &
seruetur.

**ELIXIR PROPRIETATIS
PARACELSI.**

R. Aloes succotrinæ,
Myrrhae, ana vncias duas,

Croci, vnciam vnam,

Spiritus vini rectificati libras duas.

Sulphuris vncias duas.

Spiritus Vini per aliquot dies cum Spiritu Sulphuris digestioni committantur, dein admisce Aloen, Myrrham & Crocum in pul-

verem trita. Stent in digestione quatuor

dies, tum filtretur & serventur.

EL.

**ELIXIR PROPRIETATIS SINE
ACIDO.**

R. Aloes succotrinæ,
Myrrhae electæ,
Croci optimi, in subtilissimum
puluerem redactorum,
Salis Tartari, ana vnciam vnam,
Aquaer florum Sambuci, vncias
duas.

Vasi vitro plano commissæ, in loco hu-

mido reponantur per aliquot dies. Tunc

affundantur

Spiritus vini rectificati, vncias se-

decim,

leni calore per quatriuum digesta expri-

mantur ac filtrentur. Si huius Elixirii fin-

gulis vnciis, drachma vna Spiritus Salis Am-

moniaci vinosi admiscetur & haec per biduum

digeruntur, egregie exaltari potest in

ELIXIR PROPRIETATIS DUL-

CE VOLATILE.

**ELIXIR PURGANS PROPTER
VULGUS.**

R. Foliorum Sennæ, vncias duas,

Aloes hepaticæ, vnciam semis,

Zingiberis, drachmas tres,

Colocynthidis, drachmam vnam

semis,

Liquoris terræ foliatae Tartari, vni-

cias quatuor,

Spiritus vini rectificati, vncias

duodecim,

Extrahantur lege artis.

D 2

ELIX-

EL.

ELIXIR ROBORANS.

R. Corticis peruviani optimi, vncias
quatuor,
Radicis Gentianæ rubræ,
Flauedinis corticum aurantiorum,
ana vnciam vnam cum semisse,
Spiritus vini gallici, libras quatuor.
Misce, digerantur per sex dies, tum cola
& serua.

ELIXIR VISCERALE.

Elixir Viscerale:
Cort: Or: 3ij
Fruit: Or: 3i
Cassia. 3j
Peli Carbonarii 3j
Vini Malacensis 3xx
Ort. Biges: Colletus
& Salvia
Latr: Abietinij 3j
Castrarilla, 3j
Pentian: r
Trifol: an 3j
Or: de Cedro. 3j in
Misce, & cum
3j foluti Serra.
Vini malvatici, seu
Hispanici nobilioris vnciis
vinginti

Digerantur in vase bene clauso & cooptero fortiter, fere ad ebullitionem per quatuor horas. Dein cola; speciebus remanentibus adde

EL.

Aqua communis, vncias viginti
quatuor,

coque in vase bene obturato ad remanentiam unciarum sedecim, tum filtra. Hocce Decoctum cum Extractione antecedenti misce & serua ad usum

ELIXIR VITRIOLI MYSCHTI.

R. Calami aromatici, vnciam vnam, Caryophillorum, Cinnamomi electi, ana drachmas tres, Cubebarum, Nucis moschatæ, ana drachmas duas, Galangæ minoris, vnciam vnam semis, Corticum Citri, drachmas duas, Menthae crispa, Salviae acutæ, Zinziberis albi, ana drachmas tres, Sacchari albissimi, vncias tres,

Incisa & contusa misce, & superfunde spiritus Vini rectificati vncias sedecim. Stent in digestione per quatuordecim dies; dein adde spiritus Vitrioli vncias quatuor, digerantur septimanas quatuor, tum per Emporeticam colentur. Residuo, Spiritus Vini vncias sex affunde, digere, & effentiam reliquam extrahe, quam a faecibus filtro separatam, priori tincturæ iunge & aliquamdiu circulatam probe serua.

ELIX-

EL.

ELIXIR VTERINUM
CROLLII.

R. Essentiae Herbæ Artemisiæ concentratæ,
Castorei ana vncias sex,
Croci vncias duas.
Olei destillati angelicæ,
anisi,
succini, ana drachmam semis.

Misce, leni calore digerantur.

EMPLASTRUM ADHAESIUM.

R. Emplastri diachyli simplicis, libram semis,
Picis burgundicæ, vncias tres.

Misce, liquecant, ut fiat Emplastrum.

EMPLASTRUM ALBUM
COCTUM.

R. Ceræ albæ, vncias quatuor,
Cerussæ, libram vnam semis,
Olei Oliuarum, libras duas.

Oleo, leni igne bullienti, Cerussa modico aceti adsperso subtilissime trita exæte miscatur, atque ad consistentiam iustam conquantur, cui tandem cera colliqueiat, ut lege artis emplastrum iuste consistentia euadat.

EMPLASTRUM DE AMMONIACO.

R. Gummi Ammoniaci electi, libras duas,
Galbani,

EM.

Gummi styracis,
Saponis veneti, ana libram semis,
Olei lini, libram vnam,
Ceræ flauæ,
Resinæ pini,
Therebinthinæ, ana libram semis.

Misce, fiat lege artis Emplastrum.

EMPLASTRUM DE BACCIS
LAURI.

R. Baccarum lauri, in pollinem tenuissimum redactarum, vncias duas,
Cerae citrinae, vnciam semis,
Masticæ,
Myrrhae,
Thuris, ana vnciam vnam,
Olei laurini,
Therebinthinae venetae, ana drachmas tres,
Mellis despumati, quantum sufficit.

Cera, Oleo & Therebinthina liquatis, & ab igne semotis, reliqua successive secundum artem misceantur.

EMPLASTRUM DE BETONICA.

R. Cerae flauæ,
Resinæ pini,
Therebinthinae, ana vncias duas.

Liquefactæ cum resina ceræ, & aliquatenus refrigeratae, therebinthinam adde, hisque unitis pulueres subtilissimos ex arte & exæte miscendo:

D 3

Beto-

EM.

Betonicae, vnciam vnam & semis,
Mastiche,
Thuris, ana drachmas duas.
M. Fiat Emplastrum.

EMPLASTRUM CEPHALICUM.

R. Gummi Tacamahacae,
Benzoes,
Styracis calamithae,
Mastiche,
Hederae,
Olibani,
Ladani puri, ana vncias
duas,
Therebinthinae venetae, vnciam
vnam,
Olei nucis moschatae, drachmam
vnam,
Cum sufficiente quantitate styracis liquidet
fiat lege artis Emplastrum.

EMPLASTRUM DE CICUTA.

R. Succi ex tota cicuta expresi, vncias viginti,
Gummi ammoniaci electi, vncias
octo.
Diffoluatur gummi in succo, & inspissetur
ad puluis consistentiam, tum adde
Pulueris herbae cicutae, vncias
decem,
Cerae flauae, libram vnam,
Olei lini recentis, vncias quatuor.
Misce fiat lege artis Emplastrum.

EM.

EMPLASTRUM CITRINUM.
R. Cerae flauae, libras duas,
Resinae, libram vnam,
Seui hircini, aut ceruini, vncias
nouem,
Therebinthinae, vncias octo,
Olei liliorum alborum, aut hyper-
rici florum, vnciam semis,
Misce fiat lege artis Emplastrum.

EMPLASTRUM DEFENSIUUM.

R. Pulueris subtilissime Cerussae,
Lithargyrii, ana
vncias octo,
Olei e floribus rosarum, libram
vnam,
Vnguenti populei vncias tres,
Aceti rosacei, vncias octo,
Succi plantaginis per residentiam
depurati, vncias quinque.

Coquantur in Diplomate, aut terreo po-
tius vase probe vitreato, commodo, igne
leni ad consumtionem humoris & con-
sistentiam Emplastri mollioris, spatula con-
tinue agitando, cui ab igne remoto suc-
cessive adde

Cerae flauae nouae, vncias duas,
Croci optimi, drachmas duas,
Lapidis calaminaris puluerisati,
Masticis electi, ana vnciam vnam
semis,
Myrrhae electae, vnciam semis.
Omnibus calide mixtis & probe subactis
fiat Emplastrum.

EM-

EM.

EMPLASTRUM DIACHYLON
COMPOSITUM, SEU CUM
GUMMIATIBUS.

R. Emplastri diachyli simplicis, mox
docendi, libram semis,
Gummi depuratorum Ammoniaci,
Galbani,
Opopanaxis,
Sagapeniana
drachmas
duas,
Cerac,
Therebinthinae, ana vnciam vnam,
Croci, scrupulum vnum,
Olei chamomillae,
liliorum alborum, ana vni-
ciam semis,
Misce, fiat secundum artem Emplastrum.

EMPLASTRUM DIACHYLON
SIMPLEX.

R. Lithargyrii, libram vnam semis,
Mucilaginis radicum Altheae,
seminis Foeni graeci
Lini, ana libram
vnam,
Olei Oliuarum puri, libras tres,
Coquuntur in diplomate leni igne, con-
tinue agitando, ad consumtionem usque
omnis humiditatis & iustam Emplastri con-
sistentiam.

EMPLASTRUM DIAPALMAE.

R. Adipis porcini recentis liquati, & a
membranis purgati, libras duas,

EM.

Vitrioli albi, vncias quatuor,
Lithargyrii tenuissime triti, libr. tres,
Olei diapalmae, libram semis,
oliuarum, libras tres,
Ramorum palmae teneriorum, aut
eorum defectu, foliorum nouel-
lorum Quercus, vncias duas.

Palmæ rami recentes (aut eorum defectu
frondes tenelli quercus) minutissime concisi
adipi aut oleo incoquantur, tum colentur,
ac cum Lithargyrio ad consistentiam conue-
nientem reducantur, quibus ab igne remo-
tis, Vitriolum album subtilissime pulveri-
satum immisceatur, spatula e querno ligno
teneriori confecta continue agitando, ad
Emplastri debitam consistentiam.

EMPLASTRUM DIAPHORETI-
CUM MYNSICHTI.

R. Bdellii, vncias quatuor,
Cerae flauae, vncias nouem,
Colophonii, vncias quatuor,
Gummi ammoniaci aceto depu-
rati, vncias duas,
Masticæ electæ,
Olibani, ana vnciam semis,
Sandaracæ, vnciam vnam,
Succini flavi, vncias tres,
Therebinthinae puræ, vncias duas.

Cerae cum Colophonio liquatae, & ab
igne sepositæ, ac semi refrigeratae The-
rebinthina Ammoniaco colliquata, hisque
iunctis ac optime mixtis, reliqua in pulue-
rem contrita addantur, & exakte com-
misceantur.

EM-

**EMPLASTRUM DIAPOM-
PHOLYGOS.**

R. Olei oliuarum, vncias octo,
Succi Solani, libram vnam.

Coquantur leni igne ad humiditatis con-
sumptionem, tunc adde

Cerae citrinae, vncias octo,
Cerussae puluerisatae, vncias duas,
Plumbi vfti,
Nihili albi,
Olibani puluerisati, ana vnc. vnam,
Tutiae praeparatae, vnciam semis.

Fiat ex arte Emplastrum.

**EMPLASTRUM DE GALBANO
CROCatum.**

R. Gummi galbani in aceto dissoluti,
vncias sex,
Emplastri de Melloto infra do-
cendi,
Diachyli simplicis, ana
vncias tres,
Cerae citrinae, vncias duas,
Therebinthinae venetae, vnciam
vnam,
Croci orientalis, drachmas sex.

Misce fiat ex arte iustae consistentiae
Emplastrum.

EMPLASTRUM AD GANGLIA.

R. Gummi Ammoniaci,
Galbani,
Opopanacis,
Sagapeni aceto soluto-
rum, colatorum & spis-
fatorum,

EM.

Gummi Myrrhae electae subtiliter
puluerisatae, ana vncias
tres,

Olei laurini,
Spiritus Vini, ana vnciam vnam,
Sulphuris viui,
Vitrioli romani,
Salis ammoniaci, ana vnciam semis,
Euphorpii, drachmas duas.

Fiat ex arte Emplastrum.

EMPLASTRUM GRISEUM.

R. Ceræ flauac, vncias sex,
Camphorac, drachmam vnam,
Cerussae praeparatae, vnciam se-
mis,
Lapidis Calaminaris praeparati,
Lithargyrii, ana vncias duas.
Masticæ,
Myrrhae,
Olibani, ana drachmas duas,
Resinæ, vncias duas,
Seui Hircini aut Ceruini, vncias
quatuor,
Therebinthinae, vnciam vnam
semis.

Cera, Therebinthina & Seno colliquatis
& paululum refrigeratis, reliqua in pulue-
rem redacta exacte commiscendo, fiat Em-
plastrum secundum artem.

EMPLASTRUM AD HERNIAS.

R. Glutinis animalis cuiuslibet, vel
etiam, quo scrinarii vtuntur,
vncias quatuor,

Lapi-

EM.

Lapidis haematitiae præparati,
Sanguinis Draconis præparati,
Sacchari saturni crystallisati, ana
drachmas tres,

Gummi ammoniaci, cum aceto
depurati, ac olei myrtini suf-
ficienti quantitat[i] coctione vni-
ti, vncias tres.

Misce calore leni cinerum, & fiat lege artis
Emplastrum, mollis quidem, sed tenacis con-
sistenter.

EMPLASTRUM DE ME-
LIOTO.

R. Herbae & florum Meliloti, vn-
cias sex,
Summitatum absynthii,
Florum chamomillae,
Baccarum lauri,
Seminis apii,
Styracis, ana drachmas sex,
Gummi ammoniaci, vnciam vnam
& semis,
Cerae citrinae, vncias nouem,
Seui hircini, vncias quinque,
Therebinthinae,
Resinæ, ana drachmas sex,
Olei chamomillæ, vncias tres,
Misce, fiat Emplastrum.

EMPLASTRUM MERCURIALE,
ALIAS DE RANIS CUM
MERCURIO.

R. Empl[or]tri diachyli cum gummi,
libram vnam semis,

EM.

Liquetur leni calore, dein ab igne remo-
to, sub continua agitatione sensim adde

Mercurii viui depurati, vncias octo,
Styracis liquidæ, vnciam vnam &
semis,

Therebinthinae, vnciam vnam,

Misce, fiat Emplastrum.

EMPLASTRUM DE MINIO.

R. Seui ceruini, seu hircini,
Cerae citrinae,
Olei rosarum, ana libram vnam,
Therebinthinae, vncias quatuor,
Liquatis lenissimo calore adde

Minii, libram vnam,
Misce, fiat Emplastrum.

EMPLASTRUM MIRACU-
LOSUM.

R. Cerussæ,
Minii, ana libram vnam,
Olei oliuarum, libras duas cum
semisse,
Saponis veneti bene siccatai, vn-
cias tres.

Scindatur sapo minutissime, atque oleo
in diplomate igne moderato feruenti im-
misceatur, vbi omnis sapo oleo fuerit col-
liquatus & mixtus, insperge continue mo-
uendo, alternatim Cerussam & Minium
subtilissime trita, semperque rudicula lignea
diligentissime agitando, ne in fundum ca-
dant, simulque cauendo, ne nimio igne
ebulliant nimis, igne moderato coquantur,
donec subfuscum colorem inducre incipient,
E &

EM.

& iustum Emplasti ductilis consistentiam, id quod guttula in frigidam instillata experiri poteris, acquirant. Tum ab igne remoue, ac medium circiter partem, aut in scatulas effunde, aut in aquam frigidam, donec tractabilis fiat, tunc manibus oleo delubitis malaxando, efforma magdaleones, & ferna.

Alteri medietati igni rursus parum impositæ Aluminis vstii, drachmas duas exacte misce, sic perinde in scatulas effunde aut magdaleones efforma.

Quod si contra Catarrhos eiusdem vsum exoptes, loco Aluminis, Camphoram in olei oliuarum pauxillo distemperatam sub finem adde & misce.

EMPLASTRUM NIGRUM SULPHURATUM BECHOLZII.

R. Cinerum clavellatorum purorum, libram vnam, Salis ammoniaci puri, vncias tres, Spiritus therebinthinae, libras duas.

Mixta, digerantur per mensem. Liquori digesto adde

Florum sulphuris, vncias duas.

Digere de nouo per mensem. Dein admisce

Gummi in aceto squillitico soluti, Ammoniaci, Galbani, Bdellii, Sagapeni, anabinas vncias cum dimidia,

EM.

Colophonii, libram vnam, Myrrhae optimae purae, Therebinthinae, ana vncias duas. Coque ad consistentiam Emplasti, sub finem adiice

Camphorae, in spiritu vini solutae vnciam vnam semis.

EMPLASTRUM OXY-CROCEUM.

R. Croci, Gummi aceto depurati, Ammoniaci, Galbani, Mastiches, Myrrhae, Olibani, ana vncias duas, Therebinthinae, Cerae, Colophoniae, Picis, ana libram semis.

Cera & Colophonia Pici colliquetut, colatis ac ab igne remotis & patumper refrigeratis, Ammoniacum ac Galbanum Therebinthina solutum, mox & reliqua subtilissime puluerisata addantur, & exacte miscantur pro Emplastro.

EMPLASTRUM RESOLUENS.

R. Gummi ammoniaci crudi, libras tres, Aftae fetidae, libram vnam, Saponis venetae concisae, libram semis, Aceti vini optimi, quantum satis, Coquantur, & fiat lege artis Emplastrum.

EM-

EM.

EMPLASTRUM SAPONATUM
BARBETTE

idem est quod

EMPLASTRUM MIRACU-
LOSUM.EMPLASTRUM DE SPERMA-
TE CETI.

R. Cerae albae, vncias quatuor,
Galbani depurati, vnciam vnam,
Spermatis Ceti, vncias duas.
Olei Liliorum alborum vnciam
semis,

Ceræ igne leni liquatæ sperma Ceti, &
tandem Galbanum commiscendo, fiat ex
arte Emplastrum.

EMPLASTRUM DE SPERMATE
RANARUM.

R. Cerae citrinae, vncias sedecim,
Cerussac venetae subtilissime tri-
tae, libras decem,
Lithargyrii, libram vnam,
Mucilaginis de spermate ranarum
per linteum colatae,
Olei oliuarum, ana libras octo,
Sacchari saturni, vncias duas cum
semisse,
Therebinthinae communis, vncias
octo.

Mucilaginem spermatis ranarum cum oleo
coque ad consumtionem usque humiditatis,
quibus demum cera ac therebinthina, vt &
pulueres reliqui lege artis immisceantur.

EM.

EMPLASTRUM STOMA-
CHICUM.

R. Gummi Galbani,
Tacamahacæ,
Masticis electi,
Styracis calamithacæ,
Ceræ flauæ, ana libram vnam,
Olei oliuarum, libras duas,
Liquefactis leni calore adde
Pulueris baccarum Lauri,
Seminis cumini, ana drach-
mas sex,
Caryophillorum aromati-
corum,
Nucis moschatae, ana vna-
ciam semis,
Balsami peruviani optimi, drach-
mas tres,
Olei destillati menthae,
carui, ana guttas
quadraginta,
Misce, fiat Emplastrum.

EMPLASTRUM DE TACA-
MAHACA.

R. Gummi Animæ,
Masticæ,
Sandaracæ,
Succini, ana drachmas tres,
Tacamahacæ, vnciam vnam,
Ceræ, vncias tres,
Olei masticini, drachmas tres,
Therebinthinae, drachmas duas,
Misce, fiat secundum artem Emplastrum.

E 2

EM-

EM.

EMPLASTRUM CONTRA
VERMES.

R. Olei absynthii, vncias quatuor,
petrae, vnciam vnam,
Cerae flauae, vncias sex,
Therebinthinae venetae, vnciam
semis.

Galbani,
Pulueris Colocynthidis,
Absynthii,
Aloes hepatica, ana vna-
ciam vnam,
Pulpae allii sub cineribus cocti, vna-
ciam vnam & semis,
Misce fiat lege artis Emplastrum.

EMPLASTRUM VESICATO-
RIUM.

R. Pulueris Cantharidum, vncias duas,
Picis albae,
Cerae citrinae,
Therebinthinae, ana vnciam vnam.
Misce, fiat Emplastrum.

EMPLASTRUM VESICATORI-
UM TEMPERATUM.

R. Emplastri vesicatorii ante descripti
vncias sex,
diachyli compositi, vna-
cias duas,

Camphorae in olei amygdalarum
dulcum quantitate sufficiente
solutae, drachmam vnam,
Misce, fiat Emplastrum.

EMPLASTRUM VESICATORI-
UM PERPETUUM.

R. Therebinthinae venetae,

ES.

Gummi Mastichis subtilissime pul-
uerisati, ana libras quatuor,
Pulueris Cantharidum, libram
vnam semis,
Pulueris gummi Euphorbii, libram
vnam,

Misce, fiat lege artis Emplastrum.

ESSENTIA ABSYNTHII
COMPOSITA.

R. Comarum Absynthii vulgaris, vna-
ciam vnam,
Foliorum Cardui benedicti, vna-
ciam semis,
Florum Centaurei minoris, drach-
mas duas,
Radicum Zedoariae,
Corticum Aurantiorum,
Citri, ana drachmastes,
Myrrhae rubrae, drachmam vnam,
Caryophillorum,
Croci, ana drachmam semis.

Incis & contusis affunde spiritus vini
rectificati libram vnam semis, stent in di-
gestione dies aliquot, quatuor circiter, vase
optime clauso, postea essentia extracta char-
ta bibula coletur.

Nota. Circa Essentias in genere idem no-
tandum, quod circa aquas compostas
supra monitum, hic quoque locum
inuenire, & circa essentias extrahen-
das obseruandum esse, ne intemperi-
uæ parsimoniae ergo, Essentiis paran-
dis spiritus vini sinceri, & quidem
optime dephlegmati loco, spiritus ad-
hibeantur, aut ab aliis speciebus ab-
strac-

ES.

Mistraditii, alienis virtutibus quadam tenus imprægnati, aut non satis exacte dephlegmati; neutquam autem se- quiores vulgares frumenti, aut aliarum frugum odore quandoque & sapore nauseabundi. Satius & optimum foret, si cuique, præsertim vegetabilium extrahendae essentiae spiritus eiusdem vegetabilis proprius, aut per fermentationem, aut per abstraktionem Vini spiritus, ab eodem vegetabili paratus, adhiberetur.

ESSENTIA ABSYNTHII SIMPLEX.

R. Summitatum absynthii floridarum & ad maturitatem proxime accedentium, cum foliis minoribus in umbra siccatarum, uncias sex, contusa infundantur in libris duabus spiritus proprii per fermentationem parati, quod consultius & præstantius, aut saltem vini gallici rectificati, post digesti-
onem sufficientem essentia extracta, decantata, expressa & per emporeticam destillata viui asseruetur.

Nota. Juxta hanc normam omnes fere reliquæ vegetabilium essentiae simpli-
ces parari poterunt.

ESSENTIA ALEXIPHARMACA STAHLII.

R. Radicum Angelicæ,
Imperatoriaæ,
Helenii, anavnciam vnam,
Carlinæ, vnciam semis,
Vincetoxicí,
Pimpinellæ albæ, ana vn-
ciam vnam semis,

ES.

Concisa infunde in ~~ALTHEÆ~~
Spiritus vini rectificati optimi, li-
bra vna,
Digerantur per Nycthemeron.

R. Huius Essentiae & Essentiae Scor-
dii ana; mixta seruentur vsui.

ESSENTIA ALOETICA.

R. Aloës succotrinae, vnciam vnam,
Spiritus Vini rectificati, vncias
quinque.

Digere per biduum, tum per char-
tam filtra.

ESSENTIA AMARA.

R. Summitatum Absynthii vulgaris
vnciam vnam semis,
Centaureiminoris,
Herbae Tanaceti,
Cardui benedicti, ana vn-
ciam vnam,
Cochleariae, vnciam se-
mis,

Baccarum Juniperi, vnciam vnam
& semis,
Corticum exteriorum Aurantio-
rum,
Radicum Zedoariae,
Gentianæ ana vnciam
unam.

Incisis & contusis affunde

Spiritus vini gallici optimi, libras
quatuor,

Digerantur octiduum, colentur & fiat
secundum artem Essentia.

E 3

ES-

E.S.

ESSENTIA AMBRAE.

R. Ambræ gryseæ optimæ, drachmam vnam,
 Moschi Alexandrini optimi, grana quindecim,
 Spiritus rosarum, per fermentationem parati, & optime rectificati, aut
 Spiritus vini gallici rectificatissimi, ana vncias tres,
 Mista exæcte phiolæ includantur bene obturata, ac per octiduum circiter calore lenissimo digerantur, post per chartam emporeticam traiiciantur, & in vase probe cooperato seruentur.

ESSENTIA AROMATICA.

R. Cinnamomi longi, vnciam vnam,
 Macis,
 Cardamomi minoris,
 Caryophillorum, ana vnciam semis,
 Zinziberis,
 Piperis longi,
 Galangæ minoris, ana drachmas duas,

Contusa extrahe cum unciis viginti Spiritus vini rectificatissimi.

ESSENTIA ASAE FOETIDÆ.

R. Asae foetidae, vncias duas,
 Spiritus vini tartarisati, libram vnam,
 Extrahe, digerendo triduum calore leni, essentiam, quam filtratam serua.

E.S.

ESSENTIA AURANTIORUM CORTICUM.

R. Flauedenis extimæ corticum aurantiorum recens detractæ & parum siccatae, vncias quinque,
 Spiritus vini a corticibus, post triduanam digestionem abstracti, optimi & fortissimi, libram vnam,

Digerantur, donec spiritus omnem essentiam extraxerit, & saturate illa tintus fuerit, que tum filtretur & seruetur.

ESSENTIA BALSAMI PERUVIANI.

R. Balsami peruviani optimi, vnciam semis,
 Salis tartari siccissimi, drachmam semis, cum spiritus vini gallici optime dephlegmati vnicis duabus lege artis dies aliquot loco tepido digere: Essentiam extractam per bulbam cola, ac serua.

ESSENTIA CARMINATIVA.

R. Radicis Calami aromatici, Zedoariae, Galangae minoris, Pomorum Aurantiorum viridium, Florum Chamomillæ romanae, ana vncias duas, Seminis Anisi stellati, vnciam vnam semis, Semi-

E.S.

Seminis Cardamomi, minoris
drachmas sex,

Mixtis concisis & contusis affunde

Aqua menthae vinosae, vncias
sedecim,

Digerantur per triduum, exprime, filtra
& serua ad usum.

ESSENTIA CASTOREI.

R. Castorei a cute ac pinguedine se-
parati & minutissime concisi,
vncias duas,
Spiritus vini rectificatissimi, vn-
cias duodecim,

Stent in digestione ocliduum circiter,
donec Essentia saturato colore tincta appa-
reat, qua per bibulam a residuo separetur
& seruetur.

ESSENTIA CENTAUREI
MINORIS.

Fit instar aliarum essentiarium simpli-
cium artis lege cum spiritu vini optime re-
ctificato.

ESSENTIA CHACARILLAE
CORTICUM.

Fit aliarum essentiarium simplicium mo-
do cum spiritu vini rectificatissimo e corti-
cibus pulueris faris extrahendo.

ESSENTIA CHINÆ CHINÆ.

R. Corticum chinæ chinæ optimæ
notæ pulueris farorum, vnciam
vniam,

E.S.

Spiritus vini tartarisati, vncias
quinque.

Digerantur ocliduum, postea expressa fil-
tro depurentur & seruentur.

ESSENTIA CINNAMOMI.

R. Cinnamomi acutissimi contusi,
vncias duas,
Spiritus vini rectificati, vncias
octo.

Stent in digestione ocliduum circiter, tum
essentia extracta per emporeticam filtrata
seruetur.

ESSENTIA CORTICUM
CITRI.

E flaudine corticum Citri recens abstra-
cta, & parumper siccata, ac scindendo
communata, cum spiritu vini a corticibus
Citri recentibus abstracto iusta proportione
digerendo, paratur ad instar Essentia cor-
ticum aurantiorum.

ESSENTIA CROCI.

R. Croci orientalis aut austriaci op-
timi, vnciam vnam,
Spiritus vini rectificatissimi, vn-
cias sex,

In phiala longi colli optime obturata
balneo toris digere biduum, tum spiritum,
essentia & tinctura imprægnatum, deple,
filtra & serua.

ESSENTIA FULIGINIS.

R. Cinerum clauellatorum, libram
semis,
solue

ES.

solue in

Aquaæ pluuiæ, libris tribus.

Stet horam vnam alteramue, ac identi-
dem agiterur, pro promtiori dissolutione:
huic solutioni iniice

Salis ammoniaci, vncias sex,

Ac denuo agita, vt plene soluantur, tan-
dem dissolutis omnibus, fuliginis a furno
splendentis in puluerem redactæ vncias duas
insperge, ac loco témperato per diem &
noctem, agitando aliquoties, vitro probe
clauso digere, per chartam emporeticam
cola, ac in vase exacte obturato & munito
serua.

ESSENTIA GENTIANÆ
RADICIS.

Ad instar aliarum essentiarum simplicium
cum spiritu vini rectificatissimo paratur.

ESSENTIA GUMMI AMMO-
NIACI,

Vid. TINCTURA.

ESSENTIA IALAPPÆ.

R. Pulueris radicum ialappæ, vnciam
vnam semis,

Flauedinis corticum citri recen-
tis vnciam semis,

Cinnamomi acuti, drachmam
vnam semis,

Spiritus vini rectificati, vncias
sex.

Stent in digestione vase bene clauso ad
extractionem vsque essentia omnis, tum ex-
primantur & filtrantur.

ES.

ESSENTIA LIGNI GUAIACI.

R. Rasuræ subtilis ligni sancti, vncias
duas,

Spiritus vini rectificatissimi vncias
octo.

Digere octiduum vase optime clauso, tum
menstruum decanta, ac per emporeticam
traicce.

ESSENTIA LIGNORUM.

R: Rasuræ Ligni sancti, vncias tres,

Santali rubri, vnciam

vnam,

Sassafras,

Juniperi ana, vncias
duas,

Rhodii, vnciam semis.

Strobulorum pini, vncias duas,
Spiritus vini rectificati libras tres,
cum semisse.

Stent in digestione vase optime clauso
octiduum, postea expressa essentia per bi-
bulam coletur.

ESSENTIA MASTICHES.

R. Granorum Mastiches electæ pul-
uerisatorum, vnciam vnam,

Spiritus vini optimi & rectifica-
tissimi, vncias tres,

Digerantur quatriduum, postea fil-
trentur.

ES-

ES.

ESSENTIA MILLEFOLII.

Perinde ut reliquæ Essentia simplices spiritu vini rectificato extrahitur lege artis.

ESSENTIA MYRRHÆ.

R. Myrrhæ subtilissime tritæ, vncias

quatuor,

Spiritus vini rectificati, vncias octodecim,

Stent infusa calore moderato, donec spiritus probe tingatur, qui decantetur & filtretur.

ESSENTIA PIMPINELLÆ ALBAE.

Spiritu vini optime rectificato, aliarum Essentiarum instar paratur.

ESSENTIA PINI.

R. Strobolorum pini viridium, vel turionum, quantum vis.

Spiritus ex eiusmodi strobulis iunioribus per fermentationem parati & optime ab iisdem rectificati, aut saltem Vini ab iisdem abstracti, quantum requiritur ad digitorum trium eminentiam.

Stent in digestione calore moderato, donec essentia tincta extrahatur, quæ post factam expressionem per bibulam coletur.

ESSENTIA STOMACHICA.

R. Radicum Calami aromatici, Galangæ minoris, Ireos florentinae, Zedoariae, Zinziberis albi,

ES.

Cardamomi minoris, Cubebarum, ana drachmam vnam, Aurantiorum pomorum viridium, Cinnamomi, ana drachmas duas, Flaudinis corticum citri, drachmas tres.

Incisa & contusa crasse, infunde in Spiritu vini rectificati optimi quantitate convenienti, stent in digestione vase optime obturato triduum, tum per bibulam transcoletur.

ESSENTIA SUCCINI SINE SALE.

R. Succini electi albi, vel flavi in puluerem subtilem redacti, vncias duas, quibus affundantur spiritus vini rectificatissimi, vncia decem, digerantur loco tepido vase optime clauso octiduum, tum essentia extracta filtretur.

Nota. Si Succinum Alcali admixto, aut liquore quodam alcalino prius reseratum extractioni commiseris, felicius succedit opus, & tunc erit

ESSENTIA SUCCINI CUM SALE PARATA.

ESSENTIA SUCCINI BALSAMICA.

R. Succini citrini bene puluerisati, vncias duas, Liquoris anodini mineralis, vncias septem,

Digerantur in vase optime clauso, lenissimo calore, atque post sufficientem extractione

ES.

tionem, clarum a spissso per inclinationem
vasis decantetur, & in vitro bene obturato
seruetur.

ESSENTIA TRIFOLII
FIBRINI.

R. Foliorum trifolii palustris sive fibrini,
modice & recens fiscatorum,
minutim conciforum,
vncias tres,
Spiritus ex iisdem per fermenta-
tionem parati & rectificati, aut
spiritus tantum eiusdem ab-
stractitii, vncias decem.

Post debitam digestionem & extractio-
nem exprimantur & filtrantur.

ESSENTIA VALERIANAE
COMPOSITA.

R. Radicis Valerianæ,
Serpentariae virginianaæ,
ana vniciam vnam,
Camphoræ, drachmam vnam,
Spiritus vni rectificati, vncias octo.
Digere, filtra & serua.

ESSENTIA VULNERARIA, seu
BALSAMUS VULNERARIUS
STAHLII.

R. Essentiæ Succini sine sale, vncias
duas,
Myrrhæ, vniciam vnam,
Spiritus Terebinthinæ optimi, vni-
ciam semis,
Misce, digere loco calido.

EX.

EXTRACTUM ABSYNTHII.

R. Summitatum Absynthii in umbra
ficcaturum, libram vnam,
Concisæ & conquassatae infundan-
tur in vase vitro aquae fon-
tanæ destillatae, libris qua-
tuor.

Digerantur oīdiuum in loco calido, li-
quor inde fortissime expressus & colatus, cu-
curbita alembico & recipiente munita, vel
in balneo matis, coquatur igne lento ad
consistentiam extracti iustum.

Nota. In genere circa extracta notandum,
ne calore nimio inspissentur, euapora-
tio potius in balneo Mariæ vel alio,
istum caloris, gradum non superante,
& quidem vel in vase vitro, vel terreo
vitreato, vel etiam stanneo, sed satis
capacibus & amplis instituenda. Si-
mili modo, ut absynthii extractum,
parantur

Extractum Arnicae herbæ & florum,
Cardui benedicti,
Centaurei minoris,
Chamomillæ,
Cochleariaæ,
Enulae,
Liliorum conuallium,
Marrubii,
Millefolii,
Rhabarbari,
Scordii,
Tanaceti,
Trifoli fibrini.

EX-

EX.

EXTRACTUM ACETO-
SELLAE.

R. Herbae recentis Acetosellæ, libram
vnam,

In mortario vitro vel ferreo contundatur, dein sacculo linteo immittatur & sub prælo succus omnis exprimatur, post fæculas istas cum residuo coquatur in Aqua fontana, & decoctum hoc cum succo expresso misceatur, filtretur per manicam Hippocratis, & tandem in vase vitro, vel terreo vitreato leni igne, & sub perpetua agitatione ad Extracti consistentiam coquatur. Secundum hanc normam etiam ex herbis & floribus recentibus parantur.

Extractum Chaerfolii,
Cicutæ,
Daturæ,
Fumariae,
Hyosciami,
Stramonii,
Taraxaci,
Veronicae.

EXTRACTUM AGARICI.

R. Agarici optimæ notæ contusi, vncias quatuor,

Affunde spiritus vini optimi ad eminentiam trium digitorum, stent in digestione quatriduum.

Postea decantetur & leuiter exprimatur; colatura per emporeticam facta, in balneo maris abstrahendo vini spiritum, beneficio cucurbitæ alembico munitæ, ad Extracti consistentiam redigatur.

EX.

EXTRACTUM ALOËS
AQUOSUM.

R. Aloës succotrinæ, vncias sex, redige in puluerem, ac in matracio seu cucurbita vitrea affunde Aquæ Cardui Benedicti ad eminentiam quatuor vel quinque digitorum; cucurbitam aut matracium exacte subere, ac cera hispanica claudere, atque in balneum Maris, fere bulliens, positam, duos vel tres dies digere ac soluetur aloë, & aqua Rubini colorem induet, quam decanta, aliamque sed minori quantitate affunde, ut prius digere, atque tinctam priori adde, idque toties continua, donec non amplius tingatur aqua, quas omnes confusas destilla leni igne, & exhala ad mellaginem spissam.

EXTRACTUM ANGELICÆ.

R. Angelicæ radicum, vncias quatuor; crassiuscule contusa infundantur in spiritus vini tartarifati libra vna, stent per quatriduum in loco calido, donec extracta sit radicum virtus, extractam deple, & expime. Residuo aquam communem affunde, atque aliquantis per coque, tandem expime, per emporeticam depura, atque priori extractioni spiritu vini factæ adiunge, per emporeticam cola, atque in cucurbita coquendo ad spissitudinem extracti exhala.

Simili modo ex omnibus fere radicibus extracta parantur, & quidem sequentium magis in usum venientium.

EX.

Extractum Aristolochiae,
Calami aromatici,
Corticis peruviani gum-
meo - resinosum,
Gentianae,
Pimpinellæ,
Pini,
Valerianæ,
Zedoariae.

EXTRACTUM ANTHELMINTICUM.

R. Seminis Santonici,
Summitatum Absynthii, ana ses-
quivnciam,
Vitrioli martis ad albedinem cal-
cinati, drachmam vnam,
Agarici, vnciam semis,
Seminis Dauci sylvestris,
Herbæ Tanaceti, ana vnciam vnam,
Concisis contulis groso modo affunda-
tur Spiritus vini rectificatus quantitate suf-
ficienti, & facta digestione filtretur Tinctu-
ra, quæ dein euaporando inspissetur ad Ex-
tracti formam.

EXTRACTUM CASTOREI.

Ex Essentia eius supra edocta, Spiritum
vini per alembicum, leni igne auocando,
ac in Extracti consilientiam exhalando fiat.
Spiritus inde resultans in futurum pro pa-
randa rursus essentia seruari, aut medica-
mentis hystericis utilem iungi potest.

EXTRACTUM CATHOLICUM.

R. Aloës succotrinae purissimæ, vn-
ciam vnam,

EX.

Agarici optimae notae,
Radicum Hellebori nigri,
Jalappæ,
Scammonii eleæti, ana vnciam
semis,
Pulpæ Colocynthidis, drachmas
sex.

In puluerem redacta infundantur in Spi-
ritus vini tartaratis, quantitate sufficienti,
ad eminentiam quatuor digitorum, ac di-
gerantur triduum, dein cum aliquali ex-
pressione per bibulam colata, balnei calore
exhalentur, ad mellis spissioris consistentiam,
cui adde

Pollinis Sacchari albissimi, vnciam
vnam, irrorati cura,
Olei destillati Cinnamomi,
Caryophillorum, ana
guttis sex,
Anisi, guttis decem,
Et exakte misce.

EXTRACTUM COLOCYNTHIDIS.

Ex sola pulpa a grani omnibus vendi-
cata, coquendo fit aqua communi, & de-
coctionem postea colatam, expressam &
filtratam, addito sub finem pauxillo Spiri-
tus vini optimi ad Extracti spissam con-
sistentiam euaporando.

EXTRACTUM CORTICIS CASCARILLÆ AQUOSUM.

R. Pulueris corticis Cascarillæ, libram
vnam.

In-

EX.

Infunde cum aqua fontana bullienti in vase terreo vitreato, digeratur per Nycthemeron, dein decanta fluidum & residuum per linteum exprime, expressum filtra, & cum Decocto misce, quod leni caloris gradu, ad debitam Extracti consistentiam inspissandum.

EXTRACTUM CORTICIS PERUUIANI AQUOSUM.

Simili modo paratur. Si vero intendis mere subtilissimum gummosum principium extrahere, pulvis corticis huius cum aqua fontana frigida in lagena vitrea infunditur, & sepius quassatur, idque per aliquot dies sepius iteratur, tum omnis Tinctura grati flavi, aurei quasi coloris filtratur, & in balneo Mariæ evaporatur: Sic habebis Extractum corticis peruvianum gummosum, cum aqua frigida paratum.

EXTRACTUM CROCI.

R. Croci orientalis optimi, vncias duas, Spiritus vini rectificatissimi, quantum satis ad eminentiam digitorum duorum, digere loco tepido, vase optime clauso, per biduum; spiritum tinctum deple, aliud affunde, digere, idque continua, donec omnis effentia extrausta, quas omnes confunde, ac spiritum in balneo leni calore abstrahet, ad Extracti consistentiam.

Aut si mauis, sola aqua communi omnem Croco effentiam elue, quam postea exhalando inspissa in extractum, quod non nullis, forte non iniuria, praecedenti præfertur.

EX.

EXTRACTUM seu MELLAGO GRAMINIS RADICIS.

R. Radicis Graminis recentissimae & minutum concilae, quantum vis.

Exprimatur omnis succus fortissime, residuum cum aqua fontana pauca coquatur; Decoctum filtratum cum succo espresso misceatur & in balneo Mariæ ad Mellaginem inspissetur.

EXTRACTUM HELLEBORI NIGRI.

R. Fibrarum Hellebori nigri teneriorum, reiectis partibus lignosis, libram vnam,

Scindendo comminuantur & affundantur Aquae simplicis limpidissimae, librae tres, Spiritus vini, vnciae quatuor, Salis tartari, vncia semis.

Macerentur in balneo Maris ad sufficien- tem virium extractionem, tum liquor extractus depleteatur, & ad Extracti spissitudinem exhaletur.

EXTRACTUM LIGNI GUAIACI.

R. Rasuræ ligni guaiaci, quantum vis.

Coque in aqua communi ad medietatem, decoctum expressum & clarificatum inspissando in Extractum redige.

EX.

OP EXTRACTUM MARTIS.

R. Limaturae martis purissimae, vncias quatuor,
Superinfunde in vase vitreo

Aceti vini, vncias duodecim,
Digere per tres dies, filtra & residuo iterum adde

Aceti vini, vncias duodecim.

Sic digerendo, colando & de novo Extractum ad residuum addendo, progredere usque ad perfectam Limaturam solutionem. Dein singulas solutiones misce & coque in vase ferreo, sub perpetua cum spatula agitatione, & lento igne, usque ad Mellis consistentiam.

EXTRACTUM MYRRHÆ.

R. Myrrhae rubrae electae puluerisatae, vncias tres,
affunde

Aquæ fontanae bullientis, vncias duodecim.

Digerantur per biduum, tunc liquor filteretur & lenissimo igne ad Mellaginem usque euaporetur.

EXTRACTUM NUCUM JUGLANDIS.

Nuces Juglandis nondum maturae circa finem mensis Julii collectae, cum sufficiente quantitate aquæ destillatae misceantur, & in vase ligneo cum pistillo itidem ligneo bene contundantur; post omnis succus exprimatur, & in balneo arenæ leni calore sub continua agitatione ad debitam Extracti consistentiam inspissetur.

EX.

EXTRACTUM OPII.

R. Opii thebaici optimi, quantum vis, In frustula minutissima scissum, aqua communi fluuiali feruida solue, solutum deple, & per emporeticam filtra, filtratum illud calore moderato balnei maris ad Extracti consistentiam inspissa.

EXTRACTUM PANCHYMA-GOGUM.

R. Agarici optimae notae, recens trochiscati,
Diagrydii,
Jalappæ,
Rhabarbari electi,
Turbith albi, & gummosi,
Seminis Carthami decorticati, ana vnciam semis,
Fibrarum radicum helleborini gr.,
Foliorum Sennæ, a stipitibus mundatorum, ana vnciam vnam,
Pulpa Colocynthidis veteris, ab arillis & granis purgatae, drachmas sex,
Cinnamomi electi & acuti, drachmam vnam,
Cardamomi,
Caryophyllorum, ana drachmam semis,
Croci.
Spicae indicae,
Ligni aloës, ana scrupulum vnum,
Masticæ, drachmam semis.
Contusa omnia crassiusculæ infundantur in

EX.

in Spiritus vini rectificati, quantum sufficit ad eminentiam trium digitorum, stent loco calido in digestione, singulis diebus mouendo, dies quatuordecim, facta cum expressione colatura, residuo affunde:

Aqua communis,

(imprægnatae Salis tartari purissimi, drachmis sex) quantum satis, digere biduum igne feruente balnei, tum exprime & per bibulam cola, solutionem utramque misce, & lenissimo igne balnei maris, in cucurbita alembico munita Spiritum vini primum, suis usibus aptum, evoca, postea vase aperito ulterius ex arte ad debitam Extracti consistentiam evapora.

EXTRACTUM QUASSIÆ.

Simili modo paratur quam

EXTRACTUM LIGNI
GUAIACI.EXTRACTUM SALICIS FRA-
GILIS CORTICIS,

Eodem modo paratur uti

EXTRACTUM GASCA-
RILLÆ.

EXTRACTUM SATURNI.

Est Acetum Lithargyrii concentratum, vel ad consistentiam tenuioris mellis lenissimo igne evaporatum.

FLORES BENZOËS GUMMI.

R. Gummi benzoës subtilissime triti, quantum vis.

Misce arenæ purissimæ, lotæ & rursus seccatæ duplo, inde cacabo terreo vi-

FL.

treato rotundo, cui pyramidem chartaceam, duplcatam ita impone, ut orificium cacabi illa exacte tegatur, ac igne moderato carbonum subministrato, sublimabuntur flores, chartæ cohærentes, sèpius, ne relabantur, eximendi, donec omnes sublimati fuerint.

Est &c aliud per destillationem parandi modus, quo maiores & elegantiores acquirentur flores, quem qui sequi voluerit, consulat Schroederi Pharmacopeam. Parte 4. Clasæ 2. Tit. 377. Pag. 217.

FLORES SALIS AMMONIACI
MARTIALES.

R. Limaturae martis subtilissimæ, vñciam vnam, Salis ammoniaci purissimi, libram vnam.

In puluerem redacta & optime mixta ac aliquamdiu loco calido digesta, e cucurbita vitrea igne arenae gradatim aucta, tandem satis intenso sublimantur. Flores superiores ac leuiores caute collecti præter alios usus Essentiæ martialis parandæ cedunt. Inferiores in fundo cucurbitæ residui per deliquium in cella soluendi, liquori martiali suo loco tradendo inseruiunt.

FLORES SULPHURIS.

R. Sulphuris puluerisati, quantum vis, Arena lotæ & rursus exsiccatae, aut salis decrepitati tantudem, misce ac e cucurbita plani fundi proportionata, igne arenæ conuenienti sublima; initio

FL.

tio capitellum impone rostratum, ad excipiendum ac remouendum parum liquoris acidi, quod, si magna sulphuris copia sublimanda, primo exsillare solet. Hoc deficiente, muta alembicum & aliud rostratum ac cæcum impone, aut rostrum saltim arcte obtura, ad arcendum aëcis accessum. Quo floribus aliquatenus replete, alium priori exacte respondentem, qui hunc in finem in pronitu sit, remoto priori impone subito, (ne irruente in cucurbitam aëre, sulphur feruens siam concipiat) ac flores in priori collectos caute exime, quo altero quoque floribus impleto, hunc rursus imponere queas, sicque continua iusto ignis gradu, donec omnes adscenderint flores, quos sollicite collectos ferua.

FLORES ZINCI.

R. Zinci, in frustula tenuia communi-
nati, quantum volueris.

Committe in crucibulum amplum & altum, medios inter carbones reponendum. Ignem vrge donec fluat Semi - metallum, ac tandem erumpat in flamمام ex cæruleo viridem. Tum crucibulum contege, vel cochleari ferreo, vel alio crucibulo inuerso, vt colligantur Flores albi & leuissimi, flocorum niuis ad instar. Nisi enim retineanter, totum dissipabitur & avolabit Zincum, & totius laboratorii spatiū lanugine quadam, per aëra volitante, obnubilabit; unde Flores illi non inepto nomine vocantur a Chymicis *Nihil album*, ab aliis *Lana philosophica*.

GA.

GALBANETUM PARACELSI.

R. Gunnini Galbani, libram vnam,
Hederæ, vncias tres,
Olei Terebinthinæ, libram semis,
Laurini,
Spicæ, ana vnciam vnam,
Digerantur simul per vnum alterumue
diem, dein retorta destilletur Liquor.

GLOBULI MARTIALES

Gallis BOULES d'ACIER.

R. Limaturæ ferri præparatæ, partem
vnam,
Tartari albi puluerisati, partes
duas.

Misce in cucurbita, affunde Spiritum
vini ad eminentiam digiti, radiis solaribus
vel balneo maris digere, & evapora ad siccitatem. Massæ exsiccatae & pulverisatae ite-
rum Spiritum vini affunde, digere ut supra,
idque toties repete, donec massa exsiccata
quasi resinosa appareat. Ex hac massa Glo-
buli formentur, ad ouï magnitudinem.

GLYCYRRHIZA TORTILIS.

Vid. PASTA.

HEPAR ANTIMONII.

Eius conficiendi methodus supra in Cro-
ci metallorum præparatione simul indica-
ta est.

JULAPIUM ROSATUM ET
VIOLARUM.

Parantur simplici solutione super igne
moderato Sacchari albissimi, libræ vnius
cum

KE.

cum semiste, in aqua illorum florum fragrantissimæ, libra una.

KERMES MINERALIS.

R. Antimonii in puluerem grossum redacti, libram unam,

Cinerum elatellatorum bene depuratorum, vncias decem, Aquæ fontanæ destillatae, libras quinque.

Coquuntur per biorum, & liquor feruens filtretur, vas dein reponatur, usque dum mora & quiete sua puluis sponte precipitet, tum fluidum omne decantetur, & precipitatum saepius lotum siccetur. Liquor decantatus massa priori reaffundatur, quoties simili labore talis adhuc puluis obtineri potest.

LAC SULPHURIS.

R. Florum Sulphuris, vncias tres, Salis Sodaæ depurati, vncias nonnullas, uem,

Cum aqua pluiali seu destillata in vase vitreato tam diu coquuntur, usque dum plurimum sulphuris solutum fuerit: Tum filtra & solutioni calidæ tantum aceri destillati insilletur, quantum ad omnem precipitationem pulueris necessæ est. Præcipitatum aqua destillata saepius edulcoretur, & siccetur.

LAPIS DIUINUS, seu OPHTALMUS.

R. Vitrioli cyprini, Nitri depurati, Aluminis, ana vncias tres.

DA.

Bene puluerisata leni igne vase vitro liquefactis admisce

Camphoræ, drachmam unam semis.

Massa refrigerata usq[ue] seruetur.

LAPIS INFERNALIS ALCALINUS seu CAUSTICUM POTENTIALE.

R. Salis alcali, Calcis viuae, ana quantum placet.

Contusa in uicem indantur crucibulo & sedulo calcinentur: Extractum inde cum aqua communi lixiuum euaporetur ad massam sicciam, q[ua]d in vitro bene obturato ab omni accessu aeris tuendo asseruetur.

LAPIS INFERNALIS LUNARIS seu CAUSTICUM LUNARE.

R. Argenti cupellati in laminis, partem unam,

Aquæ fortis, partes duas, vel quantum sufficit.

Solutio lunæ leni calore absoluta caute ad siccitatem euaporet. Hæc massa secca in crucibulo satis capaci & ampio igne sensim auto, olei instar liquefacit, tum in modulos ferreos aptos ante calefactos & sebo illinitos effundatur. Qui bacilli seci in vitro optime clauso ab aeris accessu custodiendi.

LAPIS MEDICAMENTOSUS CROLLII.

R. Vitrioli viridis, libram unam, albi, libram semis,

G

Alu-

LA.

Aluminis crudi, libram vnam semis,
Salis anatron, seu Fellis vitri,
communis,
Tartari ana vncias tres.

In olla vitreata satis capaci puluerisata omnia ac affuso aceti vini, quantum sufficit, humectata coque igne carbonum moderato, sepius agitando, cum spissescere incipit, adde optime trita

Cerussæ, libram semis,
Boli Armenæ, vncias quatuor,

Subigantur diligentissime & misceantur exakte, donec exhalante liquore omni, in lapidis duritiem concreuerint, qui fracta olla eximendus & usui affluandus.

LAPIS PRUNELLÆ seu NITRUM TABULATUM.

R. Nitri optime depurati, quantum vis.

Liqua in crucibulo, liquato iuice Florum sulphuris, aut Sulphuris saltim flavi purissimi frustulatim, successiue pauxillum, donec ad vnciam vnam Nitri, drachma circiter semis deflagraverit, tum in rotulas effunde parumper refrigeratum.

Si quas inter deflagrandum impuritates contraxerit, solui poterit aqua quacunque vel pluia destillata, vel rosarum, quod prestat, ac rursus secundum artem crystallisari, aut in rotulas liquatum effundi.

LA.

LAUDANUM LIQUIDUM SYDENHAM.

R. Opii thebaici depurati, & rursus siccati, vncias duas,

Croci orientalis optimi, vnciam

vnam,

Pulueris Cinnamomi acuti,

Caryophillorum, ana

drachmam vnam,

Vini hispanici optimi, libram

vnam.

Infunde ac balneo Maris triduum digere, donec opium sit solutum, & reliquorum virtus extracta, tum demum leni expressione cola ac serua, quod & aliis

ELIXIR BALSAMICUM, audit

LAUDANUM VRINARIUM.

R. Succi liquiritiae in aqua Cerasorum soluti, vnciam vnam semis,

Camphoræ, drachmam vnam,

Croci, scrupulos quatuor,

Baccarum Alkekengi, vnciam

semis,

Gummi Tragacanthi,

Masticæ, ana drach-

mam vnam semis,

Laudani opiat, drachmas duas.

Misce fiat massa, ex qua formentur pilulae, pro re nata idoneæ.

A quibusdam D. Michaelis attributa, pro summo secreto habentur, de quibus tamen in scriptis eius editis alcum silentium.

LI-

LI.

LIQUAMEN MYRRHÆ.

Vide LIQUOR.

LIQUOR ANODYNUS MINERALIS. Vid. SPIRITUS VITRIOLI DULCIS.

LIQUOR CORNU CERVI SUCCINATUS.

R. Salis Succini bene depurati, vniciam vnam, Spiritus Cornu Cerui, ob omni oleo empyreumatico, rectificatione liberati, quantum sufficit ad saturationem.

Postea per chartam bibulam filtratus liquor seruetur.

Nota. Non possumus, quin hic loci Pharmacopeos adhortemur, ne quemuis venalem Cornu Cerui spiritum emant, sed istum ipsimet destillent, & certe etiam persuasi sint, Sal succini verum & optimum esse.

LIQUOR, seu LIQUAMEN MYRRHÆ.

R. Ova gallinacea ad duritiam cocta, testis externis purgatis, secundum longitudinem per medium dissecentur, & reiecto vitello cavitatis puluere Myrrha impleantur, hoc factio & albuminis filo munitis in loco humido vel Cella suspendantur, sic Myrrha in liquorum abit, qui liquor excipendus: sed ad usum non afferuandus, quia fitum contrahit.

LI.

LIQUOR PROBATORIUS.

R. Auripigmenti, vnciam vnam, Calcis viuac recentis, vncias duas, Puluerisata coquantur cum aqua q. f. in vase figulino, octava parte horz, vt vnicaz due liquidi filtrandi possint decantari.

LIQUOR TERRÆ FOLIATÆ TARTARI.

Arcanum Tartari, seu Terra foliata Tartari (suo loco descripta) quando cellæ vel aëri humido exponitur, deliquescit, & in liquorem salsum mutatur & a fæcibus pure decantatus vñti servatur. Quia vero Medicamentum hocce satis efficax ita carum est, vt pro pauperibus præscribi nequeat, vilius iam eiusdem efficacia remedium sequens subministrare consultius ducimus.

LIQUOR TERRÆ FOLIATÆ TARTARI PRO PAUPERIBUS.

R. Cinerum clauellatorum depuratorum, vncias duas, Aceti fortissimi, quantum satis ad saturationem.

Liquor bene saturatus evaporetur lebiter ad vnius librae circiter remanentiam.

MAGNESIA SALIS AMARI.

R. Salis Sedlicensis, libram vnam, solue in

Aquaæ fluvialis calidæ, libris sedecim.

Solutio filtretur, liquori filtrato calido instilla sub continua agitatione cum spatula lignea

Solutionis Salis tartari,

MA.

tantum; quantum ad omnem præcipitationem, necesse est.

Tunc quiete stent tam diu, usque dum omne præcipitatum residueat. Tum liquor clarus limpidus supernatans omnis decantetur; magnesia vero sèpius & tam diu aqua destillata abluatur, donec omnis sapor tantummodo salus cessat: Tandem præcipitatum edulcoratum successive lenissime sicca, & in vase bene obturato ad usum serua.

MASSA PRO FORNACE
COMMUNIS.

R. Corticum Thymiamatis,
Gummi Benzoës,
Storacis calamitæ,
Olibani, ana vnciam vnam,
Ladani, vncias quatuor,
Ligni Aloës,
Rhodii,
Masticæ, ana vnciam semis,
Florum Lauendulæ, drachmas duas,
Sacchari albi, vnciam vnam,
Storacis liquidæ,
Cerae nouæ,
Terebinthinae clarae, ana vncias duas
Gummi Tragacanthi in sufficienti
quantitate aquæ rosarum
fragrantissimæ solutæ, vnciam
vnam, aut quantum sufficit.

Misce fiat lege artis Massa & inde ba-
cilli pro lubitu.

MEL ROSATUM.

R. Foliorum recentium Rosarum ru-
brarum, aut incarnatarum, li-
bras sex,

ME.

. Conquassatis affunde aquæ calidae libras
totidem, stent diem & noctem in macera-
tione. Colatur expressæ adde Mellis optimi
& purissimi tantundem, coquantur exarte ad
consilientiam melle paulo liquidorem.

MERCURIUS DULCIS.

R. Mercurii sublimati corrosivæ, in-
tra docendi, vncias quatuor,
Mercurii vivi optimi purgati, vn-
cias tres cum semisse.

In mortario marinoreo, aut pro quanti-
tatis ratione in vase fictili valido, plani
fundi & apaci pistillo ligneo sollicite
terendo, dosec Mercurii viui
nil usquam. Vnum e cucurbita vi-
treæ inferne p. vt artis est,
igne conuenienti, au. ut arenz in
cupella ferrea, sublima, t. in fundo re-
flitantes, vt & materiam nig. in
collo altius sublimatam, vitrum a
reto caute frangendo, aufer. Mercurium
sic sublimatum detinò, addita & exalte, vi
prius, mixta Mercurii crudi diligenter pur-
gati medierate, si vis; aut per se quoque su-
blima, sublimatumque sequestratis seque-
strandis, pro Mercurio sufficenter edulcorato
serua: Sèpius enim repetitæ sublimationes
eius vires non augent, sed minuunt. Cognos-
citur autem perfecta dulcificatio, instillando
Aquam Calcis vive saturatam, unde corro-
siva portio fluescit, dulcificata nigrescit.

MERCURIUS PRÆCIPITATUS
ALBUS.

R. Mercurii vivi optime purgati, quantum
placet, sole. Aqua fortis communis,
solutum aqua salsa, salsabunde im-

ME.

prægnata, præcipita, ac aqua simplici
(si vis calida, pro paranda D. Mayerne
Manna Mercurii) sèpissime affusa, a
sale rursus libera & edulcorata, tum su-
per charta bibula, Cretæ super imposi-
ta in trochiscos efforma, quos optime
ficcatis in vitro sollicite teclo serua.

MERCURIUS PRAECIPITATUS
CITRINUS seu FLAVUS.

Vid. TURPETHUM MINERALE.

MERCURIUS PRÆCIPITATUS
RUBER.

R. Mercurii viui debitis purgatis, quantum
libet, affunde quantum soluendo
par est) acerrimæ e Nitri
& Vitriolum oorem calcinati, ana-
bus, & vna parte Alu-
mpei destillati (si communem
præcipitatum rubrum desideras, fin-
corallatum nobiliorem ac tutiorem lo-
co Aque illius fortis, spiritum Nitri
solius optime rectificatum accipe) &
solue. A soluto e retorta in balneo
siccо, igne gradatim aucto, tandem,
que vehementissimo, omnem aquam
fortem aut spiritum aqua, refrige-
rate, ac e retorta, exenta & trita
materiæ, recentem aquam fortiori
spiritum nitri affunde, & rursus euca-
ca, idque tertia vice repete, tandem
ignem augendo, ut retorta omnis
candeat. Tum cessa, puluerem ru-
bicundum, fracta retorta exime, ac
pro præcipitato rubro eleganti, (sed
spiritu vini aliquoties prius edulcoran-
do) serua.

ME.

MERCURIUS SUBLIMATUS
CORROSIUS.

R. Mercurii crudi optime sale & ace-
to aut etiam vini spiritu loti
& purgati,
Vitrioli ad rubedinem calcinati,
Salis decrepitati, ana quantum
cupis.

Misce omnia exacte in vase, ad id apto
fictili, capaci ac plani fundi, identidem
pauxillum aceti sale imprægnati (a purga-
tione Mercurij restantis & per chartam em-
poreticam traieci) inspergendo, id quod
mixturam, alias tediolas, valde promo-
uet; postmodum e cucurbita terrea loricata
aperto igne, aut vitrea inferne probe luta-
ta plani fundi, ex arena cupelle ferreæ im-
missa, igne caute & gradatim administrato
sublima; Imposito initio alembico rostrato
cum recipiente exiguo neglectum applicato,
liquorem acetosum primo exstlicantem ex-
cipe, & irrorandæ posthac massæ subli-
mandæ magis, quam acetum prædictum sale
prægnans idoneum, serua. Cum nihil huius
amplius exhalat (id quod cultri politi
lamina, orificio cucurbitæ identidem ad-
mota explorare poteris) orificio encur-
bitæ quounque modo obtura, auge tum
ignem gradatim ad ignitionem usque fundi
cucurbitæ remissorem seu obscure ruben-
tem, sicque aliquot horas continua, donec
omnis Mercurius salium spiritibus subtili-
simis imprægnatus ascenderit, ac lateribus
cucurbitæ paulo supra massam sublimandam
adhaerit. Hunc a remanentibus in fundo
fecibus, atque altius euectis quasi fuligini-
bus caute sequelstratum, si vis, maioris pu-
rita.

MI.

ritatis ergo, absque vltiori additamento
faliū, sic satis iam saturatum, denuo per
se sublimare poteris.

MIXTURA SIMPLEX, seu
SPIRITUS DE TRIBUS.

R. Spiritus Theriacalis camphorati,
vncias quinque,
Tartari rectificati, vncias
duas,
Vitrioli rectificati, vnciam
vnam.

Digerantur triduum in phiola optime
clausa.

MIXTURA TONICO-NERUINA
STAHLII.

R. Tinctoræ Antimonii regulinæ, par-
tes duas,
Spiritus Cornu Cerui rectificati,
partem vnam,

Misceantur.

MORSULI DE CITRO PRÆ-
SERUATIUI.

R. Condituræ pulpæ Citri,
Corticum Citri,
Flauedenis Citri, ana
vnciam vnam semis,
Flauedenis Citri recentis minutif-
fime concisæ, drachmas
septem,
Olei Citri destillati, guttas sex,
Succi Citri purissimi, quantum li-
buerit & suffecerit,

MO.

Sacchari canariensis in aqua Citri
& Rosarum, ana quantum suf-
ficit dissoluti, libram vnam.

Misce fiant secundum artem Morsuli.

MORSULI IMPERATORIS
CUM FRUCTIBUS.

R. Conseruæ Rosarum damascenarum
vnciam semis,
Specierum pro morsulis Impera-
toris, infra reperiundarum,
drachmas tres,
Specierum aromaticarum rosata-
rum, inter Species præ-
scriptarum,
Cinnamomi acuti, ana drachmam
vnam,
Amygdalarum dulcium, recens
decorticatarum;
Pinearum enucleatarum,
Pistaciæ mundatorum, ana
vnciam semis,
Sacchari albissimi, in aquæ rosa-
rum, quantum sufficit, so-
luti, vncias octo.

Fiant secundum artem Morsuli.

MORSULI RESTAURANTES
KUNCKELII.

R. Amygdalarum dulcium decorti-
catarum,
Pinearum recentium non rancida-
rum, ana vnciam semis,

Cin-

MO.

Cinnamomi acuti, drachmam
vnam,
Cardamomi minoris decorticati,
drachmam semis,
Antimonii hungarici crudi opti-
mæ notæ, in puluerem sub-
tilissimum triti, drachmas
tres cum semifffe,
Sacchari candidissimi canariensis,
aqua Rosarum & Cinnamo-
mi ana soluti, vncias quatuor,
Fiant lege artis Morsuli, drachmam vnam
ponderantes.

MORSULI DE RHABAR-
BARO.

R. Cremoris tartari,
Pulueris rhabarbari optimi, ana
drachmas duas,
Flauedenis corticum Citri, recen-
ter e duobus aut tribus citri
pomis deraſæ, drachmam semis,
Sacchari albi, in aqua rosarum fo-
luti, vncias quatuor,
Misce & fiant, vt artis est, Morsuli.

MORSULI AD VERMES.

R. Pulueris radicis Turbith gummo-
ſæ, drachmam vnam,
Radicis filicis, vnciam fe-
mis,
Jalappæ,
Hellebori nigri,
Florum tanaceti,

NA.

Pulueris Seminis Dauci sylvestris
Cinæ, ana drach-
mam vnam,
Amygdalarum dulcium recentium
decorticatarum & conci-
ſarum,
Condituræ corticis Citri, ana vn-
ciam vnam,
Cinnamomi acuti puluerisati
drachmam vnam,
Olei destillati de Cedro, guttas
viginti,
Sacchari albi in aqua rosarum &
florum naphæ soluti, vncias
octo.

Misce fiant lege arris Morsuli.

NAPHTHA NITRI.

R. Aquæ fortis concentratæ,
Spiritus Vini rectificatissimi ana
partes, ad mensuram, non
ad pondus, æquales.

Aqua fortis infundatur phialæ epistomio
vitreo munitæ; tum infiletur Spiritus pau-
latim, & caute ad marginem vasis, adeo
vt non innicem commisceantur, sed Spir-
itus supernatet. Relinquantur in loco fri-
gido per quatriduum. Sic sponte Naphtha
instar olei superne prodens separabitur,
qua aquæ superfusa & sic ab acido libe-
rata, in vase vitreo, obturaculo vitreo,
munito, seruetur.

NAPH-

NA.

NAPHTHA VITRIOLI

R. Olei vitrioli glacialis,
Spiritus vini rectificatissimi, ana
libras tres,

Oleum caute ac paulatim instilletur Spiritui; facta per biduum digestione, ex retorta leni igne destillentur primum vncia sex, quæ seorsim seruatæ, ad parandum Liquorem anodynum mineralem inseruire possunt, loco Alcoholis. Tum recipiente iterum adaptato continuetur destillatio caute ac leni igne, ne ascendat massa, donec appareant striae in recipiente & bullula in retorta. Destillatus liquor commisceatur cum dupla aquæ quantitate; sic separatur Naphtha, quæ aquæ superfusa ab acido liberata, seruanda est, sicut Naphtha nitri. Si residuo in retorta dimidium additur Spiritus vini, & idem processus denovo instituitur, adhuc aliquid Naphtha vitrioli obtineri poterit. Quod si Naphtha vitrioli sulphurei odoris transcendat, illa misceatur cum parte circiter decima Spiritus salis ammoniaci aquosi cum alcali parati, agiteur saepius, donec empyreumna penitus fuerit sublatum, quo facto ambo liquores a se inuicem lege artis separantur.

NITRUM ANTIMONIATUM.

Nitrum est a detonatione Antimonii per edulcorationem recuperatum & post colaturam per chartam emporeticam duplum exæstam exhalando coagulatum. Parandi modum supra vide sub titulo Antimonii diaphoretici. Vocatur alias communiter *Anodinum minerale*.

NI.

NITRUM DEPURATUM.

Fit Nitrum commune, soluendo saepius, filtrando & evaporando ad cuticulam, donec loco frigido in crystallos satis puras & nitidas concrescat.

NITRUM TABULATUM, VID.
LAPIS PRUNELLÆ.OLEUM ABSYNTHII
COCTUM.

R. Summitatum Absynthii recentis conquaßatarum, libram unam, Olei oliuarum clari recentis, libras tres.

Macerentur in sole aut loco aliquo calido tridum, deinde coquantur, donec prunis inspersum oleum non amplius frideat, tunc coletur & seruetur.

OLEUM AMYGDALARUM
DULCIUM.

R. Amygdalarum dulcium non rancidarium, quantum placet.

Minutissime contusas ac cilicio inclusas, prælo exprime, idque successive, donec omne oleum fuerit expressum.

OLEUM ANETHI.

Eodem, quo oleum absynthii modo fit, e foliis & floribus anethi, ac oleo oliuarum defractato.

OLEUM CHAMOEMELINUM.

Ex floribus Chamomille recentibus & olei communis puro fit, ad instar olei Absynthii.

OLE-

OL.

OLEUM DESTILLATUM
ABSYNTHII.

R. Summitatum Absynthii cum semine maturitati proximo, quantum vis.

Conquassata macerentur aliquamdiu triduum forte vel quadriduum in aqua fontanæ quantitate sufficiente, tum modico salis addito, destillentur per vesicam, ut artis est, & aquæ innatans oleum aut separatorio aut gossypio separetur.

Eodem modo parantur OLEA sequentia,

ANETHI,
CEREFOLII,
HYSSOPI,
MAIORANAE,
MELISSÆ,
MENTHÆ,
MENTHÆ PIPERITIDIS,
ORIGANI CRETICI,
PULEGII,
RORISMARINI,
RUTÆ,
SABINÆ,
SALUIAE,
SATUREIAE,
SERPILLI,
TANACETI,
THYMI.

OLEUM DESTILLATUM AN-
GELICÆ SEMINIS.

R. Seminis Angelicae conquassati, libram semis aut quantum vis,

OL.

Infusio aquæ fontanæ, ac aliquantisper macerata, addito salis modico destilletur vesica cum refrigeratorio, & oleum ut moris, ab aqua separetur.

Quo modo & paratur

OLEUM DESTILLATUM ANISI,
CARUI,
CORIANDRI,
CUMINI,
FOENICULI,
JUNIPERI
BACCIS.

OLEUM ANIMALE DIPPELII.

R. Olei Cornu Cerui, libras duas;

Infundatur hocce Oleum ope infundibuli vitrei retortæ vitreæ purissimæ, ita quidem, ne collum retortæ ab Oleo isto crassò fetido inquinetur; tum recipiente applicato ac bene lutato committatur balneo arenæ, & lenissimo igne destillentur circiter duæ vnciæ: tum remoueatur recipiens & alio nouo applicato & bene lutato iterum destillentur vnciæ octo, & sic destillatio finiatur. Hae octo vnciæ Olei Cornu Cerui ita rectificati, iterum eadem cautela rotorte nouæ purissimæ infundantur, ne collum inquinetur, & additis Aquæ fontanæ libris duabus, & applicato recipiente bene lutato, de nouo lenissimo ignis gradu tam diu destillentur, usque dum vnciæ sex transierint. Hac operatio bis, ter vel quater eodem modo reiterari potest, usque dum Oleum Animale limpidissimum, aquæ instar appareat, & omnis odor ingratus euaneat. Quod usque seruetur. Melius tamen est, in lagenulis minimis drachmarum duarum circiter ex-

OL.

acte obturatis istud Animale Oleum conseruare, quoniam lagenæ maiores quoties appetiuntur, toties accessu aëris color albissimus paululum flauescit, & tandem nigrescit.

OLEUM ASPHALTI.

R. Asphalti veri purissimi puluerisati,
libram vnam,
Salis communis decrepitati, libram semis,
Arenae purissimæ, libram vnam
& dimidiam.

Bene mixta immittantur retortæ vitreæ & igne successiue aucto omne Oleum in recipientem destilletur. Hocce Oleum per separatorium ab omni phlegmate bene separatum, vel sic seruetur, vel si RECTIFICATUM OLEUM ASPHALTI desideres, noua destillatione, & si placet, bis iterata, rectificatur.

OLEUM DESTILLATUM AURANTIORUM CORTICUM.

R. Corticum exteriorum recentium Aurantiorum malorum non putridorum, quantum placet; incisi cum sufficienti aqua fontana absque fermentatione, e vesica destillentur, ac oleum, vt in reliquis aquæ innatans, lege artis separetur.

Eadem methodo &

OLEUM CORTICUM CITRI,
destillatione paratur.

OLEUM DESTILLATUM BETULINUM.

Italis Balsamum Lithuanicum dictum.

OL.

Oleum est odoris empyreumatici paulo grauioris, ab Incolis Ducatus Lithuaniae Clibanorum, e bracteis ferreis stanno obductis constructorum ope, e corticibus exterioribus albis, igne suppressionis per descensum extortum. Medicamentum Eupriston simul ac polychrestum, tam internis, quam externis vñibus, aptum.

Ventriculi imbecillitati, colicis atque aliis scorbuticis doloribus subueniens, lumbicis, vel vmbilico solum illitum, infensum, ad obauditiones, susurros & tinnitus aurium, odontalgiam, variosque alias affectus efficax. Vulgo Germanorum, vt & Lithuaniae Dage audit.

Volgi cauſa locum adhuc hic obtinuit.

OLEUM DESTILLATUM CORTICIS ET LIGNI SASAFRAS.

R. Corticis & ligni Sassafras, minutissime conciforum, libras quinque,

Aquaæ fluialis purissimæ, libras viginti quatuor vel triginta.

Macerentur in vase capaci per octiduum & diutius, post destillentur e vesica igne moderato, tum refrigeratis, oleum aquæ innatans separatnr.

Eodem modo paratur quoque

OLEUM LIGNI JUNIPERI,
RHODII,

OLEUM DESTILLATUM CARYOPHILLORUM.

R. Caryophillorum aromaticorum, quantum placet.

Con-

OL.

Contusa crassiuscule affusa aquæ tepidae sufficienti quantitate, addito etiam, si lubet, Salis pauxillo, stent in digestione dies circiter quinque, postea e vesica destilla, & separatum solcite oleum serua.

Eadem methodo etiam obtinebis:

OLEUM DESTILLATUM CARDAMOMI,
CUBEBARUM,
MACIS,
NUCIS MOSCHA-
TAE,
PIPERIS.

**OLEUM DESTILLATUM
CERAE.**

R. Ceræ flauæ, libram vnam.

Liquata cum arenae bene lotæ & cibratae duplo, vel libris duabus, immittatur retorta ac destilletur igne moderato, successiue tamen paululum aucto. Sic post liquorem acidum prodit oleum crassum collo adhaerens, nisi prunis admotis incalesceat. Per repetitas distillationes ex arena rectificatur.

**OLEUM DESTILLATUM CHA-
MOMILLÆ ROMANÆ.**

R. Florum Chamomillæ romanæ, in umbra fiscatorum, quantum placet.

Conquassatos aqua calida paululum macea, tum per vesicam igne conuenienti cum aqua oleum destillando elice, ac more solito separa.

OL.

Eadem encheiresi etiam fiunt:
OLEUM DESTILLATUM CHAMOMILLÆ
VULGARIS,
LAUENDULÆ,
MAIORANA,
MILLEFOLII E
FLORIBUS,
SPICAE.

**OLEUM DESTILLATUM CIN-
NAMOMI.**

R. Corticis Cinnamomi acutissimi contusi, libram vnam, Salis communis, vncias duas, Aquæ fluialis purissimæ, libras quinque vel sex.

In loco calido per quatuor vel quinque dies macerata, per retortam leni igne de-
stillentur, & post quietem longam, trium fere hebdomadum, aquæ cauta decantatione oleum subsidens separetur.

**OLEUM CORNU CERUI REC-
TIFICATUM.**

R. Cornu Cerui frustulatum concisi, quantum lubet.

Impone retorta terreæ lutatae, aut cu-
curbitæ ferreæ alembico terreo devitreato
munitæ, ac igne aperto, gradatim ad igni-
tionem usque retorta aut cucurbitæ, admi-
nistrato, omnes cum phlegmate, sale vo-
latili & oleo, spiritus euoca, qua omnia
rectificando cucurbita vitrea loricata &
alembico vitro ac commido instructa, iunc-
turis optime lutatis, successiue separa &
seorsim serua.

OL.

OLEUM DESTILLATUM GUMMI AMMONIACI.

R. Gummi Ammoniaci purissimi & selecti, libram vnam,
Arenæ lotæ purissimæ, libram
vnam semis,
Salis communis decrepitati, li-
bram semis.

Retortæ vitree indita ex arena igne conuenienti moderato destillentur, sic liquor lacteus oleo iunctus primo extillabit, seorsim recipiente mutato, excipiendo, & ex arte separandus, igne tum auctiori rubrum sequitur oleum, separatim rectificandum.

Eadem ratione paratur &

OLEUM DESTILLATUM MASTICHES,
MYRRHAE,
TACAMAHACAE.

OLEUM DESTILLATUM GUMMI GALBANI.

R. Gummi Galbani electi purissimi,
libram vnam,
Aquaæ fluuiialis purissimæ, libras
tres vel quatuor.

Per retortam vitream, cum recipiente bene munito in balneo arenæ dimidia aquæ quantitas destilletur. Oleum essentialie secundum artem separetur, & usi servetur. Tum de novo applicato recipiente reliqua aquæ quantitas leni igne destilletur, & apparebit primo, Oleum cœrulei & postea fuscæ coloris empyreumaticum, separatim seruanda.

OL.

OLEUM PETRAE, seu PETROLEUM.

Natuum est partim ex Indiæ Orientalis Provincia Sumatra ad nos delatum, partim in Italia e rupibus petrarum scaturiens, & in Sicilia aquæ innatans, huius quidem loci non est, nisi rectificatum retorta vitrea, e cupella igne moderato lippidissimum, rectificata in fundo retortæ materia picea Colophonæ simili, vulneribus solidandis apta.

OLEUM DESTILLATUM PHILOSOPHORUM ALBUM.

Laterum frusta mediocriter candentia iniiciantur oleo oliuarum, ut olei, quantum possint, imbibant, horum quantum vis fac, ac eisdem retortæ terreæ probe locicata medietate impleta, igne aperto gradatim adhibito, oleum prius album prolice, mox mutato recipiente, ubi flanescere incipit, sequens rubrum seorsim cape, ac in cineribus aut arena ex arte rectifica & habebis

OLEUM PHILOSOPHORUM RUBRUM.

OLEUM DESTILLATUM SUCCINI.

R. Succini electi crassiuscule contusi, aut fragmentorum potius vulgo venalium, libras duas, vel quantum placet.

Retortæ vitreæ inditum, ex arena, aut balneo sicco igne gradatim, initio moderate admodum & caute administrato destilla

OL.

tilla, ac primo phlegmatis parum seorsim excipe, illo paulatim cessante recipiens muta, & exacte iuncturam claudet, ac spiritum subtilem album ac clarum phlegma subsequentem cape, tandem & hoc cessante ac separato, igne auctiori flauum & crassius una cum sale volatili vitri lateribus & collo adhaerente, postea separando, cuius modum suo loco repieres, exstillans excipe, super capite mortuo calcinato aut cineribus mundis rectificandum.

OLEUM DESTILLATUM TARTARI FOETIDUM.

Vna cum spiritu destillatione prodit, ab illo, vt moris & artis est, separandum.

OLEUM TARTARI RECTIFICATUM.

Ex oleo praedito foetido, magna aqua quantitate affusa, Maris balneo aut & vesica destillando separatur, vt artis alias est, ac denuo affusa fragrantis alicuius aqua portione e cucurbita vitrea rectificatum, a tetro illo odore aliquatenus liberatur.

OLEUM DESTILLATUM THEREBINTHINAE.

R. Therebinthinae depuratae, & clarificatae, quantum vis.

Vesicae affusa aqua sufficienti quantitate, aut retorta etiam capaci arena commixtum, igne leni, destilla, ac primo album, phlegmati acidulo sociatum, prodibit oleum, quod Spiritus vulgo dicitur, quodue seorsim accipendum, succendentibus igne auct-

OL.

tiore guttis flavis, mutandum recipiens, ac flauum quoque separatum excipiendum, quod huius loci, donec, intenso magis adhuc igne, rubra guttae apparet, a prioribus quoque separandae ac rectificandae, quae Balsami nomine quibusdam veniunt. Si absque arenæ additione e retorta destilletur tandem in Colophoniam transit.

OLEUM HYOSCIAMI E SEMINE EXPRESSUM.

R. Seminis Hyosciami optime contusi, & parumper tosti, quantum vis, inde cilicio valido ac torculari oleum exprime.

Nota. Qui maiorem huius olei copiam desiderat tostura supersedeat, eiusque loco semen pauxillo aquæ pluiae, aut simplicis saltem irroratum leni calori exponat, quo a liquore adsperso turgescat & incalescat, sicque torculari subiiciatur, vt artis est, ac duplum ad minimum olei efficacis anodyni obtinebit.

OLEUM HYPERICI.

SIMPLEX, sola cum oleo communis, infusione iterata, florum cum semine maturescente conquaflatorum, insolatione diuturna & colatura cum expressione paratur.

COMPOSITUM Dominorum Augustanorum, quod balsami vulnerarii vices sustinet, tale est:

R. Florum Hyperici cum seminibus iam maturescientibus contuso- rum, libras tres,

H 3

Olei

OL.

Olei defacatissimi, libras duas,
Croci, scrupulos quatuor.

Macera flores in oleo triduum, postea
ad consumtionem humiditatis coque, tan-
dem expime & Colatur expressæ adde

Terebinthinae claræ, libras duas.

OLEUM LAURINUM.

E baccis Lauri recentibus expressum ad-
uehi solet, cuius tamen defectu, e baccis
lauri, quam haberi possunt, recentibus,
coctione cum aqua simplici, quantitate pro-
portionata affusa, sufficienti impetrari po-
test, aquæ cum expressione forti colatæ,
vbi refrigerata fuerit, innatans.

OLEUM LILIORUM AL-
BORUM.

R. Florum Liliorum alborum an-
theris reiectis, libram vnam,
Olei oliuarum clari, libras tres.

Insolentur octiduum, postea colentur
& exprimantur, iterata etiam, si pla-
cet infusione, ac insolatione, nouis floribus
additis.

OLEUM LINI EXPRES-
SUM.

R. Seminis Lini minutissime contusi,
quantum libet.

Inclusum cilicio exprimatur fortis-
ime.

OL.

OLEUM LUMBRICORUM
TERRESTRUM.

R. Lumbricorum terrestrium stupæ
adminiculo purgatorum, libram
circiter semis.

Bene lotis affunde

Olei Rosarum libras duas.

Coque moderato igne ad humiditatis ex-
halationem, & colatum oleum serua.

OLEUM MACIS EX-
PRESSUM.

E Macis electi puluere recens comminuto
ac patum in sartagine munda fricto & ci-
lico incluso, torculari, vt moris est, ex-
primitur.

OLEUM MENTHAE.

E Mentha crispa fit ad instar oleorum
reliquorum vegetabilium, addito oleo de-
facatissimo, leni coctione & euaporatione
humiditatis, tandemque colatura cum leui
expressione.

OLEUM NUCIS MOSCHATAE
EXPRESSUM.

Ad instar olei Macis e nucibus Myristi-
cis, quantum fieri potest recentibus, in
pulucrem redactis, ac, aut vapore aquæ
feruentis irroratis, aut etiam fine illo, so-
lum feruefacitis, exprimitur.

OLE-

OL.

OLEUM OUORUM EX-
PRESSUM.

R. Ouorum recentium ad duritatem
coctorum, numero centum,

Exemtos vitellos & comminutos in far-
tagine igne leni assos, mouendo spatula,
donec ruffescant, ac pinguedinem sudare
incipiant, tum cilicio inclusos prælo subiice,
& oleum omne elice.

OLEUM PAPAUERIS EX
SEMINTE.

Paratur eodem, quo oleum seminis Li-
ni, modo.

OLEUM POPULEUM.

R. Gemmarum Populi nigri, veris
initio collectarum, libras tres,
Conquassatis affunde

Olei oliuarum purissimi, libras
septem,

Macerentur aliquamdiu, tum ad humi-
ditatis consumtionem coquantur, expriman-
tur & colentur.

OLEUM ROSARUM.

E Rosarum rubrarum, nondum plene
hiantium, libra vna semis, &
Olei oliuarum clari, libris quatuor,

Paratur iuxta normam Olei Liliorum al-
borum.

OL.

OLEUM SULPHURIS PER
CAMPANAM.

E sulphure flavo, aut ut nonnullis pla-
cet, viuo potius, arsenicalis malignitatis
non participe, in puluerem redacto, in
scutella terrea non nimis ampla, nec alta
nimis, patina vitrea lata interueniente sus-
tentaculo vitro, imposita, & suspensa de-
super receptaculo ampio vitro, campana
forma praedito, deflagrante paratur. Coa-
gulato nimis in campana sulphuris fumo,
indeque in substratum ipsi patinam destil-
lante. Vbi obseruandum, aere vdo & plu-
uioso felicius hoc succedere negotium, plus-
que olei (haud adæquate sic dicti) quam
sicco aut sereno cœlo colligi.

OLEUM VERBASCI FLORUM.

Eadem, qua Oleum Liliorum alborum,
aut Chamælinum, methodo fit.

OLEUM VITRIOLI.

Obtinetur vel ex Vitriolo diurna de-
stillatione igne vehementissimo, vel defla-
gratione sulphuris cum pauxillo Nitri in va-
se satis capaci, quin amplissimo, cui pau-
lulum aquæ infusum, vt vapores in illam,
grauitate sua descendant, quæ aqua acido
Vitrioli satis imprægnata destillatione con-
centratur. Quia vero operationes istæ mul-
tis difficultatibus obnoxia, Pharmacopoei
vilius ab exteris oleum hocce, quod melius
SPIRITUS VITRIOLI CONCENTRA-
TUS nominandum, emunt, sed vt vene-
lam istum Spiritum concentratum destilla-
tione rectificent, necesse est.

OXY-

OX.

OXYMEL COLCHICUM.

R. Aceti colchici, partem vnam,
Mellis purissimi, partes duas,
Misce, coquantur ad iustam consistentiam.

OXYMEL SIMPLEX.

R. Aceti vini albi, libram vnam,
Mellis despumati, libras duas,
Misceatur, coquantur ad iustam consistentiam.

OXYMEL SQUILLITICUM.

E Mellis despumati libris tribus ac
Aceti squillitici libris duabus coccione secundum artem fit.

PANACEA MERCURIALIS. Idem est ac MERCURIUS DULCIS.

PASTA ALTHEAE, Gallis PATE DE GUIMAUVE.

R. Radicis Altheæ recentis, in taleos dissectæ, vncias quatuor,
Aquæ fontanæ, libras octo.

Coque ad consumtionem dimidiæ partis,
in Colatura solue

Gummi arabici albi electi & purissimi,
Sacchari canariensis, ana libras duas cum semifisse.
Coletur, & igne lento ad spissitudinem extracti, continuo spatula mouendo, hu-

-XXO

PA.

mor exhalet; ab igne remota agitantur multum, & celeriter, quo albescant, & subinde inspergendo quid albuminis, ex sex ouis recentibus in spumam conquallati, itemque aquæ naphæ odoratissimæ vacia, lento calore, satque perpetua agitatione inspissentur, vsque dum manui non adhærent. Formentur pasta oblongæ, quadratæ, quæ puluere sacchari, vel amyli, ne chartæ adhærent, conspergantur.

PASTA LIQUIRITIÆ, seu SACCHARUM LIQUIRITIÆ, Gallis REGLISSE.

R. Radicis Liquiritiæ decorticatae,
vncias sex,
coque in

Aquæ fontanæ, libris duodecim,
In decocto colato solue
Gummi arabici, libras duas cum
semifisse,
Sacchari albi, libram vnam semis.

Dein, adiecto oui albo, soluta hæc clatifica, & dein leni coque igne, donec spissior evaserit massa, mellis instar: posthac ipsum vas in feruidam imponitur, & super igne detinetur, donec formis planis ac levibus infundi tenacior iam facta queat massa. Tandem loco calido penitus exsiccata in tabulas discinditur, vsique feruntur.

PASTILLI PRO FUMO.

R. Gummi Storacis calamithæ,
Olibani,
Pulueris Succini flavi,
Flo-

PI.

Florum Lauendulæ, ana vncias duas,
Styracis liquidæ, vnciam vnam,
Terebinthinae clarae, vnciam fēmis,
Carbonum Tiliae, vncias decem.
Redactis in puluerem redigendis excipiantur omnia mucilagine gummi arabici vel tragacanthi, & fiat Massa, vt inde formari possint Pastilli.

PILULÆ AETHIOPIS MINERALIS.

R. Aethiopis mineralis, vnciam vnam, Reguli Antimonii medicinalis, Gummi Guaiaci, ana vnciam vnam & semis, Extracti Angelicae, vnciam dimidiām.
Misce fiat Massa pilularum.

PILULÆ CACHECTICÆ MARTIALES.

R. Gummi Ammoniaci electi purissimi, drachmas sex, Extracti Aloës gummosi, vnciam fēmis, Chalybis in alcohol redacti, drachmas quinque, Olei destillati Caryophillorum, Anisi, ana scrupulum vnum.
Misce fiat Massa pilularum.

PI.

PILULÆ DE CYNOGLOSSO.

R. Radicum siccaram Cynoglossi, Seminis Hyoscyami albi, Opii depurati, ana vnciam semis, Myrrhae, drachmas sex, Thuri, drachmas quinque, Styracis calamitae, Caryophillorum, Cinnamomi, ana drachmas duas. Cum Succi de Cynoglosso & Syrupi Violarum ana, ex arte fiat pilularum massa.

PILULÆ FOETIDÆ.

R. Gummi Galbani, Sagapeni, Opopanaxis, ana drachmas duas, Asae foetidae, drachmam vnam, Extracti Myrrhae aquosi, Aloës aquosi, ana drachmam semis, Olei destillati Anisi, Rutae, ana scrupulum vnum.
Misce fiat Massa pilularum.

PILULÆ HYDROPICÆ BONTII.

R. Aloës optimae purissimae, drachmas duas & semis, Gummi Ammoniaci electi, Guttae subtilissime tritae, ana drachmam vnam semis,

I

Dia-

PI.

Diagrydii, drachmam vnam,
Tartari vitriolati, drachmam se-
mis.

Misce fiat Massa pilularum.

**PILULÆ MERCURIALES
PURGANTES.**

R. Mercurii dulcis, vnciam semis,
Extracti aloës aquosi, drachmas
tres,

Resinæ Jalappæ praeparatae,
drachmas duas.

Misce fiat Massa pilularum.

**PILULÆ PECTORALES seu
ASTHMATICÆ.**

R. Gummi Ammoniaci electi, drach-
mas duas & semis,

Millepedum, drachmas tres,

Florum Benzoës, drachmam
vnam,

Croci Orientalis,

Balsami Peruuiam, ana grana
quindecim.

Misce fiat Massa pilularum.

**PILULÆ PESTILENTIALES
RUFFI**

R. Aloës purissimæ,
Gummi Ammoniaci depurati, ana
vnciam vnam,

Myrrhae selectæ, vnciam semis,

Paretur cum succo Limonum, Massa.

PI.

**PILULÆ POLYCHRESTAE
BALSAMICAE.**

R. Extracti Aloës aquosi,
Absynthii,
Centaurei minoris, ana
vnciam semis,
Hellebori nigri aquosi,
drachmas duas.

Gummi Myrrhae,
Masticis,
Benzoës, ana drachmam
vnam,
Terebinthinae venetae, drachmas
duas.

Misce fiat Massa pilularum.

PILULÆ STARCKEYANAE.

R. Saponis alcalici Starckeyani, par-
tes tres;

Opii depurati,
Radicis Liquiritiae,
Hellebori albi,
nigri, ana par-
tem vnam.

Misce fiat Massa pilularum.

PILULÆ SCILLITICAE.

R. Radicis Squillæ, recenter pulue-
risatae,

Gummi Ammoniaci electi,
Millepedum, ana semivnciam,
Sagapeni purissimi, vnciam vnam,
Balsami Copaiuæ, drachmam vnam.

Misce fiat Massa pilularum.

PI-

PI.

PILULÆ DE STYRACE.

R. Styracis Calamitæ, drachmas duas,
 Succi Glycyrrhizæ depurati, drach-
 mam vnam semis,
 Ladani,
 Myrrhæ,
 Olibani optimi,
 Opii, aqua destillata depurati &
 insipisci,
 Extracti Croci, ana drachmam
 vnam.

Cum Syrupo Papaueris albi, quantum suf-
 ficit, fiat lege artis Massa.

PILULÆ DE SUCCINO
CRATONIS.

R. Agarici recenter trochiscati, drach-
 mam vnam semis,
 Aloës succotrinæ, drachmas quin-
 que,
 Aristolochiae rotundæ verae,
 drachmam semis,
 Mastiches electæ,
 Succini praeparati, ana drachmas
 duas.

Cum Syrupo de Betonica fiat Massa.

PLUMBUM VSTUM.

R. Plumbi, libram vnam,
 Sulphuris citrini, vncias duas.
 In vase ferreo comburantur, in uicem
 semper agitando.

PU.

PULVIS ABSORBENS ANTI-
MONIATUS.

R. Testarum Concharum, sine igne
 præparatarum, vnciam vnam,
 Antimonii diaphoretici, vnciam
 semis,
 Cinnabaris Antimonii, grana quin-
 decim.
 Misceantur optime, & fiat Pulvis sub-
 tilissimus.

PULUIS ABSORBENS CI-
TRATUS.

R. Oculorum Cancrorum puluerisa-
 torum, quantum placet.

Affunde succi Citri recentis, quantum
 satis usque ad saturationem, postea exhale-
 tur aquositas leni calore, in vase terreo, vel
 vitro, agitando spatula lignea. Tandem
 teratur, cibreturque per linteum.

PULUIS ABSORBENS NI-
TRATUS.

R. Oculorum Cancrorum præpara-
 torum,
 Testarum Concharum præpara-
 tarum,
 Nitri depurati, ana.

Misce in pulverem.

PULUIS ANTARTHriticus.

R. Gummi Guaiaci,
 Sacchari Lactis, ana vnciani vnam,
 Salis
 I 2

P U.

Salis volatilis Succini depurati,
drachmam semis,
Misce fiat Puluis subtilissimus.

PULUIS PRO CATAPLASMATE.

R. Herbæ Maluæ,
Altheæ, ana vncias tres,
Florum Chamomillæ vulgaris,
Meliloti,
Sambuci, ana vncias duas,
Radicis Altheæ, vncias quatuor,
Seminis Fænugræci, vncias decem
Lini, libram vnam,
Fiat omnium Puluis.

PULUIS DENTIFRICIUS.

R. Cremoris Tartari, vncias duas,
Radicis Iridis florentinæ,
Offium Sepiae, ana vnciam semis,
Myrrhae rubrae electæ,
Gummi Laccae in baculis deraſi,
ana drachmas duas,
Olei destillati ligni Saffafras guttulas viginti,
Misceanter & puluerisentur subtilissime.

PULUIS EPILEPTICUS.

R. Visci Quercini, vncias duas,
Radicis Pœoniae,
Valerianæ sylvestris,
Lumbricorum terrestrium præparatorum,
Nitri depurati, ana vnciam vnam,

P U.

Misce fiat Puluis.
Poterunt vulgi cauffa addi,
Folia auri.

PULUIS FUMALIS.

R. Baccarum Juniperi, libram vnam,
Succini rafi, libram dimidiam,
Storacis Calamitæ,
Olibani,
Florum Lauendulae, ana vncias quatuor.

Contusa grosso modo, misceantur.

PULUIS INCIDENS.

R. Salis mirabilis Glauberi, vncias duas,
Radicis Ari recenter puluerisatae,
Ireos florentinæ, ana vnciam vnam.

Misce fiat Puluis.

PULUIS PRO INFANTIBUS. Vide
PULUIS ABSORBENS ANTIMONIATUS.

PULUIS PECTORALIS.

R. Radicis Liquiritiæ, vncias duas,
Ari, vnciam vnam,
Ireos florentinæ, drachmas sex,
Florum Sulphuris, vnciam semis,
Seminis Fæniculi, vnciam vnam,
Sacchari albi, vncias quatuor,
Misce fiat Puluis.

PUL-

PU.

PULUIS PUEGORUM COM-
MUNIS PRO VULGO.

R. Radicum Iridis florentinae,
 Poeoniae,
 Scorzonerae, ana vncias
 duas,
 Seminis Poeoniae decorticati, vn-
 ciam semis,
 Croci, drachmas duas,
 Sacchari candi, vncias quatuor.
 Misce, in puluerem tenuissimum com-
 minuta.

PULUIS RESOLUENS COM-
POSITUS.

R. Pulueris resoluentis, vnciam vnam
 semis,
 Extracti Cascarillae cum aqua, vna-
 ciam semis,
 Misce.

PULUIS RESOLUENS
 SIMPLEX.

R. Testarum Concharum, sine igne
 præparatarum,
 Antimonii diaphoretici,
 Nitri depurati, ana,
 Misceantur optime.

Composito huic innocentissimo, Chi-
 rurgi & vulgus admodum affueti,
 hinc locum ei hic dare nulli dabit-
 uimus.

PU.

PULUIS SQUILLÆ COM-
POSITUS.

R. Radicum Squillæ recentium, li-
 bram vnam,
 Vincetoxici puluerisa-
 tarum vncias qua-
 tuor.

Contunde in pulpam, leniter exsicca, &
 rursus contunde in puluerem.

PULUIS STERNUTATORIUS.

R. Foliorum Nicotianæ, vnciam
 vnam,
 Maioranæ,
 Serpilli, ana vnciam
 semis,
 Florum Liliorum conuallium,
 Meliloti, ana drachmas
 tres,
 Radicis Hellebori albi,
 nigri, ana drach-
 mam vnam.

Misce fiat Pulus.

Cui placet, tantillum Moschi, Ambræ nec
 non olei ligni Rhodii aliquot guttulas
 addere iubeat.

PULUIS STOMACHICUS.

R. Radicis Ari recentis,
 Acori vulgaris,
 Pimpinellæ albae,
 Corticis Winterani, ana vnciam
 vnam,

P U.

Cinnamomi acuti, vnciam semis,
Salis Absynthii, drachmas tres,
Sacchari albi, ad pondus om-
nium.

Misce, fiat Pulus.

PULUIS TEMPERANS ALBUS.

R. Tartari vitriolati crystallini,
Nitri depurati, ana.

Misce in puluerem.

PULUIS TEMPERANS RUBER.

R. Tartari vitriolati crystallini,
Nitri depurati, ana vncias quatuor,
Cinnabaris facilitiae rite præpara-
tae, drachmas tres.

Misceantur optime.

REGULUS ANTIMONII ME-
DICINALIS.

Vid. ANTIMONII REGULUS
MEDICINALIS.

RESINA JALAPPÆ.

R. Pulueris radicum Jalappæ, quantum vis,
affunde Spiritus vini rectificatissimi, in
vitro commodo, ad eminentiam trium,
quatuor, plurimumue digitorum. Stent
vitro exacte clauso in digestione lenis
caloris sèpius mouendo, donec spiri-
tus saturate sit essentia radicum im-
butus, deple tunc illum & aliud

RE.

sed minori copia affunde, digere,
move, vt prius, donec & ille fatis
tinctus, idque continua, donec om-
nis e radicibus essentia aut tinctura sit
extracta, tandem omnes extractiones
coniunge, & e cucurbita humili, im-
posito alembico, & recipiente appli-
cato, iuncturis probe clausis omnem
Spiritum vini, simili labori idoneum
balneo roris aut maris euoca, ac refi-
debit in fundo cucurbitæ resina, super
charta, oleo qualicunque aromatico
parum, imbuta in sole ficcanda & a
pulueri custodienda. Aut, si mauis,
abstracta aliquota Spiritus vini parte
frigida affundenda, vnde illa extraçio
laetescet, tum euocato balneo maris
Spiritu vini reliquo, residuum liquo-
rem lacteum repone aliquantis per &
quietum serua, sic resina a liquore se-
parata fundum petet, quæ depleto
liquore, aqua rosarum bis, terue eluen-
da, ficcanda & seruanda.

Nota. Si posteriori modo processeris, re-
liquum a separatione resinæ, lento
igne inspissatum, extraçum tibi da-
bit, Jalappæ virium non omnino
expers.

RESINA JALAPPÆ PRAE-
PARATA.

R. Resinæ Jalappæ,
Amygdalarum dulcium sicce ex-
corticatarum, ana,

Terantur in puluerem.

RE-

R.O.

RESINA SCAMMONEL.

E puluere Scammonei grosso eadem ratione fit, qua superior Jalappa.

ROB BERBERUM.

Fit, succum Berberum depuratum ad mellis consistentiam igne moderato inspissando.

ROB JUNIPERINUM.

R. Baccarum Juniperi maturarum recentium conquaßatarum, quantum placet.

Coquantur aqua communi sufficienter donec mollescant, tum per setaceum colentur, ac modice exprimantur. Succus inde natus ad consistentiam mellis, calore moderato, inspissetur.

ROB MORORUM cum SACCHARO seu DIAMORON.

R. Succi Mororum depurati, libras quatuor,
Sacchari albi purissimi, libras duas.

Coquantur, vt artis est, ad consistentiam Rob.

ROB SAMBUCINUM.

R. Succi baccarum Sambuci maturarum, quantum sufficit, igne moderato, cauendo empyreuma, coque ad iustum consistentiam.

S.A.

SACCHARUM LACTIS.

R. Seri lactis, cum coagulo vitulino parati libras duodecim, leni igne vaporet ad libras tres: tum in locum frigidum sepone, vt crystalli formentur. Liquor superstes iterum leniter vaporet, vt in loco frigido crystallos ponat.

Si impuræ sunt crystalli, solutione in aqua fluiatili purissima & crystallisatione iterata purifcentur, donec facchari instar albæ euadant.

SACCHARUM PENIDIUM.

Saccharum ad consistentiam iustum secundum artem coctum super tabula marmorea, oleo Amygdalarum dulcium imbuta, effusum donec eatenus refrigerescat, vt Terebinthinæ dense instar, manibus terfis & Amylo sèpius adspersis super vno ferreo iterato & operose tractari ac filorum instar crassorum aut funium duci, tandemque, postquam sufficienter refrixerit ac candorem contraxerit, in bacilos oblongos digitum circiter crassos contorqueri ac efformari possit.

SACCHARUM, seu SAL SATURNI.

R. Cerussæ scissilis puluerisatae, quantum placet,
Aceti vini optimi, tantum affundatur vt acetum emineat, ultra tres vel quatuor digitos.

Digerantur per aliquot dies mediocri calore, tum decantetur fluidum, & iterum tantum aceti affunde, quod tam dia continu-

SA.

tinuandum, quamdiu post digestionem menstruum decantatum dulcem subadstringentem præbet gustum. Liquores isti decantati, vasi apto infusi, evaporationi & crystallisationi, vti artis est, exponantur.

SAL ABSYNTHII ET PLANTARUM IN GENERE.

R. Absynthii, integri, parum, sed non omnimode siccata, sub dio, aut camino coacevata, ac concremati cineres albos, crucibulo impositos igne forti, vt totum vndeque candeat cum cineribus crucibulum, calcina, agitando inter calcinandum rudicula, & quidem crebris & iteratis affusionibus omnem acrimoniam elue, vt fiat lixiuum saturatum; quod per emporeticam, aut manicam Hippocratis colatum & aliquamdiu digestum, igne mediocri exhalo & in salem inspissa. Quem rursus crucibulo commissum, igne convenienti vt totus rubeat, sed caue ne quid peregrini in crucibulum incidat, calcina, tum solue, filtra, & ad cuticulam euapora, ac ad crystallandum loco frigido repone; crystallos inde natas exime forcipula lignea, & emporetica impositas sicca. Reliquum denuo euapora ad cuticulam, crystallisa, sicque perge, donec cuticulam amplius contrahere recuset.

Salem omnem repetitis crystallationibus collectum, si satis sit candidum, serua; sin minus, laborem hunc calcinationis, solutionis, evaporationis & crystallisationis itera, donec voto tuo repondeat.

SA.

Eadem norma reliquorum quoque vegetabilium, præcipue amarorum, salia paranda.

SAL ABSYNTHII CITRATUM.

R. Salis Absynthii, vnciam vnam, Succi Citri, quantum satis ad perfectam saturationem.

Euaporentur lenissimo calore, vel ex balneo Mariæ ad siccitatem usque.

SAL ACETOSELLAE.

R. Succi ex foliis Acetosellæ recentibus expressi, quantum placet.

Leviter ebulliat, ut fœces separantur, dein coletur, tum leni ignis gradu ad Syrupi consistentiam evaporetur, & loco frigido, seu cella exponatur ad crystallisationem, crystalli abluta exsiccantur & usque seruentur.

SAL ALCALI MINERALE FIMUM. Vid. SODA.

SALIS AMMONIACI FLORES. Vid. FLORES.

SAL CORNU CERUI VOLATILE.

E cerui cornibus in segmenta mediocria dissectis, igne aperto retorta capaci, aut cucurbita terrea, vel ferrea potius, capitulo terreo probe vitreato, rostro ampio instruto, ac recipiente capaci adaptato, iuncturis optime clausis, vna cum spiritu & oleo elicuntur, quod aqua modico, e retorta, vel alembici rostro, ac a lateribus recipientis elotum, charta bibula duplicata ac humectata ab olei parte potiori segregatur.

Recti-

SA.

Rectificatione postmodum, e cucurbita virea ex arena igne admodum leni, a spiritu quoque ac phlegmate affuso, cineribus offum caliginatorum saturato, & fortiori demum ab iisdem igne recuperando separatur, tandem encheirefi singulare, mediante nimis spiritu Vini, aut saltem Frumenti rectificato, a reliquis olei sequestrandum & ad puritatem desideratam & candorem gratum deducendum.

SAL MARTIS. Vid. VITRIO-LUM MARTIS.

SAL MIRABILE GLAUBERI.

Ex residuo spiritus salis fumantis Glau-beriani calcinato, aqua calida fontana af-fusa elicuntur partes saline, liquor hic salinus filtratus ad cuticulam usque evaporetur, & loco frigido ad crystallisationem reponatur: Crystalli siccentur & ad usum seruentur.

SAL POLYCHRESTUM GAL-LORUM.

R. Nitri & Florum Sulphuris, ana libram unam.

Mixta successione detona, residuum aqua solue, & post colaturam evaporando coagula in salem.

Quid hic pro Nitro preparato, aut Lapide seu Sale Prunellæ, vulgo sic dicto, peculiare, praeter quantitatem maiorem sulphuris, habeat, non satis liquet.

SA.

SAL POLYCHRESTUM DE SEIGNETTE.

R. Soda Hispanicae depuratae, libram unam,

solute in

Aqua fontana calida.

Post filtrationem huius solutionis calido huic lixiuio adde successione

Crystallorum Tartari puluerisatarum, quantum sufficit ad perfectam saturationem.

Post tam diu euaporetur, donec guttulas super vitrum inspersas in salinum corpus mutari videas. Tandem crystallisationi exponatur, ut artis est.

SAL SATURNI, Vide SACCHARUM SATURNI.

SAL SEDATIUUM HOMBERGI.

R. Boracis Venetae puluerisatae, par-tes duas,

solute in larga quantitate

Aquae feruidæ,

Solutioni huic calida, circumspete affundatur

Olei Vitrioli Anglicani rectificati, pars una.

Dein bona phlegmatis portio leni euaporet calore, donec in residui liquoris superficie lamella saline crystallinæ generentur. Hoc facto, quicquid supereft lixiuji, loco frigido, ut in crystallos coeat, seponatur;

K

SA.

natur; sic enatæ crystalli aqua abluta sic centur.

SAL SUCCINI VOLATILE.

Vna cum oleo in destillatione huius, igne auctiori adscendit, per chartam bibulam ab illo separandum.

SAL SUCCINI VOLATILE DEPURATUM.

Sal volatile succini modo dictum, ab oleo separatum cucurbitæ humili immittitur, ex que pileus coniformis, quantum fieri potest fastigiatus, e charta bibula, aut etiam alba duplice compositus, imponitur, ac lenissimo arenæ calore sublimatur, sèpius mutato pileo, ne relabatur, abradendum, sive colligendum & accuratissime seruandum.

SAL TARTARI.

Genuinum quære infra sub titulo, Tartari Sal. Paratur & Sal tartari extemporeaneum e partibus æqualibus Nitri & Tartari mixtis & detonatis, mixtum, plurimis quidem, non tamen omnibus vñibus, quibus Tartari Sal conuenit & dicatur, aptum. Hoc Docimatis *Fluor albus* vocatur.

SAL VOLATILE OLEOSUM SYLUIL.

Hoc arcannum, cum sibi Author, suisque hereditarium esse voluerit, de genuina eius descriptione dubii, eius loco, cum vulgo sèpius expeti soleat, sequenti utimur:

R. Salis Tartari optime depurati, vñcias sex,

SA.

Olei stillatitii Anisi,
Caryophillorum,
Cinnamomi, ana
drachmam semis,
Macis, scrupulum
vnum,
Zedoarie,
Succini, ana scrupu-
lum semis.

Digerantur loco calido in cucurbita op-
time alembico cæco clausa, biduum aut
triduum, tum hoc remoto, & affusa prius
Spiritus vini communis libra vna semis,
addatur

Salis Ammoniaci purissimi probe
contriti, libra semis,
ac imposito dextre alembico rostrato, iunc-
turis exacte & sollicite munitis, media pars
circiter spiritus destillando blando arenæ
calore eliciatur, ac vitro exacte obturato
seruetur.

SAL VOLATILE SALIS AMMO- NIACI SICCUM.

R. Salis Ammoniaci, libram vnam,
Cretæ purissimæ, libras duas,

Sublimetur e retorta igne fortiori: Sub-
limatum in vitro bene obturato afferuetur.

SAPO STARKEYANUS.

R. Salis Alcali mineralis sicci, vel
Sodæ depuratæ, semilibram,

Fluat intenso igne per horam, ferridum-
que effundatur in mortarium ferreum pro-
be calefactum, & cum pistillo calido in pol-
linem

SO.

linem teratur. Pulueri insilletur confestim,
ita, ut gutta guttam excipiat

Olei Therebinthinae ætherei, ses-
quilibra;

Terantur in mortario vitro, donec in
saponem coaluerint. Mixtio perfecta cog-
noscitur, si ab affusa aqua oleum non se-
paratur.

SODA DEPURATA, seu
SAL ALCALI MINERALE
FIXUM.

R. Soda Hispanica puluerisata, quan-
tum placet,
Aquaæ fluuiatilis bullientis, quan-
tum satis ad solutionem,
Lixiuum per chartam coletur, & post
lenem euaporationem, in vase vitro & lo-
co frigido seponatur, ut Crystalli for-
mentur.

SOLUTIO AMARA.

R. Extracti Centaurei minoris,
Trifolii fibrini, ana vncias
duas,
Absynthii,
Cardui Benedicti, ana vn-
ciam vnam,
Aquaæ Menthæ, libras tres;
Misce, solue & serua.

SOLUTIO RESINÆ GUAIACI.

R. Resinæ Guaiaci, vncias duas,
Spiritus Sacchari, vncias sedecim,
Misce, solue & ad usum serua.

SP.

SPARADRAPUS GOULARDI.

R. Cerae albæ, libram vnam & semis,
Olei Oliuarum recentis, vncias
quinque & drachmam vnam,
Extracti Saturni, vnciam vnam,
Camphoræ, drachmam vnam,

Hisce igne leniori continua agitatione
bene liquatis, immersantur masœ adhuc
calidæ, linteola, vti in descriptione cereo-
lorum dictum fuit.

SPECIES CEPHALICÆ PRO
CUCUPHIS.

R. Foliorum Maioranæ,
Melissæ,
Rorismarini,
Serpilli, ana vnciam fe-
mis,

Florum Lauendulæ,
Liliorum conuallium, ana
drachmas tres,

Storacis calamitæ,
Cinnamomi acuti,
Caryophillorum aromaticorum,
ana drachmam vnam,
Incisa misce, fiat omnia puluis grossus.

SPECIES PRO CATAPLASMATE
EMOLLIENTE. Vid. PULUIS.

SPECIES DECOCTI CARMI-
NATIUI.

R. Radicum Glycyrrhizæ, vnciam
semis,

Semi-

K 2

SP.

Seminis Anisi,
Carui,
Coriandri,
Dauci,
Fœniculi, ana drachmas
tres,
Florum Chamomillæ römanæ,
drachmas duas,
Passularum majorum, vnciam
vnam semis,
Misce concisa.

SPECIES DECOCTI EMOLLI-
ENTIS PRO ENEMATE.

R. Herbarum Altheæ,
Maluae,
Florum Chamaemeli vulgaris,
Sambuci, ana vncias duas,
Seminis Lini, vnciam vnam.
Incisa & contusa misceantur.

SPECIES DECOCTI LIG-
NORUM.

R. Radicum Saponariae,
Caricis arenariae, ana
vncias duodecim,
Bardanae,
Fœniculi,
Scrophulariae,
Liquiritiae,
Ligni Sassafras, ana vncias quatuor,
Juniperi,
Sancti, ana libram semis.
Incisa misceantur.

SP.

SPECIES DECOCTI
NIGRI.

R. Radicis Tormentillæ, vnciam
vnam semis,
Herbae Sabinae,
Rutae,
Scordii,
Saluiae,
Absynthii,
Foliorum Quercus, ana drach-
mas sex,
Corticum Granatorum,
Gallarum turcicarum, ana vncias
duas cum semisse,
Aluminis crudi, vncias quatuor,
Vitrioli viridis, vncias duas,
Viridis aëris,
Tartari rubri, ana vnciam vnam,
Incisa & contusa misce.

SPECIES PRO DECOCTO
PECTORALI.

R. Radicum Liquiritiæ,
Altheæ decorticatae, ana
vnciam vnam,
Herbae Tussilaginis,
Veronicæ,
Hyssopi, ana drachmas sex,
Florum Papaueris rhoeados,
Bellidis minoris, ana
drachmas duas.

Concisa misceantur.

SPE-

SP.

SPECIES DIAIREOS.

R. Specierum Diatragacanthe frigidi,
Sacchari candi albi, ana drach-
mas duas,
Radicum Iridis florentinæ, vn-
ciam semis,
Misce fiat Puluis subtilissimus.

SPECIES DIATRAGACANTHI
FRIGIDI.

R. Gummi Arabici, drachmas decem,
Tragacanthi, vncias duas,
Amyli, vnciam semis,
Radicis Liquiritiæ, drachmas duas,
Sacchari albi, vncias duas,
Misce, fiat Puluis subtilissimus.

SPECIES PRO FOMEN-
TATIONE.

R. Florum Lupuli, libram vnam,
Chamæmeli vulgaris,
Lauendulæ,
Millefolii cum toto,
Herbarum Rorismarini,
Serpilli,
Tanaceti,
Meliloti,
Botryos, ana vncias
duas.
Incisa misce.

SPECIES FUMALES. Vide PUL-
UIS FUMALIS.

SP.

SPECIES PRO GARGA-
RISMATE.

R. Radicum Liquiritiæ, vncias qua-
tuor,
Pimpinellæ albae,
Herbarum Saluiae, ana vncias duas,
Hyssopi,
Hederae terrestris,
Altheæ,
Verbasci, ana vnciam
vnam,

Florum Rosarum,
Prunellæ,
Millefolii,
Sambuci, ana vnciam
semis.

Incisa misce.

SPECIES HIERÆ PICRÆ.

R. Aloës illotae, vncias duodecim,
Afari,
Cinnamomi,
Croci,
Cubebarum,
Masticæ,
Spicae indicae, ana drachmas sex,
Misce, fiant, vt moris, Species.

SPECIES PRO INFUSO LOCO
THEE.

R. Foliorum Saniculæ,
Veronicae,
Hederae terrestris,
Saluiae,
Folio-

SP.

Foliorum Melissae, ana vnciam
semis,
Florum Chamomillae romanae,
Anthos,
Radicum Saffraparillæ,
Ligni Saffafras,
Anisi, ana drachmas tres.
Incisa & contusa minutim misce.

SPECIES MORSULORUM IMPERATORIS.

R. Caryophillorum, vnciam semis,
Cinnamomi electi, drachmas de-
cem,
Galangae,
Macis,
Nucis moschatae, ana drachmas
duas,
Zingiberis, vnciam vnam.
Misce, fiant Species.

SPECIES RRO PEDILUUIO.

R. Herbarum Menthae crispaæ,
Melissae,
Serpilli,
Maluae, ana vnciam
vnam,
Florum Chamomillæ,
Spicae, ana vnciam semis.
Incisa grosso modo misce.

SPECIES RESOLVENTES EXTERNAE.

R. Herbarum Absynthii,

SP.

Herbarum Melissae,
Menthæ,
Origani, ana vncias
quatuor,
Florum Chamomillæ,
Sambuci, ana vncias tres,
Baccarum Lauri, vncias duas.
Incisa & contusa misceantur.

Cui libet, Camphoræ quantitatem necessariam addere potest.

SPECIFICUM CEPHALICUM.

R. Cinnabaris factitiae rite praepara-
tæ, vncias quatuor,
Radicis Pœoniae, vncias tres,
Coralliorum rubrorum praepara-
torum, vnciam vnam,
Succini praeparati, vnciam semis,
Foliorum Auri, quantum libet.
Misce fiat omnium puluis subtilissimus.

SPIRITUS ACETI. Vide ACE-
TUM DESTILLATUM.

SPIRITUS ANISI.

R. Seminis Anisi mundati & conqua-
fati, libram semis,
Spiritus frumenti rectificati, aut
Vini potius communis,
mensuram vnam.

Stet in infusione oſtiduum, tum per ma-
ris balneum spiritum euoca.

SPI-

S.P.

**SPIRITUS CARMINATIUUS
DE TRIBUS.**

R. Spiritus Nitri fumantis, vnciam dimidiā,
Vini rectificatissimi, vncias sex,
Tartari, vncias tres.
Mixta destillentur e retorta.

SPIRITUS COCHLEARIAE.

R. Herbae Cochleariae florentis,
libras octo,
Contunde ac vesicæ imposito affunde:

Spiritus Vini non rectificati, libras decem.

Juncturis, accommodato refrigeratorio ac recipiente commodo, probe clausis ac mutatis, destilla igne moderato spiritum, quem recenti herbae reaflusum, semel iterumque destilla, rectifica ac probe obturatum serua.

SPIRITUS COERULEUS.

R. Herbae Absynthii,
Rutae,
Scordii,
Rorismarini,
Florum Lauendulae, ana vncias duas,
Baccarum Juniperi, vncias quatuor,
Salis Ammoniaci, vncias quinque,
Cinerum clauellatorum, vncias quatuor,

S.P.

Spiritus Frumenti, mensuras quatuor.

Mixta destillentur & Spiritus abstractus effundatur super lamellam cupream.

SPIRITUS CORNU CERUI.

Vide de hoc titulum **SALIS CORNU CERUI VOLATILIS.**

Vnius enim & eiusdem destillationis tam Sal, quam Spiritus proles est, certa & illic indicata encheiresi ab inuicem & oleo fætido separanda.

SPIRITUS FOENICULI.

R. Seminis Foeniculi, libram vnam,
Spiritus vini Gallici optimi, libras sex.

Infusa stent diem vnum aut alterum, tum destillentur, vt artis.

SPIRITUS FORMICARUM.

R. Formicarum circa solstitium astrium die serena, in cucurbitam vna cum ouulis collectarum, & a festucis mundatarum, quantum placet. Affunde iis Spiritus vini rectificati, ad trium digitorum eminentiam, vase optime clauso, digere biduum, postea imposito cucurbitæ alembico, & applicato recipiente, iuncturis optime clausis, ex arena destilla, donec stria disparere incipiant. Spiritum destillatum recentibus formicis affunde, digere ac denuo, vti prius destilla.

SPL-

SP.

SPIRITUS JUNIPERI E
BACCIS.

R. Baccarum Juniperi recentium bene maturarum, quantum placet;

Conquassatis in vase querno aut terreo vitreato affundatur modicum aquae tepidae, ut probe madescant, & pultis liquidiusculi consistentiam acquirant, ac addito pauxillo fecum vini, aut saltem cereuisie, ad fermentandum disponantur, qua rite peracta, ubi vinorum odorem spirare incipiunt, destilla.

SPIRITUS LAUENDULÆ.

Sæpius super recentes Lauendulae Flores, cohobatus & rectificatissimus requiritur.

SPIRITUS LAUENDULÆ
COMPOSITUS.

R. Spiritus Lauendulae simplicis, libras tres,

Rorismarini, libram unam,
Cinnamomi acuti, unciam unam,
Caryophillorum aromaticorum,
Cubebarum, ana drachmas tres.

Misce, digere & per retortam destilla.

SPIRITUS LILIORUM CON-
UALLIUM.

E conquassata florum sufficienti quantitate affuso aquæ calidæ modico, & addito vini aut cereuisie alba fecum pauxillo, post fermentationem debitam instar aliorum e fructibus fermentatis spirituum, destillando e vesica, & rectificando paratur.

SP.

SPIRITUS LUMBRICORUM
TERRESTRIVM.

R. Lumbricorum terrestrium stupa depuratorum aut lotorum, quantum placet.

Super infunde spiritus vini rectificati ad trium ditorum eminentiam, digere quadratum vase probe obturato, tandem ex arena, iuncturis exacte clausis, destilla, spiritum prolectum aliis lumbricis reaffunde, digere ac denuo ex arena igne moderato reuoca.

SPIRITUS MATRICALIS.

R. Cinnamomi acerrimi,
Nucis moschatae,
Macis,
Zingiberis,
Caryophillorum,
Granorum Paradisi,
Cubebarum,
Cardamomi, ana unciam unam
semis,
Piperis longi, unciam semis,
Galangae,
Zedoariae, ana unciam unam,
Foliorum Saliae minoris,
Menthæ crispæ,
Feniculi,
Melissæ, ana unciam
semis.

Puluerisentur, tum affunde Spiritus Vi-
ni generosi, mensuras tres; Digerantur
vale optime clauso, aliquandiu, tum lego
artis destillentur, ac Spiritus seruetur: cu
libet,

S.P.

libet, Camphorae, quantum placet, addere iubeat.

SPIRITUS MINDERERI.

R. Salis Ammoniaci volatilis, quantum vis,
Paulatim instilletur, subinde agitando.

Aceti destillati, quantum sufficit,
Donec cestet effervescentia, & saturatio
sit perfecta.

SPIRITUS NITRI DULCIS.

R. Spiritus Vini rectificatissimi, vncias
viginti quatuor,
Paulatim instillentur

Spiritus Nitri fumantis, vnciae
duae.

Mixta digerantur per aliquot dies, po-
stea destillentur ac cohobentur e retorta vi-
trea ter, ut optime vniuantur, Spiritusque
nitri mitescat.

SPIRITUS NITRI FUMANS.

R. Nitri siccissimi puluerisati, libras
tres.

Immittatur cucurbitae vitreæ tubulatae
siccæ & calefactæ, atque recipiente appli-
cato, cuius iuncturæ optime clausæ sint: tum
per tubulum guttatum affundantur

Olei Vitrioli concentrati, libræ
duæ.

Post leni arenæ igne fiat destillatio, quam-
diu sub specie humorum rubicundorum ex-

halat Spiritus. Qui in vitro epistomio vi-
treo bene clauso & lutato seruetur.

SPIRITUS RORISMARINI.

R. Summitatum Rorismarini recen-
tium cum floribus, libras duas,
Spiritus Vini, libras quatuor.

Stent in digestione, vase bene clauso,
triduum vel octiduum, tum e vesica, iunctu-
ris probe claufis, igne moderato, ex arena
destilla.

SPIRITUS ROSARUM.

R. Rosarum fragrantium, nondum
plene hiantium, sufficientem
quantitatem,

Contunde probe & in vase vitreato vel
ligneo pauxillo Salis, aut, si cum Ludovico
mauis, Sacchariana adiecto, impaffentur sic-
que stent, donec fermententur. Vbi fer-
mentata odorem vinolum spirare incipiunt, ve-
sicæ immittas, & affusa, quantum sufficit,
ad præcaudum empyreuma, aqua rosa-
cea, capitello ac refrigeratorio cum reci-
piente accommodatis, iuncturisque exacte
claufis & munitis, igne moderato destilla,
destillatum recentibus rosis fermentatis reaf-
funde, ac destilla, idque bis, terue reitera,
tandem e maris balneo rectifica.

SPIRITUS RUBI IDAEI.

E baccis conquassatis ac fermentatis alio-
rum instar fructuum spiritus, provti in spi-
ritu Juniperi norma illorum destillandorum
cernitur, parandus.

L

SPI-

SP.

**SPIRITUS SALIS AMMONIACI
CUM ALCALI AQUOSUS.**

R. Salis Tartari vel loco huius, Cinerum clauellatorum depuraturum,
Salis Ammoniaci puluerisati, ana quantum vis,

Sal tartari indatur cucurbitae vitreæ, cui Sal ammoniacus aqua fontana purissima solutus affundatur, moxque imposito alembico ac adaptato excipulo, iuncturis debite munitis, ex arena igne moderato destilletur, eo usque ut prolixiatur Spiritus cum Sale Alkali volatili probe imprægnatus. Residuum filtratum ad siccitatem euaporatum Sal præbet aperitiuum & antisebrile Sylui.

Nota. Si major Spiritus quantitas obtinenda, duplum vel triplum salis tartari vel cinerum clauellatorum sumendum, & ante destillationem per 24 horas leni digestioni committendum.

**SPIRITUS SALIS AMMONIACI
ANISATUS.**

R. Spiritus Salis Ammoniaci rectificati, vncias sex, Vini Anisati rectificatisimi, libram unam, Olei destillati Anisi, drachmas duas.

Mixta digerantur in phiala optime obturata ocliduum, postea e cucurbita igne arenæ destillantur.

SP.

Nota. Alii loco spiritus salis ammoniaci rectificati, sumunt cinerum clauellatorum vel Salis Tartari, partes tres, Salis Ammoniaci, partem unam, Seminis Anisi, partes quatuor, quibus Spiritus Vini rectificati, libra una affundatur & in balneo Mariæ ad siccitatem destillentur, hac ratione Spiritus salis ammoniaci minoribus sumtibus paratur.

**SPIRITUS SALIS AMMONIACI
CUM CALCE VIUA.**

R. Calcis perfecte vivæ, libram unam & semis,

Aquæ puræ, libras tres,

In vase terreo capaci sensim mixtis, post absolutam Calcis extinctionem in Cucurbita vitrea immitte & admisce

Salis Ammoniaci puluerisati, libram semis,

Et actu tum imposito alembico, ad id ante adaptato, ac apposito recipiente, iuncturas, quam potes, citissime muni, tum igne initio lenissimo destilla libram unam spiritus, qui in vase optime clauso seruandus.

Nota: E capite mortuo SALEM quære AMMONIACUM FIXATUM.

**SPIRITUS SALIS AMMONIACI
SUCCINATUS, vulgo EAU
DE LUCE.**

R. Olei Succini rectificati, guttas quinquaginta, Spi-

S.P.

Spiritus Vini rectificati, vnciam
vniam,
Salis Ammoniaci vinosi,
vncias duodecim,
Igne moderato e retorta destillentur.

**SPIRITUS SALIS AMMONIACI
VINOSUS.**

R. Salis Tartari, vel loco huius, Ci-
nerum clauellatorum depura-
torum, libram vnam,
Salis Ammoniaci puluerisati, li-
bram semis,
Mixtis in retorta vitrea affundantur

Spiritus Vini non rectificati, libræ
quatuor.

Tum ex arena leni igne destillentur.

**SPIRITUS SALIS COMMUNIS
ACIDUS.**

R. Salis marini, libras quatuor.

Soluatur aquæ fontanæ, quantum sufficit,
ac filtrando purgetur, purgatus exhalet ad
cuticulam fere. Muria huic boli vulgaris,
aut argilla saltē torridæ ac puluerisata,
quantum sufficit, libræ circiter decem aut
duodecim impastentur, vt fiat massa ad for-
mandum globulos apta, qui parandi ac probe
siccandi. Tunc retorta indendi, ac adap-
tato recipiente amplissimo, igne aperto gra-
datim adhibito, tandemq[ue] vehementissi-
mo, vt retorta omnis intensissime candeat,
spiritus omnes eliciendi, qui retorta post-
modum vitrea rectificandi.

S.P.

**SPIRITUS SALIS COMMUNIS
CONCENTRATUS, seu FU-
MANS.**

R. Salis communis puluerisati, libras
quatuor,

Immittantur retorta vitrea, atque succe-
fue superaffundantur

Olei Vitrioli anglici, libræ duæ,
quod prius cum

Aquaæ fontanæ, libra vna,
caute commissum est;

Adaptetur vas recipiens, & juncturis op-
time clausis leni igne arenæ instituatur de-
stillatio.

Spiritus prolectus fumans e Cucurbita
vitrea rectificari potest & in vitro, episto-
mio vitreo clauso astenuari.

E capite mortuo elixuari potest SAL
MIRABILE GLAUBERI.

SPIRITUS SALIS DULCIS.

R. Spiritus Salis concentrati rectifi-
cati, vncias duas,
Vini rectificatissimi, vn-
cias sedecim.

Digerantur & circulentur vase commodo
prius oclidium, postea retorta vitrea, ex
arena, igne gradatim suppeditato, auocen-
tur ac semel iterumque pro arctiori vnione
cohobentur.

**SPIRITUS SAMBUCI E
FLORIBUS.**

Ad instar spiritus Rosarum distillatur.

L 2

SPI-

SP.

SPIRITUS SAPONATUS.

R. Saponis alikantici, vncias octo,
Liquoris Salis Tartari, vncias sex,
Spiritus Vini rectificatissimi, men-
suram semis,

Misce, digere & filtra.

SPIRITUS SERPILLI.

In hoc parando eadem, quae in spiritu
Lauendulae acribeia desideratur.

SPIRITUS SULPHURIS.

Vide supra titulum OLEI SULPHURIS
PER CAMPANAM.

SPIRITUS TARTARI.

R. Tartari qualiscunque solutione, colatū-
ra & coagulatione depurati, quantum
vis, imple illo tertiam retortæ lapideæ
partem, ac igne apero in recipientem
satis capacem probe adaptatum ac
luttatum, gradatim aucto igne spiritus
omnes vna cum oleo fætido destilla,
& spiritus ab oleo charta emporetica
duplicata, humectata separa.

SPIRITUS TEREBINTHINÆ.

R. Terebinthinae depuratae clarae,
quantum placet.

Affuso in vesica cuprea aut cucurbita vi-
treâ humili aquâ limpida triplo, - destilla
igne initio moderato, phlegmatis aciduli
parum, mox oleum album, quod SPIRI-
TUS nomine venit, seorsim excipiendum,
cui succedit continuato parumque aucto

SP.

igne flauum, tandemque auctiori rubrum,
demum rectificandum.

**SPIRITUS THERIACALIS
CAMPHORATUS.**

R. Theriacæ, vncias decem,
Croci orientalis, vnciam vnam,
Myrræ rubræ, vncias quinque,
Spiritus vini rectificatissimi, libras
duas.

Stent vase exacte clauso loco tepido tri-
duum, tum e cucurbita, imposita alembico
Camphoræ vncia semis, iuncturis solicite
claulis ac munitis, e balneo maris calore
successive aucto destillentur spiritus omnes.

SPIRITUS DE TRIBUS. Vid.**MIXTURA SIMPLEX.****SPIRITUS VINI CAMPHO-
RATUS.**

R. Spiritus Vini optime rectificati,
libram vnam,
in qua soluetur
Camphoræ, vncia vna semis.

Stent in digestione lenissima, donec Cam-
phora omnis sit soluta.

**SPIRITUS VINI CAMPHORA-
TO-CROCATUS.**

R. Spiritus Vini camphorati, libras
duas,
Effentiae Croci, vncias duas,
Misce.

SPI-

SP.

SPIRITUS VINI RECTIFI-
CATUS.*R.* Spiritus Vini, quantum vis,

Infunde cucurbitæ excelsæ, ac optime adaptato alembico cum recipiente, iuncturisque solidissime lutatis, medietatem eius debito calore auoca, & probe obturato vitro serua.

Quod si huius denuo medietatem balnearioridi calore lenissimo abstraxeris, phlegmate omni liberatum *Alcohol vini* audit, vel

SPIRITUS VINI RECTIFICA-
TISSIMUS.SPIRITUS VINI TARTA-
RISATUS.

R. Spiritus Vini optime, vt dictum, rectificati, libras duas, Salis Tartari probe depurati, & siccatai, vel Cinerum clauellatorum depuratorum, vncias quatuor.

Misce, & e cucurbita vitrea iuncturis exacte munitis igne arenæ moderato destilla.

Non opus est, vt ad siccitatem vrgearitur destillatio, relinquitur enim in fundo phlegma nudum evaporatione separandum, sic sal alcali rursus impetratur, quod siccandum. Et sola digestione *Spiritus vini tartarisatus* paratur, nempe si cineres clauellati depurati cum spiritu vini rectificato infundantur.

SPIRITUS VITRIOLI DULCIS,
seu

SP.

LIQUOR ANODYNUS MINE-
RALIS.*R.* Spiritus Vini rectificatissimi, libras sex,

Olei Vitrioli anglici rectificati, libras duas.

Spiritui vini retortæ vitreæ satis capaci infuso, oleum vitrioli successiue & guttatum admiscetur, bene cauendo, ne virrum calefiat. Hoc factio recipiens applicetur, & bene lutetur, tum in mariæ balneo prius per nycthemeron unum vel alterum leni calore digeratur, tum aucto paululum igne successiue ad partem dimidiam liquor destilletur: Destillatum hocce effundatur in aliud vitrum, & epilomio bene miniatur. Recipiens iterum applicetur retortæ, denuo lutetur & leni igne ita destilletur, vt quoties quatuor vel sex vnciae destillatae fuerint, semper recipiens remoueatur, & destillatus liquor præcedenti admisceatur, idque tam diu continuetur, vñque tum odoris aliquid sulphurei perceperis; tum recipiens iterum separetur, vñlimum hocce vero destillatum, bene examinetur, numne aliquid phlegmatis ipsi admixtum sit, quo apparente liquoribus antecedentibus non statim admisceatur, sed per separatorium vitreum Naphtha supernatans caute separetur & hæc sola destillato liquori antecedenti adfundatur, quem in vase vitro bene obturato vñli serues.

SPIRITUS VITRIOLI SIMPLEX.

R. Olei Vitrioli concentrati, vnciam vnam,

Aquaæ fontanæ, vncias octo.
Miscentur.

L 3

SPON-

SU.

SPONGIA CERATA.

Spongia tenuis mundata exsiccata ceræ flauæ liquefactæ immersatur, ac prælo fortiter exprimatur, & quando refrixerit, seruanda.

STANNUM ANGLICUM PULUERJSATUM.

Stannum anglicum purissimum liquefactum effundatur in pyxidem ligneam, intus creta obductam, atque celeri succusione redigatur, quantum potest, in puluerem. Reliquum iterum fusum, eodem modo in puluerem mutetur.

SULPHUR AURATUM ANTIMONII.

R. Antimonii crudi optimi,
Sulphuris citrini purissimi, ana vncias duas,
Cinerum clauellatorum depuratum, vncias octo.

Misceantur in puluerem, qui crucibulo indetur, & bene recto crucibulo igne satis forti massa bene aquæ instar fundatur, tum massa sic fusa effundatur in mortarium ferruum purissimum calefactum: nunc hæc massa calida contundatur, contusa in aquæ destillatae quantitate sufficiente soluatur, & sic solutio per nycthemeron quiescat. Post filtretur & aqua diluatur, tum tantum spiritus vitrioli addatur, quantum ad omnem sufficit præcipitationem. Aqua supernans decantetur, & præcipitatum toties aqua feruida abluatur, usque dum omnis sapor salinus & odor ingratus cessauerint,

SU.

Denique bene ablutum præcipitatum lenissimo calore siccatur & usui seruetur.

Nota. Hocce sulphur auratum antimonii una præcipitatione absoluitur, quia vero permulti magis in usu habent aliud tertiae præcipitationis, iam & istum præcipitandi modum subministrabimus.

SULPHUR AURATUM ANTIMONII TERTIAE PRAECIPITATIONIS.

R. Residui a Tinctura Antimonii tartarifata, quantum volueris,
In puluerem trito, addatur

Aquæ fontanæ, octuplum.

Postquam sati diu cocta fuerint, solutioni ex flavo rubra filtrata, infilletur in vase vitro acetum destillatum, & Sulphur præcipitatum ope chartæ bibulae separetur. Lixiuio iterum adsundatur acetum, iterumque separetur Sulphur aurantii coloris. Tertia demum vice, multum addatur lixiuio Aceti, puluisque excusus tenuissimus, coloris aurantii nimis saturati, probe abluatur, donec fetorem deposuerit.

SULPHUR AURATUM ANTIMONII LIQUIDUM.

R. Solutionem Scoriarum Reguli Antimonii.

Dimidiam eius partem evaporationi subiice, donec ouum illi innatare possit, tum vero statim admisce æqualem quantitatem

Olei expressi Papaueris vel Amygdalarum,

et

SU.

et leniter coque, donec oleum non amplius conspiciatur, & masia digito facilime obediens prodeat; postea alteram lixiuii sulphurati partem successiue adfundere, coctionem continua, usque dum alcalini saporis nihil deprehendatur, nec oleum amplius fibi relictum appareat.

Puls hæc saponacea probe desicetur, & in mortareo lapideo cum tinctura antimonii acri per abstraccionem spiritus ad dimidium redacta, ad eminentiam trium digitorum affusa, per horas aliquot probe tere, postea cucurbitæ indita per viginti quatuor horas digere.

Ita prodibit peramoena Tinctura acredinis expers, qua totum saponem una cum Sulphure antimonii solutum fistit, nullo in cucurbita residuo reliquo.

SUPPOSITORIUM COMMUNE.

Ex mellis, vitelli, & salis, quantum sufficit, ut artis est, paratur, cum pulueris Aloës, Rutæ ac Cumini, ana quantum sufficit pro re nata acendum.

SUPPOSITORIUM STIMULANS.

R. Specierum Hieræ Picræ, vnciam unam,
Salis communis, vnciam dimidiæ,
Farinae frumenti, vncias quatuor,
Saponis albi, vncias tres,
Mellis, quantum sufficit,

Ut fiat Pasta, ex qua fermentur Suppositoria.

SY.

SYRUPUS ACETOSITATIS CITRI.

R. Succi Citri depurati & filtrati, libram unam & semis,
Sacchari albissimi, libras tres,
Unica super igne moderato ebullitione in vase terreo vitreato fiat Syrupus justæ consistentia, coletur.

SYRUPUS DE ALTHEA.

R. Radicis Altheæ, vncias tres,
Aquæ fontanæ, librae sex.
Coquantur ad tertiarum partis consumtionem, sub finem addendo

Radicis Liquiritiæ,
Herbæ Capillorum Veneris, ana vnciam unam.

Colatur, subsidentia depurata, addantur
Sacchari albi, librae sex.

Coquantur leni igne sub continua agitacione, donec fiat Syrupus.

SYRUPUS AMYGDALINUS.

R. Amygdalarum dulcium excorticatarum, vncias sex,
amararum excorticatarum, vncias duas,

In mortario lapideo cum pistillo ligneo minutissime contundantur, sensim addendo

Aquæ fontanæ decoctæ frigidæ,
vncias duodecim,
Aqua

SY.

Aqua^e florum Naphae, vnciam
vnam.

Colatura expreſſa vncias decem adde
Sacchari albifſimi, vncias octo-
decim.

Calore leniſſimo fiaſ Syrupus.

SYRUPUS AURANTIORUM
CORTICUM.

R. Corticum Aurantiorum extimo-
rum recentium, libram femis,
Aqua^e Naphae, libram vnam;

Digere in cucurbita operculata optime
clauſa, ne quid exhalet, horas viginti qua-
tuor; poſtea exprime, ac cum Sacchari al-
bifſimi libra vna femis in eadem cucurbita
obturata ſoluendo tantum, blando calore
in Syrupi conſiſtentiam redige.

SYRUPUS BALSAMICUS.

R. Balsami Peruviani, vnciam vnam,
Aqua^e fontanae, vncias duodecim;

Coque per duas vel tres horas in vase cir-
culatorio; liquor, poſquam refrierit, co-
lato admisce

Sacchari albi, quantum ſufficit,
vt fiaſ Syrupus.

SYRUPUS BERBERUM.

R. Succi Berberum recentis depu-
rati,

Sacchari albifſimi, ana libras duas;
Coquantur ſecundum artem in Syrupum.

SY.

SYRUPUS CAPILLORUM
VENERIS.

R. Herbae Capillorum Veneris electae
& parum concifae, vncias duas

Infunde per horam dimidiā cum

Aqua^e fontanae feruentis, libris
duabus,

Colatura albumine ouorum clarificetur
& cum

Sacchari albi, libris duabus cum
semifeſe,

ad Syrupi conſiſtentiam coquatur.

Pro lubitu addi poterunt etiam

Aqua^e Naphae, vnciae tres.

SYRUPUS CERASORUM
ACIDORUM.

R. Succi Cerasorum acidorum per
residentiam depurati, libras
quinque,

Sacchari albifſimi, libras tres;

Coquantur igne moderato ad iustum Sy-
rupi conſiſtentiam.

SYRUPUS CICHOREI EX
SUCCO.

Fit ad instar aliorum Syruporum e ſucco
Cichorei per residentiam depurato, cum
Sacchari albi puri ana.

SY-

SY.

SYRUPUS DE CICHOREO
CUM RHEO.

R. Radicum Cichorei, vncias sex,
Aquaæ fontanae, libras tres.
ad tertix partis consumtionem coctis ad-
dantur

Rhei minutum concisi, vnciae
duae,
Cinnamomi optimi, vncia una.
Ebulliant leni igne. Expressis immisce-
antur

Sacchari albi, librae duae,
Clarificata ac colata, misceantur in Sy-
rupum.

SYRUPUS DE CINNA-
MOMO.

R. Pulueris crassi Cinnamoni electi
& acuti, vncias quinque,
Affunde in cucurbita vitrea

Aquaæ Cinnamomi cum vino de-
stillatæ optimæ, libras
duas,
Rosarum fragrantissimæ,
vncias tres,

Digerantur vase optime obturato loco
tepidò biduum. Tum colentur ac cum
Sacchari albissimi clarificati, ac ad consi-
stentiam tabulati & ultra cocti, libris tri-
bus, sola dissolutione fiat justæ consistentia
Syrupus.

SY.

SYRUPUS CITRI CORTICUM.

R. Corticum Citri aut Limonum re-
centium extimorum, minutim
conciforum, libram semis.
Aquaæ Corticum Citri, libram
vniam.

Digere in cucurbita operculata optime
clausa, ne quid exhalet, horas viginti qua-
tuor, postea exprime, ac cum Sacchari al-
billissimi libra una semis, in eadem cucurbita
obturata soluendo tantum, blando calore in
Syrupi consistentiam redige.

SYRUPUS CORALLIORUM.

R. Coralliorum rubicundissimorum
grosse contusorum, libram semis.

Extrahe triduana digestione balnei, cum
succo Berberum, post lenem ebullitionem
per pannum colato & ad aliqualem eminen-
tiā affuso, effentiam. Extractum per in-
clinationem effunde, & recentem succum
reaffunde, digere, decanta, idque tertio
aut quarto repete, donec corallia fere solu-
ta & consumta. Extractions omnes con-
fundere ac tantundem ponderis Sacchari al-
billissimi adde, atque leni ebullitione aut eu-
poratione saltem syrupum para, probæ &
durabilis consistentia.

SYRUPUS CYDONIORUM.

R. Succi Cydoniorum acidorum de-
purati & clarificati, libras tres,
Sacchari albi purissimi, libras
duas,

Fiat coquendo lege artis Syriopus.

M

SY-

SY.

Syrupus diacodii mon-
TANI.

R. Capitum Papaveris albi, cum se-
minibus, numero viginti,
Siliquarum dulcium, vncias tres,
Liquiritiae rasae, vncias duas.

Eximantur Siliquis grana, & cum aquae
fontanæ libris decem, coquantur ad quartæ
circiter partis remanentiam; residuum co-
letur cum expressione; Colaturæ libris dua-
bus cum semisse adde:

Sacchari Candi rubri, libras duas;

Coquantur ad consistentiam Syrupi, in-
star mellis spissi.

SYRUPUS DE ERYSIMO
LOBELII.

R. Erysimi totius, recentis, con-
quaflati, vncias tres,
Radicum Emulæ,
Taraxaci,
Liquiritiae rasæ, ana vñ-
cias duas,
Herbarum Borraginis,
Capillorum Veneris,
Cichorei, ana drach-
mas sex,
Florum Anthos,
Betonicæ, ana drachmas
duas,
Seminis Anisi, drachmas sex,
Passularum mundatarum, vncias
duas,

SY.

Coquantur incisa & contusa in

Aqua Hordei, libris octo,
Succi Erysimi, libra semis,
ad remanentiam tertię circiter partis. Co-
laturæ expressæ adde Sacchari albi & Mel-
lis depurati, ana libras duas. Clarifica, ut
artis est, & in debita consistentia syrum
coque.

SYRUPUS GRANORUM
KERMES.

R. Coccionellæ, vnciam dimidiam,
Salis tartari depurati, grana decem,
Probe terantur cum

Aquæ Cinnamomi sine vino,
Rosarum, ana vnciis octo.

Stent per noctem in infusione, & ad-
dantur

Sacchari albi, librae duae,
Succi granorum Kermes, vnciae
decem,

Vnica ebullitione fiat Syrum, per lin-
teum colandus.

SYRUPUS DE LIQUIRITIA.

R. Radicum Liquiritiae, vncias duas,
Capillorum Veneris, vnicam vnam,
Foliorum Hyssopi, vnciam semis.

Concisa in aquæ fermentis libris quatuor
infunde, ac horas viginti quatuor digere,
tum ad medietatis circiter consumptionem
coque, colaturam expressam addita mellis
def-

SY.

despumati, ac sacchari albi, ana libra vna, clarificatam ex arte, ad syrapi spissioris consistentiam vterius percoque, cui tandem additis sub finem aquæ rosarum fragrantis, vnciis sex, justam syrapi consistentiam concilia.

SYRUPUS GRANATORUM.

Paretur juxta modum aliorum syruperum, e succis acidis Berberum nimirum, aut similiu, parandorum.

SYRUPUS DE MANNA.

*S. Gal. Senna
3j.
Lm. Generali 3j.*
R. Radicum Polypodii, vncias tres, Aquae feruidae, libras duas semis,

*V. Fod. q. 1:
Collab. 3xx*
Per noctem macerata coquantur ad tertiam partis consumtionem.

Colatur addantur

*Sacchar. Thomatis
Manna 1ff.
Lq: ad coros. 4:
Syrupi*
Foliorum Sennae electorum sine stipitibus, vnciae quatuor,

Seminis Fæniculi, vncia dimidia;

In loco calido digesta exprimantur. Clasificata demum admistis

Mannae calabrinae, vnciis sex, Sacchari albi, vnciis viginti duabus,

coquantur in Syrum.

SYRUPUS MORORUM

Paratur, vti Syrum Acetositatis

Citri.

SY.

SYRUPUS NÝMPHEÆ, f.
DE NENUPHAR.

R. Florum Nymphaceæ luteae, libras duas,

Infunde in aquæ Nymphaæ, aut saltem fontanae feruentis, libris quatuor. Scenit in digestione caloris balnei horas viginti quatuor, tum exprimantur valide, exprefsum recentibus reaſfundatur floribus, digeratur, exprimatur, idque tertia vice repetatur; Expressioni postremæ addantur Sacchari, librae totidem, quo succi sunt, ac clarificando & ebulliendo, vt artis, fiat Syrum.

SYRUPUS PAPAVERIS ALBI.

R. Capitum Papaveris albi-recentium cum Seminibus, libram vnam semis,

Coquantur in libris septem aquæ pluvialis purissimæ ad remanentiam librarum duarum. Quibus colatis & expressis adde

Sacchari albi, libram vnam cum semis,

Coque, clarifica, vt artis, & ad consistentiam syrupo conuenientem reduc.

SYRUPUS PAPAVERIS ERRATICI FLORUM.

R. Florum Papaveris erratici recentium, libras duas,

Infundantur in libris quatuor Aquæ calentis, digerantur per noctem; Aqua a floribus

M 2

SY.

ribus leni expressione separata, recentium Papaueris erratici florum, libris duabus rursum affundatur, digeratur ut ante & separatur, idque tertia vice repetatur; Huic tandem liquido leni expressione a floribus tertia vice separato, adde

Sacchari albi, libras quatuor,
Post debitam, ex arte, clarificationem,
Syrupum justæ consistentia confice.

SYRUPUS POEONIÆ.

Eadem norma, qua Papaueris erratici triplex nimirum infusione fiat.

SYRUPUS RIBIUM.

E succo espresso depurato fiat ad instar Syrupi Berberum.

SYRUPUS ROSARUM.

E libris sex circiter Foliorum Rosarum recentium contusis, ac in aqua limpidissimæ feruentis libris tribus per horas viginti quatuor infusis ac digestis, posteaque expressis & albumine oui, ut artis est, clarificatis, addita sacchari libra una cum semis, aut etiam duabus, sub alembico recipiente munito in cucurbita vitrea balnei calore pro recuperanda aqua odorata, ad Syrupi consistentiam coquendo paratur.

SYRUPUS RUBI IDAEI.

Ad normam syrupi Berberum ex succi depurati & sacchari clarificati partibus æqualibus paretur.

SYRUPUS DE SPINA CERUINA, seu DOMESTICUS.

R. Succi Baccarum Spinæ ceruinæ, libras sex,

SY.

adde

Seminis Anisi,
Masticis, ana vncias duas,
Zingiberis,
Cinnamomi,
Caryophillorum, ana vnciam
vniam,
Sacchari albi, libras duodecim.

Fiat lege artis Syrupus.

SYRUPUS VIOLARUM.

R. Florum Violarum recentium mundatarum, libram vnam,
Aquæ Fontanæ feruentis purissimæ, libram vnam & semis,

In vase figulinæ, optime vitreato per aliquot horas macerata, exprimantur & collentur;

Demum additis

Sacchari albissimi, libris tribus,
leni ac vnicæ ebullitione in vase stanneo fiat Syrupus, iterum colandus.

TAMARINDORUM PULPA.

R. Tamarindorum,
Aquæ fontanæ feruentis, ana libram
vniam,

Cum convexo cochlearis parte agitentur
& per cibrum trajiciantur, tum adde

Sacchari albi, vncias duas;
Coquantur lenissimo igne ad Consistentiam Roob.

TAR-

TA.

TARTARI CREMOR, Vid. CREMOR TARTARI.

TARTARI CRYSTALLI, Vid. CRYSTALLI TARTARI.

TARTARUS EMETICUS.

R. Crystallorum Tartari supra edo-
ctorum,

Vitri Antimonii (cuius parandi
modum supra quoque vide) in
pollinem subtilem terendo re-
dacti, aut Croci Metallorum,
ana vnciam vnam.

Infunde in vnciis viginti quatuor aqua-
pluiae, aut fluminalis limpidissimæ; stent
in digestione caloris lenissimi per biduum;
postea ebulliant, ut Tartarus soluatur, tum
feruentem adhuc, ocyus per chartam em-
poreticam trajice, ac lenissime euapora ad
siccitatem.

TARTARI OLEUM PER DE-
LIQUUM.

Minus hoc apte sic dictum, cum liquor
potius sit, quam oleum; sit e sale Tartari
in furno figulino igne acerrimo ad albedi-
nem calcinato, aut in tabula vitrea in cella
frigidiori & humidiori, aut in manica Hip-
pocratis lana, aere humido, a pluia tam-
en & sole remoto, solutioni exponendo,
& destillantem inde liquorem vitro commo-
do, super imposito ipsi infundibulo cum
charta emporetica excipiendo, sique lim-
pidissimum seruando.

Vel, Sal Tartari diluatur sufficienti por-
tione aquæ.

TA.

TARTARI SAL.

R. Capitis mortui Tartari, a destilla-
tione spiritus & olei omnimo-
da, in retorta residui, quan-
tum vis,

Ac olla figulinæ non vitreatæ inditum &
in furno reuerberii aut figulino aut laterum
etiam, ad albedinem calcinatum, aqua ca-
lida solue, filtra & in vase vitro aut ter-
reo, ad lapideam duritiem ac soliditatem
excocto, igne cinerum aut arenæ exhalan-
do, coagula.

TARTARUS TARTARI-
STATUS.

R. Olei Tartari per deliquium, aut saltem
Salis Tartari optime depurati, atque
in sufficienti quantitate aqua limpidissimæ
pluiae aut destillata, soluti, quan-
tum placet, huic successive insperge
Tartari modo supra dicto depurati ad
punctum usque saturationis. Cessante
ebullitione aqua superflua lente exha-
let ad siccitatem, & in puluerem abi-
bit, in quois liquore facile solubilem,
hinc vase bene clauso seruandum.

TARTARI TERRA FOLIATA,
Vid. supra ARCANUM TAR-
TARI.

TARTARUS VITRIOLATUS.

R. Salis Tartari depurati, libram
vnam,
Olei Vitrioli anglicani, quantum
fatis,

M 3

Sali

TH.

Sali Tartari in satis larga quantitate
Aqua pluialis purissimæ soluto, successiue
& guttatum tantum addatur, quantum ad
perfectam saturationem necesse sit, dein le-
ge artis euaporetur & crystallifetur.

Cui lubet, methodo Tackeniana, e Vi-
triolo Martis & cineribus clauellatis parare
potest.

THERIACA ANDROMACHI.

R. Gummi Sagapeni,
Galbani,
Styracis Calamithæ, ana
vncias duas,
Myrræ rubræ electæ,
Castorei russici,
Croci orientalis, ana vnciam
vniam,
Pulueris Radicis Angelicæ, vncias
decem,
Valerianæ, vncias
septem,
Squillæ,
Zedoariae, ana
vncias tres,
Cardamomi minoris,
Cinnamomi acuti,
Caryophyllorum, ana vn-
ciam vnam & semis,
Opii thebaici, aqua simplici opti-
me depurati & iterum inspissati,
vnciam vnam cum semis,
Mellis depuratissimi, libras duo-
decim.

Opium in Vini hispanici quantitate suf-
ficiente solutum addatur melli, & postea

cæteræ species bene mixtæ & puluerisatæ
sub continua agitatione successiue admis-
ceantur.

Nota. Quævis Vicia hujus Theriacæ
continet circiter Opii depurati grana
quatuor.

THERIACA DIATESSERON, seu
PRO PECORIBUS.

R. Radicum Aristolochiæ rotundæ,
Gentianæ,
Baccarum Lauri,
Myrræ electæ, ana vncias duas,
Mellis despuniati, libras duas.

Fiat lege artis Electuarium.

TINCTURA ANTIMONII
ACRIS, seu REGULINA.

R. Reguli Antimonii martialis, vn-
cias quatuor,
Nitri depurati, vncias viginti
quatuor.

Primo Regulus comminutus immittatur
crucibulo calenti, sic carenti Regulo ad-
misceatur successiue quantitas præscripta
Nitri depurati, & igne aucto aquæ initia
fluant, & in fluore tali seruetur per horæ
spatium & ulterius. Postea effundatur in
conum fusorum calefactum, & massæ suc-
cini instar flavae cucurbitæ vitrez immisæ
calenti adhuc spiritus Vini rectificatissimi
quantitas sufficiens affundatur & digestione
extrahatur Tinctura saturate rubra; hæc
Tinctura decantetur & iterum spiritus Vini
rectificatissimus affundatur, idque reitere-
tur,

TI.

tur, quam diu Spiritus satis rubore tingatur: & pro tota hac quantitate sufficient librae quatuor Spiritus vini rectificatissimi. Hasce tinturas omnes misce & ad usum serua.

TINCTURA ANTIMONII TAR-
TARISATA.

R. Antimonii optimi, libram semis,
Salis Tartari, libram unam.

Puluerisata misce exaeque, & igne satis valido liqua, liquata in fluore per horam forte serua, sed prospice, ne crucibulum perforetur & jacturam patiaris. Tum effusam in mortarium ferreum calefactum massam adhuc calentem in puluerem reduc subtilem, hunc illico, antequam ex aere humiditatem attrahat, vitro commodo inde, ac spiritus Vini rectificatissimi, quantum sufficit, affunde, ut quatuor aut quinque digitos superemineat, (vel, ut distincte pondus determinemus, libras tres Spiritus vini,) digere, donec optime tingatur. Posfunt etiam Scoriae a Regulo martiali vel simplici cum Tartaro & Nitro facta, adhuc candentes contundi, spiritui Vini rectificatissimo immergi & digeri ad sufficientem Tincturæ extractionem. Spiritus Vini ad hoc negotium debet esse optime dephlegmatus, minime supra sal Tartari, vel cineres clauellatos abstractus.

TINCTURA BELLIDIS
FLORUM.

R. Florum Bellidis hortensis, colo-
re rubro, a capitulis suis de-
cerptorum & fiscatorum, un-
ciam unam,

TI.

Spiritus Vitrioli, drachmas duas,
Aqua communis destillatae, uncias
octo.

Digerantur per Nycthemeron. Expri-
primantur & filtrantur.

Simili modo parantur

TINCTURA FLORUM AQUILEGIAE,
PAPAUERIS ERRATICI,
ROSARUM &c.

TINCTURA BENZOES.

R. Gummi Benzoës selecti, quan-
tum vis,

Solue in sufficiente quantitate spiritus vini rectificatissimi & extrahe essentiam colore rubicundo commendabilem, qua emporea-
tica a fructibus separata, tincturæ nomine venit.

Nota. Si huic aquam affuderis Rosarum, laetescit, & precipitatur Magisterium Benzoës, florum ejus vices, maiori tum saporis, fortassis & virtutis gratia supplens.

TINCTURA CATECHU.

E pulvere subtilissimo Succi compositi, terra nempe sic dictæ Iaponicae s. Catechu cum sufficiente quantitate Spiritus Vini pa-
rari solet.

Nota. Pro Medici intentione etiam cum menstruo variari, & loco spiritus vini spiritus Nitri dulcis aut spiritus Salis ammoniaci vinofusus adhiberi potest.

TINC-

T.I.

TINCTURA LACCÆ.

R. Gummi Laccæ selesti & in puluerem redacti, vnciam vnam,
Aluminis crudi, vnciam semis,

Misce, & affunde

Aquæ pluiae destillatae, vncias sex.

Bulliendo parum solue gummi & alumen, quibus refrigeratis adde

Aquæ Saluiæ,
Rosarum, ana vncias duas,
ac per bibulam colata serua.

TINCTURA MARTIS HEL-
LEBORATA.

R. Limaturae Martis,
Pulueris Tartari, ana libram se-
mis,

Affunde

Aquæ pluiae, libras viginti octo,
In olla noua coque, semper agitando ru-
dicula, donec exhalando in malagma quasi
reducatur, cui adde

Fibrarum Hellebori nigri, vnciam
vnam,

Radicum Pimpinellæ maioris,
drachmas sex,

Aquæ pluiae, libras tredecim.

Coquantur denuo sepius agitando, donec
ad remanentiam librarum octo exhalarint,
tunc filtra, & melioris conseruationis ergo,

T.I.

spiritus Cochleariaæ quantitatem sufficientem
adde, sicque serua.

TINCTURA MARTIS cum VI-
NO MALUATICO.

R. Vitrioli Martis, e limatura modo
infra docendo, oleo aut spiri-
tu Vitrioli parati,

Crystallorum Tartari, ana libram
semis,

Coquantur in aqua simplici, quantum
sufficit, ac agitando continue, sensim exha-
lent ad mellis spissioris consistentiam, cui
affundantur vini Maluatici, aut Canariensis,
libræ sex. Misce optime, ac digere tridu-
um, tandem per chartam emporeticam
destilla.

Nota. Qui loco Tartari aut Crystallo-
rum eius, terram illius foliatam, sal
essentiali vini Zwelffero p. 1. c. 3.
p. 337. dictam acceperit, ac cum Vi-
triolo Martis prædicto, exada in
mortario vitreo aut lapideo tritura
combinauerit, atque in patella vitrea
sparsum distributa aprico aliquandiu
exposuerit, donec efflorescant, ac ru-
bicundo colore imbuantur, tum spi-
ritum Vini cinnamomifatum aut
aquam salem Cinnamomi vinosam
spirituosam affuderit, Tincturam ele-
gantem Martis, pro vera a Zwelffero
agnitam, nanciscetur, quæ optimo
ture audiet

TINCTURA MARTIS
ZWELFFERI.

TINC-

TI.

TINCTURA MARTIS CUM
SUCCO POMORUM BORS-
DORFFIANORUM.

R. Extracti Martis cum Succo Po-
morum Borsdorffianorum, vna-
ciam vnam,

Aqua Cinnamomi vinosa, vna-
cias sex.

Misce, servetur ad usum.

Nota. *Hic loci necessario inferendam
credimus præparationem*

EXTRACTI MARTIS CUM SUCCO
POMORUM BORSDORFFIA-
NORUM,

ante omitti

R. Limatur Martis purissimæ, libram
vnam,
Succi Pomorum Borsdorffianorum re-
cens expressi & depurati, libras
quatuor,

*Stent in digestione loco calido, per
oclo dies. Postea coquantur, spatula
perpetuo agitata, leni igne, ad
dimidiæ partis consumtionem; clau-
rum a spissso colando separetur; & ad
Extracti consistentiam evaporetur.*

TINCTURA MARTIS TARTA-
RISATA D. LUDOVICI.

R. Vitrioli Martis,
Tartari depurati, ana libram se-
mis,

*Coquantur forti bulliente feroore, cum
aqua simplicis, libris sex, agitando continue,*

TI.

donec ad consistentiam mellis exhalet, huic
magmati affunde spiritus vini gallici, libras
sex, filtra, & serva.

TINCTURA RHABARBARI.

R. Pulueris Rhabarbari optimi, vna-

ciam vnam,

Salis Tartari, drachmas tres,
Aqua Cichorei,

Cinnamomi fine vino, ana
vncias sex.

Infusa stent loco tepido horas viginti qua-
tuor, postea per bibulam colentur.

Nota. *Cum Essentia eiusdem supra de-
scripta coincidit. Tinctura Rhabar-
bari etiam absque aqua & sale Tartari,
cum spiritu vini rectificato, vel, si pla-
cat, rectificatissimo parari potest.*

TINCTURA TARTARI.

R. Salis Tartari caustici bene calcinati,
quantum vis, puluerisato adhuc calido
in mortario calefacto ac phiola indito,
affunde spiritus vini rectificatissimi ad
eminentiam trium vel quatuor digitorum,
digerendo & aliquando mouendo
tincturam extrahe, quam a residuo bi-
bula separatam in vase bene clauso
serua.

TRAGEA ALBA.

R. Zingiberis albi,
Cinnamomi acuti, ana vnciam
vnam,
Nucum moschatarum,

N Car-

TR.

Cardamomi minoris,
Caryophillorum, ana vnciam se-
mis,
Galangæ, drachmas duas,
Seminis Coriandri, scrupulum
vnum,
Sacchari albissimi, libras tres,
Misce, fiat omnium puluis pro Tragea.

TROCHISCI ALHANDAL.

R. Pulpæ Colocynthidis, a femini-
bus liberatae, minutimque con-
cifæ, vncias decem,
Macerentur Mucilaginis e
Gummi Arabici,
Bdellii,
Tragacanthi, ana drach-
mis duabus.

Aqua rosacea extractæ modico, vt tan-
tum madescant, tum siccentur exæctæ &
puluerisentur, atque e puluere cum residuo
eiusdem mucilaginis impastato, vt artis est,
Trochisci efformentur.

TROCHISCI BECHICI
ALBI.

R. Amyli, vncias tres,
Pulueris Radicis Ireos florentinæ,
Ari,
Pimpinellæ albæ,
ana drachmas
quinq;e,
Squillæ, drachmas
duas,
Sacchari albissimi, libras duas.

TR.

Cum sufficiente quantitate Gummi Tra-
gacanthi Aqua Rosatum soluti fiant artis le-
ge Trochisci.

Nota. Cui libet, Ambræ gryseæ, scru-
pulum vnum, & Moschi alexandrini
scrupulum semis addat; & sic ena-
scuntur Trochisci bechici albi, cum
Moscho & Ambra.

TROCHISCI BECHICI MAJO-
RES FRIDERICI WILHELMI
ELECTORIS.

R. Succi Liquiritiæ inspissati, quan-
tum vis,

Solute in quantitate sufficiente aquæ Fæni-
culi; Solutum per manicam Hippocratis co-
la; Colatum ad mellis consistentiam rufus
inspissa. Tandem admixto Saccharo candi-
ant saltem albo Canariensi, fiat artis lege
massa, e qua formentur iusta magnitudinis
Trochisci.

TROCHISCI BECHICI
NIGRI.

R. Pulueris Radicis Iridis florentinæ,
vncias tres,
Liquiritiæ,
Seminis Anisi,
Fæniculi, ana vn-
cias quinque,
Storacis Calamitæ depuratae,
drachmas duas,
Succi Liquiritiæ, in aqua Hyssopi
dissoluti, vncias ix,
Sacchari Melitæi purissimi, libras
quatuor,
Muci-

TU.

Mucilaginis Tragacanthi aqua Rosarum soluti, quantum sufficit.
Misce fiant ex arte Trochisci.

TURPETHUM MINERALE.

R. Mercurii optime purgati, libram semis,
Olei Vitrioli puri & rectificati, libram vnam,

In retorta vitrea loricata, oleum Mercurio affunde, & per biduum in arena, orificio obturato, digere, postea igne auctiori oleum Vitrioli auoca, sub finem ignem augendo, ut retorta candeat; sic præcipabitur Mercurius in massam albam, quam fracta caute retorta, ne quid vitri aut alias peregrini accedat, exime, & super marmore tere, ac aqua pluia destillata calida in vase ampli orificii acrimoniam omnem repetita sèpius affusione & effusione ablue, puluerem quavis vice strenue agitando, & postquam per horas quatuor sibi relictus subsederit, decantando, idque eo vsque continuando, donec nulla amplius in aqua decantata deprehendatur acrimonia, sed puluis subfudens flauissimum colorem acquifuerit.

VITRIOLUM MARTIS.

R. Aquae pluialis purissimae, vncias decem,
Olei Vitrioli concentrati, vnciam vnam,
Limatura Martis purissimae, vncias quatuor,

VI.

Stent in vase vitro per aliquot dies, sèpe agitando, deinde liquor clarus decantetur, & lege artis crystallisatio fiat.

Eodem modo paratur

VITRIOLUM VENERIS.

VITRIOLI TERRA DULCIS.

Est Caput mortuum, ab olei Vitrioli distillatione in retorta relictum, aqua edulcoratum.

VITRUM ANTIMONII, Vide ANTIMONII VITRUM.

R. Aeruginis, drachmas sex,
Mellis puri, vncias duas,
Aceti Vini acerimi, vnciam vnam.

Aerugo trita aceto diluatur, ac per setaceum colata, mellique permixta, igne ad vnguenti molliusculi, colore se purpureo commendantis, consistentiam coquatur.

VNGUENTUM ALBUM CAMPHORATUM.

R. Albuminum Ouorum probe conquassatorum, numero sex,
Camphorae, guttis aliquot olei rosarum dissolutae, drachmas duas,
Cerae albae, vncias tres,
Cerussae Venetae albissimae subtilissime tritae,
Olei rosacei, ana libram vnam,
Misce, lege artis, vt fiat Vnguentum.

VN.

VNGUENTUM ALBUM RE-
SOLUENS.

R. Olei Amygdalarum dulcium, quantum vis, huic exakte misce in mortario lapideo aut vitro spiritus salis ammoniaci cum calce viua parati, quantum sufficit, pro componendo linimento debita consistentia.

VNGUENTUM ALBUM
SIMPLEX.

R. Cerussae tritae,
Cerae albae, ana libras duas,
Seui hircini,
Olei oliuarum,
rosati, ana libram vnam,

Cera oleis colliquata Sebum hircinum, tandemque Cerussiam exakte contritam misce, & secundum artem vnguentum para; cui, si res exigit, ex tempore oui albumen conquaessatum justa proportione addi ac commisceri potest, alias vnguentum minus durabile fit.

VNGUENTUM DE ALTHEA.

R. Radicum Altheae recentium, minutum concifarum & cufarum, libram vnam, Seminis Fœnu Graeci, Lini, ana vncias sex, Pulueris radicum Curcumae, vniciam semis, aut quantum sufficit, pro colore flavo grato, Butyri Majalis recentis non saliti, libras decem.

VN.

Coquantur leni igne ad consumtionem humiditatis & consistentiam decentem, potesta per linteum colentur, & fiat lege artis Vnguentum.

VNGUENTUM AD AMBUSTA.

R. Butyri recentis non saliti, liquetur in vale terreo vitreato, moderato feroere, donec portio caseosa, exhalante humiditate, subsederit. Clarum superfans decantetur in aquam frigidam suppositam. Eloto ponderato addatur medium pondus ceræ flauæ, liqueatur de nouo; iterum in aquam frigidam effusum seruetur usui.

Quia vero sensim rancidum odorem contrahit, potest subinde in parua quantitate renouari, aut in ipso casu recens parari, quia vix horæ spatio indiget.

VNGUENTUM DE ARTHA-
NITA.

R. Succi Radicum Cyclaminis seu Arthanitae, libram vnam, Cucumeris vncias quatuor, Pulpae Colocynthidis, Fellis Tauri ad mellis spissitudinem in balneo euaporati, ana vniciam vnam, Butyri recentis non saliti, Olei oliuarum, ana vncias tres, Aloes hepaticae, vniciam vnam, Euphorbii, vniciam semis, Misce fiat lege artis Vnguentum.

VN-

VN.

VNGUENTUM BASILICUM.

R. Cerae flauæ, vncias duas,
Croci, scrupulos duos,
Masticæ,
Myrræ,
Picis naualis,
Seui vaccini,
Thuris, ana drachmas duas,
Resinae Pini,
Therebinthinae clarae, ana vnciam
semis,
Olei communis, vncias tres.

Thus, Myrrha, Masticæ & Crocus puluerifata subtilissime, cæteris ex arte liquatis, paulatim inspergantur, ac exacte miscéantur, vt fiat Vnguentum.

VNGUENTUM CARMINA-
TIUUM.

R. Baccarum Lauri, vnciam semis,
Florum recentium Chamomillæ,
vnciam vnam,
Summitatum recentium Abrotani,
Menthæ
crispæ,
Tanaceti,
Seminis Cumini, ana semi vnciam.
Contusa & conquassata omnia infundan-
tur in
Olei Anethi,
Adipis porcini recentis, ana libra
vna,
Macerentur per quatuordecim dies, dein

leniter ebulliant ad humiditatis consumptio-
nem. Colaturæ exprelit adde.

Cerae Citrinae, unciam vnam se-
mis,
Styracis liquidæ, drachmas sex,
Olei stillatitii Anisi,
Carui,
Menthæ, ana drach-
mam vnam,
Misce fiat lege artis Vnguentum.

VNGUENTUM DIGES-
TIUUM.

R. Terebinthinae Venetae, vncias
duodecim,
Mellis Rosarum, vncias quatuor,
Olei Hyperici, vncias tres,
Pulueris Aloës, vnciam vnam,
Vitelli Ouorum, numero duo.
Misce optime.

VNGUENTUM EXSIC-
CANS.

R. Olei Oliuarum, libras tres,
Cerae flauæ, libram vnam,
Boli Armenæ,
Lapidis Calaminaris, ana libram
semis,
Lythargirii,
Ceruſlæ, ana vncias sex,
Camphoræ, drachmas sex,

Misce fiat Vnguentum.

N 3

VN-

VN.

VNGUENTUM FUSCUM FE-
LICIS WURZ.

R. Colcotharis, seu Terra Vitrioli dulcis, vncias duas,
 Florum Aeris, drachmas decem,
 Aceti Vini, in quo Folia Plantaginis ac Chelidonii maioris recentium, sufficienter per aliquot dies macerata, ac postea expressa fuerint, vncias tres,
 Phlegmatis Vitrioli, vncias duas,
 Mellis despumati, vncias sex.
 Inspissentur leni igne, continue agitando, ad mellis consistentiam.

VNGUENTUM DE LINARIA.

R. Foliorum & Florum recentium Linariae, vnciam vnam,
 Macerentur contusa & conquassata in liquefacti
 Adipis Porcini recentis, aut Butyri Majalis recentis non saliti, vncias sex,

Coquantur macerata ad humiditatis consumtionem & exprimantur. Expressis recentia adde folia cum floribus, macera, coque & exprime, hisce demum expressis adde:

Olei e Vitellis Ovorum, vnciam semis,
 Olei Seminis Hyosciami expressi, drachmas duas,
 Succi Semperuii, drachmas tres,
 Misce exacte pro Vnguento.

VN.

• Nota. Quanto plus foliorum & florum adhibetur, ad minimum duplum prescripti, eo melius erit.

VNGUENTUM DE LITHAR-
GYRIO, seu NUTRITUM.

R. Lithargyrii tenuissime triti, libram semis,
 Aceti Vini acris, libram vnam,
 Olei Rosacei, libras duas.

Continua tritura & agitatione nutritur Lithargyrium in mortario, si vis, & ad manus est, plumbeo, per vices affuso alternatim pauxillo, modo olei, modo aceti, donec acetum dispareat omne, ac vnguentum debitam spissitudinem & candorem acquirat.

VNGUENTUM MERCURIALE,
seu NEAPOLITANUM.

R. Mercurii viui depuratissimi, libram semis,
 Axungiae porcinae recentis, vncias nouem,
 Seui hircini recentis, vncias tres.

Agitentur simul in mortario, donec globuli mercuriales euaneant.

Cui placet, Terebinthinæ Venetæ, vnciam vnam vel alteram addere jubeat.

VNGUENTUM DE MINIO.

R. Minii, vncias tres,
 Lithargyrii, vncias duas,
 Cerussæ, vnciam vnam semis,
 Tu-

VN.

Tutiae praeparatae, drachmas
tres,
Cerae citrinae, vncias duas,
Olei rosarum, libram vnam semis.

Ceræ Oleo lento igne colliquatae, reliqua
in puluerem subtilissimum redacta in morta-
tio, si vis, plumbeo, exactissime com-
misce.

Nota. Cui volupe, Camphoræ in oleo
dissolutæ drachmas tres addere pote-
rit, sive CAMPHORATUM
audiet.

VNGUENTUM NERUINUM.

R. Baccarum Lauri puluerisatarum,
vnciam vnam & semis,
Radicis Pyrethri, drachmas tres,
Masticis, vnciam vnam,
Terebinthinae, drachmas sex,
Axungiae Porci, vncias tres,
Olei destillati Succini, drachmas
duas,

Misce fiat Vnguentum.

VNGUENTUM NIHILI.

R. Nihili albi subtilissime praeparati,
vnciam vnam,
Tutiae praeparatae, vnciam semis,
Camphorae, drachmam semis,
Axungiae porci recentis, libram
semis,
Olei de Bergam, guttas duodecim.
Misce fiat Vnguentum.

VNGUENTUM NUTRITUM. Vid
VNGUENTUM DE LITHAR-
GYRIO.

VN.

VNGUENTUM OPHTHAL-
MICUM.

R. Mercurii præcipitati rubri, drach-
mas duas cum semisse,
Tutiae praeparatae, & subtilissime
puluerisatae, drachmam vnam,
Camphoræ, grana quindecim,
Olei ouorum, drachmam semis,
Butyri Majalis recentissimi sine fa-
le, vncias tres,
Misce fiat Vnguentum.

VNGUENTUM PEDICU-
LORUM.

R. Pulueris seminis Sabadilleos, vn-
ciam vnam,
Axungiae porci recentis, vncias
quatuor,
Olei Foeniculi, drachmam semis,
Misce fiat Vnguentum.

VNGUENTUM POPULEUM.

R. Gemmarum Populi arboris recen-
tium contusarum, libram vnam,
Foliorum Solani contusorum,
Sedi maioris contuso-
rum,
Hyosciami, ana vncias
duas,
Pinguedinis porci recentis, libras
duas,
Coque leni igne ad humiditatis exhala-
tionem. Colentur, exprimantur & fiat
Vnguentum.

VN-

VN.

VNGUENTUM seu potius LINIMENTUM RESOLUENS IN GLANDULARUM OBSTRUCTIONE ET INDURATIONE.

R. Olei Cornu Cerui, vnciam vnam,
Galbani essentialis,
Spiritus Salis ammoniaci volatilis,
ana drachmas duas,
Camphorae, scrupulum vnum,
Pulueris Gummi Galbani, vnciam
semis,
Mixta soluantur omnia, vt fiat Linimentum.

VNGUENTUM ROSATUM.

R. Rosarum albarum recentium a caliculis & flaminibus mundatarum,
ac modice in mortario marmoreo conquaflatarum, libras duas,
Adipis porcini recentis, candidi,
aqua simplici aliquoties loti,
libram vnam,
Miscentur probe in vase fierili optime vitreato, & insolentur aliquot diebus, vase occluso, postea igne moderato coquantur ad humiditatis consumtionem & colentur.

VUGUENTUM SATURNI SAPONATUM GOULARDI.

R. Saponis vulgaris, vncias octo,
Soluantur leni igne in
Aqua fontanæ, mensuris duabus,
Sub perpetua agitatione, dein addantur
Extracti Saturni, vnciac duae,
Camphorae, drachma vna,
Misce fiat Vnguentum.

VN.

VNGUENTUM CONTRA SCABIEM.

R. Axungiae porcinae recentis, vncias octo,
Baccarum Lauri puluerisatarum,
vnciam vnam,
Therebinthinae venetae, vnciam
semis,
Sulphuris citrini, vncias duas,
Mercurii praecipitati rubri, vnciam vnam,
Misce fiat lege artis Vnguentum.

VNGUENTUM STOMACHICUM

R. Summitatum Absynthii,
Herbae Menthae crispa,
Florum Spicae, ana vnciam vnam,
Radicis Calami aromatici, vnciam
semis,
Caryophillorum, drachmas duas,
Baccarum Lauri, drachmas tres,
In puluerem redactis redigendis, ceteris probe conquaflatis, affunde
Vini rubri gallici,
Olei Absynthii,
Rosarum, ana vncias quinque,
Coquantur leni igne ad consumtionem
vini. In colatura expressa, liquefac
Cerac citrinae, quantum satis,
adde
Olei Menthae distillati, drachmam
vnam,
Misce fiat Vnguentum.

VNGUENTUM CONTRA VERMES. Vide VNGUENTUM DE ARTHANITA.

DESIGNATIO

MEDICAMENTORUM

tam simplicium quam praeparatorum, quae in Officinis magnarum urbium semper, non solum reperiri, sed etiam genuina, bona & requisitis facultatibus praedita exhiberi debent.

AC.

ACE T A.

Acetum Concentratum, +
Destillatum,
Lithargyrii,
Rosarum,
Rubi idei,
Rutæ, +
Sambuci florum,
Squilliticum,
Vini.

Aerugo.
Aes vstum.
Aethiops antimonialis,
martialis,
mineralis,
faccharatus. +

Agaricus.
Aloë depurata,
hepatica,
succotrina.
Alumen crudum,
vstum.
Ambra grysea. +

AM.

Amygdalæ amaræ,
dulces.
Amylum.
Antimonium crudum,
diaphoreticum.
Anthophylli. +

AQUÆ SIMPLICES.

Aqua Acacia florum, +
Calcis vivæ,
Cardui benedicti, +
Ceraforum nigrorum,
Chamomillæ,
Cinnamomi sine vino,
Citri e corticibus recentibus, +
Cochleariæ, +
Feniculi,
Hyssopi, +
Lauendulæ,
Liliorum alborum,
Maioranæ,
Melissæ,

O

Aqua

AQ.

Aqua Menthæ,
Piperitidis.
Naphæ, seu Florum Auran-
tiorum.
Persici foliorum, +
Petroselini,
Pulegii,
Rosarum,
Rutæ, +
Salviæ,
Sambuci florum,
Tiliae florum, +
Veronicae, +

Aqua Sclopetaria seu *Eau d'Arque-*
busade,

Sclopetaria Thedii,
Styptica externa,
Theriacalis,
Vegeto-mineralis,
Veronicae cum Vino,
Vitæ stomachica externa,

Arcanum duplicatum.
Argentum foliatum.
Arsenicum album.
Auripigmentum.
Aurum foliatum,
fulminans.

AQUÆ VINOSÆ ET COM-
POSITÆ.

Aqua Apoplectica,
Aurantiorum corticum cum
Vino,
Benedicta Rulandi, +
Cephalica Caroli Quinti,
Cinnamomi cum Vino,
Citri corticum cum Vino, +
Cœrulea,
Embryonum,
Fortis,
Liliorum conquallium cum Vino,
Masticina,
Melissæ cum Vino,
Menthæ cum Vino,
Phagadaenica,
Raphani composita,
Regia,

Axungia Canis,
Castorei,
Porci,
Viperarum,
Vrsi. +

BACCÆ.

Baccæ Alkekengi, +
Juniperi,
Lauri.
Baculi Liquiritiæ albi & citrini.

BALSAMI.

Balsamus Arcæi,
Bal-

AX.

AX.

DESIGNATIO MEDICAMENTORUM.

107

BA.

Balsamus Commendatoris,
 Copayvæ,
 Locatelli, +
 Mastichinus, +
 Nucis Moschatæ,
 Ophtalmicus ruber,
 compositus,
 Peruvianus niger,
 Sulphuris anisatus,
 terebinthinatus,
 Vitæ,
 externus,
 Vulnerarius Stahlii.

 Bitumen judaicum. +
 Bolus Armena.
 Borax Veneta.
 Butyrum Antimonii,
 Cacao,
 Majoranæ,

 Cacao.
 Calomelas.
 Camphora.
 Candelæ fumales.
 Cantharides.
 Caput mortuum Vitrioli. +
 Cardamomum minus.
 Caricæ seu Ficus.
 Caryophylli aromatici.
 Cassia Caryophyllata,
 Fistularis.
 Ligneæ.
 Castoreum.
 Catechu, seu Terra Catechu.

CE.

Cera alba,
 arborea,
 citrina,
 viridis.
 Ceratum de Cumino, +
 ad Labia,
 Saturni.
 Cereoli exploratorii,
 Falckii,
 mitigantes.
 Cerussa alba,
 citrina.
 Chocolada. +
 Cineres clauellati.
 Cinnabaris Antimonii,
 factitia.
 Cinnabaris natuua.
 Cinnamomum.
 Coccionella.
 Coffea arabica. +
 Colocynththis.
 Colophonia.

CONDITA.

Conditum Calami aromatici, +
 Carnis Citri, +
 Cerasorum acidorum, +
 Cichorei radicum,
 Corticum Aurantiorum,
 Citri,
 Cydoniorum, +
 Helenii radicum, +
 Nucum juglandium,

O 2

Con-

CO.

Conditum Ribium, +
Zinziberis.

Nota. Cum facile in corruptionem ab-
eant Condita, non in magna quantitate
conficienda sunt.

CONFECTA.

Confectum saccharatum Anisi, +
Calami aro-
matici,
Cubebarum, +
Fœniculi,
Seminis Cy-
næ.

CONSERVÆ.

Conserua Cochlearia; +
Rosarum.

Corallia alba, +
rubra. +

Corallina.
Cornu Cerui raspatum,
vftum.
Corpus pro Balsamis Sulphuris ex
tempore parandis.

CORTICES.

Cortices Aurantiorum Curassauiens.
Betulae, +
Cascarillæ,

CO.

Cortices Chinæ Chinæ, +
Citri,
Frangulae, +
Fraxini, +
Granatorum,
Ligni Guajaci,
Quassiae,
Mezeræ radicis,
Salicis fragilis, +
pentandra, +
Simarubæ,
Tamarisci, +
Vlmi interiores,
Winterani.

Cremor Tartari.

Creta Norwegica.

Crocus Austriacus,
Martis adstringens,
aperitivus Stahlii,
Metallorum.

Crystalli Tartari.

Cubebæ.

Dactyli.

Diagrydium sulphuratum.

ELECTUARIA.

Electuarium Diacatholicon, +
Diascordium Fracastorii,
HieræPicræ compositum, +
fimplex, +
Lenitiuum,

Ele-

EL.

Electuarium contra Morsum canis rabi,
Stomachicum. +

ELIXIRIA.

Elixir Acidum Halleri,
Antiscorbuticum amarum,
temperatum.
Pectorale,
temperatum.
Proprietatis cum Khabarbaro,
sine Acido,
Paracelsi. +
Purgans.
Roborans.
Viscerale.
Vitrioli Mynfichti. +
Vterinum Crollii. +

EM.

Emplastrum Diaphoreticum Mynfichti,
Diapompholygos.
Gryseum, +
ad Hernias, +
de Meliloto,
Minio,
Miraculosum,
Nigrum sulphuratum
Bechholzii,
Oxycroceum,
de Ranis cum Mercurio,
Resolvens,
de Spermate Ceti,
Ranarum,
Stomachicum,
de Tacamahaca,
contra Vermes, +
Vesicatorium,
perpetuum,
temperatum.

EMPLASTRA.

Emplastrum Adhæsiuum,
Album coctum,
de Ammoniaco,
de Baccis Lauri, +
de Betonica. +
Cephalicum,
de Cicuta,
Citrinum,
Defensiuum,
Diachylon cum Gummi
simplex,
Diapalmæ, +

ESSENTIAE SIMPLICES
VSITATORES.

Effentia Absynthii simplex,
Aloëtica,
Asae fœtidae,
Balsami peruviani,
Castorei,
Centaurii minoris, +
Corticum Aurantiorum,
Cascarillæ,
Chinae,
Effen-

E.S.

Essentia Corticum Cinnamomi,
Citri,
Croci,
Fuliginis, +
Gentianae rubrae,
Ligni Guaiaci,
Masticis, +
Millefolii, +
Myrrhae,
Pimpinellae radicum alba-
rum,
Pini,
Scordii, +
Sucini balsamica,
fine Sale, +
Trifolii fibrini,
Zedoariae.

ESSENTIAE COMPOSITAE.

Essentia Absynthii composita,
Alexipharmacæ,
Amara,
Ambræ, +
Aromatica,
Carminatiua,
Jalappæ,
Lignorum, *Liquiriti: pagina 40.*
Stomachalis,
Valerianæ composita,
Vulneraria Stahlii, Vide Bal-
samum vulnerarium Stahlii. +

E.X.

EXTRACTA SIMPLICIA
CUM AQUA.

Extractum Absynthii,
Aloës aquosum,
Arnicae Plauenfis,
Cardui benedicti,
Cascarillæ aquosum,
Centaurii minoris,
Chamomillæ,
Chinae,
gummosum,
Cicutaæ,
Colocynthidis, +
Cochleariae,
Enulae,
Fumariae,
Graminis,
Hyosciamis,
Ligni Guaiaci,
Liliorum conuallium, +
Martis cum Aceto,
cum succo Pomorum
Borstorffiorum,
Millefolii,
Myrrhae aquosum,
Nucum juglandium,
Opii,
Quassiae,
Rhabarbari,
Salicis fragilis, +
Saturni,
Scordii, +
Tanaceti, +
Taraxaci,
Trifolii fibrini.

EX-

EX.

EXTRACTA SIMPLICIA CUM
SPIRITU VINI.

Extractum Agarici, +
 Angelicae,
 Cascarillae,
 Castorei, +
 Corticum Chinae,
 Croci, +
 Gentianae rubrae,
 Leuisticæ,
 Pimpinellæ albæ,
 Pini et strobilis,
 Valerianæ,
 Vincetoxicæ, +
 Zedoariae,

EXTRACTA COMPOSITA.

Extractum Anthelminticum, +
 Catholicon, +
 Hellebori nigri,
 Panchymagogum Crollii.
 Fel inspissatum bouis.

FLORES.

Flores Aeruginis,
 Acaciae nostræ, +
 Anthos s. Rorismarini,
 Aquilegiae, +
 Arnicae Plauenfis,
 Balaustiorum,
 Bellidis minoris, +

FL.

Flores Benzoës, +
 Borraginis, +
 Buglossi, +
 Calendulae, +
 Carthami, +
 Centaurii minoris,
 Chamacheli romani,
 vulgaris,
 Cheiri, +
 Genistæ, +
 Hyperici, +
 Lauendulæ,
 Liliorum alborum,
 conuallium,
 Maluac arboreæ, +
 vulgaris,
 Meliloti,
 Nymphaeæ luteæ, +
 Papaueris erratici,
 Poconiae,
 Primulæ Veris,
 Rosarum incarnatarum, +
 rubrarum oprimarum
 Salis ammoniaci martiales,
 Saluiae,
 Sambuci,
 Stœchados Arabicae, +
 citrinae,
 Sulphuris,
 Tanaceti, +
 Tiliae, +
 Tunicae,
 Verbasci,
 Violarum,
 Zinci.

FO-

F O.

FOLIA.

Folia Aurantiorum,
Betulae, +
Lauri,
Ligustris, +
Quercus, +
Sennae.

F U N G I.

Fungus Boleti ceruini, +
Chirurgorum, v. Agaricus, + Hepar Antimoñii.
Sambuci, +
Sorbi aucupariae, +

Gallae Turcicae.

Globuli martiales,
Grana Chermes, +
Paradisi. +

GUMMATA vulgo dicta.

Gummi Ammoniacum,
depuratum,
Anime,
Arabicum,
Afae fœtidæ,
Bdellii, +
Benzoës,
Elemi, +
Euphorbii, +
Galbani,
Guaiaci,
Guttae,

GU.

Gummi Hederae, +
Laccae, +
Masticis,
Myrrhae,
Olibani,
Opopanacis,
Sagapeni,
Sandaracæ, +
Styracis calamitæ,
Tacamahacæ,
Tragacanthi electi.

HERBAE.

Herba Abrotani, +
Absynthii pontici,
vulgaris cum Sum-
mitatibus,

Acetosæ,
Adianthi albi f. Rutae murariae, +
aurei f. Polytrichi, +
nigris f. Capilli Veneris, +

Agrimoniae, +
Alchimillæ, +
Altheæ,
Anagallidis flore phœnico, +
Anethi, +
Angelicae, +
Aristolochiae longæ,
Arnicae Plauenfis,
Artemisiae, +

Herba

DESIGNATIO MEDICAMENTORUM.

113

HE.

Herba Basiliconis,
 Beccabungae, +
 Belladonnae,
 Betonicae, +
 Borraginis, +
 Botryos,
 Brancae vrsinae, +
 Buglossi, +
 Cardui benedicti, +
 Centaurii minoris, +
 Cerefolii, +
 Chamaedryos, +
 Chamaepityos, +
 Cichorei, +
 Cicutae virosae,
 Cochleariae, +
 Conii, +
 Cynoglossi, +
 Dictamni cretici, +
 Endiviae, +
 Equiseti, +
 Erysimi, +
 Eupatorii cannabini, +
 Euphrasiae, +
 Farfarae s. Tussilaginis, +
 Fragariae, +
 Fumariae, +
 Hederae arboreae, +
 terrestris,
 Hepaticae nobilis,
 Hyosciami, +
 Hyperici, +
 Hyssopi, +
 Lauendulae,
 Leuisticci, +

HE.

Herba Linariae,
 Lysimachiae luteae, +
 purpureae s. Salicariae,
 Majoranae,
 Maluae,
 Mari veri, +
 Marrubii, +
 Matricariæ,
 Matrifluae, +
 Meliloti,
 Melissae,
 Menthae crispae,
 piperitidis,
 Mercurialis, +
 Millefolii cum Summitatibus,
 Nicotianæ, +
 Origani cretici, +
 vulgaris,
 Paralyseos, +
 Parietariae, +
 Petroselini,
 Plantaginis vulgaris, +
 Polygoni majoris, +
 Prunellae, +
 Ptarmicae,
 Pulegii,
 Pulmonariae arboreae, +
 maculosae, +
 Pyrolae, +
 Quinquefolii, +
 Rorismarini,
 Rutae hortensis,
 Sabinae, +

P

Her-

HE.

Herba Salviae majoris,
minoris,
Saniculae,
Saponariae, +
Saturejae,
Saxifragiae, +
Scabiose, +
Sclareae f. Hormini, +
Scordii,
Serpilli cum floribus,
Sideritidis, +
Solani nigri,
Tanaceti,
Taraxaci, +
Thée, +
Thymi vulgaris,
Trifolii aquatichi,
Verbasci,
Verbenae, +
Veronicae,
Vincae Pervincae, +
Virguae aureae, +
Vrticae, +
Vuac Vrsi.
Hirudines viui.
Ichthyocolla f. Colla piscium.
Indigo.
Julapium Rosarum.
Kermes minerale.
Lacca Florentina,
in globulis.
Lac Sulphuris.

LA.

L A P I D E S

Lapis Calaminaris,
Cancrorum,
Diuinus,
Haematitiae,
Infernalis alcalicus,
Jularis,
Medicamentosus,
Prunellae f. Nitrum tabulatum.

Laudanum Liquidum Sydenhami.

L I G N A.

Lignum Aloës, +
Brasiliense rubrum, +
Campechense, +
Juniperi, +
Quassiae cum cortice,
Rhodium,
Sanctum,
Santalum citrinum, +
rubrum, +
Sassafras.

Limatura Cupri,

Martis,

Stanni.

L I Q U O R E S.

Liquor Anodinus mineralis,
Cornu Cerui succinatus,

Li-

DESIGNATIO MEDICAMENTORUM.

115

L I.

Liquor Myrrae,
Probatorius, +
Salis Tartari per deliqu.
Terra foliatae Tartari
pro pau-
peribus.

Lichen f. Muscus Islandicus.
Lithargyrum.
Lumbrici terrestres exsiccati. +
Macis.
Magnesia alba, +
Salis amari. AERIO
Manna Calabrina depurata,
electa.

Mel Rosarum,
Virgineum,
Vulgare.

Mercurius currens f. viuus,
dulcis,
praeccipitatus albus,
ruber,
sublimatus corrosius.

Millepedes f. Afelli. +
Minium.
Mixtura simplex,
Tomico-neruina.

Morsuli Antimoniales f. restaurantes,
de Citro,
Imperatoris,
de Rhabarbaro,
ad Vermes.

Moschus Alexandrinus.
Muscus Islandicus, vid. Lichen Islan-
dicus.

M Y.

Myrtilli exsiccati, +
Myva Cydoniorum simplex. +
Naphta Nitri,
Vitrioli.
Nitrum antimoniatum, +
depuratum,
tabulatum. Vid. Lapis Pru-
nella. nellae.

Nuces moschatae,
Vomicae.
Nuclei Cerasorum, +
Malorum Persicorum. +
Oculi Cancrorum, v. Lap. Cancr. +
Populi arboris. +

OLEA COCTA SIMPLICIA.

Oleum Absynthii,
Anethi, +
Chamaemeli,
Hyperici,
Liliorum alborum,
Lumbricorum terrestrium,
Menthae,
Populeum,
Rosarum, +
Rutae, +
Verbasci florum.

OLEA DESTILLATA EM-
PYREUMATICA.

Oleum Animale Dippelii,
P 2 Oleum

O L.

Oleum Asphalti, +
Cerae,
Cornu cerui,
Fuliginis, +
Galbani,
Petrae ordinarium,
Philosophorum,
Rusci, +
Saponis,
Succini, +
Tartari foetidum, +
rectificatum, +

OLEA DESTILLATA ES-
SENTIALIA.

Oleum Absynthii, +
Anethi, +
Anisi,
Cajeput,
Carui, +
Caryophyllorum,
de Cedro,
Chamaemeli romani, +
vulgaris, +
Cinnamomi,
Corticum Citri, +
Fœniculi,
Juniperi e baccis, +
Lauendulae,
Ligni Rhodii,
Macis,
Majoranae, +

O L.

Oleum Melissae,
Menthæ,
Piperitidis,
Origani cretici, +
Rorismarini,
Rutæ,
Sassafras, +
Spicae, +
Tanaceti, +
Terebinthinae.

OLEA EXPRESSA.

Oleum Amygdalarum dulcium,
amararum,
Diapalmae, +
Hyosciami seminis, +
Laurinum,
Lini,
Nucis moschatae,
Nucum juglandium, +
Oliuarum,
Ouorum,
Papaueris seminis, +
Raparum seminis, +
Ricini.

OLEA ABUSIUE SIC
DICTA.

Oleum Myrrhæ vel Liquamen Myrrhæ, +
Tartari per deliquum vid. Li-
quor, +
Vitrioli.

Op-

OP.

Opium.
Opobalsamus.
Offa Sepiae.
Oxymel colchicum,
 simplex,
 squilliticum.
Oxyfaccharum simplex. +

Panis Cydoniorum. +
Passulæ majores,
 minores.
Pasta de Althea,
 Liquiritiae.
Pastilli prò fumo.

PILULEÆ.

Pilulæ Aethiopis mineralis,
Cacheoticæ martiales, +
de Cynoglosso,
Fœtidæ,
Hydropicæ Bontii, +
Mercuriales,
Pectorales,
Pestilentiales Ruffi, +
Polychrestæ balsamicæ,
Squilliticae,
Starckeyanae,
de Styrace, +
 Succino Cratonis.

Pineae. +
Piper album, +
Hispanicum s. Capsicum, +
longum. +

PI.

Piper nigrum.
Pistaciae. +
Pix nautilus. +
Plumbum vñstum.

PRÆPARATA.

Bolus Armena.
Chelæ Cancerorum. +
Cinnabaris Antimonii, +
 factitia. +
Corallia rubra, +
Cornu Alcis, +
 Cerui vñstum. +
Creta alba. +
Lapis Haematites.
Oculi s. Lapidès Cancrorum.
Succinum album.
Testac Concharum,
 Ouorum. +
Tutia Alexandrina.

Pulpa Cassiae,
 Tamarindorum.

PULUERES SIMPLICES.

Puluis Aloës,
 Antimonii,
Baccarum Lauri,
Cantharidum,
Cardamoni minoris, +
Caryophyllorum, +
Cerussæ,

P.U.

Puluis Cinnamomi,
Corallinae,
Corticum Cascarillæ,
Chinæ Chinæ,
Croci,
Cubebarum,
Foliorum Sennæ,
Gummi Arabici,
Guttae,
Masticis,
Myrrhae,
Olibani,
Tragacantheæ,
Lapidis Calaminaris.
Ligni Aloës,
Limaturae Martis,
Lithargyrii,
Lumbricorum terrestrium,
Lycopodii,
Macis,
Millepedum,
Nucum Moschatarum,
Vomicarum,
Opii,
Offium Sepiae.
Piperis albi,
nigri,
Radicis Ari,
Curcumae,
Galangae,
Jalappæ,
Ipecacuanhae,
Ireos Florentinae,
Rhabarbari,
tostæ,

PU.

Puluis Radicis Serpentariae virginia-
nae,
Squillæ,
Valerianaæ,
Zedoariae,
Rasurae C.C.,
Sanguinis Draconis,
Seminis Cinac,
Fenugraeci,
Lini,
Succi Liquiritiae,
Zinziberis.

PULUERES COMPOSITI IN-
TERNI ET EXTERNI.

Puluis Absorbens antimoniatus s. pro
Infantibus,
citratus,
nitratius,
Antarthriticus,
seu Species pro Cataplasmate,
Dentifricius,
Epilepticus,
pro Fumo,
Incidens,
Pectoralis,
Puerorum communis,
Resoluens,
compositus,
Squillæ compositus,
Sternutatorius,
Stomachicus,
Temperans albus,
ruber.

RA-

DESIGNATIO MEDICAMENTORUM.

119

R.A.

RADICES.

Radices Allii, +
 Altheae,
 Anchusae,
 Angelicae,
 Apii, +
 Ari,
Aristolochiae longae verae, +
 rotundae, +
 vulgaris, +
Arnicae Plauensis.
Asari,
Asparagi, +
 Bardanae,
 Bistortæ,
Bryoniae, +
Calami aromatici,
Caricis arenariae,
 seu Bulbi Cepae,
Carlinae,
Caryophyllatae,
Chinae,
Cichorei hortensis,
Colchici,
Columbae,
Consolidae majoris, +
Contrayervae,
Curcumae,
Cyclaminis, +
Cynoglossi,
Cyperi rotundi,
Dictamni albi, +
Dauci vulgaris, +
Ellebori albi,

R.A.

Radices Ellebori nigri,
 Filicis,
 Fœniculi,
Galangæ minoris,
Gentianæ rubræ,
Glycyrrhizæ,
Graminis,
Helenii,
Jalappæ,
Imperatoriæ f. Ostrutii,
Ipecacuanhæ,
Iridis Florentinæ,
Inostratis, +
Lapathi acuti,
Leuisticæ,
Liliorum alborum,
Malvae,
Mechoacannæ albæ, +
Meu, +
Nymphaeæ albæ & luteæ, +
Pareiræ brauæ,
Petasitidis, +
Petroselini, +
Pimpinellæ albæ,
 nigræ,
Pœoniae,
Polypodiij,
Ptarmicæ.
Rhabarbari,
Rhapontici, +
Rubiae tinctorum;
Rusci, +
Salep f. Salab,
Saponariae rubrac,
Sassaparillæ,

Ra-

DESIGNATIO MEDICAMENTORUM.

R.A.

Radices Scillae,
Scorzonerae,
Scrophulariae,
Serpentariae virginianae,
Sigilli Salomonis, +
Succifae, +
Taraxaci,
Tormentillae,
Valerianae maioris,
minoris,
Vincetoxici, +
Zedoariae,
Zinziberis albi.

Regulus Antimonii martialis,
medicinalis.
Resina Abietina vel Pini,
Jalappae,
praeparata,
Ligni Sancti vel Guaiaci,
Scammonii.

R. O. B.

Rob Ceraforum, +
Ebuli, +
Juniperinum,
Mororum cum saccharo,
Nucum, +
Prunorum, +
Sambucinum.

Rotulae Diaireos simplices, +
de Rhabarbaro. +
Sacchara varia,

S.A.

Saccharum Lactis,
penidium,
Saturni.

S A L I A.

Sal Absynthii,
citratum,
Acetosellae essentiale,
Ammoniacum,
depuratum,
Cardui benedicti, +
Centaurii minoris, +
Ebshamense,
Gemmae,
Marinum, +
Mirabile Glauberi,
Polychrestum Gallorum, +
Sedatiuum Hombergii,
Sedlizense,
de Seignette,
Sodae depuratum,
Tartari,
Vniuersale Herbarum, +
Volatile Cornu Cerui,
Oleosum,
Salis ammoniaci,
Succini depuratum.

Sanguis Draconis.

Sapo Alikantinus,
Starkeyanus,
Venetus.

Sebum Ceruinum,
Hircinum.

SE-

DESIGNATIO MEDICAMENTORUM.

121

S E.

S E M I N A.

Semen Ammeos,
Amomi,
Anethi,
Anisi stellati,
vulgaris,
Apii,
Cannabis,
Cardui benedicti, +
Mariae, +
Carthami, +
Carui,
Cinæ,
Citrulli, +
Coriandri,
Cucumeris, +
Cucurbitæ, +
Cumini,
Cydoniorum,
Dauci Cretici, +
vulgaris, +
Erucae, +
Fabarum,
Fœniculi,
Fœnugræci,
Hordei,
Hyoscyami,
Lactucæ, +
Leuisticæ, +
Lini,
Lycopodii,
Maluæ, +
Melonum,
Nasturtii, +
Nigellæ,

S E.

Semen Oryzæ, +

Papaueris albi,
Phellandrii aquatichi,
Pœoniae,
Psyllii,
Raphani domestici, +
Rutæ, +
Sabadilleos,
Sinapi nigrae,
Staphidifagriæ.

Siliquæ.

Solutio amara, "

Gummi Guaiaci.

Sparadrapus Goulardi, +

S P E C I E S.

Species Cephalicæ pro Cucuphis,
Decocti carminatiui,
pro Clysteribus,
Lignorum,
Nigri,
Pectoralis,

Daireos, +

Diatragacanthæ frigidæ,

pro Fomentatione,

Fumo, vid. Puluis pro fumo, +

Gargarismate,

Hieræ picræ, +

pro Infuso loco Thée,

Morsulorum Imperatoris,

pro Pediluvio,

Resoluentes externæ.

Specificum Cephalicum.

Sperma Ceti.

Q

SPI-

S P.

SPIRITUS SIMPLICES IN-
FLAMMABILES.

Spiritus Anisi, +

Cochleariae,
Feniculi, +
Formicarum,
Juniperi e baccis,
Lauendulae,
Liliorum conuallium,
Lumbricorum terrestrium, +
Rorismarini,
Rosarum,
Sambuci e floribus, +
Serpilli,
Vini Rectificatus,
Rectificatissimus,
Tartarisatus.

S P.

SPIRITUS COMPOSITI IN-
FLAMMABILES ET SA-
LINI.

Spiritus Cœruleus,
Matricalis,
Mindereri,
Nitri dulcis,
Sališ ammoniaci anisatus,
succinatus,
vinofus,
dulcis,
Saponatus,
Theriacalis camphoratus,
de Tribus, +
Vini Camphoratus,
Camphorato-crocatus,
Vitrioli dulcis.

SPIRITUS SIMPLICES SALINI
ET EMPYREUMATICI.

Spiritus Cornu Cerui, +

Nitri rectificatus, +
Salis ammoniaci aquosus, +
cum alcali,
cum calce viua, +
communis, acidus, +
concentra-
tus,

Sulphuris, +
Tartari, +
Vitrioli, +

Spongia cerata,
marina.
Styrax liquida.
Succinum album,
citrinum.

S U C C I.

Succus condensatus Acaciae, +
Glycyrrhizae,
expressus fluidus Berberum, +
Citri,
Granatorum, +
Suc-

SU.

Succus expressus fluidus Granorum
 Kermes,
 Ribium, +
 Rubi Idae. +
 Sulphur Auratum antimonii tertiae
 præcipitationis,
 liquidum.
 Caballinum, +
 Citrinum. +
 Suppositoria.

SYRUPI SIMPLICES.

Syrpus Acetofitatis Citri,
 Aurantiorum corticum,
 Balsamicus,
 Berberum,
 Capillorum Veneris, +
 Cerasorum acidorum, +
 de Cinnamomo,
 Citri corticum, +
 Coralliorum, +
 Cydoniorum, +
 Granotorum,
 Mororum,
 Myrtillorum, +
 Nympheæ seu de Nenuphar, +
 Papaueris albi,
 erratici, +
 Pœoniae florum,
 Ribium, +
 Rosarum,
 Rubi Idae,
 Violarum.

SY.

SYRUPI COMPOSITI.

Syrpus Altheae,
 Amygdalinus,
 de Cichorio cum Rhabar-
 baro,
 Diacodii Montani,
 Domesticus s. de Spina Cer-
 uina,
 de Eryfimo Lobelii, +
 Glycyrrhiza,
 Manna.

Tamarindi.
 Tartarus albus,
 emeticus,
 Ruber,
 Tartarifatus,
 Vitriolatus.

Terebinthina cocta,
 communis,
 Veneta.
 Terra foliata Tartari, & pauperibus
 Japonica Vid. Catechu. +

Testæ Concharum,
 Ostrearum. +

Theriaca Andromachi,
 pro Pecoribus.

TINCTURÆ.

Tinctura Antimonii acris,
 tartarifata,
 Q 2 Tin-

TL.

Tinctura Benzoës,
Catechu,
Gummi Laccæ,
Martis helleborata,
pomata,
tartarisata Ludovici,
Papaueris erratici,
Rhabarbari,
Rosarum,
Tartari.

Tragea alba.

Trochisci Alhandal, +
Bechici albi,
Frid. Wilhelmi,
nigri.

Turpethum minerale.

Tutia Alexandrina.

Vermes maiales.

Viscus quercinus.

Vitriolum album,
Cyprium,
Martis.

Vitrum Antimonii, +
ceratum. +

VN.

VNGUENTA.

Vnguentum Aegyptiacum,
Album camphoratum,
resoluens,
simplex,

de Althea,
ad Ambusta, +
de Arthanita, +
Basilicum,
Carminatium,
Digestium,
Exficcans,
de Linaria,
Lithargyrio,
Mercuriale s. Neapolita-

num,
de Minio,
Neruinum,
Nihili, +
Ophthalmicum, +
Pediculorum,
Pomatum,
Populeum,
Resoluens, +
Rosatum,
Saturni saponatum seu +
Nutritum Saturni,
contra Scabiem,
Stomachicum.

Vngulae Alcis. +

DE-

DESIGNATIO ALTERA

PRO

PHARMACOPOLIIS VRBIUM MINORUM.

*A.C.**A C E T A.*

Acetum concentratum,
Destillatum,
Lithargyrii,
Squilliticum,
Vini.

Aerugo.
Agaricus.
Aloë depurata,
hepatica,
Succotrina.
Alumen crudum,
vstum.
Amygdalæ amaræ,
dulces.

Amylum.
Antimonium crudum,
diaphoreticum simplex.

AQUAE SIMPLICES.

Aqua Acaciae florum,
Calcis viuæ,
Cardui benedicti,
Ceraforum nigrorum,

AQ.

Aqua Cinnamomi;
Fœniculi,
Menthæ,
Perfici foliorum,
Petroselini,
Plantaginis,
Rosarum,
Sambuci florum,
Scabiosæ,
Scordii,
Tiliae florum,
Verbenæ,
Veronicæ.

*AQUÆ VINOSE ET COM-
POSITÆ.*

Aqua Apoplectica,
Carminatiua,
Cinnamomi c. Vino,
Embryonum,
Fortis,
Menthæ cum Vino,
Ophtalmica,
Phagadænica,
Regia,

Q 3

Aqua

DESIGNATIO ALTERA.

AQ.

Aqua Sclopetaria,
Thedii,
Vegeto-mineralis,
Veronicae cum Vino,
Zedoariæ cum Vino.

Arcanum duplicatum.
Argentum foliatum.
Arsenicum album.
Auripigmentum.
Aurum foliatum.

AXUNGIAE.

Axungia Canis,
Porci,
Vrsi.

Baccae Juniperi,
Lauri.
Baculi Liquiritiae albi,
citrini.

BALSAMI.

Balsamus Arcae,
Copayvae,
Nucis Moschatae,
Peruvianus niger,
Rutae,
Vitae,
Vulnerarius Stahlii.

BO.

Bolus Armena.
Borax Veneta.
Butyrum Majoranae,
Cacao.

Camphora.
Candelae fumales.
Cantharides.
Cardamomum mintus.
Caricae seu Ficus.
Caryophylli aromatici.
Cassia fistularis,
lignea.
Castoreum.
Cera alba,
arborea,
citrina.
Cerussa alba.
Chocolada.
Cineres clavellati.
Cinnabaris factitia.
Cinnamomum.
Colocynththis.
Colophonias.

CONDITA.

Conditum Berberum,
Calami aromatici,
Carnis Citri,
Cerasorum acidorum,
Corticum Citri,
Cydoniorum,
Helenii radicis,
Nucum Juglandium,

Con-

C.O.

Conditum Ribium,
Zinziberis.

Confectum saccharatum Anisi,
Calami aromatici,
Cubebarum,
Fæniculi,
Seminis Ci-
næ.

*Nota. In locis minimis non tenentur
Pharmacopœæ hæc Condita & Con-
fecta semper in pæsto habere.*

Conserua Cochleariae,
Rosarum.

Corallia rubra,
Corallina,

Cornu Cerui raspatum,
vftum.

Corpus pro Balsamis Sulphuris ex
tempore parandis.

Cortices Aurantiorum,
Betulæ,
Cascarillæ,
Chinæ Chinæ,
Citri,
Salicis fragilis.

Cremor Tartari.
Creta alba,
Crocus Austriacus,
Martis antimoniatus Stahlii,
Metallorum.

C.R.

Crystalli Tartari.
Cubebaæ.

Diagrydium sulphuratum.

ELECTUARIA.

Electuarium Diascordii Fracaftorii,
Lenituum,
contra Morsum canis
rabidi.

ELIXIRIA.

Elixir Acidum Halleri,
Antiscorbuticum amarum,
Pectorale,
Proprietatis fine acido,
Roborans,
Viscerale,
Vitrioli Mynsichti.

EMPLASTRA.

Emplastrum Adhaesium,
Album coctum,
Ceratum Saturni,
de Cicuta,
Citrinum,
Defensium,
Diachylon cum Gummi,
simplex,
de Meliloto,

Em-

E.M.

Emplastrum de Ranis cum Mercurio,
Sapone Barbette,
Spermate Ceti,
Ranarum,
Stomachale,
Vesicatorium,
tempera-

ESSENTIAE SIMPLICES.

Effentia Absynthii,
Aloetica,
Asae foetidae,
Castorei,
Centaurii minoris,
Corticum Aurantiorum,
Cascarillae,
Chinae,
Citri,
Croci,
Gentianae rubrae,
Jalappae,
Opii,
Pimpinellae albae,
Rhabarbari,
Scordii,
Succini.

ESSENTIÆ COMPOSITÆ.

Effentia Alexipharmacæ,
Amara,
Carminatiua,

E.S.

Effentia Lignorum,
Stomachalis,
Valerianaæ composita.

EXTRACTA SIMPLICIA
CUM AQUA.

Extractum Absynthii,
Aloës,
Cardui benedicti,
Cascarillæ,
Centaurii minoris,
Chinac,
Cicutæ,
Cochleariae,
Croci,
Graminis,
Martis cum succo Pomo-
rum Borsdorffiorum,
Opii,
Rhabarbari,
Taraxaci,
Trifolii fibrini.

EXTRACTA SIMPLICIA CUM
SPIRITU VINI.

Extractum Castorei,
Ellebori nigri,
Gentianæ rubrae,
Leuisticæ radicis,
Vincetoxicæ radicis,

EX-

EX.

EXTRACTA COMPOSITA.

Extractum Hellebori nigri,
Panchymagogum Crollii.
Fel bouis inspissatum.

F L O R E S.

Flores Aeruginis,
Anthos seu Rorismarini,
Bellidis minoris,
Benzoës,
Borraginis,
Buglossi,
Calendulæ,
Chamaemeli romani,
vulgaris,
Cheiri,
Hyperici,
Lauendulae,
Liliorum conuallium,
Maluae arboreæ,
Nymphææ luteæ,
Papaueris erratici,
Pœoniæ,
Primulae Veris,
Rosarum incarnatarum,
rubrarum optimarum,
Salis Ammoniaci martiales,
Saluiæ,

F L.

Flores Sambuci,
Stoechados citrinæ,
Sulphuris,
Tanaceti,
Tiliæ,
Tunicæ,
Verbasci,
Violarum.

F O L I A.

Folia Aurantiorum,
Quercus,
Sennæ.

F U N G I.

Fungus Boleti ceruini,
Sorbi aucupariæ.

Gallæ Turcicæ,
Grana Paradisi.

G U M M A T A.

Gummi Ammoniacum,
depuratum,
Arabicum,
Asæ fœtidae,
Bdellii,
Benzoës,
Elemi,
Euphorbii,
R Gum-

GU.

Gummi Galbani,
Guajaci,
Guttae,
Laccae,
Mastiche,
Myrrhae,
Olibani,
Opopanaxis,
Sagapeni,
Scammoniae,
Storacis calamitae,
Tacamahacae,
Tragacanthea.

Hepar Antimonii.

H E R B A E.

Herba Abrotani,
Absynthii,
Adianthi albi,
nigri,
Alchymillae,
Altheae,
Antirrhini,
Aristolochiae longae,
Arnicae Plauenfis c. flore,
Artemisiae,
Basiliconis,
Betonicae,

Herba Borraginis,
Brancae Vrsinae,
Cardui benedicti,
Centaurii minoris,
Cerefolii,
Cicutae,
Cochleariae,
Dictamni Cretici,
Endiuiae,
Erysimi,
Euphrasiae,
Farfarae,
Fumariae,
Hederae terrefris,
Hepaticae nobilis,
Hyssopi,
Linariae,
Lysimachiae purpureae,
Majoranae,
Maluae,
Marrubii,
Matricariae,
Meliloti cum flore,
Melissae,
Menthae crispaes,
Millefolii,
Origani,
Parietariae,
Plantaginis,

Her-

HE.

Herba Prunellae,
Pulegii,
Pulmonariae,
Rorismarini,
Rutae hortensis,
Sabinae,
Salviae,
Saniculae,
Saturejae,
Scabiosae,
Scolopendriae,
Scordii,
Serpilli,
Thée,
Thymi,
Verbasci,
Verbenae,
Veronicae.

Ichthyocolla f. Colla piscium.
Indigo.
Julapium Rosarum.
Lacca Florentina,
in globulis.

LAPIDES.

Lapis Calaminaris,
Diuinus,
Infernalis alcalicus,

LA.

Lapis Infernalis lunaris,
Medicamentosus,
Prunellae f. Nitrum tabulatum.
Laudanum Liquidum Sydenhami.

L I G N A.

Lignum Juniperi,
Sanctum seu Guajacum,
Santalum citrinum,
rubrum,
Sassafras.
Limatura Martis,
Stanni anglicani.
Liquamen Myrrhae,
Liquor Anodinus mineralis,
Cornu Cerui succinatus,
Salis Tartari per deliquium,
Terrae foliatae Tartari.
Lumbrici terrestres exsiccati.

Macis.
Magnesia alba,
Salis amari.
Manna Calabrina.
Mel Rosarum,
Virgineum,
Vulgare.
Mercurius currens f. viuus,
dulcis,
praecipitatus ruber,

R 2

Mer-

ME.

Mercurius sublimatus corrosiuūs.
Minium.
Mixtura simplex.
Moschus Alexandrinus.

Nihilum album.
Nitrum depuratum,
tabulatum. Vid. Lapis Prunellae.
Nuces moschatae,
Nuclei Cerasorum,
Persicorum.

Oculi Cancrorum,
Populi.

OLEA COCTA SIMPLICIA.

Oleum Absynthii,
Chamaemeli,
Hyperici,
Liliorum alborum,
Lumbricorum terrestrium,
Menthæ.

OLEA DESTILLATA EM-PYREUMATICA.

Oleum Cornu Cerui,
Petrae,

OL.

Oleum Philosophorum,
Rusci,
Succini.

OLEA DESTILLATA ES-SENTIALIA.

Oleum Absynthii,
Anisi,
Carvi,
Chamomillæ,
Cort. Citri Italicum, vulgo
de Cedro,
Juniperi,
Lauendulæ,
Macis,
Majoranae,
Menthæ,
Rorismarini,
Rutæ,
Sassafras Ligni,
Spicae,
Terebinthinae.

OLEA EXPRESSA.

Oleum Amygdalarum dulcium,
Laurinum,
Oleum

OL.

Oleum Lini,
Nucis Moschatae,
Oliuarum,
Ouorum,
Raparum Seminis.

OLEA ABUSIUE SIC
DICTA.

Oleum Myrrhae, Vide Liquamen
Myrrhae,
Tartari per deliquium, Vide
Liquor Salis Tartari,
Vitrioli.

Opium.
Offa Sepiae.
Oxymel simplex,
squilliticum.

Passulae maiores,
minores.
Pasta de Althaea,
Liquiritia.

PILULAE.

Pilulae cachecticae martiales,
fœtidæ,
hydropicae,

PI.

Pilulae mercuriales,
polychrestae balsamicae,
Starckeyanae,
de Terebinthina.
Piper album,
longum,
nigrum.
Pix liquida,
naualis.

PRÆPARATA.

Bolus Armena,
Cinnabaris factitia,
Corallia rubra,
Cornu Cerui vſtum,
Creta alba,
Lapides Cancrorum,
Succinum album,
Testae Concharum,
Tutia Alexandrina.

Pulpa Cassiae,
Tamarindorum.

PULUERES SIMPLICES.

Puluis Aloës,
R 3

Pul-

P U.

Puluis Antimonii,
 Baccarum lauri,
 Cantharidum,
 Cardamomi minoris,
 Caryophillorum,
 Cinnamomi,
 Corticis Cascarillæ,
 Chinæ Chinæ,
 Croci,
 Foliorum Sennæ,
 Gummi Arabici,
 Guttae,
 Mastichis,
 Myrræ,
 Tragacanthæ,
 Limatura Martis,
 Lithargyrii,
 Lumbricorum terrestrium,
 Lycopodii,
 Macis,
 Nucum Moschatarum,
 Opii,
 Offium Sepiae.
 Piperis nigri,
 Radicis Ari,
 Curcumæ,
 Galangæ,
 Jalappæ,
 Ipecacuanhae,

P U.

Puluis Radicis Ireos Florentinæ,
 Rhabarbari,
 tosti,
 Serpentariae virginia-
 nae,
 Squillæ,
 Valerianaæ, [quae vero
 ut Serpentaria virgi-
 niana tantum in parua
 quantitate pulueri-
 fanda, & in vitro be-
 ne obturato affer-
 uanda,]
 Zedoariae.
 Rasurae Cornu Cerui,
 Sanguinis Draconis,
 Seminis Cinac,
 Viridis Aeris,
 Zinziberis.

PULUERES COMPOSITI IN- TERNI ET EXTERNI.

Puluis Absorbens antimoniatus s. pro
 Infantibus,
 citratus,
 nitratus,
 feu Species pro Cataplasmate,
 Epilepticus,
 pro Fumo,

Pul-

DESIGNATIO ALTERA.

135

P U.

Paluis Incidens,
Pectoralis,
Resoluens,
compositus,
Squillae compositus,
Stomachicus,
Temperans albus,
ruber.

R A.

Radices Dauci vulgaris,
Dictamni albi,
Ebuli,
Ellebori albi,
nigri,
Feniculi,
Gentianæ rubræ,
Glycyrrhizæ,
Graminis,
Helenii,
Jalappæ,
Ipecacoanhæ,
Ireos Florentinae,
Leuisticæ,
Mechoacannæ albae,
Pimpinellæ albae,
nigrae,
Pœoniae,
Polypodii,
Ptarmicae,
Rhabarbari,
Rhapontici,
Rubiac tinctorum,
Saponariae,
Sassaparillæ,
Scillae,
Scorzonerae,
Scrophulariae,
Serpentariae Virginianæ,

Ra-

RADICES.

Radices Altheæ,
Angelicae,
Apii,
Aristolochia longæ veræ,
rotundæ,
Ari,
Asparagi,
Bardanae,
Bistortæ,
Bryoniae,
Calami aromatici,
Caricis arenariae,
Carlinae,
Caryophyllatae,
Cichorei hortensis,
Contrayervae,
Curcumæ,

DESIGNATIO ALTERA.

R.A.

Radices Succise f. Morsis Diaboli,
 Taraxaci,
 Tormentillae,
 Valeriana,
 Vincetoxicis,
 Zedoariae,
 Zinziberis.
 Resina Abietina,
 Jalappae,
 praeparata,

R O B.

Rob Juniperi,
 Mororum,
 Prunorum,
 Sambuci.
 Rotulae Diaireos simplices.
 Sacchara varia,
 Saccharum lactis,
 penidium,
 Saturni.

S A L I A.

Sal Absynthii,
 Acetosellae essentiale,
 Amarum anglicanum,

R.A.

S.A.

Sal Ammoniacum,
 depuratum,
 Gemmæ,
 Mirabile Glauberi,
 Sedlizenſe,
 de Seignette,
 Tartari,
 Vniuersale herbarum,
 Volatile C. C.
 Oleosum,
 Sanguis Draconis.
 Sapo Venetus.
 Sebum Ceruinum,
 Hircinum.

S E M I N A.

Sem Anethi,
 Anisi stellati,
 vulgaris,
 pii,
 annabis,
 ardui benedicti,
 Mariæ,
 arthami,
 arui,
 inae,
 trulli,
 coriandri,

Semen

