

*Schule der Pharmazie*

Botanischer Teil

bearbeitet


von


Dr. E. Gilg

Erste Auflage

Dr 3354 5/7

Dv 3394<sup>5</sup> / 14





D

B

B

B

B

B

L

h

Z

b

d

# Schule der Pharmazie

in 5 Bänden

herausgegeben von

Dr. J. Holfert †, Prof. Dr. H. Thoms, Dr. E. Mylius, Prof. Dr. E. Gilg,  
Dr. K. F. Jordan.

**Band I: Praktischer Teil.** Bearbeitet von Dr. E. Mylius. Vierte, vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 137 in den Text gedruckten Abbildungen. In Leinw. geb. Preis M. 4,—.

**Band II: Chemischer Teil.** Bearbeitet von Prof. Dr. H. Thoms. Fünfte, verbesserte Auflage. Mit 105 in den Text gedruckten Abbildungen. In Leinw. geb. Preis M. 10,—.

**Band III: Physikalischer Teil.** Bearbeitet von Dr. K. F. Jordan. Vierte, vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 153 in den Text gedruckten Abbildungen. In Leinw. geb. Preis M. 5,—.

**Band IV: Botanischer Teil.** Bearbeitet von Prof. Dr. E. Gilg. Fünfte, verbesserte Auflage. Mit 559 in den Text gedruckten Abbildungen. In Leinw. geb. Preis M. 8,—.

**Band V: Warenkunde.** Bearbeitet von Prof. Dr. H. Thoms und Prof. Dr. E. Gilg. Vierte, völlig umgearbeitete und verbesserte Auflage. Mit 29 in den Text gedruckten Abbildungen. In Leinw. geb. Preis M. 8,—.

 *Jeder Band ist einzeln käuflich.* 

Daß die Schule der Pharmazie sich ihren Platz als bevorzugtestes Lehrbuch für Anfänger in der pharmazeutischen Literatur gesichert hat, beweisen die neuen Auflagen, welche in verhältnismäßig kurzen Zwischenräumen notwendig geworden sind. Der chemische und der botanische Teil liegen nunmehr in fünfter Auflage vor.

Dieser Erfolg ist ohne Zweifel dem Umstande zuzuschreiben, daß das Werk den gesamten Lehrstoff nicht etwa in trockener Wieder-

gabe enthält, sondern ihn anschaulich und leichtfaßlich behandelt und dadurch den Vorzug genießt, von den jungen Fachgenossen mit Lust und Liebe studiert zu werden.

Die seit Erscheinen der ersten Auflage bei dem Gebrauche der einzelnen Bände gemachten Erfahrungen haben den Verfassern die Überzeugung verschafft, daß in ihrer Anlage das Richtige getroffen wurde; und was im einzelnen daran verbesserungs- und ergänzungsbedürftig ist, wird durch den ständigen Gedankenaustausch der Verfasser mit den nach diesen Lehrbüchern Lehrenden und Lernenden bei der Neuauflage jedes einzelnen Bandes auf das Sorgfältigste berücksichtigt.

So werden die Bände, wie es bisher geschehen, dauernd ihren beiden Zwecken in vollem Maße entsprechen können, indem sie einerseits dem Lehrer Leitfaden und Grundlage für den persönlich zu erteilenden Unterricht sind, und andererseits da, wo der Eleve oder Studierende der persönlichen Unterweisung etwa entbehrt, durch die induktive Behandlung des Lehrstoffes tunlichsten Ersatz dafür bieten.

Entsprechend dem Ausbildungsgange des jungen Pharmazeuten, dessen Tätigkeit zunächst die praktische ist, beginnt der erste Band der Schule der Pharmazie mit dem praktischen Teil, in welchem alles das erörtert ist, was der Anfänger an Kunstgriffen erlernen muß, um die Arzneistoffe der Apotheke kunstgerecht zu verarbeiten und zu verabfolgen und mit den dazu nötigen Gerätschaften regelrecht umgehen zu können. Die unleugbare Abnahme der eigentlichen Laboratoriumstätigkeit in den Apotheken und andererseits die Zunahme der kaufmännischen Berufstätigkeit des Apothekers erforderten eine ganz besonders eingehende Behandlung des praktischen Teiles und die völlige Abtrennung desselben von dem übrigen Lehrstoff.


In den wissenschaftlichen Teilen haben die Verfasser von einer monographischen Behandlung der einzelnen Kapitel oder gar der Prüfungsaufgaben abgesehen und unter Vermeidung aller überflüssigen Gelehrsamkeit dem Lernenden ein klares Gesamtbild der einzelnen Wissenszweige mit steter Bezugnahme auf alles pharmazeutisch Wichtige gegeben. Die Verfasser waren besonders bemüht, in möglichst leichtverständlicher Ausdrucksweise, vom Leichten zum Schweren aufsteigend, die drei Hilfswissenschaften der Pharmazie: Chemie, Physik und Botanik, in ihren Grundzügen dem Anfänger klar zu machen.

An Stelle des pharmakognostischen Teiles ließen die Verfasser einen solchen treten, welcher sich Warenkunde betitelt und der neben der Kennzeichnung, Prüfung und Wertbestimmung der Vegetabilien auch diejenige der Chemikalien zum Gegenstande hat. Hierdurch wurde es ohne viele Wiederholungen ermöglicht, im chemischen Teil des Eingehens auf die handelsmäßige Beschaffenheit der in den Apotheken vorrätigen Chemikalien zu entraten und Prüfung und Wertbestimmung derselben zusammenhängend zu behandeln. Dies sind dieselben Gesichtspunkte, welche ja schon von jeher eine Abtrennung der Pharmakognosie als besondere Disziplin von der Botanik veranlaßt haben. Chemische und botanische Warenkunde, letztere Pharmakognosie genannt, haben somit in diesem Lehrbuche eine völlig analoge Behandlung gefunden.

Eine große Zahl guter Abbildungen erleichtert mit Vorteil das Verständnis des Lehrganges.

**Berlin**, im November 1914.

**Verlagsbuchhandlung von Julius Springer.**



# Schule der Pharmazie.

Herausgegeben von

Prof. Dr. J. Holfert †, Prof. Dr. H. Thoms, Dr. E. Mylius,  
Prof. Dr. E. Gilg, Dr. K. F. Jordan.

## IV. Botanischer Teil.

Bearbeitet

von

**Dr. Ernst Gilg,**

a. o. Professor der Botanik und Pharmakognosie an der Universität Berlin,  
Kustos am Kgl. Botanischen Museum zu Berlin-Dahlem.

Fünfte, verbesserte Auflage.

Mit 559 Textabbildungen.



Berlin.

Verlag von Julius Springer.

1915.

Schule der Pharmazie

Alle Rechte, insbesondere das der Übersetzung  
in fremde Sprachen, vorbehalten.  
Copyright by Julius Springer in Berlin 1915.

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK  
- Med.-Naturwiss. Abt. -  
DUSSELDORF  
V5949

## Vorwort zur dritten Auflage.

Als an mich die Aufforderung der Verlagsbuchhandlung erging, für die „Schule der Pharmazie“ den Botanischen Teil in dritter Auflage zu bearbeiten, nahm ich gerne an in der festen Absicht, an dem sehr gut eingeführten und mir als praktisch und zuverlässig bekannten Buche so wenig wie möglich zu ändern.

Leider hat sich diese Absicht nur teilweise verwirklichen lassen, und die vorliegende Neuauflage hat an Umfang nicht unerheblich zugenommen. Hierfür waren folgende Erwägungen maßgebend.

Da einmal durch den verstorbenen Professor Holfert in dieses in erster Linie für den jungen, noch vor dem Universitätsstudium stehenden Pharmazeuten bestimmte Buch ein Abschnitt über die Anatomie der Pflanzen eingeführt worden war und ich auch durch langjährige Erfahrung als Universitätslehrer weiß, daß dieser anatomische Teil benutzt wird, daß nicht wenige Pharmazeuten mit gewissen anatomischen Kenntnissen zum Universitätsstudium kommen, welche vorher durch selbständige orientierende Untersuchungen unter gleichzeitiger Benutzung von Büchern erworben worden sind, so war es für mich geboten, diesen anatomischen Teil dem Buche zu erhalten. Ja, ich glaubte ihn sogar aus zwei Gründen etwas erweitern zu müssen. Denn einerseits schienen mir die Angaben des anatomischen Teils in den früheren Auflagen des Buches für den Anfänger oft zu kurz gefaßt und deshalb unverständlich zu sein; und andererseits konnte das Buch, wenn die Anatomie ausführlicher dargestellt wurde, in vielen Fällen auch von den studierenden Pharmazeuten als Handbuch gebraucht werden, da die übrigen Disziplinen der Botanik wohl mit genügender Ausführlichkeit behandelt sind.

An einer anderen Stelle schien mir ferner noch eine Erweiterung des Buches dringend geboten zu sein, nämlich bei der Darstellung der Kryptogamen. In neuerer Zeit hat das intensivere Studium

dieser eigenartigen Formen so interessante Resultate ergeben und ihre gewaltige Bedeutung im Haushalte des Menschen so schlagend dargetan, daß die allgemeine Kenntnis von dem morphologischen und physiologischen Verhalten zahlreicher dieser Organismen (z. B. der Bakterien, Schimmelpilze, Gärungserreger, Brandpilze, Rostpilze etc.) schon längst nicht mehr nur einen Teil des Studiums auf der Universität bilden sollte, sondern zum geistigen Besitz jedes gebildeten Menschen geworden sein müßte.

Die Zahl der Abbildungen hat sich um beinahe hundert vermehrt, andere fehlerhafte und minderwertige wurden verbessert.

Die neu eingefügten Abbildungen sind nur zum Teil aus anderen Werken übernommen; der größte Teil wurde unter meiner Aufsicht original gezeichnet.

Die Teile des Buches „Hilfsmittel für das Studium der Botanik“ und „Morphologie“ wurden fast vollständig unverändert in die neue Auflage übernommen, auch bezüglich der Systematik der Siphonogamen (Phanerogamen) wurde kaum eine Erweiterung vorgenommen, ja es wurde versucht, so viel als irgend möglich die Einrichtungen der früheren Auflagen (z. B. die Einteilung größerer Pflanzenfamilien, die Hervorhebung solcher Familien, welche in unserer heimischen Flora eine große Rolle spielen oder die von größerer pharmazeutischer Wichtigkeit sind) beizubehalten, auch wenn sie meiner Ansicht nach manchmal für dieses Buch zu weitgehend oder gar unnötig erschienen, wie die Angabe der Linnéschen Klasse und die Zitierung des Autornamens hinter den Pflanzennamen.

Jedoch war es durchaus angezeigt, die Darstellung der Systematik nach dem bei den Systematikern der ganzen Erde jetzt fast allgemein angenommenen Englerschen System zu geben. Dieses System unterscheidet sich von dem Eichlerschen (das in den früheren Auflagen wiedergegeben war) prinzipiell nur in einigen für unsere Betrachtung nebensächlichen Punkten. Es ist jedoch nicht zu vergessen, daß die Wissenschaft seit der Aufstellung des Eichlerschen Systems gewaltige Fortschritte gemacht hat und daß dieses System unverändert bestehen blieb, während Engler jedem Fortschritt der Wissenschaft folgte und sein System geradezu als eine Darstellung der gegenwärtigen Kenntnisse in der Systematik der vergleichenden Anatomie und Fortpflanzungsphysiologie gelten muß.

Ich glaube auch, daß es nur zu begrüßen ist, wenn ein für den Pharmazeuten bestimmtes Handbuch der Botanik nicht zu kurz gehalten ist. Denn es unterliegt mir keinem Zweifel, daß die Zeit vorüber ist, wo immer mehr und mehr pflanzliche durch rein chemische Heilmittel verdrängt wurden, wo es schien, als ob die Pharmakognosie ihre Bedeutung als Wissenschaft für den Pharmazeuten fast vollständig verlieren sollte. Immer klarer bricht sich in der Medizin die Erkenntnis Bahn, daß die allerdings stark und rasch wirkenden chemischen Präparate und auch die aus Drogen rein dargestellten Alkaloide und Glykoside nicht imstande sind, ohne weiteres an die Stelle der früher gebräuchlichen, vom Apotheker selbst dargestellten einfachen Drogenauszüge zu treten, sondern daß für die Wirksamkeit oder wenigstens die richtige Wirksamkeit des Heilmittels meist mehrere der in ihm enthaltenen Körper in Frage kommen. Für die Erkenntnis von der neuerdings wieder zunehmenden Wichtigkeit der Botanik für die Pharmazie sprechen auch die im neuen Arzneibuch oft recht ausführlich behandelten pharmakognostischen Teile der einzelnen Abschnitte.

Steglitz-Dahlem b. Berlin, im September 1903.

### Vorwort zur fünften Auflage.

Gegenüber der vierten Auflage erscheint die fünfte äußerlich in wenig veränderter Form, da sich die bei der Bearbeitung jener befolgten und in der Vorrede zur dritten Auflage hervorgehobenen Grundsätze bewährt zu haben scheinen. Es wurde jedoch, wie jeder Fachmann erkennen wird, darnach getrachtet, das Buch im einzelnen sorgfältiger durchzuarbeiten, wodurch besonders der anatomische und systematische Teil jetzt auch soweit gebracht wurden, daß selbst der studierende Pharmazeut sie mit Vorteil wird benutzen können. Besonderer Wert wurden, wie in der vorigen Auflage, auf eine bessere Illustrierung gelegt, obgleich die Anzahl der Abbildungen die gleiche geblieben ist; infolge des Entgegenkommens der Verlagsbuchhandlung konnten nicht nur viele Abbildungen aus meiner „Pharmakognosie“ in die „Botanik“ übernommen, sondern auch zahlreiche neue Abbil-

dungen original gezeichnet werden, wodurch es ermöglicht wurde, eine Menge der früheren kleinen und wenig instruktiven Abbildungen zu verwerfen. Besonderer Wert wurde endlich auf eine möglichste Vervollständigung des Sachregisters gelegt; die Benützung des Buches dürfte dadurch sehr erleichtert werden.

Die in den früheren Auflagen den Pflanzenarten beigefügten Autornamen sowie die Angabe der Linnéschen Klasse und Ordnung wurden gestrichen. Sie sind für ein Lehrbuch ohne jede Bedeutung. Es wäre überhaupt dringend zu wünschen, daß das bei Apothekern noch vielfach sehr beliebte Linnésche System mehr und mehr aus dem Lehrgang der Eleven und auch aus den floristischen Handbüchern verschwände. Dies erste das ganze damals bekannte Pflanzenreich umfassende und durch leicht faßbare Merkmale gliedernde System hat jetzt nur noch historische Bedeutung. Seine Anwendung gibt dem Anfänger ein völlig falsches Bild von dem jetzigen Stande der wissenschaftlichen Systematik und der Kenntnis von der Verwandtschaft der Pflanzen und hat schon vielfach dem angehenden Floristen die Beschäftigung mit der *Scientia amabilis* verleidet.

Zu großem Danke bin ich Herrn Dr. M. Brandt und Herrn Geheimrat Prof. Dr. E. Rost verpflichtet, die mir manche wichtige Hinweise auf eine notwendige Erweiterung und Ergänzung des Buches gaben; ersterer leistete mir auch bei der Korrektur wesentliche Hilfe.

Berlin-Dahlem, im Dezember 1914.

Ernst Gilg.

## Inhaltsverzeichnis.

	Seite
Einleitung . . . . .	1
<b>Hilfsmittel für das Studium der Botanik.</b>	
Anlegen des Herbariums . . . . .	3
Sammeln der Pflanzen, Botanisieren . . . . .	4
Bestimmen der Pflanzen . . . . .	8
Pressen der Pflanzen, Trocken, Präparieren . . . . .	11
Ordnen und Aufbewahren der Pflanzen . . . . .	14
Studium der Pflanzenanatomie . . . . .	16
Gebrauch des Mikroskops . . . . .	17
Herstellung mikroskopischer Schnitte . . . . .	20
Behandlung mikroskopischer Präparate . . . . .	24
<b>Äußere Gestalt der Pflanzen. Morphologie.</b>	
Die Organe der Pflanzen . . . . .	27
Formen der Wurzel- und Stammorgane . . . . .	31
Verzweigung . . . . .	35
Formen der Blätter . . . . .	36
Die Blüte . . . . .	47
Die Kelchblätter . . . . .	47
Die Blumenblätter . . . . .	48
Die Staubblätter . . . . .	50
Die Fruchtblätter . . . . .	54
Der Blütenboden . . . . .	56
Die Blütendiagramme . . . . .	58
Die Blütenformeln . . . . .	60
Die Blütenstände . . . . .	61
Die Frucht . . . . .	65
Die Samenanlage . . . . .	70
Der Bau der Samenanlagen . . . . .	71
Die Gestalt der Samenanlagen . . . . .	73
Die Anheftung der Samenanlagen . . . . .	73
Der ausgewachsene Samen . . . . .	74
Verbreitung der Früchte und Samen . . . . .	75
<b>Innerer Bau der Pflanzen. Anatomie.</b>	
Zellenlehre . . . . .	78
Allgemeines über den Bau der Zelle . . . . .	78
Zellinhalt . . . . .	80
Die Zellwand . . . . .	92
Entstehung der Zellen . . . . .	96

	Seite
Die Gewebe . . . . .	97
1. Der Aufbau der Pflanzen. Die Bildungsgewebe . . . . .	99
2. Schutzgewebe, Hautsystem . . . . .	102
3. Festigungsgewebe, Skelettsystem (Mechanisches System) . . . . .	107
4. Die Ernährung der Pflanze . . . . .	109
a) Das Absorptionssystem (Aufnahmesystem) . . . . .	109
b) Das Assimilationssystem . . . . .	111
c) Das Leitungssystem . . . . .	113
d) Das Speichersystem . . . . .	127
e) Das Durchlüftungssystem . . . . .	128
f) Das Sekretionssystem . . . . .	129
<b>Einteilung der Pflanzen. Systematik.</b>	
Die Verwandtschaft der Pflanzen . . . . .	133
Künstliche Pflanzensysteme . . . . .	135
Übersicht des Linnéschen Systems . . . . .	136
Natürliche Pflanzensysteme . . . . .	138
Die Grundzüge einzelner natürlicher Systeme . . . . .	138
Übersicht über die wichtigsten Familien, Gattungen und Arten des Pflanzenreiches nach dem Englerschen System . . . . .	141
I. Abteilung. Schizophyta Spaltpflanzen . . . . .	142
1. Klasse. Schizomycetes (Bacteria). Bakterien, Bazillen, Spaltpilze . . . . .	143
1. Reihe. Eubacteria . . . . .	153
Familie Bacteriaceae. Stäbchenbakterien . . . . .	153
Familie Spirillaceae. Schraubenbakterien . . . . .	159
Familie Chlamydbacteriaceae. Scheidenbakterien . . . . .	161
Familie Coccaceae. Kugelbakterien . . . . .	162
2. Reihe. Thiobacteria . . . . .	163
Familie Beggiatoaceae . . . . .	163
Familie Rhodobacteriaceae . . . . .	163
2. Klasse Schizophyceae (auch Cyanophyceae, Phycochromaceae genannt). Spaltalgen . . . . .	163
Familie Oscillatoriaceae . . . . .	163
Familie Nostocaceae . . . . .	164
Familie Chroococcaceae . . . . .	165
II. Abteilung. Phytosarcodina, Myxothallophyta, Myxomycetes. Schleimpilze, Pilztiere . . . . .	165
III. Abteilung. Flagellatae . . . . .	169
IV. Abteilung. Dinoflagellatae (Peridineae). Peridineen . . . . .	170
V. Abteilung. Bacillariophyta. Diatomeen. Kieselalgen . . . . .	171
Familie Bacillariaceae . . . . .	175
VI. Abteilung. Conjugatae. Jochalgen . . . . .	175
Familie Desmidiaceae . . . . .	175
Familie Zygnemataceae . . . . .	176
VII. Abteilung. Chlorophyceae. Grünalgen . . . . .	177
1. Klasse. Protococcales . . . . .	178
Familie Volvocaceae . . . . .	178
Familie Pleurococcaceae . . . . .	179
2. Klasse. Confervales . . . . .	179
Familie Ulvaceae . . . . .	179
Familie Chaetophoraceae . . . . .	180
Familie Oedogoniaceae . . . . .	180
3. Klasse. Siphonales. Schlauchalgen . . . . .	181
Familie Vaucheriaceae . . . . .	181
Familie Caulerpacaeae . . . . .	181
VIII. Abteilung. Charophyta. Armleuchteralgen . . . . .	182
Familie Characeae . . . . .	182
IX. Abteilung. Phaeophyceae. Braunalgen oder Brauntange . . . . .	184
1. Reihe Phaeosporeae . . . . .	184

	Seite
Familie Ectocarpaceae . . . . .	184
Familie Laminariaceae . . . . .	185
2. Reihe Cyclosporeae . . . . .	187
Familie Fucaceae . . . . .	187
X. Abteilung. Rhodophyceae. Rotalgen oder Rottange, auch oft Flori- deen genannt . . . . .	188
XI. Abteilung. Eumycetes. Fungi. Echte Pilze . . . . .	190
1. Klasse. Phycomycetes. Algenähnliche Pilze . . . . .	190
1. Reihe. Zygomycetes . . . . .	191
Familie Mucoraceae . . . . .	191
Familie Entomophthoraceae . . . . .	192
2. Reihe. Oomycetes . . . . .	193
Familie Peronosporaceae . . . . .	193
Familie Saprolegniaceae . . . . .	194
Familie Pythiaceae . . . . .	195
2. Klasse. Ascomycetes. Schlauchpilze . . . . .	195
Familie Aspergillaceae. Schimmelpilze . . . . .	196
Familie Eutuberaceae. Trüffelpilze . . . . .	197
Familie Helvellaceae. Morchelpilze . . . . .	198
Familie Hypocreaceae . . . . .	199
Familie Saccharomycetaceae . . . . .	201
3. Klasse. Basidiomycetes. Basidienpilze . . . . .	202
1. Unterklasse. Hemibasidii . . . . .	202
Familie Ustilaginaceae. Brandpilze . . . . .	202
Familie Tilletiaceae. Brandpilze . . . . .	204
2. Unterklasse. Eubasidii . . . . .	204
1. Reihe. Protobasidiomycetes . . . . .	204
Familie Pucciniaceae. Rostpilze . . . . .	204
Familie Auriculariaceae . . . . .	209
2. Reihe. Autobasidiomycetes . . . . .	209
Familie Clavariaceae. Keulen- oder Korallenpilze . . . . .	210
Familie Hydniaceae. Stachelschwämme . . . . .	210
Familie Polyporaceae. Löcherschwämme . . . . .	210
Familie Agaricaceae. Lamellen- oder Blätterschwämme . . . . .	212
Familie Phallaceae . . . . .	215
Familie Lycoperdaceae . . . . .	216
Familie Sclerodermataceae . . . . .	217
Anhang. Lichenes. Flechten . . . . .	217
1. Reihe. Ascolichenes . . . . .	221
2. Reihe. Basidiolichenes . . . . .	222
XII. Abteilung. Embryophyta asiphonogama (Archegoniatae). Moose und Farnpflanzen . . . . .	222
1. Unterabteilung. Bryophyta (Muscineae). Moospflanzen . . . . .	223
1. Klasse. Hepaticae. Lebermoose . . . . .	225
Familie Marchantiaceae . . . . .	225
Familie Jungermanniaceae . . . . .	225
2. Klasse. Musci (Musci frondosi). Laubmoose . . . . .	227
Familie Sphagnaceae. Torfmoose . . . . .	228
Familie Bryaceae . . . . .	230
Familie Polytrichaceae . . . . .	230
2. Unterabteilung. Pteridophyta. Farnpflanzen (Gefäßkryptogamen oder besser Leitbündelkryptogamen) . . . . .	230
1. Klasse. Filicales. Echte Farnkräuter . . . . .	233
1. Reihe. Filicales leptosporangiatae . . . . .	233
1. Unterreihe. Eufilicineae . . . . .	233
Familie Polypodiaceae . . . . .	233
Familie Cyatheaceae . . . . .	234
Familie Osmundaceae . . . . .	234
2. Unterreihe. Hydropterides. Wasserfarne . . . . .	234
2. Reihe. Marattiales . . . . .	235

	Seite
Familie Marattiaceae . . . . .	236
3. Reihe. Ophioglossales . . . . .	237
Familie Ophioglossaceae . . . . .	237
2. Klasse. Equisetales. Schachtelhalmgewächse . . . . .	237
Familie Equisetaceae . . . . .	238
3. Klasse. Lycopodiales. Bärlappartige . . . . .	238
Familie Lycopodiaceae. Bärlappgewächse . . . . .	238
Familie Selaginellaceae . . . . .	239
Familie Isoëtaceae . . . . .	240
XIII. Abteilung. Embryophyta siphonogama. Phanerogamen oder Samenpflanzen . . . . .	241
1. Unterabteilung. Gymnospermae. Nacktsamige Gewächse . . . . .	244
1. Klasse. Cycadales . . . . .	246
Familie Cycadaceae . . . . .	246
2. Klasse. Ginkgoales . . . . .	246
Familie Ginkgoaceae . . . . .	246
3. Klasse. Coniferae Zapfenträger, Nadelhölzer . . . . .	246
Familie Taxaceae. Eibengewächse . . . . .	248
Familie Pinaceae. Kieferngewächse . . . . .	248
4. Klasse. Gnetales . . . . .	251
2. Unterabteilung. Angiospermae. Bedecktsamige Gewächse . . . . .	251
1. Klasse. Monocotyledoneae. Einkeimblättrige Gewächse . . . . .	252
1. Reihe. Pandanales. Schraubenbaumartige . . . . .	252
Familie Typhaceae. Lieschkolbengewächse . . . . .	253
Familie Sparganiaceae. Igelkolbengewächse . . . . .	253
2. Reihe. Helobiales. Sumpfbewohnende . . . . .	253
Familie Potamogetonaceae. Laichkrüutergewächse . . . . .	253
Familie Alismataceae. Froschlöffelgewächse . . . . .	254
Familie Hydrocharitaceae. Froschbißgewächse . . . . .	254
3. Reihe. Glumiflorae. Spelzenblütige . . . . .	255
Familie Gramineae. Grasgewächse . . . . .	255
Familie Cyperaceae. Riedgrasgewächse . . . . .	259
4. Reihe. Principes. Palmen . . . . .	260
Familie Palmae. Palmengewächse . . . . .	260
5. Reihe. Spathiflorae. Scheidenblütler . . . . .	263
Familie Araceae. Aronstabgewächse . . . . .	263
Familie Lemnaceae. Wasserlinsengewächse . . . . .	264
6. Reihe. Farinosae. Mehlsamige . . . . .	265
Familie Bromeliaceae. Ananasgewächse . . . . .	265
7. Reihe. Liliiflorae. Lilienblütige . . . . .	265
Familie Juncaceae. Binsengewächse . . . . .	265
Familie Liliaceae. Liliengewächse . . . . .	266
Familie Amaryllidaceae. Amaryllisgewächse . . . . .	269
Familie Dioscoreaceae. Yamsgewächse . . . . .	270
Familie Iridaceae. Schwertliliengewächse . . . . .	270
8. Reihe. Scitamineae. Gewürzlilien . . . . .	272
Familie Musaceae. Bananengewächse . . . . .	273
Familie Zingiberaceae. Ingwergewächse . . . . .	273
Familie Cannaceae. Cannagewächse . . . . .	275
Familie Marantaceae. Marantagewächse . . . . .	275
9. Reihe. Microspermae. Kleinsamige . . . . .	275
Familie Orchidaceae. Orchisgewächse . . . . .	276
2. Klasse. Dicotyledoneae. Zweikeimblättrige Gewächse . . . . .	279
1. Unterklasse. Archichlamydeae. (Apetalae und Choripetalae) . . . . .	279
1. Reihe. Piperales. Pfefferartige . . . . .	279
Familie Piperaceae. Pfeffergewächse . . . . .	279
2. Reihe. Salicales. Weidenartige . . . . .	280
Familie Salicaceae. Weidengewächse . . . . .	280
3. Reihe. Juglandales. Walnußartige . . . . .	281
Familie Juglandaceae. Nußbaumgewächse . . . . .	281

	Seite
4. Reihe. Fagales. Buchenartige . . . . .	281
Familie Betulaceae. Birkengewächse . . . . .	283
Familie Fagaceae. Buchengewächse . . . . .	283
5. Reihe. Urticales. Nesselartige . . . . .	284
Familie Ulmaceae. Ulmengewächse . . . . .	284
Familie Moraceae. Maulbeergewächse . . . . .	285
Familie Urticaceae. Nesselgewächse . . . . .	288
6. Reihe. Santalales. Santelbaumartige . . . . .	288
Familie Santalaceae. Santelgewächse . . . . .	288
Familie Loranthaceae. Mistelgewächse . . . . .	289
7. Reihe. Aristolochiales. Osterluzeiartige . . . . .	290
Familie Aristolochiaceae. Osterluzeigewächse . . . . .	290
8. Reihe. Polygonales. Knöterichartige . . . . .	290
Familie Polygonaceae. Knöterichgewächse . . . . .	290
9. Reihe. Centrospermae. Gekrümmtsamige . . . . .	292
Familie Chenopodiaceae. Gänsefußgewächse . . . . .	292
Familie Caryophyllaceae. Nelkengewächse . . . . .	292
10. Reihe. Ranales. Hahnenfußartige . . . . .	296
Familie Nymphaeaceae. Seerosengewächse . . . . .	296
Familie Ranunculaceae. Hahnenfußgewächse . . . . .	296
Familie Berberidaceae. Berberitzengewächse . . . . .	301
Familie Menispermaceae. Mondsamengewächse . . . . .	302
Familie Magnoliaceae. Magnoliengewächse . . . . .	303
Familie Anonaceae. Gewürzappelgewächse . . . . .	304
Familie Myristicaceae. Muskatnußgewächse . . . . .	304
Familie Lauraceae. Lorbeergewächse . . . . .	307
11. Reihe. Rhoeadales. Mohnartige . . . . .	309
Familie Papaveraceae. Mohngewächse . . . . .	309
Familie Capparidaceae. Kapperngewächse . . . . .	311
Familie Cruciferae. Kreuzblütlergewächse . . . . .	311
Familie Resedaceae. Resedagewächse . . . . .	315
12. Reihe. Sarraceniales. Insektenfangende Gewächse . . . . .	316
Familie Sarraceniaceae. Schlauchblattgewächse . . . . .	316
Familie Nepenthaceae. Kannenträger . . . . .	316
Familie Droseraceae. Sonnentaugewächse . . . . .	316
13. Reihe. Rosales. Rosenähnliche . . . . .	319
Familie Saxifragaceae. Steinbrechgewächse . . . . .	319
Familie Hamamelidaceae . . . . .	319
Familie Rosaceae. Rosengewächse . . . . .	319
Familie Leguminosae. Hülsenfrüchtler . . . . .	327
14. Reihe. Geraniales. Storchschnabelgewächse . . . . .	336
Familie Geraniaceae. Storchschnabelgewächse . . . . .	337
Familie Oxalidaceae. Sauerkleegewächse . . . . .	338
Familie Linaceae. Leingewächse . . . . .	338
Familie Erythroxylaceae. Cocogewächse . . . . .	338
Familie Zygophyllaceae. Jochblättrige Gewächse . . . . .	339
Familie Rutaceae. Rautengewächse . . . . .	340
Familie Simarubaceae. Simarubengewächse . . . . .	343
Familie Burseraceae. Balsambaumgewächse . . . . .	344
Familie Polygalaceae. Kreuzblumengewächse . . . . .	344
Familie Euphorbiaceae. Wolfsmilchgewächse . . . . .	346
15. Reihe. Sapindales. Seifenbaumartige . . . . .	349
Familie Anacardiaceae. Sumachgewächse . . . . .	349
Familie Aquifoliaceae. Stechpalmengewächse . . . . .	351
Familie Aceraceae. Ahorngewächse . . . . .	351
Familie Sapindaceae. Seifenbaumgewächse . . . . .	351
16. Reihe. Rhamnales. Faulbaumartige . . . . .	352
Familie Rhamnaceae. Kreuzdorngewächse . . . . .	352
Familie Vitaceae. Weinrebgewächse . . . . .	353
17. Reihe. Malvales. Malvenartige . . . . .	353

Familie Tiliaceae	Lindengewächse	Seite
Familie Malvaceae	Malvengewächse	353
Familie Sterculiaceae	Kakaobaumgewächse	354
18. Reihe, Parietales	Wandsamige Gewächse	355
Familie Theaceae (Ternstroemiaceae)	Teegewächse	357
Familie Guttiferae	Guttigewächse	358
Familie Dipterocarpaceae	Flügelfruchtgewächse	359
Familie Cistaceae	Cistusgewächse	359
Familie Violaceae	Veilchengewächse	361
Familie Passifloraceae	Passionsblumengewächse	361
Familie Caricaceae	Melonenbaumgewächse	361
19. Reihe, Opuntiales	Kaktusartige	362
Familie Cactaceae	Kaktusgewächse	362
20. Reihe, Myrtiflorae	Myrtenblütige	362
Familie Thymelaeaceae	Seidelbastgewächse	362
Familie Punicaceae	Granatbaumgewächse	363
Familie Myrtaceae	Myrtengewächse	364
Familie Oenotheraceae (Onagraceae)	Weidenröschengewächse	365
21. Reihe, Umbelliflorae	Doldenblütige	365
Familie Araliaceae	Efeugewächse	365
Familie Umbelliferae	Doldentragende Gewächse	366
2. Unterklasse, Metachlamydeae oder Sympetalae	Verwachsenkronige Dikotylen	373
1. Reihe, Ericales	Heidenartige	373
Familie Ericaceae	Heidekrautgewächse	374
2. Reihe, Primulales	Primelartige	375
Familie Primulaceae	Schlüsselblumengewächse	375
3. Reihe, Ebenales	Ebenholzartige	376
Familie Sapotaceae	Guttapercha liefernde Gewächse	376
Familie Ebenaceae	Ebenholzgewächse	376
Familie Styracaceae		377
4. Reihe, Contortae	Gedrehtblütige	378
Familie Oleaceae	Ölbaumgewächse	379
Familie Loganiaceae	Strychnosgewächse	379
Familie Gentianaceae	Enziangewächse	379
Familie Apocynaceae	Hundstodgewächse	381
Familie Asclepiadaceae	Seidenpflanzengewächse	383
5. Reihe, Tubiflorae	Röhrenblütige	384
Familie Convolvulaceae	Windengewächse	385
Familie Boraginaceae (Asperifoliaceae)	Boretschgewächse	385
Familie Verbenaceae	Eisenkrautgewächse	388
Familie Labiatae	Lippenblütlergewächse	388
Familie Solanaceae	Nachtschattengewächse	392
Familie Scrophulariaceae (Personatae)	Rachenblütlergewächse	396
6. Reihe, Plantaginales	Wegebreitartige	400
Familie Plantaginaceae	Wegebreitgewächse	401
7. Reihe, Rubiales	Krappblütige	401
Familie Rubiaceae	Krappgewächse	401
Familie Caprifoliaceae	Geißblattgewächse	402
Familie Valerianaceae	Baldriangewächse	404
Familie Dipsacaceae	Kardengewächse	406
8. Reihe, Cucurbitales	Kürbisartige	406
Familie Cucurbitaceae	Kürbisgewächse	407
9. Reihe, Campanulatae	Glockenblumenartige	408
Familie Campanulaceae	Glockenblumengewächse	409
Familie Compositae (Synanthereae)	Röhrenbeutelige- oder Korbblütlergewächse	410
Sachregister		420

## Einleitung.

Mit dem Namen Botanik oder Pflanzenkunde bezeichnet man diejenige Wissenschaft, welche die Kenntnis des Pflanzenreichs zum Gegenstand hat.

Zunächst fällt an der Pflanze ihre äußere Gestalt auf. Man nennt den Zweig der Botanik, welcher sich mit der äußeren Gestalt der Pflanze und ihrer Organe sowie den den Aufbau des Pflanzenkörpers bedingenden allgemeinen Gesetzen beschäftigt, die Lehre von der Gestalt der Pflanzen, äußere Morphologie oder schlechtweg Morphologie (aus dem griechischen *μορφή* = morphe, die Gestalt, und *λόγος* = logos, die Lehre).

Bei dem Zerschneiden und Zerlegen einer Pflanze bemerkt man weiter, daß ihr innerer Bau ein sehr vielgestaltiger ist; man erkennt, wenn nicht mit bloßem Auge, so doch schon bei schwacher Vergrößerung, z. B. am Holundermark, daß dieses aus einzelnen Bläschen oder Zellen besteht, und daß sich z. B. aus der Lindenrinde oder der Leinpflanze ohne weiteres lange Bastfaserbündel herauslösen lassen. Der Betrachtung des inneren Baues der Pflanzen erschließt sich aber erst dann ein ganz ungeahnt weites Feld, wenn man das Mikroskop benutzt, mit dessen Hilfe man die Bilder der Schnittflächen bis weit über das Tausendfache vergrößert zu beobachten vermag. Der Zweig der Botanik, welcher sich mit der Erkenntnis dieser Verhältnisse befaßt, heißt die Lehre von dem inneren Bau der Pflanzen, innere Morphologie oder gewöhnlich Anatomie (aus dem griechischen *ἀνά* = ana, durch, und *τόμος* = tomos, der Schnitt).

Beide Zweige der botanischen Forschung lehren jedoch nur fertige Zustände zu betrachten und sie allenfalls vom Gesichtspunkte der Anordnung im Raume zu beurteilen. Ihren Wert erlangen beide erst in Verbindung mit einem dritten Zweige, welcher das Studium der Lebensvorgänge in der Pflanze zum Gegenstande hat, der Lehre vom Leben und den (physikalischen und chemischen) Lebenserscheinungen der Pflanzen, der Physiologie (aus dem griechischen *φύσις* = physis, die Natur).

Eine vollkommen getrennte Behandlung dieser drei Zweige der Pflanzenkunde ist nur für Denjenigen von Wert, welcher mit jedem

einzelnen derselben in gewissem Maße vertraut ist; Lehrbücher der reinen Morphologie, Anatomie oder Physiologie setzen auf jeder Zeile die Kenntnis der anderen beiden Zweige bei dem Studierenden voraus. Da der Benutzer der „Schule der Pharmazie“ jedoch instande sein soll, diese gänzlich unvorbereitet zu gebrauchen, so ergab sich die Notwendigkeit, sowohl im morphologischen als auch im anatomischen Teil die Bestimmung, welcher die einzelnen Organe der Pflanze dienen, gleichzeitig mit ihrer Beschreibung zu erläutern, also die Deutung der Lebensvorgänge in der Pflanze mit der Beschreibung ihrer Organe zu verbinden. Es ist daher im vorliegenden Buche ein Teil der Physiologie mit der Morphologie, der andere Teil mit der Anatomie verbunden worden.

Ein vierter und in gewissem Sinne der älteste selbständige Zweig der Pflanzenkunde ist die Pflanzenbeschreibung, auch spezielle oder systematische Botanik (Systematik) genannt, weil diese neben dem Zwecke der genauen Beschreibung der einzelnen Pflanzen ihre Gruppierung, d. h. die Einordnung in natürliche oder künstliche Systeme zum Gegenstand hat.

Weitere Zweige der Pflanzenkunde, deren Behandlung jedoch nicht in den Rahmen dieses Lehrbuches gehört, sind z. B. die Biologie, die Lehre vom Leben und den Lebenserscheinungen der Organismen, soweit sie in Beziehung zur umgebenden Natur stehen; die Phytogeographie (Pflanzengeographie) oder die Lehre von der Verbreitung der Pflanzen; die Phytopaläontologie (Palaeobotanik) oder die Lehre von den vorweltlichen Pflanzen und der Entwicklung der Pflanzenwelt; endlich soll noch genannt werden die Phytopathologie, die Lehre von den Krankheiten der Pflanze.

# Hilfsmittel für das Studium der Botanik.

## Anlegen des Herbariums.

Botanik muß, wie jede Naturwissenschaft, praktisch erlernt werden, und die Meinung ist ganz falsch, daß man durch das Studium von Büchern allein, selbst unter Benutzung der besten Abbildungen, die nötigen Kenntnisse erwerben könne.

Auch in der Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 18. Mai 1904, betreffend die Prüfung der Apothekergehilfen, wird der Nachweis gefordert, daß der junge Pharmazeut sich während seiner Lehrzeit praktisch mit der Botanik beschäftigt habe, und zwar durch die Bestimmung, daß bei der mündlichen Prüfung ein während der Lehrzeit angelegtes Herbarium vorgelegt werden muß.

Wie schon aus der Fassung dieser Bestimmung hervorgeht, ist die Hauptsache nicht das Vorhandensein des Herbariums in den Händen des Prüflings, sondern vielmehr die Gewähr dafür, daß dieser durch das Anlegen eines Herbariums sich mit den in der betreffenden Gegend gedeihenden Pflanzen in morphologischer und systematischer Hinsicht mehr oder weniger vertraut gemacht habe; denn alle mit dem Anlegen des Herbariums verbundenen Beschäftigungen sind geeignet, dem Anfänger botanische Kenntnisse zu erwerben, sie dann zu vermehren und zu befestigen. Bei dem Botanisieren prägt man sich u. a. die Wachstumsweise und die Häufigkeit des Vorkommens der Arten, Gattungen und Familien ein, beim Bestimmen lernt man die Merkmale der Pflanzen bis ins eingehendste kennen, und beim Einordnen übt man die Kenntnisse von der Verwandtschaft der Gewächse auf das erfolgreichste.

Das Zustandebringen eines Herbariums ist das Resultat der folgenden vier Beschäftigungen, welche sich zeitlich eng aneinander anschließen, nämlich:

1. Sammeln der Pflanzen (Botanisieren);
2. Bestimmen der Pflanzen;
3. Pressen der Pflanzen, Trocknen, Präparieren;
4. Einordnen der Pflanzen.

## Sammeln der Pflanzen.

### Botanisieren.

Das Sammeln der Pflanzen soll nicht etwa das beiläufige Resultat gelegentlicher Spaziergänge sein, sondern es muß Jeder, der mit Ernst das Anlegen eines Herbariums betreiben will, mit zweckentsprechender Ausrüstung versehen sich zum Sammeln der Pflanzen anschicken. Im Anfange wird ja allerdings schon die allernächste Umgebung, ein Wegrand oder eine Wiese, reichliche Ausbeute gewähren, aber bald dürfte es notwendig sein, an ein planmäßiges Absuchen der Gegend zu gehen.

Zu solchem Zwecke rüstet man sich mit einer Reihe von Gerätschaften aus, die zum Einsammeln der Pflanzen sehr nützlich oder sogar unentbehrlich sind. Es sind dies:

1. ein handfester Spaten oder Pflanzenstecher
2. ein kräftiges Taschenmesser;
3. eine Botanisiertrummel, oder an Stelle derselben besser
4. eine Pflanzengitterpresse oder Botanisiermappe.




Abb. 1. Botanisierspaten oder Pflanzenstecher, *a* nach Prof. Ascherson, *b* sogenannte amerikanische Form (stark verkleinert).

Da man danach trachten muß, alle Pflanzen, welche man sammelt, dem Herbarium möglichst so vollständig einzuverleiben, daß man sich daraus ein vollkommenes oder nahezu vollkommenes Bild der betreffenden Pflanze machen kann, so empfiehlt es sich, ein Abschneiden blühender Zweige nur bei Holzgewächsen vorzunehmen; in diesem Falle trennt man jene mit einem kurzen, schiefen Schnitt von den Zweigen. Bei Krautgewächsen hingegen empfiehlt es sich, wenn die Exemplare nicht gar zu groß sind, diese möglichst mit der Wurzel zu sammeln; denn oft ist das Vorhandensein der Wurzel zum Bestimmen der Pflanzen unerlässlich. Häufig, wenigstens aus lockerem Erdreich, kann man die ganze Pflanze mit einem geschickten Griffe unversehrt ausreißen. Ist das Erdreich hart oder die Wurzel leicht zerbrechlich, oder hat man Zwiebelgewächse vor sich, so bedarf man des Spatens oder Pflanzenstechers (Abb. 1), mit welchem man vorsichtig das Erdreich in kleinem Umkreis um die Pflanze herum absticht; man kann jene dann leicht ausheben und den Wurzelstock von der noch anhängenden Erde befreien. Sogenannte Botanisierstücke, an welche sich ein Spaten anschrauben läßt,

sind, sofern sie sehr solid gearbeitet sind, auch verwendbar, meist aber nicht praktisch. Das Mitnehmen eines Krückstockes empfiehlt sich jedoch, um Zweige herabzubiegen oder Wasserpflanzen damit heranholen zu können. Zu letzterem Zwecke eignet sich noch besser ein an einer Schnur befestigter großer, möglichst vierspitziger Angelhaken.

Zum Unterbringen und Heimschaffen der gesammelten Pflanzen gibt es zwei verschiedene Methoden. Einige ziehen den Transport in der Botanisiertrommel, andere in der Gitterpresse vor. Verwendet man die erstere, so legt man die Pflanzen nebeneinander in die Trommel oder sondert sie, wenn man eine Trommel mit zwei Fächern verwendet, derart, daß man in das eine sperrige und dornige Gewächse, auch wohl die Wasserpflanzen legt, in das andere die Krautgewächse. Die Verwendung der Trommel hat jedoch viele Übelstände. Ist sie nicht ganz angefüllt, so beschädigen sich die Pflanzen gegenseitig beim Tragen durch die schüttelnde Bewegung. Ist an einigen Wurzeln Erde hängen geblieben, was meist nicht zu vermeiden ist, so werden dadurch die Blüten anderer Pflanzen,




Abb. 2. Pflanzenpressen, a nach Auerswald, b nach K. W. Müller (stark verkleinert).

namentlich wenn sie nicht ganz trocken sind, beschmutzt; Kronblätter fallen leicht aus; auch dürfen die Pflanzen in der Trommel nicht welken, weil sie zu Hause auseinander gesucht werden müssen. Endlich lassen sich die weiter unten zu beschreibenden Zettel mit der Standortsbezeichnung schlechter daran befestigen, fallen leicht wieder ab, kommen dann durcheinander und werden auch wohl durch Feuchtigkeit unleserlich. Manche dieser Nachteile lassen sich allerdings dadurch vermeiden, daß man die von jeder Pflanzenart gesammelten Exemplare jedesmal für sich vorsichtig in Papier einschlägt; sehr bald wird dann aber auch die größte Botanisiertrommel mit einer an Zahl verhältnismäßig nur geringfügigen Ausbeute vollständig gefüllt sein.

Ganz anders ist dies bei der Verwendung der Gitterpresse als Sammelmappe, welche in jeder Hinsicht der Botanisiertrommel vorzuziehen ist. Diese Gitterpressen (Abb. 2) lassen sich bequem auf der Wanderung mitführen und können am Handgriffe getragen oder an einem Riemen umgehängt oder bei großen Fußreisen auf

den Rücken geschnallt werden. Es existieren zwei Formen dieser Pressen im Handel. Die ältere Form nach Auerswald (Abb. 2 a) trägt einen Griff an der Langseite und besitzt vier Ketten zum Verschuß. Eine neuere Form, die Patentpflanzenpresse von K. W. Müller (Abb. 2 b) hat den Handgriff an der Schmalseite, bedarf nur zweier Ketten, und ihre Gitterplatten werden durch Federkraft zusammengedrückt. Auch für längere Botanisierwanderungen bestimmte Pflanzenentornister sind im Handel. Bedient man sich der Gitterpresse zum Einsammeln, so füllt man sie zu Hause mit einer entsprechenden Anzahl von Paketen aus je drei Bogen grauen Fließpapiers (Pflanzenpapier), welches zu diesem Zwecke nicht gerade ganz trocken zu sein braucht, aber auch nicht feucht sein soll. Außerdem versieht man sich mit einer Anzahl kleiner Zettel von Visitenkartengröße, in welche man zwei Schnitte in nachstehend angedeuteter Weise macht (Abb. 3).

Auf diese schreibt man unterwegs mit Bleistift den Standort und etwaige sonstige Notizen, welche bei dem zu Hause vorzunehmenden




Abb. 3. Pflanzenzettel zur Aufzeichnung des Standortes.

Bestimmen eine Erleichterung bieten können. Nennt ein erfahrener Begleiter schon unterwegs den Namen der Pflanze, so wird man auch diesen darauf notieren, wird ihn zu Hause jedoch lediglich zur Bestätigung des durch Bestimmen gefundenen Resultates benutzen. Die Zettel befestigt man an dem Stengel oder an einem Blatt, indem man sie mit Hilfe der beiden Einschnitte spangenförmig darüber schiebt. Die gefundenen Pflanzen legt man nun unterwegs zwischen die Fließpapierpakete, braucht dabei jedoch nicht so genau auf ihre Lage zu achten wie später, wenn man sie zu Hause zum Trocknen in die Presse legt. Es empfiehlt sich, von jeder Pflanze mehrere Exemplare mitzunehmen oder zum mindesten einem schönen Herbarexemplar mehrere Blüten noch lose beizulegen, da man von wenigblütigen Gewächsen leicht sämtliche Blüten zum Bestimmen allein verbraucht. Das Einsammeln mit Zwischenlagen von Fließpapier in der Gitterpresse, an deren Stelle man in gleicher Weise eine Mappe mit Deckel und drei Klappen aus Pappe oder Leder verwenden kann, hat den Vorteil, daß die Pflanzen auf dem Transport sich gegenseitig nicht beschädigen, daß kleine Pflanzen beim Aussuchen der Sammelschätze nicht übersehen werden können, daß

die Exemplare derselben Art beisammen liegen bleiben, wie sie hineingelegt worden sind, daß die Standortsbezeichnungen nicht abfallen und durcheinander kommen können und daß endlich die Pflanzen zu Hause etwas abgewelkt und gleichzeitig auf einer Ebene ausgebreitet ankommen, so daß das endgültige Einlegen in die Presse viel leichter zu bewerkstelligen ist, als wenn die Pflanzen durch die Spannung ihrer Gewebe dem platten Ausbreiten zwischen die zum Pressen bestimmten Fließpapierlagen Widerstand entgegensetzen. Voraussetzung ist dabei, daß das Bestimmen alsbald nach der Ankunft zu Hause vorgenommen wird, während man in der Trommel gesammelte Pflanzen allenfalls einen Tag oder sogar länger in einer Umhüllung von feuchtem Fließpapier im Keller aufbewahren kann.

Für das Einsammeln von Pflanzen beachte man noch folgende Winke: Man hüte sich davor, anfangs gar zu viel zu sammeln. Exemplare von zwanzig verschiedenen Pflanzen, die man im Anfang ja schnell beisammen haben wird, dürften reichlich genug sein, wenn das Bestimmen aller mit Sorgfalt durchgeführt werden soll. Später, wenn man die am häufigsten vorkommenden Gewächse dem Herbarium einverleibt hat, wird man gut tun, sich an weniger betretene Wege zu halten, Feldraine, Laubwälder und Gebüsch abzustreifen, Waldblößen aufzusuchen und namentlich den Läufen kleinerer Gewässer zu folgen.

Die Botanisierrgänge unternahme man nicht in der Tageszeit der größten Hitze, auch nicht unmittelbar nach Regen. Möglichst wähle man dazu die Morgenstunden, doch ist auch der spätere Nachmittag dazu geeignet. Sind die Pflanzen naß, so verlieren sie beim Transport leicht die Kronblätter und behalten beim Trocknen nicht die natürliche Farbe, sondern werden dunkel, ja sogar schwarz.

Man wähle, wo es angängig ist, Exemplare in verschiedenen Entwicklungsstadien aus, da häufig das Vorhandensein von Früchten oder wenigstens abgeblühten Blumen zum Bestimmen unerlässlich ist. Namentlich gilt dies für Cruciferen und Umbelliferen, bei denen jedoch meist alle Entwicklungsstadien an ein und demselben Exemplar leicht zu finden sind.

Jedenfalls aber mache man es sich zur Aufgabe, nur Pflanzen in voller Blüte zu sammeln, auch Farne nur mit Sporenhäufchen, da Gewächse ohne Blüten (Farne ohne Sporenhäufchen) für das Studium wertlos sind. Bei Pflanzen mit getrenntgeschlechtigen Blüten versäume man nicht, nach den Blüten beiderlei Geschlechts zunächst an demselben Exemplar (meist Bäumen oder Sträuchern) zu suchen und, falls dies erfolglos ist, falls also zweihäusige (diöcische) Pflanzen vorliegen, sich in der Nähe nach Exemplaren des anderen Geschlechts umzusehen. Derartige Notizen versäume man nicht auf dem Standortszettel anzubringen.

Benutzt man zum Einsammeln die Trommel, so lege man ganz kleine Pflanzen in das Notizbuch oder in die etwa mitgenommene Taschenflora. Das Mitnehmen der letzteren hat jedoch, wenigstens für den Anfänger, meist nicht den davon erhofften Vorteil.

### Bestimmen der Pflanzen.

Das Bestimmen der Pflanzen nehme man, wie bereits erwähnt, alsbald nach der Ankunft zu Hause vor. Erfährt es einen Aufschub von auch nur einer Stunde, so versäume man wenigstens nicht, die Pflanzen samt der Presse oder Mappe inzwischen in den Keller zu legen. Hat man mit der Trommel botanisiert, so nehme man die Pflanzen aus dieser heraus und bringe sie, mit einer Hülle feuchten Fließpapiers umgeben, gleichfalls in den Keller.

In letzterem Falle muß man vor dem Bestimmen das Gesammelte sortieren und die Exemplare jeder Art in einzelnen Häufchen auf dem Tische ausbreiten. In ersterem Falle legt man die Presse oder Mappe aufgeschlagen neben sich und braucht darin nur wie in einem Buche weiterzublättern.




Abb. 4. Verschiedene Geräte zum Zerlegen der Pflanzen, *a* Skalpell, *b* krumme Schere, *c* Nadel, *d–g* verschiedene Formen von Pinzetten (verkleinert).

Beim Pflanzenbestimmen hat man eine Anzahl Geräte nötig, welche namentlich zum Zerlegen der Blüten mehr oder weniger wichtig sind. Es gehören dazu:

1. ein Skalpell zum Anfertigen von Schnitten durch die Fruchtknoten usw. (Abb. 4 *a*);
2. eine Schere zum Aufschneiden von Blütenhüllen, Abtrennen von Staubgefäßen usw. (Abb. 4 *b*);
3. einige Nadeln zum Sondieren (Abb. 4 *c*);
4. zwei Pinzetten beliebiger Form zum Auszupfen der Blumenblätter, Festhalten einzelner Blütenteile usw. (Abb. 4 *d–g*);
5. eine Lupe zur Besichtigung kleiner Pflanzenteile unter Vergrößerung. — Ausgezeichnete Dienste beim Bestimmen der Pflanzen, resp. beim Untersuchen kleiner oder kompliziert gebauter Blüten, leisten die sogen. Präpariermikroskope

(Abb. 5), deren Handhabung sehr einfach ist und hier nicht beschrieben zu werden braucht. Es sei jedoch hervorgehoben, daß ein solches Präpariermikroskop zum Bestimmen der Pflanzen nicht unbedingt notwendig ist!

Die unter 1—4 aufgeführten Apparate sind meist zu sogenannten botanischen Bestecken vereinigt im Handel käuflich (Abb. 6). Es ist jedoch zu empfehlen, vielleicht gleich ein nur wenig teureres sogen. Mikroskopier-Besteck (vergl. später) zu erwerben, da in einem solchen sämtliche zu botanischen Arbeiten überhaupt notwendigen Werkzeuge vereinigt sind. Man hüte sich auf alle Fälle davor, ein zu billiges Besteck zu kaufen, da die darin enthaltenen Apparate meist minderwertig sind und häufig dem Anfänger durch ständiges Zerbrechen die Freude am Arbeiten nehmen. In der Handhabung derselben muß man sich eine gewisse Fertigkeit aneignen.

Unter den zahlreichen Büchern zum Bestimmen der Pflanzen wähle man dasjenige aus, welches einem am besten zusagt oder von einem erfahrenen Fachgenossen empfohlen wird. Entweder wähle man eine der Spezialfloren, welche dadurch, daß sie nur die Pflanzen

des betreffenden Gebietes berücksichtigen, das Auffinden unter der geringeren Anzahl von Pflanzen erleichtern, oder man arbeite sich gleich von vornherein in eine der Floren von Deutschland ein, welche den Vorteil bieten, daß man eine größere Anzahl von Gattungen und Arten gleich von vornherein nebenher kennen lernt. Die bekannteste unter diesen, welche Nord- und Süddeutschland zugleich berücksichtigt, ist diejenige von A. Garcke; daneben die Floren für Deutschland von O. Wünsche (herausgegeben von Abromeit), Potonié (mit Abbildungsatlas), Schmeil und Fitschen. Thomé's: Illustrierte Flora von Deutschland, sowie die Illustrierte Flora von Mitteleuropa von Hegi sind teure, aber durch schöne farbige Tafeln geschmückte Bücher; noch



Abb 5. Präpariermikroskop zum Bestimmen der Pflanzen, von E. Leitz, Wetzlar.

umfangreicher ist die Synopsis der Mitteleuropäischen Flora von Ascherson und Graebner. Für das schweizerische Gebiet ist neben der Exkursions-Flora von A. Gremli neuerdings auch eine solche von O. Wünsche für das gesamte Alpengebiet erschienen, ebenso der Atlas der Alpenflora von Dalla Torre. Besonders empfehlenswert ist die „Flora der Schweiz“ von H. Schinz und R. Keller.

Von Spezialflora sind folgende zu nennen: Preußen: Rheinprovinz: Wirtgen; Hessen-Nassau: Wigand-Meigen; Westfalen: A. Karsch, Beckhaus; Nordwestdeutsche Tiefebene: Fr. Buchenau; Nord-Ost-




Abb. 6. Botanische Bestecke zum Bestimmen der Pflanzen ( $\frac{1}{2}$  natürl. Größe).

Deutschland: Ascherson und Graebner, zwei verschiedene Ausgaben; Prov. Sachsen: Schneider; Schlesien: Wimmer, E. Fiek; Pommern: Th. Fr. Marsson, Müller; Mark Brandenburg: P. Ascherson; Prov. Preußen: C. J. v. Klinggraeff, Abromeit; Schleswig-Holstein: P. Knuth, P. Prahl; Thüringen: Ilse; Harz: W. Reinecke, Bertram; Karpathen: Sagorski u. Schneider; Riesen- u. Isergebirge: W. Winkler; Bayern: K. Prantl; Sachsen: O. Wünsche; Württemberg: Martens und Kemmler, J. Daiber, O. Kirchner; Baden: Döll, M. Seubert-Klein; Mecklenburg: E. Boll, Ernst H. L. Krause; Oldenburg: A. Meyer; Hessen: Dosch u. Scriba; Braunschweig: W. Bertram; Thüringen: H. Vogel, H. Ilse, Bogenhard, G. Lutze, R. Schönheit; Hamburg: O. Sonder, C. Nöldeke; Lüneburg-Lauenburg: C. Nöldeke; Bremen: Fr. Buchenau; Lübeck: Haecker; Nordseeinseln: Buchenau; Elsaß-Lothringen: H. Waldner.

Abbildungswerke, wie z. B. Schlechtendal-Halliers Flora von Deutschland, Sturms Flora von Deutschland 2. Aufl. etc., benutze man nur zur Bestätigung des beim Bestimmen gefundenen Resultates, hüte sich aber davor, in solchen Werken die passende Abbildung, mit welcher man das zu bestimmende Exemplar für übereinstimmend hält, aufzusuchen und den darunter gefundenen Namen für den richtigen zu halten; besonders bei dem an zweiter Stelle genannten Werke sei vor der ungeheuerlichen Nomenclatur gewarnt.

Wie man Pflanzen zu bestimmen hat, läßt sich nicht beschreiben. Es ergibt sich dies bei Benutzung der Floren von selbst. Diese stellen stets Fragen, von denen zwei oder mehrere einander gegenüberstehen, z. B. ob die Blüten zwittrig oder eingeschlechtig, ob das Perigon fünfblättrig oder fehlend, verwachsenblättrig oder freiblättrig ist, ob vier oder fünf Staubgefäße vorhanden, ob die Laubblätter ganzrandig oder gezähnt sind usw.

Durch fortgesetzte Beantwortung dieser Fragen, welche man, wenn nötig, unter Zuhilfenahme der Lupe, sowie von Nadeln, Pinzette, Messer und Schere löst, findet man Familie, Gattung und zuletzt die Art, welcher die betreffende Pflanze angehört. Dabei verfähre man genau und gewissenhaft. Denn man soll die Charaktereigentümlichkeiten der Gattung und Art zum Zwecke des Bestimmens nicht allein erkennen, sondern sie sich auch einprägen, um den erforderlichen Nutzen davon zu haben.

Den gefundenen Namen gibt man, wenn man überzeugt ist, daß er richtig ist, nebst Familie und Linnéscher Klasse auf dem oben erwähnten Standortzettel, oder, wenn nötig, auf einem neuen Zettel von gleicher Gestalt an und heftet ihn an die Pflanze; diese wird nun durch Trocknen zum Einlegen in das Herbarium vorbereitet.

## Pressen der Pflanzen.

### Trocknen, Präparieren.

Was man unter Pressen der Pflanzen versteht, heißt zutreffender: Trocknen unter gelindem Druck, um die Verlegung aller Teile in eine Ebene zu bewirken. Es gilt hierbei, der Pflanze eine möglichst natürliche Lage zu geben und ihre Farben so gut als möglich zu erhalten.

Man nimmt graues Fließpapier, welches möglichst weich ist, und trocknet es in Paketen zu je drei oder mehr Bogen an der Sonne oder im Trockenschrank gut aus. Nachdem dies geschehen, nimmt man zuerst einige dieser Pakete übereinander und legt auf das oberste eine der gesammelten und bestimmten Pflanzen. Ist die Pflanze sehr lang, so zerschneidet man sie entweder in Stücke von etwa Dreiviertel der Höhe eines Foliobogens und preßt diese nebeneinander, um sie später in der Reihenfolge, daß links der Wurzelteil, rechts die Spitze und in die Mitte etwaige Zwischenteile zu liegen kommen (Abb. 7 a), einzukleben, oder man knickt den Stengel einige Male um, was übrigens weniger zu empfehlen und höchstens bei unbeblätterten Stengeln anzuwenden ist (Abb. 7 b S. 12).

Die Pflanzen in die geeignete Lage zu bringen, hält meistens nicht schwer, wenn sie in der Gitterpresse gesammelt waren und ihre Gewebe nicht mehr so prall und widerstandsfähig sind, wie im frischen Zustande. Blattwirtel drückt man mit der Fingerspitze flach, ebenso die Blüten, von denen es sich empfiehlt, einige in Seitenansicht, einige in Vorderansicht zu bringen. Ist die Pflanze in geeigneter Lage ausgebreitet und ist möglichst dafür gesorgt, daß Blätter und Blüten nicht aufeinanderliegen, auch Stengel und Zweige sich nicht kreuzen, so legt man ein neues Papierpaket auf und fährt so fort, bis alle Pflanzen (jede unter Beifügung des dazu gehörigen Zettels) untergebracht sind; dann schließt man wieder mit zwei oder drei Paketen ab und beginnt mit dem Trocknen. Pflanzen, welche dem Gattlegen großen Widerstand entgegensetzen, ordne man in der



Abb. 7. Beispiel für das Einlegen von Pflanzen, a mit zerschnittenem, b mit geknicktem Stengel.

angedeuteten Weise erst, nachdem sie einen Tag lang in der Presse gelegen haben, mithin etwas abgewelkt sind. Sehr zarte Pflanzen aber, z. B. jüngere Farnblätter, und solche mit feinen Fliederblättchen müssen im Gegensatz hierzu so früh wie möglich in die richtige Lage gebracht werden, da dies sonst die größten Schwierigkeiten verursacht.

Zum eigentlichen Trocknen stehen abermals verschiedene Wege offen. Meist bringt man das ganze Paket in die Gitterpresse und hängt diese, sofern die Luft im Freien nicht außergewöhnlich feucht ist, an das offene Fenster oder sonst an einen zugigen Ort. Hat man sehr viele Pflanzen zu trocknen oder benötigt man inzwischen der Gitterpresse zum abermaligen Botanisieren, so ist es zweckmäßig, falls keine zweite Gitterpresse zur Verfügung steht, einige Bretter vorrätig zu halten, welche die Größe der Fließpapierbogen ringsum um 1 bis

2 cm übertreffen. In je zwei derselben bringt man dann Pflanzenpakete in entsprechender Dicke und schnürt sie mit Hilfe von Lederriemen (Plaidriemen) zusammen oder man umschnürt sie kreuzweise mit starkem Bindfaden. Mit diesen Paketen verfährt man wie sonst mit der Gitterpresse. Schraubenpressen zu verwenden, ist nicht vorteilhaft, weil, abgesehen von ihrer Unhandlichkeit, leicht zu stark gepreßt und die Luftzirkulation dadurch beeinträchtigt wird.

Die zweite, meist schneller zum Ziel führende Methode des Pflanzentrocknens ist das Verbringen der Mappen über den geheizten Küchenherd oder in die „Bratröhre“, am besten jedoch, wenn ein solcher zur Verfügung steht, in einen Trockenschrank, und zwar kann dazu entweder der geheizte oder aber der mit wasserentziehenden Mitteln, namentlich Ätzkalk, beschickte Trockenschrank Verwendung finden.

Man mag trocknen wie man will, jedenfalls ist tägliches Umlegen in frisch getrocknetes, wenn möglich noch warmes Papier, namentlich am zweiten und dritten Tage, geboten. Am vierten oder fünften Tage pflegt dann das Verfahren, wenn nicht gerade besonders ungünstige Trockenverhältnisse vorliegen, beendet zu sein. Zur Feststellung dieses Zeitpunktes bedient man sich des Gefühls, indem die Pflanzen, mit dem Rücken der Hand in Berührung gebracht, sich nicht mehr kalt anfühlen dürfen. Gänzlich trockene Pflanzen biegen sich auch nicht.

Das empfehlenswerteste Trockenverfahren ist jedoch das folgende: Man legt die frisch gesammelten Pflanzen je in einen Bogen Fließpapier, indem man den Stengeln, Blättern, Blüten gleich die gewünschte Lagerung erteilt. Diesen Fließpapierbogen bringt man nun zwischen je zwei vollständig trockene Pakete von nicht zu starker Pappe, bis die Mappe eine bestimmte Dicke erreicht hat, die sie nicht überschreiten sollte. Am folgenden Tage werden die Pappepakete ausgewechselt, d. h. man bringt an die Stelle der feucht gewordenen solche, die „strohtrocken“ sind, die am besten über dem Feuer getrocknet wurden und noch warm sein dürfen. Dieses Verfahren hat den großen Vorzug, daß die Pflanzen selbst nicht umgelegt zu werden brauchen, was ziemlich zeitraubend ist und den Pflanzen auch meist nicht zum Vorteil gereicht. Man wird durch dieses einfachere Verfahren in den meisten Fällen ein sehr gutes Resultat erhalten.

Für besondere Fälle merke man, daß man sehr dicke Pflanzenteile halbiert oder von ihnen hinten so viel wegnimmt, als ohne Beeinträchtigung der Vorderansicht möglich ist; so bei dicken Stengeln, Wurzeln, Rhizomen, Knollen, Zwiebeln, Kompositenblütenköpfchen usw. Wenn dabei klebriger Saft auf der Schnittfläche austritt, so bedeckt man diese mit Wachspapier, um das Ankleben am Fließpapier zu verhindern.

Sehr widerstandsfähige Pflanzen, namentlich Sedum-Arten, müssen vor dem Pressen durch Eintauchen in siedendes Wasser oder indem man sie zwischen mehreren Lagen Fließpapier mit einem heißen

Plätteisen überfährt, abgetötet werden, weil sie sonst in der Presse weiterwachsen.

Ein sehr gutes Verfahren, dicke, widerstandsfähige Pflanzen rasch zu trocknen, ist das folgende. Man legt die Pflanzen zwischen mehreren Lagen von Fließpapier auf den Fußboden und tritt auf das Paket mehrere Male fest, aber elastisch, mit dem beschuhten Fuße auf. Dadurch entstehen in der Oberhaut der Fettpflanzen mikroskopische, dem unbewaffneten Auge unsichtbare oder kaum sichtbare Sprünge, durch welche das in der Pflanze massenhaft festgehaltene Wasser beim ferneren normalen Pressen rasch entweicht.

Papaveraceenblüten und andere sehr zarte Blüten, wie z. B. diejenigen der Convolvulaceen, müssen zwischen glatt satiniertem Papier anstatt zwischen Fließpapier getrocknet werden, da die Blumenblätter sonst leicht ausfallen oder am Löschpapier kleben bleiben. Man nimmt entweder für die betreffende Pflanze je einen ganzen Bogen Konzeptpapier oder legt kleine Stückchen davon unter und auf die einzelnen Blüten. Pflanzen, welche beim Trocknen leicht schwarz werden, wie z. B. Melampyrum- und Centaurea-Arten sowie Orchidaceen, werden vor dem Pressen geschwefelt, indem man nach ca. eintägigem Trocknen Schwefeldämpfe in einem fest geschlossenen Raum, event. einer Kiste, ca. eine Stunde lang darauf einwirken läßt. Die hierauf zunächst verschwundenen Farben stellen sich nach mehrtägigem Trocknen in ursprünglicher Frische wieder ein.

Tritt während des Pressens Schimmelbildung an den Pflanzen ein, was jedoch bei regelmäßigem Umlegen und Verwendung ganz trockenen Papiers nicht geschehen sollte, so bepinselt man die Pflanzen mit einer 1%igen spirituösen Sublimatlösung, welcher 5% Glycerin zugesetzt ist.

### Ordnen und Aufbewahren der Pflanzen.

Die völlig getrockneten Pflanzen werden zum Aufbewahren im Herbarium fertig gemacht, indem man sie mit möglichst schmalen, weißen oder farbigen, gummierten Papierstreifen auf der inneren Seite eines Foliobogens befestigt. Man verwende nicht einfache Blätter (halbe Bogen), da sonst die trockenen, mehr oder weniger spröden Pflanzen keinen Schutz haben und leicht beschädigt werden. Zum Aufkleben gummiere man Papier im voraus, indem man es mit Gummilösung (stärker als Mucilago) bestreicht, welcher einige Prozent Sirupus simplex zugesetzt sind; die Streifen schneide man jedoch erst bei Bedarf. An den Fuß des Blattes, auf welchem die Pflanze befestigt ist, schreibe man nach nochmaligem Vergleich mit den Angaben der zum Bestimmen benutzten Flora den lateinischen und deutschen Namen, Klasse und Ordnung nach Linné, natürliche Familie und, wenn nötig, auch Unterfamilie, den Fundort, von welchem die Pflanze entnommen ist, Standortsbeschaffenheit und Fundzeit. Zu diesem Zwecke sind auch Etiketten im Handel, welche diese Angaben für die am häufigsten vorkommenden Pflanzen aufgedruckt tragen. Solche sind von Emil Fischer in Oskar Leiners Verlag erschienen;

*Syngenesia*  
*Superflua.*

*Compositae*  
*Tubuliflorae.*



*Tussilago farfara* L.  
Gemeiner Huflattich.

Ufer der Panke hinter Pankow. 15. April 1898.

Abb. 8. Beispiel für die Ausstattung eines Herbariumbogens.

da eine große Anzahl von Etiketten jedoch dennoch geschrieben werden muß, so erreicht man auch durch jene nicht das gleichmäßige Aussehen, das man vielleicht wünscht. Um das Ordnen zu erleichtern, empfiehlt es sich, am besten oben in der Ecke die Familie und in der anderen Ecke die Linnésche Klasse und Ordnung zu wiederholen. Ein solches Blatt würde dann wie Abb. 8 aussehen.

Befindet sich ein Herbarium noch in den ersten Anfängen, so ist es zweckmäßig, dasselbe vorläufig nach Linné zu ordnen. Hat man jedoch erst einige Hundert Pflanzen beisammen, so muß man daran gehen, seine Schätze nach einem natürlichen System einzureihen. Hierzu ist es erforderlich, sich stets nur eines und desselben Buches zu bedienen; man wähle dazu möglichst sogleich eine der umfangreicheren Floren, nicht eine Spezialflora.

Beim Einreihen der Pflanzen bringe man zunächst die Arten einer Gattung zusammen in einen Gattungsbogen, welcher von demselben (Konzept-)Papier sein kann, wie die Art-Bogen. Als Familienbogen hingegen wähle man ein anderes Papier, entweder blaue Aktendeckel oder Packpapier. Man bezeichne Gattungs- und Familienbogen auf der Außenseite entsprechend und bringe die letzteren mit ihrem Inhalte dann in die dafür bestimmten Mappen unter. Am geeignetsten ist es, Mappen zu verwenden, welche aus zwei mit Band durchgezogenen Pappdeckeln bestehen, so daß ihr Umfang sich beliebig erweitern und verengern läßt. Auch Pflanzenalben zum Einkleben der gepreßten Pflanzen existieren im Handel, sind aber absolut nicht zu empfehlen.

Die gesammelten Pflanzen können nun ihre Bestimmung, fortgesetzt zu Anschauungszwecken zu dienen, erfüllen, und sie tun dies am erfolgreichsten, wenn man sie recht häufig einer Durchsicht unterzieht. Dabei schützt man das Herbarium auch am sichersten vor seinen Feinden: den Schimmelpilzen und einigen Insekten, wie dem Kräuterdieb, dem Brotbohrer und der Staublaus. Schimmelpilze beseitigt man, wie oben bereits erwähnt, durch Bepinseln mit Sublimatlösung; da das Auftauchen jener ein Zeichen von Feuchtigkeit ist, so empfiehlt es sich, die ganze Mappe mit ihrem Inhalt in solchem Falle im Trockenschranke nachzutrocknen. Tiere aller Art, welche in Pflanzensammlungen auftauchen, tötet man am zuverlässigsten, indem man die betreffende Mappe mit ihrem Inhalt in eine Kiste bringt, in welcher ein Schälchen mit Schwefelkohlenstoff (feueregefährlich!) aufgestellt ist. Man beläßt die Pflanzen einige Tage in der gut verschlossenen Kiste. Will man den Schwefelkohlenstoff geruchlos machen, so schüttelt man ihn vor der Anwendung mit 1<sup>o</sup>/iger Sublimatlösung oder mit Bleisuperoxyd. Seine Wirksamkeit wird durch beide Mittel nicht beeinträchtigt.

## Studium der Pflanzenanatomie.

Das Studium der Pflanzenanatomie muß in der Hauptsache der späteren Ausbildung des Pharmazeuten an der Hochschule oder an der Universität vorbehalten bleiben. Mit dem Gebrauch des Mikro-

skops aber sollte man sich bereits während der Lehrzeit einigermaßen vertraut machen, um einen Einblick in die anatomischen Strukturverhältnisse der Pflanzen ganz im allgemeinen und die zum Verständnis derselben nötige Föhlung zwischen den Beschreibungen der Lehrbücher und der praktischen Anschauung zu gewinnen.

Von diesem Gesichtspunkte allein ist die nachstehende kurze Anleitung zum Gebrauche des Mikroskops, zur Herstellung mikroskopischer Schnitte und zur Behandlung mikroskopischer Präparate zu betrachten. Zur gedeihlichen Inangriffnahme des pflanzenanatomischen Studiums wird die persönliche Anleitung eines erfahrenen Hochschullehrers stets unbedingt erforderlich sein.

### Gebrauch des Mikroskops.

Während die Lupe (auch einfaches Mikroskop genannt) von dem durch sie betrachteten Gegenstande ein Bild entwirft, welches in gleicher Lage des Gegenstandes, aber vergrößert, vom Auge empfunden wird (scheinbares, virtuelles Bild), entwirft die dem Objekt zugekehrte Linse (Objektiv, Abb. 9 *Ob*) des zusammengesetzten Mikroskops ein verkehrtes und vergrößertes reelles Bild, welches durch die dem Auge zugewendete Linse (Okular, Abb. 9 *Oc*) wie durch eine Lupe betrachtet wird und infolgedessen nochmals vergrößert als scheinbares (virtuelles) Bild eines umgekehrten reellen Bildes sich darstellt. (Näheres hierüber vergl. im physikalischen Teil der „Schule der Pharmazie“.) Alle Bilder erscheinen unter dem zusammengesetzten Mikroskop daher verkehrt, d. h. rechts und links, vorn und hinten ist vertauscht; das Präparieren eines Gegenstandes unter dem zusammengesetzten Mikroskop ist deshalb selbst bei Anwendung der allerschwächsten Vergrößerungen anfangs ganz unmöglich und läßt sich erst nach langer Übung erlernen. Ist ein Präparieren erforderlich, so bedient man sich einer feststehenden Lupe (sogen. Präparier-Mikroskop, Abb. 5).




Abb. 9. Mikroskop. *F* Fuß, *T* Objektisch, *O* Objektischöffnung, *B* Blende, *Sp* Spiegel, *K* Klemmen, *M* Mikroskopssäule, *Mm* Mikrometerschraube, *H* Hülse, *Tb* Tubus, *Ob* Objektiv, *Oc* Okular.

Das zusammengesetzte Mikroskop, Abb. 9, besteht aus einem feststehenden Teil, dem Stativ, und dem darin beweglichen Teil, dem Tubus oder der Mikroskopröhre mit den Linsen.

Der Fuß *F* pflegt bei den heutigen Mikroskopen gewöhnlich hufeisenförmig zu sein. Er trägt den Objektisch *T*, in dessen Mitte sich eine Öffnung *C* befindet. Auf den Objektisch wird das Objektgläschen (Objektträger) so gelegt, daß sein Objekt in der Mitte der Öffnung sich befindet, wo es durch den Spiegel *Sp* von unten her durchleuchtet wird. Der Spiegel ist nach allen Richtungen verstellbar, um dem Lichte zugewendet werden zu können. Planspiegel und Hohlspiegel sind meist vereinigt. Ein größerer oder geringerer Helligkeitsgrad wird durch Erweiterung oder Verengung der Objektischöffnung mittelst der Blende *B* erzielt. Zur etwa nötigen Festhaltung des Objektträgers dienen zwei einzusetzende Klammern *K*.

Auf der dem Mikroskopierenden zuzuwendenden Seite des Mikroskops erhebt sich über dem Objektisch die Mikroskopsäule *Ms*. In ihr befindet sich ein Triebwerk, welches die feine Einstellung des Tubus bewirkt und durch die Mikrometerschraube *Mm* geregelt wird. Die grobe Einstellung bewirkt man bei den meisten einfacheren Instrumenten mit der Hand, indem man in der Hülse *H* den Tubus *Tb* durch Schieben oder etwas drehendes Schieben hebt und senkt.

Um das Objektiv zu wechseln, entfernt man den Tubus anfangs stets aus der Hülse. (Nur bei komplizierteren Instrumenten, welche zu diesem Zwecke sogenannte Revolverapparate besitzen, ist dies nicht nötig.) Man hebt zunächst das Okular aus dem Tubus und dreht diesen dann um, indem man das Objektiv zwischen die Finger der ruhenden linken Hand nimmt und mit der rechten Hand durch drehende Bewegungen den Tubus aus dem Gewinde des Objektivs löst. Umgekehrt verfähre man nicht, auch nicht beim Einschrauben der Objektive, denn der in der linken Hand ruhende Gegenstand ist dem Herunterfallen nicht ausgesetzt; daß ein Fallen dem wertvollen und leicht zu beschädigenden Objektiv nachteiliger ist als der Mikroskopröhre, welche nur aus einem Messingzylinder besteht, liegt auf der Hand.

Will man einen auf einem Objektträger liegenden und von einem Deckgläschen bedeckten, durchsichtigen oder durchscheinenden Gegenstand betrachten, so legt man ihn auf die Mitte des Objektisches, versieht den Tubus in angegebener Weise mit einem schwachen Objektiv und schiebt ihn unter leicht drehender Bewegung in die Hülse, jedoch nicht zu weit, hinein. Darauf faßt man mit beiden Händen an den Spiegel des Mikroskops und verschiebt ihn, während man von oben durch den Tubus blickt, so lange, bis ein schönes gleichmäßiges Licht durch die Mikroskopröhre fällt. Nun setzt man ein schwaches Okular auf und sucht, mit einem Auge durch das Okular sehend, durch leichtes Heben und Senken des Tubus mit der rechten Hand denjenigen Abstand der Objektivlinse vom Objekt auf, welcher nötig ist, um ein deutliches Bild zu erhalten. Vermag man die Umrisse des Bildes erst deutlich zu erkennen, so legt man die

linke Hand an die Mikrometerschraube *Mm* und sucht durch Hin- und Herdrehen die Einstellung zu finden, welche das genaue Erkennen der Einzelheiten im mikroskopischen Bilde ermöglicht.

Bei schwachen Vergrößerungen ist der erforderliche Abstand zwischen Objekt und Objektiv größer, bei starken Vergrößerungen oft außerordentlich gering, und es ist in diesen Fällen größte Vorsicht geboten, um nicht Objekt und Objektiv durch unvorsichtiges Aufstoßen zu beschädigen.

Man betrachtet das Objekt, indem man beide Augen offen hält und mit einem derselben, am besten mit dem linken (namentlich, wenn man das Objekt auf ein danebengelegtes Papier zeichnet), durch das Okular in die Mikroskopröhre sieht. Anfangs sieht man Objekt und Umgebung gleichzeitig, aber bald gewöhnt man sich, die Aufmerksamkeit so auf das mikroskopische Bild zu richten, daß das der Umgebung gar nicht mehr zum Bewußtsein kommt. Die linke Hand läßt man an der Mikrometerschraube liegen, um durch mäßiges Bewegen derselben höhere und tiefere Schichten des Objektes in das Gesichtsfeld zu rücken. Mit der rechten Hand bewegt man zunächst den Objektträger hin und her, um alle Teile des Präparates in das Gesichtsfeld zu bekommen und denjenigen Punkt auszusuchen, welcher für die nähere Betrachtung ausersehen sein soll. Um diesen festzuhalten, kann man — es ist dies jedoch meist nicht notwendig — die Klammern *K* auf das Objektglas drücken, ohne jedoch dabei das Deckgläschen zu berühren.

Will man nun einen Teil des Objektes in stärkerer Vergrößerung sehen, so stellt man diesen Punkt zunächst noch mit der schwächeren Vergrößerung genau in die Mitte des Gesichtsfeldes ein, weil bei stärkeren Vergrößerungen das Gesichtsfeld sich verkleinert und daher nur die vorher eingestellten, in der Mitte liegenden Partien mit Sicherheit wieder zu finden sind.




Abb. 10. Mikroskop von E. Leitz-Wetzlar. Stativ Ia mit Abbeschem Beleuchtungsapparat und Irisblende, 3 fachem Revolver, Objekt 3, 6, 8, Okul. 1, 3; Vergröß. 60–550. — Preis 305 Mk. Bei derselben Firma sind auch für einfachere Untersuchungen völlig geeignete Mikroskope schon zum Preise von 80 Mk. erhältlich.

Beim Wechseln der Objektive verfähre man genau wie oben angegeben, entferne zunächst das Okular, ziehe dann den Tubus heraus, nehme das Objektiv in die ruhende linke Hand und drehe den Tubus mit der Rechten. Dann nehme man das neue Objektiv in die Linke, schraube den Tubus in das Gewinde desselben mit der Rechten ein, bringe den Tubus vorsichtig wieder in die Mikroskophülse, setze das Okular wieder auf und verfähre beim Einstellen wie oben; nur hat man mit zunehmender Vergrößerung entsprechend vorsichtiger dabei zu sein.

Starke Okulare werden selten und zwar nur beim Studium bestimmter Einzelheiten im mikroskopischen Bilde verwendet, weil sie das Bild nur auseinanderziehen, ohne weitere Feinheiten zu zeigen. Zunehmende Vergrößerungen erzielt man in erster Linie durch Wechseln der entsprechenden Objektive.

Bei schwachen Vergrößerungen läßt man der Öffnung im Objektive ihre ganze Weite und wendet den Planspiegel zur Beleuchtung an. Bei starken Vergrößerungen wirft man gesammelte Lichtstrahlen mittelst des Hohlspiegels auf das Objekt und wendet dementsprechend, um das übrige (Seiten-) Licht abzublenden, die Blendvorrichtung *B* an. Unter Umständen ist es erwünscht, die Konturen des Bildes durch Schatten zu verdeutlichen, und man stellt zu diesem Zwecke den Spiegel seitlich.

Zur Arbeit wird das Mikroskop am besten auf einem Tische am Fenster oder in der Nähe des Fensters aufgestellt. Die geeignetste Lichtquelle ist das von weißen Wolken zurückgeworfene Sonnenlicht. Hingegen sind direktes Sonnenlicht und nicht abgeblendetes Lampenlicht beim Mikroskopieren unbrauchbar und für das Auge höchst schädlich. Ist man gezwungen, bei Licht zu arbeiten, so nimmt man am besten Gasglühlicht und läßt die Strahlen durch eine Schusterkugel mit blauer Farblösung auf den Spiegel fallen.

Während früher Mikroskope sehr teuer waren, sind jetzt solche von den besten deutschen Fabriken (*Leitz-Wetzlar*, *Zeiß-Jena*, *Himmeler-Berlin* etc.) zu sehr mäßigen Preisen erhältlich. Es ist obenstehend ein Mikroskop (mit Preisberechnung) dargestellt, welches allen Anforderungen genügen dürfte und das nach Anschaffung eines oder einiger stärkerer Systeme auch zu Bakterienuntersuchungen etc. verwendet werden kann (Abb. 10).

### Herstellung mikroskopischer Schnitte.

Wenn man einzelne Zellen (z. B. *Lycopodium*sporen, Blütenstaub) oder wenigzellige Gebilde (z. B. Hopfendrüsen, Kamala) mikroskopischer Betrachtung unterziehen will, so genügt es, diese in geringer Anzahl in einem Tropfen Wasser auf den Objektträger zu bringen und mit einem Deckgläschen zu bedecken. Der Zusatz eines der weiter unten genannten Aufhellungsmittel genügt dann, um diese Objekte zur mikroskopischen Beobachtung geeignet zu machen.

Kommt es darauf an, aus komplizierten, zusammengesetzten Gewebeformen nur die einzelnen Gewebe-Elemente nach ihrem Aus-

sehen kennen zu lernen, so schabt man von dem Objekte kleine Teilchen ab, bringt sie in einen auf dem Objektträger befindlichen Tropfen Wasser und zerzupft jene, nachdem sie gehörig aufgeweicht, mit zwei Präpariernadeln. Liegen verholzte Elemente vor, so kocht man das Schabsel unter dem Abzug in einem Reagensglase mit konzentrierter Salpetersäure unter Zusatz von chlorsaurem Kali und wäscht die jetzt isolierten Elemente durch Dekantieren mit Wasser aus, bevor man sie auf den Objektträger bringt.

Wesentlich größere Schwierigkeiten macht es, Teile eines Zellgewebes so zur Beobachtung zu bringen, daß aus dem gewonnenen Bilde die Lage und Anordnung der einzelnen Gewebeelemente deutlich hervorgehen, und noch schwieriger ist es, gleichzeitig auch die

Inhaltsbestandteile der einzelnen Zellen zu beobachten und zu studieren. Man bedarf dazu außer den beim Pflanzenbestimmen bereits genannten Instrumenten, wie Nadeln, Skalpell, Schere und Pinzette, des hauptsächlichsten Werkzeugs für den Pflanzenanatomien, des Rasiermessers und vielleicht auch

eines Glättemessers. Auch diese Instrumente sind zu Bestecken zusammengestellt käuflich (Abb. 11).

Zweckmäßig ist es, von Rasiermessern zwei gute Exemplare in Gebrauch zu haben, nämlich eines mit Keilklinge für harte Objekte (Rinden, Hölzer) und eines mit hohlgeschliffener Klinge für zarte Gegenstände (frische krautige Stengel, Blüten usw.). Die Schnittführung mit dem Rasiermesser hat derart zu geschehen, daß man die Klinge mit ihrem unteren Ende flach auf einer frischen, glatten Schnittfläche (nicht am Rande!) des in der linken Hand gehaltenen Objektes auflegt und sie dann unter möglichst geringer Steilstellung langsam und gleichmäßig, ohne abzusetzen, darüber hinzieht (Abb. 12).

Um eine ruhige Haltung beider Arme zu erzielen, legt man beide Ellbogen auf den Tisch auf. Ein Druck des Rasiermessers auf das Objekt oder nach vorn ist zu vermeiden. Bei den meisten Objekten, insonderheit bei solchen von saftiger Beschaffenheit, ist es




Abb. 11. Mikroskopisches Besteck von E. Leitz-Wetzlar.  
(Preis 13,75 Mk.)

erforderlich, daß die Klinge des Rasiermessers befeuchtet ist. Von der Dünne des Schnittes hängt seine Brauchbarkeit für die mikroskopische Beobachtung ab, und diese Prozedur bedarf einer nicht geringen Geschicklichkeit, welche man sich durch Übung jedoch leicht aneignet. Jedenfalls lasse man sich durch eine Anzahl zuerst ohne Zweifel mißlingender Versuche nicht entmutigen. Daß ein Schnitt zu dünn werden könnte, braucht der Anfänger jedenfalls niemals zu befürchten.

Viel kommt darauf an, daß man über die Richtung der Schnittführung genau orientiert ist. Denn es ist begreiflicherweise nötig, wenn man sich eine klare Vorstellung von der Beschaffenheit eines Gewebes machen will, daß man sich dasselbe aus dem Querschnittsbilde und dem Längsschnittsbilde konstruieren muß. Trifft man




Abb. 12. Schnittführung beim Anfertigen mikroskopischer Schnitte.

aber die Richtung nicht genau, so ist es nicht möglich, aus den gewonnenen Bildern sich eine klare Vorstellung zu machen. Man ersieht dies deutlich an dem Beispiele Abb. 13. Man wird daraus auch erkennen, daß es häufig notwendig ist, zwei verschiedene Längsschnitte zu machen, nämlich einen in der Richtung des Querschnittradius und einen in der Richtung der Querschnitt-Tangente. In Abb. 13 *a* (ein Stück Fichtenholz) stellt die obere Fläche den Querschnitt des keilförmigen Holzstückes dar, die Fläche links ist die Radialschnittfläche, diejenige rechts ist die Tangentialschnittfläche. In Abb. 13 *b* ist aus den drei Bildern, welche dünne Scheiben der genannten drei Schnittflächen bei hundertfacher Vergrößerung unter dem Mikroskop zeigen, das Bild rekonstruiert, welches ein Teil jenes Fichtenholzstückes ergeben würde, wenn es direkt mit dem Mikroskop betrachtet werden könnte. Man ersieht ohne weiteres, daß, wenn beispielsweise der Radialschnitt nicht genau senkrecht (in der Richtung der Wachstumsachse) geführt worden wäre, eine Menge nebeneinander liegender Zellreihen angeschnitten sein würde, und man wird begreifen, daß auf diese Weise eine klare

Vorstellung des anatomischen Baues nicht erhalten werden kann. Mit bloßem Auge oder, wenn nötig, mit Hilfe der Lupe wird man sich jedoch jederzeit leicht vergewissern können, ob die Schnittführung annähernd der gewünschten Richtung entspricht. Man muß auch stets eine größere Anzahl Schnitte nebeneinander anfertigen, ehe man mit der Untersuchung beginnt, und findet dann unter dem Mikroskop mit Hilfe einer schwachen Vergrößerung bald, welcher von jenen für das Studium am geeignetsten ist.

Will man Schnitte durch kleine oder dünne Gegenstände anfertigen, so muß man sich in verschiedener Weise helfen, um die Objekte in eine solche Form zu bringen, daß sie sich in der Hand festhalten lassen und dem Messer hinreichenden Widerstand entgegenzusetzen. Blätter klemmt man, mehrfach übereinander gelegt oder seitlich zusammengefaltet oder zusammengerollt, zwischen zwei Holundermark- oder Korkhälften ein, kleine Samen bettet man in ein Stück Paraffin, indem man mit einer erwärmten Nadel darin eine Höhlung bereitet und das Objekt im verflüssigten Paraffin erstarren läßt.

Auch müssen die Objekte überhaupt eine zum Schneiden geeignete Konsistenz haben. Trockene Pflanzenteile bröckeln meist, wenn sie nicht vorher in Wasser oder verdünnter Kalilauge, in Glycerinwasser oder aber in verdünntem Ammoniak aufgeweicht sind; frische, sehr saftige und weiche Objekte hingegen müssen zuvor durch Einlegen in mäßig starken Alkohol gehärtet werden.

Um die erhaltenen Schnitte von dem Rasiermesser auf den Objektträger zu übertragen, nimmt man sie von der feuchten oder, wenn nötig, nachträglich noch mit einem Tropfen Wasser zu befeuchtenden Klinge durch Berührung mit der Präpariernadel, an welcher der feuchte Schnitt leicht hängen bleibt, herunter und taucht dann die Nadelspitze mit dem Schnitt in einen auf die Mitte des Objektträgers vermittelst eines Glasstabes gebrachten Tropfen Wassers. Wenn nötig, nimmt man zum Übertragen einen feinen Haarpinsel zu Hilfe. Meist wird man mehrere Schnitte in denselben Wassertropfen nebeneinander auf diese Weise übertragen. Dann




Abb. 13. Querschnitt, Radialschnitt und Tangentialschnitt durch Fichtenholz, a in natürlicher Größe, b ein Teil davon in 100facher Vergrößerung. (R. Hartig.)

nimmt man ein sorgfältig geputztes Deckgläschen, legt es mit einer Kante auf und läßt es dann hinabsinken. Etwa vorhandene und die Beobachtung störende Luftblasen entfernt man durch vorübergehendes Übertragen der Schnitte in absoluten Alkohol. So ist das Objekt vorläufig für eine orientierende Betrachtung bei mäßiger Vergrößerung fertig.

Zur Bequemlichkeit stellt man, wenn man in dieser Weise am Mikroskop arbeitet, vor sich ein Glas mit Wasser für zu reinigende und bereits gebrauchte Objektträger, daneben ein Schälchen mit Wasser zur Aufnahme der Deckgläschen und endlich womöglich ein Glas mit filtriertem destilliertem Wasser nebst einem zugespitzten Glasstabe zum Befeuchten der Objekte und des Messers. Ein reines weiches Wischtuch muß jederzeit zur Hand sein zum Reinigen der Gläschen und der Instrumente. Daß das Mikroskop und alle Instrumente vor dem Weglegen auf das sorgfältigste gereinigt, namentlich letztere völlig trocken gerieben sein müssen, braucht kaum erwähnt zu werden.

### Behandlung mikroskopischer Präparate.

Das auf dem Objektträger zunächst in einem Tropfen Wasser befindliche, gelungene Präparat beläßt man in solchem, sofern man dasselbe später noch mit Reagentien zu behandeln wünscht. Ist dies jedoch nicht der Fall, so bringt man sogleich mittelst des Glasstabes neben das Deckgläschen einen Tropfen verdünntes Glycerin, so daß diese Flüssigkeit, in demselben Maße, wie das Wasser an den Rändern des Deckgläschens verdunstet, nachziehen kann und das Präparat auf diese Weise nach und nach in Glycerin liegt. Dieses ist dem Verdunsten bekanntlich nicht ausgesetzt und gestattet ohne weiteres ein Aufbewahren des Schnittes für mäßig lange Zeit.

Meist wird man mit dem Präparat einige Reaktionen vorzunehmen haben, und man muß das Einbetten in Glycerin oder in ein anderes Einbettungsmittel so lange aufschieben.

Um eine Streckung der oft geschrumpften Zellwände und gleichzeitig eine Aufhellung des Bildes zu bewirken, setzt man dem Präparat ein schwaches Alkali, meist verdünnte Kalilauge, in der Weise zu, daß man einen Tropfen davon rechts neben das Deckgläschen legt und auf der anderen Seite die Flüssigkeit mit einem Stückchen Fließpapier oder einem ausgedrückten Haarpinsel absaugt. Dies ist die Art und Weise, in welcher man jedes der Reagentien in Anwendung zu bringen pflegt. Da die Grundsätze für die Anwendung von Reaktionsmitteln bei mikroskopischen Präparaten dieselben sind, wie bei chemischen Operationen überhaupt, so muß man natürlich Sorge tragen, daß diese in einer indifferenten Flüssigkeit vorgenommen werden. Will man einen mit verdünnter Kalilauge aufgehellten Schnitt beispielsweise mit Chromsäure behandeln, um die Schichtung der Zellwände deutlicher hervortreten zu lassen, so muß das Alkali zuvor mit Wasser in der angegebenen Weise hinreichend wieder ausgewaschen sein.

Andererseits muß man stets auf die Veränderungen Rücksicht nehmen, welche vorher angewendete Reaktionsmittel an dem Objekte bewirkt haben. Will man also beispielsweise Stärkekörner durch Jodlösung deutlicher sichtbar machen, mit welcher sich jene intensiv blau färben, so darf der Schnitt nicht zuvor mit Alkalien behandelt oder aber erhitzt worden sein, weil dadurch die Stärkekörner gelöst, bezw. verkleistert sein würden.

Die Wirkung der Reagentien auf die Pflanzengewebe und ihre Inhaltsbestandteile kann im Rahmen dieses Buches nicht erörtert werden. Es sei hier nur kurz erwähnt, daß man sich zum Aufhellen der Präparate verdünnter Kalilauge, verdünnten Ammoniaks oder einer Natriumhypochlorit- oder Chloralhydratlösung bedient. Zum Nachweis von Stärke dient Jodjodkaliumlösung (Blaufärbung), zum Nachweis unveränderter Cellulose Chlorzinkjod (Violett-färbung), zum Nachweis verholzter Zellmembranen Phloroglucin und Salzsäure (Rosenrotfärbung), zum Nachweis verkörkter Zellmembranen Chromsäure (Unlöslichkeit), zum Nachweis von Eiweißstoffen Millons Reagens (Rotfärbung), zur Deutlichmachung von Zellkernen Alaunkarmin (Tiefrotfärbung), zum Nachweis von Gerbstoffen Eisenchloridlösung (Grün- oder Blaufärbung) usw. Näheres hierüber muß man, wenn man sich eingehender mit Mikroskopie beschäftigen will, z. B. in Strasburger „kleines botanisches Praktikum“, in Wilhelm Behrens „Leitfaden der botanischen Mikroskopie“ oder in dem bekannten Buche Hager-Mez „Das Mikroskop und seine Anwendung“ nachlesen. Jedenfalls ist bei der Einführung in das mikroskopische Studium überhaupt die Anleitung eines erfahrenen Lehrherrn oder noch besser eines Hochschullehrers unentbehrlich.

In Kürze möge noch eine der Herstellungsweisen für mikroskopische Dauerpräparate beschrieben sein, da die Herstellung von solchen die Freude am Studium sehr zu erhöhen vermag. Hat man einen guten Schnitt, welcher des Aufhebens wert ist, in Glycerin liegen, so kann man ihn, wenn der Rand um das Deckgläschen herum vollkommen trocken und die Glycerinmenge so gering ist, daß das Deckgläschen nicht beweglich darauf schwimmt, sondern fest aufliegt, sogleich einschließen, indem man die Ränder des Deckgläschens derart mit Maskenlack überzieht, daß die Hälfte des Lackstriches auf dem Deckgläschen, die Hälfte auf dem Objektträger liegt. Folgende Vorschrift zur Bereitung von Maskenlack wird empfohlen: 5,0 Terebinthina veneta, 7,5 Kampfer und 40,0 Sandarak werden in 60,0 Spiritus gelöst und mit 10,0 Kienruß nach und nach angerieben. Den Pinsel dazu wäscht man nach jedesmaligem Gebrauch in Spiritus aus und bewahrt ihn unter Spiritus auf.

Da bei der soeben angegebenen Methode des Einschließens in Glycerin große Vorsicht insofern nötig ist, als jede Spur Glycerin, welche sich neben dem Deckgläschen auf dem Objektträger befindet oder welche später etwa durch zufälligen Druck auf das Deckgläschen austritt, die Haltbarkeit des Lackes beeinträchtigt, so empfiehlt

sich mehr noch die Einschließung in Glyzeringelatine; doch hat diese den Übelstand, daß das Objekt nicht in dem erst angefertigten Präparat unter dem Deckgläschen verbleiben kann, sondern in die Gelatinemasse übertragen werden muß. Die Gelatinemasse stellt man sich dar, indem man 7,0 Gelatine in 42,0 destilliertem Wasser erweicht, dann darin durch Erwärmen und unter Zusatz von 50,0 Glycerin löst und endlich 1,0 Acid. carbol. liquefact. hinzusetzt. Einen kleinen Tropfen dieser erwärmten Lösung bringt man auf die Mitte eines erwärmten Objektträgers und überträgt dann in diesen den Schnitt aus Glycerin mittelst einer Nadel. Man läßt hierauf schnell das gleichfalls erwärmte Deckgläschen darauffallen, drückt es leicht an und entfernt nach dem Erkalten die darunter hervor-




Abb. 14. Mikroskopisches Dauerpräparat.

gequollene Gelatine. Den sorgfältig gesäuberten Rand überzieht man zuletzt in oben angegebener Weise mit Maskenlack.

Das sehr vielfach angewendete Einschließen von Präparaten in Kanadabalsam ist für den Anfänger nicht ratsam, da die Objekte vor dem Übertragen in den Balsam meist in mehr oder weniger komplizierter Weise mikrochemisch behandelt werden müssen, um nachträgliche Schrumpfungen oder Trübungen der Präparate zu vermeiden.

Die aufzubewahrenden Dauerpräparate müssen sorgfältig signiert sein. Man bringt zu diesem Zwecke zwei Etiketten auf den beiden Seiten des Objektträgers an, auf welchen die Pflanze, der Pflanzenteil, die Art des Schnittes, das Einbettungsmittel, die etwa mit dem Objekt vorgenommene Reaktion oder Färbung und endlich das Datum der Anfertigung angegeben ist (Abb. 14). Diese Dauerpräparate werden in geeigneten Kartons aufbewahrt, in welchen jeder Druck auf die Deckgläschen vermieden wird, da ein solcher die Präparate verderben könnte. Hierbei sind mappenartige Kartons mit flacher Aufbewahrung der Objektträger bei Präparaten in reinem Glycerin der kastenartigen mit senkrechter Stellung der Objektträger unbedingt vorzuziehen.

# Äußere Gestalt der Pflanzen. Morphologie.

## Die Organe der Pflanzen.

Bei den einfachsten, aus einer einzigen Zelle bestehenden und darum im System an den Anfang gestellten pflanzlichen Gebilden finden wir noch keinerlei Gliederung in Organe, da ein solches aus mindestens einer selbständigen Zelle bestehen, eine ganz besondere Tätigkeit im Leben der Pflanze ausüben und für diese auch ganz besonders eingerichtet sein muß. Wohl aber kann man selbst bei den einzelligen Pflanzen schon eine Arbeitsteilung innerhalb der Zelle beobachten, indem einzelne Bestandteile des Zellenleibes bestimmte Lebensverrichtungen übernehmen.

Auch unter den mehrzelligen Pflanzen finden wir zahlreiche Formen, bei denen die Zellen zwar zu Fäden, Flächen oder Körpern fest vereinigt sind, aber keinen inneren Zusammenhang aufweisen und ihre volle Selbständigkeit gewahrt haben. Auf der nächst höheren Stufe treffen wir dann diejenigen pflanzlichen Organismen, deren Zellen in einem inneren Zusammenhang miteinander stehen und eine biologische Einheit bilden. Bei den einfacheren dieser Formen ist der Körper, der, wie auch bei den früher erwähnten Pflanzen, Thallus genannt wird, noch nicht nach Art der Blütenpflanzen als beblätterter Sproß ausgebildet. Viele unter diesen zeigen an dem Thallus noch keinerlei besondere Gliederung, wohl aber Organe, und nur bei den höher entwickelten finden wir, daß der Thallus in eine Achse und Anhangsorgane gegliedert ist; diese besitzen jedoch nur eine äußere Ähnlichkeit mit den „höheren“ Pflanzen, sind aber im Innern gleichartig gebaut und daher nicht mit ähnlichen Gebilden der höheren Pflanzen zu vergleichen. Alle diese Gewächse faßt man zusammen unter dem Namen Thallophyten, zu denen man nach alter Einteilung die Algen, Pilze und Flechten rechnet.

Ihnen stehen die Kormophyten gegenüber, d. h. die Pflanzen, die echte beblätterte Sprosse aufweisen. Hierher gehören im allgemeinen die Embryophyten, doch ist festzuhalten, daß unter diesen

einige trotz sonstiger Abweichungen durchaus thalloidisch gebaut sind, wie z. B. manche Lebermoose.

Auch unter den Kormophyten kann man eine niedere und eine höhere Ausgestaltung unterscheiden. So besitzen die Moose zwar im großen und ganzen beblätterte Sprosse, tragen jedoch nur Rhizoiden, Wurzelhaare, und entbehren durchaus noch der echten Wurzeln, die wir in der morphologischen Stufenfolge erst bei den Pteridophyten antreffen. Bei diesen können wir, wie bei den noch höher stehenden Phanerogamen, d. h. Blütenpflanzen, zwei grundsätzlich verschiedene




Abb. 15. Keimling einer Dikotyledonee (Phaseolus). *w* Stämmchen (Radicula), aus dem später die Hauptwurzel herauswächst, *st* Knöspschen, *bl* erste Laubblätter, *c* eins der beiden Keimblätter (das andere, obere, wurde entfernt). (C. Müller.)




Abb. 16. Schematischer Längsschnitt einer dikotylen Pflanze. *w* Wurzel, *sw* Seitenwurzeln, *st* Stengel, *bl* Blätter, *v* Vegetationspunkt des Stengels. (Nach Frank und Tschirch.)

Organe unterscheiden: die Wurzel, die unter dem Einfluß der Schwerkraft dem Erdmittelpunkt zustrebt, die Pflanze im Boden befestigt und die anorganischen Nährstoffe aus ihm aufnimmt, jedoch niemals Blattorgane trägt, und den sich aufrecht stellenden beblätterten, assimilierenden und die Fortpflanzungsorgane tragenden Sproß.

Da die Pteridophyten jedoch in zahlreichen Punkten, besonders in der Ausbildung der Fortpflanzungsorgane, von den Blütenpflanzen bedeutend abweichen, so können auch sie bei der Besprechung der Morphologie hier meist nicht berücksichtigt werden.

Es handelt sich also in den folgenden Abschnitten fast ausschließlich um die Lehre von der äußeren Gestalt der Blütenpflanzen oder Phanerogamen.

Wurzel und Sproß sowie die diesem ansitzenden Blätter (vergl. Abb. 15 *w*, *st* und *bl*) sind deutlich meist schon vor der Keimung

am Keimling des Samens zu erkennen; die Anzahl der Keimblätter hat sogar zur Einteilung des Pflanzenreichs Anlaß gegeben.

Bei der Keimung durchdringt zunächst die junge Wurzel, aus dem Stämmchen oder Hypokotyl (auch häufig *Radicula* genannt) (Abb. 15 *w*), hervorbrechend, die Samenschale, dringt senkrecht in den Boden ein und sorgt in später zu erörternder Weise für Wasserzufuhr, damit das junge Pflänzchen, welches zur Zeit noch nicht Nährstoffe aufnehmen und assimilieren kann, mit Hilfe dieses Wassers die Nährstoffe des Samens oder der Keimblätter auflösen und zu seiner Ernährung verwenden kann. Gleichzeitig streckt sich meist das Hypokotyl, und das Knöspchen, das Ende der Sproßachse, Plu-




Abb. 17. *a* Wurzel mit Seitenwurzeln und ansitzenden Wurzelhaaren (10fach vergrößert), *b* Wurzelende (*W*) mit der die Spitze bedeckenden Wurzelhaube (*Wh*) (30fach vergrößert), *c* Querschnitt einer sehr jungen Wurzel mit zentralem Leitbündel (*l*) und ansitzenden Wurzelhaaren (*w*) (70fach vergrößert).

mula genannt (Abb. 15 *st*), richtet sich in die Höhe; die ersten Laubblätter (Abb. 15 *bl*) finden Gelegenheit, sich zu entfalten, und während die Reste des ausgesaugten Samens oder die Keimblätter (*Kotyledonen*, Abb. 15 *c*) in Verwesung übergehen oder vertrocknen, hat sich die junge Pflanze zum getreuen Ebenbild ihrer Mutterpflanze entwickelt.

**Die Wurzel** (Abb. 16 *w*) zeichnet sich nächst ihrem, dem Erdmittelpunkte zugerichteten Wachstum dadurch aus, daß sie fast nie grün gefärbt ist, nie Blätter trägt und daß die zahlreich aus ihr hervorbrechenden Seitenwurzeln (Abb. 16 *sw*) *endogen* entstehen, d. h. im Innern der aus dem Hypokotyl (*Radicula*) hervorbrechenden Hauptwurzel und nicht an der Oberfläche ihren Ursprung haben, wie es bei den Seitenachsen der Stammorgane der Blütenpflanzen der Fall ist. Dies hat seinen Grund darin, daß der Gefäßbündelteil in der Mitte der Wurzelorgane liegt, wie dies in Abb. 16 durch die starke schwarze Mittellinie, die sich weiter oben, im Stamme, teilt, angedeutet ist (vergl. auch Abb. 17 *c*). Hiernach erklärt sich

zugleich, in welcher Weise die Wurzel eine der Hauptaufgaben, welche ihr zufallen, erfüllt. Die Wurzel dient nämlich zwei Aufgaben, einer rein physiologischen und einer rein mechanischen. Der physiologische Zweck ist die Aufnahme von Wasser nebst den darin gelösten mineralischen Bestandteilen, was durch die weiter unten zu beschreibenden Wurzelhaare geschieht; der mechanische Zweck hingegen ist die Befestigung der Pflanze in der Erde. Diesen Zweck erfüllen die Hauptwurzel und ihre zahlreichen seitlichen Verzweigungen mit Hilfe ihres zentral gelegenen, zugfesten Leitbündelzylinders etwa in gleicher Weise, wie zahlreiche Taae oder Kabel bei dem Verankern eines Fahnenmastes.

Bei den Thallophyten und Bryophyten kommen Wurzeln noch nicht vor. Diese werden bei den genannten Pflanzengruppen durch die sog. Rhizoiden ersetzt, einfache oder seltener verzweigte, feine Zellfäden, welche die Funktionen der Wurzeln höherer Pflanzen, Befestigung im Boden und teilweise auch Ernährung der Pflanze, ausüben.

Da die echten Wurzelorgane fortgesetzt an ihrer Spitze im Boden fortwachsen, so würden ihre sehr zarten Vegetationspunkte (d. h. diejenigen Punkte, an denen das Wachstum vor sich geht, vergl. unter Anatomie) Verletzungen durch Steine und dergl. ausgesetzt sein, wenn sie nicht durch eine darüber gebreitete Wurzelhaube geschützt wären (Abb. 17 *b*, *Wh*).

**Der Sproß** (Abb. 16 *st*), dessen Wachstumsrichtung, wie schon erwähnt, derjenigen der Wurzel im Prinzip entgegengesetzt ist, ist in der Regel grün gefärbt und kann sowohl Blattorgane als auch seitliche Wurzelorgane (Adventivwurzeln) entwickeln. Obgleich als Grenze zwischen Wurzel und Sproß von jeher diejenige Stelle angesehen worden ist, in welchem die aufstrebende und die absteigende Wachstumsrichtung zusammentreffen, so hat man doch früher häufig den Irrtum begangen, die unter der Erde liegenden Stammstücke (Rhizome) infolge ihres Vermögens, Seitenwurzeln zu bilden, fälschlich als Wurzeln zu bezeichnen. — Der Vegetationspunkt des Sprosses (Abb. 16 *v*) ist von keiner Haube bekleidet wie derjenige der Wurzel. Schutz vor Verletzung gewähren ihm die darüber sich zusammenwölbenden Anlagen der jungen Blätter, wie dies aus Abb. 16 ersichtlich ist.

Am Sproß unterscheidet man leicht zwei meist sehr scharf gekennzeichnete Teile, die Sproßachse oder den Stamm und die Seitenorgane darstellenden Blätter. Letztere werden unterhalb des Vegetationspunktes, sei es des Hauptstammes oder seitlicher Stammorgane, durch Höckerbildung ausgegliedert und zwar in der Weise, daß stets das dem Scheitel am nächsten stehende Blatt das jüngste ist. Die Blätter haben, wie die seitlichen Stammorgane, ihren Ursprung an der Oberfläche und nicht im Innern des Stammes, wie dies in Abb. 16 durch die dunkle Linie, welche den sich in die Blätter verzweigenden Leitbündelstrang darstellt, angedeutet ist. Sie entstehen also exogen. Unter den Blattorganen sind keineswegs allein die gewöhnlich mit diesem Namen belegten grünen Laubblätter zu verstehen, sondern es

gehören hierhin u. a. auch farblose und dunkle Knospenschuppen, sowie die Kelchblätter, Blumenblätter, Staubblätter und Fruchtblätter, d. h. alle Organe der Blüte.

### Formen der Wurzel- und Stammorgane.

Die Hauptwurzel, deren die Pflanze nur eine einzige besitzt, entwickelt durch Verzweigung meist zahlreiche Seiten- oder Neben-




Abb. 18. Ästige Wurzel der Malve, *Malva rotundifolia*, a Pfahlwurzel, r Nebenwurzeln, f Faserwurzeln, b Stängel.



Abb. 19. Pfahlwurzel von *Taraxacum officinale*, a Basalstücke der Blätter u. Blütenstände, b Stammteil.




Abb. 20. Faser- oder Büschelwurzeln der Gerste, *Hordeum hexastichum*.

wurzeln (Abb. 18). Ist die Hauptwurzel sehr stark ausgebildet, so nennt man eine solche Form Pfahlwurzel (Abb. 19). Bleibt die Hauptwurzel jedoch in der Ausbildung hinter den Nebenwurzeln zurück, wie dies bei den meisten Monokotylen der Fall ist, so spricht man von Faser- oder Büschelwurzeln (Abb. 20).

Nach ihrem Aussehen nennt man die Hauptwurzel fädlich, kegelförmig (Abb. 21 a), spindelförmig (Abb. 21 b), walzig, zylindrisch, rübenförmig (Abb. 21 c) oder kugelig.

Nach ihrer Härte bezeichnet man sie, übereinstimmend mit ihrem innern Bau, als holzig oder fleischig. Die fleischigen Wurzeln dienen meist als Speicherapparate, besonders bei Pflanzen mit überwinterten Wurzeln und jährlich absterbendem Kraut. Solche Organe sind meist knollig verdickt und stellen häufig auch Mittelglieder zwischen Stamm- und Wurzelorganen dar (Wurzelknollen, Abb. 22, 23 und 24).




Abb. 21. a Kegelförmige Wurzel der Möhre, *Daucus carota*, b spindelförmige Wurzel, c rübenförmige Wurzel des Rettichs, *Raphanus sativus*.

Die Luftwurzeln, z. B. der Orchidaceen und Araceen, welche in erster Linie dazu bestimmt sind, Wasser aus der Luft aufzunehmen, die Haftwurzeln, z. B. des Efeus (Abb. 25 A) und der Vanille, welche nur der Befestigung dienen, indem sie sich an andere Gewächse äußerlich anklammern oder in Ritzen von Mauern und dergleichen eindringen, ferner die besonders bei tropischen Feigenbäumen




Abb. 22. *Orchis militaris*. A Knollen einer blühenden Pflanze, B dieselben längs durchgeschnitten ( $\frac{1}{4}$ ) a alte, vorjährige Knolle, j. Kn junge diesjährige Knolle, die nächstes Jahr die blühende Pflanze B, K zur Entwicklung bringen wird.

vorkommenden Stützwurzeln, die den Mangrovepflanzen eigentümlichen Stelzwurzeln, weiter die bei manchen Sumpfpflanzen auftretenden, negativ geotropischen Atemwurzeln, die bei manchen Orchidaceen vorkommenden, Chlorophyll führenden und die Blätter ersetzenden Assimilationswurzeln, endlich die Saugwurzeln der Schmarotzergewächse, die die befallene Wirtspflanze aussaugen (Abb. 25 B und C), indem sie in das Gewebe derselben eindringen und sich an die Gefäßbündel anlegen, sind weitere besondere Formen der Wurzel.




Abb. 23. Wurzelknollen von *Gymnadenia odoratissima*, a Mutterknolle, b Tochterknolle.

An den Stammorganen (Achsen, Kaulomen, Stengeln) entstehen Seitenachsen stets nur in den Achseln von Blättern (Tragblättern), an den sogenannten Knoten, wie man die Stellen des Stengels nennt, an denen Blätter ansitzen. Die dazwischen liegenden Stengelglieder heißen Internodien. Stammorgane erkennt man als solche, selbst wenn sie unter der Erde kriechend gefunden werden, auch wenn eigentliche Blätter nicht mehr vorhanden sind, stets an den Ansatzstellen oder Narben von Blättern, welche den Wurzeln ausnahmslos fehlen. Die meistens unterirdischen, manchmal auch der Erde oberflächlich aufliegenden Stengelorgane treten in mannigfachen Formen auf, z. B. als Ausläufer oder Stolonen (Abb. 26), das sind lange und dünne, schnell wachsende, kriechende und mit sogenannten Niederblättern versehene Stengel, ferner als

Wurzelstöcke oder Rhizome, das sind meist kurze, dicke und langsam wachsende, zuweilen hinten absterbende Stengelorgane, z. B. bei *Polygonum bistorta* (Abb. 27), *Veratrum album* (Abb. 28) und




Abb. 24. Wurzelknollen von *Aconitum napellus*, *A* Mutterknolle, *B* Tochterknolle, *k* Knospe, *a* Verbindungsglied zwischen Mutter- und Tochterknolle, *sr* Stengelrest.




Abb. 25. *A* Haftwurzeln des Efeus, *Hedera helix*, *B*, *C* Kleeseide, *Cuscuta europaea*, um eine Wirtspflanze (*N*) herum windend, die Saugwurzeln (*S*) zeigend, *C* die Saugwurzeln (*S*) des Stengels stärker vergrößert.

*Cicuta virosa* (Abb. 29), als Knollen, z. B. die Kartoffeln, welche den Wurzelknollen (siehe oben) in Form und Zweck gleichkommen, als Zwiebelknollen, z. B. *Tubera Colchici* (Abb. 30), das sind




Abb. 26. Ausläufer der Erdbeere, *Fragaria vesca*.

Verdickungen, an welchen sich neben dem Stengel ein oder mehrere Niederblätter beteiligen, und endlich als Zwiebeln (Abb. 31). An diesen letzteren beschränkt sich der Stengelteil auf ein tellerförmiges Gebilde, Zwiebelkuchen genannt (Abb. 31*d*), am Grunde der




Abb. 27. Schlangenförmig gewundenes, hinten absterbendes Rhizom von *Polygonum bistorta*.




Abb. 28. *Veratrum album*. *A* Längs-, *B* Querschnitt durch das Rhizom. ( $\frac{1}{4}$ .) *infl* Stelle der diesjährigen, verblühten Pflanze, *kn* Knospe der nächstjährigen, *wu* Wurzelreste, *cent* Zentralzylinder, *end* Endodermis, *ri* Rindenschicht, *ge* Leitbündel.




Abb. 29. Quergefächertes Rhizom des Wasserschierlings, *Cicuta virosa*, längsdurchschnitten.




Abb. 30. Zwiebelknolle der Herbstzeitlose, *Colchicum autumnale*, *a* von dem Niederblatt befreit, *b* querdurchschnitten, mit dem Stengelquerschnitt *c*.




Abb. 31. Eine Zwiebel längsdurchschnitten, *t* Stengelteil oder „Zwiebelkuchen“, *v* die Niederblätter, *l* die Zwiebelknospe, *b* Seitenknospen, *r* Wurzeln.

Zwiebel, während die sogenannten Zwiebelhäute fleischig gewordene Niederblätter (s. S. 37 und Abb. 31/) und demnach Blattorgane sind. Während also bei den Ausläufern die Internodien gestreckt entwickelt sind, sind sie bei der Zwiebel auf das äußerste verkürzt (unentwickelt), die Blätter mithin auf eine mehr breite als lange Stammachse zusammengestaucht.

### Verzweigung.

Die Verzweigung sowohl des Stengels, als auch der Wurzel folgt bestimmten Gesetzen. Teilt sich der Vegetationspunkt in zwei Vegetationspunkte, die in ihrer weiteren Entwicklung einander gleichen, so erhalten wir die *dichotomische Verzweigung*, wie sie besonders bei manchen Thallophyten, sowie Moosen und Farnen vorkommt. Behält jedoch der Vegetationspunkt seine ursprüngliche Richtung unverändert — ohne sich zu teilen — bei und gibt er nur seitliche Organe ab, so entsteht die *monopodiale Verzweigung*.




Abb. 32. Formen der dichotomen Verzweigung.




Abb. 33. Formen der monopodialen Verzweigung. *M* racemöse Verzweigung, *S* cymöse Verzweigung.

Die *dichotomische Verzweigung* wird *gabelig* genannt, wenn die beiden bei der Verzweigung entstandenen Sprosse sich gleichmäßig entwickeln (Abb. 32, 1), *schraubelähnlich*, wenn bei fortgesetzter dichotomischer Verzweigung sich stets der nach der einen Seite liegende Sproß kräftiger entwickelt als der andere (Abb. 32, 3), *wickelähnlich*, wenn abwechselnd der eine und dann wieder der andere Sproß kräftiger auswächst (Abb. 32, 2).

Eine *monopodiale Verzweigung* heißt *racemös*, wenn der aus dem Vegetationspunkt hervorgehende Hauptsproß sich stets stärker entwickelt als die Seitensprosse (Abb. 33 *M*), dagegen *cymös*, wenn sich die Seitensprosse kräftiger ausbilden als der Hauptsproß

(Abb. 33 S). Ist bei dieser cymösen Verzweigung mehr als ein Seitenzweig entwickelt, so entsteht bei regelmäßiger Ausbildung von zwei Seitenzweigen das Dichasium, von mehreren das Pleiochasium; kommt dagegen stets nur ein Seitensproß vor, so entsteht das Monochasium oder Sympodium. Dieses wird Schraubel genannt, wenn die Seitensprosse fortlaufend alle auf derselben Seite des Hauptsprosses auftreten, Wickel, wenn sich jene abwechselnd rechts und links vom Hauptsproß bilden (Abb. 33 S).

Es ist in manchen Fällen recht schwer, die wahre Natur der Verzweigungen festzustellen.

### Symmetrieverhältnisse.

Läßt sich irgend ein Pflanzenkörper durch mindestens drei Längsschnitte in spiegelbildlich gleiche Hälften zerlegen, so ist er radiär (aktinomorph, multilateral) gebaut; ist jenes nur durch zwei Längsschnitte möglich, so wird er bisymmetrisch, nur durch einen Längsschnitt, dann monosymmetrisch (zygomorph, symmetrisch) genannt. Solche Pflanzenkörper, die nach keiner Richtung hin in zwei spiegelbildlich gleiche Hälften zerlegt werden können, sind unsymmetrisch. Pflanzenorgane, bei denen die rechte und linke Seite spiegelbildlich gleich, aber deren andere Seiten, d. h. Ober- und Unterseite oder Vorder- und Hinterseite, ungleich ausgebildet sind, werden bilateral genannt. Diese sind gewöhnlich, aber nicht immer, auch dorsiventral, d. h. ihre Rücken- und Bauchseite sind verschieden ausgebildet. Sie lassen sich höchstens durch einen Schnitt in spiegelbildlich gleiche Hälften teilen.

### Formen der Blätter.

Blätter sind an der Pflanze in den verschiedensten Formen vorhanden. Man unterscheidet:

Keimblätter,  
Niederblätter,  
Laubblätter,  
Hochblätter,  
Blütenblätter.

Letztere sind die speziellen Organe der Blüte. An den Blättern selbst unterscheidet man drei Teile, und zwar (Abb. 34):

die Blattscheide oder Vagina,  
den Blattstiel oder Petiolus,  
die Blattspreite oder Lamina.

Letztere kann ganz oder geteilt sein. Der Blattstiel und die Blattscheide fehlen häufig.

**Keimblätter** oder **Kotyledonen** sind die im Samen am Keimling bereits vorhandenen Blätter, welche bei den Monokotylen (Abb. 35) einzeln, bei den Dikotylen (Abb. 36 und 37) zu zweien und bei manchen Nadelholzarten (Abb. 38) zahlreich vorhanden sind. Sie sind dünnhäutig (Abb. 37c) oder fleischig (Abb. 36) und enthalten

im letzteren Falle selbst die Reservestoffe für die erste Ernährung des Keimlings, oder aber sie besorgen zu dem gleichen Zwecke in




Abb. 34. Schematische Zeichnung eines vollkommenen Blattes; sch Blattscheide, st Blattstiel, sp Blattspreite.




Abb. 35. Mais, *Zea mays*. A Längsschnitt durch den keimenden Samen, B Derselbe von vorn gesehen, C Weiter fortgeschrittene Keimung. E Endosperm, Sc Santellum, Ws Wurzelscheide, W Wurzel, Bk Blattknospe, Ss Die aufgerissene Samenschale.

manchen Fällen die Aussaugung des Nährgewebes der Samen (Abb. 35). **Niederblätter** sind stets schuppenförmig gestaltet und besitzen

nur selten grüne Färbung. Sie befinden sich meist an unterirdischen Stengelorganen, und zwar einzeln (Abb. 39) oder zu mehreren tutenförmig gruppiert (Abb. 40) oder bei verkürzten Internodien dicht zusammengedrängt wie bei der Zwiebel (Abb. 31). Die Niederblätter sitzen mit breiter Basis, ohne Blattstiel, an, sind parallelnervig und gewöhnlich ganzrandig.




Abb. 36. Samen der Schminkebohne, *Phaseolus multiflorus*: 1 mit der Samenschale; 2 von der Samenschale befreit; 3 nach Entfernung des einen der beiden Keimblätter; k Keimblätter, r Radicula, g Laubblätter des Knospchens, h Nabelfleck.




Abb. 37. Samen von *Strychnos nux vomica*: 1 der ganze Samen; 2 Längsdurchschnitt; 3 Querdurchschnitt, r Radicula, c Keimblätter, end Endosperm, t Samenschale.




Abb. 38. Samen der Kiefer, *Pinus silvestris*, Längsdurchschnitt, r Radicula, wh Wurzelhaube, g Stengel, vk Vegetationspunkt desselben, k Keimblätter, ep Endosperm.

**Laubblätter** bilden die überwiegende Masse der Blätter an den Pflanzen. Sie sind diejenigen, welche im Volksmunde allein als Blätter im gewöhnlichen Sinne gelten. Ihre Form ist äußerst mannigfaltig.




Abb. 39. Rhizom des Gottesnadenkrautes, *Gratiola officinalis*: *a* Achse ersten Grades in den Blütenproß *c* auslaufend, *b* Achse zweiten Grades; *d* Niederblätter.




Abb. 40. Rhizom der Sandsegge, *Carex arenaria*.

Je nach dem Vorhandensein oder Fehlen des Blattstieles unterscheidet man gestielte Blätter (Abb. 41 *a*) und sitzende Blätter (*b*). Zu letzteren gehören auch die Nadeln der Koniferen (*c*). Laubblätter sind meist




Abb. 41. *a* gestielte Blätter, *b* sitzendes Blatt, *c* Nadelblätter.

von grüner Farbe, auf der Unterseite in der Regel von einem etwas matteren Ton. Die Laubblätter der Monokotylen sind gewöhnlich parallelnervig (Abb. 41 *b*, 45 *d*), diejenigen der Dikotylen meist verzweigt-nervig (fiedernervig, Abb. 41 *a*). Innerhalb der Nerven befinden sich als Hauptbestandteile die aus dem Stengel in die Blattspreite eintretenden Leitbündel. Parallelnervige Blätter sind meist sitzend,

verzweigt nervige meist gestielt, doch können die letzteren auch des Blattstieles entbehren und auch umgekehrt bei ersteren Blattstiele vor-




Abb. 42. Verschieden eingefügte Blätter: 1 stengelumfassend, 2 herablaufend, 3 reitend, 4 verwachsen, 5 durchwachsen, 6 ringsum gelöst.

kommen (Araceen, Bambus). Die Blätter können ferner stengelumfassend, herablaufend, reitend, verwachsen oder durchwachsen sein (Abb. 42). Infolge der außerordentlich verschiedenen Gestalt, welche die Blattfläche annehmen kann, unterscheidet man, von verschiedenen Gesichtspunkten aus betrachtet, folgende mannigfache Formen:

nach dem äußeren Umfange und dem Längen- und Breitenverhältnis (Abb. 43): borstenförmige, pfiemenförmige, lineale (a), nadelförmige, keilförmige, spatelförmige, lanzettliche (b), längliche (c), eiförmige (d), elliptische, kreisrunde (e), nierenförmige und rautenförmige Blätter;

nach der Spitze: ausgeschnittene, ausgerandete, abgestutzte, abgerundete, spitze, stachelspitzige und zugespitzte Blätter;




Abb. 43. Umrißformen der Blätter.




Abb. 44. Berandung des Blattes: a gesägt, 1. fein, 2. grob, 3. doppelt. b gezähnt, 1. fein, 2. grob, 3. doppelt. c gebuchtet, d ausgeschweift, e gekerbt, 1. grob, 2. doppelt.

nach der Basis: herzförmige, pfeilförmige und spießförmige Blätter;  
nach dem Rande (Abb. 44): ganzrandige, wellige, gesägte (a), gezähnte (b), gewimperte, gekerbte (e), ausgeschweifte (d) und gebuch-

tete (c), sowie doppelt gesägte (a 3), doppelt gezähnte (b 3) und doppelt gekerbte (e 2) Blätter;

nach der Berippung (Nervatur, Abb. 45): handförmige (a), fußförmige (b), fiedernervige (c) endlich parallelnervige (d) Blätter;




Abb. 45. Nervatur der Blätter.

nach der Teilung der Blattfläche (Abb. 46): handförmig gelappte (a), handförmig geteilte (b) und gefingerte (c), ferner (Abb. 47)



Abb. 46. Teilungsformen der Blattfläche.

fiederteilige (a), unpaarig gefiederte (b) und paarig gefiederte (c) Blätter. Es gibt auch doppelt, dreifach und vierfach gefiederte Blätter (Abb. 48), bei denen jedes Fiederblättchen wiederum eine entsprechende Teilung seiner Blattfläche aufweist. Und endlich unterscheidet man:




Abb. 47. Fiederteilung der Blätter.

nach der Konsistenz: krautige, häutige, harthäutige, lederige, fleischige Blätter.

Die Knospenlage der Blattspreite (Vernation genannt) kann flach, gefaltet, eingerollt, zurückgerollt und schneckenförmig, ihre Deckung (Aestivation genannt) offen, klappig, dachig, gedreht oder reitend sein.

Die Knospenlage der Blattspreite (Vernation genannt) kann flach, gefaltet, eingerollt, zurückgerollt und schneckenförmig, ihre Deckung (Aestivation genannt) offen, klappig, dachig, gedreht oder reitend sein.

Der Blattstiel der Laubblätter besitzt auf seiner Oberseite meist eine längsrinnenförmige Vertiefung, welche das Abfließen des Regenwassers von der Blattfläche ermöglicht. Er ist zuweilen geflügelt (Abb. 49 a), zuweilen auch selbst blattartig verbreitert (Abb. 49 b) und wird, wenn eine Blattspreite fehlt, ein *Phyllodium* genannt.

Die Scheide der Laubblätter ist diejenige Stelle, an welcher der Blattstiel oder, wenn dieser fehlt, die Blattfläche selbst mit dem




Abb. 48. a doppelt, b dreifach, c vierfach gefiederte Blätter.

Stengel verwachsen ist. In ersterem Falle trägt die Scheide häufig Nebenblätter (Abb. 50). Diese sind meist von der Farbe der Laubblätter und stehen seitlich am Blattstiel, zuweilen auch scheinbar im Winkel zwischen Blattstiel und Achse. Sie sind meist ganzrandig, oft jedoch selbst gefiedert (Abb. 50 c). Bei ungestielten Laubblättern trägt die Scheide an derjenigen Stelle, wo sie in das Blatt übergeht, häufig ein kleines, zartes, ungefärbtes Häutchen, Blatthäutchen oder Ligula genannt (Abb. 51), mitunter auch eine durch Verwachsung von Nebenblättern gebildete tutenförmige Umhüllung, eine Ochrea (Abb. 52). Die Blattscheide kann bei sitzenden Blättern gespalten, bauchig erweitert und dann nur an der Spitze gespalten, oder endlich geschlossen sein (Abb. 53).



Abb. 49. a geflügelter, b blattartig verbreiteter Blattstiel.

Die Stellung der Blätter zueinander, ihre Insertion an der Achse, wird von bestimmten Regeln beherrscht, welche sich aus ihrer Entstehungsfolge herleiten lassen. Es sei nur kurz darauf hingewiesen, daß an den Vegetations-

punkten alle Seitenglieder da entstehen, wo sich zwischen den schon ausgegliederten Organen die größte Lücke findet.

Man nennt die Blattstellung:

a) wechselständig oder spiralig, wenn die einzelnen Blätter, eine Spirale bildend, in ungleicher Höhe einzeln in die Achse eingefügt sind,




Abb. 50. Formen der Nebenblätter.

b) gegenständig, wenn je zwei derselben sich in gleicher Höhe gegenüberstehen, und

c) quirlständig, wenn mehr als zwei in gleicher Höhe der Achse entspringen.




Abb. 51. Blatthäutchen oder Ligula (l).

Abb. 52. Tutenförmiges Blatthäutchen oder Ochrea.

Abb. 53. Formen der Blattscheide: 1 gespalten, 2 bauchig, 3 geschlossen.

Um die Gesetzmäßigkeit zu ergründen, welcher die wechselständigen Blätter im Einzelfalle folgen, ermittelt man zwei in senkrechter Linie übereinander eingefügte Blätter und sieht dann zu, wie man auf dem kürzesten Wege in einer, jedes dazwischen liegende Blatt berührenden Spirallinie von dem unteren zu dem darüber liegenden Blatte gelangt. Ein solcher Umlauf von einem Blatt bis zu dem senkrecht darüber stehenden heißt ein Cyklus. Im Falle A

(Abb. 54) z. B. liegt stets das zweite Blatt in derselben Linie, man braucht somit, um in einem Umlaufe dahin zu gelangen, nur zwei Blätter, also *a, b, c, d, e* usw. zu berühren und drückt dies durch einen Bruch aus, in welchem die Zahl der Umläufe den Zähler und die Zahl der dabei berührten Blätter den Nenner bildet; in gegenwärtigem Falle also  $\frac{1}{2}$ . — In einem anderen Falle *B* kann man nicht mit zwei senkrechten Linien sämtliche Blätter treffen, sondern mit dreien, und man erreicht in Spirallinie das darüber liegende Blatt, indem man auf einem Umlaufe drei Blätter berührt, also




Abb. 54. Schema der Blattstellungen: *A*  $\frac{1}{2}$ , *B*  $\frac{1}{3}$ , *C*  $\frac{2}{5}$ , *D* gegenständige und dekussierte Blattstellung.




Abb. 55. In eine Ebene projizierte gegenständige Blätter; 1 ein Paar, 2 zwei übereinander liegende Paare.

*a, b, c, d, e, f, g* usw.; man nennt diese Stellung  $\frac{1}{3}$ -Stellung. — In einem weiteren Falle *C* sind fünf senkrechte Linien nötig, um sämtliche übereinanderliegende Blätter miteinander zu verbinden, und man muß, um auf dem kürzesten Wege von einem Blatte zum nächsten, senkrecht darüber liegenden zu gelangen, zwei Umläufe in Spirallinie vollziehen, indem man dabei fünf Blätter berührt, also *a, b, c, d, e, f*. Diese Anordnung bezeichnet man demgemäß als  $\frac{2}{5}$ -Blattstellung. Die senkrechten Linien, welche übereinander eingefügte Blätter miteinander verbinden, heißen Geradzeilen oder Orthostichen (von *ὀρθός*, orthos = gerade, und *στίχος*, stichos = Reihe), diejenigen Spirallinien jedoch, welche die Blätter miteinander verbinden, deren seitlicher Abstand an der Achse am geringsten ist, heißen Schrägzeilen oder Parastichen. Der Ausdruck der Blattstellung in Bruchzahlen hat außer seiner bezeichnenden Kürze noch den Vorteil, gleichzeitig den Winkel (Divergenzwinkel) auszudrücken, welchen die Blätter, auf eine Ebene projiziert, zueinander einnehmen würden. Berührt man:

auf einer Umdrehung zwei Blätter, so ist der Divergenzwinkel

$$\frac{1}{2} \text{ von } 360^\circ = 180^\circ,$$

auf einer Umdrehung drei Blätter, so ist der Divergenzwinkel

$$\frac{1}{3} \text{ von } 360^\circ = 120^\circ,$$

auf zwei Umdrehungen fünf Blätter, so ist der Divergenzwinkel

$$\frac{2}{5} \text{ von } 360^\circ = 144^\circ \text{ usw.}$$

Man findet:

$\frac{1}{2}$ -Stellung	z. B. bei der Linde ( <i>Tilia</i> ),
$\frac{1}{3}$ „ „ „ „	der Erle ( <i>Alnus</i> ),
$\frac{2}{5}$ „ „ „ „	dem Hahnenfuß ( <i>Ranunculus</i> ),
$\frac{3}{8}$ „ „ „ „	der Stechpalme ( <i>Ilex</i> ),
$\frac{5}{13}$ „ „ „ „	dem Löwenzahn ( <i>Taraxacum</i> ).

Gegenständig Blätter (Abb. 54 D) lassen sich durch zwei Linien auf eine Ebene projizieren, auf welcher sie einen Divergenzwinkel von  $180^\circ$  bilden (Abb. 55, 1). Hier ist der Fall häufig, daß jedes einzelne Paar mit dem vorhergehenden und dem folgenden derart abwechselt (alterniert), daß die die beiden gegenüberliegenden Blätter verbindenden Linien sich rechtwinkelig schneiden (Abb. 55, 2). Man nennt dies die gekreuzte oder dekussierte Blattstellung. Gegenständige und gekreuzte Blattstellung ist z. B. allen Lippenblütlern (Labiaten) eigen.

Quirlständige Blätter kann man sich zustande gekommen denken, indem mehrere Paare gegenständiger Blätter oder eine bis mehrere Umdrehungen wechselständiger Blätter durch Verkürzung der zwischenliegenden Achsenstücke (Internodien) in eine Ebene verlegt sind. In Abb. 55, 2 deuten die punktierten Blätter das darunterliegende Paar gegenständiger Blätter an. Liegen diese in einer Ebene, so stellt Abb. 55, 2 den Querschnitt durch einen viergliedrigen Blattquirl dar. Es gibt auch sechs-, acht- und mehrgliedrige Blattquirlle. Quirlständige Blätter sind beispielsweise dem Tannenwedel, *Hippuris vulgaris*, eigen.

**Hochblätter** kommen nur an den Blütenständen vor und stehen mit den Blüten in gewisser örtlicher Beziehung. Sie sind den Laubblättern zuweilen ähnlich, zuweilen diesen sogar völlig gleich, häufiger aber von ihnen in Farbe, Gestalt, Konsistenz und Größe außerordentlich verschieden. So besteht z. B. die Blütenscheide (*Spatha*) vieler Monokotylen (Abb. 56) aus einem Hochblatte, ebenso werden die Außenhülle an den Blüten vieler Dikotylen (*Involuerum*, Abb. 58), und der Hüllkelch, sowie die Spreublättchen der Kompositen (Abb. 57), von Hochblättern gebildet. Mit der Achse des Blütenstandes verwachsene Hochblätter besitzt die Linde (Abb. 59). Die meisten Blüten sitzen in der Achsel eines, wenn auch kleinen Hochblattes, welches als Deckblatt der Blüte bezeichnet wird. Solche Deckblätter können jedoch bei manchen Familien völlig fehlen, z. B. bei den Cruciferen. Auch am Blütenstiele sitzen häufig noch ein oder zwei weitere, oft schuppenförmige Hochblätter an, welche Vorblätter genannt werden.

**Blütenblätter** nennt man diejenigen Blätter, welche die Blüten der Pflanzen bilden. Als „Blüte“ bezeichnet man die Vereinigung



Abb. 56. Blütenscheide oder Spatha (p) von *Arum maculatum*, \* der Blütenkolben (Spatha).




Abb. 57. Hüllkelch (f) und Spreublättchen (e) eines Kompositenköpfchens; a und b Einzelblüten, f der Blütenboden.




Abb. 58. Außenhülle oder Involucrum (i) von *Anemone pulsatilla*, p die Blüte.




Abb. 59. A Blütenstand der Winterlinde (*Tilia cordata*.) ( $\frac{3}{4}$ ), B einzelne Blüte im Längsschnitt ( $\frac{2}{5}$ ), C Blütenstand der Sommerlinde (*Tilia platyphyllos*.) ( $\frac{3}{4}$ ).

aller Organe eines Sprosses, die in irgend einer Weise am Zustandekommen der geschlechtlichen Fortpflanzung beteiligt sind. Um zu begreifen, daß sämtliche Teile der Blüte, auch Staubgefäße und Pistille, nichts anderes als umgewandelte (metamorphosierte) Blätter eines Sprosses sind, muß man beachten, daß die Achse, an welcher sie spiralig oder wirtelig angeordnet sind, meist reduziert, d. h. gestaucht ist. Die Anheftungsstellen der Blütenblätter, welche man an der gestreckten Achse übereinanderliegend erblicken würde, liegen in einer horizontalen Ebene, und zwar so, daß — der Verjüngung der Achse nach oben hin entsprechend — der unterste Kreis den




Abb. 60. Eine vollkommene fünfzählige Blüte: *A* schematisch an verlängerter Blütenachse dargestellt, *sep* Kelchblätter, *pet* Blumenblätter, *st. ext* äußere Staubblätter, *st. int* innere Staubblätter, *carp* Fruchtblätter. *B* Die Teile derselben Blüte in eine Ebene verlegt und querdurchschnitten. (C. Müller.)

weitesten und äußersten, die den Sproß abschließenden Fruchtblätter hingegen den innersten Kreis bilden. Man vergleiche Abb. 60 *A*, welche eine typische fünfzählige Blüte schematisch mit verlängerter Achse darstellt, und Abb. 60 *B*, welche den Grundriß der in einer Ebene liegenden Blütenteile wiedergibt. Einen solchen Grundriß nennt man ein Blütendiagramm (siehe Seite 58). Mit Hinzunahme der Vorblätter  $\alpha$ ,  $\beta$  und  $d$ , sowie des oberen Punktes, welcher die Hauptachse bedeutet, wird man in dem Diagramm Abb. 60 *B* alle Teile der Abb. 60 *A* wieder erblicken.

Die Homologie der Blütenblätter und der Laubblätter tritt in den mannigfachsten Erscheinungen zutage, so z. B. darin, daß Scheide, Blattstiel und Blattfläche an ersteren mehr oder weniger deutlich unterscheidbar sind, daß ihre Insertion an der Achse von denselben Prinzipien beherrscht wird und ihre Knospenlage sowie Knospendeckung derjenigen der Laubblätter gleich ist.

### Die Blüte.

Die vollkommensten Blüten setzen sich aus fünf Blütenblattkreisen zusammen, und zwar:

- einem Kelchblattkreis,
- einem Blumenblattkreis,
- zwei Staubblattkreisen,
- einem Fruchtblattkreis.

Einer oder mehrere dieser Kreise können an einfacheren Blüten fehlen. Ohne die letztgenannten Kreise, d. h. zwei oder mindestens einen Staubblattkreis und einen Fruchtblattkreis, würden jene jedoch aufhören Blüten im botanischen Sinne zu sein. Ihr Vorhandensein bedingt vielmehr erst den Charakter der Blüte als Zeugungsort.

Sind sowohl der Fruchtblattkreis, als auch beide oder einer der beiden Staubblattkreise vorhanden, so ist die Blüte zwittrig oder monoklin, d. h. männliche und weibliche Organe sind auf einem Lager vereinigt (z. B. die Blüte vom Hahnenfuß, *Ranunculus*). Fehlt der Fruchtblattkreis, so heißt die Blüte männlich, fehlen beide Staubblattkreise, so ist sie eine weibliche; in beiden Fällen ist die Blüte eine eingeschlechtige oder diklinische, d. h. männliche und weibliche Organe sind auf zwei Lager verteilt. Sind die diklinischen Blüten beiderlei Geschlechts auf einer Pflanze vereinigt, so heißt diese monöcisch; sie wird diöcisch genannt, wenn sie nur Blüten eines Geschlechts, und polygam, wenn sie sowohl eingeschlechtige als zwittrige Blüten entwickelt. Den Kelchblattkreis und den Blumenblattkreis faßt man beide unter dem Namen Blütenhülle oder Perianth (von *περί*, *peri* = um, und *άνθος*, *anthos* = die Blüte) zusammen. Fehlt das Perianth, so heißt die Blüte nackt (*achlamydeisch*), andernfalls ist sie behüllt. Ist nur ein Hüllblattkreis vorhanden, so nennt man die Blüte *haplochlamydeisch*, dagegen *diplochlamydeisch*, wenn beide Hüllblattkreise ausgebildet sind; sind in letzterem Falle (d. h. bei *diplochlamydeischer* Blüte) die beiden Hüllblattkreise gleichartig ausgebildet, so nennt man die Blüte *homiochlamydeisch*; eine solche Blütenhülle kann entweder kelchblattartig (*sepaloid*) oder kronblattartig (*petaloid*) sein; zeigt dagegen eine Blüte typischen Kelch und Blumenkrone, so wird sie als *heterochlamydeisch* bezeichnet.

Die Staubblätter nennt man in ihrer Gesamtheit, da sie den männlichen Geschlechtsapparat bilden, das *Androeceum* (von *άνήρ*, *άνδρός*, *aner*, Genit. *andros* = der Mann, und *οίκος*, *oikos* = das Haus); die Fruchtblätter, der weibliche Geschlechtsapparat, werden als *Gynaecium* (von *γυναικεῖον*, *gynaikeion* = das Frauengemach) bezeichnet.

### Die Kelchblätter.

Der Kelch, auch *Calyx* genannt, setzt sich aus Kelchblättern (*Sepala*) zusammen. Diese können grün und blattartig im gewöhnlichen Sinne oder aber buntgefärbt und dann blumenblattartig ge-

staltet sein, wie z. B. bei *Iris* (Abb. 61). Immer aber sind sie ungestielt. Blumenblattartig ausgebildete Kelche nennt man *corollinisch* oder *petaloid*. Bei den unvollkommenen und unregelmäßigen Blüten kann der Kelch auch nur aus einem einzigen Blatt bestehen, er kann sogar nur auf einen Höcker oder Wulst zurückgeführt sein. Bei den Korbblütlern ist er meist borstenförmig (Abb. 62) und wird *Pappus* genannt.

#### Verwachsung der Kelchblätter untereinander.

Häufig sind die Kelchblätter im ganzen Umkreise untereinander verwachsen. Die Blüte heißt dann *synsepal* (oder schlechter




Abb. 61. Blüte von *Iris pallida*: a die blumenblattartigen, buntgefärbten Kelchblätter, b die Blumenblätter, c die Narben.




Abb. 62. A Zungenblüte einer Komposite: b der Kelch oder Pappus. B Röhrenblüte einer Komposite: p der Kelch oder Pappus, c die verwachsene Blumenkrone.

*gamosepal*) zum Unterschiede von der *chorisepalen* (auch manchmal *dialysepal* genannten) Blüte. Erstreckt sich diese Verwachsung bis zur Spitze, so heißt der Kelch *ungeteilt*, anderenfalls besitzt er mehr oder weniger tiefe Einschnitte und heißt dann *geteilt*, wenn diese sehr tief, *gezähnt*, wenn sie ziemlich flach sind; die freigebliebenen Spitzen heißen der *Saum* des Kelches. Die Zahl der Zipfel entspricht der Anzahl der verwachsenen Kelchblätter. Bei unregelmäßigen Blüten pflegen ein oder zwei Einschnitte tiefer als die anderen zu sein, und es kommt dadurch ein *einlippiger* oder *zweilippiger* Kelch zustande.

#### Die Blumenblätter.

Die Blumenblätter oder *Petala* bilden die Blumenkrone, auch kurzweg *Krone* oder *Corolla* genannt. Sie sind nicht immer sitzend, wie die Kelchblätter, sondern häufig mit einem schmalen, längeren oder kürzeren Stiele versehen, welchen man den *Nagel* (Abb. 63 *u*) nennt, zum Unterschied von dem flächenförmigen Teile des Blumenblattes, der *Platte* oder *Spreite* (Abb. 63 *l*). An der Verbindungsstelle von Platte und Nagel findet sich nicht selten ein

Anhängsel von mannigfaltiger Gestalt, die Ligula (z. B. Abb. 63 c); sind die Ligulargebilde einer Blüte sehr kräftig ausgebildet, so spricht man häufig von einer Nebenkrone.

#### Verwachsung der Blumenblätter untereinander.

Sehr häufig sind die Blumenblätter mit ihren Rändern verwachsen. Solche Blüten heißen *sympetal* (häufig auch schlechter *gamopetal*), zum Unterschied von den freiblätterigen, *choripetalen* (auch manchmal *dialypetal* oder *eleutheropetal* genannten) Blüten. Die Blumenblätter bilden, wenn verwachsen, eine trichterförmige, röhrenförmige (Abb. 62 B, c) oder glockenförmige (Abb. 64) Blumenkrone. Glockenförmige Corollen können auch im Grunde verengert sein, wie bei *Digitalis* (Abb. 65). Vom Saum der Blüte gilt dasselbe, was von dem des Kelches gesagt wurde. Die Verwachsung kann sich nur auf den alleruntersten Teil erstrecken, wie z. B. bei der Schwertlilie (Abb. 61), oder sie kann über alle Zwischenstufen hinweg soweit gehen, daß die Zipfel nur noch als unscheinbare Ausbuchtungen (Abb. 62 A, d) sichtbar sind.




Abb. 63. Genageltes Blumenblatt: u der Nagel, l die Spreite, c Blumenblattanhängsel.

#### Verwachsung der Blumenblätter mit den Kelchblättern.

Nicht selten sind Blumenblätter und Kelchblätter nicht allein unter sich, sondern auch miteinander verwachsen, und zwar ist in diesen Fällen der Kelch stets blumenblattartig ausgebildet (Abb. 77 A). Die Mehrzahl der Liliengewächse veranschaulicht diese Verwachsung.



Abb. 64. Glockenförmige Blumenkrone der Glockenblume, *Campanula rotundifolia*.




Abb. 65. Trichterförmige Blumenkrone des Fingerhuts, *Digitalis purpurea*: a von außen, b in der Längsrichtung aufgeschnitten.

Eine solche gemeinsame Blütenhülle nennt man ein *Perigon*; doch bedingt dieser Begriff nicht hauptsächlich die Verwachsung der Kelchblätter mit den Blumenblättern, sondern ihre gleichartige Ausgestaltung, z. B. die blumenblattartige Ausbildung der ersteren. Sind Kelch und Blumenblätter nur am Grunde miteinander verwachsen, so unterscheidet man den Kelchblattkreis als äußeres und den Blumenblattkreis als inneres Perigon.

### Die Staubblätter.

Die Staubblätter, auch Staubgefäße oder Stamina genannt, stellen in ihrer Gesamtheit den männlichen Geschlechtsapparat oder das Androeceum dar. Obwohl die Mehrzahl der Staubgefäße nicht leicht ihre Blattnatur erkennen läßt, so tritt diese doch manchmal, wie z. B. bei *Nymphaea*, deutlich in die Erscheinung




Abb. 66. Verschieden geformte Staubgefäße. *f* Staubfaden oder Filament, *a* Staubbeutel oder Anthere.

(vergl. Abb. 66, 1, 2, 4, 5, 6), ferner auch an jenen durch gärtnerische Kunst zu „gefüllten Blumen“ gewordenen Blüten der Rose, des Mohns usw., an denen man, so lange die Füllung noch keine vollkommene ist, alle Übergänge von dem fadenförmigen Staubgefäß bis zu den völlig blumenblattartig gewordenen Gebilden beobachten kann.

An dem Staubgefäß typischer Form unterscheidet man den Staubfaden oder das Filament (Abb. 67 *f*), dem Blattstiel entsprechend, und den diesem aufsitzenden Teil, welcher als Staubbeutel oder



Abb. 67. Ein Staubgefäß typischer Form: *f* Staubfaden oder Filament, *a* Staubbeutel oder Anthere.




Abb. 68. Antheren zweier Staubgefäße, quer durchschnitten; *I* geschlossen, *II* nach dem Ausstreuen des Pollens, *f* Filament, *c* Konnektiv, *l* Pollensäcke.

Mittelband oder Konnektiv (Abb. 68 *c*) ansitzen. Solche Antheren werden dithecisch genannt; monothecisch dagegen, sind diejenigen, die nur eine Theca mit zwei Pollensäcken (wie z. B. bei den Malvaceen) tragen. Je nachdem die Thecae der Bauch- oder Rückenseite des Filaments angeheftet sind, wird die Anthere intrors oder extrors genannt. Jedes der Staubbeutelblätter schließt zumeist wiederum zwei nebeneinanderliegende Längshöhlungen in sich, welche die Pollensäcke (Abb. 68 *l*) genannt werden und welche den Pollen oder die Pollenkörner, d. i. die männlichen Befruchtungszellen der Pflanze, enthalten. Zur Zeit der Reife verschmelzen gewöhnlich die

beiden Pollensäcke miteinander und öffnen sich durch einen gemeinsamen Längsspalt, wie es Abb. 68 II veranschaulicht; auf diese Weise wird dem Pollen der Austritt gestattet, um durch den Wind oder durch Insekten auf die weiblichen Befruchtungsorgane übertragen zu




Abb. 69. Pollenkörner. A von Aloe, B Arnica, C Iris, D Acanthus, E Atropa belladonna.

werden. Die Pollenkörner selbst sind verschieden gestaltet (Abb. 69). Sie sind trocken und glatt, so vorzugsweise in Windblüten, mehr oder weniger klebrig oder stachelig, hauptsächlich in Insektenblüten. Bei der Reife lösen sich gewöhnlich die Pollenkörner voneinander los; seltener bleiben sie zu vieren (nach der Art ihrer Entstehung aus einer Pollenmutterzelle) in Pollentetraden miteinander verbunden oder bilden, wie bei den Orchidaceen und Asclepiadaceen, eine keulenförmige, zusammenhängende, aus einzelnen Pollenzellgruppen, den Pollinien, bestehende, wachsartige Masse, das Pollinarium.

Die einfachste, häufigste und typische Form der Staubgefäße kann hier und da Abweichungen zeigen. So z. B. kann das Konnektiv nicht an seinem unteren Ende, sondern in seiner Mitte am Filament angefügt sein, wie man es an der Grasblüte oder bei der Lilie (Abb. 70 c) beobachten kann. Auch kann das Konnektiv ungewöhnlich lang sein




Abb. 70. Bewegliche Antheren: a und b der Tulpe, Tulipa Gesneriana, c der Lilie, Lilium candidum.




Abb. 71. Staubgefäß der Salvei, Salvia officinalis, mit zweischenklig verlängertem Konnektiv (c) und einer halben Anthere (d).




Abb. 72. A gehörnte Anthere der Bärentraube, Arctostaphylos uva ursi. B gespornte Antheren des Stiefmütterchens, Viola tricolor.



Abb. 73. a männliche Blüte und b ein einzelnes Staubblatt des Lebensbaumes, Thuja occidentalis, mit schildförmigem Konnektiv u. zahlreichen Pollensäcken.

und die Antherenfächer an seinen Enden tragen, wie bei Salvia officinalis (Abb. 71), wo außerdem das zweite Antherenfach verkümmert oder zurückgebildet ist. Auch verzweigte Staubgefäße kommen vor, z. B. bei Ricinus communis.

Ferner können die Antherenfächer gehörnt sein, wie bei der Bärentraube (Abb. 72 A), oder gespornt, wie bei dem Stiefmütterchen (Abb. 72 B).

Bei manchen Nadelhölzern und überhaupt bei den meisten nacktsamigen Gewächsen (Gymnospermen, siehe dort), sind nicht zwei, bezw. vier, sondern zahlreiche Pollensäcke vorhanden (Abb. 73).

Auch das Aufspringen der Antherenfächer kann Abweichungen von der oben geschilderten, typischen Art zeigen; so geschieht das Aufspringen bei dem Frauenmantel durch Querspalten (Abb. 74 A, d) oder mit Löchern bei den Nachtschattengewächsen (Abb. 74 B), mit




Abb. 74. A mit Spalten aufspringendes Staubgefäß des Heidekrautes, *Calluna vulgaris*, und des Frauenmantels, *Alchemilla vulgaris* (d). B mit Löchern aufspringendes Staubgefäß der Kartoffel, *Solanum tuberosum*. C mit zwei Klappen aufspringendes Staubgefäß der Berberitze, *Berberis vulgaris*. D mit vier Klappen aufspringendes Staubgefäß des Zimtbaumes, *Cinnamomum zeylanicum*.

Abb. 75. Staubblatt des Tausendgüldenkrautes, *Erythraea centaurium*: a vor dem Ausstäuben, b nach dem Ausstäuben des Pollens.

zwei Klappen bei der Berberitze (Abb. 74 C) und vielen Lorbeer- gewächsen, mit vier Klappen bei manchen anderen Lorbeergewächsen (Abb. 74 D).

Das Ausstreuen der Pollenkörner wird zuweilen durch Drehung der Antheren unterstützt, wie z. B. bei dem Tausendgüldenkraut (Abb. 75).

Als Staminodien bezeichnet man unfruchtbare, sterile Glieder des Androeceums, welche keinen Pollen erzeugen und entweder verkümmert und funktionslos sind oder als kronblattähnliche oder aber als Nektar absondernde Gebilde Anlockungsmittel für Insekten bei Insektenblütengewächsen darstellen.

#### Verwachsung der Staubblätter untereinander.

Die Staubblätter können untereinander an ihren Rändern verwachsen, und zwar entweder im ganzen Umkreise, d. h. zu einer Röhre, oder nur teilweise, d. h. zu einzelnen Bündeln. Diese Verwachsung erstreckt sich jedoch fast niemals auf die Staubblätter in ihrer ganzen Länge, sondern es verwachsen entweder nur die Staubfäden (Leguminosae-Papilionatae) oder aber nur die Staubbeutel (Compositae). Sind Staubfäden und Staubbeutel miteinander verwachsen, so spricht man von einem Synandrium (Cucurbitaceae).

Beide Arten der Verwachsung haben für Linné, welcher Zahl und Anordnung der Staubgefäße seinem künstlichen System bei der Pflanzeneinteilung zugrunde legte, Veranlassung zur Bildung besonderer Klassen gegeben. Zu einem einzigen Bündel sind die Staubfäden beispielsweise bei den Malven (Abb. 76 A), den Storchschnabelgewächsen und den Kürbisgewächsen verwachsen (XVI. Klasse Linnés); zwei Bündel finden sich bei den Polygalaarten und bei den Erdrachgewächsen (Abb. 76 B), doch zählt Linné zu dieser seiner XVII. Klasse auch diejenigen Gewächse, bei denen neun Staubfäden zu einem Bündel verwachsen sind und das zehnte Staubgefäß allein freigeblichen ist; dies ist bei einem Teil der großen Familie der Schmetterlingsblütler der Fall. Staubfäden, welche zu mehr als zwei Bündeln verwachsen sind, besitzt das Johanniskraut, *Hypericum*.




Abb. 76. A zu einem Bündel verwachsene Staubgefäße der Malve, *Malva alcea*. B zu zwei Bündeln verwachsene Staubgefäße des Erdrachs, *Fumaria officinalis*.

Zu den Pflanzen mit untereinander verwachsenen Staubbeuteln (Linnés Röhrenbeutelige oder Syngenesia) gehört die große Familie der Korbblütler oder Kompositen (Abb. 62 A, e und Abb. 62 B, a).

Verwachsung der Staubblätter mit den Blumenblättern.

In vielen Fällen verwachsen die Staubfäden zum Teil mit den Blumenblättern, bzw. mit dem Perigon, und es bleiben nur die Staubbeutel nebst dem oberen Teile der Filamente frei, so daß es




Abb. 77. Mit der Blütenhülle verwachsene Staubgefäße: A des Maiglöckchens, *Convallaria majalis*, B der Ochsenzunge, *Anchusa officinalis*.

den Anschein hat, als entsprängen die Staubgefäße nicht dem gemeinsamen Blütenboden, sondern der Blütenhülle. Solche Beispiele bieten das Maiglöckchen (Abb. 77 A) und die Ochsenzunge (Abb. 77 B).

Eine Verwachsung der Staubblätter mit den Kelchblättern kommt im eigentlichen Sinne, d. h. abgesehen von den Fällen, wo der Kelch mit den

Blumenblättern das Perigon bildet, wie bei dem Maiglöckchen (Abb. 77 A), nicht vor. Die Ansicht Linnés, daß bei seiner XIII. Klasse die Staubgefäße auf dem Kelchrande eingefügt seien, ist ein Irrtum, welcher später bei der Besprechung des Blütenbodens Aufklärung finden wird.

### Die Fruchtblätter.

Die Fruchtblätter nehmen stets den innersten Kreis der Blüte, also den Gipfel der Blütenachse ein und bilden den weiblichen Geschlechtsapparat, das Gynaeceum. Sie heißen auch Karpelle oder Karpiden (von καρπός, karpos = die Frucht) und können entweder einzeln oder zu mehreren in einer Blüte vorhanden sein.

Das Fruchtblatt selbst ist fast nie gestielt, sondern sitzt mit breiter Basis der Achse, bezw. dem Blütenboden auf. Da die Frucht-




Abb. 78. Schematische Zeichnung zur Verdeutlichung des ausgebreiteten (a), des mit seinen Bändern einwärts gekrümmten (b) und des geschlossenen Fruchtblattes (c) im Querschnitt.



Abb. 79. Ein einzelnes geschlossenes Fruchtblatt: I g Fruchtknoten, st Griffel, n Narbe. II Dasselbe im Querschnitt; r Rückennaht, b Bauchnaht, in der Mitte eine Samenanlage.

blätter fast stets die Samenanlagen einschließen, so sind sie längs der Mittelrippe gefaltet und verwachsen meist an ihren Rändern. Stehen die Fruchtblätter einzeln, so verwachsen ihre beiden Ränder miteinander, wie es Abb. 78 a, b, c in entwicklungsgeschichtlicher Folge darstellt. Die Verwachsungsstelle bezeichnet man als Bauchnaht, die der Mittelrippe des Blattes entsprechende Linie als die Rückennaht. Offene, nicht geschlossene Fruchtblätter besitzt nur eine Abteilung von Gewächsen, die Gymnospermae, wogegen alle anderen Blütenpflanzen mit geschlossenen Fruchtblättern als Angiospermae bezeichnet werden.

Die Fruchtblätter heißen, gleichviel ob sie einzeln oder gemeinsam den Raum einschließen, welcher die Samenanlagen enthält, Fruchtknoten oder Ovarium (Abb. 79 I und II).

Die Spitze der Fruchtblätter wächst meist zu einem kürzeren oder längeren Fortsatz aus, welcher gerade oder gekrümmt sein kann und als der Griffel oder Stylus beschrieben wird (Abb. 79 I st). Seine Spitze ist meist verbreitert, von papillöser, drüsig-klebriger Beschaffenheit und wird als Narbe oder Stigma (Abb. 79 I n) von dem übrigen Teile des Griffels unterschieden. Die Narbe kann bei

den Angiospermae niemals fehlen, weil sie zur Aufnahme der Pollenkörner bei der Befruchtung dient; wohl aber kann der Griffel fehlen; in solchem Falle heißt die Narbe sitzend, wie bei den Fruchtblättern des Mohns (Abb. 99). Das aus Fruchtknoten, Griffel und Narbe bestehende Gebilde wird Pistill oder Stempel genannt.

#### Verwachsung der Fruchtblätter untereinander.

Die Fälle, wo nur ein einziges Fruchtblatt vorhanden ist, sind verhältnismäßig selten (z. B. bei den Schmetterlingsblütlern). Meist enthält eine Blüte mehrere bis zahlreiche Fruchtblätter, und diese sind dann wiederum nur selten jedes für sich geschlossen und mehr




Abb. 80. Verschiedene Grade der Verwachsung der Fruchtblätter.



Abb. 81. 1 freie Fruchtblätter, 2 mit Scheidewänden verwachsene und 3 ohne Scheidewände verwachsene Fruchtblätter im Querschnitt.

oder weniger unabhängig voneinander, wie bei den Hahnenfußgewächsen (Abb. 80, 1 und 81, 1). In diesem Falle spricht man von einem apokarpen Gynaeceum.

Meist sind die Fruchtblätter untereinander mit ihren Rändern verwachsen und bilden ein synkarpe Gynaeceum. Diese Verwachsung kann wiederum den eigentlichen Blatteil allein betreffen dann bleiben die Griffel, von denen gewöhnlich so viele vorhanden sind als Fruchtblätter, frei (Abb. 80, 2). Die Verwachsung kann sich jedoch auch auf die Griffel, und zwar auf diese wiederum nur teilweise (Abb. 80, 3) oder aber ganz (Abb. 80, 4) erstrecken. In letzterem Fall ist die Anzahl der Fruchtblätter meist mit der Anzahl der Narbenlappen übereinstimmend.

Der Anzahl der verwachsenen Fruchtblätter entsprechend erscheint auch der Fruchtknoten meist gefächert oder geteilt, doch können auch mehrere Fruchtblätter einen einzigen, ungeteilten Fruchtknoten bilden. Abb. 81, 1 zeigt drei freie, getrennte Fruchtblätter im Querschnitte, Abb. 81, 2 zeigt jene derart miteinander verwachsen, daß durch ihre Ränder drei Scheidewände gebildet werden und Abb. 81, 3 zeigt dieselbe Verwachsung ohne Scheidewände.

Zuweilen stülpen sich nach erfolgter Befruchtung von der Rückennaht aus scheidewandartige Fortsätze in die Höhlung des




Abb. 82. Der Narbe (a) des Fruchtknotens g aufgewachsene Anthere (b) einer Orchis, p verklebter Pollen, m Klebscheiben, c Konnektiv, r das sogenannte Schnäbelchen, l verkümmerte Antheren.

Fruchtknotens hinein, welche man als falsche Scheidewände bezeichnet, z. B. beim Lein.

Verwachsung der Fruchtblätter mit den Staubblättern.

Eine Verwachsung zwischen Fruchtblättern und Staubblättern kommt fast nur bei den Osterluzeigewächsen (Aristolochiaceen) und bei den Knabenkrautgewächsen (Orchidaceen) vor. Bei letzteren ist die filamentlose Anthere (Abb. 82) mit ihren beiden Pollensäcken der Narbe unmittelbar eingefügt, welche den Endpunkt der Griffelsäule bildet. Linné machte diese eigentümlichen Verhältnisse zum Merkmale einer besonderen Klasse, der Gynandria oder der mannweibigen Gewächse (XX. Klasse). Das durch Verwachsung des Fruchtblattkreises mit dem Staubblattkreise zustande kommende Gebilde nennt man ein Gynostemium.

### Der Blütenboden.

Da, wie bereits erwähnt, angenommen werden muß, daß die Anordnung der einzelnen Blütenblattkreise in erster Linie durch die Stauchung sämtlicher, ursprünglich an einer Achse übereinander angeordneter Blütenteile zustande gekommen ist, so müßten bei der typischen Blüte auch die Einfügungs- oder Insertionsstellen sämtlicher Blütenteile in einer Ebene liegen und ein etwas oberhalb dieser Ebene geführter Querschnitt den vollkommenen Grundriß der Blüte veranschaulichen, wie dies in ähnlicher Weise bei dem Bau-




Abb. 83. Querschnitt der Blüten: A vom Hahnenfuß, *Ranunculus acer*, B der Schlüsselblume, *Primula officinalis*.

plan eines Hauses der Fall ist. Diese Querschnitte würden bei dem Hahnenfuß und der Schlüsselblume etwa untenstehende Bilder ergeben (Abb. 83. A, B).

Indessen erfahren die eben geschilderten Verhältnisse häufig eine Verschiebung dadurch, daß der Achsenteil, welchem die Blütenteile eingefügt sind, sich vergrößert. Dieser Teil heißt der Blütenboden oder Torus. Er ist fast stets dicker als der Blütenstiel, dessen Gipfel er einnimmt, und erweitert sich häufig durch nachträgliches Wachstum zwischen Androeceum und Gynaeceum zu einem kegel-, scheiben-, becher- oder krugförmigen Gebilde, dem Receptaculum oder Achsenbecher. Die Stellung des Fruchtknotens zu den übrigen Teilen der Blüte (Abb. 84) wird durch diese Vergrößerung des Receptaculums entweder:

- a) eine erhöhte, oder  
 b) eine vertiefte, oder  
 c) eine eingesenkte.

In dem Falle *a*, welcher der Anordnung des Fruchtknotens an der normal gestauchten Blütenachse entspricht, ist der Fruchtknoten oberständig, alle übrigen Blütenteile sind unterweibig oder hypogyn (von ὑπό, hypo = unter etc.).

Im zweiten Falle (*b*) hat sich der scheibenförmig verbreiterte Blütenboden mit seinen Rändern nach oben gewölbt, ohne jedoch über dem Fruchtknoten zusammenschließen. In diesem Falle ist der Fruchtknoten ebenfalls oberständig, aber vertieft (auch mittelständig genannt); es ist diese Form eine Mittelstellung zwischen der ersteren und der nachher zu erwähnenden dritten Form. Die




Abb. 84. Stellung des Fruchtknotens zu den übrigen Organen der Blüte:  
*a* erhöhte, *b* vertiefte, *c* eingesenkte Stellung.

übrigen Blütenteile, welche gemeinsam auf dem Rande des Blütenbodens eingefügt sind, nennt man dann in betreff ihrer Stellung zum Fruchtknoten umweibig oder perigyn (von περί, peri = um etc.) (Abb. 85 *b*).

Drittens endlich (*c*) kann unter sonst gleichen Verhältnissen der Blütenboden oberhalb des Fruchtknotens zusammenschließen und mit dessen Rändern verwachsen, so daß die übrigen Blütenteile unmittelbar über dem Fruchtknoten stehen. Dann heißt der Fruchtknoten unterständig, die übrigen Blütenteile aber sind oberweibig oder epigyn (von ἐπί, epi = auf etc.) (Abb. 85 *c*).

Man achte also darauf, daß in der hypogynen, unterweibigen Blüte der Fruchtknoten oberständig, in der epigynen, oberweibigen Blüte der Fruchtknoten unterständig ist, daß sich also ober und unter in derselben Bezeichnung gegenüberstehen, weil es darauf ankommt, von welchem Teile man ausgeht, um die Stellung des anderen Teiles zu kennzeichnen.

Zu erwähnen sind hier noch Auswüchse des Blütenbodens, die sogenannten Achseneffigurationen, welche nicht selten vorkommen. Zuweilen sind diese groß und blumenblattartig (z. B. bei Passiflora), meistens aber weniger auffallend, ungefärbt und wulst-

förmig. Man bezeichnet sie dann mit dem Namen Discus. Dieser ist entweder ein zusammenhängender Ring oder bildet eine ringförmige Gruppe von Drüsen und Schuppen, die sich gewöhnlich zwischen Androeceum und Gynaeceum befinden. Der Discus scheidet in der Regel behufs Anlockung von Insekten eine zuckerreiche Flüssigkeit, den Nektar, aus und wird dann Nectarium genannt. Doch auch Blätter oder einzelne Teile von Blättern können in der Blüte als Nektarien ausgebildet sein, wie z. B. in einzelnen Fällen die Blumenblätter und die Staubblätter.




Abb. 85. Blütendiagramme: *A* einer dreizähligen Blüte, *B* einer fünfzähligen, aktinomorphen, obdiplostemonen Blüte, *C* einer fünfzähligen, median-zygomorphen Blüte.

### Die Blütendiagramme.

Aus dem soeben Gesagten geht hervor, daß es bei einer großen Anzahl von Blüten nicht möglich ist, durch einen einzigen, in bestimmter Höhe geführten Querschnitt sämtliche Teile der Blüte so zu treffen, daß aus dem gewonnenen Querschnittsbilde die Stellung jener zueinander klar hervorgeht. Um jedoch die Vorteile auszunützen, welche ein vollkommenes Bild von der räumlichen Anordnung der Blütenteile in sich vereinigt, pflegt man sich nach den Gesetzen der geometrischen Projektionslehre die Einfügungs- oder Insertionsstellen sämtlicher Blütenteile, einschließlich des Fruchtknotens, in eine einzige geometrische Ebene verlegt zu denken. Das so entstehende Bild nennt man ein Blütendiagramm.

Ein Blütendiagramm ist imstande, fast alles über die Blüte Wissenswerte zu veranschaulichen. Es läßt sich aus ihm ersehen, ob die Blüte regelmäßig (strahlig oder aktinomorph) oder unregelmäßig (zygomorph) ist, wie viele Kelch-, Blumen-, Staub- und Fruchtblätter jene besitzt, ob letztere verwachsen oder getrennt sind und echte oder falsche oder beiderlei Scheidewände bilden, ob die Staub-

gefäße in einen einzigen Kreis oder in mehrere Kreise angeordnet sind, ob sie vor den Kelch- oder Kronblättern stehen oder spiralg angeordnet sind, ob ihre Antheren nach außen oder nach innen am Staubfaden angeheftet sind, ob die Anordnung der Blütenteile eine kreisförmige, cyklische (von *κύκλος*, *kyklos* = der Kreis) oder spiralgige (acyklische), ja sogar, ob die Blüte eine Endblüte (Terminalblüte) oder eine Seitenblüte ist, und in welcher Stellung sie sich zur Hauptachse, zu ihrem Deckblatt und ihren Vorblättern befindet.

So ist Abb. 85 *A* der Grundriß einer durchweg dreizähligen, aus fünf Kreisen aufgebauten, regelmäßigen Blüte mit einem Vorblatt, Abb. 85 *B* der Grundriß einer gleichfalls aus fünf Kreisen aufgebauten, aber durchweg fünfzähligen, regelmäßigen Blüte mit zwei Vorblättern, Abb. 85 *C* der Grundriß einer fünfzähligen, aber unregelmäßigen, jedoch symmetrischen Blüte mit zwei Vorblättern und je einem Deckblatt (*d*).

Die hier unter *A* und *B* dargestellten Blütendiagramme sind solche von sogenannten vollständigen Blüten, d. h. von Blüten, in denen sämtliche fünf Blütenblattkreise, nämlich

der Kelchblattkreis,  
der Blumenblattkreis,  
der äußere Staubblattkreis,  
der innere Staubblattkreis,  
der Fruchtblattkreis

vorhanden und auch der Zahl ihrer Organe nach vollkommen entwickelt sind. In den Fällen, wo einzelne Organe fehlen, deutet man sie in dem typischen (durch verwandtschaftliche Verhältnisse der Pflanze ermittelten) Grundriß durch Kreuze an (vergl. z. B. Abb. 85 *C*).

Jedoch noch weit mehr läßt sich in diesen Blütendiagrammen zum Ausdruck bringen.

In Abb. 85 *A* ist z. B. für Kelch- und Blumenblätter die gleiche Form gewählt, und es wird damit angedeutet, daß die Kelchblätter nicht als solche ausgestaltet, sondern blumenblattartig ausgebildet sind und mit den Blumenblättern zusammen ein Perigon bilden.

In den Abbildungen *B* und *C* hingegen sind die Kelchblätter als außenseitig deutlich gekielt markiert, wodurch die Kelchblattform angedeutet ist. In Abb. *A* stehen die Kelchblätter in einem Kreise, in Abb. *B* sind sie spiralg angeordnet.

In den Abbildungen *A* und *B* sind alle Kelch- und Blumenblätter frei, in Abb. *C* sind sie zu zweien oder dreien verwachsen.

Die Staubgefäße bilden in Abb. *A* und *B* zwei Kreise, in Abb. *C* nur einen, und auch in diesem ist ein Staubblatt nicht entwickelt und deshalb seine Stelle durch ein Kreuz angedeutet.

Im Fruchtknoten endlich läßt sich bei dem Blütendiagramm außer der Zahl der Fruchtblätter angeben, ob diese verwachsen sind, und daß sie in Abb. *A* drei echte, in Abb. *B* fünf echte und in Abb. *C* eine echte Scheidewand und zwei falsche (nicht bis zur Mitte reichende) Scheidewände besitzen.

Bilden die einzelnen Glieder der Blüte je einen Kreis, so heißt die Blüte *cyklisch*. Zeigt die Blüte jedoch *spiralige* Anordnung der Gesamtheit ihrer Glieder, wie es bei den *Ranunculaceen* die Regel ist, so wird sie *acyklisch* oder *spiralig* genannt, dagegen *hemicyklisch*, wenn ein Teil ihrer Organe, z. B. Blütenhüllblätter und Staubblätter, *spiralig* angeordnet ist, während der andere, z. B. die Fruchtblätter, eine *cyklische* Anordnung zeigt.

Meistens wechseln die einzelnen Organe der verschiedenen Kreise miteinander ab, so daß, von außen betrachtet, vor dem Kelchblatt nicht ein Blumenblatt, sondern erst ein Organ des auf den Blumenblattkreis folgenden Kreises, nämlich des äußeren Staubblattkreises zu stehen kommt, wohingegen das Blumenblatt an derjenigen Stelle eingefügt ist, an welcher zwei Kelchblätter mit ihren Rändern zusammenstoßen. Man nennt dies die *alternierende* Folge der Blütenblätter. So berührt z. B. bei Abb. 85 A ein Radius je ein Kelchblatt, ein äußeres Staubblatt und ein Fruchtblatt, ein anderer Radius hingegen die Organe der dazwischenliegenden Kreise, nämlich je ein Blumenblatt und ein inneres Staubblatt. Diese Stellung der Staubgefäße ist die normale und wird als *diplostemon* bezeichnet. Eine nicht seltene Abweichung von diesem Blütenbau besteht aber darin, daß die äußeren Staubgefäße vor den Kronenblättern, die inneren vor den Kelchblättern inseriert sind. In diesem Falle wird das *Androeceum* *obdiplostemon* genannt. In dem in Abb. 85 B gegebenen Diagramm einer *obdiplostemon* Blüte berührt also ein Radius je ein Kelchblatt und ein Staubgefäß des inneren (statt des äußeren) Staubblattkreises und ein anderer Radius führt durch ein Blumenblatt, ein äußeres Staubgefäß und ein Fruchtblatt.

Blüten, bei denen das *Androeceum* nur von einem einzigen vollzähligen Kreis oder Wirtel gebildet wird, heißen *haplostemon*. Bei solchen unterscheidet man der Stellung nach *epispale* oder *epipetale* Staubblätter.

Regelmäßige Blüten nennt man *strahlig*, *radiär* oder *aktinomorph* (von *ἀκτίς*, *aktis* = der Strahl, und *μορφή*, *morphe* = die Gestalt); unregelmäßige, aber symmetrische Blüten nennt man *zygomorph* (von *ζυγόν*, *zygon* = das Joch oder das Paar). Wenn diejenige Linie, welche die Blüte in zwei spiegelbildlich gleiche Hälften teilt, auch die Achse schneidet, an welcher sie seitlich ansitzt, wenn jene also mit der Medianlinie zusammenfällt, so nennt man die Blüte *median zygomorph*, z. B. bei den *Orchidaceen* und *Labiaten*; bildet die Symmetrieebene mit der Mediane einen spitzen Winkel, so ist die Blüte *schräg zygomorph*, z. B. bei der *Roskastanie*; ist der Winkel endlich ein rechter, so heißt die Blüte *quer zygomorph* oder *transversal zygomorph*, z. B. bei den Arten von *Fumaria*.

### Die Blütenformeln.

Obgleich sich durch die Blütendiagramme ein fast vollkommenes Bild der Blüte geben läßt, so hat man doch weiterhin versucht, sich

von der bildlichen Darstellung unabhängig zu machen und gibt jenen Bildern in Formeln Ausdruck, welche, anfangs nur dazu bestimmt, die Zahlenverhältnisse wiederzugeben, durch eine Art Zeichensprache so weit ausgestaltet worden sind, daß man in ihnen fast ebenso viel ausdrücken kann, wie in der bildlichen Darstellung der Blüten-diagramme.

Man bezeichnet mit *K* den Kelch, mit *C* (Corolla) die Blumenblätter, mit *P* ein Perigon, mit *A* (Androeceum) die Staubgefäße, mit *G* (Gynaeceum) die Fruchtblätter und stellt hinter diese Bezeichnungen die Ziffern, welche die Anzahl der einzelnen Organe in jedem Kreise angeben. So würde z. B. die Blütenformel für Abb. 85 A lauten:

$$P\ 3 + 3\ A\ 3 + 3\ G\ 3.$$

Ist die Gliederzahl eines Kreises sehr groß oder unbestimmt, so wird dies durch das Zeichen  $\infty$  ausgedrückt.

Fehlende Kreise läßt man nicht weg, sondern ersetzt ihre Zahlen durch 0; die Verwachsung von Gliedern eines Kreises deutet man durch Klammern an, und ob der Fruchtknoten ober- oder unterständig ist, durch einen Strich unter oder über der Zahl; z. B.  $G^{(3)}$  bedeutet: dreiblättriger, verwachsener, oberständiger Fruchtknoten. Findet Verwachsung einzelner Kreise nur teilweise statt, so daß Ober- und Unterlippe gebildet werden, so setzt man die Zahl der zur Verwachsung der Oberlippe zusammengetretenen Blätter in den Zähler, die der Unterlippe in den Nenner eines Bruches. Endlich kann man auch die Aktinomorphie und die Zygomorphie durch Zeichen andeuten.  $\oplus$  bedeutet aktinomorph,  $\downarrow$  median zygomorph,  $\swarrow$  schief und  $\leftarrow$  quer zygomorph. Die Blütenformel für Abb. 85 C würde, als eine der umständlichsten, also lauten:

$$\downarrow K \frac{3}{2} C \frac{2}{3} A\ 4 + 0 G^{(2)}.$$

### Die Blütenstände.

Nur selten stehen die Blüten einzeln und bilden das Ende des Sprosses, wie dies z. B. bei der Einbeere (*Paris quadrifolia*) der Fall ist (einachsige Pflanzen, Abb. 86). Nicht zu verwechseln sind diese Fälle mit denjenigen, wo die Blütenstiele aus einer Blattrosette dicht über dem Erdboden entspringen, wie bei dem Veilchen (*Viola odorata*, Abb. 87); denn tatsächlich bildet in letzterem Falle eine der Blattachsen der Rosette die Ursprungsstelle des Blütenstieles, und die Blüte ist somit ebenso eine seitenständige, wie die Mehrzahl der Blüten überhaupt.

Meistens sind die Blüten, wenn deren zahlreiche vorhanden sind, an der Spitze des Haupttriebes oder seiner Seitentriebe dicht zusammengedrängt und bilden daselbst sogenannte Blütenstände. Ihre Anordnung unterliegt dabei bestimmten Gesetzmäßigkeiten, welchen wiederum die Gesetze der Verzweigung im allgemeinen (siehe S. 35) zugrunde liegen.



Abb. 86. Endständige Blüte der Einbeere, *Paris quadrifolia*.

Alle Blütenstände lassen sich auf zwei Grundformen zurückführen, da beide dem monopodialen Verzweigungssystem angehören (obgleich es scheinbar Ausnahmen gibt), nämlich:

a) die traubigen, botrytischen oder racemösen Blütenstände, und

b) die trugdoldigen oder cymösen Blütenstände.

Beiden traubigen oder racemösen Blütenständen wächst die Hauptachse unbegrenzt fort, und alle Nebenachsen sind Sprosse erster Ordnung, welche der Reihe nach gemeinsam aus einem und demselben Fußstück, der Hauptachse, hervorgegangen sind. Dieses Fortwachsen der Hauptachse bringt es mit sich, daß die innersten, bezw. obersten Blüten noch in der Entwicklung begriffen sind,




Abb. 87. Seitenständige Blüten des Veilchens, *Viola odorata*.

während die äußeren, bezw. unteren Blüten zuweilen schon längst verblüht sind. Aus diesem Grunde kommt den traubigen oder racemösen Blütenständen auch die Benennung *centripetale* Blütenstände zu (d. h. in ihrer Blütenfolge dem Mittelpunkt zustrebend, z. B. Hyacinthe, Sonnenblume), während die trugdoldigen oder cymösen auch *centrifugale* Blütenstände genannt werden, da stets die Endblüte des jeweiligen Sprosses zuerst blüht, das Aufblühen also vom Mittelpunkt nach der Peripherie hin fortschreitet.

a) Bei den traubigen, racemösen oder centripetalen Blütenständen können je nach den Längsverhältnissen der Haupt- und Nebenachsen 4 Grundformen zustande kommen, und zwar:

1. Hauptachse verlängert — Nebenachsen verlängert: die **Traube** (*Racemus*), Abb. 88, 1;
2. Hauptachse verlängert — Nebenachsen verkürzt: die **Ähre** (*Spica*), Abb. 88, 2;




Abb. 88. Schematische Zeichnung der racemösen Blütenstände: 1 Traube, 2 Ähre, 3 Kolben, 4 Dolde, 5 Köpfchen.

3. Hauptachse verkürzt — Nebenachsen verlängert: die **Dolde** (*Umbella*), Abb. 88, 4;
4. Hauptachse verkürzt — Nebenachsen verkürzt: das **Köpfchen** (*Capitulum*), Abb. 88, 5.

Eine Unterform der Ähre ist der **Kolben** (*Spadix*), Abb. 88, 3, bei welchem die Hauptachse (Spindel) fleischig verdickt ist.

b) Die trugdoldigen, cymösen oder centrifugalen Blütenstände lassen folgende Formen unterscheiden:

1. Das **Dichasium**. Dieses besteht aus einer Endblüte und zwei unterhalb derselben an der Hauptachse in gabeliger Verzweigung entstandenen Seitenblüten (Abb. 89, 1a). Fällt die Endblüte ganz weg, was, wenn auch sehr selten, vorkommen kann, so nennt man das Dichasium ein gabeliges oder *dichotomes* Dichasium (Abb. 89 1b). Eine Abart des Dichasiums ist das **Pleiochasium**, bei dem statt zweier Seitenachsen deren drei (**Trichasium**) oder mehrere ausgebildet werden.

2. Die **Wickel**, *Cincinnus*. Diese entsteht, wenn unterhalb der Endblüte am Hauptsproß sich nur ein Nebensproß entwickelt, aus diesem selbst wiederum nur ein Nebensproß zweiter Ordnung usf.

Voraussetzung ist, daß dies abwechselnd links und rechts von der Abstammungsachse geschieht (Abb. 89, 2a). Hat das Ganze eine gestreckte Form angenommen (Abb. 89, 2b), so ist der Blütenstand von einer Traube nur dadurch zu unterscheiden, daß die Deckblätter den einzelnen Blüten gegenüberstehen. Häufig, besonders bei Borraginaceen und Leguminosen, kommen Doppelwickel vor, bei denen die beiden Seitenachsen eines Dichasiums je zu einer Wickel auswachsen.




Abb. 89. Schematische Zeichnung der cymösen Blütenstände: 1a Dichasium, 1b gabeliges Dichasium, 2a Wickel, 2b gestreckte Wickel, 3a Schraubel, 3b gestreckte Schraubel.

3. Die **Schraubel**, *Bostryx*. Diese entsteht in ähnlicher Weise wie die Wickel, aber mit dem Unterschiede, daß die Verzweigung nur nach einer Richtung hin geschieht. Es existiert hier ebenfalls die gewöhnliche (Abb. 89, 3a) und die gestreckte Form (Abb. 89, 3b).




Abb. 90. Schematische Zeichnung zusammengesetzter Blütenstände: 1 Doppeldolde, 2 Trugdolde.

Abb. 91. Schematische Zeichnung zusammengesetzter Blütenstände: 1 Rispe, 2 Spirre.

c) Die zusammengesetzten Blütenstände können aus lauter racemösen, oder aus lauter cymösen Teilblütenständen, oder aus beiden zugleich gebildet sein. Zusammengesetzte Blütenstände kommen sehr häufig vor. Man bezeichnet sie zumeist der Zusammensetzung entsprechend, z. B. als Dichasien in Trauben, Köpfchen in Schraubeln usw. — Diese Ausdrücke erklären sich von selbst.

Einige, und zwar besonders häufig vorkommende, zusammengesetzte Blütenstände seien hier besonders erwähnt, da sie mit besonderen Namen belegt worden sind. Es sind dies:

1. Die **Doppeldolde** (Abb. 90, 1), d. i. eine Dolde, deren einzelne Zweige abermals doldig verzweigt sind! Dies ist derjenige Blütenstand, welcher mit sehr wenigen Ausnahmen bei sämtlichen Doldengewächsen (Umbelliferen) vorkommt.

2. Die **Trugdolde**. Diese entsteht (Abb. 90, 2), wenn sich die Seitenachsen eines cymösen Blütenstandes in gleicher Weise derart verzweigen, daß die Blüten ungefähr in einer Ebene liegen (*Sambucus nigra*). Sie ist im Grunde nichts anderes als ein vielfaches Dichasium.

3. Die **Rispe**, *Panicula* (Abb. 91, 1), ist eine Traube, deren einzelne Zweige abermals traubig (oder auch ährenförmig) verzweigt sind, wie es z. B. bei dem Weinstock (Weintraube) der Fall ist.

4. Die **Spirre**, *Anthela* (Abb. 91, 2), ist eine Trugdolde mit teils traubenförmigen, teils dichasienartig verzweigten, verlängerten Nebenachsen (*Luzula pilosa*).

## Die Frucht.

Da die Blüte nur dem Zwecke der Befruchtung der (wenn wir von den Gymnospermen absehen) in ihrem Fruchtknoten eingeschlossenen Samenanlagen dient, so ist ihre Bestimmung erfüllt, sobald die Befruchtung, sei es durch Vermittelung des Windes oder bestimmter Insekten, stattgefunden hat. Staubgefäße, Blumenblätter und oft auch der Kelch sterben ab und lösen sich meist von der Pflanze los, während hingegen die Fruchtblätter zugleich mit der fortschreitenden Entwicklung der Samen zu mannigfach gestalteten Hüllen für die letzteren auswachsen. Wenn hierbei eine verschiedene Ausbildung der äußeren, mittleren und inneren Fruchtblattschicht stattfindet, so unterscheidet man danach an der fertigen Fruchtwandung, dem Perikarp (von außen nach innen): *Exokarp*, *Mesokarp* und *Endokarp*.

An dieser Hüllenbildung können sich jedoch noch andere Teile außer den Fruchtblättern beteiligen, so der Kelch, oder aber, wie es häufig geschieht, der Blütenboden. In diesem Falle spricht man von *Scheinfrüchten* oder *Halbfrüchten*.

**Die echten Früchte** sind ausnahmslos nur aus den Fruchtblättern (einschließlich der Samenanlagen) hervorgegangen. Man unterscheidet:

- a) Trockenfrüchte und
- b) Fleischfrüchte oder Saftfrüchte.

Bei ersteren ergibt sich ein wesentlicher Unterschied wiederum dadurch, daß die Früchte zur Zeit der Reife entweder geschlossen bleiben oder aber von selbst aufspringen, wonach man sie in *Schließfrüchte* und *Springfrüchte* einteilt. Man hat die echten Früchte also wie folgt zu unterscheiden:

### a) Trockenfrüchte.

#### I. Schließfrüchte:

- 1. Nuß;
- 2. Achaene;

- 3. Doppelachaene;
  - 4. Caryopse.
- II. Springfrüchte:
- 1. Balgfrucht;
  - 2. Hülse;
  - 3. Schote;
  - 4. Kapsel.

**b) Fleischfrüchte oder Saftfrüchte.**

- 1. Steinfrucht;
- 2. Beere.

Die **Nuß** besitzt ein holziges Perikarp (z. B. die Hanffrucht, die Haselnuß, Abb. 92) und umschließt nur einen einzigen Samen.




Abb. 92. Nuß vom Haselstrauch, *Corylus avellana*.

Abb. 93. Achaene von *Silybum Marianum*. (c u. d vergrößert).

Abb. 94. Doppelachaene vom Römischen Kümmel, *Cuminum cyminum*.

Die **Achaene** besitzt eine lederige Hülle mit nur einem Samen, der der Fruchtwandung fest angewachsen ist (z. B. Kompositenfrüchte, Abb. 93).



Abb. 95. DreiBalgfrüchte von *Aconitum napellus*: a die aufspringende Bauchnaht, o die Rücken-naht.

Abb. 97. Schötchen des Hirtentäschel, *Capsella bursa-pastoris*: 1 geschlossen, 2 aufgesprungen u. vergrößert.

Abb. 96. Hülsenfrucht der Bohne, *Phaseolus vulgaris*: 1 geschlossen, 2 geöffnet.

Die **Doppelachaene** ist die den Umbelliferen eigentümliche Frucht, welche aus zwei Fruchtblättern hervorgeht. Jede von ihnen schließt einen Samen ein, welcher mit der Fruchtschale fest

verwachsen ist. Bei der Reife zerfallen die Doppelachänen leicht in zwei Teile, Merikarpien oder Spaltfrüchte genannt (Abb. 94).

Die **Caryopse** ist die mit einer häutigen, der Samenschale fest angewachsenen Hülle versehene Frucht der Gräser (z. B. Körner des Roggens, des Weizens).

Die **Balgfrucht** (Folliculus) ist die aus einem einzigen, häutig gewordenen Fruchtblatt gebildete, besonders bei den Ranunculaceen vorkommende Frucht, welche zur Reifezeit an ihrer Bauchnaht aufspringt (Abb. 95).

Die **Hülse** (Legumen) wird ebenfalls aus einem Fruchtblatte gebildet, springt aber zur Reifezeit an Bauch- und Rückennaht meist gleichzeitig auf. Sie ist den Leguminosen eigen (Abb. 96).




Abb. 98. Schote des Kohls, *Brassica oleracea*: 1 geschlossen, 2 aufgesprungen; die obere Klappe ist bei 2 entfernt.

Abb. 99. *Papaver somniferum*. I. Kapsel von der Seite gesehen. II. Narbe von oben gesehen. III. Kapsel im Querschnitt, die unvollständigen, mit Samen besetzten Scheidewände zeigend. Vergr.  $\frac{2}{3}$ .

Die **Schote** (Siliqua) wird aus zwei Fruchtblättern gebildet, zwischen denen sich eine falsche Scheidewand befindet. Zur Reifezeit lösen sich beide Fruchtblätter klappenartig von der Scheidewand ab. Die Schote ist z. B. den Cruciferen eigen (Abb. 98). Ist sie weniger als doppelt so lang wie breit, so nennt man sie gewöhnlich Schötchen (Silicula, Abb. 97).

Die **Kapsel** besteht aus zwei oder mehr Fruchtblättern, welche unter sich verwachsen sind (Abb. 99). Sie kann einfächerig sein, wenn die verwachsenen Ränder der Fruchtblätter sich nicht oder nur wenig nach innen vorwölben, oder aber mehrfächerig, durch echte Scheidewände geteilt, wenn die verwachsenen Ränder der Fruchtblätter bis zur Mitte reichen oder noch weiter wachsen und innerhalb der Fächer von innen vorspringen. Auch können, durch Wucherung der Mittelrippen der einzelnen Fruchtblätter, nicht bis zur Mitte reichende, sogenannte falsche Scheidewände gebildet werden. Zur Zeit der Reife öffnet sich die Kapsel, um die Samen auszustreuen, und man unterscheidet nach der Art und Weise, in welcher das Öffnen vor sich geht, drei Typen:

1. Das Aufspringen findet längs der Scheidewand statt — scheidewandspaltige oder septicide Dehiscenz (Abb. 100 b).

2. Das Aufspringen findet durch einen Längsriß in der Mitte der Außenwand jedes Faches statt — fachspaltige oder lokulicide Dehiscenz (Abb. 100 c).

3. Das Aufspringen findet durch Trennung der Scheidewände und der Außenwände statt — wandbrüchige oder septifrage Dehiscenz (Abb. 100 d).




Abb. 100. Verschiedenartig aufspringende Kapseln querdurchschnitten: a dreifächerige, geschlossene Kapsel, b wandspaltig geöffnet, c fachspaltig geöffnet, d wandbrüchig geöffnet.





Abb. 101. Deckelkapsel des Bilsenkrautes, *Hyoscyamus niger*: a geschlossen, b mit abfallendem Deckel.

Weiterhin kann das Ausstreuen der Samen auch geschehen, indem sich Löcher in der Kapsel bilden, wie beim Mohn (Abb. 99) oder indem sich der obere Teil der Kapsel deckelförmig abhebt, wie beim Bilsenkraut (Abb. 101) oder manchen Primulaceen (*Cyclamen*, *Anagallis*). Man spricht dann von Porenkapseln und Deckelkapseln.

Die **Steinfrucht** (*Drupa*) ist eine Fleischfrucht; durch Verholzen der inneren Fruchtschicht wird eine steinharte Schale um den oder die Samen gebildet; jene ist von einer fleischig-weichen Schicht umgeben, wie es bei dem Steinobst: Kirschen, Pflaumen, Pfirsichen usw. der Fall ist.



V. M.  
Abb. 102. Heidelbeere, Frucht von *Vaccinium myrtillus*; rechts dieselbe querdurchschnitten.

Die **Beere** (*Bacca*) ist eine Fleischfrucht, in welcher die meist zahlreichen Samen unmittelbar von dem weichen Fruchtfleische umgeben werden (Heidelbeere, Abb. 102, Stachelbeere).

#### Sammelfrüchte.

Diese entstehen dadurch, daß mehrere oder zahlreiche in einer Blüte vorhandene, ursprünglich freie Karpelle zu einem zusammenhängenden Gebilde verwachsen, wie es z. B. bei der Himbeere und Brombeere der Fall ist.

#### Scheinfrüchte oder Halbfrüchte.

Sie finden sich, streng genommen, bei sämtlichen Pflanzen mit unterständigem Fruchtknoten, da bei diesen stets die Blütenachse an der Fruchtbildung beteiligt ist. Man pflegt jedoch häufig, wie z. B. bei den Achaenen und Doppelachaenen, darüber hinwegzusehen.

Die Scheinfrüchte sind, wie bereits angedeutet, solche Früchte, an deren Zustandekommen sich auch andere Teile als allein die Fruchtblätter beteiligt haben. Immer aber sind sie, zum Unterschiede von den Fruchtständen, aus einer einzigen Blüte hervorgegangen. Wichtige Formen derselben sind:



Abb. 103. Quittenfrucht, längsdurchschnitten.




Abb. 104. Rosenfrucht, längsdurchschnitten.




Abb. 105. Junge Erdbeerfrucht im Längsschnitt.

Die **Apfelfrucht**, welche außer bei dem Apfel auch bei der Birne, der Quitte, der Mispel angetroffen wird (Abb. 103). Hier ist nur der innere Teil mit den Samen (das sogen. Gehäuse) aus den Fruchtblättern hervorgegangen. Er unterscheidet sich beim Durch-




Abb. 106. Granatfrucht von *Punica granatum*: 1 längsdurchschnitten, c der Kelchsaum, d der Blütenboden; 2 querdurchschnitten.




Abb. 107. 1 Fruchtbildung von *Anacardium occidentale*, 2 von *Semecarpus anacardium*. a Frucht, b fleischig angeschwollener Fruchtstiel.

schneiden einer solchen Frucht durch eine scharf umschriebene Linie deutlich von dem ihn umgebenden fleischigen Teile, welcher aus dem Fruchtboden hervorgegangen ist und oben noch von den Überresten des Kelches gekrönt zu werden pflegt (Abb. 103 c).

Die **Rosenfrucht** (Abb. 104) ist in ähnlicher Weise zu stande gekommen, nur sitzen hier die zahlreichen Einzelfrüchtchen auf der Innenseite des fleischig gewordenen, krugförmigen Fruchtbodens an.

Die **Erdbeerfrucht** (Abb. 105) zeigt umgekehrte Verhältnisse. Hier bildet der Blütenboden den mittleren, fleischigen Kegel, während die gleichfalls von je einem Fruchtblatte umschlossenen Samen, also Einzelfrüchtchen, jenem auf seiner ganzen Oberfläche aufsitzen.

Die **Granatfrucht** (Abb. 106) ist durch ein ungewöhnlich starkes Wachstum des Blütenbodens, die **Anacardienfrucht** (Abb. 107) durch Wucherung des Fruchstieles zu stande gekommen.

#### Fruchtstände.

Die **Fruchtstände** sind, wie der Namen sagt, nicht aus einer einzigen, sondern einer gewissen Anzahl von Blüten hervorgegangen. Daß man oft scheinbar eine einzige Frucht vor sich zu haben glaubt, rührt daher, daß derjenige Achsenteil, welchem die Einzelfrüchtchen




Abb. 108. *Ficus carica*. A Fruchtstand im Längsschnitt ( $\frac{2}{1}$ ). B einzelne männliche Blüte im Längsschnitt ( $\frac{2}{1}$ ). C weibliche Blüte im Längsschnitt ( $\frac{15}{1}$ ). D steriler Samen aus einer sog. Gallenblüte ( $\frac{2}{1}$ ). E fertiler Samen, längs durchschnitten. ( $\frac{20}{1}$ .)

aufsitzen, fleischig, wie z. B. bei der Feige (Abb. 108), Maulbeere und Ananas, oder samt seinen Deckblättern holzig geworden ist, wie z. B. bei der Erle (Abb. 109),

Besondere Erwähnung verdienen hier die Zapfen und Zapfenbeeren der Nadelholzwächse (z. B. Wacholderbeeren). Ihrem Zustandekommen liegen ganz besondere Verhältnisse zugrunde, welche im systematischen Abschnitte dieses Buches an betreffender Stelle erörtert werden sollen.

#### Die Samenanlage.

Der Samen, zu dessen Schutz oder Verbreitung die Frucht vorhanden ist, liegt einzeln oder zu mehreren (die Gymnospermen sind hier ausgenommen) innerhalb der Frucht und ist mit dieser an der Nabelstelle verbunden. Er stellt das aus der Samenanlage (dem Eichen oder Ovulum) hervorgegangene Gebilde dar.

Während die Samenanlagen der Gymnospermen frei an den Fruchtblättern stehen, sind sie bei den Angiospermen stets im Fruchtknoten eingeschlossen. Sie entspringen in der Regel aus den Randteilen der Fruchtblätter und sind dementsprechend im einfächerigen Fruchtknoten meist wandständig oder parietal, im mehrfächerigen meist zentralwinkelständig. Abweichend hiervon ist die scheinbare Erzeugung der Samenanlagen durch die Blütenachse (grundständige Samenanlagen), welche z. B. bei den Reihen der Centrospermae und der Primulales vorkommt. Man ist jedoch vielfach geneigt, diese Erscheinung auf Verkümmern, Verwachsung oder Verschiebung der Scheidewände zurückzuführen.




Abb. 110. Samenanlagen verschiedener Gestalt: I gerade, orthotrop oder atrop, II gekrümmt oder campylotrop, III umgewendet oder anatrop; f der Nabelstrang oder Funiculus, α äußeres, i inneres Integument, k Nucellus oder Knospkern, e Embryosack, m Mikropyle.

Die Stellen des Fruchtknotens, an denen die Samenanlagen entspringen, sind mehr oder weniger verdickt und heißen Samenleisten oder Placenten (Placentae, die schraffierten Stellen in Abb. 110). Aus diesen Samenleisten erhebt sich der Nabelstrang, welcher das Verbindungsglied zwischen der Samenanlage und der Pflanze bildet.

Der Nabelstrang (Funiculus) besitzt eine sehr verschiedene Länge, je nachdem die Samenanlage und dementsprechend später der ausgereifte Samen gerade, gekrümmt oder umgewendet ist. Die drei Figuren in Abb. 110 veranschaulichen diese drei verschiedenen Arten von Samenanlagen.

### Der Bau der Samenanlagen.

Die wesentlichsten Teile der Samenanlage sind:

- a) Die Integumente.
- b) Der Nucellus (Knospkern),
- c) Der Embryosack (Keimsack).

a) Die Integumente (Abb. 110 a und i) umhüllen becherartig den Nucellus und wachsen nach der Befruchtung zur Samenschale aus. Sie bilden an einer Stelle eine mundförmige Öffnung, Mikropyle oder Keimmund genannt (Abb. 110 m). Häufig ist nur ein einziges Integument vorhanden.

b) Der Nucellus oder Knospenkern (Abb. 110*k*) wird von der gesamten Gewebemasse gebildet, welche die Integumente umschließt. In ihm fällt eine große Zelle, welche in der Nähe der Mikropyle liegt, besonders auf, es ist dies:

c) Der Embryosack oder Keimsack (Abb. 110*e*). Seine nähere Beschaffenheit wird bei der Erläuterung des Befruchtungsvorganges (vergl. die Einleitung zu den Embryophyta siphonogama im systematischen Teil) Besprechung finden. Vorläufig genügt es zu wissen, daß innerhalb des Embryosackes sich nach erfolgter Befruchtung der gewöhnlich von einem Nährgewebe umgebene Embryo oder Keim bildet, aus welchem bei der Keimung des Samens die neue Pflanze hervorgeht. Der Embryosack vergrößert sich, sobald der Embryo nach erfolgter Befruchtung sich zu entwickeln beginnt, ja er kann so groß werden, daß von dem Gewebe des Nucellus zwischen Embryosack und Integumenten nichts mehr übrig bleibt, indem das Gewebe des Nucellus vom Embryosack völlig aufgezehrt (resorbiert) wird. Wenn der Embryo, wie gewöhnlich, nicht den ganzen vergrößerten Embryosack ausfüllt, so umgibt ihn ein Gewebe, welches die bei der Keimung nötigen Nährstoffe aufgespeichert enthält (Nährgewebe oder Endosperm).

Man ersieht hieraus, daß durch die Entwicklung des Keimes oder Embryos in seinem Verhältnis zu dem ihn umgebenden Gewebe des Embryosackes und dem außerhalb des Embryosackes liegenden Gewebe des Nucellus drei verschiedene Zustände herbeigeführt werden können, nämlich:

1. Der Embryosack vergrößert sich zwar, aber er zehrt das umliegende Gewebe des Nucellus nicht völlig auf. Dieses bleibt deshalb als Perisperm (d. h. um den Embryosack herum entstandenes Nährgewebe) im reifen Samen bestehen. Gleichzeitig nimmt auch meist der Embryo nicht den gesamten Raum des vergrößerten Embryosackes ein, und es bleibt um den Embryo herum noch Raum für Endosperm (d. h. innerhalb des Embryosackes entstandenes Nährgewebe).

2. Der Embryosack vergrößert sich derart, daß von dem Gewebe des Nucellus nichts übrig bleibt. Der Embryo selbst nimmt den Embryosack nicht völlig ein, sondern wird von einem innerhalb des Embryosackes entstandenen Nährgewebe, dem Endosperm, umgeben. Dies ist der am häufigsten vorkommende Fall.

3. Der Embryosack und der Embryo vergrößern sich derart, daß von dem Nucellargewebe nichts übrig bleibt. Der Embryo selbst nimmt den Embryosack völlig ein, und es bleibt auch kein Platz für ein weiteres, innerhalb des Embryosackes befindliches Nährgewebe. In diesem Falle spricht man von nährgewebelosen Samen, z. B. bei den Cruciferen und Leguminosen.

Da in ersterem Falle gelegentlich auch das Endosperm infolge der Vergrößerung des Embryos in Wegfall kommen kann, so existieren folgende vier verschiedene Arten von Samen:

- I. Samen mit Perisperm und Endosperm (z. B. bei den Pfeffergewächsen);

- II. Samen nur mit Perisperm (sehr selten).
- III. Samen mit Endosperm (bei den meisten Pflanzen);
- IV. Nährgewebelose Samen (z. B. bei den Cruciferen und Leguminosen).

Wo weder Endosperm noch Perisperm ausgebildet wird, haben die Keimblätter des Embryos frühzeitig das Nährgewebe aufgezehrt, sind dick und fleischig geworden (z. B. Abb. 36) und haben die zur Keimung erforderlichen Nährstoffe in ihrem Gewebe gespeichert. Dieser Typus der Samenbildung ist als der fortgeschrittenste, höchst entwickelte anzusehen, da hier der sich entwickelnde Embryo alle zur Keimung notwendigen Nährstoffe in sich selbst enthält.

### Die Gestalt der Samenanlagen.

Die Gestalt der Samenanlagen kann eine dreifache sein, und zwar:

1. Gerade oder atrop (auch orthotrop genannt).
2. Gekrümmt oder campylotrop.
3. Umgewendet oder anotrop.

Gerade Samenanlagen kommen verhältnismäßig selten vor. Bei ihnen liegt der Keimmund gegenüber der Anheftungsstelle (Abb. 110 I). (Piperaceae, Polygonaceae.)

Gekrümmte Samenanlagen, welche ebenfalls nur bei wenigen Gruppen des Pflanzenreiches vorkommen, besitzen einen bogenförmig nach der Anheftungsstelle zurückgekrümmten Nucellus. Die Mikropyle liegt seitlich oder ist der Ebene, aus welcher der Samen entspringt, mehr oder weniger zugewendet (Abb. 110 II). (Centrospermae).

Umgewendete Samenanlagen sind die häufigsten. Bei ihnen ist die Drehung nach der Anheftungsstelle hin eine so vollkommene, daß eine Krümmung des Kerns gar nicht stattfindet. Der Keimmund liegt unmittelbar neben der Anheftungsstelle (Abb. 110 III).

### Die Anheftung der Samenanlagen.

Das Verbindungsglied zwischen der Samenanlage und der Samenleiste oder Placenta wird Nabelstrang oder Funiculus genannt. Er ist meistens:

- kurz bei den aufrechten Samenanlagen;
- lang und gekrümmt bei den gekrümmten Samenanlagen;
- lang und der Samenanlage seitlich angewachsen bei den umgewendeten Samenanlagen (Abb. 110 III f).

Die oft langgestreckte Verwachsungsstelle von Samenanlage und Funiculus wird Raphe genannt und tritt bei Samen, die aus umgewendeten Samenanlagen hervorgegangen sind, häufig auffallend hervor.

Die Stelle, an welcher der Nabelstrang in den Samen eintritt, nennt man den Nabel (Hilum). Dieser liegt:

- gegenüber dem Keimunde bei den aufrechten Samenanlagen;
- seitlich vom Keimunde bei den gekrümmten Samenanlagen;
- unmittelbar neben dem Keimunde bei den umgewendeten Samenanlagen.

Die Stelle, an welcher der Nabelstrang endet, nennt man den inneren Nabel oder die Chalaza; sie ist in Abb. 110 durch eine punktierte Linie bezeichnet und liegt stets am Grunde des Nucellus.

Die Mehrzahl der Samenanlagen ist seitlich an den Placenten angeheftet, und man unterscheidet dann, ob sie wagrecht abstehend, aufwärts gekrümmt (aufsteigende Samenanlage) oder abwärts gekrümmt ist (hängende Samenanlage). Im ersteren




Abb. 111. Stellung der Samenanlagen zur seitlichen Samenleiste.




Abb. 112. Richtung der gekrümmten Samenanlagen.

Falle unterscheidet man z. B. wagrecht abstehende, gerade (Abb. 111 I), wagrecht abstehende, aufrecht umgewendete (II) und wagrecht abstehende, abwärts umgewendete (III) Samenanlagen. Bei hängenden und aufsteigenden umgewendeten Samenanlagen pflegt man einen Unterschied zu machen je nachdem die Samenanlage zwischen Plazenta und Funiculus liegt (dorsale Raphe) oder durch den Funiculus von der Plazenta getrennt wird (ventrale Raphe). In Abb. 112 zeigt beispielsweise Fig. I eine umgewendete aufsteigende Samenanlage mit dorsaler Raphe, Fig. II eine ebensolche mit ventraler Raphe, Fig. III eine umgewendete hängende Samenanlage mit ventraler Raphe und Fig. IV endlich eine solche mit dorsaler Raphe.

### Der ausgewachsene Samen.

Nach erfolgter Befruchtung wächst die Samenanlage zum Samen aus und ihre einzelnen Teile erfahren dabei mannigfache Ausbildung. Immer aber entspricht am reifen Samen:

- die Samenschale — den Integumenten,
- das Nährgewebe (auch manchmal Sameneiweiß genannt) — wenn es außerhalb des Embryosackes entstanden ist, dem Perisperm,
- wenn es innerhalb des Embryosackes entstanden ist, dem Endosperm.

Die Mikropyle schließt sich durch Verwachsung der Integumentränder, und die Verbindung des Samens mit der Pflanze löst sich an der Eintrittsstelle des Nabelstranges, einen sogenannten Nabelfleck (Hilum) hinterlassend. Bei den aus umgewendeten Samen-

anlagen hervorgegangenen Samen ist der seitlich mit der Samenschale verwachsene Nabelstrang von außen meist deutlich sichtbar und wird als Raphe bezeichnet.

Die Samenschale, Testa genannt, ist meist in zwei Schichten gesondert, eine innere, sehr dünne, meist weiße und stets häutige Schicht, welche gewöhnlich aus dem inneren Integument hervorgegangen ist, und eine äußere Schicht, welche ebenfalls häutig sein kann, wie bei der Walnuß, oder aber lederartig, wie bei der Bohne, oder endlich knochenhart, wie bei dem Weinstock.

Zuweilen, besonders bei Beerenfrüchten, wird die äußere Schicht des Integuments fleischig wie das sie umgebende Fruchtfleisch, so bei der Johannisbeere, oder sie besitzt Quellschichten, wie beim Leinsamen, welcher sich beim Einlegen in Wasser mit einer dicken Schleimschicht umgibt. Meist ist die Samenschale kahl, aber sie kann auch behaart sein, wie bei den Baumwoll- und Strophanthusamen. Bei letzteren und bei den Samen des Weidenröschens (*Epilobium*) trägt die Spitze außerdem eine gestielte oder ungestielte, als Flugorgan dienende Haarkrone.

Einige Samen besitzen außerdem nachträglich, d. h. nach erfolgter Befruchtung der Samenanlage entstandene Wucherungen. Nehmen diese von der Basis des äußeren Integumentes oder vom Funiculus




Abb. 113. *Myristica fragrans*. Samen vom Arillus umgeben, in der Frucht liegend; die obere Fruchthälfte entfernt.




Abb. 114. Rcinussamen. *A* Samen von vorn, *B* von hinten, *C* und *D* die beiden verschiedenen Längsschnitte, *E* Querschnitt ( $\frac{3}{2}$ ); *ka* Caruncula.

ihren Ausgang, so nennt man sie Samenmantel oder Arillus, z. B. die fälschlich „Blüte“ genannte Muskatblüte, d. i. der Arillus der Muskatnuß (Abb. 113). Eine Wucherung der Mikropyle hingegen ist z. B. die sogenannte Caruncula der Rcinussamen (Abb. 114).

### Verbreitung der Früchte und Samen.

Ganz kurz soll hier noch darauf hingewiesen werden, daß die Art der Verbreitung der Früchte und Samen durch gewisse morpho-

logische Eigenschaften bedingt ist. So werden die Saftfrüchte und auch saftige Scheinfrüchte und Samen durch Tiere verbreitet, die sie meist im ganzen verzehren und die unverdaulichen Samen, die den Darmkanal, ohne Schaden zu nehmen, durchlaufen, an anderen Stellen wieder von sich geben. Andere, die sogenannten Klettfrüchte, zeigen Widerhaken, mit denen sie leicht am Fell von Tieren und auch den Kleidern der Menschen haften und so verschleppt werden. Groß ist die Zahl der Früchte und Samen, die eine bedeutende Oberflächenvergrößerung durch Ausbildung von Flügeln oder Haarkronen erfahren haben und daher, wie die staubfeinen Samen der Orchidaceen, Begoniaceen und Lobelien, sich durch den Wind weithin tragen lassen. Schließlich sind auch noch mit einem Schwammgewebe ausgestattete Früchte zu erwähnen, die durch fließendes Wasser, durch Wellen oder Meeresströmungen, oft weit hinweggeführt werden.

## Innerer Bau der Pflanzen. Anatomie.

Um den inneren Bau der Pflanzen zu begreifen, muß man sich zunächst klar machen, auf welche Weise er zu stande gekommen ist, d. h. wie das Werden neuer Pflanzen und Pflanzenteile sich vollzieht. Dies geschieht ausnahmslos durch die Tätigkeit der Protoplasten oder Protoplasten. Ihnen allein wohnt Lebenskraft inne, welche nur zeitweise ruht, wie z. B. im Keimling der Samenpflanzen oder in den Sporen der Kryptogamen, unter bestimmten Umständen aber, die man als die Lebensbedingungen der Pflanzen bezeichnet, wieder in Tätigkeit tritt. Die Protoplasten sind zugleich die Träger aller Eigentümlichkeiten der einzelnen Pflanzen und übertragen diese Eigenschaften auf die Nachkommen.

Der lebendige Protoplastkörper umgibt sich meist mit einer Haut, welche ihn vor äußeren Einflüssen schützt. Diese Haut wird Zellwand genannt und bildet in Gemeinschaft mit dem Protoplasten die lebende Zelle. Jedoch befinden sich im Organismus höher entwickelter Gewächse auch Zellen, welche später kein lebensfähiges Protoplasma mehr enthalten und Dauerzellen genannt werden. Diese sind jedoch ausnahmslos einmal, und zwar bei ihrer Entstehung, sowie während der Dauer ihres Wachstums, lebende Zellen gewesen. Die Dauerzellen erfüllen ihre Bestimmung im Pflanzenorganismus nur im Verbands mit anderen, lebenden Zellen. Sie verdienen streng genommen die Bezeichnung „Zelle“ nicht mehr, obschon gerade sie diese Namengebung veranlaßten. Die ersten mit Hilfe starker Linsen arbeitenden Forscher nahmen eine Zusammensetzung des Pflanzenkörpers aus winzig kleinen Kammern wahr, welche sie Zellen (Cellulae) nannten, und lange Zeit hindurch galten auch diese Zellen als die Grundelemente der Lebewesen. Erst später, als das zusammengesetzte Mikroskop in der Erkenntnis weiterzuschreiten gestattete, nahm man wahr, daß als das Grundelement der Lebewesen nur ein ganz bestimmter Teil dieser Zellen zu bezeichnen war, nämlich das lebende Protoplasma. Nichtsdestoweniger ist die Bedeutung der „toten Zellen“ für den Organismus der höher entwickelten Gewächse eine erhebliche, denn sie bilden z. B. deren Wasserbahnen und verleihen ihnen die notwendige Festigkeit.

## Zellenlehre.

### Allgemeines über den Bau der Zelle.

Eine normale, jugendliche Zelle läßt folgende Teile erkennen (vergl. Abb. 115 A):

1. eine dünne, elastische Wandung, welche allseitig geschlossen ist und die Zellhaut, Zellwand oder Zellmembran genannt wird,
2. eine das gesamte Zellinnere ausfüllende farblose, weiche, zäh-schleimige, feinkörnige, wasserreiche Substanz, das Protoplasma, in welchem sich an beliebiger Stelle der Zellkern eingelagert findet.




Abb. 115. Wachsende Zellen aus dem Gewebeverbande einer Phanerogamo: A das jüngste, B und C fortgeschrittenere Wachstumsstadien darstellend.

Wächst diese jugendliche Zelle, so erkennen wir, daß im Protoplasma allmählich mehr und mehr kleine, in erster Linie aus Wasser bestehende Tröpfchen abgeschieden werden, die sogen. Vacuolen. Diese nehmen immer mehr an Größe zu und fließen meistens dann auch zu mehreren zusammen, so daß das Protoplasma an Masse oft weit hinter die Vacuolen zurücktritt. Die wässrige Flüssigkeit, welche die Vacuolen erfüllt, nennt man Zellsaft. In der definitiv ausgebildeten Zelle ist also das Protoplasma von zahlreichen kleinen oder wenigen großen Vacuolen durchsetzt oder aber das Plasma liegt als

einfacher, mehr oder weniger dünner Schlauch der Wandung der Zelle an (Abb. 115 B u. C), sodaß schließlich nur eine große Vacuole vorhanden ist.

Es gibt auch Zellen, welche vollständig nackt sind, d. h. welchen die Zellwand fehlt. Solche nackte Zellen, die also nur aus Protoplasma mit eingelagertem Zellkern bestehen und die häufig als Primordialzellen bezeichnet werden, sind nicht etwa unvollkommen, nicht völlig ausgebildet, sondern sie sind sogar zu den allerwichtigsten Lebensäußerungen der Pflanze befähigt, wie zur Ausübung der Fortpflanzung (Gameten, Spermatozoiden) oder zur




Abb. 116. Bierhefe, *Saccharomyces Cerevisiae*: 1 ein einziges Individuum, 2 eine durch Sprossung entstandene Kolonie. (3 und 4 Vermehrung durch Sporen.)

Abb. 118. a Querschnitt durch ein Markstrahlparenchym, b eine Zelle desselben körperlich dargestellt.

Abb. 117. 1 Ein Schimmelpilz; bis auf die Köpfchen der Fruchträger aus einer einzigen Zelle bestehend. (2, 3 und 4 Vermehrungs- und Befruchtungsorgane des Pilzes, siehe später.)

Vermehrung (Schwärmer). Erst wenn sie ihre Funktion erfüllt haben, umgeben sie sich mit einer vom Plasma ausgeschiedenen Wandung und zeigen hierdurch recht deutlich, daß eben die Hülle nicht, wie das Plasma, zu den unbedingt notwendigen Bestandteilen einer lebenden Zelle gehört.

Außerordentlich verschieden sind die Zellen im Hinblick auf Größe und Gestalt.

Sehr unvollkommene Pflanzen, wie einige Algen und Pilze, können nur aus einer einzigen Zelle bestehen. Diese kann äußerst klein sein, wie bei den Bakterien, die erst bei tausendfacher Vergrößerung im Mikroskop deutlich wahrnehmbar sind und bei denen der Durchmesser manchmal nur  $\frac{1}{2000}$  mm beträgt; größer sind z. B. die Zellen der Hefepilze, von denen ebenfalls jede einzelne

ein Pflanzenindividuum darstellt (Abb. 116). Einzelne Zellen können aber auch beträchtlich groß werden und mannigfache Verzweigungen erfahren. Das gesamte Mycelium mancher Pilze z. B. besteht nur aus einer einzigen Zelle (Abb. 117, *I*) und die Internodialzellen mancher Characeen können bis 10 cm Länge und 2 mm Durchmesser betragen.

Zellen, welche vollkommen frei existieren und nach keiner Seite hin von umgebenden Zellen beengt werden, besitzen meist Kugel- oder Schlauchform (z. B. Hefepilze [Abb. 116], Bakterien und Pilzhypen). Stoßen nur zwei Zellen aneinander, so sind sie an der Berührungsstelle bereits etwas abgeplattet. Stoßen mehrere Zellen aneinander, so ergibt sich durch den gegenseitigen Druck eine polyedrische Form (Abb. 118).

Außer diesen von außen her bedingten Einflüssen auf die Gestalt der Zellen liegen dieser jedoch innere Gestaltungskräfte zugrunde, welche die Form der Tätigkeit anpassen, den die einzelnen Zellen nach ihrer Vollendung im Organismus der Pflanze ausüben sollen, ja diese Gestaltungskräfte sind weit mächtiger als die aus der Umgebung herrührenden Einflüsse, so daß diese nur in zweiter Linie gestaltend wirken. Durch diese Einflüsse wird die Entstehung zweier ganz verschiedener Formen der Zellen herbeigeführt, nämlich:

- a) die parenchymatische Gestalt,
- b) die prosenchymatische Gestalt.

Beide lassen sich auf die obenerwähnten Gestalttypen der freien Zellen zurückführen, und zwar die Gestalt der parenchymatischen Zellen auf die Bläschen-(Kugel)-form, diejenige der prosenchymatischen Zellen auf die Schlauchform.

**Parenchymatische Zellen** sind demnach polyedrische Zellen, deren Form zwar auch eine gestreckte sein kann, deren Quer- und Längsschnittsbilder jedoch im allgemeinen keine große Verschiedenheit aufweisen (z. B. Abb. 118). Der Name (von *παρά*, para = daneben, darauf, und *ἔγχυμα*, enchyma = das Eingegossene) deutet darauf hin, daß bei diesem Bilde die Zellen aufeinander stehend gedacht sind (Abb. 118).

**Prosenchymatische Zellen** sind (meist lang) spindelförmig, an den Enden zugespitzt, ineinander eingekeilt; ihr Längsschnittsbild weist zwei spitze Winkel auf (vergl. die Abb. 147 *B, C* weiter hinten unter „Mechanisches System“). Der Name ist von *πρός*, pros = gegen, zwischen, abgeleitet, d. h. es wird dadurch zum Ausdruck gebracht, daß die Zellen zwischeneinander geschoben sind.

Daß es zwischen diesen beiden Zellformen Zwischenglieder gibt, ist selbstverständlich. Es läßt sich nicht immer mit Sicherheit entscheiden, ob eine bestimmte Zelle in einem Zellgewebe zu dem parenchymatischen oder prosenchymatischen Typus zu rechnen ist.

## Zellinhalt.

**Protoplasma.** Das Protoplasma ist nicht als eine einfache Flüssigkeit aufzufassen, sondern es besitzt eine wahrscheinlich sehr komplizierte innere Struktur; es setzt sich zusammen aus sehr verschiedenen

Eiweißstoffen und Wasser und es reagiert entweder alkalisch oder neutral. Im Protoplasma unterscheiden wir zunächst bestimmt geformte Teile, Zellkern und Chromatophoren (welche später gesondert behandelt werden), und eine die Zelle oft mehr oder weniger vollständig erfüllende, meist zähflüssige, ungeformte Grundsubstanz, das Cytoplasma, das aber auch oft der Zellwand nur als ein sehr dünner, zuweilen erst bei Kontraktion nach erfolgter Wasserentziehung (Plasmolyse) sichtbar werdender Schlauch anliegt. Am Cytoplasma lassen sich meist wieder zwei Schichten erkennen, welche allerdings häufig nicht scharf voneinander getrennt sind, eine äußere, wasserhelle, der Zellwandung eng anliegende Schicht, das Wandplasma oder Hyaloplasma, und eine innere, von mehr oder weniger zahlreichen, winzigen Körnchen (Mikrosomen) erfüllte Partie, welche meist als Körnchenplasma bezeichnet wird.

Das Cytoplasma besteht, wie erwähnt, hauptsächlich aus Eiweißstoffen; deshalb wird es auch durch Kochen, durch giftig wirkende Körper, wie z. B. Sublimat, Chromsäure, Osmiumsäure u. a. m. zum Gerinnen gebracht, „fixiert“. Es nimmt dann gierig Farbstoffe auf. Von Kalilauge wird es gelöst. Besonders charakteristisch ist in physiologischer Hinsicht die osmotische Eigenschaft des Cytoplasmas, daß es zu den Salzen, die im Zellsaft enthalten sind, reichlich Wasser zutreten läßt, dieses Wasser aber außerordentlich festhält, wodurch der Saftdruck (Turgor) der Zelle hervorgerufen wird.

In den Zellen mancher Pflanzen kann man unter dem Mikroskop sehr deutlich eine Bewegung des Cytoplasmas, die sogen. Plasmaströmung, wahrnehmen. Entweder bewegt sich das Cytoplasma in einem einzigen Strom mit konstanter Richtung der Zellwandung entlang, besonders dann, wenn das Zellplasma einen der Wandung anliegenden, die große zentrale Vacuole begrenzenden Schlauch bildet (z. B. in einer Zelle, wie in Abb. 115 C rechts dargestellt). Man nennt diese Bewegung des Plasmas Rotation. Die Rotationsbewegung beobachten wir besonders schön z. B. in den Blattzellen von *Helodea canadensis*, ferner in den Wurzelhaaren von *Vallisneria*. Als Zirkulation wird im Gegensatz hierzu die Strömung des Plasmas bezeichnet, wenn das Cytoplasma in isolierten Strömen mit wechselnder Richtung die den Zellsaft durchsetzenden Stränge nach dem verschiedenartig gelagerten, oft im Zellinnern aufgehängten Zellkern zu oder von demselben weg durchzieht. Die Zirkulation läßt sich z. B. sehr gut in den Staubfadenhaaren der Arten von *Tradescantia* (Abb. 119), ferner in den Haaren mancher Solanaceen etc. wahrnehmen. Ganz fehlt die Bewegung im Plasma überhaupt nie, doch geht sie in den meisten Fällen so langsam vor sich, daß sie nicht direkt wahrnehmbar ist.

Die nackten Primordialzellen zeigen häufig eine sehr charakteristische Bewegung. So bewegen sich die nackten Zellen und Zellvereinigungen (Plasmodien)

Schule der Pharmazie IV. 5. Aufl.



Abb. 119. Zelle eines Staubfadenhaares von *Tradescantia virginica* mit Zirkulation des Protoplasmas in den den Safttraum durchziehenden Cytoplasmasträngen. Stark vergrößert. (Nach Kühne.)

der sogen. Schleimpilze (Myxomycetes) dadurch langsam fort, daß aus dem Plasmaklumpchen Ausstülpungen (Pseudopodien) hervortreten, in welche allmählich der Zellkörper nachkriecht, worauf sich dann wieder neue läppchenförmige Ausstülpungen bilden. Ganz anders erfolgt das sogen. Schwärmen der nackten Vermehrungs- und Fortpflanzungsorgane vieler Algen und Pilze. Hier treten aus dem nackten Protoplasten einzelne, wenige bis zahlreiche feine Cytoplasmafäden, die sogen. Geißeln oder Cilien, aus, welche eine lebhaft schlagende Bewegung ausführen und dadurch den Zellkörper rasch durch das Wasser wirbeln. Auch manchen mit Membran versehenen Zellen, z. B. manchen Bakterien und Volvocaceen, kommt eine solche Schwärmbewegung zu.

**Zellkern.** Der Zellkern (Nucleus) findet sich an beliebiger Stelle, besonders da, wo in der Zelle gerade das lebhafteste Wachstum stattfindet, dem Cytoplasma eingelagert und ist, wie oben schon hervorgehoben wurde, nichts anderes als ein Protoplasmagebilde von bestimmter Gestalt, welches sich durch eine sogen. Plasmamembran (Kernmembran) vom umliegenden ungeformten Protoplasma abgrenzt. Die Gestalt des Kerns ist sehr wechselnd. Meistens ist er mehr oder weniger kugelig, seltener linsen- oder scheibenförmig, in einzelnen wenigen Fällen spindelförmig oder sogar gelappt. Innerhalb der Kernmembran liegt das den Kernsaft durchziehende sogen. Kerngerüst, d. h. ein Gewirr von Fäden, welchen zahlreiche, gewisse Farbstoffe (Hämatoxylin, Carmin etc.) speichernde Körnchen (die Chromatinkörner) eingelagert sind. Außer dem Kerngerüst findet man in jedem Kern einen oder mehrere, stark lichtbrechende, ebenfalls leicht färbbare Körper, die Kernkörperchen (Nucleoli). Allermeist enthält eine Zelle nur einen einzigen Kern; in einzelnen großen Zellen, wie in den Milchsafschläuchen der höheren Pflanzen oder den großen, ganze Individuen zusammensetzenden Zellschläuchen mancher Algen (*Vaucheria*, *Caulerpa*) und Pilze (*Phycomycetes*) findet man jedoch regelmäßig mehrere bis zahlreiche Kerne. Bei den am tiefsten stehenden Pflanzen, den Bakterien und den Spaltalgen, ist es bisher noch nicht gelungen, einen echten Zellkern nachzuweisen.

Niemals kommt es vor, daß sich der Zellkern, welcher offenbar der hauptsächlichste Träger der Vererbungserscheinungen ist, selbständig neu aus dem Protoplasma bildet. Die Bildung von Zellkernen erfolgt stets nur durch eine meist sehr komplizierte Zellteilung schon vorher vorhandener Kerne, und es ist deshalb klar, daß alle die unendlich zahlreichen Kerne einer höheren Pflanze, z. B. eines Baumes, aus dem befruchteten Kerne einer Eizelle hervorgegangen sind.

Die Zellkernteilung ist meistens ein sehr komplizierter Vorgang. Nur in recht vereinzelt Fällen findet eine direkte (amitotische) Teilung statt (z. B. in alternden Zellen einiger höherer Pflanzen, in Milchsafschläuchen etc.), indem sich der mehr oder weniger kugelige Kern in der Mitte immer stärker biskuitförmig einschnürt, bis sich endlich die Hälften voneinander trennen. Wie jedoch schon oben hervorgehoben wurde, ist eine andere, weit kompliziertere Art der Zellkernteilung als die normale zu bezeichnen; es ist dies die indirekte (mitotische) Zellkernteilung oder Karyokinese, mit welcher auch stets oder fast stets eine Zellteilung Hand in Hand geht (vergl. Abb. 120). Ein zur indirekten Teilung sich anschickender Zellkern vergrößert sich stark; Kernmembran und Nucleolen verschwinden, sein dicht verknäueltes Kerngerüst tritt dagegen immer deutlicher hervor, bis es sich allmählich zu einem Kernfaden vereinigt, der in eine bestimmte, für

jede Pflanzenart fest normierte Zahl von gleichgestalteten Kernsegmenten oder Chromosomen zerfällt. Diese rücken nach der Mitte der Zelle zur sogen. Kernplatte zusammen, und hier erfolgt jetzt der wichtigste Vorgang: jedes Kernsegment teilt sich der Länge nach in zwei dünnere Hälften, welche im weiteren Verlauf nach den entgegengesetzten Polen der Zelle auseinander wandern. Hierdurch wird bewirkt, daß sich die Kernsubstanz der Mutterzelle gleichmäßig auf die nun entstehenden Kerne der Tochterzellen verteilt. Die bisher geschilderten und weiter zu schildernden Teilungs- resp. Bewegungsvorgänge der Kernbestandteile erfolgen natürlich durch die Tätigkeit des lebenden Cytoplasmas,




Abb. 120. Teilungsvorgänge im Zellkern: 1 bis 12 fortschreitende Entwicklungsstadien. Stark vergrößert. (Nach Strasburger.)

und hierbei spielt besonders die sogen. Kernspindel eine große Rolle, d. h. von den beiden Polen der sich teilenden Zelle verlaufen gegen den Äquator derselben strahlenförmig sich erweiternde Cytoplasmafäden, welche wohl bei der Umlagerung der Kernkörperchen eine wichtige Rolle spielen. Die aus der Teilung der Kernsegmente hervorgegangenen dünneren Fäden rücken nun in der oben angegebenen Weise auf den Bahnen der Kernspindeln immer mehr den Zellpolen zu und bilden allmählich durch Aneinandergliederung zu Kernfäden zwei neue Kerne, die sich zuletzt auch wieder mit einer Kernmembran umgeben und neue Nucleoli erkennen lassen. Ehe dies erfolgt, treten in allen den Fällen, wo mit der Kernteilung auch eine Zellteilung Hand in Hand geht, die Kernspindeln sehr deutlich hervor, und in der Mitte zwischen den beiden Polen, d. h. in der Äquatorialebene der Mutterzelle, zeigen die einzelnen Fäden deutliche, von Cellulosemicellen herrührende Anschwellungen (Zellplatte), aus denen allmählich eine zarte Teilungswand hervorgeht. Nach der Ausbildung der Tochterzellen verschwindet die Kernspindel.

Bei manchen niedrigstehenden Thallophyten ist die indirekte Kernteilung durch die Centrosomen, die auch bei der Teilung von tierischen Zellen zu

beobachtet sind, beeinflusst. Es sind dies kleine, kugelige Gebilde, die ursprünglich in der Anzahl jedem Kern anliegen, aber vor der Kernteilung sich teilen und dann je nach den beiden Polen des Kerns wandern. Um die Centrosomen bilden sich fädige Strahlungen, und auch die Fasern der Kernspindeln gehen von ihnen aus. Bei höheren Pflanzen sind die Centrosomen noch nicht festgestellt worden.

**Chromatophoren.** Die Farbstoffträger oder Chromatophoren sind sehr wichtige und auch sehr charakteristische Inhaltsbestandteile der Zellen. Sie sind, ähnlich wie der Zellkern, Protoplasmagebilde von im allgemeinen sehr wechselnder, aber im speziellen Fall fest normierter Gestalt, die meist,

wenigstens zu bestimmten Zeiten, als Träger von Farbstoffen fungieren. Sie vermehren sich in ganz ähnlicher Weise wie der Zellkern bei der direkten Zellkernteilung, d. h. sie schnüren sich in der Mitte immer mehr ein, bis die Tochterkörper sich voneinander lösen. Die Chromatophoren bilden sich also — wie die Kerne — niemals frei aus dem Protoplasma heraus. Man unterscheidet drei Formen der Chromatophoren: Chloroplasten, Leukoplasten und Chromoplasten.




Abb. 121. Chlorophyllkörner im Cytoplasma der Zellen eines Farnprothalliums: A im optischen Durchschnitte der Zellen; B einzelne Körner in Teilung begriffen. (400mal vergrößert.)

der grünen Pflanzenteile in großer Zahl in Form von diskusförmigen (flach scheibenförmigen), selten fast kugeligen Körnern der wandständigen Protoplasmaschicht eingelagert (Abb. 121).

In sehr jugendlichen oder aber älteren, im Dunkeln gehaltenen, Pflanzenteilen erkennt man die Chlorophyllkörner als ungefärbte, feinkörnige Protoplasmakörper ohne besondere oder wenigstens deutlich erkennbare Struktur. Unter dem Einflusse des Lichtes entsteht erst der grüne Farbstoff, welcher in der Form von winzigen ölartigen Tröpfchen der protoplasmatischen Grundsubstanz des Körnes eingelagert ist. Dieser Farbstoff der Chlorophyllkörner läßt sich aus grünen Pflanzenteilen leicht durch Alkohol, Schwefelkohlenstoff oder andere Lösungsmittel extrahieren. Die Lösung erweist sich als fluoreszierend: bei durchfallendem Licht ist sie frisch grün, bei auffallendem Licht blutrot. An dieser Lösung läßt sich auch zeigen,

#### 1. Chloroplasten. Die

Chloroplasten oder Chlorophyllkörper sind diejenigen Farbstoffträger, welche den Pflanzen ihre charakteristische grüne Färbung verleihen. Fast durchweg finden wir sie in den Zellen

daß der grüne Farbstoff nicht einheitlich, sondern ein Gemisch mehrerer Farbstoffe ist, deren Natur noch nicht mit vollster Sicherheit geklärt ist. Nach den neuesten Forschungen nimmt man an, daß wir es hier mit einem Gemisch von 3 verschiedenen Farbstoffen zu tun haben, einem rein grünen, dem eigentlichen Chlorophyll, einem gelben, dem Xanthophyll, und endlich einem nur in Spuren vertretenen orangeroten, dem Carotin. Setzt man einer alkoholischen Blattgrünlösung Benzol zu, schüttelt kräftig und läßt absetzen, so erhält man folgendes charakteristische Bild: das Benzol hat das Chlorophyll (und das nicht in die Erscheinung tretende Carotin) aufgenommen und bildet über dem schwereren Alkohol, dem das gelbe Xanthophyll geblieben ist, eine schön grüne Schicht.

Bei einigen wenigen Formen der grünen Algen ist das Chlorophyll nicht an diskusförmige oder mehr oder weniger kugelige, sondern an plattenförmige, sternförmige oder in Gestalt von Spiralbändern die Zelle umlaufende Protoplasmagebilde gebunden, welche manchmal sehr groß sind und nur zu wenigen oder sogar einzeln die Zelle erfüllen.

Wenn die Vegetationszeit der grünen Gewächse abgelaufen ist, meist also im Herbst, werden die Chloroplasten fast stets aufgelöst, die grüne Färbung verschwindet, winzige gelbe oder gelbrote Körnchen treten auf und bilden die Ursache für die sogen. Herbstfärbung der Pflanzen.

Die Chloroplasten sind von großer Wichtigkeit für das Leben der Pflanzen. Ihnen kommt jene merkwürdige Tätigkeit zu, unter dem Einflusse des Lichtes aus anorganischen Substanzen (Wasser, Kohlensäure der Atmosphäre) organische (Kohlehydrate) zu bilden. Als erstes sichtbares Produkt dieses Vorganges, der *Assimilation*, erscheint die Stärke, und zwar in der Form winziger Körnchen in den Chlorophyllkörpern selbst. In grünen Pflanzenteilen, welche längere Zeit dem Sonnenlicht ausgesetzt waren, finden wir deshalb in jedem Chlorophyllkörper mehrere bis zahlreiche Stärkekörnchen, die dann beim Verdunkeln des Pflanzenteils wieder aufgelöst, d. h. in lösliche Kohlehydrate (Glukose etc.) übergeführt werden und in dieser Form nach den Verbrauchsstellen oder in die Reservestoffbehälter der Pflanze wandern. Wir werden hierauf später noch zurückkommen.

2. Leukoplasten. Unter diesem Namen faßt man vielleicht recht heterogene Dinge zusammen. Man bezeichnet nämlich als Leukoplasten die in sehr jugendlichen Organen der Pflanze noch nicht ergrünteten Anlagen der Chloroplasten; mit demselben Namen werden jedoch auch Gebilde bezeichnet, welche in den Reservestoffbehältern der Pflanzen (z. B. in Knollen) enthalten sind, niemals ergrünen, nicht die Fähigkeit besitzen, aus anorganischen Stoffen organische zu schaffen, sondern nur die Aufgabe haben, aus den Reservestoffbehältern zugeführten gelösten Kohlehydraten wieder Stärke zu bilden, und zwar meist in der Form größerer Körner von charakteristischer Gestalt (Reservestärke).

3. Chromoplasten. Unter dem allgemeinen Namen Chromoplasten („Farbstoffträger“) faßt man alle im Pflanzenreiche vorkommenden Farbstoffträger zusammen, welche nicht grün sind. Sie können aus Chloroplasten oder Leukoplasten durch Verwandlung entstanden sein und sind den ersteren in der Form häufig noch vollständig gleich, d. h. sie besitzen die diskusförmige oder kugelige Gestalt der Chlorophyllkörner. Häufig kommt es jedoch auch vor, daß die Chromoplasten infolge Auskristallisierens des Farbstoffes nadelförmige, spindelförmige oder mehr oder weniger tafelförmige Gestalt annehmen (Abb. 122). Der Farbstoff der Chromoplasten ist Carotin und Xanthophyll; er verleiht den Pflanzenteilen, in welchen Chromoplasten vorkommen, eine gelbe bis tief orangerote Färbung.

Chromoplasten kommen hauptsächlich vor in gefärbten Früchten und in Blumenblättern. Es leuchtet ein, daß nicht alle Färbungen des Pflanzenreichs durch Chromoplasten hervorgerufen sein können, da diese stets nur gelb oder orangerot erscheinen. Die blaue oder grellrote Farbe vieler Blumenblätter ist darauf zurückzuführen, daß bestimmte Zellpartien derselben einen im Zellsaft gelösten entsprechenden Farbstoff (Anthocyan) enthalten.




Abb. 122. *A* Zelle aus dem Perigonblatt von *Hemerocallis fulva* mit spindelförmigen Chromoplasten. *B* Chromoplasten aus dem Fruchtfleisch von *Pirus aucuparia* mit fädigen Farbstoffkristallen. *C* Gelappte Chromoplasten aus den Blumenblättern von *Genista tinctoria*. Stark vergrößert. (Nach Schimper und Haberlandt.)

**Zellsaft.** Wie oben schon hervorgehoben wurde, ist das Protoplasma sehr saftreich. In der fertig ausgebildeten, lebendigen Zelle sammelt sich der Zellsaft, der im Gegensatz zum Protoplasma stets sauer reagiert, in mehr oder weniger zahlreichen Vacuolen an oder die Vacuolen fließen sehr häufig zu einem großen Zellsafttraum zusammen, der von dem der Zellwand anliegenden Plasmaschlauche umschlossen wird (Abb. 115). Der Zellsaft ist nicht etwa reines Wasser, sondern eine wässrige Lösung der verschiedenartigsten Substanzen, welche als überflüssig und unbrauchbar von der Pflanze ausgeschieden (Exkrete) oder aber als Nährstoffe hier abgelagert werden und die später wieder im Stoffwechsel Aufnahme finden. Auf diese im Zellsaft enthaltenen Stoffe wird weiter unten genauer eingegangen werden.

**Stärke.** Es wurde bei der Besprechung der Chloroplasten gezeigt, daß in ihnen durch die Assimilation winzige Stärkekörner (Assimilationsstärke) entstehen. Diese werden in eine lösliche

Form übergeführt und gelangen so, wenn sie nicht sofort für den Aufbau des Pflanzenkörpers verwendet werden, in Reservestoffbehälter (Knollen, Wurzeln, Stämme etc.). Hier beginnt dann, wie schon angeführt, die Tätigkeit der Leukoplasten: diese lagern an ihrem Rande oder in ihrem Innern Reservestärke ab. Manchmal kommt es jedoch auch vor, daß die sehr reichlich in den




Abb. 123. Stärkekörner verschiedener Gestalt und Abstammung: I Roggenstärke, II Kartoffelstärke, III Marantastärke, IV Maisstärke, V Haferstärke, VI Reisstärke, VII Leguminosenstärke, VIII Curcumastärke, IX Manihotstärke, X Sagostärke, XI Sarsaparillestärke, XII Euphorbiastärke (475fach vergrößert.) (Nach H. Warnecke.)

Chlorophyllkörnern gebildeten Kohlehydrate weder gleich gebraucht, noch infolge Überfüllung der Leitungsbahnen nach den Reservestoffbehältern transportiert werden; diese werden dann in der Form kleiner, wenig differenzierter Körnchen meist in der Nähe ihrer Bildungsstätten, in Blättern oder Stengeln, zeitweilig deponiert und als transitorische (Wander-) Stärke bezeichnet. Die Reservestärkekörner sind viel größer als diejenigen der Assimilationsstärke, ferner sind sie meistens durch eine charakteristische Schichtung aus-

gezeichnet. In den Reservestoffbehältern finden sie sich gewöhnlich in ungeheurer Anzahl (z. B. in der Kartoffel oder in den Getreidefrüchten). Ihre Gestalt ist fast immer mehr oder weniger rundlich, kugelig, auch häufig eiförmig, seltener linsenförmig oder bei großer Anzahl der Körner und starkem gegenseitigem Druck vieleckig.

Die Schichtung und auch die Gestalt der Körner ist meistens eine so charakteristische, daß man sie dazu benutzen kann, um die verschiedenen Stärkesorten unter dem Mikroskop zu unterscheiden. Die Schichtung selbst ist auf einen regelmäßigen Wechsel von dichteren und weicheren (substanzärmeren) Schichten um ein Zentrum (Kern genannt) zurückzuführen. Sind die Schichten allseitig gleich dick, liegt also der Kern im Zentrum, so bezeichnet man die Stärkekörner als konzentrisch (Stärke der Leguminosen, von Weizen, Roggen, Gerste etc., Abb. 123 I, VII). Sind dagegen die Schichten auf der einen Seite des Kerns stärker, dicker ausgebildet als auf der anderen, so daß der Kern mehr oder weniger weit an den Rand des Stärkekorns, manchmal bis in dessen unmittelbare Nähe rückt, so werden die Stärkekörner exzentrisch genannt (Stärke der Kartoffel, Abb. 123 II, der Scitamineen, von welchen weitaus das meiste Arrowroot her stammt etc., Abb. 123 III, VIII). Nicht selten sind dann ferner die sogen. zusammengesetzten Stärkekörner, d. h. ein Korn besitzt ganz die Gestalt eines gewöhnlichen kugeligen oder eiförmigen Korns, erweist sich jedoch als zusammengesetzt aus mehr oder weniger zahlreichen vieleckigen, kleinen Körnchen (Stärke von Reis und Hafer, Abb. 123 V, VI). Nicht zusammengesetzte, aber doch eckige Körner besitzt z. B. der Mais (Abb. 123 IV). Hier sind die anfangs kugelig angelegten, kleinen Körner in den äußeren Partien des Samens in solcher Menge in den Zellen entwickelt, daß sie sich gegenseitig abplatteten und polyedrisch werden. Endlich sind noch die wegen ihrer knochenförmigen oder hantelförmigen Gestalt sehr auffallenden Stärkekörner zu erwähnen, welche man in den Milchsafschläuchen von *Euphorbia* antrifft (Abb. 123 XII).

Die Stärkekörner bestehen aus einem Kohlehydrat ( $C_6H_{10}O_5$ ). Sie kommen bei fast allen Pflanzen vor; ausgenommen sind die Pilze und eine Gruppe von Algen (*Rhodophyceae*). Die Stärke ist mikrochemisch leicht nachzuweisen: beim geringsten Zusatz von Jod tritt sofort Blaufärbung ein; in heißem Wasser quillt die Stärke auf und wird zu Kleister. Ferner verkleistert die Stärke bei Zusatz von Kalilauge, während sie durch verdünnte Säure in Zucker übergeführt und gelöst wird. Reine Stärke, die sich als ein feines weißes Pulver darstellt, wird unschwer durch Auswaschen der Stärkekörner aus stärkereichen Pflanzenkörpern, wie z. B. Knollen, gewonnen.

Wird die Stärke der Reservestoffbehälter von der Pflanze wieder gebraucht, so werden die Körner durch ein Ferment, die Diastase, in eine lösliche Form übergeführt und wandern so nach den Verbrauchsstellen.

**Ätherisches und fettes Öl.** Bei zahlreichen Pflanzen findet sich im Cytoplasma der Zellen ätherisches oder fettes Öl in der Form stark lichtbrechender, in der Größe sehr wechselnder, meist winziger Tröpfchen. Das fette Öl (Gemenge von Fettsäure-Estern) ist als ein Reservestoff aufzufassen und kann manchmal auch in der Form von unregelmäßig geformten, weißen Körnern oder von kristallinen Nadeln auftreten. Das ätherische Öl tritt niemals als ein Reservestoff, sondern meist als ein Sekret (s. unter Sekretionsorgane!) auf. In den Blumenblättern mancher Pflanzen (so z. B. der Rose) findet sich jedoch das ätherische Öl in Form feinsten Tröpfchen im Cytoplasma der Zellen; es nimmt hier auch manchmal Kristallform an.

**Eiweißkörper.** Wie wir gesehen haben, besteht das Protoplasma in erster Linie aus Eiweißstoffen. Aber auch der Zellsaft enthält häufig Eiweiß in größeren oder geringeren Mengen gelöst,




Abb. 124. Aleuronkörner verschiedener Gestalt; in der Mitte zwei Zellen mit Aleuronkörnern angefüllt. Stark vergrößert. (Th. Hartig.)

und aus dem Zellsaft werden die Eiweißkörper, die Protein- oder Aleuronkörner, ausgeschieden. Es geschieht dies dadurch, daß den Zellen ihr Zellsaft mehr oder minder entzogen wird, worauf das Eiweiß in sehr wechselnder Form ausfällt (Abb. 124).

In zahlreichen Fällen stellen die Protein- oder Aleuronkörner winzige, rundliche Körner dar. Bei den Hülsenfrüchtlern finden wir z. B. in den Zellen der Samen zahlreiche große Stärkekörner, während der gesamte übrige Raum der Zellen mit den soeben beschriebenen winzigen Proteinkörnchen dicht erfüllt ist.

Manchmal erreichen die Proteinkörner eine ansehnliche Größe, so z. B. in den Samen von *Ricinus* und *Bertholletia*, überhaupt in Samen, die reich an fettem Öl sind. Wir finden im fettreichen Protoplasma der Zellen dieser Samen dicht gedrängt liegend rundliche Körner, welche aus Eiweißsubstanzen bestehen und die häufig, meist erst nach geeigneter Behandlung mit Reagentien, Einschlüsse erkennen lassen: Kristalloide von reiner Eiweißsubstanz, Globoide, rundliche, aus Phosphorsäure, Calcium und Magnesia

bestehende Körper, und manchmal auch Kristalle von oxalsaurem Kalk. Nicht immer kommen, wie schon angedeutet, diese Einschlüsse sämtlich nebeneinander vor, häufig findet man in den Körnern nur den einen oder den anderen.

In den äußersten Schichten mancher Kartoffelsorten, ferner auch in den Zwiebelschalen treten in den Zellen vereinzelt, selten zahlreichere, frei im Protoplasma liegende Proteinkörner in der Form von Kristallen auf. Man bezeichnet diese als Kristalloide; sie unterscheiden sich dadurch sehr leicht von echten Kristallen, daß sie im Wasser quellen und sich allmählich vollständig auflösen.

**Kristalle.** Sehr verbreitet sind in den Zellen der Pflanzen Kristalle, und zwar mit verschwindenden Ausnahmen Kristalle




Abb. 125. Kristalle von oxalsaurem Kalk in den Zellen des Blattstiels einer *Begonia* (200-fach vergrößert); *k* Einzelkristalle, *dr* Druse.




Abb. 126. *A* Zelle mit Raphidenbündel aus dem Blatt von *Pistia stratiotes*. *B* Offenes Ende einer solchen Zelle mit teilweise entleerten Raphiden. (250-fach vergrößert.) (Nach Haberlandt.)

von oxalsaurem Kalk. Diese finden sich immer in den Vacuolen abgelagert, wo sie aus der Verbindung der im Zellsaft fast stets vorhandenen, als Nebenprodukt des Stoffwechsels entstandenen und für die Pflanzen sehr schädlichen, freien Oxalsäure mit den aus dem Nährboden aufgenommenen Kalksalzen entstehen.

Die Kristalle treten meistens auf als Einzelkristalle (Oktaeder oder klinorhombische Säulen) oder als Drusen, und in diesen Formen kommen sie häufig nebeneinander in denselben oder wenigstens in benachbarten Zellen vor (Abb. 125). Seltener trifft man die Kristalle in der Gestalt von Raphiden (Bündel zahlreicher, lang nadelförmiger Körper, Abb. 126) oder als Kristallsand (winzige, in ungeheurer Menge die Zelle erfüllende Körnchen). Das Vorkommen von Raphiden und von Kristallsand ist häufig für ganze Gruppen des Pflanzenreichs charakteristisch. So treffen wir z. B. in den Blättern sämtlicher Aloë-Arten massenhafte Raphiden,

in den Blättern vieler Solanaceen, z. B. im Tabak, zahlreiche Zellen mit Kristallsand. Die Zellen, welche Kristalle, besonders diejenigen der beiden zuletzt beschriebenen Formen, enthalten, sind meistens stark vergrößert, treten in den Geweben sehr deutlich hervor und werden häufig als Kristallschläuche bezeichnet.

Nur sehr wenige Vorkommen von Kristallen in der Form von Gips oder kohlen saurem Kalk sind bekannt. Ihr Nachweis, resp. die Unterscheidung von Kristallen aus oxalsaurem Kalk geschieht durch die bekannten Reagentien sehr leicht.

**Alkaloide** und **Glykoside** kommen stets im Zellsaft gelöst vor. Sie sind in der Pflanze an Säuren, wie Oxalsäure, Apfelsäure, Zitronensäure, gebunden, mit denen sie leichtlösliche Salze bilden.



Abb. 127. Epidermiszellen eines Blattes von *Duboisia myoporoides* mit durch Zusatz von Kalilauge zur Ausscheidung gebrachten Duboisinkristallen. (Stark vergrößert.) (Nach J. Möller.)




Abb. 128. Sphärkristalle von Inulin in den Zellen der Knollen von *Dahlia variabilis*. (Stark vergrößert.) (Nach Sachs.)

Läßt man zu einem Schnitte unter dem Mikroskop Kalilauge hinzutreten, so scheidet sich das freie Alkaloid meist in feinen Nadeln aus (Abb. 127).

**Asparagin** ist stets gelöst im Zellsaft und besitzt eine große Verbreitung im Pflanzenreiche.

**Inulin** vertritt die Stelle der Stärke in den Wurzeln und Rhizomen von Kompositen. Es ist in der lebenden Pflanze im Zellsaft gelöst und scheidet sich erst nach sehr raschem Trocknen oder noch besser nach längerem Einlegen der betreffenden Pflanzenteile in absoluten Alkohol in der charakteristischen Form von Sphärkristallen aus (Abb. 128). Diese lösen sich langsam in kaltem, rasch in warmem Wasser.

**Zuckerarten** (Rohrzucker, Traubenzucker etc.) finden sich ihrer leichten Löslichkeit wegen fast stets gelöst im Zellsafte. Nur aus sehr konzentrierten Lösungen scheiden sie sich, z. B. in den Datteln, dem Johannisbrot, der Meerzwiebel aus. Zuckerarten sind sehr verbreitet im Pflanzenreiche.

**Gerbstoffe** sind ebenfalls meist gelöst im Zellsaft. In getrockneten Pflanzenteilen (Drogen) ist die Gerbstofflösung, wo sie vorhanden war, meist zu durchsichtigen, eckigen Klumpen eingetrocknet oder von den Wandungen der absterbenden Zellen aufgesaugt worden. In den Rinden sind meist oxydierte Gerbstoffe (Phlobaphene) enthalten, welche jenen die charakteristische braune oder rotbraune bis schwarze Farbe erteilen.

**Pflanzensäuren** kommen frei oder an Alkalien, namentlich Kalk, oder aber an Alkaloide gebunden im Zellsaft der Pflanze vor. Seltener sind sie frei, wie z. B. Zitronensäure in der Zitrone, Weinsäure und Zitronensäure in den Tamarinden. Von den meist gebunden vorkommenden Säuren sind zu nennen: Essigsäure, Propionsäure, Buttersäure, Baldriansäure, Oxalsäure, Bernsteinsäure, Weinsäure und Zitronensäure.

Weitere Inhaltsbestandteile der Zellen, auf welche an dieser Stelle nicht näher eingegangen sein soll, sind:

**Wachs, Harze, Gummi, Kautschuk, Bitterstoffe, Fermente oder Enzyme (Diastase).** Die Entstehung mancher Gummiarten, sowie vieler Harze und Balsame beruht jedoch auf krankhaften (pathogenen) Veränderungen des Zellinhaltes oder der Membranen, oder jene entstehen in großen, nachträglich sich bildenden Zwischenzellräumen (Intercellularen), nicht in lebenden Zellen.

## Die Zellwand.

Jede in einem Zellverbände bestehende Zelle und ebenso die überwiegende Mehrzahl der einzellebenden Zellen ist von einer Zellwand (Zellhaut) oder Membran umgeben, welche im jugendlichen Zustand ein dünnes, aus Cellulose bestehendes Häutchen darstellt, sich aber später in mancher Hinsicht verändert. Im Laufe des Wachstums wird die junge Zelle allmählich immer größer, sie erreicht zuletzt häufig das Hundert-, ja in manchen Fällen das Tausendfache der anfänglichen Größe, sie behält ihre ursprüngliche, mehr oder weniger kugelige, isodiametrische Gestalt oder sie kann eine durchaus abweichende Form (verzweigt, spindelförmig, lang-faserförmig) annehmen. Die Gestalt, welche eine Zelle annimmt, ist natürlich abhängig von der für den betreffenden Pflanzenteil auszuführenden Arbeit. Manche Leistungen für die Pflanze sind jedoch auch mechanischer Natur, d. h. nicht allein die Form und Größe, sondern die Stärke der Wand gewisser Zellen kommt für das Leben der Pflanze in Frage.

Aus dieser Betrachtung geht hervor, daß die Wandung einer jungen Zelle zwei verschiedene Wachstumserscheinungen zeigen muß: ein Flächenwachstum, durch welches das Volumen der Zelle vergrößert wird, und ein Dickenwachstum, welches der Zelle eine gewisse und oft sogar recht weitgehende Festigkeit verleiht.

**Flächenwachstum.** Die jugendliche Zellwand ist ein zartes, feinporöses, stark dehnbares, wasserhaltiges Häutchen. Ein Flächenwachstum erfolgt in der Weise, daß in die Poren der jungen Wand stets neue feine Cellulosemoleküle vom Protoplasma aus abgelagert werden, während gleichzeitig durch den mächtigen Turgor des Plasmas der jungen Zelle eine ständige starke Dehnung der Wandung stattfindet. Ein derartiges Wachstum wird als *Intussusception* (= Zunahme von innen heraus, Wachstum durch Einlagerung) bezeichnet.

**Dickenwachstum.** Dickenwachstum tritt ein, wenn das Größenwachstum der Zelle und damit das Flächenwachstum der Zellwand beendet ist. Das Dickenwachstum der Zellwand ist ein recht komplizierter Vorgang. Entweder wird vom Protoplasma der Zelle ganz allmählich Cellulosesubstanz auf die jugendliche Zellwand abgelagert oder aber, und dies dürfte der häufigere Fall sein, das Protoplasma scheidet plötzlich eine neue, dünne Cellulosemembran aus, welche an die erstvorhandene von innen angepreßt wird. Diese Art des Wachstums wird als *Apposition* (= Anlagerung) bezeichnet. Die so entstandene, junge Verdickungshaut wächst nun wieder durch *Intussusception*, bis sie eine gewisse Dicke erreicht hat, worauf auf sie durch *Apposition* vom Plasma wieder eine neue Verdickungsschicht abgelagert werden kann. Diese regelmäßige Schichtenauflagerung läßt sich an ausgewachsenen „mechanischen Zellen“ oft noch sehr deutlich wahrnehmen (Abb. 129).

Der Wandverdickungsprozeß geht bei Zellen und Gefäßen (siehe S. 114) nicht immer über die ganze Wandfläche gleichmäßig vor sich. Abgesehen davon, daß nur eine, zwei oder drei Wände verdickt sein können, während die vierte vollkommen frei davon bleibt, bleiben auch an den verdickten Wänden selbst wiederum unverdickte Stellen. Bei Zellen sowohl als auch bei Gefäßen zeigen die Verdickungen, wenn sie sich nicht über die ganze Fläche erstrecken, oft spiralförmige oder ringförmige Anordnung (Abb. 150 *b, c*). Durch Verzweigung dieser verdickten Partien auf der Wandfläche entsteht die Form der leiterförmigen und der netzförmigen Verdickungen (Abb. 150 *d*). Die von der Verdickung freibleibenden Wandpartien nennt man *Tüpfel*; diese können in ihrer Größe außerordentlich wechseln. Je nachdem die Wandverdickung stattgefunden hat, zeigen auch die Tüpfel zueinander eine sehr charakteristische und unter dem Mikroskop leicht zu erkennende Anordnung (Abb. 150 *d* und *g*). Da die Tüpfel den Zweck haben, den Saftaustausch dickwandiger Zellen oder Gefäße mit benachbarten Zellen oder Gefäßen zu ermöglichen, so stoßen die Tüpfel benachbarter Elemente stets aufeinander (Abb. 129 *l-m*). Man merke sich jedoch, daß diese

Tüpfel nicht Löcher in der Zellwand sind, sondern daß die ursprüngliche dünne, für Wasser und Flüssigkeiten durchlässige Cellulosemembran (Mittellamelle) vorhanden bleibt. Eine besondere Art von Tüpfeln, sogenannte behöfte Tüpfel oder Hoftüpfel, entsteht dadurch, daß eine unverdickt bleibende Stelle der ursprünglichen Zellwand (Mittellamelle) von der Wandverdickungsschicht überwölbt wird (Abb. 130). Die Celluloselamelle kann innerhalb des entstehenden Hohlraums in der Zellwand dem größeren oder geringeren Flüssigkeitsdruck in der einen oder anderen Zelle entsprechend an die Wand angeedrückt werden und so einen Verschuß herbeiführen.




Abb. 129. Querschnitt einer parenchymatischen Zelle mit verdickten Wänden: *d*, *e* und *s* Zellwände dreier benachbarter Zellen, *a* Zellkern, *b* Nucleolus, *c* kontrahierter Protoplasmaschlauch, *p* zentrale Vacuole, *l* bis *m* korrespondierende Tüpfel. (Stark vergrößert.) (R. Hartig.)



Abb. 130. Behöfte Tüpfel verschiedener Form im Querschnitt, rechts daneben in der Aufsicht; *b* u. *c* mit an die Wand gepreßter Mittellamelle. (Stark vergrößert.) (Th. Hartig.)

Die dünne Mittellamelle zwischen den Tüpfeln kann manchmal eine nachträgliche Entwicklung erfahren. Liegt sie zwischen einer lebenden, turgescenden und einer abgestorbenen Zelle oder Röhre (z. B. einem Gefäß), so wird sie infolge des Turgordrucks in die letztere hineingepreßt und rundet sich dort zu einer oft recht umfangreichen Blase ab, die manchmal das ganze Lumen ausfüllt und die Röhre verstopft. Solche Neubildungen werden als Thyllen bezeichnet.

Die Wandverdickungen haben hauptsächlich die Aufgabe, zu verhüten, daß die Zellen und Gefäße von der Seite her zusammengedrückt werden. Es geschieht dies etwa in gleicher Weise, wie z. B. eine dünne Papphülse durch Einlegen einer Drahtspirale vor dem Zusammendrücken geschützt werden kann.

Den innerhalb der Wandverdickungen frei bleibenden Hohlraum der Dauerzellen oder Gefäße nennt man das Lumen.

Nur verhältnismäßig selten besteht die Zellwand aus reiner Cellulose, einem Kohlehydrat, welches genau dieselbe chemische Zusammensetzung zeigt, wie die Stärke ( $C_6H_{10}O_5$ ), sich durch die Reagentien Chlorzinkjod oder Jod und Schwefelsäure schön blau färbt, durch Kupferoxydammoniak sowie durch konzentrierte Schwefelsäure rasch löst, in Kalilauge quillt, während sie durch verdünnte Säuren und Alkalien nicht gelöst wird. Meist finden wir der Cellulose Pektinstoffe in größerer oder geringerer Menge beigemischt, welche leicht durch die Reaktion erkannt werden (keine Färbung durch Chlorzinkjod, Löslichkeit in Alkalien nach vorheriger Behandlung mit verdünnten Säuren). Auf diesem abweichenden Verhalten der reinen Cellulose zu den Pektinstoffen beruht das Verfahren der Maceration. Wir sahen soeben, wie durch ständig fortgesetzte Abscheidung (Apposition) vom Cytoplasma aus neue Wandungsschichten auf die ursprünglich vorhandene dünne Primärwand einer in der Verdickung begriffenen Zelle abgelagert werden. Die jüngst gebildeten Schichten bestehen aus fast reiner Cellulose, die älteren werden immer reicher an Pektinstoffen, die Primärwand besteht fast nur noch aus den letzteren. Kocht man nun Gewebekörper einer Pflanze, Holz, Rinde etc. in einer Mischung von chlorsaurem Kali mit Salpetersäure, so erhält man die Zellen der betreffenden Gewebe völlig isoliert, losgelöst voneinander, da die Primärwand verschwunden ist. — An Stelle der Cellulose tritt bei den Pilzen ein anderes Kohlehydrat, Pilzcellulose, auf. Bei den Bakterien besteht die Membran meist aus Eiweißstoffen.

Noch zahlreiche chemische Veränderungen kann die Zellwand im Laufe der Entwicklung der Zellen erfahren, von denen die wichtigsten hier kurz hervorgehoben sein mögen.

Soll die Zellohrt einen Abschluß bewirken, soll sie für Wasser in tropfbar flüssiger wie in gasförmiger Gestalt undurchdringbar sein, so wird ein fettartiger Stoff, das Suberin, eingelagert: die weiche und biegsame Zellwand ist verkorkt. Genau dasselbe wird erreicht durch die Einlagerung von Cutin. Verkorkte und cutinisierte Membranen färben sich mit Jod und Schwefelsäure gelb.

Verholzt nennen wir eine Membran, in welche ein Lignin genanntes Gemisch verschiedener chemischer Substanzen (z. B. Coniferin und Vanillin) abgelagert wurde, wodurch jene eine ansehnliche Härte erlangt, aber für Wasser in tropfbar flüssiger und gasförmiger Gestalt (überhaupt für Gase) leicht durchdringbar (permeabel) ist. Verholzte Membranen werden durch Phloroglucin mit Salzsäure rot, durch schwefelsaures Anilin, sowie durch Jod und Schwefelsäure, gelb gefärbt.

Schleimmembranen kommen besonders häufig in Samenschalen vor (Leinsamen, Quitten etc.), finden sich aber auch im Innern von Stengeln und Blättern. Im trockenen Zustande sind jene meist ziemlich hart, quellen jedoch bei Wasserzutritt sehr rasch mächtig auf und zerfließen häufig vollständig. — Pflanzenschleim kann recht verschiedenartigen Ursprung besitzen; außer dem eben be-




Abb. 131. Querschnitt aus dem Blatt von *Ficus elastica* (250fach vergrößert): *c* Cystolith, *e* Epidermiszellen, *p* Palisadenzellen, *s* Schwammparenchym. (Nach Strasburger).

geschrieben sind festzuhalten die Entstehung desselben in Interzellularräumen (Schleimgänge, z. B. bei Malvaceen, Tiliaceen etc.) und auf pathologischem Wege (krankhafte Veränderung der Cellulose, wie z. B. Kirschgummi).

Kieselsäure und Kalksalze findet man häufig der Membran eingelagert, meist in amorpher Form, Calciumoxalat in sehr seltenen Fällen auch als Kristalle. Verkieselt ist z. B. die Oberhaut der Gräser und Schachtelhalme, ferner die Membran der sogen. Kiesalgen (Diatomeen); deshalb bleibt die Form dieser Körper beim Verbrennen und Verwesens unverändert erhalten.

An dieser Stelle sind die eigenartigen Körper zu erwähnen, welche man z. B. in Oberhautzellen der Moraceae, Urticaceae und Acanthaceae antrifft und die für diese Familien des Pflanzenreiches geradezu ein Charakteristikum darstellen, die Cystolithen. Diese Gebilde sind als eine Art von Wandverdickung aufzufassen. Von irgend einer Stelle der Wandung einer sich allmählich stark vergrößernden Zelle erstreckt sich in das Zellinnere ein stielartiger Teil, aus reiner Cellulose bestehend, in welche sich Kieselsäure einlagert. An den unteren Teil dieses Stieles setzen sich sodann schichtenförmig Celluloselamellen an, wodurch allmählich ein traubenförmiger, warziger Körper entsteht, in welchen sich amorpher kohlenaurer Kalk einlagert. Setzt man einem Präparat, welches Cystolithen enthält, eine mineralische Säure zu, so kann man unter dem Mikroskop beobachten, wie der kohlenaurer Kalk unter Aufbrausen sich löst, während der Stielteil unverändert bleibt und der Körperteil des Cystolithen als feines Celluloseskelett sich bemerkbar macht (Abb. 131).

## Entstehung der Zellen.

Die Entstehung der Zellen kann man auf zwei Typen zurückführen, welche prinzipiell voneinander verschieden sind.

1. Zellteilung oder Zellfächerung. Jeder Zellteilung geht die Teilung des Zellkerns voran, ein Vorgang, der oben schon beschrieben wurde. Wir sahen, daß nach dem Auseinanderweichen der Tochterkerne am Äquator der sich teilenden Zelle eine dünne Cellulosewandung gebildet wird. Es entstehen hierdurch zwei Tochterzellen, auf welche Zellkern, Protoplasma, Chloroplasten und Wandung der Mutterzelle vollständig verteilt worden sind (Abb. 132).

Der Fall der Zellbildung, welchen man gewöhnlich als Hefesprossung oder auch als Abschnürung (bei Pilzen) bezeichnet, ist in mancher Hinsicht von dem soeben beschriebenen Typus abweichend. Eine Zelle treibt eine kleine seitliche Ausstülpung, in die Kern und Protoplasma hineinwandern und welche allmählich mehr und mehr anwächst, sich immer mehr von der Mutterzelle abschnürt, bis es endlich zu einer vollständigen Loslösung kommt (Abb. 116).

2. Freie Zellbildung. Im Gegensatz zur Zellfächerung wird bei der freien Zellbildung nicht das gesamte Protoplasma der Mutterzelle zum Aufbau der Tochterzellen verwendet, und vor allem haben die Tochterzellen keinen Anteil an der Membran der Mutterzelle. Als Beispiel sei hier die Sporenbildung der Schlauchpilze (Ascomycetes) angeführt. Im jugendlichen, sehr plasmareichen Schlauche finden wir einen einzigen Zellkern. Durch wiederholte Zweiteilung entstehen aus diesem vier oder meist sogar acht Tochterkerne, von welchen jeder von einer bestimmten Menge von Cytoplasma um-

geben ist. Von diesem Cytoplasma werden sodann feste Membranen gebildet, und es sind dadurch vier oder acht Zellen, die sogen. Sporen entstanden, die jede mit Membran, Cytoplasma und Zellkern versehen




Abb. 132. In Teilung befindliche Parenchymzellen, stark vergrößert.




Abb. 133. Freie Zellbildung in den Schläuchen von *Peziza convexula*. a-f Entwicklungsfolge der Schläuche und Sporen. (Stark vergrößert). (Nach Sachs.)

und dem übrigbleibenden Protoplasma einer einzigen, stark schlauchartig angeschwollenen Mutterzelle eingelagert sind. (Abb. 133). Dieses nicht zur Bildung der Sporen verbrauchte Plasma der Mutterzelle degeneriert allmählich, es wird gallertartig und dient zum Ausstreuen oder Ausschleudern der Sporen aus den Schläuchen.

### Die Gewebe.

Gruppen von Zellen, welche sich in engerem Verbande zueinander befinden und denen in ihrer Gesamtheit eine gemeinsame Verrichtung im Pflanzenorganismus zufällt, nennt man Gewebe.

**Die Entstehung der Gewebe.** Wir kennen nicht wenige Pflanzen, deren Vegetationskörper aus einer einzigen Zelle besteht, z. B. viele Formen der Algen und Pilze. Weit häufiger — so bei allen höheren

Pflanzen — ist der Vegetationskörper aus zahlreichen, ja meistens sehr zahlreichen Zellen gebildet, unter welchen eine strenge Arbeitsteilung stattfindet; sie sind jedoch sämtlich aus einer einzigen Zelle durch fortgesetzte Zweiteilung oder Fächerung hervorgegangen.

Teilt sich diese Ursprungszelle stets nur nach einer Richtung des Raumes, so entstehen Zellreihen, Zellfäden, bei welchen die Zellen nur mit zwei gegenüberliegenden Endflächen zusammenstoßen. Zellflächen, d. h. einfache Zellschichten, entstehen, wenn die Ursprungszelle sich nach zwei Richtungen des Raumes teilt, endlich Zellkörper, wenn in der Ursprungszelle oder in den aus ihr hervorgegangenen Zellen Teilungen nach allen drei Richtungen des Raumes stattfinden.

Außer durch fortgesetzte Zweiteilung kann ein Gewebe auch durch Verwachsung ursprünglich vereinzelter Zellen oder Zellfäden zu einem Ganzen entstehen, wie dies besonders bei mehreren Gruppen der Pilze der Fall ist. Die Fruchtkörper der höheren Pilze, d. h. eben das, was man gewöhnlich als „Pilz“ bezeichnet, bestehen immer aus äußerst dünnen, oft stark verzweigten Zellfäden, Hyphen oder Mycelstränge genannt, welche in der verschiedenartigsten Weise zu Geweben zusammentreten: Entweder sie lagern sich, wie in den Stielen der Pilzhüte, parallel nebeneinander und bilden dadurch strangförmige Körper, oder sie verflechten sich so fest und wirr durcheinander, daß sie auf einem Querschnitt durch den betreffenden Teil ein echtes Gewebe vortäuschen (Pseudoparenchym).

**Die anatomisch-physiologische Einteilung der Gewebe.** Je nach der Aufgabe, welche die einzelnen Gewebe zu erfüllen haben, gruppiert man diese zu Gewebesystemen, und zwar unterscheidet man, da die Pflanze, wie jedes andere organische Wesen, 1. aufgebaut, 2. geschützt, 3. gefestigt und 4. ernährt werden muß, um ihrem Endzweck, der Fortpflanzung, zu dienen, im wesentlichen folgende vier Kategorien von Gewebesystemen:

1. Dem Aufbau dienend:  
Bildungsgewebesysteme (Meristeme).
2. Dem Schutze dienend:  
Hautsystem.
3. Der Festigung dienend:  
Skelettsystem.
4. Der Ernährung dienend:
  - a) Absorptionssystem.
  - b) Assimilationssystem.
  - c) Leitungssystem.
  - d) Speichersystem.
  - e) Durchlüftungssystem.
  - f) Sekretionssystem.

Streng genommen wären hier auch die der Fortpflanzung dienenden Gewebesysteme zu behandeln. Jedoch ist es üblich geworden, sie bei den entsprechenden Abschnitten der Systematik zu besprechen.

Dem Zwecke dieses Buches entsprechend sollen die Gewebesysteme im folgenden in gedrängter Kürze dargestellt werden.

## 1. Der Aufbau der Pflanze. Die Bildungsgewebe.

Unter den mannigfachen Gewebeformen der Pflanzen befinden sich bestimmte Zellen oder Zellgruppen, welche durch die in ihnen sich vollziehenden Zellteilungen die Masse des Pflanzenkörpers und die Zahl seiner Elemente vermehren. Sie stehen mithin im völligen Gegensatze zu allen übrigen Gewebeformen, den Dauergeweben, und führen den Namen Bildungsgewebe oder Meristeme.

Bildungsgewebe, und zwar Urmeristem, das seinen Ursprung direkt von dem Meristem des Embryos genommen hat, findet sich, wie schon aus dem Namen und aus dem oben Gesagten hervorgeht, an allen wachsenden Teilen der höheren Pflanzen, also an den Spitzen des Stengels (Abb. 134) und der Wurzel (Abb. 135 und 136 S. 100), an den Spitzen sämtlicher Seitentriebe beider, sowie in den Knospen. Sie bestehen aus kleinen, dünnwandigen, sehr reichlich Protoplasma führenden Zellen, welche sich ständig teilen. Man bezeichnet den Sitz der Bildungsgewebe an den Sproßspitzen (und auch in den Knospen, die ja noch nicht ausgewachsene Sprosse sind) als Vegetationspunkte (Abb. 134 bis 136).

Bei den Thallophyten, sowie den Moosen und Farnpflanzen findet sich am Vegetationspunkt kein Bildungsgewebe, sondern eine einzige, große, sich stets lebhaft teilende Zelle, die Scheitelzelle, auf die das ganze Wachstum zurückzuführen ist.

Etwas unterhalb des Vegetationspunktes lassen sich bei den höheren Pflanzen meist drei verschiedene Schichten in den Stämmen und Wurzeln unterscheiden. Die äußerste, gewöhnlich nur eine Zellschicht starke Schicht wird Dermatogen genannt, und aus diesem geht die Oberhaut oder Epidermis hervor. An ihm bemerken wir auch zuerst die Blattanlagen in Form kleiner Höcker. In der Mitte liegt der viele Zellschichten starke, kegelförmige Zentralzylinder, das Plerom, aus dem sich allmählich Mark und Leitbündel entwickeln. Zwischen Plerom und Dermatogen liegt endlich der mehrere Zellschichten umfassende Hohlzylinder des Periblems, aus dem die Rinde hervorgeht. (Abb. 135 und 136.)




Abb. 134. Längsschnitt des Sproßgipfels der Wasserpest (*Helodea canadensis*), stark vergrößert. (Nach Kny.)




Abb. 135. Längsschnitt durch die Wurzelspitze von *Pisum sativum*: *h* Wurzelhaube, *hm* Bildungsgewebe, *bm* durch die Tätigkeit des Bildungsgewebes neuentstandene Zellen, welche zu Elementen der Gefäßbündel und des Markes (Plerom) werden, *gm* neuentstandene Parenchymzellen, aus denen später die Rinde (Periblem) hervorgeht. 140fach vergrößert. (Nach Janczewski.)




Abb. 136. Längsschnitt durch die Wurzelspitze von *Helianthus annuus*. *h* Wurzelhaube,  $\pi$   $\rho$   $\pi$  Plerom (d. h. das Gewebe, aus welchem später der Zentralzylinder hervorgeht), *b* Dermatogen (Gewebe, aus dem das Hautgewebe sich bildet), zwischen beiden das Periblem (Gewebe, das später zur primären Rinde wird), *f* die Meristemzellen, durch deren Teilung das Periblem und Plerom entstehen. Stark vergrößert. (Nach Reinke.)

An allen echten Wurzeln entwickelt sich über dem Vegetations-  
scheitel zum Schutze gegen Verletzungen die Wurzelhaube, die bei  
den Farnen von der Scheitelzelle, bei den höheren Pflanzen vom  
Urmeristem aus stets durch neue Zellabscheidungen ergänzt wird.

Während die Mehrzahl der von den Vegetationspunkten gebildeten  
Zellen sich mit fortschreitendem Wachstum zu Dauerzellen umbildet,  
bleiben bei den Gymnospermen (z. B. Coniferen) und den dikotylen  
Gewächsen gewisse Partien als ein zwischen Holzteil und Siebteil der  
Gefäßbündel (siehe unten) gelegenes primäres Meristem, Cambium,




Abb. 137. Teil eines Querschnittes durch einen Lindenzweig: *k* äußere Grenze des  
Holzteilcs, *c* Cambiumzone, von da ab die ganze obere Partie Siebteil, darin *s* Siebröhren,  
*f* Bastfasergruppen, *k* Zellen mit Kristallen, *m* Markstrahlen. 220fach vergrößert.  
(Nach de Bary.)

(Abb. 137 *c*) dauernd teilungsfähig, wodurch das sogenannte sekun-  
däre Dickenwachstum ermöglicht wird (s. S. 124). Bei den  
monokotylen Gewächsen hingegen gehen alle Bildungsgewebezellen  
in die größeren, dickwandigeren, plasmaärmeren Dauerelemente über,  
und es bleibt kein Cambium zwischen dem Holzteil und dem Sieb-  
teile der Gefäßbündel erhalten (Abb. 156). Diese Pflanzen zeigen da-  
her kein echtes sekundäres Dickenwachstum.

Es kommt aber auch vor, daß scheinbar schon in den Dauer-  
zustand übergegangene Gewebe oder Gewebepartien (wie z. B. Epi-  
dermiszellen und Rindenparenchymzellen) sich plötzlich durch fort-  
gesetzte Fächerung zu einem nachträglich entstandenen Meristem,  
einem Folgemeristem, entwickeln. Folgemeriste mesind z. B. das

Phellogen, durch dessen Tätigkeit der Kork gebildet wird, sowie der sog. Wundkallus, der die Aufgabe besitzt, Wundstellen von Pflanzen zu überwallen und zu verschließen.

## 2. Schutzgewebe. Hautsystem.

Zum Schutze gegen äußere Einflüsse und zur Verhinderung der Wasserverdunstung sind alle Organe der höheren Pflanzen mindestens mit einer einschichtigen Epidermis oder Oberhaut bekleidet. Diese besteht aus tafel- oder plattenförmigen, lückenlos zusammenschließenden, nur wenig Protoplasma und meist gar kein Chlorophyll, dagegen meist sehr reichlich Wasser führenden Zellen, deren Außenwand verdickt und außen mit einer cutinisierten Lamelle, der Cuticula, bekleidet ist (Abb. 138 c; 139 a). Cutinisierte Substanz ist für




Abb. 138. Querschnitt durch die Epidermis (Ep) der Blattunterseite von *Mentha piperita*, s Schließzellen der Spaltöffnung, n Nebenzellen, c Cuticula, mer Schwammparenchym. Stark vergrößert. (Tschirch.)

Wasser undurchdringlich, und die Cuticula verhindert so den Verlust von Feuchtigkeit aus den Pflanzen. Besonders bei den Gewächsen, die in sehr trockenen Gebieten gedeihen, ist die Cuticula oft von auffallender Dicke. Außerdem kann sie noch durch Auflagerung von Wachs in Form feinsten Körnchen oder feiner Stäbchen unterstützt werden. Zur Regelung der Verdunstung und zur Zuführung von Luft nach den Intercellularräumen sind an oberirdischen Organen die Spaltöffnungen vorhanden (Abb. 138, E), welche sich dem jeweiligen Bedarf entsprechend öffnen oder schließen (vergl. hinten unter „Durchlüftungssystem“).

Die Verdickung der Außenwände der Epidermiszellen, die bei manchen Pflanzen sehr weit gehen kann, verleiht diesen eine erhöhte Widerstandskraft. In stark wasserleitenden Teilen größerer Gewächse jedoch, wie z. B. bei den Stämmen und den Wurzeln der Dikotylen (Bäume und Sträucher) genügt eine einschichtige Epidermis zum Schutze der inneren Gewebeteile häufig nicht, besonders da die Epidermis der durch das Dickenwachstum bedingten Ausdehnung der betreffenden Organe nicht zu folgen vermag. Bei der Mistel (*Viscum album*) bleibt als bei einer Ausnahme die Epidermis stets erhalten, während sonst fast durchweg die Epidermis bei fortschreitendem

Dickenwachstum durch vielschichtigen Kork (Periderm) ersetzt wird. Dieser wird aus platten- oder tafelförmigen Zellen *g* bildet (Abb. 139 *b*), deren meist dünne Membran jedoch durchaus mit Suberin durchtränkt und nicht nur, wie bei der Epidermis, mit einer Korklamelle versehen ist. Der Kork entsteht durch das nachträgliche Auftreten eines Korkcambiums (Phellogen, Abb. 139, 2 *b* unten), welches sich entweder in den äußeren Lagen der Rinde oder seltener in der Epidermis (als ein Folgeremistem, d. h. ein aus schon in den definitiven Zustand übergegangenen Zellen nachträglich entstandenes Meristem) selbst bildet. Das Korkcambium scheidet übrigens nicht nur nach außen Korkzellen ab, sondern auch noch nach innen ein parenchymatisches Gewebe (Phello-*derm*), welches zur Verdickung der äußeren Rinde dient. Korkbildung läßt sich besonders schön an der Korkeiche studieren, von der der sehr vielschichtige Flaschenkork stammt.

Wenn nachträglich sich weitere (sekundäre, tertiäre etc.) Korkzellreihen in das Gewebe der Rinde hineinschieben, so schieben sie die außerhalb des Korkes liegenden Rindenzellen von dem Saftverkehr des Stammes ab, bringen sie zum Absterben und veranlassen so die sogen. Borkebildung (Abb. 140). Borke ist demnach Kork

samt mehr oder weniger großen Partien abgestorbenen Rindengewebes.

Wo die Epidermis nicht durch Korkbildung ersetzt wird und dennoch gegen außen ein sehr starker Schutz nötig ist, wie z. B. bei den Samen, wird die Widerstandsfähigkeit durch ganz außerordentliche Verdickung ihrer Zellwand, die fast bis zum Verschwinden des Lumens führen kann, erhöht (Abb. 141).

Die Verstärkung der Zellwände kann dabei aus reiner Cellulose bestehen oder aus Schleimsubstanz (Abb. 142), welche im trockenen, wasserfreien Zustande kaum weniger widerstandsfähig ist als erstere, bei Wasserzutritt jedoch mächtig aufquillt. Auch Verkieselung der Membran zeigen einige Pflanzen (z. B. Schachtelhalmarten) zum Schutze gegen äußere Einflüsse.




Abb. 139. Übergang einer einzellreihigen Epidermis in eine vielzellreihige Korkschicht: 1 Epidermis (*b*) mit der Cuticula (*a*), welche im Begriff ist, abgeworfen zu werden. In 2 ist die Epidermis durch ein vielzellreihiges Korkgewebe (*b*) ersetzt und die Cuticula ist abgeworfen. In den Zellschichten oberhalb *c*, dem Korkcambium oder Phellogen (*b* unten) werden neue Korkzellen gebildet. Stark vergrößert.  
(Th. Hartig.)

Zur mechanischen Verstärkung der Epidermis, oder besonders häufig zur Herstellung eines äußeren Wasserreservoirs um die Pflanze,




Abb. 140. Borkenbildung bei *Cinchona calisaya*. Querschnitt durch die Rinde *k* Korkbänder; durch die Binnenkorkbänder wird Borke gebildet. *b* Rindengewebe. Stark vergrößert. (Berg).




Abb. 141. Querschnitt durch die Samenschale einer Erbse: *p* Epidermis aus hartwandigen Palisadenzellen, *c* Cuticula. Stark vergrößert. (J. Moeller.)




Abb. 142. Querschnitt durch die Randpartie eines Leinsamens: *ep* Epidermis mit den aufgequollenen Schleimschichten, *c* Cuticula. Stark vergrößert. (J. Moeller.)

dient auch häufig das sogenannte Hypoderm (Abb. 143 und 144), d. h. unverdickte oder oft collenchymatisch oder sklerenchymatisch

verdickte, unterhalb der Epidermis liegende, ein- oder mehrschichtige Zellagen.

Als Anhangsgebilde der Oberhaut sind die Haare oder Trichome zu bezeichnen, die sowohl an Wurzeln, als auch an Stengeln und Blättern vorkommen. Sie gehen aus der Oberhaut oder aber den alleräußersten Schichten jener Organe in der Weise hervor, daß einzelne Epidermiszellen oder auch Gruppen derselben auswachsen und sich in verschiedener Weise mehr oder weniger hoch über die Epidermis erheben. Sie zeigen fast niemals eine regelmäßige Anordnung. Man nennt sie schlechthin Haare, wenn sie durch Ausstülpung je einer Epidermiszelle entstanden sind, gleichviel ob das fertige Gebilde einzellig ist oder durch nachträgliche Teilung mehr-




Abb. 143. Querschnitt durch die Nadel von *Pinus pinaster* (schwach vergrößert). *e* Epidermis, *es* hypodermale Faserstränge, *sp* Spaltöffnungen, *h* Harzgänge, *p* chlorophyllhaltiges Parenchym, *ab* farbloses inneres Gewebe, zwei Leitbündel enthaltend. (Nach Sachs.)




Abb. 144. Die linke Kante der vorigen Abbild. stark vergrößert (800mal). *c* kutikularisierte Hautschichten der Epidermiszellen, *i* innere, nicht kutikularisierte Schichten derselben, *c'* sehr stark verdickte Außenwand der an der Kante liegenden Epidermiszellen, bei *g* *i'* die hypodermalen Zellen, *g* die Mittellamelle, *i'* die geschichtete Cellulose, *p* chlorophyllhaltiges Parenchym, *pr* kontrahierter Inhalt desselben. (Nach Sachs.)

zellig wird. Als Zottenhaare oder aber als Stacheln (z. B. die „Dornen“ der Rosen) werden diejenigen Trichome bezeichnet, welche aus einer mehr oder weniger großen Gruppe von Oberhautzellen hervorgegangen sind.

Die Wurzelhaare (Abb. 17 und 148) sind diejenigen Organe der Wurzel, welche das Wasser mit den darin gelösten Nährsalzen aus dem Erdreich aufnehmen. Sie stehen stets einige Millimeter hinter der Wurzelspitze (Abb. 17 *a*) und sterben am älteren Teile der Wurzel in dem Maße ab, als die Wurzel fortwächst. Auf die bedeutungsvolle Tätigkeit der Wurzelhaare wird weiter unten, wo von der Ernährung der Pflanze die Rede ist, näher eingegangen werden.

Die Haare der oberirdischen Pflanzenteile, des Stengels und der Blätter, haben mannigfache Form (Abb. 145) und dienen ebenso mannigfachen Zwecken. In der Jugend sind alle

Haarbildungen mit Protoplasma erfüllt, und viele behalten diesen Inhalt ständig, andere jedoch verlieren ihn allmählich und ersetzen ihn durch Luft, so daß sie (besonders wenn in größerer Anzahl vorhanden




Abb. 145. Pflanzenhaare. *A* Oberhautpapillen von einem Blumenblatt. *B* einfaches Haar. *C* gegliedertes Haar. *D* Sternhaar. *E* Schuppenhaar. *F* letzteres im Längsschnitt. *G* Brennhaar von der Brennnessel. *H* Schleimhaar. *I* Drüsenhaar mit wenigzelligem Kopf. *K* Drüsenhaar mit vielzelligem Kopf (Drüsenhaare), letzteres von oben gesehen. *L* stark vergrößert.

Cuticula ansammelt. Auch die Brennhaare müssen besonders hervorgehoben werden, lange, unten flaschenartig erweiterte, einzellige, am oberen Ende knopfartig abgerundete Haare, deren Membran mehr oder weniger stark verkieselt ist und deshalb beim Berühren leicht unregelmäßig, glasartig abbricht, worauf die scharfkantigen Ränder in die

und schuppenförmig ausgebildet) wie ein schützender Mantel die Pflanze gegen Temperaturverschiedenheiten umhüllen und auch starke Verdunstung verhindern. Die Epidermiszellen sind manchmal höckerartig vorgewölbt, wie z. B. auf zahlreichen Blumenblättern, und durch diese Papillenbildung wird für unser Auge der charakteristische Samtglanz mancher Pflanzenorgane hervorgerufen. Bei weiterer Vorwölbung der Epidermiszellen entstehen dann die einfachen Haare, die einzellig oder durch Einschieben von Querwänden mehrzellig (Gliederhaare) sein können. Oft sind Haare auch verzweigt, und es entstehen so Etagenhaare, Büschelhaare, Sternhaare, Schuppenhaare. Besonders wichtig sind die Drüsenhaare, bei denen die Endzelle kugelig oder keulig anschwillt und sich noch häufig nachträglich mehrfach teilt; von den Drüsenzellen wird mehr oder weniger reichlich Sekret abgeschieden, das sich zwischen der Außenwand der Zellen und der abgehobenen, undurchlässigen

Haut eindringen und der Inhalt der Haare sich in die Wunde ergießt. Dieser Inhalt besteht nicht, wie man früher gewöhnlich annahm, aus Ameisensäure, sondern vielleicht aus Toxinen (einem den Eiweißkörpern ähnlichen Stoff).

### 3. Festigungsgewebe. Skelettsystem. (Mechanisches System.)

Während das Hautgewebe Schutz gegen schädliche Einflüsse örtlicher Natur bietet, bedarf die Pflanze auch eines inneren Schutzes, welcher sie gegen die Wirkungen der Schwerkraft und des Windes schützt. Diese Schutzvorrichtungen müssen natürlich um so bedeutender sein, je größer die Pflanze ist, das heißt je mehr Angriffspunkte sie den elementaren Gewalten bietet. Grashalme werden vom Winde gebogen und müssen daher biegungsfest sein, Baumstämme müssen, um unter dem Gewicht ihrer Kronen nicht zu brechen, strebefest sein, Wurzeln müssen, um nicht zerrissen zu werden, zugfest sein usw. Zu diesem Zwecke sind hauptsächlich die Bastfasern vorhanden und finden sich je nach der Bestimmung, welche sie erfüllen sollen, in der Masse des Pflanzenkörpers verschieden verteilt. Die Prinzipien für ihre Verteilung sind dieselben, welche bei den Konstruktionen der Technik maßgebend sind; deshalb schließen die zugfesten Organe einen Bastfaserstrang kabelartig in ihrer Mitte ein, biegungsfeste Organe besitzen meist einen Bastfaserstrang rings um einen Hohlkörper angeordnet, und strebefeste Organe müssen in allen ihren Teilen von festigenden Gewebeelementen durchsetzt sein.

Die Elemente des Skelettsystems sind, wie diejenigen des Leitungssystems, entweder von prosenchymatischer oder aber von parenchymatischer Gestalt. Die ersteren spielen die Hauptrolle; sie heißen Bastzellen, Bastfasern oder Sklerenchymfasern (Abb. 146, *b*; 147, *B*, *C*). Ihre Wandungen sind stets mehr oder weniger stark verdickt und haben nur spärlich enge, meist spaltenförmige Tüpfel, durch welche sie mit den Nachbarzellen in Verbindung stehen. Ist die Wandverdickung sehr stark vorgeschritten, was zuweilen bis fast zum Verschwinden des Lumens geschieht, so bilden




Abb. 146. *b* Bastfasern im Längsschnitt, *st* und *m* Steinzellen im Längs- und Querschnitt. Stark vergrößert. (J. Moeller.)

die Tüpfel auf dem Querschnitt nur enge, schmale Kanäle. Bastfasern sind, ihrer Bestimmung entsprechend, häufig sehr lang; solche von über 1 m Länge sind nicht selten (während Gefäße von solcher Länge nur sehr selten vorkommen). Andererseits kennen wir auch




Abb. 147. Dickwandige Zellen des Pflanzenkörpers.  
A normale Steinzellen, B Bastfasern im Gewebeverband, C vereinzelte Blattfasern, D und E verschiedene Formen von Collenchym. Stark vergrößert.

Bastfasern von nur 0,01 mm Länge und weniger. Sie können einzeln stehen, können aber auch Bündel von größerer oder geringerer Stärke bilden. Man bezeichnet die Fasern nur, wenn sie in den Siebteilen der Gefäßbündel (Rinde) vorkommen, als Bastfasern und nennt die im Holzteile vorkommenden gewöhnlich Libriform-

fasern. In Wirklichkeit sind beide physiologisch und auch morphologisch gleich oder fast gleich.

Zu den parenchymatischen Elementen des Skelettsystems gehören die Steinzellen, Sklerenchymzellen oder Sklereiden (Abb. 146 *st* und *m*, Abb. 147, *A*). Sie besitzen, abgesehen von der parenchymatischen Form, alle Eigentümlichkeiten der Bastfasern, sind aber meist viel reichlicher und grober getüpfelt als jene; sie dienen im übrigen, wie schon aus ihren Formen hervorgeht, niemals der Zug- oder Biegungsfestigkeit, sondern sind hauptsächlich bestimmt, in oft lückenlosem Verbands, z. B. in Frucht- oder Samenschalen, gegen Druck oder das Eindringen fremder Körper schützend zu wirken.

Parenchymzellen mit vorwiegend an den Kanten verdickten Wandungen werden als Collenchymzellen (Abb. 147, *D*, *E*) bezeichnet. Während Bastfasern und Steinzellen abgestorbene, d. h. protoplasmalose Elemente sind, sind die Collenchymzellen lebend und führen auch häufig noch Chlorophyll. Sie finden sich hauptsächlich in jungen, noch wachsenden Organen und werden später, nach deren definitiver Ausbildung, meist bei Borkenbildung abgestoßen und durch Bastfasern ersetzt.

#### 4. Die Ernährung der Pflanze.

Die elementaren Bestandteile der Pflanzen sind Wasserstoff, Sauerstoff, Kohlenstoff und Stickstoff, ferner Schwefel als notwendiger Bestandteil der Eiweißsubstanzen, Phosphor, Chlor, Kalium, Calcium, Magnesium und Eisen, welches letztere namentlich zur Chlorophyllbildung unerlässlich ist.

Diese sämtlichen Stoffe nimmt die Pflanze zum Teil aus der Erde, zum Teil aus der Luft in sich auf, und zwar aus der Erde namentlich Sauerstoff und Wasserstoff in Form von Wasser, welches gleichzeitig die obengenannten anorganischen Bestandteile in Gestalt von Salzen, wie Kaliumnitrat, Kaliumchlorid, Calciumphosphat, Magnesiumsulfat, Eisenchlorid u. a. mehr gelöst enthält. Kohlenstoff wird den Pflanzen in Gasform, und zwar durch die einen Bestandteil der atmosphärischen Luft bildende Kohlensäure zugeführt; Stickstoff entstammt vorwiegend den stickstoffhaltigen Nährsalzen des Erdbodens.

Die Gewebesysteme, welche für die Ernährung in Frage kommen, wurden oben (Seite 98) angeführt und sollen im folgenden kurz geschildert werden.

##### a) Das Absorptionssystem (Aufnahmesystem).

Während bei Sumpf- und Wasserpflanzen die ganze Wurzel infolge der Durchdringbarkeit ihrer äußeren Haut zur Aufnahme von Wasser geeignet ist, haben die im Erdreich gedeihenden Pflanzen, welche die große Mehrzahl aller Gewächse bilden, dazu die bereits

oben erwähnten Wurzelhaare nötig. Die Membran der Wurzelhaare ist für Wasser durchlässig. Die Wurzelhaare befinden sich, wie früher (S. 105) bereits erwähnt, stets einige Millimeter hinter der Wurzelspitze und sterben hinten in demselben Maße ab, wie die Wurzel fortwächst, während vorn stets wieder neue gebildet werden. Da nun die Wurzelhaare gleichzeitig mit dem Wasser auch gelöste Salze in sich aufnehmen und diese Lösung durch Zersetzung der im Erdreiche befindlichen kleinen und kleinsten Gesteinstrümmel vor




Abb. 148. Querschnitt durch eine junge Wurzel, um das Anlagern der Wurzelhaare an die Gesteinsteilchen zu zeigen. *h* Holzteile, *c* Siebteile. Stark vergrößert. (R. Hartig.)

sich geht, an welche sich die Wurzelhaare anlagern (Abb. 148), so ersieht man aus oben Gesagtem, daß beim Fortwachsen der Wurzeln immer neue Gesteinsteilchen in den Erdreichsschichten mit neuen Wurzelhaaren in Berührung kommen und so eine fortschreitende Nutzbarmachung des Erdreiches durch die Pflanze sich vollzieht.

Bei vielen untergetaucht lebenden Wasserpflanzen dient die ganze Oberfläche der Aufnahme von Nährstoffen, und sogar die Gase werden so der Pflanze zugänglich gemacht (Helodea).

Bei den phanerogamen Schmarotzergewächsen vertreten Saugorgane (Haustorien) die Stelle der Wurzelhaare (Abb. 25, *b, c*); bei Moosen und anderen Kryptogamen, denen Wurzeln überhaupt fehlen,

nennt man die Wurzelhaar-ähnlichen Gebilde, welche dort unmittelbar an dem Grunde des Stengels entspringen, Rhizoiden.

Es soll endlich noch erwähnt werden, daß bei zahlreichen Pflanzen, ja sogar bei wichtigen, waldbildenden Bäumen, wie z. B. der Kiefer, Wurzelhaare nicht ausgebildet werden, sondern durch die sogen. Mycorrhiza ersetzt werden. Man versteht hierunter einen Mantel aus dicht verflochtenen Pilzfäden (die Arten der Pilze sind vielfach noch unbekannt), die entweder die Wurzeln nur oberflächlich umkleiden (ektotrophe M.) oder aber in die äußersten Schichten eindringen (endotrophe M.). Sie sind imstande, die im Boden, besonders im Waldboden, enthaltenen organischen Nährstoffe direkt aufzunehmen und ihrer Wirtspflanze zuzuführen. Andererseits leben sie aber auch auf Kosten der Nährstoffe, die die Wirtspflanze als Assimilate gebildet hat. Wir haben demnach hier einen Fall von Lebensgemeinschaft (Symbiose) zwischen Blütenpflanze und Pilz.

### b) Das Assimilationssystem.

Die Gewinnung des Kohlenstoffs aus der Kohlensäure der Luft und seine Überführung in organische Substanz wird bei der Pflanze als Assimilationsprozeß bezeichnet, während man beim Tierreich diesen Namen für alle Ernährungsprozesse gebraucht, bei denen eine Umbildung der gebotenen Nährstoffe in die Körpersubstanz der Organismen stattfindet. Zur Arbeitsleistung der Assimilation sind alle Chlorophyllkörper besitzende, grün gefärbten Teile der Pflanze befähigt. In erster Linie hat daher das Assimilationssystem seinen Sitz in den der umgebenden Atmosphäre allerseits zugänglichen Blättern. Die Chlorophyllkörper sind die Laboratorien, in denen sich dieser für die gesamte Lebewelt wichtigste chemische Prozeß ausschließlich abspielt. Höchst bemerkenswert ist jedoch, daß die Chlorophyllkörper nur mit Hilfe von Licht und Wärme diese ihre Funktion erfüllen können. Alle Blätter enthalten reichlich Chlorophyll, besonders reichlich aber auf der dem Lichte am meisten ausgesetzten, oberen Blattseite, welche meist schon oberflächlich betrachtet dem Auge tiefer grün erscheint, als die Unterseite.

Die Chlorophyllkörner sind an der Blattoberseite in schmalen schlauchförmigen, rechtwinklig zur Blattfläche pfahlartig nebeneinander gestellten Zellen, den sogenannten Palisadenzellen




Abb. 149. Teil des Querschnittes durch ein Buchenblatt: *pa* Palisadenzellen, *sp* Schwammparenchym, *co* obere Epidermis, *cu* untere Epidermis, *s* Spaltöffnung. Stark vergrößert.

(dem Palisadenparenchym), angeordnet (Abb. 149 *pa*). Auf der Unterseite der Blätter befindet sich das sogen. Schwammparenchym (Abb. 149 *sp*). Nur sehr selten kommt es auch vor, daß — vor allem bei stielrunden Blättern — die Ober- und Unterseite von Palisadenparenchym oder auch von Schwammparenchym eingenommen wird. Letzteres ist von zahlreichen Intercellularräumen durchsetzt, in denen die durch die Spaltöffnungen (siehe weiter hinten) eintretende kohlenensäurehaltige Luft zirkuliert, um durch die Lebens-tätigkeit der sie umgebenden Zellen dem überaus interessanten, aber noch wenig aufgeklärten Prozesse der Zerlegung anheim zu fallen. Welche Produkte es sind, die aus diesem Vorgang unmittelbar hervorgehen, ist noch nicht mit voller Sicherheit bekannt. Man kann nur annehmen, daß Kohlensäure und Wasser sich unter Ausscheidung von Sauerstoff nach folgender Gleichung umsetzen:



Als einziges sichtbares Produkt der Assimilationstätigkeit erscheinen äußerst kleine Stärkekörnchen in den Chlorophyllkörnern derjenigen Zellen, in denen die Assimilationsvorgänge sich abspielen. Jene sind besonders reichlich am Abend sehr sonniger Tage, also nach sehr lebhafter Assimilation, zu beobachten. Die Stärkekörnchen gehen im Pflanzenkörper bald wieder in lösliche Stärke oder in Zuckerarten über und werden als solche in gelöster Form fortgeführt, was sich bei Tage nur schwer beobachten läßt, in der Nacht aber besonders auffällig ist. Dies geschieht zunächst durch die Leitbündel der Blattnerven, welche mit denen des Blattstieles, wo solcher vorhanden ist, und weiterhin mit denen der Stengelteile in Verbindung stehen, um auf dieser Bahn entweder zu den Orten des Verbrauchs, den Vegetationspunkten, oder zu den Orten der Aufspeicherung, z. B. den Samen, Knollen, Rhizomen usw., hingeleitet zu werden.


Andererseits werden dem Assimilationsgewebe der Blätter durch die in den Blattnerven enthaltenen Leitbündel alle diejenigen Stoffe zugeführt, welche außer der Kohlensäure zum Zwecke der Assimilation nötig sind, also hauptsächlich Wasser, daneben aber auch die anorganischen Salze, deren Anwesenheit zur Umbildung des Kohlenstoffs in die Stickstoff, Schwefel und Phosphor enthaltenden Eiweißstoffe erforderlich ist. Über den Verlauf der Entstehung von Eiweißkörpern jedoch weiß man noch weniger Genaueres, als über den der Kohlehydrate aus Kohlensäure und Wasser. Daß sie aber aus Kohlehydraten und gelösten Mineralstoffen erfolgt, schließt man aus der beobachteten Zufuhr und dem Verbrauch dieser Stoffe an den Plasmabildungsstätten.

Von den mineralischen Nährstoffen kommen hauptsächlich Kalium- und Magnesium-Nitrate, Sulfate und Phosphate zur Verarbeitung. Den Nitraten und Sulfaten werden dabei Stickstoff und Schwefel unter Zerstörung des Säureradikals vermutlich entzogen, während aus den Phosphaten die Säuregruppe als solche für den

Aufbau der Zellkerne Verwendung finden dürfte. Die Anwesenheit der Basen, namentlich des Kalkes, erscheint notwendig zur Neutralisierung und Fällung der bei der Eiweißbildung entstehenden schädlichen Nebenprodukte, hauptsächlich der Oxalsäure; Kristalle von Calciumoxalat (Einzelkristalle, Drusen, Raphiden, Kristallsand) sind in großen Mengen in vielen Geweben abgelagert wahrzunehmen.

Das gasförmig entweichende Nebenprodukt der Kohlenstoffassimilation sowohl, als auch der Stickstoffverarbeitung ist Sauerstoff. Dieser wird durch die Lebenstätigkeit der Pflanzen in äußerst ausgiebigem Maße entbunden. Während aber zur Ernährung der Pflanzen bei Licht die Kohlensäure der Luft zerlegt und dabei Sauerstoff erzeugt wird, geht neben diesem Prozeß ständig ein zweiter einher, die Atmung, durch welche umgekehrt Sauerstoff eingeatmet und Kohlensäure ausgeatmet wird. Quantitativ steht jedoch der Sauerstoffverbrauch der Pflanzen bei der Atmung der Sauerstoffentbindung bei der Assimilation so bedeutend nach, daß die Bedeutung der Pflanzen als Sauerstoffregeneratoren im Haushalte der Natur dadurch nicht beeinträchtigt wird.

Der Atmungsprozeß der Pflanzen ist genau wie beim tierischen Organismus ein Oxydationsprozeß, welcher zur Unterhaltung der Lebenstätigkeit erforderlich ist, weil durch ihn Energie erzeugt wird. Um die Betriebskraft zum Leben zu erlangen, opfert die Pflanze einen Teil ihrer organischen Substanz, namentlich Kohlehydrate, der physiologischen Verbrennung, deren Endprodukt Kohlensäure und Wasser ist:



Assimilation und Atmung sind also zwei Lebensprozesse, welche ganz unabhängig voneinander im pflanzlichen Organismus sich vollziehen. Während aber die Assimilation nur unter dem Einflusse des Lichtes durch die chlorophyllhaltigen Pflanzenteile bewerkstelligt wird, findet die Atmung durch alle lebenden Pflanzenteile ununterbrochen Tag und Nacht statt, denn der durch den Atmungsprozeß sich vollziehende Eintritt von Sauerstoff in den Chemismus der Zellen ist ununterbrochen erforderlich, um die lebendige Substanz des Protoplasmas im Zustande normaler Tätigkeit zu erhalten und Umsetzungen zu verhüten, welche die Lebenstätigkeit hemmen oder aufheben könnten.

### c) Das Leitungssystem.

Die Elemente, welche alle höher organisierten Gewächse von den feinsten Wurzeln bis in alle Blattspitzen durchziehen, durch welche, von osmotischen und anderen, teilweise noch unbekanntem Kräften getrieben, beständig Ströme von Wasser und von Nährlösungen fließen, ja, welche sozusagen dem Adersystem mit Venen und Arterien im tierischen Körper zu vergleichen sind, sind die Leitbündel oder Gefäßbündel.

Dieser Ausdruck darf nicht zu der falschen Auffassung Veranlassung geben, als müßten die Bündel nur aus Gefäßen bestehen; es gibt sogar Bündel, die überhaupt keine Gefäße enthalten, sondern an ihrer Stelle nur Tracheiden besitzen. Der Ausdruck Fibrovascularstränge, welchen man für Gefäßbündel braucht, schließt jene Ungenauigkeit nicht aus, hingegen ist die Bezeichnung Leitbündel (Mestom) zutreffender. Alle drei Ausdrücke werden in gleichem Sinne gebraucht.

Die Leitbündel gehen, wie wir schon oben sahen, aus dem Plerom hervor, aus dem sich zuerst Reihen meristematischen Gewebes, die sogen. Procambiumstränge differenzieren. Aus den äußeren Partien dieser Procambiumstränge entwickelt sich der Siebteil, aus den inneren der Holzteil der Leitbündel. Bei den Monocotyledoneen ist damit das Procambium erloschen, während bei Dicotyledoneen und Gymnospermen ein Teil desselben bestehen bleibt und — zwischen Sieb- und Holzteil liegend — später als Cambium das Dickenwachstum herbeiführt.

Jedes Leitbündel oder Gefäßbündel (Mestom) besteht aus zwei Teilen, dem Holzteil oder Hadrom (auch Vasalteil oder Xylem [von *ξύλον*, xylon = das Holz] genannt), und dem Siebteil oder Leptom (auch als Cribralteil oder Phloëm [von *φλοῖος*, phloios = die Rinde] bezeichnet)<sup>1)</sup>.

Die Elemente des Holzteiles sind oder können sein:

1. Gefäße;
2. Tracheiden;
3. Librifasern;
4. Ersatzfasern;
5. Holzparenchym (Hadromparenchym).

Die Elemente des Siebteiles sind oder können sein:

1. Siebröhren;
2. Geleitzellen;
3. Cambiformzellen;
4. Siebparenchym (Leptomparenchym).

Elemente des Holzteiles (vergl. hierzu auch Abb. 152, S. 118).

**Die Gefäße**, auch Tracheen genannt (von dem latein. *trachea*, die Luftröhre, da man als solche die Gefäße früher irrümlich ansah), sind keine Zellen, sondern meist lange Röhren, entstanden durch mehr oder weniger vollständige Auflösung der Querwände in langen Reihen übereinander liegender Zellen. Die Grenzen der einzelnen zu einem Gefäß verschmolzenen Zellen sind noch als ringförmiger Randwulst (ringförmige Perforation) an den Gefäßwandungen erkennbar; oder es werden von den Querwänden nur einzelne Streifen aufgelöst, so daß jene einer Leiter mit mehr oder weniger zahlreichen Sprossen gleichen (leiterförmige Perfo-

<sup>1)</sup> Mit den Bezeichnungen Phloëm und Xylem umfaßt man allerdings nicht nur die leitenden, sondern auch zugleich die mechanischen Elemente (Stereom), welche im Siebteil, resp. im Holzteil vorkommen. Mit dem Namen Mestom bezeichnen wir sämtliche leitenden Elemente des Leitbündels; mit Leptom nur diejenigen des Siebteils, mit Hadrom nur diejenigen des Holzteils; Phloëm ist also Leptom + Stereom, Xylem = Hadrom + Stereom.

ration). Nach der Ausbildung der Gefäße verschwindet aus ihnen das Protoplasma; die Gefäße stellen dann tote Röhren dar. Die Länge der Gefäße erreicht niemals die Länge der ganzen Pflanze und beträgt z. B. bei der Erle durchschnittlich 5,7 cm, bei der Birke 12 cm, bei der Ulme 32 cm, bei der Eiche 57 cm, bei der Robinie (fälschlich Akazie genannt) 70 cm. Die Gefäße jüngerer Zweige sind stets kürzer als diejenigen älterer Zweige bis zum vierten Jahre. So beträgt ihre Länge z. B. bei einem einjährigen Zweige des türkischen




Abb. 150. Schematischer Radial-Längsschnitt durch das Leitbündel (Gefäßbündel) einer dikotylen Pflanze: a Markzellen, b Ringgefäß, c Spiralgefäß, d Netzgefäß, e Holzparenchym, f Librifasern, g Gefäß mit behöfteten Tüpfeln, h Holzparenchym, i Cambium, k Geleitzellen, l Siebröhre, m Siebparenchym, n Lastfasern, o Rindenparenchym (etwa 250fach vergrößert). (Nach Kny.)

Flieders 5 cm, bei einem zweijährigen 14 cm, einem dreijährigen 24 cm, einem vierjährigen 37 cm, einem fünfjährigen 36 cm, einem sechsjährigen 34 cm. Man darf daraus jedoch nicht schließen, daß die anfangs kürzer angelegten Gefäße etwa nachträglich an Ausdehnung gewinnen, sondern es beruht dies lediglich darauf, daß die während einer neuen Wachstumsperiode sich bildenden Gefäße eine bedeutendere Länge erreichen, als die Gefäße des Vorjahres im ausgebildeten Zustande besitzen. Auch im Verlauf eines einzelnen Zweiges selbst zeigen die Gefäße an verschiedenen Stellen verschiedene Längen, und zwar so, daß die Größe derselben von der Basis des Zweiges an stetig zunimmt, etwas über der Mitte des Zweiges ihren Höhepunkt erreicht und dann nach der Spitze zu rasch zu einem geringen Maße herabsinkt. Die Weite der

Gefäße ist sehr verschieden und wechselt zwischen 0,004 mm bis 0,3 mm. Namentlich sind die erstentstandenen, primären Gefäße enger als später angelegte, sogenannte sekundäre Gefäße. Ganz besonders weite Gefäße treffen wir in den Lianenstämmen an.

Über die charakteristische Gestalt der Wandverdickungsformen, die bei den Gefäßen vorkommen, welche im Prinzip jedoch sich




Abb. 151. Tangentialer Längsschnitt durch das sekundäre Holz von *Allanthus glandulosa*. *g* Gefäße, *st* querdurchschnittene Markstrahlen, *p* Holzparenchym, *t* Tracheiden, *lf* Librifasern. Stark vergrößert. (Nach Sachs.)

nicht von den Wandverdickungsformen der Zellen unterscheiden, ist S. 93 bereits berichtet worden. Die Namen Ringgefäße, Spiralgefäße, Treppengefäße, Netzgefäße, Tüpfelgefäße (Abb. 150 *b—d*, *g*) beziehen sich nur auf die Art ihrer Wandverdickungen.

**Die Tracheiden** (von *trachea*, die Luftröhre, das Gefäß, und *εἶδος*, *eidōs* = das Aussehen, d. h. den Gefäßen oder Tracheen ähnlich) sind tote Zellen von prosenchymatischer (langgestreckter und meist an beiden Enden zugespitzter) Gestalt (Abb. 151 *t*). Sie können 1 mm

lang, ja bei den Coniferen, wo sie am charakteristischsten vorkommen, sogar 4 mm lang sein. Die Verdickung der Wände findet in ganz ähnlicher Weise statt, wie bei den Gefäßen. Namentlich kommen sehr große behöft Tüpfel bei den Tracheiden der Nadelhölzer vor (vergl. Abb. 13); die Nadelhölzer besitzen Gefäße (abgesehen von spärlichen, sehr engen Primärgefäßen) überhaupt nicht.

**Die Libriformfasern** lassen sich sehr zutreffend als die Bastfasern des Holzkörpers bezeichnen; sie haben mit der Saftleitung nichts zu tun und dienen nur mechanischen Zwecken. Meist sind sie länger als die Tracheiden und viel stärker verdickt, es fehlen ihnen auch durchweg die behöft Tüpfel; nur recht spärlich findet man bei ihnen enge einfache Tüpfel (Abb. 151 *lf*). Es ist jedoch festzuhalten, daß sich zwischen Tracheiden und Libriformfasern einerseits und Libriformfasern und den gleich zu besprechenden Ersatzfasern, ja sogar zu dem Holzparenchym andererseits alle Übergänge finden. Echte Libriformfasern enthalten kein Protoplasma mehr.

**Die Ersatzfasern** sind Elemente, die den Libriformfasern sehr ähnlich sind, sich aber dadurch von diesen unterscheiden, daß sie gewöhnlich viel dünnwandiger und stets von lebendem Protoplasma erfüllt sind.

**Das Holzparenchym** (Hadromparenchym) (Abb. 150 *e, h*) besteht, wie schon der Name sagt, aus mehr oder weniger parenchymatischen, lebenden Zellen mit verhältnismäßig dünnen, aber wie bei den vier vorher genannten Elementen meist ebenfalls verholzten Wänden. Es umkleidet oft die Gefäße, kommt aber auch in größeren Gruppen im Holzkörper vor. In seinen Zellen treten häufig nachträgliche Querwandbildungen auf.

Elemente des Siebteiles (vergl. hierzu auch Abb. 152).

**Die Siebröhren** entstehen, wie die Gefäße, aus in Reihen übereinanderliegenden Zellen, jedoch kommen die Querwände dieser Zellen nicht zum Verschwinden, sondern sie bleiben als sogenannte Siebplatten bestehen (Abb. 150 *l, 153*); diese werden teilweise verdickt, die dünnbleibenden Stellen aber siebförmig durchlöchert. Häufig, aber nicht immer, stehen diese Siebplatten schief zur Längsrichtung der Siebröhren. Diese können bis zu 2 mm lang und bis 0,08 mm weit sein und enthalten stets lebendes Protoplasma. Das Protoplasma der einzelnen Zellen der Siebröhren steht durch die feinen Löcher der Siebplatten in offener Verbindung miteinander. Da ihre Wände nicht oder nur in sehr geringem Maße sich verdicken, keinesfalls aber verholzen, so werden alle Siebröhren, welche der Leitung (siehe oben) nicht mehr dienen, häufig bis zum Verschwinden ihres Lumens (Hohlraums) durch kräftigere, ihnen benachbarte Zellen zusammengedrückt und bilden dann in ihrer Gesamtheit eine hornige Masse, das sogen. Keratenchym.

**Die Geleitzellen** (Abb. 150 *k, 153 z*) umkleiden, bzw. geleiten die Siebröhrengruppen und unterstützen diese vermutlich in ihren Funktionen, da in ihnen wahrscheinlich die Eiweißsubstanzen gebildet werden. Sie entstehen mit der benachbarten Siebröhrenzelle aus einer




Abb. 152. Das Leitungs- und Stützgewebe der Pflanzen. Schnitt durch ein Stengelstück des Pflanzstrauches *Aristolochia sipho*, in 200facher Vergrößerung. *A* Epidermis, *B* Collenchym der Rinde, *C* dünnwandiges Parenchym der Rinde, *D* Bastfaser-Ring, *E* dünnwandiges Parenchym der Rinde, *F* zerdrücktes Siebgewebe, *G* leitungsfähiges Siebgewebe (mit Siebröhren und Geleitzellen), *H* Cambium, *J* Holzkörper des Leitbündels (*J* Holzparenchym, *z* Tracheiden, *s* Tracheiden, *4* Treppengefäße, *5* Spiralgefäß, *6* Ringgefäße), *K* aus dünnwandigem Parenchym bestehendes Mark. — Nach E. Gilg in H. Kraemer, „Mensch und Erde“.

und derselben Mutterzelle, enthalten sehr reichlich Protoplasma und besitzen meist ein enges Lumen. Die an die Siebröhren angrenzenden Wände sind fein getüpfelt.

**Die Cambiformzellen** sind dünnwandige, langgestreckte, reichlich Protoplasma führende Zellen mit zugespitzten Enden. Sie unterscheiden sich nur recht unwesentlich von den Geleitzellen. Ihre Funktion ist noch nicht sicher erwiesen.

**Siebparenchym** (*Leptomparenchym*, Abb. 150, *m*) nennt man die gleichfalls dünnwandigen, parenchymatischen, protoplasmführenden, mehr oder weniger kugeligen oder wenigstens nur unbedeutend gestreckten Zellen, welche stets in Gemeinschaft mit den vorher genannten Elementen im Siebteil vorkommen.

Dem Holzteil der Leitbündel (Gefäßbündel) fällt die Aufgabe zu, das durch die Wurzeln aufgenommene, Nährsalze enthaltende Wasser nach den Stellen der Assimilation, namentlich den Blättern, zu führen, wo es zum Teil verdunstet, zum Teil nebst den mitgeführten Salzen in oben geschilderter Weise chemisch gebunden wird. Der Siebteil hingegen hat die Aufgabe, die durch die Assimilationstätigkeit der Pflanze entstandenen Kohlenstoff- oder Stickstoffverbindungen nach den Orten ihres Verbrauchs zu führen, also nach den Vegetationspunkten und dem Cambium, wo sie als Baustoffe für neue Zellen des Pflanzenkörpers verbraucht werden. Auch nach den Blüten und heranwachsenden Früchten ist ein starker Nahrungsstrom gerichtet, wo er zur Bildung der an Kohlenstoff- und Stickstoffverbindungen reichen Samen dient; im Herbst, wenn die Pflanze in den Zustand der Ruhe übergeht, werden die den Winter überdauernden Teile, wie Stamm, Rhizom, Knollen, Wurzeln usw. mit Nährstoffen angefüllt. Im Frühjahr, wenn die Wachstumsperiode der Pflanzen beginnt, wandern sie in gelöster Form wieder aus, um Baustoffe für die neu zu bildenden Blätter und die jungen Sprosse zu liefern.




Abb. 153. Längsschnitt durch das Leptom von *Cucurbita pepo*; die Querwände *q* sind noch nicht durchlöchert; *si* junge Siebplatte an einer Seitenwand; bei *x* und *l* bilden sich später gleichfalls Siebplatten; *ps*, *sp* und *sl* kontrahierter Inhalt der Siebröhrenlieder; *z* Geleitzellen. Stark vergrößert. (Nach Sachs.)

Schnitt durch ein Stengelstück des Pfeifenstrauces, *Aristolochia siphio*, in 200facher Vergrößerung. *A* Epidermis, *B* Collenchym der Rinde, *C* dünnwandiges Parenchym der Rinde, *D* Bastfaser-Ring, *E* dünnwandiges Parenchym der Rinde, *F* verdicktes Siebgevebe, *G* leitungsflühiges Siebgevebe (mit Siebröhren und Geleitzellen), *H* Cambium, *J* Holzparenchym, *K* aus dünnwandigem Parenchym bestehendes Mark. — Nach E. Gilg in H. Kraemer, „Mensch und Erde“.

Anordnung der Leitbündel.  
Konzentrische, kollaterale, bikollaterale und radiale  
Leitbündel.

Im Leitbündel (Gefäßbündel) können Holzteil und Siebteil verschieden zueinander angeordnet sein. Umschließt einer der beiden Teile den andern ringförmig, also entweder der Holzteil den Siebteil oder der Siebteil den Holzteil, so wird das Bündel ein konzentrisches genannt. Dieser Fall kommt namentlich in Stämmen




Abb. 154. Querschnitt durch ein konzentrisches Leitbündel im Rhizom von *Iris* (350fach vergrößert); *t* Tracheen, *t'* zuerst entstandene Tracheen, *s* Siebröhren, *g* Geleitzellen.




Abb. 155. Stück des Querschnitts eines etwa 13 mm dicken, 1 m hohen Stämmchens einer *Dracaena*, schwach vergrößert; *e* Epidermis, *r* Periderm, *b* primäre Rinde, *b* ein durch diese austretender Blattspurstrang, *g* primäre Bündel des Stammes zwischen Parenchym *m*, *x* Jungzuzwachs-, Cambium-ähnliche Zone mit Initialsträngen; weiter nach innen fertiges Holz, *g'* sekundäre konzentrische Leitbündel, *st* markstrahlähnliche Parenchymstreifen. (De Bary.)

von Farnen, selten von Monokotylen, sehr selten von Dikotylen vor (Abb. 154, 155g).

Liegen jedoch Holzteil und Siebteil nebeneinander, so sind zwei Fälle möglich, wenn man die gegenseitige Lage beider Teile zur Wachstumsachse des Sprosses in Betracht zieht, welchem das Leitbündel angehört, nämlich:

a) der Siebteil liegt, von der Peripherie des Sprosses aus betrachtet, in der Richtung des Radius vor dem Holzteil (Abb. 156 u.

158 A), dann ist das Leitbündel ein kollaterales. Dies ist bei den Stengelorganen der Monokotylen und Dikotylen der normale Fall. In verhältnismäßig wenigen Fällen findet sich Siebgewebe außer vor dem Holzteil, auch noch hinter dem Holzteil. Man spricht in diesen Fällen (Cucurbitaceae, Solanaceae, Apocynaceae etc.) von bikollateralen Leitbündeln (Abb. 157);




Abb. 156. Querschnitt eines geschlossenen Leitbündels im Stamm von *Zea mays* (550.)  
*a* Außenseite, *i* Innenseite bezüglich der Stammachse, *p* Grundgewebe, *gg* zwei große getüpfelte Gefäße, *s* Spiralgefäß, *r* Ring eines Ringgefäßes, *l* lufthaltige Lücke, durch Zerreißen entstanden, umgeben von dünnwandigen Zellen. Zwischen den beiden Gefäßen *g* liegen kleinere, netzartig verdickte und gehöft getüpfelte Gefäße. Diese Zellformen bilden den Holzteil. — Im Siebteil liegen die Siebröhren (*v*), durch ihre Weite ausgezeichnet; die kleineren viereckigen Zellen dazwischen sind die Geleitzellen; der ganze Strang ist umgeben von einer Bastfaserscheide.  
 (Nach Sachs.)

b) der Siebteil liegt in der Richtung des Radius neben dem Holzteil (Abb. 148, 158 B), dann ist das Leitbündel ein radiäres oder radiales. Dies ist bei allen Wurzelorganen der Fall.

Bei den kollateralen Leitbündeln der Gymnospermen und Dikotylen (Abb. 158 A) verläuft das neue Elemente erzeugende Bildungsgewebe, Cambium genannt, in der Richtung der punktierten

Linie rings um den Stammittelpunkt. Ursprünglich findet sich das Cambium nur in den Leitbündeln selbst (Fascicular-Cambium) und zwar als eine schmale Zone zwischen Siebteil und Holzteil




Abb. 157. Querschnitt durch einen zweijährigen Zweig von *Solanum dulcamara* mit bikollateralen Leitbündeln, stark vergrößert.

*K* Kork, *Mr* Außen- (primäre) Rinde, *b* Bastfasern, *Jr* Innen- (sekundäre) Rinde (äußerer Siebteil), *rs* Rindenstrahl, *C* Cambium, *Jar* Jahresring des Holzkörpers (*I* erstes Jahr, *II* zweites Jahr), *ms* Markstrahl, *is* innerer Siebteil, *m* Mark. (Nach Tschirch.)

(Abb. 159c); es ergänzt sich jedoch zwischen den Leitbündeln durch ein nachträglich aus dem Grundgewebe entstandenes Bildungsgewebe, das sogen. Interfascicular-Cambium (Abb. 159cb), zu




Abb. 158. Schematische Zeichnung zur Verdeutlichung der gegenseitigen Lage von Holzteil und Siebteil: *A* in kollateralen Leitbündeln, *B* in radialen Leitbündeln, *H* Holzteil, *S* Siebteil.




Abb. 159. Querschnitt durch das kollaterale, offene Leitbündel von *Ricinus communis*. *r* Rinde, *m* Mark, *c* Fascicularcambium, *cb* Interfascicularcambium; innerhalb *c* der Holzteil, in diesem bezeichnet *t* enge Tüpfelgefäße, *g* weite Tüpfelgefäße; außerhalb des Cambiums liegt das Siebgewebe *y*; *b* Bastfaserbündel. — Das Leitbündel ist auf seiner Außenseite von einer Stärkescheide umgeben. — Stark vergrößert. (Nach Sachs.)

einem geschlossenen Ring, welcher nach außen fortwährend neue Siebelemente, nach innen neue Holzelemente erzeugt und hierdurch das sekundäre Dickenwachstum der Stammorgane bewerkstelligt.

In welcher Weise aus einer Anzahl ursprünglich voneinander getrennter kollateraler Leitbündel bei fortschreitendem Wachstum ein Querschnittsbild von demjenigen Aussehen entsteht, wie es




Abb. 160. 1 Schematischer Querschnitt durch einen einjährigen Stängel mit 8 Leitbündeln; 2 Teil des schematischen Querschnittes durch denselben Stängel nach dreijährigem Wachstum; c Cambiumring, m Mark, mk Markverbindungen, mk<sup>1</sup> primäre und mk<sup>2</sup> sekundäre Markstrahlen, h<sup>1</sup> primäres und h<sup>2</sup> sekundäres Holz (Xylem), p<sup>1</sup> primäre und p<sup>2</sup> sekundäre Rinde (Phloëm). (H. Potonié.)

einander verbinden, also den gesamten Holzkörper und die innere Rinde durchsetzen (mk<sup>1</sup>; in Abb. 161 die dunkeln Linien, welche von innen nach außen das Holz durchlaufen). Sekundäre Markstrahlen (mk<sup>2</sup>) endigen innenseits im Holzteile, außenseits im Siebteile. Im Siebteile ist das Verhältnis natürlich insofern ein umgekehrtes, als dort die primären Elemente (p<sup>1</sup>) außen, die sekundären (p<sup>2</sup>) hingegen innen, also ebenfalls wie im Holzteile dem Cambium zunächst liegen.

Es mag hier erwähnt sein, daß infolge der im Frühjahr bedeutenderen, im Sommer geringeren Leitungstätigkeit des Holzkörpers sich deutliche konzentrische Kreise in vielen Dikotylenstämmen unterscheiden lassen, von denen jeder eine Wachstumsperiode umfaßt (Abb. 161). Denn im Frühjahr, zur Zeit, wo die neuen Triebe sich entwickeln, werden tracheale Elemente von größerer Weite und ge-

der Querschnitt durch einen beliebigen Dikotylenstängel, -stamm oder -zweig zeigt, läßt sich aus Abb. 160 ersehen. Die in der ersten Anlage vorhandenen Holzteile unterscheidet man als primäres Holz (Abb. 160 h<sup>1</sup>) im Gegensatze zu dem durch die Wachstumstätigkeit des Cambiums entstandenen sekundären Holz (h<sup>2</sup>). Die ursprünglich vorhandenen radial verlaufenden Verbindungen von Mark zur Rinde (mk) bleiben bestehen, dadurch, daß das Cambium an den betreffenden Stellen parenchymatische, meist radial etwas gestreckte Zellen hervorbringt; sie kennzeichnen sich als die primären (ursprünglichen) Markstrahlen dadurch, daß sie das Mark mit der äußeren Rinde wie im anfänglichen, so auch im späteren Stadium mit-

ringerer Wandungsdicke im Holzteile ausgebildet, als im Spätsommer. So entsteht abwechselnd Frühjahrsholz mit vielen und weiten Gefäßen und Tracheiden, und Herbstholz mit vorwiegend solchen Hadrom-Elementen, welche der Festigung dienen und deshalb eine geringere Weite ihres Lumens aufweisen. Aus der Anzahl der Ringe, welche auf dem Querschnitt eines Baumstammes schon mit bloßem Auge als solche erkennbar sind, kann man daher leicht das Alter des Stammes erkennen. Man nennt diese Ringe Jahresringe.




Abb. 161. Teil des Querschnittes durch einen dreijährigen Lindenzweig: *e* Epidermis, *pd* Periderm, *rp* primäre Rinde, *ph* sekundäre Rinde (Phloëm), *c* Cambium, *h* Holzkörper, *j* Grenze der Jahresringe. Schwach vergrößert. (Nach Kny.)

Solche Jahresringe findet man in der Regel nur in solchen Pflanzen, die eine scharf ausgeprägte Vegetationsruhe (Winterruhe oder Trockenruhe) durchmachen. Doch kann es selbst bei diesen vorkommen, daß Früh- und Spätholz kaum verschieden und daher die Jahresringe fast nicht zu unterscheiden sind.

Die Dicke der Jahresringe wechselt sehr stark, einmal nach dem Alter des Baumes oder der betreffenden Zweige, indem die allerersten ziemlich schmal, die folgenden sehr breit werden, um dann mit zunehmendem Alter immer mehr abzunehmen; sodann prägen sich die günstigen oder ungünstigen Lebensbedingungen der einzelnen

Vegetationsperioden sehr deutlich in der größeren oder geringeren Dicke der Jahresringe aus. — In tropischen Hölzern fehlen die Jahresringe meist völlig.

In Pflanzenteilen, welche ein hohes Alter erreichen, also in Baumstämmen, pflegen die älteren Teile des Holz- und Rindenkörpers mit der Zeit an dem Saftverkehr sich nicht mehr zu beteiligen. Man bezeichnet dann die älteren Holzteile, welche nur noch der Festigung dienen und sich meist auch (gewöhnlich infolge Einlagerung harzartiger Stoffe) durch dunklere Färbung auszeichnen, als Kernholz, zum Unterschiede von den jungen, leitungsfähigen Holzelementen, dem Splint.

In einem normal gebauten Stamm unterscheidet man dreierlei Hauptschnittebenen, von denen jede ganz besondere Eigenheiten zeigt:

1. Den Querschnitt, auch Hirnschnitt genannt, der rechtwinklig zur Wachstumsrichtung liegt. Auf ihm zeigen sich die Markstrahlen als radial verlaufende Streifen von größerer oder geringerer Breite, die die meist konzentrischen Jahresringe rechtwinklig durchsetzen;
2. den radialen Längsschnitt, der in der Längsrichtung des Stammes verläuft und das Mark trifft; auf ihm treten die Markstrahlen als mehr oder minder breite, in der Schnittebene liegende Parenchybinden auf;
3. den tangentialen Längsschnitt, der rechtwinklig zum vorigen und parallel zur Längsachse, aber als Tangente zu den Jahresringen oder Zuwachszonen geführt ist und die Markstrahlen so trifft, daß sie als eiförmige oder zweispitzige Gebilde auf ihm erscheinen.

Um ein vollständiges Bild vom Aufbau eines Holzkörpers zu gewinnen, sind stets die drei genannten Schnitte nötig. Handelt es sich allein um den Bau der Markstrahlen, so gibt schon der tangentialen Längsschnitt genügend Auskunft.

Normalerweise sind die Jahresringe ringsum gleich stark, so daß das Dickenwachstum konzentrisch ist. Nicht selten tritt aber an Stämmen und fast regelmäßig an schräg aufwärts oder wagenrecht wachsenden Zweigen eine einseitige Förderung, also ein exzentrisches Wachstum auf. Nimmt die Oberseite stärker zu, so spricht man von Epinastie, wird dagegen die Unterseite kräftiger ausgebildet, von Hyponastie.

Für gewisse Pflanzenfamilien und besonders für holzige Lianen ist eine mehr oder minder tiefgehende Zerklüftung des Holzkörpers charakteristisch, die entweder dadurch hervorgerufen werden kann, daß an gewissen Stellen die Tätigkeit des Cambiums erlischt oder von ihm nur einseitig Rindenelemente gebildet werden, oder daß innerhalb der sekundären Rinde eine Neubildung von Cambium auftritt, das in seiner weiteren Entwicklung neue, von dem ursprünglichen durch Rindengewebe getrennte Holzkörper hervorbringt.

So kommt es z. B. bisweilen vor, daß in einem konzentrisch gebauten Stamm das Cambium nur kurze Zeit tätig ist und in der

Rinde immer von neuem Cambialzonen auftreten (Phytolacca); der Stamm besteht dann zuletzt aus zahlreichen konzentrischen wechselnden Holzteilen und Siebteilen.

Anders als bei den Stammorganen vollzieht sich das Dickenwachstum bei den Wurzelorganen, also beim Vorhandensein radialer Leitbündel (Abb. 148, 158 B). Hier verläuft das Cambium in radial gestellten Linien zwischen den Holzteilen und Siebteilen des Leitbündels (in der Abbildung die drei punktierten Linien zwischen *H* und *S*). Ferner entstehen an den Innenseiten der Siebteile durch Teilung des dort befindlichen Grundgewebes neue Cambiumstreifen, welche nach innen Holzelemente, nach außen Siebelemente bilden. Ihre Ränder treffen zuletzt vor den Holzteilen zusammen und bilden dann einen ununterbrochenen Cambiumring, dessen anfänglich buchtig verlaufende Linie sich durch seine Tätigkeit bald zu einem ringförmigen Verlauf wie bei kollateralen Leitbündeln ausgleicht, so daß stark in die Dicke gewachsene Wurzeln von Stammteilen nur dann zu unterscheiden sind, wenn noch im Zentrum die primären Holzteile vorhanden sind.

#### d) Speichersystem.

Die von der grünen Pflanze durch die Assimilation produzierten Baustoffe finden nur zum Teil sofortige Verwendung, und zwar, wie schon hervorgehoben wurde, an den Orten des Aufbaues, an den Vegetationspunkten des Stengels und der Wurzel. Es findet deshalb, besonders im Hochsommer und Herbst, wo das Wachstum der meisten Pflanzen schon völlig aufhört oder wenigstens sehr eingeschränkt wird, in den verschiedensten Organen eine Speicherung statt. Das typische Speichergewebe dieser Organe zeigt einen ganz charakteristischen Bau: mehr oder weniger kugelige, aber gegeneinander abgeplattete, meist dünnwandige Parenchymzellen, welche kleine oder wenigstens nur recht unbedeutende Interzellularräume besitzen. Das Speichergewebe findet sich vor allem in Wurzeln, Knollen, Zwiebeln, Samen, oft aber auch in Stengeln, selten in Blättern, und führt als Reservestoffe Stärke, Eiweiß, fettes Öl, in manchen Fällen auch Reservecellulose.

Aber nicht nur die Behälter der Pflanze für organische Nährstoffe sind zum Speichersystem zu rechnen, sondern auch die Reservoirs für Wasser, welche wir bei vielen Pflanzen heißer und trockener Standorte, den Steppen- und Wüstenpflanzen, antreffen. Diese eigenartigen, oft fleischigen Gewächse sammeln in mächtigen Speicherorganen während der oft nur kurzen feuchten Jahreszeit Wasser an, welches dann während der Trockenperiode allmählich verbraucht wird. In den Blättern, manchmal auch in den Stengeln zahlreicher derartiger Pflanzen finden wir verhältnismäßig riesige Wassergewebe, welche bei feuchtem Wetter voll gefüllt sind, deren Zellwände jedoch nach größerer oder geringerer Zeit der Dürre allmählich zusammenfallen in dem Maße, wie der wässrige Inhalt aufgebraucht wird. Bei Wasserzutritt

schwellen die Zellen sofort wieder an und die Zellwände führen in dieser Weise blasebalgartige Bewegungen aus.

### e) Durchlüftungssystem.

Der Eintritt der atmosphärischen Luft in den pflanzlichen Organismus vollzieht sich bei höher organisierten Gewächsen, welche mit undurchlässigen Hautschichten versehen sind, durch die Spaltöffnungen und die Lenticellen. Nur Zellen, welche mit umgebendem Wasser oder umgebender Luft in unmittelbarer Berührung stehen, können die zur

Assimilation und Atmung notwendigen Stoffe direkt aufnehmen, während die rings von anderen Zellen lückenlos umgebenen Zellen mehrschichtiger Gewebe auf die Zuführung der Gase durch Luftkanäle (Intercellulargänge) angewiesen sind. Diese durchsetzen den Pflanzenkörper und stehen durch die Spaltöffnungen und Lenticellen mit der Außenatmosphäre in Verbindung. Sie dienen auch dazu, die Verdunstung des Wassers zu bewerkstelligen, welches von der Wurzel aufgestiegen ist und die anorganischen Nährstoffe (die Salze der Erdschicht in gelöstem Zustande) den Orten des

Verbrauchs zum Zwecke der Ernährung, d. h. zur Bildung neuer Baustoffe zugeführt hat.

Die Spaltöffnungen oder Stomata (Abb. 162) sind namentlich an Blättern, und zwar meistens auf ihrer Unterseite (auf der Blattunterseite findet man auf einem Quadratmillimeter durchschnittlich 100 Spaltöffnungen, eine Zahl, die aber manchmal bis auf das Siebenfache steigen kann), aber auch an anderen grünen Teilen der Pflanze in der Epidermis zerstreut. Sie bestehen aus Zellenpaaren, zwischen denen je ein Intercellulargang spaltenförmig endet. Unter jeder Spaltöffnung befindet sich im Blattgewebe ein großer Intercellularraum, die Atemhöhle, wie auf Abb. 162 ersichtlich. Die Zellenpaare, Schließzellen genannt, sind durch ihren eigenartigen, komplizierten Bau befähigt, die zwischen ihnen liegende




Abb. 162. Spaltöffnung von Tradescantia. A im Querschnitt (des Blatts), B von oben gesehen. At Atemhöhle, S Schließzellen, N Nebenzellen, T Tüpfel in der Zellwand.

Öffnung zu erweitern, zu verengern oder ganz zu schließen und dadurch den Austausch der Gase zwischen den Intercellularräumen der Pflanzen und der Atmosphäre je nach Bedarf zu regeln. Es ist festzuhalten, daß im allgemeinen tagsüber die Spaltöffnungen geöffnet sind, wenn die Pflanze Feuchtigkeit genug besitzt, um nicht durch die mit Atmung und Assimilation Hand in Hand gehende Transpiration geschädigt zu werden, daß sich jedoch die Spaltöffnungen allmählich schließen, sobald sich Wassermangel in der Pflanze fühlbar macht, d. h. sobald die Spannung, der Turgor des Protoplasmas in den Zellen, nachläßt.

Die Lenticellen oder Rindenporen ersetzen die Spaltöffnungen an denjenigen Stengelorganen, an welchen Korkbildung stattfindet. Es sind vorgewölbte Partien im Korkgewebe, welche aus lockeren, sogenannten Füllzellen bestehen, durch deren Intercellulargänge die atmosphärische Luft in die Stämme einzudringen vermag. Sie vermitteln den Gasaustausch der inneren Gewebe mit der Atmosphäre sehr wahrscheinlich in der Weise, daß durch sie die Gase in die Markstrahlen gelangen, von denen aus sie sich auf alle lebenden Gewebe des Stammes von innen her zu verteilen imstande sind.

Besonders bei solchen Pflanzen, die in sumpfigem, sauerstoffarmem Wasser oder aber im Salzwasser wachsen (z. B. bei den Mangrovepflanzen an den tropischen Meeresküsten) findet man besondere von den Wurzeln ausgehende, über den Boden oder das Wasser hervorragende, negativ geotropische Organe, die Pneumathoden, die infolge ihres lockeren Baues befähigt sind, reichlich Luft zu den untergetauchten Organen der Gewächse zu leiten.

#### f) Sekretionssystem.

Wie vom Tier, so werden auch von der Pflanze zahlreiche, chemisch sehr verschiedenartige Stoffe aufgenommen oder sogar gebildet, welche nicht vollständig verbraucht werden; die Reststoffe werden späterhin meist nicht weiter ungearbeitet und spielen im Haushalt der Pflanze keine Rolle mehr, sie werden als mehr oder weniger unbrauchbar oder schädlich aus den Leitungsbahnen oder den Reservestoffbehältern entfernt und als Sekrete in besondere Sekretionsorgane abgeschieden.

Es sollen die wichtigsten derselben kurz hier angeführt werden.

**Hydathoden.** Bei zahlreichen Pflanzen kommt es vor, daß Wasser in der Form von Wassertropfen meist aus den Blättern ausgeschieden wird, wenn die Transpiration nur sehr gering, d. h. unter normal ist. Das Wasser tritt hierbei allermeist durch sogen. Wasserspalten aus, d. h. durch Gebilde, die oft ganz das Aussehen von Spaltöffnungen besitzen, sich aber nicht öffnen und schließen können, und die sich meistens an den randständigen Blättzähnen finden, z. B. bei der Kapuzinerkresse oder aber an den Spitzen mancher Blätter, wie bei den Gräsern und Araceen.

**Drüsenhaare.** Ein Drüsenhaar, das sich als Sekretionsorgan der Epidermis bezeichnen läßt, gliedert sich in einen Stielteil und einen oberen sezernierenden, kopfigen Teil, welcher letzterer meistens aus mehreren bis zahlreichen Zellen besteht. Das Sekret bildet sich, wie neuerdings festgestellt wurde, in den äußeren Cellulosewandungen des Haares, wird jedoch durch die Cuticula dieser Wandung festgehalten und sammelt sich häufig in der Form großer Blasen zwischen der Cellulosemembran und der weit abgehobenen Cuticula (z. B. bei den Hopfendrüsen) (vergl. Abb. 145, J—L). Es wird häufig dadurch frei, daß die sehr stark gespannte Cuticula aufplatzt.

**Sekretzellen.** Es sind dies mehr oder weniger rundlich-isodiametrische oder auch häufig schlauchartig langgestreckte Zellen, welche einzeln im Parenchym eingebettet oder zu größeren Gruppen oder




Abb. 163. A Schizogener Sekretbehälter aus der Wurzel von Arnica, B Lysigener Sekretbehälter aus dem Pomeranzenblatt. Stark vergrößert.

Zellenzügen vereinigt sind. Es findet sich in ihnen Harz, ätherisches Öl, Schleim oder Gerbstoff.

**Sekretbehälter.** Man macht gewöhnlich einen Unterschied zwischen schizogenen (= durch Auseinanderweichen entstandenen) und lysigenen (= durch Auflösung entstandenen) Sekretbehältern. Erstere bilden sich in folgender Weise: In jungen Stadien findet man an der Stelle, welche später durch einen Sekretbehälter eingenommen wird, auf dem Querschnitt eine einzige plasmareiche Zelle, welche sich bald kreuzweise in vier oder in sechs Zellen spaltet. Diese bleiben sehr inhaltsreich und zartwandig und weichen in der Mitte auseinander, so daß ein anfangs nur enger Zwischenzellraum entsteht. Die zartwandigen Zellen (Epithelzellen) teilen sich darauf noch lebhaft, die Lücke vergrößert sich und verlängert sich oft nach oben im wachsenden Organ, so daß sie allmählich zu einem mehr oder weniger weiten Behälter oder einem sich langhin erstreckenden Kanal wird. In diesen wird sodann von den Epithelzellen Sekret abgeschieden (Abb. 163 A).

Die lysigenen Behälter entstehen in etwas komplizierterer Weise. In jungen Zuständen findet man an bestimmten Stellen Nester von zartwandigen und reichlich Protoplasma führenden Zellen. Die Wände dieser Zellen fangen nun plötzlich an sich aufzulösen und wandeln sich wie der Zellinhalt zu einem Sekret um. Später werden noch mehr Zellen in den Auflösungsprozeß hineingezogen, wodurch die Sekretlücke sich immer mehr vergrößert und reichlich mit Inhalt erfüllt wird (Abb. 163 B).

Sehr häufig kommt es vor, daß typisch schizogene Sekretbehälter sich nachträglich lysigen weiterbilden. Man sieht in diesem Fall, daß die anfangs normal ausgebildeten und einen secernierenden Kranz um den Behälter bildenden Epithelzellen allmählich aufgelöst




Abb. 164. Milchsafschläuche im Längsschnitt; A gegliedert und anastomosierend aus der Schwarzwurzel, B ungegliedert von einer Euphorbia mit eigentümlich geformten Stärkekörnern. Stark vergrößert.

werden, ja daß sogar auch weitere den Gang umgebende parenchymatische Zellen bald in den Auflösungsprozeß hineingezogen werden. Es ist in einem solchen Zustand nicht mehr festzustellen, daß der Behälter ursprünglich schizogen entstanden war, und man bezeichnet einen solchen gewöhnlich als schizo-lysigen.

Es sei noch erwähnt, daß man in neuerer Zeit immer mehr der Ansicht zuneigt, es gäbe von Anfang an lysigene Behälter überhaupt nicht, sondern mehr oder weniger alle derartige Gebilde seien, wenn auch nur sehr kurze Zeit, schizogener Natur, worauf dann die lysigene Weiterbildung früher oder später — in manchen Fällen sehr frühzeitig — eintrete.

**Milchsafschläuche oder -Röhren.** Die Milchsafschläuche können auf zwei ganz verschiedenartige Weisen entstanden sein. Entweder bilden sie sich ganz so wie die Gefäße, d. h. in geraden oder stark verzweigten Reihen von übereinander liegenden Zellen werden die

Querwände aufgelöst, worauf mehr oder weniger lange Röhren (gegliederte [= aus einzelnen Gliedern entstandene] Milchsaftschläuche) entstehen; oder aber sie gehen aus dem fortgesetzten Wachstum und der Verzweigung von einzelnen, schon im jungen Keimling enthaltenen Zellen hervor, welche pilzfadenähnlich intercellular die ganze, allmählich heranwachsende Pflanze durchziehen; man bezeichnet diese letzteren als ungegliederte Milchsaftschläuche (Abb. 164).

Die Milchsaftschläuche besitzen einen sehr dünnen Protoplasmaschlauch und zahlreiche Kerne. Ihre Wandung ist meist nur schwach, kann aber auch eine ansehnliche Dicke erreichen. Der Milchsaft, weiß, gelb bis orangerot gefärbt, stellt eine Emulsion dar, d. h. eine wässrige Flüssigkeit, in der massenhaft Körnchen (Stärke) und Tröpfchen (Fett, Kautschuk, Guttapercha, Harz, Alkaloide) suspendiert sind. Gelegentlich trifft man im Milchsaft auch Zucker und Eiweiß vertreten, und es ist wohl kaum zweifelhaft, daß derartige für die Pflanze so außerordentlich wertvolle Stoffe später wieder in den Kreislauf ihrer Lebensprozesse einbezogen werden. Sicher besitzt jedoch der Milchsaft für die ihn führenden Gewächse die Bedeutung, daß er als Schutzmittel dient. Wird nämlich eine solche Pflanze verletzt, so tritt der unter starkem Druck in dem Individuum gehaltene Milchsaft rasch in großen Mengen aus und bedeckt, an der Luft schnell erhärtend, die Wundfläche mit festem Verschuß.

---

# Einteilung der Pflanzen. Systematik.

## Die Verwandtschaft der Pflanzen.

Eine einzelne Pflanze nennt man ein Individuum, d. h. ein Wesen, welches selbständig und ohne Beihilfe anderer, gleichgestalteter Wesen lebt und leben kann. Gleichgestaltete Individuen, welche durch ihre Abstammung miteinander verwandt sind, d. h. gemeinsame Nachkommen eines Urahns oder eines Urahnepaares sind, gehören ein und derselben Art (Spezies) an. Um beurteilen zu können, welche Individuen gleichgestaltet sind, werden die durch unsere Sinne wahrnehmbaren Eigenschaften, insbesondere die Form und der Aufbau des Pflanzenkörpers berücksichtigt. Jede Art oder Spezies hat ihre besonderen Merkmale oder Kennzeichen, welche erblich sind und in der Nachkommenschaft nahezu unverändert hervortreten.

Falls jedoch durch Standort, Klima, Bodenbeschaffenheit oder gärtnerische Kunst Verschiedenheiten erzeugt werden, welche, ob schon sie (in letzterem Falle besonders) sehr augenfällig sein können, dennoch das Wesen der Pflanze nicht ändern, so nennt man diese Varietäten. Blumenkohl, Kopfkohl, Blätterkohl und Kohlrabi sind z. B. Varietäten der Art *Brassica oleracea*.

Während die Zahl der Varietäten bei den Kulturgewächsen eine ungemein große ist, wird die Zahl der auf der ganzen Erde vorhandenen Arten auf zwei bis dreimal Hunderttausend geschätzt. In Deutschland allein mögen mit Einschluß der eingebürgerten Fremdlinge etwa 3000 Phanerogamen-Arten vorkommen. Die Zahl der Kryptogamen-Arten ist noch ganz erheblich größer.

Die Arten selbst zeigen untereinander wiederum eine größere oder geringere Ähnlichkeit. Einige weichen nur in einem, andere in mehreren, die meisten aber in zahlreichen Merkmalen voneinander ab. Von dieser größeren oder geringeren Ähnlichkeit schließt man auf einen näheren oder entfernteren Grad der Verwandtschaft und vereinigt näher verwandte Arten zu einer Gattung

(Genus). Die Zahl der bekannten Phanerogamen-Gattungen schätzt man auf über 10,000.

Jeder Pflanze hat man einen aus zwei Worten gebildeten, lateinischen Namen beigelegt, und zwar ist die Gattung in demselben durch ein Hauptwort vertreten, z. B. *Aconitum*, während die Art durch ein Eigenschaftswort, z. B. *ferox*, oder durch ein anderes wie ein Adjektivum gebrauchtes Wort, z. B. *napellus*, bezeichnet wird. Man nennt dies die binäre Nomenklatur, die durch Linné eingeführt wurde. Hinter dem Pflanzennamen pflegt man den Namen desjenigen Botanikers anzuführen (Autornamen), welcher der Pflanze den betreffenden Namen gegeben hat, weil manche Arten von verschiedenen Forschern verschieden benannt worden sind.

Die wesentlichste Eigenschaft der Art ist die Beibehaltung ihrer spezifischen Merkmale bei der Fortpflanzung. Die Fortpflanzung wird von den Pflanzen in der verschiedensten Art und Weise ausgeführt, und es herrscht dabei eine solche Mannigfaltigkeit, daß jede Familie, jede Gattung, ja oft die einzelne Art hierfür besonders ausgeprägte Eigentümlichkeiten besitzt, namentlich wenn man die Gruppe der Kryptogamen in gleicher Linie mit den Phanerogamen in Betracht zieht. Auf diese Abweichungen in den Fortpflanzungsorganen und deren Funktionen ist die ganze Systematik so wesentlich begründet, daß sie in der Hauptsache auf eine spezielle Darstellung der Fortpflanzungsformen und -organe im Pflanzenreich hinausläuft.

Aus den überaus vielgestaltigen Formen der Fortpflanzungsart treten zwei verschiedene Wege scharf getrennt hervor: die ungeschlechtliche oder vegetative Fortpflanzung (welche man besser als Vermehrung bezeichnet) und die geschlechtliche oder sexuelle Fortpflanzung.

Die vegetative, ungeschlechtliche Vermehrung besteht in der Bildung von Zellen oder Zellkörpern (Stecklinge, Ableger), welche nach ihrer Lostrennung von der Mutterpflanze ohne weiteres, entweder sofort oder nach einer gewissen Ruhezeit, zu neuen, selbständigen Einzelwesen derselben Art heranwachsen.

Bei der sexuellen oder geschlechtlichen Fortpflanzung hingegen werden zweierlei Fortpflanzungszellen erzeugt, von denen jede zwar die Eigentümlichkeiten ihrer Art in sich trägt, welche jedoch nicht die Fähigkeit besitzen, zu Nachkommen ihrer Art auszuwachsen, bevor ihnen Gelegenheit geboten ist, miteinander zu verschmelzen. Man unterscheidet männliche und weibliche Zellen. Erst wenn die weibliche Zelle den Inhalt der männlichen Zelle in sich aufgenommen hat und ihr Kern mit dem männlichen vollständig verschmolzen ist, wird sie entwicklungsfähig und beginnt ein intensives Wachstum. Neue Spielarten und Varietäten entstehen fast nur auf sexuellem Wege, während vegetativ erzeugte neue Individuen meistens die Merkmale ihrer Mutterpflanze streng beibehalten.

Die ungeschlechtliche Vermehrung geschieht bei Phanerogamen meist neben der geschlechtlichen Fortpflanzung, und zwar spontan durch Brutknospen, Brutzwiebeln, Knollen oder Ausläufer, künstlich

durch Ableger, Senker oder Stecklinge, sowie durch Pfropfen, Okulieren und Kopulieren.

Auf der speziellen Charakteristik der Fortpflanzungs-Arten, -Formen und -Organe begründet sich, wie schon erwähnt, die Systematik. Sie gruppiert die Pflanzen nach übereinstimmenden Merkmalen und stellt jene nebeneinander oder auseinander, indem sie den Wert und die Bedeutung ihrer Ähnlichkeiten und Verschiedenheiten abschätzt.

Ein in so geschilderter Weise zu stande gekommenes System nennt man Natürliches System, und zwar deshalb, weil es auf der natürlichen Verwandtschaft der Gewächse untereinander beruht, — ein Begriff, welcher durch die von Lamarck aufgestellte und von Charles Darwin ausführlicher begründete Lehre, die sogenannte Descendenztheorie oder Selektionstheorie, begründet und näher erläutert wurde. Da diese Lehre das Prinzip vertritt, daß die Ureltern eines jeden Individuums nicht diesem gleich, sondern niedriger organisiert gewesen sind, so stellt ein natürliches System gleichsam den Stammbaum des gesamten Pflanzenreiches dar. Ein vollendetes natürliches System würde aber aus demselben Grunde nur dann aufzustellen möglich sein, wenn ihr Verfasser die Entwicklungsgeschichte sämtlicher Pflanzen kannte, selbst derjenigen, welche im Laufe der Jahrtausende bereits aufgehört haben zu existieren. Alle vorhandenen natürlichen Systeme aber müssen unzulänglich sein und bleiben, weil die durch Mangel der stammesgeschichtlichen Erkenntnis entstehenden Lücken durch Spekulationen ausgefüllt werden müssen. Hieraus erklärt sich die Verschiedenheit der einzelnen Systeme verschiedener Verfasser. In seinen Hauptumrissen können wir den Entwicklungsgang des Pflanzenreiches gleichwohl als aufgeklärt betrachten, und deshalb stimmen auch die Hauptabteilungen der natürlichen Systeme — aber nur diese — im allgemeinen überein.

### Künstliche Pflanzensysteme.

Als man begann, die Pflanzen zu klassifizieren, glaubte man sie unbedingt nach einzelnen willkürlich gewählten, an allen Pflanzen leicht erkennbaren Merkmalen ordnen zu müssen und schuf daher künstliche Systeme, welche die Beschaffenheit der Wurzeln, der Blätter, der Blüten oder aber der Früchte zur Grundlage hatten. Als Hauptzweck bei Aufstellung dieser Systeme galt das praktische Ziel, die einzelnen Pflanzen mit Hilfe der Merkmale, nach denen sie gruppiert sind, möglichst leicht auffinden und bestimmen zu können. Unter ihnen allen hat das im Jahre 1735 von Carl von Linné aufgestellte System nicht nur große Bedeutung erlangt, sondern eine geraume Zeit hindurch sogar die Botanik allein beherrscht. Es hat die Beschaffenheit der Befruchtungsorgane oder Geschlechtsorgane der Pflanzen zum Ausgangspunkte und heißt deshalb auch Geschlechtssystem oder Sexualsystem.

## Übersicht des Linnéschen Systems.

### A. Die Klassen.

a. Pflanzen mit Staubgefäßen und Pistillen.		
b. Staubgefäße und Pistille in jeder Blüte vorhanden.		
c. Staubgefäße und Pistille getrennt.		
d. Staubgefäße nicht miteinander verwachsen.		
e. Die Länge der Staubgefäße bleibt unberücksichtigt.		
f. Die Zahl der Staubgefäße bildet allein das Unterscheidungsmerkmal.		
g. 1 Staubgefäß . . . . .	I. Kl. Einmännige . . . . .	Monandria.
g. 2 Staubgefäße . . . . .	II. Kl. Zweimännige . . . . .	Diandria.
g. 3 " . . . . .	III. Kl. Dreimännige . . . . .	Triandria.
g. 4 " . . . . .	IV. Kl. Viermännige . . . . .	Tetrandria.
g. 5 " . . . . .	V. Kl. Fünfmännige . . . . .	Pentandria.
g. 6 " . . . . .	VI. Kl. Sechsmännige . . . . .	Hexandria.
g. 7 " . . . . .	VII. Kl. Siebenmännige . . . . .	Heptandria.
g. 8 " . . . . .	VIII. Kl. Achtmännige . . . . .	Octandria.
g. 9 " . . . . .	IX. Kl. Neunmännige . . . . .	Enneandria.
g. 10 " . . . . .	X. Kl. Zehnmännige . . . . .	Decandria.
g. 12 bis 18 Staubgefäße . . . . .	XI. Kl. Zwölfmännige . . . . .	Dodecandria.
f. Zahl und Befestigungsstelle der Staubgefäße bilden das Unterscheidungsmerkmal.		
g. 20 oder mehr Staubgefäße oberhalb des Fruchtknotens stehend . . . . .	XII. Kl. Zwanzigmännige . . . . .	Icosandria.
g. 20 oder mehr Staubgefäße unterhalb des Fruchtknotens stehend . . . . .	XIII. Kl. Vielmännige . . . . .	Polyandria.
e. Die Länge der Staubgefäße bildet das Unterscheidungsmerkmal.		
f. Von den Staubgefäßen sind zwei länger und zwei kürzer (meist Lippenblütler) . . . . .	XIV. Kl. Zweimüchtige . . . . .	Didynamia.
f. Von den Staubgefäßen sind vier länger und zwei kürzer (Frucht eine Schote oder Schöthe) . . . . .	XV. Kl. Viermüchtige . . . . .	Tetradynamia.
d. Staubgefäße miteinander verwachsen.		
e. Nur die Staubfäden sind verwachsen; die Staubbeutel sind frei.		
f. Die Fäden bilden ein Bündel . . . . .	XVI. Kl. Einbrüderige . . . . .	Monadelphia.
f. Die Fäden bilden zwei Bündel . . . . .	XVII. Kl. Zweibrüderige . . . . .	Diadelphia.
f. Die Fäden bilden drei oder mehrere Bündel . . . . .	XVIII. Kl. Vielbrüderige . . . . .	Polyadelphia.
e. Nur die Staubbeutel sind verwachsen; die Staubfäden sind frei . . . . .	XIX. Kl. Röhrenbeutelige . . . . .	Syngenesia.
c. Staubgefäße dem Pistill angewachsen . . . . .	XX. Kl. Weibermännige . . . . .	Gynandria.
b. Nur Staubgefäße oder nur Pistille in jeder Blüte vorhanden		
c. Männliche und weibliche Blüten auf derselben Pflanze . . . . .	XXI. Kl. Einhäusige . . . . .	Monoecia.
c. Entweder nur männliche oder nur weibliche Blüten auf je einer Pflanze . . . . .	XXII. Kl. Zweihäusige . . . . .	Dioecia.
d. Daneben keine Zwitterblüten vorkommend . . . . .	XXIII. Kl. Vielehige . . . . .	Polygamia.
d. Daneben Zwitterblüten vorkommend.		
a. Pflanzen ohne Staubgefäße und Pistille, zuweilen ohne Höhenwachstum, und dann ohne Blätter und Stengel . . . . .	XXIV. Kl. Verborgtblütige . . . . .	Kryptogamia.

### B. Die Ordnungen.

Von der I. bis zur XIII. Klasse werden die Ordnungen nach der Anzahl der Fruchtknoten, oder, wenn ein einzelner Fruchtknoten vorhanden ist, nach der Anzahl der Griffel oder der Narben genannt. Die Ordnung Monogynia hat also einen Fruchtknoten mit einem Griffel oder einer Narbe; die Ordnung Digynia hat zwei Fruchtknoten oder einen Fruchtknoten mit zwei Griffeln bezw. mit zwei Narben. Die zwölf Ordnungen der I. bis XIII. Klasse heißen:

Einweibige . . . . .	Monogynia,
Zweiweibige . . . . .	Digynia,
Dreiweibige . . . . .	Trigynia,
Vierweibige . . . . .	Tetragynia,
Fünfweibige . . . . .	Pentagynia,
Sechsweibige . . . . .	Hexagynia,
Siebenweibige . . . . .	Heptagynia,
Achtweibige . . . . .	Octogynia,
Neunweibige . . . . .	Enneagynia,
Zehnweibige . . . . .	Decagynia,
Zwölfweibige . . . . .	Dodecagynia,
Vielweibige . . . . .	Polygynia.

Die XIV. Klasse hat zwei Ordnungen: Gymnospermia mit vier sogen. nackten Samen im Kelch (in Wirklichkeit ist die Frucht tief vierspaltig, und der Griffel steht zwischen den vier Fruchtheilen) und Angiospermia mit meist vielen, in eine Kapsel eingeschlossenen Samen.

Die XV. Klasse hat ebenfalls zwei Ordnungen: Siliculosa, bei denen die Frucht ein Schötchen, d. h. höchstens wenig länger als breit ist, und Siliquosa, bei denen die Frucht eine Schote, d. h. bedeutend länger als breit ist.

Bei den Klassen XVI bis XXIII mit Ausnahme der XIX. Klasse werden die Ordnungen nach der Zahl der Staubblätter gebildet und benannt, also Monandria, Diandria etc.

Die XIX. Klasse theilte Linné wie folgt in fünf Ordnungen ein: Die Einzelblüten besitzen eine gemeinsame Hülle.

↑ Sämtliche Blüten sind Zwitterblüten . . . . .	1. Ordnung Aequalis.
↑ Nur die Scheibenblüten sind Zwitterblüten, die	
Randblüten sind weiblich und zwar:	
Alle Blüten sind fruchtbar . . . . .	2. Ordnung Superflua.
Nur die Zwitterblüten sind fruchtbar . . . . .	3. Ordnung Frustranea.
Nur die weiblichen Blüten sind fruchtbar . . . . .	4. Ordnung Necessaria.
↓ Jede der Einzelblüten besitzt eine besondere Hülle	5. Ordnung Segregata.

Während die Namen Aequalis und Segregata sich von selbst erklären, diene zur Erklärung für die übrigen, daß in der 2. Ordnung die Randblüten überflüssig (superflua) erscheinen, weil die zwitterigen Blüten der Scheibe selbst fruchtbar sind; in der 3. Ordnung sind die Randblüten, da sie noch dazu unfruchtbar sind, sogar vergebens (frustranea); in der 4. Ordnung hingegen sind die Randblüten, da die zwitterigen Scheibenblüten nicht fruchtbar sind, notwendig (necessaria).

Die XXIV. Klasse theilte Linné nach der natürlichen Verwandtschaft in Filices, Musci, Algae, Lichenes und Fungi ein.

Der schätzbarste Vorzug dieser Einteilung ist der, daß sie, weil auf die einfachsten Begriffe begründet, für jeden Anfänger ohne größere botanische Vorkenntnisse faßlich ist. Ein Nachteil aber ist z. B. darin zu erblicken, daß die Geschlechtsorgane einzelner Arten zuweilen Unregelmäßigkeiten oder Abweichungen aufweisen und diese Arten dann in ganz andere Linnésche Klassen gestellt werden müssen als ihre allernächsten Verwandten.

Andererseits vereinigt das Linnésche System allerdings schon die wichtigsten und größten Familien der natürlichen Systeme fast vollzählig in bestimmten Klassen, so die Gramineen in Klasse III, 2; die Umbelliferen in Klasse V, 2; die meisten Labiaten in Klasse XIV, 1; die Cruciferen in Klasse XV, 1 und 2; die Papilionatae in Klasse XVII, 3; die Kompositen in Klasse XIX, 1 bis 5 und die Orchidaceen

in Klasse XX. Diese Familien allein umfassen zusammen fast die Hälfte aller Phanerogamen.

Das Linnésche System zerfällt in Klassen und Ordnungen. Die Klassenmerkmale beruhen im wesentlichen auf der Beschaffenheit der Staubgefäße, also der männlichen Befruchtungsorgane, während für die Bildung und Benennung der Ordnungen entweder die Zahl der Griffel, oder der Bau der Frucht, oder Zahl und Verwachsung der Staubgefäße, oder Geschlecht und Fruchtbarkeit der Einzelblüten (in der XIX. Klasse) usw. maßgebend sind.

Übersicht des Linnéschen Systems siehe Seite 136 und 137.

### Natürliche Pflanzensysteme.

Der Begründer der Einteilung der Pflanzen nach ihrer natürlichen Zusammengehörigkeit ist Antoine Laurent de Jussieu. Dieser stellte im Jahre 1789 ein natürliches System auf, welches jedoch im Anklang an das ein halbes Jahrhundert vorher ins Leben gerufene Linnésche System noch vieles Künstliche an sich trug und vornehmlich auf der Zahl der Keimblätter, der gegenseitigen Stellung der Blütenteile und der Beschaffenheit der Blumenkrone aufgebaut war. In dem System hingegen, welches im Jahre 1813 Auguste Pyrame de Candolle aufstellte, wurde der Versuch gemacht, den inneren Bau der Pflanzen zur Charakteristik der Hauptabteilungen zu verwenden, während in zweiter Linie dazu die Blütenhülle diente. Das im Jahre 1836 von Stephan Endlicher angegebene System ist auf den Wachstumsverschiedenheiten der Pflanzen begründet, und erst mit Adolph Brongniarts Einteilung im Jahre 1843 begann man der für die ganze Entwicklungsgeschichte des Pflanzenreiches so hochwichtigen Gruppe der Nacktsamigen Gewächse, welche das verbindende Glied zwischen den sogenannten Kryptogamen und den Phanerogamen bildet, die gebührende Stellung im System zu geben. Seitdem sind hervorragende Pflanzensysteme von Alexander Braun 1864, von A. W. Eichler 1883 und von Adolf Engler 1886 aufgestellt worden.

Den Systemen von Braun, Eichler und Engler liegt im Grundprinzip wiederum die Einteilung Brongniarts zugrunde, während die Grundzüge der älteren Systeme durch den Fortschritt der morphologischen, anatomischen und physiologischen Forschung sich als auf mehr oder weniger irrtümlichen Voraussetzungen begründet erwiesen haben.

#### Die Grundzüge einzelner natürlicher Systeme.

##### Jussieus System.

**Acotyledones**, Pflanzen ohne Keimblätter.

**Monocotyledones**, Pflanzen mit einem Keimblatt.

**Dicotyledones**, Pflanzen mit zwei Keimblättern.

**Apetalae**, Blumenkronlose.

**Monopetalae** mit verwachsenblättriger Blumenkrone.

**Polypetalae** mit getrenntblättriger Blumenkrone.

**Diclinales irregulares** mit getrenntgeschlechtlichen, meist nackten, d. h. kronenlosen Blüten.

### Brongniarts System.

**Kryptogamae**, Pflanzen ohne Blüten.

**Amphigenae**, Pflanzen ohne Unterschied zwischen Blatt und Stengel.

**Akrogenae**, Pflanzen mit Stengel und Blättern.

**Phanerogamae**, Pflanzen mit Blüten.

**Monocotyledoneae**, einkeimblättrige Pflanzen.

↑ **Albuminosae** mit Eiweißgewebe in den Samen.

↓ **Exalbuminosae** mit eiweißfreien Samen.

**Dicotyledoneae**, Mehrkeimblättrige Pflanzen.

↑ **Angiospermae**, Bedecktsamige, mit geschlossenem Fruchtknoten.

↑ **Gamopetalae** mit verwachsenen Kronblättern.

↓ **Dialypetalae** mit freien Kronblättern oder ohne solche.

↓ **Gymnospermae**, Nacktsamige, mit offenem Fruchtknoten.

### Englers System<sup>1)</sup>.

- I. Abteilung. **Schizophyta**. Spaltpflanzen.  
**Schizomyces**, Spaltpilze oder Bakterien; **Schizophyceae**, Spaltalgen.
- II. Abteilung. **Phytosarcodina**, **Myxothallophyta**, **Myxomycetes**.  
 Schleimpilze.  
**Acrasiales**, **Plasmodiophorales**, **Myxogasteres**.
- III. Abteilung. **Flagellatae**. Geißeltragende, pilz- oder algenähnliche Körper.
- IV. Abteilung. **Dinoflagellatae**. Geißeltragende, algenähnliche Körper.
- V. Abteilung. **Bacillariophyta**. Kieselalgen.
- VI. Abteilung. **Zygophyceae**. Chlorophyllgrüne Algen, Fortpflanzung durch Kopulation.
- VII. Abteilung. **Chlorophyceae**. Chlorophyllgrüne Algen, Fortpflanzung durch schwärmende Gameten oder durch Spermatozoiden und Oosphären.
- VIII. Abteilung. **Charophyta**. Chlorophyllgrüne Algen von eigenartigem, hochentwickeltem Bau. Fortpflanzung durch Spermatozoiden und Oosphären.
- IX. Abteilung. **Phaeophyceae**. Braunalgen. Fortpflanzung durch schwärmende Gameten oder durch Spermatozoiden und Oosphären.
- X. Abteilung. **Rhodophyceae**. Rosenrote bis violette Algen. Fortpflanzung durch unbewegliche Spermation und Eizelle.
- XI. Abteilung. **Eumycetes**. Echte Pilze. Chlorophyllose Saprophyten und Parasiten.
- XII. Abteilung. **Embryophyta asiphonogama**. (Archegoniaten.) Embryopflanzen mit Befruchtung durch schwärmende Gameten.  
**Bryophyta**, Moospflanzen; **Pteridophyta**, Farnpflanzen.
- XIII. Abteilung. **Embryophyta siphonogama**. Embryopflanzen mit Pollenbefruchtung. (Phanerogamen).

<sup>1)</sup> Nach der 7. Aufl. von Engler-Gilg „Syllabus der Pflanzenfamilien“ (Berlin 1912).

**Gymnospermae**, Nacktsamige: Cordaitales, Bennettitales, Cycadales, Ginkgoales, Coniferae, Gnetales.

**Angiospermae**, Bedecktsamige.

**Monocotyledoneae**, Einkeimblättrige.

- ↑ **Pandanales** Fam.: Typhaceae, Pandanaceae, Sparganiaceae.
- Helobiae** Fam.: Potamogetonaceae, Najadaceae, Aponogetonaceae, Scheuchzeriaceae, Alismataceae, Butomaceae, Hydrocharitaceae.
- Triuridales** Fam.: Triuridaceae.
- Glumiflorae** Fam.: Gramineae, Cyperaceae.
- Principes** Fam.: Palmae.
- Synanthae** Fam.: Cyclanthaceae.
- Spathiflorae** Fam.: Araceae, Lemnaceae.
- Farinosae** Fam.: Flagellariaceae, Restionaceae, Centrolepidaceae, Mayacaceae, Xyridaceae, Eriocaulaceae, Thurniaceae, Rapateaceae, Bromeliaceae, Commelinaceae, Pontederiaceae, Cyanastraceae, Philydraceae.
- Liliiflorae** Fam.: Juncaceae, Stemonaceae, Liliaceae, Haemodoraceae, Amaryllidaceae, Velloziaceae, Taccaceae, Dioscoreaceae, Iridaceae.
- Scitamineae** Fam.: Musaceae, Zingiberaceae, Cannaceae, Marantaceae.
- ↓ **Microspermae** Fam.: Burmanniaceae, Orchidaceae.

**Dicotyledoneae**, Zweikeimblättrige.

**Archichlamydeae**, mit Blütenumhüllung auf niederer Stufe.

- ↑ **Verticillatae** Fam.: Casuarinaceae.
- Piperales** Fam.: Saururaceae, Piperaceae, Chloranthaceae, Lacistemaceae.
- Salicales** Fam.: Salicaceae.
- Garryales** Fam.: Garryaceae.
- Myricales** Fam.: Myricaceae.
- Balanopsidales** Fam.: Balanopsidaceae.
- Leitneriales** Fam.: Leitneriaceae.
- Juglandales** Fam.: Juglandaceae.
- Batidales** Fam.: Batidaceae.
- Julianiales** Fam.: Julianiaceae.
- Fagales** Fam.: Betulaceae, Fagaceae.
- Urticales** Fam.: Ulmaceae, Moraceae, Urticaceae.
- Proteales** Fam.: Proteaceae.
- Santalales** Fam.: Myzodendraceae, Santalaceae, Opiliaceae, Grubbiaceae, Olacaceae, Octoknemataceae, Loranthaceae, Balanophoraceae.
- Aristolochiales** Fam.: Aristolochiaceae, Rafflesiaceae, Hydnoraceae.
- Polygonales** Fam.: Polygonaceae.
- Centrospermae** Fam.: Chenopodiaceae, Amarantaceae, Nyctaginaceae, Cyrorambaceae, Phytolaccaceae, Aizoaceae, Portulacaceae, Basellaceae, Caryophyllaceae.
- Ranales** Fam.: Nymphaeaceae, Ceratophyllaceae, Trochodendraceae, Cericidiphyllaceae, Ranunculaceae, Lardizabalaceae, Berberidaceae, Menispermaceae, Magnoliaceae, Calycanthaceae, Lactoridaceae, Anonaceae, Eupomatiaceae, Myristicaceae, Gomortegaceae, Monimiaceae, Lauraceae, Hernandiaceae.
- Rhoeadales** Fam.: Papaveraceae, Capparidaceae, Cruciferae, Tovariaceae, Resedaceae, Moringaceae.
- Sarraconiales** Fam.: Sarraconiaceae, Nepenthaceae, Droseraceae.
- Rosales** Fam.: Podostemonaceae, Hydrostachyaceae, Crassulaceae, Cephalotaceae, Saxifragaceae, Pittosporaceae, Brunelliaceae, Cunoniaceae, Myrothamnaceae, Bruniaceae, Hamamelidaceae, Encemmiaceae, Platanaceae, Crossosomataceae, Rosaceae, Connaraceae, Leguminosae.
- Pandales** Fam.: Pandaceae.
- Geraniales** Fam.: Geraniaceae, Oxalidaceae, Tropaeolaceae, Linaceae, Humiriaceae, Erythroxylaceae, Zygophyllaceae, Onoraceae, Rutaceae, Simarubaceae, Bursaraceae, Meliaceae, Malpighiaceae, Trigoniaceae, Vochysiaceae, Tremandraceae, Polygalaceae, Dichapetalaceae, Euphorbiaceae, Callitrichaceae.
- Sapindales** Fam.: Buxaceae, Empetraceae, Coriariaceae, Limnanthaceae, Anacardiaceae, Cyrillaceae, Pentaphylacaceae, Corynocarpaceae, Aquifoliaceae, Celastraceae, Hippocrateaceae, Salvadoraceae, Stachnaceae, Staphyleaceae, Icacinaceae, Aceraceae, Hippocastanaceae, Sapindaceae, Sabiaceae, Melianthaceae, Balsaminaceae.
- Rhamnales** Fam.: Rhamnaceae, Vitaceae.
- Malvales** Fam.: Elaeocarpaceae, Chaenaceae, Gonystilaceae, Tiliaceae, Malvaceae, Bombacaceae, Sterculiaceae, Seytopetalaceae.
- Parietales** Fam.: Dilleniaceae, Eucryphiaceae, Ochnaceae, Caryocaraceae, Marcgraviaceae, Quinaceae, Theaceae, Guttiferae, Dipterocarpaceae, Elatinaceae, Frankeniaceae, Tamaricaceae, Fouquieriaceae, Cistaceae, Bixaceae, Cochlospermaceae, Winteranaceae, Violaceae, Flacourtiaceae, Stachyuraceae, Turneraceae, Malesherbiaceae, Passifloraceae, Achariaceae, Caricaceae, Loasaceae, Datisceae, Begoniaceae, Ancistrocladaceae.

- Opuntiales. Fam.: Cactaceae.  
 Myrtiliflorae. Fam.: Geissolomataceae. Panaceaceae. Oliniaceae. Thymelaeaceae.  
 Elaeagnaceae. Lythraceae. Sonneratiaceae. Punicaceae. Lecythidaceae. Rhizo-  
 phoraceae. Nyssaceae. Alangiaceae. Combretaceae. Myrtaceae. Melastomata-  
 ceae. Oenotheraceae. Haloragaceae. Hippuridaceae. Cynomoriaceae.  
 Umbelliflorae. Fam.: Araliaceae. Umbelliferae. Cornaceae.

**Metachlamydeae oder Sympetalae, mit Blütenumhüllung auf vor-  
geschrittener Stufe.**

- Ericales. Fam.: Clethraceae. Pirolaceae. Lennoaceae. Ericaceae. Epacridaceae.  
 Diapensiaceae.  
 Primulales. Fam.: Theophrastaceae. Myrsinaceae. Primulaceae.  
 Plumbaginales. Fam.: Plumbaginaceae.  
 Ebenales. Fam.: Sapotaceae. Ebenaceae. Symplocaceae. Styracaceae.  
 Contortae. Fam.: Oleaceae. Loganiaceae. Gentianaceae. Apocynaceae. As-  
 clepiadaceae.  
 Tubiflorae. Fam.: Convolvulaceae. Polemoniaceae. Hydrophyllaceae. Borra-  
 ginaceae. Verbenaceae. Labiatae. Nolanaceae. Solanaceae. Scrophulariaceae.  
 Bignoniaceae. Pedaliaceae. Martyniaceae. Orobanchaceae. Gesneriaceae.  
 Columelliaceae. Lentibulariaceae. Globulariaceae. Acanthaceae. Myo-  
 poraceae. Phrymaceae.  
 Plantaginales. Fam.: Plantaginaceae.  
 Rubiales. Fam.: Rubiaceae. Caprifoliaceae. Adoxaceae. Valerianaceae. Dip-  
 sacaceae.  
 Cucurbitales. Fam.: Cucurbitaceae.  
 Campanulatae. Fam.: Campanulaceae. Goodeniaceae. Brunoniaceae. Styli-  
 diaceae. Calyceraceae. Compositae.

Wenn es sich darum handelt, welchem System wir uns im folgenden anschließen haben werden, so kann nach dem heutigen Stande der Wissenschaft nur das Englersche System in Frage kommen, welches im besten Sinne des Wortes als ein phylogenetisches System bezeichnet werden darf und, alle Resultate der neuesten Forschungen berücksichtigend, nach bestimmten, fest formulierten Grundsätzen von den einfachsten bis zu den kompliziertesten Gestalten des Pflanzenreiches fortschreitet.

## Übersicht über die wichtigsten Familien, Gattungen und Arten des Pflanzenreiches nach dem Englerschen System.

Noch vor verhältnismäßig kurzer Zeit glaubte man, daß die Gliederung des Gewächsreiches in zwei große Gruppen, die Kryptogamen und die Phanerogamen, die einzig zutreffende wäre, wie wir dies auch noch im Eichlerschen System durchgeführt finden. Die Bezeichnung Kryptogamen und Phanerogamen für die zwei großen Gruppen des Pflanzenreiches ist jedoch heutzutage nicht mehr richtig. Dem Wortlaut nach würden die Kryptogamen (von *κρυπτος*, *kryptos* = verborgen, und *γαμος*, *gamos* = die Ehe) Pflanzen sein, deren Befruchtungsorgane dem menschlichen Auge nicht sichtbar sind, die Phanerogamen (von *φανερως*, *phaneros* = offenbar) hingegen

solche Gewächse, deren Befruchtungsorgane in Gestalt von Blüten dem menschlichen Auge mehr oder weniger auffällig erscheinen. Seit der Vervollkommnung und allgemeinen Anwendung des Mikroskops und seit dem Studium der feineren Vorgänge bei der Befruchtung aber hat diese Unterscheidung ihre Bedeutung verloren; nur wenn die Übersetzung etwas anders gefaßt wird, d. h. wenn man unter dem Namen Kryptogamen diejenigen Pflanzen begreift, welche der Blüten im gewöhnlichen Sinne entbehren und deren Befruchtungsorgane meist nur unter dem Mikroskop deutlich gesehen werden können, hingegen unter dem Namen Phanerogamen jene Gewächse zusammenfaßt, welche Blüten tragen und deren (ohne Beihilfe des Mikroskops sichtbare) Befruchtungsorgane als metamorphosierte Blätter zu gelten haben, so könnten diese althergebrachten und eingebürgerten Bezeichnungen auch ihrem Wortlaute nach Geltung behalten.

Man ist jedoch in neuerer Zeit immer tiefer in die Kenntnis der sog. Kryptogamen eingedrungen und hat dabei die Erfahrung gemacht, daß unter den hierher gerechneten Formen sich ungemein tiefgreifende Unterschiede bemerkbar machen, Unterschiede, welche mindestens so schwerwiegend sind als die soeben zwischen Kryptogamen und Phanerogamen aufgeführten. Es hat sich deshalb die Notwendigkeit herausgestellt, nicht nur zwei, sondern zahlreiche gleichwertige Abteilungen des Pflanzenreiches aufzustellen. Gleichwertig sind diese Abteilungen natürlich nur in morphologischer, nicht in praktischer Hinsicht; und da wir im folgenden des Raumes wegen gezwungen sind, nur die „wichtigeren Pflanzen“ zu berücksichtigen, so sollen einige Abteilungen nicht oder nur ganz kurz erwähnt werden.

## I. Abteilung.

### Schizophyta. Spaltpflanzen.

Als Spaltpflanzen bezeichnet man winzige, nur mit starken mikroskopischen Vergrößerungen wahrnehmbare, einzellige Organismen, die entweder gänzlich ungefärbt sind oder aber die verschiedensten Farben zeigen, nie jedoch die rein chlorophyllgrüne. Die Individuen leben entweder einzeln oder sie sind zu sehr verschiedenartig gestalteten Kolonien lose vereinigt, wobei jede Einzelzelle vollständig selbständig ist, für sich allein zu leben vermag und sich zu vermehren befähigt ist. Eine geschlechtliche Fortpflanzung fehlt den Spaltpflanzen vollständig, die Vermehrung erfolgt nur durch fortgesetzte Zweiteilung; es finden sich bei ihnen häufig auch Sporen oder Dauerzellen, d. h. mehr oder weniger dickwandige Zellen, welche befähigt sind, ungünstige Vegetationsverhältnisse (Trockenzeiten, Winter und dergl.) ohne Schaden zu überdauern, um dann beim Eintreten günstigerer Bedingungen wieder zum normalen, vegetativen Zustand zurückzukehren. Kerne fehlen. Teilung stets quer zur Hauptachse.

## 1. Klasse.

**Schizomycetes (Bacteria). Bakterien, Bazillen, Spaltpilze.**

In neuerer Zeit haben die Bakterien eine solche Wichtigkeit für das Leben und den ganzen Haushalt des Menschen erlangt, daß es angebracht erscheint, sie hier etwas ausführlicher zu behandeln.

Die Gestalt der Bakterien ist überaus einförmig. Im allgemeinen können wir drei Formen unterscheiden, welche wir stets mit kleinen Abänderungen wiederfinden, die Kugel, das gerade und das krumme Stäbchen, oder nach De Bary die Formen der Billardkugel, eines Bleistifts und eines Korkziehers. Die Bakterien sind ganz außerordentlich klein. Der Durchmesser der Kugelbakterien beträgt meistens etwa  $\frac{1}{1000}$  mm, man kennt jedoch auch Formen, welche nur  $\frac{1}{2000}$  mm Durchmesser besitzen. Sehr selten finden sich Arten von einem Durchmesser von  $\frac{1}{500}$  mm. Bei den Stäbchenbakterien beträgt die Dicke kaum jemals mehr als der Durchmesser der Kugelbakterien, ihre Länge dagegen ist außerordentlich schwankend, und wir kennen solche, welche sich der Kugelform stark nähern, und andere, deren Länge die Dicke vielfach übertrifft.

Wie oben bei der Charakteristik der Schizophyta hervorgehoben wurde, vermehren sich alle hierher gehörigen Formen nur durch Zweiteilung. Dabei können sich die hierdurch gebildeten Zellindividuen sofort nach der Ausbildung voneinander trennen oder aber in Verbänden oder „Kolonien“ mehr oder weniger fest miteinander vereinigt bleiben, welche je nach der engeren oder lockereren Vereinigung regelmäßige oder unregelmäßige Umrisse besitzen.




Abb. 165. Der Paketspaltpilz (*Sarcina*) etwa 1000mal vergr.

Bleiben die Zellen nach erfolgter Spaltung fest miteinander vereinigt, so entstehen bei den Kugelbakterien bei einer Teilung nach einer Richtung des Raumes rosenkranzartige Ketten, eine Wachstumsweise, die man allgemein als die *Streptococcus*-form bezeichnet. Bei einer Teilung nach zwei Richtungen des Raumes entstehen Zellplatten; erfolgt endlich die Spaltung der Zellen nach drei Richtungen des Raumes, so resultieren Zellhaufen von eigenartiger Gestalt, welche man am besten mit der von gleichseitigen, fest umschnürten Warenballen vergleichen kann (*Sarcina*, Abb. 165).

In weitaus den meisten Fällen trennen sich die einzelnen Zellen jedoch gleich nach erfolgter Spaltung und weisen dann keine weiteren Beziehungen zueinander auf.

Die Stäbchenbakterien zeigen lange nicht so verschiedenartige Wuchsformen, wie wir sie bei den Kugelbakterien beobachten konnten. Bei ihnen erfolgt nämlich die Teilung ausschließlich nach einer Richtung des Raumes, und zwar stets quer zu ihrer Längsachse, so daß bei einer bleibenden Vereinigung der durch die fort-

gesetzten Teilungen entstehenden Zellen mehr oder weniger lange Fäden entstehen. Es ist einleuchtend, daß bei geraden Einzelzellen auch die entstehenden Zellfäden fast gerade sind und nur unbedeutende, sekundäre Krümmungen aufzuweisen haben, daß dagegen bei gebogenen Einzelzellen schraubenförmig gewundene Fäden resultieren müssen. Aber auch bei den Stäbchenbakterien ist der häufigste Fall der, daß sich die einzelnen Individuen nach erfolgter Spaltung voneinander lösen.

Bei dem Teilungsvorgange selbst erreicht jede der Mutterzellen eine gewisse Maximalgröße, worauf sich in deren Mitte eine zarte Scheidewand bemerkbar macht, welche die Zelle in zwei gleiche oder wenigstens fast gleiche Tochterzellen zerlegt.

Unter günstigen Bedingungen können die Teilungen bei vielen Arten sehr rasch aufeinander folgen. Man kennt zahlreiche Bakterien, bei welchen bei Anwesenheit reichlicher Nährstoffe, günstiger Temperatur und Belichtung das Wachstum ein so rapides ist, daß durchschnittlich jede halbe Stunde eine Teilung der Zellen erfolgt, daß also aus einer einzigen Mutterzelle in sechs Stunden 4096, in 24 Stunden gar 280 000 000 000 000 Individuen hervorgegangen sind. Tatsächlich werden solche Fälle nur sehr selten eintreten, denn irgendwelche äußere Bedingungen werden sich meistens bald ändern, sei es, daß in dieser Zeit Nahrungsmangel eintritt oder doch die Konzentration der Nährstoffe eine geringere wird, oder daß sich bei der Vegetation der Bakterien Stoffwechselprodukte bilden, die hemmend auf die Entwicklung der Individuen einwirken. Immerhin zeigen aber diese Zahlen, welcher ungeheuren Vermehrung die Bakterien fähig sind, wenn ihnen die gegebenen Verhältnisse zusagen, daß sie reichlich durch ihre Zahl ersetzen können, was ihnen an Größe abgeht.

Als die höchststehenden, am weitesten differenzierten Bakterien faßt man eine Abteilung derselben auf, welche früher als Fadensbakterien bezeichnet wurde, welche man jetzt jedoch meist treffender unter dem Namen Scheidenbakterien zusammenfaßt. Denn das ausschlaggebende und ihre Stellung bedingende Moment ist nicht das, daß sie in einzelnen Fällen zu langen Fäden vereinigt sind, denn das finden wir auch noch bei anderen Bakterien, sondern daß um die Fäden eine zarte, aber deutlich nachweisbare, gemeinsame Gallerthülle oder -scheide abgesondert wird, welche mit dem Alter der Fäden an Dicke und Deutlichkeit zunimmt.

Über den genaueren Aufbau der einzelnen Zellen wissen wir im allgemeinen — eine Folge der Kleinheit der Bakterien — nur sehr wenig. In manchen Fällen verhält sich die Zellhaut der Bakterien gegen Reagentien so oder ähnlich wie die der höheren Pflanzen, oft aber auch so, wie wir sie bei den echten Pilzen finden; sie besteht dann aus einer Modifikation der echten Cellulose, welche man allgemein als Pilzcellulose bezeichnet. Ferner kennt man einige Formen, bei welchen die Zellhaut deutlich gefärbt ist. Die Zellhaut selbst erweist sich meist als fest und starr, so daß die Zellen ihre Form nicht

ändern können; bei der wichtigen Gattung *Spirochaete* dagegen sind die Zellen schlangenartig biegsam.

Über den Zellinhalt der Bakterien ist nur verhältnismäßig wenig Sicheres bekannt, und besonders wenig weiß man über die Plasmastruktur. Ein Zellkern ist mit Sicherheit noch nicht nachgewiesen worden.

Sehr interessant ist es, daß eine große Zahl von Spaltpilzen die Fähigkeit der Eigenbewegung besitzt.

Bei den kugeligen Bakterien finden wir diese Beweglichkeit nur äußerst selten, um so mehr dagegen bei den Faden- und Schraubenbakterien. Je nach der Art, der Gestalt und endlich auch dem Alter und der Größe erfolgt die Bewegung langsam oder blitzschnell, gleitend oder unregelmäßig hin und her zitternd oder endlich in auffallender Weise schlängelnd.

Früher hatte man gar keine Erklärung für die Bewegung der Spaltpilze, denn es war unmöglich, Bewegungsorgane zu erkennen. Vor verhältnismäßig wenigen Jahren ist es jedoch gelungen, durch komplizierte Färbungsmethoden die Bewegungsvermittler sichtbar zu machen: äußerst feine und zarte Protoplasmastränge, die sogen. Geißeln oder Cilien, die von sehr verschiedenartigen Stellen der Bakterienzelle ausgehen können und durch peitschenartiges Schlagen die Zelle durch die Flüssigkeit hindurchbewegen. Man kennt Formen, bei denen die Geißeln einzeln an einem oder beiden Enden der Zelle stehen, oder aber auch solche, wo die Cilien zu mehreren oder sogar in größeren Büscheln und häufig von einem Punkte mitten am Körper ausstrahlen (Abb. 166).




Abb. 166. Geißeltragende Bakterien, gefärbt. (1000mal vergr.) (Nach Migula.)

Die Bakterien besitzen niemals Chlorophyll, zeigen also nicht die Fähigkeit, wie die grünen Pflanzen aus Wasser und der Kohlensäure der Atmosphäre Kohlehydrate zu bilden und dieselben zum Aufbau ihres Körpers zu verwenden; sie vermögen nicht organische Verbindungen aus anorganischen herzustellen und sind infolgedessen auf die Annahme schon zubereiteter Nahrung angewiesen: sie gehören nicht zu den produzierenden, sondern zu den verzehrenden Lebewesen. In dieser physiologischen Hinsicht verhalten sie sich ganz wie die Pilze und wurden deshalb auch Spaltpilze genannt, obgleich sie zu den echten Pilzen keinerlei verwandtschaftliche Beziehungen aufweisen. Der eben angeführte Namen ist jedoch insofern für sie sehr bezeichnend, weil er dartut, daß ihre Vermehrung eben ausschließlich durch fortgesetzte Teilung, Spaltung der Zellen erfolgt.

Bei vielen Bakterien hat man auch die Bildung von Dauerzellen oder Sporen beobachten können. Diese tritt meist nur dann ein, wenn eine Erschöpfung des Nährbodens sich bemerkbar macht oder wenn ungünstige Vegetationsbedingungen herannahen; denn im

Dauerzustand, als Sporen, sind die Individuen befähigt, Austrocknung, Nahrungsmangel und fast alle übrigen schädlichen Einflüsse zu überstehen.

Man unterscheidet zwei Arten von Sporen und hat nach ihrem Verhalten auch vielfach die Bakterien zu gruppieren versucht. Bei den einen bilden sich die Sporen im Inneren der vegetativen Zellen (endospore Bakterien), bei den anderen dagegen wird die ganze vegetative Zelle zur Spore (arthrospore Bakterien).

Eine Einteilung der Bakterien nach dem Bildungsprinzip der Sporen stößt jedoch auf erhebliche Schwierigkeiten, da man von einer großen Zahl von Spaltpilzen überhaupt noch keine Sporenbildung kennen gelernt hat und sie auch bei manchen genau bekannten Arten überhaupt zu fehlen scheint.

Die Bildung der Endosporen ist im allgemeinen ziemlich leicht zu beobachten (Abb. 167). Die zur Sporenbildung schreitende Zelle gibt zunächst die fortgesetzten Teilungen auf, ohne sich sonst von den vegetativen Zellen zu unterscheiden. In dem homogenen oder sehr feinkörnigen Plasma bildet sich nun aber bald an einer oft



Abb. 167. Vorgang der Sporenbildung bei *Bacillus subtilis*, dem Heubazillus. Eine Zelle in verschiedenen Stadien, vom Beginn bis zur vollendeten Ausbildung der Spore. (Nach Migula.)

etwas anschwellenden Stelle ein heller Fleck, der meist allmählich stark heranwächst, seltener schon von Anfang an (d. h. von dem Moment an, wo er überhaupt beobachtungsfähig wird) die definitive Größe besitzt. Dieser Fleck nimmt ständig an Helligkeit und Lichtbrechungsvermögen zu und scheidet zuletzt eine deutlich umschriebene starke Wand ab. Während dieses Prozesses zerfällt das bei der Sporenbildung nicht verwertete Protoplasma, die Zellwand der ursprünglichen Bakterienzelle wird allmählich resorbiert, d. h. sie wird immer undeutlicher und verschwindet zuletzt ganz, so daß die Spore völlig frei wird.

Der Vorgang der Arthrosporenbildung ist nun von dem soeben geschilderten Verfahren sehr abweichend und hat, ehe man ihn richtig erkannte, vielfach zu falschen Schlüssen und Theorien geführt. Der Hauptunterschied ist der, daß sich hier vegetative Zellen direkt zu Sporen verwandeln, ohne, wie bei der Endosporenbildung, neue Zellen in ihrem Innern zu erzeugen. Auffallend ist, daß meistens bei Beginn dieser Bildung die Bakterienfäden oder längeren Stäbchen in kürzere Gliederzellen zerfallen, welche außerordentlich an die Kugelbakterien erinnern und auch die Veranlassung waren, daß man noch vor verhältnismäßig kurzer Zeit manchen Bakterienarten großen Polymorphismus, eine große Formenmannigfaltigkeit, zuschreiben zu müssen glaubte. Es war damals von mehreren Forschern als zweifellos hingestellt worden, daß aus dem Zerfall der Stäbchen typische Mikrokokken hervorgehen könnten.

Wie oben schon ausgeführt wurde, können die Bakterien sich ihre organischen Nährstoffe, welche sie zum Leben brauchen, nicht selbst bereiten; sie sind deshalb darauf angewiesen, mindestens einen

Teil ihrer Nährstoffe anderen lebenden oder toten Organismen zu entziehen. Man bezeichnet die Bakterien als parasitisch, wenn sie sich auf oder in noch lebenden, pflanzlichen oder tierischen Organismen ernähren, als saprophytisch dagegen, wenn sie die organischen Stoffe aus abgestorbenen Lebewesen entnehmen und auf oder in denselben vegetieren.

Zu ihrem Gedeihen bedürfen die Bakterien fast genau derselben Nährstoffe, welche auch für die höheren Pflanzen unbedingt notwendig sind. Nicht alle Bakterienarten besitzen jedoch organischen Verbindungen gegenüber die gleiche Zersetzungsfähigkeit. Es hat sich auch herausgestellt, daß z. B. ein gewisser Stoff noch sehr lebhaft von einer Bakterienart ausgebeutet werden kann, der vorher schon von einem anderen Spaltpilz befallen und nach Ausaugung gewisser Verbindungen wieder verlassen worden war. Es ergibt sich also hieraus, daß den organischen Körpern von irgend einem Bakterium nur gewisse Atomgruppen entzogen werden, während die zurückbleibende, einfachere chemische Verbindung dann später von anderen Bakterien noch weiter zerlegt werden kann, so weit, daß zuletzt von derselben nur noch die anorganischen Verbindungen: Wasser, Kohlensäure und Ammoniak übrig bleiben.

Es ist klar, daß sich nach der verschiedenartigen Zusammensetzung der Nährstoffe auch sehr verschiedenartige Vorgänge bei der Nahrungsaufnahme der Bakterien zeigen müssen. Man hat auch in der Tat drei Gruppen von Zersetzungserscheinungen unterschieden, welche jedoch vielfach ineinander übergehen, nämlich die Fäulnis, eine Zersetzung stickstoffhaltiger Verbindungen, die Verwesung, eine Zersetzung von Kohlenstoffverbindungen im allgemeinen, und endlich die Gärung als Zersetzung einiger bestimmter organischer Verbindungen der Kohlehydrate. Für alle drei Prozesse ist gemeinsam, daß den dabei beteiligten Verbindungen gewisse Atomgruppen entzogen werden und daß dadurch einfachere chemische Körper resultieren. Daß sich während dieser Vorgänge häufig noch sehr komplizierte Stoffe in geringerer Menge bilden können, ist bekannt, wir wissen jedoch noch nichts über die genaueren Bedingungen ihres Entstehens.

Eine sehr wichtige Eigenschaft vieler Bakterien ist die, daß sie instande sind, Fermente oder Enzyme zu bilden, chemische Verbindungen, welche ganz die Arbeit lebender Zellen zu verrichten vermögen. Ihrer chemischen Natur nach sind diese Stoffe noch nicht vollständig aufgeklärt worden; man weiß jedoch, daß sie befähigt sind, gewisse und oft recht wichtige Veränderungen anderer chemischer Verbindungen zu bewirken. Die Bedeutung dieser Ausscheidungsprodukte der Bakterien liegt darin, daß ihnen Stoffe durch dieselben zubereitet werden, die sie für ihre Ernährung direkt verwerten können. So ist z. B. der Kohlenstoff in der Stärke und im Rohrzucker für die Bakterien nicht ohne weiteres zur Aufnahme vorbereitet, während er aus dem Traubenzucker sofort aufgenommen werden kann.

Wir finden ferner bei anderen Bakterien Fermente, durch welche die unverdaulichen Eiweißstoffe in Pepton verwandelt werden, oder solche, welche Cellulose in eine lösliche und assimilierbare Form überführen. Alle diese Fermente sind jedoch nicht etwa ausschließlich charakteristisch für die Bakterien, wir finden dieselben auch sowohl im Tierreich, als auch im Pflanzenreich bei anderen Gruppen. Sie sind es, welche bei der Verdauung im Speichel, im Magensaft und im Pankreassaft eine sehr wichtige Rolle spielen, die auch bekanntlich bei den „insektenfressenden“ höheren Pflanzen als Verdauungsvermittler auftreten, die endlich in den keimenden Samen häufig die Lösung der Stärke und anderer Reservestoffe für die junge Keimpflanze einleiten und ausführen.

Speziell charakteristisch dagegen für zahlreiche Bakterien sind die bei ihrer Vegetation und ihrer zersetzenden Tätigkeit auftretenden Nebenprodukte, welche man zum großen Teil erst in neuester Zeit näher kennen und würdigen lernte. Hierher zählen z. B. die Ptomaine oder Leichengifte, welche z. T. zu den furchtbarsten Giften überhaupt gehören, basische Verbindungen, die manchen pflanzlichen Alkaloiden in ihrer Zusammensetzung sehr ähnlich sind, ja mit einzelnen derselben, so z. B. mit dem Gifte des Fliegenschwammes, dem Muskarin, völlig übereinstimmen. Die Ptomaine entwickeln sich unter der Tätigkeit der Bakterien hauptsächlich in faulem Fleisch und sind in den Körpern von Tieren und Menschen sehr schwer mit völliger Sicherheit nachzuweisen, besonders da sie eben kaum von manchen pflanzlichen Alkaloiden unterschieden werden können. Vielleicht noch weniger bekannt und noch schwieriger nachzuweisen sind auch die äußerst giftigen Eiweißverbindungen, welche man ebenfalls als Stoffwechselprodukte der Bakterien auffaßt.

Durch die Tätigkeit der Bakterien erhalten wir endlich eine Anzahl sehr wichtiger Stoffe, so Alkohol und zahlreiche organische Säuren, wie die Milchsäure, die Buttersäure, die Essigsäure etc. Sehr interessant ist es, daß diese Stoffwechselprodukte oft von den Bakterien in solchen Mengen hervorgebracht werden, daß sie selbst daran zugrunde gehen, oft lange bevor die ihnen gebotenen Nährstoffe aufgebraucht sind.

Die meisten Spaltpilze bedürfen zu ihrer Entwicklung unbedingt der Anwesenheit des atmosphärischen Sauerstoffes, d. h. sie sind *Aërobionten*, andere können sich sowohl bei Anwesenheit wie bei Fehlen des Sauerstoffes ungestört entwickeln und werden als *fakultative Aërobionten* bezeichnet. Es gibt aber auch Formen unter den Bakterien, die dadurch einzig im Pflanzen- und Tierreich dastehen, daß sie nur dann sich kräftig zu entwickeln vermögen, wenn der Sauerstoff der Luft nicht zu ihnen gelangt, und die bei Luftzutritt früher oder später zugrunde gehen, die *Anaërobionten*. Diese letzteren Spaltpilze sind demnach als bis aufs äußerste angepaßte Saprophyten und Parasiten befähigt, selbst den Sauerstoff, den jedes Lebewesen zur Atmung nötig hat, aus den ihnen gebotenen Nährstoffen zu entnehmen.

Man teilt die Spaltpilze gewöhnlich nach ihrem Verhalten in drei physiologische Gruppen ein, von denen wir die eine, die der Gärungserreger (zymogene Bakterien), soeben schon besprochen haben.

In die zweite Gruppe rechnet man die Formen, welche in neuester Zeit besonders für die Medizin sehr wichtig geworden sind, die krankheitserregenden oder pathogenen Bakterien. Sie sind Parasiten, d. h. sie besitzen die Fähigkeit, aus dem lebenden Körper anderer Organismen ihre Nährstoffe zu entnehmen, nachdem sie den Widerstand der lebenden Zellen gebrochen haben.

Die Arten der dritten physiologischen Gruppe endlich bezeichnet man als chromogene Bakterien. Sie scheiden während ihres Stoffwechsels Farbstoffe aus, wodurch ihre Kolonien oft ein farbenprächtiges Aussehen erhalten: rote, blaue, grüne, gelbe, braune, violette Farbstoffe, welche sich in ihrem chemischen und optischen Verhalten sehr eng an die Anilinfarbstoffe anlehnen. Als eines der bekanntesten und charakteristischsten Beispiele dieser Arten sei hier nur der „Bazillus der blutenden Hostie“, *Bacillus prodigiosus*, erwähnt.

Für das ungestörte, vegetative Wachstum der Bakterien ist außer dem passenden Nährsubstrat die geeignete Temperatur von größter Wichtigkeit. Wie bei allen übrigen Lebewesen kennt man auch für die Bakterien ein Temperaturoptimum, bei welchem sie sich am kräftigsten entwickeln, und eine obere und untere Temperaturgrenze, bei deren Überschreitung das Wachstum aufhört. Die drei Grenzen sind jedoch je nach der Art sehr wechselnd, bei einzelnen Arten liegen sie nur wenige Grade auseinander, während sie bei anderen fast 50° Unterschied zeigen. Der Tuberkelbazillus, der Erreger der Lungenschwindsucht, wächst z. B. am besten bei 37°, er stellt sein Wachstum ein über 42° und unter 28°; dagegen zeigt der Heubazillus (*Bacillus subtilis*) sein Wachstumsoptimum bei 30°, entwickelt sich aber auch noch in den Grenzen von 5 bis 50°.

Völlig unempfindlich sind viele Bakterien gegen Kälte insofern, als selbst die höchsten Kältegrade ihrem Leben nichts schaden. Es ist selbstverständlich, daß unterhalb 0° bei allen, auch den ausdauerndsten Arten die Lebenstätigkeit, vor allem deren lebhafteste Äußerung, die fortgesetzte Spaltung der Individuen, sofort aufhört; man hat aber Bakterien in Kältegrade bis zu 110° gebracht und sie einfrieren lassen; sobald sie wieder aufgetaut waren, setzten sie ihr Wachstum, ohne nur die geringste Schädigung zu zeigen, sogleich wieder fort. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Bakterien, die sehr hohe Temperaturen zu ertragen vermögen, z. B. solche, die sich noch bei 74° zu vermehren imstande sind und die man deshalb häufig in Thermalwässern findet.

Bei allen diesen soeben geschilderten Verhältnissen handelte es sich stets um die vegetativen Zustände der Bakterien. Ganz anders verhalten sich jedoch die Ruhezustände derselben, die Sporen. Diese besitzen eine erstaunliche Widerstandsfähigkeit gegen alle

möglichen ungünstigen Verhältnisse, vor allem gegen hohe Temperaturen.

Die Versuche vieler Forscher früherer Jahre scheiterten oft an einer ganz unerklärlichen Erscheinung. Trotzdem dieselben nämlich die aufs beste verschlossenen Flaschen mit Nährflüssigkeit stundenlang der Siedetemperatur ausgesetzt hatten, entwickelten sich darin manchmal nach einiger Zeit Bakterien in großen Mengen, deren Auftreten dann als Beweismittel für die Theorie der „Urzeugung“ angesprochen wurde. Jetzt wissen wir, daß das Erscheinen der Bakterien in dieser Weise durchaus nichts Auffallendes ist; denn es sind viele Arten der Spaltpilze bekannt, deren Sporen ohne Schaden ein stundenlanges Sieden zu ertragen vermögen. Nicht alle Bakterien sporen sind jedoch so widerstandsfähig, und so ist man in manchen Fällen imstande, durch längeres Kochen aus einer von vielen Bakterienarten besiedelten Nährflüssigkeit eine ganz bestimmte Art zu isolieren und rein zu erhalten. Um z. B. eine Kultur des Heubazillus anzulegen, kocht man einen Heuaufguß etwa eine Stunde lang. Hierbei sterben alle oder fast alle der im Aufguß enthaltenen Bakterien und deren Sporen ab, bis auf die des Heubazillus, dessen Sporen im Gegenteil durch das Kochen zu reger Wachstumstätigkeit und zu raschem Keimen angeregt zu werden scheinen. Im übrigen kennt man keine einzige Art, deren Sporen bei einem mehrstündigen Kochen in reinem Wasser nicht getötet werden. Die Flüssigkeit, in welcher sie sich befinden, bedingt in dieser Beziehung große Unterschiede, denn es hat sich herausgestellt, daß ihr Absterben in sauer reagierenden Flüssigkeiten bei einer viel niedrigeren Temperatur, resp. bei anderen Arten nach viel kürzerem Kochen erfolgt, als in neutralen oder alkalischen; hierauf beruht auch die Bakterienfreiheit der Torfmoore und des Torfmulls.

Sehr eigentümlich ist es, daß — wie es wenigstens nach neueren Untersuchungen scheint — die Bakterien in der Milch am schwersten zum Absterben zu bringen sind, da man selbst nach vielstündigem Kochen fast stets eine nachträgliche Entwicklung einzelner derselben nachweisen konnte. Auf der anderen Seite geht es nicht an, die Milch stark über den Siedepunkt zu erhitzen, da sie sonst ihren Geschmack ändert und ungenießbar wird.

Auch gegen Austrocknung sind die Sporen der meisten Bakterien sehr widerstandsfähig, und man weiß mit Bestimmtheit, daß einzelne derselben im Trockenem mehrere Jahre hindurch ihre Keimkraft zu bewahren vermögen. Die vegetativen Zustände brauchen dagegen zu ihrem Gedeihen notwendig eine bestimmte Menge Wasser und vermögen meist Trockenheit nur wenige Tage lang auszuhalten; doch kennt man auch vereinzelte Formen, die, ohne Sporen zu besitzen, mehrere Monate hindurch der Austrocknung widerstehen.

Daß wir gegen die Bakterien wirksame Gifte besitzen, ist allgemein bekannt. Das wichtigste Abtötungsmittel der Spaltpilze ist das Sublimat (Quecksilberchlorid), welches in den meisten Fällen schon in einer Verdünnung von  $\frac{1}{10000}$  die vegetativen Zustände zum

Absterben bringt, während alle Sporen bei einer solchen von  $\frac{1}{5000}$  nach mehrstündigem Einwirken, bei  $\frac{1}{1000}$  in wenigen Minuten der Vernichtung anheimfallen.

Häufiger noch als das auch für den Menschen sehr stark giftige Sublimat wird die Karbolsäure verwendet, doch wirkt diese lange nicht in dem Maße vernichtend wie jenes. Denn um vegetative Zustände sicher abzutöten, bedarf man einer mindestens 3 prozentigen Lösung, und dauerhafte Sporen bleiben sogar in 5 prozentiger Lösung noch mehrere Tage lebend.

Wie wichtig die Methoden sind, um die Bakterien und ihre Sporen abzutöten, namentlich zum Zweck der Konservierung der




Abb. 168. Kulturplatte mit aus der Luft aufgefangenen Bakterienkolonien. (Nach Migula.)

Nahrungsmittel, zur Beseitigung der Krankheitsstoffe usw., ist jedermann bekannt. Je besser wir die Bakterien und ihre Lebensäußerungen kennen lernen, desto mehr werden wir auch Mittel und Wege finden, um ihnen erfolgreich gegenüber treten zu können.

Es erübrigt noch einige Worte über die Kulturmethode der Bakterien zu sagen.

Vor den grundlegenden Arbeiten Robert Kochs hatte man kein Mittel, um die einzelnen Bakterienformen in Reinkulturen zu züchten. Dieser Forscher zeigte nun, daß flüssige Nährmedien, welche bisher ausschließlich zur Bakterienkultur benutzt worden waren, unbrauchbar seien. Er erfand dadurch, daß er den flüssigen Nährmedien Gelatine oder Agar-Agar zusetzte, einen Nährboden, welcher nach dem Wunsche des Forschers durch Temperaturver-

änderung stets in den festen oder den flüssigen Zustand übergeführt werden konnte und dabei völlig durchsichtig blieb. Es zeigte sich, daß die Bakterien auf dem ihnen gebotenen Nährboden ausgezeichnet gediehen, daß sie aber auch je nach der Art außerordentlich charakteristische Verschiedenheiten in ihrem Wuchs aufwiesen. Der größte




Abb. 169. Stichkultur  
des Typhusbazillus auf  
Nährgelatine.  
(Nach Migula.)

Abb. 170. Strichkultur  
des Tuberkelbazillus  
auf Blutserum.  
(Nach Migula.)

und sofort in die Augen fallende Vorteil dieser Methode aber war der, daß es sich auf diese Weise als möglich herausstellte, die einzelnen in einer bestimmten Masse enthaltenen Bakterienarten voneinander zu trennen. Das Verfahren ist folgendes. Man bringt in ein Glas mit flüssiger Gelatine geringe Teile des zu untersuchenden Bakteriengemisches und gießt die Masse, nachdem sie gut durcheinander gemengt wurde, auf sterilisierte (keimfreie) Glasplatten aus. Beim Ausbreiten der Gelatine werden die einzelnen Bakterienkeime voneinander getrennt. Jeder der Keime beginnt nun zu wachsen, sich lebhaft zu teilen, und bald finden wir Kolonien entwickelt, welche ausschließlich aus einer einzigen Art bestehen (Abb. 168). Diese können nicht verunreinigt werden, da ja infolge der erstarrten Gelatine eine Vereinigung der Kolonien nur dann möglich ist, wenn diese sich sehr weit ausgebreitet haben und sich mit den Rändern zu berühren beginnen. Es ist natürlich sodann ein Leichtes, durch Überimpfen von diesen Kolonien in Reagensgläserchen mit sterilisierter Nährgelatine Reinkulturen in völlig beliebiger Menge herzustellen und alle ihre Vegetationsverhältnisse nach jeder Richtung hin zu erforschen (Abb. 169 u. 170). Nur sehr wenige Arten von Bakterien sind bisher bekannt geworden, welche sich auf diese Weise nicht kultivieren lassen, welche an das Nährsubstrat ganz bestimmte und fest normierte Ansprüche stellen in bezug auf Zusammensetzung und Temperatur. Es leuchtet ein, von welcher Wichtigkeit bei im allgemeinen so übereinstimmenden Ansprüchen an das Nährsubstrat die Begründung der Methodik ihrer Kultur sein mußte.

und sofort in die Augen fallende Vorteil dieser Methode aber war der, daß es sich auf diese Weise als möglich herausstellte, die einzelnen in einer bestimmten Masse enthaltenen Bakterienarten voneinander zu trennen. Das Verfahren ist folgendes. Man bringt in ein Glas mit flüssiger Gelatine geringe Teile des zu untersuchenden Bakteriengemisches und gießt die Masse, nachdem sie gut durcheinander gemengt wurde, auf sterilisierte (keimfreie) Glasplatten aus. Beim Ausbreiten der Gelatine werden die einzelnen Bakterienkeime voneinander getrennt. Jeder der Keime beginnt nun zu wachsen, sich lebhaft zu teilen, und bald finden wir Kolonien entwickelt, welche ausschließlich aus einer einzigen Art bestehen (Abb. 168). Diese können nicht verunreinigt werden, da ja infolge der erstarrten Gelatine eine Vereinigung der Kolonien nur dann möglich ist, wenn diese sich sehr weit ausgebreitet haben und sich mit den Rändern zu berühren beginnen. Es ist natürlich sodann ein Leichtes, durch Überimpfen von diesen Kolonien in Reagensgläserchen mit sterilisierter Nährgelatine Reinkulturen in völlig beliebiger Menge herzustellen und alle ihre Vegetationsverhältnisse nach jeder Richtung hin zu erforschen (Abb. 169 u. 170). Nur sehr wenige Arten von Bakterien sind bisher bekannt geworden, welche sich auf diese Weise nicht kultivieren lassen, welche an das Nährsubstrat ganz bestimmte und fest normierte Ansprüche stellen in bezug auf Zusammensetzung und Temperatur. Es leuchtet ein, von welcher Wichtigkeit bei im allgemeinen so übereinstimmenden Ansprüchen an das Nährsubstrat die Begründung der Methodik ihrer Kultur sein mußte.

Das einzige System der Bakterien, das auf streng wissenschaftlicher, morphologischer Basis beruht, ist das von Migula aufgestellte, welches im folgenden kurz wiedergegeben werden soll.

### 1. Reihe. **Eubacteria.**

Zellen ohne Schwefelkörnchen und ohne den roten oder violetten Farbstoff Bakteriopurpurin.

#### Familie **Bacteriaceae.** Stäbchenbakterien.

Die Zellen sind zylindrisch, kurz oder lang, meist gerade, seltener leicht gebogen, vor der Teilung sich stets auf die doppelte Länge streckend. Nicht selten sind fadenförmige Kolonien oder starke Aufquellung der Membran.

Die Arten der Gattung **Bacterium** besitzen niemals Geißeln, zeigen also auch keine Bewegung.

Einige wichtige hierhergehörige Arten sollen kurz geschildert werden.

**Bacterium acidi lactici** tritt in der Form kleiner, kurzer Stäbchen auf, welche meistens zu zweien zusammenhängen. Seine Sporen sind imstande, ein kurz andauerndes Kochen ohne Gefahr zu überstehen. Er bewirkt in erster Linie das Sauerwerden der Milch, und zwar dadurch, daß er den Milchsucker in Milchsäure und Kohlensäure zu verwandeln vermag. Beim Sauerwerden der Milch, welche bekanntlich besonders an heißen Tagen sehr rasch infolge der Ansäuerung gerinnt, ist der genannte Bazillus allerdings nicht der einzige in Frage kommende Organismus; doch nimmt er unter jenen weitaus die Hauptstellung ein. — Sehr charakteristisch ist, daß die in der Milch erzeugte Säuremenge nie 1% übersteigt; denn schon in dieser geringen Menge wirkt die Säure, welche doch das Produkt des Spaltpilzes ist, nachteilig und hemmend auf seine weitere Entwicklung ein.

**Bacterium aceticum** ist der Essigsäurebazillus. Er besitzt die Fähigkeit, in den Stoffen zu vegetieren, welche vorher schon von anderen Bakterien bereitet worden sind und in welchen jene nicht mehr weiterzuleben vermochten, d. h. er vegetiert in Alkohol, welcher für die meisten Spaltpilze als Gift wirkt, und vergärt ihn in Essigsäure. In den allermeisten Fällen ist auf ihn auch das Sauerwerden von Fruchtsäften, Wein und Bier zurückzuführen. Es ist ein Glück, daß der Essigsäurebazillus zu ungehindertem Wachstum großer Sauerstoffmengen bedarf, denn so ist ein rasches Wachstum in gut verschlossenen Flaschen für ihn ausgeschlossen.

**Bacterium anthracis**, der Milzbrandbazillus, läßt sich leicht kultivieren und tritt meist in der Form langer Fäden auf, welche aus verhältnismäßig großen und dicken Zellen bestehen (Abb. 171); seltener kommen die Zellen einzeln vor. Äußerlich zeigen sie große Übereinstimmung mit denen des Heubazillus, lassen sich aber doch leicht von diesem unterscheiden, da sie nie Geißeln besitzen, während jene Form (wenigstens in einzelnen Entwicklungsstadien) durch lebhaftige Bewegung ausgezeichnet ist. Die Ähnlichkeit dieser beiden Spaltpilze hatte Veranlassung zu der Theorie gegeben, daß dasselbe Bakterium sowohl indifferent wie pathologisch auftreten könne. Robert Koch führte beim Milzbrandbazillus zum erstenmal den lückenlosen Beweis für die pathogenen Eigenschaften eines Organismus. Diese Art ist eines der vorzüglichsten Objekte für die Demonstration der Sporenbildung und die Keimung der Endosporen.

Im tierischen Organismus wächst der Milzbrandbazillus außerordentlich rasch und erfüllt bald nach dem Befallen die Kapillargefäße, besonders die der

inneren Organe, wie Milz, Leber, Niere (Abb. 172). Besonders für das Rindvieh ist dieser Bazillus außerordentlich gefährlich, er befällt jedoch auch Pferde, Schafe, gelegentlich auch den Menschen und kann sehr leicht tödlich werden.

*Bacterium tuberculosis*, der sogen. Tuberkelbazillus, ist einer der bestbekanntesten Spaltpilze. Er ist der Krankheitskeim der Schwindsucht, jener furchtbarsten Krankheit des Menschen, welche in unseren Klimaten etwa  $\frac{1}{7}$  aller Todesfälle herbeiführt. Die Schwindsucht tritt nie epidemisch auf, wird aber sehr leicht übertragen, besonders wenn eine Prädisposition, z. B. eine




Abb. 171. Milzbrand. a) Vom Rande einer im hängenden Tropfen auf Deckglas gewachsenen Kultur. — b) Sporenhaltige Fäden. Die Sporen liegen genau in der Mitte der Zellen, doch sind die meisten zuletzt entstandenen Scheidewände nicht sichtbar, weshalb es scheint, als wenn jede Zelle zwei Sporen enthielte, die an den Polen liegen. (1000mal vergrößert.) (Nach Migula.)




Abb. 172. Milzbrand. Schnitt durch Gewebe (gefärbt). (400 mal vergrößert.) (Nach Migula.)

schwache Lunge, vorliegt. So kommt es auch, daß oft nacheinander ganze Familien dem Tode durch die Schwindsucht anheimfallen.

Gerade der Umstand, daß die Schwindsucht nie gleichzeitig größere Massen ergreift, war die Ursache, daß man sie noch vor verhältnismäßig kurzer Zeit nicht für ansteckend hielt. Villemin und Cohnheim gelang es zuerst, den Beweis für die Ansteckungsfähigkeit der Schwindsucht zu erbringen. Sie zeigten, daß die Krankheit durch Impfung von Tier zu Tier übertragbar ist. Aber erst 1882 wurde durch Robert Koch der Tuberkelbazillus wirklich zweifellos nachgewiesen, und diesem Forscher gebührt das große Verdienst, nicht nur diesen größten Feind des Menschen aufgedeckt, sondern auch durch die Art der Aufdeckung einen ungeahnten Fortschritt für die Bakteriologie herbeigeführt zu haben. Denn auch schon vor Koch hatten zahlreiche Bakteriologen in den kranken Geweben nach dem krankheitserregenden Mikroorganismus gesucht; sie konnten denselben aber nicht finden, da diese winzigen Wesen nie scharf zu beobachten waren. Koch dagegen gelang es, ein Verfahren festzustellen, mittelst dessen er den Bazillus färben konnte, so daß er sich scharf von



Abb. 173. Tuberkelbazillen. Links „sporenfrei“ Bazillen, rechts Bazillen mit farblosen Stellen, die manchmal als Sporen oder Dauerzellen gedeutet werden. Färbung mit Anilinwasser-methylenblau. (4000mal vergrößert.) (Nach Migula.)

den Geweben abhob. Dieses Verfahren ist so interessant und zugleich so wichtig für die Bakteriologie geworden, daß wir im nachfolgenden eingehender darauf zu sprechen kommen wollen. Der Tuberkelbazillus besitzt die Gestalt eines feinen, schlanken, meist sehr schwach gebogenen Stäbchens und kommt meist einzeln vor, selten zu zweien zusammenhängend (Abb. 173). Er bildet nie Sporen, die vegetativen Zellen sind jedoch ganz außerordentlich widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse und sind imstande, längere Zeit hindurch hohe Temperaturen und Trockenheit ohne Schaden zu ertragen. Man hat früher geglaubt, daß

Sporen gebildet würden, es scheint aber sicher zu sein, daß das Bild, welches oft gefärbte Präparate ergeben, nur darauf zurückzuführen ist, daß sich in einzelnen Zellen (den vermeintlich sporenhaltenden) das Plasma von Stellen zurückgezogen hat, die sich dann natürlich nicht färben.

Es hat sich nun gezeigt, daß der Tuberkelbazillus Farbstoffe nur sehr schwer aufnimmt und mit den gewöhnlichen Färbemethoden überhaupt nicht zu tingieren ist. Das beste Färbemittel, das man jetzt fast durchweg verwendet, ist eine Lösung, welche aus 100 g Wasser, 5 g Karbolsäure, 100 ccm Alkohol und 1 g Fuchsin besteht und die am besten heiß benutzt wird. Der Schwindsuchtsbazillus besitzt aber nicht nur die Eigenschaft, Farbstoffe sehr schwer aufzunehmen, sondern auch die, die einmal aufgenommenen Farbstoffe dann sehr fest zu halten, wodurch er sich sehr scharf von fast allen anderen Bakterien unterscheidet. Auf dieser Eigenschaft beruht nun das bekannte Verfahren der Doppelfärbung, welches gerade für das Erkennen des Tuberkelbazillus von großer Bedeutung geworden ist und deshalb hier (nach Migula) angeführt werden soll.

Man bringt eines der feinen, gelblichen, käsigen Bröckchen aus dem Auswurf Lungenkranker zwischen zwei Deckgläschen und sucht es durch Druck und Verschieben möglichst gleichmäßig zu verteilen. Ist dies gelungen, so zieht man die Deckgläschen voneinander in einer Weise ab, daß die Schicht auf beiden möglichst wenig verschoben wird, was anfangs nicht recht gelingen will. Dann läßt man die Gläschen lufttrocken werden, zieht sie mehrmals durch die Flamme und wirft sie auf eine heiße Karbolfuchsinlösung, auf welcher sie ungefähr fünf Minuten schwimmen müssen. Die so gefärbten Gläschen werden in Wasser abgespült, dann für einige Sekunden in etwa 15prozentige Schwefelsäure und aus dieser in 60prozentigen Alkohol gebracht. In der Schwefelsäure nimmt die gefärbte Sputumschicht zunächst eine violette, dann rasch gelbliche Färbung an und wird schließlich fast farblos. Ist dieser Zeitpunkt eingetreten, so werden die Deckgläschen in den Alkohol übertragen, in welchem sie bald wieder rot erscheinen und Wolken von Farbstoff von sich geben. Man spült so lange ab, bis sich kein Farbstoff mehr löst und die Sputumschicht fast farblos erscheint. Untersucht man dieses Präparat unter dem Mikroskop, so erscheinen die Tuberkelbazillen leuchtend rot auf farblosem oder nur hellrosa gefärbtem Untergrunde. Besser noch aber ist es, man bringt das Deckglaspräparat in eine gewöhnliche, wässrige Methylenblaulösung, in welcher sich mit Ausnahme der Tuberkelbazillen alle Bakterien, sowie die Sputummasse selbst blau färben. Durch den Kontrast zwischen den intensiv roten Tuberkelbazillen und der blauen Umgebung treten die ersteren noch weit schärfer hervor. Auf diese Weise lassen sich die Tuberkelbazillen überall mit Sicherheit nachweisen und von anderen Arten unterscheiden. Das Verfahren mit Gewebeschnitten ist ein ganz ähnliches. Man macht durch die als Tuberkelknötchen bekannten und charakteristisch tuberkulösen Teile des Gewebes feine Schnitte und bringt sie in die Farbstofflösung; sie werden besser mit Salpetersäure entfärbt und in Alkohol und Wasser ausgewaschen, nur müssen die Schnitte in den einzelnen Flüssigkeiten meist etwas länger verweilen.

Nachdem man erst einmal ein Mittel hatte, um den Schwindsuchtsbazillus mit Sicherheit erkennen zu können, gelang auch bald der Nachweis, daß zahlreiche andere Krankheiten außer der Schwindsucht, zwischen denen man bisher einen Zusammenhang nicht vermutet hatte, auf denselben Erreger zurückzuführen sind, so Darmtuberkulose, Lupus, Kniegelenkentzündungen.

Der Tuberkelbazillus läßt sich auf den gewöhnlichen Nährsubstraten nicht kultivieren. Dagegen gedeiht er, wie Koch zeigte, sehr gut auf Blutserum, aber nur, wenn dasselbe Blutttemperatur besitzt. Sehr charakteristisch für dieses Bakterium ist, daß es außerordentlich langsam wächst, auch wenn man ihm die günstigsten Lebensbedingungen gewährt, so daß die Kolonien auf Nährböden erst nach einer vierzehntägigen Kultur sichtbar werden. Gerade diese Schwierigkeit der Kultur war aber auch die Ursache, daß Verfahren ersonnen wurden, um völlig reine Kolonien zu erhalten. Denn es leuchtet ein, daß, wenn auch nur zwei Keime auf die Platte gebracht würden, deren einer zu einer anderen Art gehört, unfehlbar die langsam wachsende Form von der schnellwüchsigen sehr bald überholt und „erstickt“ würde. Es gehört deshalb immer noch zu den

schwierigsten und die größte Vorsicht erheischenden Arbeiten in der Bakteriologie, Reinkulturen des Schwindsuchtsbazillus anzulegen, in denen eine Überwucherung durch andere Spaltpilze ausgeschlossen ist.

Es scheint zweifellos zu sein, daß der Schwindsuchtsbazillus kaum jemals außerhalb des tierischen Körpers längere Zeit vegetationsfähig bleiben kann, da er eben keine Sporen zu bilden vermag, da er ferner Blutwärme benötigt und infolge seines langsamen Wachstums stets den Fäulnisbakterien im Kampf ums Dasein unterliegen würde, wenn er auch der Trockenheit Widerstand leistet. Er ist im Gegenteil ein echter Parasit, und zwar fast sämtlicher Warmblütler, denn es hat sich herausgestellt, daß nur sehr wenige Tiere seinen Angriffen Widerstand zu leisten vermögen.

Charakteristisch für alle tuberkulösen Krankheiten sind die eigentümlichen hirsekorn- oder bohnen großen, gelblichen Knötchen, Tuberkeln, welche sich an den infizierten Stellen bilden und von denen die Krankheit auch ihren Namen erhalten hat.




Abb. 174. Tuberkelbazillus. Schnitt durch einen Tuberkelknoten der Lunge, in der zwei mit zahlreichen Bazillen erfüllte Riesenzellen zu erkennen sind. Die Bazillen treten durch die Anilinwassermethylenblaufärbung als dunkle Striche sehr deutlich hervor. (1000mal vergr.) (Nach Migula.)

Am Rande dieser Knötchen findet man noch Bazillen, in der Mitte derselben, wo die Gewebe zu einer käseartigen Masse zerfallen und zerstört sind, ist oft nicht ein Tuberkelbazillus zu konstatieren, hier sind sie sämtlich abgestorben. Auffallend sind bei der Tuberkulose auch die sogen. Riesenzellen (Abb. 174), d. h. mit Bakterien erfüllte Hohlräume, um welche sich zahlreiche Zellkerne anhäufen.

Wir wissen jetzt mit vollster Gewißheit, daß der Tuberkelbazillus auf drei verschiedenen Wegen in den Körper einzudringen vermag und auf diese Weise auch verschiedene Krankheitsbilder hervorbringt: Er dringt ein mit der eingeatmeten Luft in die Lunge — Lungentuberkulose, oder er wird mit

der Nahrung aufgenommen — Darmtuberkulose, oder endlich er gelangt in Verwundungszellen — Lupus. Zweifellos ist der hauptsächlichste Infektionsstoff der Auswurf Lungenschwindsüchtiger, welcher gewöhnlich nicht vorsichtig entfernt wird und so Veranlassung zur Ansteckung vieler anderer Menschen werden kann. Wir sahen ja oben schon, daß die vegetativen Tuberkelbazillen imstande sind, kürzere Zeit hindurch widrige Vegetationsverhältnisse ohne Schaden zu überstehen, besonders eine gewisse Austrocknung zu ertragen. Tierversuche haben ergeben, daß man den meisten warmblütigen Tieren durch Verfütterung, durch Inhalation und Impfung die Krankheit übertragen kann, und es ist zweifellos, daß auch der Mensch in ähnlicher Weise befallen wird. Es muß deshalb auf das allerdringlichste darauf hingewiesen werden, daß der Auswurf Schwindsüchtiger mit der größten Vorsicht entfernt und unwirksam gemacht wird (etwa dadurch, daß der Auswurf in Flaschen entleert wird, welche mit fünfprozentiger Karbolsäure gefüllt sind), da jener, auf den Boden gelangt, sehr bald zerstäubt und dann die Ursache für die Ansteckung zahlreicher Menschen, besonders aber für die Angehörigen des Erkrankten, werden kann. Daß auch nach dem Obengesagten Milch und Fleisch perlsüchtiger, d. h. schwindsüchtiger Kälber gemieden werden muß, ist selbstverständlich, solange nicht der sichere Beweis geführt ist, daß die Krankheit des Rindviehes auf den Menschen nicht übertragen werden kann. Ist die Milch gekocht, so ist die Ansteckungsgefahr

natürlich geringer, da ja die Bakterien Siedehitze nicht zu überstehen vermögen; wohl aber muß darauf hingewiesen werden, daß Fleisch und Milch auch dann nicht ohne Gefahr genossen werden dürfen, da ja durch irgendwelche Zufälle doch einige Individuen dem Tode entgangen sein könnten.

Auf weitere wichtige Arten der Gattung *Bacterium*, so z. B. auf *B. pneumoniae* (Erreger der Lungenentzündung), *B. leprae* (*Leprabacillus*), *B. influenzae* (Keim der Influenza), *B. diphtheritidis* (Erreger der Diphtheritis) soll hier nicht näher eingegangen werden.

Die Gattung *Bacillus* unterscheidet sich dadurch von *Bacterium*, daß ihre Arten an ihrer ganzen Oberfläche mit zerstreuten Geißeln ausgerüstet sind.

Von den zahlreichen hierher gehörigen Arten sollen einige wichtige kurz geschildert werden.

*Bacillus subtilis*, der Heubazillus, kann fast als „indifferent“ bezeichnet werden, da er weder pathogen, noch chromogen ist und nur sehr schwache Gärungen hervorruft. Diese Art ist in mehrfacher Hinsicht von historischem Interesse. An ihr wurde zuerst durch F. Cohn die Sporenbildung und -Keimung beobachtet. Ferner wurde oben schon darauf hingewiesen, daß sie infolge ihrer Ähnlichkeit mit dem Milzbrandbazillus sehr viel zur Theorie von der Veränderlichkeit der Bakterienarten beitrug.

Der Heubazillus ist ein sehr beliebtes Probeobjekt für mannigfache Bakterienuntersuchungen. Denn einmal ist er völlig harmlos und gibt nie zu Erkrankungen Veranlassung, dann ist er außerordentlich genügsam und gedeiht auf den denkbar dürtigsten Nährböden, endlich zeigt er, wie oben schon angeführt wurde, eine auffallende Widerstandsfähigkeit der Sporen. Um Reinkulturen zu erhalten, übergießt man Heu mit Wasser, das man einen Tag lang stehen läßt und dann, um eventuellen Schmutz zu entfernen, ganz roh filtriert. Die abgegossene Flüssigkeit wird sodann in eine mit einem Wattepropf versehene Flasche gegossen und eine Stunde lang gekocht. Die meisten der außerordentlich zahlreichen in diesem Aufgusse enthaltenen Bakterien gehen samt ihren Sporen während des Kochens zugrunde, die Sporen des Heubazillus halten jedoch sehr gut aus und beginnen sofort nach erfolgtem Erkalten der Nährflüssigkeit mit dem Auskeimen. Es ist deshalb klar, daß man den so außerordentlich widerstandsfähigen Heubazillus sehr gern als Probeobjekt benutzt, um Desinfektionsapparate auf ihre Leistungsfähigkeit zu prüfen.

*Bacillus prodigiosus*, der sogen. Hostienpilz oder Blutwunderpilz, hat schon zu allen Zeiten viel von sich reden gemacht und rief besonders im Mittelalter abergläubische Vorstellungen hervor. Diese Art besteht aus kleinen, ovalen oder schmal eiförmigen Zellen, die bei genügendem Nährstoff sich außerordentlich schnell vermehren und einen grell karminroten oder blutroten Farbstoff ausscheiden. In der Auswahl der Nährstoffe ist diese Form nicht wählerisch und nimmt mit allerlei organischen Stoffen, wie Eiern, Milch, Rüben, gekochten Kartoffeln, Brot usw. vorlieb. Wenn der Pilz längere Zeit hindurch vegetiert hat, so produziert er Trimethylamin, einen nach Heringslake riechenden Stoff, dessen widerlicher Geruch alle befallenen Gegenstände völlig ungenießbar macht. Infolge des raschen Wachstums ist schon in sehr kurzer Zeit jedes bewohnte Nährsubstrat mit großen, blaßroten Flecken bedeckt, die eine etwas schleimige Beschaffenheit aufweisen. Daß dieser Spaltpilz in Massenkulturen auftreten kann, ist schon von manchen Stellen bekannt. Vor einigen Jahren machte er sich z. B. in Paris bemerkbar und rief eine „Blutkrankheit“ des Brotes hervor. Nachdem sich der Bazillus zuerst hier und da an Broten gezeigt hatte, trat er nach kurzem in kolossalen Mengen auf, die Brote wurden an einzelnen Stellen blutrot und gaben einen so widerlichen Geruch von sich, daß sie durchaus ungenießbar erschienen. Besonders feuchte, dumpfige Orte sind für das Wachstum dieses Spaltpilzes sehr geeignet, und so kann es uns

nicht wundern, daß er sich hier und da auch auf Hostien einstellte und das Volk in früheren Zeiten in Aufregung und Schrecken versetzte.

*Bacillus amylobacter* ist der Organismus, welcher die Buttersäure erzeugt. Er ist von allen zymogenen Bakterien dadurch ausgezeichnet, daß er nur bei Abschluß von Luft, besonders aber von Sauerstoff sich lebhaft zu entwickeln vermag. Die Buttersäuregärung wird vom *Bacillus amylobacter* in sehr verschiedenen Stoffen hervorgerufen, so in Stärkelösungen, Dextrin, Zuckerarten und sehr wahrscheinlich noch in anderen Kohlehydraten. Besonders häufig findet man diese Gärung in der Milch auftreten, wenn die Milchsäuregärung, durch das *Bacterium acidi lactici* hervorgerufen, vorüber ist. Diese beiden Bakterien ergänzen sich insofern ausgezeichnet, als der letztgenannte auf den in der Milch enthaltenen Sauerstoff angewiesen ist und ihn auch fast völlig verbraucht, so daß dann nachher der sauerstofffeindliche Buttersäurebazillus den besten Nährboden vorfindet. Während der Milchsäurebazillus der Milch eine angenehme Säure verleiht, erhält jene durch den Buttersäurebazillus einen merkbar bitteren Geschmack, was sich bei zu lange stehengelassener Sauermilch oft recht deutlich fühlbar macht.

*Bacillus typhi*, der Typhusbazillus, ist bisher nur als ein Parasit des Menschen bekannt geworden, und es gelang bisher noch nie, mit ihm Tierversuche anzustellen. Er ist der Erreger der furchtbaren Krankheit, welche als Unterleibstypus (*Typhus abdominalis*) bekannt und gefürchtet ist und sehr häufig zum Tode des Befallenen führt.

Der Typhusbazillus bildet ziemlich kleine, kurze Stäbchen, welche nur wenigmal länger als breit sind und häufig — in Kulturen — kurze, wenig-




Abb. 175. Typhusbazillus. Deckglaspräparat von einer vier Tage alten Kultur, gefärbt. (100mal vergrößert.) (Nach Migula.)

gliedrige Fäden bilden (Abb. 175). Besonders in jugendlichen Stadien sind die Einzelzellen sehr beweglich, und zwar geht diese Bewegung von einem Geißelbüschel aus, welches von einem Punkte an der Seite des Bazillus entspringt. Es gelang bisher noch nicht, Sporen desselben nachzuweisen. Er ist sehr leicht zu kultivieren und kommt auf den meisten Nährsubstraten fort, auf welchen er sehr charakteristische Kolonien bildet. Und doch ist der Typhusbazillus schwer zu erkennen, da er in der Gestalt sehr vielen anderen Formen nahesteht. Am leichtesten gelingt sein Nachweis auf Kartoffelkulturen, da er hier ein sehr charakteristisches Wachstum besitzt. Auf gekochten Kartoffeln entwickelt er sich nämlich sehr rasch und kann sehr leicht unter dem Mikroskop nachgewiesen werden, ohne daß durch ihn das Aussehen des Substrates auch nur im geringsten verändert würde.

Auffallend ist beim Typhusbazillus, daß sich die vegetativen Zellen außerordentlich widerstandsfähig erweisen und z. B. ein Austrocknen von mehreren Wochen unbeschadet zu ertragen vermögen. Es ist dies von großer Bedeutung für ihn, da er ja keine Sporen bildet und so im Kampfe ums Dasein viel schlechter ausgestattet ist als viele andere Bakterien.

Es ist zweifellos, daß der *Bacillus typhi* als „fakultativer Parasit“ anzusehen ist, da er sich sehr gut außerhalb des menschlichen Körpers in feuchter Erde, im Wasser und in der Milch zu vermehren vermag, gelegentlich aber in den Körper eindringt und dort sein gefährliches Wachstum fortsetzt. Man hat ihn bei Unterleibstypus stets angetroffen, und zwar tritt er hier besonders in der Milz, der Leber, den Darmzotten und den Mesenterialdrüsen auf, sehr selten dagegen in dem Blute der Erkrankten. Da das Tierexperiment — wie oben schon angeführt wurde — bei ihm nicht gelingt, so hat man ihn oft als alleinigen Erreger des Unterleibstypus bestritten; doch ist jetzt kaum oder nicht mehr daran zu zweifeln, da man ihn, wie gesagt, stets bei dieser Krankheit und nie bei anderen angetroffen hat.

Die Ansteckung erfolgt nur durch Aufnahme des Bazillus mit der Nahrung in den Verdauungskanal oder natürlich auch dadurch, daß bakterienhaltige Gegenstände mit den Lippen in Berührung kommen, z. B. Finger, welche vorher Wäsche oder Kleidung Erkrankter berührt haben. In manchen Fällen ist aber

auch schon der Beweis gelungen, daß Typhusepidemien durch das Trinkwasser, oft auch durch das Spülwasser herbeigeführt wurden. Man beobachtete anfangs, daß Gegenden eines Ortes, welche ihr Wasser einer bestimmten Wasserleitung oder einem bestimmten Brunnen entnahmen, epidemisch vom Typhus befallen wurden, während im übrigen Orte die Krankheit nicht oder nur sehr vereinzelt auftrat. Es lag also nahe, dem Wasser die krankheitserregenden Stoffe zuzuschreiben. Und es gelang in einzelnen Fällen auch wirklich, in dem verdächtigen Wasser den *Bacillus typhi* nachzuweisen. Daß es in sehr vielen anderen Fällen nicht gelang, kann uns nicht verwundern, wenn wir bedenken, wie leicht sich das Wasser erneuert und wie lange es oft dauerte, bis ein bestimmter Verdacht auftauchte. Endlich ist auch zu erwägen, daß in einer Wasserleitung sehr leicht nur eine bestimmte Menge bakterienhaltigen Wassers enthalten sein konnte, durch welches dann ein großer Teil derjenigen Personen erkrankte, die gerade zu der betreffenden Zeit davon tranken. Es ist bekannt, daß besonders in Kasernen der Typhus immer und immer wieder ausbrach, bis man endlich den alten Brunnen verließ und Wasser von neuen Brunnen bezog. Daß auch durch die Milch der Typhus verbreitet werden kann, ist zweifellos nachgewiesen. So berichtet Migula einen Fall, in welchem Milchgefäße in einem Grabenwasser gereinigt wurden, in welches Abgänge eines Typhuskranken beim Spülen der damit verunreinigten Wäsche gelangt waren. Da nun die Milch für den Typhusbazillus ein vorzüglicher Nährboden ist, so wucherte derselbe in der Milch sehr reichlich und verursachte auf diese Weise eine langandauernde Epidemie in dem betreffenden Orte, welche aber sofort aufhörte, als man die Ursache vermutete und zum Spülen der Gefäße anderes Wasser verwendete.

Die Gattung *Pseudomonas* unterscheidet sich von den Gattungen *Bacterium* und *Bacillus* dadurch, daß ihre Zellen mit polaren Geißeln versehen sind. Hierher gehört z. B. *Pseudomonas europaea*, der Erreger der Nitrifikation im Boden.

#### Familie **Spirillaceae**. Schraubenbakterien.

Zu dieser Familie stellt man die Bakterien von halbkreisförmiger bis schraubenförmig gewundener Gestalt der Zellen. Die Zellen sind geißellos oder durch polare Geißeln ausgezeichnet.

Die Arten der Gattung *Microspira* besitzen starre, nicht biegsame Zellen mit meist einzelnen polaren Geißeln.

Zu dieser Gattung gehören nur wenige Arten von allgemeinerer Bedeutung; eine Ausnahme macht jedoch *Microspira comma*, der Cholera-bazillus, ein Spaltpilz, der zu den furchtbarsten Schädlingen des Menschen gerechnet werden muß.

Der Cholera-bazillus ist bei uns nicht einheimisch; die Seuche wird nur von Zeit zu Zeit aus Indien, wo die Krankheit endemisch ist und in manchen Gegenden überhaupt niemals erlischt, zu uns überführt. Erst seit dem Jahr 1884 kennen wir den Erreger der furchtbaren Krankheit, welcher von Robert Koch damals auf einer Studienreise in Ägypten und Ostindien festgestellt wurde. Er besitzt die Form kleiner, leicht gebogener Stäbchen, welche meistens vereinzelt und frei voneinander vorkommen, in selteneren Fällen jedoch auch zu mehreren in Form einer Schraube vereinigt bleiben können (Abb. 176). Die Einzelzellen besitzen eine starre Membran und eine, seltener zwei bis drei polare, wellig gebogene Cilien, wodurch die Individuen auf dem Höhepunkt ihrer Entwicklung außerordentlich schnell sich bewegen.

Der Cholera-bazillus ist unter dem Mikroskop sehr schwierig zu erkennen, da zahlreiche ihm nahestehende Formen bekannt sind. In der Stiechkultur ver-



Abb. 176. Cholera-bazillen, etwa 1000mal vergr. (Nach Migula.)

flüssigt er die Gelatine nur in einem ganz dünnen Faden, während der nahestehende Erreger der sogen. Cholera nostras, welcher gewöhnlich als *Spirillum Finkleri* bezeichnet wird, in der gleichen Zeit einen breiten Gelatinetrichter verflüssigt. Ferner ist charakteristisch für den Cholera Bazillus, daß sich an der Mündung des bei einer Stiehkultur verflüssigten dünnen Trichters stets eine glänzendweiße Luftblase bildet, welche bei den Kulturen des *Spirillum Finkleri* fehlt.

Gegen Trockenheit ist der Cholera Bazillus außerordentlich empfindlich und vermag nicht einmal ein Austrocknen von einigen Tagen zu überstehen. Es wird dies klar, wenn man berücksichtigt, daß bisher bei diesem gefährlichen Lebewesen Sporen noch nicht nachgewiesen werden konnten und diese also sehr wahrscheinlich überhaupt fehlen. Aus diesem Grunde genügt es auch, Kulturen etwa eine halbe Stunde lang auf 60° zu erwärmen, um alle darin enthaltenen Cholera Bazillen zu töten.

Dafür ist aber auch das Wachstum der Zellen ein außerordentlich rasches und findet schon bei gewöhnlicher Zimmertemperatur statt. Doch sagt ihnen eine höhere Temperatur noch mehr zu und kann bei passenden Bedingungen ihre Vermehrung so erhöhen, daß gegen sie auf dem Nährsubstrat kein anderes Lebewesen aufzukommen vermag. In bezug auf die Nährstoffe ist der Cholera Bazillus sehr wenig wählerisch, und es ist deshalb kaum zu bezweifeln und gerade in der letzten Zeit vielfach bestätigt worden, daß er auch außerhalb des menschlichen Körpers zu vegetieren und sich wenigstens eine Zeitlang zu erhalten vermag.

Um krankheitserregend auftreten zu können, muß der Cholera Bazillus in den Darm des Menschen gelangen. Er muß also zu diesem Zweck den Magen passieren, ohne daß seine Lebenskraft durch die Magensäure geschädigt ist. Da wir nun wissen, wie wenig widerstandsfähig gerade dieser Bazillus ist, so leuchtet ein, daß nur verhältnismäßig außerordentlich selten einmal dieser Fall sich ereignet und daß ein guter Magen die beste Schutzvorrichtung gegen die Krankheit bildet. Ist dagegen die Verdauung eines Menschen gestört, befindet sich der Magen infolge irgend welcher Exzesse in anormalem, geschwächtem Zustande oder ist er überhaupt krank, so daß er seinen Funktionen nicht mehr ordentlich nachkommen kann, so sind die günstigen Verhältnisse für das Eindringen des Kommabazillus vorhanden.

Wenn man berücksichtigt, wie leicht eine Übertragung der Bakterien von Mensch zu Mensch stattfindet, so sind zweifellos beim Auftreten der Seuche die besten Mittel gegen diese: peinlichste Reinlichkeit, eine mäßige Lebensweise und das Vermeiden des Genusses ungekochter Nahrungsmittel. Man könnte vielleicht annehmen, daß gerade bei dieser Krankheit eine Übertragung der Bakterien aus Dejektionen Kranker nach dem Munde anderer Individuen nur sehr selten stattfinden möchte. Doch vergegenwärtigt man sich dabei nicht die wirkliche Sachlage. Denn es ist kaum zu vermeiden, daß Leute, welche sich mit Kranken beschäftigen, vielleicht unwillkürlich ihre Hände zum Munde führen, welche vorher den Kranken berührt haben. Und daß infolge einer solchen Berührung Mengen von Bakterien von der durch Dejektionen des Kranken unreinigten Wäsche oder vom Körper selbst an die Hände des Wärters gelangen können, ist gewiß selbstverständlich. Es ist ferner auch sehr wahrscheinlich, daß die Krankheit durch Wasser, Milch und andere Nahrungsmittel verbreitet wird, weiter, daß auch bei der Verbreitung die Fliegen und Mücken eine sehr wichtige Rolle spielen, welche die Bakterien vom Kranken aufnehmen und sie auf scheinbar sicher aufbewahrte Lebensmittel bringen. Daß die Cholera durch die Luft verbreitet wird, ist nicht wahrscheinlich und kann so gut wie verneint werden. Denn wir sahen ja, daß der Cholera Bazillus ganz außerordentlich empfindlich gegen Austrocknen ist und nur sehr kurze Strecken durch den Wind verweht werden könnte, ohne abzusterben. Sehr charakteristisch für die Ausbreitung der Krankheit ist jedoch, daß Leute, die mit Wasser zu tun haben, welches leicht Bakterien von Kranken enthalten kann, auch stets am meisten von der Seuche zu leiden haben, nämlich vor allem Schiffer und Wäscherinnen, erstere, die in gleicher Weise ihre Dejektionen in die Flüsse zu entleeren und andererseits daraus wieder ihr Trinkwasser zu entnehmen gewohnt sind, letztere, welche beim

Waschen nicht wissen können, ob die Wäsche von Gesunden oder von Kranken stammt. Gerade durch die Wäsche von Cholerakranken wird zweifellos die Seuche häufig weiter verbreitet, und es ist deshalb gerade für diesen Punkt sorgfältigste Desinfektion am Platze, welche bei uns glücklicherweise durch die Behörde streng ausgeführt wird. Es hat sich stets gezeigt, daß diese gefürchtete Krankheit an einem Orte nicht aufkommen kann, wo rechtzeitig, ehe die Seuche eine weitere Verbreitung erhalten hat, für vorsichtigste Desinfektion aller der Gegenstände gesorgt wurde, welche aus Seuchengegenden Zugereiste berührt hatten.

Die Gattung *Spirillum* umfaßt Bazillen von schraubig gewundener Zellform, welche sich von *Microspira* hauptsächlich durch die Büscheln von Geißeln an beiden Polen unterscheiden.

Zu *Spirochaete* stellt man Arten mit schlangenartig biegsamen Zellen und schlangenartiger Bewegung.

Hierher gehört z. B. *Spirochaete Obermeieri*, der Erreger des Rückfalltyphus (Abb. 177). Diese Form stellt sich dar als ziemlich lange, mehrfach schraubenförmig gewellte Fäden, welche eine sehr lebhaft bewegte Bewegung zeigen. Man hat sie bisher nur im Blut der an Rückfalltyphus Erkrankten nachweisen können; es gelang noch nicht, den Spaltpilz in irgend einem Nährsubstrat zu kultivieren. Sehr auffallend ist das Auftreten dieser Art. Sie findet sich nämlich nur dann im Blut der periodisch Erkrankten, wenn bei diesen das Fieber auftritt; sie ist dann geradezu massenhaft vorhanden, wenn das Fieber seinen Höhepunkt erreicht hat, läßt sich dagegen in der fieberfreien Zeit überhaupt nicht nachweisen. Man nimmt als Erklärung für dieses auffallende Verhalten an, daß beim Blutkreislauf die meisten *Spirochaeten* von der Milz aufgenommen und dort auf irgend eine Weise zerstört werden, daß aber offenbar noch einige zurückbleiben müssen, welche dann später nach erfolgter starker Vermehrung einen neuen Fieberanfall hervorrufen.

*Spirochaete pallida* ist neuerdings als Erreger der Syphilis bekannt geworden.



Abb. 177. Der Erreger des Rückfalltyphus (*Spirochaete Obermeieri*).  
(Nach Migula.)

#### Familie **Chlamydobacteriaceae**. Scheidenbakterien.

Fadenförmige, von mehr oder weniger deutlich sichtbarer Gallertscheide umgebene, Kolonien bildende Zellen, welche sich nur selten nach drei Richtungen des Raumes teilen und dadurch körperförmige Kolonien bilden.

Die zu dieser Familie gehörige Gattung *Crenothrix* enthält nur eine Art, *Crenothrix polyspora* (Abb. 178, b), welche sich infolge ihrer ungeheuer schnell erfolgenden Vermehrung schon oft sehr unangenehm bemerkbar gemacht hat. Diese Art bildet unverzweigte Zellfäden, deren Zellen sich anfangs nur nach einer Richtung des Raumes teilen, später jedoch nach drei Richtungen des Raumes. Darauf runden sich die Teilungszellen ab und werden zu Vermehrungszellen. Die einzelnen Fäden, welche nur wenige Millimeter Länge erreichen, setzen sich in Büscheln an vom Wasser berieseltem Holz, an Mauern und Röhren fest und vermögen sich unter noch nicht völlig geklärten, für sie günstigen Bedingungen so auffallend zu vermehren, daß Gräben dicht erfüllt und Wasserleitungsröhren völlig ver-

Schule der Pharmazie IV. 5. Aufl.




Abb. 178. a *Beggiatoa alba*,  
b *Crenothrix polyspora*.

stopft werden können. Noch schlimmer ist die Anwesenheit dieser Art, wenn sie abzusterben beginnt, denn sie bringt dann einen so widerlichen Geruch hervor, daß das Wasser vollständig ungenießbar wird. Es ist deshalb verständlich, daß das Auftreten dieser Art in den Wasserleitungen großer Städte schon zu wahren „Wassersnöten“ geführt hat.

**Sphaerotilus dichotomus** (= *Cladothrix dichotoma*) tritt in der Gestalt kleiner, in der Jugend festsitzender Fäden auf. Diese Art kommt in Sumpfwässern sehr häufig vor; sie vermehrt sich sehr stark und sammelt sich besonders an der Wasseroberfläche an, wo sie die bekannten auffallenden Kahmhäute bildet.

#### Familie **Coccaceae**. Kugelbakterien.

Die zu dieser Familie gehörigen Bakterien besitzen kugelige Zellen, welche sich vor der Teilung nicht in die Länge strecken. Die Zellteilung erfolgt nach einer, nach zwei oder aber nach drei Richtungen des Raumes. Die Zellen leben frei oder in Kolonien locker vereinigt. Sie besitzen nie Geißeln, zeigen deshalb auch keine Bewegung.

**Streptococcus pyogenes** ist ein gefährlicher Eitererreger, dessen Zellen meist eine Anordnung in perlschnurartige Reihen zeigen. Er dringt sehr oft von den Infektionsstellen in die Lymphbahnen weiter vor und bringt starke Entzündungen hervor, ja er greift nicht selten edlere Teile an und kann dann sogar den Tod herbeiführen, so z. B. beim Kindbettfieber.

**Streptococcus mesenterioides**, früher auch *Leuconostoc mesenterioides* genannt, ist der sogen. Froschlaichpilz (Abb. 179). In passenden Nährsubstraten entwickelt er sich ganz überraschend schnell: aus wenigen Zellen sind bald gallertige Klümpchen entstanden, und nach kurzer Zeit ist das ganze Kulturgefäß von einer schleimig-gallertigen Masse erfüllt. Bei mikroskopischer Betrachtung läßt sich zeigen, daß die verhältnismäßig kleinen, runden Zellen in mächtigen, dickwurstartigen Gallertscheiden eingebettet liegen. Früher war dieser Pilz besonders in Zuckerfabriken sehr gefürchtet, da er sich hier und da einzustellen pflegte, in kürzester Frist alle zuckerhaltigen Stoffe zerstörte und die befallenen Behälter vollständig ausfüllte, ja sogar oft die Abwassergräben verstopfte. Der Froschlaichpilz ist der Verursacher der Dextrangärung.




Abb. 179. Der Froschlaichpilz (*Streptococcus mesenterioides*), 1000mal vergrößert. (Nach Migula.)

Diese geht mit solcher Schnelligkeit vor sich, daß eine dünne Schicht des Froschlaichpilzes an den Wänden eines Bottichs genügt, um in einem halben Tage 50 hl einer 12% Zucker haltenden Melasselösung in eine Gallertmasse zu verwandeln, wobei die Gallertbildung hauptsächlich auf Kosten des Zuckergehalts erfolgt.

Die Gattung *Micrococcus* enthält zahlreiche wichtige Arten zymogener, chromogener und pathogener Natur (*M. gonorrhoeae*, Erreger der Gonorrhoea, *M. vaccinia*, wirksamer Bestandteil der Pockenlymphe), auf welche hier jedoch nicht näher eingegangen sein soll.

**Sarcina ventriculi**, der Paket-Spaltpilz (Abb. 165), besitzt eine eigenartige Gestalt. Er findet sich häufig im Magen Magenleidender, ohne daß er die Ursache der Krankheit zu sein scheint. Die Annahme hat zum mindesten sehr viel Wahrscheinlichkeit für sich, daß er erst dann auftritt, wenn ihm andere Bakterien den Boden vorbereitet haben. Charakteristisch ist die Art dadurch, daß ihre Zellen sich nach drei Richtungen des Raumes teilen und in eigentümlich warenballenartigen Anhäufungen vereinigt bleiben.

2. Reihe. **Thiobacteria.**

Zellen mit Schwefelein schlüssen, farblos oder durch Bakterio-  
purpurin rot oder violett gefärbt.

Familie **Beggiatoaceae.**

Durch undulierende Membran bewegliche, fadenförmige, unbe-  
scheidete Kolonien bildende Zellen, welche Schwefelkörnchen ent-  
halten.

Die Arten der Gattung *Beggiatoa* (Abb. 178, a) treten besonders häufig  
in schwefelhaltigem Wasser auf, fehlen auch meist nicht in Abwässern von  
Fabriken. Charakteristisch ist für sie, daß sie in stande sind, Schwefelverbin-  
dungen zu zersetzen und dadurch den bekannten Schwefelwasserstoffgeruch,  
d. h. den Geruch nach faulen Eiern, in Schwefelquellen hervorzurufen. Im  
Innern der Zellen finden wir stets feine, stark lichtbrechende Körnchen aufge-  
speichert, die als reiner Schwefel erkannt worden sind.

Familie **Rhodobacteriaceae.**

Der Zellinhalt der hierher gehörigen Spaltpilze ist durch den  
Farbstoff Bakteriopurpurin rosa, rot oder violett gefärbt, ferner sind  
in jenem Schwefelkörnchen enthalten.

*Lamprocystis roseopersicina* ist ein Spaltpilz, der sich häufig in  
Sümpfen und Gräben findet und dem Wasser derselben einen auffallend rosa-  
violetten Farbenton verleihen kann.

## 2. Klasse.

**Schizophyceae (auch Cyanophyceae, Phycchromaceae  
genannt). Spaltalgen.**

Die Spaltalgen entsprechen in Bau und Vermehrung den Spalt-  
pilzen. Ihre Zellen enthalten jedoch den Farbstoff *Phycocyan*,  
welcher mit *Chlorophyll* gemischt das *Phycochrom* bildet  
und den Individuen eine spangrüne, blaugrüne, seltener rote oder  
violette Färbung verleiht.

Ihre Vermehrung erfolgt durch fortgesetzte Zweiteilung; häufig  
werden auch ungeschlechtliche Dauersporen gebildet. Die Zellen sind  
häufig von Gallertscheiden umgeben. — Die hierher gehörigen Arten  
spielen im Haushalte der Natur meist nur eine untergeordnete Rolle  
und sollen deshalb nur kurz besprochen werden.

Familie **Oscillatoriaceae.**

Zu dieser Familie stellt man Individuen, welche aus geldstück-  
artigen oder scheibenförmigen Zellen bestehen; diese sind stets zu  
einfachen, unverzweigten Fäden verbunden. Die Fäden besitzen  
meist die Gestalt von Geldrollen und sind fast immer von einer  
mehr oder weniger dicken Gallertscheide umgeben. Eine ganz be-  
sonders charakteristische Eigenschaft der Arten dieser Familie, wo-  
her letztere auch ihren Namen erhalten hat, ist die auffallende

Eigenbewegung der Fäden. Diese gleiten nämlich stets langsam hin und her, indem unter einer fortgesetzten Drehung um ihre Längsachse die leicht gewundenen Enden pendelartig von einer Seite zur anderen schwingen. Ihre vegetative Vermehrung erfolgt häufig in der Weise, daß Stücke der Fäden durch ihre selbständige Bewegung in der Gallertscheide sich aus dem Fadenverbande lösen und zu-

letzt auch die Scheide selbst verlassen. Nachdem sie frei geworden sind, beginnen die Zellen dieses Teilfadens (Hormogonium) sich sehr lebhaft zu teilen und wachsen bald zu einem neuen Faden aus.

Die vegetativen Zellen besitzen eine ungewöhnliche Widerstandsfähigkeit; sie können eintrocknen, ja sogar einfrieren, ohne in ihrer Vegetationstätigkeit gestört zu werden. Besondere Dauerzellen kommen deshalb nicht vor.

Zu dieser Familie gehört z. B. die Gattung *Oscillatoria* (Abb. 180, b), welche über die ganze Erde mit sehr zahlreichen Arten verbreitet ist und sich auf feuchter Erde und besonders in schmutzigen Pfützen, Rinnsteinen, Ab-




Abb. 180. a Eine Nostoc-Kolonie, von einer Gallertkugel umgeben. h Heterocysten; b Stück eines *Oscillatoria*-Fadens. Stark vergrößert.

wässern überall findet. Häufig trifft man die *Oscillatoria*-Arten auch in heißen Thermalwässern an. In manchen Fällen sind sie durch einen eigenartig unangenehmen, modrigen Geruch ausgezeichnet.

#### Familie **Nostocaceae.**

Hierher werden zu fadenförmigen, unverzweigten Kolonien vereinigte Individuen gestellt, deren Zellen eine deutliche Kugelform aufweisen (Abb. 180, a). Die Kolonien besitzen eine sehr charakteristische, perlschnurartige oder rosenkranzförmige Gestalt. In den Fäden treffen wir hier und da einzelne größere Zellen, die Grenz-zellen (Heterocysten), welche im Gegensatz zu den normalen vegetativen Zellen von gelblicher Farbe sind und nie die Fähigkeit, sich zu teilen, besitzen. Außerdem finden wir bei der Familie Sporen entwickelt, Dauerzellen, welche dadurch entstehen, daß gewöhnliche vegetative Zellen an Größe mehr oder weniger zunehmen und eine dicke Wandung erhalten. Infolge dieses Schutzes sind die Sporen imstande, der Kälte des Winters und den im Sommer häufig erfolgenden Austrocknungen ihrer Standorte erfolgreich Widerstand zu bieten.

Bei den meisten Arten der Familie wird Gallerte ausgeschieden, und zwar in solcher Menge, daß die Zellfäden zu vielen in der bis zur Größe eines Apfels anschwellenden, strukturlosen Gallertmasse eingebettet liegen. Diese Kugeln schwimmen zum Teil an der Wasseroberfläche, teils sitzen sie anderen Pflanzen an.

Eine der häufigsten Arten, *Nostoc commune*, kommt oft auf feuchtem Boden vor und ist bei Feuchtigkeitsanwesenheit mit unbewaffnetem Auge leicht zu erkennen, da die Gallertmassen bis handgroß werden und unregelmäßig hinartig gefaltet sind. Tritt jedoch Trockenheit ein, so schrumpft die Gallerte zusammen, und von den Kolonien ist kaum noch etwas wahrzunehmen. Auf der anderen Seite genügt aber auch ein Regenguß, um die auffallenden Körper in ihrer ganzen Größe wieder herzustellen, und dieser Umstand hat beim Volke in vielen Gegenden zu dem Märchen vom Gallertregen oder Froschlaichregen geführt. — Viele Nostocaceen gehören zu den „Wasserblüte“ erregenden Organismen, die zeitweise in Seen eine Massenvegetation bilden. *Aphanizomenon flos aquae* tritt z. B. oft so massenhaft auf, daß sie ganzen Seen eine spanngrüne Färbung und ölfarbenartige Beschaffenheit verleiht.

#### Familie **Chroococcaceae.**

Zu dieser Familie bringt man die Formen, deren Zellen eine rundliche, kugelige oder geldstückartige Gestalt besitzen. Die Zellindividuen leben einzeln oder sie sind durch eine Gallertausscheidung zu sehr verschiedenartigen Kolonien — jedoch nie fadenförmigen — vereinigt.

Sehr interessant ist die Art und Weise der Teilung. Bei einzelnen Arten, wie z. B. bei *Gloeothece* und *Aphanothece*, teilen sich die Zellen stets nur nach einer Richtung des Raumes, und die so gebildeten Individuen trennen sich bald voneinander. Bei anderen Gattungen dagegen, wie z. B. bei *Merismopedia*, finden wir eine Teilung nach zwei Richtungen des Raumes, und da hier die Einzelindividuen in einer Gallerte eingebettet liegen, so erhalten wir tafelförmige Kolonien. Wieder andere Formen teilen sich nun aber sogar nach drei Richtungen des Raumes, d. h. wir erhalten bei fortgesetzter Teilung und bei reichlicher Gallertausscheidung Kolonien von kugelig oder sogar ziemlich streng würfelförmiger Gestalt, so z. B. bei *Gloecapsa* und *Chroococcus*.

Sämtliche Arten dieser Familie findet man auf feuchter Erde, an feuchten Baumstämmen und besonders häufig in stehendem Wasser.

## II. Abteilung.

### Phytosarcodina, Myxothallophyta, Myxomycetes. Schleimpilze, Pilztiere.

Die hierher gehörigen Formen bilden einen Übergang zwischen dem Pflanzen- und dem Tierreich und werden auch noch häufig dem Tierreiche zugerechnet. Sie sollen im folgenden ziemlich ausführlich abgehandelt werden, da sie allen übrigen Vertretern der Pflanzenwelt recht schroff gegenüberstehen und ihre Lebensverhältnisse von großem morphologischem Interesse sind.

Die Schleimpilze sind chlorophyllfreie, d. h. nicht grün gefärbte Organismen, welche während ihres vegetativen Zustandes aus nackten, membranlosen Zellen bestehen und während dieser Zeit stets die Fähigkeit besitzen, sich zu bewegen. Eine geschlechtliche Fortpflanzung fehlt ihnen meist, dagegen finden wir bei ihnen eine sehr reichliche ungeschlechtliche Vermehrung. Diese erfolgt durch Vermehrungszellen, Sporen, welche frei oder in geschlossenen Behältern gebildet werden. Bei der Keimung der Sporen tritt ihr Protoplasma entweder als ein „Schwärmer“ oder als ein amöboider Körper her-




Abb. 181. A Sporen und Keimung von *Comatricha nigra*. B Schwärmer von *Didymium serpula*. C Amöben von *Fuligo septica*. D kleines Plasmodium derselben. E ausgebildetes Plasmodium von *Didymium serpula*. F ein Teil eines Plasmodiums von *Didymium granulatum*.  
(Nach Schröder in Natürl. Pflanzenfam.)

vor, oder aber er erweist sich erst als Schwärmer, um dann später zu einem amöboiden Körper zu werden. Dieser vermehrt sich sehr lebhaft durch fortgesetzte Zweiteilung und tritt mit den aus anderen Sporen ausgetretenen Protoplasmanengen in Vereinigung, wodurch größere Plasmaansammlungen, sogen. Plasmodien, entstehen. Diese bewegen sich, geradeso wie die einzelnen amöboiden Körper, längere Zeit in eigenartig kriechender Weise fort, bis sie zum Vermehrungsakt schreiten und Sporen hervorbringen, die den Winter oder ungünstige Vegetationsperioden ohne Schaden zu überdauern vermögen.

Es sei hier ein Schleimpilz geschildert, welcher häufig in sehr auffallender Form auftritt, die sogen. Lohblüte (*Fuligo septica*), da ohnedies die soeben gegebene Charakteristik der Abteilung für den Anfänger kaum verständlich sein dürfte, auch manche Punkte

hier erörtert werden können, die bei der Besprechung der Thallophyta immer und immer wiederkehren (vergl. im folgenden Abb. 181).

Die derbwandigen Vermehrungszellen, die Sporen der Lohblüte, besitzen die Fähigkeit, bei geschützter, trockener Aufbewahrung mehrere Jahre hindurch ihre Keimkraft zu bewahren. Gelangen sie jedoch dann, eventuell auch schon bald nach der Bildung, unter günstige Vegetationsverhältnisse, d. h. ist ihnen genügend Feuchtigkeit und Wärme geboten, so keimen sie. Hierbei nimmt das Protoplasma der Spore reichlich Wasser auf, schwillt dadurch stark an und sprengt die Wandung. Darauf verläßt das Plasma die Sporenwandung und stellt ein winziges, nur mit starken Mikroskopvergrößerungen wahrnehmbares, hautloses Klümpchen dar, welches befähigt ist, seine äußere Gestalt zu verändern. Bald nach erfolgter Keimung nimmt das Plasmaklümpchen eine ungefähr wurstförmige Gestalt an; das vordere Ende, in dem der Zellkern liegt, läuft spitz aus und endet in einen langen, dünnen Faden, die Geißel oder Cilie, das hintere Ende ist abgerundet: wir haben das Schwärmstadium der Myxomyceten vor uns, die sogen. *Myxomonaden*. Man sieht unter dem Mikroskop, daß sich diese Protoplasmaegebilde, die Myxomonaden, im Wasser rasch zu bewegen vermögen, indem sie, die starkschlagende Geißel voran und ihren Plasmaleib stark biegend, schnell dahinschwimmen oder, wenn weniger Feuchtigkeit vorhanden ist, mehr hüpfend oder sogar fast kriechend ihre Lage verändern. Sie vermehren sich lebhaft durch fortgesetzte Zweiteilung und sind befähigt, sich längere Zeit hindurch aus den in der umgebenden Flüssigkeit enthaltenen Nährstoffen zu ernähren.

Allmählich wird jedoch ihre Bewegung langsamer, und zuletzt kommen die Myxomonaden ganz zur Ruhe. Die Geißel wird in den Protoplasmakörper eingezogen, der Körper selbst rundet sich mehr oder weniger ab und aus den Myxomonaden wird jetzt allmählich der Zustand der sogen. *Myxamöben*. Auch diese zeigen eine deutliche Ortsänderung, welche durch eine Art von Kriechen erfolgt, in der Weise, daß an einer oder mehreren Stellen Plasmafortsätze, die sogen. *Pseudopodien* (= Scheinfüße) erscheinen, in welche allmählich das gesamte Plasma hineinwandert, worauf dann wieder neue Ausstülpungen ausgeschiedt, andere eingezogen werden und dadurch der Plasmakörper willkürlich vorwärts bewegt wird. In dieser Weise leben die Myxamöben eine Zeitlang selbständig fort, indem sie sich durch fortgesetzte Zweiteilung in der Mitte lebhaft vermehren.

In ein drittes Stadium tritt die Lohblüte dann, wenn die Myxamöben ihre Zweiteilung einstellen. Wir sehen dann, wie die vereinzelt Protoplasmakörper allmählich zu mehreren miteinander zu verschmelzen beginnen. Die dadurch entstandenen größeren Plasmaportionen verlieren ihre Bewegungsfähigkeit nicht, sondern verändern, ganz wie früher die Myxamöben, durch ihre Pseudopodien ständig ihre Lage. Wenn auf dieser langsamen Wanderung andere derartige Plasmaportionen angetroffen werden, so verschmelzen dieselben miteinander, und wir erhalten allmählich größere, dem bloßen Auge deutlich sichtbare, flache Plasmaklumpen, die sogen. *Plasmodien*. Diese Plasmodien bilden zusammenhängende Massen von weicher, rahmartiger Beschaffenheit und bestehen aus einer wasserhellen Grundsubstanz, in welche Plasmakörnchen, Fetttropfchen und Kalkkörnchen eingebettet sind und in der wir noch deutlich die zahlreichen Zellkerne der Einzelamöben erkennen, aus denen sich das komplizierte Gebilde des Plasmodiums zusammensetzt.

Dieser Plasmodiumzustand, d. h. dasjenige, was man gewöhnlich als „Lohblüte“ bezeichnet, stellt den Hauptlebenszustand der Myxomyceten dar, da sie längere Zeit in demselben beharren. Die schleimige Masse ist in ständig fortschreitender Bewegung, indem sich ihre lang ausgezogenen, oft aderartig verzweigten Stränge auf der Oberfläche oder im Inneren der Haufen von Gerberlohe hinziehen, sich immer wieder verästeln, netzförmig miteinander in Zusammenhang treten und oft langgestreckte, sehr verschieden dicke Äste bilden, die viele Centimeter lang werden können. In diesen Strängen findet man stets nicht unbedeutende Massen von kohlenurem Kalk abgelagert, ferner auch chromgelbe Farbstoffe, wodurch die Plasmodien so auffallend werden und sich von der dunkleren Lohe scharf und deutlich abheben.

Nachdem nun die Lohblüte längere Zeit im Plasmodienzustand gelebt und eine Art von Reife erlangt hat, schreitet sie, vielleicht hauptsächlich durch äußere Bedingungen beeinflusst, zur Vermehrung, resp. Sporenbildung.

Diese Sporenbildung erfolgt, nachdem sich die ersten Anfänge gezeigt haben, sehr rasch. Die Plasmodien treten in diesem Stadium aus dem Inneren der Lohhaufen an die Oberfläche derselben und bilden dicke, korallenartig verzweigte und zu einem anastomosierenden Netzwerk verbundene Stränge, die in ihrer Gesamtheit oft mehr als faustgroße, anfangs schleimige Körper bilden. Sehr bald differenziert sich in diesen Plasmaklumpen der äußere Teil zu einer dicken, strukturlosen, festen Hülle, welche das innere weiche Plasma umschließt.




Abb. 182. Fruchtkörper verschiedener Myxomyceten (A, D, E, G, J) mit Haargeflecht oder Capillitium (B, C, F, H) und Sporen (I, F, H). (Nach Schröder in Natürl. Pflanzenfam.)

In letzterem bilden sich sehr zahlreiche, kleine, von einer dünnen Haut umgebene, mit kernreichem Plasma angefüllte Kammern, die Sporangien. Nachdem sich dann die Kerne dieses Plasmas durch Zweiteilung noch sehr ansehnlich vermehrt haben, zerfällt dasselbe durch gleichzeitige reichliche Teilung in sehr zahlreiche, winzige Portionen, welche sich, nachdem sie sich abgerundet haben, mit einer starken Membran umgeben und so zu dicht nebeneinander liegenden Vermehrungszellen, Sporen, werden. Ein Teil des Plasmas der Sporangien jedoch, welcher zwischen den Kernen liegt, macht eine Art von Erstarrungsprozeß durch und wird zu einem fädig-netzartigen, stark entwickelten Gerüst, dem Capillitium oder Haargeflecht (vergl. Abb. 182). In letzteres werden, ebenso wie in die übrigen Teile der Wandungen, die in den Plasmodien in großen Mengen vorhandenen Kalkmassen abgelagert.

Mit der Bildung der Sporen ist der Lebenscyklus der Lohblüte abgeschlossen. Jene können lange Zeit hindurch in diesem latenten Zustand verharren, bis unter günstigen äußeren Bedingungen das Plasma der Sporen wieder austritt und nach Schwärmer- und Amöbenstadium zum Hauptlebenszustand, der Plasmodienbildung, schreitet.

Diese soeben ausführlich besprochene Art, *Fuligo septica*, die Lohblüte, gehört zu den *Myxogasteres*, einer Klasse der Myxo-

thallophyta, welche weitaus die meisten bisher bekannten Arten dieser eigenartigen Lebewesen umfaßt. Sie sind sämtlich Saprophyten, d. h. sie leben auf abgestorbenen und vermodernden Pflanzenteilen. Keine derselben besitzt größere praktische Bedeutung.

Dagegen soll noch kurz eine Art besprochen werden, welche zu der Klasse der **Plasmodiophorales** gehört. Alle hierher gehörigen Formen — nur wenige sind bisher bekannt — sind Parasiten in lebenden Pflanzenzellen.

Bei der Keimung der Spore tritt ein Schwärmer aus, der dann zur Amöbe wird und zuletzt mit anderen zusammen ein echtes Plasmodium bildet, welches dem der Lohblüte gleicht. Bei der Sporenbildung zerfällt jedoch das ganze Plasmodium durch fortgesetzte Zweiteilung in zahlreiche Portionen, die sich sodann mit Membran umgeben und so zu Sporen werden. Diese liegen entweder frei in der Nährzelle und füllen dieselbe fast ganz aus oder sie lagern sich in Gruppen zusammen.

Von den hierher gehörigen Formen kommt für uns nur **Plasmodiophora Brassicae** in Betracht, ein gefährlicher Parasit der Kohlgewächse, welcher über ganz Europa und Nordamerika verbreitet ist und die in Deutschland gewöhnlich als „Kohlkropf“ oder „Kohlhernie“ bezeichnete Krankheit hervorruft. Man erkennt die Krankheit daran, daß die Nebenwurzeln der infizierten Kohlpflanzen sich stark verdicken und mit unregelmäßigen, wurst- oder knollenförmigen Auftreibungen versehen sind. Auch die Hauptwurzel wird von den Parasiten befallen und aufgetrieben, jedoch nicht so stark wie die Nebenwurzeln. Sehr häufig kommt es dann vor, daß infolge der Infektion nach kurzer Zeit das Wurzelwerk der Kohlpflanze ganz die Form einer verkrüppelten Hand annimmt, wobei die rübenförmige Hauptwurzel ungefähr der Handfläche, die angeschwollenen Nebenwurzeln den Fingern gleichen, woraus sich auch manche der Benennungen der Krankheit in anderen Sprachen (belgisch: vingerziekte oder maladie digitoire) erklären. Sehr bald fangen die kranken Wurzeln zu faulen an, und selbstverständlich leidet darunter die ganze Pflanze mehr oder minder, so daß sie sogar häufig ganz zum Absterben gebracht wird. Da die Krankheit sehr ansteckend und gefährlich ist, so sind schon mehrmals in einzelnen Gebieten, besonders in Rußland, förmliche Epidemien unter den Kohlpflanzen bekannt geworden.

### III. Abteilung.

#### Flagellatae.

Mikroskopisch kleine, geißeltragende, pilz- oder algenähnliche Körper.

Diese Abteilung kann hier übergangen werden, da zu ihr keinerlei praktisch wichtige Arten gehören.

## IV. Abteilung.

## Dinoflagellatae (Peridineae). Peridineen.

Die Peridineen sind winzige, einzellige Lebewesen, welche mit Membran versehen sind. Sie sind besonders dadurch charakterisiert, daß um ihren Zellkörper eine furchenartige Einschnürung, die Querfurchen, ringförmig herumläuft, welche von einer zweiten Furche, der Längsfurche, senkrecht durchschnitten wird. Nur bei wenigen Formen fehlt dies Merkmal; dagegen finden wir bei allen Arten eine Einrichtung, welche mit der Furchenbildung im engsten Zusammenhang steht, nämlich Bewegungsorgane von auffallender Anordnung, wie wir sie sonst bei keiner Gruppe des Pflanzenreiches antreffen. Die Peridineen

besitzen nämlich durchweg zwei Geißeln, deren eine in der Längsrichtung der Zelle getragen und dabei meist in der Längsfurche geschützt wird, während die andere sich entsprechend der Querfurchen im Kreise um den Zellkörper herumlegt und wellenförmige Bewegungen ausführt (Abb. 183).




Abb. 183. Plankton-Peridineen.  
A *Ceratium tripos*. B *Peridinium divergens*. Sehr stark vergrößert. (Nach Schütt.)

eigenartiges zentrifugales Dickenwachstum, wodurch Membranplatten in der Form poröser Lamellen gebildet werden. Auf diese sind nach außen oft hervorragende Verdickungsleisten aufgesetzt, welche in manchen Fällen sehr bedeutende Dimensionen annehmen und den einzelnen Arten abenteuerliche Gestalten verleihen können.

Weitaus die meisten Peridineen besitzen gelbe Chromatophoren, welche von plattenförmiger Gestalt sind und infolge ihres Chlorophyllgehaltes diese Formen zur Assimilation befähigen, d. h. ihnen ermöglichen, unter dem Einfluß des Lichtes aus den ihnen in ihrem Lebenslement, dem Meere, nie fehlenden Substanzen Wasser und Kohlensäure organische Substanzen zu schaffen.

Über die Fortpflanzungsverhältnisse der Arten dieser Familie sind wir noch nicht in allen Punkten genau unterrichtet. Wir kennen dagegen gut die ungeschlechtliche Vermehrung, welche durch fortgesetzte Zweiteilung der Individuen erfolgt. Nur sehr selten findet die Teilung während des Umherschwärmens statt; meist geht ihr ein kürzer oder länger andauernder Ruhezustand voraus.

Die Membran der Peridineen ist unverkieselt. Sie besitzen ein

Die Peridineen sind deshalb von großer Wichtigkeit, weil sie einen großen Bruchteil des Planktons darstellen, d. h. derjenigen Pflanzen, welche die Flora des hohen Meeres ausmachen und dort auch allein das Leben der Tiere ermöglichen. Bei den Bacillariophyta soll hierüber eingehender berichtet werden. Manche der Peridineen sind auch am Meeresleuchten beteiligt.

### V. Abteilung.

### Bacillariophyta. Diatomeen. Kieselalgen.

Die Diatomeen sind durchweg winzige, mikroskopische, einzellige Lebewesen, deren Protoplasmakörper von einer Zellmembran umhüllt wird. Diese Membran besteht aus einer celluloseartigen Grundsubstanz; in ihr ist jedoch — dies ist für die Diatomeen charakteristisch — so viel Kieselsäure eingelagert, daß sie starr und panzerähnlich wird. Wird der Zellkörper der Diatomeen geglüht, so bleibt ihre Form deshalb unverändert erhalten: die Cellulose verbrennt zwar, dafür bleibt aber das Kieselgerüst zurück,




Abb. 184. Diatomeen: a *Surirella gemma*, b *Seoliopleura Jenneri*, c *Amphiprora paludosa*, sämtlich stark vergrößert.

und nun treten die Struktureigentümlichkeiten der Zellhülle, zarte Rinnen oder hervorragende Leisten (Abb. 184), nur um so deutlicher hervor. Eine solche verkieselte Membran finden wir auch noch bei anderen Klassen des Pflanzenreiches, z. B. bei den Schachtelhalmen; bei den Diatomeen kommen jedoch noch Verhältnisse hinzu, welche für sie ganz ausschließlich charakteristisch sind. Die Diatomeen sind einzellebende Zellen, oder ihre Zellen sind zu fadenförmigen, von Schleim umhüllten Kolonien vereinigt; häufig sitzen die einzelnen Zellen auch Gallertstielen auf.

Die Membran der Diatomeenzelle besteht nicht aus einem einzigen, den Plasmakörper allseitig umschließenden Stück, son-

dem sie ist zusammengesetzt aus zwei Teilen, welche wie die Hälften einer Schachtel ineinander greifen. Geradeso nämlich, wie von den beiden Hälften einer Schachtel die eine mit ihren Rändern über die andere geschoben wird, so wird auch die Diatomeenzelle dadurch abgeschlossen, daß die Ränder der Hälften übereinander liegen, ohne jedoch zu verwachsen, wobei die Hälften stets in einer Richtung beweglich bleiben. Es ist demnach auch




Abb. 185. Eine Bacillariacee oder Diatomee (*Pinnularia viridis*).  
Schalenansicht: r Riefen, „ Mittel-  
linie, k Endknoten, g Mittelknoten,  
B Gürtelbandansicht: a äußere,  
i innere Schale, n Nebenlinien.  
(800mal vergr.) (Nach Pfitzer.)

ganz selbstverständlich, daß eine unter dem Mikroskop beobachtete Diatomeenzelle zwei ganz verschiedene Bilder bieten muß, je nachdem sie ihre Deckel- oder aber ihre Seitenfläche, die Schalenansicht oder die Gürtelbandansicht, dem Beschauer zukehrt (Abb. 185).

Die Diatomeen enthalten ein an körnige oder plattenförmige Chromatophoren gebundenes Chlorophyll, welches jedoch durch den Farbstoff Diatomin verdeckt wird, so daß die Diatomeenzelle stets gelb bis gelbbraun erscheint. Durch den Chlorophyllgehalt sind die Diatomeen, wie alle grünen Pflanzen, imstande, Kohlensäure zu assimilieren. Sie gehören also zu den „produzierenden Lebewesen“. Die Zellen leben einzeln oder sie sind zu sehr verschiedenartig gestalteten Kolonien vereinigt.

Die Vermehrung der Diatomeen erfolgt ausschließlich durch Teilung, welche stets nur in einer Richtung erfolgt, nämlich parallel der Schalenseiten. Die beiden Schalenhälften rücken dabei auseinander, der Zellinhalt, resp. das Protoplasma mit Inhaltkörper der sich teilenden Zelle, zerfällt in zwei gleiche Teile, von denen

jeder mit einer der auseinander gerückten Zellhälften in Verbindung bleibt.

Durch diese Teilprotoplasmen werden sodann je eine neue Schalen- (resp. Schachtel-) Hälfte gebildet, welche mit ihren Rändern, resp. Gürtelbandseiten, in die beiden auseinander gerückten Schalenhälften der Mutterzelle eingeschachtelt sind und so wieder die ursprüngliche Gestalt des Individuums herstellen. Wir finden nun bei sehr vielen Arten das Verfahren, daß die Teilung streng simultan erfolgt, d. h. daß die beiden Tochterzellen eines Individuums zu ganz gleicher Zeit wieder die Fähigkeit erlangen, eine neue Teilung einzugehen. Wir kennen jedoch auch genug Fälle, wo eine sehr auffallende Erscheinung sich bemerkbar macht. Bei diesen Arten muß nämlich das kleinere der durch die Teilung der Mutterzelle hervorgebrachten Zellindividuen erst ein gewisses Reifestadium erreichen, und es schiekt

sich erst dann zur Teilung an, wenn die größere Schwesterzelle zum zweitenmal in das Teilungsstadium eintritt.

Es ist klar, daß die mit Kieselsäureeinlagerung versehenen, panzerartig festen Schalen der Diatomeen nicht die Fähigkeit besitzen können, noch nachträglich zu wachsen, daß also bei fortgesetzter Zweiteilung der Individuen infolge des ständigen Einschachtelns in




Abb. 186. *Frustulina saxonica* in Konjugation. *A* Berührung der beiden Mutterzellen der Auxosporen zwischen den geöffneten Schalen. *B* Auxosporen, welche eben ihre Kappen abstoßen, zwischen den vier leeren Schalen der kopulierenden Individuen. *C* Auxosporen, welche schon die Schalen der neuen sogenannten Erstlingszelle in sich entwickelt haben. *s* Schalen der in Konjugation befindlichen Zellen, *m* Gallerthülle der sich berührenden Plasmamassen, *a* Auxosporen und *k* deren Kappen. — In Abb. *C* wurde der Deutlichkeit wegen nur in der Auxospore rechts der gesamte Inhalt gezeichnet. 1200mal vergrößert. (Nach Pfitzer.)

die Schalen der Mutterpflanze eine allmähliche Verkürzung im Längsdurchmesser der Zellen eintreten muß.

Wenn diese Teilungsvorgänge unbegrenzt weitergehen würden, so müßte selbstverständlich die Größe der Diatomeen ständig abnehmen. Wir können in der Tat auch die zunächst auffallende Erscheinung konstatieren, daß die Individuen einer und derselben Art an Größe ganz außerordentlich variieren und daß ein Zellindividuum ein anderes derselben Art oft um das Zehnfache übertreffen kann.

Damit aber diese Verkleinerung in Wirklichkeit nicht zu weit geht, besitzen die Diatomeen ein Regulativ, das von außerordentlichem Interesse ist, die sogen. Auxosporenbildung. Sobald nämlich eine Zelle durch die oft in ziemlich kurzen Zeitabständen erfolgende Zweiteilung eine gewisse Minimalgröße erreicht hat, so erfolgt eine eigenartige Bildung, welche den Erfolg hat, daß das Individuum wieder die Maximalgröße seiner Art erlangt. Der Prozeß ist nach den einzelnen Arten sehr verschieden, dagegen ist der Erfolg genau derselbe.

Bei einzelnen im hohen Meer lebenden Arten öffnet sich die Schachtelzelle eines Individuums etwas, es tritt ein gewisser Teil des Protoplasmas mit einem Kern aus und wächst, während sich die Wände der Mutterzelle wieder schließen und dieselbe bald ungestört die Zellteilungen wieder aufnimmt, sehr bald zu einem neuen, die Maximalgröße der betreffenden Art besitzenden Individuum heran. Bei anderen Arten wird das gesamte Plasma einer Zelle bei der Bildung der Auxospore verbraucht.

Wieder bei anderen Arten finden wir ein Verhalten, das von dem soeben geschilderten stark abweicht und in einzelnen Punkten schon an die bei den höheren Algen zu beobachtenden Geschlechtsverhältnisse erinnert.

In manchen Fällen legen sich nämlich stets zwei Individuen der Minimalgröße zusammen, worauf ihr Protoplasma die Schalen verläßt und eine gemeinsame Gallerthülle ausscheidet. Ohne daß nun die Plasmamassen der zwei Exemplare in irgendwelche Verbindung miteinander treten, entsteht allmählich aus jeder derselben wieder ein Individuum von der Maximalgröße der Art.

Noch weiter fortgeschritten und noch mehr an die oben erwähnten Beziehungen erinnernd sind nun eine Anzahl von Arten, bei welchen es wirklich zu einer Vereinigung des Protoplasmainhaltes zweier Zellen kommt (Abb. 186). Die Inhalte zweier nebeneinander liegender Zellen treten aus und verschmelzen vollständig zu einer einzigen Auxospore; oder es teilt sich das Protoplasma jeder der beiden Zellen kurz nach dem Austritt in je zwei gleiche Portionen, von welchen immer zwei gegenüberliegende, je einem der beiden Individuen angehörige zur Auxospore zusammentreten. Es werden also durch den letzteren Vorgang zwei Auxosporen gebildet.

Die meisten Diatomeen sind durch eine eigenartige gleitende Bewegung ausgezeichnet, andere sind imstande, sich im offenen Tropfen frei, als ob sie schwämmen, zu bewegen. Wie diese Bewegung ermöglicht wird, ist noch nicht genügend aufgeklärt.

In bezug auf ihre Lebensverhältnisse teilt man die Diatomeen ein in Grunddiatomeen und Planktondiatomeen. Erstere sind mehr oder weniger an den Boden gebunden, d. h. sie sind so gebaut, daß sie nur in seichterem Wasser zu Hause sein können, während die letzteren an ein freischwebendes Leben in tiefem Wasser angepaßt sind. Die Grunddiatomeen werden sich also naturgemäß meist in Gräben, seichten Gewässern, kleinen Bächen, im Meer endlich längs der Küste finden, wo sie am Boden auf der nackten Erde, noch häufiger aber an Wasserpflanzen festsitzend vorkommen und hier oft braune Überzüge bilden. Die Planktondiatomeen dagegen sind die hauptsächlichsten Bewohner des hohen Meeres und bevölkern dieses in ungeheueren Schwärmen, indem sie mit den oben kurz besprochenen Peridineen zusammen fast ganz ausschließlich die Flora der Ozeane ausmachen und auf diesen infolge ihrer stoffaufbauenden Eigenschaften das tierische Leben ermöglichen. Jedoch erfüllen sie nicht das ganze Meer in gleicher Dichtigkeit, denn sie

finden sich nur in einer Wasserschicht von einigen hundert Metern unter der Wasseroberfläche und nehmen nach unten zu schnell an Menge ab. Es ist dies auch ganz selbstverständlich. Denn wir wissen ja, daß die Diatomeen nur bei Anwesenheit von Licht aus Kohlensäure und Wasser organische Substanz erzeugen können, deren sie zu ihrer Lebenstätigkeit bedürfen. Schon in der Tiefe von wenigen Hunderten von Metern sind jedoch kaum noch Spuren von Licht nachzuweisen, bis dahin dringt kein Sonnenstrahl vor; in einer größeren Tiefe muß jedes auf das Licht angewiesene Lebewesen zugrunde gehen.

Von abgestorbenen Diatomeen verweist nur der Inhalt; das Kieselgerüst bleibt unversehrt erhalten. Die sogen. Kieselgurlager, die man stellenweise in großer Ausdehnung antrifft und die hauptsächlich zur Herstellung von Dynamit ausgebeutet werden, bestehen aus fast reinen Massen von Diatomeen-Kieselgerüsten.

Zu der Klasse der Bacillariales gehört nur die einzige sehr formenreiche Familie (über 2000 Arten sind bekannt) der

#### Familie **Bacillariaceae.**

Keine der Arten der Familie besitzt speziell größere Wichtigkeit, so daß auf sie nicht näher eingegangen werden soll. Ziemlich bekannt ist die Diatomee **Pleurosigma angulatum**, die eine besonders feine Schalenstruktur besitzt und deshalb zur Prüfung der Leistungsfähigkeit von Mikroskopen viel gebraucht wird.

### VI. Abteilung.

#### **Conjugatae. Jochalgen.**

Hierher stellt man chlorophyllgrüne Algen, welche entweder einzellig sind oder aber einfache, unverzweigte Fäden bilden. Jede einzelne Zelle ist jedoch auch im letzteren Falle ein durchaus selbstständiges, zur Teilung und Fortpflanzung befähigtes Individuum, welches nur in sehr lockerem Verhältnis zu dem Gesamtorganismus des Fadens steht. In jeder Zelle liegt ein einziger deutlicher Zellkern. Die geschlechtliche Fortpflanzung erfolgt in der Weise, daß die Inhalte zweier Zellen miteinander verschmelzen (kopulieren) und eine Spore bilden.

Die Conjugatae sind sicher mit den Bacillariophyta nahe verwandt; sie sind jedoch leicht von ihnen zu unterscheiden, da sie rein grün gefärbt sind und nie eine verkieselte Membran besitzen.

#### Familie **Desmidiaceae.**

Die Arten dieser Familie bestehen meist aus einzelnen Zellen, selten sind diese Zellen zu sehr locker vereinigten Fäden verbunden.

Die Zellen sind ferner meistens durch eine Einschnürung der Membran in der Mitte in symmetrische Hälften geteilt oder sie besitzen einen in symmetrische Hälften geteilten Protoplasmahalt, was besonders infolge der sehr mannigfach gestalteten Chromatophoren scharf hervortritt. Hierher gehören ganz besonders schöne und zierliche Formen, die häufig in Moorgräben und in Wasserlachen gut zu beobachten sind. — Die geschlechtliche Fortpflanzung ist ähnlich derjenigen, die in der folgenden Familie besprochen werden soll.

#### Familie **Zygnemataceae.**

Hierher gehören nur Arten, deren zylindrische Zellen zu unverzweigten Zellfäden fest vereinigt sind. Im Protoplasma der Zellen liegen sehr verschieden gestaltete Chromatophoren, meist ein bis mehrere spiralförmige, die Zellwand beinahe berührende und sie oft vielmal umlaufende Chlorophyllbänder.




Abb. 187. Copulation einer Spirogyra I Ruhende Zellen, II oben zur Conjugation schreitende Zellen, III Vollzogene Copulation; der Inhalt der rechten Zelle tritt in die linke über und bildet dort in IV die Zygospore.

Die Kopulation erfolgt in folgender Weise (Abb. 187). Von den Zellen zufällig nebeneinander liegender oder durcheinander gewirrter Fäden, selten von Zellen desselben Fadens, wachsen Kopulationsfortsätze aus und solchen anderer Zellen entgegen, bis sie sich berühren. Darauf wird die trennende Membran aufgelöst, und nun strömt das Plasma der einen kopulierenden Zelle in die andere Zelle ein.

Nachdem sich dann die beiden Plasmamassen vereinigt haben, wird von ihnen aus durch Bildung einer festen Wand die Spore, die sogen. Zygospore oder Joehspore, erzeugt. Sie ist befähigt, lange Zeit hindurch ungünstigen äußeren Verhältnissen, Kälte, Hitze, Austrocknung usw. Widerstand zu bieten und keimt dann, sobald ihr wieder zusagende Verhältnisse geboten werden. Bei der Keimung wächst aus der Spore sofort wieder ein neuer Zellfaden hervor. — Wir werden später sehen, daß ganz ähnliche Fortpflanzungsverhältnisse auch bei einer

Gruppe der Pilze (*Zygomycetes*) vorkommen.

Man kennt von dieser Familie etwa 100 Arten, die in süßem oder brackischem Wasser vorkommen. Es ist besonders die Gattung **Spirogyra** zu erwähnen, deren Arten durch die Spiralläufigkeit ihrer Chromatophoren ausgezeichnet sind.

## VII. Abteilung.

**Chlorophyceae. Grünalgen.**

Chlorophyllgrüne Algen, welche entweder einzellig sind oder aber aus mehr- bis vielzelligen Fäden, Flächen oder Körpern bestehen. Sehr häufig sind auch hier noch die Zellverbände als Kolonien einzelliger Lebewesen aufzufassen, von denen jedes seine volle Selbständigkeit besitzt. Erst allmählich bildet sich in dieser Klasse eine Art von Arbeitsteilung aus, wo dann die vielzelligen Verbände wirklich ein Individuum darstellen, dessen verschiedene Zellen unter Umständen verschiedenartige Leistungen zu verrichten haben. Jede Zelle kann einen oder mehrere Zellkerne enthalten.

Bei den im folgenden zu beschreibenden Formen unterscheidet man scharf eine ungeschlechtliche Vermehrung von der geschlechtlichen Fortpflanzung.

Meistens wird die ungeschlechtliche Vermehrung durch Schwärmer (auch manchmal unkorrekt „Schwärmosporen“ oder „Zoosporen“ genannt) bewirkt. Diese entstehen in vegetativen Zellen und sind hautlose, kugelige, ei- oder birnförmige Protoplasmamassen, die sich meistens sehr lebhaft mittelst Geißeln (Cilien) im Wasser bewegen. Die Anzahl der Geißeln ist sehr wechselnd, auch ist der Ort ihrer Festheftung ein sehr verschiedener; meist jedoch finden sie sich zu zweien an einem Pol der Zelle, in der Regel dem spitzeren Ende eingefügt. Die Schwärmer führen Zellkern und Chlorophyll und sind gegen Licht, Wärme und chemische Reagentien empfindlich, d. h. sie werden von denselben angezogen oder abgestoßen. Häufig kommt bei ihnen auch ein kleiner roter „Augenfleck“ vor.

Nachdem die Schwärmer nach ihrem Entstehen längere oder kürzere Zeit scheinbar ziellos im Wasser umhergeirrt sind, gelangen sie allmählich zur Ruhe und umgeben sich mit einer deutlichen, wenn auch nur dünnen Membran. Bald darauf beginnt die Zweiteilung, aus der zuletzt die fertige Alge resultiert.

Die geschlechtliche Fortpflanzung ist meist bedeutend komplizierter als die soeben betrachtete ungeschlechtliche Vermehrung. Sie läßt sich stets auf denselben Vorgang zurückführen: auf eine Verschmelzung zweier (gleichartiger oder ungleichartiger) Plasmamassen.

Der einfachste Fall ist der, daß die zur Vereinigung gelangenden Plasmamengen gleichartig sind, d. h. in Form und Größe miteinander übereinstimmen. Diese geschlechtlichen Protoplasten oder Geschlechtszellen werden Gameten, die Zelle, in der sie entstehen, Gametangium genannt. Die Geschlechtszellen sind allermeist schwärmend, d. h. sie unterscheiden sich in ihrem Aussehen oft in nichts von den ungeschlechtlichen Schwärmern. Die gleichartigen Gameten, auch Isogameten genannt, schwärmen

kürzere oder längere Zeit im Wasser umher, bis sie einem anderen Gameten begegnen. Beide eilen aneinander zu und stoßen mit ihren vorderen farblosen Polenden, an denen die Cilien stehen, zusammen. Dann legen sie sich seitlich aneinander, allmählich werden die Cilien in den Plasmaleib eingezogen, die Kerne vereinigen sich, und die Gameten verschmelzen vollständig zu einem einzigen Plasmagebilde, das sich dann sehr rasch mit einer Zellwand umgibt und zur Gamospore (oder Gametospore) wird.

Man findet nun schon häufig Fälle, in denen zwar die Geschlechtszellen sämtlich noch beweglich sind, wo man aber deutlich größere, nur langsam bewegliche, und kleinere, sehr rasch dahineilende unterscheiden kann. Hier ist schon eine Differenzierung erfolgt, und man spricht von Heterogameten (= ungleichartigen Gameten, Anisogameten): die kleineren Gameten stellen die männlichen, die größeren die weiblichen Geschlechtszellen dar.

Noch weiter durchgeführt treffen wir dies dann bei einer großen Anzahl von Algen, wo die zur Vereinigung gelangenden Geschlechtszellen absolut keine Ähnlichkeit mehr miteinander besitzen. Diese Arten bilden in besonderen Zellen, die Antheridien genannt werden, kleine, mittelst Cilien schnell bewegliche, schwärmerartige und oft gelb gefärbte männliche Gameten, welche man in diesem Falle Spermatozoiden nennt, und sehr viel größere, kugelige, cilienlose und deshalb unbewegliche weibliche Protoplasmamassen, die Eizellen oder Oosphären (= Eikugeln). Letztere verlassen in den meisten Fällen nicht einmal mehr die Zelle, in der sie gebildet worden sind und die Oogonium (= eibildende Zelle) genannt wird, sondern die Spermatozoiden dringen durch ein Loch in der Wandung des Oogoniums zu der Eizelle oder den Eizellen vor, um diese zu befruchten. Nach der Befruchtung entsteht aus der Eizelle die Eispore oder Oospore.

### 1. Klasse. **Protococcales.**

Hierher werden Pflanzen gestellt, welche einzellig sind oder zu locker vereinigten und außerordentlich verschieden gestalteten Verbänden und Kolonien zusammentreten und die nicht selten in Gallertmassen eingelagert erscheinen. Die Zellen besitzen nie ein Spitzenwachstum und haben meistens je einen Zellkern; selten sind mehrere Zellkerne in den Zellen anzutreffen.

#### Familie **Volvocaceae.**

Diese Familie wurde noch vor kurzem fast allgemein dem Tierreich zugezählt, weil die hierher gehörigen, einzelligen oder zu Kolonien vereinigten Lebewesen fast während ihres ganzen Lebens frei im Wasser umherschwärmen, und zwar mit Hilfe von Cilien, die von den mit Membran versehenen Einzelzellen ausgehen (Abb. 188, 1). Jede der Zellen besitzt meist nur ein grünes Chromatophor, welches

aber in manchen Fällen durch einen roten Farbstoff verdeckt sein kann.

Die hierher gehörige Gattung *Haematococcus* ist dadurch ausgezeichnet, daß ihre Zellen einzeln leben und in ihnen das Chlorophyll häufig durch einen roten Farbstoff, das Hämatochrom, verdeckt wird. *Haematococcus pluvialis* entwickelt sich häufig in Wasserlachen und stehenden Gewässern in solchen Mengen, daß das Wasser rot gefärbt erscheint. *Chlamydomonas nivalis* dagegen gehört zu jenen Lebewesen, die selbst auf Eis und Schnee lebensfähig bleiben, ja sich ungestört entwickeln und in den Hochgebirgen und den Polarländern oft auf weite Strecken hin den auffallenden „roten Schnee“ bilden.

Sehr viel komplizierter gebaut ist *Volvox globator*, welche stellenweise nicht selten in stehenden Gewässern, Altwassern u. dgl., sich findet. Die Einzelzellen leben in Kolonien, welche bis über 20000 Zellen umfassen und die am Rande einer Gallert-Hohlkugel eingelagert sind. Die Befruchtung findet hier statt durch Spermatozoiden und Eizellen.




Abb. 188. 1 *Pandorina morum*, eine schwärmende Kolonie, 2 ein schwärmender Gamet derselben, 3 zwei solche in Verschmelzung begriffen. (Nach Pringsheim.)

#### Familie **Pleurococcaceae.**

Die hierher gestellten Arten bestehen aus einzellebenden Zellen, die stets unbeweglich sind und sich durch fortgesetzte Zweiteilung vermehren. Sie kommen im Wasser oder auf feuchter Erde vor.

*Pleurococcus vulgaris* ist diejenige Alge, welche meistens die Rinde von Bäumen in dichter, grüner Schicht überzieht. Doch nicht allseitig umkleidet sie bekanntlich den Stamm, sondern fast durchweg nur auf der Nordseite, so daß in nicht zu dichten Wäldern die Orientierung durch sie sehr erleichtert wird. Es hat dies den Grund, daß alle diejenigen Zellen, welche sich auf anderen Seiten des Stammes als der Nordseite bilden, stets wieder zugrunde gehen, sobald sie von der Sonne einmal intensiv getroffen werden.

### 2. Klasse. **Confervales.**

Hierher gehören Arten, welche aus einfachen oder verzweigten Fäden oder ein- bis zweischichtigen Flächen bestehen mit fest vereinigten, meist einen, selten mehrere Zellkerne führenden Zellen. Die Einzelzellen der Individuen haben hier also ihre Selbständigkeit verloren, das Individuum ist mehrzellig geworden, und jede Zelle hat ihre ganz bestimmten Leistungen für den Gesamtorganismus beizutragen.

#### Familie **Ulvaceae.**

Zu dieser Familie gehört der sogen. „Meersalat“, *Ulva latissima*, eine Alge, welche sich im Meer- und Brackwasser an den Küsten oft in großer Menge findet. Ihr Zellkörper besteht aus einer einschichtigen oder zweischichtigen Zellfläche von ansehnlicher Ausdehnung und unregelmäßig gelappter Form.

Familie **Chaetophoraceae.**

Zu dieser Familie wird eine Alge gerechnet, welche den bekannten Geruch des „Veilchensteins“ hervorbringt, **Trentepohlia iolithus**. Sie besteht aus auf Steinen festsitzenden, verzweigten Zellfäden, deren Chlorophyll durch einen orangeroten Farbstoff verdeckt wird. Die ungeschlechtliche Vermehrung erfolgt durch Schwärmer, die geschlechtliche durch Isogameten. Der „Veilchenstein“ findet sich nur in der reinen Luft der Berge, besonders auf alten kalkfreien Gesteinen (Granit, Gneis, Glimmerschiefer) in ständig feuchter Atmosphäre.




Abb. 189. A *Oedogonium ciliatum*. og befruchtete Oogonien; m die Zwergmännchen, welche die Spermatozoiden schon entlassen haben; sie sind erwachsen aus Schwärmern, die in den Zellen m am oberen Ende der Figur gebildet wurden. B ein Oogonium derselben Pflanze im Augenblicke der Befruchtung; og Oogonium, o Eizelle, m Zwergmännchen, z Spermatozoid. C reife Oospore derselben Pflanze. D *Oedogonium gemelliparum*; die Schwärmer z treten aus ihren Mutterzellen aus. E Stück einer Pflanze von *Bulbochaete*. F die durch Teilung der Oospore von *Bulbochaete* entstandenen vier Schwärmer, deren jede zu einer neuen Pflanze auswächst (G). (Nach Pringsheim.)

Wasser umher, dringen durch ein Loch der und befruchten diese.

Manchmal kommt aber auch ein Verhalten vor, welches zu den wunderbarsten Erscheinungen der Pflanzenwelt überhaupt gehört. Man findet nämlich, daß ungeschlechtliche Schwärmer sich in der Nähe der Oogonien an den Fäden

Familie **Oedogoniaceae.**

Von dieser Familie ist besonders die Gattung **Oedogonium** von Interesse, deren Arten, wenigstens zum großen Teil, durch eine auffallende Art der Fortpflanzung ausgezeichnet sind (Abb. 189).

Ihre Zellfäden sind einfach. Die ungeschlechtliche Vermehrung erfolgt durch große Schwärmer, welche an einem Pol einen ganzen Kranz von Cilien tragen. Die geschlechtliche Fortpflanzung wird durch Spermatozoiden und Eizellen bewirkt. Erstere werden in Antheridien gebildet, in kurzen, flachen und zu mehreren bis vielen übereinander liegenden Zellen, und zwar so, daß aus jeder der Zellen einzelne oder je zwei derselben hervorgehen, welche in der Form sehr an die Schwärmer erinnern. Die Eizellen entstehen einzeln in fast kugelförmig anschwellenden Zellen, den Oogonien, welche sich auch häufig zu mehreren nebeneinander im Faden entwickeln. Bei der Reife der Geschlechtszellen treten die Spermatozoiden aus den Antheridien aus, schwärmen im Wasser umher, dringen durch ein Loch der Oogonwandung zu den Eizellen vor

ansetzen und sich mit einer Membran umgeben. Sehr bald wachsen sie dann zu einem kleinen, wenigzelligen Faden aus, von dem einige Zellen vegetativ bleiben, während wenige an der Spitze gelegene sich zu Antheridien von der normalen, flachen Gestalt umformen. Aus ihnen treten Spermatozoiden aus und dringen in die nahegelegenen Oogonien ein, wo sie die Befruchtung der Eizellen ausführen. Man hat die von den Schwärmern gebildeten, kleinen männlichen Fäden „Zwergmännchen“ genannt und dadurch ihr physiologisches Verhalten sehr treffend ausgedrückt.

### 3. Klasse. Siphonales. Schlauchalgen.

Die Schlauchalgen sind von den bisher betrachteten dadurch unterschieden, daß ihre Zellen mit Spitzenwachstum versehen sind. Die Individuen selbst besitzen meist einen reich gegliederten Thallus, und doch besteht dieser im vegetativen Zustand durchweg nur aus einer einzigen, oft sehr großen Zelle, die zahlreiche Zellkerne enthält.

#### Familie Vaucheriaceae.

Zu dieser Familie gehört eine morphologisch wichtige Alge, *Vaucheria sessilis*, welche wie die nahestehende Art *Vaucheria dichotoma* in süßem und brackischem Wasser, aber auch auf feuchter Erde vorkommt und über die ganze Erde verbreitet ist.

Ihr Thallus ist im vegetativen Zustand stets einzellig, fadenförmig und unregelmäßig oder gabelig verzweigt. Wenn diese Formen zur ungeschlechtlichen Vermehrung schreiten, so gliedern sich die Astspitzen durch Querwände vom übrigen Thallus ab, und in diesen Endzellen werden meist zahlreiche Schwärmer erzeugt. Bei der geschlechtlichen Fortpflanzung werden zunächst seitlich am Thallus kurze und oft gekrümmte Seitenzweige gebildet, die sich durch eine Querwand abgliedern und von denen einzelne zu Antheridien, die andern zu Oogonien werden. Beide Geschlechtsorgane (Abb. 190, 3) befinden sich meist dicht nebeneinander auf dem Zellfaden. In den Antheridien werden nun sehr zahlreiche, mit zwei Geißeln versehene Spermatozoiden gebildet, während das Oogon nur eine einzige Eizelle enthält. Bei der Reife der Geschlechtszellen öffnet sich das Antheridium an der Spitze mit einem Loch, die Spermatozoiden schlüpfen aus und schwärmen zu dem benachbarten Oogon hinüber, wo sie durch eine Öffnung der Membran eindringen und eines von ihnen die Eizelle befruchtet.

Dieser Vorgang ist deshalb von Wichtigkeit, weil wir bei einer Gruppe der Pilze (Oomycetes) fast genau dieselbe Art und Weise der Fortpflanzung finden werden.

#### Familie Caulerpacceae.

Die hierher gehörigen Arten besitzen einen ganz auffallend gegliederten Thallus. Jedes Individuum besteht aus einer einzigen,




Abb. 190. Eine Schlauchalge, *Vaucheria sessilis*: 1 Austritt eines Schwärmers aus einem Astende. 2 Schwärmer, an seiner ganzen Oberfläche von Cilien besetzt. 3 Befruchtung der Oospheare im Oogonium (o) durch die im Antheridium (a) enthaltenen Spermatozoiden (s). (Nach Pringsheim.)

mächtigen, gegliederten Zelle, welche von sehr zahlreichen ausstützenden Cellulosebalken durchzogen wird. Die Zelle ist aber gegliedert in einen wurzel-, stengel- und blattartigen Teil (Abb. 191) und erhält dadurch ganz das Aussehen einer höheren Pflanze, bei welcher sich




Abb. 191. *Caulerpa crassifolia*; einzellige Pflanze mit reich gegliedertem Thallus; *s* dem Stamm, *b* den Blättern, *w* der Wurzel entsprechende Teile desselben, *v* Spitze. (Nach Sachs.)

die Einzelzellen in die Funktionen der Pflanze geteilt haben. Die Vermehrung erfolgt dadurch, daß sich einzelne Thallusteile lösen und zu neuen Pflanzen auswachsen.

Die zahlreichen Arten der Gattung *Caulerpa* sind Bewohner der Küsten tropischer und subtropischer Meere.

## VIII. Abteilung.

### Charophyta. Armleuchteralgen.

Es gehört hierher nur die eine

#### Familie **Characeae**,

deren Arten in süßem und brackischem Wasser über die ganze Erde verbreitet sind und auch bei uns sehr häufig vorkommen. Sie gehören zu den charakteristischsten Bestandteilen der Bodenflora stehender oder nur schwach fließender Gewässer oder flacher Seen

und erinnern in ihrem Äußern in mancher Hinsicht an stark verkleinerte Schachtelhalme (Abb. 192).

Ihre Sproßachse ist in längere und kürzere Glieder geteilt und enthält reichlich reingrünes Chlorophyll. Die längeren Glieder, als Internodien bezeichnet, bestehen aus einer großen, oft bis zu 20 cm langen und dickzylindrischen Zelle (2). Die kürzeren Glieder werden als Knoten bezeichnet. Von ihnen gehen Quirle von ziemlich kurzen Seitenzweigen aus, welche sich allermeist nicht mehr verzweigen und an denen die Fortpflanzungsorgane, Antheridien und Oogonien, zur Entwicklung kommen (2). Ferner senden die Knotenzellen häufig sehr zahlreiche haarartige Zellen aus, die sich den Internodien fest anlegen und dieselben förmlich als Rindenschicht (Berindungszellen) umgeben.

Die Antheridien (2a) zeigen einen sehr komplizierten und interessanten Bau. Sie sind von kugeliger Gestalt und besitzen eine aus acht flachen und rot gefärbten, einzelligen Schildern bestehende Hülle mit eigenartig eingefalteten Rändern. In der Mitte dieser Schilder sitzt innen ein kurzer Träger, das Manubrium, auf, von welchem wieder eine große Zahl von vielzelligen Zellfäden in das Antheridiuminnere ausstrahlt (3). In jeder der kurzen Zellen dieser Zellfäden entsteht je ein Spermatozoid. Diese treten bei ihrer Reife aus und sprengen die Schilder des Antheridiums, wodurch sie in das umgebende Wasser gelangen (4, 5).

Die Oogonien bestehen im reifen Zustand aus der mächtigen Eizelle, welche durch fünf von ihrem Grunde heraufwachsende Hüllzellen berindet wird. Letztere verlängern sich meist noch über die Eizelle hinaus und drehen sich an der Spitze derselben zu einer krönchenartigen Bildung (2k). Bei der Reife des Oogoniums weichen die das Krönchen zusammensetzenden Zellen unterhalb der Spitze auseinander, oder aber das ganze Krönchen fällt ab, so daß die Spermatozoiden in das Oogon einzudringen und die Eizellen zu




Abb. 192. Die Armleuchteralge *Chara fragilis*. 1 ein Zweigstück mit ansitzenden Geschlechtsorganen in natürlicher Größe. 2 ein Zweigstückchen stark vergrößert: a Antheridium, s Seitenzweigen, in deren Achsel das Oogonium steht, k dessen Berindungszellen, k das Krönchen, o die befruchtungsfähige Eizelle, 3 Manubrium mit den die Spermatozoiden enthaltenden Zellfäden; 4 Stück eines solchen Zellfadens stärker vergrößert; 5 ein einzelnes Spermatozoid noch stärker vergrößert.

befruchten vermögen. Nachdem die Befruchtung erfolgt ist, entsteht aus der Eizelle eine derbwandige und reichlich mit Stärke erfüllte Oospore, welche imstande ist, den Winter oder eine Austrocknung ohne Schaden zu überstehen.

Sehr interessant ist, daß einzelne Arten der Familie durch eine parthenogenetische Entwicklung ausgezeichnet sind. Es kommt nämlich vor, daß die Antheridien und Oogonien auf getrennten Pflanzen auftreten, ferner daß an manchen Standorten stets nur Individuen weiblichen Geschlechts vorkommen. Und doch entwickeln sich die Oosphären regelmäßig zu Oosporen, geradeso als wenn sie normal befruchtet worden wären.

Besonders häufig sind die Arten der Gattungen *Chara* und *Nitella*, von welchen jedoch keine eine speziellere Bedeutung besitzt.

## IX. Abteilung.

### Phaeophyceae. Braunalgen oder Brauntange.

Vielzellige Algen, deren Chlorophyll durch einen braunen Farbstoff, das Phycophänin, verdeckt ist und die deshalb eine charakteristische braune Färbung aufweisen. Wie bei den Chlorophyceae kennen wir auch bei vielen hierher gehörigen Arten eine ungeschlechtliche Vermehrung durch Schwärmer und eine geschlechtliche Fortpflanzung durch Gameten, oder aber durch Spermatozoiden und Eizellen. Schwärmer wie Gameten sind dadurch ausgezeichnet, daß bei ihnen die beiden Cilien seitlich eingefügt sind.

#### 1. Reihe. Phaeosporeae.

Fortpflanzungsorgane aus oberflächlichen Teilen der Sprosse auswachsend und frei am Thallus stehend.

#### Familie **Ectocarpaceae.**

Hierher gehört die große und an den deutschen Meeresküsten reich vertretene Gattung *Ectocarpus*. Ihre Arten bestehen aus einfachen oder verzweigten Zellfäden, welche in verschiedenartiger Weise dem Substrate aufsitzen. Die Fäden wachsen nicht durch Spitzenwachstum, sondern dadurch, daß wenigstens eine Zeitlang alle Zellen die Fähigkeit besitzen, sich zu teilen. An der Spitze der Fäden oder auch an Seitenästen entstehen die Geschlechtsorgane, und zwar so, daß entweder in der großen Endzelle direkt die Gameten entstehen oder aber, daß jene sich in sehr zahlreiche kleine Zellen teilt, von welchen jede einen Gameten hervorbringt. Diese Gameten sind stets gleichartig (Isogameten) und lassen sich nach den Geschlechtern nicht voneinander unterscheiden.

Familie **Laminariaceae.**

Zu dieser Familie werden die auffallendsten Formen unter den Algen gerechnet. Ihr Thallus ist, ähnlich wie bei den schon oben



Abb. 193. *Laminaria Cloustoni*, dem Boden einer Meeresküste aufsitzend, in verschiedenen Entwicklungsstadien.

behandelten *Caulerpanceae*, in einen wurzel-, stengel- und blattähnlichen Teil differenziert (Abb. 193), doch besteht hier das Individuum

aus unzähligen kleinen Zellen, welche alle oder fast alle gleichartig und nicht zu einer bestimmten Arbeitsteilung fortgeschritten sind. Anfangs wächst die Pflanze dadurch, daß alle ihre Zellen teilungsfähig sind. Später aber sind die Wachstumszonen auf ganz bestimmte Punkte des Thallus beschränkt, und hierdurch werden dann die auffallenden Gestaltungsverhältnisse mancher Arten hervorgebracht




Abb. 194. Die Braunalge *Fucus vesiculosus*: 1 Stück des Thallus mit Schwimmblasen (b) und Behältern der Befruchtungsorgane (c); 2 eine kugelige Höhlung (Conceptaculum) des verdickten Thallusendes; 3 ein Oogonium; 4 ein solches im Begriff die Eizellen zu entleeren; 5 Antheridien (a), einem verzweigten Haare ansitzend, daneben zwei bewimperte Spermatozoiden (s); 6 eine Eizelle von Spermatozoiden umschwärmt. (Nach Thuret.)

(vgl. Abb. 193). Die geschlechtliche Fortpflanzung erfolgt durch Isogameten, welche in einfächerigen Sporangien gebildet werden; diese letzteren sitzen in großen Mengen herdenweise auf der Thallus-Blattoberfläche zusammen und bedecken diese oft fast vollständig.

Alle Laminariaceae sind typische Meerstrandsalgen.

Besonders verbreitet an den Küsten der Nord- und Ostsee ist *Laminaria digitata*, ausgezeichnet durch ihren meist handförmig geteilten Blatthallus. Die besonders in den Polarmeeren verbreitete *Laminaria Cloustoni* (auch *L. digitata* var. *Cloustoni* genannt, Abb. 193) liefert die früher officinellen *Stipites Laminariae*, welche damals in der Chirurgie von großer Bedeutung waren, jetzt allerdings weniger Verwendung finden. Es wird von ihr der stammartige Teil verwendet. Dieser schrumpft beim Trocknen sehr stark zusammen, besitzt jedoch infolge seines großen Schleimgehaltes die Fähigkeit, bei späterem Feuchtigkeitszutritt stark aufzuquellen; die *Stipites* werden deshalb besonders dazu gebraucht, um ganz allmählich Wunden zu erweitern.

Eine andere Art dieser Gattung, *Laminaria saccharina*, enthält ziemlich viel Zucker und wird deshalb an den Küsten der Nordsee häufig gesammelt, um aus ihr einen allerdings nicht sehr geschätzten Sirup herzustellen.

Es ist dann endlich noch *Macrocystis pyrifera* anzuführen, ein Tang, welchen man mit vollstem Recht als die größte Pflanze bezeichnen kann. Sie ist besonders reich in den arktischen Meeren verbreitet und findet sich an den Orten ihres Vorkommens in ungeheuren Mengen. Da nun die einzelne Pflanze eine Länge von über 300 m erreichen kann, so läßt sich leicht begreifen, daß sie förmliche unterirdische Wälder zu bilden imstande ist, welche an Höhe kaum zur Hälfte von landbewohnenden Pflanzen erreicht werden.

## 2. Reihe. Cyclosporeae.

Fortpflanzungsorgane im Inneren von besonderen Behältern (Konzeptakeln) stehend.

### Familie **Fuaceae.**

Die hierher gerechneten Brauntange besitzen einen aus zahllosen fest vereinigten Zellen zusammengesetzten, fast lederartig harten Thallus. Zahlreiche Arten sind durch große, kugelige oder birnförmige Auftreibungen ausgezeichnet, d. h. durch mit Luft erfüllte Erweiterungen des Thallus, welche als Schwimmblasen fungieren und die Aufgabe haben, die am Meeresboden an den Küsten festsitzenden Pflanzen durch den starken Auftrieb in mehr oder weniger senkrechter Stellung zu erhalten. Die Geschlechtsorgane sind in eigenartigen Höhlungen der Thallusoberfläche, den Konzeptakeln, enthalten, welche sich meistens an den Enden der Thalluslappen in größerer Anzahl finden (Abb. 194). Diese Konzeptakeln entstehen in der Weise, daß um eine bestimmte Stelle, auf welcher sich die Geschlechtsorgane zu bilden beginnen, die oberflächlichen Zellen des Thallus ein starkes Wachstum erlangen. Sehr bald kommt es dann so weit, daß die Geschlechtsorgane von einem Thalluswalle umgeben sind, und zuletzt entwickelt sich dieser Wall so stark, daß die Geschlechtsorgane in einem nur an der Spitze eine kleine Öffnung besitzenden Behälter liegen. Ein solches Konzeptakulum kann gleichzeitig beide Geschlechter enthalten, oder aber letztere sind auf verschiedene Konzeptakeln, ja sogar oft auf verschiedene Individuen verteilt. Die Antheridien entstehen in großer Menge an stark verzweigten Zellfäden und enthalten bei der Reife zahlreiche gelbe, birnförmige Spermatozoiden. Die Oogonien sind kurz gestielt, dunkelbraun, von ovaler Form und entwickeln zwei, vier oder acht Eizellen. Bei der Reife treten die Eizellen aus dem Oogon aus und bleiben unbeweglich in dem Konzeptakulum liegen. Die Eizellen werden von den Spermatozoiden in ungeheuren Mengen umschwärmt, so daß sie zuletzt in eine drehende Bewegung versetzt werden und allmählich die Konzeptakeln verlassen.

Der Transport der Eizellen wird besonders dadurch unterstützt, daß die Innenwandung der Konzeptakeln mit starren, nach der Ausgangsöffnung gerichteten Haaren ausgekleidet ist, wodurch erzielt

wird, daß umgekehrt wie bei einer Fischreue kleine Körper wohl den Hohlraum verlassen, dagegen nicht mehr in ihn eindringen können. Während dieses Transportes erfolgt die Befruchtung, indem eines der Spermatozoiden in die Eizelle eindringt. Sofort nach erfolgter Befruchtung umgibt sich die Eizelle mit einer Membran und wächst, sich an irgend einen Gegenstand ansetzend, zu einer neuen Pflanze aus.

**Fucus vesiculosus** und **F. serratus** kommen an den Küsten der nördlichen Meere, in der Ost- und Nordsee, oft in ungeheuren Mengen vor. Sie werden stellenweise gesammelt, da man aus ihnen durch Verbrennen die sogen. Tangsoda, auch Kelp oder Varek genannt, gewinnt, welche zur Glasfabrikation hier und da noch verwertet wird. Diese Tange enthalten auch beträchtliche Mengen von Jod, weshalb sie früher medizinisch verwendet wurden.

Zu der Familie der **Fucaceae** gehört auch die Gattung **Sargassum**, deren Arten in erster Linie zu der Zusammensetzung des sogen. Sargassomeeres beitragen. Sie wachsen an den Küsten des mexikanischen Meerbusens, werden dort durch die Gewalt des Golfstromes losgerissen, in den Atlantischen Ozean getrieben und durch Strömungsverhältnisse an den Ort zusammengetragen, welcher nach ihnen den Namen Sargassomeer führt.

## X. Abteilung.

### Rhodophyceae. Rotalgen oder Rottange,

auch oft Florideen genannt.

Die Rhodophyceen (von  $\rho\acute{o}\delta\omicron\varsigma$ , rhodos = rot) sind fast ohne Ausnahme Meeresalgen. Ihre lebhaft rote Farbe rührt von Phycöerythrin her, einem Farbstoff, welcher das Chlorophyllgrün verdeckt und im Seewasser unlöslich ist, durch kaltes Süßwasser hingegen ausgezogen wird. Alkalien, sowie der Einfluß des Lichtes zerstören den Farbstoff gleichfalls, weshalb die officinellen Drogen dieser Algengruppe farblos sind. Die Rottange besitzen eine ungeschlechtliche Vermehrung und eine geschlechtliche Fortpflanzung. Erstere geschieht durch Sporen, welche meist zu vier (in Tetraden) in einzelnen Zellen (Sporangien) zusammenliegen und Tetrasporen genannt werden. Die geschlechtlichen Fortpflanzungsorgane bestehen in den männlichen Antheridien, welche nackte, unbewegliche, kugelige Zellen (Spermatien) erzeugen, und den weiblichen Karpogonien, Zellen von eigenartiger Gestalt, mit einem basalen, etwas angeschwollenen Teil, von welchem ein fadenförmiger Teil (das Trichogyn, Abb. 195 t) ausläuft. An diesem haften die durch das Wasser herangespülten Spermatien und vollziehen die Befruchtung, deren Resultat ein sogen. Fruchthaufen (Karposporen) ist. Auf die Einzelheiten dieses oft sehr komplizierten Befruchtungsvorganges kann an dieser Stelle nicht näher eingegangen werden. — Schwärmer werden bei den Rottangen nicht gebildet.

Off. **Chondrus crispus** (Abb. 196) und **Gigartina mamillosa** (Abb. 197) wachsen an felsigen Küsten Europas sowie Nordamerikas und sind die Stamm-




Abb. 195. Geschlechtsorgane einer Rotalge: I Ein Zweig mit Anthridien (an) und einem Karpogon (c), letzteres mit dem Trichogyn (t) versehen; an diesem sitzen zwei Spermation (sp), welche im Begriff sind, die Befruchtung zu vollziehen; II bis V stellen die nach erfolgter Befruchtung vor sich gehende Ausbildung des Karpogons (c) zu einem Fruchthaufen (V gl) dar.



Abb. 196. *Chondrus crispus*.




Abb. 197. *Gigartina mamillosa*.

pflanzen des „Carrageen“, des sogen. „Irländisch Moos“. — *Eucheuma spinosum* und *Gracilaria lichenoides* sind die Stammpflanzen der Droge „Agar-Agar“.

*Alsidium helminthochorton*, eine Alge des Mittelländischen Meeres, wurde früher gleichfalls gesammelt und als Wurmmittel unter dem Namen „Helminthochorton“ medizinisch gebraucht.

Sehr zahlreiche schleimhaltige Arten der Rottange werden in Japan gesammelt und bilden ein wichtiges Volksnahrungsmittel.

## XI. Abteilung.

### Eumycetes. Fungi. Echte Pilze.

Zwischen Algen und Pilzen besteht nur ein wirklich durchgreifender Unterschied: erstere enthalten Chlorophyll, während dieses den letzteren fehlt. Da also die Pilze nicht die Fähigkeit besitzen, aus anorganischen Stoffen organische zu bilden, und sich in dieser Hinsicht ganz analog den Tieren verhalten, so sind sie auf ein saprophytisches oder parasitisches Leben angewiesen, d. h. sie entnehmen anderen toten oder lebenden Organismen die von jenen gebildeten oder wenigstens in ihnen enthaltenen organischen Stoffe.

Besonders mit der Algengruppe der Siphonales zeigen einige Gruppen der Pilze noch sehr große Übereinstimmung, in vegetativer wie in reproduktiver Hinsicht. Alle Pilze sind nämlich wie jene stets mit echtem Spitzenwachstum versehen; ihr Thallus besteht aus locker gelagerten oder eng verflochtenen, ein- bis außerordentlich vielzelligen Fäden, den Hyphen oder dem Mycelium, welche in das Substrat eindringen und diesem seine Nährstoffe entziehen. Die Vermehrung erfolgt auf ganz außerordentlich verschiedenartige Weise: Bei einer kleinen Gruppe, den Phycomyceten, durch bewegliche Schwärmer, bei allen übrigen Pilzen dagegen durch abge schnürte oder im Innern vegetativer Zellen gebildete Sporen, die sogen. Konidien. Eine unzweifelhafte geschlechtliche Fortpflanzung finden wir nur bei den niedrigsten Gruppen und auch hier nicht regelmäßig vertreten. Sie erinnert dann ganz an die geschlechtlichen Vorgänge, welche wir bei den Algengruppen der Siphonales oder der Conjugatae beobachteten. Neuerdings ist es gelungen, auch bei einzelnen höheren Pilzen (Ascomyceten und Basidiomyceten) sehr verwickelte Vorgänge zu verfolgen, die wohl als Geschlechtsakt zu deuten sind und die Bildung der Fruchtkörper bewirken.

#### 1. Klasse. Phycomycetes. Algenähnliche Pilze.

Ihr Thallus besteht im vegetativen Zustand fast stets aus einer einzigen, meist sehr stark verzweigten und oft ungemein umfangreichen Zelle. Häufig finden wir noch eine geschlechtliche Fortpflanzung, oft allerdings in allen Stadien der Reduktion, d. h. der

Rückbildung: wir nehmen wahr, daß allmählich die geschlechtliche Fortpflanzung überhaupt aufgegeben wird und dafür eine sehr weitgehende und energische ungeschlechtliche Vermehrung in den Vordergrund tritt.

### 1. Reihe. Zygomycetes.

Hierher gehören saprophytische und parasitische Pilze mit reich verzweigtem Mycel. Die ungeschlechtlichen Vermehrungssporen entstehen im Innern vegetativer Zellen oder werden von Mycelschläuchen abgeschnúrt. Die geschlechtliche Fortpflanzung ist derjenigen, welche wir bei der Algengattung *Spirogyra* (*Conjugatae*) kennen lernten, sehr ähnlich.

#### Familie **Mucoraceae.**

Als Vertreter dieser Familie soll der sogenannte Köpfchenschimmel, **Mucor mucedo** (Abb. 198), besprochen werden.

Er kommt besonders häufig auf Pferdemist vor, oft aber auch auf allen möglichen nährstoffreichen Substanzen. Wenn auf diese Stoffe eine Spore des Pilzes gefallen ist, so keimt diese nach kurzem mit einem Keimschlauche aus, welcher sich bald mächtig durch Spitzenwachstum streckt, sich nach allen Seiten verzweigt und überall hin — stets einzellig bleibend — das Nährsubstrat durchzieht. Nachdem dann dieser vegetative Teil des Pilzes, das Mycelium, eine gewisse Stärke erlangt, d. h. genügende Nährstoffe aufgenommen hat, sehen wir ihn zur Vermehrung schreiten. Zu diesem Zwecke konzentriert sich ein großer Teil des in der oft riesigen Zelle enthaltenen Protoplasmas an einem oder einigen Punkten derselben, von welchen aus dann aufrechte, in die Luft hineinragende, plasmareiche, dicke Äste gebildet werden. Nach kurzer Zeit schwillt ihre Spitze kugelig an und gliedert sich durch eine gewölbte Querwand, die sogen. *Columella*, das Säulchen, von dem Stiele ab. In dieser abgeschnürten Zelle, dem Sporangium, zerfällt nun das Protoplasma in sehr zahlreiche, kleine Portionen, welche sich zuletzt mit einer festen Membran umgeben und so zu Sporen werden. Es ist jedoch festzuhalten, daß nicht das gesamte Protoplasma zur Sporenbildung verbraucht wird, sondern daß zwischen den Sporen noch ein Teil desselben übrig bleibt, die sogen. Zwischensubstanz, welche außerordentlich stark quellungsfähig ist. Tritt bei der Sporenenreife Feuchtigkeit zu dem Sporangium, so nimmt




Abb. 198. 1 *Phycomyces nitens* mit drei reifen und zwei sich entwickelnden Sporangien; 2 Längsschnitt durch den Gipfel eines Sporangiums von *Mucor mucedo*, *c* Sporen; 3 zwei Mycelzweige in Kopulation begriffen; 4 die daraus entstandene Zygospore (*z*).  
(Nach Sachs und Brefeld)

die Zwischensubstanz dieselbe auf, quillt sehr stark und sprengt so die Sporangienwand, worauf die Sporen, in die zähe Flüssigkeit eingehüllt, heruntertropfen und leicht verbreitet werden. Die Sporen besitzen die Fähigkeit, sofort, nachdem sie ein zusagendes, feuchtes Substrat gefunden haben, zu keimen und sehr rasch wieder neue Mycelien zu bilden. Wenn wir nun berücksichtigen, daß ein einziges Mycelium viele Sporangien hervorbringen kann, daß ein Sporangium meist außerordentlich zahlreiche Sporen enthält und diese sofort wieder keimungsfähig sind, so läßt sich begreifen, wie ungeheuerlich stark die Verbreitungsfähigkeit dieses Pilzes durch die ungeschlechtlichen Vermehrungssporen ist.

Enthält das Nährsubstrat, auf welchem sich der *Mucor* entwickelt hat, reichlich Nährstoffe und Feuchtigkeit, so bleibt der Pilz meist ständig bei dieser soeben geschilderten ungeschlechtlichen Vermehrung. Sobald aber die Nährstoffe abnehmen oder sonst ungünstige Vegetationsbedingungen eintreten, so schreitet der Pilz zur geschlechtlichen Fortpflanzung. Auch jetzt werden durch eine ProtoplasmaKonzentration dicke Äste am Mycel gebildet, welche sich aber nicht in die Luft erheben, sondern in der Höhe des Nährsubstrates bleiben. Je zwei derselben wachsen einander entgegen, schwellen an ihren Enden, nachdem sie sich aneinander gelegt haben, keulenförmig an, worauf sich die angeschwollenen Endzellen durch Querwände abgliedern. Sodann wird die trennende Membran zwischen den beiden Zellen aufgelöst, deren Inhalte vereinigen sich und bilden eine große, kugelige Spore, die sogen. *Zygospore*. Diese vergrößert sich noch nachträglich sehr stark, erhält eine dicke, warzige Wandung und wird allmählich dadurch frei, daß die Myceläste, aus denen sie hervorgegangen ist, die sogen. *Suspensorien*, verwelken und vermodern. Die *Zygospore* kann nicht, wie die Konidien, sofort keimen, sondern muß eine gewisse Ruheperiode durchmachen. Infolge ihrer dicken Wandung ist sie imstande, unbeschadet lange Zeit Austrocknung und Kälte zu ertragen.

Früher kannte man nicht die Bedingungen, unter denen *Zygosporenbildung* auftritt, und war bei Kulturversuchen auf den Zufall angewiesen. Der amerikanische Pilzforscher Harper entdeckte vor kurzem, daß gewisse *Mucoraceen* homiothallisch sind, d. h. daß *Zygosporen* zwischen zwei Ästen desselben Thallus gebildet werden. Bei zahlreichen anderen jedoch fand er Heterothallie, d. h. bei ihnen werden *Zygosporen* nur beim Zusammentreffen von Ästen verschiedener Thalli gebildet, die zwar äußerlich nicht voneinander zu unterscheiden, aber offenbar physiologisch verschieden sind. Da man sie nicht als ♂ und ♀ bezeichnen kann, hat man die beiden Formen als + und - Thallus bezeichnet. Heute ist man imstande, leicht durch Aussaat der Sporen einer heterothallischen *Mucoracee* *Zygosporen* zu erhalten.

Von Interesse ist, daß bei anderen Arten der Gattung *Mucor* zwar die Konjugationsäste regelmäßig angelegt werden, ohne daß es zur Vereinigung zweier derselben käme, oder daß sich die Äste treffen, ohne daß die Plasmahalte zusammentreten; und doch werden in diesen Fällen regelmäßig Sporen gebildet, welche sich von den normalen, geschlechtlich gebildeten Sporen in nichts unterscheiden. Man nennt diese *Azygosporen*. Sie sind als eine Reduktionserscheinung zu deuten, als einen Zurücktritt der Geschlechtlichkeit, und sind für das Verständnis der bei den höheren Pilzen zu beobachtenden Verhältnisse von großer Wichtigkeit.

#### Familie **Entomophthoraceae.**

Zu dieser Familie gehören allermeist parasitisch lebende Arten, von denen eine der bekanntesten besprochen werden soll, *Empusa Muscae*, der Pilz, welcher die in jedem Spätjahr zu beobachtende Fliegenseuche erregt.

Nach der Mitte jedes Jahres bis in den Spätherbst hinein sieht man tote Fliegen oft in großen Mengen an Mauern oder Fenstern sitzen, welche von einem hellgelben oder weißen Hofe umgeben sind. Dieser Hof besteht aus einem Haufen von Sporen, welche stark klebrig sind. Kriecht nun eine Fliege über

einen solchen Sporenhaufen, so bleiben leicht einige der Sporen an ihrem Hinterleib hängen. Diese keimen sofort und bilden einen Keimschlauch, welcher durch die zarteren Partien des Fliegen-Hinterleibes sich einbohrt und, sobald er in den Körper gelangt ist, mächtig zu wuchern und sich auszubreiten beginnt. Sehr bald wird das Insekt nach allen Richtungen hin vom Mycel durchzogen, der Nährstoffe beraubt, zuletzt gänzlich ausgefüllt, förmlich ausgestopft und allmählich zum Absterben gebracht. Nun brechen kräftige Mycelfäden, die sogen. Konidienträger, zwischen den Hinterleibsringen in aufrechten Reihen hervor und schnüren in ungeheuren Mengen Sporen, Konidien, ab, welche oft centimeterweit weggeschleudert werden und einem klebrigen Plasmatröpfchen eingelagert sind. — Bei dieser Familie werden also die Sporen abgeschnürt und nicht im Inneren von Sporangien gebildet wie bei den Mucoraceae.

Die geschlechtliche Fortpflanzung der Entomophthoraceae erfolgt ähnlich wie bei den Mucoraceae.

## 2. Reihe. Oomycetes.

Saprophyten oder Parasiten. Ungeschlechtliche Vermehrung sehr wechselnd. Geschlechtliche Fortpflanzung ähnlich wie bei der Siphonales- (Algen-) Gattung Vaucheria durch Bildung von Oosporen.

### Familie Peronosporaceae.

Von dieser wichtigen Familie soll ein Vertreter genauer geschildert werden.

Die Arten der Gattung *Phytophthora* sind zum Teil als gefährliche Parasiten gefürchtet. Besonders *Ph. infestans* ist hier anzuführen, ein Pilz, welcher eine der gefährlichsten Erkrankungen der Kartoffelpflanze herbeiführt und in manchen Jahren schon kolossalen Schaden angerichtet hat. Man bemerkt an den erkrankten Pflanzen zuerst, daß die Blätter sich zu bräunen beginnen. Die Flecken nehmen an Größe immer mehr zu, und bald ist das Blatt vollständig abgestorben. Auch die Kartoffelknollen werden angesteckt, und zwar kann dies erfolgen, während die Knollen mit der Pflanze noch in Verbindung stehen, oder erst, wenn sie geerntet sind und überwintert werden. Hauptsächlich durch diese erkrankten Knollen, in welchen sich das Mycel lebend erhält, wird die Krankheit dann im folgenden Jahre wieder weiter verbreitet und tritt häufig so frühzeitig und gefährlich auf, daß Knollen gar nicht mehr entstehen. — Die ungeschlechtliche Vermehrung findet in folgender Weise statt:

Die konidienartigen Sporangien, von Birnform, entstehen an den Astenden reich verzweigter Träger, die einzeln oder oft auch in ganzen Büscheln durch




Abb. 199. *Peronospora calotheca*: 1 ein Sporangienträger aus einer Spaltöffnung der Nährpflanze hervortretend; c Sporangium; 2 geschlechtliche Fortpflanzung desselben Pilzes, a Antheridium, o Oogonium. (Stark vergrößert.) (Nach Kny.)

die Spaltöffnungen der Wirtspflanze hervorbrechen (s. Abb. 199, *I*), während der vegetative Teil des Pilzes im Inneren der Wirtspflanze wuchert und derselben Nährstoffe entzieht. Die Sporangien fallen nun, sobald sie ihre Reife erreicht haben von ihren Trägern ab und werden durch den Wind verbreitet. Wird ihnen dann genügend Feuchtigkeit geboten, so treten aus ihnen Schwärmer in großer Anzahl aus, welche eine Zeitlang schwärmen, dann zur Ruhe kommen und in das Substrat eindringen. Finden sie nicht die zusagende Nährpflanze, so gehen sie zugrunde. Die geschlechtliche Fortpflanzung erfolgt wie bei *Pythium* (s. S. 195).

Von den Arten dieser Familie sei endlich noch *Plasmopara viticola* erwähnt, der sogen. „falsche Mehltau“ des Weinstockes, der oft großen Schaden anzurichten vermag. Man bemerkt auf den erkrankten Blättern einen mit bloßem Auge deutlich erkennbaren Schimmel, welcher sich unter dem Mikroskop als durch die Sporangienträger (vergl. Abb. 199) hervorgerufen erweist. Diese treten in großen Mengen aus den Spaltöffnungen der Blätter hervor und verbreiten infolge der Unzahl der gebildeten Sporangien die Krankheit sehr rasch, während die vegetativen Hyphen das Blattinnere nach allen Richtungen durchziehen, demselben die Nährstoffe entnehmen und so das Blatt zu frühzeitigem Welken und Abfallen bringen.

#### Familie **Saprolegniaceae.**

Die zu dieser Familie zu rechnenden Formen sind echte Wasserpilze, welche meist als Saprophyten auf abgestorbenen Pflanzen oder




Abb. 200. *A-C* *Saprolegnia* Thuretii. *A* Fliege mit *Saprolegnia*-Rasen. *B* Schwärmsporangium vor, *C* nach Entleerung der Schwärmer. *D* *S. monilifera*. Oogonien. *E* *S. Thuretii*. Oogonium und Antheridium. *F* *S. asterophora*. Oogonium und Antheridium. *A* natürliche Größe, *B-D* etwa 200mal, *E* 400mal, *F* 600mal vergrößert. (*A-C* nach Thuret. *D-F* nach De Bary.)

Tieren leben, die aber auch manchmal parasitisch werden und lebende Tiere befallen (Abb. 200). Die ungeschlechtliche Vermehrung erfolgt geradeso wie bei vielen Algen durch Schwärmer, welche in ungeheurer Anzahl in langgestreckten Schläuchen, den Sporangien, entstehen. Die geschlechtliche Fortpflanzung wird durch Antheridien und Oogonien vermittelt, ähnlich wie wir dies bei der folgenden Familie kennen lernen werden.

Es ist jedoch festzuhalten, daß bei den Saprolegniaceae die Geschlechtlichkeit oft schon sehr zurücktritt; in manchen Fällen werden gar keine Antheridien mehr gebildet, und doch entwickeln sich die meist in der Mehrzahl entstandenen Eizellen regelmäßig — auf parthenogenetischem Wege — zu Oosporen.

#### Familie **Pythiaceae.**

**Pythium** De Baryanum ist ein winziger, mikroskopischer, fadenartiger Pilz, welcher besonders junge Keimpflanzen befällt und denselben häufig großen Schaden zufügt. Die ungeschlechtliche Vermehrung erfolgt durch mit zwei Cilien versehene Schwärmer, welche in meist kugeligen Sporangien in großer Menge gebildet werden (vergl. auch Abb. 200, B, C). Die geschlechtliche Fortpflanzung geht in folgender Weise vor sich. Einzelne Teile des einzelligen Thallus, meist die Spitzen der Zweige, schwellen an und trennen sich vom übrigen Thallus durch Querwände ab. Ihr Protoplasma differenziert sich in eine zentrale, mit körnigem Plasma erfüllte Kugel, die eigentliche Eizelle, welche von einem wasserhellen Protoplasma, dem sogen. Periplasma, umhüllt wird; es sind dies die Oogonien. In der Nähe dieser Oogonien entstehen an anderen Zweigenden kurze Zellen, die Antheridien, welche sich bald dem weiblichen Geschlechtsapparate anlegen. Sie treiben von der Anlegestelle aus einen kurzen Fortsatz, den Befruchtungsschlauch, durch die Oogonwandung und das Periplasma hindurch, welcher sich der Eizelle anlegt und dessen Plasmahalt sich mit demjenigen der Eizelle vermengt. Darauf umgibt sich sofort die Eizelle mit einer starken Membran und wird zur Oospore, welche erst nach einer gewissen Ruheperiode wieder keimen kann.

### 2. Klasse. **Ascomycetes. Schlauchpilze.**

Das Mycel ist äußerst zart und fein, vielzellig. Die geschlechtliche Fortpflanzung ist vollständig oder fast vollständig erloschen. Die ungeschlechtliche Vermehrung ist sehr mannigfaltig: sie erfolgt durch Konidien (Nebenfruchtform) und Ascosporen (Hauptfruchtform). Erstere sind meist von Gattung zu Gattung wechselnd, letztere für die ganze Klasse durchaus gleichartig. Die Ascosporen entstehen in dem sogen. Schlauch oder Ascus, d. h. in einem Sporangium, welches nach Form, Größe und besonders nach der Sporenzahl bestimmt, fixiert worden ist. Diese Sporangien oder Asci können an jeder beliebigen Stelle am vegetativen Mycel des Pilzes entstehen. Meist aber finden wir Fruchtkörper entwickelt, wo die Asci in besonderen und oft eigenartig differenzierten Fruchtanlagen entstehen: Hier treffen wir meist sehr zahlreiche Asci, welche gleichgerichtet, wie Pfosten, nebeneinander liegen und so ein Lager, ein Hymenium, bilden. Doch liegt meist nicht Ascus neben Ascus, sondern zwischen sie schieben sich stets sehr zahlreiche unfruchtbare Schläuche ein,

die sogen. Paraphysen, deren genauere Bedeutung noch unbekannt ist. Meist finden wir im Ascus acht Sporen vor, doch wechselt die Zahl innerhalb ganz bestimmter Grenzen. Wir kennen auch Fälle, wo die Sporenzahl des Ascus 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, beträgt. Die Erklärung für diese bestimmte Zahlenreihe beruht darin, daß der ursprünglich einzige Kern des Ascus sich teilt, daß darauf meist die Tochterkerne noch mehrere Teilungen durchmachen und aus denselben dann Sporen hervorgehen.

Der Ascus entwickelt sich aus Endzellen der Mycelfäden, welche keulen- oder schlauchartig anschwellen. Bei der Sporenbildung wird nun nicht das gesamte Protoplasma des Ascus verbraucht, sondern es bleibt stets ein Teil desselben, das sogen. Periplasma, zurück, in welchem die Sporen eingebettet liegen und welches dann später zur Verbreitung der Sporen beiträgt. Bei der Sporenreife nimmt nämlich das Periplasma gierig Feuchtigkeit auf und quillt dadurch stark. Der Ascus wird dabei mehr und mehr aufgetrieben und seine Membran allmählich immer mehr gespannt, bis diese zuletzt dem Drucke nicht mehr widerstehen kann, am Scheitel aufreißt und sich zusammenzieht, wodurch der gesamte Inhalt, Sporen und Periplasma, mit großer Kraft herausgeschleudert wird. Das Periplasma ist klebrig, und die Sporen haften leicht anderen Gegenständen und Lebewesen an, durch welche sie dann verbreitet werden.

#### Familie **Aspergillaceae.** Schimmelpilze.

Die hierher gehörigen Formen werden gewöhnlich schlechthin als „Schimmelpilze“ bezeichnet und spielen im Haushalte der Natur eine große Rolle.

**Aspergillus herbariorum**, der sogen. „blaue Schimmel“, stellt sich auf allen vegetabilischen Substanzen ein und besitzt ein geradezu ungeheures Verbreitungsvermögen. Sobald die Sporen auf irgendwelche organische Substanzen gelangt sind, bilden sie ein reich verzweigtes Mycel, an dem sehr bald die Nebenfruchtform auftritt. Es erheben sich vom Mycel zahlreiche dicke, senkrecht stehende Äste, welche an der Spitze kopfig anschwellen, die Konidienträger.

Von deren Kopfe entstehen sodann kurze, zylindrische Zellen, die sogen. Sterigmen, welche in großer Menge Konidien in langen Ketten abströmen. Diese werden durch den Wind verweht und können, auf einen Nährboden gelangt, sofort keimen. Längere Zeit dauert diese Konidienbildung gleichmäßig fort, so daß also die Vermehrung des Pilzes eine ganz ungeheuer sein kann. Erst wenn das Substrat nährstoffärmer wird, schreitet der Pilz zur Hauptfruchtform, zur Bildung der Ascosporen.

Man sieht dann an einzelnen Hyphen schraubenartig gewundene dicke Äste (fertile oder ascogene Hyphen genannt, siehe Abb. 201, g) auftreten, an deren Basis dünnere sterile Fäden aussprossen. Die letzteren verzweigen sich dann rasch sehr stark und umhüllen bald die fruchtbaren Hyphen vollständig, indem sie durch starkes Verflechten eine pseudoparenchymatische Hülle bilden. Erst dann beginnt in der fruchtbaren Hyphe, welche sich bisher nur wenig entwickelt hat, ein kräftiges Wachstum. Es treten Querteilungen auf und es bilden sich kurze verzweigte Äste, die sich zwischen die sterilen Hyphen einschieben und dieselben auseinander drängen. Ihre letzten Verzweigungen, die Enden der Seitenäste, schwellen dann schlauchartig an, während die unfruchtbaren Hyphen allmählich verdrängt und aufgelöst werden, und erfüllen zuletzt als Ascii mit

je acht Sporen (Abb. 201, *a*) den jetzt nur noch von einschichtiger, starker Wand umgebenen Fruchtkörper. Erst wenn dieser zerreißt oder verwittert, werden die Sporen frei.

Zu dieser Familie gehört auch *Penicillium crustaceum*, der gemeine Pinselschimmel (Abb. 201, *a, g, x*), welcher ebenfalls auf fast sämtlichen




Abb. 201. Schimmelpilze: *a, g, x* *Penicillium crustaceum*, der Pinselschimmel; *x* ein Konidienträger, *g* fertile Hypha, *a* Asci mit Sporen; *p, y* *Erysiphe communis*: *p*<sup>1</sup> Fruchtkörper, *p*<sup>2</sup> Fruchtkörper, die Asci entlassend, *y* Abschnürung der Konidien an vegetativen Mycelfäden. (Stark vergrößert.) (Nach Brefeld und Frank.)



Substraten fortkommt und dieselbe kolossale Vermehrung zeigt wie der vorige Pilz. Er weicht hauptsächlich dadurch vom „blauen Schimmel“ ab, daß bei ihm die Konidienträger an der Spitze mehrfach gegabelt sind (Abb. 201, *x*). Ascosporen werden nur sehr selten und nur auf bestimmten Substanzen (z. B. Brot) gebildet, auch fast durchweg erst vor Einbruch des Winters.

#### Familie **Entuberaceae**. Trüffelpilze.

Die Trüffelpilze besitzen ein weit verzweigtes Mycel, welches in der Erde wuchert und wohl stets den Wurzeln holziger Pflanzen aufsitzt. Die Ascosporen werden gebildet in großen, unterirdisch liegenden, fleischig-knollenförmigen Fruchtkörpern, welche von unregelmäßig gewundenen Luftgängen durchsetzt sind (Abb. 202). Die Wände dieser Gänge sind mit der Schlauchschiicht (Ascohymenium) ausgekleidet. In jedem Ascus liegen meist vier, manchmal aber auch zwei oder acht Sporen, welche ziemlich groß sind, gewöhnlich eine stachelige Membran besitzen und erst durch Verwitterung des Frucht-

körpers frei werden. Das Innere des Fruchtkörpers ist fleischig, die Außenwand ist jedoch fest und hart.

*Tuber melanosporum* ist die sogen. Perigordtrüffel, welche seit längerer Zeit schon auf den Wurzeln von Eichen in Südfrankreich kultiviert wird und auch in Süddeutschland wildwachsend vorkommt. Die Perigordtrüffel ist ungefähr nuß- bis faustgroß, schwarzrötlich und besitzt etwa die Konsistenz der Kartoffel. Ihr Wert beruht in ihrem feinen Geschmack und dem starken Aroma.



2

Abb. 202. Eine Trüffel (*Tuber rufum*). 1 Fruchtkörper im Vertikalschnitt, 5mal vergrößert, a die Rinde, d das lufthaltige Gewebe, c dunkle Adern lückerloses Gewebe, h das askusbildende, später gekammerte Gewebe. 2 Ein Stückchen des Hymeniums, 450mal vergrößert. (Nach Tulasne)



Abb. 203  
*Morchella esculenta*,  
die Speisemorchel.

### Familie **Helvellaceae.**

#### Morchelpilze.

Für die hierher gehörigen Arten ist charakteristisch, daß das *Ascohymenium* (die Schicht der *Asci*) frei an der Außenseite sehr verschiedenartig geformter, fleischiger Fruchtkörper liegt.

Zu dieser Familie gehört die Morchel (*Morchella esculenta*, Abb. 203), ein Pilz, welcher zu den wichtigsten Speisepilzen gehört.

Diese Art ist dadurch ausgezeichnet, daß ihr Fruchtkörper in einen unfruchtbaren Stiel und einen fruchtbaren, kopfförmigen oberen Teil geschieden ist. Die Morchel tritt stellenweise auf sandigem Boden und auf Waldwiesen herdenweise auf, kann aber an denselben Stellen oft wieder jahrelang verschwinden. Sie enthält absolut keine giftigen oder schädlichen Stoffe und bildet eine geschätzte Delikatesse.

Auch *Helvella* (oder *Gyromitra*) *esculenta*, die Stockmorchel oder Lorchel, welche der Morchel ziemlich ähnlich ist, wird gerne gegessen. Sie enthält im frischen Zustand ein Gift (*Helvellasäure*); dieses ist jedoch in

kochendem Wasser löslich, so daß der Pilz nach dem Abgießen des Wassers ungefährlich und genießbar ist.

### Familie **Hypocreaceae.**

Hierher gehört ein sehr interessanter Pilz, welcher auffallende Bildungen hervorbringt:

Off. **Claviceps purpurea**, der Pilz des Mutterkorns.

Die Entwicklung dieses Pilzes soll von Anfang bis Ende geschildert werden, da das Mutterkorn officinell ist und wir hier auch ein Beispiel von einem überaus formenreichen Pilze besitzen.

Viele Gräser, besonders manche unserer Getreidepflanzen, werden zu ihrer Blütezeit von einem Pilz befallen. Die Sporen des letzteren gelangen auf die Blütenstände, keimen dort aus und senden einen Keimschlauch durch die Oberhaut des Fruchtknotens. In dem jungen Fruchtknoten, dem reichliche Nährsäfte (eigentlich zur Samenbildung bestimmt!) zuströmen, entwickelt sich der Pilz sehr rasch, so daß das Mycel ihn bald vollständig erfüllt. Hierdurch wird auch die Form des Fruchtknotens geändert. Es resultiert bald ein schmutzig-weißes, fleischiges, überall von tiefen Furchen durchzogenes, etwa zylindrisches Gebilde, durch dessen Oberhaut überall die Pilzhyphen hervortreten, d. h. der Grasfruchtknoten wird zu einem Lager, einem Stroma des Pilzes. In den Furchen des Stromas (Abb. 204, 2) schnüren nun die Hyphen sehr zahlreiche Konidien ab, zugleich wird dort aber auch eine süße Flüssigkeit produziert, in welcher die Sporen schwimmen und die man früher oft als Honigtau bezeichnet hat. Durch diesen süßen Saft werden zahlreiche Insekten herbeigelockt, welche beim Aufnehmen desselben sich mit den im Saft schwimmenden Konidien beladen und sie beim Besuchen anderer Grasblüten auf diese verschleppen. Auch diese Blüten werden dann sofort vom Pilze befallen, so daß also die Krankheit rasch eine große, fast epidemische Ausbreitung gewinnen kann und oft bedeutenden Schaden anrichtet.

Die geschilderte Konidienbildung dauert so lange an, als die Nährstoffe dem Fruchtknoten in reichlicher Menge zufließen. Sobald aber die Grasart dem Ende ihrer Vegetationsperiode zuschreitet, tritt der Pilz in ein anderes Stadium ein. Die Sporenbildung hört auf, dagegen zeigt das Mycelium ein um so energischeres Wachstum. Die Hyphen verzweigen sich sehr lebhaft, verflechten fest miteinander, und das bisher fleischige Stroma wird nun zu einem verlängert-zylindrischen, durch und durch festen, fast holzartigen Körper, einem Dauerzustand des Pilzes, einem sogen. Sklerotium. In ihm füllen sich die Zellen des Pilzes allmählich, nachdem ihr starkes Wachstum aufgehört hat, mit Reservestoffen (besonders fettem Öl), und das Sklerotium erhält zuletzt eine schwarz bis dunkelviolet gefärbte, harte, fast hornige Rindenschicht, die sich deutlich von der etwas weichen Innenschicht abhebt. Das auffallende Gebilde ragt weit über die Spelzen des Grases hinaus und bildet so das Mutterkorn, das *Secale cornutum* (Abb. 204, 1 u. A), über dessen plötzliche Entstehung man sich früher natürlich keine Vorstellung machen konnte und das eine große Bedeutung als Heilmittel hatte. Auch jetzt wird das Mutterkorn noch sehr viel medizinisch verwertet und ist officinell.

Mit Hilfe der geschilderten Sklerotien, welche zuletzt aus den Spelzen abfallen und auf dem Boden liegen bleiben, überdauert der Pilz den Winter. Sobald aber im Frühjahr reichliche Feuchtigkeit und Wärme erscheinen, beginnen die Sklerotien zu „keimen“ (Abb. 204, 3). Unter Zuhilfenahme der reichlich angesammelten Reservestoffe setzen die Hyphen das während des Winters unterbrochene Wachstum wieder fort. Durch die rissige Rindenschicht der Sklerotien treten mehrere bis viele dicke Bündel von Hyphen hervor, die an ihrer Spitze bald hellrote bis purpurrote, kugelige Anschwellungen bilden. An der Peripherie derselben finden wir zahlreiche, flaschenförmige Einsenkungen, die sogen. Peritheecien (Abb. 204, 4, 5), in welchen die Ascusbildung erfolgt, und wir erkennen, daß diese Hyphenbündel und -köpfchen als „stromatische

Bildungen<sup>2</sup>, d. h. als eine Vereinigung zahlreicher Ascusfrüchte aufzufassen sind. Die Asci besitzen die Form langer zylindrischer Schläuche, und in ihnen liegen je acht dünne und lange, fadenförmig gestreckte Ascosporen (Abb. 204, 6, 7), welche bald aus den Schläuchen herausgeschleudert und dann durch die Luft weithin verweht werden. Gelangen sie rechtzeitig zur Keimung auf die Blütenstände der Gramineen, so wiederholt sich der soeben geschilderte Kreislauf von neuem.

In die Verwandtschaft der Gattung *Claviceps* gehört die interessante Gattung *Cordyceps*, welche besonders reich in den Tropen vertreten ist, bei uns aber nur mit einer einzigen Form auftritt. Während *Claviceps* parasitisch auf Pflanzen lebt, sind die Arten von *Cordyceps* fast durchweg auffallende Parasiten auf Raupen und Puppen. Wird eine solche von einer Spore befallen, so



Abb. 204 A. Roggenähre mit mehreren in Mutterkorn umgewandelten Früchten ( $\frac{3}{4}$ ).




Abb. 204. Der Mutterkornpilz (*Claviceps purpurea*): 1 Grasähre mit dem Sklerotium (*s*) und Resten des vertrockneten Fruchtknotens (*m*) (natürl. Größe); 2 Bildung der Konidien; *m* Mycelium, *c* abgeschnürte Konidien (stark vergrößert); 3 Sklerotium (*s*) zu sogen. Peritheciaträgern (*t*) ausgewachsend (natürl. Größe); 4 Längsschnitt durch das Köpfchen eines Peritheciaträgers; *p* Perithecia; 5 Längsschnitt durch ein Perithecium (*p*) mit den Asci (*a*); 6 zwei Asci (*a*) mit den Sporen (*sp*); 7 letztere stärker vergrößert; 8 zwei Sporen in Keimung begriffen. (4–8 stark vergrößert.) (Nach Tulasne.)

keimt diese bald und dringt mit einem Schlauche in das Lebewesen ein. Binnenkurzem wird das Insekt durch das ungeheuer wuchernde Mycel zum Absterben gebracht, und zwar so, daß die Form desselben völlig erhalten bleibt, da es förmlich ausgestopft worden ist. Der Körper des Tieres wird also selbst zum Sklerotium, aus dem dann später das ascusbildende Stroma hervorbricht.

Familie **Saccharomycetaceae.**

Die Arten der Gattung *Saccharomyces* sind stets winzige, nur mit starken Mikroskopvergrößerungen zu erkennende, runde Zellen, welche sich außerordentlich lebhaft durch Sprossung vermehren: an dem Ende einer Zelle bilden sich Ausstülpungen in der Ein- oder Mehrzahl, welche rasch heranwachsen und sich zuletzt von der Mutterzelle abschnüren (Abb. 205). Bei vielen Arten kommt es regelmäßig, bei anderen meist erst nach Erschöpfung ihres Substrates an Nährstoffen, zur Bildung von Sporen, d. h. die wenig veränderten Hefezellen werden zu Asci, in denen zwei oder vier Sporen entstehen. Offenbar sind die Saccharomycetaceae sehr reduzierte Formen.

Die Saccharomycetaceae stellen die typischen Gärungserreger dar, welche imstande sind, in zuckerhaltigen Säften Alkohol zu erzeugen. Ihr Studium hat in neuester Zeit besonders deshalb eine große Bedeutung erlangt, weil man nachweisen konnte, daß die verschiedenen Arten, Formen und Rassen ganz verschiedenartige Gärungen hervorrufen. Man ist deshalb jetzt bestrebt, Reinkulturen herzustellen, in welchen sich nur eine ganz bestimmte Art entwickelt und von welcher man dann auch eine ganz bestimmte verlaufende und gleichmäßige Resultate erzielende Gärung erwarten darf. Nur auf diese Weise ist es möglich, stets dieselbe Sorte Bier zu brauen,




Abb. 205. *Saccharomyces cerevisiae*: 1 Ein einzelnes Individuum; 2 eine durch Sprossung entstandene Kolonie; 3 ein Individuum mit zwei Sporen; 4 drei auskeimende Sporen (stark vergrößert). (Nach Reelf.)




Abb. 206. Entwicklungsstadien einer Basidie (von *Corticium amorphum*) in der Reihenfolge von A—E, anfangs noch ohne Sterigmen und Sporen, zuletzt mit reifen Sporen. (Nach De Bary.)

und in neuester Zeit ist es sogar wahrscheinlich, wenn nicht ganz sicher geworden, daß auch die Güte des Weines wesentlich durch die Art des Gärungserregers beeinflusst wird.

### 3. Klasse. **Basidiomycetes. Basidienpilze.**

Die zu dieser Klasse gehörigen Formen besitzen geradeso wie die *Ascomycetes* ein vielzelliges, oft außerordentlich reich entwickeltes Mycel. Auch fehlt wie bei jenen durchweg eine deutlich erkennbare geschlechtliche Fortpflanzung. Wie bei den *Ascomycetes* kennen wir endlich auch hier Nebenfruchtformen und eine Hauptfruchtform. Erstere können sehr mannigfaltig sein und unterscheiden sich häufig in nichts von denjenigen, die wir bei der vorigen Klasse beobachteten. Die Hauptfruchtform ist dagegen durchaus verschieden. Sie kennzeichnet sich durch die Bildung von Konidien, und zwar an Trägern von eigenartiger Form. Bei den weitaus meisten *Basidiomycetes* entstehen die Konidien, die sogen. Basidiosporen, in fest normierter Zahl an Trägern (Basidien) von ganz bestimmter Gestalt und Ausbildung (Abb. 206).

#### 1. Unterklasse. **Hemibasidii.**

Hier sind die Konidienträger basidienähnlich, stets aus Chlamydosporen entsprossen, mehrzellig oder einzellig und bringen stets Sporen in unbestimmter, sehr wechselnder Anzahl hervor.

Es gehört hierher eine größere Anzahl von parasitischen Pilzen, welche in vielen Fällen unseren Kulturgewächsen bedeutenden Schaden zuzufügen vermögen und deshalb von großer praktischer Bedeutung sind. Es soll aus diesem Grunde auf sie etwas genauer eingegangen werden.

#### Familie **Ustilaginaceae.** Brandpilze.

Eine der charakteristischsten und sehr häufig zu beobachtenden Formen der Brandpilze ist *Ustilago Avenae*.

Man bemerkt häufig auf Haferfeldern, daß in zahlreichen Fruchtständen keine Körner ausgebildet werden, sondern daß sich an deren Stelle ein dunkelbraunes Pulver findet (Abb. 207, 1). Unter dem Mikroskop erweist sich dieses als eine dichte Masse derbwandiger, brauner Sporen, welche — wie zahlreiche Untersuchungen zweifellos ergeben haben — befähigt sind, lange Zeit hindurch trotz der ungünstigsten Verhältnisse ihre Keimkraft zu bewahren. Sobald man diese Sporen in Nährflüssigkeiten oder auch nur in Wasser bringt, treiben sie sehr rasch einen kurzen, drei- oder vierzelligen Keimschlauch aus, welcher sich als ein Fruchträger erweist. Denn seitlich an den Zellen des Schlauches werden bald feine Anschwellungen gebildet, welche rasch heranwachsen, sich bei der Reife ablösen und als Konidien darstellen (Abb. 207, 3). Wenn die Konidien abgefallen sind, können von den Zellen des Keimschlauches immer und immer wieder neue Sporen hervorgebracht und abgeschnürt werden, so daß also die Vermehrung eine ganz enorme ist. Ist diesen Konidien nun flüssiger Nährstoff geboten, so beginnen sie sofort mit Hefesprossungen, in derselben Weise, wie wir dies früher bei den echten Hefen kennen gelernt haben, so daß die nach einiger Zeit gebildeten Sporen, resp. Zellen, nach vielen Hunderttausenden zählen können. Wenn jetzt aber die Nährflüssigkeit schwindet, tritt der Pilz in ein anderes Entwicklungsstadium ein. Die Konidien sowohl wie die Zellen

des Fruchträgers wachsen jetzt nämlich zu Hyphen aus, und diese sind befähigt, in junge Keimpflanzen einzudringen. Der Pilzfaden durchbohrt die Außenschicht jener kurz über dem Boden, dringt in das Pflänzchen selbst ein und breitet sich in dem ganzen Sproß aus, ohne dem Individuum vorläufig Schaden zuzufügen. Die junge Pflanze wächst rasch heran, und in ihrer Spitze wandert das Mycel stetig mit, während es in den unteren Partien der Wirtspflanze allmählich abstirbt und zuletzt völlig verschwindet. Die Haferpflanze bildet sich also ganz normal aus, bis sie zur Blütenbildung schreitet. Das im Stengel mitgewanderte Mycel dringt nun plötzlich in die jungen Fruchtknoten ein, wo es reichliche Nährstoffe zugeleitet erhält, verzweigt sich dort sehr rasch, so daß es den gesamten Raum füllt, und wandelt zuletzt seine sämtlichen Zellen zu Brandsporen (Chlamydosporen) um: die Mycelfäden zerfallen in zahlreiche kurze Gliederzellen, die sich etwas abrunden und eine starke Membran erhalten (Abb. 207, 2). Durch diese Chlamydosporenbildung wird natürlich die Ausbildung eines Samens des Hafers durchaus verhindert, und es ist klar, daß bei einem starken Auftreten des Parasiten ganze Ernten vernichtet werden können.

Es hat sich in neuester Zeit herausgestellt, daß jede unserer Getreidepflanzen eine besondere Art dieser Brandpilze beherbergt, die man früher alle unter *Ustilago segetum* zusammengefaßt hatte. So wird der Hafer von *U. Avenae*, Gerste von *U. Hordei*, Weizen von *U. Tritici* befallen.

Bei dem Maisbrande, *Ustilago Maydis*, ist die Entwicklung in vielen Punkten von dem eben geschilderten Typus abweichend. Werden von diesem Pilz junge Keimpflanzen befallen, so werden sie sehr rasch getötet. *U. Maydis* ist jedoch auch befähigt, in die Gewebe der entwickelten Pflanze einzudringen. Er befallt dann meist nicht den Blütenstand, sondern er breitet sich an der Stelle des Stengels, welche er befallen hat, mehr oder weniger weit aus und regt diese Gewebe zu abnormem Wachstum an. Es entstehen dann an den Maispflanzen starke, kropfige Anschwellungen, in welchen sich die Chlamydosporen in ungeheurer Menge entwickeln und bei der Reife als ein dunkelbraunes Pulver frei werden, während alle übrigen Teile der Pflanze ganz normal bleiben und sich auch die Früchte gut entwickeln. Natürlich wird aber die Maispflanze durch den Parasiten doch sehr geschwächt, da dieser ihr viele Nährstoffe entzieht und zur Sporenbildung verbraucht.

Wir sahen oben, daß die Konidien in flüssigem Nährsubstrat zur Hefesprossung schreiten und daß die auf diese Weise gebildeten Konidien dann später wieder zu Mycelien auswachsen. Dies ist aber, wie genaue Untersuchungen gezeigt haben, nur dann möglich, wenn die Hefesprossung nicht zu lange angedauert hat. Läßt man nämlich den Pilz sich längere Zeit ständig durch Hefesprossung vermehren, so verlieren die Konidien allmählich die Fähigkeit, wieder zu Mycelien auszuwachsen. Auf die Praxis übertragen heißt dies also, daß die




Abb. 207. 1 Ein Brandpilz (*Ustilago Avenae*) auf einer Haferrispe (natürl. Größe). 2 ein Teil des Myceliums in Chlamydosporenbildung begriffen (stark vergr.); 3 Keimschläuche mit Konidien; 4 beginnende Hefesprossung der Konidien. (Nach Frank und De Bary.)

auf dem feuchten Ackerboden auskeimenden Chlamydosporen mittelst ihrer Konidienträger sehr zahlreiche Sporen hervorbringen und daß diese sich dann durch Hefesprossung bis ins Ungemessene vermehren können, ohne daß eine Ansteckung der Haferpflanzen zu erfolgen braucht — wenn nämlich die Witterung so feucht ist, daß ständig die Sprossungen fortdauern und es nicht zur Bildung von Mycelien kommen kann.

#### Familie **Tilletiaceae**. Brandpilze.

Biologisch verhalten sich die Arten dieser Familie fast ganz wie die der vorigen, besonders so, wie wir dies bei *Ustilago Avenae* kennen gelernt haben. Sie dringen meist in die Keimpflanzen ein, wachsen mit der Vegetationsspitze mit, ohne die Pflanzen zu schädigen, und bilden dann ihre Chlamydosporen (die auch hier als Brandsporen bezeichnet werden) in den Fruchtanlagen der Wirtspflanzen. Morphologisch verhalten sich die Arten hingegen nicht wenig abweichend. Bei der Keimung der Chlamydosporen tritt nämlich ein dicker ungeteilter Keimschlauch aus, welcher an seiner Spitze eine unbestimmte Anzahl von fadenförmigen, langgestreckten Konidien abschnürt, deren Entwicklung im übrigen ähnlich verläuft wie diejenige der Konidien von *Ustilago*. Viele Arten dieser Familie bilden sehr gefährliche Parasiten unserer Getreidepflanzen.

Es ist vor allem *Tilletia Tritici* anzuführen, der Erreger des sogen. Stinkbrandes des Weizens. Bei den erkrankten Pflanzen sind die Fruchtknoten mit einer schmierig-klebrigen Masse, den Chlamydosporen, erfüllt, welche stark nach Heringslake riecht. Kommen solche erkrankte Körner unter das Getreide und werden gemahlen, so können dadurch große Mengen von Mehl total unbrauchbar werden.

#### 2. Unterklasse. **Eubasidii**.

Die Konidienträger sind hier zu echten **Basidien** geworden, d. h. bei ihnen werden die Konidien (Basidiosporen) in fest normierter Zahl an Trägern von bestimmter Form gebildet (Abb. 206 und 209).

#### 1. Reihe. **Protobasidiomycetes**.

Die Basidien sind bei dieser Reihe quer oder längs geteilt.

#### Familie **Pucciniaceae**. Rostpilze.

Alle hierher gehörigen Arten sind echte Parasiten, welche lebende Pflanzen befallen und sich mittelst eines quer geteilten Mycels in deren Geweben ausbreiten. Teils durchwuchert ihr Mycel nur lokal bestimmte Stellen der Nährpflanzen, teils aber durchzieht es letztere auch mehr oder weniger vollständig. Infolgedessen fallen auch die Erkrankungen der Nährpflanzen je nach dem verschiedenartigen Verhalten des Parasiten verschieden aus.

In manchen Fällen ist kaum oder nicht nachzuweisen, daß die Wirtspflanze irgendwelchen direkten Schaden genommen hat, in anderen Fällen dagegen wird die Pflanze abgetötet oder wenigstens so stark geschwächt, daß sie nicht zur Fruchtbildung zu schreiten vermag. Wieder in anderen Fällen werden die Gewebe so sehr deformiert, oft zu übermäßigem, unnatürlichem Wachstum angeregt, oft auch im Wachstum zurückgehalten, daß dadurch Verunstaltungen hervorgerufen werden, z. B. die sogen. Hexenbesenbildungen, die den befallenen Pflanzen oder Pflanzenteilen ein abnormes, auffallendes Aussehen verleihen.

Auch ihr morphologisches Verhalten ist ein außerordentlich verschiedenes und von solchem allgemeinem Interesse, daß es angezeigt sein dürfte, mehrere charakteristische Vertreter kurz zu besprechen.

Eine Art, welche einen ziemlich einfachen Entwicklungsgang zeigt, ist *Puccinia Malvacearum*. Sie entstammt tropischen Gebieten, machte jedoch vor mehreren Jahren einen plötzlichen Vorstoß bis in die gemäßigten Klimate und brachte eine förmliche Epidemie hervor. Sie hat die Fähigkeit, sämtliche oder fast sämtliche Malvengewächse (Malvaceae) befallen zu können, und schädigt diese in so intensiver Weise, daß sie zum Absterben gebracht werden. Und so kam es, daß in manchen Gegenden schon wenige Jahre nach dem Auftreten des Pilzes kaum noch Malvengewächse anzutreffen waren: sämtlich waren sie der „Epidemie“ zum Opfer gefallen. Seitdem ist der Pilz bei uns einheimisch geworden. Er tritt jedoch nie mehr in so gefährlicher Form auf, ein Verhalten, wie wir es in ganz ähnlicher Weise von Bakterienepidemien kennen gelernt haben. Wenn ein Malvenblatt von einer Spore von *Puccinia Malvacearum* befallen wird, so keimt letztere sehr bald und sendet einen Keimschlauch in die Wirtspflanze hinein, wo sich dieser rasch verzweigt und in kurzer Zeit ein kräftiges Mycel entwickelt. Unter der Blattepidermis entstehen dann kleine polsterförmige Lager, in welchen sich die Myceläste stark verzweigen und nach außen strecken. Bald wird hierdurch das Oberhautgewebe an kleinen Stellen zerrissen und die Hyphenlager liegen frei da. Am Ende jeder dieser gestreckten Hyphen nun wird eine zweizellige, spindelförmige Spore gebildet, welche mit fester Membran umgeben ist (Chlamydospore). Jede der Zellen besitzt jedoch in der dicken Wandung eine verdünnte Stelle, den Keimporus (vergl. Abb. 208, II, III). Sobald die Sporen gereift sind und etwas feuchte Witterung eintritt, erfolgt die Keimung der meist abgefallenen Sporen, und zwar so, daß aus dem Keimporus ein vierzelliger Keimschlauch austritt. Dieser Keimschlauch stellt nun die Basidie dar (Abb. 209). Jede der vier Zellen desselben treibt nämlich einen kurzen Fortsatz (Sterigma) aus, an welchem sich eine einzellige Spore bildet. Auch diese Sporen keimen bei günstigen Vegetationsbedingungen sofort, sie werden durch den Wind verweht, dringen mittelst eines Keimschlauches in eine Nährpflanze ein und von ihrem Mycel werden dann wieder Chlamydosporen in der erst geschilderten Weise gebildet. Es ist klar, daß bei einer so ununterbrochenen Fortentwicklung und der ungeheuren Anzahl der gebildeten Sporen die Verbreitung des Pilzes von Pflanze zu Pflanze sehr rasch erfolgen kann.

Bei vielen anderen Arten dieser Familie finden wir nun ein abweichendes Verhalten insofern, als hier zwei Arten Chlamydosporen gebildet werden: ziemlich zartwandige, einzellige (Abb. 208, III w), welche gleich nach erlangter Reife auskeimen können, jedoch nicht fruktifikativ, d. h. ohne Basidien zu bilden, sondern vegetativ, einfach, indem sie einen Keimschlauch treiben, der in eine Wirtspflanze eindringt. Erst im Spätjahr oder bei Eintritt ungünstiger Vegetationsbedingungen treten allmählich zwischen den eben geschilderten Chlamydosporen andere auf, welche in der Gestalt stark abweichen und allmählich immer reichlicher gebildet werden, so daß zuletzt die Sporenhäufchen nur noch aus ihnen bestehen (Abb. 208, II, III t). Sie sind zwei- bis mehrzellig, dickwandig, vermögen ohne Schaden den Winter zu überstehen und keimen im nächsten Frühjahr

fruktifikativ aus, d. h. indem sie Basidien bilden. Die im Sommer gebildeten Sporen werden allgemein als Uredo- oder Sommersporen, die im Spätjahr entstehenden als Teleuto- oder Wintersporen bezeichnet. Die zuletzt geschilderten Arten besitzen also zweierlei verschiedene Sorten von Chlamydosporen, welche zeitlich aufeinander folgen. — Die meisten Arten der Familie sind nun aber noch weiter entwickelt: wir finden bei ihnen drei verschiedene Chlamydosporenformen.

Befällt eine Spore dieser Arten eine Wirtspflanze, so treten meist im zeitigen Frühjahr zunächst an den erkrankten Pflanzenteilen kleine, oft hellgefärbte




Abb. 208. *Puccinia graminis*. I Blattquerschnitt von *Berberis* mit Äcidien *a*; *p* deren Peridie; *u* Unter-, *o* Oberseite des Blattes, das an der Strecke *xy* durch den Schmarotzer verdickt ist; auf der Oberseite stehen Pyreniden (*sp*). *A* ein junges, noch nicht hervorgebrochenes Äcidium. II Teleutosporienlager (*t*) auf dem Blatt von *Triticum repens*, *e* dessen Epidermis. III Teil eines Uredolagers ebendort; *ur* die Uredosporen; *t* eine Teleutospore. (Nach Sachs und De Bary.)

Becherchen auf, die sogen. Äcidien (Abb. 208, I, *a*). Es sind dies Fruchtkörper, welche sich geschlossen unterhalb der Oberhaut der Wirtspflanze bilden. An ihrem inneren Grunde tritt eine Schicht nach außen gestreckter, dicker und kurzer Schläuche auf, von welchen mehr oder weniger lange Ketten von dickwandigen Sporen abgeschnürt werden. Sehr bald zerreißt über der Fruchtanlage die Oberhaut der Wirtspflanze, die von einer Hülle (Peridie) umgebenen Fruchtkörper öffnen sich becherartig, die unzähligen Sporen (Äcidiosporen) werden dadurch frei und von dem Wind verweht. Sobald diese auf eine Nährpflanze

gelangen, keimen sie vegetativ durch Austreiben eines Mycelschlauches, welcher in das Gewebe eindringt und sich dort zum Mycel entwickelt. Sie verhalten sich also in diesem Punkte ganz wie die Uredosporen. Diejenigen Pucciniaceae, welche durch diese letztbeschriebene Chlamydosporenbildung ausgezeichnet sind, zeigen nun meist noch eine sehr charakteristische Nebenfruchtform. Während nämlich die Acidienbecher fast durchweg auf der Blattunterseite der Wirtspflanzen auftreten, findet man auch auf der Oberseite der Blätter kleine Fruchtkörper, die sogen. Pycniden oder Spermogonien (Abb. 208, I, *sp.*). Es sind dies meist etwa flaschentörmige, nach außen geöffnete Räume, um welche herum sich Mycelschläuche radial gerichtet legen und nach dem Inneren der Pycnide winzige und ziemlich dünnwandige Sporen, Konidien (Pycnosporen), abschnüren. Diese werden sehr leicht verweht und keimen stets vegetativ. Ihre Bedeutung für den Entwicklungsgang des Pilzes ist noch unbekannt.

Sehr charakteristisch und interessant ist es nun, daß die meisten Pucciniaceen-Arten, welche durch die Bildung der soeben geschilderten drei Hauptfruchtformen ausgezeichnet sind, eine ganz regelmäßige Fruchtfolge zeigen.

Wie wir schon sahen, entwickeln sich meist sehr zeitig im Frühjahr die Acidien und mit ihnen zusammen die Pycniden. Die Acidiosporen keimen aus und treiben ein Mycel, von welchem dann den Sommer über gewöhnlich nur Uredosporen gebildet werden. Erst gegen den Herbst stellen sich die Teleutosporen ein, welche den Winter überdauern und durch deren fruktifikative Keimung dann im folgenden Frühjahr der Kreislauf der Art wieder aufgenommen wird.

Die auffallendste Erscheinung, welche bei den Pucciniaceae und vielleicht überhaupt im Pflanzenreiche auftritt, ist aber die, daß sich die Fruchtformen einer und derselben Art — wenigstens zum Teil — auf verschiedenen Nährpflanzen entwickeln. Es geschieht dies durchweg in der Weise, daß der Pilz auf der einen Nährpflanze mit Acidiosporen und Pycnosporen, auf einer anderen mit Uredo- und Teleutosporen auftritt.

Es soll als Beispiel die Entwicklungsgeschichte des Pilzes angeführt werden, welcher infolge des großen, der Landwirtschaft zugefügten Schadens schon seit Jahrhunderten bekannt war, an welchem aber erst vor verhältnismäßig kurzer Zeit die interessante Tatsache des „Wirtswechsels“ festgestellt wurde.

Schon den Bauern des Mittelalters war es aufgefallen, daß eine Rostkrankheit des Getreides sich immer nur da zeigte, wo in der Nähe der Felder Berberitzensträucher standen. Obgleich absolut kein Beweis für den Zusammenhang von Ursache und Wirkung erbracht werden konnte, war der Glaube doch schon so gefestigt worden, daß Gerichte die Entfernung von Berberitzensträuchern von Getreidefeldern beantragten. Erst vor verhältnismäßig kurzer Zeit wurde der Beweis erbracht, daß die Praktiker richtig erkannt hatten.

Einer und derselbe Pilz, *Puccinia graminis*, bedarf nämlich zu seiner Entwicklung der beiden Wirtspflanzen, Getreide und Berberitze. — Auf den Blättern der letzteren treten im zeitigen Frühjahr hellgelbe Pusteln, Becherchen (Abb. 208, I), auf, welche die Acidienform von *Puccinia graminis* darstellen.




Abb. 209. Keimung der Teleutosporen verschiedener Uredineen; A von *Puccinia* (400), B von *Melampsora* (300), C von *Coleosporium* (230), t Teleutosporen, pm Basidio, sp Basidiosporen.

Die Äcidiosporen werden dann verweht und müssen, wenn sie keimen sollen, auf bestimmte Grasarten gelangen. Alle übrigen Sporen gehen zugrunde. Auf den Gräsern, d. h. also in unserem Falle auf dem Getreide, keimen die Äcidiosporen aus, dringen mit Keimschlauch ein und bilden ein starkes Mycel, bis sie dann nach kurzer Zeit zur Uredo- (Abb. 208, III) und zuletzt zur Teleutosporenbildung (Abb. 208, II) schreiten, welche beiden Fruchtformen eben den gefürchteten Getreiderost ausmachen. Diese letzteren Sporen überwintern, bilden fruktifikativ (vergl. Abb. 209) im Frühjahr Basidiosporen, die zugrunde gehen, wenn sie nicht auf die Blätter der Berberitze gelangen. Dort beginnt dann der Pilz seinen Kreislauf wieder mit der Äcidienbildung. Bei diesem Entwicklungsgang des Pilzes ist es klar, daß dieser mit Notwendigkeit verschwinden muß, wenn ihm eine der beiden Wirtspflanzen entzogen wird, d. h. wenn eine Zeitlang kein Getreide mehr gebaut wird, oder noch besser, wenn die Berberitzensträucher sämtlich umgehauen werden. Ferner leuchtet ein, daß die Ansteckungsgefahr eines Getreidefeldes durch Rost dann am größten ist, wenn in unmittelbarer Nähe desselben Berberitzensträucher stehen, daß also die Praktiker des Mittelalters ganz richtig gesehen und geurteilt hatten.

Solche Arten der Pucciniaceae, welche sich wie *Puccinia graminis* verhalten, d. h. die notwendig an zwei Wirtspflanzen gebunden sind, werden obligatorisch heteröcisch genannt. Man kennt jedoch auch solche, welche wohl für gewöhnlich diesen Wirtswechsel durchmachen, die aber beim Fehlen der zweiten Wirtspflanze nicht zugrunde gehen, sondern instand sind, eine der Fruchtformen, die Äcidienbildung, vollständig auszulassen. Es befallen im Frühjahr die aus den Teleutosporen hervorgehenden Basidiosporen wieder dieselbe Wirtspflanze, auf welcher der Pilz dann den ganzen Sommer über Uredosporen erzeugt, bis endlich im Herbst allmählich mehr und mehr Teleutosporen sich einstellen. Erscheint dann aber die zweite Nährpflanze in einem folgenden Jahre wieder, so bildet auf dieser im Frühjahr der aus den Teleutosporen hervorgehende Pilz sofort wieder Äcidien. — Derartige Formen, welche befähigt sind, in Fällen der Not den Wirtswechsel aufzugeben, werden als fakultativ heteröcisch bezeichnet.

Man weiß nun zwar, daß in den meisten Fällen zu einer Äcidienform auch die anderen Fruchtformen gehören und umgekehrt. Es ist aber oft sehr schwer, die zusammengehörigen Formen festzustellen, und in sehr zahlreichen Fällen ist dies auch noch nicht gelungen.

Die wichtigsten Formen der Pucciniaceae, der Rostpilze, sollen nun aufgeführt werden.

*Uromyces pisi* ist ein heteröcischer Pilz, dessen Uredo- und Teleutosporen auf den Blättern der Erbse vorkommen und dort kleine dunkle Pusteln bilden. Die Äcidien dagegen treten auf *Euphorbia cyparissias*, einer bei uns sehr verbreiteten Wolfsmilchart, auf. Auffallend ist, daß hier das Mycel nicht auf einzelne Stellen beschränkt ist, sondern daß die ganze Wolfsmilchpflanze von demselben durchzogen wird. In dem ausdauernden Wurzelstock überwintert das Mycel, wächst dann im nächsten Frühjahr mit den austreibenden Sprossen mit, verändert dieselben krankhaft (*Hypertrophie*), so daß sie sich von den gesunden Pflanzen sehr stark unterscheiden, und entwickelt an den grünen Teilen die Äcidienbecher, durch deren Sporen der Pilz immer und immer wieder verbreitet wird.

Von der Gattung *Puccinia* haben wir soeben schon den gefährlichen Parasiten *P. graminis* kennen gelernt. Es gehören hierher aber auch noch andere Arten, welche dem Getreidebau fast ebensolchen Schaden zuzufügen vermögen. Besonders ist dies der Fall mit *P. rubigo vera*, deren Äcidienform auf der Ackerochsenzunge (*Anchusa arvensis*) vorkommt. Ist einmal der Pilz in einer Gegend verbreitet, so kann er dem Getreidebau großen Abbruch tun. Es gibt dann nur eine Hilfe: die Unkräuter der Felder mit allen Mitteln auszurotten. Denn sobald *Anchusa* nicht mehr in der Nähe oder inmitten des Getreides wächst, muß der Pilz mit Notwendigkeit verschwinden. — Auch *P. coronata* ist ein gefürchteter Getreideschädling. Seine Äcidienform kommt auf dem Faulbaum zur Entwicklung, dessen Blätter im Frühjahr oft ganz mit den gelben Becherchen bedeckt sind.

Die Gattung *Melampsora*, zu welcher viele gefährliche Parasiten gehören, ist dadurch ausgezeichnet, daß bei ihr die teleutosporenbildenden Hyphen zu festen, krustenförmig zusammenhängenden Lagern vereinigt sind.

*Melampsora pinitorquum* ist der Pilz, welcher die sogen. Kiefern-Drehwüchsigkeit hervorruft. Die Uredo- und Teleutosporenform zeigt sich auf den Blättern der Zitterpappel in wenig auffälliger Form und fügt diesem Baume wohl kaum irgendwelchen Schaden zu. Dagegen tritt die Äcidienform in sehr gefährlicher Weise auf jungen Kiefern auf und kann unter günstigen Vegetationsbedingungen ganze junge Bestände zum Absterben bringen. — In ganz ähnlicher Weise zeigt sich *M. tremulae*, der sogen. Lärchenrost, dessen Uredo- und Teleutosporenform ebenfalls auf der Zitterpappel vorkommt, während die Äcidienform auf Lärchen auftritt. Sehr bald nach dem Erkranken werden die Nadelblätter gelb und fallen dann massenhaft ab, so daß die Bäume zugrunde gehen müssen.

Noch viele hierher gehörige Arten sind als Forstverwüster zu bezeichnen und vermögen großen Schaden anzurichten. Doch müssen sie hier übergangen werden, da ihre Aufzählung zu weit führen würde.

Nur die Gattung *Gymnosporangium* soll hier kurz besprochen werden, da sie in manchen Gegenden häufig in außerordentlich auffallender und charakteristischer Form auftritt. Die Gattung ist dadurch charakterisiert, daß bei ihr die Teleutosporen in großen, kegelförmigen, gallertartigen Fruchtkörpern erscheinen. — *Gymnosporangium sabiniae* ist derjenige Pilz, welcher auf den Blättern des Birnbaumes den auffallenden und in manchen Distrikten Jahr für Jahr auftretenden Gitterrost hervorbringt. Die Uredo- und Teleutosporen zeigen sich in ansehnlichen, gelben, gallertähnlichen Massen auf der Rinde des Sadebaumes (*Juniperus sabina*). Die Äcidienform dagegen entwickelt sich auf den Blättern des Birnbaumes, wo große orangefarbene oder oft grellrote, stark vorgewölbte Polster hervorgebracht werden. Diese Äcidien brechen nun nicht, wie wir dies vorhin bei *Puccinia* sahen, becherartig auf, sondern sie bleiben am Scheitel geschlossen und öffnen sich nur seitlich gitterartig mit einigen Längsrissen. — Es ist klar, daß die Krankheit des Birnbaums verschwinden muß, sobald der Sadebaum aus dessen Nähe entfernt wird.

#### Familie **Auriculariaceae.**

Die Arten dieser Familie zeigen, was ihre Vermehrung betrifft, noch vielfache Übereinstimmung mit den Pucciniaceen insofern, als auch bei ihnen die Basidien quergeteilt, vierzellig sind und von jeder Basidienzelle eine einzige Spore auf einem langen Sterigma gebildet wird. Hier entspringt jedoch die Basidie direkt vom Mycel.

*Auricularia auricula judae*, ein Pilz, welcher sich an Holunderstämmen nicht selten findet, ist ausgezeichnet durch große, ohrförmige, gallertartige, aus dicht verflochtenen Hyphen gebildete Fruchtkörper und wird im Volksmunde häufig als „Judasohr“ bezeichnet. Er war früher gebräuchlich und spielt auch jetzt noch hier und da in der Volksmedizin eine Rolle.

#### 2. Reihe. **Autobasidiomycetes.**

Die Basidien sind einzellig, ungeteilt, mehr oder weniger keulenförmig, mit meist 4, selten 2, 6 oder 8 apikal gestellten Sterigmen (Abb. 206). Die Fruchtkörper sind nur selten noch locker und gallertartig, meist besitzen sie einen festen, fleischigen oder holzigen Bau, d. h. sie sind aus derben, miteinander fest verwachsenen und verflochtenen Fäden zusammengesetzt. Die Basidien entspringen zwar vom Mycel, aber meist nicht an jeder beliebigen Stelle desselben, sondern vom Mycel werden bestimmt geformte, charak-

teristisch und zweckmäßig gebildete Fruchtkörper hervorgebracht, an denen oder innerhalb derer sich Basidien und Basidiosporen entwickeln. Nebenfruchtformen kommen nur noch sehr selten vor.

#### Familie **Clavariaceae.** Keulen- oder Korallenpilze.

Hier finden wir recht auffallende, oft sehr große Fruchtkörper, bei denen wir deutlich eine Markschrift von einer Rindenschicht unterscheiden können. Letztere ist von einer Basidienschicht (einem Basidiohymenium) allseitig dicht überzogen.

**Clavaria botrytis** (Ziegenbart) ist ein häufiger Pilz unserer schattigen, humösen Wälder, der wie alle Arten der Familie gegessen werden kann. Der Fruchtkörper ist fleischig, stark korallenartig verzweigt, von auffallender schwefelgelber bis orangeroter Farbe und erreicht oft bis zu Kopfgröße.

#### Familie **Hydnaceae.** Stachelschwämme.

Bei den Arten dieser Familie erfolgt die Basidienbildung nicht mehr an jeder beliebigen Stelle des Fruchtkörpers, sondern jene ist auf bestimmte Gebiete beschränkt. Die Form der Fruchtkörper ist bei dieser Familie noch sehr wechselnd. Eine und dieselbe Art kann je nach der Art der Unterlage und der größeren oder geringeren Menge von Nährstoffen sehr verschiedenartige Fruchtkörper bilden, und diese können von der krustigen bis zu der hutförmigen Gestalt alle Übergänge zeigen. Die Basidien entstehen jedoch stets nur an eigenartigen stachelförmigen oder kammförmigen Vorsprüngen der Fruchtkörper, welche sich an hutförmigen Exemplaren meist auf der Unterseite entwickeln.

Alle Arten der Gattung **Hydnum**, welche fleischige und ansehnliche Fruchtkörper besitzen, werden gegessen; sie kommen in Wäldern oft massenhaft vor.

#### Familie **Polyporaceae.** Löcherschwämme.

Hierher gehören fast nur noch Formen, deren Fruchtkörper schon eine ganz bestimmte und für die Gattung und Art meist charakteristische Gestalt zeigen (Abb. 210) und nur an ganz besonders ausgebildeten Teilen die Basidien bilden. Charakteristisch ist für alle **Polyporaceae**, daß auf einem Teile des Fruchtkörpers, meist auf der Unterseite des Hutteils, mehr oder weniger tiefe Gruben oder Löcher, oft von wabigem Bau, auftreten, oder daß sich röhrenförmige oder labyrinthartig gewundene Kanäle ausbilden, an deren Wandung die Basidien entstehen und in welche hinein die Basidiosporen abgeschieden werden (Abb. 211).

**Merulius lacrymans**, der Hausschwamm, ist eine derjenigen Formen, bei welchen der Fruchtkörper noch keine bestimmte und fest gewordene Gestalt besitzt. Er kommt in Wäldern nur ziemlich selten vor, besonders auf Nadelhölzern, und tritt hier in wenig auffälliger Form und nur wenig Schaden anrichtend auf. Kommt er aber mit solchem Holz in ein Haus, d. h. werden Balken, in welchen das ausdauernde Mycel wuchert, zu Bauzwecken verwendet, oder aber, entwickelt sich der Pilz erst aus Sporen in einem Haus, das nicht völlig ausgetrocknet ist, so breitet sich das Mycel mit großer Schnelligkeit nach

allen Seiten aus. Besonders günstig sind für die Entwicklung des Pilzes solche Orte, welche wenig gelüftet werden und wo ständig eine feuchte Atmosphäre herrscht. Das Mycel wächst von Balken zu Balken, dringt auch durch starke




Abb. 210. Zunderschwamm (*Fomes fomentarius*). Links ein Pilzfruchtkörper in senkrechtem Durchschnitt, auf der Unterseite das Röhrenlager, oben die Zunderschicht aufweisend. Rechts oben ein kleines Stückchen der Unterfläche des Hutes (der Röhrensicht) im Querschnitt, stark vergrößert.

Mörtellagen hindurch und durchzieht oft in wenigen Monaten bei günstigen Vegetationsbedingungen ganze Häuser. Von ihm werden Enzyme ausgeschieden, welche das Holz stark zersetzen und so mürbe machen, daß man es zwischen den Fingern zerreiben kann. Dieses mürbe Holz wirkt sodann wie ein Schwamm, d. h. es nimmt Wasser mit großer Leichtigkeit auf und leitet es weiter. Dazu kommt noch, daß auch das Pilzmycel wasserleitend wirkt und das Wasser ständig an das morsche Holz abgibt, wodurch vom Grund des Hauses oder von feuchten Stellen derselben ständig Wasser nach trockenen Stellen hingeleitet wird. Dies zeigt sich sehr rasch in den Häusern, welche vom Hausschwamm befallen sind. Die Wände derselben erweisen sich stets als feucht und übelriechend und wirken deshalb krankheitserregend. Hat sich nun das Mycel weithin ausgebreitet, sind genügend Nährstoffe gesammelt und gelangt jenes dann in einen Raum, wo ihm Licht und Luft geboten wird, z. B. in ein leerstehendes, wenig gelüftetes Zimmer, so schreitet der Pilz zur Fruchtkörperbildung. Die Fruchtkörper sind sehr verschiedenartig, stets krustenartig der Unterlage angeschmiegt, fleischig, anfangs schneeweiß, später braun gefärbt und weisen auf der Oberseite flache Runzeln oder unregelmäßig geformte Gruben auf, in welchen sich die Basidien bilden und wo die Sporen in ungeheurer Anzahl entstehen. Auch diese Sporen, welche von jedem Luft-




Abb. 211. *Fomes igniarius*, ein Röhrenschwamm. Ein Querschnitt der Röhren (Flächenschnitt zum Hut), welcher zeigt, wie diese auf der ganzen Innenfläche mit Basidien und den Paraphysen (dem sogen. Basidiohymenium) ausgekleidet sind.

hauche davongetragen werden, wirken stark gesundheitsschädigend, da sie zu schweren Reizungen der Atmungsorgane Veranlassung geben.

Bei den Gattungen **Polyporus** und **Fomes** ist der fertile Teil des konsolartig wachsenden Fruchtkörpers dicht von unzähligen tiefen, oft wabenartig angeordneten Poren durchsetzt, in welchen die Basidien und an diesen die Sporen entwickelt werden. Man erkennt die Poren schon mit bloßem Auge als feine, nadelstichartige Grübchen.

**Polyporus destructor** entwickelt sich häufig in Häusern in ganz ähnlicher Weise wie der Hausschwamm und wird mit diesem oft verwechselt. Schon dadurch ist er jedoch nicht schwer von jenem unterscheidbar, daß er das Wasser nicht so zu leiten vermag und deshalb auch keine Feuchtigkeit der Wände herbeiführt. Aber auch er ist sorgfältig zu bekämpfen, da er schon großen Schaden herbeigeführt hat.

**Polyporus officinalis** ist der sogen. Lärchenschwamm, welcher früher als „*Agaricus albus*“ oder „*Fungus laricis*“ häufig in der Medizin Verwendung fand und auch jetzt noch nicht selten gebraucht wird. Er enthält ziemlich reichlich harzartige Stoffe und dient besonders als drastisch purgierendes Mittel.

**Fomes** (*Polyporus*, auch *Ochroporus*) *fomentarius* ist der Zunder- oder Feuerschwamm, welcher in früheren Zeiten große Wichtigkeit besaß. Er entwickelt sich meist auf Rotbuchen, seltener auf Birken, und kommt in manchen Gegenden sehr häufig vor; er bewirkt, wie die meisten verwandten Arten, eine Zersetzung und ein allmähliches Absterben der befallenen Bäume. Die Fruchtkörper erlangen eine bedeutende Größe und Härte. Ihre untere Schicht, die Röhrenschicht, ist hart und unbrauchbar, die obere, unfruchtbare Schicht dagegen besteht aus feinen, verflochtenen Mycelien, aus welchen der Zunder hergestellt wird. Diese Schicht wird stark geklopft und mit Salpeterlösung behandelt, worauf nach erfolgtem Trocknen das Handelsprodukt fertig ist. Es ist bekannt, welche große Bedeutung früher der Zunder für den Menschen besaß. Jetzt findet er nur noch als blutstillendes Mittel Verwendung und ist vielfach als *Fungus chirurgorum* officinell (Abb. 210).

**Fomes igniarius** ist dem Zunderschwamm sehr ähnlich, besitzt aber ein härteres Mycelgewebe und darf deshalb als Wundschwamm nicht verwendet werden. Aus seinem Fruchtkörper werden häufig als Spielerei Ornamente geschnitzt.

Zur Gattung **Boletus** rechnet man *Polyporaceae*, welche einen typisch hutförmigen Fruchtkörper ausbilden.

**Boletus bulbosus** (= *B. edulis*) ist der bekannte und geschätzte Steinpilz, welcher mit Recht als einer der beliebtesten Speisepilze gilt. Er findet sich in Nadelwäldern, aber auch häufig in Laubwäldern, massenhaft.

#### Familie **Agaricaceae**. Lamellen- oder Blätterschwämme.

Die Fruchtkörper besitzen fast durchweg Hutform und fleischige Konsistenz. Auf der Hutunterseite bilden sich die radial von dem Stielansatze ausstrahlenden Lamellen oder Leisten, an denen die Basidien stehen (Abb. 212).

Das Mycel der *Agaricaceae* ist wie das der sämtlichen *Basidiomycetes* und *Ascomycetes* sehr zart und vielzellig.

Erwähnenswert ist, daß bei manchen Formen eine Art von Milchsaftschläuchen vorkommt; wir finden hier im Fruchtkörper lange, reichverzweigte und unregelmäßig verlaufende, dicke, schlauchförmige

Hyphen, die einen weißen oder gelbroten Milchsaft enthalten, welcher unter starkem Drucke steht und sofort in großen Mengen austritt, wenn der Fruchtkörper verletzt wird.

Ferner ist auf die bei den Agaricaceae häufig vorkommenden Dauerzustände des Mycels hinzuweisen, die Sklerotien und Rhizomorphen.

Die Sklerotien entstehen durch eine starke Verknäuelung und Verästelung der Mycelien, in deren Zellen dann reichlich Nährstoffe, Reservestoffe, abgelagert werden. Die Außenschichten der Sklerotien werden oft sehr hart und fast holzartig starr, dadurch, daß sich die Hyphen zu einem Pseudoparenchym vereinigen. Viele Sklerotien erhalten bedeutende Größen; solche von weit über Kopfgröße sind




Abb. 212. 1. Ein Basidienpilz (Hutpilz): Psalliota oder Agaricus campestris, der Champignon, 1. der gesamte Fruchtkörper, am Grunde mit den Resten des Myceliums, *t* Lamellen; 2. eine Lamelle mit dem Hymenium im Querschnitt, vergrößert; 3. die Randpartie einer Lamelle (das Hymenium) stärker vergrößert, *b* Basidien, *s* Sporen. (Nach Sachs.)

keine Seltenheit. Aus ihnen gehen nach einer gewissen Ruhezeit bei Anwesenheit genügender Wärme und Feuchtigkeit Fruchtkörper hervor, manchmal, nachdem jene jahrelang scheinbar leblos gelegen hatten und den ungünstigsten Vegetationsverhältnissen ausgesetzt waren. Infolge der angesammelten Nährstoffe sind viele dieser Sklerotien eßbar.

Die Rhizomorphen (= wurzelähnliche Körper) entspringen sehr häufig aus Sklerotien und ähneln oft täuschend den Wurzeln höherer Pflanzen. Schneidet man eine solche Rhizomorpha quer durch, so findet man bei Betrachtung des Querschnittbildes unter dem Mikroskop, daß sich dasselbe nur aus Hyphen zusammensetzt, welche im Centrum ziemlich locker verlaufen und meist von weißer Farbe sind, während sie in der Rindenschicht pseudoparenchymatisch dichtgedrängt liegen und eine braune bis tief schwarze Färbung aufweisen. Ein bei uns sehr häufiger Parasit der Nadelhölzer, der als Speisepilz geschätzte Hallimasch (*Armillaria mellea*) ist ganz besonders ausgezeichnet durch charakteristisch ausgebildete Rhizomorphen. Diese werden oft viele Meter lang und mehrere Millimeter

dick und wachsen mittelst Spitzenwachstums. Die Rhizomorphen entwickeln sich mit großer Schnelligkeit zwischen Rinde und Holz der Nadelhölzer und bohren sich ihre Bahn durch das weiche Cambium derselben, indem sie dort diesem Bildungsgewebe reichlich Nährstoffe entziehen. Von den Rhizomorphen gehen nach allen Richtungen feine Hyphenstränge ab, die ins Holz eindringen und hier Zerstörungen hervorrufen. Durch die Rhizomorphen verbreitet sich der Pilz auch von Baum zu Baum. Von einem pilzkranken Baum wachsen unterirdisch diese wurzelähnlichen Stränge nach einem benachbarten Baum hin, dringen dort in die Wurzeln ein und wachsen nach oben, um endlich, wenn sie später stark genug herangewachsen sind, reichlich Fruchtkörper zu bilden.

Von der formenreichen Familie der Agaricaceae sollen hier nur einige der allerwichtigsten Formen herausgegriffen werden.




Abb. 213. 1 Ein Champignon im jugendlichen Zustande; 2, 3 und 4 Entwicklungsstadien des Fliegenpilzes, d. h. des Fruchtkörpers von *Amanita muscaria*.

Die Gattung *Lactaria* ist durch die Ausbildung von Milchsaftschläuchen in den Fruchtkörpern ausgezeichnet.

*Lactaria deliciosa* ist der sogen. Blutreizker, einer der wohl-schmeckendsten Speisepilze, welcher eigentlich ein sehr „giftiges“ Aussehen besitzt. Zerbricht man den schön gelb gefärbten Fruchtkörper, so tritt an der Bruchfläche sehr reichlich ein orangeroter Milchsaft aus, der an der Luft rasch erstarrt und eine grüne Färbung annimmt.

Am besten von allen Basidiomycetes ist dem Laien der Champignon (*Psalliota* oder *Agaricus campestris*) bekannt (Abb. 212 und 213. 1). Dieser wertvolle Speisepilz kommt wildwachsend oft in großen Mengen auf sandigen Waldwiesen vor. Für den Handel wird der Pilz jedoch in großem Maßstabe kultiviert.

*Amanita muscaria*, der Fliegenchwamm (Abb. 213, 2—4), stellt mit seinem roten, weißgefleckten Hute eine auffallende Erscheinung unserer Wälder dar. Er ist ein sehr gefürchteter Giftpilz. Sehr nahe mit ihm verwandt ist einer der beliebtesten Speisepilze des südlichen Europa, der besonders in Italien sehr häufig ist und allgemein gegessen wird, *Amanita caesarea*, der Kaiserschwamm. Er zeichnet sich dadurch aus, daß er auf der Hutunterseite gelbe Lamellen hat, während diejenigen des Fliegenpilzes reinweiß sind.

*Cantharellus cibarius*, der Pfefferling, ist ein sehr beliebter Speisepilz, welcher durch seine hellgelbe Farbe sehr auffällt. Er ist leicht von den übrigen Agaricaceae dadurch zu unterscheiden, daß bei ihm die Lamellen noch an dem Stiel herab verlaufen. Diese Art kommt in Nadelwäldern, in trockenem wie in feuchten, oft in riesigen Mengen vor und hat als Volksnahrungsmittel eine nicht zu unterschätzende Bedeutung.

#### Familie **Phallaceae.**

Man hat die hierher gehörigen Formen als „Pilzblumen“ bezeichnet, und zwar aus mehreren sehr zutreffenden Gründen. Einmal finden wir unter den Fruchtkörpern der Phallaceae sehr




Abb. 214. *Phallus impudicus*; aus dem Mycelstrange *a* entspringen die Fruchtkörper *b* und *c*; an ersterem ist die mit gallertartiger Mittelschicht verschene Peridie noch geschlossen, bei *c* umgibt sie am Grunde den Stiel, der die Gleba an dem glockenförmigen Hut emporgehoben hat.  
(Nach Sachs.)

schöne und auffallende Gestalten, ferner hauchen diese einen sehr charakteristischen, wenn auch nicht angenehmen Eigengeruch aus, welcher zum Herbeilocken von Insekten dient, und endlich wissen wir auch mit Sicherheit, daß die Sporen durch diese Insekten ver-

schleppt und verbreitet werden; also alles Fälle, welche wir auch bei der Blüten- resp. Fruchtbildung der höheren Pflanzen beobachten werden.

Die Fruchtkörper der Phallaceae (vergl. Abb. 214) sind vor der Reife kugelig oder eiförmig und werden umhüllt von einer fleischigen oder gallertartigen, völlig geschlossenen Hülle, der *Volva*. Im Innern finden wir einen Gewebekörper mit zahlreichen Kammern (die sogen. *Gleba*), deren Wände aus einem Lager von Basidien bestehen und in welche dann die Sporen abgeschieden werden. Bei der Reife wird diese *Gleba* durch einen Stielteil, Träger oder *Receptaculum* genannt, in die Höhe gehoben, nachdem durch dessen gewaltiges Wachstum die *Volva* am Scheitel zerrissen worden ist und dann am Grunde des *Receptaculums* als eine gallertartige Hülle bestehen bleibt. Sobald das *Receptaculum* sich gestreckt hat, zerfließt das gesamte Gewebe der *Gleba* und tropft von der Spitze des *Receptaculums* herab, in den Tropfen große Mengen der vorher gebildeten Basidiosporen mit sich führend.

Von der Gattung *Phallus*, welche mit ihren meisten Arten in den Tropen gedeiht, kommt *Ph. impudicus*, die sogen. Gichtmorchel oder Stinkmorchel (Abb. 214), auch bei uns vor. Dieser auffallende Pilz wächst hier und da in trockenen Nadelwäldern, am liebsten im dichten Waldesdunkel. Häufig wird man auf die Anwesenheit des Pilzes schon aufmerksam, lange bevor man ihn erblicken kann, und zwar infolge seines ekelerregenden Aasgeruches, welchen er bei seiner Entfaltung entwickelt.

#### Familie **Lycoperdaceae.**

Diese Familie steht den Phallaceae nahe. Doch wird hier die Hülle (*Peridie*) nicht vom *Receptaculum* durchbrochen, sondern bleibt bis zur Sporenreife geschlossen, worauf sie sich an der Spitze unregelmäßig oder regelmäßig öffnet. Das ganze Innere des Frucht-




Abb. 215. *Geaster hygrometricus*, der Erdstern; *A* junger Fruchtkörper, *B* dieser entwickelt mit spreizender, äußerer *Peridie* bei feuchter Luft, *C* derselbe in trockener Luft. (Nach Corda.)

körpers wird von der *Gleba* ausgefüllt, welche reichlich gekammert ist und deren Kammerwände von einem Basidihymenium bedeckt sind.

Die Arten der Gattung *Lycoperdon* sind in der Jugend essbar. Sie werden meist als Stäublinge bezeichnet. Sie besitzen einen schwachen Stielansatz

und einen deutlich verdickten Kopfteil. In der Jugend ist der ganze Fruchtkörper durchweg von einem weißen Mycel zusammengesetzt und besitzt eine fleischige Konsistenz. Später ist auf einem Durchschnitt der gesamte Kopfteil schwarz, d. h. hier haben sich in den mit bloßem Auge nicht sichtbaren Kammern unzählige schwarze oder dunkle Sporen entwickelt. Bei der Reife reißt die Hülle am Scheitel unregelmäßig auf, so daß die Sporen bei jedem Windstoß als Staubwolke entlassen und weithin verbreitet werden.

Ganz ähnlich verhält sich auch der Riesenbovist, *Globaria bovista*, welcher bis zu 40 cm Durchmesser erlangen kann. Häufig findet man dieses riesige weiße „Ei“ auf Wiesen vor. Es ist im Jugendzustande, d. h. solange sich die Sporen noch nicht entwickelt haben und der Fruchtkörper noch fleischig ist, essbar.

In vielen Punkten abweichend verhält sich die Gattung *Geaster* (= Erdstern). Hier schlägt sich bei der Reife die äußere Peridienschicht in zahlreichen scharf geformten Lappen zurück, während die Gleba von einer dünnen Hüllschicht umgeben frei daliegt. Die eigenartige Form der zurückgeschlagenen äußeren Peridialhülle hat der Gattung ihren Namen eingetragen (Abb. 215).

#### Familie **Sclerodermataceae.**

Zu dieser Familie gehört die sogen. falsche Trüffel, *Scleroderma vulgare*, welche in unseren Wäldern nicht selten vorkommt. Sie besitzt einen kugelige, harten Fruchtkörper, welcher einen undeutlichen Stielansatz aufweist. Beim Durchschnitt durch den Fruchtkörper erhalten wir ein Bild, das sehr an das entsprechende der echten Trüffel erinnert. Jener ist nämlich deutlich gekammert und wird von helleren und dunkleren „Adern“ durchzogen, welche sich von der verschiedenartigen Stärke der Hyphenverflechtung herleiten. Die Kammern sind von den winzigen dunkeln Basidiosporen fast völlig erfüllt. Obgleich diese Art zweifellos giftig ist, wird sie doch recht häufig zur Verfälschung der echten Perigord-Trüffel verwendet. Für jeden Mikroskopiker ist es jedoch leicht, die Fälschung aufzudecken, da eben hier der Fruchtkörper Basidien mit winzigen, freiliegenden Sporen enthält, während bei der echten Trüffel die großen, dichtwarzigen oder stacheligen Sporen in kugelige Schläuchen hervorgebracht werden.

#### Anhang zu den Pilzen:

#### Lichenes. Flechten.

Noch vor ungefähr 50 Jahren wurden die Flechten allgemein als eine gut geschiedene und charakterisierte Klasse des Pflanzenreiches angesehen. Man glaubte die Flechten den Klassen der Algen und Pilze gleichwertig an die Seite setzen zu müssen. Man hatte zwar schon unter dem Mikroskop wahrgenommen, daß sich der Flechtenthallus aus zweierlei Elementen aufbaut, von denen der eine starke Beziehungen zu bekannten Algen, der andere zu bekannten Pilzen aufwies. Aber erst damals wurde definitiv gezeigt, daß tatsächlich der Flechtenthallus durch Algen und Pilze gemeinsam aufgebaut wird, und seitdem haben zahlreiche Arbeiten keinen Zweifel darüber gelassen, daß die Flechtenbildung entweder als eine Symbiose, als eine Lebensgemeinschaft zwischen Pilz und Alge, aufgefaßt werden müsse, oder aber als ein Parasitismus

des Pilzes auf der Alge (Abb. 216). Wir wissen nun auch mit vollster Bestimmtheit, daß ständig Flechten auf die Weise gebildet werden, daß frei lebende Algenkolonien von Pilzfäden ergriffen und umspinnen werden und daß dann zuletzt aus diesen beiden Komponenten das Produkt hervorgeht, welches wir als Flechte bezeichnen und das oft so charakteristische und auffallende Formen annehmen kann.

In bezug auf den Thallus der Flechten kann man leicht zwei ganz verschiedene Gruppen unterscheiden, welche man als homöo-




Abb. 216. Gonidientypen von Flechten, *g* Gonidien, *h* Hyphen; *A* keimende Spore von *Xanthoria parietina* auf *Pleurococcus viridis*. *B* Scytonemafäden von *Stereocaulon ramulosum* umspinnen. *C* *Physma compactum*, Hyphe in einen *Nostoc*faden eindringend. *D* *Synalissa symphorea*, die Gonidien sind *Gloeocapsazellen*. *E* *Cladonia furcata*. (Nach Bornet.)

mere oder als heteromere Flechten bezeichnet hat. Im ersteren Falle lebt der Pilz auf Algenkolonien, welche ihm an Größe weit überlegen sind und wo zwischen den zahlreichen Algenzellen (Gonidien genannt, Abb. 216) nur verhältnismäßig wenige Pilzfäden anzutreffen sind. Die Pilzfäden nehmen in der Flechte hier auch niemals eine bestimmte Lagerung ein, sondern durchziehen oder umwuchern regellos die Algen. Bei den heteromeren Flechten (Abb. 217) finden wir nun gerade das umgekehrte Verhalten. Hier bildet der Pilz den Hauptbestandteil der Flechte und die Alge tritt mehr oder weniger zurück. Infolgedessen ist es hier auch der Pilz, der fast oder ganz ausschließlich die Form der Flechte bedingt, während die

Algen sich in größerer Menge nur an bestimmten Partien, in ganz bestimmten Schichten des Flechtenthallus finden.

Der Gestalt des Flechtenthallus nach unterscheiden wir Fadenflechten, Gallertflechten, Krustenflechten (Abb. 218 A), Laubflechten (Abb. 218 B) und Strauchflechten (Abb. 219 und 221), endlich noch die Steinflechten, welche durch Auflösungsmittel sich Höhlungen in Gesteinen schaffen, in welchen sie ihren Thallus aufbauen.

Die Fruchtformen der Flechten sind sehr wechselnd. Es kann uns dies nicht wundern, wenn wir bedenken, daß die mit den Algen zusammentretenden Pilze den verschiedensten Gruppen angehören können und daß es die Pilze ausschließlich sind, welche die Fruchtformen der Flechten bilden. Es ist deshalb in rein wissenschaftlichen Werken schon durchgeführt worden, die Flechten nicht gemeinsam, zusammenhängend darzustellen, sondern sie denjenigen Pilzgruppen anzuschließen, zu welchen in jedem Falle die symbiotischen Pilze gehören. Weitaus der größte Teil der Flechten




Abb. 217. Querschnitt durch den heteromerischen Thallus von *Sticta fuliginosa* (500mal vergr.); o und u Rindenschicht der Ober- und Unterseite, m Markscheid, g Gonidenschicht, r Rhizoiden. (Nach Sachs.)




Abb. 218. A Eine Krustenflechte, *Baeomyces roseus*. B Eine Laubflechte, *Parmelia parietina*.

gehört in diesem Sinne zu den Ascomycetes (Ascolichenes), und nur wenige Arten haben sich als Basidiolichenes, d. h. Flechten mit einem Basidienpilz, herausgestellt. Die Algen der Flechten haben die Fähigkeit der Fortpflanzung vollständig verloren, sie vermehren sich nur durch fortgesetzte Zweiteilung.

Von größtem Interesse ist die sogenannte Soredienbildung der Flechten, eine rein vegetativ erfolgende Vermehrung, welcher hauptsächlich die Flechten ihre ungemein große Verbreitung verdanken. Es lösen sich vom Flechtenthallus, besonders zu bestimmten Zeiten und an bestimmten Stellen, einzelne Algenzellen oder Gruppen derselben vom Thallus los, welche von lebenden Bruchstücken der




Abb. 219. *Cetraria islandica*. A Pflanze mit drei Apothecien an der Spitze ( $\frac{1}{4}$ ); B Stückchen von dem Lappenrand mit Spermogonien ( $\frac{150}{1}$ ); C ein einzelnes Spermogonium im Längsschnitt mit austretenden Spermation ( $\frac{350}{1}$ ).

Abb. 220. *Cetraria islandica*. Längsschnitt durch ein reifes Apothecium ( $\frac{250}{1}$ ). par Paraphysen, asc Schläuche (Asci) mit Sporen spor; subh Subhymenialschicht, gon Gonidien, ma Marksicht, u. ri Untere Rindenpartie.

Hyphen umspinnen sind. Diese winzigen Gebilde besitzen natürlich nur ein minimales Gewicht und bieten doch der Luft infolge der abstehenden Hyphenhülle so viele Angriffspunkte, daß sie auf ungeheuerere Strecken hin verweht werden können. Kommen sie dann an irgend einem Orte zur Ruhe, wo ihnen nur eine einigermaßen genügende Feuchtigkeit geboten wird, so beginnt sich die Alge zu teilen und die Pilzhypen fangen ein lebhaftes Wachstum an, so daß nach einiger Zeit wieder eine Flechte von der ursprünglichen Form resultiert. Es ist deshalb nicht verwunderlich, daß die Flechten

durchweg die ersten Besiedler neuen Bodens und selbst an Stellen zu finden sind, wo keine andere Pflanze zu vegetieren vermag, auf den höchsten Berggipfeln und an den steilsten und völlig humuslosen Felsen. Die Algen selbst sind ja an Feuchtigkeit gebunden und kommen mit sehr wenigen Ausnahmen niemals an ständig trockenen Orten vor. In der Flechte vermögen sich jedoch die Algen unter dem Schutze der dicht verflochtenen Hyphenhülle lebhaft zu entwickeln und der größten Trockenheit Widerstand zu bieten. Es dürfte wohl auch nicht von der Hand zu weisen sein, daß die Pilzhyphen die Fähigkeit besitzen, Luftfeuchtigkeit aufzusaugen.

In der Lebensgemeinschaft hat also die Alge den Vorteil, vor Wassermangel geschützt zu sein, so daß sie sich ungestört zu vermehren vermag; der Pilz dagegen wird durch die kräftig assimilierende Alge ernährt.

### 1. Reihe. Ascolichenes.

Ascomycetes (Schlauchpilze), welche mit Algen in Symbiose leben.

*Sticta pulmonacea* ist eine Laubflechte mit großem auffallendem Thallus, welche besonders in den höheren Lagen der Gebirge sehr häufig ist. Sie sitzt meistens an Baumrinden fest und war früher als „Lungenflechte“ officinell.




Abb. 221. Eine Strauchflechte. *Usnea barbata*: 1 Teil des Thallus, a Fruchtkörper, Apothecien; 2 Längsschnitt durch ein Thallus-Ende vergrößert, g die Gonidien in besonderer Schicht; 3 Sorredienbildung, d. h. eine aus dem Verbinde gelöste Alge, von Pilzhyphen umgeben; 4 ein Sporenschlauch des Apotheciums; letztere beide Figuren stark vergrößert. (Nach Sachs.)

Off. *Cetraria islandica*, das isländische Moos (Abb. 219, 220), ist auf trockenen Heideflächen der Gebirge überall häufig und kommt auch nicht selten in großen Massen in den Ebenen vor, wo sie stellenweise unfruchtbaren Boden weithin fast allein überzieht. Diese Flechte ist als Lichen islandicus

offizinell und wird gegen Erkrankungen der Respirationsorgane mit Erfolg verwendet.

*Cladonia rangiferina*, die Rentierflechte oder das Rentiermoos, besitzt eine große Bedeutung. Sie ist überall häufig und eine der gewöhnlichsten Flechten in trockenen Wäldern und auf Heiden, von Mitteleuropa an bis nach dem äußersten Norden. Nur ihr ist es zu verdanken, daß die Polargegenden überhaupt noch bewohnbar sind. Denn für eine lange Zeit des Jahres bildet die Rentierflechte die einzige Nahrung für das „Ein und alles“ jener unwirtlichen Gebiete, das Rentier. Die Flechte enthält reichlich Nährstoffe.

Eine gewisse Bedeutung für den Handel mancher Gebiete besitzt dann ferner die Strauchflechte *Roccella tinctoria*. Sie ist fast reinweiß gefärbt und bewohnt die Felsen tropischer und subtropischer Gebiete, wo sie in Menge gesammelt wird. Man gewinnt aus ihr durch geeignete Behandlung die Orseille, einen sehr geschätzten roten oder violetten Farbstoff, welcher zum Färben der Seide und Wolle Verwendung findet. Nicht minder verdient sie aber auch deshalb angeführt zu werden, weil man aus ihr den Farbstoff *Lackmus* herstellt, der für unsere Chemie so große Bedeutung erlangt hat.

Endlich soll noch *Usnea barbata* (Abb. 221) angeführt werden, welche zwar als Nutzpflanze nicht von Bedeutung, dafür aber durch ihre auffallende Erscheinung und ihr stellenweise massenhaftes Auftreten ausgezeichnet ist. In den höheren Lagen der Gebirge, bisweilen allerdings auch in den Ebenen, hängt diese Flechte, weißlich oder grau gefärbt, in langen Strähnen bartartig von den Ästen herab, dieselben oft dicht bedeckend, weshalb der Volksmund für sie Namen wie Bartflechte, Rübezahlsbart etc. erfunden hat.

## 2. Reihe. Basidiolichenes.

Basidiomycetes, welche mit Algen in Symbiose leben.

Man kennt diese Formen erst seit verhältnismäßig kurzer Zeit genauer, ihre Auffindung besitzt jedoch eine außerordentlich große morphologische Bedeutung. Denn an ihnen ließ sich schlagend der Nachweis führen, daß die Flechten kein den Algen und Pilzen gleichwertiges Reich darstellen, da eben nun Pilze verschiedenartiger Gruppen, der *Ascomycetes* wie der *Basidiomycetes*, bekannt waren, welche mit Algen symbiotisch zusammenleben.

Von den wenigen hierher gehörigen Arten sei nur die in Bergwäldern Westindiens häufig vorkommende *Cora pavonia* angeführt, eine sehr schöne Flechte, welche in ihrer Färbung und dem Oberflächenbau an das Auge einer Pfauenfeder erinnert.

## XII. Abteilung.

### Embryophyta asiphonogama (Archegoniatae).

#### Moose und Farnpflanzen.

Es sind dies allermeist Pflanzen mit Stamm und Blättern (Kormophyten), nur selten noch thalloidische Gewächse, bei welchen eine Trennung von Stamm und Blatt noch nicht eingetreten ist. In

ihrem Entwicklungsgang finden wir zwei Generationen, eine geschlechtliche und eine ungeschlechtliche. Die geschlechtliche oder proömbryonale Generation, der Gametophyt, entwickelt Antheridien, in denen Spermatozoiden gebildet werden, und Archegonien, welche als Hauptelement die zu befruchtende Eizelle enthalten. Aus dieser Eizelle entsteht nach erfolgter Befruchtung ein Gewebekörper, der Embryo, resp. die ungeschlechtliche oder embryonale Generation, der Sporophyt, welche noch längere Zeit mit der geschlechtlichen Generation in Verbindung bleibt und von ihr ernährt wird.

### 1. Unterabteilung. Bryophyta (Muscineae).

#### Moospflanzen.

Der normale Entwicklungsgang der Moose ist in kurzen Zügen folgender (vergl. Abb. 222):




Abb. 222. Entwicklung eines Laubmooses. *A* Spore mit Fettröpfchen. *B* Protonema aus der Spore *S* auskeimend, *Ch* Chlorophyllkörner. *C* Vorkeim, Protonema, *S* Rest der Spore, *R* Rhizoiden, *M* junge Moospflanzen-Knospe. *D* dieselbe zu einem jungen, noch sterilen Moospflänzchen herangewachsen, *Bl* Laubblätter. *E* Gipfel einer Moospflanze mit männlichen ♂ und weiblichen ♀ Befruchtungsorganen (Antheridien und Archegonien), umgeben von Paraphysen *P* und einer vielblättrigen Hülle, Perichaetium *Per*. *F* Antheridium im Längsschnitt, von 4 Paraphysen umgeben, das Innere mit Spermatozoiden erfüllt, deren oberste bereits ausschwärmen. *G* reifes Spermatozoid mit den beiden Geißeln. *H* junges Archegonium im Längsschnitt. *Ha* Halskanal, durch welchen die Spermatozoiden nach Öffnung der Spitze zur Eizelle *E* gelangen. *J* reifes Archegonium mit einer befruchteten Eizelle *E*. (Alles etwas schematisiert.)

Bei der Keimung der Spore entwickelt sich aus ihr ein in seiner Gestalt sehr wechselnder Vorkeim (Protonema), welcher sich längere Zeit hindurch algenähnlich verhält; er gleicht entweder

einer Fadenalge oder einer Blattalge und besitzt die Fähigkeit, sich beliebig lang durch seinen Chlorophyllgehalt und die damit verbundene Assimilation zu ernähren. Nach kürzerer oder längerer Frist geht nun aus diesem Vorkeim durch seitliche Sprossung die eigentliche Moospflanze hervor, d. h. entweder ein blattloses, thalloidisches Gebilde (so z. B. bei vielen Lebermoosen) oder aber meist ein in Stengel und Blatt gegliedertes Pflänzchen (so bei vielen Lebermoosen und fast allen Laubmoosen). Auf diesen Moospflänzchen (der proembryonalen oder geschlechtlichen Generation, dem Gametophyten), welche niemals echte Wurzeln entwickeln und keine Leitbündel enthalten, bilden sich nun die Geschlechtsorgane. Das männliche Organ, das Antheridium, besitzt meist einen deutlichen Stielteil und einen oberen keulenförmigen oder mehr oder weniger kugeligen Teil, der von einer einschichtigen Wandung umhüllt wird. Das ganze Innere des Antheridiums wird erfüllt von winzigen, durchaus gleichartigen Zellen, von welchen jede ein Spermatozoid von charakteristischer Form hervorbringt.

Das weibliche Organ, das Archegonium, ist um vieles komplizierter gebaut als das Antheridium. Im ausgebildeten Zustand besitzt es die Form einer Flasche, d. h. sein unterer Teil ist stark angeschwollen und läuft nach oben allmählich in einen mehr oder weniger langen Halsteil aus. Das ganze Gebilde besitzt wie das Antheridium eine einschichtige Wandung. Im unteren Teil des Archegons, dem Bauchteil, liegt die große Eizelle, oberhalb welcher sich bis zum Ende des Halses in einfacher Reihe die sogen. Halskanalzellen anschließen.

Bei der Reife des Archegoniums verquellen die Kanalzellen, sobald sie genügende Feuchtigkeit zugeführt erhalten, und nun können die Spermatozoiden durch den so entstandenen Kanal zur Eizelle vordringen und diese befruchten. Der erste Erfolg dieser geschlechtlichen Vereinigung ist der, daß sich die Eizelle mit einer Zellwandung umgibt. Bald aber treten in der so gebildeten Zelle sehr reichlich Teilungen ein, durch welche zuletzt ein vielzelliger Körper, der Embryo, gebildet wird. Mit ihm beginnt nun die zweite Generation, die ungeschlechtliche oder embryonale, der Sporophyt, welche in der Hauptsache dasjenige Organ darstellt, welches man schlechthin als Mooskapsel bezeichnet, eine Generation, welche also niemals einen in Stamm und Blatt gegliederten Vegetationskörper besitzt. In der Mooskapsel, welche aus dem Embryo hervorgegangen ist, entwickeln sich auf ungeschlechtlichem Wege die Sporen. Auch die Archegonwand macht einen Wachstumsprozeß mit. Sie wächst mit der Mooskapsel mehr oder weniger stark heran und wird zur „Haube“ oder Calyptra, welche entweder an der Spitze von der sich stark streckenden Mooskapsel durchbrochen wird und als ein Wulst (Volva) am Grunde des Kapselstieles bestehen bleibt (so bei den Lebermoosen) oder aber in wechselnder Form an der Basis abgerissen und als „Mütze“ von der Kapsel hochgehoben wird (bei den Laubmoosen).

1. Klasse. **Hepaticae. Lebermoose.**

Hier finden wir noch zahlreiche thalloidische Formen, deren Vegetationskörper noch nicht in Stamm und Blatt gegliedert ist; aber auch kormophytische Formen kommen häufig vor, doch besitzen in diesem Falle die Blätter niemals Blattnerven. Das Protonema ist meist klein und rasch vergänglich; es schreitet meist fast sofort zur Bildung des Moospflänzchens. Die Kapsel ist häufig ungestielt und bleibt dann stets von der Calyptra, dem angeschwollenen Bauchteil des Archegons, umschlossen. Ist dagegen das Sporogon (Kapsel) gestielt und wird die Calyptra durchbrochen, so bleibt diese einfach am Grunde des Kapselstieles als Wulst oder Manschette sitzen. Bei den Lebermoosen springt endlich die Kapsel fast stets mit vier Klappen auf, während sich die Kapsel der Laubmoose mittelst eines Deckels öffnet; in den Lebermooskapseln finden wir häufig neben den Sporen auch noch unfruchtbare Schleuderzellen entwickelt, welche das Ausstreuen der Sporen vermitteln.

Familie **Marchantiaceae.**

Einer der bekanntesten Vertreter der Familie, *Marchantia polymorpha* (Abb. 223), kommt, wie viele andere Arten der Lebermoose, häufig herdenweise auf feuchten Sandplätzen, auf Blumentöpfen und an feuchten Felsen vor. Sie besitzt einen großen, flachen, dunkelgrünen, gabelig verzweigten Thallus, welcher mehr- bis vielschichtig ist und große Luftkammern umschließt. Diese Luftkammern stehen durch eigenartige Bildungen, die an die Spaltöffnungen der höheren Pflanzen entfernt erinnern, mit der atmosphärischen Luft in Verbindung.

Eine vegetative Vermehrung besitzt *Marchantia* in den sogenannten Brutbecherchen, in welchen kleine grüne Knospchen gebildet werden (Abb. 223, 3b<sup>2</sup>). Diese lösen sich los, fallen zu Boden und wachsen allmählich zu neuen Individuen heran. Die Geschlechtsorgane, die männlichen wie die weiblichen, entwickeln sich auf eigenartigen Trägern, und zwar auf verschiedenen Pflanzen (Diöcie). Die Kapseln sind fast ungestielt und enthalten neben den Sporen auch noch Schleuderzellen (Elateren). Sie sitzen auf der Unterseite schildförmiger Gebilde (Receptakeln), die nachträglich durch einen Stiel hoch über den übrigen Thallus emporgehoben werden.




Abb. 223. Ein thalloidisches Lebermoos, *Marchantia polymorpha*: 1 Stück einer Pflanze mit männlichen Befruchtungsorganen (mr); 2 Längsschnitt durch den Gipfel des männlichen Receptaculum (a), vergrößert; 3 Stück einer Pflanze mit weiblichen Befruchtungsorganen (wr); 4 Längsschnitt durch das weibliche Receptaculum mit Kapseln (s), vergrößert.

Familie **Jungermanniaceae.**

Zu dieser außerordentlich formenreichen Familie gehören thalloidische und kormophytische Arten (Abb. 224 und 225 auf S. 226).

Bei letzteren stehen die Blätter selten in zwei Reihen am Stämmchen, meist liegen sie in drei Zeilen, von denen zwei auf den beiden Rücken-seiten des Stämmchens verlaufen, die Oberblätter, während die dritte Zeile sich auf der Bauchseite des dem Boden aufliegenden Stämmchens findet. Diese letzteren Blätter sind meist eigenartig krugförmig oder becherartig gestaltet und werden als Schattenblätter oder als Amphigastrien bezeichnet. Die Kapsel ist




Abb. 224. Ein in Stamm und Blatt gegliedertes (kormophytisches) Lebermoos, *Jungermannia furcata*.

Abb. 225. Ein kormophytisches Lebermoos (*Noteroclada porphyrorrhiza*). A Fruchtbende Pflanze in natürl. Größe. // Spitze derselben, vergrößert. C Sterile Pflanze in natürlicher Größe D Blatt, von der Rückenseite gesehen, vergrößert. (Nach Hooker.)

lang gestielt, enthält neben den Sporen reichlich Schleuderzellen und öffnet sich bei der Reife mit vier Klappen, worauf die Sporen mit ansehnlicher Kraft ausgeschleudert werden. — Die Arten der Familie sind, wie überhaupt sämtliche Lebermoose, typische Schattenpflanzen und bedürfen zu ihrem Gedeihen fast durchweg fortwährender und meist großer Feuchtigkeit. Sie finden sich in unseren Gebieten sehr reichlich und fehlen wohl nie in Wäldern, auf feuchten Felsen und auf quelligem Boden. Mit einer ganz außerordentlichen Formenfülle finden wir sie jedoch in den Tropengebieten vertreten, besonders in den ewig feuchten und dunkeln Urwäldern, und dort ist auch ihre eigentliche Heimat.

## 2. Klasse. Musci (Musci frondosi). Laubmoose.

Das Protonema der Laubmoose ist fadenalgenartig und verharrt meist längere Zeit in diesem Zustand, bis sich durch seitliche Sprossung ein Knöspchen bildet, aus dem dann allmählich die in Stengel und Blatt gegliederte Moospflanze hervorgeht (Abb. 222, C, D, E). Die Blätter sind stets mit einer Mittelrippe versehen. Der Stengel enthält niemals echte Leitbündel, auch wenn die Moospflanzen ansehnliche Höhen erreichen; ebenso fehlen echte Wurzeln vollkommen; wir finden an deren Stelle die sogen. Rhizoiden, d. h. einfache oder verzweigte Zellfäden, durch welche die Pflänzchen sich am Boden befestigen. Die Geschlechtsorgane unterscheiden sich in nichts




Abb. 226. Entwicklung einer Laubmooskapsel. *A* Der Embryo wächst durch den Boden des Archegoniums ein Stück in den Gipfel des Moosstämmchens hinein und bildet hier den Schaft *S* des die Mooskapsel *K* tragenden Stieles, ♀ unbefruchtete Archegonien, *Per* Perichaetialblätter. *B* Längsschnitt durch die reife Mooskapsel, der größte Teil des langen Stieles ist weggelassen, *S* der Schaft des Stieles, ♀ unbefruchtete Archegonien, wie bei Fig. *A*, *L* Luftraum, den Sporensack *Sp* umgebend, in der Mitte die Columella *C*, oben am Rand die Zähne des Peristoms *Pst*, *C* reife Kapsel mit der Haube *H*, *D* abgefallene Haube, *E* abgefallener Deckel der Kapsel *F*, wo nun das Peristom *Pst* freiliegt (Alle Figuren etwas schematisiert.)

von denen der Lebermoose; sie stehen entweder seitlich am fortwachsenden Sproß, oder aber am Scheitel und begrenzen sein Wachstum.

Die Kapsel der Laubmoose (Abb. 226) ist dagegen von derjenigen der Lebermoose sehr stark verschieden. Es soll an dieser Stelle nur darauf hingewiesen werden, daß die langgestielte Laubmooskapsel von der aus dem Archegon hervorgegangenen Haube oder

Calyptra bedeckt ist, daß sich in ihr sehr verschiedenartige Schichten unterscheiden lassen, in deren einer nur Sporen gebildet werden, daß eine unfruchtbare Schicht, die sogen. Mittelsäule oder Columella, von der Basis bis zur Spitze der Kapsel hindurchgreift, daß die Kapsel sich stets mit einem Deckel öffnet und in ihr niemals Schleuderzellen entwickelt werden. Wenn der Kapseldeckel bei der Reife abgefallen ist, zeigt sich an der Kapselmündung eine dichte Reihe von Zähnen, das Peristom; diese Zähne sind sehr stark hygroskopisch, d. h. sie führen je nach den Änderungen der Luftfeuchtigkeit bestimmte Bewegungen aus: bei feuchtem Wetter verschließen sie fest die Kapsel (Urne), bei trockenem Wetter, das für die Sporenverbreitung am zweckmäßigsten ist, klaffen sie auseinander, so daß dann die Sporen aus der Kapsel herausfallen oder herausgeweht werden können. Sehr interessant ist endlich, daß man an der Basis der Laubmooskapseln echte Spaltöffnungen antrifft, während diese an den Blättern der Moospflanze selbst niemals vorkommen.

Laubmoose findet man in allen Zonen und Höhenlagen der Erde, soweit überhaupt Pflanzenleben anzutreffen und die Menge der Niederschläge nicht allzu gering ist. Ihre Bedeutung im Haushalt der Natur und besonders für die Waldwirtschaft beruht auf ihrer großen und raschen Aufnahmefähigkeit für Wasser, das sie nur langsam wieder abgeben, wodurch der Boden stets feucht und locker erhalten wird.

#### Familie **Sphagnaceae**. Torfmoose.

Es gehören hierher die bekannten blassen Moose, welche auf keinem Hochmoor fehlen und die gerade hier, in ungeheueren Mengen auftretend, in dichter Schicht den Boden bedecken. Sie sind deshalb von Bedeutung, da sie das Hauptmaterial für die Torfbildung geliefert haben und auch jetzt noch ständig liefern.

Das Stämmchen ist sehr dicht mit den kleinen Blättchen besetzt. Wenn nun der Pflanze reichlich Wasser zufließt, so erscheint sie grünlich oder hellgrün; verdunstet aber allmählich das Wasser, so erhält jene eine blasse, weißliche oder weiße Farbe. Dies ist auf eine sehr eigenartige und für die Torfmoose charakteristische Erscheinung zurückzuführen, die auch mit der bekannten Eigenschaft jener zusammenfällt, das Wasser wie ein Schwamm aufzusaugen und festzuhalten. Die jungen Blättchen bestehen aus lauter gleichartigen Zellen. Bald aber tritt eine Sonderung insofern ein, als ein Teil von ihnen stark heranwächst und blasenartig wird, während sich die anderen lang und eng schlauchartig umbilden und sich, untereinander netzartig verbunden, zwischen den großen Zellen hinziehen.

Aber auch in anderer Hinsicht sind die beiden Zellformen stark voneinander geschieden (Abb. 227). Die großen blasigen Zellen verlieren allmählich ihren Plasmahalt und sterben ab, nachdem ihre Wände sich schraubenartig verdickt haben und zwischen den

Schraubengängen große, runde Löcher entstanden sind. Sie sind es, welche das Wasser aufnehmen und die Schwammnatur dieser Arten herbeiführen. Die kleinen Schlauchzellen dagegen behalten ständig




Abb. 227. *Sphagnum acutifolium* Blatt (von der Fläche (A) und im Durchschnitt (B) gesehen. *cl* schlauchförmige, chlorophyllführende Zellen, *ls* große, leere Zellen mit den Löchern *f* und spiralförmigen Verdickungen *f*. (Nach Sachs.)




Abb. 228. Ein Zweig einer *Hypnum*-Art, *i* Kapselstiel oder Seta (Borste), *d* Kapsel, *e* Deckel, *i* Kapsel oder Büchse, welche den Deckel abgeworfen hat.

ihren Plasmainhalt und führen reichlich Chlorophyll.

In bezug auf die Kapselbildung unterscheiden sich die Torfmoose (**Sphagnum-**

Zu Abb. 229. *Polytrichum commune*. Rechts eine männliche Pflanze blühend. In der Mitte eine solche, deren Kapsel noch von der filzigen Haube bedeckt ist. Links eine Pflanze mit freier Kapsel. Natürl. Größe. (Nach Luerßen.)




Abb. 229.

Arten) dadurch von den übrigen Moosen, daß die Columella nicht die ganze Kapsel durchsetzt, sondern auch am Gipfel von dem sporenbildenden, kappenartigen Gewebe bedeckt wird.

#### Familie **Bryaceae.**

Es handelt sich hier um Waldmoose, die in größter Menge und auf weite Strecken den Boden bedecken können und auch den Fuß der Waldbäume häufig überziehen. — Die Bryaceae gehören zu den pleurokarpen Moosen, die meist stark verzweigt sind und die Geschlechtsorgane und später die Kapseln an den Seitenzweigen tragen (Abb. 228).

#### Familie **Polytrichaceae.**

Hierher gehört eine der häufigsten und charakteristischsten Arten unserer Waldmoose, **Polytrichum commune**. Diese Art, welche große, dicke Polster bildet, war früher unter dem Namen Herb. *Adiantum aureum* in der Pharmazie gebräuchlich (Abb. 229). — Die Polytrichaceae gehören zu den akrokarpigen Moosen, bei denen die Geschlechtsorgane und später die Kapseln sich am oberen Ende unverzweigter Stämmchen finden.

### 2. Unterabteilung. **Pteridophyta.**

#### **Farnpflanzen.**

(Auch **Gefäßkryptogamen** oder besser **Leitbündelkryptogamen** genannt.)

Wie bei den Moosen entsteht auch bei den Farnen nach erfolgter Befruchtung der Eizelle durch die beweglichen Spermatozoiden der Embryo und wie jene zeigen auch die Farne einen ausgesprochenen Generationswechsel. Doch können wir gerade in der Ausbildungsweise der beiden Generationen einen einschneidenden Unterschied zwischen Moosen und Farnen konstatieren.

Wir sahen soeben, daß der Gametophyt, die geschlechtliche Generation der Moose, die Moospflanze, ein ziemlich hoch entwickeltes Pflänzchen darstellt, an welchem die Geschlechtsorgane entstehen und auf dem die ungeschlechtliche Generation, die Mooskapsel, fast parasitisch als ein ziemlich unscheinbares, wenn auch in vielen Fällen hoch entwickeltes Gebilde lebt. Bei den Farnen treffen wir nun gerade das umgekehrte Verhalten. Hier erweist sich die geschlechtliche (proembryonale) Generation (der Gametophyt) als ein winziges thalloidisches Gebilde, während die ungeschlechtliche (embryonale) Generation, der Sporophyt, die hoch entwickelte Farnpflanze darstellt, welche oft baumartig wird und zu den schönsten Typen der Pflanzenwelt überhaupt gehört.

Der Entwicklungsgang der Farne ist kurz folgender. Aus der Spore geht bei der Keimung ein winziger Vorkeim, hier Pro-

thallium genannt, hervor (Abb. 230). Auf diesem winzigen grünen Pflänzchen, das an sehr kleine, blattartige Algen erinnert und höchstens bis zu 1 cm groß werden kann, entstehen die Geschlechtsorgane, Antheridien und Archegonien, welche sich meist noch ganz wie bei den Moosen verhalten, bei den höheren Farnen jedoch große Reduktionen, Vereinfachungen erfahren (Abb. 231). Das Prothallium stellt also die geschlechtliche Generation, den Gametophyten, dar. Aus der befruchteten Eizelle entwickelt sich sodann die Farnpflanze (Abb. 232), die ungeschlechtliche Generation, der Sporophyt. Diese zeigt eine so hohe Ausbildung und Gewebedifferenzierung, daß sie schon in mancher Hinsicht an die Phanerogamen, besonders an die Monocotyledoneen erinnert. Wir finden hier typische, Wasser und die verschiedenen Nährstoffe leitende Zellen, welche zu geschlossenen Leitbündeln vereinigt sind. Nur ausnahmsweise sind jedoch bei den Farnen echte Gefäße entwickelt, meist findet die Wasser-




Abb. 230. Prothallium eines Farns von der Unterseite gesehen: *an* Antheridien, *ar* Archegonien, *r* Rhizoiden. Stark vergrößert




Abb. 231. Geschlechtsorgane eines Farnprothalliums, stark vergrößert: *an* ein Antheridium, die Spermatozoiden entlassend; *ar* ein geöffnetes Archegonium mit der weiblichen Eizelle. (Nach Luerßen.)




Abb. 232. Eine junge Farnpflanze, welche aus der befruchteten Eizelle, dem Embryo eines Farnprothalliums hervorgeht: *p* Prothallium, *w* die erste Wurzel, *w'* eine Nebenwurzel, *b* das erste Blatt (Wedel) der Farnpflanze. (Nach Sachs.)

leitung in Tracheiden statt. Dabei sind die Bündel stets konzentrisch gebaut, d. h. ein zentraler Strang von Hadrom wird von reichlichem



Abb. 233. Unterseite eines Wedelabschnittes von *Aspidium filix mas* mit den Sporangienhäufchen.




Abb. 234. 1 Sporangienhäufchen mit in der Mitte angeheftetem Indusium (i) von *Aspidium filix mas*; 2 Sporangienhäufchen mit seitlich angeheftetem Indusium (i) von *Asplenium trichomanes*; e die untere Epidermis der Wedelfläche, f die Sporangien (vergrößert).




Abb. 235. Querschnitt durch einen Blattabschnitt von *Aspidium filix mas*, den von dem Indusium bedeckten Sorus zeigend; die gestielten Sporangien teils geschlossen, teils geöffnet. (Nach Kny.)

Leptom umschlossen. Die Farnpflanze besitzt ferner stets echte Wurzeln, welche Leitbündel führen.

Auf den Blättern der Farnpflanze, meist auf deren Unterseite, bilden sich haufenweise die Sporangien (Abb. 233, 234, 235, 236),

d. h. die Sporenbhälter, in deren Innerem die Sporen entstehen. Während bei den Moosen von einer Art stets gleichartige Sporen hervorgebracht werden, finden wir bei den Farnen nicht selten das Verhalten, daß eine und dieselbe Art verschiedenartige Sporen produziert, kleinere und in Menge erzeugte (Mikrosporen), aus welchen dann bei der Keimung ein männliches Prothallium hervorgeht, und größere und nur zu wenigen im Sporangium produzierte (Makrosporen), welche zu weiblichen Prothallien auskeimen.

### 1. Klasse. Filicales.

#### Echte Farnkräuter.

Hierher gehören alle die Formen, welche wir als Farnkräuter bezeichnen, meist ausdauernde, mehrjährige Gewächse mit kriechendem oder sehr kurzem, gestauchtem, selten verlängertem bis hoch baumartigem Stamm und dicht gestellten, schönen, großen, meist gefiederten Blättern. Auf der Blattunterseite finden wir die Sporangien, welche meistens in besonderen Gruppen (Sporangienhäufchen = Sorus) zusammenstehen (Abb. 233). Die Sori werden meist von einer haut- oder haarartigen Wucherung, dem Schleier oder Indusium, bedeckt. Die Sporangien bestehen im entwickelten Zustand aus einer einschichtigen Wandung mit dem Sporenhalt. An der Zellschicht der Wandung bemerken wir stets verstärkte Zellpartien, welche bei verwandten Arten immer in gleichartiger Weise auftreten und deshalb für die Einteilung der Farne von großer Bedeutung sind, den sogen. Ring (Annulus, Abb. 235, 236). Dieser Ring hat die Aufgabe, das Aufreißen der Sporangien zu bewirken und damit zur Verbreitung der Sporen beizutragen.




Abb. 236. Ein Farnsporangium von *Polypodium vulgare*, im Aufspringen begriffen: *st* der Stiel, *g* der Annulus, *sp* Sporen (vergrößert).

#### 1. Reihe. Filicales leptosporangiatae.

Die Sporangien entwickeln sich (ähnlich wie Drüsenhaare) aus einzelnen Oberhautzellen des Blattes.

##### 1. Unterreihe. Eufilicineae.

Sporen alle gleichartig.

##### Familie **Polypodiaceae.**

Hierher gehören fast sämtliche bei uns vorkommende Farnkräuter, diese bekannten Zierden unserer feuchten und dunkeln

Wälder, welche aber auch die mittleren Berghöhen in großen Mengen besiedeln. Sie besitzen unterirdische, kriechende, mit Spreuschuppen meist dicht besetzte Stämme (Rhizome), aus denen die schönen gefiederten Blätter entspringen. Diese sind im Jugendzustand spiralig eingerollt.




Abb. 237. *Aspidium filix mas*  
(stark verkleinert).

*Pteridium* (oder *Pteris*) *aquilinum* ist der bekannte Adlerfarn, welcher über die ganzen gemäßigten und warmen Gebiete der Erde verbreitet ist und bisweilen 3—4 m hoch werden kann.

*Scolopendrium vulgare*, die Hirschwurmfarn, ist ausgezeichnet durch ganzrandige, einfache, lanzettliche Blätter, was bei den Farnen nur sehr selten vorkommt. Sie ist die Stammpflanze des früher gebrauchten Herb. *Scolopendrii*.

Off. *Aspidium* (oder *Nephrodium* oder *Dryopteris*) *filix mas*, der bekannte Wurmfarn (Abb. 237), ist bei uns eines der häufigsten Farnkräuter, ausgezeichnet durch einen dicken Wurzelstock. Dieser ist (offizinell als *Rhizoma Filicis*) samt den ansitzenden Blattbasen als Wurmmittel sehr geschätzt.

*Polypodium vulgare*, der sogen. Engelsüß, ist bei uns sehr häufig. Er ist die Stammpflanze des Rhiz. *Polypodii*.

*Adiantum capillus veneris*, das sogen. Venushaar, ein sehr zierlicher Farn des Mittelmeergebiets, liefert Herb. *Capillor. Veneris*.

#### Familie **Cyatheaceae.**

Hierher gehören fast nur baumartige Formen von großer Schönheit.

Besonders *Alsophila australis* ist zu nennen, welche im tropischen Australien stellenweise in ausgedehnten Beständen auftritt und eine Zierde unserer Warmhäuser bildet.

#### Familie **Osmundaceae.**

Hierher gehört der weit verbreitete und auch in Deutschland häufig vorkommende Königsfarn, *Osmunda regalis*, der durch seine auffallende Blattbildung ausgezeichnet ist. Der untere Teil der Blätter ist nämlich steril und scharf gegen die obere, fruchtbare und sporangientragende Region abgesetzt.

#### 2. Unterreihe. **Hydropterides.** Wasserfarne.

Hier treffen wir in den Sporangien durchweg zweierlei Sporen, Mikrosporen und Makrosporen. Die Mikrosporen werden in großer Anzahl in Mikrosporangien erzeugt. Bei der Keimung entspringt aus ihnen ein kleines Prothallium, an dem nur wenige Spermatozoiden hervorbringende Antheridien entstehen. Die Makrosporangien bringen nur je eine Makrospore hervor. Aus dieser entwickelt sich ein großes grünes Prothallium, welches wenige Archegonien, ja sogar oft nur ein einzelnes trägt.

Die Wasserfarne sind in ihrer Ausgestaltung von den gewöhnlichen Farnen ganz außerordentlich verschieden und lassen es nicht vermuten, daß sie ihren Fortpflanzungsorganen nach aufs engste mit den Farnen verwandt sind.

*Salvinia natans* kommt bei uns in Altwässern und Seen nicht selten vor (Abb. 238). Sie besitzt ein horizontal dem Wasser aufliegendes Stämmchen, an dem die Blätter in drei Reihen stehen. Stets finden wir zwei Reihen von Rückenblättern, welche flach dem Wasser aufliegen und als Schwimmblätter bezeichnet werden. Häufig ist aber auch noch auf der Bauchseite, d. h. auf der Unterseite des Stengelteils, eine Reihe von zerschlitzten Wasserblättern entwickelt, die durchaus das Aussehen von Wurzeln besitzen und an denen die Sporangienfrüchte stehen.




Abb. 238. *Salvinia natans*. A Schwimmende Pflanze in natürlicher Größe. B Stück des Stengels mit zwei Luftblättern und dem zugehörigen, fruktifizierenden Wasserblatt, natürl. Größe. C Zwei Sporangien im Längsschnitt, das obere mit Makro-, das rechts untere mit Mikrosporangien, schwach vergrößert und etwas schematisiert. (Nach Luerßen.)

*Marsilia quadrifolia* bewohnt Sümpfe oder niedrige Gräben, besitzt ein kriechendes, horizontal wachsendes Stämmchen, an dem zwei Reihen von in der Jugend farnartig eingerollten Rückenblättern stehen (Abb. 239). Diese sind im ausgebildeten Zustand kleeförmig, vierzählig, die Blättchen am Tage ausgebreitet, nachts zusammengeklappt. Am unteren Teil des langen Blattstieles entspringen die Sporangienfrüchte von Bohnenform.

*Pilularia globulifera* ist über ganz Europa verbreitet und bewohnt dieselben Standorte wie *Marsilia*, doch findet man sie fast stets völlig untergetaucht wachsend. Sie ist durch fadenförmige, schmal grasartige Blätter ausgezeichnet.

## 2. Reihe. Marattiales.

Die Sporangien der einzelnen Sori entwickeln sich als mehrschichtige Zellkomplexe und sind untereinander mehr oder weniger verwachsen.

Familie **Marattiaceae.**

Es gehören hierher zahlreiche tropische Formen, welche ausgezeichnet sind durch mächtigen, dickkugeligen und nur wenig den




Abb. 239. *Marsilia quadrifolia*. Stück des kriechenden Stengels mit zwei fruktifizierenden Blättern in natürlicher Größe. In der Mitte die Sporangienfrucht vergrößert. (Nach Luerßen.)

Abb. 240. 1 *Botrychium lunaria*, eine Farnpflanze mit besonders ausgebildeter sporentragender Wedelhälfte; 2 Teil der letzteren vergrößert.

Erboden überragenden Stamm, von dem sehr große, viele Meter lange und schön gefiederte Blätter entspringen. — Einzelne Arten von **Marattia** werden in Warmhäusern kultiviert.

3. Reihe. **Ophioglossales.**

Das Prothallium entwickelt sich, abweichend von den bisher behandelten Farnen, ganz oder teilweise unterirdisch und ist mehrschichtig, fast knollenförmig.

Familie **Ophioglossaceae.**

Die Blätter verhalten sich ähnlich wie die des Königsfarn, d. h. ein Teil derselben ist steril, während der andere, obere, fruchtbar wird und durch die am Rande stehenden Sporangien ein eigenartiges Aussehen erlangt. Die Sporangien entwickeln sich wie bei den Marattiales aus Zellkomplexen.

**Ophioglossum vulgatum**, die sogen. Natterzunge, kommt bei uns auf feuchten Wiesen nicht selten vor.

**Botrychium lunaria** hat Fiederblätter, deren untere Abschnitte halbmondförmig sind. Sie findet sich auf sandigen Wiesen nicht selten, häufig besonders in Gebirgsgegenden (Abb. 240).

2. Klasse. **Equisetales. Schachtelhalmgewächse.**

Die Schachtelhalme sind ausgezeichnet durch ihren stets verlängerten, nicht gestauchten Stamm, an dem die winzigen Blättchen




Abb. 241. 1 Sporangienähre eines Schachtelhalmes; 2 ein Sporangienträger von der Seite gesehen, etwas vergrößert; 3 eine Spore mit den sich aufwickelnden Schleudern und 4 mit aufgewickelten Schleudern, beide sehr stark vergrößert.

Abb. 242. *Equisetum arvense* mit fruchtbarem Stengel, links ein unfruchtbarer Stengel.

stehen. Diese sind linealisch, schuppenförmig, ungestielt, stehen in vielzähligen Quirlen am Stamm und sind untereinander häufig tütenförmig verwachsen. Die Sporangien entstehen auf Blattoorganen, welche hierdurch sehr stark umgebildet werden und in nichts mehr an die gewöhnlichen vegetativen Blätter erinnern (Abb. 241). Diese „Fruchtblätter“ stehen in dicht gedrängten Quirlen zusammen und finden sich stets an der Spitze der Stengel und Zweige, deren Wachstum sie abschließen.

Die Sporangien tragenden Blätter entstehen entweder an der Spitze eigenartiger, chlorophyllloser, braungefärbter Triebe (Abb. 242) oder aber (bei anderen Arten) an der Spitze der normalen grünen Sprosse. Sie bilden eine Ähre von kurzer, eiförmiger oder elliptischer Gestalt. Jedes einzelne Blatt ist schildförmig (Abb. 241, 2), in der Mitte gestielt und trägt am Rande auf der Unterseite die Sporensäcke. Der Stengel ist deutlich längsgestreift und mit Ausnahme der Knoten hohl. Die Membran der ganzen Pflanze ist stets stark mit Kieselsäure imprägniert und dadurch sehr starr. Stets finden wir geschlossene Leitbündel, in denen kein Cambium vorhanden ist. In den Sporangien werden nur gleichartige Sporen (Isosporen) gebildet. Die Sporen sind mit sehr hygroskopischen Schleuderorganen versehen (Abb. 241, 3, 4), welche zu ihrer Verbreitung dienen.

#### Familie **Equisetaceae.**

Die Klasse der Equisetales umfaßt nur diese einzige Familie, diese nur die eine Gattung *Equisetum*.

*Equisetum arvense*, der Ackerschachtelhalm, mit blassen Frucht- und grünen Laubtrieben, war früher als *Herb. Equiseti minoris*, *E. hiemale*, mit ausdauernden grünen, sporentragenden Stengeln, als *Herb. Equiseti majoris* in den Apotheken gebräuchlich. Die grünen, harten Stengel vieler Arten dienen wegen ihres Kieselsäuregehalts als „Zinnkraut“ zum Scheuern.

### 3. Klasse. **Lycopodiales. Bärlappartige.**

Die Formen dieser Klasse sind ausdauernde, sehr selten einjährige Pflanzen, deren meist anscheinlich verlängerter Stengelteil mit ziemlich kleinen, spiralig angeordneten, selten quirligen Blättern dicht besetzt ist. Die Sporangien stehen nie auf der Blattunterseite, sondern entweder auf deren Oberseite oder aber in der Achsel derselben.

#### Familie **Lycopodiaceae.** Bärlappgewächse.

Die Stengel der hierhergehörigen Arten sind wie deren Wurzeln fast durchweg gabelig verzweigt. Die Sporangienblätter sind häufig von den vegetativen Blättern verschieden und stehen an den Stengelenden in Ährenform. Die Sporangien enthalten stets nur einerlei Sporen (Isosporen).

Die Arten der allein noch jetzt vorkommenden Gattung *Lycopodium* sind zwar hauptsächlich in den Tropengebieten der Erde verbreitet, doch kommen auch mehrere Arten in unserem Klima vor und sind besonders in unseren Gebirgsgegenden stellenweise sehr häufig.




Abb. 243. *Lycopodium clavatum*: o ein Stück des Stengels mit den Sporangienähren (f); a und b Blätter des Stengels; c Sporangiendeckblatt mit dem ansitzenden Sporangium (e); d Sporen. a-d vergrößert.

*Lycopodium selago*, eine besonders in Gebirgsgegenden vorkommende, aufrecht wachsende Art, zeigt keine Differenzierung in sterile und fertile Blätter.

Off. *L. clavatum* dagegen, eine der häufigsten Arten, hat ährenförmige Sporophyllverbände (Abb. 243), die sich von dem kriechenden Stamm senkrecht nach oben erheben. Die Sporen sind als Hexenmehl, Bärlappsamen oder *Lycopodium officinell*.

#### Familie **Selaginellaceae.**

Die Arten dieser Familie ähneln denjenigen der *Lycopodiaceae* oft ganz außerordentlich. Die Sporangien stehen in ährenartigen Verbänden, welche dadurch auffallend sind, daß die fruchtbaren Blätter kleiner sind als die sterilen. Meistens werden in den unteren Teilen der Ähre Makrosporangien ausgebildet, während in ihrem oberen Teil Mikrosporangien entstehen. Die *Selaginellaceae* sind also „heterospor“. Theoretisch wichtig für den Zusammenhang der Pteridophyten mit den Phanerogamen ist, daß bei einigen Selaginellen die Entwicklung des weiblichen Prothalliums

schon auf der Mutterpflanze stattfindet, in ähnlicher Weise, wie es gewöhnlich bei den Phanerogamen der Fall ist.

Die einzige Gattung *Selaginella* ist fast ausschließlich tropisch und zählt mehrere hundert Arten. In Mitteleuropa finden sich nur zwei Arten, *S. spinulosa* und *S. helvetica*, die aber meist nur auf Gebirgen anzutreffen sind.

#### Familie **Isoëtaceae.**

Die Arten der einzigen, mit vielen Arten über die Erde verbreiteten Gattung *Isoëtes* besitzen einen auffallenden, von dem der Farne sehr abweichenden Habitus. Ihr Stamm ist knollenförmig, mehrjährig und durch offene Gefäßbündel ausgezeichnet, weshalb er auch ein Dickenwachstum besitzt. An diesem Stamm sitzen spiralig,




Abb. 244. *Isoëtes lacustre*. *A* ganze Pflanze im Längsschnitt, natürl. Größe, *a* Stengel, *b* dessen Rindenschichten, *c* zentrales Leitbündel, *w* Wurzeln, *sp* Sporangien. *B* eine Makrospore, 60 mal vergrößert; *C* dieselbe im Längsschnitt nach der Keimung, *a* ein Archegonium. *D* Mikrospore, gekeimt, mit dem Prothallium *v*, 500mal vergr. *E* ein Spermatozoid, 500mal vergr. (Nach Sach-.)

dichtgedrängt, die binsenförmigen Blätter, in deren unterem Teil, dicht über der Basis, die Sporangien wie in einer Tasche eingesenkt liegen. Auch hier enthalten die Sporangien entweder Mikrosporen oder Makrosporen.

*Isoëtes*, das Brachsenkraut (Abb. 244), ist die einzige Gattung. Zu ihr gehören meist in Seen untergetaucht lebende Arten. In Mitteleuropa finden sich stellenweise, besonders in vereinzelt Gebirgsseen *I. lacustre* und *I. echinosporum*.

## XIII. Abteilung.

## Embryophyta siphonogama.

## Phanerogamen oder Samenpflanzen.

In Stamm, Blatt und Wurzel gegliederte Pflanzen mit Generationswechsel.

Wie schon bei einer Anzahl Pteridophyten (den Schachtelhalmen und einer Anzahl von Farnen) die sporenbildenden Blätter von anderer Gestalt sind als die Laubblätter, so bilden sich auch die Geschlechtsorgane der Phanerogamen auf besonders ausgebildeten Blättern, Blüte genannt.

Die Staubblätter tragen Pollensäcke, in denen die männlichen Zellen (Pollenkörner) enthalten sind, und die Fruchtblätter tragen die Samenanlagen, in denen sich die weibliche Eizelle findet.

Im Pollenkorn, das der Mikrospore der Embryophyta asiphonogama homolog ist, entwickelt sich das männliche Prothallium (geschlechtliche Generation) der Phanerogamen. Es besteht aus einer zum Pollenschlauch auswachsenden vegetativen Zelle, welche die Befruchtung vermittelt, und noch einer oder wenigen kleineren Zellen, von denen die eine dem Antheridium der Pteridophyten entspricht. Diese teilt sich in zwei nackte generative Zellen, welche sich in einzelnen, seltenen Fällen zu Spermatozoiden umbilden, meist aber als Spermakerne im Pollenschlauch zur zu befruchtenden Eizelle wandern. Jedes Pollenkorn ist von einer zähen Haut umgeben, die aus einer äußeren (Exine) und einer inneren Hülle (Intine) besteht. Die Oberfläche des Pollenkorns ist häufig von Stacheln, Warzen und ähnlichen Auswüchsen besetzt (Abb. 69, 246), zwischen denen sich dünnwandige Austrittsstellen befinden, durch welche der Pollenschlauch bei der Keimung herauswächst.

Die Samenanlage enthält in der Regel einen einzigen Embryosack (Abb. 245 e), welcher der Makrospore der Pteridophyten gleichzusetzen ist. Innerhalb desselben werden vor der Befruchtung nur




Abb. 245. Schematische Darstellung des Fruchtknotens einer bedecktsamigen Samenpflanze (*Polygonum convolvulus*): *n* die Narbe, *p* Pollenkörner, *ps* Pollenschlauch, *g* Griffel, *mi* Mikropyle, *nu* Nucellus, *e* Embryosack, *ek* Zentralkern desselben, *ei* Eiapparat, *an* Antipoden, *ie* äußeres Integument, *ii* inneres Integument, *fw* Funiculus, *fs* Fruchtknotenwandung.

wenige Archegonien (Gymnospermen) oder sogar nur ein einziges Archegonium hervorgebracht, welches auf eine Eizelle und zwei Synergidenzellen reduziert ist (Angiospermen).

Im Embryosack finden wir zur Zeit der Geschlechtsreife sieben nackte Zellen. Die dem Mikropylarende (vergl. auch den Bau der Samenanlagen, S. 71 u. Abb. 110) des Embryosackes benachbarte Gruppe von drei Zellen wird als der Eiapparat bezeichnet. Sie besteht aus der Eizelle und zwei steril bleibenden Zellen, welche bei der Befruchtung der Eizelle anscheinend eine Rolle spielen und deshalb Gehilfinnen oder Synergiden genannt werden. Die drei Zellen am entgegengesetzten Pole des Embryosackes werden als Gegenfüßlerinnen oder Antipoden bezeichnet. In der Mitte zwischen diesen beiden Gruppen von nackten Zellen findet sich der sogen. Zentralkern, welcher aus zwei vereinigten Zellkernen hervorgegangen ist und aus dem sich nach erfolgter Befruchtung durch

ständig fortgesetzte Teilung das den Embryosack ausfüllende Nährgewebe bildet. Die Antipoden und der Zentralkern bilden das weibliche, allerdings stark reduzierte Prothallium. Bei den Gymnospermen ist dieses mehr als sechszellig und füllt schon vor der Befruchtung den Embryosack aus.




Abb. 246. Reifes Pollenkorn von *Cichorium intybus*. Die kugelige Zelle ist von mächtigen Verdickungsleisten besetzt, die wiederum in Stacheln auslaufen.

Zwischen Pollenkorn und Eizelle vollzieht sich der Befruchtungsvorgang. Das Pollenkorn gelangt entweder unmittelbar in die Mikropyle (bei den Gymnospermen, siehe weiter unten), oder auf die Narbe des Fruchtknotens (bei den Angiospermen, vergl. Abb. 245). Hier bildet sich aus einer der erwähnten Austrittsstellen der

Pollenschlauch, welcher oft auf längerem Wege erst die zwei Spermakern bis zu dem Embryosack führt (Abb. 245<sup>ps</sup>). Der Pollenschlauch dringt durch den Keimund oder die Mikropyle, sodann durch das Gewebe des Nucellus bis zur Spitze des Embryosackes vor, wo eine Auflösung der Membran an seiner Spitze erfolgt. Von den beiden mitgewanderten Spermakernen vereinigt sich der eine mit dem Kern der Eizelle, welche sich nun zum Embryo entwickelt, der andere mit dem Zentralkern des Embryosackes, durch dessen Teilung dann das Nährgewebe (Endosperm) entsteht. Gleich darauf gehen die beiden Synergiden zugrunde, indem ihre Substanz von dem befruchteten Ei aufgesogen wird. Weiterhin umgibt sich die Eizelle mit einer Zellhaut und bildet durch wiederholte Zellteilungen den Keimling oder Embryo, welcher durch einen Fortsatz, den sogen. Suspensor, in das Innere des sich bildenden Nährgewebes geschoben wird. Der weitere Entwicklungsgang des Samens ist S. 72 u. folg. beschrieben.

Zur Übertragung des Pollens auf die Narbe dienen bei den Phanerogamen verschiedene höchst sinnreiche Einrichtungen. Die Übertragung geschieht durch den Wind oder durch Tiere, selten

durch Wasser. Letztere Art der Befruchtungsvermittlung ist vorwiegend den Kryptogamen eigen.

Bei windblütigen oder anemophilen Pflanzen wird durchweg eine enorme Menge von Pollen erzeugt, weil die Übertragungsweise von den Zufälligkeiten der Luftströmung abhängig ist. Behufs Aufnahme des Pollens durch den Wind sind die Blüten in Kätzchenform dem Luftzug ausgesetzt, wie bei den Nadelhölzern und Kätzchenblütlern, oder ihre Staubbeutel sind langen, schwanken Filamenten aufgesetzt, wie bei den Gräsern. Die Pollenkörner selbst kleben nicht und hängen nicht durch rauhe Oberflächen aneinander, sondern entfallen leicht und lose den geöffneten Staubbeuteln. Die weiblichen Organe wiederum sind zur Aufnahme des durch die Luft zugeführten Pollens mit pinselförmigen, behaarten, gefiederten oder langfädigen Narben ausgestattet.

Die große Mehrzahl der Phanerogamen ist bei der Befruchtung auf die Vermittelung von Tieren, namentlich Insekten angewiesen (insektenblütige oder entomophile Pflanzen), seltener auf diejenige von Vögeln oder Schnecken. Die Zuführung des Pollens zur Narbe ist in diesem Falle nicht so sehr wie bei den Windblütlern dem Zufall anheimgegeben, so daß bei entomophilen Pflanzen der Pollen nicht in so verschwenderischer Fülle erzeugt zu werden braucht. Um den Besuch der Insekten in den Blüten herbeizuführen, wird in jenen Zuckersaft, welcher als „Nektar“ an verschiedenen Teilen der Blüte abgeschieden wird, dargeboten, und um sie von weitem her dazu anzulocken, werden Düfte und bunte Farben entweder von den Blütenblättern selbst oder in einzelnen Fällen auch durch Hochblätter erzeugt. Der Pollen der Insektenblütler ist in der Regel nicht staubartig trocken, sondern klebend, oder mit rauhen haftenden Oberflächen (Abb. 69, 246) versehen, und der Bau der Blüten ist so eingerichtet, daß die Pollenkörner an bestimmten Stellen des Nahrung suchenden Tieres hängen bleiben und von ihm auf der filzigen oder klebrigen Narbe einer anderen Blüte abgestreift werden müssen.

Alle diese Einrichtungen sind dazu bestimmt, den Pollen einer Blüte auf die Narbe einer anderen zu übertragen und die Übertragung zwischen den Organen einer und derselben Blüte möglichst zu verhindern, weil auf diesem Wege eine Verschlechterung der




Abb. 247. Heterostylie bei den Blüten von *Lythrum salicaria*: A langgrifflige, B mittelgrifflige, C kurzgrifflige Blüte.

Nachkommenschaft herbeigeführt werden würde. Am sichersten wird natürlich die Selbstbefruchtung vermieden, wenn die Blüten eingeschlechtig sind. Wo dies nicht der Fall ist, und das trifft für die meisten Phanerogamen zu, wird die Kreuzung mit anderen Individuen durch Dichogamie gesichert. Hierunter versteht man die ungleichzeitige Reife der männlichen und weiblichen Geschlechtsorgane. Denn wenn die männlichen Organe vor den weiblichen oder umgekehrt zur Reife kommen, so wird auch bei Zwitterblüten Selbstbefruchtung vermieden.

Besonders ist hier auch auf die Einrichtung der Heterostylie hinzuweisen (Abb. 247). Dies Wort bezeichnet die Eigentümlichkeit vieler Pflanzen, ihre Narben und Staubbeutel in verschiedenen Blüten in verschiedener Länge resp. Höhe zu entwickeln, in der Weise, daß die eine Blüte lange Griffel und kurze Staubgefäße und die andere kurze Griffel und lange Staubgefäße hervorbringt. Dadurch nun, daß besuchende Insekten gleich hoch gestellte Sexualorgane mit derselben Körperstelle berühren, wird eine Wechselbefruchtung herbeigeführt. — Bei einer großen Zahl von Blüten endlich wird die Selbstbefruchtung mechanisch unmöglich gemacht, indem der Pollen durch die gegenseitige Lage der Sexualorgane daran verhindert wird, mit der Narbe derselben Blüte in Berührung zu kommen.

Die Phanerogamen oder Samenpflanzen zerfallen in zwei Gruppen, deren eine, bei weitem kleinere, den höchstentwickelten Kryptogamen entwicklungsgeschichtlich ziemlich nahe steht. Es sind dies die Gymnospermen oder Nacktsamigen Gewächse, welche von der großen Gruppe der Angiospermen oder Bedecktsamigen Gewächse streng zu unterscheiden sind.

### 1. Unterabteilung. Gymnospermae.

#### Nacktsamige Gewächse.

Die Samenanlagen der Gymnospermen (von *γυμνος*, gymnos = nackt, und *σπέρμα*, sperma = der Samen) sind nicht in einen Fruchtknoten eingeschlossen, wie bei den Angiospermen, sondern sie stehen nackt auf einem offen ausgebreiteten Fruchtblatte (Abb. 248, 252 o). Im Embryosack bildet sich, die am Scheitel gelegenen Archegonien umgebend, schon vor der Befruchtung Endosperm, was bei den Angiospermen erst nach der Befruchtung geschieht. Dieses Endosperm ist als ein Prothallium gleich demjenigen der Gefäßkryptogamen anzusprechen. Auch die meist zahlreich (nicht regelmäßig zu zwei oder vier, wie bei den Angiospermen) an den Staubblättern gebildeten Pollensäcke (Abb. 251) erinnern an die in unbestimmter Zahl vorkommenden Behälter der männlichen Befruchtungsorgane bei den Gefäßkryptogamen. Die Pollensäcke sind Mikrosporan-




Abb. 248. Nicht zu einem Fruchtknoten verwachsenes Fruchtblatt.



Abb. 249. Links *Cycas Normanbyana*, rechts zwei Stämme von *C. media*. (Nach F. v. Müller.)




Abb. 250. ♂ *Ginkgo biloba*, der Ginkgo-Baum Chinas und Japans. Kurztrieb mit männlichen Blüten und Blättern, welche sich nach der Blütezeit noch ansehnlich vergrößern. Das übrige Blüten- und Fruchtverhältnisse. (Nach Eichler.)

gien, die Pollenkörner Mikrosproren (welche vor dem Ausstäuben ein wenigzelliges Prothallium mit ein bis zwei vegetativen Zellen und einer männlichen Sexualzelle erzeugen), die Samenanlagen Makrosporangien und der Embryosack die Makrospore.

### 1. Klasse. **Cycadales.**

Stamm nicht oder nur sehr wenig verzweigt, ohne Gefäße im Holzkörper. Blätter meist sehr groß und schön, in der Regel fiederförmig oder gefiedert, an der Spitze des Baumes einen Schopf bildend. — Nur eine

#### Familie **Cycadaceae.**

Die hierhergehörigen Arten sind fast ausschließlich Tropenbewohner und werden häufig in unseren Warmhäusern gezogen.

Die an den plumpen Stämmen einen dichten Schopf bildenden schönen Blätter (Abb. 249) mehrerer Arten, besonders von *Cycas revoluta*, welche gewöhnlich als „Palmzweige“ oder „Palmwedel“ bezeichnet werden, finden zu Trauerdekorationen häufig Verwendung.

### 2. Klasse. **Ginkgoales.**

Stamm stark verzweigt, ohne Gefäße im Holzkörper. Laubblätter eingeschnitten, keil- bis fächerförmig.

#### Familie **Ginkgoaceae.**

Die einzige jetzt noch lebende Art dieser in früheren Erdabschnitten mit vielen Arten auftretenden Familie, *Ginkgo biloba*, ist in Japan und China einheimisch und wird auch häufig bei uns kultiviert. Es ist dies ein schöner Baum, der durch seine auffallenden Blätter sehr charakteristisch ist (Abb. 250).

### 3. Klasse. **Coniferae. Zapfenträger, Nadelhölzer.**

Die Nadelholzgewächse sind Holzpflanzen mit verzweigtem, gefäßlosem (nur Tracheiden!) Stamm und nadel- oder schuppenförmigen Blättern (Abb. 253). Ihre Blüten sind nackt (ohne Blütenhülle), eingeschlechtig und meist einhäusig (XXI. Klasse nach Linné), selten zweihäusig (XXII. Klasse). Die männlichen Blüten bestehen nur aus Pollenblättern (Abb. 251), welche ährenförmig zu kleinen Zapfen (Kätzchen) angeordnet sind. Die weiblichen Blüten sind zapfenförmig, d. h. an einer gemeinsamen Spindel sitzen in spiraliger oder quirliger Anordnung Fruchtschuppen, welche auf ihrer Oberseite nahe an ihren Achseln die Samenanlagen tragen (Abb. 252, 254). Bei der Reife verholzen die Fruchtschuppen entweder und bilden Holzzapfen, wie bei der Kiefer, Fichte und Tanne (Abb. 257), oder sie werden fleischig und bilden Beerenzapfen wie bei dem Wacholder (Abb. 259, *H* und *J*). Die Nadelholzgewächse enthalten in allen ihren Teilen in Harzgängen reichlich Harz und ätherisches Öl.



Abb. 251. 1 Männliche Blüte (Blüten-  
kätzchen) des Wacholders, *Juniperus*  
*communis*; 2 drei Staubblätter von unten  
gesehen; 3 desgl. von oben; 4 ein ein-  
zelnes Pollenblatt von der Rückseite;  
5 das Filament, c das Konnektiv, l die  
Pollenösche.



Abb. 252. 1 Weibliche Blüte des Wacholders, *Juni-  
perus communis*; b schuppenförmige Blätter,  
c Fruchtblätter, o die drei nackten Samenanlagen;  
2 dieselben von den schuppenförmigen Blättern be-  
freit; 3 der aus der Verwachsung der drei Fruchtblätter  
hervorgegangene Beerenzapfen; 4 ein Samen;  
5 Querschnitt durch den Beerenzapfen mit Balsam-  
gängen (v).




Abb. 253. *Taxus baccata*, die Eibe, ♂ männlicher, ♀ weiblicher Blütenzweig, fr Fruchtzweig in  
natürlicher Größe. — Das übrige zeigt die Verhältnisse des Blüten- und Fruchthaues teilweise  
stark vergrößert. (Nach Eichler.)

Man unterscheidet in der Klasse der Coniferae gewöhnlich nur zwei Familien.

### Taxaceae.

Familie der Eibengewächse.

Sie zeigen meist nur wenige Fruchtblätter in der weiblichen Blüte oder ein einziges endständiges mit je einer Samenanlage. Der Samen ist steinfruchtartig und überragt die Fruchtblätter.

*Taxus baccata*, die Eibe, früher in Mitteleuropa ein verbreiteter Waldbaum, jetzt überall sehr zurückgegangen, ist die einzige Konifere ohne Harzgänge in den Blättern. Sie ist ein beliebter Zierbaum für Parkanlagen und besitzt ein sehr hartes Holz. Der Samen ist bei der Reife von einem roten, fleischigen Samenmantel (Arillus) umhüllt (Abb. 253).

### Pinaceae.

Familie der Kieferngewächse.

In der zapfenartigen männlichen wie weiblichen Blüte sind die Geschlechtsblätter stets zu mehreren oder vielen vereinigt. Die Samen sind zwischen den Fruchtblättern versteckt, mit lederiger, holziger bis knochenharter Schale.



Abb. 254. *Pinus silvestris*.



Abb. 255. *Pinus pumilio*.

Die Familie teilt man gewöhnlich folgendermaßen ein:

- a) Araucarieae. Blätter und Fruchtblätter spiralig, letztere einfach, nicht in Deck- und Fruchtschuppen gegliedert; jedes Fruchtblatt mit einer einzigen Samenanlage.
- b) Abieteae. Mit spiraliger Anordnung der Nadelblätter und Zapfenschuppen, deren jede aus Deckschuppe und Fruchtschuppe besteht. Jede Fruchtschuppe trägt zwei Samenanlagen. Die Zapfen sind stets holzig.

- c) Cupresseae. Die Blätter sind gegenständig oder quirlig. Die Fruchtblätter stehen ebenfalls meist in quirliger Ordnung. Die Früchte sind entweder Trockenzapfen oder durch Saftigwerden und Verwachsen der Fruchtschuppen (z. B. bei *Juniperus*) sog. Beerenzapfen.

Erwähnenswert sind:

a) **Araucarieae:**

*Agathis dammara*, ein immergrüner Baum des Indischen Archipels mit elliptischen Blättern und kugeligen Zapfen, liefert Manila-Kopal, *A. australis* auf Neuseeland den Kauri-Kopal, (nicht Damar, wie man früher glaubte). *Araucaria excelsa*, von den Norfolkinseln (Australien), wird als „Zimmertanne“ sehr viel kultiviert.

b) **Abieteae:**

Bei der Gattung *Pinus* stehen die Nadeln stets zu 2–5 vereinigt auf Kurztrieben beisammen. Off. *Pinus silvestris* (Abb. 254, 258 c), die besonders in Norddeutschland als verbreitetster Waldbaum auftretende Kiefer oder Föhre, *P. australis*, *P. taeda* (beide im südlichen Nordamerika



Abb. 256. *Larix europaea*.




Abb. 257. Blütenkätzchen und Fruchtzapfen der Fichte, *Picea excelsa*.

Abb. 258. Zweige von: a) der Fichte, *Picea excelsa* mit ringsumstehenden, vierkantigen, einzelnen Nadeln; b) der Edeltanne, *Abies alba*, mit zweizeilig-gewendeten, flachen, an der Spitze ausgerandeten einzelnen Nadeln; c) der Kiefer, *Pinus silvestris*, mit auf Kurztrieben paarig aufsitzen, langen und spitzen Nadeln.

sehr verbreitet), *P. pinaster* (Südfrankreich) und *P. nigra* (= *P. laricio*, (Südeuropa und Österreich) liefern eine Anzahl officineller Produkte, nämlich Terebinthina, woraus durch Destillation *Ol. Terebinthinae* und als Rückstand Kolophonium gewonnen wird. *Resina Pini* ist das wasserhaltige Harz. Durch trockene Destillation des harzreichen Holzes von Arten dieser und der nachfolgenden Gattung wird *Pix liquida* gewonnen. *P. pumilio* (Abb. 255), die Latschenkiefer der höheren Gebirge, liefert *Ol. Pumilionis*.




Abb. 259. *Juniperus communis*. A blühender und fruchtender Zweig, B männliche Blüte, C Staubblatt von außen, D von innen, E von der Seite gesehen, F weibliche Blüte, G diese im Längsschnitt, H Beerenzapfen, I Querschnitt desselben.

Die Gattung *Larix* besitzt Langtriebe mit einzeln stehenden und Kurztriebe mit büschelig stehenden, sommergrünen Nadeln. Off. *Larix europaea* (Abb. 256) und *L. sibirica*, die Lärchen, liefern Lärchenterpentin (*Terebinthina veneta*) und Holzteer (*Pix liquida*).

Die Tannen unterscheiden sich von den im Wuchs ihnen oft sehr ähnlichen Fichten besonders durch aufrechtstehende Zapfen, während diese bei den letzteren herabhängen. *Abies balsamea*, die Balsamtanne, in Nordamerika einheimisch, ist die Stammpflanze des Bals. Canadense; *A. alba* ist die auf den Gebirgen Mitteleuropas einheimische und weit verbreitete Weiß- oder Edeltanne (Abb. 258 b).

*Picea excelsa*, die Fichte oder Rottanne (Abb. 257, 258 a), ist einer der verbreitetsten Waldbäume Mitteleuropas. (Betreffs der Unterschiede ihrer Nadeln vergl. Abb. 258.)

## c) Cupresseae:

*Callitris quadrivalvis*, in Nordwestafrika (besonders im Atlasgebirge) heimisch, ist die Stammpflanze des Sandarak-Harzes.

Off. *Juniperus communis*, der Wacholder (Abb. 251, 252 und 259), ein häufiger Strauch unserer heimischen Wälder mit quirlig gestellten Nadeln, trägt Beerenzapfen, welche durch Fleischigwerden der drei Deckschuppen der Samenanlage entstehen und als Fruct. Juniperi officinell sind. — *J. sabinana*, der Sadebaum (Abb. 260), in Südeuropa heimisch, in Deutschland leider in Gärten noch ziemlich viel kultiviert, liefert die Summitates Sabinae (Zweigspitzen samt Nadeln).

## 4. Klasse. Gnetales.

Stamm einfach oder verzweigt, mit echten Gefäßen im Holzkörper. Blätter ungeteilt, gegenständig. Blüten mit unscheinbaren Blütenhüllen.

Hierher gehören drei Familien oder drei Unterfamilien einer einzigen Familie von ganz außerordentlich voneinander abweichendem Aussehen, deren Arten fast ausschließlich den Tropengebieten angehören. Sie sind von großem morphologischem Interesse, besitzen aber keinerlei praktische Bedeutung.

## 2. Unterabteilung. Angiospermae.

## Bedecktsamige Gewächse.

Die Samenanlagen der Angiospermen (von *ἀγγεῖον*, angion = der Behälter, und *σπέρμα*, sperma = der Samen) sind stets einzeln oder zu mehreren in einem Fruchtknoten eingeschlossen, auf dessen Narbe die Pollenkörner zur Keimung gelangen. Die Eizelle bildet sich im Embryosack (= Makrospore) durch freie Zellbildung aus, die Endospermibildung geht erst nach erfolgter Befruchtung vor sich. Die in den Antherenfächern der Staubgefäße gebildeten Pollensäcke sind nur in regelmäßig beschränkter Zahl vorhanden (zwei oder vier), niemals aber in unbestimmter Zahl wie bei den Gymnospermen.

Mit Rücksicht auf die Entwicklung der Blütenhülle werden folgende Stufen unterschieden:

1. Blüten ohne Blütenhülle: Blüten nackt, achlamydeisch (auch oft ungenau als apetal bezeichnet).




Abb. 260. *Juniperus sabinana*. A Fruchttragender Zweig, B Blatt von der Seite gesehen, C Blatt von außen, D Blatt von innen gesehen, oe Ölgang.

2. Mit einfacher Blütenhülle (mit einem Kreis von Blütenhüllblättern): haplochlamydeisch. Die Blütenhüllblätter (Tepalen) entweder:

- a) hochblattartig (brakteoid) oder
- b) blumenblattartig (petaloid, korollinisch).

3. Mit doppelter Blütenhülle (mit zwei Kreisen von Blütenhüllblättern): diplochlamydeisch; dabei

- a) beide Kreise von Blütenhüllblättern (Tepalen) gleichartig, homoiochlamydeisch, bisweilen durch Vereinigung der beiden Kreise scheinbar haplochlamydeisch:
  - $\alpha$ ) Tepalen getrennt (choritepal),
  - $\beta$ ) Tepalen vereint (syntepal); oder
- b) beide Kreise ungleichartig, heterochlamydeisch, hierbei gewöhnlich der äußere Kreis sepaloid (Kelchblätter: Sepalen), der innere Kreis petaloid (Blumenblätter: Petalen):
  - $\alpha$ ) Blumenblätter getrennt (choripetal);
  - $\beta$ ) Blumenblätter vereint (sympetal);
  - $\gamma$ ) Die Blumenblätter sind infolge einer zweckmäßigen Reduktion abortiert (apopetal).

Unter den Bedecktsamigen Pflanzen werden zwei große Klassen unterschieden, nämlich:

- a) mit einem Keimblatt versehene: Monocotyledoneae,
- b) mit zwei Keimblättern versehene: Dicotyledoneae.

Die Zahl der Keimblätter ist jedoch nicht der einzige Unterschied dieser beiden großen Pflanzengruppen, sondern es gehen damit meist eine ganze Reihe wesentlicher Unterschiede Hand in Hand. So sind in der Regel:

	bei den Monokotylen:	bei den Dikotylen:
die Blätter . . .	parallelnervig	fiedernervig
die Blüten . . .	dreizählig	vier- oder gewöhnlich fünfzählig
die Leitbündel auf dem Quer- schnitt des Stengels	zerstreut, ohne Cam- bium (geschlossene Leitbündel)	ringförmig gelagert, mit Cambium (offene Leitbündel).

## 1. Klasse. Monocotyledoneae. Einkeimblättrige Gewächse.

### 1. Reihe. Pandanales. Schraubenbaumartige.

Die getrenntgeschlechtigen Blüten stehen noch auf einer sehr niedrigen Stufe. Sie sind entweder nackt oder mit einer aus winzigen, unscheinbaren Blättchen gebildeten, gleichartigen (homoiochlamydeischen) Blütenhülle versehen. Die Zahl der Staubblätter in den männlichen und der Fruchtblätter in den weiblichen Blüten ist

stark schwankend. Samen mit Nährgewebe. Die Blüten stehen in zusammengesetzten, kugeligen oder kolbenähnlichen Blütenständen.

### Typhaceae.

Familie der Lieschkolbengewächse.

Blüten vollständig nackt.

Die Arten der Gattung *Typha* sind als Lieschkolben bekannt und gehören zu den charakteristischen Erscheinungen unserer Sumpf- und Teichflora.

### Sparganiaceae.

Familie der Igelkolbengewächse.

Blüten mit winziger, unscheinbarer Blütenhülle.

Die Gattung *Sparganium*, Igelkolben genannt (Abb. 261), kommt in unserer Flora mit zwei Arten häufig vor.

#### 2. Reihe. Helobiae.

Sumpfbewohnende.

Blüten nackt oder mit einfacher oder doppelter Blütenhülle, hypogynisch oder epigynisch. Staubblätter  $1 - \infty$ , Fruchtblätter  $1 - \infty$ , meist frei voneinander, unverwachsen. Nährgewebe meist fehlend. Sumpf- und Wasserkräuter.

### Potamogetonaceae.

Familie der Laichkräutergewächse.

Untergetauchte oder mit den Blättern auf der Wasseroberfläche schwimmende Kräuter. Blüten völlig nackt, klein, meist in dichten, aus dem Wasser hervorragenden Ähren.




Abb. 261. *Sparganium ramosum*, der Igelkolben.  
(Nach Engler.)

Die Gattung *Potamogeton* (Laichkräuter) ist in unserer Flora mit zahlreichen Arten vertreten.

### Alismataceae.

Familie der Froschlöffelgewächse.

Blüten mit Kelch und Blumenkrone, hypogynisch, mit der Formel  $K\ 3, P\ 3, A\ 6 - \infty, Cp.\ 6 - \infty$ .



Abb. 262. *Sagittaria sagittifolia*. A Blatt und Blütenstand; B Frucht in Seitenansicht nach Entfernung einer Anzahl Früchtchen; C Knolle, zu einer jungen Pflanze auswachsend; D eine solche in weiter vorgerücktem Stadium. (Nach Buchenau.)

Hierher gehört *Alisma plantago*, der „Froschlöffel“, eine sehr charakteristische Pflanze unserer Teichränder, ferner *Sagittaria sagittifolia* (Abb. 262), das Pfeilkraut, welches an denselben Standorten sich findet.

### Hydrocharitaceae.

Familie der Froschbißgewächse.

Blüten fast dieselben Blütenverhältnisse zeigend wie bei voriger Familie, aber der Fruchtknoten unterständig.

**Hydrocharis morsus ranae**, der Froschbiß, und **Stratiotes aloides**, die Wasseraloë, sind zwei in unserer Flora heimische, frei auf der Wasseroberfläche schwimmende Arten dieser großen Familie.

**Helodea canadensis**, die Wasserpest, stammt aus Nordamerika, ist aber jetzt (nur in der weiblichen Pflanze!) bei uns eingebürgert.

### 3. Reihe. **Glumiflorae.** Spelzenblütige.

Blüten von Hochblättern (Spelzen) bedeckt, unterständig, zwittrig oder eingeschlechtig, nackt oder selten mit sehr einfachem Perigon, mit einfächerigem, eine Samenanlage enthaltendem Fruchtknoten. Infloreszenz viel- und kleinblütig. Blätter linealisch, parallelnervig, „grasartig“.

## **Gramineae.**

### Familie der Grasgewächse.

Die Grasgewächse besitzen kleine und durch das Fehlen des Perigons sehr unscheinbare Blüten. Diese sind in zusammengesetzten Ähren oder Rispen vereint, deren einzelne Glieder stets aus Ährchen bestehen. Als häufigste Blütenformel (Abb. 263) läßt sich die folgende ansehen:  $P_0, A_3+0, G^1$  oder aber  $P_0+2, A_3+0, G^1$  (wenn man die Lodiculae als reduzierte Perigonblätter auffaßt, wie es gelegentlich geschieht). Sowohl die Blüte selbst, als auch das ganze Ährchen sind von schmalen, harten, oft mit einer Granne versehenen Hüllblättern, Spelzen genannt, umgeben. So folgen z. B. am Weizenährchen (Abb. 264, vergl. auch Abb. 265) auf die beiden Hüllblätter des Ährchens ( $g_1$  und  $g_2$ ), welche Hüllspelzen oder Glumae genannt werden, vier Blüten mit je einem Deck- und Vorblatt ( $d$  und  $v$ ), meist Deck- und Vorspelze genannt, welche beide zusammen auch den Namen *Paleae* führen. Zwei am Grunde des Fruchtknotens stehende Schwellenschüppchen werden als Lodiculae (vgl. Abb. 264 C, l) bezeichnet; diese werden manchmal (aber wohl unrichtig) als reduzierte Perigonblätter gedeutet; vergl. Abb. 263. Die Staubfäden der Gramineen sind sehr dünn, lang und leicht beweglich; desgleichen die Staubbeutel, welche in der Mitte ihrer Längsseite am Filament angeheftet sind und durch den Wind mit Leichtigkeit bewegt werden können, damit der Pollen ausstäubt. Der Fruchtknoten ist aus einem einzigen Fruchtblatt hervorgegangen, aber fast durchweg von zwei federigen Narben gekrönt. Der Samen (Abb. 266) verwächst bei der Reife auf das engste mit der dünnen Fruchtwand und bildet eine Hautfrucht oder Caryopse. Die Getreidekörner sind also keine Samen, sondern Früchte. Im Samen findet sich reichliches




Abb. 263. Grundriß einer Grasblüte:  $d$  das Deckblatt (Deckspelze),  $v$  das Vorblatt (Vorspelze.)

Nährgewebe, an dessen Vorderseite und Basis der nur von der Fruchtwandung bedeckte Embryo außen anliegt. Der Embryo besitzt eine schildförmige Erweiterung des Cotyledons (Scutellum), welche bei der Keimung des Samens als Saugorgan dient (Abb. 35, 266, *sc*).




Abb. 264. *A* Ein Weizenährchen mit den beiden Hüllspelzen  $g_1$  und  $g_2$  und vier von je einer Deckspelze ( $d$ ) und einer Vorspelze ( $v$ ) umhüllten Einzelblüten; *B* eine Einzelblüte; *C* dieselbe von Deck- und Vorspelze befreit;  $l$  Lodiculae.




Abb. 265. Schema eines Grasährchens. 1 Hauptachse, 2 Seitenachsen des Teilblütenstandes, uH untere Hüllspelze, oH obere Hüllspelze, D Deckspelze, V Vorspelze, L Lodiculae.

Abb. 266. Längsschnitt der Frucht (Caryopse) von *Zea mays*, 6mal vergr. *c* Fruchtschale, *fs* Basis der Frucht, *eg* fester, *ew* weicher Teil des Endosperms, *sc* Scutellum (Cotyledon), *ss* dessen Spitze, *k* Knospe des Keimpflänzchens, *w* Wurzel, *ws* Wurzelscheide, *st* Stämmchen des Keims. (Nach Sachs.)

Die Grasgewächse sind einjährig oder unterirdisch ausdauernd (z. B. *Triticum repens*, *Bambusa*). Charakteristisch für den ganzen Habitus der Gräser ist der Stengel, welcher meist hohl ist und *Halm* genannt wird. An jeder Einfügungsstelle eines Blattes befindet sich ein sogen. Knoten, d. h. eine Verdickung des Stengels, welche auch

innen ausgefüllt ist, also die röhrenförmige Höhlung des Stengels (Halmes) durch eine Scheidewand unterbricht.

Die Blätter der Grasgewächse sind meist sehr lang, linealisch und oben zugespitzt. Sie sind am Grunde mit einer gespaltenen Scheide versehen, welche von einem Knoten bis zum andern reicht, so daß die eigentliche Blattfläche erst an dem nächsten, über der Einfügungsstelle gelegenen Knoten beginnt. An der Stelle, wo die Scheide in die Blattfläche übergeht, befindet sich ein farbloses, häutchenartiges Züngelchen, *Ligula* genannt (Abb. 51).

Alle Grasgewächse, mit Ausnahme des Mais, des Reis und der Bambusarten, gehören nach Linné der III. Klasse 2. (bezw. 3.) Ordnung an.

Die Gattungen dieser Familie lassen sich in zwei Gruppen einteilen, und zwar in solche, bei denen jedes Ährchen von 3—6 Hüll-

Abb. 267. *Zea mays*.Abb. 268. *Saccharum officinarum*.

spelzen (*Glumae*) umhüllt ist; diese werden nach der Gattung **Panicum**: **Panicoideae** genannt; — und solche mit nur 2 Hüllspelzen vor jedem Ährchen; letztere werden nach der Gattung **Poa**: **Poaeideae** genannt.

#### a) **Panicoideae**:

**Andropogon sorghum**, wichtigste Körnerfrucht der Tropen, besonders Afrikas.

**Panicum miliaceum**, echte Hirse, aus Ostindien stammend, wird bei uns in sandigen Gegenden als Nahrungsmittel angebaut.

**Zea mays**, Mais, Türkischer Weizen (Abb. 266, 267), stammt wahrscheinlich aus Zentralamerika und zeichnet sich dadurch aus, daß sein Halm mit Mark

erfüllt ist. Er ist als Nähr- und Futterpflanze gleich wichtig. Der Mais ist getrenntgeschlechtlich und gehört deshalb in die XXI. Klasse 3. Ordnung nach Linné.

*Oryza sativa*, der Reis, wahrscheinlich im tropischen Afrika heimisch, in feuchten Gegenden aller wärmeren Klimate als Volksnahrungsmittel gebaut, ist neben *Bambusa* das einzige Gras, welches 6 Staubgefäße besitzt. Er gehört daher zur VI. Klasse 2. Ordnung nach Linné.

*Saccharum officinarum*, das Zuckerrohr (Abb. 268), besitzt wie der Mais mit Mark gefüllte Halme. Es ist in Ostindien heimisch, wird in allen feuchtwarmen Tropengebieten, im größten Maßstab auf den Antillen, angebaut und liefert einen Teil des Rohrzuckers, sowie den Rum.

#### b) Poaeoideae:

*Poa annua*, Rispengras, und andere im Gegensatz zu diesem ausdauernde Poa-Arten sind verbreitete Wiesengräser.

*Triticum repens* (auch *Agropyrum repens* genannt), Quecke (Abb. 269), liefert *Rhizoma Graminis*. *T. vulgare*, Weizen (Abb. 270 b), *Secale cereale*, Roggen (Abb. 270 d), *Hordeum vulgare*, Gerste (Abb. 270 a), *Avena sativa*, Hafer (Abb. 270 c), sind die wichtigsten Getreidearten.



Abb. 269. *Triticum repens*.

Abb. 270. a *Hordeum vulgare*, b *Triticum vulgare*, c *Avena sativa*, d *Secale cereale*.

*Lolium perenne*, englisches Raygras (*L. temulentum*, Taumelloch, enthält dagegen in den Früchten stets einen giftigen Pilz!), *Anthoxanthum odoratum*, Ruchgras (eumarinhaltig), *Alopecurus pratensis*, Fuchsschwanz, *Holcus lanatus*, Honiggras, *Dactylis glomerata*, Knäuelgras, *Briza media*, Zittergras, *Arrhenatherum elatius*, *Festuca*-Arten sind häufige Wiesengräser und gute Futtergräser. *Phragmites communis*, „Schilf“, ist an Flüssen und Seen über die ganze Erde verbreitet.

*Bambusa arundinacea* ist das größte aller Gräser und wird bis über 20 Meter hoch. Es gehört der VI. Klasse 1. Ordnung nach Linné an. In Ostindien einheimisch.

**Cyperaceae.**

## Familie der Riedgrasgewächse.

Die unterscheidenden Merkmale dieser Familie von der Familie der Grasgewächse sind folgende:

Die Ährchen besitzen keine Hüllspelzen (Glumae), und jede Blüte ist meist nur mit einer Spelze (Palea) versehen. Das Perigon fehlt oder ist durch Borsten oder Haare vertreten (Abb. 271 A, s). Der Fruchtknoten ist einfächerig und wird von zwei oder drei




Abb. 271. A Zwitterblüte einer Cyperacee; s die das Perigon vertretenden Borsten, a Staubgefäße, st Narben; B männliche, C weibliche Blüten einer Cyperacee.




Abb. 272. *Carex arenaria*.

Fruchtblättern gebildet; der Griffel besitzt zwei oder drei Narben. Die Frucht ist ein einsamiges Nüßchen. Die Halme sind knotenlos und dreikantig, auch die Blätter sind dementsprechend dreizeilig angeordnet. Die Scheiden der Blätter sind nicht gespalten wie bei den Grasgewächsen, sondern geschlossen und besitzen keine Ligula. Bisweilen fehlen auch Blätter vollkommen (*Scirpus lacuster*). Die Riedgräser gedeihen vorzugsweise auf feuchtem Boden und sind der Hauptbestandteil der sogenannten „sauerer Wiesen“. Die Blüten der Riedgrasgewächse sind häufig zweigeschlechtlich und gehören daher, wenn nicht der Linné'schen III. Klasse 1. bzw. 3. Ordnung, der XXI. (selten XXII.) Klasse 3. Ordnung an.

Man unterscheidet zwei Unterfamilien:

a) **Caricoideae:** mit getrenntgeschlechtigen Blüten.

*Carex arenaria*, die Sandsegge (Abb. 272), wächst am Meeresstrande und auf sandigen Äckern Mitteleuropas. Sie zeichnet sich durch lange zähe Rhizome aus, welche als Rhiz. Caricis auch medizinisch gebräuchlich sind.

Zahlreiche andere Arten der großen Gattung *Carex* sind in unserer Flora einheimisch.

**b) Scirpoideae:** mit Zwitterblüten.

Die Gattung *Scirpus*, Binse, ist in zahlreichen deutschen Arten vertreten.

*Cyperus flavescens*, Cypergras, hat der Familie den Namen gegeben. Sie ist auf nassen Triften häufig. *Cyperus papyrus*, in Afrika massenhaft, auch vereinzelt in Südeuropa, lieferte in dem Mark seiner Stengel den Rohstoff zu dem „Papyrus“ des Altertums.

*Eriophorum latifolium* und andere Arten, Wollgras, durch ihre nach der Blütezeit zu langen weißen Haaren auswachsenden Perigonborsten charakteristisch, auf Sumpfwiesen gemein.

4. Reihe. **Principes.** Palmen.

Blüten hypogyn, meist diklinisch, aktinomorph, sehr klein, mit 2 Kreisen winziger Blütenhüllblätter, 2 Kreisen von Staubblättern und einem Fruchtblattkreis. Blütenstand einfache oder zusammengesetzte, kolbige Ähren. — Einzige Familie

**Palmae.**

Familie der Palmengewächse.

Die Palmen sind fast durchweg in tropischem Klima einheimische, stammbildende

Pflanzen mit einfachem, meist unverzweigtem Stamme und großen fächerförmigen oder fiederförmig zerteilten Blättern (Abb. 273, 275). Das Stehenbleiben der Scheiden der abgestorbenen Blätter gibt den Stämmen meist ein eigentümliches und für die Palmen charakteristisches Aussehen. Die Blüten der Palmen stehen meist in hängenden Rispen (Abb. 274, A, E) oder in Kolben (Abb. 276); der ganze Blütenstand ist von einem Hochblatt umgeben. Die Blüten sind entweder

Zwitterblüten, zusammengesetzt nach der Formel  $P_3 + 3 A_3 + 3 G^{(3)}$ , oder sie sind getrenntgeschlechtig. Die Perigonblätter sind meist unscheinbar, von lederiger




Abb. 273. *Cocos nucifera*, die Kokospalme. A Habitusbild, B Fruchtbündel, C Frucht im Längsschnitt, D der freigelegte Steinkern von unten gesehen, mit den drei Keimblättern. — Alles stark verkleinert.

Beschaffenheit, verwachsen oder frei. Die Frucht der Palmen ist eine Beere, eine Steinfrucht oder eine Nuß; sie ist ursprünglich dreifächerig, wird aber durch Fehlschlagen oft einfächerig und einsamig. Die Palmen gehören nach Linné der VI. Klasse 1. Ordnung, Hexandria Monogynia, oder der XXI., bzw. XXII. Klasse 6. Ordnung, Monoecia, bzw. Dioecia Hexandria, an.

Off. *Cocos nucifera*, die Kokospalme (Abb. 273), in allen Tropengegenden verbreitet, liefert Kokosnüsse und Ol. *Cocos*, d. i. das fette Öl des Nährgewebes; das getrocknete Nährgewebe ist unter dem Namen Kopra im Handel. Es liefert den Rohstoff zur Herstellung von Palmin und Palmona und anderer als Butterersatzmittel verwendeter Pflanzenfette.




Abb. 274. *Areca catechu*. A oberer Teil eines männlichen Blütenstandsweiges, B einzelne männliche Blüte, vergrößert, C Staubblatt, D Rudiment des unfruchtbaren Fruchtknotens, E untere Kolbenverzweigung mit vier, unten weibliche Blüten tragenden Zweigen. — Das übrige zeigt Verhältnisse der weiblichen Blüte, der Frucht und des Samens. (Nach Drude.)

Off. *Areca catechu* (Abb. 274), in Ostindien einheimisch, ist die Stammpflanze des Sem. *Arecae*.

*Daemonorops draco* liefert Resina (*Sanguis Draconis*, das ostindische Drachenblut).

*Elaeis guineensis* ist die afrikanische Ölpalme, aus deren Fruchtfleisch das Palmöl gewonnen wird, während die Samen das Palmkernöl liefern.

*Chamaerops humilis*, die einzige in Europa heimische Palme, tritt in Portugal, Südspanien und Sizilien auf.

*Calamus rotang*, Liane von oft über 200 m Länge, liefert im indisch-malayischen Gebiet Spanisches Rohr und Stuhlrohr.

*Copernicia cerifera*, im tropischen Südamerika, liefert das Carnaubawachs. Auch andere Palmen liefern sog. Pflanzenwachs.




Abb. 275. *Phoenix dactylifera*, die Dattelpalme. *A* Fruchttragende Pflanze, *B* Diagramm der Blüte, *C* Fruchtbündel, *D* Frucht, *E* Fruchtlängsschnitt.

*Phoenix dactylifera* (Abb. 275) ist die Stammpflanze der Datteln. Sie ist am Südrand des Mittelmeergebiets verbreitet und für die Araber von höchster Wichtigkeit.

*Metroxylon Rumphii* (Abb. 276) liefert aus dem Marke seines Stammes den echten Sago.

*Phytelephas macrocarpa* besitzt Samen mit überaus hartem Endosperm (Reservecellulose), welche als sogenanntes vegetabilisches Elfenbein zu Drechslerarbeiten für Knöpfe etc. Verwendung finden. Auch noch andere Palmensamen (z. B. von der Gattung *Coelococcus*) werden zu denselben Zwecken gebraucht.

### 5. Reihe. Spathiflorae.

#### Scheidenblütler.

Blüten klein, mit einfacher oder doppelter, unscheinbarer Blütenhülle oder durch Reduktion nackt und oft nur aus 1 Staubblatt oder 1 Fruchtknoten bestehend, zweigeschlechtig oder eingeschlechtig, stets an einfacher, von einem auffallenden Hochblatt (Spatha) umschlossener, kolbiger Ähre (Spadix).



Abb. 276. *Metroxylon Rumphii*.

### Araceae.

#### Familie der Aronstabgewächse.

Zu den Aronstabgewächsen gehören sowohl Wasserpflanzen als auch Sumpf- und Landpflanzen. Sie zeichnen sich besonders durch ihre Blütenstände aus; diese sind kolbenförmig und meist, wenigstens im jugendlichen Zustande, von einem Hochblatte, der sogen. Spatha, umhüllt (Abb. 277, *p*). Der Kolben (Spadix) ist zuweilen ganz (Abb. 278), zuweilen nur teilweise (Abb. 277) mit Blüten besetzt; die Spitze bildet im letzteren Falle eine fleischige Keule. Die Blüten sind entweder Zwitterblüten (Abb. 279), nach der Formel  $P 3 + 3 A 3 + 3 G^{(3)}$  zusammengesetzt, oder sie sind getrenntgeschlechtig und häufig auffallend reduziert. In letzterem Falle stehen meist am unteren Teile des Kolbens die weiblichen, am oberen die männlichen Blüten. Zwischen beiden und oberhalb der männlichen Blüten befinden sich z. B. bei *Arum* solche mit unausgebildeten Geschlechtsorganen (Abb. 277, rechts).

Von den zahlreichen Arten dieser Familie seien nur die folgenden hier erwähnt:

*Arum maculatum*, Gefleckter Aronstab (Abb. 277), besitzt spießförmige, oft braungefleckte Blätter. Der Kolben ist purpurrot, keulig, und wird von der

Blütenscheide überragt. Die Früchte sind scharlachrote Beeren. Liefert Tubera Ari.

Off. *Acorus calamus*, Kalmus (Abb. 278, 279), besitzt schwertförmige Blätter, durch welche der Kolben zur Seite gedrängt wird. Die Pflanze ist sehr wahrscheinlich in Ostindien heimisch und bei uns vielleicht nur verwildert; sie wächst hauptsächlich an den Rändern sumpfiger Seen. Liefert Rhizoma Calami.



Abb. 277. Blütenkolben von *Arum maculatum*, rechts von der Spatha befreit und vergrößert.



Abb. 279. Blüte von *Acorus calamus*.




Abb. 278. *Acorus calamus*. Habitusbild der blühenden Pflanze. *Rh* Rhizom, *B* Blütenstiel, *K* Blütenkolben, *S* Spatha (Deckblatt des Kolbens), *L* Laubblätter.

*Monstera deliciosa*, oft fälschlich *Philodendron pertusum* genannt, ist als Zimmerpflanze sehr beliebt.

*Anthurium Scherzerianum* u. a. A. mit schön gefärbter Spatha werden als Zierpflanzen in Warmhäusern viel kultiviert.

### Lemnaceae.

Familie der Wasserlinsengewächse.

Blüten getrenntgeschlechtig, sehr reduziert, d. h. die ♂ Blüten aus 1 Staubgefäß, die ♀ aus 1 Fruchtknoten bestehend. — Freischwimmende Wasserpflanzen mit sehr reduziertem Vegetationskörper.

*Lemna minor*, und andere L.-Arten, Wasserlinsen, überziehen stehende Gewässer mit ihren grünen, linsenförmigen, teilweise unterseits bewurzelten Pflanzenkörpern.

6. Reihe. **Farinosae.** Mehlsamige.

Blüten mit meist doppelter, unscheinbarer oder hochblattartig gefärbter Blütenhülle nach der Formel  $P_3+3, A_3+3, G^{(3)}$  (5 Kreise zu je 3 Gliedern = pentacyklisch trimere Blüte). Manchmal kommt eine mehr oder weniger weitgehende Verkümmern der Staubblätter vor. Samen stets mit mehligem, stärkehaltigem Nährgewebe.

Von den zahlreichen hierhergehörigen, sämtlich oder fast sämtlich tropischen Familien soll nur die folgende hier angeführt werden.

**Bromeliaceae.**

Familie der Ananasgewächse.

Blüten mit Kelch und Blumenkrone, 2 Kreisen Staubblättern und einem dreifächerigen, ober- oder unterständigen Fruchtknoten. Die Frucht ist eine Beere oder Kapsel.

*Ananas sativus* liefert in ihren fruchtähnlichen, fleischigen, von einem Blattschopf gekrönten Fruchtständen die Ananas.

7. Reihe. **Liliiflorae.** Lilienblütige.

Regelmäßige (aktinomorphe), selten schwach zygomorphe, hypogyne oder epigyne Blüten, stets mit Perianth und aus vollständigen, vollkommen ausgebildeten, dreizähligen Quirlen bestehend, meist das pentacyklisch trimere Schema repräsentierend (5 Kreise zu je 3 Gliedern), Fruchtknoten dreifächerig, Samenanlagen anatrop oder campylotrop, selten atrop; Embryo von fleischigem, d. h. ölreichem Endosperm umgeben.

**Juncaceae.**

Familie der Binsengewächse.

Blüten homoiochlamydeisch, strahlig, hermaphroditisch mit hochblattartiger Blütenhülle. Die Blütenformel ist wie die der Liliaceae, doch ist manchmal der innere Staubblattkreis nicht entwickelt. Fruchtknoten oberständig, ein- oder dreifächerig mit je einer oder zahlreichen Samenanlagen. Kapsel fachspaltig. — Meist einjährige Kräuter mit schmalen, grasartigen Blättern und mannigfach zusammengesetzten, reichblütigen Blütenständen.

*Juncus*-Arten, Binsen, sind auf feuchtem Boden fast auf der ganzen Erde verbreitet.

*Luzula*-Arten, Sinsen, meist in Wäldern massenhaft auftretend.

**Liliaceae.**

## Familie der Liliengewächse.

Alle Gattungen und Arten dieser Familie besitzen vollkommen regelmäßige Blüten (Abb. 280). Diese sind nach der Formel zusammengesetzt:  $P 3 + 3 A 3 + 3 G^{(2)}$ . Der Kelchblattkreis und der Blumenblattkreis sind gleichmäßig, blumenblattartig ausgebildet und bilden ein Perigon. Der Fruchtknoten ist stets dreiteilig und oberständig und bildet zur Zeit der Reife eine Kapsel oder eine Beere mit meist zahlreichen Samen.



Abb. 280. Grundris der typischen Monokotylenblüte:  
d Deckblatt, v Vorblatt.

Die Mehrzahl der Liliengewächse stirbt in ihren oberirdischen Teilen alljährlich ab, während die unterirdischen Wurzelstöcke (z. B. Spargel) oder Zwiebeln (z. B. Hyacinthe oder Tulpe) den Winter überdauern. Nur einige in den Tropen wachsende Liliengewächse, wie z. B. die Aloë und der Drachenbaum, sind ausdauernd.

Die sehr zahlreichen Gattungen dieser Familie lassen sich in folgende Unterfamilien bringen.

**a) Melanthioideae:**

Pflanzen mit Rhizom oder Zwiebelknolle und endständigem Blütenstand. Kapsel meist septicid aufspringend.



Abb. 281. Aloë vulgaris.




Abb. 282. Urginea maritima.

Off. *Colchicum autumnale*, die Herbstzeitlose (Abb. 283), ist die Stammpflanze von Bulbus und Semen Colchici. Die Pflanze zeichnet sich dadurch aus, daß sie im Herbst blattlos blüht (daher der deutsche Name) und im Frühjahr Blätter und Früchte trägt.

Off. *Veratrum album*, die Nieswurz oder der weiße Germer (Abb. 284) liefert Rhiz. *Veratri*; sie ist in den Gebirgen Europas einheimisch.

Off. *Schoenocaulon officinale*, auch *Sabadilla officinalis* oder *Veratrum sabadilla* genannt, kommt in Zentralamerika vor und liefert Sem. *Sabadillae*.

#### b) Asphodeloideae:

Pflanzen meist mit Rhizom und grundständigen Blättern oder mit Stamm, der an seiner Spitze einen Blattschopf trägt. Kapsel loculicid aufspringend.

*Phormium tenax*, in Neu-Seeland einheimisch, liefert neuseeländischen Flachs.

Off. *Aloë vulgaris* (Abb. 281), *A. spicata*, *A. africana*, *A. ferox*, *A. lingua* und andere Arten sind sämtlich in den Tropen und Subtropen Afrikas einheimisch und liefern die Droge Aloë. Da ihre Blüten typische Lilienblüten sind, gehört die Gattung Aloë nach Linné in die VI. Klasse 1. Ordnung.



Abb. 283. *Colchicum autumnale*.



Abb. 284. *Veratrum album*.

*Xanthorrhoea hastile* und *X. australe*, in Australien heimisch, liefern das Akaroidharz.

#### c) Allioideae:

Pflanzen mit Zwiebel oder kurzem Rhizom. Blütenstand eine Schraubeldolde, von 2 breiten Hüllblättern umschlossen.

*Allium sativum* ist der Knoblauch, *A. schoenoprasum* der Schnittlauch, *A. ascalonicum* die Schalotte, *A. cepa* die sogen. Bolle oder Speisewiebel, *A. fistulosum* die Winterwiebel.

#### d) Lilioideae:

Pflanzen mit Zwiebel. Blüten in Trauben. Kapsel loculicid aufspringend. Off. *Urginea maritima* (auch *Scilla maritima* genannt), die Meerzwiebel (Abb. 282), an den Küsten des Mittelmeeres heimisch, liefert *Bulbus Scillae*.

*Lilium candidum*, die weiße Lilie, *Tulipa Gesneriana*, die Gartentulpe, *Fritillaria imperialis*, die Kaiserkrone, *Hyacinthus orientalis*, die wohlriechende Hyacinthe u. v. a. m., sind beliebte Ziergewächse.

Abb. 285. *Smilax pseudosiphilitica*.Abb. 286. *Paris quadrifolia*.**e) Dracaenoideae:**

Meist große, oft baumförmige Gewächse mit eigenartigem Dickenwachstum des Stammes. Frucht Beere oder Kapsel.

*Dracaena draco*, Drachenbaum, auf Teneriffa, und *D. cinnabari*, auf Socotra, liefern Drachenblut.

*Sansevieria*-Arten liefern im tropischen Afrika wichtige Gespinnstfasern.

**f) Asparagoideae:**

Pflanzen mit unterirdischem Rhizom, in oberirdische, blühende Zweige endigend. Frucht eine Beere.

*Asparagus officinalis* (Abb. 287) ist der Spargel, *Convallaria majalis* (Abb. 288) das Maiglöckchen, *Paris quadrifolia* (Abb. 286) die Einbeere.

## g) Smilacoideae:

Kletternde Sträucher oder Halbsträucher. Beerenfrucht.  
 Off. *Smilax ornata* (= *S. officinalis*), *S. medica*, *S. syphilitica*,  
*S. pseudosyphilitica* (Abb. 285) und wahrscheinlich noch andere in Zentral-




Abb. 287. *Asparagus officinalis*. *A* junger Sproß, der eßbare Spargelkopf. *B* Laubzweig mit nadelartigen Blättern und ♂ Blüten, *C* eine ♂ Blüte im Längsschnitt am Grund mit rudimentärem Fruchtknoten, *D* ♀ Blüte im Längsschnitt mit verkümmerten Staubblättern, *E* Früchte tragender Zweig, *F* Samen, *G* derselbe im Längsschnitt, *H* Schema der Büschel von nadelartigen Blättern und Blüten im Aufriß, *J* im Grundriß, *a* Stengelachse, *I* Primärsproß, *II* Sekundärsproß, welcher zuerst eine Blüte *fl* und dann nadelartige Blätter trägt, *T* Tragblatt des ganzen Büschels.

amerika wachsende Smilaxarten sind die Stammpflanzen der Sarsaparillsorten; jedoch ist die Abstammung der offizinellen Sarsaparille noch nicht mit Sicherheit festgestellt. *S. china*, in Japan und China heimisch, liefert Rhiz. oder Tubera Chinae.

## Amaryllidaceae.

Familie der Amaryllisgewächse.

Diese Familie zeigt dieselben Blütenverhältnisse wie die Liliaceae, besitzt jedoch einen unterständigen Fruchtknoten.

Hierher gehören viele unserer Zierpflanzen, so *Galanthus nivalis*, das Schneeglöckchen, *Leucojum vernum*, der Märzbecher, die Gattung *Narcissus* mit zahlreichen Arten, die Narzissen. Ferner ist hierher die Gattung *Agave* zu stellen, welche mit zahlreichen Arten im tropischen Amerika einheimisch ist. *A. americana*, die sogen. „hundertjährige Aloe“, hat sich in allen tropischen und subtropischen

Gebieten (z. B. in den Mittelmeerländern) akklimatisiert; von ihr wird in Mexiko ein alkoholhaltiges Getränk gewonnen. Andere Arten der Gattung (*A. rigida*, var. *sisalana*, in Deutschostafrika viel gebaut) liefern wertvolle Faser (Sisalhanf).

### Dioscoreaceae.

Familie der Yamsgewächse.

Blüten homoiochlamydeisch, hermaphroditisch oder getrenntgeschlechtlich, mit hochblattartiger Blütenhülle, die am Grunde meist zu einer kurzen Röhre vereinigt ist. Von den 6 Staubblättern die 3 inneren häufig als Staminodien ausgebildet. Fruchtknoten unterständig, 3- oder 1-fächerig mit zentralwinkelständigen oder wandständigen Plazenten. Frucht eine Kapsel oder Beere. — Kletternde oder schlingende Kräuter mit meist knolligen, stärkereichen Rhizomen, meist pfeilförmigen Blättern und in Trauben stehenden kleinen Blüten.

*Dioscorea batatas*, in China und Japan heimisch, und mehrere andere in Ostasien und dem südlichen Nordamerika heimische Arten, liefern die wie Kartoffeln genossenen Yamsknollen und werden deshalb viel kultiviert.

### Iridaceae.

Familie der Schwertliliengewächse.

Von den ihnen nahestehenden Liliengewächsen unterscheiden sich die Schwertliliengewächse erstens durch ihren unterständigen



Abb. 288. *Cavallaria majalis*.



Abb. 289. *Iris germanica*.

Fruchtknoten und zweitens dadurch, daß nur der äußere der beiden Staubblattkreise ausgebildet ist. Die Gattungen dieser Familie gehören daher sämtlich der III. Klasse I. Ordnung nach Linné an, und ihre Blütenformel ist  $P_3 + 3A_3 + 0G_{(3)}$ . Die beiden Kreise des Perigons sind bei *Crocus* (Abb. 291) gleichartig gestaltet, bei *Iris* (Abb. 290) verschieden ausgebildet. Bei *Gladiolus* ist die Blüte

median-zygomorph. Bei *Iris* sind die Narbenlappen blumenblattartig gestaltet, bei *Crocus* sind sie tief gespalten. Die Frucht ist eine dreifächerige Kapsel.

Die Schwertliliengewächse sind unterirdisch ausdauernd und besitzen knollige oder gestreckte Wurzelstöcke.



Abb. 290. Blüte von *Iris pallida*: a die blumenblattartigen, buntgefärbten Kelchblätter, b die Blumenblätter, c die Narben.

Abb. 291. *Crocus sativus*. A Blühende Pflanze ( $\frac{1}{2}$ ); B Staubblatt von der Innenseite ( $\frac{1}{2}$ ); C Pollenkorn ( $\frac{100}{1}$ ); D Griffel mit den 3 Narben ( $\frac{1}{2}$ ); E Fruchtknoten im Längsschnitt ( $\frac{1}{1}$ ); F im Querschnitt ( $\frac{1}{1}$ ).

Off. *Iris germanica* (Abb. 289), *I. pallida* (Abb. 290) und *I. florentina*, Schwertlilien, liefern *Rhizoma Iridis*. Sie sind in den Mittelmeerländern heimisch, werden jedoch bei uns in Gärten häufig gezogen. *I. pseudacorus* hingegen wächst in Deutschland wild und unterscheidet sich von jenen durch gelbe Blüten.

Off. *Crocus sativus*, der Safran (Abb. 291), ist in den Mittelmeerländern verbreitet. Von dieser Pflanze dient die dreispaltige Narbe der Griffel unter dem Namen *Crocus* oder Safran zu pharmazeutischen und anderweitigem technischen Gebrauch.

*Gladiolus communis*, Allermannsharnisch, in Deutschland sehr selten wild, häufiger in Südeuropa vorkommend, ist die Stammpflanze des *Bulbus Victoralis*. Mehrere andere *G.*-Arten werden als Zierpflanzen in Gärten kultiviert.

8. Reihe. **Scitamineae**, Gewürzlilien.

Blüten epigyn, stark zygomorph oder asymmetrisch,  
Androeceum reduziert, meist teilweise blumenkron-



Abb. 292. Gruppe der Banane, *Musa sapientum*, an der Loangküste. (Nach Pechuel-Lösche.)

artig (petaloid) ausgebildet, Fruchtknoten meist dreifächerig, Samen mit Perisperm und Endosperm, Samen-

schale von einem Arillus umhüllt. — Meist durch Rhizome perennierende Kräuter mit fiedernervigen Blättern und ansehnlichen, auf Insektenbestäubung angewiesenen Blüten. Ölzellen in allen Teilen der Pflanzen.

### Musaceae.

Familie der Bananengewächse.

Die Blüten besitzen zwei Kreise von Blütenhüllblättern, meist nur 5 fruchtbare Staubblätter und Beeren- oder Kapsel Frucht. — Auffallende „Krautbäume“ der Tropengebiete mit einer schönen Krone riesiger, ungeteilter Blätter und einem aus den Blattcheiden gebildeten Scheinstamm, der erst beim Auftreten des Blütenstandes von einem echten, dünnen Stammgebilde im Zentrum durchwachsen wird.

*Musa sapientum* (siehe Abb. 292 auf S. 272) und *M. paradisiaca*, Banane, Plantain, Pisang, werden wegen der eßbaren, zucker- oder mehlfreichen Früchte überall in den Tropen kultiviert, bei uns auch vielfach als dekorative Pflanzen den Sommer über im Freien aufgestellt. Bei den Kulturbananen bilden sich keine Samen mehr aus.

### Zingiberaceae.

Familie der Ingwergewächse.

Die Blüten der Ingwergewächse besitzen nur ein einziges Staubblatt, und alle Gewächse dieser Familie gehören daher der I. Klasse nach Linné an. Alle übrigen Staubgefäße sind verkümmert, die




Abb. 293. Grundriß einer Zingiberaceenblüte: *d* das Deckblatt, *v* das seitliche Vorblatt, *fl* die verkümmerten beiden hinteren Staubgefäße des äußeren Kreises, *lab* die zu einem lappigen Blattorgan umgebildeten zwei vorderen Staubgefäße des inneren Kreises.



Abb. 294. *Zingiber officinale*.  
Sehr stark verkleinert.

drei des äußeren Kreises zuweilen zu einem lappigen Blattorgan mit größerem Mittellappen umgebildet. Nur das schuppenförmige Vorblatt der Blüte (s. Abb. 293, *v*) beeinträchtigt durch seine seitliche Stellung den sonst symmetrischen Blütenbau. — Die drei vollkommen

ausgebildeten Fruchtblätter bilden einen unterständigen dreifächerigen Fruchtknoten mit vollständigen Scheidewänden. Die Frucht ist eine



Abb. 295. *Eleotaria cardamomum*. Blatt, Blütenstand, Blütenverhältnisse, Frucht und Samen. (Nach Luerßen, mit Benutzung von Berg und Schmidt.)

fachspaltige Kapsel oder eine Beere. Die Ingwergewächse sind mit Rhizomen versehene, ausdauernde Gewächse, welche ausschließlich

in den Tropen gedeihen. Sie enthalten meist reichlich ätherisches Öl in Ölzellen.

Off. *Zingiber officinale*, Ingwer (Abb. 294), ist in Ostindien heimisch und liefert Rhiz. *Zingiberis*.

Off. *Elettaria cardamomum* (Abb. 295), sowie andere E.-Arten liefern Fruct. *Cardamomi*. Vaterland gleichfalls Ostindien.

Off. *Alpinia officinarum*, in Südostasien heimisch, liefert Rhiz. *Galangae*.

Off. *Curcuma longa*, Gelbwurz, liefert Rhiz. *Curcumae*; und *C. zedoaria*, Zittwer, Rhiz. *Zedoariae*. Die Heimat beider ist Ostindien.

### Cannaceae.

Familie der Cannagewächse.

Diese Familie zeichnet sich dadurch aus, daß fünf ihrer Staubgefäße in blumenblattartige Organe umgewandelt sind und nur eins, nämlich das der Achse zugekehrte (hintere) Staubblatt des inneren Kreises eine halbe Anthere trägt (Abb. 296 *st*), wodurch die Blüte unsymmetrisch wird. Die Gewächse dieser Familie gehören also, wie die Zingiberaceae, der I. Klasse 1. Ordnung nach Linné an. Die Fruchtfächer sind mehrsamig und der Keim der Samen gerade.

*Canna indica*, das indische Blumenrohr (Abb. 296), ist eine bei uns sehr beliebte, aus Indien stammende Zierpflanze.

### Marantaceae.

Familie der Marantagewächse.

Diese Familie ist in ihren äußeren Merkmalen den Cannaceen ganz ähnlich; die Blüten sind ebenfalls unsymmetrisch, und nur das hintere Staubblatt des inneren Kreises trägt eine halbe Anthere. Jedoch sind die Fruchtfächer nur ein- bis dreisamig und der Keim der Samen gekrümmt.

*Maranta arundinacea*, die Pfeilwurz, liefert neben anderen Arten dieser und der vorhergehenden Familie das Westindische *Amylum Marantae* (Arrowroot), d. i. das in den Rhizomen enthaltene Stärkemehl, zu pharmazeutischem und diätetischem Gebrauch.

### 9. Reihe. Microspermae. Kleinsamige.

Blüten epigyn, meist zwittrig, zygomorph; Perigon corollinisch; das Androeceum auf zwei oder nur ein Glied reduziert, meist aus nur einem mit Anthere versehenem Staubgefäß bestehend, mit dem Griffel zu einer Säule verwachsen; Fruchtknoten drei- oder oft einfächerig; Frucht meist eine Kapsel; Samen äußerst zahlreich und sehr klein.



Abb. 296. Blüte von *Canna indica* (natürl. Größe), *f* der unterständige Fruchtknoten, *pa* äußere, *pi* innere Blütenhülle, *g* Griffel, *st* das fertile Staubblatt mit der halben Anthere *an*, *l* Labelium, *α* und *β* die beiden anderen Staminodien. (Nach Natürl. Pflanzenfamilien.)

**Orchidaceae.**

## Familie der Orchisgewächse.

Die ausnahmslos unregelmäßigen, aber symmetrischen Blüten der Orchisgewächse sind durch Drehung um 180°, welche am Fruchtknoten deutlich erkennbar ist, derartig an der Achse eingefügt, daß der eigentlich obere Teil zum unteren geworden ist und umgekehrt (Resupination, Abb. 298, *B, g*). Von den Perigonblättern ist das eine, Labellum genannt (Abb. 298, *A, l*), stets größer und anders geformt, als die übrigen, häufig auch mit einem Sporn versehen. Von den Staubgefäßen ist gewöhnlich nur eins des äußeren Kreises




Abb. 297. Grundriß zweier Orchideenblüten: *A* mit einem, *B* mit zwei Staubgefäßen.

Abb. 298. *A* Blüte von *Orchis mascula*: *st* Stengel, *s* Deckblatt, *g* gedrehter Fruchtknoten, *p* obere Perigonzipfel, *l* das Labellum, *v* der Sporn, *a* Narbenfleck, *b* Anthere; *B* 1 Gynaeceum und Androeceum derselben Blüte vergrößert; *g* der gedrehte Fruchtknoten, *b* die beiden Antherenfächer, *c* Konnektiv, *e* die beiden verkümmerten Antheren; 2 die Griffelsäule von hinten, *c* die verkümmerten Antheren.

ausgebildet (Abb. 297, *A*), seltener (z. B. bei *Cypripedium*) zwei des inneren Kreises (Abb. 297, *B*); die übrigen fehlen oder sind verkümmert. Der Fruchtknoten ist unterständig. Die Staubgefäße sind mit dem Griffel zu einer Säule (Gynostemium genannt) verwachsen (Abb. 298 *B, 299*). Die Pollenkörner sind meist zu zwei gestielten keulenförmigen Pollenmassen verklebt (Abb. 298 *B, b*), welche am Rüssel der die Befruchtung ausführenden Insekten vermittelt der am Fuße ihres Stieles vorhandenen Klebdrüsen haften bleiben. Die Orchideen bilden Linnés XX. Klasse (Gynandria). Die Blütenformel ist  $P3 + 3A1 + 0$  oder  $0 + 2G_{(3)}$  (Abb. 297). Die Frucht ist eine Kapsel, selten eine Beere.

Die einheimischen Orchideen besitzen meistens Knollen oder Rhizome und wachsen in Wäldern oder auf feuchten Wiesen. Sehr reich an Orchideen sind die Tropenländer, wo diese Gewächse meist




Abb. 299. Der Narbe (a) des Fruchtknotens (g) aufgewachsene Anthere (b) einer *Orchis*. — p verklebter Pollen, m Klebdrüsen, c Konnektiv, r das sogen. Schnäbelehen, l verkümmerte Antheren.



Abb. 300. *Orchis mascula*.

als Epiphyten auf Bäumen gedeihen und sogen. Luftwurzeln treiben. Die Samen der epiphytischen Orchidaceen entwickeln sich nur in Boden, der gewisse Mycorrhizen enthält.



Abb. 301. *Orchis morio*.



Abb. 302. *Platanthera bifolia*.

Off. *Orchis mascula* (Abb. 300), *O. morio* (Abb. 301), *O. militaris*, *O. ustulata*, *Anacamptis pyramidalis*, *Gymnadenia conopsea* und *Platanthera bifolia* (Abb. 302), sämtlich bei uns einheimisch, liefern Tubera Salep, d. s. die Wurzelknollen dieser Pflanzen.

*Cephalanthera pallens* und *C. ensifolia*, sowie *Epipactis latifolia*, *Listera ovata*, *Neottia nidus avis* und *Cypripedium calceolus* gehören zu den in Deutschland meist zerstreut vorkommenden Orchidaceen.



Abb. 303. Die blühende Vanillepflanze (*Vanilla planifolia*). *A* Säule und Lippe, *B* Säule von der Seite, *C* Säulenspitze von vorn gesehen, *D* Anthere, *E* Samen. (Nach Berg u. Schmidt.)

Off. *Vanilla planifolia* (Abb. 303) ist in Mexiko einheimisch und die jetzt in den Tropen vielfach kultivierte Stammpflanze der Fruct. *Vanillae*.

Als Zierpflanzen werden zahlreiche tropische Orchidaceen mit herrlichen Blüten in Gewächshäusern gezogen, z. B. Arten der Gattungen *Epidendrum*, *Catasetum*, *Dendrobium*, *Oncidium*, *Paphiopedilum* u. v. a. m.

## 2. Klasse. Dicotyledoneae. Zweikeimblättrige Gewächse.

Die zweikeimblättrigen Gewächse, welche sich von den eikeimblättrigen nicht nur durch die Anzahl der Keimblätter, sondern auch, wie oben bereits erwähnt, durch verzweigt-nervige Blätter, meist fünfzählige Blüten und durch ringförmige Anordnung der offenen Leitbündel im Stamme auszeichnen (vgl. S. 252), lassen sich in folgender Weise klassifizieren:

- A. Mit fehlenden oder getrennten Blumenkronblättern Archichlamydeae.
- B. Mit Blumenkronblättern, welche zu einer röhren- oder glockenförmigen, nur am Rande geteilten Hülle verwachsen sind . . . . . Metachlamydeae.

Beide Abteilungen zerfallen in Reihen, von denen jede eine gewisse Anzahl von Familien in sich schließt.

### 1. Unterklasse. Archichlamydeae.

#### (Apetalae und Choripetalae.)

Blütenhülle auf niederer Stufe, d. h. (vergl. S. 251 u. 252) 1. entweder ganz fehlend (achlamydeisch), oder 2. einfach (haplochlamydeisch), oder 3. doppelt (diplochlamydeisch), in letzterem Falle beide Kreise gleichartig (homoiochlamydeisch) oder ungleichartig (in Kelch und Blumenkrone differenziert, heterochlamydeisch). Bisweilen können die Blumenblätter durch Rückbildung (Reduktion) verloren gehen (apopetale Blüten). Die Blumenblätter allermeist nicht miteinander verwachsen.

#### 1. Reihe. Piperales. Pfefferartige.

Blüten nackt oder selten mit einfacher Blütenhülle. Staubblätter in der Zahl sehr wechselnd, 1—10. Fruchtblätter 1—4, frei oder verwachsen. Blüten sehr klein, in Ähren.

### Piperaceae.

#### Familie der Pfeffergewächse.

Die Pfeffergewächse sind zumeist Klettersträucher, welche nur in den Tropen gedeihen. Ihre Blüten sind hermaphroditisch oder eingeschlechtig und stehen in dichten Ähren. Jede Blüte ist nur von einem Deckblatt gestützt und entbehrt jeglicher Blütenhülle. Die männlichen bestehen aus je zwei oder mehr Staubgefäßen, die weiblichen aus je einem unbehüllten, eine geradläufige Samenanlage einschließenden Fruchtknoten; bei hermaphroditischen Blüten (Abb.

304, *a*) liegen die Verhältnisse entsprechend. Die Frucht ist eine steinfruchtartige Beere. Die Samen besitzen Perisperm und Endosperm und einen winzigen Embryo. In allen Teilen der Pflanzen finden sich Zellen mit ätherischem Öl.

*Piper nigrum*, der schwarze Pfeffer (Abb. 304), im indisch-malayischen Gebiet einheimisch, liefert die Drogen *Fructus Piperis albi* (reife Früchte) und *Fructus Piperis nigri* (unreife Früchte).




Abb. 304. *Piper nigrum*: *a* Stück einer Ähre mit Zwitterblüten, stark vergrößert; *b* Zweig mit Früchten.

Off. *Piper cubeba* (auch *Cubeba officinalis* genannt), der Stielpfeffer, aus dem indisch-malayischen Gebiet stammend, ist die Stammpflanze der *Fructus Cubebae*.

*Piper longum* liefert *Fructus Piperis longi*, *P. betle* den Betelpfeffer.

## 2. Reihe. **Salicales.** Weidenartige.

Blüten nackt, diöcisch, mit seitlichem oder becherförmigem Diskus. Staubblätter 2 — ∞. Der Fruchtknoten ist einfächerig und wird aus zwei Fruchtblättern zusammengesetzt. Samenanlagen zahlreich. Kapsel mit zahlreichen Samen; diese winzig, mit basalem Haarschopf. Die männlichen und weiblichen Blüten stehen in Kätzchen.

## **Salicaceae.**

Familie der Weidengewächse.

Die getrenntgeschlechtigen Blüten dieser Familie stehen stets auf verschiedenen Bäumen, resp. Sträuchern; sie sind diöcisch. Die männlichen Blüten bestehen aus je 2—5 oder zahlreichen Staubgefäßen

(Abb. 305, *A*), die weiblichen aus einem Fruchtknoten (Abb. 305, *B*). Die Weidengewächse sind Bäume und Sträucher unseres Klimas.

*Salix fragilis*, die Bruchweide, *S. alba*, die gemeine Weide, *S. pentandra*, die Lorbeerweide u. a., sind bei uns häufig und liefern *Cortex Salicis*; aus *S. viminalis*, der Korbweide, werden die Weidengeflechte angefertigt. — Die Weiden, die neben den Staubblättern je einen seitlichen, Honig abscheidenden Diskus tragen, werden durch Insekten bestäubt.




Abb. 305. *A* männliche, *B* weibliche Blüte der Weide, *Salix*; *d* Kätzchenschuppen, *h* Honigdrüse, *a* Staubblätter, *f* Fruchtknoten, *n* Narben (vergr.); *C* aufspringende Frucht der Pappel; *s* Samen, *p* Discus. (Nach Prantl Pax.)

*Populus alba*, die Silberpappel und *P. nigra*, die Schwarzpappel, desgl. *P. tremula*, die Espe oder Zitterpappel, sind unsere Pappelbäume, deren junge Blattknospen früher als *Gemmae Populi* medizinisch angewendet wurden. Neuerdings wird die sehr raschwüchsige *P. canadensis* viel angepflanzt und verwildert massenhaft. — Bei den Pappeln erfolgt die Bestäubung durch den Wind.

### 3. Reihe. Juglandales. Walnußartige.

Blüten nackt oder selten mit einfacher Blütenhülle, getrenntgeschlechtig, monöisch. Staubblätter 3 —  $\infty$ . Fruchtknoten einfächerig, aus zwei Fruchtblättern gebildet, eine geradläufige Samenanlage einschließend. Blüten in Kätzchen.

#### Juglandaceae.

Familie der Nußbaumgewächse.

Die männlichen Blüten stehen in langen Kätzchen (Abb. 306) und besitzen 4 oder mehr Staubgefäße mit unscheinbarer Blütenhülle. Die weiblichen Blüten stehen zu wenigen beisammen (Abb. 306). Die Nußbaumgewächse sind sämtlich Bäume mit gefiederten Laubblättern.

Off. *Juglans regia*, der Walnußbaum (Abb. 306), ist im Balkan und im Himalaya einheimisch, bei uns vielfach kultiviert und liefert außer den essbaren Walnüssen und dem sehr wertvollen Holz die Droge *Fol. Juglandis* und die medizinisch nur wenig mehr gebräuchliche Droge *Cortex nucum Juglandis*.

### 4. Reihe. Fagales. Buchenartige.

Blüten epigyn, eingeschlechtig, mit scheinbar einfachem, in Wirklichkeit doppeltem, unscheinbarem Perigon; männliche Blüten in Kätzchen, die weiblichen




Abb. 306. *Juglans regia*. A blühender Zweig, B Stück eines männlichen Kätzchens, C männliche Blüte von oben gesehen, D Anthere von hinten, E von vorne gesehen, F weibliche Blüte, G Frucht nach Entfernung der oberen weichen Fruchtwandung, H Frucht und Samen im Querschnitt.




Abb. 307. *Corylus avellana*: A blühender Zweig, B männliche Blüte mit Deckschuppe von oben, C dieselbe nach Wegnahme der Antheren, F weibliche Blütengruppe von innen, b Deckschuppe. (Nach Eichler.)



Abb. 308. Fruchtstand der Erle, *Alnus glutinosa*.

in verschiedenartigen Infloreszenzen. Zahl der Staubblätter schwankend, häufig vor den Blütenhüllblättern stehend, Gynaeceum zwei- bis sechsgliedrig, Samen ohne Endosperm. Sämtlich Holzgewächse.

### Betulaceae.

Familie der Birkengewächse.

Der unterständige Fruchtknoten besteht aus zwei verwachsenen Fruchtblättern, ist meist zweifächerig und besitzt zwei Griffel. Die Samenanlagen besitzen stets nur ein Integument. Die Frucht ist eine Schließfrucht mit einem Samen ohne Nährgewebe.

*Carpinus betulus* ist die Hain- oder Weißbuche, ein in Mitteleuropa stellenweise Bestände bildender Waldbaum.

*Corylus avellana*, die Haselnuß (Abb. 307), ist ein in Mitteleuropa überall an Wegen und Waldändern verbreiteter, auch viel kultivierter Strauch.

*Betula verrucosa* und *B. pubescens* sind die in Mitteleuropa verbreiteten Birken. Erstere wächst vorzugsweise auf Sand, letztere mehr auf Moorboden und geht bis zum 71° n. B. nach Norden. Sie gehören stellenweise auch in den Hochgebirgen zu den am höchsten aufsteigenden Holzgewächsen.

*Alnus glutinosa* (Abb. 308) und *A. incana* sind die in Deutschland vorkommenden, typische Bestände der Waldmoore bildenden Erlen.

### Fagaceae.

Familie der Buchengewächse.

Der unterständige Fruchtknoten ist dreifächerig mit je zwei hängenden Samenanlagen; diese besitzen stets zwei Integumente. Fruchtknoten und Frucht einzeln oder gruppenweise von einer becherförmigen Achsenwucherung, dem sogen. Fruchtbecher (Cupula)




Abb. 309. *Quercus robur*. A männliche Blüte von oben gesehen, B weibliche Blüte mit Deckblatt (D) von der Seite gesehen, C weibliche Blüte im Längsschnitt, P Perigon, Cu Kupula.

umgeben. Frucht eine Schließfrucht mit einem Samen ohne Nährgewebe.

*Fagus sylvatica*, die Rotbuche, ist einer der bekanntesten und schönsten europäischen Waldbäume, welcher bis zum 60° nach Norden geht.

*Castanea vulgaris*, die echte oder Edelkastanie, bildet in Südeuropa Wälder, gedeiht auch noch gut in Süd-Deutschland. Sie liefert die Kastanien oder Maronen.

Off. *Quercus sessiliflora*, die Winterliche, und *Qu. pedunculata*, die Sommerliche (Abb. 309, 310, 311), sind die Eichbäume der deutschen Wälder

und liefern Cortex Quercus. (Linné faßte beide Arten mit Recht unter dem Namen *Qu. robur* zusammen.) *Qu. suber*, die Korkeiche, ist in den feuchten Teilen des westlichen Mittelmeergebiets einheimisch und liefert den Flaschenkork.

Auf den jungen Trieben von *Qu. infectoria* (auch *Qu. lusitana* var. *infectoria* genannt) entstehen im östlichen Mittelmeergebiet durch den Stich einer Gallwespe die Gallae (aleppicae).




Abb. 310. Frucht von *Quercus pedunculata*: c Cupula, f die Eichel.

#### 5. Reihe. **Urticales.** Nesselartige.

Blüten hypogyn, oft eingeschlechtig, klein, mit meist doppeltem, aber scheinbareinfachem, kelchartigem Perigon. Staubgefäße den Perigonblättern gleichzählig, vor ihnen stehend. Gynaeceum aus einem oder selten zwei Karpellen be-



Abb. 311. *Quercus pedunculata*. Blühender Zweig.

stehend, in letzterem Falle das eine verkümmert. Fruchtknoten einfächerig, mit einer Samenanlage. Kräuter und Holzgewächse mit dichten, meist trugdoldigen Blütenständen.

### **Ulmaceae.**

Familie der Ulmengewächse.

Bäume mit zwittrigen oder durch Fehlschlagen eingeschlechtigten Blüten mit meist 4—5 Perigonblättern und in der Knospelage ge-

raden Staubgefäßen. Der Fruchtknoten besteht aus zwei Fruchtblättern, ist aber einfächerig, mit einer hängenden anatropen Samenanlage. Die Frucht ist eine geflügelte Nuß oder eine Steinfrucht. In den Blättern finden sich Cystolithen.




Abb. 312. *Ulmus campestris*, Feldrüster. *A* blühender Zweig mit drei Laubknospen oberhalb der Blütenstände; *B* eine 5-männige Blüte ohne Fruchtknoten; *C* eine 8-männige Blüte; *D* Antheren von vorn, von hinten und im Querschnitt; *E* Längsschnitt durch eine Blüte; *F* ein Fruchtbüschel; *G* eine Frucht, geöffnet; *H* Keimling in beiden Seitenansichten. (Nach Engler.)

*Ulmus campestris*, die Feld-Ulme oder Rüster (Abb. 312), und *U. effusa* sind einzeln vorkommende Laubholzbäume und beliebte Alleebäume unseres Klimas und die Stammpflanzen von *Cortex Ulmi interior*.

### Moraceae.

#### Familie der Maulbeergewächse.

Bäume oder Sträucher, seltener Kräuter, mit oft fleischig werdender Blütenhülle und getrenntgeschlechtigen Blüten. Perigonblätter meist vier; Staubblätter ebensoviel und vor den Perigonblättern (Abb. 313, *A*). Der Fruchtknoten ist aus zwei Fruchtblättern gebildet, einfächerig und enthält eine hängende, meist umgewendete Samenanlage. Frucht eine Nuß oder eine Steinfrucht. Blüten klein, in trugdoldigen Blütenständen, welche oft Köpfchen oder Ähren bilden und infolge von Wachstumsvorgängen der Blütenstandsachse zu Scheiben oder Bechern werden. — In allen Teilen der Pflanzen kommen Milchsaftschläuche vor; auch sind Cystolithen häufig.




Abb. 313. *Morus nigra*: *A* männliche Blüte, *B* fleischig gewordener Fruchtstand.

**Morus alba** u. **M. nigra** sind die durch ihre eßbaren Fruchtstände (Abb. 313, *B*) bekannten Maulbeerbäume. Die Blätter der *M. alba* bilden die Hauptnahrung der Seidenraupen.

**Ficus carica**, der Feigenbaum (Abb. 315), ist in den Mittelmeerländern heimisch und liefert Caricae. Viele andere Arten dieser in den Tropen ungeheuer reich entwickelten Gattung liefern Kautschuk, z. B. *F. elastica* aus




Abb. 314. *Artocarpus incisa*, der Brotfruchtbaum. *A* Zweig mit männlichen und weiblichen Blütenständen. *B* männliche Blüte. *C* weibliche Blüte im Längsschnitt. *D* Samen im Längsschnitt.

dem indisch-malayischen Gebiete. Die Feige ist ein fleischig gewordener Fruchtstand, und die im Inneren enthaltenen „Körner“ sind die Früchte, jedes ein einsamiges Nüßchen darstellend.

**Artocarpus integrifolia**, der Jackbaum, und *A. incisa*, der Brotfruchtbaum (Abb. 314), beide dem indisch-malayischen Gebiete entstammend, sind wichtige Nährpflanzen der Tropen.

**Castilloa elastica**, in Zentralamerika heimisch, liefert Kautschuk.

*Cannabis sativa*, der Hanf (Abb. 316), ist in Persien und Indien einheimisch und gedeiht zwar ebenfalls bei uns, liefert aber dann keine narkotische Droge, dafür aber die wichtige Hanffaser. Er ist die Stammpflanze von Fruet.




Abb. 315. *Fiens carica*. *A* Fruchtstand im Längsschnitt ( $\frac{1}{1}$ ). *B* einzelne männliche Blüte im Längsschnitt ( $\frac{2}{1}$ ). *C* weibliche Blüte im Längsschnitt ( $\frac{15}{1}$ ). *D* steriler Samen aus einer sog. Gallenblüte ( $\frac{8}{1}$ ). *E* fertiler Samen, längs durchschnitten. ( $\frac{10}{1}$ ).




Abb. 316. *Cannabis sativa*. *A* Blütenstand der männlichen Pflanze ( $\frac{2}{1}$ ); *B* männliche Blüte ( $\frac{4}{1}$ ); *C* blühender Zweig der weiblichen Pflanze ( $\frac{1}{2}$ ); *D* weibliche Einzelblüte ganz, *E* dieselbe längsdurchschnitten ( $\frac{2}{1}$ ); *F* Frucht ( $\frac{3}{1}$ ); *G* Längsschnitt, *H* Querschnitt derselben ( $\frac{1}{1}$  u.  $\frac{2}{1}$ ).

Cannabis und von Herb. Cannabis Indic. (Haschisch), sowie dementsprechend von Extract. Cannabis Ind.

**Humulus lupulus**, der Hopfen (Abb. 317), dient zur Bierbereitung und liefert Glandul. Lupuli. Den Fruchtstand des Hopfens nennt man einen Strobilus (Abb. 317, c).

### Urticaceae.

Familie der Nesselgewächse.

Kräuter, seltener Sträucher mit meistens getrenntgeschlechtigen, selten hermaphroditischen, winzigen Blüten. Blütenhüllblätter 4–5, Staubblätter ebensoviel und vor den Perigonblättern. Der Frucht-



Abb. 317. *Humulus lupulus*: a männliche Blüte, b zwei weibliche Blüten, c Fruchtstand.

knoten ist stets einfächerig und enthält eine grundständige, geradläufige Samenanlage. Frucht eine Nuß oder eine Steinfrucht. — Milchsaft fehlt. Charakteristisch sind die langen Bastfasern und die in den Blättern vorkommenden Cystolithen.

*Urtica urens*, einjährig, und *U. dioica*, ausdauernd, sind die als Unkräuter bekannten Brennnesseln. Sie liefern sehr schöne Gespinnstfasern.

*Boehmeria nivea*, einheimisch in Ost-Indien, gibt hervorragend schöne Gespinnstfasern, welche als Ramie bekannt sind.

### 6. Reihe. Santalales. Santelbaumartige.

Blüten aktinomorph mit meist einfacher Blütenhülle, die Staubblätter vor den Blütenhüllblättern, der unterständige Fruchtknoten meist aus 2–3 Fruchtblättern zusammengesetzt, zu jedem Fruchtblatt meist nur eine unbehüllte, d. h. integumentlose Samenanlage gehörig.

### Santalaceae.

Familie der Santelholzgewächse.

Diese sind belaubte, halbschmarotzende Bodenpflanzen, vorwiegend der tropischen Zone mit regelmäßigen (aktinomorphen) zwittrigen Blüten und einfächerigem Fruchtknoten.

*Santalum album*, der Santelholzbaum oder Sandelholzbaum, ein Baum Ostindiens, ist die Stammpflanze des Lignum Santali album und des Oleum Santali. *Thesium* kommt mit einigen Arten in Mitteleuropa vor. Es sind dies niedrige chlorophyllführende Wurzelschmarotzer.

### Loranthaceae.

#### Familie der Mistelgewächse.

Auf Baumästen schmarotzende, belaubte Sträucher vorwiegend der tropischen Flora, mit aktinomorphen Blüten und einfachem, entweder corollinischem oder kelchartigem, vier- bis sechszähligen Perigon.

*Loranthus europaeus*, Riemenstrauch, kommt auf Eichen und Kastanien schmarotzend im Mittelmeergebiet und noch in Süddeutschland vor.

*Viscum album*, Weiße Mistel, schmarotzt, mit besonderen Rassen auf den verschiedenen Wirtspflanzen, auf sehr vielen Baumarten (Apfel, Birne, Kiefer, Fichte,




Abb. 318. *Aristolochia clematitis*. Ein Stenzelstück *st* mit Blattstiel *b*, in dessen Achsel nebeneinander verschiedene alte Blüten stehen: *1* eine junge, noch unbefruchtete, *2* zwei befruchtete, abwärts gewendete Blüten; *k* kesselförmige Erweiterung der Blumenröhre *r*; *f* der unterständige Fruchtknoten. Natürliche Größe. (Nach Sachs.)




Abb. 319. *Aristolochia clematitis*. *A* die proterogynische Blüte vor und *B* nach der Bestäubung im Längsschnitt, vergr. (Nach Sachs.)

Pappel, Linde) als kleiner, immergrüner Strauch, auffällig durch seine gabelige Verzweigung. Die Pflanze treibt zwischen Rinde und Holz ihres Nährastes einen aus wurzelartigen Strängen bestehenden, holzigen Saugapparat. Die Verbreitung des Schmarotzers geschieht durch Vögel, welche die weißen, klebrigen Beeren verzehren und die Samen unverdaut wieder abgeben. Die ganze Pflanze war als *Stipites Visci* früher medizinisch gebräuchlich.

7. Reihe. **Aristolochiales.** Osterluzeiartige.

Blüten mit einfacher, corollinischer Blütenhülle, strahlig oder zygomorph. Fruchtknoten meist unterständig, drei- bis sechsfächerig mit zentralwinkelständiger Placenta, oder einfächerig mit wandständiger Placenta, und stets zahlreichen Samenanlagen.

**Aristolochiaceae.**

## Familie der Osterluzeigewächse.

Die Osterluzeigewächse sind Kräuter oder Klettersträucher mit herz- oder niereenförmigen Blättern, einfacher blumenkronartiger, verwachsenblättriger Blütenhülle und mit 6 oder 12, oft mit dem Griffel verwachsenen Staubgefäßen (Gynostemium). Der Fruchtknoten ist unterständig, vier- bis sechsfächerig, die Frucht kapselartig. — Meist tropisch, nur wenige Arten gehören unserem Klima an.

*Aristolochia elematitis*, Osterluzei (Abb. 318, 319), eine stattliche Staude mit gelblichem, zygomorphem Perigon und Gynostemium, lieferte früher Rad. et Herb. Aristolochiae. *A. serpentaria*, in Nordamerika heimisch, ist die Stammpflanze des Rhiz. oder Rad. Serpentariae. *A. siphon*, der Pfeifenstrauch, ebenfalls aus Nordamerika stammend, wird bei uns als Schlinggewächs an Lauben häufig angebaut und zeichnet sich durch sehr große Blätter und eigentümliche, pfeifenartige Blüten aus.

*Asarum europaeum*, Haselwurz, eine niedrige Pflanze mit niereenförmigen Blättern und ganz versteckten grünbräunlichen Blüten, in Gebüsch und Laubwäldern vorkommend, ist die Stammpflanze des Rhizoma oder Rad. Asari.

8. Reihe. **Polygonales.** Knöterichartige.

Blüten mit einfacher oder doppelter Blütenhülle. Fruchtknoten oberständig, einfächerig mit einer aufrechten Samenanlage. Blätter gewöhnlich mit der sogen. Ochrea versehen.

**Polygonaceae.**

## Familie der Knöterichgewächse.

Die in Rispen oder Ähren angeordneten Blüten der Knöterichgewächse sind meist zwittrig und besitzen eine ursprünglich dreizählige unscheinbare Blütenhülle, welche jedoch bei manchen Gattungen in den zweizähligen Typus übergeht. Die ebenfalls ursprünglich in der Dreizahl angeordneten Staubgefäße sind im äußeren Kreise zuweilen verdoppelt (z. B. bei Rheum, Abb. 320). Die Blütenformel ist  $P_4 - 6A_4 - 9G^{(2)-(2)}$ . Im Grunde des Fruchtknotens steht eine einzige gerade Samenanlage (Abb. 321). Die Frucht ist eine nußartige, scharfkantige Hautfrucht. Die wechselständig angeordneten Laubblätter sind mit je einer großen Nebenblatt-Tute (Ochrea) versehen. In der Knospenlage sind die Blattränder stets nach außen umgerollt.



Abb. 320. Grundriß der Rhabarberblüte.




Abb. 321. Blüte von Polygonum; *g* die Samenanlage, *p* Perigon, *f* Staubgefäße.



Abb. 322. Polygonum bistorta.



Abb. 323. Rheum officinale, ganze Pflanze, Einzelblüten und Frucht: *n* Fruchtknoten von Staubgefäßen und Perigon befreit, *d* Honigwulst.

**Polygonum bistorta** (Abb. 322), der Natternknöterich, auf Bergwiesen häufig, liefert Rhiz. Bistortae, **P. aviculare**, Vogelknöterich, ein gemeines Unkraut, den Homeriana-Tee.

**Fagopyrum esculentum** (= *Polygonum fagopyrum*), der Buchweizen, aus Ostasien stammend, ist eine in Sandgegenden angebaute Mehlf Frucht.

**Rumex acetosa** und **R. acetosella**, Sauerampfer, und eine große Anzahl anderer, nicht sauer schmeckender Arten der Gattung *Rumex* sind in unserem Klima überaus verbreitete Vertreter dieser Familie.

Off. **Rheum palmatum** und **Rh. officinale** (Abb. 323), vielleicht auch andere in China einheimische *Rh.*-Arten liefern Rhiz. Rhei; **Rh. rhaponticum** liefert den obsolet gewordenen pontischen Rhabarber, Rad. Rhapontici. Die Blütenformel von Rheum ist  $P_3 + 3A_3^{\overline{3}} + 3G^{\overline{(3)}}$  (Abb. 320).

#### 9. Reihe. **Centrospermae.** Gekrümmtsamige.

Blüten zwittrig, meist hypogyn, fünfzählig, mit einfacher oder doppelter Blütenhülle, meist mit kelchartigem Perigon oder mit Kelch und Korolle. Das Androeceum ist haplo- oder diplostemon, der Fruchtknoten meist einfächerig, mit einer basalen Samenanlage oder mehreren, an freier zentraler Placenta sitzenden, campylotropen Samenanlagen. Die Samen sind perispermhaltig, mit gekrümmtem Keim. Vorwiegend krautige Gewächse mit einfachen, nebenblattlosen Blättern.

#### **Chenopodiaceae.**

Familie der Gänsefußgewächse.

Die Chenopodiaceen besitzen Blüten mit doppeltem, nur scheinbar einfachem, kelchartigem, krautigem Perigon und sind zuweilen eingeschlechtig. Das Androeceum ist haplostemon und epitepal. Der einfächerige Fruchtknoten besteht aus zwei bis fünf Fruchtblättern mit einer Samenanlage und entwickelt sich zu einer nussartigen Frucht. Vorwiegend Kräuter mit zerstreuten, häufig fleischigen Blättern und dichten, kleinblütigen Infloreszenzen.

**Chenopodium**-Arten, Gänsefuß, sind bei uns überaus häufige Unkräuter. *Ch. botrys* war früher als Herb. Botryos, *Ch. bonus henricus* als Herb. Boni Henrici, *Ch. ambrosioides* als Herb. Chenopodii mexicanum arzneilich gebräuchlich.

**Beta vulgaris**, die Rübe oder Mangold, heimisch an den Küsten des Mittelmeers, ist in vielen Varietäten, als Runkelrübe, Zuckerrübe, weiße Rübe, rote Rübe etc. für Garten, Landwirtschaft und Zuckerfabrikation von großer Bedeutung.

**Spinacia oleracea**, der Spinat, ist eine verbreitete Gemüsepflanze. Verschiedene **Atriplex**-Arten, Melde, sind gemeine Unkräuter.

#### **Caryophyllaceae.**

Familie der Nelkengewächse.

Die Blüten der Nelkengewächse sind regelmäßig (aktinomorph) und die Glieder sämtlicher Kreise meist in der Fünfzahl vorhanden. Die typische Blütenformel ist daher  $K_5 C_5 A_5 + 5 G^{\overline{(5)}}$  (Abb. 324).

Allen Nelkengewächsen gemeinsam ist der einfächerige Fruchtknoten, in welchem an einer Mittelsäule die meist zahlreichen Samenanlagen eingefügt sind (Abb. 326). Die Frucht ist eine Kapsel, welche teils fach-, teils wandspaltig, teils auch nur mit Zähnen an der Spitze aufspringt. Bemerkenswert sind die in dieser Familie vorkommenden, sogenannten genagelten Blumenblätter (z. B. bei *Saponaria*, Abb. 326). Dieselben sind oft dort, wo der Nagel in die Blattspreite übergeht,




Abb. 324. 1 Grundriß der Caryophyllaceenblüte; *k* Kelch, *b* Krone, *s* Staubblätter, *n* Honigdrüsen, *f* Fruchtknoten, *e* Samenanlagen; 2 ein Staubblatt nebst Honigdrüsen.



Abb. 325. *Silene nutans*.

mit einem häutchenförmigen Anhängsel (einer Art Ligula, Abb. 326) versehen. Die Blütenstände sind durchweg cymös; die häufigste Form ist das Dichasium; an der Spitze der Triebe gehen die Dichasien häufig in Wickel über.

Man unterscheidet zwei Unterfamilien.

#### a) Alsinoideae:

Kelchblätter frei. Staubblätter meist perigynisch. Griffel frei oder verwachsen.

*Alsine verna*, Miere, ist eine kleine, rasenartige Frühlingspflanze unseres Klimas.

*Spergula arvensis*, Spark, ein auf Sandboden gedeihendes Futterkraut.

*Stellaria media*, Hühnerdarm, gemeine Sternmiere, Vogelmiere, sowie andere *Stellaria*-Arten, u. *Cerastium arvense* (Abb. 328), Ackerhornkraut, sind häufige Garten- und Wiesen-Unkräuter.

*Scleranthus annuus* und *perennis*, Knäuelkraut, sowie *Herniaria glabra* und *hirsuta*, Bruchkraut, sind häufig vorkommende sandliebende Gewächse; letztere waren als Herb. *Herniariae* früher medizinisch gebräuchlich.

#### b) Silenoideae:

Kelchblätter verwachsen, Blumenblätter und Staubblätter hypopynisch. Griffel frei.




Abb. 326. *Saponaria officinalis*. *A* Spitze der blühenden Pflanze, *B* Blüte im Längsschnitt, *C* Blumenblatt mit davorstehendem Staubblatt, *D* Längsschnitt durch den Fruchtknoten, *E* Querschnitt durch denselben; man sieht die zentrale Plazenta *P* und die daran befestigten 4 Reihen Samenanlagen. *F* reife Frucht im Längsschnitt, Samen meist schon von der in der Mitte stehenden Plazentarsäule losgelöst, *G* Same, *H* Längsschnitt, *J* Querschnitt durch denselben.



Abb. 327. *Agrostemma githago*.



Abb. 328. *Cerastium arvense*.

*Silene inflata*, Blasiges Leimkraut, und *S. nutans* (Abb. 325) sind bei uns häufig vorkommende Vertreter der Gattung *Silene*.

*Dianthus caryophyllus*, die Gartenmelke, wegen ihres an Gewürznelken erinnernden Geruches so benannt, hat der Familie Caryophyllaceae den Namen gegeben, obwohl die Droge „Caryophylli“ mit dieser Familie nichts zu




Abb. 329. *A, B Nymphaea lotus*, die echte, weißblühende Lotosblume aus Ägypten. *A* Längsschnitt durch eine Blüte, *B* Frucht nach Entfernung des stehenbleibenden Kelches. *C Nymphaea coerulea*, der blaue Lotos aus Ägypten. *D Nymphaea sansibariensis*, Querschnitt des Fruchtknotens. *a, a, a, a* die Spalten zwischen den einzelnen Fruchtblättern.

tun hat. Zahlreiche Sorten und Bastarde werden in Gärten und als Topfpflanzen kultiviert.

*Saponaria officinalis*, die Seifenwurzel (Abb. 326), ist in Europa heimisch, aber nicht gerade häufig; sie liefert die saponinhaltige Rad. *Saponariae*.

*Agrostemma githago*, die Kornrade (Abb. 327) und verschiedene *Lychnis*-Arten (Lichtnelken) sind bei uns häufige Unkräuter; erstere Art ist wegen ihrer giftigen Samen im Getreide gefürchtet.

#### 10. Reihe. **Ranales.** Hahnenfußartige.

Blüte hypogyn, perigyn oder epigyn, zwittrig, oft teilweise oder ganz spiralig, mit meist zahlreichen Staubgefäßen und zahlreichen, freien Karpellen. Samen meist mit Endosperm. Kräuter und Holzgewächse.

#### **Nymphaeaceae.**

Familie der Seerosengewächse.

Die Blüten sind meistens spirocyklisch gebaut, d. h. die Glieder einzelner der Blütenhüllkreise sind spiralig, andere in Kreisen angeordnet. So gehen z. B. bei *Nymphaea* die Kelchblätter ganz allmählich in die Blumenblätter, diese ganz allmählich in die Staubblätter über, während die Fruchtblätter in einem scharf abgesetzten Kreise stehen. Die Blumenblätter, Staubblätter und Fruchtblätter sind meist in großer Zahl vorhanden. Letztere sind frei voneinander oder fest miteinander verwachsen. — Meist Wasser- oder Sumpfpflanzen mit auf der Wasseroberfläche schwimmenden Blättern und schönen, großen Blüten.

Die Gattung *Nymphaea* (Abb. 329) tritt in den Tropengebieten mit zahlreichen Arten auf; in Mitteleuropa z. B. *N. alba*, die weiße Seerose. *N. lotus*, fast in ganz Afrika verbreitet, ist die echte Lotosblume der Ägypter (Abb. 329 A, B).

*Nuphar luteum* ist die gelbe Seerose unserer Teiche.

*Nelumbo nucifera* (trop. Asien) mit großen, schildförmigen, über das Wasser hoch emporragenden Blättern und schönen großen Blüten wird häufig in warmen Teichen kultiviert. Sie wird oft fälschlich als Lotosblume bezeichnet.

*Victoria regia*, im nördlichen Südamerika heimisch und häufig in Gewächshäusern kultiviert, ist durch die rasche Entwicklung ihrer riesigen Blätter auffallend.

#### **Ranunculaceae.**

Familie der Hahnenfußgewächse.

Die Gewächse dieser Familie haben mit den andern Familien ihrer Reihe das gemein, daß die Anordnung ihrer Blütenkreise nicht durchweg eine cyklische, sondern teilweise eine spiralige ist, d. h. daß z. B. die Blumenblätter und die Staubblätter nicht für sich abgeschlossene Kreise bilden, sondern daß namentlich die meist zahlreichen Staubblattkreise, zuweilen auch die Fruchtblattkreise, spiralig ineinander übergehen (Abb. 330).

Die Ranunculaceen sind eine, wenn auch nicht gerade sehr gattungsreiche, so doch für den Pharmazeuten ziemlich wichtige Familie. Die Blüten derselben weisen mannigfache Verschiedenheiten auf. So können Kelch und Krone vorhanden sein, oder eines von beiden kann fehlen, oder es können die Kelchblätter blumenblatt-

artig ausgebildet sein, während die Blumenblätter (z. B. bei Helleborus) zu eigentümlich gestalteten, der Form von Blumenblättern keineswegs mehr ähnlichen Honigbehältern umgestaltet sind. Unter den Blüten der Ranunculaceen kommen ebensowohl aktinomorphe als median-zygomorphe vor. Zuweilen kommt unterhalb der Blumenkrone am Stengel durch eng zusammengestellte, der Blüte nicht angehörige Hochblätter ein sogenannter Hüllkelch von rosettenartiger Form zustande (z. B. bei Pulsatilla und bei Hepatica).

Die Staubgefäße der Ranunculaceenblüten sind stets zahlreich, und alle Gewächse dieser Familie gehören deshalb der XIII. Klasse nach Linné an, da die Staubgefäße dem Fruchtboden eingefügt sind. Die nur aus einem einzigen Fruchtblatt bestehenden, meist zahlreichen Fruchtknoten sind einsamig oder vielsamig und wachsen bei der Reife zu Hautfrüchten oder zu Balgfrüchten aus; nur selten (bei Actaea) ist die Frucht eine Beere.




Abb. 330. 1 Grundriß einer Ranunculaceenblüte: k Kelch, b Blumenblätter, s Staubblätter, f Fruchtblätter; 2 ein Blumenblatt mit der ansitzenden Honigdrüse (n).



Abb. 331. *Clematis vitalba*.




Abb. 332. *Anemone nemorosa*.

Die Ranunculaceen sind fast durchweg Kräuter, selten Halbsträucher mit nebenblattlosen, häufig hand- und fußförmig geteilten Blättern.

*Clematis vitalba* (Abb. 331), die Waldrebe, und andere Cl.-Arten sind Klettergewächse, welche bei uns teils wild wachsen, teils beliebte Gartenpflanzen sind.

*Anemone nemorosa* (Abb. 332), das Windröschen, ist eine sehr bekannte und verbreitete Frühlingsblume.

Abb. 333. *Pulsatilla vulgaris*.Abb. 334. *Pulsatilla pratensis*.Abb. 335. *Ranunculus acris*.Abb. 336. *Helleborus viridis*: 1 der Blütenboden mit drei Fruchtblättern, nebst den Staubblättern und den zu Honigbehältern umgebildeten Blumenblättern; 2 ein Staubgefäß, 3 die zu drei-Balgfrüchten ausgewachsenen Fruchtblätter, 4 ein Samen im Längsschnitt.

**Pulsatilla vulgaris** (Abb. 333) und **P. pratensis** (Abb. 334), die beiden Küchenschellen, sind die Stammpflanzen der Herb. Pulsatillae und kommen in Norddeutschland namentlich auf sandigen Hügeln vor.

**Hepatica triloba**, das Leberblümchen, ist wie das Windröschen eine in Laubwäldern verbreitete Frühlingsblume Deutschlands. Sie ist die Stammpflanze von Herb. Hepaticae. — Die Gattungen Pulsatilla und Hepatica werden häufig als Untergattungen zu Anemone gestellt.

**Adonis vernalis**, das Frühlings-Adonisröschen, liefert die sehr giftige Herba Adonidis.

**Ranunculus acer** (Abb. 335), der scharfe Hahnenfuß, und zahlreiche andere Ranunculus-Arten sind namentlich auf Wiesen bei uns gemein. Das Gleiche gilt von **Ficaria ranunculoides**, der Feigwurz.

**Helleborus viridis** (Abb. 336) und **H. niger**, die grüne und schwarze Nieswurz, sind in Gebirgsgegenden, namentlich Süddeutschlands, heimische Gewächse, welche im Februar bereits zu blühen beginnen. Sie zeichnen sich, abgesehen von den bereits geschilderten Eigentümlichkeiten ihrer Blüten, durch die fußförmig geteilten Blätter aus. Sie liefern Rad. Hellebori viridis und nigri.

Off. **Aconitum napellus**, blauer Eisenhut, hat unregelmäßige, zygomorphe Blüten (Abb. 337 u. 338). Die Blütenhülle besteht aus blauen, blumenblattartig ausgebildeten Kelchblättern, während von den acht Blumenkronblättern nur zwei in eigentümlicher Form ausgebildet sind (Abb. 337 C). Die übrigen sind nur als unscheinbare Schüppchen



Abb. 337. *Aconitum napellus*: A blühende Pflanze, B Blüte im Längsschnitt, C Blüte nach Entfernungen der Hüllblätter, D und E Staubblätter. F Balgfrüchte.




Abb. 338. Grundriß der Blüte von Aconitum.



Abb. 339. Delphinium consolida.



Abb. 340. Aquilegia vulgaris.



Abb. 341. Hydrastis canadensis: A Blühende Pflanze, B Blüte, C Blumenblatt, D Staubgefäß, E Fruchtblatt im Längsdurchschnitt, F Samen im Längsschnitt.

vorhanden. Blütenformel  $K_5 C_8 A_\infty G_{3-5}$  (Abb. 338). Die Pflanze liefert *Tubera Aconiti*.

**Delphinium consolida** (Abb. 339), der Feldrittersporn, bemerkenswert durch ein gesporntes Kelchblatt, ist ein bekanntes Unkraut und liefert *Herb. Consolidae*, *D. staphisagria*, in Südeuropa einheimisch, ist die Stammpflanze des Sem. *Staphisagriae*.

**Aquilegia vulgaris** (Abb. 340), die Akelei, mit strahligen, fünffach gespornten Blüten, fand in früheren Zeiten ebenfalls medizinische Anwendung.

**Nigella sativa**, der Schwarzkümmel, ist die Stammpflanze von *Semen Nigellae*, *N. damascena* dagegen eine Gartenzierpflanze, deren Samen zu medizinischer Anwendung ungeeignet sind.

**Paeonia officinalis**, die Pfingst- oder Gichtrose, eine bei uns beliebte Gartenzierpflanze, liefert *Flores*, *Semen* und *Rad. Paeoniae*.

### Berberidaceae.

Familie der Berberitzengewächse.

Diese Familie hat Zwitterblüten, deren einzelne Glieder meist in der Dreizahl vorhanden sind. Der Fruchtknoten wird stets von einem



Abb. 342. Grundriß der Blüte von *Podophyllum peltatum*:  
L Laubblätter.

Abb. 343. *Podophyllum peltatum*.

einzigem Fruchtblatt gebildet (Abb. 342). Die typische Blütenformel ist:  $K_3 + 3 C_3 + 3 A_3 + 3 G^1$ . Die Antheren springen oft mit Klappen, seltener mit Längsspalten auf. Das Fruchtblatt schließt stets mehrere Samenanlagen ein.




Abb. 344. *Anamirta cocculus*: a männliche Blüte, b Einzelfrucht längsdurchschnitten.

Die Berberitzengewächse sind Sträucher und Kräuter der gemäßigten Zonen.

Off. *Hydrastis canadensis* (Abb. 341), in Nordamerika einheimisch, ist die Stammpflanze des Rhiz. Hydrastis.

*Berberis vulgaris*, die Berberitze oder der Sauerdorn, ein bei uns verbreiteter dorniger Strauch mit gelben Blüten und roten Beeren, liefert Fruct. Berberidis und ist eine der Wirtspflanzen des Rostpilzes *Puccinia graminis*.

Off. *Podophyllum peltatum* (Abb. 342 u. 343), in Nordamerika einheimisch, liefert Rhiz. Podophylli und Podophyllin.

### Menispermaceae.

Familie der Mondsamengewächse.

Die Familie hat ihren Namen von der halbmondförmigen Krümmung der Samen; diese Krümmung erstreckt sich, da die Einzel Früchte stets einsamig sind, auch auf die Früchte (Abb. 344 *b*). Die



Abb. 345. *Jatrochiza palmata*.

Gewächse dieser Familie sind tropische Schlingpflanzen mit getrenntgeschlechtigen, meist zweihäusigen Blüten (Abb. 344 *a*). Ihre häufigste Blütenformel ist  $K_3 + 3C_3 + 3A_3 + 3G^3$ .

Off. *Jatrorrhiza palmata* (Abb. 345 auf S. 302), auch *Cocculus palmatus*, *Menispermum palmatum*, oder *Menispermum calumba* genannt, ist im tropischen Ostafrika heimisch und liefert Rad. Colombo.

*Anamirta cocculus* ist in Ostindien heimisch und liefert die sehr giftigen Fruct. Cocculi.

### Magnoliaceae.

Familie der Magnoliengewächse.

Die Gewächse dieser Familie sind fast ausnahmslos in den Subtropen oder Tropen einheimische Holzpflanzen, bei denen die Spiralstellung der Blütenorgane meist sämtlichen inneren Kreisen von den Blumenblättern an eigen ist, während die Kelchblätter cyklisch angeordnet sind. Die Blütenformel ist  $K 3 C \infty A \infty G \infty$ . Meist ist gleichzeitig eine Streckung der Blütenachse vorhanden (Abb. 346), und da in-



Abb. 346. Blüte von *Drimys Winteri*, längsdurchschnitten.

folgedessen die Staubgefäße unterhalb der Fruchtblätter auf dem Fruchtboden eingefügt sind, gehören alle Gewächse dieser Familie, wie die der vorhergehenden, zur XIII. Klasse nach Linné. — Ölzellen.

*Magnolia grandiflora*, die großblütige Magnolie, ist im südl. Nordamerika einheimisch und wird bei uns oft als Zierstrauch kultiviert.




Abb. 347. *Illicium anisatum*: a Blüte, b Fruchtblätter der Blüte vergrößert, c Frucht.

*Illicium verum*, der Sternanisbaum, ist im südöstlichen Asien (China) einheimisch; seine aus zahlreichen sternförmig gestellten Balgfrüchten, deren jede von einem einzigen, an seiner Bauchnaht sich öffnenden Fruchtblatt gebildet wird, bestehenden Sammelfrüchte sind die vielfach officinellen Fruct. Anisi stellati. *I. anisatum* (= *I. religiosum*) (Abb. 347), hat fast die gleiche Verbreitung und besitzt giftige Früchte, Sikkimi genannt, welche leicht mit den Sternanisfrüchten verwechselt werden können.

*Drimys Winteri* (Abb. 346), in Südamerika einheimisch, liefert die früher gebräuchliche Droge Cortex Winteranus.

*Liriodendron tulipifera*, Tulpenbaum, ist in Nordamerika heimisch und wird als prächtig blühender Alleebaum oft bei uns angepflanzt.

### Anonaceae.

Familie der Gewürzpfelgewächse.

Alle hierhergehörigen Arten sind echt tropische Bäume oder Sträucher, deren Blütenbau sehr charakteristisch ist. Die Blüten besitzen (wie diejenigen der vorigen Familie) in den meisten




Abb. 348. A Frucht von *Anona muricata* im Längsschnitt. B Frucht von *Anona squamosa*. C dieselbe im Querschnitt. (Nach Baillon.)

Kreisen Spiralstellung ihrer Glieder. Die Blütenformel ist meistens  $K 3 C 3 + 3 A \infty G \infty$ . Die Fruchtblätter sind meist frei voneinander und werden bei der Reife beerenartig; die Früchte zeigen oft sehr auffallende Bildungen (vergl. Abb. 348 und 349). — Ölzellen.

*Anona muricata* und andere Arten (Abb. 348) liefern in ihren Früchten ein geschätztes Tropenobst, das neuerdings auch nach Deutschland eingeführt wird.

*Xylopia aethiopica* gibt in den Früchten (Abb. 349) den sogenannten Mohrenpfeffer, ein scharfes Gewürz, das stellenweise in Westafrika sehr beliebt ist.

### Myristicaceae.

Familie der Muskatnußgewächse.

Die Muskatnußgewächse sind tropische Holzpflanzen mit getrenntgeschlechtigen, diöcischen Blüten. Sie besitzen, wie die Gewächse

der vorhergehenden Familie, nur eine einfache Blütenhülle. Die Staubgefäße, welche in der Zahl von 3 bis 15 vorhanden sind, sind zu einer Säule verwachsen (Abb. 350, *a*). Die weiblichen Blüten be-



Abb. 349. Zweig von *Xylopiya aethiopia* mit Blüte und Frucht ( $\frac{2}{3}$  natürlicher Größe). (Nach Baillon.)




Abb. 350. *Myristica fragrans*: *a* die verwachsenen Staubgefäße der männlichen Blüte, *b* die weibliche Blüte, *c* dieselbe längsdurchschnitten.

sitzen stets einen einzigen Fruchtknoten, welcher von der verwachsenen Blütenhülle eingeschlossen wird (Abb. 350, *b*, *c*). Die Frucht ist eine Beere, welche bei der Reife, noch am Baume hängend, auf-

zuplatzen pflegt und zwischen dem Fruchtfleisch und der Samenschale den nach der Befruchtung herangewachsenen Samenmantel (Arillus) zeigt (Abb. 351 und 352). — Ölzellen.



Abb. 351. *Myristica fragrans*; Zweig mit Frucht.




Abb. 352. *Myristica fragrans*. Samen vom Arillus umgeben, in der Frucht liegend; die obere Fruchthälfte entfernt.




Abb. 352a. Samen von *Myristica*, samt dem Arillus (Macis) im Längsschnitt, a Arillus, s Samenschale, n Endosperm und Perisperm, k Keimling.

Off. *Myristica fragrans*, der echte Muskatbaum (Abb. 350 bis 352), auf den Molukken einheimisch und in fast allen Tropengegenden kultiviert, liefert Samen *Myristicae*, Oleum *Myristicae*, Macis und Öl. *Macidis*.

**Lauraceae.**

## Familie der Lorbeergewächse.

Die Lorbeergewächse sind immergrüne Holzpflanzen der warmen und tropischen Zone. Ihre Blüten zeichnen sich dadurch aus, daß sie eine doppelte, aber nicht als Kelch und Krone unterschiedene, kelchartige Blütenhülle besitzen. Die Antheren öffnen sich mit auf-




Abb. 353. *a* Blüte von *Cinnamomum zeylanicum*, *b* dieselbe längsdurchschnitten.

springenden Klappen, von denen oft jedes der zwei in jeder Antherenhälfte übereinander liegenden Pollenfächer eine besitzt, so daß jede Anthere mit vier Klappen aufspringt (Abb. 353 u. 354). In den inneren Kreisen kommen verkümmerte Staubgefäße (Staminodien)




Abb. 354. *a* Männliche, *b* weibliche Blüte von *Sassafras officinale*.

vor. Der Fruchtknoten ist einfächerig und enthält eine einzige Samenanlage. Den Blütenblattkreisen liegt meist die Dreizahl zugrunde; die typische Blütenformel ist  $P_3 + 3A_9G^{(2)}$ . Es kommen zweigeschlechtige und eingeschlechtige Blüten vor; die Arten, welche Zwitterblüten tragen, gehören der IX. Klasse nach Linné an.

Off. *Laurus nobilis*, der Lorbeerbaum, gedeiht in allen Mittelmeerländern und liefert Fruct. Lauri, sowie Ol. Lauri, desgl. Fol. Lauri.

Off. *Cinnamomum zeylanicum*, der Zimtbaum (Abb. 353 u. 355), auf Ceylon heimisch, in Zimtgärten gezogen, liefert Cort. Cinnamom. Zeylan. — *C. cassia*, im südöstlichen Asien heimisch, liefert Cort. Cinnamom. Cassiae und Flores Cassiae. — *C. camphora* (auch *Laurus camphora* oder *Cam-*



Abb. 355. *Cinnamomum zeylanicum*. A blühender Zweig, B Blüte, C Staubblatt des innersten Kreises mit Drüsen, D Anthere von vorn, E von hinten gesehen.

*phora officinarum* genannt) (Abb. 356), im südöstlichen Asien heimisch, liefert Camphora und Safrol.

Off. *Sassafras officinale* (Abb. 354), (auch *Laurus sassafras* genannt), im östlichen Nordamerika heimisch, liefert Lignum Sassafras.

*Nectandra puchury*, in Brasilien heimisch, ist die Stamm-pflanze von Sem. Pichurim.

11. Reihe. **Rhoeadales**, Mohnartige.

Blüte hypogyn, mit doppelter Blütenhülle, zwittrig, vorwiegend zweizählig; das Perianth besteht meist aus drei zweigliedrigen oder viergliedrigen, das

Abb. 356. *Cinnamomum camphora*.

Androeceum oft aus zwei zweigliedrigen Quirlen. Der Fruchtknoten ist einfächerig oder mehrfächerig. Es sind meist Kräuter mit wechselständigen, einfachen Blättern ohne Nebenblätter.

**Papaveraceae.**

Familie der Mohngewächse.

Die Mohngewächse besitzen hermaphroditische, strahlige oder zygomorphe Blüten, die sich besonders durch die Zweizähligkeit ihrer Blütenblattkreise auszeichnen. Auffällig sind die zwei Kelchblätter, welche beim Entfalten der Blüten meist abfallen und daher nur an den Knospen zu finden sind. Die 4 Blumenblätter liegen in der Knospe meist nicht gefaltet, sondern zerknittert (Abb. 357). Die Staubgefäße sind meist zahlreich, seltener in begrenzter Anzahl vorhanden. Die

Fruchtblätter sind mit ihren Rändern verwachsen und bilden, auch wenn zahlreich vorhanden, einen einfächerigen Fruchtknoten, welcher zuweilen mit falschen, nie aber mit echten Scheidewänden versehen



Abb. 357. Aufbrechende Blütenknospe von *Papaver rhoeas*.




Abb. 358. *Papaver somniferum*.  
I, Kapsel von der Seite gesehen. II, Narbe von oben gesehen. III Kapsel im Querschnitt, die unvollständigen, mit Samen besetzten Scheidewände zeigend. Vergr.  $\frac{2}{3}$ .

ist. Die Samen sind wandständig. Die Frucht ist eine schotenförmige (Abb. 360) oder eine mit Löchern aufspringende Kapsel (Abb. 358). Die Blütenformel ist:  $K 2 C 2 + 2 A \infty G^{(2)}$  oder  $(\infty)$ . Die



Abb. 359. *Papaver rhoeas*.



Abb. 360. *Chelidonium majus*.

Samen der Mohngewächse besitzen Endosperm und unterscheiden sich dadurch wesentlich von denen der Kreuzblütler. Die meisten Mohngewächse sind reich an Milchsaft, der aber manchmal wasserhell ist.

Man unterscheidet zwei Unterfamilien:

a) **Papaveroideae.** Blüten strahlig. Blumenblätter ohne Sporn. Staubblätter und Fruchtblätter meist zahlreich.

Off. *Papaver somniferum*, der Schlafmohn (Abb. 358), ist im Orient heimisch, wird aber auch bei uns kultiviert; er liefert Fructus Papav. immat., Semen Papav., sowie das Opium. Von *P. rhoeas* (Abb. 359), Klatschrose oder Feuermohn, stammen die Flores Rhoeados. *P. dubium*, *P. argemone* und *P. hybridum* sind häufige Unkräuter, namentlich in Getreidefeldern.

*Chelidonium majus*, das Schöllkraut, durch lebhaft gelben Milchsaft ausgezeichnet, (Abb. 360), ist gleichfalls ein häufiges Unkraut. Herb. Chelidonii wurde früher arzneilich angewendet.

b) **Fumarioideae.** Blüten transversal zygomorph. Der Kelch ist zweiblättrig, die Korolle besteht aus zwei zweiblättrigen Quirlen, von den äußeren Blumenblättern ist das eine oder beide mit einem Sporn versehen. Die zwei vorhandenen Staubblätter sind dreiteilig und erscheinen wie zwei aus je drei Staubgefäßen mit nur halben Antheren verwachsene Bündel; daher XVII, 1. Der Fruchtknoten ist einfächerig, ein- oder vielsamig.

*Fumaria officinalis*, Erdrauch, ein auf Äckern sehr gemeines Unkraut, liefert Herba Fumariae (Abb. 76, B).

*Corydalis cava*, in Laubgebüsch verbreitet, ist die Stammpflanze der früher viel gebrauchten Radix Aristolochiae rotundae cavae.

*Dicentra spectabilis* und *formosa*, aus Nordchina stammend, unter dem Namen Flammendes Herz beliebte Gartenzierpflanzen, sind durch ihre schlanken, einseitwendigen Blütentrauben und die herzförmige Gestalt ihrer roten Blumen auffällig.

## Capparidaceae.

Familie der Kapperngewächse.

Blüten (Abb. 361, S. 312) besonders durch ihre Blütenachse sehr auffallend, welche ring- oder schuppenförmig oder seltener zu einem röhrenförmigen Gebilde innerhalb der Blüte entwickelt und meist unter den Carpiden, oft auch noch unterhalb der Staubblätter lang stielartig verlängert ist (Gynophor resp. Androgynophor). Die Blütenformel lautet:  $K4C4A\infty - 6 - 4G^{(2-5)}$ . Die Samenanlagen sind zahlreich, kampylotrop. Die Samen sind nierenförmig mit gekrümmtem Embryo.

*Capparis spinosa*, im Mittelmeergebiet heimisch, liefert in ihren Knospen die Kappern, das bekannte Gewürz.

## Cruciferae.

Familie der Kreuzblütlergewächse.

Die zu dieser Familie gehörigen Gewächse sind stets Kräuter. Alle Blüten stehen seitlich und sind in Trauben angeordnet, an denen man während der vorgeschrittenen Jahreszeit meist schon reife Früchte am unteren Teile findet, während an der Spitze noch Knospen vorhanden sind. Deckblätter fehlen.



Abb. 361. Blüten, Früchte und Samen aus verschiedenen Gattungen der Capparidaceae; besonders charakteristisch ist das Gynophor, resp. das Androgynophor mancher Blüten. (Nach Pax.)




Abb. 362. Grundriß der Cruciferenblüte.




Abb. 363. A Schote, B 1 Schütchen, 2 dasselbe geöffnet und vergrößert.

Die Blüten der Kreuzblütlergewächse (Abb. 362, 366) besitzen vier Kelchblätter, welche in zwei Kreisen angeordnet sind, ferner vier Blumenblätter in einem Kreise, welche durch ihre kreuzförmige Stellung der Familie den Namen gegeben haben (*crux*, *crucis*, das Kreuz). Der äußere Staubblattkreis wird von zwei (kürzeren) Staubgefäßen, der innere von zweimal zwei (längeren) Staubgefäßen gebildet. Dieses Vorhandensein von vier längeren und zwei kürzeren Staubgefäßen nennt man Viermächtigkeit (Tetradynamie von *τετρα*, tetra = vier, und *δύναμις*, dynamis = die Kraft oder Macht); dieselbe bildet zugleich die charakteristische Eigentümlichkeit von Linnés XV. Klasse. Die Cruciferen füllen diese Klasse (Tetra-




Abb. 364. *a*, *b* und *c* Querschnittsbilder, *d* und *e* Längsschnittbilder durch verschiedene Cruciferensamen; links das Würzelchen, rechts die Keimblätter. (C. Müller.)

Abb. 365. Querschnitt durch *a* ein latiseptes, breitwandiges, *b* ein angustiseptes, schmalwandiges Schötchen. (C. Müller.)

dynamia) vollkommen aus. Der Fruchtknoten besteht aus zwei Fruchtblättern, welche zur Zeit der Reife eine Schote (Siliqua) oder ein Schötchen (Silicula), selten andere Fruchtformen bilden. Die Blütenformel (Abb. 362) ist:  $K 2 + 2 C 4 A 2 + 2 \times 2 G^{(2)}$ .

Schoten und Schötchen sind fast allein den Kreuzblütlergewächsen eigen, und dieser Umstand hat Linné Veranlassung gegeben, die Ordnungen seiner XV. Klasse danach abzugrenzen und zu benennen. Der Unterschied zwischen Schoten und Schötchen ist der, daß die Schote mindestens  $1\frac{1}{2}$  mal so lang als breit, meist aber viel länger ist (Abb. 363 *A*), während das Schötchen jenes Längenmaß niemals erreicht (Abb. 363 *B*). Schoten und Schötchen haben zwischen den beiden Randleisten, welche die Samen tragen und von denen sich die Fruchtschalen zur Zeit der Reife von unten her ablösen (Abb. 363), eine papierdünne Scheidewand, welche, weil sie nicht durch Einstülpung der Fruchtblätter, sondern als eine Wucherung der Randleisten entstand, als eine sogen. falsche Scheidewand anzusehen ist. Einige Abarten dieser Fruchtform, nämlich die dem Rettich (*Raphanus*) eigene Gliederschote (Lomentum, Abb. 366 *L*) und

das dem Färberwaid (*Isatis*) eigene Nußschötchen (*Nucamentum*), verdienen hier nur dem Namen nach erwähnt zu werden.

Die Samen der Kreuzblütlergewächse sind sämtlich nährgewebelos, d. h. sie besitzen fleischige Keimblätter, welche das Nährgewebe völlig aufgezehrt und in ihrem Inneren die Nährstoffe für die Keimpflanze gespeichert haben. Die Lage, welche das Würzelchen und die beiden Keimblätter auf dem Querschnitt des Samens zueinander einnehmen, kann eine fünffach verschiedene sein, wie in Abb. 364 veranschaulicht ist. Man drückt dies, wo erforderlich, durch die unter den Figuren befindlichen Zeichen aus, wobei ○ das Würzelchen und || oder = oder >>




Abb. 366 Blüten u. Früchte von Cruciferen. A–F *Brassica nigra*, A Blüte, B dieselbe nach Entfernung der Kelch- u. Blumenblätter,  $\bar{a}$  äußere,  $\bar{i}$  innere Staubblätter,  $h$  Honigdrüsen am Grunde derselben, C Fruchtknoten, D derselbe im Längsschnitt,  $St$  Staubfaden,  $\Delta$  Honigdrüsen, E reife Frucht, die vordere Klappe losgelöst, F Querschnitt durch dieselbe, G *Sinapis alba*, reife Frucht, die vordere Klappe schon losgelöst, H–K *Cochlearia officinalis*, H Blüte im Längsschnitt, J reife Frucht, die vordere Klappe schon losgelöst, K Querschnitt durch die Frucht, L–N *Rhaphanus raphanistrum*, L reife Frucht, M ein Stück davon im Längsschnitt, N im Querschnitt.

die beiden Keimblätter bedeuten. Die Figuren *d* und *e* sind zur besseren Veranschaulichung im Längsschnitt gezeichnet. Das Verhältnis zu dem Bilde des darunter mittelst genannter Zeichen angedeuteten Querschnitts geht jedoch leicht aus der Abbildung hervor. De Candolle hat diesen morphologischen Verhältnissen entsprechend eine Einteilung der Kreuzblütlergewächse aufgestellt. Eine andere, ebenfalls von De Candolle herrührende Einteilung gründet sich darauf, ob die Schoten oder Schötchen vom Rücken der Fruchtblätter her breitgedrückt sind und die Scheidewand daher den breiten Durchmesser einnimmt (*latisepte* Schötchenfrüchte, Abb. 365 *a*), oder ob die Zusammendrückung von den Seiten her stattgefunden und die Scheidewand daher den schmalen Durchmesser einnimmt (*angustisepte* Schötchenfrüchte, Abb. 365 *b*).

Hier soll die einfache Einteilung in Schotenfrüchtige und Schötchenfrüchtige benutzt werden.

#### A. Siliquosae. Schotenfrüchtige.

Off. *Brassica nigra*, der schwarze Senf (auch *Sinapis nigra* genannt), (Abb. 366 A—F), liefert Sem. *Sinapis*. Die Pflanze blüht gelb und ist ein häufiges Saatunkraut. Zur Samengewinnung wird sie felderweise angebaut. — *B. juncea*, der Sarepta-Senf (auch *Sinapis juncea* genannt), wird namentlich in wärmeren Klimaten zur Mostrichgewinnung kultiviert. — *B. oleracea*, der Kohl, ist das bekannte Küchengewächs, das infolge Jahrtausende alter Kultur die verschiedenartigsten Formen angenommen hat (z. B. Gartenkohl, Rosenkohl, Wirsingkohl, Rotkohl, Blumenkohl, Kohlrabi, Kohlrübe). Andere Arten der Gattung werden als Saatgewächse, namentlich zur Ölgewinnung [z. B. Raps (*B. napus*) und Rüben (*B. campestris*)], angebaut.

Off. *Sinapis alba*, der weiße Senf (Abb. 366 G), liefert Sem. *Erucae* oder Sem. *Sinapis alb.* — *S. arvensis*, ist ein lästiges Ackerunkraut.

*Dentaria bulbifera*, die knollentragende Zahnwurz, besitzt scharf riechende knollige Wurzeln, welche mit Spiritus destilliert ein wie Spir. *Cochleariae* wirkendes und häufig an dessen Stelle angewendetes Präparat geben.

*Matthiola annua* und *incana*, Sommer- und Winterlevkoje, sowie *Cheiranthus cheiri*, der Goldlack, sind beliebte Gartenzierpflanzen.

*Nasturtium officinale*, Brunnenkresse, und *Cardamine pratensis*, Wiesenschaumkraut, wurden früher medizinisch angewendet. Erstere wird als Salat sehr geschätzt.

*Barbaraea vulgaris*, Senfkraut, *Turritis glabra*, Waldkohl, *Arabis hirsuta* und *A. Halleri*, Gänsekresse, *Sisymbrium officinale* und *Alliaria officinalis*, Knoblauch-Hederich, sind häufige Unkräuter.

#### B. Siliculosae. Schötchenfrüchtige.

Off. *Cochlearia officinalis*, das Löffelkraut (Abb. 366 H—K), mit weißen Blüten und breitwandigen, kugelig aufgedunsenen Schötchen, gedeiht besonders an den nordeuropäischen Meeresküsten und liefert Herb. *Cochleariae*, frisch destilliert Spiritus *Cochleariae*. — *C. armoracia* ist der seines scharf schmeckenden Rhizomes wegen kultivierte Mährettich (Meerrettich).

*Capsella bursa pastoris*, das Hirtentäschel, ist ein sehr verbreitetes Unkraut, welches vereinzelt auch zu therapeutischer Anwendung empfohlen worden ist.

*Raphanus sativus*, der Rettich, ist in verschiedenen Kulturvarietäten, als Gartenrettich, Monatsrettich und Radieschen ein verbreitetes Gartengewächs, *R. raphanistrum*, Hederich (Abb. 366 L—N), ein lästiges Ackerunkraut.

*Isatis tinctoria*, Färberwaid, im Mittelmeergebiet heimisch, wurde früher zur Bereitung des deutschen Indigo in ausgedehntem Maße angebaut.

*Lepidium sativum*, Gartenkresse, wird als Salat- und Gewürzpflanze angebaut, *L. campestre* ist an Wegrändern häufig.

*Iberis amara*, Schleifenblume, *Thlaspi arvense*, Täschel- oder Hellerkraut, *Camelina sativa*, Leindotter und *Erophila verna*, Hungerblümchen, sind in unserem Klima sehr verbreitete Vertreter dieser Pflanzengruppe.

*Draba*-Arten kommen in großer Anzahl besonders in den Hochgebirgen der Erde vor.

*Lunaria rediviva* und *L. biennis*, „Silberblatt“, kommen wild selten vor, sind aber zu beliebten Gartenpflanzen geworden.

### Resedaceae.

#### Familie der Resedagewächse.

Diese haben zygomorphe Blüten mit zerschlitzen Blumenblättern und drei bis vierzig Staubgefäßen; Fruchtblätter zwei bis sechs, frei

oder zu einem oben offenen, einfächerigen Fruchtknoten verwachsen. Es sind vorwiegend krautige, in den Mittelmeerländern heimische, kleinblütige Gewächse.

**Reseda odorata**, Reseda, ist eine aus Nordafrika stammende und wegen ihres Wohlgeruchs ungemein beliebte Zierpflanze. **R. luteola**, Färberwau, wächst bei uns an Wegrändern wild.

#### 12. Reihe. **Sarraceniales.** Insektenfangende Gewächse.

Die Blüten hypogynisch, mit doppelter, kelchartiger oder korollinischer Blütenhülle. Fruchtknoten dreibis fünffächerig mit zentralwinkelständigen oder wandständigen, zahlreichen Samenanlagen. Samen klein, mit Nährgewebe.

Kräuter mit insektenfangenden und -verzehrenden Blättern.

#### **Sarraceniaceae.**

Familie der Schlauchblattgewächse.

Die hierher gehörigen wenigen Arten sind Sumpfpflanzen Amerikas mit einzelnen oder wenigen ansehnlichen, in lockeren Trauben stehenden Blüten an axillärem Schaft. Die Blätter sind schlauchförmig, sondern im Inneren Schleim und Honig ab und fangen Insekten. Ob diese in den Schläuchen verdaut werden, ist jedoch nicht ganz sicher.

**Sarracenia purpurea** ist in Nordamerika heimisch und wird nicht selten in Botanischen Gärten kultiviert.

#### **Nepenthaceae.**

Familie der Kannenträger.

Kletterpflanzen des indisch-malayischen Gebietes mit spiralig gestellten Blättern und kleinen, unscheinbaren, getrenntgeschlechtigen Blüten in vielblütigen Trauben oder Rispen. Die oberen Blätter laufen in Ranken aus, bei den unteren ist die Blattspreite zu bedeckelten Schläuchen oder Kannen umgebildet. Die Wände dieser Kannen sind mit vielen Drüsen ausgekleidet, welche ein schleimiges, schwach säuerliches Sekret ausscheiden. Insekten, welche in die Kannen fallen, werden verdaut.

Die **Nepenthes**-Arten (Abb. 367) sind im indisch-malayischen Gebiete verbreitet und werden häufig in Warmhäusern kultiviert; sie sind durch ihre großen und schön gefärbten Kannen sehr auffallende Gewächse.

#### **Droseraceae.**

Familie der Sonnentaugewächse.

Gewächse mit regelmäßigen Blüten und fünf Staubgefäßen. Der Fruchtknoten ist einfächerig und entwickelt sich zu einer Kapsel- frucht. Die Sonnentaugewächse sind Kräuter mit drüsig gewimperten, „fleischfressenden“ Blättern.

*Drosera rotundifolia*, *D. longifolia* und *D. intermedia*, Sonnentau (Abb. 368 S. 318), sind auf Torfmooren in unserem Klima heimische kleine Gewächse. Die zahlreichen Drüsenhaare der Blätter sondern einen klebrigen




Abb. 367. *Nepenthes gracilis*. (Nach Korbals.)

Saft ab, mit welchem sie Insekten anlocken. Diese werden durch den Saft festgehalten, die Drüsenhaare schließen sich über dem Tier zusammen, scheiden

sodann einen schwach sauren Saft ab und saugen die verdaulichen Teile der Insekten auf. Das Kraut war früher unter dem Namen Herba Rorellae medizinisch gebräuchlich.



Abb. 368. Die drei deutschen Drosera-Arten. *A* *Drosera rotundifolia*, *B* *Drosera intermedia*, *C* *Drosera longifolia*, in Blüte. (Nach Drude.)

*Dionaea muscipula* ist die sogen. Venusfliegenfalle (Abb. 369). Ihre Blattohälften klappen bei Berührung einer der 6 Fühlborsten rasch zusammen und fangen auf diese Weise Insekten, welche sodann verdaut werden. Die Pflanze ist in Sümpfen des südlichen Nordamerikas heimisch.

13. Reihe. **Rosales.** Rosenähnliche.

Blüten cyklisch, selten halbspiralig angeordnet, mit doppelter Blütenhülle, hypogynisch, perigynisch oder epigynisch. Fruchtblätter häufig frei voneinander, manchmal aber auch verwachsen.

**Saxifragaceae.**

Familie der Steinbrechgewächse.

Die Steinbrechgewächse besitzen meist zwei je fünfgliedrige Staubblattkreise. Diese können sowohl unter, als auch über dem Fruchtknoten stehen, wie auch um denselben herum. Der Fruchtknoten besteht aus zwei Fruchtblättern oder aus vier, bezw. fünf, welche miteinander verwachsen sind. Die Samenanlagen stehen an dicken, zentralwinkelständigen Placenten. Die Blütenformel ist:

$$K\ 5\ C\ 5\ A\ 5\ +\ 5\ G\ (2).$$

*Saxifraga granulata*, der knollentragende Steinbrech, ist ein auf sonnigen Hügeln häufiges Kraut. — Andere Arten dieser formenreichen Gattung gehören zu den schönsten und charakteristischsten Gewächsen der Hochgebirge.

Familie **Hamamelidaceae.**

Sträucher oder Bäume mit kleinen, in dichte Ähren oder Köpfchen gestellten Blüten, welche oft von Hochblättern umhüllt sind.

Off. *Liquidambar orientalis* (Abb. 370), ein platanenähnlicher Baum Kleinasiens mit handförmig gelappten Blättern und kleinen, in dichten Knäueln stehenden Blüten, liefert *Styrax liquidus*.

**Rosaceae.**

Familie der Rosengewächse.

Die Rosengewächse sind Kräuter, Bäume und Sträucher mit zerstreuten, häufig gefiederten und geteilten Blättern und mit Neben-




Abb. 369. Habitusbild von *Dionaea muscipula*.  
(Nach Drude.)

Styrax liquidus.

blättern, welche oft an dem Blattstiele angewachsen sind (Abb. 371). Die Blüten sind vollkommen und regelmäßig, nach der Fünffzahl gebaut und oft typisch perigyn, d. h. der Blütenboden ist rings



Abb. 370. *Liquidambar orientalis*.

um den Fruchtknoten hinaufgewölbt und auf seinem Rande stehen Kelchblätter, Blumenblätter und Staubgefäße eingefügt (Abb. 372), was Linné nicht zutreffend „Staubgefäße auf dem Kelch-



Abb. 371. Blatt von *Rosa* mit angewachsenen Nebenblättern.




Abb. 372. Eine Blüte von *Rosa*, längsdurchschnitten: *a* der hinaufgewölbte Fruchtboden, *d* Honigwulst (Diskus), *c* Kelchblätter, *p* Blumenblätter, *m* Einfügungsstelle derselben, *f* Staubgefäße, *g* die zahlreichen freien Fruchtblätter.

rande eingefügt“ nannte. Die Rosengewächse gehören daher zum Teil der XII. Klasse nach Linné an. Die Blütenformel ist:  $K5C5A5 - \infty G1 - \infty$ . Der flach schüsselförmige bis tief krug-

förmige, oder aber vorgewölbte Blütenboden, Hypanthium, bezw. Receptaculum genannt, beteiligt sich oft an der Frucht-, bezw. Scheinfruchtbildung (Hagebutte, Erdbeere, Apfelfrucht). — Nach der Anzahl der Fruchtknoten und nach der Art und Weise, in welcher die Fruchtbildung vor sich geht, unterscheidet man eine Anzahl Unterfamilien:

a) **Spiraeoideae:**  $K5C5A10 - \infty G5 - 2$ . Die meist zu fünf vorhandenen, weder der Blütenachse eingesenkten, noch auf einem vorgewölbten Blütenboden aufsitzenden Fruchtblätter wachsen bei der Reife zu mehrsamigen Balgkapseln aus.




Abb. 373. *Pirus malus*. A Blühender Zweig, B Blüte nach Entfernung der Blumenblätter, C Längsschnitt durch die Blüte, D Staubblätter, E Griffel, F Narbe, G Fruchtknotenquerschnitt, H Samen, J und K Samenlängsschnitte, L Samenquerschnitt.

b) **Pomoideae:**  $K5C5A10 - \infty G(2) - (5)$ . Die Fruchtblätter sind sowohl unter sich, als auch mit dem hohlen Blütenboden verwachsen. Beide werden mehr oder weniger fleischig und bilden die sogen. Apfelfrucht, d. i. eine Scheinfrucht, welche an ihrer Spitze von den vertrockneten Kelchblättern gekrönt wird (Abb. 375, 376).

c) **Rosoideae:**  $K5C5A\infty G\infty$ . Die Fruchtblätter stehen zahlreich und frei nebeneinander, entweder dem gewölbten, halbkugeligen bis kegelförmigen Blütenboden aufsitzend, oder aber teils im Grunde,

teils an der Wandung des schwach vertieften oder meistens tief krugförmigen, oben verengten Blütenbodens eingefügt, durch dessen obere Öffnung nur die Griffel hervorragen.



Abb. 374. *Pirus communis*.

Durch das Wachstum des Blütenbodens entstehen nach der Befruchtung Scheinfrüchte, an denen im erst geschilderten Fall die zahlreichen Früchtchen außen ansitzen; diese können nüsschenartig wie bei der Erdbeere, oder beerenartig wie bei der Himbeere sein. Bei der Erdbeere ist der Blütenboden der rote essbare Körper, welchem die Früchte als kleine gelbe Nüsschen aufsitzen (Abb. 385). Bei der Himbeere und der Brombeere hingegen ist der Blütenboden kegelförmig und nicht essbar, während die saftigen Früchtchen miteinander verwachsen und gemeinsam die vom Blütenboden ablösbare Scheinfrucht (Sammelfrucht) bilden (Abb. 383, 3). Im zweiten Falle werden die Früchte zu harten Nüsschen, welche vom fleischigen Blütenboden umgeben sind (Hagebutte, Fig. 380).

d) **Prunoideae:**  $K5C5A\infty G1$ . Das einzige vorhandene Fruchtblatt wächst zu einer meist einsamigen Steinfrucht aus. Der Blütenboden




Abb. 375. Scheinfrucht von *Cydonia vulgaris* längsdurchschnitten.




Abb. 376. 1 Scheinfrucht von *Mespilus germanica*; 2 dieselbe längsdurchschnitten; 3 querdurchschnitten; a und c die Reste des Kelches.

fällt mit dem Kelch vor der Reife der Frucht ab. Die innen mit einem harten Steinkern versehene Steinfrucht besitzt saftiges Fleisch (Pflaume, Pfirsich) oder sie ist saftlos (Mandel, Abb. 394).

**a) Spiraeoideae:**

*Spiraea*-Arten werden häufig als Ziersträucher in unseren Gärten kultiviert. Off. *Quillaja saponaria*, ein in Chile einheimischer Baum, ist die Stammpflanze von Cort. *Quillajae*.

Abb. 377. *Sorbus aucuparia*.

Sorb.

Abb. 378. Scheinfrucht von *Sorbus aucuparia*.Abb. 379. *Rosa canina*.Abb. 380. Scheinfrucht von *Rosa canina* (Hagebutte).**b) Pomoideae:**

*Pirus malus* (Abb. 373), der Apfelbaum, und *P. communis* (Abb. 374), der Birnbaum, sind allenthalben kultivierte Obstbäume, jeder derselben mit zahllosen Varietäten, deren Unterschiede auf Form, Größe und Geschmack der Früchte beruhen.

*Sorbus aucuparia* (Abb. 377), Vogelbeerbaum oder Eberesche, wird bei uns häufig an Landstraßen angepflanzt. Der Saft der frischen Früchte (Abb. 378) dient zur Gewinnung von Äpfelsäure und von Extr. Ferri pomatum. — Die Gattung *Sorbus* wird häufig als Sektion zu *Pirus* gezogen.


Abb. 381. *Geom urbanum*.Abb. 382. *Rubus idaeus*.

Abb. 383. 1 Blüte von *Rubus idaeus*; 2 dieselbe längsdurchschnitten und vergrößert; A der Blütenboden, d Diskus, c Kelchblätter, p Blumenblätter, f Staubgefäße, m Einfügungsstelle derselben, g die zahlreichen, freien Fruchtblätter, st die Griffel; 3, a Sammelfrucht von *Rubus idaeus*, b dieselbe längsdurchschnitten.


Abb. 384. *Fragaria vesca*.

Abb. 385. Eine Erdbeerblüte, längsdurchschnitten und vergrößert, um die auf dem eßbaren, kegelförmigen Fruchtboden aufsitzenden Einzelfruchtknoten zu zeigen.

*Cydonia vulgaris*, die gemeine Quitte, trägt gleichfalls eßbare Früchte (Abb. 375) und liefert schleimreiche Sem. Cydoniae. *C. japonica*, aus Japan stammend, ist ein häufig kultivierter, schön blühender Gartenstrauch.

*Mespilus germanica* trägt Früchte, welche ebenfalls eßbar sind (Mispeln, Abb. 376.)

### c) Rosoideae:

Off. *Rosa canina*, die Hundsrose (Abb. 379, 380), wächst bei uns wild und liefert Fruct. und Sem. Cynosbati. Von den zahlreichen anderen Rosenarten ist eine Anzahl als Gartenzierpflanzen durch Kultur zu einer ganz außerordentlichen Mannigfaltigkeit von Varietäten und Bastarden ausgebildet worden. Unter ihnen sind zu nennen *R. gallica*, die Essigrose, mit purpurroten Blumenblättern, und *R. centifolia*, die Centifolie, mit rosafarbenen Blumenblättern.



Abb. 386. *Poterium sanguisorba*.



Abb. 387. *Agrimonia eupatoria*.

Beide liefern Flores Rosae. — *R. damascena*, die Damascener- oder Monatsrose, stammt aus dem Orient und liefert besonders in Bulgarien Oleum Rosae, welches neuerdings aus derselben Art auch in Deutschland (Sachsen) gewonnen wird.

*Ulmaria palustris* (= *U. pentapetala*, Abb. 390), an feuchten Ufern und auf Wiesen bei uns häufig, liefert Flores Ulmariae. *U. filipendula*, an denselben Standorten wie vorige Art, liefert Rad. Filipendulae.

*Potentilla verna*, das Frühlings-Fingerkraut, und andere *P.*-Arten sind bei uns häufige Wiesenkräuter. *P. (Tormentilla) erecta*, die Rotwurz, wächst ebenfalls bei uns wild und liefert Rhizoma Tormentillae.

*Geum urbanum*, die Nelkenwurz (Abb. 381), in feuchten Gebüschern wildwachsend, ist die Stammpflanze von Rhizoma Caryophyllatae.

*Rubus idaeus*, der Himbeerstrauch (Abb. 382, 383) und *R. caesius*; *R. ulmifolius* u. v. a. m., Brombeersträucher, liefern in zahllosen Formen beliebtes Beerenobst. Aus den Früchten des ersteren wird Sirup. Rubi Idaeii gewonnen.

*Fragaria vesca*, die Wald-Erdbeere (Abb. 384, 385), wächst bei uns wild. Andere Arten, namentlich *F. elatior* und *F. virginiana*, sind in Kultur genommen und liefern mit ihren mannigfachen Varietäten und Bastarden die geschätzten „Ananas-Erdbeeren“.

*Poterium sanguisorba* (Abb. 386), fälschlich Gartenpimpinelle genannt, wächst auf Wiesen wild.

*Agrimonia eupatoria*, Odermennig (Abb. 387), wächst in Gebüsch wild und liefert Herb. Agrimoniae.

Off. *Hagenia abyssinica* (auch *Brayera anthelmintica* genannt), der Kussobaum (Abb. 388, 389), ist in Abyssinien und anderen Hochgebirgen des tropischen Afrika heimisch und zeichnet sich durch getrenntgeschlechtige Blüten und hinfallige Blumenblätter aus, sowie durch das Vorhandensein eines Nebenkelchs, dessen Blätter sich an den weiblichen Blüten nach dem Verblühen stark vergrößern. Liefert Flor. Koso.



Abb. 388. *Hagenia abyssinica*.




Abb. 389. *Hagenia abyssinica*: *B* männliche, fünfzählige Blüte mit großen Kelchblättern, welche den Nebenkelch verdecken; *C* weibliche, vierzählige Blüte mit vergrößertem Nebenkelch und dem auf diesem aufliegenden normalen Kelch; die kleinen linealischen Blumenblätter sind weggelassen, resp. schon abgefallen; *D* weibliche Blüte im Längsschnitt.

#### d) Prunoideae:

*Prunus insititia*, die Pflaume, *P. domestica*, die Zwetsche und eine weitere Anzahl Prunusarten, wie *P. italica*, die Reineclaude und *P. armeniaca*, die Aprikose, *P. cerasus* (Abb. 391), die Sauerkirsche, *P. avium*, die Süßkirsche, liefern beliebtes Tafelobst. Sie stammen fast sämtlich aus Asien, nur die Süßkirsche ist europäischen Ursprungs. — *P. spinosa*, der Schlehdorn (Abb. 392), ist die Stammpflanze der sogenannten Flores Acaciae. — *P. laurocerasus* (Abb. 393), der Kirschlorbeer, in Kleinasien heimisch, bei uns im Freien anhaltend, hat blausäurehaltige Blätter, welche zur Bereitung von Aqua Laurocerasi dienen.

Off. *P. amygdalus* (= *Amygdalus communis*), der Mandelbaum, stammt aus Zentralasien, wird im Orient und in Südeuropa angebaut und liefert die

Mandeln (Abb. 394). Süße und bittere Mandeln (*Amygdalae*) sind die Samen zweier Formen derselben Art.

*P. persica* (= *Persica vulgaris*), ist die Stammpflanze der Pfirsiche. Sie stammt aus Nordchina. Ihre Früchte bilden ein geschätztes Tafelobst; aus ihren Samen wurde ursprünglich Persicolikör bereitet.



Abb. 390. *Ulmaria palustris*. A blühende Pflanze, B Knospe, C Blüte, D dieselbe im Längsschnitt, E Gynaeceum, F dasselbe quer durchschnitten, G Frucht, H Samen.

### Leguminosae.



Familie der Hülsenfrüchtler.

Blüten mit doppelter Blütenhülle, fünfgliedrig, mit zahlreichen oder meist in zwei Kreisen stehenden Staubblättern, hypogyn, strahlig oder zygomorph. Nur ein Fruchtblatt vorhanden, dieses einen einfächerigen Fruchtknoten bildend mit zahlreichen Samenanlagen an der Bauchnaht. Frucht eine Balgfrucht (Hülse). Samen ohne Nährgewebe mit dicken Kotyledonen.

Diese große und wichtige, etwa 7000 Arten umfassende Familie wird in folgende drei Unterfamilien (die auch oft als Familien behandelt werden) eingeteilt:



Abb. 391. *Prunus cerasus*.

Abb. 392. *Prunus spinosa*.Abb. 393. *Prunus laurocerasus*.Abb. 394. Frucht von  
*Prunus amygdalus* im  
Begriff sich zu öffnen.Abb. 395. *Acacia arabica*.

1. Unterfamilie **Mimosoideae.**

Es sind dies Holzwächse oder Kräuter mit meist paarig gefiederten Blättern. Die Blüten sind regelmäßig, die Blumenblätter in der Knospenlage klappig. Die Blütenformel ist:  $K 5 C 5 A 5 - 10 - \infty G^1$ . In der Zahl der Staubgefäße herrscht große Mannigfaltigkeit. Die

Abb. 396. *Acacia catechu*.

meist sehr kleinen Blüten stehen häufig in Köpfchen, welche oft wiederum ährenartig gruppiert sind.

*Mimosa pudica*, überall in den Tropen eingebürgertes Unkraut, wird wegen der auffallenden Empfindlichkeit seiner Blätter und Blättchen häufig in Warmhäusern gehalten.

Off. *Acacia senegal* (Syn. *A. verec*), *A. arabica* (Abb. 395) und andere Arten, welche im tropischen Afrika einheimisch sind, liefern Gummi arabicum; von ersterer Art stammt die officinelle Sorte. *A. catechu* (Abb. 396) wächst in Indien und liefert neben der nicht hierher gehörigen *Ourouparia gambir* das

Catechu. Zahlreiche Arten von *Acacia* mit gefiederten Blättern (Afrika) oder mit Phyllodien (blattlose, aus Australien) werden neuerdings unter dem Namen „Mimosen“ als Schnittpflanzen von der Riviera eingeführt.

*Stryphnodendron barbatimao*, in Brasilien heimisch, ist die Stammpflanze von Cort. adstring. Brasiliens.

## 2. Unterfamilie **Caesalpinioideae.**

Die Blüten dieser Unterfamilie sind in ihrem Bau denjenigen der Papilionatae oft ziemlich ähnlich, haben jedoch, trotzdem sie typisch zygomorph sind, meist keine schmetterlingsförmige Gestalt.



Abb. 397. *Cassia fistula*.



Abb. 398. *Tamarindus indica*.

Die Blumenkronblätter sind in der Knospe in aufsteigender Deckung, also umgekehrt als bei den Papilionatae, eingefügt. Zuweilen sind die Blumenblätter unvollkommen, zuweilen fehlen sie ganz. Die Staubgefäße sind in Zahl und Stellung recht verschieden, oft stark reduziert, frei oder miteinander verwachsen. — Die Caesalpinioideen sind ausnahmslos Holzgewächse, seltener Kräuter wärmerer Klimate und tragen gefiederte Blätter.

*Caesalpinia brasiliensis* ist die Stammpflanze des Fernambukholzes, *C. sappan* diejenige des Sappanholzes, welche beide zum Färben dienen. Beide Arten sind im tropischen Amerika heimisch.

Off. *Cassia angustifolia* und *C. acutifolia*, auch *C. obovata*, im tropischen Ostafrika einheimisch, sind Halbsträucher mit paarig gefiederten Blättern, deren Fiederblättchen als *Folia Sennae* officinell waren. Neuerdings ist nur noch erstere gebräuchlich. *C. fistula* (Abb. 397) hat dasselbe Verbreitungsgebiet und ist die Stammpflanze der *Fruet. Cassiae fistulae*.

Off. *Tamarindus indica* (Abb. 398), wahrscheinlich im trop. Afrika heimisch und in den Tropen überall kultiviert, ist ein immergrüner Baum mit paarig gefiederten Blättern und großen gelben und roten Blüten. Das Mus der Früchte bildet die officinelle Pulpa *Tamarindorum*.



Abb. 399. *Copaifera officinalis*.

Off. *Copaifera officinalis* (Abb. 399), *C. guianensis* und andere Arten, in Zentralamerika und dem nördlichen Südamerika heimische Bäume, sind die Stammpflanzen des Balsamum Copaivae.

*Trachylobium verrucosum*, ein in Ostafrika heimischer, hoher Baum, liefert den besten, den sogen. Sansibar-Kopal.

*Hymenaea courbaril*, in Brasilien heimisch, gibt den amerikanischen Kopal.

Off. *Krameria triandra*, ein auf den Anden Perus einheimischer, niedriger, silberhaariger Strauch, ist die Stammpflanze von Rad. Ratanhiae.

**Haematoxylon campechianum**, in Mexiko heimisch, liefert Lignum Campechianum.

**Ceratonia siliqua** (Abb. 400), liefert Johannisbrot und gedeiht in den Mittelmeerländern.

### 3. Unterfamilie **Papilionatae.**

#### Schmetterlingsblütler.

Diese Unterfamilie hat ihren Namen von der charakteristischen Form der Blüte, welche man mit dem Namen Schmetterlingsblüte (Abb. 401, 1) bezeichnet. Diese ist unregelmäßig, aber symmetrisch gebaut. Von den fünf Kelchblättern bilden zwei die Oberlippe, drei




Abb. 401. 1 Eine Papilionatenblüte; 2 die einzelnen Blumenblätter in ihrer gegenseitigen Stellung: v die Fahne, Vexillum; a die beiden Flügel, Alae; c der Kiel, Carina.

die Unterlippe, oder eins die Oberlippe und vier die Unterlippe. Die Blumenkronblätter sind in absteigender Deckung (Abb. 403) eingefügt. Das oberste (hinterste) Blumenblatt (Abb. 401, 2 v) ist meist viel größer als die übrigen und wird die Fahne (Vexillum) genannt. Die beiden seitlichen Blumenblätter (a) bilden die Flügel (Alae) und




Abb. 402. A Eine von den Blumenblättern befreite Papilionatenblüte: a der Kelch, b neun Staubgefäße zu einem Bündel verwachsen, d das zehnte freie Staubgefäß, c die Narbe des Griffels; B das Gynaeceum einer Papilionatenblüte: f der Fruchtknoten, g der Griffel, n die Narbe.

die beiden unteren Blumenblätter (c) den Kiel (Carina). Die vorhandenen zehn Staubgefäße sind entweder sämtlich mit ihren Filamenten zu einem röhrenförmigen Bündel verwachsen, oder aber das oberste derselben ist von der Verwachsung freigeblichen (Abb. 402, A). Im letzteren Falle gehört die Pflanze der XVII. Klasse nach Linné (Diadelphia), im ersteren der XVI. Klasse (Monadelphia) an. Die

Blütenformel ist:  $K_5 C_5 A_5 + 5G^1$  (Abb. 403). Die Frucht ist eine Hülse (Legumen), wird jedoch bei den Erbsenfrüchten (Abb. 404) im Volksmunde fälschlicherweise als „Schote“ bezeichnet (Schotenfrüchte besitzen fast nur die Cruciferen). Die Hülsen öffnen sich bei der Reife meist an Bauch- und Rückennaht zugleich. Durch Einschnürung und Bildung falscher Scheidewände zwischen den Samen



Abb. 403. Grundriß einer Papilionatenblüte.



Abb. 404. Frucht einer Papilionate (*Pisum sativum*): *m* Rückennaht, *v* Bauchnaht.

Abb. 405. *Melilotus officinalis*. *A* Blühender Zweig ( $\frac{1}{2}$ ), *B* ganze Blüte von der Seite gesehen ( $\frac{1}{2}$ ), *C* Fahne, *D* Flügel, *E* Schiffehen ( $\frac{1}{2}$ ), *F* Kelch mit Staubblattsäule und Griffel ( $\frac{1}{2}$ ), *G* reife Frucht ( $\frac{1}{2}$ ).

entsteht die Gliederhülse. Diese kommt jedoch nur selten vor. Die Blüten bilden stets seitlich stehende, meist traubenförmige Blütenstände ohne Gipfelblüte. Die Blätter der Papilionatae sind gefiedert und mit Nebenblättern versehen. Die Papilionatae sind einjährige bis ausdauernde, häufig rankende Kräuter, Sträucher oder Bäume gemäßigter, sowie auch heißer Klimate.

Off. *Melilotus officinalis* und *M. altissimus*, Honigklee (Abb. 405), auf Wiesen häufig, sind die Stammpflanzen der Herb. Meliloti und enthalten Cumarin.

Off. *Trigonella foenum graecum*, der Bockshornklee, wird als Viehfutter sowohl, wie auch zur Gewinnung von Sem. Foenugraeci, namentlich im Mittelmeergebiet angebaut.

Off. *Astragalus adscendens*, *A. leioclados*, *A. brachycalyx*, *A. gummifer*, *A. microcephalus*, *A. pycnoclados* und *A. verus* (Abb. 406) wachsen in Kleinasien und Vorderasien. Von sämtlichen genannten

Abb. 406. *Astragalus verus*.Abb. 407. *Glycyrrhiza glabra*.

Arten wird Tragacantha gewonnen. Die Gattung *Astragalus* ist mit über 1600 Arten wohl die artenreichste Gattung des gesamten Pflanzenreichs.

Off. *Glycyrrhiza glabra*, besonders die var. *glandulifera* (Abb. 407), wild in Südeuropa und in Südrußland, wird häufig angebaut zur Gewinnung von Rad. Liquiritiae und Succus Liquiritiae (Lakritzen).

Off. *Ononis spinosa*, Hauhechel, ist stellenweise an Rainen ein lästiges Unkraut und liefert Rad. Ononidis.

*Spartium scoparium* (*Sarothamnus scoparius*), der Besenginster liefert Flor. Spartii.

*Genista tinctoria* ist dem vorhergehenden sehr ähnlich und wurde früher gleichfalls medizinisch angewendet.

*Laburnum vulgare*, der Goldregen, ist als Zierstrauch bei uns viel angepflanzt und wegen seiner giftigen Samen bekannt.

*Trifolium*, der Klee, ist in zahlreichen Arten bei uns verbreitet. Die Blüten von *T. arvense* sind in der Volksmedizin gebräuchlich. *T. pratense*, wichtigste Futterpflanze, auch hochgeschätztes Bienenfutter.

*Phaseolus*, die Bohne, *Vicia*, die Wicke, *Lens*, die Linse, *Pisum*, die Erbse, gehören zu den wichtigsten Kulturpflanzen und Nährstofflieferanten des Menschen; sie werden z. T. in zahlreichen Arten und verschiedenen Formen bei uns angebaut und dienen als Nahrungsmittel für Menschen und Tiere (sogen. Hülsenfrüchte).



Abb. 408. *Arachis hypogaea*, die Erdnuß. A blühende und fruchtende Pflanze, B Hülse, C aufgeschnittene und zwei Samen zeigende Hülse.

*Arachis hypogaea*, die Erdeichel oder Erdnuß, in Südamerika heimisch, zeichnet sich durch eigentümliche, unter der Erde zur Reife kommende Früchte aus, aus welchen das wie Olivenöl gebrauchte Arachisöl oder Erdnußöl gepreßt wird (Abb. 408).

Off. *Myroxylon balsamum*, var. *Pereirae*, ist ein immergrüner Baum der Westküste von Zentralamerika und liefert Balsamum Peruvianum. *M. balsamum*, var. *genuinum* (Abb. 409), ein im nördlichen Südamerika heimischer, fiederblättriger Baum, ist die Stamm-pflanze des Balsamum Tolutanum.

*Physostigma venenosum* (Abb. 410), eine bohnenähnliche Schling-pflanze des tropischen Westafrikas mit purpurnen Blütentrauben, ist die Stamm-pflanze der Fabae Calabaricae und des Physostigmins.

Off. *Andira araroba*, ein hoher Baum Südamerikas mit unpaarig gefiederten Blättern und violetten Blütenrispen, liefert Chrysarobin.

**Pterocarpus marsupium** und **P. indicus**, in Ostindien einheimisch, sind hauptsächlich die Stammpflanzen des Kino. **P. draco** liefert das amerikanische Drachenblut.

**Indigofera tinctoria**, ein Halbstrauch Ostindiens, ist die Stammpflanze des Indigo, welcher aus dem Kraute der Pflanze durch Gärung gewonnen wird, aber durch den künstlichen Indigo schon stark zurückgedrängt worden ist.

**Robinia pseudacacia**, in Nordamerika heimisch, in Europa als „Akazie“ überall eingebürgert.

**Dipteryx odorata**, in Venezuela und Guiana heimisch, liefert Samen Tonco.



Abb. 409. *Myroxylon balsamum*, var. *genuinum*, der Tolubalsambaum.

**Anthyllis**, Wundklee, **Lotus**, Schotenklee, **Medicago**, Schneckenklee, Luzerne, **Lupinus**, Lupine, **Lathyrus**, Platterbse, **Onobrychis**, Esparsette, **Coronilla**, Kronwicke, **Ornithopus**, Vogelfuß, **Serradella**, sind weitere Gattungen, welche die Unterfamilie der Papilionatae in unserem Klima vertreten.

#### 14. Reihe. **Geraniales**, Storchschnabelartige.

Blüten hypogyn, mit doppelter Blütenhülle, fünfzählig, gewöhnlich aktinomorph mit meist vollzähligen Kreisen. Der Fruchtknoten ist synkarp, gefächert. Die Samen-

anlagen sind anatrop, hängend, mit ventraler Raphe und nach oben gekehrter Mikropyle, oder, wenn mehr als eine Samenanlage vorhanden, einzelne mit dorsaler Raphe und der Mikropyle nach unten (Abb. 411).

### Geraniaceae.

Familie der Storchschnabelgewächse.

Die aktinomorphen Blüten sind vorwiegend regelmäßig, mit fünf oder zehn Staubgefäßen und zwei Samenanlagen in jedem Fruchtknotenfache. Die Karpelle sind nach oben grannenartig verlängert und



Abb. 410. *Physostigma venenosum*.




Abb. 411. Plazentation der Samenanlagen bei den Geraniales. A Hängende Samenanlage mit ventraler Raphe *v* und nach oben gerichteter Mikropyle. B Aufsteigende Samenanlage mit dorsaler Raphe *d* und nach unten gerichtete Mikropyle *p* Plazenta. (Schematisch.)

lösen sich bei der Reife von der bleibenden Mittelsäule ab. Es sind Kräuter oder Sträucher mit einfachen Blättern. Hauptverbreitungsgebiet der Familie ist das Kapland.

*Geranium pratense*, Wiesenstorchschnabel, und andere Arten dieser Gattung, wie *G. Robertianum*, *G. sanguineum*, *G. silvaticum*, *G. pu-*

Schule der Pharmazie IV. 5. Aufl.

22

sillum, *G. rotundifolium* und *G. molle* kommen sämtlich in unserem Klima überaus häufig vor.

*Erodium cicutarium*, Reiherschnabel, ist ebenfalls ein sehr häufiges Unkraut. Die Fruchtgrannen von *E. gruinum* dienen häufig als Hygrometer.

*Pelargonium*-Arten, im Kaplande heimisch, sind bei uns beliebte Zimmerpflanzen.

### **Oxalidaceae.**

Familie der Sauerkleegewächse.

Die aktinomorphen Blüten dieser Familie besitzen zehn Staubgefäße und in jedem Fruchtknotenfache mehrere Samenanlagen. Die Frucht ist eine Kapsel. Es sind Kräuter und Holzgewächse mit zusammengesetzten Blättern.

*Oxalis acetosella*, Sauerklee, Hasenklee, ist ein in Laubwäldern und feuchten Gebüsch häufiges, kleines Kraut mit schneeweißen, ansehnlichen, chasmogamen (d. h. sich öffnenden), und unscheinbaren kleistogamen (stets geschlossen bleibenden) Blüten, die auch durch Heterostylie ausgezeichnet sind. Zwei gelblühende Arten sind häufige Gartenunkräuter.

### **Linaceae.**

Familie der Leingewächse.

Die Leingewächse besitzen ebenfalls aktinomorphe Blüten mit fünfgliederigen Blütenblattkreisen. Die Blumenblätter sind in der Knospenlage gedreht. Die Blütenformel ist  $K 5 C 5 A 5 G^{(5)}$ . Die Frucht ist eine Kapsel, welche durch falsche Scheidewände in doppelt so viele Fächer geteilt ist, als Fruchtblätter vorhanden sind.

Off. *Linum usitatissimum*, der Lein oder Flachs (Abb. 412), ist die Stammpflanze von Sem. Lini. Die Samen liefern gekocht Schleim, gepreßt reichlich Öl (Leinöl), das bei Sauerstoffzutritt rasch erstarrt (trocknet) und deshalb zu Firnis, sowie zur Linoleumbereitung benützt wird. Die zähen Bastfasern des Stengels bilden nach geeigneter Herrichtung die zu Leinengespinnsten verarbeiteten Flachsfasern. *L. catharticum*, Purgierlein, ist ein häufiges Unkraut.

### **Erythroxylaceae.**

Familie der Cocagewächse.

Die Cocagewächse besitzen aktinomorphe Blüten. Ein Honigwulst verbindet die Staubgefäße an ihrem Grunde untereinander (Abb. 413 a, c). Die Blumenblätter tragen eigentümliche Anhängsel (Abb. 413 a, a, b). Die Blütenblattkreise sind durchweg fünfzählig. Die Cocagewächse sind Bäume und Sträucher der Tropengebiete und sind mit schuppenförmigen, blattachselständigen (intrapetiolen) Nebenblättern versehen (Abb. 413).

Off. *Erythroxylum coca* (Abb. 413) ist ein in den Anden Südamerikas heimischer Strauch mit unscheinbaren Blüten und kleinen roten Früchten, dessen Blätter (Fol. Coca) behufs Gewinnung des Kokain gesammelt werden. Er wird, wie neuerdings auch *E. novogranatense*, in der alten und neuen Welt viel kultiviert.

**Zygophyllaceae.**

Familie der Jochblättrigen Gewächse.

Die Zygophyllaceen sind meist tropische Holzgewächse oder Kräuter mit oft geflügelten Blattstielen, meist paarig gefiederten Blättern


Abb. 412. *Linum usitatissimum*Abb. 413. *Erythroxylum coca*.

Abb. 413a. *Erythroxylum coca*: a die Blüte, b ein Blumenblatt, c die am Grunde verwachsenen Staubgefäße.

und mit bleibenden Nebenblättern. Die Blüten sind regelmäßig, in allen Kreisen fünfzählig, mit zehn Staubgefäßen und nur wenig entwickeltem Diskus versehen.

Off. *Guajacum officinale*, ein im tropischen Zentral- und Südamerika heimischer Baum mit immergrünen, paarig gefiederten Blättern, liefert das offi-



Abb. 414. *Guajacum sanctum*.

zinelle, sehr harte und deshalb zur Herstellung von Kegelkugeln etc. benutzte Lign. Guajaci. *G. sanctum* (Abb. 414) unterscheidet sich nur wenig von der vorhergehenden Art und ist ebenfalls officinell.

### Rutaceae.

Familie der Rautengewächse.

Die Rautengewächse sind Holzpflanzen oder Kräuter der wärmeren Zonen mit abwechselnden, gefiederten oder gedrehten, Öldrüsen enthaltenden Blättern ohne Nebenblätter. Die Blüten sind regelmäßig und meist nach der Fünfzahl gebaut. In diesem Falle ist die typische Blütenformel  $K 5 C 5 A 10 G^{2-5}$ . Zwischen Staub- und Fruchtblättern befindet sich bei dieser Familie ein honigabsondernder Wulst, Diskus genannt (Abb. 417, C). Die Staubgefäße sind zuweilen (bei Citrus) zu Bündeln verwachsen (Abb. 417, C). Die Früchte sind

entweder mehrfächerig, oder seltener ist jedes einzelne Fruchtblatt für sich geschlossen.

*Ruta graveolens*, die Gartenraute (Abb. 415), ist in Südeuropa einheimisch, bei uns meist verwildert. Ihre Blüten sind gelb; die Gipfelblüte jedes Zweiges ist fünfzählig, alle übrigen Blüten vierzählig. Liefert *Folia Rutae* und *Oleum Rutae*.


Abb. 415. *Ruta graveolens*.Abb. 416. *Citrus aurantium*.

Abb. 417. *Citrus aurantium*. *A* Blatt mit geflügeltem Blattstiel, *B* Blüte, *C* dieselbe im Längsschnitt, die Blumenblätter größtenteils abgeschnitten, *D* Fruchtknoten im Querschnitt, *E* linke Hälfte einer halbierten Frucht, *F* Samen im Querschnitt.

*Dictamnus albus*, mit schönen, großen, rosafarbenen Blüten, im Mittelmeergebiet und Süddeutschland wachsend, ist die Stammpflanze von Rad. Dictamni.  
 Off. *Pilocarpus pennatifolius* (Abb. 418), ein in Brasilien wachsender Strauch mit immergrünen, gefiederten Blättern, und mehrere andere Arten der Gattung sind die Stammpflanzen der Folia Jaborandi.



Abb. 418. A und B *Pilocarpus Selloanus*. A blühender Zweig, B einzelne Blüte im Längsschnitt, C Frucht von *P. giganteus*, D Samen von *P. macrocarpus*, E–J *P. pennatifolius*, E einzelne Blüte, F Blattquerschnitt (oben in der Mitte einer Drüse), G Epidermis der Unterseite, H Teil der Frucht, J längsdurchschnittener Samen. (Nach A. Meyer und Engler.)

*Cusparia trifoliata* (auch *Galipea officinalis* oder *Cusparia febrifuga* genannt), im tropischen Amerika einheimisch, liefert die aromatische Angosturarinde, Cortex Angosturae.

*Barosma crenata* und andere *Barosma*-Arten, sowie *Empleurum serrulatum*, am Kap der guten Hoffnung heimisch, liefern Folia Bucco.

Off. *Citrus aurantium*, var. *amara*, die Pomeranze (Abb. 416, 417), liefert Folia Aurantii, Flor. Aurantii, Fruct. Aurant. immatur. und Cort. Aurantii

Fruct.; von der Var. *dulcis* stammen die Apfelsinen, die in Südeuropa, besonders auf Sizilien und im östlichen Spanien, massenhaft gebaut werden. — *C. medica* liefert die Citronen, Fruct. Citri, sowie Cort. Citri Fruct. — *C. bergamia* liefert Ol. Bergamottae. Einige Arten der Gattung *Citrus* zeichnen sich durch einen geflügelten Blattstiel aus (Abb. 417).

### Simarubaceae.

Familie der Bitterholzgewächse.

Die Simarubaceen sind durchweg tropische Holzgewächse. Der Blütenbau ist demjenigen der Rutaceae ganz ähnlich. Die Gewächse



Abb. 419. *Quassia amara*. A Blühender Zweig, B Blüte im Längsschnitt, C Antheren, D Staubblattbasis von vorn und von hinten, E Frucht.

dieser Familie zeichnen sich durch reichen Gehalt an Bitterstoffen aus. Öldrüsen in den Blättern, wie sie den Rutaceen eigen sind, fehlen den Simarubaceen.

Off. *Quassia amara* (Abb. 419), im tropischen Amerika heimisch, und *Picraena excelsa*, auf Jamaica und den kleinen Antillen heimisch, liefern Lignum Quassiae, erstere Lignum Quassiae surinamense, letztere Lignum Quassiae jamaicense.

### Burseraceae.

Familie der Balsambaumgewächse.

Die Burseraceae, ebenfalls eine Familie tropischer Holzgewächse, weichen im Bau ihrer Blüten ebenso wie die Simarubaceen von demjenigen der Rutaceenblüten nur unwesentlich ab. Ein Charakteristikum der Familie sind die in der Rinde der Stämme verlaufenden, starken, schizolysigenen Harzkanäle.

Off. *Commiphora* (auch *Balsamodendron* genannt) *abyssinica* und andere Arten, in Nordostafrika heimisch, liefern Myrrha.

*Boswellia Carteri* und andere *Boswellia*-Arten, sämtlich im nordöstlichen Afrika heimisch, liefern Olibanum.

*Teica icicariba*, in Südamerika wachsend, sowie *Canarium commune*, im indisch-malayischen Gebiet einheimisch, sind hauptsächlich die Stammpflanzen des Elemi.

### Polygalaceae.

Familie der Kreuzblumengewächse<sup>1)</sup>.

Die Blüten der Polygalaceen sind medianzygomorph (Abb. 420). Der Bau der Polygala-Blüte ist folgender (Abb. 420 und 421, 422): Von den fünf Kelchblättern sind die drei äußeren gleichmäßig als gewöhnliche grüne Kelchblätter (Abb. 421, 1*k*), die beiden inneren jedoch ungleich größer und blumenblattartig ausgebildet (*a*). Diese sind so groß, daß sie durch flügelartiges Zusammenneigen die übrigen Blütenorgane fast völlig verdecken. Von den Blumenblättern sind nur drei entwickelt, und zwar das vordere unverhältnismäßig groß, schiffchenförmig, vorn mit einem Kamm versehen (Abb. 421, 1*c*). Die vorhandenen acht Staubgefäße sind zu einem oben offenen, vorn tief gespaltenen Bündel verwachsen (Abb. 421, 4*st*). Linné hielt das Staubgefäßbündel wegen der tiefen Spaltung für zwei Bündel, und deshalb gehört Polygala zu Linnés XVII.,




Abb. 420. Grundriß der Polygalablüte: 4 Deckblatt, α und β Vorblätter.

nicht XVI. Klasse. Der Fruchtknoten ist zweifächerig mit nach hinten gekrümmtem Griffel (Abb. 421, 3 u. 4*p*). Die Blütenformel ist:  $K 5 C 3 A (8) G^{(2)}$ . Die Frucht ist eine zweifächerige, von der Seite zusammengedrückte Kapsel (Abb. 421, 3). Die Kreuzblumengewächse sind Kräuter oder Sträucher verschiedener Klimate mit stets ganzrandigen Blättern. Sie zeichnen sich durch Bitterstoff- und Saponin-gehalt aus.

<sup>1)</sup> Nicht zu verwechseln mit den Kreuzblütlergewächsen, den Cruciferae.

Off. *Polygala amara*, die bittere Kreuzblume (Abb. 422), wächst bei uns wild und liefert Herba Polygalae. — *P. senega*, ein in Nordamerika wild-




Abb. 421. 1 Blüte von *Polygala vulgaris*; *k* äußere Kelchblätter, *a* innere Kelchblätter oder Flügel, *d* bis zur Basis gespaltene Oberlippe, *c* Unterlippe mit Kamn; 2 Frucht mit den beiden Flügeln; 3 *g* geöffnete Frucht, *h* dieselbe im Querschnitt; 4 *p* Pistill, *st* die verwachsenen Staubgefäße.




Abb. 422. *Polygala amara*. *A* Habitus ( $\frac{1}{2}$ ), *B* ganze Blüte ( $\frac{1}{1}$ ), *C* diese im Längsschnitt ( $\frac{1}{1}$ ), *D* Staubbeutel von innen gesehen ( $\frac{2}{1}$ ), *E* Fruchtknoten mit Griffel und Narbe ( $\frac{1}{1}$ ), *F* Querschnitt durch den Fruchtknoten ( $\frac{1}{1}$ ), *G* Frucht ohne die Blütenhülle ( $\frac{1}{1}$ ), *H* diese quer durchgeschnitten ( $\frac{1}{1}$ ), *J*, *K* Samen von der Seite und von vorn gesehen ( $\frac{1}{1}$ ), *L* derselbe im Längsschnitt ( $\frac{1}{1}$ ).

wachsendes, kleines, schmalblättriges Kraut mit weißen oder rötlichen Blütentrauben, liefert *Radix Senegae*.


**Euphorbiaceae.**

Familie der Wolfsmilchgewächse.

Die Familie der Wolfsmilchgewächse nimmt im Pflanzensystem eine ziemlich isolierte Stellung ein, denn ihre Blüten weisen mannig-

Abb. 423. *Ricinus communis*.Abb. 423 a. Verzweigtes Staubgefäß von *Ricinus communis*.Abb. 423 b. Ricinussamen. *A* Samen von vorn, *B* von hinten, *C* und *D* die beiden verschiedenen Längsschnitte, *E* Querschnitt ( $\frac{3}{2}$ ); *ka* Caruncula.

fache Eigentümlichkeiten auf. Sie sind stets getrenntgeschlechtig, einhäusig oder zweihäusig. Bei den meisten Wolfsmilchgewächsen

Abb. 424. *a* Blütenstand von *Euphorbia peplus*; *b* Blütenstand von *Euphorbia helioscopia*; *a* und *b* Hülle, *g* Honigdrüsen, *c* weibliche, *f* männliche Blüten; *h* eine aus einem einzigen Staubfaden bestehende männliche Blüte.

ist eine einfache Blütenhülle (Perigon), zuweilen aber auch noch eine doppelte Blütenhülle (Kelch und Krone) vorhanden. Staubgefäße können in der Zahl 1 bis  $\infty$  existieren; bei *Ricinus* sind dieselben verzweigt (Abb. 423 a). Fruchtblätter sind meist drei vorhanden. Die

Frucht ist fast stets eine in drei Teilfrüchte (Kokken) sich spaltende Kapsel. Der Samen enthält reichlich Nährgewebe (Abb. 423 b).




Abb. 425. *Euphorbia resinifera*. *A* Spitze eines blühenden Zweiges ( $\frac{3}{4}$ ), *B* junges männliches Cyathium ( $\frac{1}{1}$ ) *C* ein anderes älteres, dessen einzige weibliche Blüte sich bereits zur Frucht entwickelt ( $\frac{1}{1}$ ).



Abb. 426. *Croton tiglium*.

Bei der Gattung **Euphorbia** bilden die aus einem einzigen Staubgefäß bestehenden männlichen Blüten (Abb. 424, *h*) und die aus einem gestielten Fruchtknoten bestehenden weiblichen Blüten einen eigentümlichen Blütenstand, der wie eine Einzelblüte aussieht (Abb. 424 und 425) und *Cyathium* (von *κύαθος*, *kyathos* = Becher) genannt wird. Er besteht aus zwei bis zwölf männlichen



Abb. 427. *Mallotus philippinensis*: *a* Zweig einer männlichen, *b* einer weiblichen Pflanze.

Blüten von der Form eines gegliederten Staubgefäßes, dessen unterer Teil (Abb. 424, *h*) den Blütenstiel darstellt, und aus je einer die männlichen Blüten überragenden weiblichen Blüte (Abb. 424, *c*). Diesen Blütenstand umhüllt ein krugförmiges, am Rande oft mit halbmondförmigen Drüsen besetztes Achsengebilde.

Die Wolfsmilchgewächse sind häufig Milchsaft führende Kräuter, Sträucher oder Bäume, von zuweilen kaktéenartigem Habitus.

**Ricinus communis** (Abb. 423), eine in Ostindien oder Afrika einheimische Pflanze, liefert Sem. Ricini und Öl. Ricini.

Off. **Croton tiglium** (Abb. 426), ebenfalls in Ostindien heimisch, liefert Sem. Crotonis und Öl. Crotonis. — **C. eluteria**, auf den Bahamainseln wachsend, ist die Stammpflanze von Cort. Cascarillae.

Off. **Mallotus philippinensis** (auch *Rottlera tinctoria* genannt), (Abb. 427), ist auf den Inseln des Indischen Archipels heimisch und liefert Kamala (die Drüsenhaare der Früchte).

**Aleurites moluccana**, ein in den Tropengebieten der Erde jetzt überall kultivierter Baum, liefert in seinen Samen sehr reichlich fettes Öl, welches besonders in neuerer Zeit für die Technik sehr wichtig geworden ist.

**Hevea brasiliensis** und andere Arten dieser Gattung, im tropischen Amerika heimisch, liefern den besten, den sogen. Para-Kautschuk.

**Manihot Glaziovii** und andere in Brasilien einheimische Arten der Gattung liefern Kautschuk und werden jetzt überall in den Tropen der Erde kultiviert. — **M. utilisissima**, im tropischen Amerika heimisch, liefert essbare Wurzelknollen und aus ihnen das geschätzte Maniok-Mehl.

Off. **Euphorbia resinifera**, ein in Nordafrika heimischer, laubloser, dorniger Strauch von kaktusähnlichem Aussehen (Abb. 425), ist die Stammpflanze des Euphorbium. — **E. cyparissias**, **E. peplus**, **E. helioscopia** und andere *Euphorbia*-Arten sind bei uns häufige Unkräuter.




Abb. 428. Plazentation der Samenanlagen bei den Sapindales. *A* Hängende Samenanlage mit dorsaler Raphe *d* und nach oben gerichteter epitrone Micropyle. *B* Aufsteigende Samenanlage mit ventraler Raphe *v* und nach unten gerichteter, apotrone Micropyle; *p* Plazenta. (Schematisch.)

#### 15. Reihe. Sapindales. Seifenbaumartige.

Die Blütenverhältnisse sind dieselben wie bei der vorigen Reihe, aber die Samenanlage in entgegengesetzter Stellung, entweder hängend mit dorsaler Raphe und der Mikropyle nach oben, oder aufsteigend mit ventraler Raphe und mit der Mikropyle nach unten (Abb. 428).

### Anacardiaceae.

#### Familie der Sumachgewächse.

Die Sumachgewächse sind tropische oder subtropische Holzpflanzen mit schizolysigenen Harzgängen in der Rinde. Der Fruchtknoten ist zur Zeit der Reife stets einsamig, obwohl anfangs zuweilen mehrere Samenanlagen vorhanden sind. Die Frucht ist eine Steinfrucht (Abb. 431). Die meisten der Sumachgewächse sind durch einen Gehalt an sehr scharfen Stoffen (darunter Cardol) ausgezeichnet.

**Mangifera indica**, der Mangobaum, liefert ein geschätztes Tropenobst.

**Anacardium occidentale**, in Westindien einheimisch, mit sehr auffallendem Blütenbau (Abb. 429), ist die Stammpflanze der Frucht. *Anacard. occidentale*. (Abb. 430, 1.)

**Semecarpus anacardium**, in Ostindien einheimisch, ist die Stammpflanze der Frucht. *Anacard. orientale*. (Abb. 430, 2). Bei beiden beteiligt sich an der

Fruchtbildung auch der Fruchtstiel, indem er bei ersterem birnförmig, bei letzterem anderweit wulstig anschwillt. Er stellt bei der Reife ein geschätztes Obst dar.

*Rhus toxicodendron*, der Gift-Sumach (Abb. 431), ein nordamerikanischer Strauch, liefert die Fol. Toxicodendri. Im Harzsaft der ganzen Pflanze ist ein




Abb. 429. Grundriß der Blüte von *Anacardium occidentale*.




Abb. 430. 1 Frucht von *Anacardium occidentale*  
2 Frucht von *Semecarpus anacardium*: a Frucht  
b fleischig verdickter Fruchtstiel.

scharf reizender Stoff enthalten, der, schon in geringster Menge auf die Haut gebracht, schwere Entzündungen hervorruft. Ein oberflächliches Berühren der




Abb. 431. *Rhus toxicodendron*. A Stück der blühenden ♀ Pflanze, B ♂ Blüte, C ♀ Blüte längs durchschnitten, D Fruchtknoten mit Discus und darauf sitzenden 5 Staminodien, E Fruchtzweig, F Längsschnitt, G Querschnitt durch eine reife Frucht, Ex Exocarp, äußerste Schale, Me Mesocarp, Mittelschicht mit Harzgängen, H, En Endocarp, innere Steinschicht, Ss Samenschale, K Keimling.

Pflanze schadet dagegen nichts. — *Rh. cotinus* (= *Cotinus coggygria*), der Perückenbaum, liefert Fisetholz, *Rh. coriaria* die zum Gerben verwendete Sumach-Lohe. Beide sind im Mittelmeergebiet heimisch. — Von der ostasiatischen *Rh. semialata* stammen die gerbstoffreichen Gallae Chinesens.

*Pistacia lentiscus* ist im ganzen Mittelmeergebiet heimisch und liefert auf den Inseln des griechischen Archipels Mastix. — *P. vera*, in Südeuropa wildwachsend und auch angebaut, liefert die mandelartigen, eßbaren Pistaziensamen (Pistaziennüsse), *P. terebinthus*, ebenfalls mediterran, liefert „Cyprischen Terpenthin“ und sehr gerbstoffreiche Gallen.

### **Aquifoliaceae.**

Familie der Stechpalmengewächse.

Blüten klein, diöcisch, die Blumenblätter oft am Grunde mit den gleichzähligen Staubblättern vereinigt. Die Frucht ist eine 4—8-kernige Steinfrucht. — Sträucher oder Bäume mit meist immergrünen, einfachen Blättern.

*Ilex aquifolium*, die sogen. „Stechpalme“, ist in Süd- und Westeuropa verbreitet und findet sich stellenweise in Deutschland nicht selten. *I. paraguariensis* und andere Arten des tropischen Südamerika liefern den coffeinhaltigen sogen. Mate-Tee, welcher in Südamerika fast ausschließlich getrunken wird.

### **Aceraceae.**

Familie der Ahorngewächse.

Die Ahorngewächse sind Bäume mit gegenständigen Blättern und regelmäßigen (aktinomorphen) getrenntgeschlechtigen Blüten, acht Staubgefäßen und zweifächerigem Fruchtknoten mit zwei Samenanlagen in jedem Fache. Die Frucht ist eine geflügelte Spaltfrucht.

*Acer campestre*, Feldahorn, wächst in Süd- und Mittelddeutschland wild. Häufig angepflanzt werden *A. platanoides*, der spitzblättrige Ahorn, aus Süddeutschland stammend, und *A. pseudo-platanus*, der Bergahorn.

### **Sapindaceae.**

Familie der Seifenbaumgewächse.

Die Blüten der Seifenbaumgewächse sind durch einen außerhalb der Staubblattkreise liegenden, honigabsondernden Wulst (Diskus) charakteristisch. Die unregelmäßigen Blüten lassen sich nicht durch eine Linie, welche gleichzeitig die Achse schneidet, in zwei spiegelbildliche Hälften teilen, wohl aber durch eine schräg zur Achse stehende Linie: die Blüten sind also schräg zygomorph. Im übrigen entsprechen die Blüten in ihrem Bau dem fünfzähligen Dicotylentypus, doch fallen zuweilen einzelne Glieder darin aus. Die durchschnittliche Blütenformel ist:  $K 5 C 5$  oder  $4 A 8 G^{(5)}$ . — Zu den Seifenbaumgewächsen gehören nicht allein Bäume, sondern auch holzige Schlinggewächse und Kräuter.

*Sapindus saponaria*, der Seifenbaum, in Südamerika einheimisch, hat der Familie den Namen gegeben. Das Fleisch seiner Früchte wird wie Seife gebraucht.

*Paullinia cupana* (= *P. sorbilis*), ein in Brasilien heimisches Schlinggewächs, liefert die sehr coffeinhaltige, aus den Samen hergestellte Pasta Guarana.

*Aesculus hippocastanum*, die weiße Rofkastanie (Heimat Mazedonien), und *Pavia rubra*, die rote Rofkastanie (Heimat Nordamerika), sind bei uns

beliebte Alleebäume. — Auf diese beiden Gattungen (welche auch häufig unter *Aesculus* zusammengefaßt werden) hat man eine besondere Familie, die der **Hippocastanaceae** begründet, welche allerdings mit den Sapindaceen nächstverwandt ist.

#### 16. Reihe. **Rhamnales**, Faulbaumartige.

Blüte hypogyn, seltener peri- oder epigyn, aktinomorphen, mit doppelter Blütenhülle, haplostemon, die Staubblätter vor den Blütenhüllblättern stehend. Diskus meist vorhanden. Fruchtknoten zwei- bis fünfzählig, gefächert. — Meist Sträucher mit einfachen oder geteilten Blättern und kleinen Blüten.

#### **Rhamnaceae.**

Familie der Kreuzdorngewächse.

Die Blüten der Kreuzdorngewächse unterscheiden sich von denen der Weinrebengewächse namentlich durch die Ausbildung eines Achsengebildes (Receptaculum), welches hüllenförmig sich über den




Abb. 432. *Rhamnus cathartica*. A Knospe, B männliche Blüte, C weibliche Blüte, beide im Längsschnitt, K Kelchblätter, Bl Blumenblätter, Std Staminodien, r. F. rudimentärer Fruchtknoten.




Abb. 433. A Grundriß der vierzähligen Blüte von *Rhamnus cathartica*; B der fünfzähligen Blüte von *Rhamnus frangula*.

Fruchtknoten hinaufwölbt und auf seinem mit großen Kelchzähnen versehenen Rande nur unscheinbare Blumenblätter, sowie die Staubgefäße trägt (Abb. 432). Die Blütenblattkreise werden von der Fünf- oder Vierzahl beherrscht (Abb. 433, A und B). Die Frucht ist eine beerenartige Steinfrucht. Die Kreuzdorngewächse sind Bäume oder Sträucher.

Off. *Rhamnus frangula*, der Faulbaum, ein bei uns heimischer Strauch, liefert Cort. Frangulae. — *Rh. Purshiana*, in Nordamerika wachsend, ist die Stammpflanze der neuerdings stark in Aufnahme gekommenen Cort. Rhamni Purshianae oder Cascara Sagrada. — *Rh. cathartica*, der in Deutschland heimische Kreuzdorn, liefert Fruct. Rhamni cathart. und Sirup. Rhamni cathart., sowie den Farbstoff „Saftgrün“.

*Zizyphus vulgaris*, in den Mittelmeerländern heimisch, ist die Stammpflanze der Fruct. Jujubae.

### Vitaceae.

#### Familie der Weinrebengewächse.

Die Weinrebengewächse sind fast ausnahmslos mit Ranken kletternde Gewächse, deren zu Rispen — fälschlich Trauben (Weintrauben) genannt — vereinigte Blüten ziemlich unscheinbar sind. Die Blütenblattkreise sind mit Ausnahme der Fruchtblätter fünf- oder vierzählig, der zwischen Staubgefäßen und Fruchtknoten gelegene, honigabsondernde Wulst (Diskus) ist stark ausgebildet; der Fruchtknoten ist zweifächerig mit je zwei Samenanlagen in jedem Fruchtknotenfach (Abb. 434). Die Frucht ist eine Beere.

*Vitis vinifera*, der edle Weinstock, im Mittelmeergebiet und noch in Süddeutschland wildwachsend, liefert die Weintrauben, die Rosinen und den Wein. Eine besondere (kernlose) Varietät ist die Stammpflanze der kleinen Rosinen oder Korinthen.

*Parthenocissus quinquefolia* ist der sogenannte wilde Wein, in Nordamerika heimisch, bei uns als Ziergewächs gebräuchlich. Neuerdings wird die mit Haftscheiben klimmende *P. tricuspidata* (= *Vitis Veitchii*) mit auffallender Heterophyllie (einspitzigen Blättern an jungen Trieben, dreispitzigen Blättern am alten Holz) viel zur Bekleidung von Mauern benützt.



Abb. 434. Grundrisse der Blüte von *Vitis vinifera*. Die schraffierte Zone bedeutet den Diskus.

#### 17. Reihe. Malvales. Malvenähnliche.

Blüten hypogyn, aktinomorph, zwittrig, Kelch und Blumenkrone fünfblättrig. Das Androeceum ist in der Anlage fünfgliederig, wird aber durch Spaltung vielgliederig, gleichwohl bleibt dasselbe monadelphisch, d. h. nur die Staubfäden erscheinen verwachsen, während die Antheren frei bleiben. Der Fruchtknoten ist 2- bis  $\infty$  karpellig, in letzterem Falle durch Verwachsung zahlreicher Fruchtblätter entstanden und dieser Zahl entsprechend gefächert.

### Tiliaceae.

#### Familie der Lindengewächse.

Meist Holzgewächse der gemäßigten Zone, aber auch Kräuter, deren Blätter mit hinfalligen Nebenblättern versehen sind. Die Blüten sind regelmäßig und namentlich durch zahlreiche Staubgefäße

ausgezeichnet. Kelchblätter und Blumenkronblätter sind nicht verwachsen, die Staubfäden sind meist zahlreich und frei, nur zuweilen, und dann nur am Grunde, gruppenförmig vereinigt. Die Blütenformel (Abb. 435) ist:

$$K 5 C 5 A \infty G^{(2)}$$

Die Früchte sind Steinfrüchte oder Nüßchen.

Off. *Tilia platyphyllos*, die Sommerlinde und *T. cordata* (= *T. ulmifolia*), die Winterlinde, sind beliebte Alleebäume und liefern Flor. Tiliae (Abb. 436). Gesammelt werden die mit einem eigentümlichen blassen, häutigen Vorblatt (Abb. 436) versehenen Blütenstände. Beide Arten unterscheiden sich hauptsächlich dadurch, daß erstere nur 2–3 Blüten (daher auch *Tilia pauciflora* genannt), letztere hingegen 5–7 Blüten auf einem gemeinsamen Blütenstiele trägt.

*Corchorus olitorius* und *C. capsularis*, in Südasien heimisch, liefern die unter dem Namen Jute bekannte Gewebefaser.




Abb. 435. Grundriß der Lindenblüte.



Abb. 436. A Blütenstand der Winterlinde (*Tilia cordata*) ( $\frac{3}{4}$ ). B einzelne Blüte im Längsschnitt ( $\frac{3}{2}$ ). C Blütenstand der Sommerlinde (*Tilia platyphyllos*) ( $\frac{3}{4}$ ).

### Malvaceae.

Familie der Malvengewächse.

Die Kelchblätter sind am Grunde verwachsen, und die Blumenkronblätter sind nicht allein am Grunde unter sich, sondern auch mit den zu einer hohlen Säule vereinigten Staubfäden verwachsen

(Abb. 437, 1 und 2). Die sehr zahlreichen Staubgefäße hingegen sind an ihrer Spitze wiederum gespalten, und jeder Faden trägt nur eine halbe Anthere (Abb. 437, 3). Die Griffel sind zu einer Säule verwachsen, welche oben in eine der Zahl der Fruchtblätter




Abb. 437. 1 Blüte von *Althaea officinalis*, 2 dieselbe längsdurchschnitten, 3 Staubgefäß, 4 dasselbe nach dem Ausstreuen des Pollens, 5 Frucht, 6 Außenkelch von unten gesehen, 7 Pistill.

entsprechende Anzahl Narben sich pinselförmig teilt (Abb. 437, 7). Die Blütenformel (Abb. 438) ist daher  $K(5) [C(5) A(\infty)] G(\infty)$ . Die Malvengewächse gehören der XVI. Klasse nach Linné (Monadelphia) an. Die Frucht ist eine mehrfächerige, fachspaltige Kapsel, oder es sind zahlreiche, aus je einem Fruchtblatt hervorgegangene Teilfrüchtchen ringförmig vereinigt, welche zur Reifezeit auseinanderfallen (Abb. 437, 5). Eigentümlich ist den Malvengewächsen ferner ein aus Hochblättern gebildeter Hüllkelch (Außenkelch, Abb. 437, 6 und 441, a). Die Blüten stehen in Wickeln, die Blätter sind mit unscheinbaren, hinfälligen Nebenblättern versehen. Viele Malvengewächse zeichnen sich durch großen Schleimgehalt aus.




Abb. 438. Grundriß einer Malvenblüte (unterste Blüte einer Wickel):  $\gamma$ ,  $\delta$ ,  $\epsilon$  Außenkelch.

Off. *Malva neglecta* (= *M. vulgaris*) und *M. silvestris* (Abb. 439) haben einen dreiblättrigen Außenkelch und liefern Fol. Malvae, letztere auch die Flores Malvae.

Off. *Althaea officinalis*, der Eibisch (Abb. 440), sammetfilzig behaart, mit 6- bis 9-blättrigem Außenkelch, liefert Rad. Althaeae. — *A. rosea*, die Stockrose, ist eine beliebte Zierpflanze und in der dunkelrot blühenden Form die Stammpflanze der Flor. Malv. arbor.

Off. *Gossypium herbaceum* (Abb. 441), *G. arboreum* *G. barbadense* und andere *G.*-Arten, sämtlich in tropischen und subtropischen Gebieten der neuen und alten Welt einheimisch und angebaut, liefern in ihren Samenhaaren die Baumwolle.

### Sterculiaceae.

Familie der Kakaobaumgewächse.

Die Kakaobaumgewächse sind teilweise blumenblattlos. Es sind ebenfalls zahlreiche Staubgefäße vorhanden, von denen eine Anzahl




Abb. 439. *Malva silvestris*. A Blühender Zweig, B Staubblatt- und Griffelsäule, C Antheren, die linke nach dem Ausstreuen des Pollens, D Frucht.



Abb. 440. *Althaea officinalis*.



Abb. 441. *Gossypium herbaceum*: a Außenkelch, f aufgesprungene Frucht.

unfruchtbar (antherenlos) bleibt; am Grunde sind meist alle Staubfäden zu einer Röhre verwachsen, daher XVI. Klasse nach Linné (Monadelphia). Die Kelchblätter sind gleichfalls am Grunde verwachsen. Die Frucht ist eine Kapsel oder Beere.



Abb. 442. *Theobroma cacao*, der Kakaobaum. *A* blühender Zweig, *B* Blüte im Längsschnitt, *C* Staubblatt, *D* Diagramm der Blüte, *E* fruchttragendes Stammstück, *F* Frucht im Längsschnitt, die Samen zeigend, *G* Samen, *H* Samen im Längsschnitt, die Zerknitterung der Keimblätter zeigend.

Off. *Theobroma cacao*, Kakaobaum (Abb. 442), in den meisten Tropen-  
gegenden angebaut, ist ein immergrüner Baum mit großen, lanzettlichen Blättern  
und unmittelbar aus der Rinde hervorbrechenden roten Blüten. Liefert Sem.  
Cacao und das daraus gewonnene Ol. Cacao.

*Cola vera* und *C. acuminata*, ebenfalls tropische Bäume, in Westafrika  
heimisch, sind die Stammpflanzen von Sem. Colae.

#### 18. Reihe. **Parietales.** Wandsamige Gewächse.

Blüten häufig mit zahlreichen Staubblättern und  
Fruchtblättern, mit doppelter Blütenhülle, mit ober-  
ständigem bis unterständigem Fruchtknoten. Samen-  
anlagen häufig an wandständigen Plazenten (daher der  
Name der Reihe), die aber seltener auch in der Mitte des  
Fruchtknotens zusammentreffen können.

**Theaceae** (auch **Ternstroemiaceae** genannt).

## Familie der Teegewächse.

Diese Familie zeichnet sich durch zahlreiche Staubgefäße aus, welche auf dem Blütenboden eingefügt sind. Kelch- und Blumenblätter sind in der Fünzfahl vorhanden, der Fruchtknoten ist dreifächerig, die Frucht eine fachspaltige Kapsel.

Abb. 443. *Thea sinensis*.Abb. 444. *Garcinia Hanburyi*.

*Thea sinensis*, der Teestrauch (Abb. 443), wird im südlichen Asien in ausgedehntem Maße kultiviert und liefert *Thea nigra* sowohl wie *Thea viridis*. *Th. japonica* (*Camellia japonica*) ist die Kamellie, ein in Japan heimischer, bei uns in Warmhäusern vielfach kultivierter Zierstrauch.

**Guttiferae.**

## Familie der Guttigewächse.

Die Gewächse dieser Familie sind tropische Holzpflanzen mit schizogenen Harzgängen oder Sekretlücken und regelmäßigen, denen der Teegewächse ähnlichen Blüten, welche jedoch häufig getrenntgeschlechtlich sind und im Androeum eigenartige Spaltungen zeigen.

Off. *Garcinia Hanburyi*, der Gummiguttbaum (Abb. 444), im südöstlichen Asien wildwachsend, und andere Arten liefern Gutti.

Hierher gehört auch die Gattung **Hypericum** mit regelmäßigen Blüten und zahlreichen Staubblättern, die in drei oder fünf Bündeln stehen (daher zu Linnés Polyadelphia gehörig). Der Fruchtknoten ist ein- oder mehrfächerig, mit wandständigen Samenleisten. Die Blätter sind gegenständig und enthalten Sekretlücken.

*Hypericum perforatum*, Hartheu oder Johanniskraut, ist neben anderen Arten dieser Gattung in Deutschland sehr verbreitet und die Stammpflanze des früher gebrauchten Herb. Hyperici.

### Dipterocarpaceae.

Familie der Flügelfruchtgewächse.

Die Blüten sind denen der Theaceae und Guttiferae ähnlich, doch wachsen bei der Reife entweder alle 5 oder nur 3 oder 2 Kelchblätter unter der Frucht zu oft sehr großen Flügeln aus. In der Rinde finden sich stets Harzgänge.

*Dryobalanops camphora*, auf Borneo heimisch, liefert den Baroskampfer.

*Dipterocarpus turbinatus* und andere Arten der Gattung, in Ostindien heimische, mächtige Bäume, liefern Harz (Gurjunbalsam).

Off. Von mehreren Arten der Gattung *Shorea*, aber auch von Arten anderer Gattungen der Familie, wird auf Sumatra das Dammarharz gewonnen.

### Cistaceae.

Familie der Cistusgewächse.

Die Cistusgewächse sind kleine Sträucher oder einjährige Gewächse der Mittelmeerländer mit regelmäßigen (aktinomorphen) Blüten und zahlreichen Staubgefäßen. Der Fruchtknoten, aus drei bis fünf



Abb. 445. Grundriß der Blüte von *Viola*.




Abb. 446. Gynaecium von *Viola tricolor*:  
1 von Blumenblättern und Staubgefäßen  
befreit, 2 dasselbe quer durchschnitten,  
3 aufgesprungene Frucht.

Karpellen gebildet, ist einfächerig, mit wandständigen Samenleisten, der Griffel einfach, die Frucht eine Kapsel.

*Cistus creticus* und *C. ladaniferus* sind die Stammpflanzen des früher gebrauchten Ladanum.

*Helianthemum vulgare*, Sonnenröschen, ist einer der wenigen bei uns wild vorkommenden Vertreter dieser Familie.



Abb. 447. *Viola tricolor*. *A* Blühender Zweig, *B* Knospe, *C* die um den Fruchtknoten fest anliegenden Antheren, zwei von ihnen mit Spornen versehen, *D* ungespornte Antheren, *E* gespornte Antheren, *F* Gynaeceum, *G* aufgesprungene Frucht, *H* Fruchtknotenquerschnitt, *J* Samen.




Abb. 448. *Viola odorata*. Eine blühende, reichlich Ausläufer entwickelnde Pflanze.

**Violaceae.**

Familie der Veilchengewächse.

Die Gewächse dieser Familie haben meist zygomorphe Blüten, in deren Blütenblattkreisen die Fünffzahl vorherrscht. Niemals sind zwei Staubblattkreise vorhanden. Die Blütenformel (Abb. 445) ist:  $K_5 C_5 A_5 G^{(2)}$ . Die Frucht ist eine einfächerige, fachspaltige Kapsel mit wandständig sitzenden Samen (Abb. 446, 2 und 3). Die Veilchengewächse sind vorwiegend Kräuter; ihre Blätter sind mit Nebenblättern versehen.

Off. *Viola tricolor*, das Acker-Stiefmütterchen (Abb. 447), ist stellenweise auf Brachäckern überaus häufig. Seine Kelchblätter sind am Grunde mit Anhängseln versehen. Liefert Herb. *Violae tricoloris*. — *V. altaica* ist das in Gärten kultivierte Stiefmütterchen. — *V. odorata*, das wohlriechende Veilchen (Abb. 448), ist eine wegen ihres Wohlgeruchs beliebte Zierpflanze, aus deren Blüten auch Sirup. *Violarum* dargestellt wird.

**Passifloraceae.**

Familie der Passionsblumengewächse.

Diese sind rankende Kräuter und Sträucher mit großen, schön gefärbten Blüten, welche ein Androgynophor (vgl. S. 311) besitzen und oft eine aus röhrenförmigen Blütenachsenweiterungen bestehende Nebenkronen tragen (Abb. 449). Sie sind in den Tropen heimisch und bei uns als Zierpflanzen bekannt.

*Passiflora coerulea*, Blaue Passionsblume, ist ein Tropengewächs, an dessen Blüten Legenden vom Leiden Christi geknüpft werden.




Abb. 449. Längsschnitt durch die Blüte von *Passiflora edulis*. (Nach Baillon.)

**Caricaceae.**

Familie der Melonenbaumgewächse.

Blüten getrenntgeschlechtlich, strahlig, mit röhriger oder glockiger Blütenachse. Blumenblätter verwachsen. Fruchtknoten einfächerig, mit zahllosen Samenanlagen an 3–5 wandständigen Plazenten. — Krautbäume der Tropen, die sehr reich an Milchsafte sind und an der Spitze ihres meist unverzweigten Stammes einen Schopf mächtiger Blätter tragen.

*Carica papaya*, der Melonenbaum, wird seiner geschätzten Obstfrüchte halber überall in den Tropen kultiviert. Der Milchsafte enthält ein Ferment, das Eiweiß peptonisiert, frisches Fleisch schnell weich macht und Milch zum Gerinnen bringt.

19. Reihe. **Opuntiales**, Kaktusartige.

Blüten epigyn, aktinomorph, zwittrig, im Perianth und Androeceum spiralig; beide und das Gynaeceum aus einer großen, unbestimmten Zahl von Gliedern bestehend; Fruchtknoten einfächerig, mit zahlreichen wandständigen Samenleisten; Samenanlagen an langen Nabelsträngen; Beerenfrüchte.

**Cactaceae.**

## Familie der Kaktusgewächse.

Die Kaktusgewächse sind in tropischen und subtropischen Steppengebieten Amerikas heimische, meist blattlose Gewächse mit dickfleischigen, säulenförmigen oder kugelförmigen, walzigen, stumpfkantigen oder abgeplatteten Stengeln, welche statt der Blätter Büschel von Stacheln auf Höckern tragen. Die Blüten sind meist vereinzelt, groß und farbenprächtig. Der Bau derselben ist unter der Charakteristik der Reihe beschrieben, deren einzige Familie die Cactaceae sind.

*Opuntia coccionellifera*, Cochenille-Kaktus, in Mexiko heimisch und z. B. in Südeuropa angebaut, ist die Pflanze, auf welcher die Cochenille-Schildlaus, *Coccus Cacti*, lebt, die wegen ihres Karminfarbstoffes gezüchtet wird.

*Opuntia ficus indica* ist der aus Mexiko stammende, sogen. Feigenkaktus, welcher jetzt in wärmeren Gebieten der ganzen alten Welt, besonders im Mittelmeergebiet, eingebürgert ist. Die Frucht ist ein beliebtes Obst.

20. Reihe. **Myrtiflorae**, Myrtenblütige.

Blüten perigyn oder epigyn, meist aktinomorph, mit doppelter Blütenhülle; Androeceum aus einem oder zwei Kreisen bestehend, oft die einzelnen Glieder gespalten; Gynaeceum synkarp mit vollständiger Fächerung. Blätter meist gegenständig und ohne Nebenblätter. Kräuter und Holzgewächse, häufig mit Gehalt ätherischen Öles.

**Thymelaeaceae.**

## Familie der Seidelbastgewächse.

Holzpflanzen mit perigynen, oft nach der Vierzahl gebauten, kleinen, regelmäßigen Blüten, deren Kelch blumenkronenartig ausgebildet ist, während die Blumenblätter meist fehlen. Häufigste Blütenformel:  $K_4 C_0 A_8 G_1$ . In der Rinde reichlich zähe Bastfasern.



*Daphne mezereum*, Seidelbast oder Kellerhals, ein Strauch mit rosenroten, hyazinthenartig riechenden und sehr zeitig im Frühjahr vor den Blättern erscheinenden Blüten, in Gebirgswäldern heimisch, ist die Stammpflanze von Cortex Mezerei.

Aus den zähen, langen Bastfasern der Rinde mehrerer Arten der Familie (*Wikstroemia*, *Edgeworthia*) wird das beste Japanische Papier hergestellt.

**Punicaceae.**

Familie der Granatbaumgewächse.

Bäume mit ganzrandigen Blättern und schönen axillären Blüten. Blütenachse kreiselförmig. Kelchblätter 5—7, Blumenblätter 5—7, Staubblätter  $\infty$ , Fruchtblätter  $\infty$  (meist 8), unterständig, verwachsen,

Abb. 450. *Punica granatum*.Abb. 451. *Punica granatum*. *A* Blüte im Längsschnitt, *B* Querschnitt durch die obere, *C* durch die untere Partie des Fruchtknotens, *D* Samen, *E* derselbe im Längsschnitt. (Nach Niedenzu)Abb. 452. Frucht von *Punica granatum*: 1 längsdurchschnitten, 2 querdurchschnitten: *d* die aus dem inneren Fruchtblattkreis hervorgegangenen Fruchtfächer, *c* die Reste des Kelches.

in zwei Etagen übereinander stehend, mit der Blütenachse verwachsen. Frucht eine beerenartige Halbfrucht mit vielsamigen Fächern. Samen groß, mit saftreicher Schale.

Off. *Punica granatum*, der Granatbaum (Abb. 450), ist einheimisch im Mittelmeergebiet und wird als Ziergewächs wegen seiner „granatroten“ Blüten auch bei

uns häufig gezogen. Die Frucht ist eine faustgroße, innen gefächerte, dicklederige Beere (Abb. 452). Die Fruchtknotenfächer sind meist in zwei Kreisen angelegt; in der Frucht stehen die Fächer in zwei Stockwerken, einem oberen, (meist 5-zähligen), aus dem äußeren Fruchtblattkreise hervorgegangenen, und einem unteren, aus dem inneren Fruchtblattkreise hervorgegangenen (meist 3-zähligen) (Abb. 451, A—C). Der Granatbaum liefert Flores Granati, Cort. Fruct. Granati und Cortex Granati.

### Myrtaceae.

#### Familie der Myrtengewächse.

Die Myrtengewächse sind aromatische Bäume und Sträucher mit gegen- oder quirlständigen, immergrünen, lederigen Blättern; sie sind zumeist in den Mittelmeerländern und den Tropen heimisch. Die Blütenblattkreise der Myrtengewächse sind meist viergliedrig, mit zahlreichen Staubgefäßen. Der unterständige Fruchtknoten ist aus der Verwachsung von zwei oder vier Fruchtblättern hervorgegangen. Die Frucht ist eine Beere oder eine Kapsel mit vielsamigen Fächern. Die Blütenformel ist  $K\ 4\ C\ 4\ A\ \infty\ G_{(2)}$  oder  $(\bar{4})$ . Die Myrtaceae gehören meist der XII. Klasse 1. Ordnung an. Sie besitzen durchweg schizogene Sekretlücken.



Abb. 453. *Jambosa caryophyllus*.  
Blühender Zweig.




Abb. 453a. Caryophylli. A Spitze eines Blütenzweiges mit 3 Knospen ( $\frac{1}{4}$ ), B eine Knospe im Längsschnitt, C Fruchtknotenquerschnitt ( $\frac{1}{4}$ ).

•*Myrtus communis*, die Myrte, ein in Südeuropa wildwachsender Strauch wird bei uns häufig als Zierpflanze gezogen und als Brautschmuck verwendet.

Off. *Jambosa caryophyllus* (auch *Eugenia caryophyllata*, *E. aromatica* oder *Caryophyllus aromaticus* genannt), der Gewürznelkenbaum, ist auf den Gewürzinseln heimisch, wird aber in vielen anderen Tropengegenden kultiviert. Die getrockneten Blütenknospen sind die Caryophylli, die getrockneten Früchte die Anthophylli (Abb. 453 und 453a).

*Melaleuca leucadendron*, der Cajeputbaum, ist ein in Australien und Hinterindien heimischer hoher Baum, aus dessen Blättern *Oleum Cajeputi* dargestellt wird.

**Eucalyptus globulus** ein in Australien heimischer, im Mittelmeergebiet viel angepflanzter Riesenbaum mit hängenden, sichelförmigen Blättern und andere Arten der Gattung liefern Folia Eucalypti. Bemerkenswert ist die bei zahlreichen Arten der Gattung vorkommende, sehr auffallende Heterophyllie (Gegensatz zwischen Jugendblättern und Blättern am ausgewachsenen Baum).

**Pimenta officinalis** (auch *Myrtus pimenta* genannt), ist im mittleren Amerika heimisch und liefert „Gewürz“, Fruct. Pimentae.

### **Oenotheraceae** (auch **Onagraceae** genannt).

Familie der Weidenröschengewächse.

Diese sind Kräuter und Sträucher mit meist ansehnlichen regelmäßigen Blüten und unterständigem Fruchtknoten. Die Blüten sind durchweg nach der Vierzahl gebaut, die Früchte trocken oder saftig, vielsamig.

**Epilobium angustifolium**, **E. hirsutum**, **E. palustre** und andere Arten, Weidenröschen, wachsen bei uns namentlich an feuchten Stellen und in Wäldern wild.

**Oenothera biennis**, Nachtkerze, welche ihre gelben Blüten des Abends öffnet, gehört, obgleich aus Nordamerika stammend, jetzt zu den völlig eingebürgerten Pflanzen unserer Heimat.

**Circaea lutetiana** ist das Hexenkraut, welches in schattigen Wäldern häufig ist.

**Fuchsia coccinea**, Fuchsia, aus Südamerika stammend, ist ein überaus beliebtes, in unzähligen Varietäten kultiviertes Topfgewächs.

### 21. Reihe. **Umbelliflorae**, Doldenblütige.

Blüten aktinomorph, selten schwach zygomorph, mit doppelter Blütenhülle, epigyn, im Perianth vier- bis fünfgliedrig, haplostemon; Kelch sehr reduziert; Blütenboden mit intrastaminalem Diskus; Gynaeceum meist zweikarpellig; Fruchtknoten zweifächerig, mit einer Samenanlage in jedem Fache; Samen mit reichlichem Endosperm. Blätter meist mit Scheide, zerteilt oder zusammengesetzt; Blüten klein, in Dolden oder doldenähnlichen Infloreszenzen.

### **Araliaceae.**

Familie der Efeugewächse.

Die Blüten meist 5-, seltener 3- bis  $\infty$ -gliederig, bisweilen mit undeutlichem Kelch. Staubblätter meist so viel wie Blumenblätter. Karpelle  $\infty$  bis 1, unterständig. Halbfrüchte beeren- oder steinfruchtartig mit  $\infty$  — 1 getrennten Steinkernen. — Meist Sträucher, seltener Kräuter oder Bäume mit abwechselnden oder gegenständigen, sehr verschiedenartig gestalteten Blättern. Blüten meist in Köpfchen, Dolden oder Ähren, die zu Trauben oder Rispen vereinigt sind. Stets mit Ölgängen in den vegetativen Teilen.

**Hedera helix**, der Efeu, mit charakteristischer Heterophyllie, in Wäldern sehr verbreitet und zum Bekleiden von Mauern viel angepflanzt.

**Umbelliferae.**

Familie der doldentragenden Gewächse.

Die Umbelliferen verdanken ihren Namen ihrem charakteristischen Blütenstande, welcher in der Regel eine zusammengesetzte Dolde ist (Abb. 454), d. h. eine Dolde, deren einzelne Zweige wiederum doldenförmig verzweigt sind. An jeder der beiden Verzweigungs-




Abb. 454. Blütenstand der Umbelliferen (zusammengesetzte Dolde).




Abb. 455. Carum carvi. A Blüte im Längsschnitt, B Querschnitt durch den Fruchtknoten, in der Mitte die Samenanlagen Sa, umgeben von je 6 Ölgängen (Oe) in der Fruchtwand. C Biskuitförmiges Pollenkorn mit drei Poren.

stellen sitzt meist ein Kranz von Hochblättern, von denen der untere „Hülle“ (Involucrum) genannt wird, während der obere „Hüllchen“ (Involucellum) heißt. Die Blüten sind meist regelmäßig, nur zuweilen neigen die am Rande der zusammengesetzten



Abb. 456. Grundriß einer Umbelliferenblüte.




Abb. 457. Carum carvi. Kümmel. Querschnitt durch die reife Frucht. C Carpoporph, Fruchtkörper, F die innere, einander zugekehrte Fläche, Fugenfläche, der beiden Teilfrüchte. In der Fruchtschale sieht man die Hauptrippen Hr und die schwächeren Nebenrippen Nr, welche in den Tälichen T liegen. Oe Ölgänge, Östriemen genannt, L Leitbündel in den Hauptrippen, N Nährgewebe, E Embryo.

Dolde stehenden Blüten zu einseitiger Ausbildung der Blumenkrone. Die Blüten der Umbelliferen sind nach der Fünfzahl gebaut. Der Kelch wird aus fünf oft sehr kleinen Zähnen gebildet. Die Blumenblätter sind klein und meist mit ihrer Spitze nach einwärts ge-

krümmt (Abb. 455, *A*). Den Staubblattkreis bilden stets fünf normal gebaute Staubgefäße. Der aus zwei Karpellen bestehende Fruchtknoten ist stets unterständig und oft von einem Honigwulst (Diskus) gekrönt, aus welchem sich die zu zweien vorhandenen Griffel erheben. Die Blütenformel ist:  $K\ 5\ C\ 5\ A\ 5\ \overline{G}_{(2)}$  (Abb. 456). Alle Umbelliferen gehören der V. Klasse 2. Ordnung nach Linné an. Charakteristisch ist die Frucht der Umbelliferen. Sie ist eine Doppelachäne, indem jedes Fruchtblatt zu einer Schließfrucht auswächst, und wird, weil sie nur dieser Familie eigen ist, auch kurzweg Umbelliferenfrucht genannt. Die beiden Teilfrüchte liegen in ihrer Mitte dicht aneinander an, trennen sich aber zur Zeit der Reife meist an dieser Stelle und hängen dann nur mit ihren Spitzen an einem meist zweiteiligen Fruchttträger (Carpophor genannt) an. An ihrem äußeren Umkreise weist jede Teilfrucht sehr häufig fünf Längsrippen auf (Abb. 457, *Hr*), so daß dadurch an jeder Teilfrucht wiederum 4 Tälchen (Valleculae genannt, Abb. 457, *T*) gebildet werden. Innerhalb dieser 4 Tälchen tritt oftmals je eine meist unbedeutendere Längsrippe auf. In diesem Falle besitzt dann die ganze Doppelachäne in ihrem Umkreise 2mal 5 Hauptrippen (*Costae primariae*) und 2mal 4 Nebenrippen (*Costae secundariae*). In der Mitte der Tälchen (also unter den Nebenrippen, wo solche vorhanden) liegen im Gewebe der Fruchtschale häufig Ölstriemen (*Vittae* genannt). Solche befinden sich auch auf der Fugenfläche, wo beide Teilfrüchte aneinander anliegen (Abb. 457, *Oe*). Die beiden Seitenrippen sind oft flügelartig ausgebildet.

In jedem Fruchtblatt liegt nur eine einzige Samenanlage, und mit dem daraus sich entwickelnden Samen verwächst die Fruchtschale meist aufs engste, so den Charakter des Achäniums bedingend. Der Samen ist reich an Nährgewebe, und dieses bildet die auf dem Querschnitt sichtbare hornartige Substanz des Samens (Abb. 457, *N*).

Die Gewächse dieser Familie sind Kräuter mit meist fiederig zerschlitzen, wechselständigen Blättern. Die Scheiden der Blätter sind oft auffällig vergrößert und manchmal sogar tutenförmig ausgebildet. Die Umbelliferen enthalten in schizogenen Sekretgängen meist reichlich ätherisches Öl, sowie Harz und teilweise Gummiharze.

Man teilt vielfach die Umbelliferen nach der Gestalt des Nährgewebes ihrer Samen ein in:

- a) Geradsamige,
- b) Gekrümmtsamige,
- c) Hohlsamige.

a) Bei den Geradsamigen, *Orthospermae* genannt (von *ὀρθός*, orthos = gerade, und *σπέρμα*, sperma = der Samen), erscheint die Umrißlinie des Nährgewebes an der Fugenseite (der Berührungsfläche beider Teilfrüchte) auf Quer- und Längsschnitt völlig flach (Abb. 458, *I*).

b) Bei den Gekrümmtsamigen, *Campylospermae* genannt (von *κάμπυλος*, *kampylos* = gekrümmt), besitzt das Nährgewebe auf der Fugenseite eine Längsfurche, so daß seine Umrißlinie auf dem Querschnitt einwärts gekrümmt, auf dem Längsschnitt jedoch gerade erscheint (Abb. 458, II).

c) Bei den Hohlsamigen, *Coelospermae* genannt (von *κοίλος*, *koilos* = hohl), ist das Nährgewebe jeder Teilfrucht völlig nach außen gewölbt und erscheint daher auf Quer- und Längsschnitt bauchig (Abb. 458, III).




Abb. 458. Querschnitte (a) und Längsschnitte (b) der Umbelliferenfrüchte: I Orthospermae, II Campylospermae, III Coelospermae. Die Fruchtwand ist schraffiert, das Nährgewebe der Samen weiß. (C. Müller.)



Abb. 459. *Carum carvi*.

#### a) Orthospermae:

Off. *Carum carvi*, der Kümmel (Abb. 455, 457, 459), wächst bei uns wild und wird zur Fruchtgewinnung angebaut. Seine Blätter sind zweifach fiederspaltig, sein Blütenstand besitzt keine oder nur sehr spärliche Hüllblättchen. Die Frucht ist seitlich zusammengedrückt, die Hauptrippen sind nicht geflügelt, und in jedem Tälchen befindet sich nur eine Ölstrieme (Abb. 457). Liefert Fruct. Carvi.

Off. *Pimpinella saxifraga* (Abb. 460) und *P. magna* haben beide rundlich fünfkantige Teilfrüchte mit nur schwach hervortretenden Längsrippen und mehreren Ölstriemen in je einem Tälchen (Abb. 461). Hülle und Hüllchen fehlen beiden. Erstere Art hat stielrunde, letztere gefurchte Stengel. Beide wachsen bei uns wild und liefern Rad. Pimpinellae. — *P. anisum* (auch *Anisum vulgare* genannt), zeichnet sich dadurch aus, daß nur die mittleren Laubblätter gefiedert sind. Die Früchte sind flaumhaarig; in jedem Tälchen befinden sich ebenfalls zahlreiche Ölstriemen. Liefert Fruct. Anisi und wird zu diesem Zwecke angebaut.

Off. *Foeniculum vulgare* (auch *Foeniculum officinale* und *Foeniculum capillaceum* genannt) (Abb. 462), hat sehr schmale Fiederblättchen und gelbe, eingerollte Blumenblätter. Die Rippen der Teilfrüchte sind stumpf; in jedem Tälchen ist eine Ölstrieme; auf der Fugenseite befinden sich deren zwei (Abb. 463). Liefert Fruct. Foeniculi.



Abb. 460. *Pimpinella saxifraga*.




Abb. 461. Querschnitt der Frucht von *Pimpinella saxifraga*, vergrößert.




Abb. 462. *Foeniculum vulgare*.




Abb. 463. Querschnitt der Frucht von *Foeniculum vulgare*, vergrößert.




Abb. 464. Querschnitt der Frucht von *Archangelica officinalis*; a die Samen, f die flügelartigen Seitenrippen.

Schule der Pharmazie IV. 5. Aufl.




Abb. 465. Querschnitt der Frucht von *Levisticum officinale*, vergrößert.

Off. *Archangelica officinalis*, die Engelwurz, zeichnet sich durch die flügelartige Ausbildung der Seitenrippen ihrer Früchte aus (Abb. 464, f), sowie dadurch, daß bei der Reife die äußere Fruchtwand sich von der inneren trennt. Jedes Tälehen enthält mehrere Ölstriemen. Sie ist die Stammpflanze von Rad. Angelicae.

Off. *Levisticum officinale*, der Liebstöckel, hat Früchte, deren sämtliche Rippen flügelartig ausgebildet sind (Abb. 465). Jedes Tälehen enthält nur eine Ölstrieme. Liefert Rad. Levistici.

*Oenanthe phellandrium*, der Pferdekümmel (Abb. 466), hat Früchte, welche abweichend von den meisten Umbelliferenfrüchten, zur Zeit der Reife nicht auseinander fallen. Wächst bei uns an Wassergräben und Sümpfen wild und liefert Fruct. Phellandrii (Abb. 467).

*Sanicula europaea*, der Sanikel, zeichnet sich dadurch aus, daß fast alle Blätter grundständig sind. Die Pflanze ist in Laubwäldern häufig und liefert Herb. Saniculae.



Abb. 466. *Oenanthe phellandrium*.  
A Blühender Zweig, B Blüte, C Frucht.




Abb. 467. Querschnitt der Frucht von  
*Oenanthe phellandrium*.

*Cicuta virosa*, der Wasserschierling (Abb. 468), zeichnet sich durch seinen quergefächerten Wurzelstock aus (Abb. 469), sowie dadurch, daß die Fiederschnittchen seiner dreifach gefiederten Blätter scharf gesägt sind (Abb. 468). Der Wasserschierling ist unsere giftigste Doldenpflanze.

*Petroselinum sativum*, die Petersilie, ist ein wegen seiner Blätter und Wurzeln angebautes Küchengewächs. Die Blätter sind glänzend, frischgrün und zwei- bis dreifach gefiedert (Abb. 470, A). Sie dürfen nicht verwechselt werden mit den feinen geteilten, halbmatten, dunkelgrünen Blättern der Hundspetersilie, *Aethusa cynapium* (Abb. 470, B) oder gar mit denen des Schierlings (s. unten S. 373).

*Cuminum cyminum*, römischer Kümmel, in Südeuropa angebaut, ist die Stammpflanze der Fruct. Cumini oder Fruct. Cymini (Abb. 471).

*Daucus carota*, mit Früchten, deren Nebenrippen stark hervortreten und Stacheln tragen (Abb. 472), liefert die als Gemüse dienende Mohrrübe oder Möhre. In der Mitte der weißen Dolde finden sich regelmäßig eine bis mehrere rotschwarze, verkümmerte Blüten.



Abb. 468. *Cicuta virosa*.




Abb. 469. Quergefächertes Rhizom von *Cicuta virosa*.



Abb. 470. Fiederblatt, *A* von *Petroselinum sativum*, *B* von *Aethusa cynapium*.




Abb. 471. Frucht von *Cuminum cyminum*: *a* beide Teilfrüchte am Carpophor hängend, nat. Größe; *b* Frucht von der Seite; *c* im Längsschnitt, vergrößert; *d* im Querschnitt, dreifach vergrößert.




Abb. 472. Frucht von *Daucus carota*, fünffach vergrößert.

*Imperatoria ostruthium*, die Meisterwurz, in Gebirgsgegenden Mitteldeutschlands wildwachsend, liefert Rhiz. oder Rad. *Imperatoriae*.

Off. *Ferula assa foetida*, *F. foetida* (Abb. 473) und *F. narthex* sind die in Mittelasien heimischen Stamppflanzen der *Asa foetida*. — *F. galbaniflua* und *F. rubricaulis*, ebenda heimisch, liefern Galbanum. Die Arten der Gattung *Ferula* (welche mit der Gattung *Peucedanum* vielleicht als identisch




Abb. 473. *Ferula foetida*.



Abb. 474. *Dorema ammoniacum*.

bezeichnet werden kann) sind meist übermannshohe Stauden mit früh verwelkenden Blättern und tutig bescheideten Stengeln. Die Früchte derselben sind vom Rücken her zusammengedrückt und die geflügelten Seitennerven beider Teilfrüchte miteinander verwachsen.

Off. *Dorema ammoniacum* (Abb. 474) ist im Bau den vorigen sehr ähnlich und zeichnet sich im übrigen durch einfache Dolden von fast kugeligem Umfang aus. Liefert Ammoniacum.

*Euryangium sumbul*, in Südasien heimisch, ist die Stammpflanze von Rad. Sumbuli.

#### b) Campylopermae:

Off. *Conium maculatum*, der gefleckte Schierling, eine mit unangenehmem Mäusegeruch behaftete Pflanze, hat einen hohen, glatten und völlig kahlen Stengel, welcher bläulich bereift und am Fuße oft rötlich gefleckt ist (daher der Name maculatum). Seine mit tiefen Sägezähnen versehenen




Abb. 475. Fructus Coriandri. A Ganz und B im Querschnitt, h Hauptrippen, n Nebenrippen, carp Fruchträger, oe Ölgänge, end Endosperm. C Eine Blüte vom Rande der Dolde.

Fiederblättchen sind oberseits dunkelgrün, unterseits heller und dürfen nicht mit Petersilienblättern (Abb. 470, A) verwechselt werden, da die ganze Pflanze sehr giftig ist. Die Früchte tragen wellig gekerbte Längsrippen. Die Tälehen sind gleichfalls längsgestreift und besitzen keine Ölstriemen. Die Blätter sind als Herba Conii officinell.

#### c) Coelospermae:

*Coriandrum sativum* trägt kugelige Früchte (Abb. 475, A) mit wellig geschlingelten, aber flachen Hauptrippen und scharfen, stärker hervortretenden Nebenrippen. Die am Doldenumfang stehenden Blüten sind unregelmäßig gebaut (Abb. 475, C). Die Pflanze ist im Mittelmeergebiet heimisch. Liefert Fruct. Coriandri.

### 2. Unterklasse. Metachlamydeae oder Sympetalae.

#### Verwachsenkronige Dikotylen.

Blütenhülle auf vorgeschrittener Stufe, stets der Anlage nach doppelt, die innere Hülle (Korolle) meistens verwachsenblättrig.

#### 1. Reihe. Ericales, Heidenartige.

Blüten meist hypogyn, aktinomorph, meist fünfzählig, Androeceum obdiplostemon, der Krone nicht angewachsen, Pollen meist in Tetraden; Blumenblätter manchmal noch frei; Fruchtknoten mehrfächerig. Meist immergrüne Holzpflanzen mit oft nadelförmigen oder lanzettlichen Blättern.

**Ericaceae.**

## Familie der Heidekrautgewächse.

Die Heidekrautgewächse haben regelmäßige, meist fünfzählige, seltener vierzählige Blüten mit meist verwachsenblättriger und glockiger, am Rande kurz gezählter Blumenkrone (Abb. 476). Die Staubbeutel sind zuweilen mit eigentümlichen Anhängseln versehen (gehörnte Antheren, Abb. 477). Der Fruchtknoten besteht aus meist fünf Fruchtblättern mit einfachem Griffel. Die Blütenformel ist:  $K 5 C (5) A 5 + 5 G (5)$  oder  $K 4 C (4) A 4 + 4 G (4)$ . Der Fruchtknoten kann sowohl ober- wie unterständig sein, die Frucht ist eine viel-samige Beere oder Kapsel.



Abb. 476. Blüte von *Arctostaphylos uva ursi*.



Abb. 477. Staubgefäß mit gehörnten Antheren von *Arctostaphylos uva ursi*.

Man unterscheidet 4 Unterfamilien:

a) *Rhododendroideae* mit freien oder verwachsenen Blumenblättern, oberständigem Fruchtknoten, scheidewandspaltiger Kapsel-frucht, ungehörnten Antheren.

b) *Arbutoideae* mit oberständigem Fruchtknoten, Beeren- oder fachspaltiger Kapsel-frucht, Antheren mit borstenförmigen Anhängseln.

c) *Vaccinioidae* mit unterständigem Fruchtknoten und Beerenfrucht; Antheren gehörnt.

d) *Ericoideae* mit oberständigem Fruchtknoten und meist fachspaltiger Kapsel-frucht; Antheren meist gehörnt.

**a) Rhododendroideae:**

*Rhododendron hirsutum* und *Rh. ferrugineum* sind die bekannten Alpenrosen, niedrige Sträucher der Alpen mit rosenroten Blüten, letztere mit unter-seits rostfarbenen, lanzettlichen Blättern, welche unter der Bezeichnung *Folia Rhodo-dendri* früher medizinisch gebräuchlich waren. Zahlreiche andere Arten, auf den Hochgebirgen des tropischen Asiens heimisch, gehören zu den schönsten Ziergewächsen unserer Gewächshäuser, halten z. T. bei uns auch im Freien aus. *Rh. indicum*, unter dem Namen „Azalee“ sehr beliebte und in zahllosen Formen gezogene Topfpflanze.

*Ledum palustre*, Porst, ein Halbstrauch der nördlichen Torfmoore, lieferte früher *Folia Ledi*, auch *Herb. Rosmarini silvestris* genannt.

**b) Arbutoideae:**

Off. *Arctostaphylos uva ursi* (Abb. 478), die Bärentraube, gedeiht auf Heideboden der Gebirge und ist die Stammpflanze der *Fol. Uvae Ursi*.

e) **Vaccinoideae:**

*Vaccinium myrtillus*, die Heidelbeere (Abb. 479), und *V. vitis idaea*, die Preiselbeere (Abb. 480), gedeihen allenthalben in Laub- und Nadelwäldern, besonders der Gebirge. Ihre Früchte sind ein beliebtes Beerenobst. Die Blätter der letzteren sind auch als Heilmittel in Aufnahme gekommen.

Abb. 478. *Aretostaphylos uva ursi*.Abb. 479. *Vaccinium myrtillus*.Abb. 480. *Vaccinium vitis idaea*.d) **Ericoideae:**

*Calluna vulgaris*, das Heidekraut, ist ein niedriger Strauch mit kleinen Blättern und traubigen Blütenständen, welcher weite Länderstrecken zu bedecken pflegt und diesen das charakteristische Gepräge der „Heide“ verleiht.

Die Gattung *Erica* ist mit mehreren hundert Arten besonders am Kap der Guten Hoffnung heimisch. Nur wenige Arten gedeihen im Mittelmeergebiet und in Mitteleuropa, von denen die „Glockenheide“, *E. tetralix*, erwähnt sein möge.

2. Reihe. **Primulales**, Primelartige.

Blüten hypogyn, aktinomorph, nach der Fünffzahl gebaut, Androeceum der Krone angewachsen, diplostemon oder meist haplostemon und dann epipetal, Fruchtknoten einfächerig, mit freier, basaler, zentraler, zahlreiche Samenanlagen tragender Placenta.

**Primulaceae.**

Familie der Schlüsselblumengewächse.

Die Schlüsselblumengewächse zeichnen sich durch regelmäßige, meist trichterförmige Blumenkrone aus; sie besitzen nur einen Kreis von Staubblättern, deren Staubfäden mit der Blumenkrone verwachsen sind. Die Blütenformel ist:  $K 5 C (5) A 5 G \textcircled{5}$ . Die Frucht ist eine ungefächerte, vielsamige Kapsel.

*Primula officinalis* (Abb. 481) und *P. elatior*, die Schlüsselblumen, sind sehr bekannte Frühlingsblumen; die Blüten der ersteren fanden früher medizinische Anwendung. *P. auricula*, Aurikel, in den Alpen heimisch, ist eine durch mannigfache Varietäten ausgezeichnete Gartenzierpflanze. Neuerdings sind zahlreiche ostasiatische Arten als Zierpflanzen bei uns eingeführt worden; *P. obconica*, mit aufgeblasenem, verkehrt kegelförmigem Kelch und feindrüsiger Behaarung, ruft — ebenso wie noch manche verwandte Arten — durch das Sekret ihrer Drüsenhaare schwere Entzündungen der Haut hervor.

Abb 481. *Primula officinalis*.

*Lysimachia vulgaris*, *nummularia* und *nemorum*, Gilbweiderich, *Anagallis arvensis*, Gauchheil, wachsen auf Äckern und Wiesen wild.

*Trientalis europaea*, Siebenstern, ist eine in Gebirgswäldern, seltener in der Ebene vorkommende Pflanze, die sich durch die Siebenzahl ihres Perianths und Androeceums von allen anderen unterscheidet.

*Cyclamen europaeum*, Erdscheibe oder Alpenveilchen, und andere Arten der Gattung sind sehr bekannte Topfpflanzen.

### 3. Reihe. Ebenales. Ebenholzartige.

Blüten aktinomorph, vier- oder fünfzählig; Androeceum der Krone angewachsen, meist diplostemon oder triplostemon oder mit  $\infty$  Staubblättern; Fruchtknoten gefächert, mit einer oder wenigen Samenanlagen in jedem Fache an zentralwinkelständiger Placenta. Immergrüne tropische Holzgewächse.

## Sapotaceae.

Familie der Guttapercha liefernden Gewächse.

Bäume mit zahlreichen Milchsaftschläuchen in Rinde, Mark und Blättern. Blüten wenig ansehnlich, einzeln oder meist zu wenigen achselständig. Staubblätter in 2 bis 3 Quirlen. Frucht eine Beere. Samen mit charakteristisch glänzender, glatter Samenschale, an der die Ansatzfläche sehr stark vortritt. Meist ölreiches Nährgewebe.

*Palaquium oblongifolium*, *P. gutta* (Abb. 482) und andere Arten der Gattung, im indisch-malayischen Gebiet heimisch, sowie *Payena Leerii*, aus demselben Gebiet stammend, liefern Guttapercha.

*Mimusops balata*, im nördlichen Südamerika, gibt die Balata, ein Ersatzmittel für Guttapercha.

## Ebenaceae.

Familie der Ebenholzgewächse.

Die Ebenholzgewächse sind im Bau der Blüten der vorhergehenden Familie ähnlich; es sind meist beide Staubblattkreise,

manchmal sogar noch mehr Staubblätter entwickelt und der Fruchtknoten vielfächerig, jedoch wenigsamig; meist sind die Blüten getrenntgeschlechtig. Die Pflanzen dieser Familie sind meist in den Tropen einheimische Bäume oder Sträucher.

*Diospyros ebenum*, der Ebenholzbaum, ist in Ostindien heimisch. Sein schwarzes Kernholz bildet das sehr geschätzte Ebenholz.



Abb. 482. *Palaquium gutta*. A Blühender Zweig, B Blüte, C Knospe, D Fruchtknoten, E junge Frucht, F Fruchtknotenquerschnitt, G reife Frucht.

#### Familie **Styracaceae**.

Sträucher und Bäume mit ganzrandigen oder gesägten Blättern und meist kleinen Blüten, mit Stern- oder Schuppenhaaren. Staubblätter doppelt so viel wie Blumenblätter, nur am Grunde oder

selten höher zu einer Röhre vereinigt. Frucht eine Steinfrucht oder Schließfrucht.

Off. *Styrax benzoin*, ein auf Java und Sumatra heimischer Baum, liefert Benzoëharz; *St. officinalis*, in den östlichen Mittelmeerländern heimisch, ist die Stammpflanze des nicht mehr gebräuchlichen festen Storax (nicht zu verwechseln mit *Styrax liquidus* des Arzneibuches).




Abb. 483. Grundriß der Blüte von *Olea europaea*.

Abb. 484. *Olea europaea*. A Blühender Zweig, B Knospe, C Blüte, D Fruchtknoten, E Antheren, F Blumenkrone aufgeschnitten und ausgebreitet.

#### 4. Reihe. *Contortae*, Gedrehtblütige.

Blüten hypogyn, aktinomorph, vier- oder fünfzählig; die Kronblätter sind in der Knospelage meist gedreht, die gleichzähligen, selten minderzähligen Staubgefäße der Krone angewachsen. Blätter meist gegenständig, ganzrandig.

**Oleaceae.**

## Familie der Ölbaumgewächse.

Die Oleaceen zeichnen sich durch einen weniggliedrigen Staubblattkreis aus, und die typische Blütenformel ist  $K 4 C (4) A 2 G^{(2)}$  (Abb. 483). Vor allem ist hervorzuheben, daß stets nur zwei Staubblätter vorkommen und daß die Petalen manchmal unverwachsen sind, ja manchmal durch Abort ganz verschwinden. Die Oleaceen gehören meist der II. Klasse nach Linné an. Ihre Fruchtblätter, welche mannigfache Ausbildung zu Kapseln, Schließfrüchten, Beeren oder Steinfrüchten erfahren, sind meist nur zweisamig. Die Oleaceen sind Holzgewächse mit gegenständigen Blättern.

Off. *Olea europaea*, der Ölbaum, Olive, ist im Mittelmeergebiet heimisch und wird in Südeuropa zum Zwecke der Gewinnung des Ol. Olivarum, dem aus dem Fleische seiner Früchte gewonnenen Öle, kultiviert. Die Oliven sind in ihrer Heimat ein wichtiges Nahrungsmittel. (Abb. 484)

Off. *Fraxinus ornus*, die Manns-Esche, ein hoher Baum Kleinasiens und Südeuropas, liefert die officinelle Manna. — *F. excelsior* ist die bei uns gedeihende Esche mit gefiederten Blättern und sehr elastischem Holz.

*Syringa vulgaris*, der „spanische Flieger“, ist wie mehrere andere ebenfalls aus Ostasien stammende Arten ein sehr verbreiteter Zierstrauch.

*Ligustrum vulgare*, Rainweide, ist ein bei uns häufig angepflanzter Heckenstrauch.

*Forsythia suspensa* und andere Arten der Gattung, deren gelbe Blüten im ersten Frühjahr vor den Blättern erscheinen, sind jetzt vielfach in Gärten angepflanzte Sträucher Ostasiens.

**Loganiaceae.**

## Familie der Strychnosgewächse.

Die Gewächse dieser Familie besitzen im Bau ihrer Blüten große Ähnlichkeit mit den Enziangewächsen; ihr Fruchtknoten ist jedoch meist zweifächerig (Abb. 485). Die Frucht ist eine Kapsel oder Beere mit zahlreichen, oder auch nur einem einzigen, oft flachen Samen. — Meist Sträucher oder Bäume.

Off. *Strychnos nux vomica*, der Brechnußbaum, ist ein in Ostindien und dem indischen Archipel heimischer immergrüner Baum und liefert Sem. Strychni (Abb. 486), welche meist zu wenigen in dem saftigen Fleische der kugeligen, hartschaligen Frucht eingebettet sind. *S. tieute* (Java) und *S. toxifera* (Guiana) liefern gefährliche Pfeilgifte, dasjenige der letzteren (Curare) wird auch medizinisch angewendet. *S. Ignatii*, auf den Philippinen heimisch, ist die Stamm-pflanze der *Fabae Ignatii*.

*Gelsemium sempervirens*, in Nordamerika heimisch, liefert Rad. Gelsemii.




Abb. 485. Grundriß der Blüte von *Strychnos nux vomica*.

**Gentianaceae.**

## Familie der Enziangewächse.

Die Blüten dieser Familie sind denen der vorhergehenden durch das Vorhandensein von zwei oberständigen Fruchtblättern und

durch viele andere Merkmale sehr ähnlich. Ihre Blüten sind stets regelmäßig und entweder nach der Fünffzahl oder der Vierzahl gebaut. Die Blütenformel ist daher:  $K 5 C (5) A 5 G^{\ominus}$  (Abb. 487) oder  $K 4 C (4) A 4 G^{\ominus}$ . Die Fruchtblätter sind meist nur mit ihren Rändern verwachsen und die Kapsel, zu der sie bei der Reife ausgewachsen, ist daher einfächerig. — Kräuter.



Abb. 486. *Strychnos nux vomica*. A Blühender Zweig, B Blüte aufgeschnitten und ausgebreitet, C Antheren, D Frucht, E Frucht im Querschnitt, F Samenquerschnitt, G Samen.

Off. *Gentiana lutea* (Abb. 488), *G. pannonica*, *G. purpurea* und *G. punctata*, sämtlich in den Alpen und den Gebirgen des südlichen Europa heimisch, sind die Stamppflanzen von *Radix Gentianae*. *G. ciliata*, *G. campestris*, *G. germanica*, *G. amarella* und *G. cruciata* sind durchweg blau oder violett blühende, bei uns einheimische, aber nicht sehr häufig vorkommende, prächtige Vertreter dieser besonders in den Hochgebirgen Amerikas, Europas und Asiens entwickelten Gattung. *G. pneumonanthe* ist auf Moorswiesen stellenweise auch in der Ebene häufig. *G. asclepiadea* tritt in den deutschen Mittelgebirgen oft in grosser Menge auf.

Off. *Erythraea centaurium*, Tausendgüldenkraut (Abb. 489), mit fleischroten Blüten, zeichnet sich durch die Drehung der Antheren aus, welche bei dem Ausstäuben des Pollens erfolgt, und ist die Stamppflanze von *Herb. Centaurii*.

Off. *Menyanthes trifoliata*, Bitterklee oder Biberklee (Abb. 490), wächst auf sumpfigen Wiesen und trägt seine weissen Blütentrauben an der Spitze eines blattlosen Schaftes. Ihren deutschen Namen hat die Pflanze von der Form ihrer dreizähligen Blätter, welche als *Fol. Trifolii fibrini* medizinisch gebräuchlich sind.

**Apocynaceae.**

## Familie der Hundstodgewächse.

Die Blüten der Apocynaceae sind denen der vorhergehenden Familie ähnlich und zeichnen sich wie diese durch gedrehte Knospenlage der Blumenkrone aus. Die Blütenformel ist:  $K 5 C (5) A 5 G (2)$ . Die Fruchtblätter enthalten je zahlreiche Samenanlagen und sind unter-




Abb. 487. Grundriß einer Gentianaceenblüte, *Menyanthes trifoliata*.

Abb. 488. *Gentiana lutea*. A Stück des Blütenstandes, B Knospen von verschiedenen Seiten gesehen, C Anthera von vorn und von hinten, D von der Seite gesehen, E aufgesprungene Frucht, F Fruchtknotenquerschnitt.

einander nur mit ihren Griffeln verwachsen. Die Frucht ist meist eine Kapsel, die reifen Samen tragen häufig Haarschöpfe. Die Blüten stehen einzeln oder in Trugdolden. Die Apocynaceae sind vorwiegend tropische, stets milchsaftreiche Holzgewächse mit meist

gegen- oder quirlständigen, einfachen Blättern; sie führen in Stengeln, Blättern und Samen meist sehr heftig wirkende Glykoside, Herzgifte, die als Heilmittel viel angewendet werden.

Off. *Strophanthus hispidus* (Abb. 491), in Westafrika heimisch, und *St. komba*, in Ostafrika heimisch, sind windende Sträucher mit großen ellip-



Abb. 489. *Erythraea centaurium*. A oberer Teil, B unterer Teil der blühenden Pflanze, C Blüte im Längsschnitt, D Anthere nach dem Austreten des Pollens, E Fruchtknoten mit Griffel und Narbe.

tischen Blättern und buntfarbigen Blüten, deren Kronzipfel in lange, bandförmige Fortsätze auslaufen. Die flaumig behaarten und beschopften Samen beider Arten (oder neuerdings nur letzterer Art) sind die officinellen Sem. *Strophanthi*.

*Aspidosperma quebracho*, ein in Argentinien wachsender Baum mit kleinen stachelspitzigen Blättern und gelben Blüten, ist die Stammpflanze von *Cortex Quebracho*.

*Vinca minor*, das Immergrün oder Sinngrün, wird bei uns als Gartenzierpflanze gehegt und behält auch im Winter seine immergrünen Blätter, welche als Herb. Pervineae früher medizinische Anwendung fanden.

*Nerium oleander*, im Mittelmeergebiet heimisch, ist der in Kübeln häufig gezogene Zierbaum Oleander, der sich durch schöne rote oder seltener weiße Blüten auszeichnet.

Arten der Gattungen *Landolphia*, *Kickxia*, *Clitandra*, *Carpodinus* u. a., meist Lianen des tropischen Afrika, liefern Kautschuk.



Abb. 490. *Menyanthes trifoliata*. A blühende Pflanze, B Blüte im Längsschnitt, C Fruchtknoten im Querschnitt, D Kapsel mit Samen, E Samen, F Samen im Längsschnitt.




Abb. 491. *Strophanthus hispidus*. A Blütenzweig, a Knospen, B Längsschnitt durch eine Blüte, die langen Zipfel der Kronlappen bei  $\times$  abgeschnitten.

### Asclepiadaceae.

Familie der Seidenpflanzengewächse.

Die Blütenformel der Asclepiadaceen ist dieselbe wie die der vorhergehenden Familie. Dennoch zeichnet sich die Asclepiadaceenblüte vor allen übrigen Dicotyledoneenblüten durch zwei Eigentümlichkeiten aus.

keiten aus, indem die Pollenmasse je einer Antherenhälfte wie bei den Orchidaceen zu einem Pollinium verklebt und je zwei derselben miteinander und mit der Narbe des Fruchtknotens in eigentümlicher Weise verwachsen sind (Abb. 492). Die Fruchtblätter sind unten frei und nur die Griffel unter sich verwachsen. Die Asclepiadaceen sind meist tropische, milchsaftrreiche Holzgewächse oder Kräuter mit Kapsel Früchten und langbehaarten Samen.




Abb. 492. *Asclepias Cornuti*. A Blüte, B Diagramm, C Längsschnitt der Blüte, ca Kelch, co Krone, st Staubblatt, anth innere fertile Hälfte, a äußere, taschenförmig ausgebildete Hälfte, na Narbenkopf. D Androecium, die sterilen Staubblatthälften entfernt, e blattartige Verbreiterung der fertilen Antherenhälfte, f der zwischen denselben liegende Spalt, über welchem die drüsigen Kanten r des Narbenkopfes hervortreten; das von r ausgeschiedene Sekret fließt in zwei Rinnen abwärts, und an ihm bleiben die beiden Pollinien haften. E junges Androecium, die Drüsen r und die beiden Rinnen ri zeigend. F Gynöceum, nach Entfernung des Androeciums; an r sind je zwei Pollinien p haften geblieben. G zwei Pollinien, durch die sich leicht lösende Drüse r miteinander verbunden. (Nach K. Schumana.)

Off. *Marsdenia cundurango*, ist ein an Baumstämmen emporklimmendes Schlinggewächs des nordwestlichen Südamerika, dessen Rinde als Cortex Cundurango in den Arzneischatz eingeführt ist.

*Cynanchum vincetoxicum*, Hundswürger, in Gebüsch und lichten Wäldern vorkommend, ist der einzige in Deutschland einheimische Vertreter dieser Familie.

#### 5. Reihe. Tubiflorae, Röhrenblütige.

Blüten hypogyn, aktinomorph oder zygomorph, mit meist vier nach der Fünfzahl gebauten Kreisen. An-

droecium vollzählig oder durch Abort minderzählig, der Krone angewachsen. Fruchtknoten zweifächerig, seltener dreifächerig, häufig durch falsche Scheidewände mehrkammerig, mit zwei bis sehr zahlreichen Samenanlagen in jedem Fache. — Meist Kräuter mit wechselständigen oder gegenständigen Blättern.

### Convolvulaceae.

Familie der Windengewächse.

Die Windengewächse besitzen regelmäßige, fünfzählige Blüten mit trichterförmigen, bis oben hinauf verwachsenen Blumenkronen, welche in der Knospenlage gedreht sind. Die Staubblätter sind in der Fünfzahl vorhanden, der Fruchtknoten besteht aus zwei Fruchtblättern mit je zwei Samenanlagen und wird meist eine Kapsel. Die Blütenformel ist:  $K 5 C 5 A 5 G^{(2)}$  (Abb. 493). Die Convolvulaceae sind milchsafführende, windende Gewächse mit langen dünnen Sprossen.



Abb. 493. Grundriß einer Convolvulaceenblüte.

Off. *Exogonium* (*Ipomoea*) *purga*, die Jalapenwinde (Abb. 494), an den Abhängen der mexikanischen Anden gedeihend, ist die Stammpflanze von *Tubera* und *Resina Jalapae*.

*Convolvulus sepium*, Zaunwinde, und *C. arvensis*, Ackerwinde, sind bei uns häufige Unkräuter; *C. scammonia*, die Purgierwinde, ist in den östlichen Mittelmeerländern heimisch und liefert *Radix* und *Resina Scammoniae* (*Scammonium*).

*Cuscuta europaea* und andere Arten der Gattung sind unangenehme, blatt- und chlorophyllose Parasiten unserer Kulturpflanzen mit fadendünnem Stengel und zu fast kugeligen Knäueln vereinigten Blüten.

### Borraginaceae

(auch *Asperifoliaceae* genannt).

Familie der Boretschgewächse.

Die Blüten der Boretschgewächse zeigen, abgesehen vom Fruchtknoten, große Ähnlichkeit mit denen der vorher beschriebenen Windengewächse, nur mit dem Unterschiede, daß die Blumenkrone in der Knospenlage nicht gedreht, sondern dachig gefaltet ist. Die Blumenkronröhre besitzt häufig sogen. Schlundanhänge, welche sich nach innen klappenartig vorwölben (Abb. 495 C). Die Blütenformel ist:  $K 5 C 5 A 5 G^{(2)}$  (Abb. 495 A). Jedes der beiden vorhandenen Fruchtblätter schnürt sich in seiner Mitte so vollkommen bis zur Fruchtknotenachse ein, daß bei der Reife der ganze Fruchtknoten entsprechend der Stellung seiner vier Samenanlagen in vier Teilfruchtknoten zerfällt, deren jeder aus einem halben Fruchtblatt gebildet wird. Fälschlicherweise hat man die vier Teilfrüchte (Klausen), da sie bei der Reife sehr hart werden, als Nüßchen bezeichnet

(Abb. 495 *D, E, G*). Infolge dieser Einschnürung steht auch der Griffel nicht auf der Spitze des Fruchtknotens, sondern ist in die Mitte desselben eingesenkt. Man nennt dies einen gynobasischen




Abb. 494. *Exogonium (Ipomoea) purga*.

Griffel (Abb. 495, *G*). Die Blüten stehen in Wickeln. Die Borraginaceen sind meist krautige Gewächse unseres Klimas mit fast ausnahmslos rauhaarigen Blättern (daher auch der früher oft gebrauchte Name *Asperifoliaceae*).

*Borrago officinalis*, der Boretsch, ist ein Gartengewächs mit schönen blauen Blüten. Seine Blätter werden als Salat oder meist als Beimengung zum Salat genossen und waren früher auch medizinisch gebräuchlich.

*Myosotis palustris* und viele andere *M.*-Arten sind die wildwachsenden und auch als Zierpflanzen sehr beliebten Vergiftmeinnicht (Abb. 496).

*Pulmonaria officinalis*, das Lungenkraut (Abb. 497), lieferte früher *Herba Pulmonariae* und ist, wie *P. angustifolia*, eine der ersten und hübschesten Frühlingsblumen unserer Wälder.




Abb. 495. *Anchusa officinalis*. A Diagramm der Blüte, S Schlundschüppchen, B Blüte, C dieselbe im Längsschnitt, D Fruchtknoten und Griffel, E beide im Längsschnitt, F Fruchtkelch, G die 4 Teilfrüchte, Klausen, im Inneren desselben; die vordere ist entfernt, H Samen von außen, J von innen, K im Längsschnitt.



Abb. 496. *Myosotis palustris*.



Abb. 497. *Pulmonaria officinalis*.

*Alkanna tinctoria*, in Südeuropa heimisch, ist die Stammpflanze der zum Färben von Ölen und Fetten dienenden Rad. Alkannae.

*Symphytum officinale*, ein an Bachufern und auf feuchten Wiesen heimisches Kraut, lieferte die früher in der Tierheilkunde gebrauchte Rad. *Consolidae majoris*.

*Lithospermum officinale* und *L. aryense*, Steinsamen, sind verbreitete Unkräuter. Die Samen des ersteren wurden früher unter der Bezeichnung *Sem. Mili solis* medizinisch angewendet.

*Echium vulgare*, Natterkopf, *Anchusa officinalis*, Ochsenzunge (Abb. 495), und *Cynoglossum officinale* wachsen bei uns wild. Letzteres ist die Stammpflanze der früher medizinisch verwendeten Herba Cynoglossi.

### Verbenaceae.

#### Familie der Eisenkrautgewächse.

Die Familiencharaktere sind denen der Labiaten sehr ähnlich, doch der Fruchtknoten meist ungelappt, mit gipfelständigem Griffel. Die Frucht ist meist eine Steinfrucht mit 1 bis 4 Steinkammern. Die Familie ist fast ausnahmslos in den Tropen heimisch.

*Verbena officinalis*, Eisenkraut, ein unscheinbares, an Wegrändern wachsendes Unkraut, ist der einzige Vertreter der Familie in unserem Klima. Mehrere nordamerikanische Arten sind Zierpflanzen unserer Gärten geworden.

*Tectona grandis*, der ostindische Teakholzbaum, liefert das beste Holz für Schiffsbauten.

### Labiatae.

#### Familie der Lippenblütlergewächse.

Die Familie hat ihren Namen von der gewöhnlich zweilippigen Gestalt der Blumenkronen. Zwei der fünf Kronblätter pflegen zu der meist helmförmigen, zuweilen jedoch auch sehr kleinen Ober-




Abb. 498. Eine Labiatenblüte: 1 dieselbe von der Seite gesehen, o Oberlippe, u Unterlippe; 2 der Kelch,  $\frac{2}{5}$  lippig; 3 die Blüte längsdurchschnitten, n die Narbe des Griffels; 4 der Fruchtknoten längsdurchschnitten; 5 ein Teilfrüchtchen (Klause), f die aus einem halben Fruchtblatt hervorgegangene Fruchtwand, s der Samen.



Abb. 499. Grundriß einer Labiatenblüte mit nur zwei fruchtbaren Staubblättern (Salvia).

lippe, drei zur Unterlippe verwachsen zu sein (Abb. 498). In gleicher Weise ist der Kelch meist derart geteilt, daß drei obere Kelchzipfel sich von zwei unteren deutlich abheben. Die Zahl der Staubgefäße ist meist vier (das hintere obere fehlt stets), seltener zwei (bei *Salvia* und *Rosmarinus*, bei denen auch von den zwei vorhandenen nur die vorderen Staubbeutelhälften ausgebildet sind). Sind vier Staubgefäße vorhanden, so sind die beiden vorderen länger als die hinteren beiden (zweimächtige oder didynome Staubgefäße); daher gehören die meisten Labiatae der XIV. Klasse nach Linné an. Der Fruchtknoten besteht aus zwei Fruchtblättern, welche, wie bei den Borraginaceen, eingeschnürt sind und zur Zeit der Reife vier Teil-

früchte (Klausenfrüchte) bilden. Linné sah die vier Teilfrüchte fälschlich für nackte Samen an und nannte deshalb diejenige




Abb. 500. *Lavandula vera*. A Blüte, B Längsschnitt durch dieselbe, C Kelch ausgebreitet und von innen gesehen ( $\frac{2}{4}$ ).

Ordnung der XIV. Klasse, welcher die Labiatae angehören, irrtümlich Gymnospermia = Nacktsamige. Der Griffel ist gleichfalls wie bei den Borraginaceen in die Einschnürung des Fruchtknotens eingesenkt (gynobasischer Griffel). Die Blütenformel ist:  $K(5) C(5) A4$  oder  $2 G^{(2)}$  (Abb. 499). Die Blüten sind bei den Labiaten stets seitenständig und stehen meist in Wickeln, zu Scheinquirlen vereinigt, in den Achseln der Laubblätter. Die Laubblätter selbst sind gegenständig und an den vierkantigen Stengeln derart gestellt, daß je zwei gegenüberliegende Paare sich kreuzen. Fast sämtliche Lippenblütler führen in Drüsenhaaren, namentlich an ihren Blättern, reichlich ätherisches Öl.

Off. *Melissa officinalis*, Melisse, besitzt Blüten, deren lippenförmiger Charakter deutlich ausgeprägt ist, und liefert Fol. *Melissae*.



Abb. 501. *Mentha piperita*. A Spitze einer blühenden Pflanze ( $\frac{1}{2}$ ), B Knospe ( $\frac{1}{4}$ ), C Blüte ( $\frac{1}{4}$ ), D dieselbe im Längsschnitt ( $\frac{1}{4}$ ), E Staubblatt von vorn gesehen ( $1\frac{1}{4}$ ).

Off. *Lavandula vera*, Spike oder Lavendel, zeichnet sich durch die nur schwach lippig ausgebildete Gestalt ihrer Blumenkrone aus (Abb. 500), besitzt blaublütige, ährenförmige Blütenstände und liefert Flor. Lavandulae.

Off. *Mentha piperita*, Pfefferminze (Abb. 501), besitzt ebenfalls nur schwach lippenförmig ausgebildete Blüten und ausnahmsweise gleichlange Staub-




Abb. 502. *Thymus serpyllum*. A Stück einer blühenden Pflanze ( $\frac{2}{3}$ ), B Blatt mit den ölhaltigen Drüschuppen ( $\frac{4}{5}$ ), C Blütenknospe ( $\frac{4}{5}$ ), D Blüte ( $\frac{2}{3}$ ), E Staubblatt von vorn, F von hinten gesehen ( $\frac{15}{1}$ ), G Samen, H derselbe längs- u. J quer durchschnitten ( $\frac{10}{1}$ ).




Abb. 503. *Thymus vulgaris*. A Blühende Pflanze, um die Hälfte verkleinert, B Blatt von unten gesehen, Vergr.  $\frac{1}{2}$ , C Blüte von der Seite gesehen, Vergr.  $\frac{1}{2}$ . (Gilg.)

fäden (Abb. 501 D). Nichtsdestoweniger gehört auch die Gattung *Mentha* der XIV. Klasse nach Linné an. Die in den Achseln der Laubblätter stehenden Blüten-Scheinwirtel sind bei vielen *Mentha*-Arten an den Sproßspitzen ähren-

Abb. 504. *Lamium album*.Abb. 505. *Glechoma hederaceum*.Abb. 506. *Salvia officinalis*. A blühender Zweig, B Blüte, C die beiden fruchtbaren Staubgefäße, D Frucht.

förmig einander genähert. Liefert *Fol. Menthae piperitae*, Pfefferminzöl und Menthol. — *M. crispata*, Krauseminze, liefert *Fol. Menthae crispae*.

Off. *Thymus vulgaris*, Thymian (Abb. 503), ein strauchartiges Kraut der Mittelmeerländer mit aufsteigendem Stengel und länglich eiförmigen, am Rande zurückgerollten, unterseits weißgrauen Blättern, liefert *Herb. Thymi*,

während *Th. serpyllum*, Quendel oder Feldkümmel (Abb. 502), die an Rainen überall häufige Stammpflanze der Herb. Serpylli, einen niedergestreckten, am Grunde kriechenden Stengel und an ihrer Basis gewimperte Blätter besitzt.

*Lamium album*, Taubnessel (Abb. 504), trägt Blüten mit helmförmiger Oberlippe, ist ein verbreitetes Unkraut und liefert Flor. Lamii alb.

*Glechoma hederaceum*, Gundermann (Abb. 505), ebenfalls ein gemeines Unkraut, ist die Stammpflanze der Herb. Hederæ terrestris.

Off. *Salvia officinalis*, Salbei (Abb. 506), mit nur zwei Staubgefäßen, deren Konnektiv hebelartig vergrößert ist und nur je ein ausgebildetes Staubbeutel trägt, besitzt eine bauchig ausgesackte Blumenkronröhre und eine stark helmförmig ausgebildete Oberlippe. Liefert Fol. Salviae. Die aus Südeuropa stammende Pflanze wird bei uns häufig angebaut. Zahlreiche Arten mit petaloid gefärbtem Kelch, z. B. *S. splendens* (mit feuerroten Blüten), sind beliebte Zierpflanzen.




Abb. 507. Blüte von *Rosmarinus officinalis*: st Staubgefäß, n Griffel mit Narbe.

Off. *Rosmarinus officinalis*, Rosmarin, im Mittelmeergebiet heimisch, zeigt dieselbe Eigentümlichkeit der Staubgefäße, wie *Salvia*, nur mit dem Unterschiede, daß das Konnektiv nicht so deutlich gegliedert ist und der unfruchtbare Arm desselben nur ein unscheinbares Fähnchen bildet (Abb. 507). Liefert Fol. Rosmarini und wird zu diesem Zwecke, sowie als Ziergewächs, auf dem Lande häufig angebaut.

*Hyssopus officinalis*, in Südeuropa heimisch, liefert Herba Hyssopi.

*Galeopsis ochroleuca*, *G. versicolor* und *G. tetrahit* sind häufige Unkräuter auf Feldern und in Waldschlägen und liefern Herba Galeopsidis, *Betonica officinalis*, *Betonie*, Herba *Betonicae*, *Marrubium vulgare*, Andorn, Herba *Marrubii*, *Ballota nigra*, *Ballota*, Herba *Ballotæ*, *Prunella vulgaris* und *P. grandiflora* Herba *Prunellæ*, *Teucrium flavum* Herba *Teucrii*, *T. marum* Herba *Mari veri*, *T. botrys* Herba *Botryos* und *T. scordium* Herba *Scordii*. Die meisten von ihnen sind in Deutschland einheimisch; die übrigen stammen aus den Mittelmeerländern.

*Ocimum basilicum*, Basilie, ist ein bekanntes Küchenkraut.

*Origanum vulgare*, Dost, ist auf sonnigen Hügeln häufig und *O. majorana*, Majoran oder Majoran, ist die Stammpflanze von Herba *Majoranæ* und zugleich Küchen- und Gewürzkräut. *Satureja hortensis*, Pfefferkraut, dergleichen. *Ajuga reptans*, Günsel, ist ein auf Wiesen und an Waldrändern häufiges Unkraut.

### Solanaceae.

#### Familie der Nachtschattengewächse.

Die in pharmazeutischer Beziehung überaus wichtige Familie der Nachtschattengewächse ist nach dem Bau der Blüten der vorhergehenden Familie nahe verwandt, zeichnet sich aber dennoch durch eine Anzahl sehr charakteristischer Besonderheiten aus, namentlich in bezug auf den Fruchtknoten. Dieser besteht zwar ebenfalls aus zwei Fruchtblättern, wird jedoch nicht vierfächerig wie bei den *Borraginaceae*, sondern bleibt zweifächerig. Die Stellung des Querschnittbildes des Fruchtknotens zur Achse ist eine schräge (Abb. 508), d. h. eine durch die Mitte der Fruchtblätter gezogene Linie schneidet die Achse der Pflanze, an welcher die

Blüte seitlich ansitzt, nicht. Die Nachtschattengewächse haben die Eigentümlichkeit, daß in der Blütenregion die vorhandenen Laubblätter bis zu einem gewissen Punkte mit den Infloreszenz-Sprossen oder die Infloreszenz-Sprosse mit der Hauptachse bis zum nächsthöheren Laubblatt verwachsen, so daß häufig infolge der laubblatt-





Abb. 508. Schräg zygomorphe Solanaceenblüten: A von *Datura stramonium*, B von *Hyoscyamus niger*.



Abb. 509. *Solanum dulcamara*.

artigen Ausbildung der Blüten-Vorblätter Blätter der verschiedenen Knoten in gleicher Höhe, im Winkel von  $90^\circ$ , beieinander stehen, sogenannte gepaarte Blätter, die außerdem häufig ungleich groß sind. Die Frucht ist eine Beere oder Kapsel, beide mit sehr zahlreichen Samen an dicken Placenten. Die Nachtschattengewächse sind meist Kräuter mit bikollateralen Leitbündeln und zahlreichen Drüsenhaaren. Sie zeichnen sich fast durchweg durch einen hohen Alkaloidgehalt aus, weshalb eine große Zahl derselben medizinische Anwendung findet.

*Solanum tuberosum*, die Kartoffelpflanze, stammt von den Anden Südamerikas und ist seit ihrer Einführung in Europa ihrer essbaren Knollen wegen von großer volkswirtschaftlicher Bedeutung geworden. *S. dulcamara*, das Bittersüß (Abb. 509), ein in Europa namentlich an Flußufern verbreiteter, häufig in Bäumen hochkletternder Halbstrauch, liefert *Stipites Dulcamarae*. *S. nigrum* ist ein verbreitetes Unkraut, *S. lycopersicum* ist die aus Südamerika stammende Tomate mit roten, kugelig-wulstigen Früchten, die als Marktartikel bekannt sind und in zahlreichen Formen mit mehr als 2 Karpellen im Fruchtknoten gezogen werden.



Abb. 510. *Atropa belladonna*: A Blühender Zweig, B Blüte aufgeschnitten und ausgebreitet, C Staubblätter, D Fruchtknoten, E Narbe, F Fruchtknotenquerschnitt, G Samen, rechts ein solcher im Längsschnitt.

Off. *Atropa belladonna*, die Tollkirsche (Abb. 510), wächst in Laubwäldern wild und hat durch ihre mit Kirschen allerdings kaum zu verwechselnden Beeren (Abb. 510, A) schon manche verhängnisvolle Vergiftung veranlaßt. Liefert Fol. *Belladonnae* und Radix *Belladonnae*. Atropin ist in allen Teilen der Pflanze enthalten.

Off. *Capsicum annuum*, der Spanische Pfeffer (Abb. 511), ist ein in Mexiko heimisches, in Südeuropa kultiviertes strauchartiges Kraut mit bis finger-

langen, kegelförmigen Beeren (Abb. 512), deren Fruchtfleisch beim Trocknen ganz verschwindet. Liefert das Gewürz Paprika, sowie Fruct. Capsici.



Abb. 511. *Capsicum annuum*.




Abb. 512. Fructus Capsici. *A*, Reife frische Frucht, *B* u. *C* Querschnitt einer zweifächerigen Frucht, *B* oben, *C* unterhalb der Mitte geschnitten, *D* Samen, *E* derselbe im Längsschnitt, *F* im Querschnitt.



Abb. 513. *Datura stramonium*.



Abb. 514. Aufspringende reife Frucht von *Datura stramonium*.

*Physalis alkekengi*, Judenkirsche, mit scharlachroten Beeren in einem aufgeblasenen, mennigroten Kelch, ist eine Gartenzierpflanze und war früher medizinisch gebräuchlich (Fruet. Alkekengi).

Off. *Datura stramonium*, der Stechapfel (Abb. 513), besitzt eine weiße, trichterförmige Blumenkrone und trägt weichstachelige Kapseln (daher der Name Stechapfel), welche in vier Klappen aufspringen (Abb. 514). Sie ist eine echte Schuttpflanze, liefert Fol. und Sem. Stramonii und enthält Atropin und verwandte Alkaloide.

Off. *Hyoscyamus niger*, das Bilsenkraut (Abb. 515), ein in Europa und auch anderweit besonders auf Schutt und den Dorfgängern verbreitetes Unkraut, zeichnet sich durch seine mit einem Deckel aufspringenden Kapseln aus (Abb. 515, A). Liefert Fol. und Sem. Hyoscyami. Beide enthalten Hyoscyamin.

Off. *Nicotiana tabacum*, der Tabak (Abb. 516), aus Südamerika stammend, aber in allen Tropengegenden, sowie auch in gemäßigten Klimaten kultiviert, liefert Fol. Nicotianae und enthält Nikotin. *N. rustica*, der „Bauerntabak“, liefert in den östlichen Mittelmeerländern den geschätzten Zigaretentabak.



Abb. 515. *Hyoscyamus niger*: A reife Frucht (Deckelkapsel).

### Scrophulariaceae.

Familie der Rachenblütlergewächse.

Die Gewächse dieser Familie besitzen in ihrem Blütenbau große Verwandtschaft einerseits mit den Labiäten, andererseits, namentlich wegen ihrer zweifächerigen, vielsamigen Fruchtknoten, mit den Solanaceen. Der Kelch ist fünfzählig, bald regelmäßig, bald mit verkümmertem hinterem Kelchblatt (Abb. 517, C). Die Blumenkrone ist zuweilen fast völlig aktinomorph (bei *Verbascum*), zuweilen völlig zweilippig ausgeprägt. Bei einer Anzahl der hierher gehörigen Gewächse (z. B. *Linaria*, *Antirrhinum*) verschließt die Unterlippe durch eine gaumenförmige Ausstülpung den Zugang zur Blumenkronröhre fast vollständig (Abb. 521), und diese Eigentümlichkeit hat zu der Namengebung: „Rachenblütler oder Maskenblütler“ (*Personatae*)<sup>1)</sup> Veranlassung gegeben. Die größte Mannigfaltigkeit waltet in der Ausbildung der Staubgefäße. Sämtliche fünf Staubgefäße sind nur bei *Verbascum* ausgebildet (Abb. 517, A). Bei *Digitalis* fehlt das hintere Staubgefäß (Abb. 517, B). Bei *Gratiola* und *Veronica* fehlen außer dem hinteren Staubgefäß auch die beiden vorderen (Abb. 517, C). Daher gehören die Scrophulariaceen teils der V., teils der XIV. und teils der II. Klasse nach Linné an. Aus dem aus zwei Fruchtblättern bestehenden Fruchtknoten bildet

<sup>1)</sup> Von *persona* = die Maske.

sich eine vielsamige Kapsel. Die Blüten stehen wie bei den Labiäten in den Achseln der Laubblätter oder sind an der Spitze des Sprosses traubenförmig einander genähert. Die Gewächse dieser Familie sind



Abb. 516. *Nicotiana tabacum*. A Blatt v. d. Stengelmittle ( $\frac{1}{2}$ ), B Spitze eines Blütenastes ( $\frac{1}{2}$ ), C Blüte im Längsschnitt ( $\frac{3}{4}$ ), D Staubblatt ( $\frac{3}{4}$ ), E Fruchtknoten im Längsschnitt ( $\frac{2}{3}$ ), F im Querschnitt ( $\frac{3}{4}$ ), G Frucht ( $\frac{1}{2}$ ), H Samen ( $\frac{15}{4}$ ), J derselbe längs durchgeschnitten ( $\frac{15}{4}$ ).




Abb. 517. Grundriß von Scrophulariaceenblüten: A *Verbasium* mit fünf, B *Digitalis* mit vier und C *Veronica* mit zwei Staubgefäßen.




Abb. 518. Flores Verbasci. *A* Blumenkrone von oben gesehen ( $\frac{1}{4}$ ), *B* unteres unbehaartes, *C* oberes, stark behaartes Staubblatt ( $\frac{2}{4}$ ), *D* ein Haar davon ( $\frac{90}{1}$ ), *E* Etagenhaar von der Außenseite der Blumenkrone ( $\frac{90}{1}$ ).



Abb. 519. *Gratiola officinalis*. *A* Blühender Zweig, *B* Knospe, *C* Blumenkrone aufgeschlitzt und ausbreitet, *D* Anthere.

meist bei uns einheimische Kräuter, zum Teil auf Wurzeln anderer Pflanzen schmarotzend.

*Scrophularia nodosa*, Braunwurz, an Wassergräben und in Gebüsch häufig wild, war früher als Herb. Scrophulariae medizinisch gebräuchlich.

Off. *Verbascum phlomoides* und *V. thapsiforme* (Abb. 518), Wollkraut, zwei wenig voneinander verschiedene Arten mit beiderseits wollfözig be-




Abb. 520. *Digitalis purpurea*: a eine einzelne Blüte, b dieselbe im Längsschnitt.

haarten Laubblättern und hellgelben Blüten, deren zwei vordere Staubfäden kahl, die drei hinteren weißwollig behaart sind, liefern Flor. Verbasci. Die Blüten von *V. thapsus* sind nicht officinell.




Abb. 521. Blüte von *Antirrhinum majus*: o Oberlippe, u Unterlippe, g gaumenförmige Ausstülpung derselben; A die Blumenkrone im Längsschnitt.



Abb. 522. Blütendiagramm von *Plantago media*. (Nach Eichler.)

Off. *Digitalis purpurea*, Fingerhut (Abb. 520), mit röhrenförmig bauchigen, purpurnen Blumenkronen (Abb. 520 a, b), welche zu endständigen, einseitwendigen Trauben vereinigt sind, wächst in den deutschen Gebirgswäldern und ist die Stammpflanze der Fol. Digitalis.

*Antirrhinum majus*, das Löwenmaul (Abb. 521), ist eine beliebte Gartenzierpflanze, die in vielen Farbenspielarten gezogen wird.

*Linaria vulgaris*, Leinkraut, liefert Herb. Linariae. *L. arvensis* ist auf Äckern häufig. *Linaria* besitzt, wie die vorige Gattung, gespornte Blüten.

*Veronica*-Arten, wie *V. officinalis*, *V. arvensis* u. a., Ehrenpreis, sind meist sehr verbreitete Unkräuter und liefern Herb. Veronicae.

*Gratiola officinalis*, Gottesgnadenkraut, mit zweilippig gespaltenen Blüten (Abb. 519), wächst an Flußufern wild und ist die Stammpflanze der giftigen Herb. Gratiolae.

*Euphrasia officinalis*, Augentrost, eine häufige Wiesenpflanze, liefert Herb. Euphrasiae.

*Melampyrum*-Arten, Wachtelweizen, *Pedicularis silvatica* und *palustris*, *Rhinanthus*-Arten, Hahnenkamm, u. a. m. sind bei uns häufige Unkräuter. Sie sind sämtlich Halbparasiten.



Abb. 523. *Rubia tinctorum*. A Blühender Zweig, B Blüte, C Knospe, D Blüte im Längsschnitt, E Fruchtknoten nach Entfernung der Blütenorgane, F Fruchtknoten im Längsschnitt, G derselbe im Querschnitt.

#### 6. Reihe. Plantaginales. Wegebreitartige.

Blüten stets 4-gliedrig; bis auf die wenigerzähligen Carpiden gleichzählig, strahlig, hermaphrodit oder seltener getrenntgeschlechtig, hypogyn. — Meist Kräuter mit abwechselnden Blättern.

**Plantaginaceae.**

Familie der Wegebreitgewächse.

Diese sind Kräuter mit regelmäßigen Blüten, welche (durch Unterdrückung des hinteren Kelchblattes und Staubgefäßes?) vierzählig erscheinen (Abb. 522); die Blütenhülle ist unscheinbar, häutig, der Fruchtknoten ein- bis vierfächerig.

*Plantago major*, *P. media* und *P. lanceolata*, Wegebreit, Wegerich, sind häufige Unkräuter, teilweise als Herba Plantaginis früher gebräuchlich. *P. psyllium*, in Südeuropa heimisch, ist die Stammpflanze von Samen Psyllii.

7. Reihe. **Rubiales.** Krappartige.

Blüten epigyn, aktinomorph oder zygomorph, vier- oder fünfzählig, Kelch oft sehr reduziert, Staubgefäße der Korolle angewachsen. Fruchtknoten zwei- oder dreifächerig, in jedem Fache mit einer oder zahlreichen Samenanlagen. — Blätter gegenständig.

**Rubiaceae.**

Familie der Krappgewächse.

Die Blüten dieser Familie zeichnen sich allermeist durch einen sehr kleinen Kelch aus. Die Blüten sind fünf- oder vierzählig, also  $K5C(5)A5G(2)$  oder  $K4C(4)A4G(2)$  (zufällig ist die Vierzahl fast allen einheimischen, die Fünfzahl fast allen ausländischen Rubiaceen eigen). Die Fruchtblätter wachsen stets zu einem gefächerten Fruchtknoten aus (Abb. 523, F, G). Die bei uns einheimischen Arten besitzen laubblattartige Nebenblätter, welche an Größe den Laubblättern nicht nachstehen, so daß dadurch die Blattrosetten, wie man sie z. B. am Waldmeister zu sehen gewöhnt ist, zustande kommen (Abb. 523, 524). Bei den meisten übrigen Rubiaceen sind die Nebenblätter zwischen den Blattstielen auch stets vorhanden, sie sind aber kleiner. Die einheimischen Arten sind Kräuter, die ausländischen meist Bäume und Sträucher.

Man unterscheidet zwei Unterfamilien:

a) **Cinchonoideae.** Fruchtblätter mit zahlreichen Samenanlagen. Off. *Cinchona succirubra* (Abb. 526) und andere *Cinchona*-Arten, wie *C. calisaya*, *C. Ledgeriana*, *C. officinalis*, sämtlich an den Abhängen der Anden im nördlichen Südamerika heimische, auf den Gebirge der meisten Tropengegenden jetzt angebaute Bäume mit elliptischen Blättern und rispigen Blütenständen, liefern Cort. Chinae. Die erstgenannte Art ist officinell.

Abb. 524. *Galium aparine*.

Off. *Ourouparia* (oder *Uncaria*) *gambir* (Abb. 527), ein kletternder Strauch des malayischen Inselgebiets, ist die Stammpflanze des Gambir-Katechu.

b) **Coffeoideae.** Fruchtblätter mit je einer Samenanlage.

*Coffea arabica*, der Kaffeebaum (Abb. 528), stammt aus Abessinien und wird wie *C. liberica* und neuerdings noch andere im trop. Westafrika heimische Arten wegen seiner als Genußmittel dienenden, Coffein enthaltenden Samen (Kaffeebohnen genannt) in allen Tropengegenden angebaut.



Abb. 525. *Uragoga ipecacuanha*.

Off. *Uragoga ipecacuanha*, auch **Cephaëlis** oder **Psychotria ipecacuanha** (Abb. 525), ein kleiner Halbstrauch Brasiliens mit holzigem Rhizom, eiförmigen Blättern und kleinen weißen Blüten, liefert Rad. Ipecacuanhae.

*Rubia tinctorum*, der Krapp (Abb. 523), hat der Familie den Namen gegeben und wird wegen der Färbkraft seiner Wurzel, die auch als Rad. Rubiae tinct. in Apotheken geführt wird, angebaut.

*Asperula odorata*, der Waldmeister, wird wegen seines Cumaringehaltes zur Bereitung der Maibowlen benutzt und ist die Stammpflanze der Herb. Asperulae — Dieser Pflanze im Aussehen ähnlich sind die honigduftenden *Galium*- (Klebkraut-) Arten (Abb. 524), die bei uns in grosser Menge vorkommen.

**Caprifoliaceae.**

Familie der Geißblattgewächse.

Die Blüten dieser Familie sind denjenigen der vorhergehenden Familie ähnlich und nach der Fünzfahl gebaut (Abb. 529); sie weichen hauptsächlich durch den Bau ihres meist dreizähligen Frucht-

Abb. 526. *Cinchona succirubra*.

knotens von jenen ab. Ein Teil der Caprifoliaceen besitzt unregelmäßige Blüten. Die Frucht ist meist eine Beere.

Off. *Sambucus nigra*, der Flieder oder Holunder (Abb. 530), ist ein bei uns wildwachsender Strauch, welcher Flor. Sambuci (Abb. 529) liefert. Auch *S. ebulus*, der Attich oder Zwergflieder, wurde früher medizinisch angewendet; seine Wurzel ist neuerdings durch Pfarrer Kneipp wieder als Heilmittel in Aufnahme gekommen.

**Viburnum opulus** Schneeball, ist ein an Bachufem wildwachsender Strauch, welcher auch in einer sog. gefüllten Form, die bloß geschlechtslose Schaublüten aufweist, als Gartenzierstrauch gezogen wird. Dasselbe gilt von den **Lonicera**-Arten, Geißblatt oder Jelängerjelier.

**Adoxa moschatellina**, Moschus- oder Bisamkraut, wächst in feuchten Gebüschem wild. — Sie wird häufig als einziger Vertreter einer besonderen Familie, **Adoxaceae**, hingestellt.




Abb. 527. Ourouparia (Uncaria) gambir.

### Valerianaceae.

Familie der Baldriangewächse.

Die Gewächse dieser Familie sind Kräuter mit gegenständigen, einfachen oder geteilten Blättern, deren stets unregelmäßige Blüten in Trugdolden angeordnet sind. Der Kelch ist meist verschwindend klein, oft erst nach der Befruchtung sich entwickelnd und dann einen sogenannten Pappus bildend (Abb. 531, *D*). Die am Saum unregelmäßige, glockige bis trichterförmige Blumenkrone trägt die drei vorhandenen Staubgefäße. Von den drei Fruchtknotenfächern trägt nur eins eine zur Reife gelangende Samenanlage. Die durchschnittliche Blütenformel ist:  $K O C (5) A 3 G \overline{3}$ . Die Frucht ist eine Achaene.



Abb. 528. *Coffea arabica*, der Kaffeestrauch. *A* blühender und fruchtender Zweig, *B* Frucht, *C* Fruchtquerschnitt, *D* Fruchtlängsschnitt, *E* Samen, noch teilweise in der Pergamenthülle eingeschlossen.




Abb. 529. Flores *Sambuci*. *A* Blüte von oben, *B* von unten gesehen (*v* Vorblätter unter dem Kelch, *C* Grundriß der Blüte.

Abb. 530. *Sambucus nigra*.

Off. *Valeriana officinalis*, Baldrian (Abb. 531, 532), wächst an Bachufern bei uns wild und liefert Rad. Valerianae. *V. dioica* ist auf nassen Wiesen häufig, medizinisch aber nicht verwendbar.




Abb. 531. A Blüte von *Valeriana officinalis*, B dieselbe längsdurchschnitten, C der Fruchtknoten nach dem Verblühen, D reife Frucht.

*Valerianella olitoria* und *V. dentata*, Rapünzchen, auf Brachäckern wildwachsend, liefert Blätter, die als Salat („Feldsalat“) geschätzt sind.

*Centranthus ruber*, Spornblume, aus dem Mittelmeergebiet stammend, bei uns als Gartenzierpflanze, ist interessant, weil sie nur 1 Staubgefäß besitzt und daher zu Linnés I. Klasse gehört.

### Dipsacaceae.

Familie der Kardengewächse.

Die mit Außenkelch versehenen Blüten dieser Familie sind meist zygomorph, die Krone vier- bis fünfflappig, mit vier freien Staubgefäßen und einfachem Griffel. Es sind Kräuter mit gegenständigen Blättern.



Abb. 532. *Valeriana officinalis*.

*Dipsacus pilosus* und *D. silvestris*, sind zwei wildwachsende Kardendistelarten; *D. fullonum*, die Weberdistel, wird viel kultiviert und zum Rauhen der Stoffe benutzt.

*Succisa pratensis*, Teufelsabbiß, ist die Stammpflanze der obsoleten Rad. Morsus Diaboli. *Knautia arvensis* und *Scabiosa columbaria* sind auf Wiesen und Feldern häufig wildwachsende Pflanzen.

### 8. Reihe. Cucurbitales.

Kürbisartige.

Blüten typisch fünfgliederig, Anthere mit zwei einfächerigen Theken, entweder fünf frei oder je zwei vereint oder alle fünf zu einem zentralen Synandrium verbunden.

**Cucurbitaceae.**

## Familie der Kürbisgewächse.

Die Kürbisgewächse sind Kräuter mit verhältnismäßig dicken, saftigen, kletternden Stengeln. Ihre Blüten sind fünfzählig und meist getrenntgeschlechtlich. Die Blumenkrone ist glocken- oder trichterförmig. In den männlichen Blüten sind häufig nur drei Staubgefäße vorhanden, von denen jedoch zwei breiter und durch seitliche Verwachsung je zweier Staubblätter entstanden sind. Die Staubfäden




Abb. 533. *Citrullus colocynthis*: A Eine männliche Blüte geöffnet; B, a ein doppeltes, b ein einfaches Staubblatt; C eine weibliche Blüte längsdurchschnitten; D Querschnitt durch die Frucht: a Samenleiste, eine falsche Scheidewand bildend, b echte Scheidewand.

sind häufig zu einer zentralen Säule verbunden, an welcher die Antheren wegen ihres stärkeren Längenwachstums wurmförmig gekrümmt erscheinen (Abb. 533, B). Der unterständige Fruchtknoten (Abb. 533, C) der weiblichen Blüten ist ursprünglich dreifächerig, wird jedoch im Verlaufe des Wachstums durch eigentümliche falsche Scheidewände, welche zwischen den echten Scheidewänden entstehen, oft sechsfächerig (Abb. 533, D).

*Cucurbita pepo*, der Kürbis, hat der Familie den Namen gegeben und wird ebenso wie *Cucumis melo*, die Melone, wegen seiner essbaren Frucht kultiviert; desgleichen *Cucumis sativus*, die Gurke.

Off. *Citrullus colocynthis* (Abb. 533, 534), ein in Afrika heimisches Rankengewächs mit tief fiederspaltigen Blättern, liefert *Fruct. Colocynthisidis*. — *C. vulgaris* ist die Stammpflanze der Wassermelone.

*Bryonia alba* und *B. dioica* (Abb. 535), Zaunrübe, sind die Stammpflanzen von *Rad. Bryoniae*.

9. Reihe. **Campanulatae.** Glockenblumenartige.

Blüten typisch fünfgliedrig mit gleichzähligen Staubblättern und meist minderzähligen Fruchtblättern. Die Antheren der Staubblätter zusammenneigend und

Abb 534. *Citrullus colocynthis*.

häufig miteinander teilweise oder sämtlich verwachsen. Fruchtknoten unterständig, mehrfächerig mit zahlreichen Samenanlagen, oder einfächerig mit nur einer einzigen Samenanlage.

**Campanulaceae.**

Familie der Glockenblumengewächse.

Diese sind milchsafftführende Kräuter der gemäßigten Zone. Die Blüten sind aktinomorph oder zygomorph, mit entweder freien oder meist verklebten Antheren; der Fruchtknoten ist mehrfächerig, die Frucht eine Kapsel.



Abb. 535. *Bryonia dioica*.Abb. 536. Grundriß einer *Lobelia*-Blüte.

Abb. 537. *Lobelia inflata*. *A* Habitus der blühenden Pflanze, unten mit bereits halbreifen Früchten. *B* Längsschnitt durch die Blüte, *C* junger Griffel, Narbe noch geschlossen, die den Pollen aus der Staubblattröhre heraus fegende Feghaare ausgebreitet, *D* älterer Griffel, Narbenschkel ausgebreitet, empfängnisfähig, Feghaare größtenteils vertrocknet, *E* Querschnitt durch den Fruchtknoten, *F* reifer Samen, *G* derselbe im Längsschnitt. (Nach Berg u. Schmidt.)

1. Unterfamilie **Campanuloideae.**

Blüten strahlig.

*Campanula persicifolia*, *C. rotundifolia*, *C. patula*, *C. rapuncululus*, *C. trachelium*, *C. rapunculoides* und *C. glomerata*, Glockenblumen, sind sämtlich durch blaue, glockenförmige Blüten ausgezeichnete Kräuter unserer Wiesen und Gebüsche.

*Phyteuma spicatum*, Teufelskralle, ist eine seltenere Campanulacee unserer Bergwiesen und Wälder.

*Jasione montana* kommt auf sandigen Anhöhen vor.

## 2. Unterfamilie **Lobelioideae**.

Diese Unterfamilie der Campanulaceen besitzt zwei Fruchtfächer; im übrigen herrscht im Blütenbau die Fünfzahl vor:  $K\ 5\ C\ (5)\ A\ (5)\ G\ (2)$  (Abb. 536). Die Blüten sind deutlich zygomorph und schwach lippen-




Abb. 538. Zwitterige Scheibenblüte einer Kompositae: *a* die zu einer Röhre verwachsenen Antheren, *f* Fruchtknoten, *p* Ansatz zum Kelch (Pappus), *g* Griffel, *n* Narbe, *c* die Blumenkrone.



Abb. 539. *a* Blütenköpfchen von *Centaurea cyanus*, *b* eine einzelne Randblüte, *c* eine einzelne Scheibenblüte.




Abb. 540. Grundriß der typischen Kompositenblüte.

förmig ausgebildet. Die Staubbeutel sind zu einer Röhre verklebt. Die Frucht ist meist eine Kapsel.

Off. *Lobelia inflata* (Abb. 537), in Nordamerika heimisch, liefert Herba *Lobeliae*.

*L. erinus* ist eine sehr beliebte vom Kap stammende Gartenzierpflanze.

## **Compositae**

### Familie der Korbblütlergewächse

(auch Synanthereae, Röhrenbeutelige Gewächse, genannt).

Die Kompositen sind eine so große und gleichzeitig mit so auffällig charakteristischen Merkmalen begabte Familie, daß Linné, der sämtliche übrigen Familien in 23 Klassen unterzubringen imstande war, für diese Familie eine besondere Klasse schuf; zu derselben zählte er ursprünglich allerdings noch einige weitere Pflanzen, die man heute aber daraus entfernt und nach der Zahl ihrer Staubgefäße eingeordnet hat. Das Merkmal, welches Linné als Charakteristikum für seine XIX. Klasse (Syngenesia von *σύν*, syn = zusammen, und *γένεα*, genea = das Geschlecht) wählte, ist das Verwachsensein der fünf vorhandenen Staubbeutel zu einer Röhre

(Abb. 538 a), während die Staubfäden frei sind. Dieses Merkmal hat auch zu dem jetzt nur noch selten gebrauchten Familiennamen Synanthereae = Röhrenbeutelige Gewächse geführt. Das zweite hauptsächlichste Merkmal besteht darin, daß die Einzelblüten stets zu Köpfchen vereinigt sind, d. h. zu einem Blütenstande, an welchem die Hauptachse sowohl, wie sämtliche Nebenachsen auf Null reduziert sind und eine tellerförmige, kegelförmige oder kopfförmige Verdickung der Achse die Ansatzstelle für die zahlreichen Einzelblüten bildet; der Namen Compositae oder Korbblütler rührt daher, daß der gesamte Blütenstand körbchenförmig von einem meist vielreihigen Kranze von Hüllblättern, Involucrum genannt, umgeben wird (Abb. 539, a). Außerdem besitzen die Einzelblüten aber auch meist noch Deckblättchen, in deren




Abb. 541. Ein Kompositenköpfchen längsdurchschnitten: *f* die kopfförmige Verdickung der Achse, *i* das involucrum, *a* Randblüten, *i* Scheibenblüten, *s* Spreublättchen.

Abb. 542. Formen der Kompositenblüten: *a* Röhrenblüte, *b* Zungenblüte, *c* Lippenblüte. (C. Müller.)

Achsel sie eingefügt sind (Abb. 541, *s*), welche also neben den Einzelblüten auf dem Blütenboden stehen und als Spreublättchen bezeichnet zu werden pflegen.

Man muß sich daher hüten, die Körbchen der Kompositen als Blüten anzusehen, als welche der Volksmund sie bezeichnet. Die „Kornblume“ z. B. (Abb. 539) ist keine Blüte, sondern ein Blütenstand.

Die Einzelblüten der Kompositen zeigen verschiedene Form und können ein- oder zweigeschlechtlich oder auch geschlechtslos sein, sind jedoch ausnahmslos nach dem Typus  $K5 - \infty C(5) A(5) \overline{G(2)}$  (Abb. 540) gebaut. Der Kelch ist wie bei den Valerianaceen zur Blütezeit kaum mehr als angedeutet und wächst meist erst nach der Befruchtung zu einer Haarkrone, Pappus genannt, aus. Die Blumenkrone ist röhrenförmig und entweder mit fünf regelmäßigen Zipfeln versehen (Abb. 542, *a*), oder aber es sind alle fünf Zipfel zu einer Lippe verbunden und lang ausgebreitet (Abb. 542, *b*). Ein dritter Fall, daß drei der Zipfel eine Oberlippe und die beiden übrigen eine Unterlippe bilden (Abb. 542, *c*), kommt nur bei einigen ausländischen Arten vor. Die

Abb. 543. *Tussilago farfara*.Abb. 544. *Inula helenium*.

Abb. 545. *Artemisia absinthium*. A Grundständiges Fiederblatt ( $\frac{3}{4}$ ), B blühender Zweig ( $\frac{3}{4}$ ), C junges Blütenköpfchen im Längsschnitt ( $\frac{1}{4}$ ), D aufgeblühtes Köpfchen ( $\frac{1}{4}$ ), E weibliche Randblüte ( $\frac{8}{1}$ ), F zwitterige Scheibenblüte ( $\frac{7}{1}$ ), G Pollenkörner ( $\frac{200}{1}$ ), H T-förmiges Haar vom Blütenstand ( $\frac{150}{1}$ ).

Staubgefäße besitzen, wie schon erwähnt, freie Staubfäden, aber ihre Staubbeutel sind zu einer Röhre verbunden. Der in der Mitte hindurchwachsende Griffel befördert mit seinen beiden federigen Spitzen den Pollen der Staubbeutel nach oben und bietet ihm den




Abb. 546. *Artemisia cinna*.

Abb. 546a. Flores *Cinnae*. *A* junges Blütenköpfchen, *B* dasselbe im Längsschnitt ( $\frac{9}{1}$ ), *C* Blatt des Hülkelches von aussen ( $\frac{20}{1}$ ), *D*, *E* Drüsenhaare, *F* Pollenkorn ( $\frac{200}{1}$ ).

Insekten zur Übertragung auf die Narben anderer Pistille dar. Die empfängnisfähige Stelle der Narbe befindet sich an der Trennungsstelle der beiden Narbenzipfel. Der unterständige, einfächerige Fruchtknoten besteht aus zwei Fruchtblättern, trägt jedoch nur eine einzige Samenanlage und wird bei der Reife zu einer Achaene, wie bei den Valerianaceen.

Nur selten sind alle Blüten eines Köpfchens gleich. Sind sie verschieden, so nennt man den äußeren Kreis Randblüten oder

Strahlenblüten, die von diesen umgebenen dagegen Scheibenblüten. Nach dem Geschlecht beider (ob männlich, weiblich, zwitterig oder unfruchtbar) teilte Linné seine Ordnungen der XIX. Klasse ein (siehe Seite 137). — Der bei den Kompositen vorkommende Reservestoff ist Inulin.

Je nach der Gestalt der Einzelblüten teilt man die zu den Kompositen gehörigen Gattungen ein in:

- a) Röhrenblütler (Tubuliflorae), bei denen entweder sämtliche Blüten des Köpfchens röhrenförmig, oder aber die Scheibenblüten röhrenförmig, die Randblüten zungenförmig,




Abb. 547. *Arnica montana*. A Blüte im Längsschnitt ( $\frac{1}{4}$ ), B Randblüte ( $\frac{3}{2}$ ), C Scheibenblüte ( $\frac{1}{1}$ ), D Pollenkorn ( $\frac{2}{1}$ ), E Spitze eines Pappushaars ( $\frac{150}{1}$ ), F Doppelhaar vom Fruchtknoten ( $\frac{150}{1}$ ), G Haar von der Blumenkrone ( $\frac{90}{1}$ ).

jedenfalls also die Scheibenblüten nicht zungenförmig sind und welche häufig schizogene Sekretbehälter, niemals aber Milchsäftschläuche enthalten;

- b) Zungenblütler (Liguliflorae), bei denen sämtliche Blüten zungenförmig sind und welche gegliederte Milchsäftschläuche führen.

#### a) Röhrenblütler, Tubuliflorae:

Off. *Tussilago farfara*, Huflattich (Abb. 543), ein an Flußufern auf Lehm Boden häufiges Kraut, liefert Fol. und Flor. Farfarae.

*Petasites officinalis*, Pestwurz, ist mit jenem nahe verwandt, aber nicht officinell. Beide blühen im ersten Frühjahr lange vor Erscheinen der Blätter.

Off. *Inula helenium*, Alant (Abb. 544), ist die Stammpflanze von Rad. Helenii.

Off. *Artemisia absinthium*, der Wermut (Abb. 545), ein im Mittelmeergebiet verbreiteter Halbstrauch, liefert Herb. Absinthii, *A. cina* (auch manchmal noch *A. maritima* var. *pauciflora* genannt, Abb. 546, 546 a), wächst in Turkestan und ist die Stammpflanze der Flor. Cinae.



Abb. 543. *Cnicus benedictus*. *A* Blühender Zweig, *B* Blütenköpfchen, *C* ein solcher im Längsschnitt, *D* normale Scheibenblüte, *E* geschlechtslose Randblüte.

Off. *Arnica montana*, das Wohlverleihkraut (Abb. 547), auf Bergwiesen gedeihend, liefert Flor. und Rad. *Arnicae*.

Off. *Cnicus benedictus*, das Kardobenediktenkraut (Abb. 548), in Südeuropa gedeihend, ist die Stammpflanze der Herb. *Cardui benedicti*.

Off. *Matricaria chamomilla*, die Kamille (Abb. 549, 550), ein häufiges Unkraut auf Getreideäckern und an Wegen, liefert Flor. *Chamomillae*. Der kegelförmige Blütenboden derselben ist hohl.

*Anthemis nobilis*, die römische Kamille (Abb. 551), in den Mittelmeerländern wildwachsend, ist die Stammpflanze der Flor. *Chamom. Roman.* *A. arvensis* und *A. cotula*, die Acker- und Hundskamille, dürfen nicht mit der ähnlichen *Matricaria* verwechselt werden und besitzen einen im Innern mit Mark erfüllten Blütenboden.



Abb. 549. *Matricaria chamomilla*.

*Bellis perennis*, Gänseblümchen, ist auf Wiesen überaus häufig; die Blüten wurden ehemals medizinisch verwendet (Flor. Bellidis).

*Spilanthes oleracea*, die Parakresse (Abb. 552), wächst in Südamerika und liefert Herba Spilanthis.




Abb. 550. Flores Chamomillae. *A* junges Blütenköpfchen, sich eben ausbreitend, *B* dasselbe etwas älter, die Zungen der Randblüten horizontal ausgebreitet, *C* altes Blütenköpfchen, die Zungen der Randblüten schlaff herabhängend ( $\frac{1}{4}$ ). *D* altes Blütenköpfchen längs durchgeschnitten ( $\frac{2}{4}$ ), *E* ganze Randblüte ( $\frac{3}{4}$ ), *F* Scheibenblüte im Längsschnitt ( $1\frac{1}{4}$ ).

*Helianthus annuus*, die Sonnenblume, mit oft riesigen Blütenköpfen von bis  $\frac{1}{2}$  m Durchmesser, ist ein beliebtes Ziergewächs, aus dessen Samen ein sehr wohlschmeckendes Öl gepreßt wird; es dient auch zur Verfälschung des Olivenöls. *H. tuberosus*, Topinambur, und *H. macrophyllus* liefern Knollen, die neuerdings als „Helianthi“ viel gegessen werden.



Abb. 551. *Anthemis nobilis*.

Abb. 552. *Spilanthes oleracea*.

*Tanacetum vulgare*, der Rainfarn, bei uns an Wegen häufig, liefert Flor. Tanaceti.

*Achillea millefolium*, die Schafgarbe (Abb. 553), ist ebenfalls ein häufiges Unkraut. Blüten und Blätter sind als Flor. und Herb. Millefolii noch zuweilen gebräuchlich.

*Calendula officinalis*, die Ringelblume, liefert Flor. Calendulae und zeichnet sich durch verschiedene Gestalt der äusseren und inneren Früchte aus.

*Lappa (Arctium) major* und *L. minor* (Abb. 554), die Kletten, an Wegrändern häufige Unkräuter, liefern Rad. Bardanae.

Abb. 553. *Achillea millefolium*.Abb. 554. *Lappa minor*.

*Carlina vulgaris*, die Eberwurz, auf trockenen Hügeln gedeihend, ist die Stammpflanze von Rad. Carlinae. *C. acaulis*, in Mittelgebirgen, ist die bekannte Silber- oder Wetterdistel.

Abb. 555. *Carthamus tinctorius*.Abb. 556. *Taraxacum officinale*.

*Centaurea cyanus*, ist die bekannte blaue Kornblume (Abb. 539). Andere *C.*-Arten sind an Rainen und auf Hügeln häufig.

*Carthamus tinctorius*, die Färberdistel (Abb. 555), liefert Flor. Carthami, welche unter dem Namen Saflor als Safransurrogat gebräuchlich sind.

*Solidago virga aurea*, Goldrute, lieferte die früher gebräuchliche Herba Virgaureae, *Gnaphalium arenarium* ist die Stammpflanze der Flor. Stoechados. *Erigeron canadense*, aus Nordamerika stammend, ist überall auf Sandboden verwildert.



Abb. 557. *Pyrethrum roseum*. A Geöffnetes Blütenkörbchen. B Hüllkelch von unten gesehen. C Geöffnetes Blütenkörbchen getrocknet. D Pollenkorn, stark vergrößert.

*Dahlia variabilis*, die aus Mexiko stammende „Georgine“, wetteifert an Formen- und Farbenpracht mit den Chrysanthenen.

Chrysanthemum-Arten sind die auf Wiesen wildwachsenden Wucherblumen oder Margueriten. *Ch. indicum*, in Japan heimisch, wird neuerdings



Abb. 558. *Lactuca virosa*.



Abb. 559. *Cichorium intybus*

in zahlreichen Spielarten mit prachtvollen, grossen Köpfen kultiviert und ist jetzt wohl die beliebteste Winterzierpflanze.

*Pyrethrum cinerariifolium*, in Dalmatien heimisch, liefert Dalmatisches Insektenpulver, und *P. roseum* (Abb. 557), sowie *P. carneum*, das persische Insektenpulver.

**b) Zungenblütler, Liguliflorae:**

Off. *Taraxacum officinale*, der Löwenzahn (Abb. 556), ein lästiges Unkraut, liefert Rad. *Taraxaci* c. herba.

Off. *Lactuca virosa*, der Giftlattich (Abb. 558), welcher in Südeuropa wild wächst, in Frankreich und an der Mosel angebaut wird, ist die Stammpflanze des Lactucarium; *L. sativa* hingegen ist der bei uns sehr geschätzte Kopfsalat.

*Cichorium intybus*, die Cichorie (Abb. 559), ein an Wegrändern häufiges Unkraut, wurde früher medizinisch verwendet. Ihre Wurzel liefert das bekannte Kaffeesurrogat. *C. endivia* gibt den bekannten Salat Endivie.

*Tragopogon pratensis*, Bocksbart, wächst auf Wiesen und Triften häufig.

☞ *Hieracium*-Arten, Habichtskraut, beleben in zahlreichen Arten trockene Triften und Wiesen und sind besonders in den Gebirgen in zahlreichen schwer trennbaren Arten verbreitet.

*Sonchus*-Arten, Gänsedistel, sind milchende, gelbblühende Weichdisteln und stellenweise sehr verbreitet.

*Scorzonera hispanica*, Schwarzwurzel, wird wegen ihrer Wurzeln als Gemüsepflanze kultiviert. Die Blätter dieser Pflanze sind die einzigen, welche die Maulbeerblätter bei der Seidenraupenzucht zu ersetzen vermögen.

## Sachregister.

(Die beigeetzten Zahlen bedeuten die Seitenzahlen.)

- Abies alba* 250.  
*Abies balsamea* 250.  
Abieteeae 248, 249.  
Abschnürung 96.  
Absorptionssystem 109.  
*Acacia arabica* 329.  
*Acacia catechu* 329.  
*Acacia senegal* 329.  
*Acacia verek* 329.  
Aceraceae 351.  
*Acer campestre* 351.  
*Acer platanoides* 351.  
*Acer pseudoplatanus* 351.  
Achaene 66.  
*Achillea millefolium* 416.  
Achse 32.  
Achsenbecher 56.  
Achsenfiguration 57.  
Ackerhornkraut 293.  
*Aconitum napellus* 299.  
*Acorus calamus* 264.  
*Adiantum capillus veneris* 234.  
Adlerfarn 234.  
*Adonis vernalis* 299.  
Adoxaceae 404.  
*Adoxa moschatellina* 404.  
Acidien 206.  
Ähre 63.  
Aerobionten 148.  
Aerobionten, fakultative 148.  
*Aesculus hippocastanum* 351.  
Aestivation 40.  
*Aethusa cynapium* 370.  
Agar-Agar 190.  
Agaricaceae 212.  
*Agaricus albus* 212.  
*Agaricus campestris* 214.  
*Agathis australis* 249.  
*Agathis dammara* 249.  
*Agave americana* 269.  
*Agave rigida* var. *sisalana* 270.  
*Agrimonia eupatoria* 326.  
*Agropyrum repens* 258.  
*Agrostemma githago* 296.  
Ahorngevächse 351.  
*Ajuga reptans* 392.  
Akaroidharz 267.  
Akazie 336.  
Akelei 301.  
Alae 332.  
Alant 414.  
*Aleurites moluccana* 349.  
Aleuronkörner 89.  
*Alisma plantago* 254.  
Alismataceae 254.  
Alkaloide 91.  
*Alkanna tinctoria* 387.  
*Alliaria officinalis* 315.  
Allioideae 267.  
*Allium ascalonicum* 267.  
*Allium cepa* 267.  
*Allium fistulosum* 267.  
*Allium sativum* 267.  
*Allium schoenoprasum* 267.  
*Alnus glutinosa* 283.  
*Alnus incana* 283.  
Aloë 267.  
Aloë africana 267.  
Aloë ferox 267.  
Aloë, hundertjährige 269.  
Aloë lingua 267.  
Aloë spicata 267.  
Aloë vulgaris 267.  
*Alopecurus pratensis* 258.  
Alpenrosen 374.  
Alpenveilchen 376.  
*Alpinia officinarum* 275.  
*Alsidium helminthochorton* 190.  
*Alsine verna* 293.  
Alsinoideae 293.  
*Alsophila australis* 234.  
*Althaea officinalis* 355.  
*Althaea rosea* 355.  
*Amanita caesarea* 214.

- Amanita muscaria 214.  
 Amaryllidaceae 269.  
 Amaryllisgewächse 269.  
 Ammoniacum 373.  
 Amphigastrien 226.  
 Amygdalae 327.  
 Amygdalus communis 326.  
 Amylum Marantae 275.  
 Amylum Oryzae 258.  
 Amylum Triticum 258.  
 Anacamptis pyramidalis 277.  
 Anacardiaceae 349.  
 Anacardienfrucht 70.  
 Anacardium occidentale 349.  
 Anaerobionten 148.  
 Anagallis arvensis 376.  
 Anamirta cocculus 303.  
 Ananas 265.  
 Ananasgewächse 265.  
 Ananas sativus 265.  
 Anatomie 77.  
 Anchusa officinalis 388.  
 Andira araroba 335.  
 Andorn 392.  
 Androeceum 47, 50, 60.  
 Androgynophor 311, 361.  
 Andropogon sorghum 257.  
 Anemone nemorosa 297.  
 Angiospermae 251.  
 Angosturarinde 342.  
 Anisum vulgare 368.  
 Annulus 233.  
 Anonaceae 304.  
 Anona muricata 304.  
 Anthela 65.  
 Anthemis arvensis 415.  
 Anthemis cotula 415.  
 Anthemis nobilis 415.  
 Anthere 50.  
 Antheridium 178, 188, 224.  
 Anthocyan 86.  
 Anthophylli 364.  
 Anthoxanthum odoratum 258.  
 Anthurium Scherzerianum 264.  
 Anthyllis 336.  
 Antipoden 242.  
 Antirrhinum majus 399.  
 Apetalae 279.  
 Apfelbaum 323.  
 Apfelfrucht 69.  
 Apfelsine 343.  
 Aphanizomenon 165.  
 Aphanothece 165.  
 Apocynaceae 381.  
 Apposition 93.  
 Aprikose 326.  
 Aquifoliaceae 351.  
 Aquilegia vulgaris 301.  
 Arabis Halleri 315.  
 Arabis hirsuta 315.  
 Aracene 263.  
 Arachis hypogaea 335.  
 Araliaceae 365.  
 Araucaria excelsa 249.  
 Araucarieae 248, 249.  
 Arbutoideae 374.  
 Archangelica officinalis 370.  
 Archegoniaten 222.  
 Archegonium 224.  
 Archichlamydeae 279.  
 Arctium 417.  
 Arctostaphylos uva ursi 374.  
 Areca catechu 261.  
 Arillus 75.  
 Aristolochiaceae 290.  
 Aristolochia clematitis 290.  
 Aristolochiales 290.  
 Aristolochia serpentaria 290.  
 Aristolochia siphon 290.  
 Armillaria mellea 213.  
 Armeleuchteralgen 182.  
 Arnica montana 415.  
 Aronsstabgewächse 263.  
 Arrhenaterum elatius 258.  
 Arrowroot 275.  
 Artemisia absinthium 414.  
 Artemisia cina 414.  
 Artemisia maritima 414.  
 Artemisia pauciflora 414.  
 Arten 133.  
 Artocarpus incisa 286.  
 Artocarpus integrifolia 286.  
 Arum maculatum 263.  
 Asa foetida 372.  
 Asarum europaeum 290.  
 Asclepiadaceae 383.  
 Ascolymenium 198.  
 Ascolichenes 219, 221.  
 Ascomycetes 195, 219, 221.  
 Ascus 195.  
 Asparagin 91.  
 Asparagoideae 268.  
 Asparagus officinalis 268.  
 Aspergillaceae 196.  
 Aspergillus herbariorum 196.  
 Asperifoliaceae 385.  
 Asperula odorata 402.  
 Asphodeloideae 267.  
 Aspidium filix mas 234.  
 Aspidosperma quebracho 382.  
 Assimilationsprozeß 111.  
 Assimilationsstärke 86.  
 Assimilationsssystem 111.  
 Assimilationswurzeln 32.  
 Astragalus adscendens 334.  
 Astragalus brachycalyx 334.  
 Astragalus gummifer 334.  
 Astragalus leiocladus 334.  
 Astragalus microcephalus 334.  
 Astragalus pycnocladus 334.  
 Astragalus verus 334.  
 Atemhöhle 128.

- Atemwurzeln 32.  
 Atmung 113.  
 Atmungsprozeß 113.  
 Atriplex 292.  
 Atropa belladonna 394.  
 Attich 403.  
 Aufbau der Pflanze 99.  
 Aufbewahren der Pflanzen 14.  
 Aufnahmesystem 109.  
 Aufspeicherung 112.  
 Augentrost 400.  
 Auricularia auricula judae 209.  
 Auriculariaceae 209.  
 Aurikel 376.  
 Ausläufer 32.  
 Aussenhülle 44.  
 Autobasidiomycetes 209.  
 Auxosporenbildung 174.  
 Avena sativa 258.  
 Azaleen 374.  
 Azygosporen 192.  
  
**Bacca** 68.  
 Bacillariaceae 175.  
 Bacillariophyta 171.  
 Bacillus 157.  
 Bacillus amylobacter 158.  
 Bacillus prodigiosus 149, 157.  
 Bacillus subtilis 157.  
 Bacillus typhi 158.  
 Bacteria 143.  
 Bacteriaceae 153.  
 Bacterium 153.  
 Bacterium aceticum 153.  
 Bacterium acidi lactici 153, 158.  
 Bacterium anthracis 153.  
 Bacterium tuberculosis 154.  
 Bärentraube 374.  
 Bärlappartige 238.  
 Bärlappgewächse 238.  
 Bärlappsamen 239.  
 Bakterien 143.  
 Bakterien, arthrospore 146.  
 Bakterien, chromogene 149.  
 Bakterien, endospore 146.  
 Bakterien, pathogene 149.  
 Bakterien, zymogene 149.  
 Bakteriopurpurin 152, 163.  
 Balata 376.  
 Baldrian 406.  
 Baldriangewächse 404.  
 Balgfrucht 67.  
 Ballota nigra 392.  
 Balsambaumgewächse 344.  
 Balsamodendron 344.  
 Balsamtanne 250.  
 Balsamum canadense 250.  
 Balsamum Copaiyae 331.  
 Balsamum Peruvianum 335.  
 Balsamum toltuanum 335.  
 Bambusa arundinacea 258.  
  
 Banane 273.  
 Bananengewächse 273.  
 Barbaraea vulgaris 315.  
 Baroskampfer 359.  
 Barosma crenata 342.  
 Bartflechte 222.  
 Basidien 202, 204.  
 Basidienpilze 202.  
 Basidiophytium 210.  
 Basidiolichenes 219, 222.  
 Basidiomycetes 202, 222.  
 Basidiosporen 202.  
 Basilie 392.  
 Bastfasern 107, 109.  
 Bastzellen 107.  
 Bauchmatt 54.  
 Bau, innerer der Pflanzen 77.  
 Baumwolle 355.  
 Bazillen 143.  
 Beere 68.  
 Beerenzapfen 249.  
 Beggiatoaceae 163.  
 Bellis perennis 416.  
 Benzoe 378.  
 Berberidaceae 301.  
 Berberis vulgaris 302.  
 Berberitzengewächse 301.  
 Bertholletia 89.  
 Besenginster 334.  
 Bestimmen der Pflanzen 8.  
 Beta vulgaris 292.  
 Betelpfeffer 280.  
 Betonica officinalis 392.  
 Betulaceae 283.  
 Betula pubescens 283.  
 Betula verrucosa 283.  
 Biberklee 380.  
 Bildungsgewebe, die 99.  
 Bilsenkraut 396.  
 Binse 260, 265.  
 Binsengewächse 265.  
 Birken 283.  
 Birkengewächse 283.  
 Birnbaum 323.  
 Bisamkraut 404.  
 Bitterholzgewächse 343.  
 Bitterklee 380.  
 Bitterstoffe 92.  
 Bittersüß 394.  
 Blätter, Formen der 36.  
 Blätter, gegenständige 44.  
 Blätter, quirlständige 44.  
 Blätterschwämme 212.  
 Blattfläche 39.  
 Blatthäutchen 41.  
 Blattnerven 112.  
 Blattscheide 36.  
 Blattspreite 36.  
 Blattstiel 36, 40.  
 Blüte 47.  
 Blütenblätter 36, 44.

- Blütenboden 56.  
 Blütendiagramme 58.  
 Blütenformeln 60.  
 Blütenhülle 47.  
 Blütenscheide 44.  
 Blütenstände 61.  
 Blumenblätter 48.  
 Blumenrohr, indisches 275.  
 Blutreizker 214.  
 Blutwunderpilz 157.  
 Bocksbart 419.  
 Bockshornklee 334.  
 Boehmeria nivea 288.  
 Bohne 335.  
 Boletus 212.  
 Boletus bulbosus 212.  
 Boletus edulis 212.  
 Bolle 267.  
 Boretschgewächse 385.  
 Borkenbildung 103.  
 Borraginaceae 385.  
 Borrago officinalis 386.  
 Bostryx 64.  
 Boswellia Carteri 344.  
 Botanisieren 4.  
 Botrychium lunaria 237.  
 Brachsenkraut 240.  
 Brandpilze 202, 204.  
 Brassica campestris 315.  
 Brassica juncea 315.  
 Brassica napus 315.  
 Brassica nigra 315.  
 Brassica oleracea 315.  
 Braunalgen 184.  
 Brauntange 184.  
 Braunwurz 399.  
 Brayera anthelmintica 326.  
 Brechnussbaum 379.  
 Brennesseln 288.  
 Briza media 258.  
 Brombeerstrauch 325.  
 Bromeliaceae 265.  
 Brotfruchtbaum 286.  
 Bruchkraut 293.  
 Brunnenkresse 315.  
 Brutbecherchen 225.  
 Bryaceae 230.  
 Bryonia alba 407.  
 Bryonia dioica 407.  
 Bryophyta 223.  
 Buchenartige 281.  
 Buchengewächse 283.  
 Buchweizen 292.  
 Büschelwurz 31.  
 Bulbus Colchici 266.  
 Bulbus Scillae 267.  
 Bulbus Victorialis 271.  
 Burseraceae 344.  
 Cactaceae 362.  
 Caesalpinia brasiliensis 330.  
 Caesalpinia sappan 330.  
 Caesalpinioideae 330.  
 Cajeputbaum 364.  
 Calamus rotang 261.  
 Calendula officinalis 417.  
 Callitris quadrivalvis 251.  
 Calluna vulgaris 375.  
 Calyptra 224, 228.  
 Calyx 47.  
 Cambiformzellen 119.  
 Cambium 101.  
 Camelina sativa 315.  
 Camellia japonica 358.  
 Campanulaceae 409.  
 Campanula glomerata 409.  
 Campanula patula 409.  
 Campanula persicifolia 409.  
 Campanula rapunculoides 409.  
 Campanula rapunculus 409.  
 Campanula rotundifolia 409.  
 Campanulatae 408.  
 Campanula trachelium 409.  
 Campanuloideae 409.  
 Camphora 308.  
 Camphora officinarum 308.  
 Campylospermae 368, 373.  
 Canarium commune 344.  
 Cannabis sativa 287.  
 Cannaceae 275.  
 Cannagewächse 275.  
 Canna indica 275.  
 Cantharellus cibarius 215.  
 Capparidaceae 311.  
 Capparis spinosa 311.  
 Capillitium 168.  
 Capitulum 63.  
 Caprifoliaceae 403.  
 Capsella bursa pastoris 315.  
 Capsicum annum 394.  
 Cardamine pratensis 315.  
 Carex arenaria 259.  
 Caricaceae 286.  
 Caricaceae 361.  
 Carica papaya 361.  
 Caricoideae 259.  
 Carina 332.  
 Carlina acaulis 417.  
 Carlina vulgaris 417.  
 Carnaubawachs 261.  
 Carotin 85.  
 Carpinus betulus 283.  
 Carpodinus 383.  
 Carpophor 367.  
 Carrageen 190.  
 Carthamus tinctorius 417.  
 Carum carvi 368.  
 Caruncula 75.  
 Caryophyllaceae 292.  
 Caryophylli 364.  
 Caryophyllus aromaticus 364.  
 Caryopse 67.

- Cascara sagrada 353.  
 Cassia acutifolia 331.  
 Cassia angustifolia 331.  
 Cassia fistula 331.  
 Cassia obovata 330.  
 Castanea vulgaris 283.  
 Castilleja elastica 286.  
 Catasetum 279.  
 Caulerpacae 181.  
 Cellulae 77.  
 Cellulose 92, 95.  
 Centaurea cyanus 417.  
 Centifolie 325.  
 Centranthus ruber 406.  
 Centrosomen 83.  
 Centrospermae 292.  
 Cephaelis ipecacuanha 402.  
 Cephalanthera ensifolia 278.  
 Cephalanthera pallens 278.  
 Cerastium arvense 293.  
 Ceratonia siliqua 332.  
 Cetraria islandica 221.  
 Chaetophoraceae 180.  
 Chalaza 74.  
 Chamaerops humilis 261.  
 Champignon 214.  
 Chara 184.  
 Characeae 182.  
 Charophyta 182.  
 Cheiranthus cheiri 315.  
 Chelidonium majus 311.  
 Chenopodiaceae 292.  
 Chenopodium ambrosioides 292.  
 Chenopodium bonus henricus 292.  
 Chenopodium botrys 292.  
 Chlamydobacteriaceae 161.  
 Chlamydomonas nivalis 179.  
 Chlorophyceae 177.  
 Chlorophyll 85.  
 Chloroplasten 84.  
 Cholera-bazillus 159.  
 Chondrus crispus 188.  
 Choripetalae 279.  
 Chromatinkörner 82.  
 Chromatophoren 84.  
 Chromoplasten 86.  
 Chromosomen 83.  
 Chroococccaceae 165.  
 Chrysanthemum 418.  
 Chrysanthemum indicum 418.  
 Chrysarobin 335.  
 Cichorie 419.  
 Cichorium endivia 419.  
 Cichorium intybus 419.  
 Cicimnus 63.  
 Cicuta virosa 370.  
 Cilien 145, 177.  
 Cinchona calisaya 401.  
 Cinchona Ledgeriana 401.  
 Cinchona officinalis 401.  
 Cinchona succirubra 401.  
 Cinchonoideae 401.  
 Cinnamomum camphora 308.  
 Cinnamomum cassia 308.  
 Cinnamomum zeylanicum 308.  
 Circaea lutefiana 365.  
 Cistaceae 359.  
 Cistus creticus 359.  
 Cistusgewächse 359.  
 Cistus ladaniferus 359.  
 Citrone 343.  
 Citrullus colocynthis 407.  
 Citrullus vulgaris 407.  
 Citrus aurantium 342.  
 Citrus bergamia 343.  
 Citrus medica 343.  
 Cladonia rangiferina 222.  
 Cladotrix 162.  
 Clavariaceae 210.  
 Clavaria botrytis 210.  
 Claviceps purpurea 199.  
 Clematis vitalba 297.  
 Clitandra 383.  
 Cnicus benedictus 415.  
 Cocagewächse 338.  
 Coccaceae 162.  
 Cocculus palmatus 303.  
 Cochenille 362.  
 Cochlearia armoracia 315.  
 Cochlearia officinalis 315.  
 Cocos nucifera 261.  
 Coelococcus 263.  
 Coelospermae 368, 373.  
 Coffea arabica 402.  
 Coffea liberica 402.  
 Coffeioideae 402.  
 Cola acuminata 357.  
 Cola vera 357.  
 Colchicum autumnale 266.  
 Collenchymzellen 109.  
 Columella 191, 228.  
 Commiphora abyssinica 344.  
 Compositae 410.  
 Confervales 179.  
 Coniferae 246.  
 Conium maculatum 373.  
 Conjugatae 175, 191.  
 Contortae 378.  
 Convallaria majalis 268.  
 Convolvulaceae 385.  
 Convolvulus arvensis 385.  
 Convolvulus scammonia 385.  
 Convolvulus sepium 385.  
 Copaifera guianensis 331.  
 Copaifera officinalis 331.  
 Copernicia cerifera 261.  
 Cora pavonia 222.  
 Corchorus capsularis 354.  
 Corchorus olitorius 354.  
 Cordyceps 200.  
 Coriandrum sativum 373.  
 Corolla 48.

- Coronilla 336.  
 Cortex adstringens Brasiliensis 330.  
 Cortex Angosturae 342.  
 Cortex Aurantii fructus 342.  
 Cortex Cascariillae 349.  
 Cortex Chinae 401.  
 Cortex Cinnamomi 308.  
 Cortex Citri fructus 343.  
 Cortex Condurango 384.  
 Cortex Frangulae 353.  
 Cortex Granati 364.  
 Cortex Granati fructus 364.  
 Cortex Mezerei 362.  
 Cortex nucum Juglandis 281.  
 Cortex Quebracho 382.  
 Cortex Quercus 284.  
 Cortex Quillajae 323.  
 Cortex Rhamni Purshianae 353.  
 Cortex Salicis 281.  
 Cortex Ulmi interior 285.  
 Cortex Winteranus 304.  
 Corydalis cava 311.  
 Corylus avellana 283.  
 Costae primariae 367.  
 Costae secundariae 367.  
 Cotinus coggygria 350.  
 Crenothrix polyspora 161.  
 Cribralteil 114.  
 Crocus sativus 271.  
 Croton eluteria 349.  
 Croton tiglium 349.  
 Cruciferae 311.  
 Cubebae 280.  
 Cubeba officinalis 280.  
 Cucumis melo 407.  
 Cucumis sativus 407.  
 Cucurbitaceae 407.  
 Cucurbitales 406.  
 Cucurbita pepo 407.  
 Cumarin 334.  
 Cuminum cyminum 370.  
 Cupresseae 249, 251.  
 Cupula 283.  
 Curare 379.  
 Curcuma longa 275.  
 Curcuma zedoaria 275.  
 Cuscuta europaea 385.  
 Cusparia febrifuga 342.  
 Cusparia trifoliata 342.  
 Cuticula 102.  
 Cutin 95.  
 Cyanophyceae 163.  
 Cyatheaceae 234.  
 Cyathium 348.  
 Cycadaceae 246.  
 Cycadales 246.  
 Cycas revoluta 246.  
 Cyclamen europaeum 376.  
 Cyclosporeae 187.  
 Cydonia japonica 325.  
 Cydonia vulgaris 325.  
 Cyklus 42.  
 Cynanchum vincetoxicum 384.  
 Cynoglossum officinale 388.  
 Cyperaceae 259.  
 Cypergras 260.  
 Cyperus flavescens 260.  
 Cyperus papyrus 260.  
 Cypripedium calceolus 278.  
 Cystolithen 96.  
 Cytoplasma 81.  
 Dactylis glomerata 258.  
 Daemonorops draco 261.  
 Dahlia variabilis 418.  
 Dammar 359.  
 Daphne mezereum 362.  
 Datteln 263.  
 Datura stramonium 396.  
 Daucus carota 370.  
 Dauergewebe 99.  
 Dauerezellen 77.  
 Deckblatt 44.  
 Deckelkapseln 68.  
 Deckspelze 255.  
 Delphinium consolida 301.  
 Delphinium staphisagria 301.  
 Dendrobium 279.  
 Dentaria bulbifera 315.  
 Dermatogen 99.  
 Desmidiaceae 175.  
 Deszendenztheorie 135.  
 Dianthus caryophyllus 295.  
 Diastase 88, 92.  
 Diatomeen 171.  
 Dicentra formosa 311.  
 Dicentra spectabilis 311.  
 Dichasium 36, 63.  
 Dichogamie 244.  
 Dickenwachstum 93, 101, 124, 127.  
 Dicotyledoneae 252, 279.  
 Dictamnus albus 342.  
 Digitalis purpurea 399.  
 Dikotylen, verwachsenkronige 373.  
 Dinoflagellatae 170.  
 Dionaea muscipula 318.  
 Dioscorea batatas 270.  
 Dioscoreaceae 270.  
 Diospyros ebenum 377.  
 Dipsacaceae 406.  
 Dipsacus fullonum 406.  
 Dipsacus pilosus 406.  
 Dipsacus silvestris 406.  
 Diptercarpaceae 359.  
 Diptercarpus turbinatus 359.  
 Dipteryx odorata 336.  
 Discus 58.  
 Distel 417.  
 Divergenzwinkel 43.  
 Dolde 63.  
 Doldenblütige 365.  
 Doppelachaene 66.

- Doppeldolde 65.  
 Dorema ammoniacum 373.  
 Doste 392.  
 Draba 315.  
 Dracaena cinnabari 268.  
 Dracaena draco 268.  
 Dracaenoideae 268.  
 Drachenbaum 268.  
 Drachenblut 268.  
 Drachenblut, ostindisches 261.  
 Drimys Winteri 304.  
 Droseraceae 316.  
 Drosera intermedia 317.  
 Drosera longifolia 317.  
 Drosera rotundifolia 317.  
 Drüsenhaare 130.  
 Drupa 68.  
 Drusen 90.  
 Dryobalanops camphora 359.  
 Dryopteris filix mas 234.  
 Durchlüftungssystem 128.  
  
**Ebenaceae** 376.  
 Ebenales 376.  
 Ebenholz 377.  
 Ebenholzartige 376.  
 Ebenholzgewächse 376.  
 Eberesche 323.  
 Eberwurz 417.  
 Echium vulgare 388.  
 Ectocarpaceae 184.  
 Ectocarpus 184.  
 Edelkastanie 283.  
 Edeltanne 250.  
 Efeugewächse 365.  
 Ehrenpreis 400.  
 Eiapparat 242.  
 Eibengewächse 248.  
 Eibisch 355.  
 Eichen 70.  
 Eichbaum 283, 284.  
 Einbeere 268.  
 Einfügungsstellen 58.  
 Einteilung der Pflanzen 133.  
 Einzelkristalle 90.  
 Eisenhut 299.  
 Eisenkrautgewächse 388.  
 Eispore 178.  
 Eiweißkörper 89.  
 Eizelle 178, 242.  
 Elaeis guineensis 261.  
 Elateren 225.  
 Elemente, primäre 124.  
 Elemente, sekundäre 124.  
 Elemi 334.  
 Elettaria cardamomum 275.  
 Elfenbein, vegetabilisches 263.  
 Embryo 223.  
 Embryophyta asiphonogama 222.  
 Embryophyta siphonogama 241.  
 Embryosack 72.  
  
 Empleurum serrulatum 342.  
 Empusa muscae 192.  
 Endblüte 59.  
 Endivie 419.  
 Endokarp 65.  
 Endosperm 72, 74, 242.  
 Engelsüß 274.  
 Engelwurz 370.  
 Entomophthoraceae 192.  
 Enziangewächse 379.  
 Enzyme 92, 147.  
 Epidendrum 279.  
 Epidermis 102.  
 Epilobium angustifolium 365.  
 Epilobium hirsutum 365.  
 Epilobium palustre 365.  
 Epinastie 126.  
 Epipactis latifolia 278.  
 Epithelzellen 130.  
 Equisetaceae 238.  
 Equisetales 237.  
 Equisetum 238.  
 Equisetum arvense 238.  
 Erbse 335.  
 Erdbeere 325.  
 Erdbeerfrucht 70.  
 Erdeichel 335.  
 Erdnuß 335.  
 Erdrauch 311.  
 Erdscheibe 376.  
 Erdstern 217.  
 Ericaceae 374.  
 Ericales 373.  
 Erica tetralix 375.  
 Ericoideae 374, 375.  
 Erigeron canadense 418.  
 Eriophorum latifolium 260.  
 Ernährung der Pflanze 109.  
 Erodium cicutarium 338.  
 Erodium gruinum 338.  
 Erophila verna 315.  
 Ersatzfasern 117.  
 Erythraea centaurium 380.  
 Erythroxylaceae 338.  
 Erythroxylum coca 338.  
 Erythroxylum novogranatense 338.  
 Esparsette 336.  
 Essigrose 325.  
 Essigsäurebazillus 153.  
 Eubacteria 153.  
 Eubasidii 204.  
 Eucalyptus globulus 365.  
 Encheuma spinosum 190.  
 Eufilicineae 233.  
 Eugenia aromatica 364.  
 Eugenia caryophyllata 364.  
 Eumycetes 190.  
 Euphorbiaceae 346.  
 Euphorbia cyparissias 349.  
 Euphorbia helioscopia 349.  
 Euphorbia peplus 349.

- Euphorbia resinifera 349.  
 Euphorbium 349.  
 Euphrasia officinalis 400.  
 Euryangium sumbul 373.  
 Eutuberaceae 197.  
 Exogonium purga 385.  
 Exokarp 65.  
  
**Fabae Calabaricae** 335.  
 Fabae Ignatii 379.  
 Fadenbakterien 144.  
 Fadenflechten 219.  
 Fächerung, fortgesetzte 98.  
 Färberwaid 315.  
 Färberwau 316.  
 Fäulnis 147.  
 Fagaceae 283.  
 Fagales 281.  
 Fagopyrum esculentum 292.  
 Fagus silvatica 283.  
 Fahne 332.  
 Farinosae 265.  
 Farnkräuter, echte 233.  
 Farnpflanzen 222, 230.  
 Fascicularcambium 122.  
 Faserwurzel 31.  
 Faulbaum 353.  
 Faulbaumartige 352.  
 Feigenbaum 286.  
 Feigwurz 209.  
 Feldkümmel 392.  
 Feldrittersporn 301.  
 Feldsalat 406.  
 Fermente 92, 147.  
 Fernambukholz 330.  
 Ferula assa foetida 372.  
 Ferula foetida 372.  
 Ferula galbaniflua 372.  
 Ferula narthex 372.  
 Ferula rubricaulis 372.  
 Festigungsgewebe 107.  
 Festuca 258.  
 Feuermohn 311.  
 Feuerschwamm 212.  
 Fibrovasalstränge 114.  
 Ficaria ranunculoides 299.  
 Fichte 250.  
 Ficus carica 286.  
 Ficus elastica 286.  
 Filament 50.  
 Filicales 233.  
 Filicales leptosporangiatae 233.  
 Fingerhut 399.  
 Fingerkraut 325.  
 Flachs 338.  
 Flachs, neuseeländischer 267.  
 Flächenwachstum 93.  
 Flagellatae 169.  
 Flaschenkork 284.  
 Flechten 217.  
 Flechten, heteromere 218.  
 Flechten, homöomere 218.  
 Fleischfrüchte 66.  
 Flieder 403.  
 Flieder spanischer 379.  
 Fliegenschwamm 214.  
 Flores Acaciae 326.  
 Flores Arnicae 415.  
 Flores Aurantii 342.  
 Flores Bellidis 416.  
 Flores Calendulae 417.  
 Flores Carthami 417.  
 Flores Cassiae 308.  
 Flores Chamomillae 415.  
 Flores Chamomillae Romanae 415.  
 Flores Cinae 414.  
 Flores Farfarae 414.  
 Flores Granati 364.  
 Flores Koso 326.  
 Flores Lamii albi 392.  
 Flores Lavandulae 392.  
 Flores Malvae 355.  
 Flores Malvae arboreae 355.  
 Flores Millefolii 416.  
 Flores Paeoniae 301.  
 Flores Rhoeados 311.  
 Flores Rosae 325.  
 Flores Sambuci 403.  
 Flores Spartii 334.  
 Flores Stoechados 418.  
 Flores Tanacetii 416.  
 Flores Tiliae 354.  
 Flores Ulnariae 325.  
 Flores Verbasci 399.  
 Florideen 188.  
 Flügel 332.  
 Flügelfruchtgewächse 359.  
 Föhre 249.  
 Foeniculum capillaceum 368.  
 Foeniculum officinale 368.  
 Foeniculum vulgare 368.  
 Folgemeristem 101, 103.  
 Folia Aurantii 342.  
 Folia Belladonnae 394.  
 Folia Bucco 342.  
 Folia Coca 338.  
 Folia Digitalis 399.  
 Folia Eucalypti 365.  
 Folia Farfarae 414.  
 Folia Hyoscyami 396.  
 Folia Jaborandi 342.  
 Folia Juglandis 281.  
 Folia Lauri 307.  
 Folia Ledi 374.  
 Folia Malvae 355.  
 Folia Melissaе 389.  
 Folia Menthae crispae 391.  
 Folia Menthae piperitae 391.  
 Folia Nicotianae 396.  
 Folia Rhododendri 374.  
 Folia Rosmarini 392.  
 Folia Rutae 341.

- Folia Salviae 392.  
 Folia Sennae 331.  
 Folia Stramonii 396.  
 Folia Toxicodendri 350.  
 Folia Trifolii fibrini 380.  
 Folia Uvae Ursi 374.  
 Folliculus 67.  
 Fomes 212.  
 Fomes fomentarius 212.  
 Fomes igniarius 212.  
 Formen der Stammorgane 31.  
 Formen der Wurzelorgane 31.  
 Forsythia suspensa 379.  
 Fortpflanzung, geschlechtliche 134, 177, 190.  
 Fortpflanzung, sexuelle 134.  
 Fortpflanzung, ungeschlechtliche 134.  
 Fortpflanzung, vegetative 134.  
 Fragaria elatior 325.  
 Fragaria vesca 325.  
 Fragaria virginiana 325.  
 Fraxinus excelsior 379.  
 Fraxinus ornus 379.  
 Fritillaria imperialis 267.  
 Froschbiß 255.  
 Froschbißgewächse 254.  
 Froschlaichpilz 162.  
 Froschlöffelgewächse 254.  
 Frucht 65.  
 Fruchtbecher 283.  
 Fruchtblätter 54.  
 Fruchtfolge 207.  
 Fruchthaufen 188.  
 Fruchtknoten 54.  
 Fruchtstände 70.  
 Fruchträger 367.  
 Fructus Alkekengi 396.  
 Fructus Anacardii occident. 349.  
 Fructus Anacardii orient. 349.  
 Fructus Anisi 368.  
 Fructus Anisi stellat. 303.  
 Fructus Aurantii immat. 342.  
 Fructus Berberidis 302.  
 Fructus Cannabis 287.  
 Fructus Capsici 395.  
 Fructus Cardamomi 275.  
 Fructus Carvi 368.  
 Fructus Cassiae fistulae 331.  
 Fructus Citri 343.  
 Fructus Cocculi 303.  
 Fructus Colocynthis 407.  
 Fructus Coriandri 373.  
 Fructus Cubebae 280.  
 Fructus Cumini 370.  
 Fructus Cymini 370.  
 Fructus Cynosbati 325.  
 Fructus Foeniculi 368.  
 Fructus Jujubae 353.  
 Fructus Juniperi 251.  
 Fructus Lauri 307.  
 Fructus Papaveris immat. 311.  
 Fructus Petroselini 370.  
 Fructus Phellandrii 370.  
 Fructus Piperis albi 280.  
 Fructus Piperis longi 280.  
 Fructus Piperis nigri 280.  
 Fructus Rhamni catharticae 353.  
 Fructus Vanillae 279.  
 Fuaceae 187.  
 Fuchsia coccinea 365.  
 Fuchsschwanz 258.  
 Fucus serratus 188.  
 Fucus vesiculosus 188.  
 Fuligo septica 166, 168.  
 Fumaria officinalis 311.  
 Fumarioideae 311.  
 Fungi 190.  
 Fungus chirurgorum 212.  
 Fungus laricis 212.  
 Funiculus 71, 73.  
 Futtergräser 258.  
 Gänseblümchen 416.  
 Gänsedistel 419.  
 Gänsefußgewächse 292.  
 Gänsekresse 315.  
 Gärung 147.  
 Galanthus nivalis 269.  
 Galbanum 372.  
 Galeopsis ochroleuca 392.  
 Galeopsis tetrahit 392.  
 Galeopsis versicolor 392.  
 Galipea officinalis 342.  
 Galium 402.  
 Gallae chinenses 350.  
 Gallertflechten 219.  
 Gambir-Katechu 402.  
 Gametangium 177.  
 Gameten 177.  
 Gametophyt 223, 224  
 Gametospore 178.  
 Gamospore 178.  
 Garcinia Hanburyi 359  
 Gartenkresse 315.  
 Gartennelke 295.  
 Gartentulpe 267.  
 Gattung 133.  
 Gauchheil 376.  
 Geaster 217.  
 Gedrehtblütige 378.  
 Gefäßbündel 113, 114.  
 Gefäße 114.  
 Gefäßkryptogamen 230.  
 Geißblattgewächse 403.  
 Geißeln 145, 177.  
 Gekrümmtsamige 272.  
 Gelbwurz 275.  
 Geleitzellen 117.  
 Gelsemium sempervirens 379.  
 Gemmae Populi 281.  
 Generation, embryonale 223, 224.  
 Generation, präembryonale 223, 224.

- Genista tinctoria 335.  
 Gentianaceae 379.  
 Gentiana amarella 380.  
 Gentiana asclepiadea 380.  
 Gentiana campestris 380.  
 Gentiana ciliata 380.  
 Gentiana cruciata 380.  
 Gentiana germanica 380.  
 Gentiana lutea 380.  
 Gentiana panonica 380.  
 Gentiana pneumonanthe 380.  
 Gentiana punctata 380.  
 Gentiana purpurea 380.  
 Georgine 418.  
 Geradzeilen 43.  
 Geraniaceae 337.  
 Geraniales 336.  
 Geranium molle 338.  
 Geranium pratense 337.  
 Geranium pusillum 338.  
 Geranium Robertianum 337.  
 Geranium rotundifolium 338.  
 Geranium sanguineum 337.  
 Geranium silvaticum 337.  
 Gerbstoffe 92.  
 Germer, weißer 267.  
 Gerste 258.  
 Geschlechtssystem 135.  
 Gestalt, äußere der Pflanzen 27.  
 Geum urbanum 325.  
 Gewächse, bedecktsamige 251.  
 Gewächse, doldentragende 366.  
 Gewächse, einkeimblättrige 252.  
 Gewächse, Guttapercha liefernde 376.  
 Gewächse, insektenfangende 316.  
 Gewächse, jochblättrige 339.  
 Gewächse, naktsamige 244.  
 Gewächse, röhrenbeutelige 410.  
 Gewächse, wandsamige 357.  
 Gewächse, zweikeimblättrige 279.  
 Gewebe 97.  
 Gewebe, die Entstehung der 97.  
 Gewebesystem 98.  
 Gewürzpfelgewächse 304.  
 Gewürz Lilien 272.  
 Gewürznelkenbaum 364.  
 Gichtmorehel 216.  
 Gichtrose 301.  
 Giftlatic 419.  
 Gigartina mamillosa 188.  
 Gilbweiderich 376.  
 Ginkgoaceae 246.  
 Ginkgoales 246.  
 Ginkgo biloba 246.  
 Gitterrost 209.  
 Gladiolus communis 271.  
 Glandulae Lupuli 288.  
 Gleba 216.  
 Glechoma hederaceum 392.  
 Gliederhaare 106.  
 Gliederhülse 333.  
 Gliederschote 313.  
 Globaria bovista 217.  
 Globoide 89.  
 Glockenblumenartige 408.  
 Glockenblumengewächse 409.  
 Gloeocapsa 165.  
 Gloeotheca 165.  
 Glumae 255, 257.  
 Glumiflorae 255.  
 Glycyrrhiza glabra 334.  
 Glycyrrhiza glandulifera 334.  
 Glykoside 91.  
 Gnaphalium arenarium 418.  
 Gnetales 251.  
 Goldlack 315.  
 Goldregen 335.  
 Goldrute 418.  
 Gonidien 218.  
 Gossypium arboreum 355.  
 Gossypium barbadense 355.  
 Gossypium herbaceum 355.  
 Gottesgnadenkraut 400.  
 Gracilaria lichenoides 190.  
 Gramineae 255.  
 Granatbaumgewächse 363.  
 Granatfrucht 70, 363.  
 Grasgewächse 255.  
 Gratiola officinalis 400.  
 Griffel 54.  
 Griffel, gynobasischer 386, 389.  
 Grünalgen 177.  
 Grunddiatomeen 174.  
 Guajacum officinale 340.  
 Guajacum sanctum 340.  
 Günsel 392.  
 Gummi 92.  
 Gummi arabicum 329.  
 Gummiguttbaum 359.  
 Gundermann 392.  
 Gurke 407.  
 Guttapercha 376.  
 Gutti 359.  
 Guttiferae 358.  
 Guttigewächse 358.  
 Gymnadenia conopsea 277.  
 Gymnospermae 244.  
 Gymnosporangium sabiniae 209.  
 Gynaeceum 47, 54, 55.  
 Gynophor 311.  
 Gynostemium 276, 290.  
 Gyromitra esculenta 198.  
 Haare 105.  
 Habichtskraut 419.  
 Hadrom 114.  
 Hadromparenchym 117.  
 Haematococcus pluvialis 179.  
 Haematoxylon campechianum 392.  
 Hafer 258.  
 Haftwurzeln 32.  
 Hagenia abyssinica 326.

- Hahnenfußartige 296.  
 Hahnenfußgewächse 296.  
 Hahnenkamm 400.  
 Hainbuche 283.  
 Halbfrucht 65, 68.  
 Hallimasch 213.  
 Halm 256.  
 Hamamelidaceae 319.  
 Hanf 287.  
 Hartheu 359.  
 Harze 92.  
 Haschisch 287.  
 Haselnuß 283.  
 Haselwurz 290.  
 Hasenklec 338.  
 Haube 224.  
 Hauhechel 334.  
 Hauptrippe 367.  
 Hauptwurzel 31.  
 Hausschwamm 210.  
 Haustorien 110.  
 Hautsystem 102.  
 Hedera helix 365.  
 Hederich 315.  
 Hefesprossung 96.  
 Heidekraut 375.  
 Heidekrautgewächse 374.  
 Heidelbeere 375.  
 Heidenartige 373.  
 Helianthemum vulgare 359.  
 Helianthi 416.  
 Helianthus annuus 416.  
 Helianthus macrophyllus 416.  
 Helianthus tuberosus 416.  
 Helleborus niger 299.  
 Helleborus viridis 290.  
 Hellerkraut 315.  
 Helminthochorton 190.  
 Helobiae 253.  
 Helodea canadensis 255.  
 Helvella 198.  
 Helvellaceae 198.  
 Hemibasidii 202.  
 Hepaticae 225.  
 Hepatica triloba 299.  
 Herba Absinthii 414.  
 Herba Adonidis 299.  
 Herba Agrimoniae 326.  
 Herba Aristolochiae 290.  
 Herba Asperulae 402.  
 Herba Ballotae 392.  
 Herba Betonicae 392.  
 Herba Boni Henrici 292.  
 Herba Botryos 292, 392.  
 Herba Cannabis indicae 287.  
 Herba Cardui benedicti 415.  
 Herba Centaurii 380.  
 Herba Chelidonii 311.  
 Herba Chenopodii mexicani 292.  
 Herba Cochleariae 315.  
 Herba Conii 373.  
 Herba Cynoglossi 388.  
 Herba Euphrasiae 400.  
 Herba Fumariae 311.  
 Herba Galeopsidis 392.  
 Herba Gratiolae 400.  
 Herba Hederæ terrestris 392.  
 Herba Hepaticae 299.  
 Herba Herniariae 293.  
 Herba Hyperici 359.  
 Herba Hyssopi 392.  
 Herba Linariae 400.  
 Herba Lobeliae 410.  
 Herba Majoranae 392.  
 Herba Mari veri 392.  
 Herba Marrubii 392.  
 Herba Meliloti 334.  
 Herba Millefolii 416.  
 Herba Pervincae 383.  
 Herba Plantaginis 401.  
 Herba Polygalae 345.  
 Herba Prunellae 392.  
 Herba Pulmonariae 387.  
 Herba Pulsatillae 299.  
 Herba Rorellae 318.  
 Herba Rosmarini silvestris 374.  
 Herba Saniculae 370.  
 Herba Scordii 392.  
 Herba Scrophulariae 399.  
 Herba Serpylli 392.  
 Herba Spilanthis 416.  
 Herba Teucrii 392.  
 Herba Thymi 391.  
 Herba Veronicae 400.  
 Herba Violae tricoloris 361.  
 Herba Virgaureae 418.  
 Herbarium, Anlegen des 3.  
 Herbstfärbung 85.  
 Herbstzeitlose 266.  
 Herniaria glabra 293.  
 Herniaria hirsuta 293.  
 Herz, flammendes 311.  
 Heterogameten 178.  
 Heterophyllie 365.  
 Heterostylie 244.  
 Heubacillus 157.  
 Hevea brasiliensis 349.  
 Hexenbesenbildungen 205.  
 Hexenkraut 365.  
 Hexenmehl 239.  
 Hieracium 419.  
 Hilum 73, 74.  
 Himbeerstrauch 325.  
 Hippocastanaceae 352.  
 Hirschzunge 234.  
 Hirse 257.  
 Hirtentäschel 315.  
 Hochblätter 36.  
 Hoftüpfel 94.  
 Holcus lanatus 258.  
 Holunder 403.  
 Holzparenchym 117.

- Holzteer 250.  
 Holzteil 114, 119.  
 Homeriana-Tee 292.  
 Honiggras 258.  
 Honigklee 334.  
 Hopfen 288.  
 Hordeum vulgare 258.  
 Hostienpilz 157.  
 Hühnerdarm 293.  
 Hüllchen 366.  
 Hülle 366.  
 Hüllkelch 44.  
 Hülsen 67, 333.  
 Hülsenfrüchtler 327.  
 Hüllspelzen 255.  
 Huflattich 414.  
 Humulus lupulus 288.  
 Hundspetersilie 370.  
 Hundrose 325.  
 Hundstodgewächse 381.  
 Hundswürger 384.  
 Hungerblümchen 315.  
 Hyacinthus 267.  
 Hyacinthus orientalis 267.  
 Hyaloplasma 81.  
 Hydathoden 129.  
 Hydnaceae 210.  
 Hydnum 210.  
 Hydrastis canadensis 302.  
 Hydrocharis morsus ranae 255.  
 Hydrocharitaceae 254.  
 Hydropteriden 234.  
 Hymenaea courbaril 331.  
 Hymenium 195.  
 Hyoscyamus niger 396.  
 Hypanthium 321.  
 Hypericum 359.  
 Hypericum perforatum 359.  
 Hypertrophie 208.  
 Hypphen 98, 110.  
 Hypocereaceae 199.  
 Hypoderm 104.  
 Hyponastie 126.  
 Hyssopus officinalis 392.  
  
**I**beris amara 315.  
 Icica icicariba 344.  
 Igelkolben 253.  
 Igelkolbengewächse 253.  
 Ilex aquifolium 351.  
 Ilex paraguariensis 351.  
 Illicium anisatum 303.  
 Illicium religiosum 303.  
 Illicium verum 303.  
 Imperatoria ostruthium 372.  
 Indigo 336.  
 Indigofera tinctoria 336.  
 Individuum 133.  
 Indusium 233.  
 Ingwer 275.  
 Ingwergewächse 273.  
  
 Insektenpulver 418.  
 Insertion der Blätter 41.  
 Insertionsstellen 58.  
 Integumente 71.  
 Intercellularen 92.  
 Intercellulargänge 128.  
 Interfascicular-Cambium 123.  
 Internodien 32.  
 Intussusception 93.  
 Inula helenium 414.  
 Inulin 91, 414.  
 Involucellum 366.  
 Involucrum 44, 366, 411.  
 Ipomoea 385.  
 Iridaceae 270.  
 Iris florentina 271.  
 Iris germanica 271.  
 Iris pallida 271.  
 Iris pseudacorus 271.  
 Isatis tinctoria 315.  
 Isoëtaceae 240.  
 Isoëtes 240.  
 Isoëtes echinospora 240.  
 Isoëtes lacustris 240.  
 Isogameten 177.  
 Isosporen 238.  
  
**J**ackbaum 286.  
 Jahresringe 125.  
 Jambosa caryophyllus 364.  
 Jalapenwinde 385.  
 Jasione montana 410.  
 Jatrophia palmata 303.  
 Jochalgen 175.  
 Jochspore 176.  
 Johannisbrot 332.  
 Johanniskraut 359.  
 Judasohr 269.  
 Judenkirsche 396.  
 Juglandaceae 281.  
 Juglandales 281.  
 Juglans regia 281.  
 Juncaceae 265.  
 Jungermanniaceae 225.  
 Juniperus communis 251.  
 Juniperus sabina 251.  
 Jute 354.  
  
**K**affeebaum 402.  
 Kaiserkrone 267.  
 Kaiserschwamm 214.  
 Kakaobaumgewächse 355.  
 Kaktusartige 362.  
 Kaktusgewächse 362.  
 Kalk, oxalsaurer 90.  
 Kalksalze 96.  
 Kalmus 264.  
 Kamala 349.  
 Kamellie 358.  
 Kamille 415.  
 Kannenträger 316.

- Kappergewächse 311.  
 Kapsel 67.  
 Kardendistel 406.  
 Kardengewächse 406.  
 Kardobenediktenkraut 415.  
 Karpelle 54.  
 Karpiden 54.  
 Karpogonien 188.  
 Karposporen 188.  
 Kartoffel 394.  
 Karyokinese 82.  
 Kastanie 283.  
 Kaulom 32.  
 Kaurikopal 249.  
 Kautschuk 92, 286, 383.  
 Keimblätter 36.  
 Keimmund 71.  
 Keimsack 72.  
 Kelchblätter 47.  
 Kelp 188.  
 Keratenchym 117.  
 Kerngerüst 82.  
 Kernholz 126.  
 Kernkörperchen 82.  
 Kernmembran 82.  
 Kernplatte 83.  
 Kernsegmente 83.  
 Kernspindel 83.  
 Keulenpilze 210.  
 Kieckxia 383.  
 Kiefer 249.  
 Kiefernengewächse 248.  
 Kiel 332.  
 Kieselalgen 171.  
 Kieselgurlager 175.  
 Kieselsäure 96.  
 Kino 336.  
 Kirsche 326.  
 Kirschlorbeer 326.  
 Klassen 136.  
 Klatschrose 311.  
 Klausenfrüchte 389.  
 Klebkraut 402.  
 Klee 335.  
 Kleinsamige 275.  
 Klette 417.  
 Knäuelgras 258.  
 Knäuelkraut 293.  
 Knautia arvensis 406.  
 Knoblauch 267.  
 Knoblauch-Hederich 315.  
 Knöterichartige 290.  
 Knöterichgewächse 290.  
 Knollen 33.  
 Knospenkern 72.  
 Knospenlage 40.  
 Knoten 32.  
 Königsfarn 234.  
 Köpfchen 63.  
 Köpfchenschimmel 191.  
 Körnchenplasma 81.  
 Kohl 315.  
 Kohlenstoff 109.  
 Kohlhernie 169.  
 Kokain 338.  
 Kokosnüsse 261.  
 Kokospalme 261.  
 Kolben 63.  
 Kolophonium 250.  
 Konidien 190.  
 Konidienträger 193, 196.  
 Konnektiv 50.  
 Konzeptakeln 187.  
 Kopal 331.  
 Kopfsalat 419.  
 Kopra 261.  
 Korallenpilze 210.  
 Korbblütlergewächse 410.  
 Korinthen 333.  
 Kork 103, 284.  
 Korkcambium 103.  
 Kormophyten 222.  
 Kornblume 417.  
 Kornrade 296.  
 Kotyledonen 29, 36.  
 Krameria triandra 331.  
 Krapp 402.  
 Krappartige 401.  
 Krappgewächse 401.  
 Kreuzblütlergewächse 311.  
 Kreuzblumengewächse 344.  
 Kreuzdorngewächse 352.  
 Kristalle 90.  
 Kristalloide 89, 90.  
 Kristallsand 90.  
 Kristallschläuche 91.  
 Krone 48.  
 Kronwicke 336.  
 Krustenflechten 219.  
 Küchenschellen 299.  
 Kümmel 368.  
 Kümmel, römischer 370.  
 Kürbis 407.  
 Kürbisartige 406.  
 Kürbisgewächse 407.  
 Kugelbakterien 143, 162.  
 Kussobaum 326.  
 Labellum 276.  
 Labiatae 388.  
 Laburnum vulgare 335.  
 Lactaria deliciosa 214.  
 Lactucarium 419.  
 Lactuca sativa 419.  
 Lactuca virosa 419.  
 Ladanum 359.  
 Längsschnitt 126.  
 Lärche 250.  
 Lärchenschwamm 212.  
 Lärchenterpentin 250.  
 Laichkräuter 254.  
 Laichkräutergewächse 253.

- Lakritzen 334.  
 Lamellenschwämme 212.  
 Lamina 36.  
 Laminariaceae 185.  
 Laminaria Cloustoni 186.  
 Laminaria digitata 186.  
 Laminaria saccharina 187.  
 Lamium album 392.  
 Lamprocystis roseopersicina 163.  
 Landolphia 383.  
 Lappa major 417.  
 Lappa minor 417.  
 Larix europaea 250.  
 Larix sibirica 250.  
 Lathyrus 336.  
 Latschenkiefer 250.  
 Laubblätter 36, 38.  
 Laubflechten 219.  
 Laubmoose 227.  
 Lauraceae 307.  
 Laurus camphora 308.  
 Laurus nobilis 307.  
 Laurus sassafras 308.  
 Lavandula vera 390.  
 Lavendel 390.  
 Leberblümchen 299.  
 Lebermoose 225.  
 Ledum palustre 374.  
 Legumen 67, 333.  
 Leguminosae 327.  
 Leimkraut 295.  
 Leindotter 315.  
 Leingewächse 338.  
 Leinkraut 400.  
 Leitbündel 112, 113, 114.  
 Leitbündel, Anordnung der 120.  
 Leitbündelkryptogamen 230.  
 Leitungssystem 113.  
 Lemnaceae 264.  
 Lemna minor 264.  
 Lens 335.  
 Lenticellen 128, 129.  
 Lepidium campestre 315.  
 Lepidium sativum 315.  
 Leptom 114.  
 Leptoparenchym 119.  
 Leucocjum vernum 269.  
 Leuconostoc mesenteroides 162.  
 Lenkoplasten 85.  
 Levisticum officinale 370.  
 Levkoje 315.  
 Libriformfasern 108, 117.  
 Lichenes 217.  
 Lichtnelken 296.  
 Liebstöckel 370.  
 Lieschkolben 253.  
 Lieschkolbengewächse 253.  
 Lignin 95.  
 Lignum Campechianum 332.  
 Lignum Guajaci 340.  
 Lignum Haematoxyli 332.  
 Lignum Quassiae 344.  
 Lignum Santali album 289.  
 Lignum Sassafras 308.  
 Ligula 41, 49, 257.  
 Liguliflorae 414, 419.  
 Ligustrum vulgare 379.  
 Liliaceae 265.  
 Lilienblütige 265.  
 Liliengewächse 265.  
 Lilie, weiße 267.  
 Liliiflorae 265.  
 Lilioideae 267.  
 Lilium 267.  
 Lilium candidum 267.  
 Linaceae 338.  
 Linaria arvensis 400.  
 Linaria vulgaris 400.  
 Linde 354.  
 Lindengewächse 353.  
 Linse 335.  
 Linum catharticum 338.  
 Linum usitatissimum 338.  
 Lippenblütlergewächse 388.  
 Liquidambar orientale 319.  
 Liriodendron tulipifera 304.  
 Listera ovata 278.  
 Lithospermum arvense 387.  
 Lithospermum officinale 387.  
 Lobelia erinus 410.  
 Lobelia inflata 410.  
 Lobelioideae 410.  
 Lodiculae 255.  
 Löcherschwämme 210.  
 Löffelkraut 315.  
 Löwenmaul 399.  
 Löwenzahn 419.  
 Loganiaceae 379.  
 Lohblüte 166, 167, 168.  
 Lolium perenne 258.  
 Lolium temulentum 258.  
 Lomentum 313.  
 Lonicera 404.  
 Loranthaceae 289.  
 Loranthus europaeus 289.  
 Lorbeerengewächse 307.  
 Lorchel 198.  
 Lotosblume 296.  
 Lotus 336.  
 Luftwurzeln 32.  
 Lumen 95.  
 Lunaria biennis 315.  
 Lunaria rediviva 315.  
 Lungenflechte 221.  
 Lungenkraut 387.  
 Lupine 336.  
 Lupinus 336.  
 Luzerne 336.  
 Luzula 265.  
 Lychnis 296.  
 Lycoperdaceae 216.  
 Lycoperdon 216.

- Lycopodiaceae 238.  
 Lycopodiales 238.  
 Lycopodium 239.  
 Lycopodium clavatum 239.  
 Lycopodium selago 239.  
 Lysimachia nemorum 376.  
 Lysimachia nummularia 376.  
 Lysimachia vulgaris 376.
- Maceration** 95.  
 Macis 306.  
 Macrocystis pyrifera 187.  
 Mährrettich 315.  
 Märzbecher 269.  
 Magnoliaceae 303.  
 Magnolia grandiflora 303.  
 Magnoliengewächse 303.  
 Maiglöckchen 268.  
 Mairan 392.  
 Majoran 392.  
 Makrosporangien 234, 239.  
 Makrosporen 233, 234.  
 Mallotus philippinensis 349.  
 Malvaceae 354.  
 Malvales 353.  
 Malva silvestris 355.  
 Malva vulgaris 355.  
 Malvenähnliche 353.  
 Malvengewächse 354.  
 Mandelbaum 326.  
 Mandeln 326.  
 Mangifera indica 349.  
 Mangobaum 349.  
 Mangold 292.  
 Manihot Glaziovii 349.  
 Manihot utilissima 349.  
 Manillakopal 249.  
 Manna 379.  
 Mannaesche 379.  
 Manubrium 183.  
 Maranta arundinaceae 275.  
 Marantaceae 275.  
 Marantengewächse 275.  
 Marattiaceae 296.  
 Marattiales 235.  
 Marchantiaceae 225.  
 Marchantia polymorpha 225.  
 Margueriten 418.  
 Markstrahlen, primäre 124.  
 Markstrahlen, sekundäre 124.  
 Maronen 283.  
 Marrubium vulgare 392.  
 Marsdenia cundurango 384.  
 Marsilia quadrifolia 235.  
 Mastix 351.  
 Mate Tee 351.  
 Matricaria chamomilla 415.  
 Matthiola annua 315.  
 Matthiola incana 315.  
 Maulbeergewächse 285.  
 Medicago 336.  
 Meerrettich 315.  
 Meersalat 179.  
 Meerzwiebel 267.  
 Mehlsamige 265.  
 Meisterwurz 372.  
 Melaleuca leucodendron 364.  
 Melampsora pinitorquum 209.  
 Melampsora tremulae 209.  
 Melampyrum 400.  
 Melanthioideae 266.  
 Melde 292.  
 Melilotus altissimus 334.  
 Melilotus officinalis 334.  
 Melissa officinalis 389.  
 Melone 407.  
 Melonenbaumgewächse 361.  
 Menispermaceae 302.  
 Menispermum calumba 303.  
 Menispermum palmatum 303.  
 Mentha crispa 391.  
 Mentha piperita 390.  
 Menthol 391.  
 Menyanthes trifoliata 380.  
 Merikarpien 67.  
 Merismopedia 165.  
 Meristeme 99.  
 Merulius lacrymans 210.  
 Mesokarp 65.  
 Mespilus germanica 325.  
 Metachlamydeae 279, 373.  
 Metroxylon Rumphii 263.  
 Microcoecus 162.  
 Microspermae 275.  
 Microspira comma 159.  
 Miere 293.  
 Mikropyle 71.  
 Mikroskops, Gebrauch des 17.  
 Mikrosomen 81.  
 Mikrosporangien 234, 239.  
 Mikrosporen 233, 234.  
 Milchsaftröhren 131.  
 Milchsaftschläuche 131, 132.  
 Milzbrandbacillus 153.  
 Mimosa pudica 329.  
 Mimosen 330.  
 Mimosoideae 329.  
 Mimusops balata 376.  
 Mispel 325.  
 Mistelgewächse 289.  
 Mittelband 50.  
 Mittellamelle 94.  
 Möhre 370.  
 Mohnartige 309.  
 Mohngewächse 309.  
 Mohrenpfeffer 304.  
 Mohrrübe 370.  
 Mondsamengewächse 302.  
 Monochasium 36.  
 Monocotyledoneae 252.  
 Monstera deliciosa 264.  
 Moose 222.

- Moos, irländisches 190.  
 Moos, isländisches 221.  
 Mooskapsel 224.  
 Moospflanzen 223.  
 Moraceae 285.  
 Morchel 198.  
 Morchella esculenta 198.  
 Morchelpilze 198.  
 Morphologie 27.  
 Morus alba 286.  
 Morus nigra 286.  
 Moschuskraut 404.  
 Mucoraceae 191.  
 Mucor mucedo 191.  
 Mütze 224.  
 Musaceae 273.  
 Musa paradisiaca 273.  
 Musa sapientum 273.  
 Musci 227.  
 Musci frondosi 227.  
 Muscineae 223.  
 Muskatnuß 306.  
 Muskatnußgewächse 304.  
 Mutterkorn 199.  
 Mycelium 190.  
 Mycelstränge 98.  
 Mycorrhiza 111.  
 Myosotis palustris 387.  
 Myristicaceae 304.  
 Myristica fragrans 306.  
 Myroxylon balsamum 335.  
 Myrrha 344.  
 Myrtaceae 364.  
 Myrtenblätige 362.  
 Myrtengewächse 364.  
 Myrtiflorae 362.  
 Myrtus communis 364.  
 Myrtus pimenta 365.  
 Myxamöben 167.  
 Myxogasteres 168.  
 Myxomonaden 167.  
 Myxomycetes 165.  
 Myxothallophyta 165.  
  
 Nabel 73.  
 Nabelfleck 74.  
 Nabelstrang 71, 73.  
 Nachtkerze 365.  
 Nachtschattengewächse 392.  
 Nadelhölzer 246.  
 Nährgewebe 72, 74.  
 Nagel 48.  
 Narbe 54.  
 Narcissus 269.  
 Narcissen 269.  
 Nasturtium officinale 315.  
 Natterkopf 388.  
 Natternknöterich 292.  
 Natterzunge 237.  
 Nebenblätter 41.  
 Nebenkrone 49.  
 Nebenrippen 367.  
 Nebenwurzeln 31.  
 Nectandra puchury 308.  
 Nectarium 58.  
 Nektar 243.  
 Nelkengewächse 292.  
 Nelkenwurz 325.  
 Nelumbo nucifera 296.  
 Neottia nidus avis 278.  
 Nepenthaceae 316.  
 Nephrodium filix mas 234.  
 Nerium oleander 383.  
 Nesselartige 284.  
 Nesselgewächse 288.  
 Nicotiana rustica 396.  
 Nicotiana tabacum 396.  
 Niederblätter 36, 37.  
 Nieswurz 267, 299.  
 Nigella damascena 301.  
 Nigella sativa 301.  
 Nitella 184.  
 Nomenklatur, binäre 134.  
 Nostocaceae 164.  
 Nucamentum 313.  
 Nucellus 72.  
 Nucleolus 82.  
 Nucleus 82.  
 Nuphar luteum 296.  
 Nuß 66.  
 Nußbaumgewächse 281.  
 Nußschötchen 313.  
 Nymphaea 296.  
 Nymphaeaceae 296.  
  
 Oberblätter 226.  
 Oberhaut 102.  
 Ochrea 41, 290.  
 Ochroporus 212.  
 Ochsenzunge 388.  
 Ocimum basilicum 392.  
 Odermennig 326.  
 Oedogoniaceae 180.  
 Oedogonium 180.  
 Öl, ätherisches 89.  
 Ölbaum 379.  
 Ölbaumgewächse 379.  
 Öl, fettes 89.  
 Ölpalme, afrikan. 261.  
 Ölstriemen 367.  
 Oenanthe phellandrium 370.  
 Oenothera biennis 365.  
 Oenotheraceae 365.  
 Oleaceae 379.  
 Olea europaea 379.  
 Oleander 383.  
 Oleum Bergamottae 343.  
 Oleum Cacao 357.  
 Oleum Cajeputi 364.  
 Oleum Cocos 261.  
 Oleum Crotonis 349.  
 Oleum Lauri 307.

- Oleum Macidis 306.  
 Oleum Myristicae 306.  
 Oleum Olivarium 379.  
 Oleum Pumilionis 250.  
 Oleum Ricini 349.  
 Oleum Rosae 325.  
 Oleum Rutae 341.  
 Oleum Santali 289.  
 Oleum Terebinthinae 250.  
 Olibanum 344.  
 Olive 379.  
 Onagraceae 365.  
 Oncidium 279.  
 Onobrychis 336.  
 Ononis spinosa 334.  
 Oogonium 178.  
 Oomycetes 193.  
 Oosphären 178.  
 Oospore 178.  
 Ophioglossaceae 237.  
 Ophioglossales 237.  
 Ophioglossum vulgatum 237.  
 Opium 311.  
 Opuntia coccionellifera 362.  
 Opuntia ficus indica 362.  
 Opuntiales 362.  
 Orchidaceae 276.  
 Orchisgewächse 276.  
 Orchis mascula 277.  
 Orchis militaris 277.  
 Orchis morio 277.  
 Orchis ustulata 277.  
 Ordnungen der Pflanzen 14.  
 Ordnungen 136.  
 Organe der Pflanzen 27.  
 Origanum majorana 392.  
 Origanum vulgare 392.  
 Ornithopus 336.  
 Orseille 222.  
 Orthospermae 367, 368.  
 Orthostichen 43.  
 Oryza sativa 258.  
 Oscillatoriaceae 163.  
 Osmundaceae 234.  
 Osmunda regalis 234.  
 Osterluzeiartige 290.  
 Osterluzeigewächse 290.  
 Ourouparia gambir 329, 402.  
 Ovarium 54.  
 Ovulum 70.  
 Oxalidaceae 338.  
 Oxalis acetosella 338.  
 Paeonia officinalis 301.  
 Paket-Spaltpilz 162.  
 Palaquium gutta 376.  
 Palaquium oblongifolium 376.  
 Paleae 255.  
 Palisadenzellen 111.  
 Palmae 260.  
 Palmen 260.  
 Palmengewächse 260.  
 Palmkernöl 261.  
 Palmöl 261.  
 Pandanales 252.  
 Panicoideae 257.  
 Panicula 65.  
 Panicum 257.  
 Panicum miliaceum 257.  
 Papaveraceae 309.  
 Papaver argemone 311.  
 Papaver dubium 311.  
 Papaver hybridum 311.  
 Papaver rhoeas 311.  
 Papaver somniferum 311.  
 Papaveroideae 311.  
 Paphiopedilum 279.  
 Papilionatae 332.  
 Pappeln 281.  
 Pappus 48, 411.  
 Paprika 395.  
 Papyrus 260.  
 Parakautschuk 349.  
 Parakresse 416.  
 Paraphysen 196.  
 Parasiten 169.  
 Parasitismus 217.  
 Parastichen 43.  
 Parietales 357.  
 Paris quadrifolia 268.  
 Parthenocissus quinquefolia 353.  
 Parthenocissus tricuspidata 343.  
 Parthenogenetische Entwicklung 184.  
 Passifloraceae 361.  
 Passiflora coerulea 361.  
 Passionsblumengewächse 361.  
 Paullinia cupana 351.  
 Paullinia sorbilis 351.  
 Pavia rubra 351.  
 Payena Leerii 376.  
 Pedicularis palustris 400.  
 Pedicularis silvatica 400.  
 Pektinstoffe 95.  
 Pelargonium 338.  
 Penicillium crustaceum 197.  
 Perianth 47.  
 Periblem 99.  
 Periderm 103.  
 Peridineae 170.  
 Peridineen 170.  
 Perigon 49.  
 Perigordtrüffel 198.  
 Perikarp 65.  
 Perisperm 72, 74.  
 Peristom 228.  
 Perithezien 199.  
 Peronosporaceae 193.  
 Persica vulgaris 327.  
 Personatae 396.  
 Perückenbaum 350.  
 Pestwurz 414.  
 Petala 48.

- Petasites officinalis 414.  
 Petersilie 370.  
 Petiolus 36.  
 Petroselinum sativum 370.  
 Peucedanum 372.  
 Pfahlwurzel 31.  
 Pfefferartige 279.  
 Pfeffergewächse 279.  
 Pfefferling 215.  
 Pfeffer, schwarzer 280.  
 Pfeffer, spanischer 394.  
 Pfefferkraut 392.  
 Pfefferminze 390.  
 Pfeifenstrauch 290.  
 Pfeilkraut 245.  
 Pfeilwurz 275.  
 Pferdekümmel 370.  
 Pfingstrose 301.  
 Pfirsich 327.  
 Pflanzenanatomie, Studium der 16.  
 Pflanzensäure 92.  
 Pflanzensysteme, künstliche 135.  
 Pflanzensysteme, natürliche 138.  
 Pflanzenwuchs 261.  
 Pflaume 326.  
 Phaeophyceae 184.  
 Phaeosporae 184.  
 Phallaceae 215.  
 Phallus impudicus 216.  
 Phanerogamen 241.  
 Phaseolus 335.  
 Phellogerm 103.  
 Phellogen 103.  
 Philodendron pertusum 264.  
 Phlobaphene 92.  
 Phloëm 114.  
 Phoenix dactylifera 263.  
 Phormium tenax 267.  
 Phragmites communis 258.  
 Phycobromaceae 163.  
 Phycocerythrin 188.  
 Phycomycetes 190.  
 Phylloidium 40.  
 Physalis alkekengi 396.  
 Physostigma venenosum 335.  
 Phytelephas macrocarpa 263.  
 Phyteuma spicatum 410.  
 Phytophthora infestans 193.  
 Phytosarcodina 165.  
 Picea excelsa 250.  
 Picraena excelsa 344.  
 Pilocarpus pennatifolius 342.  
 Pilularia globulifera 235.  
 Pilzcellulose 95.  
 Pilze, algenähnliche 190.  
 Pilze, echte 190.  
 Pilztiere 165.  
 Pimenta officinalis 365.  
 Pimpinella anisum 368.  
 Pimpinella magna 368.  
 Pimpinella saxifraga 368.  
 Pinaceae 248.  
 Pinselschimmel 197.  
 Pinus australis 249.  
 Pinus laricio 250.  
 Pinus nigra 250.  
 Pinus pinaster 250.  
 Pinus pumilio 250.  
 Pinus silvestris 249.  
 Pinus taeda 249.  
 Piperaceae 279.  
 Piperales 279.  
 Piper betle 280.  
 Piper cubeba 280.  
 Piper longum 280.  
 Piper nigrum 280.  
 Pirus communis 323.  
 Pirus malus 323.  
 Pisang 273.  
 Pistacia lentiscus 351.  
 Pistacia terebinthus 351.  
 Pistacia vera 351.  
 Pistaziennüsse 351.  
 Pistill 55.  
 Pisum 335.  
 Pix liquida 250.  
 Placenta 71.  
 Plankton 171.  
 Planktondiatomeen 174.  
 Plantaginaceae 401.  
 Plantaginales 400.  
 Plantago lanceolata 401.  
 Plantago major 401.  
 Plantago media 401.  
 Plantago psyllium 401.  
 Plantain 273.  
 Plasmaströmung 81.  
 Plasmodien 167.  
 Plasmodiophora Brassicae 169.  
 Plasmodiophorales 169.  
 Plasmopara viticola 194.  
 Platanthera bifolia 277.  
 Platte 48.  
 Platterbse 336.  
 Plazenten 71.  
 Pleiochasium 26, 63.  
 Plerom 99.  
 Pleurococcaceae 179.  
 Pleurococcus vulgaris 179.  
 Pleurosigma angulatum 175.  
 Plumula 29.  
 Pneumathoden 129.  
 Poa 257.  
 Poa annua 258.  
 Poaeoideae 257.  
 Podophyllin 302.  
 Podophyllum peltatum 302.  
 Pollen 50.  
 Pollenkörner 50.  
 Pollensäcke 50.  
 Pollenschlauch 242.  
 Pollentraden 51.

- Pollinarium 51.  
 Pollinium 51.  
 Polygala amara 345.  
 Polygalaceae 344.  
 Polygala senega 345.  
 Polygonaceae 290.  
 Polygonales 290.  
 Polygonum aviculare 292.  
 Polygonum bistorta 292.  
 Polygonum fagopyrum 292.  
 Polypodiaceae 233.  
 Polypodium vulgare 234.  
 Polyporaceae 210.  
 Polyporus 212.  
 Polyporus destructor 212.  
 Polyporus officinalis 212.  
 Polytrichaceae 230.  
 Polytrichum commune 230.  
 Pomeranze 342.  
 Pomoideae 321, 323.  
 Populus alba 281.  
 Populus canadensis 281.  
 Populus nigra 281.  
 Populus tremula 281.  
 Porenkapseln 68.  
 Porst 374.  
 Potamogeton 254.  
 Potamogetonaceae 253.  
 Potentilla tormentilla 325.  
 Potentilla verna 325.  
 Poterium sanguisorba 325.  
 Präparate, Behandlung mikroskopi-  
 scher 24.  
 Präparieren der Pflanzen 11.  
 Preiselbeere 375.  
 Pressen der Pflanzen 11.  
 Primelartige 375.  
 Primordialzellen 79.  
 Primula auricula 376.  
 Primula elatior 376.  
 Primula obconica 376.  
 Primula officinalis 376.  
 Primulaceae 375.  
 Primulales 375.  
 Principes 260.  
 Procambiumstränge 114.  
 Proteinkörner 89.  
 Prothallium 230.  
 Protobasidiomycetes 204.  
 Protococcales 178.  
 Protonema 223.  
 Protoplasma 78, 80.  
 Protoplasmakörper 77.  
 Protoplasten 77.  
 Prunella grandiflora 392.  
 Prunella vulgaris 392.  
 Prunoideae 322, 326.  
 Prunus amygdalus 326.  
 Prunus armeniaca 326.  
 Prunus avium 326.  
 Prunus cerasus 326.  
 Prunus domestica 326.  
 Prunus insititia 326.  
 Prunus italica 326.  
 Prunus laurocerasus 326.  
 Prunus persica 327.  
 Prunus spinosa 326.  
 Psalliota 214.  
 Pseudomonas 159.  
 Pseudomonas europaea 159.  
 Pseudoparenchym 98.  
 Pseudopodien 167.  
 Psychotria ipecacuanha 402.  
 Pteridium aquilinum 234.  
 Pteridophyta 230.  
 Pteris aquilina 234.  
 Pterocarpus draco 336.  
 Pterocarpus indicus 336.  
 Pterocarpus marsupium 336.  
 Pucciniaceae 204.  
 Puccinia coronata 208.  
 Puccinia graminis 207.  
 Puccinia malvacearum 205.  
 Puccinia rubigo vera 208.  
 Pulmonaria angustifolia 387.  
 Pulmonaria officinalis 387.  
 Pulpa Tamarindorum 331.  
 Pulsatilla pratensis 299.  
 Pulsatilla vulgaris 299.  
 Punicaceae 363.  
 Punica granatum 363.  
 Purgierlein 338.  
 Pycniden 207.  
 Pyrethrum carneum 418.  
 Pyrethrum cinerariifolium 418.  
 Pyrethrum roseum 418.  
 Pythiaceae 195.  
 Pythium 195.  
 Quassia amara 344.  
 Quecke 258.  
 Quendel 392.  
 Quercus infectoria 284.  
 Quercus lusitanica var. infectoria 284.  
 Quercus pedunculata 283.  
 Quercus robur 284.  
 Quercus sessiliflora 283.  
 Quercus suber 284.  
 Querschnitt 126.  
 Quillaja saponaria 323.  
 Quitte 325.  
 Racemus 63  
 Rachenblütlergewächse 396.  
 Radieschen 315.  
 Radix Alkanna 387.  
 Radix Althaeae 355.  
 Radix Angelicae 370.  
 Radix Aristolochiae 290.  
 Radix Aristoloch. rot. cav. 311.  
 Radix Arnicae 415.  
 Radix Asari 290.

- Radix Bardanae 417.  
 Radix Belladonnae 394.  
 Radix Bryoniae 407.  
 Radix Carlinae 417.  
 Radix Colombo 303.  
 Radix Consolididae majoris 387.  
 Radix Dictamni 342.  
 Radix Filipendulae 325.  
 Radix Gelsemii 379.  
 Radix Gentianae 380.  
 Radix Helenii 414.  
 Radix Hellebori 299.  
 Radix Imperatoriae 370.  
 Radix Ipecacuanhae 402.  
 Radix Levistici 370.  
 Radix Liquiritiae 334.  
 Radix Morsus diaboli 406.  
 Radix Ononidis 334.  
 Radix Paeoniae 301.  
 Radix Pimpinellae 368.  
 Radix Ratanhiae 331.  
 Radix Rhapontici 292.  
 Radix Rubiae tinctoriae 402.  
 Radix Saponariae 295.  
 Radix Sarsaparillae 269.  
 Radix Senegae 345.  
 Radix Serpentariae 290.  
 Radix Sumbuli 373.  
 Radix Taraxaci cum herba 419.  
 Radix Valerianae 406.  
 Rainfarn 416.  
 Rainweide 379.  
 Ramie 288.  
 Ranales 296.  
 Ranunculaceae 296.  
 Ranunculus 299.  
 Raphanus raphanistrum 315.  
 Raphanus sativus 315.  
 Raphe 73, 74, 75.  
 Raphiden 90.  
 Rapünzchen 406.  
 Rautengewächse 340.  
 Raygras, englisches 258.  
 Receptaculum 56, 216, 321.  
 Reiherschnabel 338.  
 Reineclaudie 326.  
 Reis 258.  
 Rentierflechte 222.  
 Rentiermoos 222.  
 Resedaceae 315.  
 Resedagewächse 315.  
 Reseda luteola 315.  
 Reseda odorata 315.  
 Reservestärke 87.  
 Resina Draconis 261.  
 Resina Jalapae 385.  
 Resina Pini 250.  
 Resina Scammoniae 385.  
 Resupination 276.  
 Rettich 315.  
 Rhabarber 292.  
 Rhamnaceae 352.  
 Rhamnales 352.  
 Rhamnus cathartica 353.  
 Rhamnus frangula 353.  
 Rhamnus Purshiana 353.  
 Rheum officinale 292.  
 Rheum palmatum 292.  
 Rheum rhaponticum 292.  
 Rhinanthus 400.  
 Rhizoiden 111.  
 Rhizom 30, 33.  
 Rhizoma Asari 290.  
 Rhizoma Bistortae 292.  
 Rhizoma Calami 264.  
 Rhizoma Caricis 259.  
 Rhizoma Caryophyllatae 325.  
 Rhizoma Chinae 269.  
 Rhizoma Curcumae 275.  
 Rhizoma Filicis 234.  
 Rhizoma Galangae 275.  
 Rhizoma Graminis 258.  
 Rhizoma Hydrastis 302.  
 Rhizoma Imperatoriae 372.  
 Rhizoma Iridis 271.  
 Rhizoma Podophylli 302.  
 Rhizoma Rhei 292.  
 Rhizoma Serpentariae 290.  
 Rhizoma Tormentillae 325.  
 Rhizoma Veratri 267.  
 Rhizoma Zedoariae 275.  
 Rhizoma Zingiberis 275.  
 Rhizomorphen 213.  
 Rhodobacteriaceae 163.  
 Rhododendroideae 374.  
 Rhododendron ferrugineum 374.  
 Rhododendron hirsutum 374.  
 Rhododendron indicum 374.  
 Rhodophyceae 188.  
 Rhoecadales 309.  
 Rhus coriaria 350.  
 Rhus cotinus 350.  
 Rhus semialata 350.  
 Rhus toxicodendron 350.  
 Ricinus communis 349.  
 Riedgrasgewächse 259.  
 Riesenbovist 217.  
 Rindenporen 129.  
 Ring 233.  
 Ringelblume 417.  
 Rispe 65.  
 Rispengras 258.  
 Robinia pseudacacia 336.  
 Roccella tinctoria 222.  
 Röhrenblütige 384.  
 Röhrenblütler 414.  
 Roggen 258.  
 Rohr, spanisches 261.  
 Rohrzucker 258.  
 Rosa canina 325.  
 Rosaceae 319.  
 Rosa centifolia 325.

- Rosa damascena* 325.  
*Rosa gallica* 325.  
 Rosales 319.  
 Rosenähnliche 319.  
 Rosenfrucht 69.  
 Rosengewächse 319.  
 Rosinen 353.  
 Rosoideae 321, 325.  
*Rosmarinus officinalis* 392.  
 Roßkastanie 351.  
 Rostpilze 204.  
 Rotalgen 188.  
 Rotation 81.  
 Rotbuche 283.  
 Rottange 188.  
 Rottanne 250.  
*Rottlera tinctoria* 349.  
 Rotwurz 325.  
 Rubiaceae 401.  
 Rubiales 401.  
*Rubia tinctorum* 402.  
*Rubus caesius* 325.  
*Rubus idaeus* 325.  
*Rubus ulmifolius* 325.  
 Ruchgras 258.  
 Rübe 292.  
 Rübezahlbart 222.  
 Rückennaht 54.  
 Rüster 285.  
 Rum 258.  
*Rumex acetosa* 292.  
*Rumex acetosella* 292.  
 Runkelrübe 292.  
 Rutaceae 340.  
*Ruta graveolens* 341.
- Sabadilla officinalis** 267.  
 Saccharomyces 201.  
 Saccharomycetaceae 201.  
*Saccharum officinarum* 258.  
 Sadebaum 251.  
 Saflor 417.  
 Safran 271.  
 Safrol 308.  
 Saffrüchte 66.  
*Sagittaria sagittifolia* 254.  
 Sago 263.  
 Salbei 392.  
 Salicaceae 280.  
 Salicales 280.  
*Salix alba* 281.  
*Salix fragilis* 281.  
*Salix pentandra* 281.  
*Salix viminalis* 281.  
*Salvia officinalis* 392.  
*Salvia splendens* 392.  
*Salvina natans* 235.  
*Sambucus ebulus* 403.  
*Sambucus nigra* 403.  
 Samenanlage 70.  
 Samenanlagen, Anheftung der 73.
- Samenanlagen, Bau der 71.  
 Samenanlagen, Gestalt der 73.  
 Samen, ausgewachsene 74.  
 Sameneiweiß 74.  
 Samenleisten 71.  
 Samenmantel 75.  
 Samenpflanzen 241.  
 Samenschale 71, 74, 75.  
 Sammelfrüchte 68.  
 Sammeln der Pflanzen 4.  
 Sandaracharz 251.  
 Sandelholzbaum 289.  
 Sandsegge 259.  
*Sanguis draconis* 261, 268.  
*Sanicula europaea* 370.  
 Sanikel 370.  
*Sansevieria* 268.  
 Santalaceae 288.  
 Santalales 288.  
*Santalum album* 289.  
 Santelbaumartige 288.  
 Santelholzbaum 289.  
 Santelholzgewächse 288.  
 Sapindaceae 351.  
 Sapindales 349.  
*Sapindus saponaria* 351.  
*Saponaria officinalis* 295.  
 Sapotaceae 376.  
 Sappanholz 330.  
 Saprolegniaceae 194.  
 Saprophyten 169.  
*Sarcina ventriculi* 162.  
 Sargassum 188.  
*Sarothamnus scoparius* 334.  
 Sarraceniaceae 316.  
 Sarraceniales 316.  
*Sarracenia purpurea* 316.  
 Sarsaparille 269.  
 Sassafras officinale 308.  
*Satureja hortensis* 392.  
 Sauerampfer 292.  
 Sauerdorn 302.  
 Sauerkleegewächse 338.  
 Sauerstoff 109.  
 Saugwurzeln 32.  
 Saxifragaceae 319.  
*Saxifraga granulata* 319.  
*Scabiosa columbaria* 406.  
 Scammonium 385.  
 Schachtelhalmgewächse 237.  
 Schafgarbe 416.  
 Schalotte 267.  
 Schattenblätter 226.  
 Scheide 41.  
 Scheidenbakterien 144, 161.  
 Scheidenblütler 263.  
 Scheinfrüchte 65, 68.  
 Scheinfüße 167.  
 Scheitelzelle 99.  
 Schierling 373.  
 Schilf 258.

- Schimmelpilze 196.  
 Schizomycetes 143.  
 Schizophyceae 163.  
 Schizophyta 142.  
 Schlafmohn 311.  
 Schlauchalgen 181.  
 Schlauchblattgewächse 316.  
 Schlauchpilze 195, 221.  
 Schlehdorn 326.  
 Schleier 233.  
 Schleifenblume 315.  
 Schleimmembranen 95.  
 Schleimpilze 165.  
 Schließfrüchte 65.  
 Schließzellen 128.  
 Schlüsselblumengewächse 375.  
 Schmetterlingsblütler 332.  
 Schneckenklee 336.  
 Schneeball 404.  
 Schneeglöckchen 269.  
 Schnitte, Herstellung mikroskopischer 20.  
 Schnittlauch 267.  
 Schoenocaulon officinale 267.  
 Schöllkraut 311.  
 Schötchen 67.  
 Schötchenfrüchte, angustisepte 314.  
 Schötchenfrüchte, latisepte 314.  
 Schötchenfrüchtige 315.  
 Schote 67.  
 Schotenfrüchtige 315.  
 Schotenklee 336.  
 Schrägzeilen 43.  
 Schraubel 36, 64.  
 Schraubenbakterien 159.  
 Schraubenbaumartige 252.  
 Schutzgewebe 102.  
 Schwärmer 177.  
 Schwärmsporen 177.  
 Schwammparenchym 112.  
 Schwarzkümmel 301.  
 Schwarzwurzel 419.  
 Schwellenschüppchen 255.  
 Schwertliliengewächse 270.  
 Scilla maritima 267.  
 Scirpoideae 260.  
 Scirpus 260.  
 Seitamineae 272.  
 Scleranthus annuus 293.  
 Scleranthus perennis 293.  
 Sclerodermataceae 217.  
 Scleroderma vulgare 217.  
 Scolopendrium vulgare 234.  
 Scorzonera hispanica 419.  
 Scrophulariaceae 396.  
 Scrophularia nodosa 399.  
 Scutellum 256.  
 Secale cereale 258.  
 Secale cornutum 199.  
 Seerosengewächse 296.  
 Seidelbastgewächse 362.  
 Seidenpflanzengewächse 383.  
 Seifenbaumartige 349.  
 Seifenbaumgewächse 351.  
 Seifenwurzel 295.  
 Seitenblüte 59.  
 Seitenwurzeln 31.  
 Sekretbehälter 130.  
 Sekrete 129.  
 Sekretionsorgane 129.  
 Sekretionssystem 129.  
 Sekretzellen 130.  
 Selaginellaceae 239.  
 Selaginella helvetica 240.  
 Selaginella spinulosa 240.  
 Selektionstheorie 135.  
 Semecarpus anacardium 349.  
 Semen Arecae 261.  
 Semen Cacao 357.  
 Semen Colae 357.  
 Semen Colchici 266.  
 Semen Crotonis 349.  
 Semen Cydoniae 325.  
 Semen Cynosbati 325.  
 Semen Erucae 315.  
 Semen Foenugraeci 334.  
 Semen Hyoscyami 396.  
 Semen Lini 338.  
 Semen Mili solis 387.  
 Semen Myristicae 306.  
 Semen Nigellae 301.  
 Semen Paeoniae 301.  
 Semen Papaveris 311.  
 Semen Pichurim 308.  
 Semen Psyllii 401.  
 Semen Ricini 349.  
 Semen Sabadillae 267.  
 Semen Sinapis 315.  
 Semen Sinapis albae 315.  
 Semen Staphisagriae 301.  
 Semen Stramonii 396.  
 Semen Strophanthi 382.  
 Semen Strychni 379.  
 Semen Tonco 336.  
 Senf 315.  
 Senfkraut 315.  
 Sepala 47.  
 Serradella 336.  
 Sexualsystem 135.  
 Shorea 359.  
 Siebenstern 376.  
 Siebparenchym 119.  
 Siebplatten 117.  
 Siebröhren 117.  
 Siebteil 114, 117, 119.  
 Sikimmi-Frucht 303.  
 Silberblatt 315.  
 Silene inflata 295.  
 Silene nutans 295.  
 Silenoideae 293.  
 Silicula 67.  
 Siliculosae 315.

- Siliqua 67.  
 Siliquosae 315.  
 Simarubaceae 343.  
 Sinsen 265.  
 Sinapis alba 315.  
 Sinapis arvensis 315.  
 Sinapis juncea 315.  
 Sinapis nigra 315.  
 Siphonales 181, 190, 193.  
 Sisalhanf 270.  
 Sisymbrium officinale 315.  
 Skelettsystem 107.  
 Sklereiden 109.  
 Sklerenchymfasern 107.  
 Sklerenchymzellen 109.  
 Sklerotium 199, 213.  
 Smilacoideae 269.  
 Smilax china 269.  
 Smilax medica 269.  
 Smilax officinalis 269.  
 Smilax ornata 269.  
 Smilax pseudosyphilitica 269.  
 Smilax syphilitica 269.  
 Solanaceae 392.  
 Solanum dulcamara 394.  
 Solanum lycopersicum 394.  
 Solanum nigrum 394.  
 Solanum tuberosum 394.  
 Solidago virga aurea 418.  
 Sommersporen 196.  
 Sonchus 419.  
 Sonnenblume 416.  
 Sonnenröschen 359.  
 Sonnentaugewächse 316.  
 Sorbus aucuparia 323.  
 Soredienbildung 220.  
 Sorus 233.  
 Spadix 63, 263.  
 Spaltalgen 163.  
 Spaltfrüchte 67.  
 Spaltöffnungen 112, 128.  
 Spaltpflanzen 142.  
 Spaltpilze 143, 145.  
 Sparganiaceae 253.  
 Sparganium 253.  
 Spargel 268.  
 Spark 293.  
 Spartium scoparium 334.  
 Spatha 44, 263.  
 Spathiflorae 263.  
 Speichersystem 127.  
 Speisezwiebel 267.  
 Spelzen 255.  
 Spelzenblütige 255.  
 Spargulia arvensis 293.  
 Spermatien 188.  
 Spermatozoiden 178.  
 Spermogonien 207.  
 Spezies 133.  
 Sphaerotilus dichotomus 162.  
 Sphagnaceae 228.  
 Sphagnum 229.  
 Spica 63.  
 Spike 390.  
 Spilanthus oleracea 416.  
 Spinacia oleracea 292.  
 Spinat 292.  
 Spiraea 323.  
 Spiraeoideae 321, 323.  
 Spirillaceae 159.  
 Spirillum 161.  
 Spiritus Cochleariae 315.  
 Spirochaete 145, 161.  
 Spirochaete Obermeieri 161.  
 Spirochaete pallida 161.  
 Spirogyra 176, 191.  
 Spirre 65.  
 Splint 126.  
 Sporangien 168, 233.  
 Sporangienhäufchen 233.  
 Sporen 149, 230.  
 Spornblume 406.  
 Sporophyt 223, 224.  
 Spreite 48.  
 Spreublättchen 44, 411.  
 Springfrüchte 66.  
 Sproß 30.  
 Stacheln 105.  
 Stachelschwämme 210.  
 Stäbchenbakterien 143, 153.  
 Stärke 86.  
 Stärkekörner 88.  
 Stärke, transitorische 87.  
 Stäublinge 216.  
 Stamina 50.  
 Staminodien 52.  
 Stammorgane 32, 114.  
 Staubbeutel 50.  
 Staubbeutelächer 50.  
 Staubblätter 50.  
 Staubfaden 50.  
 Staubgefäße 50.  
 Stechapfel 396.  
 Stechpalmengewächse 351.  
 Steinbrechgewächse 319.  
 Steinflechten 219.  
 Steinfrucht 68.  
 Steinpilz 212.  
 Steinsamen 387.  
 Steinzellen 109.  
 Stellaria media 293.  
 Stellung der Blätter 41.  
 Stelzwurzeln 32.  
 Stempel 54.  
 Sterculiaceae 355.  
 Sternanisbaum 303.  
 Sternmiere 293.  
 Stickstoff 109.  
 Sticta pulmonacea 221.  
 Stiefmütterchen 361.  
 Stielpfeffer 280.  
 Stigma 54.

- Stinkmorehel 216.  
 Stipites Dulcamarae 394.  
 Stipites Laminariae 186.  
 Stipites Visci 289.  
 Stockmorehel 198.  
 Stockrose 355.  
 Stolonen 32.  
 Stomata 128.  
 Storax 378.  
 Storchschnabelartige 336.  
 Storchschnabelgewächse 337.  
 Stratiotes aloides 255.  
 Strauchflechten 219.  
 Streptococcus mesenterioides 162.  
 Streptococcus pyogenes 162.  
 Strobilus 288.  
 Stroma 199.  
 Strophanthus hispidus 382.  
 Strophanthus kombe 382.  
 Strychnosgewächse 379.  
 Strychnos Ignatii 379.  
 Strychnos nux vomica 379.  
 Strychnos tieute 379.  
 Strychnos toxifera 379.  
 Stryphnodendron barbatimao 330.  
 Stützwurzeln 32.  
 Stuhlrohr 261.  
 Stylus 54.  
 Styracaceae 377.  
 Styrax benzoin 378.  
 Styrax liquidus 319, 378.  
 Styrax officinalis 378.  
 Suberin 95.  
 Succisa pratensis 406.  
 Succus Liquiritiae 334.  
 Sumach 350.  
 Sumachgewächse 349.  
 Sumpfbewohnende 253.  
 Summitates Sabiniae 251.  
 Suspensoren 192.  
 Symbiose 217.  
 Symmetrieverhältnisse 36.  
 Sympetalae 373.  
 Symphytum officinale 387.  
 Sympodium 36.  
 Synandrium 52.  
 Synanthereae 410.  
 Synergiden 242.  
 Syringa vulgaris 379.  
 Systematik 133.  
 System Brongniarts 139.  
 System Englers 139, 141.  
 System Jussieus 138.  
 System Linnés 136.  
 System, mechanisches 107.  
 System, natürliches 135.  
 System, phylogenetisches 141.  
 Tälchen 367.  
 Täschelkraut 315.  
 Tamarindus indica 331.  
 Tanacetum vulgare 416.  
 Tangersoda 188.  
 Tanne 250.  
 Taraxacum officinale 419.  
 Taubnessel 392.  
 Taumellohch 258.  
 Tausendgüldenkraut 380.  
 Taxaceae 248.  
 Taxus baccata 248.  
 Teakholzbaum 388.  
 Tectona grandis 388.  
 Teegewächse 358.  
 Teestrauch 358.  
 Teleutosporen 206.  
 Terebinthina 250.  
 Terebinthina veneta 250.  
 Terminalblüte 59.  
 Ternstroemiaceae 358.  
 Terpenthin, cyprisches 351.  
 Testa 75.  
 Tetrasporen 188.  
 Teucrium botrys 392.  
 Teucrium flavum 392.  
 Teucrium marum 392.  
 Teucrium scordium 392.  
 Teufelsabbii 406.  
 Teufelskralle 410.  
 Theaceae 358.  
 Thea japonica 358.  
 Thea nigra 358.  
 Thea sinensis 358.  
 Thea viridis 358.  
 Thecae 50.  
 Theobroma cacao 357.  
 Thesium 289.  
 Thiobacteria 163.  
 Thlaspi arvense 315.  
 Thyllen 94.  
 Thymelaeaceae 362.  
 Thymian 391.  
 Thymus serpyllum 392.  
 Thymus vulgaris 391.  
 Tiliaceae 353.  
 Tilia cordata 354.  
 Tilia pauciflora 354.  
 Tilia platyphyllos 354.  
 Tilia ulmifolia 354.  
 Tilletiaceae 204.  
 Tilletia Triticum 204.  
 Tollkirsche 394.  
 Tomate 394.  
 Torfmoose 228.  
 Tormentilla erecta 325.  
 Torus 56.  
 Tracheen 114.  
 Tracheiden 116.  
 Trachylobium verrucosum 331.  
 Träger 216.  
 Tragacantha 334.  
 Tragblätter 32.  
 Tragopogon pratensis 419.

- Traube 63.  
 Trentepohlia iolithus 180.  
 Trichasium 63.  
 Trichogyn 188.  
 Trichome 105.  
 Trientalis europaea 376.  
 Trifolium 335.  
 Trifolium arvense 335.  
 Trifolium pratense 335.  
 Trigonella foenum graecum 334.  
 Triticum repens 258.  
 Triticum vulgare 258.  
 Trockenfrüchte 65.  
 Trocknen der Pflanzen 11.  
 Trüffel, falsche 217.  
 Trüffelpilze 197.  
 Trugdolde 65.  
 Tubera Aconiti 301.  
 Tubera Ari 264.  
 Tubera Chinae 269.  
 Tubera Jalapae 385.  
 Tubera Salep 277.  
 Tuberkelbacillus 154.  
 Tuber melanosporum 148.  
 Tubiflorae 384.  
 Tubuliflorae 414.  
 Tüpfel 93.  
 Tüpfel, behöfte 94.  
 Tulipa Gesneriana 267.  
 Tulpenbaum 304.  
 Turgor 81.  
 Turritis glabra 315.  
 Tussilago farfara 414.  
 Typha 253.  
 Typhaceae 253.  
 Typhusbacillus 158.  
 Übersicht des Linnéschen Systems 136.  
 Ulmaceae 284.  
 Ulmaria filipendula 325.  
 Ulmaria palustris 325.  
 Ulmaria pentapetala 325.  
 Ulmengewächse 284.  
 Ulmus campestris 285.  
 Ulmus effusa 285.  
 Ulvaceae 179.  
 Ulva latissima 179.  
 Umbella 63.  
 Umbelliferae 366.  
 Umbelliflorae 365.  
 Uncaria gambir 402.  
 Uragoga ipecacuanha 402.  
 Uredosporen 206.  
 Urginea maritima 267.  
 Urmeristem 99.  
 Uromyces pisi 208.  
 Urticales 284.  
 Urticaceae 288.  
 Urtica dioica 288.  
 Urtica urens 288.  
 Usnea barbata 222.  
 Ustilaginaceae 202.  
 Ustilago Avenae 202.  
 Ustilago Maydis 203.  
 Vaccinioideae 374, 375.  
 Vaccinium myrtillus 375.  
 Vaccinium vitis idaea 375.  
 Vagina 36.  
 Vakuolen 78.  
 Valerianaceae 404.  
 Valeriana dioica 406.  
 Valeriana officinalis 406.  
 Valerianella dentata 406.  
 Valerianella olitoria 406.  
 Valleculae 367.  
 Vanilla planifolia 279.  
 Varek 188.  
 Varietäten 133.  
 Vasalteil 114.  
 Vaucheria 193.  
 Vaucheriaceae 181.  
 Vaucheria dichotoma 181.  
 Vegetationspunkte 99.  
 Veilchengewächse 361.  
 Venusfliegenfalle 318.  
 Vennshaar 234.  
 Veratrum album 267.  
 Veratrum sabadilla 267.  
 Verbascum phlomoides 399.  
 Verbascum thapsiforme 399.  
 Verbascum thapsus 399.  
 Verbenaceae 388.  
 Verbena officinalis 388.  
 Verbreitung der Früchte und Samen 75.  
 Vergiftmeinnicht 387.  
 Vermehrung 134, 177, 190.  
 Vernation 40.  
 Veronica arvensis 400.  
 Veronica officinalis 400.  
 Verwandtschaft 133.  
 Verwandtschaft der Pflanzen 133.  
 Verwandtschaft, natürliche 135.  
 Verwesung 147.  
 Verzweigung 35.  
 Vexillum 332.  
 Viburnum opulus 404.  
 Vicia 335.  
 Victoria regia 296.  
 Vinca minor 383.  
 Violaceae 361.  
 Viola altaica 361.  
 Viola odorata 361.  
 Viola tricolor 361.  
 Viscum album 289.  
 Vitaceae 353.  
 Vitis Veitchii 353.  
 Vitis vinifera 353.  
 Vittae 367.  
 Vogelbeerbaum 323.  
 Vogelfuß 336.  
 Vogelknöterich 292.

- Vogelmiere 293.  
 Volva 216, 224.  
 Volvocaceae 178.  
 Volvox globator 179.  
 Vorblätter 44.  
 Vorkeim 223, 230.  
 Vorspelze 255.  
**W**  
 Wacholder 251.  
 Wachs 92.  
 Wachtelweizen 400.  
 Waid 315.  
 Waldkohl 315.  
 Waldmeister 402.  
 Waldrebe 297.  
 Walnußartige 281.  
 Wanderstärke 87.  
 Wandplasma 81.  
 Wasserlöw 255.  
 Wasserfarne 234.  
 Wasserlinsengewächse 264.  
 Wasserpest 255.  
 Wasserspalten 129.  
 Wegebreitartige 400.  
 Wegebreitgewächse 401.  
 Wegerich 401.  
 Weidenartige 280.  
 Weidengewächse 280.  
 Weidenröschengewächse 365.  
 Weinrebengewächse 353.  
 Weißbuche 283.  
 Weißtanne 250.  
 Weizen 258.  
 Weizen, türkischer 257.  
 Wernut 414.  
 Wicke 335.  
 Wickel 36, 63.  
 Wiesengräser 258.  
 Wiesenschaumkraut 315.  
 Wiesenstorchschnabel 337.  
 Windengewächse 385.  
 Windröschen 297.  
 Wintersporen 206.  
 Winterzwiebel 267.  
 Wohlverleihkraut 415.  
 Wolfsmilchgewächse 346.  
 Wollgras 260.  
 Wollkraut 399.  
 Wucherblumen 418.  
 Wundklee 336.  
 Wurmfarn 234.  
 Wurzel 29.  
 Wurzelhaare 105, 110.  
 Wurzelhaube 101.  
 Wurzelknollen 31.  
 Wurzelstock 33.  
**X**  
 Xanthophyll 85.  
 Xanthorrhoea australe 267.  
 Xanthorrhoea hastile 267.  
 Xylem 114.  
 Xylopia aethiopica 304.  
**Y**  
 Yamsgewächse 270.  
 Yamsknollen 270.  
**Z**  
 Zahnwurz 315.  
 Zanzibarkopal 331.  
 Zapfen 70.  
 Zapfenbeeren 70.  
 Zapfenträger 246.  
 Zaurübe 407.  
 Zea mays 257.  
 Zellbildung, freie 96.  
 Zelle, Bau, Allgemeines 78.  
 Zelle, lebende 77.  
 Zellen, Entstehung, der 96.  
 Zellenlehre 78.  
 Zellen, parenchymatische 80.  
 Zellen, prosenchymatische 80.  
 Zellfächerung 96.  
 Zellfäden 98.  
 Zellflächen 98.  
 Zellhaut 78.  
 Zellinhalt 80.  
 Zellkern 78, 82.  
 Zellkernteilung 82.  
 Zellkörper 98.  
 Zellmembran 78.  
 Zellplatte 83.  
 Zellreihen 98.  
 Zellsaft 78, 86.  
 Zellteilung 96.  
 Zellwand 77, 78, 92.  
 Zentralkern 242.  
 Ziegenbart 210.  
 Zimmertanne 249.  
 Zimtbaum 308.  
 Zingiberaceae 273.  
 Zingiber officinale 275.  
 Zirkulation 81.  
 Zittergras 258.  
 Zittwer 275.  
 Zizyphus vulgaris 353.  
 Zoosporen 177.  
 Zottenhaare 105.  
 Zuckerarten 92.  
 Zuckerrohr 258.  
 Zuckerrübe 292.  
 Zunderschwamm 212.  
 Zungenblütler 414, 419.  
 Zweiteilung, fortgesetzte 98.  
 Zwergmännchen 181.  
 Zwetsche 326.  
 Zwiebelknollen 33.  
 Zwiebelkuchen 33.  
 Zwiebeln 33.  
 Zwitterblüte 47.  
 Zygnemataceae 176.  
 Zygomycetes 176, 191.  
 Zygomycetaceae 339.  
 Zygosporangium 176, 192.

---

Druck der Kgl. Universitätsdruckerei H. Stürtz, A. G. Würzburg.

---

Verlag von Julius Springer in Berlin.

**Pharmazeutische Übungspräparate.** Anleitung zur Darstellung, Erkennung, Prüfung und stöchiometrischen Berechnung von officinellen chemisch-pharmazeutischen Präparaten. Von Dr. **Max Biechele**, Apotheker. Dritte, verbesserte Auflage. Mit 6 Textfiguren.

In Leinwand gebunden Preis M. 6.—.

**Anleitung zur Erkennung und Prüfung aller im Deutschen Arzneibuch, 5. Ausgabe, aufgenommenen Arzneimittel.** Mit Erläuterung der bei der Prüfung der chemischen Präparate sich abspielenden chemischen Prozesse. Zugleich ein Leitfaden bei Apotheken-Visitationen für Apotheker und Ärzte. Von Apotheker Dr. **Max Biechele**. Dreizehnte, vielfach abgeänderte Auflage.

In Leinwand gebunden Preis M. 6.60.

**Pharmazeutisch-chemisches Praktikum.** Die Herstellung, Prüfung und theoretische Ausarbeitung pharmazeutisch-chemischer Präparate. Ein Ratgeber für Apothekereleven. Von Dr. **D. Schenk**, Apotheker und Nahrungsmittelchemiker. Mit 51 Textfiguren.

In Leinwand gebunden Preis M. 5.—.

**Lehrbuch der Pharmakognosie.** Von Dr. **Ernst Gilg**, a. o. Professor der Botanik und Pharmakognosie an der Universität, Kustos am Kgl. Botanischen Museum zu Berlin. Zweite, vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 411 Textabbildungen.

In Leinwand gebunden Preis M. 8.—.

**Einführung in die Chemie.** Ein Lehr- und Experimentierbuch von **Rudolf Ochs**. Mit 218 Textfiguren und einer Spektraltafel.

In Leinwand gebunden Preis M. 6.—.

**Einführung in die Mikroskopie.** Von Prof. Dr. **P. Mayer** in Jena. Mit 28 Textfiguren.

In Leinwand gebunden Preis M. 4.80.

**Hagers Handbuch der pharmazeutischen Praxis.**

Für Apotheker, Ärzte, Drogisten und Medizinalbeamte.

**Hauptwerk.** Unter Mitwirkung von Fachmännern vollständig neu bearbeitet und herausgegeben von **B. Fischer** und **C. Hartwich**. Mit zahlreichen in den Text gedruckten Holzschnitten. In zwei Bänden. Siebenter, unveränderter Abdruck.

Jeder Band Preis M. 20.—; in Halbleder gebunden M. 22.50.

**Ergänzungsband.** Unter Mitwirkung von Fachmännern bearbeitet und herausgegeben von **W. Lenz** und **G. Arends**. Mit zahlreichen Textfiguren. Zweiter, unveränderter Abdruck.

Preis M. 15.—; in Halbleder gebunden M. 17.50.

**Neues pharmazeutisches Manual.** Von **Eugen Dieterich**. Elfte, vermehrte Auflage. Herausgegeben von Dr. **Karl Dieterich**, Direktor der Chemischen Fabrik Helfenberg A.-G. vorm **Eugen Dieterich**, Privatdozent der Pharmakochemie an der Kgl. Tierärztlichen Hochschule zu Dresden. Mit 148 Textfiguren.

In Leinwand gebunden Preis M. 20.—; gebunden und durchschossen M. 22.—.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung.

Verlag von Julius Springer in Berlin.

### **Volkstümliche Namen der Arzneimittel, Drogen und**

**Chemikalien.** Eine Sammlung der im Volksmunde gebräuchlichen Benennungen und Handelsbezeichnungen. Zusammengestellt von Dr. J. Holfert. Siebente, verbesserte und vermehrte Auflage. Bearbeitet von G. Arends. In Leinwand gebunden Preis M. 4.80.

### **Neue Arzneimittel und pharmazeutische Spezialitäten**

einschließlich der neuen Drogen-, Organ- und Serumpräparate, mit zahlreichen Vorschriften zu Ersatzmitteln und einer Erklärung der gebräuchlichsten medizinischen Kunstausrücke. Von G. Arends, Apotheker. Vierte, vermehrte und verbesserte Auflage. Neu bearbeitet von Dr. A. Rathje, Redakteur an der Pharmazeutischen Zeitung.

In Leinwand gebunden Preis M. 6.—.

### **Die kaufmännische Buchführung in der Apotheke.**

Nach bequemem und brauchbarem Verfahren an der Hand eines Beispiels in leicht faßlicher Weise dargestellt von Dr. W. Mayer, Apotheker. Vierte, vermehrte Auflage.

Kartonierte Preis M. 1.60.

### **Die preußischen Apothekengesetze**

mit Einschluß der reichsgesetzlichen Bestimmungen über den Betrieb des Apothekergewerbes. Herausgegeben von Dr. H. Böttger und Ernst Urban, Redakteure der Pharmazeutischen Zeitung. Fünfte, neubearbeitete und vervollständigte Auflage.

In Leinwand gebunden Preis M. 7.—.

### **Kryptogamenflora für Anfänger.**

Eine Einführung in das Studium der blütenlosen Gewächse für Studierende und Liebhaber. Herausgegeben von Prof. Dr. Gustav Lindau, Privatdozent der Botanik an der Universität zu Berlin, Kustos am Kgl. Botan. Museum zu Dahlem.

Bisher erschienen:

Erster Band: **Die höheren Pilze** (Basidiomyceten). Von Prof. Dr. Gustav Lindau. Mit 607 Fig. im Text.

Preis M. 6.60; in Leinwand gebunden M. 7.40

Zweiter Band: **Die mikroskopischen Pilze.** Von Prof. Dr. Gustav Lindau. Mit 558 Fig. im Text.

Preis M. 8.—; in Leinwand gebunden M. 8.80.

Dritter Band: **Die Flechten.** Von Prof. Dr. Gustav Lindau. Mit 306 Fig. im Text.

Preis M. 8.—; in Leinwand gebunden M. 8.80.

Vierter Band, Teil I: **Die Algen.** Erste Abteilung. Von Prof. Dr. Gustav Lindau. Mit 489 Fig. im Text.

Preis M. 7.—; in Leinwand gebunden M. 7.80.

Vierter Band, Teil II: **Die Algen.** Zweite Abteilung. Von Prof. Dr. Gustav Lindau. Mit 437 Textfiguren.

Preis ca. M. 7.—; in Leinwand gebunden ca. M. 7.80.

Erscheint demnächst!

Fünfter Band: **Die Laubmoose.** Von Dr. Wilhelm Lorch. Mit 265 Fig. im Text.

Preis M. 7.—; in Leinwand gebunden M. 7.80.

Sechster Band: **Die Torf- und Lebermoose.** Von Dr. Wilhelm Lorch. Mit 296 Figuren im Text. **Die Farnpflanzen** (Pteridophyta). Von Guido Brause, Oberstleutnant a. D. Mit 73 Fig. im Text.

Preis M. 8.40; in Leinwand gebunden M. 9.20.

*Der III. (Schluß-) Teil von Band IV, mit dem das Werk abgeschlossen sein wird, erscheint bis Ende 1914.*

Zu beziehen durch jede Buchhandlung.

nd  
nen-  
ert.  
nds.  
.80.  
en  
ahl-  
reh-  
te,  
je,  
-.  
ce.  
iels  
te,  
.60.  
chs-  
ler-  
ma-  
ge.  
-.  
Stu-  
us-  
der  
tav  
.40  
au.  
.80.  
fig.  
.80.  
tav  
.80.  
tav  
.80.  
fig.  
.80.  
ch.  
on  
20.  
rd,

