

Antonius Romanus

Plantae officinalis in Europa

Hinc, 1837

Dv
5311

Amico

piaestantissimo ac carissimo

D.

~~B. Müller~~

~~A. Müller~~

in p. s. m.

affet
Auctos.

At auctore accepi. Vindob. 28/1/837

Müller

PLANTAE

OFFICINALES IN EUROPA

SPONTE CRESCENTES

ANTONII ROMANO,

MEDICINÆ DOCTORIS.

VIENNAE,
28/837
17/

TYPIS CONGREGATIONIS MECHITARISTICÆ.

1837.

DV 5377

Wirke! das ist das grosse Gesetz, in des Tempels Tafel
gehauen.

Klopstock.



mirabilis mundus de eis qui multo ante se et in
alii et antiquis ex eis rationibus eis mirum
mirabiliter audirem dicimus enim eis
audirem de eis quaeque ratione
mirabiliter audirem de eis quaeque ratione

P r o œ m i u m.

igitur monito de medicis sue ostentationis
omnis opus propositum est in aliis

Ingentem objectorum pro dissertatione inaugu-
rali aptorum cohortem oculo critico perlustrans,
sinceroque animo pervolvens, quid medici tiro-
nis valeant vires, descriptionem plantarum offi-
cialium in Europa sponte crescentium tandem
elegi. Non vanae gloriae illecebris sed pio desi-
derio ductus collegis et imprimis illis, qui aut
studii medici curriculum inchoant, aut illius
agmen claudunt fidelem in campo botanico asso-
ciandi ducem, ad hoc opus me accinxi. Propria
enim experientia me edocuit, quoties scripta in-
ter studiosos Botanicae in Medicinam applicatae
consuetim circulantia sint incompleta, quoties
ambigua, imo falsa. Ex altera parte vero operum

in hac re excellentium usus ob nimium illorum
pretium saepe difficilis, saepe prohibitus. In elab-
oratione hujus opusculi operibus clarissimorum
auctorum: *Person*, *Wagner*, *Ness ab Esenbeck*,
Sprengel etc. usus sum, et plantas secundum
systema sexuale *Linnaei* tironi magis notum et
simplicitate sua excellens, in ordinem redigi.
Suscipe ergo, benevole lector, aequo animo
et serena fronte teneros fructus mei laboris, et
respice finem, quem si assecutus sum, larga gau-
deo mercede.

Vale et fave!

Auctor.

Classis II. Diandria. Ordo I. Monogynia.

Olea europaea. L. Gemeiner Dehlbaum.

N. off. Olivae. *F. n.* Jasmineae, Juss.

Ch. G. Corol. 4-fida: lacinias subovatis. Drupa 2-sperma: uno abortante.

Ch. Sp. Foliis lanceolatis integerrimis, racemis axillaribus coarctatis. Eur. aust. ♂

Part. usual. Fructus. (Ph. a. 1820.)

Praep. Oleum olivarum (s. oleum expressum ex fructibus), Sapo ammoniacalis s. linimentum volatile. Cerata. Emplastra. (Ph. a. 1820.)

Ornus europaea, Pers. *Fraxinus Ornus,* L. Manna-Esche.

N. off. *Ornus.* *F. n.* Jasmineae, Juss.

Ch. G. Calyx 4-partitus. Corol. 4-partita: petalis longis ligulatis. Filamenta longa. Nux alata.

Ch. Sp. Foliis impari-pinnatis: foliolis oblongo-lanceolatis, simpliciter serratis, petiolatis. Floribus completis. Eur. merid. Sicil. Calab. Hungar. Ital. ♂

Part. usual. Succus ex trunco effluens inspissatus, sub nomine Mannae vulgaris, quarum species. M. in granis foliata, canellata, electa, calabrina.

Veronica officinalis. L. Echter Ehrenpreis.

N. off. *Veronica.* *F. n.* Primuleae. Juss.

Ch. G. Corol. limbo 4-partito: lacinia infima angustiore. Caps. bilocularis.

Ch. Sp. Spicis lateralibus pedunculatis, foliis opositis, obovato-subrotundis, pilosis annuis. Caule procumbente hirto. Germ. 2

Part. usual. Herba. (Ph. a. 1820.)

Praep. Species pro thee. (Ph. a. 1794.)

Veronica Beccabunga, L. Bachbungen.

N. off. Beccabunga. *F. n.* et *Ch. g.* ut supra.

Ch. Sp. Racemis lateralibus, foliis ovatis planis, caule repente. Germ. 2

Part. usual. Herba recens. (Ph. a. 1794.)

Praep. Conserva. (Ph. a. 1794.)

Gratiola officinalis, L. Echte Gnaden- oder Purgierkraut.

N. off. Gratiola. *F. n.* Scrophularineae, Juss.

Ch. G. Calix 7-phyllus, exterior patulus. Corol. resupinata. Filamenta 2 sterilia. Caps. 2-locularis.

Ch. Sp. Foliis lanceolatis serratis, floribus pedunculatis. Germ. ②

Part. usual. Herba et radix (Ph. a. 1820.)

Praep. Extr. herbae aquosum. (Ph. a. 1820.)

Rosmarinus officinalis, L. Echter Rosmarin.

N. off. Rosmarinus. *F. n.* Labiate, Juss.

Ch. G. Corol. ringens, labio superiore 2-partito. Filamenta longa, curva, simplicia c. dente.

Ch. Sp. Foliis opositis, linearibus, integerrimis, obtusis, margine revolutis, supra glabris, rugosis, subtus albo-tomentosis, sessilibus. Istria, Litore. 2

Part. usual. Folia. (Ph. a. 1820.) Flores. (Ph. a. 1780. et 1794.)

Praep. Aq. dest. Ol. dest. Spiritus. Acetum aromat. s. antisepticum. Aq. vulneraria c. alchohole. Linimentum.

tum saponato - camphoratum s. Opodædoc. (Ph. a. 1820.) *Spiritus balsamicus. Balsamum Saxonum. Species resolventes. Conserva.* (Ph. a. 1794.)

-
- Salvia officinalis, L. Hechter Salbei.*
N. off. Salvia, F. n. Labiate, Juss.
Ch. G. Corol. ringens. Filamenta transverse pedicello affixa.
Ch. Sp. Foliis lanceolato-ovatis, crenulatis, verticillatis paucifloris. Calycibus mucronatis. Eur. aust. 2⁴
Part. usual. Folia. (Ph. a. 1820.) Flores.
Praep. Aq. dest. Extr. aq. Ol. dest. Acet. arom. Aq. vulneraria c. alcohol. Spec. arom. (Ph. a. 1820.) Conserva. Balsamum Saxonum. Spec. resolventes et pro thee. (Ph. a. 1794.)

Salvia Sclarea, L. Scharlachfraut.

- N. off. Sclarea, F. n. et. Ch. g. ut supra.*
Ch. Sp. Foliis rugosis cordatis ablongis villosis serratis, bracteis floralibus calyce longioribus concavis acuminatis. Ital. ♂
Part. usual. Herba olim.

Classis III. Triandria. Ordo I. Monogynia.

-
- Valeriana officinalis, L. Gemeiner Baldrian.*
N. off. Valer. sylvestris. F. n. Valerianeae, Juss.
Ch. G. Calyx nullus aut margo minimus. Corol. monopetala subinfundibuliformis, 5-fida, basi hinc gibba, supra semen unum.
Ch. Sp. Foliis omnibus pinnatis, foliolis dentatis lanceolatis, caule sulcato. Germ. 2⁴
Part. usual. Radix. (Ph. a. 1820.)
Praep. Aq. dest. Ol. dest. Extr. aquos. Tinctura.
(Ph. a. 1820.) Elect. contra vermes. (Ph. a. 1794.)

Tinct. valer. aetherea et ammoniata s. volatilis.

(Ph. bor. II. 1830.)

Valeriana Phu, L. Großer Baldrian.

N. off. Phu. *F. n.* et *Ch. g.* ut supra.²

Ch. Sp. Foliis caulinis pinnatis, radicalibus indivisis,
caule laeve. Silesia. 24

Part. usual. Radix olim.

Valeriana celtica, L. Alpenbaldrian, Speik, Narden-
baldrian.

N. off. *Spica celtica.* *F. n.* et *Ch. g.* ut supra.

Ch. Sp. Foliis ovato-oblongis obtusis integerrimis, cau-
linis linearibus. Helvetia. Aust. Styria. 24

Part. usual. Planta integra. (Ph. a. 1820.)

Crocus sativus, L. Ächter Safran.

N. off. *Crocus.* *F. n.* Irideae, Juss.

Ch. G. Spatha radicalis, Corol. infundibuliformis: tubo
longissimo gracili. Stigmata profunde incisa,
cristata, crocea.

Ch. Sp. Foliis linearibus, margine revolutis, stigmate
exerto, segmentis longissimis linearibus. Coli-
tur in Austr. 24

Part. usual. Stigmata. (Ph. a. 1820.)

Praep. Tinctura. (Ph. a. 1820.) Extr. spirituos. Laudanum liquidum. Sydenh. Tinctura aloes compos. Tinctura aloes acida. Tinctura balsamica. Pulvis contra tussim. Pilulae Rufii. Pil. de Styrace. Empl. de Galbano crocatum. Empl. oxy-crocum. Empl. de mucilaginibus. (Ph. a. 1794.) Syrupus. (Ph. bor. 1830.)

Iris florentina, L. Florentinische Schwertlilie.

N. off. *Iris florentina*. *F. n.* Irideae, Juss.

Ch. G. Corol. 6-petala: laciinis alternis reflexis. Stylus nullus. Stigm. petaliformia. Stamina in-cumbentia.

Ch. Sp. Barbata, foliis ensiformibus glabris, scapo subbifloro brevioribus floribus sessilibus. Florentia. 2

Part. usual. Radix. (Ph. a. 1820.)

Praep. Pulvis contra tussim. Spiritus balsamicus. Pulv. dentifricius albus et ruber. Electuar. dentifricium. (Ph. a. 1794.)

Iris germanica, L. Deutsche Schwertlilie.

N. off. *Gladiolum coeruleum*. *F. n.* et *Ch. g.* ut supra.

Ch. Sp. Barbata, foliis ensiformibus, glabris falcatis, brevioribus, scapo multifloro, tubo germine longiore. Europ. austr. 2

Part. usual. Radix.

Cyperus esculentus, L. Erdmandel.

N. off. *Cyperus officinalis*. *F. n.* Cyperoideae, Juss.

Ch. G. Glumae paleaceae distiche imbricatae. Corol. nul. Semen 1. nudum. Spicula compressa.

Ch. Sp. Culmo 3-quetro nudo, umbella foliosa, radicum tuberibus ovatis, zonis imbricatis. Ital. Germ. 2

Part. usual. Tubera radicum.

Praep. Surrogatum Coffeae.

Classis III. Triandria. Ordo II. Digynia.

Avena sativa, L. Gemeiner Hafer.

N. off. *Avena*. *F. n.* Gramineae, Juss.

Ch. G. Calyx 2-valvis, multiflorus: arista dorsali contorta.

Ch. Sp. Paniculata, calycibus dispermis, seminibus lae-
vibus, altero aristato. Originem habet ex insula
Juan Fernandez versus Chili. ⊖

Part. usual. Semina, quae coquuntur.

Praep. Farina.

Hordeum vulgare, L. Gemeine Gerste.

N. off. *Hordeum*. *F. n.* Gramineae, Juss.

Ch. G. Flor. spicati. Cal. 1-2-florus, 6-phylloides, invo-
lucriformis: foliolis per paria digestis. Flosc.
terni, intermedio sessili, lateralibus stipitatis,
saepius sterilibus. Corol. stipitata, bivalvis, acuta
exteriore aristata.

Ch. Sp. Flosculis omnibus hermaphroditis aristatis, or-
dinibus duobus erectioribus. Sicilia. ⊖

Part. usual. Semina. (Ph. a. 1820.)

Praep. Semina mola fracta. Malthum. Cerevisiae me-
dicatae.

Secale cereale, L. Korn.

N. off. *Secale*. *F. n.* Gramineae, Juss.

Ch. G. Cal. opositus, bivalvis multiflorus, solitarius:
glumis linear-lanceolatis laevis aut utrinque
canaliculatis.

Ch. Sp. Glumarum ciliis scabris, squamis calycinis an-
gustis minoribus. Creta. ⊖

Part. usual. Semen et ejus deformitas, Secale cor-
nutum.

Praep. Farina ad enemata et cataplasmata.

Triticum sativum, L. Gemeiner Weizen.

N. off. *Triticum*. *F. n.* Gramineae, Juss.

Ch. G. Cal. 2-valvis, solitarius, multiflorus. Flos obtu-
siusculis glamis mulicis aut interrupte aristatis.

Spiculae breviusculae e latere plano rachi approximatae.

Ch. Sp. Cal. 4-floro, ventricoso, glabro imbricato aristato v. submutico. Habitat apud Basciros. ⊖

Part. usual. Semina.

Praep. Farina. Amylum.

Triticum repens, L. Agropyrum repens, Pal. Graswurzel.

N. off. Gramen. *F. n.* et *Ch. g.* ut supra.

Ch. Sp. Cal. subulatis, multinervibus, 5-floris, fosc. acuminatis, fol. planis, radice repente nodosa. 24

Part. usual. Radix. (Ph. a. 1820.)

Praep. Extr. aq. liquid. s. melago. (Ph. a. 1820.)

Classis IV. Tetrandria. Ordo I. Monogynia.

Scabiosa arvensis, L. Blaue Skabiose.

N. off. Scabiosa. *F. n.* Dipsaceae, Juss.

Ch. G. Cal. communis, polyphylus: proprius duplex superus. Receptac. paliaceum aut nudum. Flores compositi.

Ch. Sp. Corol. 4-fidis, radiantibus, foliis pinnatifidis, incisis, caule hispido. Germ. 24

Part. usual. Folia. (Ph. a. 1820.)

Praep. Spec. pro thee. (Ph. a. 1794.)

Galium Mollugo, L. Weißes Labkraut.

N. off. Mollugo. *F. n.* Rubiaceae. Juss.

Ch. G. Corol. monopetala plana. Semina duo subrotunda.

Ch. Sp. Nitidum, fol. octonis ovato-linearibus, subserratis, reflexis, mucronatis, caule flaccido, ramis patentibus. Germ. 24

Part. usual. Herba olim.

Galium verum, L. Dunkelgelbes Labkraut.

N. off. *Galium luteum*. *F. n.* et *Ch. g.* ut supra.

Ch. Sp. Foliis octonis, linearibus sulcatis, flor. paniculatis, ramis floriforis brevibus. Germ. 2^f

Part. usual. Herba olim.

Rubia tinctorum, L. Färberröthe.

N. off. *Rubia*. *F. n.* Rubiaceae, Juss.

Ch. G. Corol. 4-petala, campanulata, 4-5-fida. Baccæ 2, 1-spermae.

Ch. Sp. Foliis lanceolatis, subsenis, annuis, caule aculeato scandente. Ital. 2^f

Part. usual. Radix. (Ph. a. 1820.)

Plantago media, L. Kleiner Wegerich.

N. off. *Plantago*. *F. n.* Plantagineae, Juss.

Ch. G. Calyx 4-fidus. Corol. 4-fida: limbo reflexo.

Stamina longissima. Capsula 2-loccularis circumscissa.

Ch. Sp. Foliis ovato-lanceolatis pubescentibus, spica cylindrica, scapo tereti. Germ. 2^f

Part. usual. Herba. (Ph. a. 1794.)

Plantago lanceolata, L. Gespistter Wegerich.

N. off. *Plantago lanceolata*. *F. n.* et *Ch. g.* ut supra.

Ch. Sp. Foliis lanceolatis, spica subovata nuda, scapo angulato. Germ. 2^f

Part. usual. Herba. (Ph. a. 1794.)

Plantago Psyllium, L. Glöhsamen.

N. off. *Psyllium*. *F. n.* et *Ch. g.* ut supra.

Ch. Sp. Caule ramoso herbaceo, foliis subdentatis recurvatis, capitulis aphyllis. Germ. 2^f

Part. usual. Herba. (Ph. a. 1794.)

-
- Sanguisorba officinalis, L. Blutkäpf.
N. off. Sanguisorba. *F. n.* Rosaceae, Juss.
Ch. G. Cal. 2-phyllus inferus. Corol. supera. Germen inter calycem corolamque.
Ch. Sp. Spicis ovatis, staminibus corolae subaequalibus. Germ. 2
Part. usual. Capitula.
-

- Cornus mascula, L. Kornelkirsche, Hartrigel.
N. off. Cornus. *F. n.* Caprifoliaceae, Juss.
Ch. G. Involucrum 4- phylum saepius. Petala supra 4.
 Drupa nuce 2-loculari.
Ch. Sp. Arborea, umbellis involucrum aequantibus.
 Germ. Ital. ½
Part. usual. Fructus.
-

Classis IV. Tetrandria. Ordo IV. Tetragynia.

- Ilex aquifolium, L. Stechpalme.
N. off. Aquifolium. *F. n.* Rhamneae, Juss.
Ch. G. Cal. 4-dentatus. Corol. rotata. Stylus nullus.
 Bacca 4-sperma.
Ch. Sp. Foliis acutis spinosis, nitidis, undulatis, flor. axillaribus subumbellatis Germ. 2
Part. usual. Folia olim.
-

Classis V. Pentandria. Ordo I. Monogynia.

- Lithospermum officinale, L. Gemeiner Steinsamen.
N. off. Lithospermum. *F. n.* Boragineae, Juss.
Ch. G. Corol. infundibuliformis, fauce perforata, nuda.
 Cal 5-partita. Sem. ossea, nitida. (Genitalia inclusa.)

Ch. Sp. Semin. laevibus, corol. vix cal. superantibus,
fol. lanceolatis venosis. Germ. austr. 2

Part. usual. Radix.

Cynoglossum officinale, L. Gemeine Hundszunge.

N. off. *Cynoglossum*. *F. n.* Boragineae, Juss.

Ch. G. Corol. infundibuliformis: fauce clausa fornici-
cibus. Sem. depressa, latere interiore stylo
affixa.

Ch. Sp. Staminibus corol. brevioribus, fol. lato-lan-
ceolatis, basi attenuatis, tomentosis sessilibus,
lacinii calycinis oblongis. Germ. ♂

Part. usual. Radix. (Ph. a. 1780.)

Praep. Pilul. de cynoglossos. catarrhales. (Ph. a. 1780.)

Pulmonaria officinalis, L. Gemeine Lungentraut.

N. off. *Pulmonaria*. *F. n.* Boragineae, Juss.

Ch. G. Corol. infundibuliformis, fauce pervia. Cal.
prismatico - 5 - gonus.

Ch. Sp. Foliis radicalibus ovato-cordatis scabris. P.
foliis ovatis hirsutis. Germ. 2

Part. usual. Herba.

Symphytum officinale, L. Gemeine Schwarzwurzel.

N. off. *Consolida major*. *F. n.* Boragineae, Juss.

Ch. G. Corol. limbus tubulato-ventricosus: fauce
clausa, radiis subulatis.

Ch. Sp. Foliis ovato-lanceolatis decurrentibus. Europ.
austr. 2

Part. usual. Radix. (Ph. a. 1794.) Olim herba et flores.

Borago officinalis, L. Gemeiner Boretsch.

N. off. *Borago*. *F. n.* Boragineae, Juss.

Ch. G. Corol. rotata: fauce radiis clausa.

Ch. Sp. Fol. alternis, calyc. patentibus. Apud nos in hortis. ⊖

Part. usual. Herba et flores.

Echium vulgare, L. Mutterkopf.

N. off. Echium. *F. n.* Boragineae, Juss.

Ch. G. Corol. ut plurimum irregularis, fauce nuda ampla.

Ch. Sp. Caule tuberculato-hispido, fol. caulinis lanceolatis hispidis, floribus spicatis lateralibus.
Germ. ♂

Part. usual. Herba olim.

Cyclamen europaeum. Europäische Erd scheibe.

N. off. Cyclamen. *F. n.* Lysimachiae, Juss.

Ch. G. Corol. rotata, reflexa, tubo brevissimo: fauce prominente. Bacca tecta capsula.

Ch. Sp. Fol. orbiculatis cordatis crenatis. Silesia, Bohem. Austr. Barbaria. 2

Part. usual. Radix.

Menianthes trifoliata, L. Fieberklee

N. off. Trifolium fibrinum. *F. n.* Lysimachiae, Juss.

Ch. G. Cor. hirsuta. Stigma 2-fidum. Capsl. 1-locularis.

Ch. Sp. Corol. superne dense barbatis, fol. ternatis, Europ. 2

Part. usual. Folia. (Ph. a. 1820.)

Praep. Extract. aquos. (Ph. a. 1820.) Tinctura visceralis. (Ph. a. 1794.) Conserva. (Ph. a. 1780.)

Anagallis arvensis, L. Gemeines Gauchheil, Hühnerdarm.

N. off. Anagallis. *F. n.* Lysimachiae, Juss.

Ch. G. Corol. rotata. Filamenta hirsuta. Caps. circumissa.

Ch. Sp. Caule diffuso nudo, petalis integris planis marginē pilis capitatis. Europ. ☺

Part. usual. Herba. (Ph. a. 1794.)

Praep. Extractum.

Plumbago europaea, L. Europäische Bleiwurz.

N. off. Dentaria. *F. n.* Plumbagineae, R.

Ch. G. Cal. oblongus glanduloso-scaber. Corol. infundibuliformis. Stam. squamis basin cor. claudentibus inserta. Stigma 5-fidum. Sem. 1, oblongum, tunicatum.

Ch. Sp. Foliis amplexicaulibus lanceolatis scabris (rigidis), caule stricto. Europ. austr. ♀

Part. usual. Folia et radix.

Praep. Extractum.

Convolvulus arvensis, L. Ackerwinde.

N. off. Convolvulus. *F. n.* Convolvuli, Juss.

Ch. G. Corol. campanulata, plicata. Stigm. 2, simplicia. Caps. 2-5-locularis, loculis dispermis.

Ch. Sp. Fol. sagittatis utrinque acutis, pedunc. subunifloris. Germ. ♀

Part. usual. Herba.

Verbascum Thapsus, L. Wollkraut, Königskerze.

N. off. Verbascum. *F. n.* Solaneae, Juss.

Ch. G. Corol. rotata, subinaequalis. Filam. barbata. Caps. 2-locularis, 2-valvis: valvul. inflexis, polysperma.

Ch. Sp. Fol. decurrentibus utrinque tomentosis, caule spicato simplici. In locis siccis ac montosis. ♀

Part. usual. Folia et flores. (Ph. a. 1820.)

Praep. Species emollientes. (Ph. a. 1820.) Spec. pectorales. (Ph. a. 1794.) Oleum. Unguentum. (Ph. a. 1780.)

Datura Stramonium, L. Gemeiner Stechapfel.

N. off. Stramonium. *F. n.* Solaneae, Juss.

Ch. G. Corol. infundibuliformis, plicata. Cal. tubulosus, angulatus, deciduus: basi orbiculata persistente.

Ch. Sp. Pericarp. spinosis erectis ovatis, fol. ovatis sinuatis glabris basi in petiolum attenuatis, Europa in ruderatis. ⊖

Part. usual. Herba. (Ph. a. 1794.) Semina.

Praep. Extr. foliorum (succus inspissatus.) (Ph. a. 1794.)

Tinct. semin. (Ph. bor. 1830.) Extr. ex seminibus paratum. Daturium.

Hyoscyamus niger, L. Schwarzes Bilsenkraut.

N. off. Hyoscyamus. *F. n.* Solaneae, Juss.

Ch. G. Corol. infundibuliformis, obtusa irregularis. Stam. inclinata. Caps. operculata, 2- locularis.

Ch. Sp. Fol. amplexicaulibus sinuatis, flor. venosis sessilibus. Europ. in ruderatis. ♂

Part. usual. Herba et semina. (Ph. a. 1820.)

Praep. Extr. succi foliorum. Ol. pressum semin. (Ph. a. 1820.) Ol. herbae coctum. Emplast. de hyosciamo. (Ph. a. 1794.) Tinct. hyosc. (Ph. bor. 1830.)

Nicotiana tabacum, L. Gemeiner Tabak.

N. off. Nicotiana. *F. n.* Solaneae, Juss.

Ch. G. Corol. infundibuliformis, limbo plicato. Stam. inclinata. Caps. 2- valvis, 2- locularis.

Ch. Sp. Fol. lanceolato - ovatis sessilibus decurrentibus, flor. acutis. In Europ. culta. ⊖

Part. usual. Folia. (Ph. a. 1820.)

Praep. Extr. Tinctura. Decoct. Fowleri.

Atropa Belladonna, L. Gemeines Tollkraut. Wolfssirsche.

N. off. Belladonna. *F. n.* Solaneae, Juss.

Ch. G. Cor. campanulata. Stam. distantia. Bacca globosa, 2-locularis, calyci insidens.

Ch. Sp. Caule herbaceo brachiato, fol. ovatis integris, corol. parum ringens, fusca. Bacca nigra venenata. Germ. Ital. Austr. Angl. 2

Part. usual. Herba et radix. (Ph. a. 1820.)

Praep. Extr. herbae ex succo. (Ph. a. 1820.)

Physalis Alkekengi, L. Gemeine Schlute. Judenkirsche.

N. off. *Solanum vesicarium*. *F. n.* Solaneae, Juss.

Ch. G. Corol. campanulato-rotata. Stam. conniventia. Bacca integra calycem inflatum, 2-locularis.

Ch. Sp. Fol. geminis integris acutis, caule herbaceo inferne subramoso. Ital. Germ. 2

Part. usual. Baccæ.

Solanum Dulcamara, L. Bittersüß. Kletternder Nachtschatten.

N. off. Dulcamara. *F. n.* Solaneae, Juss.

Ch. G. Cal. persistens. Cor. rotata, aut campanulata 5-loba, plicata. Antherae subcoalitae, apice perogemino dechiscentes. Bacca 2-locularis, polysperma.

Ch. Sp. Caule inerme fruticoso scandente, fol. cordatis glabris, superiorib. auriculatis, corymbis oppositifol. Germ. 2

Part. usual. Caules vulgo stipites. (Ph. a. 1820.)

Praep. Extr. aquosum. (Ph. a. 1820.)

Solanum nigrum, L. Gemeiner, schwarzer Nachtschatten.

N. off. *Solanum vulgare*. *F. n.* et *Ch. g.* ut supra.

Ch. Sp. Caule inerme herbaceo, fol. ovatis dentato-angulatis, racemis distichis instantib. Germ. ⊖

Part. usual. Olim herba.

Capsicum annum, L. Jährige Weißbeere, türkischer Pfeffer.

N. off. *Piper Hyspanicum s. Caps. annum.*

F. n. *Solaneae*, Juss.

Ch. G. Corol. rotata. Bacca ex ucca.

Ch. Sp. Cal. herbaceo-peduncul. solitariis. In hortis nostris culta. ⊖

Part. usual. Fructus.

Praep. Tinctura. (Ph. bor. 1830.)

Rhamnus catharticus, L. Gemeiner Wegdorn.

N. off. *Spina cervina*. *F. n.* *Rhamneae*, Juss.

Ch. G. Cal. campanulatus, 4-5-fidus. Corol. squamae stamina munitentes, cal. insertae. Stigma 1-2-4-fidum. Bacca 3-4-sperma. (Flor. passim polygami, et dioici.)

Ch. Sp. Spinis terminalibus, flor. quatrifidis dioicis, fol. ovatis serratis. In sylvis nostris. ♂

Part. usual. Baccae. (Ph. a. 1820.)

Praep. Roob. (Ph. a. 1820. Syrupus. (Ph. a. 1794.)

Rhamnus Frangula, L. Faulbaum.

N. off. *Frangula*. *F. n.* et *Ch. g.* ut supra.

Ch. Sp. Inermis, flor. monogynis hermaphroditis, fol. integerrimis. ♂

Part. usual. Cortex interior.

Rhamnus Zigyphus, L. Gemeiner Zudendorn.

N. off. *Jujubae*. *F. n.* et *Ch. g.* ut supra.

Ch. Sp. Acul. geminis: altero recurvo, fol. ovatis retusis dentatis glabris. Europ. austr. ♂

Part. usual. Baccae. (Ph. a. 1780.)

Ribes rubrum, L. Johannisbeeren.

N. off. *Ribesium rubrum*. *F. n.* *Cacti*, Juss. gen. Grossulariae.

Ch. G. Petala 5 et Stamina calici inserta. Stylus 2-fidus. Bacca polysperma, infera.

Ch. Sp. Inerme, racemis glabris nutantibus, flor. planis, fol. obtuse quinquelobis, caule erecto. Suecia, Anglia et Germ. ♂

Part. usual. Baccae maturae recentes. (Ph. a. 1820.)

Praep. Syrupus ribium. (Ph. a. 1820.)

Ribes nigrum, L. Schwarze Johannisbeere.

N. off. Ribesum nigrum. *F. n.* et *Ch. g.* ut supra.

Ch. Sp. Inerme, racem. pendulis. corol. planiusculis, fol. quinquelobis. Mongolia. ♂

Part. usual. Baccae.

Praep. Syrupus olim.

Hedera helix, L. Efeu. Eppich.

N. off. Hedera arborea. *F. n.* Gerania, Juss.

Ch. G. Petala 5 - oblonga. Bacca 5 - sperma, calyce cincta.

Ch. Sp. Fol. tri-quinquelobis: floralib. ovatis, umbella erecta. Europ. ♂

Part. usual. Folia.

Vitis vinifera, L. Gemeiner Weinstock.

N. off. Vitis. *F. n.* Viniferae, Juss.

Ch. G. Petala apice calyptatim cohaerentia, emarcida. Bacca 5 - sperma, supera.

Ch. Sp. Fol. lobatis sinuatis nudis aut tomentosis. Ubi cunque colitur. ♂

Part. usual. Baccae. (Ph. a. 1812.)

Praep. Vinum. Acetum. Unguent. de uvis s. ad labia. (Ph. a. 1794.) Syrup. uvarum. (Ph. a. 1812.)

Viola odorata, L. Wohlriechendes Veilchen.

N. off. Viola. *F. n.* Cisti, Juss. gen.

Ch. G. Cal. 5 - phyllus. Corol. 5 - petala, irregularis, postice cornuta (aut ecalcerata). Anth. apice

membranula cohaerentes, aut distinctae. Caps.
superior, 3-valvis, 1-locularis.

Ch. Sp. Acaul. fol. cordatis, stolon. reptantib. Europ. 2f
Part. usual. Corollae recentes (Ph. a. 1820.) Flores siccae.
Praep. Syrupus. (Ph. a. 1820.) Species.

Viola tricolor, L. Stiefmütterchen. Dreyfaltigkeitsblume.

N. off. Jacea. *F. n.* et *Ch. G.* ut supra.

Ch. Sp. Caule angulato glabro diffuso, fol. oblongis
incisis, stipulis pinnatifidis. Europ. 2f

Part. usual. Herba. (Ph. a. 1820.)

Vinca minor, L. Sinngrün, Sommergrün, Wintergrün.

N. off. Vinca pervinca. *F. n.* Aponiceae, Juss.

Ch. G. Contorta. Corol. hypocrateriformis, fauce
5-gona. Foliculi 2, erecti, teretes angusti. Sem.
oblonga, nuda.

Ch. Sp. Caul. procumbentibus, fol. oblongo-lanceo-
latis, margine glabris. In sylvis Eur. 2f

Part. usual. Herba.

Cynanche Vincetoxicum, L. Gemeine Schwalbenwurzel.

N. off. Vincetoxicum. *F. n.* Apocynae, Juss.

Ch. G. Contorta. Corol. rotata. Nect. cylindricum
5-dentatum, corol. faucem ambiens, simplex.
Folliculi 2.

Ch. Sp. Caule erecto, fol. ovatis acuminatis margine
tenuissime ciliatis. Europ. 2f

Part. usual. Herba.

Erithrea Centaurium, Rich. *Gentiana Centaurium*, L.

Taufendguldenkraut.

N. off. Centaurium minus. *F. n.* Gentianae, Juss.

Ch. G. Cal. oppressus, subpentagonus, 5-dentatus.
Cor. infundibuliformis: tubo longo. Antherae,

post anthesin, spiraliter tortae. Stigmata 2 approximata; rarius simplex. Caps. sublinearis, 1-locularis, Recept. 2. extantia.

Ch. Sp. Foliis oblongo-ovalibus basi rosaceis, congestis, caule elongato, flor. fasciculato-paniculatis, basi squamis 1-2 cinctis. Germ. ☽

Part. usual. Herba florida. (Ph. a. 1820.)

Praep. Extr. aquosum. (Ph. a. 1820.) Tinctura.

Classis V. Pentandria. Ordo II. Digynia.

Gentiana lutea, L. Gelber oder edler Enzian.

N. off. Gentiana. *F. n.* Gentianae, Juss.

Ch. G. Corol. 1-petala. Caps. 2-valvis, 1-locularis. Receptac. 2, longitudinalibus.

Ch. Sp. Fol. latis ovatis nervosis, corol. subquinquefidis rotatis verticillatis, cal. spathaceis. In Alpibus. 24

Part. usual. Radix. (Ph. a. 1820.)

Praep. Extract. aquos. Tinctura amara, s. stomachica. (Ph. a. 1820.) Electuarium s. Theriaca diateseron. Tinctura absinthii composita. (Ph. a. 1794.) Tinctura simplex.

Gentiana pannonica, L. Ungarischer Enzian.

N. off. Gentiana. *F. n.* et *Ch. g.* ut supra.

Ch. Sp. Cor. subsexifidis campanulatis striato-punctatis verticillatis, cal. coriaceis truncatis. In alpibus. 24

Part. usual. Radix.

Praep. Extractum.

Ulmus campestris, L. Gemeiner Rüster.

N. off. Ulmus. *F. n.* Amentaceae, Juss.

Ch. G. Cal. campanul. 5-fidus. Cor. nulla. Caps. compressa, membranaceo-alata (Stam. 4 et 8. Flor. conglomerati).

Ch. Sp. Foliis duplicato-serratis basi inaequalibus,
flor. subsessilibus conglomeratis pentandris,
fruct. glabris. Germ. arbor. ♂

Part. usual. Cortex. (Ph. a. 1820.)

Chenopodium Bonus, Henricus, L. Feldspinat. Guter
Heinrich.

N. off. Bonus Henricus. *F. n.* Chenopodeae, Juss.

Ch. G. Cal. 5-phyllus, 5-gonus. Cor. nulla. Sem. 1,
lenticulare, superum.

Ch. Sp. Fol. triangulari-sagittatis integerrimis, spicis
compositis aphyllis axillaribus. Europ. ♀

Part. usual. Herba olim.

Chenopodium Botrys, L. Eichenblättriger Gänsefuß.

N. off. Botrys. *F. n.* et *Ch. g.* ut supra.

Ch. Sp. Fol. oblongis sinuatis, racemis nudis multi-
fidis. Europ. austr. ⊖

Part. usual. Herba. (Ph. a. 1780.)

Chenopodium ambrosioides, L. Wohlriechender Gänsefuß.

N. off. Botrys mexicana. *F. n.* et *Ch. g.* ut supra, Juss.

Ch. Sp. Fol. lanceolatis dentatis, racemis foliatis sim-
plicibus. Apud nos in hortis culta. ⊖

Part. usual. Herba. (Ph. a. 1820.)

Chenopodium Vulvaria, L. Stinkende Melde.

N. off. Vulvaria. *F. n.* et *Ch. g.* ut supra.

Ch. Sp. Fol. integerrimis rhomboe-ovatis, flor. con-
glomeratis axillaribus, cal. diffuso. Europ. ⊖

Part. usual. Herba.

Beta vulgaris, L. Rothe Rübe.

N. off. Beta rubra. F. n. Atriplices, Juss.

Ch. G. Cal. 5-phyllus. Cor. nulla. Sem. reniforme,
intra substantiam baseos calycis.

Ch. Sp. Flor. congestis, fol. inferioribus ovatis. Europ.
austr. ♂

Part. usual. Herba.

Beta cicla, L. Runkelrübe.

N. off. Beta alba. F. n. et Ch. g. ut supra.

Ch. Sp. Flor. ternis radicalibus petiolatis, caulinis
sessilibus, spicis lateralibus longissimis. Lusita-
nia ad Tagum. ♂

Part. usual. Radix.

Salsola Kali, L. Kalifraut.

N. off. Salsola Kali. F. n. Atriplices, Juss.

Ch. G. Cal. 5-phyllus, basi capsularis. Cor. nulla.
Styli 2—3. Caps 1-sperma. Sem. coeleatum.

Ch. Sp. Herbacea decumbens, fol. subulatis spinosis,
cal. marginatis axillaribus. In littoralibus ma-
ris. ⊖

Part. usual. Herba.

Salsola Soda, L. Sodafraut.

N. off. Salsola Soda. F. n. et Ch. g. ut supra.

Ch. Sp. Herbacea patula, fol. inermibus. Europ. austr. ⊖

Part. usual. Herba.

Eryngium campestre, L. Mannstreu, Bractdistel.

N. off. Eryngium. F. n. Umbelliferae, Juss.

Ch. G. Flor. capitati. Involucr. polyphyllum. Cal. pro-
prius, 5-phyllus, superus. Cor. 5-petala. Re-
cept. paleacum. Fruct. coronatus, 2-partibilis.

Ch. Sp. Fol. radicalibus petiolatis ternatis: caulin, inferioribus, pinnato-lanceolatis, ~~caul.~~ superne ramosissimo. Europ. 2

Part. usual. Radix olim.

Sanicula europaea, L. Saunikel, Schernäfel.

N. off. Sanicula europaea. *F. n.* Umbelliferae, Juss.

Ch. G. Umbellae confertae, subcapitatae. Fructus aculeatus. Flor. disci abortientes.

Ch. Sp. Fol. radicalib. simplicibus, flosculis omnibus sessilibus. Europ. in sylvis. 2

Part. usual. Fol. olim.

Bupleurum rotundifolium, L. Durchnäufß.

N. off. Perfoliata. *F. n.* Umbelliferae, Juss.

Ch. C. Involucra umbellulae majora, 5-phylla. Petala involuta. Fructus subrotundus, compressus, striatus. (Fol. integerrima.)

Ch. Sp. Involucris universalibus nullis, fol. perfoliatis. Germ. ⊖

Part. usual. Herba et semen olim.

Ammi majus, L. Großer oder gemeiner Kummey.

N. off. Amomum vulgare, *F. n.* Umbelliferae, Juss.

Ch. G. Umbella laxa. Involucra pinnatifida. Cor. radiatae: omnes hermaphroditae. Fructus laevis concava.

Ch. Sp. Fol. inferioribus pinnatis lanceolatis serratis, superioribus multifidis, linearibus. Europa austr. ⊖

Part. usual. Semina olim.

Conium maculatum, L. Gesleckter Schierling, Erdschierling.

N. off. Cicuta vulgaris. *F. n.* Umbelliferae, Juss.

Ch. Sp. Involucella dimidiata, subtriphylla. Fructus subglobosus, 5-striatus, utrinque crenatus.

Ch. Sp. Caule ramosissimo, maculato, seminibus striatis. Germ. ♂

Part. usual. Herba sicca et recens. (Ph. a. 1820.)

Praep. Extract. ex succo. Emplast. (Ph. a. 1820.)
Conserua. Emplast. diabotanon. (Ph. a. 1794.)

Daucus Carota, L. Gemeine Mohrrübe, Gelbe Rübe.

N. off. *Daucus. F. n.* Umbelliferae, Juss.

Ch. G. Cor. subradiatae. Flosculi disci abortivi. Fructus pilis hispidus. (Umbella fructus contractus, infundibuliformis.)

Ch. Sp. Seminibus, petioli subtus nervosis, folior. lacinias augusto - linearibus acutis. In Europ. culta. ♂

Part. usual. Radix. (Ph. a. 1820.)

Praep. Roob ex radice. (Ph. a. 1820.) Surrogatum pro coffea.

Peucedanum officinale, L. Haarstrang.

N. off. *Peucedanum. F. n.* Umbelliferae, Juss.

Ch. G. Fructus ovatus, utrinque striatus, ala cinctus. Involucra brevissima. (Caul. altus. Fol. multifido-linearia.)

Ch. Sp. Fol. quinques tripartitis filiformibus linearibus. Europ. austr. ♂

Part. usual. Radix olim.

Laserpitium latifolium, L. Weißer Enzian.

N. off. *Gentiana alba. F. n.* Umbelliferae, Juss.

Ch. G. Fructus oblongus: angulis membranaceis. Petala inflexa, emarginata, patentia.

Ch. Sp. Fol. oblique cordatis dentatis, dentibus mucronatis, seminum alis crispis. Europ. 4

Part. usual. Radix olim.

Laserpitium Siler, L. *Seselfraut*.

N. off. *Siler montanum*. *F. n.* et *Ch. g.* ut supra.

Ch. Sp. *Foliolis ovali-lanceolatis, integerrimis petiolatis*.

Aust. Helvet. et Gallia. 2

Part. usual. *Semen olim.*

Tordilium officinale, L. *Kretischer Bergkummel*.

N. off. *Seseli creticum*. *F. n.* *Umbelliferae*, Juss.

Ch. G. *Cor. radiatae, omnes hermaphroditae. Fructus suborbiculatus, margine callosus, crenatus aut laevis planus. Involucra indivisa.*

Ch. Sp. *Involucris partialibus longitudine florum, foliolis ovatis laciniatis. Anglia, Narbona, Ital. Sicil.* ⊖

Part. usual. *Semen olim.*

Heracleum Sphondylium, L. *Bartsch.*

N. off. *Heracleum Sphondylium*. *F. n.* *Umbelliferae*, Juss.

Ch. G. *Fructus ellipticus, emarginatus, compressus, striatus. Cor. difformis, inflexo-emarginata. Involucrum caducum.*

Ch. Sp. *Fol. pinnatis, foliolis quinis oblongis pinna-tifidis acutis dentatis, cor. subuniformibus. In pratis.* ♂

Part. usual. *Herba olim.*

Ligusticum Levisticum, L. *Gewöhnliches Liebstöckel*.

N. off. *Levisticum*. *F. n.* *Umbelliferae*, Juss.

Ch. G. *Fructus oblongus, 5-sulcatus utrinque. Cor. aequales. Petala involuta integra. Cal. 5-dentatus.*

Ch. Sp. *Fol. magnis multiplicibus: foliolis superne incisis. In alpibus Apenninis.* 2

Part. usual. *Radix.* (Ph. a. 1820.)

Praep. *Acetum aromaticum s. antisepticum.* (Ph. a. 1820.)

Angelica Archangelica, L. Gemeine Engelwurz.

N. off. Angelica. *F. n. Umbelliferae*, Juss.

Ch. G. Fructus subrotundus, solidus, utrinque 3-alat.
stylis reflexis. Cor. aequales: petalis incurvis.

Ch. Sp. Foliorum impari lobato. Europ. septentrionalis. ♂
Part. usual. Radix. (Ph. a. 1820.)

Praep. Extractum alcoholico-aquosum. Tinctura. Ace-
tum aromaticum s., antisepticum. Spiritus aro-
maticus. (Ph. a. 1820.) Spirit. Carmelitarum s.,
spiritus melissae compos. Tinctura balsamica.
(Ph. a. 1794.) Spirit. angelicae compositus. (Ph.
bor. 1830.)

Phellandrium aquaticum, L. Wasserfenchel.

N. off. Phellandrium. *F. n. Umbelliferae*, Juss.

Ch. G. Flosculi disci minores. Fructus ovatus, laevis;
coronatus perianthio et pistillo.

Ch. Sp. Caulis foliorumque ramificationibus divaricatis.
Germ. in pallidibus. ♀

Part usual. Semina. (Ph. a. 1820.)

Cicuta virosa, L. Wasserschierling.

N. off. Cicuta virosa s. aquatica. *F. n. Umbelliferae*, Juss.

Ch. G. Fructus subovatus, sulcatus. Involucra nulla:
partiale 3-5-phylum.

Ch. Sp. Umbellis oppositifoliis, petiolis marginatis ob-
tusis. Ad aquas stagnantes. ♀

Part. usual. Herba.

Coriandrum sativum, L. Gemeiner Kerriander.

N. off. Coriandrum. *F. n. Umbelliferae*, Juss.

Ch. G. Cor. radiata: Pet. inflexo-emarginata. Involucr.
univers. 1-phylum. Partialia dimidiata. Fructus sphaericus.

Ch. Sp. Fructibus globosis. Europ. meridionalis. ⊙

Part. usual. Semina. (Ph. a. 1820.)

Praep. Aq. carminativa. Spirit. aromaticus. (Ph. a. 1820.)

Scandix Cerefolium, L. Gartenkerbel.

N. off. Cerefolium. *F. n.* Umbelliferae, Juss.

Ch. G. Involucr. reflexum, concavum. Pet. inflexo-cor-data. Fructus oblongus, laevis, aut striatus, glaberrimus.

Ch. Sp. Seminibus laevibus, umbell. lateralib. subsessilibus, involuci universali foliiformi. Europ. meridionalis. ⊖

Part. usual. Herba recens. (Ph. a. 1780.)

Praep. Aqua destillata (Ph. a. 1820.)

Imperatoria Ostruthium, L. Gemeine Meisterwurz.

N. off. Imperatoria. *F. n.* Umbelliferae, Juss.

Ch. G. Fructus subrotundus, compressus: medio gibbus, margine alato anctus. Petala inflexo-emarginata.

Ch. Sp. Caule terreti, glabro, fol. glabris. Europ. meridionalis. 24

Part usual. Radix. (Ph. a. 1820.)

Praep. Spiritus balsamicus. (Ph. a. 1794.)

Pastinaca sativa, L. Weiße Möhre, Hammelmöhre.

N. off. Pastinaca. *F. n.* Umbelliferae, Juss.

Ch. G. Fructus ellipticus, compresso-planus. Petala involuta, integra.

Ch. Sp. Fol. simpliciter pinnatis. In pratis. ♂

Part. usual. Semina. (Ph. a. 1780.)

Pastinaca Opopanax, L. Gummibringender Pastinat.

N. off. Opopanax. *F. n.* et *Ch. g.* ut supra.

Ch. Sp. Fol. pinnatis: foliolis basi antica excisis. Italia, Sicilia, Gallia. ♂

Part. usual. Gummiresina. (Ph. a. 1780.)

Anethum graveolens, L. Gemeiner Dill.

N. off. Anethum. *F. n.* Umbelliferae, Juss.

Ch. G. Fructus subovatus, compressus, striatus. Petala involuta, integra.

Ch. Sp. Annuum, fructibus compressis. Europ. meridionalis. ☽

Part. usual. Semina. (Ph. a. 1794.)

Praep. Oleum destillatum. (Ph. a. 1794.)

Anethum Foenicum, L. Gemeiner Fenchel.

N. off. Foenicum. *F. n.* et *Ch. g.* ut supra.

Ch. Sp. Perenne, fruct. ovatis. Gall. Hispan. Helvetia, Ital. in Germ. culta. ♂

Part. usual. Semina. (Ph. a. 1820.) Radix. (Ph. a. 1794.)

Praep. Aqua destillata. Oleum destillatum. Aqua carminativa, Syrupus. (Ph. a. 1820.) Aqua aromatica, spirituosa. Electuarium pectorale. Spirit. balsam. Syrupus ononidis. (Ph. a. 1794.)

Carum Carvi, L. Rümmel.

N. off. Carvi. *F. n.* Umbelliferae, Juss.

Ch. G. Fructus ovato-oblongus, striatus. Involucrum sub 1-phylum. Petala carinata, inflexo-emarginata.

Ch. Sp. Caule ramoso, vaginis foliorum ventricosis, involucro partiali nullo. In pratis. ♀

Part. usual. Semina. (Ph. a. 1820.)

Praep. Aqua. Oleum destillatum. Spiritus. Aqua carminativa. (Ph. a. 1820.)

Pimpinella Saxifraga, L. Gemeine Bibernelle.

N. off. Pimpinella alba. *F. n.* Umbelliferae, Juss.

Ch. G. Fructus ovato-oblongus. Petala inflexa. Stigm. subglobosa. Umbellulae subglobosae, primo nutantes.

Ch. Sp. Caule striato glabro, fol. pinnatis glabris, radicalibus foliolis subrotundis argute dentatis, caulinis bipinnatis linearibus. Europ. 24

Part. usual. Radix. (Ph. a. 1820.)

Praep. Tinctura. (Ph. a. 1820.) Extractum. (Ph. bor. 1830.)

Pimpinella magna, L. Großer Bibernell.

N. off. Pimp. nigra. *F. n.* et *Ch. g.* ut supra.

Ch. Sp. Fol. uniformibus pinnatis, foliolis omnibus lobatis, impari trilobo. Europ. 24

Part. usual. Radix olim.

Pimpinella Anisum, L. Anieß.

N. off. Anisum. *F. n.* et *Ch. g.* ut supra.

Ch. Sp. Fol. radicalibus trifidis incisis. Involucr. 1-phyl-lum. Fruct. pubesc. In Germ. colitur. ☽

Part. usual. Semina. (Ph. a. 1820.)

Praep. Aq. destill. Oleum destill. (Ph. a. 1820.) Spirit. salis ammon. anisatus. Spiritus balsamicus. Ele-ctuar. pectorale. (Ph. a. 1794.)

Apium Petroselinum, L. Petersilie.

N. off. Petroselinum. *F. n.* Umbelliferae, Juss.

Ch. G. Fructus ovatus, striatus. Involucr. 1-phyllum. Petala aequalia.

Ch. Sp. Foliolis caulinis linearibus, involucellis minu-tis. Sardinia. ♂

Part. usual. Radix et semina. (Ph. a. 1780.)

Praep. Aqua destillata.

Apium graveolens, L. Wasser Eppich. Sellerie.

N. off. Apium. *F. n.* et *Ch. g.* ut supra.

Ch. Sp. Caul. sulcato, fol. caulinis cuneiformibus. In hortis culta. ♂

Part. usual. Radix et semina. (Ph. a. 1780.)

Classis V. Pentandria. Ordo III. Trigynia.

Rhus Coriaria, L. Gärberbaum.

N. off. Rhus Coriaria, *F. n.* Terebinthaceae, Juss.

Ch. G. Cal. 5-partitus, Petala 5, Bacca 1-sperma.

Ch. Sp. Fol. pinnatis, foliolis ellipticis obtuse dentatis,
subtus villosis. Europ. aust. ♂

Part. usual. Semina olim.

Rhus Cotinus, L. Perückenbaum, Perückensumach.

N. off. Cotinus. *F. n.* et *Ch. g.* ut supra.

Ch. Sp. Fol. simplicibus obovatis, racemis plumosis,
fol. ovatis. Helvetia, Austr. Hungar. ♂

Part. usual. Cortex. (Ph. a. 1820.)

Sambucus ebulus, L. Utig.

N. off. Ebulus. *F. n.* Caprifoliaceae, Juss.

Ch. G. Cal. 5-partitus. Cor. 5-fida. Bacca 3-sperma.

Ch. Sp. Cymis tripartitis, stipulis foliaceis ovatis, cau-
le herbaceo. Europ. austr. ♂

Part. usual. Baccæ. (Ph. a. 1820.)

Praep. Roob. (Ph. a. 1820.) Electuar. purgans. (Ph. a.
1794.)

Sambucus nigra, L. Hollunder.

N. off. Sambucus. *F. n.* et *Ch. g.* ut supra.

Ch. Sp. Cymis 5-partitis, stipulis 2 utrinque se-
taceis, fol. pinnatis, foliolis ovatis serratis, caule
arboreo. Tota fere Europ. ♂

Part. usual. Flores et baccæ. (Ph. a 1820.) Cortex inte-
rior. (Ph. a. 1794.)

Praep. Aq. florum. Roob. Syrupus. Electuar. leniti-
vum. (Ph. a. 1820.) Acetum. Electuar. purgans.
(Ph. a. 1794.)

- Tamarix gallica, L. Tamarisken.
N. off. Tamarix gallica. *F. n.* Portulaceae, Juss.
Ch. G. Cal. 5 - partitus. Petala 5. Caps. 1-locularis;
 3-valvis. Sem. coma instructa.
Ch. Sp. Flor. pentandris, spicis lateralibus; fol. lanceo-
 latis, amplexicaulibus, imbricatis. Gallia. Hispania. Ital. Russia. 5

Part. usual. Cortex.

- Alsine media, L. Hühnerdarm, Vogelfraut.
N. off. Alsine media. *F. n.* Caryophylleae, Juss.
Ch. G. Cal. 5-phillus. Petala 5, aequalia. Caps. super-
 ra, 1-locularis, 3-valvis, polysperma. Recept. centrale liberum.
Ch. Sp. Caule latere alterno piloso, petalis bipartitis, fol.
 ovatocordatis. Germ. ④

Part. usual. Herba olim.

Classis V. Pentandria. Ordo IV. Tetragynia.

- Parnassia pallustris, L. Weiß Leberkraut, Parnasse.
N. off. Parnassia. *F. n.* Capparides, Juss.
Ch. G. Cal. 5-partitus. Petala 5. Nectaria 5. cordata, ci-
 liata apicibus globosis. Caps. 4-valvis, 2-locu-
 laris. Recept. parietalia. Sem. membranaceo-
 marginata.
Ch. Sp. Foliis radicalibus cordatis, nectariis multise-
 tis. Europ. 4

Part. usual. Flores olim.

Classis V. Pentandria. Ordo V. Pentagynia.

- Linum usitatissimum, L. Gemeiner Flachs.
N. off. Linum. *F. n.* Cariophylleae, Juss.
Ch. G. Cal. 5-phillus. Petala 5. Caps. 5-valvis. 10-lo-
 cularis. Sem. solitaria. (Filamenta basi coalita.)

3 *

Ch. Sp. Calic. capsulisque mucronatis, petalis crenatis, fol. lanceolatis, alternis, caule subsolitario.

In cultis. ⊖

Part. usual. Semina. (Ph. a. 1820.)

Praep. Oleum pressum. Species emollientes. (Ph. a. 1820.) Emplastrum de mucilaginibus. (Ph. a. 1794.)

Linum catharticum, L. Purgierflächs.

N. off. Linum catharticum. *F. n.* et *Ch. g.* ut supra.

Ch. Sp. Fol. oppositis ovato-lanceolatis, caule superne dichotomo, cor. acutis. Europ. ⊖

Part. usual. Herba olim.

Drosera rotundifolia, L. Sonnenthau.

N. off. Rosella. *F. n.* Capparides, Juss.

Ch. G. Cal. 5-fidus. Petala 5. Caps. 1-locularis: apice 3-5-valvis. Sem. plurima. (Styli etiam 6. Fol. pilis glandulosis obsita.)

Ch. Sp. Scapis radicatis, fol. orbiculatis. Europ. ⊖

Part. usual. Herba olim.

Classis VI. Hexandria. Ordo I. Monogynia.

Allium Victorialis, L. Ranger Ulmanshirsch.

N. off. Allium Victorialis. *F. n.* Asphodelae, Juss.

Ch. G. Cor. 6-partita, patens. Spatha multiflora. Umbella congesta. Caps. supera. (Flor. capitati aut umbellati.)

Ch. Sp. Caule planifolio, umbellifero, umb. rotunda-
ta, staminibus subulatis, fol. radical. subhir-
sutis, caulinis glabris, floribus umbellatis. In
alpibus. 24

Part. usual. Radix olim.

Allium sativum, L. Knoblauch.

N. off. Allium. *F. n.* et *Ch. g.* ut supra.

Ch. Sp. Caule planifolio bulbifero, bulbo composito, staminibus tricuspidatis. In Sicilia et Helvetia sponte crescit, apud nos in hortis. 24

Part. usual. Radix s. bulbus recens. (Ph. a. 1820.)

Praep. Acetum aromaticum s. antisepticum. (Ph. a. 1820.)

Allium Cepa, L. Zwiebel.

N. off. Cepa. *F. n.* et *Ch. g.* ut supra.

Ch. Sp. Scapo nudo inferne ventricoso longiore fol. teretibus. In hortis nostris.

Part. usual. Radix s. bulbus. ♂

Lilium candidum, L. Weiße Lilie.

N. off. Lilium. *F. n.* Liliaceae, Juss.

Ch. G. Cor. 6-petala, campanulata: linea longitudinali nectarifera, laciniis saepius reflexis. Caps. valvulis pilo cancelato connexis.

Ch. Sp. Fol. lanceolatis sparsis basi attenuatis, cor. campanulatis intus glabris. Helvetia. 24

Part. usual. Radix et flores olim.

Scilla maritima, L. Gemeine Meerzwiebel.

N. off. Scilla s. Squilla. *F. n.* Asphodelae, Juss.

Ch. G. Cor. 6-petala, patens, decidua. Filam. filiformia, petalorum basi adnexa.

Ch. Sp. Nudiflora, bracteis refractis. Bulbus crassus, fere cap. humani. Fol. lanceolata, stricta. Scapus ante folia, longissimus, multiflorus. Flor. albi. Sicilia. Hispania. 24

Part. usual. Radix s. bullus. (Ph. a. 1820.)

Praep. Acetum. Extractum. Oxymel. (Ph. a. 1820.)
Electuarium contra vermes. Oxsaccharum.

(Ph. a. 1794.) Tinctura scillae Halina. (Ph. bor. 1830.) Tinct. simplex. Scillitimum.

Asphodilus ramosus, L. ~~Asphodil.~~

N. off. Asphodilus *F. n.* Asphodeli, Juss.

Ch. G. Cor. 6-partita, patens, Nectar. ex valvulis sex germen tergentibus.

Ch. Sp. Caule ramoso nudo, fol. ensiformibus carinatis laevibus. Europ. austr. 2

Part. usual. Radix.

Asparagus officinalis, L. ~~Spargel.~~

N. off. Asparagus. *F. n.* Asparagi. Juss.

Ch. G. Cor. 6-partita, erecta; petalis tribus interioribus apice reflexis. Bacca 3-locularis, supera, polysperma. (Fol. fasciculata.)

Ch. Sp. Caule herbaceo erecto paniculato, fol. setaceis, flor. dioicis, pedunculis in medio articulatis. In nostris hortis. 2

Part. usual. Radix. (Ph. a. 1780.)

Convallaria majalis, L. Mayblume.

N. off. Lilium Convallium. *F. n.* Asparagi, Juss.

Ch. G. Cor. 6-fida. Bacca maculosa, 3-locularis, supera.

Ch. Sp. Scapo nudo semicylindrico, fol. ovatis. Europ. 2

Part. usual. Flores olim.

Convallaria Polygonatum, L. Weißwurzel.

N. off. Polygonatum. *F. n.* et *Ch. g.* ut supra.

Ch. Sp. Fol. alternis amplexicaulibus, caule ancipiti, pedunc. axillaribus subunifloris. Europ. 2

Part. usual. Radix olim.

- Acorus Calamus*, L. Gemeiner Kalmar.
N. off. *Calamus aromaticus*. *F. n.* Aroideae, Juss.
Ch. G. Spadix cylindricus, tectus flosculis. Cor. 6-petalata, nuda. Stylus nullus. Caps. 3-locularis.
Ch. Sp. Scapi mucrone longissimo foliaceo. Europ. 2f
Part. usual. Radix. (Ph. a. 1820.)
Praep. Extr. alcoholico - aquosum. Acetum aromatum. (Ph. a. 1820.) Tinct. absinthii composita. Tinct. aromat. acida. (Ph. a. 1794.) Ol. aetherium. Tinct. calami compos. Tinct. carminativa (Wedelii). (Ph. bor. 1830.)

- Berberis vulgaris*, L. Gemeine Berberize.
N. off. *Berberis*. *F. n.* Berberideae, Juss.
Ch. G. Cal. 6-phyllus. Pet. 6. ad ungues glandulis 2. Stylus nullus. Stigm. umbilicatum. Bacca 1-locularis, 2-4-sperma. (Filamenta primo glandulis adhaerentia, dein elastice eriguntur.)
Ch. Sp. Racemis simplicibus pendulis, fol. obovatis ciliato-dentatis. Europ. ᄑ
Part. usual. Baccae. (Ph. a. 1794.)
Praep. Syrupus. Rotulae. (Ph. a. 1794.)

- Loranthus europaeus*, L. Eichenmistel.
N. off. *Viscum quercinum*. *F. n.* Caprifoliaceae, Reich.
Ch. G. Cal. nullus. s. margo brevis, concavus. Cor. 6-fida, evoluta, inferne agglutinata : lacin. linearispathulatis. Stam. ad apices petalorum. Bacca infera, 1-sperma, umbilicata s. cal. coronata.
Ch. Sp. Racem. simplicibus terminalibus, flor. dioicis. Austria. ᄑ
Part. usual. Lignum. (Ph. a. 1820.)
Praep. Pulvis antiepilepticus vulgo Marchionis. (Ph. a. 1794.)

Classis VI. Hexandria. Ordo II. Digynia.

Oryza sativa, L. Reis.

N. off. *Oryza sativa*. *F. n.* Gramineae, Juss.

Ch. G. Cal. gluma 2-valvis, 1-flora. Cor. 2-valvis, subaequalis, semini adnascens.

Ch. Sp. Mutica, glum. absque aristis, glutinosa, sem. glutinosis. In palud. Europae. ☺

Part. usual. Semina.

Classis VI. Hexandria. Ordo III. Trigynia.

Rumex patientiae, L. Geduldfraut.

N. off. *Rumex patientiae*. *F. n.* Polygoneae, Juss.

Ch. G. Cal. 3-phyllus. Petala 3, conniventia. Sem. 1. triquetrum.

Ch. Sp. Valvulis integerrimis; unica granifera, fol. ovato-lanceolatis. Ital. Germ. 2.

Part. usual. Radix olim (sub nomine Rhabarbarum monachorum).

Rumex acutus, L. Spigiger Ampfer. Grindwurzel.

N. off. *Lapathum acutum*. *F. n.* et *Ch. g.* ut supra.

Ch. Sp. Valv. dentatis graniferis, fol. cordato-oblongis acuminatis. Europ. 2.

Part. usual. Radix. (Ph. a. 1820.)

Rumex scutatus, L. Römischer Ampfer.

N. off. *Acetosa rotundifolia*. *F. n.* et *Ch. g.* ut supra.

Ch. Sp. Fol. cordato-hastatis, caule terreti. Helvetia, Gallia. 2.

Part. usual. Herba olim.

Rumex acetosa, L. Sauerampfer.

N. off. Acetosa vulgaris. F. n. et Ch. g. ut supra.

Ch. Sp. Flor. dioicis, caule elongato, fol. oblongis sa-
gittatis. Europ. 24

Part. usual. Radix. (Ph. a. 1794.) Herba recens et se-
mina (Ph. a. 1780.)

Colchicum autumnale, L. Herbstzeitlose.

N. off. Colchicum. F. n. Colchiaceae, De Cand.

Ch. G. Spatha. Cor. 6-partita: tubo radicato. Anth. in-
cumbentes. Caps. 3, connexae, inflatae.

Ch. Sp. Fol. planis lanceolatis erectis, petal. ovatis. In
pratis humidis. 24

Part. usual. Radix (Ph. a. 1812.), semina.

Praep. Acetum. Oxymel. (Ph. a. 1812.) Oxsaccharum.
(Ph. a. 1794.) Tinct. seminum.

Classis VII. Heptandria. Ordo I. Monogynia.

Aesculus Hippocastanum, L. Gemeine Rosskastanie.

N. off. Hippocastanum. F. n. Acera, Juss. gen.

Ch. G. Cal. 1-phyllo, ventricosus. Cor. 4-s. 5-peta-
la, inaequalis, pubescens, calyci inserta. Caps.
3-locularis. Sem. magna castaneaeformia.

Ch. Sp. Fol. digitatis septenis, cor. pentapetalis patu-
lis. Ex Asia ad nos translata. 24

Part. usual. Cortex ramorum. (Ph. a. 1820.)

Praep. Extractum aquosum. (Ph. a. 1830.)

Classis VIII. Octandria. Ordo I. Monogynia.

Daphne Mezereum, L. Gemeiner Seidelbast, Kellerhals.

N. off. Mezereum. F. n. Thymelaeae, Juss.

Ch. G. Cal. nullus. Cor. 4-fida, corollacea, marce-
scens, stamina includens, Drupa 1-sperma.

Cl. I

Ch. S
Part.

Cl.

Ch. C

Ch. S

Part.
Prae-

C

Ch. C

Ch. S

Part.

Ch. C

Ch. S

42 Cl. VIII. Octand. Ord. III. Trigynia et Ord. IV. Tetragynia.

Ch. Sp. Flor. sessilibus, ternis caulinis, fol. lanceolatis
deciduis. Germ. ♂

Part. usual. Cortex. (Ph. a. 1820.)

Classis VIII. Octandria. Ordo III. Trigynia.

Polygonum Bistorta, L. Wiesenknöterig, Natterwurz.

N. off. Bistorta. F. n. Polygoneae, Juss.

Ch. G. Cal. nullus. Cor. 5-partita, calycina. Sem.
1-angulatum, tectum (Stam. et styli numero
incerti).

Ch. Sp. Caule simplicissimo monostachyo, fol. ovatis
in petiolum decurrentibus. Europ. 24

Part. usual. Radix. (Ph. a. 1820.)

Praep. Extractum.

Polygonum aviculare, L. Wegetritt. Blutkraut.

N. off. Centumnodium. F. n. et Ch. g. ut supra.

Ch. Sp. Caul. decumbente, herbaceo, flor. octandris
trigynis axillaribus, fol. lanceolatis, margine
scabris, stipul. nervis remotis. ⊖

Part. usual. Herba olim.

Polygonum Hydropiper, L. Wasserfenchel.

N. off. Hydropiper. F. n. et Ch. g. ut supra.

Ch. Sp. Flor. hexandris semidigynis, flor. lanceolatis un-
dulatis, spic. filiformibus nutantibus, caule ere-
cto, stipulis submuticis. Germ. ⊖

Part. usual. Herba olim.

Classis VIII. Octandria. Ordo IV. Tetragynia.

Paris quadrifolia, L. Wolfsbeer, Einbeer.

N. off. Paris. F. n. Asparagi, Juss.

Ch. G. Cal. 4-phyllos. Petala 4, angustiora. Antherae
filam. medio adnexae. Bacca 4-locularis.

ia.
latis
r.
Sem.
mero
vatis
ra.
ndris
gine
s un-
ere-
ia.
herae

Cl. IX. Enneandria. Ord. I. Monogynia et Ord. III. Trigynia. 43

Ch. Sp. Fol. quaternis. In nemoribus. 24

Part. usual. Herba et baccae olim.

Classis IX. Enneandria. Ordo I. Monogynia.

Laurus nobilis, L. Gemeiner Lorbeerbaum.

N. off. Laurus. *F. n.* Laurineae, Juss.

Ch. G. Cal. 4-5-partitus. Nectar. glandulis 3, bisetis, germen cingentibus. Filam. interiora quorum 3-alterna sterilia glandulifera. Drupa 1-sperma.

Ch. Sp. Fol. lanceolatis coriaceis subundulatis venosis perenantibus, flor. subquadrifidis dioicis. Ital. Hisp. 3

Part. usual. Fructus. (Ph. a. 1820.)

Praepar. Ol. excoctum fructuum. Ung. aromat. (Ph. a. 1820.) Elect. s. Theriaca diatesseron. Spirit. balsamicus. Empl. meliloti. (Ph. a. 1794.)

Classis IX. Enneandria. Ordo III. Trigynia.

Rheum rhabonticum, L. Rhabontik.

N. off. Rhaponticum. *F. n.* Polygoneae, Juss.

Ch. G. Cal. nullus. Cor. 6-fida, persistens. Semen 1, triquetrum.

Ch. Sp. Fol. obtusis glabris, venis subtus pilosiusculis, sinu baseos dilatato, petiolis supra sulcatis, margine rotundatis. Europ. in hortis. 24

Part. usual. Radix olim.

Dictamnus albus; L. Weißer Dīptān.

N. off. Dictamnus albus. *F. n.* Rutaceae, Juss.

Ch. G. Cal. 5-phyllos. Petala 5, patula. Filamenta punctis glandulosis adspersa. Caps. 5, coalitae.

Ch. Sp. Floribus purpureis. Germ. Gallia, Ital. 24

Part. usual. Radix. (Ph. a. 1812.)

Praep. Ingreditur spirit. balsamicum et pulverem anti epilepticum. (Ph. a. 1704.)

Ruta graveolens, L. Gemeine Raute.

N. off. Ruta. *F. n.* Rutaceae. Juss.

Ch. G. Cal 4-5-partitus. Petala concava. Receptac. punctis melliferis decem cinctum. Caps. lobata. (Petala quibusdam 4 et Stam. 8.)

Ch. Sp. Fol. supradecompositis, foliolis oblongis, terminali obovato, petal. integerrimis. Eur. austr. 4

Part. usual. Herba. (Ph. a. 1820.)

Praep. Acetum. Aqua destillata. Ol. destillatum. Acet. aromaticum. Aqua vulneraria c. alchole. Species aromaticae. (Ph. a. 1820.) Spirit. balsamicus. Balsamum saxonum, Species resolventes. (Ph. a. 1794.) Balsam. vitae Hoffmanni. (Ph. a. 1780.) Conserva.

Ledum pallustre, L. Sumpfporch.

N. off. Rosmarinus sylvestris. *F. n.* Rhododendra, Juss.

Ch. G. Cal. 5-fidus. Cor. plana, 5-partita. Caps. 5-lo-
cularis, basi dehiscens. (Stam. etiam 5.)

Ch. Sp. Fol. linearibus margine revolutis subtus tomen-
tosus. Eur. septentrionalis. 4

Part. usual. Folia. (Ph. a. 1820.)

Vaccinium Myrtillus, L. Gemeine Heidelbeere.

N. off. Myrtillus. *F. n.* Ericeae, Juss.

Ch. G. Cal. superus. Cor. urceolata aut campanulata,
4-5-fida: laciniis reflexis. Filam. germini in-
serta. Bacca 4-5-loocularis, polysperma. (Stam.
quibusdam 8.)

Ch. Sp. Pedunc. 4-floris, fol. serratis ovatis deciduis,
caul. angulato. In sylvis nostris. 4

Part. usual. Baccæ. (Ph. a. 1794.)

Praep. Syrupus myrtillorum. (Ph. a. 1794.)

Vaccinium Vitis idea, L. Preußelbeerstrauch.

N. off. Vitis idea. *F. n.* et *Ch. g.* ut supra.

Ch. Sp. Racemis terminalibus nutantibus, fol. obovatis revolutis integerrimis subtus punctatis. In sylvis montosis. ♂

Part. usual. Baccæ.

Arbutus Uva ursi, L. Gemeine Sandbeere, Bärentraube.

N. off. Uva ursi. *F. n.* Ericinae, Juss.

Ch. G. Cal. 5-partitus. Cor. ovata, basi pellucida. Bacca supera, 5-locularis.

Ch. Sp. Caul. procumbentibus, fol. integerrimis. Europa frigida. ♂

Part. usual. Folia. (Ph. a. 1820.)

Pyrola rotundifolia, L. Wintergrün.

N. off. Pyrola. *F. n.* Ericaceae, Juss.

Ch. G. Cal. 5-partitus. Petala 5. Caps. 5-locularis, angulis dehiscens.

Ch. Sp. Fol. obovalibus, staminibus adscendentibus, pistillo declinato. In sylvis. ♀

Part. usual. Herba olim.

Classis X. Decandria. Ordo II. Digynia.

Saxifraga granulata, L. Weißer Steinbrech.

N. off. Saxifraga alba. *F. n.* Saxifragae, Juss.

Ch. G. Cal. 5-partitus. Cor. 5-petala. Caps. 2-rostris, 1-locularis, polysperma.

Ch. Sp. Fol. caulinis reniformib. lobatis, caule ramoso, radice granulata. Europ. ♀

Part. usual. Radix olim.

- Saponaria officinalis, L. Gemeines Seifenkraut.
N. off. Saponaria. *F. n.* Caryophylleae, Juss.
Ch. C. Cal. tubulosus, 1-phyllos, nudus. Petala 5, unguiculata. Caps. oblonga, 1-loocularis.
Ch. Sp. Calycib. cylindricis, fol. ovato-lanceolatis. Ad vias. Europ. 2.
Part. usual. Herba et radix. (Ph. a. 1820.)
Praep. Extractum herbae aquosum. (Ph. a. 1820.)

- Dianthus Caryophyllus, L. Gartennelke.
N. off. Caryophyllus ruber. *F. n.* Caryophylleae, Juss.
Ch. G. Cal. cylindricus, longus coriaceus, 1-phyllos: basi squamis 4—8. Petula 5, unguiculata. Caps. cylindrica, 1-loocularis, apice dehiscens.
Ch. Sp. Flor. solitarii, squam. calycinis subrombeis brevissimis, petalis crenatis imberibus, fol. linearis-subulatis canaliculatis glaucis. In hortis. ⊖
Part. usual. Flores.

Classis X. Decandria. Ordo V. Pentagynia.

- Sedum Telephium, L. Fette Henne. Donnerbart.
N. off. Telephium. *F. n.* Crassuleae, Juss.
Ch. G. Cal. 5-fidus. Cor. 5-petala. Squamae nectariferae 5, ad basin germinis. Caps. 5.
Ch. Sp. Fol. planiusculis ovatis, sparsis serratis, corymb. folioso; caul. erecto. In agris petrosis. 2.
Part. usual. Radix olim.

- Sedum acre, L. Mauerpfeffer.
N. off. Sedum vermiculare. *F. n.* et *Ch. g.* ut supra.
Ch. Sp. Fol. alternis subovatis adnato-sessilibus gibbis eretiusculis alternis, cyma trifida. In locis arenosis montosis. 2.
Part. usual. Herba recens (Ph. a. 1780.) et siccata.

Oxallis Acetosella, L. Gemeiner Sauerklee, Hasenklee.

N. off. *Acetosella*. *F. n.* *Gerania*. Juss.

Ch. G. Cal. 5-phillus. Petala unguibus connexa. Stam. inaequalia, 5-breviora, exteriora basi connata. Caps. angulis elastice dehiscens, 5-gona. Sem. subarillata.

Ch. Sp. Scapo unifloro, fol. ternatis obcordatis, radice dentata. Germ. Helvet. 2.

Part. usual. Herba recens. (Ph. a. 1794.)

Praep. Conserva. (Ph. a. 1794.)

Lychnis dioica, L. Weißes Seifenkraut.

N. off. *Saponaria alba*. *F. n.* *Cariophyllea*, Juss.

Ch. G. Cal. 1-phillus, oblongus, laevis. Petala 5, unguiculata: limbo subbifido. Caps. 1-5-locularis.

Ch. Sp. Caps. conicis 1-locularibus, flor. dioicis. In pratis. 2.

Part. usual. Radix olim.

Classis XI. Dodecandria. Ordo I. Monogynia.

Asarum europaeum, L. Europäische Haselwurz.

N. off. *Asarum*. *F. n.* *Aristolochiae*, Juss.

Ch. G. Cal. 4-fidus, germini insidens. Cor. nulla. Caps. coriacea, coronata.

Ch. Sp. Fol. reniformibus obtusis binis. In nemoribus. 2.

Part. usual. Folia et radix. (Ph. a. 1820.)

Praep. Extractum.

Lythrum Salicaria, L. Gemeiner oder rother Weiderich.

N. off. *Salicaria s.* *Lisimachia purpurea*, *F. n.* *Salicarieae*.

Ch. G. Cal. 6-8-10-12-dentatus. Petala 5-6, calyci inserta. Caps. tecta, 2-locularis, polysperma. (Stam. 2,8,9,10,12.)

48 Cl. XI. Dodecandria. Ord. II. Digynia et Ord. III. Trigynia.

Ch. Sp. Fol. oppositis cordato-lanceolatis, flor. spicatis dodecandris. Ad ripas aquarum. 2

Part. usual. Herba. (Ph. a. 1820.)

Classis XI. Dodecandria. Ordo II. Digynia.

Agrimonia Eupatoria, L. Gemeiner Odermennig.

N. off. *Agrimonia*. *F. n.* Rosaceae, Juss.

Ch. G. Cal. 5-dentatus, altero obvallatus. Petala 5. Sem. 2. in fundo calycis.

Ch. Sp. Fol. caulinis interrupte pinnatis: impari petiolato, fructibus hispidis. Ad vias et margines agrorum. 2

Part. usual. Herba. (Ph. a. 1794.)

Classis XI. Dodecandria. Ordo III. Trigynia.

Euphorbia Lathyris, L. Springfraut.

N. off. *Cataputia minor*. *F. n.* Euphorbiaceae, Juss.

Ch. G. Cal. 1-phyllo ventricosus. Cor. 4-s. 5-petala, calyce insidens. Caps. 3-cocca.

Ch. Sp. Umb. 4-fida: dichotoma, fol. oppositis integriniss, lanceolatis quadrifariis. Italia et Gallia. ♂

Part. usual. Semina olim.

Euphorbia helioscopia, L. Wolfsmilch.

N. off. *Esula*. *F. n.* et *Ch. g.* ut supra.

Ch. Sp. Umb. quinquefida: bifida, dichotoma, involucro obovatis, fol. cuneiformibus, serratis glabris, caps. laevib. In cultis et agris. ⊖

Part. usual. Cortex Esulae olim.

Classis XI. Dodecandra. Ordo III. Trigynia.

Sempervivum tectorum, L. Großer Hausslauch.
N. off. *Sedum majus*. *Sempervivum*. *F. n.* *Crassulaceae*, Juss.

Ch. G. Cal. 9-12- partitus. Petala 8-12. Caps. 12, polyspermae.

Ch. Sp. Fol. ciliatis propaginibus patulis, flor. dodecandris dodecagyniis nectar. cuneiformibus carunculatis. In tectis. 2.

Part. usual. Herba recens. (Ph. a. 1794.)

Classis XII. Icosandria. Ordo I. Monogynia.

Myrtus communis, L. Gemeine Myrthe.

N. off. *Myrtus*. *F. n.* *Myrti*, Juss.

Ch. G. Cal. 5 - fidus, superus. Petala 5. Bacca 3 - locularis, polysperma.

Ch. Sp. Flor. solitariis: involucro diphylo. Gall. Hispania, Italia. 3.

Part. usual. Baccae et flores olim.

Punica Granatum, L. Gemeine Granate.

N. off. *Granatum s.* *Malicorium*. *F. n.* *Rosaceae*, Juss.

Ch. G. Cal. 5 - fidus, superus. Petala 5. Bacca multilocularis, polysperma. Receptac. parietalia. Sem. baccata.

Ch. Sp. Fol. lanceolatis, caule arboreo. Arbor Europea meridionalis. 3.

Part. usual. Cortex pomorum. Flores. Radix.

Amygdalus Persica, L. Pfirsichbaum.

N. off. *Persica*. *F. n.* *Rosaceae*, Juss.

Ch. G. Cal. 5 - fidus inferus. Petala 5. Drupa nuce porris perforata. (Flor. sessiles.)

Ch. Sp. Folior. serraturis omnibus acutis, flor. sessilibus solitariis. In Europ. culta. 3.

Part. usual. Fol. recentia et nuclei. (Ph. a. 1820.)

Praep. Aqua et oleum destill. foliorum. (Ph. a. 1820.)

Amygdalus communis, L. Gemeiner Mandelbaum.

N. off. Amygdalae dulces et amarae. F. n. et Ch. g. ut supra.

Ch. Sp. Folior. serraturis infimis glandulosis, flor. sessilibus geminis, Europ. meridionalis. ♂

Part. usual. Nuclei. (Ph. a. 1820.)

Praep. Oleum pressum. Sapo medicinalis. (Ph. a. 1820.)

Syrupus amygdalarum s. emulsivus. Oleum aethereum amygdal. amar. concentrata. (Ph. bor. 1830.)

Prunus Padus, L. Traubenkirsche.

N. off. Prunus padus. F. n. Rosaceae, Juss.

Ch. G. Cal. 5 - fidus, inferus. Petala 5. Drupa laevis nux suturis prominulis.

Ch. Sp. Flor. racemosis laxis, fol. deciduis duplicito - serratis subrugosis, petiol. 2 - glandulosis. Germ. ♂

Part. usual. Cortex.

Praep. Extractum aquosum. Aqua destillata e cortice recenti parato. Oleum aethereum.

Prunus Laurocerasus, L. Kirschbeerbaum.

N. off. Laurocerasus. F. n. et Ch. g. ut supra.

Ch. Sp. Flor. racemosis, fol. sempervirentibus dorso biglandulosis. Ex Oriente in Europam translata. ♂

Part. usual. Folia recentia. (Ph. a. 1820.)

Praep. Aqua destillata Laurocerasi. (Ph. a. 1820.)

Prunus Cerasus, L. Kirschbaum.

N. off. Cerasa nigra. F. n. et Ch. g. ut supra.

Ch. Sp. Umbel. subpedunculatis, fol. ovato-lanceolatis glabris conduplicatis. In sylvis nostris. ♂

Part. usual. Nuclei. (Ph. a. 1820.)

Praep. Aqua destillata ex nucleis. (Ph. a. 1820.)

Prunus avium, L. Süße Pfirsiche.

N. off. *Prunus avium*. *F. n.* et *Ch. g.* ut supra.

Ch. Sp. Umbel. sessilibus, fol. ovato-lanceolatis, subtus pubescentibus conduplicatis. Europ. ♂

Part. usual. Fructus, folia et nuces.

Praep. Roob olim.

Prunus domestica, L. Gemeiner Pfirsichenbaum.

N. off. *Prunus*. *F. n.* et *Ch. g.* ut supra.

Ch. Sp. Pedunc. subsolitariis, fol. lanceolato-ovatis convolutis, ramis muticis. Gall. Ital. ♂

Part. usual. Fructus. (Ph. a. 1820.)

Praep. Fructuum pulpa. Electuarium lenitivum. (Ph. a. 1820.)

Prunus spinosa, L. Schlehen, Schwarzdorn.

N. off. *Acacia germanica*. (Ph. a. 1820.) *Acacia nostra*.

F. n. et *Ch. g.* ut supra. (Ph. a. 1794.)

Ch. Sp. Fruticosa, pedunc. solitariis, fol. elliptico-lanceolatis, subtus pubescentibus, ramis spinosis. ♂

Part. usual. Cortex. (Ph. a. 1820.) Flores. (Ph. a. 1794.)

Fructus. (Ph. a. 1780.)

Praep. Extractum fructuum. (Ph. a. 1812.) Syrupus florum. (Ph. a. 1794.)

Classis XII. Icosandria. Ordo II. Digynia.

Sorbus aucuparia, L. Quitschenbaum, Ebereschenbaum.

N. off. *Sorbus aucuparia*. *F. n.* Rosaceae, Juss.

Ch. G. Cal. 5-fidus. Petala 5. Styl. 2—3 Pomum. Bacca infera, 2-3-sperma. Semina cartilaginea. ♂

4 *

Ch. Sp. Fol. pinnatis utrinque glabris. Europ.
Part. usual. Fructus olim.

Classis XII. Icosandria. Ordo V. Pentagynia.

Pyrus malus, L. Gemeiner Apfelbaum.

N. off. Poma. *F. n.* Rosaceae, Juss.

Ch. G. Cal. 5-fidus. Pet. 5. Pomum inferum, 5-loculare, polyspermum.

Ch. Sp. Umbel. sessilibus, fol. ovato-oblongis acuminatis serratis glabris, unguibus calyce brevioribus stylis glabris. ♂

Part. usual. Fructus recens. (Ph. a. 1820.)

Praep. Extractum et tinctura malatis ferri seu martis cum succo pomorum. (Ph. a. 1820.)

Cydonia vulgaris, L. Gemeiner Quittenbaum.

N. off. Cydonia. *F. n.* Rosaceae, Juss.

Ch. G. Pomum tomentosum: loculis viscosis polyspermis. Cal. patens, serratus. Pet. 5.

Ch. Sp. Foliis ovatis integerrimis, flor. solitariis. Germ. ♂

Part. usual. Semina. (Ph. a. 1820.) Fructus. (Ph. a. 1780.)

Praep. Mucilago seminum. (Ph. a. 1820.) Pulpa cydonionum s. mica simplex et aromatica. Tinctura martis cydoniata.

Spirea Filipendula, L. Röther Steinbrech. Knollige Spierstaude.

N. off. Filipendula. *F. n.* Rosaceae, Juss.

Ch. G. Cal. patens, 5-fidus. Pet. 5. Caps. polyspermae, intus bivalves, 1-3-spermae.

Ch. Sp. Fol. pinnatis: foliol. uniformibus serratis, caule herbaceo, flor. corymbosis. In pascuis et sylvis. ♀

Part. usual. Radix olim.

Spirea Ulmaria, L. Johanneßwedel, Geißbart.

N. off. Ulmaria. *F. n. et Ch. g.* ut supra.

Ch. Sp. Fol. pinnatis subtus tomentosis, impari majore trilobo, lateralib. indivisis, corymbis proliferis.

In pratis uliginosis. ȝ.

Part. usual. Rad. et herba olim.

Classis XII. Icosandria. Ordo Polygynia.

Rosa centifolia, L. Gartenrose.

N. off. Rosa. *F. n.* Rosaceae, Juss.

Ch. G. Gal. urceolatus, 5-fidus. carnosus, collo coarctatus. Petala 5. Sem. plurima, hispida, calycis interiori lateri affixa.

Ch. Sp. Germinibus ovatis pedunculisque hispidis, caule hispido aculeato, petiol. inermibus, fol. subtus pubescentibus. In hortis nostris. ȝ

Part. usual. Flores. (Ph. a. 1820.)

Praep. Aq. florum destill. Mel rosatum. (Ph. a. 1820.)
Conserva. Syrupus rosatus solutivus. Ung. rosatum. (Ph. a. 1794.) Tinct. rosarum acidula. (Ph. bor. 1830.)

Rosa gallica, L. Effigrose.

N. off. Rosa rubra. *F. n. et Ch. g.* ut supra.

Ch. Sp. Germinibus ovatis pedunculisque hispidis, caule petiolisque hispido-aculeatis. In hortis nostris. ȝ

Part. usual. Flores olim.

Rosa canina, L. Hundrose.

N. off. Cynosbatum. *F. n. et Ch. g.* ut supra.

Ch. Sp. Germinib. ovatis pedunculisque glabris, caule petiolisque aculeatis, foliis ovatis glabris. Europ. ȝ.

Part. usual. Fructus, sub nomine Fruct. Cynosbati.
Semina Cynosbati.

Rubus Idaeus, L. Gemeine Himbeere.

N. off. Rubus Idaeus. *F. n.* Rosaceae, Juss.

Ch. G. Cal. 5-fidus. Petala 5. Bacca composita acinis monospermis.

Ch. Sp. Fol. quinato-pinnatis ternatisque, subtus albo-tomentosis, foliolis lineatis subrhomboideis linearis. In sylvis nostris. ♂

Part. usual. Baccæ. (Ph. a. 1820.) Syrupus. (Ph. a. 1820.) Acetum. Aq. destillata. (Ph. a. 1794.)

Rubus fruticosus, L. Brombeere.

N. off. Rubus *F. n.* et *Ch. g.* ut supra.

Ch. Sp. Fol. ternatis quinatisve subtus albo-tomentosis, foliol. petiolatis, nonnullis subincisis, caul. angulato pubescente. Europ. ♂.

Part. usual. Fructus.

Fragaria vesca, L. Erbbeere.

N. off. Fragaria *F. n.* Rosaceæ, Juss.

Ch. G. Cal. 10-fidus. Petala 5. Receptacul. seminum ovatum, baccatum, deciduum.

Ch. Sp. Flagellis reptantibus, calyce fructus reflexo, pubescentia petiolor. patentissima, pedunculor. adpressa. In sylvis, siccis, sterilibus. ♀

Part. usual. Fructus.

Potentilla Anserina, L. Gänsefraut.

N. off. Anserina. *F. n.* Rosaceæ, Juss.

Ch. G. Cal. 10-fidus. Petala 5. Semina rugosa, subrotunda, nuda, receptaculo parvo exsucquo affixa.

Ch. Sp. Fol. interrupte pinnatis sericeis, foliol. argute

serratis, caule repente, pedunc. unifloris. In pascuis argillosis. 2

Part. usual. Herba et radix.

Potentilla reptans, L. Fünffingerkraut.

N. off. Potentilla. *F. n.* et *Ch. g.* ut supra.

Ch. Sp. Fol. quinatis, caule repente, pedunc. unifloris.

In apricis argillosis 2.

Part. usual. Radix et herba olim,

Tomentilla erecta, L. Aufrechte Tormentille.

N. off. Tomentilla. *F. n.* Rosaceae, Juss.

Ch. G. Cal. 8-fidus. Petala 4. Sem. subrotunda, nuda, receptaculo parvo, exsucco affixa.

Ch. Sp. Caule eretiusculo, fol. sessilibus: foliol. ovato-lanceolatis serratis. In pascuis siccis, et syllvis. 2

Part. usual. Radix. (Ph. a. 1820.)

Praep. Extractum aquosum. (Ph. a. 1820)

Geum urbanum, L. Benediktikraut.

N. off. Caryophyllata. *F. n.* Rosaceae, Juss.

Ch. G. Cal. 10-fidus laciniae inaequales. Petala 5. Sem. barbata s. aristata: arista plerumque geniculata.

Ch. Sp. Flor. erectis, aristis uncinatis nudis, fol. caulinis ternatis, radicalibus lyrato-pinnatis. In umbrosis. 2

Part. usual. Radix (Ph. a. 1820.)

Praep. Extractum aquosum. Tinctura.

Geum rivale, L. Wasserbenediktikraut.

N. off. Geum rivale. *F. n.* et *Ch. g.* ut supra.

Ch. Sp. Flor. nutantibus, petal. longitudine calycis, aristis plumosis medio tortis. In pratis humidis. 2

Part. usual. Radix olim.

Classis XIII. Polyandria. Ordo I. Monogynia.

Capparis spinosa, L. Kapernbaum.

N. off. Capparis. *F. n.* Caparides, Juss.

Ch. G. Cal. 4-phyllo, coriaceus, deciduus. Petala 4, Semina longa. Stigma capitatum. Bacca corticosa, 1-locularis, pedunculata subglobosa aut siliquosa.

Ch. Sp. Pedunc. 1-floris solitariis, stipul. spinosis, fol. subrotundo-ovatis, acutis glabris, capsulis ovalibus. Europ. meridion. ♂

Part. usual. Cortex olim.

Chelidonium majus, L. Gemeines Schöllkraut, Schwalbenkraut.

N. off. Chelidonium majus. *F. n.* Papaveraceae. Juss.

Ch. G. Cal. 2-phyllo. Cor. 8-petala. Siliqua 1-locularis, linearis. Dissepimentum nullum, Semina plurima cristata.

Ch. Sp. Pedunculisque umbellatis, foliis quinquelobatis, lobis angustis, acute lacihiatis. Inter se pes. ♀

Part. usual. Herba. (Ph. a. 1794.)

Praep. Extractum diabotan. (Ph. a. 1794.)

Papaver Rhoeas, L. Klatschrose, rothe Kornblume.

N. off. Papaver Rhoeas s. erraticum. *F. n.* Papaveraceae, Juss.

Ch. G. Cal. 2-phyllo. Cor. 4-petala. Caps. 1-locularis, sub stigmate persistente poris dehiscens.

Ch. Sp. Caps. glabris subglobosis, caule multifloro piloso: pilis patentibus, fol. pinnatifidis incisis. In agris nostris vulgaris. ☽

Part. usual. Flores. (Ph. a. 1775 et 1820.)

Praep. Species pectorales. (Ph. a. 1775.) Syrupus flor.
papaveris rhoeados.

Papaver somniferum, L. Mohn. Weißer Mohn.

N. off. Papaver album. F. n. et Ch. g. ut supra.

Ch. Sp. Calycib. capsulisque glabris, fol. amplexicaulis
bus incisis glabris. Europ. austr. ⊖

Part. usual. Capsulae vulgo capita.

Praep. Opium (succus capsularum immaturarum in-
spissatus). Pulvis anodynus. Pulvis doveri. (Ph.
a. 1820.) Aqua opii. (Ph. bor. 1830.) Tinctura
anodina simplex s. tinctura thebaica. (Ph.
a. 1820.) Tinctura anodyna composita, s. cro-
cata, s. Laudanum liquidum Sydenhami. (Ph.
a. 1794.) Tinctura Besnardi. Extractum opii
aquo sum. (Ph. a. 1820.) Extractum opii vino-
sum et spirituosum. Electuarium anodynum
vulgo Theriaca Andromachae. (Ph. a 1794.)
Pilulae de styrace. (Ph. a. 1775.) Massa pilula-
rum de cynoglosso. Syrupus Diacodii s. papa-
veris (Ph. a. 1820.) Unguentum populeum.
(Ph. a. 1775.) Morphium et morphium aceti-
cum. (Ph. bor. 1830.)

Nymphaea alba, L. Seeblume, Seerose.

N. off. Nymphaea alba. F. n. Nymphaeaceae, Juss.

Ch. G. Cal. 4-s. 5-phyllo. Cor. polypetala. Stigma
radiatum sessile. Bacca multilocularis, loculis
polyspermis.

Ch. Sp. Fol. cordatis integerrimis, lobis imbricatis ro-
tundis. Europ. 4.

Part. usual. Flores et radix.

Praep. Aqua destillata. Syrupus.

-
- Tilia europaea, L. Lindenbaum.
N. off. Tilia, *F. n.* Tiliaceae, Juss.
Ch. G. Cal. 5-partitus. Cor. 5-petala. Caps. coriacea,
globosa, 5-locularis, 4-valvis, basi dehiscens,
monosperma.
Ch. Sp. Flor. nectario proprio destitutis, fol. cordatis
glabris. Europ. ♂
Part. usual. Flores. (Ph. a. 1820.)
Praep. Aqua destillata. Syrupus. Carbo.
-

- Citrus medica, L. Citronenbaum. Limonie.
N. off. Citrus. s. Limonia, *F. n.* Aurantiaceae, Juss.
Ch. G. Cal. 5-fidus. Petala 5, oblonga. Filam. dilata,
basi subconnata in fasciculos. Bacca corticosa,
9 - 18. locularis, pulpa molli.
Ch. Sp. Petiol. linearibus, fol. ovatis acuminatis, Europ.
austr. ♂
Part. usual. Fructus recens. Cortex fructus. Semen.
(Ph. a. 1820.)
Praep. Succus expressus. Flavedo corticum. (Ph. bor.
1830.) Oleum destill. (Ph. a. 1820.) Syrupus cor-
ticum. Eleosaccharum. (Ph. a. 1820.) Syrupus
acetositatis citri. (Ph. a. 1794.) Aqua destill.
corticum. (Ph. a. 1820.) Aqua carminativa. Spi-
ritus melissae compositus. Tinctura corticum.
(Ph. a. 1794.) Tinctura aromatica acida vulgo
elixirium vitrioli anglicanum. (Ph. a. 1794.)
-

- Citrus Aurantium, L. Pomerange.
N. off. Aurantium. *F. n.* et *Ch. g.* ut supra.
Ch. Sp. Petiol. alatis, fol. ovato-lanceolatis acumina-
tis. Europ. austr. ♂
Part. usual. Fructus integer. Cortex fructus flavus. Folia
et flores. (Ph. a. 1820.) Fructus immaturus.

- Praep.* Succus recens. Flavedo corticum aurantiorum.
(Ph. a. 1830.) Oleum aethereum. (Ph. a. 1820.)
Elaeosaccharum. (Ph. a. 1820.) Syrupus corticum.
(Ph. a. 1794.) Syrupus foliorum. (Ph. a. 1794.)
Extractum corticum fructuum alcoholicum.
(Ph. bor. 1830.) Aqua destill. florum, Naphae
dicta. (Ph. a. 1820.) Tinctura corticum. (Ph. a.
1794.) Tinctura amara s. stomachica. (Ph. a. 1820.)
Tinctura absinthii composita. (Ph. a. 1794.) Eli-
xirium stomachicum temperatum. (Ph. a. 1775.)

Classis XIII. Polyandria. Ordo II. Digynia.

- Paeonia officinalis*, L. Pfingstrose, Gichtrose.
N. off. *Paeonia*. *F. n.* Papaveraceae, Juss.
Ch. G. Cal. 5-phyllus. Petala 5. Styl. nullus. Caps.
polyspermae, leguminosae.
Ch. Sp. Fol. decompositis nudis, foliolis lobatis, lobis
lato-lanceolatis, caps. retiusculis tomentosis.
In hortis nostris culta. 24
Part. usual. Flores et radix. (Ph. a. 1794.)
Praep. Aqua destillata. Extractum. Tinctura. Syrupus.
(Ph. a. 1775.) Pulvis antiepilepticus vulgo Mar-
chionis. (Ph. a. 1794.)

Classis XIII. Polyandria. Ordo III. Trigynia.

- Delphinium consolida*, L. Rittersporn.
N. off. *Consolida regalis* s. *Calcatrippa*. *F. n.* Ranuncu-
laceae, Juss.
Ch. G. Cal. nullus. Petala 5. Nectarium 2-fidum, po-
stice cornutum. Siliquae 3 s. 1.
Ch. Sp. Nectariis monophyllis, caule subdiviso. In agris
nostris. ⊖

*Part. usual. Flores. (Ph. a. 1780.)**Praep. Tinctura Delphinii.**Delphinium Staphisagria, L. Läusekraut, Stephanskörner.**N. off. Staphisagria. F. n. et Ch. g. ut supra.**Ch. Sp. Nectariis tetraphyllis petalo brevioribus, fol. palmatis, lobis obtusis, Europ. merid. ♂**Part. usual. Semen. (Ph. a. 1775.)**Praep. Unguentum ad phthixiosin s. contra pediculos. (Ph. a. 1775.)**Aconitum Anthora, L. Giftheil.**N. off. Anthora. F. n. Ranunculaceae, Juss.**Ch. G. Cal. nullus. Pet. 5, supremo fornicato. Nect. 2, pedunculata, recurva. Siliquae 3. s. 5.**Ch. Sp. Cuculi calcare recto obtuso, labio spathulato emarginato, galea conica, fol. digitato-quinquepartitis, lacinias tripartito-dentatis cuneiformibus. In Pyrenaeis. ♂**Part. usual. Radix olim.**Aconitum Napellus, L. Sturmhut.**N. off. Aconitum coeruleum. F. n. et Ch. g. ut supra.**Ch. Sp. Cuculi calcari recto obtuso, labio lanceolato adscidente bifido, galea convexa, fol. nitidis quinquepartitis, lacin. tripartitis incisis linearibus. Ital. Helvetia, Gallia, Hungar, Aust., Siles. et reliq. Germ. 24**Part. usual. Herba. (Ph. a. 1820.)**Praep. Extractum. Tinctura. (Ph. bor. 1830.) Tinctura aconiti aetherea. (Ph. bor. 1830.)**Aconitum neomontanum, L. Mönchskeappe.**N. off. Aconitum. F. n. et Ch. g. ut supra.**Ch. Sp. Cuculi calcare adunco obtuso, labio lanceolato revoluto bifido, galea convexa, fol. nitidis di-*

gitato - quinquepartitis, laciniis lato - lanceolatis
brevisime dentatis, pedunc. glabris. 2f.

Part. usual. et *Praep.* ut supra.

Aconitum Cammarum, L. Eisenhütlein.

N. off. Aconitum. *F. n.* et *Ch. g.* ut supra.

Ch. Sp. Cuculi calcare adunco abtuso, labio lanceolato
recto, acute emarginato, galea conica elonga-
ta, fol. opacis quinquepartitis, laciniis oblongo-cuneiformibus trifidis dentatis. 2f.

Part. usual. et *Praep.* ut supra.

Classis XIII. Polyandria. Ordo V. Pentagynia.

Aquilegia vulgaris, L. Agley, Melecy.

N. off. Aquilegia. *F. n.* Ranunculaceae, Juss.

Ch. G. Cal. nullus. Petala 5 corniculata, inter petala.
Caps. 5, distinctae.

Ch. Sp. Nectar. incurvis: caule subnudo, subunifloro
viscoso-piloso, fol. subtrilobis. In nemoribus. 2f.

Part. usual. Flores et semina olim.

Nigella sativa, L. Nigelle.

N. off. Nigella. *F. n.* Ranunculaceae, Juss.

Ch. G. Cal. nullus. Petala 5. Nectar. 5, trifida, intra
corollam. Caps. 5, convexa.

Ch. Sp. Pistillis quinis, caps. muricatis subrotundis,
fol. subpilosis. Germ. ⊖

Part. usual. Semina olim.

Hypericum perforatum, L. Hartheu.

N. off. Hypericum. *F. n.* Hypericinae.

Ch. G. Cal. 5-partitus: lacin. subovatis aequalibus
Petala 5. Filam. multa in 5-phalanges basi con-
nata. Caps. subrotunda: loculis numero stylo-
rum. (Styl. 1-2-3-5.)

Ch. Sp. Flor. trigynis, caule ancipiti, fol. obtusis pelucido punctatis, foliol. calycinis lanceolatis.
Apud nos. 2

Part. usual. Flores. (Ph. a. 1794.)

Praep. Oleum a plebe in affectionibus traumaticis adhibetur.

Classis XIII. Polyandria. Ordo VII. Polygynia.

Anemone hepatica, L. Leberblume, Edelleberkraut.
N. off. Hepatica nobilis. *F. n.* Ranunculaceae. Juss.
Ch. G. Cal. nullus. Petala 6-9. Sem. plura. Flore subcalyculato.

Ch. Sp. Fol. trilobis integerrimis. In Europae nemoribus. 2

Part. usual. Herba olim.

Anemone pratensis, L. Schwarze Küchenschelle.
N. off. Pulsatilla nigricans. *F. n.* et *Ch. g.* ut supra.
Ch. Sp. Pedunc. involucrato, cor. nutante, petal. apice reflexis, fol. bipinnatis.

Part. usual. Herba florida. (Ph. a. 1820.) 2

Praep. Aqua destillata. Extractum aquosum. (Ph. a. 1820.)

Anemone nemorosa, L. Waldanemone, Waldhühnchen.
N. off. Ranunculus albus. *F. n.* et *Ch. g.* ut supra.
Ch. Sp. Scapo involucrato 1-floro: involucro 3-phyllo petiolato foliaceo, seminib. ecaudatis, foliol. incisis. Europ. 2

Part. usual. Herba et flores.

Clematis erecta, L. Brennkraut, Waldrebe.
N. off. Flammula Jovis s. Clematis. *F. n.* Ranunculaceae.
Ch. G. Cal. nullus. Petala 5, rarius 5. Sem. compressa, stylo persistente caudato.

Ch. Sp. Fol. pinnatis: foliol. ovato-lanceolatis integerimis, caule erecto, flor. pentapetalis tetrapetalisque. Europ. magis austr. 2

Part. usual. Flores et folia. (Ph. a. 1794.)

Praep. Extractum. (Ph. a. 1794.)

Helleborus niger, L. Schwarze Nießwurz, Christblume.
N. off. *Helleborus niger* s. *Melampodium*. *F. n.* Ranunculaceae, Juss.

Ch. G. Cal. nullus. Petala 5 s. plura. Nect. bilabiata, tubulata. Caps. 5-6-polyspermae, eretiusculae, compressae.

Ch. Sp. Scapo subbiflоро subnudo, fol. pedatis, foliol. cuneato-oblongis. Austr. 2

Part. usual. Radix. (Ph. a. 1820.)

Praep. Extractum. Tinctura. (Ph. a. 1820.) Pilulae purgantes drasticae. (Ph. a. 1794.) Extractum purgans drasticum vulgo catholicum. (Ph. a. 1794.) Vinum.

Helleborus foetidus, L. Stinkende Nießwurz.

N. off. *Helleborus foetidus*. *F. n.* et *Ch. g.* ut supra.

Ch. Sp. Caule multifloro folioso, fol. pedatis, remote serratis coriaceis, cor. subconivente. Europ. 2

Part. usual. Herba.

Classis XIV. Didynamia. Ordo I. Gymnospermia.

Ajuga pyramidalis, L. Güssden-Günsel.

N. off. *Consolida media*. *F. n.* Labiate, Juss.

Ch. G. Cor. labium superius minimum, bidentatum. Stamina labio superiore longiora.

Ch. Sp. *Tetragono-pyramidalis villosa*, fol. radicalibus maximis. In sylvis. ♂

Part. usual. Herba olim.

Ajuga Chamaeptyis, Schrach. Teucrium Chamaeptyis,
L. Feldcypresse.
N. off. Chamaeptyis s. Iva arthritica. *F. n.* et *Ch. g.*
ut supra.
Ch. Sp. Fol. trifidis, flor. axillaribus solitariis folio bre-
vioribus, caule diffuso. In agris. ⊖
Part. usual. Herba. (Ph. a. 1778.)

Teucrium Marum, L. Räthenkraut.
N. off. Marum verum. *F. n.* Labiate, Juss.
Ch. G. Cor. labium superius nullum, ultra basin bi-
partitum. Stam. exserta.
Ch. Sp. Fol. integerrimis ovatis acutis petiolatis, sub-
tus tomentosis, floribus racemosis secundis.
Hisp. Europ. merid. 2
Part. usual. Herba. (Ph. a. 1775.)

Teucrium Scordium, L. Räthenknoblauch.
N. off. Scordium. *F. n.* et *Ch. g.* ut supra.
Ch. Sp. Fol. oblongis sessilibus dentatis nudiusculis, flor.
axillaribus pedunculatis geminis, caule diffuso
pubescente. In locis humidis. 2
Part. usual. Herba. (Ph. a. 1820.)
Praep. Succus recens expressus ad curas majales. Spe-
cies aromaticae. (Ph. a. 1820.) Spiritus balsami-
cus vulgo Balsamum Schauerianum. (Ph. a.
1794.)

Teucrium Chamaedris, L. Gamander.
N. off. Chamaedris. *F. n.* et *Ch. g.* ut supra.
Ch. Sp. Fol. cuneiformi-ovatis incisis crenatis pétiolat-
is, flor. ternis, caulis procumbentibus sub-
pilosis. 2
Part. usual. Herba. (Ph. a. 1778.)
Praep. Extractum.

Teucrium Polium, L. Bergpole.

N. off. Polium. *F. n.* et *Ch. g.* ut supra.

Ch. Sp. Capitulis subrotundis pedunculatis, fol. lanceolatis obtusis crenatis margine revolutis tomentosis, caule decumbente. Ital. Hisp. et Gallia. 24

Part. usual. Herba olim.

Satureja hortensis, L. Saturej.

N. off. Satureja. *F. n.* Labiate.

Ch. G. Cal. tubulosus, striatus. Cor. laciniae subaequales. Stamina distantia.

Ch. Sp. Pedunc. axillaribus subcymosis, fol. lanceolatis integerrimis, caule brachiat. Europ. ①

Part. usual. Herba. (Ph. a. 1820.)

Praep. Species aromaticae. (Ph. a. 1820.)

Hyssopus officinalis, L. Ysop.

N. off. Hyssopus. *F. n.* Labiate.

Ch. G. Cor. labium inferius tripartitum, lacinula intermedia subcrenata. Stam. recta, distantia.

Ch. Sp. Flor. verticillatis racemosis secundis, lacinia corollae intermedia biloba integerrima, fol. linear-lanceolatis. Europ. merid. 24

Part. usual. Herba. (Ph. a. 1820.)

Praep. Aqua destillata. (Ph. a. 1820.) Aqua vulneraria c. alchole. (Ph. a. 1820.) Aqua vulneraria c. cum aceto. (Ph. a. 1794.) Syrupus. (Ph. a. 1778.) Electuarium pectorale. (Ph. a. 1778.) Species aromaticae.

Nepeta Cataria, L. Rätschenmünze.

N. off. Cataria. *F. n.* Labiate, Juss.

Ch. G. Cal. aridus, striatus. Cor. tubo longiusculo; labii inferioris lacinula intermedia crenata, faux margine reflexo. Stam. approximata.

Ch. Sp. Flor. spicatis, verticillis subpedicellatis, fol. petiolatis cordatis dentato-serratis. In ruderatis. 24

Part. usual. Herba olim.

Lavandula spica, L. Lavendel.

N. off. Lavandula s. spica. *F. n.* Labiateae, Juss.

Ch. G. Cal. ovatus, subdentatus, bractea suffultus. Cor. resupinata. Stamina intra tubum.

Ch. Sp. Fol. sessilibus lanceolato-linearibus margine revolutis, spica interrupta nuda. Europ. aust. 24

Part. usual. Flores. (Ph. a. 1820.)

Praep. Aqua. Oleum destill. (Ph. a. 1820.) Aqua vulneraria cum vino. (Ph. a. 1775.) Spiritus lavandulae. (Ph. a. 1820.) Spiritus saponatus. (Ph. a. 1820.) Aqua vulneraria c. alchohole. (Ph. a. 1820.) Spiritus salis ammoniaci lavandulatus, vulgo aqua anodyna dictus. (Ph. a. 1775.) Acetum lavandulatum. (Ph. a. 1775.) Acetum aromaticum. (Ph. a. 1820.) Balsamum embryonis s. aqua aromatica spirituosa. (Ph. a. 1794.) Balsamum Saxonicum. (Ph. a. 1794.) Tinctura. Species resolventes. (Ph. a. 1794.)

Lavandula Stoechas, L. Arabischer Stöchäss.

N. off. Stoechas arabica. *F. n.* et *Ch. g.* ut supra.

Ch. Sp. Fol. sessilibus linearibus tomentosis, margine revolutis, spica coarctata comota subsessili, bracteis subtrilobis. Gallia, Hispania. 24

Part. usual. Flores olim.

Sideritis hirsuta, L. Gleidkraut, Beißchenkraut.

N. off. Sideritis. *F. n.* Labiateae, Juss.

Ch. G. Cal. 5-fidus. Cor. ringens, aut subregularis, labium superius 2-fidum; infer. tripartitum. Stam. in-

tra tubum cor. Stigma brevius involvens alterum.
Ch. Sp. Fol. lanceolatis obtusis dentatis, pilosis, bract. dentato-spinosis, caul. hirsutis decumbentibus, Hisp: Gall: Ital: 2f
Part. usual. Herba olim.

Mentha sylvestris, L. Waldmünze, Rößlmünze.
N. off. Mentha sylvestris. *F. n.* Labiateae, Juss.
Ch. G. Cor. subaequalis, 4-fida: lacinia latiore emarginata. Stam. erecta, distantia.
Ch. Sp. Spicis oblongis, fol. oblongis tomentosis sessilibus argute inaequaliter serratis, staminib. cor. longioribus. Germ. Angl. Gall. 2f
Part. usual. Herba surrogatum pro aliis speciebus Mentharam.

Mentha viridis, L. Grüne Münze.
N. off. Menthastrum. *F. n.* et *Ch. g.* ut supra.
Ch. Sp. Spicis oblongis interruptis, fol. lanceolatis nudis serratis sessilibus, staminib. cor. longioribus. 2f
Part. usual. Herba surrogatum.

Mentha piperita, L. Pfeffermünze.
N. off. Mentha piperita. *F. n.* et *Ch. g.* ut supra.
Ch. Sp. Spicis obtusis inferne interruptis, fol. subovatis glabriusculis petiolatis, cal. basi glaberrimo. Anglia, in hortis nostris frequens. 2f
Part. usual. Herba. (Ph. a. 1820.)
Praep. Aqua destill. Oleum destill. Eleosaccharum. Ace- tum aromaticum. (Ph. a. 1820.) Rotulae. (Ph. a. 1820.) Species aromaticae.

-In *Mentha aquatica*, L. Wässermünze, Bachmünze.
N. off. *Mentha rubra* s. *aquatica*. *F. n.* et *Ch. g.* ut
supra.
Ch. Sp. *Hirsuta*, flor. capitatis, fol. ovatis serratis pe-
tiolatis, staminib. cor. longiorib. cal. tubulos.
sulcatis: pedicell. retrorsum hispidis. In fossis. 24
Part. usual. Herba. (Ph. a. 1820.)

Mentha Pulegium, L. Poley.
N. off. *Pulegium*. *F. n.* et *Ch. g.* ut supra.
Ch. Sp. *Flor.* verticillatis, fol. ovatis obtusis subcrena-
tis, caul. subteretibus repentibus, staminib. cor.
longioribus. In locis Europ. humidis. 24
Part. usual. Herba. (Ph. a. 1820.)
Praep. Aqua destillata. (Ph. a. 1820.)

Mentha crispa, L. Krausemünze, Balsamkraut.
N. off. *Mentha crispa*. *F. n.* et *Ch. g.* ut supra.
Ch. Sp. *Spicis* capitatis, fol. cordatis inciso-dentatis
undulatis sessilibus, stam. cor. aequantibus. Hel-
vet. in hortis nostris. 24
Part. usual. Herba. (Ph. a. 1820.)
Praep. Aqua. Aqua vulneraria cum alchole. (Ph. a.
1820.) Aqua carminativa. (Ph. a. 1820.) Aqua
aromatica spirituosa s. balsamum embryonis. (Ph.
(a. 1794.) Acetum aromaticum s. antisepticum.
(Ph. a. 1820.) Balsamum Saxonicum. (Ph. a.
1794.) Oleum destill. Spiritus. (Ph. a. 1820.) Sy-
rupus. (Ph. a. 1794.) Conserva. (Ph. a. 1794.)
Unguentum nervinum. (Ph. a. 1794.) Empla-
strum stomachicum s. emplastr. aromaticum.
(Ph. a. 1794.)

Glechoma hederacea, L. Gundermann, Gundelrebe.

N. off. Hedera terrestris. F. n. Labiateae, Juss.

Ch. G. Cal. 5-fidus. Anth. singulum par in formam crucis connivens.

Ch. Sp. Caule glabriuscule, eretiusculo simplici, tetragono, nitido, fol. reniformibus, crenatis oppositis, petiolatis. Ad vias et sepes. 2

Part. usual. Herba. (Ph. a. 1820.)

Praep. Conserva. (Ph. a. 1820.) Electuar. pectorale. (Ph. a. 1778.) Species pro Thee. (Ph. a. 1794.)

Lamium album, L. Taubennessel, weiße Todtennessel.

N. off. Lamium s. urtica mortua. F. n. Labiateae, Juss.

Ch. G. Cor. labium superius integrum, fornicatum; lab. inferius 2-lobum; faux utrinque margine dentata.

Ch. Sp. Fol. cordatis acuminatis serratis petiolatis, verticill. vigintifloris. Europ. 2

Part. usual. Flores. (Ph. a. 1778.)

Praep. Succus recens expressus ad curas majales. Aqua destillata. Syrupus.

Galeopsis grandiflora, Willd. Großblütiger Höhlzahn.

N. off. Galeopsis grandiflora. F. n. Labiateae, Juss.

Ch. G. Cor. labium superius subcrenatum, fornicatum; labium infer. supra 2-dentatum.

Ch. Sp. Fol. ovato-lanceolatis serratis villosis, interno-diis caulinis aequalibus, cor. galea crenato-incisa.

In agris et asperis. ⊖

Part. usual. Herba.

Praep. Ingrediens specierum pectoralium Lieberi.

- Betonica officinalis, L. Sehrfraut.
N. off. Betonica. *F. n.* Labiate, Juss.
Ch. G. Cal. aristatus. Cor. labium superius adscendens, planiusculum; tubus cylindricus.
Ch. Sp. Spica interrupta, cor. galea integrâ, lacinia intermedia labii inferioris emarginata, calycib. glabriusculis. In sylvis et agris arenosis. 2
Part. usual. Herba. (Ph. a. 1778.)

- Stachys recta, L. Aufrechter Biest.
N. off. Stachys recta. *F. n.* Labiate, Juss.
Ch. G. Cor. labium superius forniciatum, labium infer. lateralibus reflexum: intermedia majore emarginata. Stam. deflorata versus latera reflexa.
Ch. Sp. Verticill. subspicatis, fol. cordato-ellipticis crenatis scabris, caulib. adscendentibus. Ad vias. 2
Part usual. Herba olim.

- Marrubium vulgare, L. Weißer Andorn, Marienwurzel.
N. off. Marrubium album. *F. n.* Labiate, Juss.
Ch. G. Cal. hypocrateriformis, rigidus, 10-striatus. Cor. labium superius bifidum, lineare rectum.
Ch. Sp. Fol. subrotundo-ovatis dentatis rugoso-venosis, calycin. dentibus setaceis uncinatis. In locis ruderatis, ad sepes et vias. 2
Part. usual. Herba. (Ph. a. 1820.)
Praep. Succus recens pressus ad curas majales. Extractum aquosum. Species aromaticae. (Ph. a. 1820.)
Species resolventes. (Ph. a. 1794.)

- Leonorus Cardiaca, L. Herzgespann.
N. off. Cardiaca. *F. n.* Labiate, Juss.
Ch. G. Cal. 5-gonus quinquedentatus. Cor. labium superius villosum, planum, integrum, inferius

tripartitum, lacinia media indivisa. (Antherae punctis nitidis adspersae. Fol. sublobata.)
Ch. Sp. Fol. cuneiformi-ovatis trilobis dentatis, cor. calyce pungente majoribus, lacinia media labii inferioris acuta. In ruderatis. ♂

Part. usual. Herba olim.

Origanum creticum, L. Kretischer Dosten.
N. off. Origanum creticum. F. n. Labiateae, Juss.
Ch. G. Strobilus tetragonus, spicatus, calyces colligens.
Cor. labium superus erectum, planum; inferius tripartitum: laciniis aequalibus. (Flor. bracteis latis interjectis.)
Ch. Sp. Spicis aggregatis longis prismaticis rectis, bract. membranaceis calyce duplo longioribus. Europ. austr. 24

Part. usual. Herba olim.

Origanum vulgare, L. Wohlgemuth.
N. off. Origanum. F. n. et Ch. g. ut supra.
Ch. Sp. Spicis subrotundis paniculatis conglomeratis, bract. cal. longioribus ovatis coloratis. In montibus et ad dumeta. 24
Part. usual. Herba. (Ph. a. 1820.)
Praep. Aqua. Oleum destill. (Ph. a. 1820.) Aqua vulneraria. (Ph. a. 1820.) Species aromaticae. (Ph. a. 1820.) Balsamum Saxonicum. (Ph. a. 1794.)

Origanum Majorana, L. Majoran.
N. off. Majorana. F. n. et Ch. g. ut supra.
Ch. Sp. Spicis subrotundis ternis compactis pedunculatis, fol. petiolatis ellipticis obtusis glabriusculis, radice annua. Europ. meridion. apud nos in hortis. ⊖
Part. usual. Herba. (Ph. a. 1794.)

Praep. Aqua. Oleum destill. (Ph. a. 1794.) Aqua vulneraria cum vino. (Ph. a. 1775.) Balsamum Saxonicum. (Ph. a. 1794.) Emplastr. meliloti. (Ph. a. 1794.) Unguent. majoranae. (Ph. a. 1794.) Pulvis sternutatorius. (Ph. a. 1794.) Species resolventes.

Thymus Serpyllum, L. Quendel, wilder Thymian.

N. off. Serpyllum. *F. n.* Labiateae, Juss.

Ch. G. Cal. billabiati, faux vilis clausa, Cor. lab. superiorius planum, emarginatum.

Ch. Sp. Flor. capitatis, caulis decumbentibus, fol. planis obtusis basi ciliatis. Europ. in locis siccis et apricis. 2

Part. usual. Herba. (Ph. a. 1820.)

Praep. Aqua. Oleum destillatum. Spiritus. (Ph. a. 1820.)
Aqua vulneraria cum alchole. Aqua vulneraria cum aceto. Pulvis sternutatorius. (Ph. a. 1794.) Species aromaticae. Unguentum aromaticum. (Ph. a. 1820.)

Thymus vulgaris, L. Gemeiner Thymian.

N. off. Thymus. *F. n.* et *Ch. g.* ut supra.

Ch. Sp. Erectus, fol. revolutis ovatis linearibusque, flor. verticillato-spicatis. Hisp. Gall. Ital. apud nos in hortis. 2

Part. usual. Herba florida. (Ph. a. 1775.)

Praep. Species resolventes. Aqua vulneraria c. vino s. spirituosa. (Ph. a. 1794.)

Melissa officinalis, L. Citronenftraut, Melisse.

N. off. Melissa citrina. *F. n.* Labiateae, Juss.

Ch. G. Cal. aridus, supra planiusculus: labio superiore subfastigiat. Cor. labium superiorius subfornicata.

tum, 2-fidum; labium inferius lobo medio cordato.

Ch. Sp. Verticillis dimidiatis subsessilibus, bract. oblongis pedicellatis, fol. ovatis acutis serratis. Europ. aust. Colitur in hortis. 24

Part. usual. Herba. (Ph. a. 1820.)

Praep. Aqua destill. Tinctura. Syrupus. Aqua vulneraria c. alchohole. Spiritus melissae compositus, vulgo Carmelitarum. Balsamum embryonis. Species pro Thee.

Melissa Calamintha, L. Bergmünze.

N. off. Calamintha montana. F. n. et Ch. g. ut supra.

Ch. Sp. Caul. debili, pedunc. axillarib. multifloris dichotomis, fol. ovatis obtusis serratis hirsutis punctatis, caule hirto, cal. lacin. inferiorib. allatis longioribus. Carinthia. Austr. et Siles. 24

Part. usual. Herba. (Ph. a. 1775.)

Praep. Aqua destill. Spiritus. Aqua vulneraria cum vino.

Dracocephalum Moldavica, L. Türkische Melisse.

N. off. Melissa turcica. F. n. Labiateae, Juss. Ch. G. Cor. faux inflata, labium superius concavum.

Ch. Sp. Flor. verticillatis, bract. lanceolatis profunde dentatis, subtus punctatis, serraturis infimis subciliatis. In Moldavia. ①

Part. usual. Herba olim.

Ocymum Basilicum, L. Basilienkraut.

N. off. Basilicum. F. n. Labiateae, Juss. Ch. G. Cal. labio superiore orbiculato; inferiore quadrifido. Cor. resupinatae alterum labium 4-fidum; alterum indivisum. Filamenta exteriora basi processum emittentia.

Ch., *Sp.* Fol. ovatis glabris, calycibus ciliatis. Apud nos in hortis. ⊖

Part. usual. Herba olim.

Prunella vulgaris, L. Braunelle.

N. off. *Prunella*, *F. n.* Labiateae, Juss.

Ch., *G.* Cal. lab. suberius dilatatum. Filam. biforca: altero apice antherifera. Stigma bifidum.

Ch., *Sp.* Fol. petiolatis oblongo-ovatis subdentatis, cal. labio superiore truncato triaristato, caule ascendente, spica tereti. In pratis et pascuis. 2.

Part. usual. Herba olim,

Classis XIV. Didynamia. Ordo II. Angiospermia.

Euphrasia officinalis, L. Augentrost.

N. off. *Euphrasia*, *F. n.* Scrophularineae, Juss.

Ch., *G.* Cal. cylindricus, 4-fidus, Cor. bilabiata, labium superius bifidum; inferius trilobum; lacinias bifidis. Anth. inferiores lobis spinosis.

Ch., *Sp.* Fol. ovatis obtuse dentatis, lacinias labii cor. inferioris emarginatis. In pascuis. ⊖

Part. usual. Herba olim.

Antirrhinum Linaria, L. Gemeines Leinkraut. Löwenmaul.

N. off. *Linaria*, *F. n.* Scrophularineae, Juss.

Ch., *G.* Cal. 5-partitus: lacinias duabus inferiorib. remotis. Cor. calcarata, ringens: rictu clauso patato prominente. Caps. ovata, bivalvis, apice in lacinulas 3—5, reflexas dehiscens, relicto inter utramque aperturam arcu stapediformi stylifero.

Ch., *Sp.* Fol. lanceolato-linearibus confertis: caule erecto, spicis terminalibus sessilibus, flor. imbricatis. In ruderatis, ad vias, agros et muros. 2.

Part. usual. Herba. (Ph. a. 1794.)

Praep. Unguentum linariae. (Ph. a. 1794 et bor. 1830.)

Scrophularia nodosa. L. Knollenwurz, Braunwurzel.

N. off. Scrophularia foetida s. vulgaris. F. n. Scrophularineae, Juss.

Ch. G. Cal. 5-fidus. Cor. subglobosa, resupinata. Caps. 2-locularis.

Ch. Sp. Fol. cordatis trinervatis, caule obtusangulo.

Ad fossas. ♀.

Part. usual. Folia et radix. (Ph. a. 1794.)

Scrophularia aquatica, L. Wasserbraunwurz.

N. off. Scrophularia aquatica. F. n. et Ch. g. ut supra.

Ch. Sp. Fol. cordatis petiolatis decurrentibus obtusis, caule membranis angulato racemis terminalibus.

Anglia, Helvet. Gallia. ♂

Part. usual. Folia olim.

Praep. Oleum destill. Sal olim.

Digitalis purpurea, L. Rother Fingerhut, Waldglöcklein.

N. off. Digitalis purpurea. F. n. Scrophularineae, Juss.

Ch. G. Cal. 5-partitus. Cor. campanulata, ventricosa 5-fida. Caps. ovata, 2-locularis. (Flor. raramos.)

Ch. Sp. Calycinis foliolis ovatis acutis, corollis obtusis: labio superiore integro, fol. ovato-lanceolatis, rugosis. In sylvaticis, Europ. meridion. ♂

Part. usual. Folia. (Ph. a. 1820.)

Praep. Tinctura. (Ph. a. 1820.) Extractum. (Ph. bor. 1830.)

Cochlearia officinalis, L. Löffelkraut, Scharbockskraut.

N. off. *Cochlearia hortensis*. *F. n.* Cruciferae, Juss.

Ch. G. *Silicula turgida*, rugosa, polysperma, bivalvis: valvulis gibbis obtusis. Dissepimentum subparalellum. *Ch. Sp.* Fol. radicalibus subrotundis, caulinis oblongis subsinuatis, siliculis globosis. Europ. septent. ad litora maris. ♂

Part. usual. Herba. (Ph. a. 1820.) Semen (raro).

Praep. Aqua cochleariae. (Ph. a. 1775.) Spiritus. (Ph. a. 1820.) Syrupus. (Ph. a. 1775.) Conserva. (Ph. a. 1820.) Extractum.

Cochlearia, Armoracia, L. Meerrettig, Kren.

N. off. *Armoracia*. *F. n.* et *Ch. g.* ut supra.

Ch. Sp. Fol. radicalibus lanceolatis crenatis, caulinis incisis. In terris humidis. 2

Part. usual. Radix recens. (Ph. a. 1820.)

Praep. Aqua. Succus recens pressus. Extractum. Tinctura.

Lepidium sativum, L. Gartenfresse.

N. off. *Nasturtium hortense s. sativum*. *F. n.* Cruciferae, Juss.

Ch. G. *Cor. regularis*. *Silicula emarginata*, cordata, polysperma: vavulis carinatis, dissepimento contrariis.

Ch. Sp. *Ramosissimum*, fol. infimis pinnato-multifidis, caulinis cordatis, amplexicaulibus integris. ⊖

Part. usual. Herba.

Thlapsi arvense, L. Bauernsenf.

N. off. *Thlapsi*. *F. n.* Cruciferae, Juss.

Ch. G. *Silicula emarginata*, obcordata, polysperma: valvulis navicularib. marginato-carinatis.

Ch. Sp. Silicul. orbiculatis, fol. oblongis dentatis gla-
bris. In agris. ⊖

Part. usual. Semina olim.

Thlapsi bursa pastoris, L. Hirtentasche.

N. off. Bursa pastoris. *F. n.* et *Ch. g.* ut supra.

Ch. Sp. Siliculo deltoideo-obcordatis, fol. radicalibus
pinnatifidis. Europ. ⊖

Part. usual. Herba olim.

Classis XV. Tetrodynamia. Ordo II. Siliquosa.

Cardamine pratensis, L. Wiesenfresse.

N. off. Nasturtium pratense. *F. n.* Cruciferae, Juss.

Ch. G. Siliqua longa elastice dissiliens, valvulis revo-
lutis. Stigma integrum. Cal. subhians. Glandula
utrinque solitaria inter stamina breviora et ca-
lycem.

Ch. Sp. Fol. pinnatis: foliol. radicalib. subrotundis:
caulinis linear-lanceolatis. In pascuis aquosis.

Part. usual. Herba olim.

Sisymbrium Nasturtium, L. Wasserfresse. Brunnenfresse.

N. off. Nasturtium aquaticum. *F. n.* Cruciferae, Juss.

Ch. G. Siliqua rostro brevi tereti dehiscens, valvulis
rectiusculis. Cal. patens. Cor. patens.

Ch. Sp. Siliquis declinatis, fol. pinnatis: foliol. subcor-
datis. In fontibus et rivis. ♂

Part. usual. Herba. (Ph. a. 1794)

Praep. Succus recens pressus ad curas majales. Con-
serva.

Sisymbrium Sophia, L. Großeß Wiesenfraut.

N. off. Sophia. *F. n.* et *Ch. g.* ut supra.

Ch. Sp. Petalis calyce minoribus, fol. decomposito-pin-
natis. In maceriis, maris, tectis, ruderatis. ⊖

Part. usual. Semina olim.

Erysimum officinale, L. Wegsenf.

N. off. Erysimum. F. n. Cruciferae, Juss.

Ch. G. Siliqua columnaria, exacte tetraëdra. Cal. clausus.

Ch. Sp. Siliquis spicae adpressis, fol. runcinatis. In ru-

deratis. ⊖

Part usual. Herba et semen olim.

Erysimum alliaria, L. Knoblauchfrau.

N. off. Alliaria. F. n. et Ch. g. ut supra.

Ch. Sp. Fol. cordatis. In sylvis et hortis. 2

Part. usual. Herba. (Ph. a. 1780.)

Cheiranthus Cheiri, L. Gelbe Viole.

N. off. Cheirus. F. n. Cruciferae, Juss.

Ch. G. Cal. clausus, foliolis duobus basi gibbis. Petala dilata. Germen utrinque denticulo glandulato. Siliq. compressa, aut teres. Stigma bilobum. Semina plana, quibusdam marginata.

Ch. Sp. Fol. lanceolatis acutis glabris, ramis angulatis, caule fructicoso. In hortis. ♂

Part. usual. Flores olim.

Brassica Napus, L. Gstebrüe.

N. off. Napus. F. n. Cruciferae, Juss.

Ch. G. Cal. erectus connivens. Dissepimentum prominentes. Sem. globosa. Glandula inter stamina breviora et pistillum, interque longiora et calycem. Siliquae teretes, compressae aut tetragonae, rostratae.

Ch. Sp. Radice caulescente fusiformi, fol. laevibus, superioribus cordato-lanceolatis amplexicaulibus, inferioribus lyratis dentatis. Anglia. ♂

Part. usual. Semen et flores.

Praep. Oleum.

Brassica Rapa, L. Große Rübe.

N. off. Rapa. F. n. et Ch. g. ut supra.

Ch. Sp. Radici caulescente orbiculari depressa carnosa,
fol. radicalibus lyratis scabris, caulinis integer-
rimis laevib. Angl. Lusitan. Belg. ♂

Part. usual. Semen.

Praep. Syrupus.

Sinapis alba, L. Weißer Senf.

N. off. Eruca. F. n. Cruciferae, Juss.

Ch. G. Cal. patens. Cor. unguis recti. Glandula inter
stamina breviora et pistillum, interque longiora
et calycem. Dissepimentum prominens ensiforme.

Ch. Sp. Siliquis hispidis sub-4-spermis, rostro obliquo
longissimo ensiformi. In agris. ⊖

Part. usual. Semina olim.

Sinapis nigra, L. Senf,

N. off. Sinapis. F. n. et Ch. g. ut supra.

Ch. Sp. Siliquis glabris tetragonis sublaevibus, race-
mo adpressis, fol. summis, linear-lanceolatis. Pl.
indigena. ⊖

Part. usual. Semen. (Ph. a. 1820.)

Praep. Farina.

Raphanus sativus, L. Rettig.

N. off. Raphanus niger s. sativus. F. n. Cruciferae.

Ch. G. Cal. clausus, setosus. Siliqua torosa, subarticu-
lata, teres, evalvis, 1-2-locularis. Glandulæ 2.
inter stamina breviora et pistillum, totidem in-
ter stamina longiora et calycem.

Ch. Sp. Fol. lyratis, siliquis teretibus torosis bilocula-
ribus. Apud nos culturæ productum, sponte in
China. ⊖

Part. usual. Radix et semen. (Ph. a. 1780.)

Classis XVI. Monadelphia. Ordo IX. Polyandria.

Althaea officinalis, L. Eibisch.

N. off. *Althaea*. *F. n.* Malvaceae, Juss.

Ch. G. Cal. duplex: exterior 6-9-fidus. Caps. plurimae, monospermae.

Ch. Sp. Fol. tomentosis oblongo-ovatis obsolete trilobis dentatis. Europ. 4

Part. usual. Flos, herba et radix. (Ph. a. 1820.)

Praep. Syrupus, Pasta. (Ph. a. 1820.) Tabulae. (Ph. a. 1820.) Mel pectorale. (Ph. a. 1794.) Species decocti althaeae. (Ph. a. 1820.) Species emollientes. (Ph. a. 1794.) Species pectorales. (Ph. a. 1794.) Unguentum de althaea. (Ph. a. 1775.) Emplastrum de mucilaginibus. (Ph. a. 1794.)

Althaea rosea, L. Rosenpappel, Steckrosenpappel.

N. off. *Malva arborea*. *F. n.* et *Ch. g.* ut supra.

Ch. Sp. Caule erecto, fol. rugosis, cordatis 5-7 angulatis crenatis. In hortis nostris. ♂

Part. usual. Flos.

Malva rotundifolia, L. Räsepappel.

N. off. *Malva vulgaris*. *F. n.* Malvaceae, Juss.

Ch. G. Cal. duplex: exterior 5-phylus. Caps. plurimae, monospermae.

Ch. Sp. Caule prostrato, fol. cordato-orbiculatis obsolete quinquelobis, pedunc. fructiferis declinatis. In ruderatis. ☽

Part. usual. Flores et folia. (Ph. a. 1820.)

Praep. Species decocti althaeae. (Ph. a. 1820.) Species emollientes. (Ph. a. 1820.)

Malva sylvestris, L. Nößpappel.

N. off. Malva vulgaris. F. n. et Ch. g. ut supra.

Ch. Sp. Caule erecto herbaceo. Fol. septemlobatis acutis, pedunc. petiolisque pilosis. Europ. ☺

Part. usual. Flores et folia. (Ph. a. 1820.)

Malva alcea, L. Augenpappel.

N. off. Alcea. F. n. et Ch. g. ut supra.

Ch. Sp. Caule erecto, fol. inferiorib. angulatis, superioribus quinquepartitis, scabriusculis, cal. exterioris foliol. oblongis obtusis. German. Anglia. Gallia. ☺

Part. usual. Radix.

Classis XVII. Diadelphia. Ordo II. Hexandria.

Fumaria officinalis, L. Gemeiner Erdrusch, Taubenkropf.

N. off. Fumaria. F. n. Papaveraceae, Juss.

Ch. G. Cal. diphyllos, deciduus. Cor. irregularis, basi calcarata. Filam. 2. singula antheris 3. Caps. (Drupa) 1 - locularis, evalvis, 1 - sperma. Sem. parieti affixum.

Ch. Sp. Caule ramoso diffuso, siliquis globosis retusis, fol. supradecompositis, foliol. tripartito-lanceolatis. In agris. ☺

Part. usual. Herba. (Ph. a. 1820.)

Praep. Conserva. (Ph. a. 1794.) Extractum. (Ph. a. 1820.)

Syrupus. (Ph. a. 1794.) Succus recens pressus ad curas majales.

Classis XVII. Diadelphia. Ordo III. Octandria.

Polygala amara, L. Bittere Kreuzwurzel, Milchblume.

N. off. *Polygala amara*. *F. n.* *Polygaleae*, Juss.

Ch. G. Cal. 5-phyllus: foliolis duobus alaeformibus, coloratis. Caps. obcordata, 2-locularis, 2-valvis.

Ch. Sp. Flor. cristatis racemosis, alis calycinis trinerviis obtusis, cor. longioribus, caulib. erectiusculis, fol. obtusis; radicalib. obovatis. In regionibus montosis. 2.

Part. usual. Radix. (Ph. a. 1775.)

Polygala vulgaris, L. Kreuzblume.

N. off. *Polygala vulgaris*. *F. n.* *Pedicularideae*, Juss.

Ch. g. ut supra.

Ch. Sp. Flor. cristatis racemosis, alis calycinis trinerviis obtusis longitudine corollae, caulis pro-cumbentibus, fol. linear-lanceolatis acutiusculis, Austr. Germ. 2.

Part. usual. Herba cum radice. (Ph. a. 1820.)

Praep. Pulvis sternutatorius. (Ph. a. 1794.) Species pectorales. (Ph. a. 1794.)

Classis XVII. Diadelphia. Ordo IV. Decandria.

Spartium scoparium, L. Pfriemenkraut.

N. off. *Genista*. *F. n.* *Leguminosae*, Juss.

Ch. G. Cal. deorsum productus. Carina quibusdam pendula. Filam. germini adhaerentia. Stigma longitudinale, supra villosum. Legum. oblongum, mono- aut polyspermum.

Ch. Sp. Fol. ternatis solitariisque oblongis, flor. axillaribus, leguminibus margine pilosis, ramis angularis. In arenosis et sylvaticis. 3.

Part. usual. Herba, flores, semen.

- Ononis spinosa*, L. *Haushechel*, *Ochsenbrechwurzel*.
N. off. *Ononis s.* *Resta bovis*. *F. n.* *Leguminosae*, Juss.
Ch. G. *Cal. 5-partitus*: *laciinis linearibus*. *Vexillum striatum*. *Filam. connata*. *Legumen turgidum*, *sessile (apice hamatum)*.
Ch. Sp. *Flor. axillaribus subgeminatis*, *fol. ternatis*: *superioribus solitariis serratis subglabris*, *ramis spinosis*. *In locis incultis*. *h*
Part. usual. *Radix*. (Ph. a. 1820.)
Praep. *Syrupus*. (Ph. a. 1794.)

-
- Lupinus albus*, L. *Weisse Treibviole*.
N. off. *Lupinus*. *F. n.* *Leguminosae*, Juss.
Ch. G. *Cor. 2-labiata*. *Antherae 5-oblongae*; *5-subrotundae*. *Legum. coriaceum torulosum*.
Ch. Sp. *Calycib. alternis inappendiculatis*: *labio superiore integro*; *inferiore tridentato*. *Apud nos in hortis*. *o*
Part. usual. *Semen olim*.

-
- Phaseolus vulgaris*, L. *Gemeine Schminkblume*.
N. off. *Phaseolus*. *F. n.* *Leguminosae*, Juss.
Ch. G. *Carina cum staminibus stiloque spiraliter torta*.
Ch. Sp. *Caule volubili*, *racemo solitario fol. breviore*, *pedunc. geminatis*, *bract. calyce minoribus patentibus*, *leguminibus pendulis*. *In agris et hortis culta*. *o*
Part. usual. *Semina*.

-
- Vicia Faba*, L. *Saubohne*.
N. off. *Faba*. *F. n.* *Leguminosae*, Juss.
Ch. G. *Stigma latere inferiore transverse barbatum*.
Cal. superne emarginatus, *2-dentatus*, *inferne dentibus*, *3-rectis longis*. *Vexillum emarginatum*.

Ch. Sp. Leguminib. sessilibus ternis torulosis, foliol. ovatis integerrimis, petiolis absque cirrhis, stipul. sagittatis basi dentatis. In agris et hortis nostris culta. ◎

Part. usual. Semen. (Ph. a. 1794.)

Praep. Farina.

Glycyrrhyza glabra, L. Lafrizienholz, glattes Süßholz.

N. off. Liquiritia. *F. n.* Leguminosae, Juss.

Ch. G. Cal. bilabiatus: basi gibbus. Cor. vexillum alas et carinam includens. Legumen ovatum, compressum, hispidum, 2-spermum. (Fol. stipulata.)

Ch. G. Liquiritiae. Cal. tubulosus aequalis, 5-partitus. Cor. vexillo erecto, lateribus reflexo, alis patentibus, carina bifida. Legum. oblongum, glabrum, 3-4-spermum. (Fol. exstipulata. Flor. racemosi.)

Ch. Sp. Foliol. impari petiolato. Europ. austr. 2

Part. usual. Radix. (Ph. a. 1820.)

Praep. Extractum venale vulgo succus. Extractum depuratum. Extractum liquidum s. per infusionem paratum. (Ph. a. 1820.) Pulvis gummosus vulgo Haly. (Ph. a. 1820.) Syrupus Diacodii. Electuarium pectorale. Elixirium asthmaticum. Pilulae de styrace. Pasta s. gelatina liquiritiae. (Ph. a. 1820.) Species althaeae. Species pectorales.

Galega officinalis. L.

N. off. Galega. *F. n.* Leguminosae, Juss.

Ch. G. Cal. dentibus subulatis, subaequalibus. Legum. torulosa, teretiuscula (glaberrima. Fol. pin-nata).

Ch. Sp. Foliol. lanceolatis mucronatis glabris, stipul.
lanceolatis sagittatis, caule teretiusculo. Europ.
ausr. ♀

Part. usual. Herba.

Astagalus Tragagantha, L. Bocksdorn, Tragantstrauß.

N. off. *Tragagantha*. *F. n.* Leguminosae, Juss.

Ch. G. Carina obtusa. Legum. biloculare, aut subbiloculare, sutura inferiore introflexa.

Ch. Sp. Frutescens, petiolis spinescentibus, foliol. ellipticis incanis, pedunc. subquadrifloris, folia aequantibus, calycinis dentibus ovatis brevibus.
Arogonia, Gallia, Sicilia. ♀

Part. usual. Succus effluens ex cortice. (Gummi Tragaganthae.)

Praep. *Mucilago*. (Ph. a. 1820.) *Syrpus*. Species ditragaganthae. (Ph. londin.) *Trochisci castorei*. (Ph. a. 1820.) *Tabulae althaeae*. (Ph. a. 1820.)

Melilotus coerulea, L. Blauer Steinflee.

N. off. *Melilotus coerulea*. *F. n.* Leguminosae, Juss.

Ch. G. Flor. racemosi. Cal. tubulosus, 5-dentatus. Carina simplex, alis et vexillo brevior. Legum. cal. longius, rugosum.

Ch. Sp. Racemis ovatis pedunculatis, legum. ventricosis seminudis dispermis mucronatis, caule erecto, stipulis lanceolatis membranaceis. Germ. ♂

Part. usual. Herba olim.

Melilotus officinalis, L. Officineller Steinflee.

N. off. *Melilotus*. *F. n.* et *Ch. g.* ut supra.

Ch. Sp. Leguminib. racemosis nudis dispermis acutis, stipulis lanceolato-subulatis indivisis, caule erecto. In collibus et agris. ♂

Part. usual. Herba florida s. summitates. (Ph. a. 1820.)

foliol.
stipul.
nostris

isholz.
s.
im alas
, com-
ol. sti-
partitus.
paten-
n, gla-
Flor.

24
rum de-
isionem
s vulgo
Electua-
Pilulae
(Ph. a.
es.

Legum.
ol. pin-

Praep. Species emollientes. Emplastrum de melilotho.
(Ph. a. 1794.)

Trifolium repens, L. Wiesenflee.

N. off. Trifolium album. *F. n.* Leguminosae, Juss.

Ch. G. Flores subcapitati. Legum. cal. tectum, evalve,
2-4-spermum. (Fol. ternata.)

Ch. Sp. Capitul. umbellaribus, leguminib. tetraspermis,
calycinis dentibus superioribus brevioribus,
foliol. ovato-oblongis emarginatis serrulatis,
caule repente. In pascuis et campis. 2

Part. usual. Flores olim.

Trigonella, Foenum graecum, L. Kühhornflee, Bockshorn.

N. off. Foenugraecum. *F. n.* Leguminosae, Juss.

Ch. G. Vexillum et alae subaequales, patentes, forma
corollae tripetalae. Legum. plerumque arcuat-
um et venoso-rugosum.

Ch. Sp. Leguminib. sessilibus subternis linearibus ere-
ctiusculis subfalcatis acuminatis, caule erecto.
Europ. merid. ☽

Part. usual. Semen. (Ph. a. 1820.)

Praep. Farina. Species emollientes. Emplastrum de mu-
cilaginibus. Emplastrum de millotho.

Cl. XIX. Syngenesia. Ordo I. Polygamia aequalis.

Tragopogon pratense, L. Bockbart.

N. off. Tragopogon. *F. n.* Corymbiferae, Juss.

Ch. G. Cal. simplex, polyphyllus. Recept. nudum. Pap-
pus plumosus, stipitatus.

Ch. Sp. Calycib. corollae radium aequantibus, fol. in-
tegris strictis. In partis. ♂

Part. usual. Radix.

Scorzonera hispanica, L. Schlangengras.

N. off. Scorzonera. F. n. Cichoraceae, Juss.

Ch. G. Cal. imbricatus, squamis margine scariosis. Recept. nudum. Pappus plumosus, substipitatus.

Ch. Sp. Caule ramoso, fol. amplexicaulib. lanceolatis integris, basi subserrulatis. Hisp., Gall. merid.

Hungar. ♂

Part. usual. Radix. (Ph. a. 1794.)

Sonchus oleraceus, L. Gemüseartige Distel.

N. off. Sonchus. F. n. Cichoraceae, Juss.

Ch. G. Cal. imbricatus, ventricosus. Receptacul. nudum. Pappus pilosus, sessilis.

Ch. Sp. Pedunc. subtomentosis umbellatis, calycib. glabris, fol. oblongo-lanceolatis amplexicaulib. denticulatis subsinuatis. Europ. ☽

Lactuca sativa, L. Garten-Salat.

N. off. Lactuca sativa, F. n. Cichoraceae, Juss.

Ch. G. Cal. imbricatus, cylindricus, margine membranaceo. Recept. nudum. Pappus simplex, stipitatus. Sem. laevia.

Ch. Sp. Fol. rotundatis, caulinis cordatis, caule corymboso. In hortis culta. ☽

Part. usual. Semen et herba recens. (Ph. a. 1775.)

Praep. Lactucarium. Unguentum populeum. (Ph. a. 1775.)

Lactuca Scariola, L. Wilder Salat, Leberdistel.

N. off. Lactuca sylvestris, Scariola. F. n. et Ch. g. ut supra.

Ch. Sp. Fol. verticalibus, carina aculeatis apice acutis, basi sagittatis, runcinato pinnatifidis. Europ. austr. ☽

elilothe.

Juss.
evalve,

spermis,
toribus,
rulatis,

oetshorn.
Juss.
, forma
arcua-

ous ere-
recto.

de mu-

qualis.

uss.

m. Pap-

fol. in-

Part. usual. Herba. (Ph. a. 1820.)

Praep. Extractum.

Lactuca virosa, L. Giftlattig.

N. off. *Lactuca virosa*, Intybus angustus. *F. n.* et *Ch. g.*
ut supra.

Ch. Sp. Fol. horizontalibus carina aculeatis denticula-
tis, apice obtusis, basi sagittatis, oblongo-
lanceolatis, infimis sinuatis. German. ♂

Part. usual. Herba. (Ph. bor. 1830.)

Praep. Extractum. (Ph. bor. 1830.)

Leontodon Taraxacum, L. Löwenzähn.

N. off. *Taraxacum*. *F. n.* Cichoraceae, Juss.

Ch. G. Cal. duplex. Recept. nudum. Pappus stipitatus,
plumosus.

Ch. Sp. Calyce exteriore reflexo, scapo unifloro, fol.
runcinatis glabris, laciniis lanceolatis dentatis.
Apud nos ubique crescens. ♀

Part. usual. Herba, radix. (Ph. a. 1820.)

Praep. Extractum taraxaci liquidum s. mellago taraxaci.
(Ph. a. 1820.) (Ad clysmata visceralia Kaempfii.)
Succus recens pressus ad curas majales.

Hieracium Pilosella, L. Mausöhrchen.

N. off. *Pilosella*. *F. n.* Cichoraceae, Juss.

Ch. G. Cal. imbricatus. Recept. nudum; aut passim
subpilosum. Pappus simplex, sessilis. (Ex albido
fuscescens. Genus polymorphum.)

Ch. Sp. Fol. integerrimis ovatis subtus tomentosis, sto-
lonibus repentibus, scapo unifloro. In pascuis
aridis. ♀

Part. usual. Herba olim.

- Cichorium Intybus, L. Gemeine Cichorie, Wegwart,
N. off. Cichorium. *F. n.* Cichoraceae, Juss.
Ch. G. Cal. calyculatus. Recept. subpaleaceum. Pappus polyphyllus, paleacea.
Ch. Sp. Florib. axillaribus geminis subsessilib. fol. runcinatis. 2f
Part. usual. Herba et radix. (Ph. a. 1820.)
Praep. Extractum aquosum. (Ph. a. 1820.) Syrupus cichorei cum rheo. (Ph. a. 1820.) Tinctura visceralis. (Ph. a. 1794.) Succus rec. pressus ad curas majales. Radix tosta sistit surrogatum cofeae: Cicherienkaffeh.

-
- Cichorium Endivia, L. Endivie.
N. off. Cichorium Endivia. *F. n.* et *Ch. g.* ut supra.
Ch. Sp. Pedunc. axillaribus geminis altero elongato unifloro, altero brevissimo subquadrifloro, flor. capitatis, fol. oblongis denticulatis ramis flexuosis. Apud nos in hortis. ⊖
Part. usual. Herba et semen.

-
- Carthamus tinctoria, L. Färbender Saftor.
N. off. Carthamus. *F. n.* Cinarocephaleae, Juss.
Ch. G. Cal. imbricatus squamis apice subovato-foliaeis. Recept. paleaceo-setosum. Pappus paleaceo-pilosus, s. nullus.
Ch. Sp. Fol. ovatis integris serrato-aculeatis. Ex Aegypto in agros nostros translata. ⊖
Part. usual. Flores et semina.
-
- Carlina acaulis, L. Eberwurzel, Bärenwurzel.
N. off. Carlina s. Cardopatia, s. Chameleon album.
F. n. Cinarocephaleae, Juss.
Ch. G. Cal. radiatus squamis marginalibus longis, coloratis. Corol. flosculosae. Recept. paleaceo-setosum. Pappus paleaceo-plumosus.

Ch. Sp. Caule simplici unifloro, fol. pinnatifidis nudis,
laciinis inciso dentatis spinosis. Europ. 2

Part. usual. Radix olim.

Arctium Lappa, L. Große Klette.

N. off. Lappa major. *F. n.* Cinarocephaleae, Juss.

Ch. G. Cal. globosus, squamis apice hamis inflexis. Recept. paleaceum. Pappus setoso-paleaceus.

Ch. Sp. Fol. caulinis cordatis petiolatis denticulatis,
calyc. glabris. Apud nos. ♂

Part. usual. Radix, semen et herba.

Arctium Bardana, L. Filzige Klette.

N. off. Bardana. *F. n.* et *Ch. g.* ut supra.

Ch. Sp. Fol. caulinis cordatis petiolatis integerrimis,
calycib. arachnoideo-tomentosis. Apud nos. ♂

Part. usual. Radix. (Ph. a. 1820.)

Praep. Species decocti lignorum. (Ph. a. 1794.)

Onopordon Acanthium, L. Krebsdistel.

N. off. Acanthium. *F. n.* Cinarocephaleae. Juss.

Ch. G. Cal. imbricatus squamis mucronato-pungentibus.
Recept. favosum. Pappus pilosus, caducus.
Sem. transverse sulcata.

Ch. Sp. Squamis calycinis patentibus, fol. decurrentibus sinuatis dentatis pilosis. In ruderatis. ♂

Part. usual. Herba olim.

Eupatorium cannabinum, L. Wasserhanf.

N. off. Eupatorium. *F. n.* Corymbiferae, Juss.

Ch. G. Cal. simplex aut imbricatus, oblongus. Stylus semibifidus. Recept. nudum. Pappus pilosus, s. scaber.

Ch. Sp. Fol. petiolatis tripartitis laciinis lanceolatis seratis; intermedia longiore. Apud nos. 2

Part. usual. Herba olim.

Santolina Chamae - Cyparissys, L. Zypressenftraut.

N. off. Abrotanum montanum. *F. n.* Corymbiferae, Juss.

Ch. G. Cal. imbricatus, hemisphaericus, squamis carinatis apice scariosis. Recept. paleaceum. Pappus nullus.

Ch. Sp. Pedunc. unifloris, fol. incanis quadrifariam dentatis, dentib. obtusis, ramis tomentosis, calycib. pubescentibus. Europ. austr. 2

Part. usual. Herba olim.

Cl. XIX. Syngenesia. Ordo II. Polygamia superflua.

Tanacetum vulgare, L. Gemeiner Steinfarn, Gemeines Wurmfraut.

N. aff. Tanacetum. *F. n.* Corymbiferae, Juss.

Ch. G. Cal. imbricatus, hemisphaericus, squamis acuminatis. Cor. radii obsoletae, 3-fidae. Recept. nudum. Pappus submarginatus. (Flor. corymbosae.)

Ch. Sp. Fol. bipinnatis incisis serratis. In aggeribus. 2
Part. usual. Herba florida. (Ph. a. 1820.)

Praep. Aqua destillata, Oleum tanaceti destillatum. (Ph. a. 1820.) Extractum. (Ph. a. 1820.)

Artemisia Abrotanum, L. Eberraute, Stabwurzel.

N. off. Abrotanum. *F. n.* Corymbiferae, Juss.

Ch. G. Cal. imbricatus squamis rotundatis, conniventibus. Cor. radii nullae. Recept. subvillosum, vel undiusculum. Pappus nullus. (Flor. ut plurimum racemosi.)

Ch. Sp. Frutescens, caul. stricto, fol. inferioribus, bipinnatis, superioribus pinnatis capillaceis, calycib. pubescentibus hemisphaericis. Apud nos in hortis. 2

Part. usual. Herba. (Ph. a. 1820.)

Praep. Conserva. (Ph. a. 1775.) Acetum aromaticum.
Aqua carminativa.

Artemisia pontica, L. Römischer Beifuß.

N. off. Art. pontica. *F. n.* et *Ch. g.* ut supra.

Ch. Sp. Fol. subtus tomentosis, caulinis bipinnatis, foliol. linearibus, rameis simplicibus, flor. subrotundis pedunculatis nutantibus. German. Helvet. Ital. 2

Part. usual. Herba.

Artemisia Absinthium, L. Wermuth.

N. off. Absinthium vulgare. *F. n.* et *Ch. g.* ut supra.

Ch. Sp. Fol. incanis: radicalib. triplicato-pinnatifidis, laciniis lanceolatis dentatis obtusis, caulinis bipinnatifidis, pinnatifidisve, laciniis lanceolatis, flor. globosis pedunculatis nutantibus. In incultis. 2

Part. usual. Herba.

Praep. Oleum aethereum. (Ph. a. 1794.) Oleum coctum.

Extractum herbae aquosum. (Ph. a. 1820.) Tinctura amara. Tinctura absinthii composita. (Ph. a. 1794.) Acetum aromaticum. Elixirium stomachicum temperatum. Conserva. Succus recens pressus.

Artemisia vulgaris, L. Gemeiner Beifuß.

N. off. Artemisia vulgaris. *F. n.* et *Ch. g.* ut supra.

Ch. Sp. Fol. pinnatifidis planis incisis subtus tomentosis, racemis simplicibus recurvatis, florum radio quinquefloro. In ruderatis. 2

Part. usual. Herba. (Ph. a. 1778.)

Praep. Syrupus. Vinum. Aqua vulneraria c. vino. (Ph. a. 1775.)

Arthemisia Dragunculus, L. *Dragant*, *Kaisersalat*.

N. off. *Dragunculus*. *F. n.* et *Ch. g.* ut supra.

Ch. Sp. Fol. glabris lanceolatis utrinque attenuatis, flor.
subrotundis pedunculatis erectis. *Europ. austr.* 24

Part. usual. Herba.

Praep. Oleum et aqua.

Gnaphalium arenarium, *Mottenkraut*.

N. off. *Stoechas citrina*. *F. n.* *Corymbiferae*, Juss.

Ch. G. Cal. imbricatus squamis marginalibus rotunda-
tis, scariosis, nitidis, coloratis breviusculis. Re-
cept. nudum. Pappus pilosus, s. plamosus.
(Flosc. in plurimis toti hermaphrodit.)

Ch. Sp. Herbaceum, fol. incanis tomentosis obtusis:
radicalibus spathulato-lanceolatis: caulinis li-
neari-lanceolatis, corymbo composito. In cam-
pis arenosis. 24

Part. usual. Radix olim.

Senecio vulgaris, L. *Mottenkraut*.

N. off. *Senecio*. *F. n.* *Corymbiferae*.

Ch. G. Cal. cylindricus, calyculatus: squamis apice
sphacelatis (aut intactis, in plurimis demum
reflexis). Recept. nudum. Pappus simplex.

Ch. Sp. Coroll. nudis, fol. amplexicaulibus pinnatifidis
dentatis, flor. corymbose-coarctatis. ⊖

Part. usual. Flores et herba olim.

Solidago, *Virga aurea*, L. *Goldruthé*.

N. off. *Virga aurea*. *F. n.* *Corymbiferae*, Juss.

Ch. G. Cal. squamae imbricatae, clausae. Cor. radii cir-
citer 5 (flavae). Recept. nudum, punctis exara-
tum. Pappus simplex.

Ch. Sp. Caule erecto tereti pubescente superne ramoso, foli, inferioribus ellipticis pilosiusculis acute serratis, racemis lateralibus et terminalibus erectis, ligulis elongatis. In pascuis siccis et sylvis. 24
Part. usual. Herba olim.

Inula Helenium, L. Mantwurzel, Helenenkraut.
N. off. Helenium s. Inula s. Enula. *F. n.* Corymbiferae, Juss.

Ch. G. Cal. squarrosus, aut imbricatus. Cor. radii numerosae (luteae). Anth. basi in setas duas desinentes. Recept. nudum. Pappus simplex.

Ch. Sp. Fol. amplexicaulibus ovatis rugosis, subtus tomentosis, calycum squamis ovatis. Germ. Helvet. In nostris hortis. 24

Part. usual. Radix. (Ph. a. 1820.)

Praep. Extractum aquosum. (Ph. a. 1820.) Extractum spirituosum. (Ph. a. 1794.) Tinctura. Acetum aromaticum. Vinum.

Inula dysenterica, L. Dürrwurzel.

N. off. Conyza. *F. n.* et *Ch. g.* ut supra.
Ch. Sp. Fol. amplexicaulibus cordato-oblongis subto mentosis, caul. viloso paniculato, squamis calycinis setaceis. In fossis humidis. 24

Part. usual. Herba olim.

Arnica montana, L. Wohlverleih, Fallkraut, Engelkraut.
N. off. Arnica s. Doronicum germanicum. *F. n.* Corymbiferae, Juss.

Ch. G. Cal. foliolis aequalibus. Cor. radii saepius filamentis 5 absque antheris. Recept. nudum. Pappus simplex.

- Ch. Sp.* Fol. ovatis integris: caulinis geminis oppositis.
Helvet. Austr. Hercin. et Thuring. 24
Part. usual. Flores, folia et radix. (Ph. a. 1820.)
Praep. Extractum florum arnicae. (Ph. a. 1820.) Syrupus florum arnicae. (Ph. a. 1794.) Species resolventes. Tinctura. (Ph. bor. 1830.)
-

- Doronicum Pardalianches, L. Gemshwurzel.
N. off. Daronicum. *F. n.* Corymbiferae, Juss.
Ch. G. Cal. squamae duplicitis ordinis aequales, disco longiores. Recept. nudum. Pappus simplex. Sem. radii nuda pappoque destituta.
Ch. Sp. Fol. denticulatis, summis subrotundo-cordatis, inferioribus et radicalibus cordatis petiolatis.
Germ. 24
Part. usual. Radix olim.
-

- Tussilago Farfara. L. Hufkattig.
N. off. Farfara. *F. n.* Corymbiferae, Juss.
Ch. G. Cal. simplex squamae aequales, discum aequantes, submembranaceae. Cor. femineae ligulatae s. edentulae. Recept. nudum. Pappus simplex, sessilis. (Flosc. plerisque polygamo-dioici.)
Ch. Sp. Scapo unifloro-subnudo bracteato, flore radicato, fol. cordatis angulatis dentatis subtus pubescens. In locis humidis. 24
Part. usual. Herba, radix et flores.
Praep. Succus recenter pressus.
-

- Tussilago Petasites, L. Neuraft.
N. off. Petasites. *F. n.* et *Ch. g.* ut supra.
Ch. Sp. Thyrsi oblongo, florib. discoideis, fol. oblongo-cordatis inaequaliter denticulatis, lobis appro-

ximatis, subtus pubescentibus. Ad margines fos-
sarum. 2

Part. usual. Radix olim.

Bellis perennis, L. Maasliebent.

N. off. Bellis minor. *F. n.* Corymbiferae, Juss.

Ch. G. Cal. haemisphaericus: squamis aequalibus. Sem.
obovata. Recept. nudum, conicum. Pappus
nullus.

Ch. Sp. Scapo nudo unifloro, fol. obovalis crenatis ve-
nosity. Apud nos. 2

Part. usual. Flores olim.

Chrysanthemum Leucanthemum, L. Gänseblume,
Rindsgäuse.

N. off. Bellis major. *F. n.* Corymbiferae, Juss.

Ch. G. Cal. haemisphaericus, imbricatus: squamis mar-
ginalibus membranaceis. Recept. nudum. Pap-
pus nullus s. marginatus.

Ch. Sp. Fol. amplexicaulibus lanceolatis serratis, basi
inciso dentatis, caule erecto subramoso. Apud
nos. 2

Part. usual. Herba et flores olim.

Chrysanthemum Parthenium. Pers. Matricaria Parthe-
nium, L. Mutterfrau.

N. off. Matricaria s. Parthenium. *F. n.* et *Ch. g.* ut supra.

Ch. Sp. Fol. petiolatis compositis planis, foliol. ovatis
incisis, pedunc. ramosis corymbosis, caule erecto.

In cultis et ruderatis. 2

Part. usual. Flores et herba. (Ph. a. 1794.)

Matricaria Chamomilla, L. Gemeine Chamisse, Feldchamisse.
N. off. Chamomilla vulgaris. *F. n.* Corymbiferae, Juss.
Ch. G. Cal. planus, imbricatus, squamis margine scar-
riosis. Recept. nudum, cylindraceo-conicum.
Pappus nullus.

Ch. Sp. Fol. bipinnatis, squamis calycinis obtusiuscu-
lis. In agris, cultis. ⊖

Part. usual. Flos et herba florida. (Ph. a. 1820.)

Praep. Aqua florum destillata. Oleum florum destillatum.
Extractum alcoholico-aquosum. (Ph. a. 1820.)
Aqua carminativa. Aqua vulneraria cum aceto.
(Ph. a. 1794.)

Anthemis nobilis, L. Römische Chamisse, edle Chamisse.

N. off. Chamomilla romana s. nobilis. *F. n.* Corymbi-
ferae, Juss.

Ch. G. Cal. hemisphaericus, subaequalis. Flosc. radii
plures quam 5. Recept. paleaceum: paleis pla-
nis, apice acuminatis rigidis. Pappus nullus s.
margo membranaceus.

Ch. Sp. Fol. bipinnatis, foliol. tripartitis linearis-subula-
tis subvillosis, caul. basi ramoso. Europ. austr. 24

Part. usual. Flores. (Ph. a. 1820.)

Praep. Aqua carminativa. Spiritus balsamicus. (Ph. a.
1774.)

Anthemis Cotula, L. Hundschamisse.

N. off. Cotula foetida. *F. n.* et *Ch. g.* ut supra.

Ch. Sp. Recept. conicis, paleis setaceis, seminib. nudis,
fol. bipinnatis foliol. subulatis tripartitis. In
arvis. 24

Part. usual. Herba et flores olim.

Anthemis Pyrethrum, L. Bertramwurzel, Zahnwurzel.
N. off. Pyrethrum. *F. n.* et *Ch. g.* ut supra.
Ch. Sp. Fol. triplicato-pinnatis, foliol. linearibus, caul. decumbente, ramis axillaribus unifloris. German. 2⁴

Part. usual. Radix. (Ph. a. 1820.)

Achillea Ptarmica, L. Wilder Bertram.
N. off. Ptarmica. *F. n.* Corymbiferae, Juss.
Ch. G. Cal. ovatus, imbricatus. Flosc. radii circiter 4, dilatati. Recept. paleaceum. Pappus nullus. (Flor. corymbosi.)
Ch. Sp. Fol. lanceolatis acuminatis argute serratis. In pratis humidis. 2⁴
Part. usual. Flores, herba et radix olim.

Achillea Millefolium, L. Schaafgarbe.
N. off. Millefolium. *F. n.* et *Ch. g.* ut supra.
Ch. Sp. Fol. bipinnatis glabriusculis, pinnarum lacinii linearibus dentatis. Ubique locorum. 2⁴
Part. usual. Herba florida. (Ph. a. 1820.)
Praep. Extractum aquosum. (Ph. a. 1820.) Aqua destillata. Syrupus.

Cl. XIX. Syngenesia. Ord. III. Polygamia frustranea.

Centaurea Cyanus, L. Rönnblume.
N. off. Cyanus. *F. n.* Cinarocephaleae, Juss.
Ch. G. Cal. varius. Cor. radii infundibuliformes, longiores, irregulares. Recept. setosum. Pappus simplex, varius.
Ch. Sp. Calycib. serratis, fol. linearibus sessilibus integrerrimis, infimis basi pinnatifidis. In agris inter segetes. ⊖
Part. usual. Flores.

Centaurea benedicta, L. Spinnendistel, Kardobenedicte-
fraut.

N. off. Carduus benedictus. *F. n.* et *Ch. g.* ut supra.
Ch. Sp. Calycib. ramoso-spinosis involucratis lanatis,
fol. semidecurrentibus denticulato-spinosis. ⊖

Part. usual. Herba. (Ph. a. 1794.)

Praep. Extractum cardui benedicti. (Ph. a. 1778.) Eli-
xirium stomachicum temperatum.

Cl. XIX. Syngenesia. Ord. IV. Polygamia necessaria.

Calendula officinalis, L. Gemeine Ringelblume.

N. off. Calendula. *F. n.* Corymbiferae, Juss.

Ch. G. Cal. polyphyllus, aequalis. Recept. nudum.
Pappus nullus. Sem. disci membranacea.

Ch. Sp. Seminibus cymbiformibus muricatis incurvatis
omnibus. Germ. ⊖

Part. usual. Flores. (Ph. a. 1794.)

Praep. Unguentum. (Ph. a. 1794.)

Classis XX. Gynandria. Ordo I. Diandria.

Orchis Morio, L. Weibliche Orchis, Triftennagwurz.

N. off. Salep. s. Salap. *F. n.* Orchideae.

Ch. G. Cal. ringens, foliolo superiore fornicato. Label-
lum dilatatum, basi subtus longe calcaratum.
Anthera terminalis, adnata.

Ch. Sp. Labello trifido, laciniis lateralib. crenulatis re-
flexis, calcare apice bifido adscendente, foliol.
calyc. ovalibus obtusis conniventibus. In syl-
vis. 24

Part. usual. Radix. (Ph. a. 1820.)

Orchis mascula, L. Männliche Orchis.

N. off. Salep. *F. n.* et *Ch. g.* ut supra.

Ch. Sp. Labello 3-fido. crenulato, intermedio longiore bilobo, calcare subrecurso obtuso, foliolo calyc. lateralibus exteriorib. subfalcatis acutis reflexis.

In sylvis. 24

Part. usual. Radix. (Ph. a. 1820.)

Orchis bifolia, L. Stendelfraut.

N. off. Satyrium. *F. n.* et *Ch. g.* ut supra.

Ch. Sp. Labello lanceolato integro, calcare longissimo recto. In pascuis et sylvis. 24

Part. usual. Radix olim.

Classis XX. Gynandria. Ordo V. Hexandria.

Aristolochia longa, L. Ränger Österlüzen.

N. off. Aristolochia longa. *F. n.* Aristolochieae, Juss.

Ch. G. Cal. nullus. Cor. 1-petala, ligulata, basi ventricosa. Caps. 6-locularis, polysperma, infera.

Ch. Sp. Fol. cordatis ovatis retusis, caul. prostrato subscandente, coroll. erectis, labio lanceolato acuto. Europ. merid.

Part. usual. Radix. (Ph. a. 1780.)

Aristolochia rotunda, L. Runde Österlüzen.

N. off. Aristolochia rotunda. *F. n.* et *Ch. g.* ut supra.

Ch. Sp. Fol. cordatis ovatis obtusis subsessilibus, caul. eretiusculo subsimplice, pedunc. solitariis, coroll. erectis, labio oblongo retuso. Europ. austr. 24

Part. usual. Radix. (Ph. a. 1780.)

Aristolochia Pistochia, L. Kleine Österluze.

N. off. Pistochia. F. n. et Ch. g. ut supra.

Ch. Sp. Fol. cordatis ovatis crenatis scabris, subtus reticulatis, caul. basi ramoso flexuoso prostrato, coroll. erectis, labio lanceolato. Hispan. Gall. Helvet. 24

Part. usual. Radix olim.

Carex arenaria, L. Sandrindgras, Sandsegge.

N. off. Carex arenaria. F. n. Cyperaceae, Juss.

Ch. G. Amentum (spica) imbricatum. Mas. Cal. squama solitaria. Cor. null. Fem. Cal. squama solitaria. Cor. ventricosa, monopetala, apice bidentata. Stig. 2—3. Nux triquetra, cor. persistenti inclusa. (Utriculus.)

Ch. Sp. Spica androgyna, spiculis alternis confertis, superioribus masculis, inferiorib. femineis, intermediis apice masculis, caps. ovatis marginatis bifidis ciliato-serratis, culmo incurvo. German. Europ. septentr. 24

Part. usual. Radix.

Classis XXI. Monoecia. Ordo IV. Tetrandria.

Buxus sempervirens, L. Burbaum.

N. off. Buxus. F. n. Euphorbiae, Juss.

Ch. G. Cal. 3-phyllos. Petala 2. Germinis rudimentum. Fem. Cal. 4-phyllos. Petala 3. Styli 3. Caps. 3-rotundata, 3-locularis. Sem. 2.

Ch. Sp. Fol. ovatis, petiolis margine pilosiusculis, antheris ovato-sagittatis. In hortis nostris. 3

Part. usual. Lignum olim.

Urtica urens, L. Kleine Brennnessel.

N. off. *Urtica urens*. *F. n.* Urticeae, Juss.

Ch. G. Mas. Cal. 4-phyllus. Cor. nulla. Nect. centrale, cyathiforme. Fem. Cal. 2-valvis. Cor. nulla. Sem. 1 nitidum.

Ch. Sp. Fol. oppositis ellipticis subquinquenerviis argute serratis, spicis glomeratis geminatis. In cultis. ⊖

Part. usual. Herba et semen olim.

Urtica dioica, L. Große Brennnessel.

N. off. *Urtica major*. *F. n.* et *Ch. g.* ut supra.

Ch. Sp. Fol. oppositis cordatis, ovato-lanceolatis grosse serratis, flor. dioicis, spicis paniculatis glomeratis geminatis petiolo longioribus. In ruderatis. 2

Part. usual. Herba recens. (Ph. a. 1820.)

Praep. Conserva. (Ph. a. 1794.) Unguentum mendicorum. (Ph. a. 1775.)

Parietaria officinalis, L. Glasftraut.

N. off. *Parietaria*. *F. n.* Urticaceae, Juss.

Ch. G. Flor. polygami. Hermaphrod. Cal. 4-fidus. Cor. nulla. Stamina elastica. Stylo 1. Sem. 1. superum. Fem. Cal. 2-phyllus. Sem. cal. sicco elongato tecto.

Ch. Sp. Fol. lanceolato-ovatis, pedunc. dichotomis, calycib. diphylis. In ruderatis muris. 2

Part. usual. Herba olim.

Morus alba, L. Weißer Maulbeerbaum.

N. off. *Morus alba*. *F. n.* Urticeae, Juss.

Ch. G. Mas. Cal. 4-partitus. Coroll. nulla. Fem. Cal. 4-phyllus. Cor. nulla. Styli 2. Cal. baccatus. Sem. 1.

Ch. Sp. Fol. profunde cordatis basi inaequalibus ovatis lobatisve inaequaliter serratis laeviusculis. In nostris provinciis culta. ♂

Part. usual. Folia olim.

Morus nigra, L. Maulbeerbaum.

N. off. Morus. *F. n.* et *Ch. g.* ut supra.

Ch. Sp. Fol. cordatis ovatis aut subquinquelobis, inaequaliter dentatis scabris. In Italiae maritimis et German. culta. ♂

Part. usual. Fructus. (Ph. a. 1820.)

Praep. Syrupus mororum. (Ph. a. 1794.) Roob mororum. (Ph. a. 1820.)

Classis XXI. Monoecia. Ordo VIII. Polyandria.

Poterium Sanguisorba, L. Rothe Pimpernell.

N. off. Pimpinella rubra. *F. n.* Rosaceae, Juss.

Ch. G. Mas. Cal. 4 - phyllus. Cor. 4 - partita. Stam. 50 - 50. Fem. Cal. et Cor. maris. Pist. 2, Baccae tubo corollae indurato.

Ch. Sp. Caul. subangulosus. In asperis pratis. 2

Part. usual. Herba olim.

Juglans regia, L. Wallnuß, Wälscher Nussbaum.

N. off. Juglans. *F. n.* Therebinthinaeae, Juss.

Ch. G. Mas. Ament. imbricatum. Cal. squama. Cor. 6-partita. Filam. 4-18. Fem. Cal. 4-fidus, superus. Cor. 4-fida. Styli 2. Drupa coriacea, nuce sulcata.

Ch. Sp. Fol. subnovenis ovalibus glabris subserratis subaequalibus, fructib. globosis. Apud nos culta. ♂

Part. usual. Cortex viridis fructuum. (Ph. a. 1820.)

Nuclei. (Ph. a. 1775.)

Praep. Extractum (ex succo corticum). (Ph. a. 1820.)
Roob (ex succo corticum). (Ph. a. 1820.) Oleum
 nucum juglandum. Decoctum Pollini.

Quercus Robur, Willd. *Steineiche*.
N. off. Quercus. *F. n.* Amentaceae, Juss.
Ch. G. Mas. Cal. sub-5-fidus, Stam. 5—10. Fem. Cal.
 1-phyllus, integerrimus, scaber. Styli 2—5.
 Nux coriacea, calyce persistente basi cincta.
Ch. Sp. Fol. oblongis petiolatis glabris sinuatis, lobis
 rotundatis, fructib. oblongis, sessilibus. In Eu-
 rop. nemoribus. †
Part. usual. Cortex. Folia. Gallae cynipis quercus—folii
 Fabricii, dictae gallae turcicae.

Praep. Extractum aquosum corticis quercus. Extra-
 ctum gallarum quercus. (Ph. a. 1812.) Infusum
 gallarum (qua reagens). (Ph. a. 1820.) Tinctura
 corticis quercus (qua reagens). (Ph. a. 1812.)
 Glandae tostae. Unguentum mendicorum (Ph.
 a. 1775.)

Quercus pedunculata, Willd. *Stieleiche*.
N. off. Quercus. *F. n.* et *Ch. g.* ut supra.
Ch. Sp. Fol. oblongis subsessilibus glabris sinuatis, lo-
 bis rotundatis, fructib. oblongis pedunculatis. †
Part. usual. Ut supra et adhuc Gallae tuberosae, di-
 ctae *Knöpfer*, Glandes.

Quercus austriaca, Willd. *Deutsche Eiche*.
N. off. Quercus. *F. n.* et *Ch. g.* ut supra.
Ch. G. Fol. oblongis levissime sinuatis subtus pubes-
 centibus, basi angustatis, lobis oblongo-lanceo-
 latis dentalis, calycib. echinatis. Austr. †
Part. usual. et *praep.* ut supra.

- Arum maculatum, L. Kronwurzel, Behrwurzel, Eselohren.
N. off. Arum. *F. n.* Arvideae, Juss.
- Ch. G.* Spatha 1-phylla, cucullata. Spadix supra nudus, inferne semineus, medio staminaeus. Infra glandulae cirrhosae. Bacca ut plurimum monosperma.
- Ch. Sp.* Fol. hastato sagittatis, lobis deflexis, spadice elevato spatha breviore. In sylvaticis. ♀
- Part. usual.* Radix. (Ph. a. 1794.)

Classis XXI. Monoecia. Ordo IX. Monadelphia.

- Pinus sylvestris, L. Fichte, Kiefer.
N. off. Pinus. *F. n.* Coniferae, Juss.
- Ch. G.* Mas. Cal. 4-phillus. Stam. plurima. Anth. nudae. Fem. Cal. strobili s. coni, squama 2-flora. Pistill. 1. Nux ala membranacea excepta.
- Ch. Sp.* Fol. geminis rigidis, conis ovato conicis subgeminis: junioribus pedunculatis recurvis, Europ. magis borealis. ♂
- Part. usual.* Turiones. Resina solida. Balsamum. Pix nigra.
- Praep.* Aqua picea.

-
- Pinus Pinea, L. Pinie.
- N. off.* Pinea. *F. n.* et *Ch. g.* ut supra.
- Ch. Sp.* Fol. geminis primordialibus ciliatis, conis ovatis obtusis subinermibus folio longioribus, nucib. duris. Ital. Hispan. et Gall. austr. ♂
- Part. usual.* Nuclei.

-
- Pinus Larix, L. Lärchenbaum.
- N. off.* Larix. *F. n.* et *Ch. g.* ut supra.
- Ch. Sp.* Fol. fasciculatis deciduis, strobilis ovato-oblongis, squamarum marginibus reflexis laceris, bracteol. panduriformibus. Europ. ♂

Part. usual. Balsamum dictum terebinthina. (Ph. a. 1820.)
Praep. Oleum destill. (Ph. a. 1820.) Therebinthina cocta. (Ph. a. 1820.) Ceratum ad fonticulos. (Ph. a. 1820.) Ceratum citrinum s. emplastrum citrinum. (Ph. a. 1820.) Emplastrum cantharidum. (Ph. a. 1820.) Emplastrum gummi resinosum. Emplastrum plumbi gummiresinosum. (Ph. a. 1820.) Emplastrum hydrargyri. (Ph. a. 1820.) Emplastrum stomachicum. Emplastrum cicutae. (Ph. a. 1820.) Emplastrum melillothi. Unguentum terebinthinatum. Unguentum digestivum. Unguentum basilicum. (Ph. a. 1794.) Unguentum styracis. (Ph. a. 1794.) Unguentum citrinum vulgo althaeae. (Ph. a. 1794.) Unguentum Elemi vulgo balsamum arcae. (Ph. a. 1794.) Balsamum Schauerianum.

Pinus Picea, L. Weiſtanne, Edeltanne.

N. off. Therebinthina. *F. n.* et *Ch. g.* ut supra.

Ch. Sp. Fol. solitariis planis emarginatis pectinatis, squamis conierecti obtusissimis adpressis. In aliis montosis. †

Part. usual. Therebinthina Argentoratensis sic dicta.

Pinus Abies, L. Nothe Tanne.

N. off. Terebinthina argentoratensis. *F. n.* et *Ch. g.* ut supra.

Ch. Sp. Fol. solitariis tetragonis, strobilis cylindricis, squamis rhombeis complanatis margine repandis erosis. In sylvis nostris. †

Part. usual. Balsamum Resina. Colophonia. (Ph. a. 1778.)

Thuja occidentalis, L. Lebensbaum.

N. off. Arbor vitae. *F. n.* Coniferae, Juss.

Ch. G. Mas. Amentum turbinatum. Stam. 60—100. Filam. brevia, apice dilata. Fem. Ament. rotun-

dum, squama biflora. Stigm. capitatum. Conus durus. Drupa compressa, cartilaginea. Nucul. bipartibiles.

Ch. Sp. Ramulis ancipitibus, fol. quadrifariam imbri-catis ovato rhombeis adpressis nudis tubercu-latis, strobilis obovatis, squamis interioribus truncatis. In nostris hortis. ♂

Part. usual. Herba olim.

Ricinus communis, L. Wunderbaum.

N. off. Ricinus vulgaris, Palma Christi. *F. n.* Euphor-biaceae.

Ch. G. Mas. Cal. 5-partitus. Stam. numerosa. Fem. Cal. 3-partitus. Styli 3, bifidi. Caps. ut pluri-mum echinata; 3-loicularis, 3-sperma.

Ch. Sp. Fol. peltatis palmatis, lobis lanceolatis serratis, caul. herbaceo pruinoso. Europ. austr. ♂

Part. usual. Semina. (Ph. a. 1820.)

Praep. Oleum pressum seminum. (Ph. a. 1820.)

Momordica Elaterium, L. Eselsgurke, Springgurke.

N. off. Cucumis asininus. *F. n.* Cucurbitaceae, Juss.

Ch. G. Mas. Cal. 5-fidus. Cor. 5-partita. Filam. 3. Fem. Styl. 3-fidus. Peppo sicca elastice dissi-liens. Sem. compressa.

Ch. Sp. Pomis ellipticis hispidis, fol. cordatis hispidis obtusis dentatis, cirrhis nullis. Europ. merid. ⊖

Part. usual. Radix recens et fructus recens. (Ph. a. 1775.)

Praep. Extractum (fructuum). Unguentum de Arthani-ta. (Ph. a. 1775.) Emplastrum diabotanon.

Cucurbita lagenaria, L. Glaschenkürbis.

N. off. Lagenaria. *F. n.* Cucurbitaceae, Juss.

Ch. G. Mas. Cal. 5-dentatus. Cor. 5-fida. Filam. 3. Fem. Pist. 3-fidum. Pomum (magnum) 3-5-lo-culare. Sem. margine tumido.

Ch. Sp. Fol. cordatis rotundato-obtusis pubescentibus denticulatis basi subtus biglandulosis, pomis lignosis clavatis. Apud nos in hortis et agris. ⊖
Part. usual. Semina. (Ph. a. 1820.)

Cucurbita Pepo, L. Gemeiner Kürbis.

N. off. Pepo. *F. n.* et *Ch. g.* ut supra.

Ch. Sp. Fol. cordatis obtusis subquinquelobis, denticulatis, pomis subrotundis oblongisve laevibus. In hortis et agris nostris. ⊖

Part. usual. Semina. (Ph. a. 1820.)

Cucumis Melo, L. Melone, Pfebe.

N. off. Melo. *F. n.* Cucurbitaceae, Juss.

Ch. G. Mas. Cal. 5-dentatus. Cor. 5-partita. Filam. 3. Fem. Stigm. 3, crassa bipartita. Peponis semina arguta, gemino ordine.

Ch. Sp. Fol. angulis rotundatis, pomis oblongis torulosis. Apud nos culta. ⊖

Part. usual. Semina. (Ph. a. 1820.)

Bryonia alba, L. Gichtrübe.

N. off. Bryonia alba. *F. n.* Cucurbitaceae, Juss.

Ch. G. Mas. Cal. 5-dentatus. Cor. 5-partita. Filam. 3. Fem. Stigm. 3. emarginata. Bacca parva, subglobosa, laevis.

Ch. Sp. Fol. cordatis quinquelobis dentatis calloso-punctatis scabris, flor. racemosis. In sepibus. 2

Part. usual. Radix olim.

Bryonia dioica, L. Zaunrübe.

N. off. Bryonia. *F. n.* et *Ch. g.* ut supra.

Ch. Sp. Fol. cordatis palmatis quinquelobis dentatis calloso-punctatis, flor. racemosis dioicis. In sepibus. 2

Part. usual. Radix. (Ph. a. 1794.)

Praep. Extractum. Succus recens expressus.

Classis XXII. Dioecia. Ordo II. Diandria.

Salix alba, L. Gemeine Weide, Felber.

N. off. *Salix alba*. *F. n.* Amentaceae, Juss.

Ch. G. Mas. Ament. cylindraceum. Cal. squama. Gland. baseos nectarifera. Fem. Flor. maris. Stylus 2-fidus, Caps. 1-loocularis, 2-valvis. Sem. papposa.

Ch. Sp. Fol. lanceolatis acuminatis serratis utrinque pubescentibus: serraturis infimis glandulosis. ♂

Part. usual. Cortex ramorum. (Ph. a. 1820.)

Praep. Extractum aquosum. (Ph. a. 1820.) *Salicinum*.
(Ph. bor. 1830.)

Classis XXII. Dioecia. Ordo III. Triandria.

Ficus carica, L. Gemeine Feige.

N. off. *Carica*. *F. n.* Urticeae, Juss.

Ch. G. Receptac. commune carnosum, squamis connivens occultans flosculos apetalos vel in eodem, vel distincto individuo. Mas. Cal. 3-partitus. Fem. Cal. 5-partitus. Pistill. 1, laterale. Sem. 1. Cal. persistenti clauso subcarnoso tectum. (Urticulis pulposus.)

Ch. Sp. Fol. cordatis tri-quinquelobisve repando dentatis, lobis obtusis, supra scabris, subtus pubescentibus. Europ. calidior. ♂

Part. usual. Fructus siccus. (Ph. a. 1794.)

C

Classis XXII. Dioecia. Ordo V. Tetrandria.

Viscum album, L. Mistel, Vogelstein.

N. off. *Viscum quercinum*. *F. n.* Loranthae, Juss.

Ch. *G.* Mas. Cal. 4-dentatus. Cor. nulla. Filam. null. Anther. cal. adnatae. Fem. Styl. null. Bacca infera. 1-sperma. Sem. cordatum. (In arboribus parasiticum.)

Ch. Sp. Fol. lanceolatis obtusis enerviis, caul. dichotomo, flor. quinis terminalibus glomeratis sessilibus. In arboribus variis. ♂

Part. usual. Lignum. (Ph. a. 1820.)

Praep. Extractum. Pulvis antiepilepticus vulgo Mar-chionis. (Ph. a. 1794.)

Classis. XXII. Dioecia. Ordo V. Pentandria.

Pistacia Lentiscus, L. Mastixbaum.

N. off. Mastix, *F. n.* Terebinthaceae, Juss.

Ch. *G.* Mas. Cal. 5-fidus. Cor. null. Fem. Cal. 3-fidus. Cor. null. Styli 5. Drupa 1-sperma.

Ch. Sp. Fol. abrupte-pinnatis, foliol. lanceolatis octonis, petiolo alato. Europ. merid. ♂

Part. usual. Resina dicta Mastiche. (Ph. a. 1794.)

Praep. Tinctura mastiches composita. (Ph. a. 1794.) Spiritus mastiches compositus vulgo matricalis. (Ph. a. 1794.) Emplastrum stomachicum. Emplastrum defensivum rubrum. (Ph. a. 1794.) Balsamum Schae-rianum. Unguentum digestivum. Pulvis fumalis. (Ph. a. 1794.)

Pistacia vera, L. Hechte Pistazie.

N. off. Pistacia. F. n. et Ch. g. ut supra.

Ch. Sp. Fol. impari-pinnatis, foliol. quinis ovatis basi attenuatis apice acutiusculis submucronatis. Ital.

Gall. ፩

Part. usual. Nuclei.

Classis XXII. Dioecia. Ordo VI. Hexandria.

Cannabis sativa, L. Hanf.

N. off. Cannabis. F. n. Urticeae, Juss.

Ch. G. Mas. Cal. 5-phyllus, integer, latere hians.

Styli 2. Nux 2-valvis, intra calycem clausum.

Ch. Sp. Fol. digitatis. Apud nos culta. ⊖

Part. usual. Semina. (Ph. a. 1820.)

Praep. Oleum.

Humulus Lupulus, L. Hopfen.

N. off. Lupulus. F. n. Urticeae, Juss.

Ch. G. Mas. Cal. 5-phyllus. Cor. null. Fem. Cal. 1-phyllus, oblique patens, integer. Styli 2. Sem. 1, intra calycem foliatum (strobilum). Europa meridionalis. ፩

Part. usual. Amenta foeminea dicta turiones. (Ph. a. 1820.)

Praep. Extractum spirituoso-aquosum. (Ph. a. 1812.)

Lupulina. (Ph. bor. 1830.) Tinctura. Syrupus.

Ceratonia Siliqua, L. Johanniskroßbaum, Bockshörnel.

N. off. Siliqua dulcis. F. n. Leguminosae, Juss.

Ch. G. Hermaph. Cal. 5-partitus. Cor. null. Stam. 5.

Styl. filiformis. Legumen coriaceum, spermum.

Mas. et Fem. distincta.

Ch. Sp. Foliis alternis, pinnatis, quinquefusis, foliolis ovatis. Italia. Sicilia. ♂
Part. usual. Fructus. (Ph. a. 1775.)

Classis XXII. Dioecia. Ordo VIII. Octandria.

Populus nigra, L. Schwarzer Pappelbaum.
N. off. *Populus*. *F. n.* Amentaceae, Juss.
Ch. G. Mas. Amentum cylindraceum. Cal. squamae lacerae. Cor. turbinata, obliqua, integra. Fem. ut in mare. Stigm. 4-fidum. Caps. 2-locularis. Sem. papposa. (Fol. tremula.)
Ch. Sp. Fol. utrinque glabris acuminatis serratis deltoïdibus diametro longitudinali longiore. Europ. ♂
Part. usual. Oculi olim. (Germina frond.)

Classis XXII. Dioecia. Ordo IX. Enneandria.

Mercurialis annua, L. Bingelfraut.
N. off. *Mercurialis*. *F. n.* Euphorbiae, Juss.
Ch. G. Mas. Cal. 3-partitus. Cor. null. Stam. 9 s. 12. Anther. globosae, didymae. Fem. Styli 2. Caps. dicocca, 2-locularis, 1-sperma.
Ch. Sp. Caul. herbaceo brachiato, fol. oblongis glabris, flor. masculis spicatis. Apud nos. ⊖
Part. usual. Herba olim.

Classis XXII. Dioecia. Ordo XII. Monadelphia.

Juniperus Sabina, L. Sägewachholder, Säbenbaum.
N. off. *Sabina*. *F. n.* Coniferae, Juss.
Ch. G. Mas. Amentum ovatum. Cal. squama. Stam. 3. Fem. Cal. 3-partitus. Petala 3. Styli 3. Bacca 3-sperma, tribus tuberculis cal. inaequalis. (*Nux ossea*, 1-locularis basi glandul. balsamiferis.)

Ch. Sp. Fol. oppositis obtusis medio glandulosis, quadrifarium imbricatis, tenellis acutis oppositis, caul. fruticoso. Europ. merid. ♂

Part. usual. Frondes. (Ph. a. 1820.)

Praep. Conserva. Extractum. Tinctura simplex et composita. Oleum destill. (Ph. bor. 1850.)

Juniperus communis, L. Wachholder, Kadigg.

N. off. Juniperus. *F. n.* et *Ch. g.* ut supra.

Ch. Sp. Fol. ternis patentibus mucronatis bacca longioribus. In sylvis et locis arenosis. ♂.

Part. usual. Baccae maturae et lignum. (Ph. a. 1820.)

Resina dicta Sandaraca. (Ph. a. 1794.)

Praep Aqua, Oleum destill. Roob (baccarum). Spiritus (baccarum). (Ph. a. 1820.) Tinctura lignorum. Species decocti lignorum, Pulvis fumalis. (Ph. a. 1794.) Electuarium purgans. (Ph. a. 1794.) Electuar. Anodynum vulgo Theriaca Andromachae. Electuar. s. Theriaca Diatesseron. Unguentum (Ph. a. 1794.) Unguentum nervinum. (Ph. a. 1794.) Unguentum aromaticum. (Ph. a. 1820.) Unguentum contra vermes. Unguentum mendicorum. (Ph. a. 1775.)

Taxus baccata, L. Tarus.

N. off. Taxus. *F. n.* Coniferae, Juss.

Ch. G. Mas. Cal. 4-phyllus gemmae. Cor. null. Stam multa. Anther. peltatae, octofidae. Fem. Stylus null. Recept. cupulaeforme, nuce ovata (nuda).

Ch. Sp. Fol. linearibus distichis. planis, receptaculis masculis globosis. Europ. ♂

Part. usual. Baccae olim.

Ruscus aculeatus, L. Maasdorn.

N. off. Ruscus. *F. n.* Asparagi, Juss.

Ch. G. Mas. Cal. 6 - phyllus. Cor. null. Nect. centrale, ovatum apice perforatum. Fem. ut in mare. Sty. 1. Bacca 3 - locularis. Sem. 2.

Ch. Sp. Fol. mucronato - pungentibus, supra floriferis nudis. Europ. austr. ȳ

Part. usual. Radix.

Ruscus Hypoglossum, L. Zapfenfräut.

N. off. Vuularia. *F. n.* et *Ch. g.* ut supra.

Ch. Sp. Fol. supra floriferis sub foliolo. Hungar. Ital. ȳ

Part. usual. Herba.

Classis XXIV. Cryptogamia. Ordo I. Filices.

Polypodium vulgare, L. Süßwurz, Lüpelfarrn.

N. off. Polypodium. *F. n.* Filices, Juss.

Ch. G. Sori subrotundi, sparsi, nudi.

Ch. Sp. Fronde profunde pinnatifida, glabra; lacinias approximatis, lanceolatis, obtusis crenulatis; soris biserialibus; caudice paleaceo. Europ. 2

Part. usual. Radix. (Ph. a. 1820.)

Praep. Extractum.

Adianthum Capillus Veneris. Frauenhaar, Krüppfarrn.

N. off. Capillus Veneris. *F. n.* Filices, Juss.

Ch. G. Sori oblongi v. subrotundi. Indusiis membranaceis, e margine ortis, interius dehiscentibus, inserti.

Ch. Sp. Fronde bipinnata, pinnulis obovato-coneatis inciso sublobatis, lacinias fertilium sorolineari-oblongo terminatis, sterilibus, serratis. In rupibus Germ. 2

Part. usual. Herba. (Ph. a. 1799.)

Praep. Syrupus. (Ph. a. 1794.)

Aspidium Filix mas, L. Farrenkraut, Johannswurzel.

N. off. Filix mas. F. n. Filices, Juss.

Ch. G. Sori subrotundi, sparsi, indusia solitaria articulata v. reniformia medio v. latere affixa.

Ch. Sp. Fronde bipinnata: foliolis oblongis, obtusis, serratis; soris biserialibus; rachi stipitique paleaceis. Europ. 2.

Part. usual. Radix seu potius stipes subterraneus. (Ph. a. 1820.)

Praep. Oleum filicis maris, juxta alias extractum resinous filicis maris. (Ph. bor. 1830.) Apua stillata. Tinctura.

Scolopendron officinale, L. Gemeine Hirschjunge.

N. off. Scolopendron. F. n. Filices, Juss.

Ch. G. Sori lineares transversales sparsi, indusium duplex, utrumque latus sori occupans, superficium, quasi sutura longitudinali dehiscens.

Ch. Sp. Frondibus lato-lanceolatis, basi cordatis, stipite paleaceo. In Europ. umbrosis nemorosis saxosis. 2.

Part. usual. Herba.

Equisetum arvense, L. Zinnkraut.

N. off. Equisetum minor. F. n. Filices, Juss.

Ch. G. Receptacula peltata plana polygona spicata, subtus: Indusiis 4-7-corniculatis clausis tandem longitudinaliter rumpentibus, et fructificationes occultantibus asita. Stam. 4. Germ. ovatum. Styl. nullus. Sem. unicum.

Ch. Sp. Caulib. sterilibus simpliciter ramosis ramis scabriusculis tetragonis; fructificantibus simplicibus, vaginis cylindraceis inciso-dentatis, dentibus acutis. In Europ. locis depresis. 2.

Part. usual. Herba.

Classis XXIV. Cryptogamia. Ordo II. Musci.

Lycopodium clavatum, L. Verlaggenmoos, Johanesgürtel.

N. off. *Lycopodium*. *F. n.* *Musci*, Juss.

Ch. G. Caps. uniloculares, reniformes; polyspermae, bivalves, elastice dissilientes.

Ch. Sp. Caul. repente: ramis adscendentibus, foliis sparsis, confertis nerviis, incurvato-setigeris, spicis subgeminatis, cylindriaceis, pedunculatis, squamis ovatis, acuminatis setigeris erosodenticulatis. Europ. 2

Part. usual. Semen. (Ph. a. 1820.)

Classis XXIV. Cryptogamia. Ordo III. Algae.

Cetraria Islandica, Achar. Blütungenmoos.

N. off. *Lichen islandicum*. *F. n.* *Lichenes*, Juss.

Ch. G. Sporocarpia scutellata, orbiculata, lamina proligera in medio adnata, et margine subtus libero circumdata.

C. Sp. Thalo caespitoso, erecto, sub cartilag. olivaceobadio, subtus albidiiori, laciniis multifidis, canaliculatis, dentato-ciliatis, fertilibus dilatatis; scutellis appressis, planis, concoloribus, subintegerrimis. Europ. septentr. in montibus. 2

Part. usual. Planta integra. (Ph. a 1820.)

Praep. Gelatina. Trochisci. Chocolada.

Parmelia parietina, Achar. Wandflechte.

N. off. *Lichen parietinus*, *F. n.* *Lichenes*, Juss.

Ch. G. Sporocarpia urceolata, scutellata, disciformia. Lamina proligera, discum efformans, substantia thallode, strato corticali tecta, substrata.

Ch. Sp. Thalo orbiculari flavo v. luteo, subtus pallidiiori subfibrilloso, lobis planis, apice dilatatis

~~artulus~~ crenatis, scutellis concoloribus, integerrimis.

Germ. 24

Part. usual. Tota planta. (Ph. a. 1820.)

Sphaerococcus Helmintochorton, Ag. Wurmmooß.

N. off. Helmintochorton. *F. n.* Lichenes, Juss.

Ch. G. Frons sub coriacea vel expanso-plana et tunc aut dichotoma aut pinnata, vel filiformis. Fru-
ctus: Capsulae (sporangia) sphaericae, intus faventes nucleus globosum sporidiorum rotun-
dorum.

Ch. Sp. Fronde cartilaginea tereti cespitosa implicata,
caule filiformi repente, ramis setaceis subdicho-
tomis obsolete transversim striatis. Ad litora
maris mediteraneae.

Part. usual. Tota planta.

Praep. Gelatina.

Classis XXIV. Cryptogamia. Ordo IV. Fungi.

Lycoperdon Bovista, Pers. Gemeiner Flockenstreuling.

N. off. Crepitas Lupi. *F. n.* Fungi, Juss.

Ch. G. Sporangium subglobosum, saepe in stipidem
attenuatum et radicatum.

Ch. Sp. Peridium membranaceum, duplex, exterius in-
teriori adnatum demum in furfur fatiscens ve-
ruculosum, squamulosum v. spinulosum. Spo-
rae capillicio inspersae, subglobatae. Europ. in
sylvis.

Part. usual. Fungus c. polline. (Ph. a. 1775.)

Elaphomyces officinalis, Pers. Hirschbrunst.

N. off. Boletus cervinus. *F. n.* Fungi, Juss.

Ch. G. Sparangium arhizum (subterraneum) non de-
hiscent. Peridium sublignosum. Sporae conglo-
batae, capillito inspersae.

Ch. Sp. Subterraneus, subglobosus durus granulatus
v. laeviusculus fuscus intus e purpureo niger.
In sylvis sub terra.

Part. usual. Fungus.

Polyporus officinalis, Fries. Verchenschwamm.

N. off. Agaricus albus. *F. n.* Fungi, Juss.

Ch. G. Pileus carnosolentus vel suberosus, subsessilis,
passim stipitatus, substantia floccosa sicca. Ve-
lum nullum. Hymenium cum pilei substantia
homogeneum et concretum, poris subrotundis
pertusum, dissepimentis ascigeris. Sporis exi-
guis.

Ch. Sp. Apus, pileo suberoso-carnoso ungulate zonato
glabro, poris lutescentibus, sessilis, convexo-
planus, annulis discoloribus fulvis, poris ochro-
leucis. In sylvis apud nos.

Part. usual. Totus fungus.

Exidia Auricula Judae, Fr. Höllunderschwamm.

N. off. Fungus sambuci. *F. n.* Fungi, Juss.

Ch. G. Recept. molle, gelatinosum, horizontale, sub-
marginatum, supra tantum fructificans, poli-
tum et glabrum, subtus villosum v. rugosum.
Hymenium persistens, papillis in plurimis te-
ctum demum costato - plicatum undulatumve.
Sporidia primo in tabulis magis v. minus obso-
letis inclusa, dein elastice exsudantia.

Ch. Sp. Sessilis, concava, flexuosa, nigrescens, utrin-
que venoso - plicata: subtus sublomentosa oliva-
ceo - cinerea. Ex Sambuco.

Part. usual. Fungus.

Boletus Ignarius, Feuerschwamm.

N. off. Agaricus chirurgorum. *F. n.* Fungi, Juss.

Ch. G. Hymenium poroso-tubulosum.

Ch. Sp. Pileo crasso, duro, glaberiusculo, ferrugineo-cinereo, margine porisque convexis, exiguis, cinnamomeis. Ex quercu robore et aliis arboribus.

Part. usual. Fungus decorticatus. (Ph. a. 1794.)

Agaricus muscarius, L. Gliegenschwamm.

N. off. Agaricus muscarius. *F. n.* Fungi, Juss.

Ch. G. Pileus stipitatus carnosus vel membranaceus, horizontalis, in adultis determinatus, nunquam effusus. Velum varium, vel nullum. Hymenium. Lamellae e centro vel basi radiantes, simplices, parallelae, immixtis plerumque brevioribus, e membrana duplice arcte connexa compositae, transversim planae, a pileo subdiscretae, longitudinaliter ascigerae.

Ch. Sp. Pilei margine striato, lamellis candidis, stipite subfarcto bulboso, volva squamosa. Germ.

Part. usual. Inferior caulis pars.

Praep. Tinctura.

I n d e x.

A.	P a g.		P a g.
<i>Allium Cepa</i>	37		
— <i>sativum</i>	—		
— <i>victorialis</i>	36		
<i>Alsine media</i>	35		
<i>Althaea officinalis</i>	80		
<i>Ammi majus</i>	27		
<i>Amomum</i>	—		
<i>Amygdalus communis</i>	50		
— <i>persica</i>	49		
<i>Anagallis arvensis</i>	17		
<i>Anethum Foeniculum</i>	32		
— <i>graveolens</i>	—		
<i>Angelica Archangelica</i>	30		
<i>Anemone hepatica</i>	62		
— <i>nemorosa</i>	—		
— <i>pratensis</i>	—		
<i>Anisum</i>	33		
<i>Anserina</i>	54		
<i>Anthemis Cotula</i>	97		
<i>Antirrhinum Linaria</i>	74		
<i>Anthora</i>	60		
<i>Apium graveolens</i>	33		
<i>Petroselinum</i>	—		
<i>Aquifolium</i>	15		
<i>Aquilegia vulgaris</i>	61		
<i>Arbor vitae</i>	106		
<i>Arum</i>			
<i>Asar</i>			
<i>Aspa</i>			
<i>Aspl</i>			
<i>Aspi</i>			
<i>Atro</i>			
<i>Aver</i>			
<i>Bard</i>			
<i>Basil</i>			
<i>Becc</i>			
<i>Bella</i>			
<i>Belli</i>			
<i>Berb</i>			
<i>Beta</i>			
<i>Beton</i>			
<i>Bisto</i>			
<i>Boleti</i>			
<i>Borag</i>			

	Pag.		Pag.
Arbutus Uva ursi	45	Botrys	25
Arctium Bardana	90	— mexicana	—
— Lappa	—	Brassica Napus	78
Aristolochia longa	100	— Rapa	79
— rotunda	—	Bryonia alba	108
— Pistochia	101	— dioica	—
Arnica montana	94	Bupleurum rotundifolium	27
Artemisia Abrotanum	91	Buxus sempervirens	101
— Absynthium	92	C.	
— Dragunculus	93	Calamintha montana	73
— pontica	92	Calamus aromaticus	39
— vulgaris	—	Calendula officinalis	99
Arum maculatum	105	Cannabis sativa	111
Asarum europaeum	47	Capillus Veneris	114
Asparagus officinalis	38	Capparis spinosa	56
Asphodillus ramosus	—	Capiscum annuum	21
Aspidium Filix mas	115	Cardamine pratensis	77
Atropa Belladonna	20	Cardiaca	70
Avena sativa	11	Carduus benedictus	99
B.		Carex arenaria	101
Bardana	90	Carica	109
Basilicum	73	Cariophyllum ruber	46
Beccabunga	8	Caryophyllata	55
Belladonna	20	Carlina acaulis	89
Bellis major	96	Carthamus tinctoria	—
— minor	—	Carum carvi	32
— perennis	—	Carvi	—
Berberis vulgaris	39	Cataputia minor	48
Beta alba	26	Cataria	65
— cycla	—	Centaurea Cyanus	98
— rubra	—	— benedicta	99
— vulgaris	—	Centaurium minus	23
Betonica officinalis	70	Centumnodium	42
Bistorta	42	Cepa	37
Boletus cervinus	117	Cerasa nigra	50
— ignarius	119	Ceratonia Siliqua	111
Borago officinalis	16	Cerefolium	31
		Cetraria Islandica	116

	Pag.		Pag.	
<i>Chamaepytis</i>	64	<i>Cucumis asininus</i>	11	Eru
<i>Chamomilla romana</i>	97	— <i>Melo</i>	108	Ery
— <i>vulgaris</i>	—	<i>Cucurbita lagenaria</i>	107	Ery
<i>Cheiranthus Cheiri</i>	78	— <i>Pepo</i>	108	Esu
<i>Cheirus</i>	—	<i>Cyanus</i>	98	Eup
<i>Chelidonium majus</i>	56	<i>Cyclamen europaeum</i>	17	Eup
<i>Chenopodium Bonus Hen- ricus</i>	25	<i>Cydonia vulgaris</i>	52	Eup
<i>Chenopodium Ambrosioides</i>	—	<i>Cynanche Vincetoxicum</i>	23	Eup
— <i>Botrys</i>	—	<i>Cynosbatum</i>	53	Exic
— <i>Vulvaria</i>	—	<i>Cynoglossum officinale</i>	16	Fab
<i>Chrysanthemum Leucan- themum</i>	96	<i>Cyperus esculentus</i>	11	Farf
<i>Chrysanthemum Parthe- nium</i>	—	— <i>officinalis</i>	—	Ficu
<i>Cicuta virosa</i>	30	D.		Fili
— <i>vulgaris</i>	27	<i>Daphne Mezereum</i>	41	Fili
<i>Cichorium Endivia</i>	89	<i>Datura Stramonium</i>	19	Fili
— <i>Intybus</i>	—	<i>Daucus Carota</i>	28	Flan
<i>Citrus Aurantium</i>	58	<i>Delphinium consolida</i>	59	Foer
— <i>medica</i>	—	— <i>Staphisagria</i>	60	Foer
<i>Clematis erecta</i>	62	<i>Dentaria</i>	18	Frug
<i>Cochlearia Armoracia</i>	76	<i>Dictamnus albus</i>	43	Frar
— <i>officinalis</i>	—	<i>Digitalis purpurea</i>	75	Fum
<i>Colchicum autumnale</i>	41	<i>Doronicum Pardalianches</i>	95	Fung
<i>Conium maculatum</i>	27	<i>Dragunculus</i>	93	Galle
<i>Consolida major</i>	16	<i>Dracocephalum Moldavicum</i>	73	Gale
— <i>media</i>	63	<i>Drosera rotundifolia</i>	36	Gall
— <i>regalis</i>	59	<i>Dulcamara</i>	20	Geni
<i>Convallaria majalis</i>	58	<i>Dianthus Caryophylus</i>	46	Gent
— <i>Polygonatum</i>	—	E.		Geun
<i>Convolvulus arvensis</i>	18	<i>Ebulus</i>	34	Gladi
<i>Conyzza</i>	94	<i>Ecchium vulgare</i>	17	Geni
<i>Coriandrum sativum</i>	30	<i>Elaphomyces officinalis</i>	117	Geni
<i>Cornus mascula</i>	15	<i>Equisetum arvense</i>	115	Geni
<i>Cotinus</i>	34	— <i>minus</i>	—	Geun
<i>Cotula foetida</i>	97	<i>Erithrea Centaurium</i>	23	Gladi
<i>Crepitas Lupi</i>	117			
<i>Crocus sativus</i>	10			

	Pag.		Pag.
Eruca	79	Glechoma hederacea	69
Eryngium campestre	26	Glycyrrhyza glabra	84
Erysimum aliaaria	78	Gnaphalium arenarium	93
— officinale	—	Gramen	13
Esula	48	Granatum	49
Eupatorium cannabinum	90	Gratiola officinalis	8
Euphorbia helioscopia	48		
— Lathyris	—		
Euphrasia officinalis	74	Hedera arborea	22
Exidia Auricula Judae	118	— helix	—
		— terrestris	69
		Helleborus foetidus	63
		— niger	—
Faba	83	Helenium	94
Farfara	95	Helminthochorton	117
Ficus carica	109	Hepatica nobilis	62
Filipendula	52	Heracleum Sphondilium	29
Filix mas	115	Hieracium Pilosella	88
Flamula jovis	62	Hippocastanum	41
Foenicum	52	Hordeum vulgare	12
Foenum graecum	86	Hydropiper	42
Frugaria vesca	54	Hyoscyamus niger	19
Frangula	21	Hypericum perforatum	61
Fumaria officinalis	81	Hysopus officinalis	65
Fungus sambuci	118	Humulus Lupulus	111
G.		I.	
Gallega officinalis	84	Jacea	23
Galeopsis grandiflora	69	Ilex aquifolium	15
Gallium luteum	14	Imperatoria Ostruthium	31
— Mollugo	13	Inula dysenterica	94
— verum	14	— Helenium	—
Genista	82	Iris florentina	11
Gentiana alba	28	— germanica	—
— lutea	24	— Iuglans regia	103
— pannonica	—	— Iuniperus communis	113
Geum rivale	55	— Sabina	112
— urbanum	—		
Gladiolum coeruleum	11		

	Pag.		Pag.
		L.	M.
<i>Lactuca sativa</i>	87	<i>Majorana</i>	71
— <i>scariola</i>	—	<i>Malva alcea</i>	81
— <i>sylvestris</i>	—	— <i>arborea</i>	80
— <i>virosa</i>	88	— <i>rotundifolia</i>	—
<i>Lagenaria</i>	107	— <i>sylvestris</i>	81
<i>Lamium album</i>	69	— <i>vulgaris</i>	—
<i>Lappa major</i>	90	<i>Marubium album</i>	70
<i>Lapathum acutum</i>	40	— <i>vulgare</i>	—
<i>Laryx</i>	105	<i>Marum verum</i>	64
<i>Laserpitium latifolium</i>	28	<i>Mastix</i>	110
— <i>Siler</i>	29	<i>Matricaria Chamomilla</i>	97
<i>Laurocerasus</i>	50	— <i>Parthenium</i>	96
<i>Laurus nobilis</i>	43	<i>Melilotus coerulea</i>	85
<i>Lavandula spica</i>	66	— <i>officinalis</i>	—
— <i>Stoechas</i>	—	<i>Melissa Calamintha</i>	73
<i>Ledum palustre</i>	44	— <i>citrina</i>	72
<i>Leonurus Cardiaca</i>	70	— <i>officinalis</i>	—
<i>Leontodon Taraxacum</i>	88	— <i>turcica</i>	73
<i>Lepidium sativum</i>	76	<i>Melo</i>	108
<i>Levisticum</i>	29	<i>Menianthes trifoliata</i>	17
— <i>islandicus</i>	116	<i>Mentha aquatica</i>	68
— <i>parietinus</i>	—	— <i>crispa</i>	—
<i>Ligusticum Levisticum</i>	29	— <i>piperita</i>	67
<i>Lilium candidum</i>	37	— <i>Pulegium</i>	68
— <i>convalium</i>	38	— <i>sylvestris</i>	67
<i>Linaria</i>	74	— <i>viridis</i>	—
<i>Linum catharticum</i>	36	<i>Menthastrum</i>	—
— <i>usatissimum</i>	35	<i>Mercurialis annua</i>	112
<i>Liquiritia</i>	84	<i>Mezereum</i>	41
<i>Lithospermum officinale</i>	15	<i>Millefolium</i>	98
<i>Losanthus europaeus</i>	39	<i>Mollugo</i>	13
<i>Lupinus albus</i>	83	<i>Momordica Elaterium</i>	107
<i>Lupulus</i>	110	<i>Morus alba</i>	102
<i>Lychmis dioica</i>	47	— <i>nigra</i>	—
<i>Lycopodium clavatum</i>	116	<i>Myrtillus</i>	44
<i>Lycoperdon Bovista</i>	117	<i>Myrtus communis</i>	49
<i>Lythrum Salicaria</i>	47		

	Pag.		Pag.
		N.	
<i>Napus</i>	78	<i>Paris quadrifolia</i>	42
<i>Nasturtium aquaticum</i>	77	<i>Parmelia parietina</i>	116
— <i>hortense</i>	76	<i>Parnassia pallustris</i>	35
— <i>pratense</i>	77	<i>Pastinaca Opopanax</i>	31
<i>Nepeta cataria</i>	65	et — <i>sativa</i>	
<i>Nicotiana tabacum</i>	19	<i>Pepo</i>	108
<i>Nigella sativa</i>	61	<i>Persfoliata</i>	27
<i>Nymphaea alba</i>	57	<i>Persica</i>	49
		<i>Petasites</i>	95
		<i>Petroselinum</i>	33
		<i>Peucedanum officinale</i>	28
		<i>Phaseolus vulgaris</i>	83
		<i>Phellandrium aquaticum</i>	30
		<i>Physalis Alkekengi</i>	20
		<i>Pilosella</i>	88
		<i>Pimpinella alba</i>	32
		— <i>Anisum</i>	33
		— <i>magna</i>	—
		— <i>nigra</i>	—
		— <i>rubra</i>	103
		— <i>Saxifraga</i>	32
		<i>Pinea</i>	105
		<i>Pinus Abies</i>	106
		— <i>Larix</i>	105
		— <i>Picea</i>	106
		— <i>Pinea</i>	105
		— <i>sylvestris</i>	—
		<i>Piper hispanicum</i>	21
		<i>Pistacia Lentiscus</i>	110
		— <i>vera</i>	111
		<i>Pistolochia</i>	101
		<i>Plantago lanceolata</i>	14
		— <i>media</i>	—
		— <i>Psyllium</i>	—
<i>Paeonia officinalis</i>	59	<i>Plumbago europaea</i>	18
<i>Papaver album</i>	57	<i>Polygonum</i>	65
— <i>Rhoeas</i>	56	<i>Polygala amara</i>	82
— <i>somniferum</i>	57	— <i>vulgaris</i>	—
<i>Parietaria officinalis</i>	102	<i>Polygonatum</i>	58

	Pag.		Pag.	Poly
Saponaria officinalis	46	Sphaerococcus	Helminto-	
Satureja hortensis	65	chorton	.	117
Satyrion	100	Spicca celtica	.	10
Saxifraga granulata	45	Spina cervina	.	21
Scabiosa arvensis	13	Spirea Filipendula	.	52
Scandix Cerefolium	31	— Ulmaria	.	53
Scilla maritima	37	Stachys recta	.	70
Sclarea	7	Staphysagria	.	60
Scolopendron officinale	115	Stoechas citrina	.	93
Scordium	64	Stramonium	.	19
Scorzonera hispanica	87	Sympitium officinale	.	16
Serophullaria aquatica	75			
— foetida	—			
— nodosa	—			
Secale cereale	12		T.	
Sedum acre	46	Tomarix gallica	.	35
— majus	49	Tanacetum vulgare	.	91
— Telephium	46	Taraxacum	.	88
— vermiculare	—	Taxus baccata	.	113
Sempervivum tectorum	49	Teucrium Chamaedrys	.	64
Senecio vulgaris	93	— Marum	.	—
Serpillum	72	— Polium	.	65
Seseli creticum	29	— Scordium	.	64
Sideritis hirsuta	66	Thelephium	.	46
Siliqua dulcis	111	Therebinthina	.	106
Siler montanum	2	Thlapsi arvense	.	78
Sinapis alba	79	— bursa pastoris	.	77
— nigra	—	— Thuja occidentalis	.	106
Sisymbrium Nasturtium	77	Thymus Serpyllum	.	72
— Sophia	—	— vulgaris	.	—
Solanum Dulcamara	20	Tilia europaea	.	58
— nigrum	—	Tordilium officinale	.	29
— vesicarium	—	Tormentilla erecta	.	55
— vulgare	—	Tragagantha	.	85
Solidago Virga aurea	93	Tragopogon pratense	.	86
Sonchus oleraceus	87	Trifolium fibrinum	.	17
Sophia	77	— repens	.	86
Sorbus aucuparia	51	Trigonella foenum graecum	.	86
Spartium scoparium	82	Triticum repens	.	13

	P. ^{ag.}		P. ^{ag.}
Polygonum aviculare	42	Rhus Coriaria	34
— Bistortae	—	— Colinus	—
— Hydropiper	—	— Ribes nigrum	22
Polypodium vulgare	114	— rubrum	21
Polyporus officinalis	118	Ribesium nigrum	22
Poma	52	— rubrum	21
Populus nigra	112	Ricinus communis	107
Potentilla Anserina	54	Rosa canina	53
— reptans	55	— centifolia	—
Poterium sanguisorba	103	— gallica	—
Prunella vulgaris	74	— rubra	—
Prunus avium	51	Rosella	36
— Cerasus	50	Rosmarinus officinalis	8
— domestica	51	— sylvestris	44
— Laurocerasus	50	Rubia tinctorum	14
— Padus	—	Rubus Idaeus	54
— spinosa	51	— fructiosus	—
Psyllium	14	Rumex acetosa	41
Ptarmica	98	— acutus	40
Pulegium	68	— patientiae	—
Pulmonaria officinalis	16	— scutatus	—
Pulsatilla nigricans	62	Ruscus aculeatus	114
Punica Granatum	49	— Hypoglossum	—
Pyrethrum	98	Ruta graveolens	44
Pyrola rotundifolia	45		
Pyrus malus	52		
		S.	
		Sabina	112
		Salep	99
Quercus austriaca	104	Salicaria	47
— pedunculata	—	Salix alba	109
— Robur	—	Salsola Kali	26
		— Soda	—
		Salvia officinalis	9
		— Selarea	—
Ranunculus albus	62	Sambucus Ebulus	34
Rapa	79	— nigra	—
Raphanus sativus	—	Sanguisorba officinalis	15
Rhamnus catarticus	21	Sanicula europaea	27
— Frangula	—	Santolina Chamae Cypa-	—
— Zizyphus	—	rissys	91
Rhaponticum	43		
Rheum rhabonticum	—		

	Pag.		Pag.
Triticum sativum	12	Valeriana officinalis	9
Tussilago Farfara	95	— Phu	10
— Petasites	102	— sylvestris	9
Ulmaria	53	Verbascum Thapsus	18
Ulmus campestris	24	Veronica Beccabunga	8
Urtica dioica	102	— officinalis	7
— major	—	Vicia Faba	83
— urens	—	Vinca minor	23
Uva ursi	45	— pervinca	—
V.	—	Vincetoxicum	—
Vaccinium Myrtillus	44	Viola odorata	22
— Vitis Idea	45	— tricolor	23
Valeriana celtica	10	Virga aurea	93
	—	Viscum album	110
	—	— quercentum	39
	—	Vitis idea	45
	—	Vitis vinifera	22
	—	Vuulvaria	25

Abbreviations et signorum expositio.

L.	— Linnée.	ḥ	Planta frutescens.
N. off.	— Nomen officinale.	ḥ	— arborescens.
F. n.	— Familia naturalis.	P.	usual. — Partes usuales.
Ch. G.	— Character Generis.	Praep.	— Praeparata.
Ch. Sp.	— Speciei.	Ph. a.	— Pharmacopoea Au-
○	Planta annua		striaca.
♂	— biennis	Ph. bor.	— Pharm. Borussica.
♀	— perennis.	Col.	— Colitur.

J

