

FRANCISCUS  
ARCÆUS  
MEDICUS BENEDICTO

*Ariæ Montano Theologo S.*

**C**HIRURGICAM curandi rationem, nobis affidua lectione, & longo usu comparatam, cuius editionem tu à me diu non postulaveras modò, sed religione etiam objecta flagitaveras; quanquam ipsa medicinæ exercitatione vehementer occupatus, tandem tamen ad publicam utilitatem conscripsi: quam cùm longiorem & copiosiorē esse illa ipsa curandi negotia non finerent, certam tamen, & diligenti experimentorum fide comprobatam esse, effecerunt. Cujus rei testimonia, illustrissimaque exempla, cùm nobis abundè occurrent, quædam solum addere placuit ad difficiliores rationes spectantia, quorum tu, dum Llerenæ euangelicam pietatem publicè docens à me chirurgiam disceres, testis affuisti; nam ferè eodem tempore hæc omnia exempla simul edita sunt.

H 5 D E

DE VULNERIBUS  
in capite Exemplum.

Quantum simplicibus capitibus vulneribus, in quibus cranium lœsum non sit, loci ad aperiendum consuetudo vulgata contra id quod initio præcepimus, tum nocumenti tum moræ ad sanandum afferre possit, præter alia multa exempla, unum illud satis confirmat, quod in Joanne Gometio de columbis Cazzallensi editum est, qui Philippi Regis nostri stipendiis terras montesque mineralium investigandi causa rimatur: is dum altè defosso specu unà cum operario inquisitione suæ operam daret, ad conspectam repente glebam, quæ metalli specimen habere videbatur, manu tollendam sese festinus demittit, quem socius imprudens librato jam atque improviso iētu ligonis altero dente oblique, ac non grayiter percussit in dextera capitibus parte, super os quod laterale dicitur: nec verò vulnus ad cranium pertigit, neque ullam rupti ossis significationem dedit, quoniam revera os minimè fuerat lœsum. Huic imperitus chirurgus, vulnus adaperiens, vehementer auxit, crucemq[ue] tribus digitis quadratam incidit, & cranium satis pro arbitrio detexit: deinde

deinde multos dies digestivis, & oleo usus est, adeò profusè, ut ultra quindecim regios nummos oleo, & ovis adhibendis impendisse dictus sit: ex quo evenit, ut non modò detecta cranij pars, sed multo etiam major undique portio corrupta fuerit. tandem post alterum jam mensem cùm ego à D. Francisco Mendocio, qui Regis mandato metallorum rationibus & operibus, curæque omni præerat, accersitus hominem visissim, Llerenam, ubi publico stipendio medicam artem exercebam, adduci iusti. Huic cùm satis magnam ossis partem extrahere opus esset, quæ tamen angustiori vulneris apertione produci non posset, cumque ego tantundem aperire recusarem, orificium ad argentei nummi, quem regium vocant, magnitudinem trepanis feci, ita ut membranæ extarent, atque ea parte pus quod intus corruptum erat, quodque in dies conficiebatur, purgari posset; atque ita balsamo illo à me descripto & emplastro, de gummi elemij, & filis tam diu curationem prosecutus sum, quo ad instrumentis leviter quotidie expertus, os ipsum circumquaque abscissum esse, & duram matrem superinducta jam carne constare intellexi. Igitur ut os ipsum magnum minori multo foramine extra-

## 180 DE CURAN. VULNER.

herem, instrumentum mihi ad trepani  
instar comparavi, quo foramen facerem,  
quantum ferreus fusus foeminarum no-  
stratum facere possit: quo ferro conti-  
guis ferri pertusionibus in crucis mo-  
dum os totum corruptum perforavi;  
opus autem ipsum à medio loco incep-  
ram, qua superius vulneris ipsius oscu-  
lum patebat, quod ad argentei nummi  
magnitudinem paraveram. Foraminum  
vero intercapedinem, levatore dicto in-  
strumento interrupi: facilè enim os ip-  
sum rumpenti cedebat. Hæc ubi jam  
expedieram, unam primum ex his qua-  
tuor portionibus instrumento attollens,  
extraxi, & alteram deinde, & tertiam:  
quartam, quæ maxima erat, in poste-  
ram diem reliqui; quam tandem extra-  
xi. Totum autem os laterale appellatum,  
& pétrosi etiam ejusdem lateris bona  
pars, & coronalis quoque non exigua  
portio, quæ in anteriorem partem ver-  
git, extracta est; ex petroso prodit quan-  
tum ferè ad auriculæ originem extendi-  
tur. His autem ossibus extractis, dura  
mater quæ jam interim inducere carnem  
cœperat, ultra modum etiam induxit,  
adeò ut exuperantem carnem ex orificio  
illo, quod jam pridem feceram, bis fue-  
rim coactus rescindere: adeò autem du-  
ram experiebar, ut forcipibus vix possem  
rescin-

rescindere. Post hæc autem cùm melius habere statim cœpisset, Cazzallam discessit à quo post mensem ferè accersitus sum, quòd in capite super occipitis ipsius os, magnum tumorem ac pure etiam plenum haberet. quem cùm aperuisssem, ossa multo etiam magis, quàm quæ prædicta sunt, corrupta esse deprehendi: tum vero Llerenam ad me venire jusso, postera die satis ex arte subtiliter ossa extraxi tria etiam prædictis æqualia, sed multo magis corrupta. Relictus autem est toto ferè occipitis osse carens, atque portione etiam non exigua alterius lateris ossis sinistri. vulnera autem ipsa carne & cute undiquaque obducta sunt: molli tamen & tactui cedente constitutione, quæ pautim durescit homo autem ipse divino beneficio liberatus bene habet.

*De Barriga exemplum.*

**B**Arriga satis apud Llerenenses notus homo, vulnus longiori (quem verdugum, nostri vocant) in pectore accepit, secundum sinistram mamillam duorum digitorum spatio ferè distans, prodidit autem gladius recta via juxta spinam medullarem, quanta digiti unius crassitudo est, à spina devians, paulum subtergi osse prominens, & pulmonis pinna  
sive

sive ala sinistra , non longè à corde , ut  
situs ipse indicat , trajecta est . Curatus  
autem est ea ratione , quæ à nobis primo  
posterioris libri capite descripta est :  
dumque curatio procederet , decima ,  
postquam vulneratus est die , sanguis ex  
pulmonis vulnere satis copiosus erupit ,  
ob continuum pulmonis motum , qui in-  
tra pectus ipsum confluens concretus  
est . proxima autem curatione , magnæ  
concreti sanguinis portiones , unà cum  
pure confecto ex vulnere prodierunt ,  
non sine adstantium admiratione , quòd  
majores etiam viderentur partes , quām  
ut exitura capi & emitti posse crederen-  
tur . His animadversis accidentibus , cùm  
nimiam quotidie puris copiam bis sin-  
gulis diebus curatum effundere viderem ,  
intentionem mutare decrevi : atque eo  
modo quo fistulas curari docuimus , ex-  
perire constitui , statimque incepi . Cùm  
autem per duos dies eam quæ illic de-  
scripta est , aquam bibendam exhibuis-  
sem , omnis sanguis concretus unà cum  
pure tandem prodijt , duobus alteris die-  
bus pus etiam defecit , statimque febri  
liberatus est : ac brevissimè sanus , adeò  
atque adeò pinguis evasit , ut magna iis  
qui hominem viderint , divinarum lau-  
dum materia oblata sit , vivit ille & opti-  
mè habet .

DE  
QUODAM LUDOVICI

Zapatæ familiari exemplum.

Homo hic D. Ludovici Zapatæ familiaris pugione lato quater petitus à tergo & percussus est sinistro latere: sed ex illis vulneribus unum sex digitorum spatio sub humero acceptum est. quod scapulare os cum tentasset, resiliente ferro, inter os ipsum, & carnem, quantum septem transversis digitis mensus sæpe sum, descendit, quo ad scapulæ regione transmissa inter costarum spatia mucro obtrusus ad cavitatem ipsam corporis penetravit. Ante autem quam ego accersitus accederem, copiosum sanguinem ex omnibus vulneris partibus diffusum, in cavitatem ipsam promanasse, ex ijs quæ postea acciderunt, conjecturam facio: ille vero sanguis fossis promanare non potuit, quod cute & carne obductum vulnus deorsum penetrabat, quo influxus commodius tendere verosimile est: nam prima mucronis apertio altior erat quam ut sanguis commodè erumperet. Ita ego cum primam curationem incepisse, nequi negressum directum invenirem, non magis quam cætera penetrasse existimassem,

nisi

nisi diligentius etiam tacto loco , & dī-  
gito immisso , vulnus illud deorsum ul-  
terioris , quam ipse dīgito persequi pos-  
sem , descendere cognovissem . Cum  
igitur ad cavitatem penetrare vulnus de-  
prehendissem , locum eregione costarū  
rum , quā penetrare intellexi , aperui ,  
incisa ex directo cute & carne , ita ut  
immissus digitus ad interiora facile ad-  
mitteretur , & pulmonem etiam qui se-  
cundūm spinam est , attingeret .

Curatus autem est eo quem descripsi-  
mus , modo in vulneribus pectoris pene-  
trantibus . Ac primis quidem curationi-  
bus nullum pus confectum est , sed quæ-  
dam tantūm humiditas exigua admo-  
dum effluebat . Quarta verò die aqua  
sanguineo colore effluit , qualis ea est  
in qua carnes lavantur , in dies autem  
consequentibus curationibus , copiosius  
effluebat , adeò ut singulis curationibus  
vas , quod scutellam vocamus , impleret .  
utque commodè , & citò efflueret , æ-  
grum tussire , aut respirationem conti-  
nere jubebam : quatur autem per singu-  
los dies à me curabatur . Præter id autem  
quod inter curandum effluxerat , noctu  
ac diu fluxus ipse non sistebatur , adeò  
ut lectus lacunæ instar haberet . Igitur  
quarta die , cùm hujusmodi aquæ efflu-  
xum sine ulla puris specie perseverare  
adhuc

adhuc conspexisse, aquam illam nobis proximo exemplo indicatam ægrotō exhibere institui: statim autem ex quo bibere cœpit, per duodecim dies major aquæ sive saniei copia, sine ulla hominis noxa, aut gravi aliquo sensu prodijt; sed ita adeò ut secundo die subalbida & liquida prodierit; tertio autem die multo etiam albior, quoad ita alba & densa prodijt, vase, in quo excipiebatur, tenacius hærens, ut vix etiam inclinata deflueret. parcus autem in dies prodibat, usque ad duodecimam, qua tandem defecit, atque vulneris ostium subito ab interiori parte occlusum est: quod quanquam ego ferramentis nonnunquam adaperirem; nihil tamen aut puris, aut ejusmodi humoris remittebat; neque spiritus ea ex parte, ut antea, reddebat: atque ita curatio processit, ægrotō adhuc continua febre correpto. quam ob rem tribus diebus aquæ illi binos hordei integri pugillos, & passularum tussarum cum suis acinis ternos; tamarindorum verò uncias binas addidi. atque hoc modo febris evanuit. Decima autem die post haec gravi pectoris difficultate & febri laborantem hominem offendit; cùmque ex vulnere illius aquæ, sive saniei copiam prodiisse sine pure deprehensum est; tenta indita plus adhuc saniei defluit.

xit. atque hoc modo per sequentes sex dies habuit, minus in dies aquæ ex vulnere emittens. Post hæc & fluxus constitit, & vulnus sanatum omnino est: atque homo ipse egregiè adhuc Dei salvatoris ope valet.

*De modo componendorum medicamentorum, & de nonnullis medicamentis, tum simplicibus tum compositis, ad omnes peccantes humores.*

Hi, qui medicinam facere aggreduntur, commoda & incommoda à medicamentis provenientia potissimum intelligere debent. hæc autem apud Avicennam, & Scriptores alios legi poterunt. cognoscendæ etiam sunt simplicium medicamentorum qualitates, nec non quas corporis partes respiciant. Sunt enim medicamenta; quæ peculiarem corporis partem roborant, ut *Mentha* totum corpus calefacit, sed *stomachum* potissimum, quod fit per quandam illius herbae, & *stomachi* sympathiam, ut alibi diximus de *Betonica*, *Melissa*, *Cucurbita*, *Chamæpity*, *Nuce Moschata*, *Chamædry*, *Lauro*, *Centaurio*, quæ caput respiciunt. Considerandum etiam est

est in decoctis præscribendis, ut quæ crassioris substantiæ sunt, primo loco ponantur; nam primo, & diutius decoquendæ sunt radices. secundo loco herbæ, tertio semina, quarto fructus, quinto flores, sexto aromata. Illud etiam sciendum est, quod radices, & semina pondere, herbæ manipulis, flores pugillis; fructus verò numero mensurantur. Exemplum contra obstructionem & calidam hepatis intemperiem syrpus ita describendus erit.

*Rx. Corticum citri radicum centaurij ana 3 ij.*

*corticum radicum apij fæniculi, petrofælini, quæ per noctem in aceto infusæ dam hepaticæ fuerint, ad calorem illarum contemppe- randum, ana 3 i.*

*secundo loco, endiviæ non lotæ, scariolæ, hepaticæ, lactucæ, scolopendrij capill. ven. ana. m. iii.*

*tertio loco, quatuor seminum frigidorum majorum, & minorum ana 3 ij.*

*quarto loco, prunorum fujubarum sebesten ana numero xxx.*

*quinto loco, florum violarum nymphæcæ, rosarum ana p. j. vini malorum grana- torum 3 v.*

*santalorum omnium ana 3 iij.*

*sacchari albi q. satis est, & fiat syrpus.* Ad fri-  
Exemplum in intemperie frigida. gid. he-  
*Rx. Cor-* patis.

188 DE CURAN. VULNER.

Rx. *Corticu[m] radicis raphani, fraxini, genistæ, apij, fæniculi, petroselini, graminis, asparagi ana* 3 j.  
*menthæ, melissæ, chamaedryos, chame-*  
*pityos ana m. j.*  
*quatuor seminum frigidorum majorum*  
*3 ij.*  
*florum chamæmeli, meliloti, stæchadis,*  
*rosmarini, genistæ ana pug. j.*  
*caricas pingues num. xx.*  
*squinati cinnamomi* 3 j.  
*sacchari mellis ana* 3 j.

Notandum est, quod in compositione  
syruporum laxativorum ponenda sunt,  
quæ laxandi vim habent inter flores, si  
tenuiorum partium sint; si verò sint par-  
tium crassiorum, inter aromaticæ, vel  
semina, & flores conjunge, pro ratione  
decoquendorem. Exemplum pro melan-  
cholico humore.

Pro  
humore  
melan-  
cholico.

Rx. *Corticu[m] superius dictorum* 3 j.  
*herbarum superiùs dictarum ana* 3 j.  
*deinde adde.*

Rx. *Senæ cuscute, polypodij quercini, semi-*  
*num cartami, agarici ana* 3 ij.  
*florum ameos violarum stæcadis ana p. j.*  
*potes deinde addere aromaticæ, & saccha-*  
*rum. post decoctas herbas facienda ta-*  
*men primò est colatura herbarum & ra-*  
*dicum, cui addenda sunt laxativa & aro-*  
*matica. Illud maximè observandum in*

me-

medicamentis præscribendis, ut herbæ manipulis radices unciis, flores pugillis, fructus numero præscribantur. In laxativorum compositione doses cognosci debent: est enim plus discriminis in illis quam in aliis medicamentis. & quia simplicium medicamentorum verae doses tradi non possunt, nisi cum delectu & ratione; ideo medicamentorum facultates peculiariter sunt cognoscendæ, & alia etiam quæ in illis exhibendis respicere oportet; quæ sunt, ægrotantis vires, temperatura, ætas; regio ipsa, & anni tempus, & ejusdem constitutio. ideo difficile est simplicium & compositorum medicamentorum doses tradere & docere, & pro ratione eorum, ex quibus componuntur, doses augendæ sunt vel minuendæ. Exemplum. Diacatholicon ex fortibus medicamentis non constat; ejus dosis est ʒ j. electuarium de succo rosarum, & diaphœnicon medicamenta fortiora recipiunt, nempe dacrydium: eorum dosis est ʒ ℥. cum sola exhibentur: cum vero aliis admiscentur, dosis erit immutanda. Exemplum in evacuatione cholerae & phlegmatis. cum. s. æquis portionibus commiscenda sunt medicamenta, dosis ita constituenda erit.

R. Electuarii diacartami, electuarii de succo rosarum ana ʒ ij.

Doses  
compos.  
medi-  
cam.

190 DE CURA N. VULNER.

*non autem ana* 3*fl.*

notandum etiam , quod si cholera magis redundant quam phlegma , tunc in majori dosi exhibendum erit electuarium de succo rosarum : si e contra major sit copia phlegmatis , diacartami dosis augenda erit . & hac ratione composita medicamenta miscenda sunt . Eadem ratione in simplicibus medicamentis procedendum .

purgatio Rx. Rhabarbari electi , turpeti gummosi ana  
3*fl.*

*spicæ Zinziberis ana* 3*j.*

*fiat pulvis cum saccharo.* & nota , quod rhabarbari dosis est 3*j. fl.*

Turpeti dosis illi æqualis est , sed ratione compositionis cum simul miscentur , dosis est minuenda . si vero simplex medicamentum exhibendum fuerit , in sua dosi integra exhibebitur . Exemplum in evacuatione cholerae .

Cholerā Rx. Electuarij de succo rosarum 3*fl.*  
purgat. exhibetur in aurora , in evacuatione phlegmatis .

Me- Rx. Diacartami 3*fl.*

lancho- in evacuatione melancholiæ .

liam Rx. Diasenæ 3*j.*

purgat. hic dosis augenda est ; nam medicina non est fortis . notandum est quod propter medicamentorum commisionem compositorum doses aliquando augentur , aliquando minuantur ut . Rx

Rx. electuarij de succo rosarum 3j.

diacartami 3 ij.

diacatholici 3 ij. ℥.

triferae sarracenicae 3 iiij.

pulveris trium santalorum 3 j.

specierum diagalangae 3 j.

masticis capill. ven. ana 3 j.

capiatur modo opiatæ. s. in sex diebus,  
nam opiatæ una dosis est 3 vj.

poteris & tuo judicio his addere de opiatis  
aliis 3 ij. vel iij.

in laxativis præscribendis; quibus non  
immutatis ad plures dies uti consuevi-  
mus. id observandum est, ut nostro ju-  
dicio illorum dosim augeamus vel mi-  
nuamus, prout ægrotantes laxiori, aut  
contumaciiori sunt alvo.

*Exemplum in educenda cholera rhabarbari*  
dosis 3 j.

usque ad 3 iij.

*corrigitur cum G. vi. spicæ & aliis quaæ*  
à Mesue traduntur, & nocte una in aqua  
endiviæ macerandum est.

*Tamarindorum dosis est à 3 ij.*

usque ad 3 j.

*& corriguntur cum aqua casei. dacrydij*  
dosis est 3 ℥.

*corrigitur cum G. ij. masticis, & aliis*  
quaæ tradit Mesues.

*Myrobalanorum citrinorum dosis est à*  
3 ij. ad 3 v.

in

*in infusione verò à 3 v. ad 3 xx.*

*myrobalanorum cepulorum tritorum dosis  
est à 3 ij. ad 3 iij.*

*in infusione verò à 3 iiiij. ad 3 x..*

*myrobalanorum empelliticorum tritorum  
ab aureo uno ad aureos tres in infusione  
ab aureis tribus ad aureos sex, corriguntur*

*Aloes. aqua casei, & alijs quæ dicuntur à Mesue.  
dosis est Aloes dosis est à 3 l. ad 3 ij.*

*à 3 l. in infusione ab aureo uno ad aureos tres,  
ad 3 ij. corrigitur tragacanthii 3 l.*

*aliis quæ affert Mesues : ex solventibus  
medicamentis aliqua tutò, aliqua non  
sine discrimine exhibentur ; ideo illorum  
dosim omitto. Est etiam compositorum  
medicamentorum tradenda dosis, eo-  
rum, inquam, quæ choleram educunt,  
quæ pro ægrotantium viribus augenda  
est, vel minuenda.*

*Electuarii de succo rosarum dosis est 3 l.*

*diaprunis solutivi dosis est à 3 ij. ad 3 l.*

*triferæ sarracenicae dosis est 3 j.*

*de pilulis choleram educentibus.*

*Pilularum aurearum dosis est 3 j.*

*pilulæ communes ad 3 ij. exhibentur.*

*Dilularum è fumaria dosis est 3 j.*

*pilularum è rhabarbaro 3 i. l.*

*hæc autem omnia pro judicio medici.  
& ægroti viribus. Sunt præter hæc alia  
solutiva, sed his ut plurimum utimur.  
mutantur & doses medicamentorum in*

*pe-*

peculiaribus regionibus, tunc eorum doses à medicis & pharmacopolis illius regionis sunt addiscendæ. Animadver- rendum etiam est, an in medicamentis sit scammonium, colocynthis, aut elle- borus: quæ enim hæc recipiunt, fortes sunt medicinæ, ideo non exhibentur in majori dosi quam ad 3 iiiij. aut ad 3 ℥. de medicamentis pituitam ducentibus.

Turpetum à 3 j. ad 3 iiij.

exhibetur in infusione ad 3 iiiij.

corrigitur cum zinziberis 3 ℥.

agarici dosis est à 3 j. ad 3 iiij.

in decoctione vero ad 3 v.

corrigitur sale gemmæ colocynthis à 3 j.

ad 3 ℥.

exhibetur: corrigitur tragacantho. Poly-

podij dosis est à 3 iiij. ad 3 ℥.

corrigitur 3 j. anisi. Hermodactylorum

dosis est à corriguntur cum 3 j.

zynziberis. Cartami dosis est à 3 iiiij.

ad 3 ℥.

corrigitur tragacantho & mastiche.

Turpe-  
tum do-  
sis 3 j.

Agarici  
dosis

3 j. ad  
3 iiij.

Colocyn-  
this dosis

a. 3 j. ad

3 ℥.

polypo-  
dij dosis

3 j. ad

3 ℥.

Electuariorum pituitam educentium  
doses.

Benedicta	} Electuarium	Diaturpeti	} omnium dosis est
Hiera ruffi			
Hiera pura		de citro	
Hiera logadii		Daphœnicon	
Diacartam		3 ℥.	

*Pilulæ.*

*Pilulæ* { ex agarico : cocciæ : lucis :  
arthriticæ : ex hermodactylo :  
ex eupatoria. è hiera :  
alephanginæ : ex euphorbio :  
è castorio : è quinq; myrobalanis  
ex mezzeno.

Notandum, quod electuaria Indum majus & minus phlegma educunt, & ejusdem ferè sunt facultatis; in hoc differunt, quod electuarium Indum minus non est adeò calidum. Turpetum & scammonium choleraam & pituitam educunt. Diaphænicon medicamentum est compositum, & ad ægritudines & febres compositas utile est, & ad chronicos morbos est medicamentum tutissimum: confert coli doloribus & ægritudinibus ventris, humoribus crudis & frigidis; & est solutivum aptissimum. Electuarium Indum majus educit redundantes humores speciatim pituitosos & putridos à stomacho, & membris nutritioni inservientibus, & flatus in illis contentos dissolvit.

*Dosis simpl. medicamentorum eductum melancholiam.*

Senæ dosis est à 3 ij. ad 3 iiiij. infusæ verò dosis est ab 3 j. ad 3 ij. corrigitur autem 3 j. Zinziberis, aut glycyrrhizæ, aut

aut xilobalsami, aut cuscutæ. Lapidis lazuli dosis est à 3 j. ad 3 ij. corrigitur, si novies largetur. Lapis armeniacus eadem dosi exhibetur. Epithymi dosis est 3. ss. corrigitur, si aqua rosacea bis aut ter largetur.

*Dosis compositorum medicamentorum eduentium melancholiam.*

Diasenæ	} Diacatholici	} Hieræ ruffi	} Triferæ Sarraceni	} cæ	} tami	} dosis 3 j.	} Diacar. } Omnium
---------	----------------	---------------	---------------------	------	--------	--------------	--------------------

Hiera ruffi caput purgat, stomachum & reliquum corpus ab humoribus crassis & viscidis; & atram bilem tantum educit: confert maniæ, epilepsiæ, oris torturæ, & paralysiæ, & melancholiæ: flatus discutit, stomachi concoctionem juvat; & est medicamentum conferens fistulis, ulceribus cancerosis, & lepræ.

*Pilulæ humorem melancholicum eduentes.*

Pil.	{ è sumo terræ. ex elleboro ex lapide lazuli. ex epithymo fœtidæ	} omniū dosis est à 3j. ad 3 iij.
------	---	---

Notandum, quod in regionibus frigidis & transmarinis in majori dosi medicamenta exhibenda sunt quam in aliis regionibus.

196 DE CURAN. VULNER.

Confectio Hamech confert ægritudinibus ab atra bile & humoribus adustis, ut maniæ, melancholiæ, vertigini, obliuione, & ægritudinibus cutis, ut scabiei, morpheæ, lepræ, carbunculo, elephantiæ, & impetigini.

His absolutis, doceamus dosim medicamentorum quæ tuta sunt, & audacter exhiberi possunt. Primo loco de his quæ bilem purgant, loquemur. Secundo loco ea quæ pituitæ conferunt, exponam. Tertio loco ea quæ humorem melancholicum respiciunt, explicabo. In universum, dico quòd istorum debiliorum medicamentorum, aquarum, & electuariorum roborantium, & non solventium dosis est  $\frac{3}{4}$  j.

*Syrupi ad bilem.*

Syr. de endivia	Syr. acetosus simplex
Syr. è capill veneris	Syr. è ribes
Syr. violaceus	Syr. de limonibus
Syr. de agresta	Syr. de acetositate citri
Oxysacchara simplex	Syr. de portulaca
Oxysacchara comp.	Syr. de papavere
Syr. è berberis	Syr. de jujubis
Syr. è cydonijs.	Dosis cuiuslibet horum syrporum est ab $\frac{3}{4}$ j. usque ad $\frac{3}{4}$ ij.

*Aquæ bilem contemperantes.*

Scariolæ : endiviæ : lactucæ :  
Aqua I plantaginis: acetosæ: limonum:  
portu-

Aqua  
E  
Electu  
Rosat  
Diatr  
Abbat  
Diapr  
Dof  
No  
sis est  
assum  
tabell  
Etuar  
tuend  
satis e  
& qua  
cenda  
sed un  
aut du  
piende  
Co  
Conf.  
Conf.  
Conf.  
Conf.  
Conf.

Aqua portulacæ : nymphææ: rosacea  
 | scolopendrij: capil. ven. cichorij  
 | curcurbitæ : cucumberis.

*Electuaria bitem cohibentia.*

Electuarium è tribus santalis :  
 Rosata novella: Electuarium de gemmis:  
 Diatragacanthum frig. Diarhodon :  
 Abbatis: Diamargariton frigidum:  
 Diapruni: Diacydonium.

*Dosis cujuslibet istorum est 3 j.*

Nota, quod cujuslibet electuarij dosis est 3 j. non tamen unica vice tota est assumenda, sed singulis vicibus singulæ tabellæ sunt capienda; & nisi adhuc electuaria, corum loco conservæ substituendæ. atque horum non traditur dosis: satis enim est communem mensuram, & quantitatem novisse, neque commiscenda omnia simul sunt, quæ scripsimus, sed unum tantum per se exhibendum, aut duo vel tria commiscenda sunt, capiendo uniuscujusque partes æquales.

*Conservæ ad bitem, & earum  
 dem dosis.*

Conf. rosatum	Conf. nymphææ
Conf. violatum	Conf. capill. ven.
Conf. corticum citri	Conf. buglossæ
Conf. papaveris	Conf. acetosæ
Conf. borraginis	Dosis cujuslibet harum

198 DE CURAN. VULNER.

harum conservarum est ab  $\frac{3}{4}$  ℥. ad  $\frac{3}{4}$  j.  
plus minus, prout ægro convenit. vel sic  
componantur.

R<sup>x</sup> Conservæ rosarum & violarum ana  $\frac{3}{4}$  ℥.  
conservæ capil. ven.  $\frac{3}{4}$ . j.

pulveris trium santalorum, specierum  
diarhodon ana  $\frac{3}{4}$  j.

sacchari quod satis est misce, & fiat con-  
ditum auro cooperiū. possunt etiam addi  
ea quæ roborant viscera; ut os de corde  
cervi ad  $\frac{3}{4}$  j. vel ij. aut siquid aliud tibi vi-  
sum fuerit, ut spodiū & santala, quorum  
dosis ut plurimum est ab una  $\frac{3}{4}$  ad  $\frac{3}{4}$  ij.  
His etiam conditis adduntur aliquando  
lapides, quorum dosis ut plurimum est  
 $\frac{3}{4}$  j. vel ij. & quandoque limatura auri,  
cujus dosis est  $\frac{3}{4}$  ℥.  $\frac{3}{4}$  j. & sic de aliis.

*Syrupi ad pituitam.*

Syr. è stœchade,	Syr. de Hyssopo,
Syr. byzantinus	Syr. de prassio,
Syr. de mentha,	Syr. è calamintha,
Syr. de artemisia,	Syr. de eupatorio,
Oxymel scilliti.	Syr. è glycyrrhiza,
Syr. de absinthio,	Oxymel simplex.

*Dosis est omnium æqualis  $\frac{3}{4}$  ij.*

Aqua verbenæ    Saxifragiæ    Melissæ  
Calaminthæ    Enulæ camp. Salviæ  
Aqua majoranæ    Satureiæ    Hyperici  
Euphragiæ    Menthæ.

est

Omnium dictarum aquarum dosis est 3 iiij. ut semper aquæ dupla ratio sit ad syrum quem diluit. Sunt & aliæ aquæ, ut feniculi, petroselini, graminis, asparagi; quarum 3 iiiij. exhibentur: si vero plures aquas simul miscere cupis, earum doses augendæ.

*Electuaria ad pituitam.*

Diaturfurum	Dianthos cū muscho
Elect. plir. cū moscho	Diatrion pipereon
Aromaticū rosatum	Diaprasium
Diacostu	Diacalaminta
Diamentha	Diacyminon
Diarhodon nilei	Diacastoriu
Diagalanga	Garyophyllum
Diamarathru	Diazinziber.
Daireos simpl.	Dianisu
Diahysopum	Dosis cujuslibet
Diacaryon	est à 3 ij. ad 3 iiij.

*Opiatæ ad pituitam.*

Theriaca Mithridatum Trifera mag.  
Aurea Alexandrina (sine opio.  
Dosis istarum est à 3 j: ad 3 ij. Cum ele-  
ctuariis uti volueris, eorum dosis est 3 j.  
vel 3 S. ut tu vis. si eadem in tabellis  
exhibere libet, dosis erit 3 j. hoc pacto.  
Rx Daireos specierum diahysopu ana 3 S.  
Sacchari quod satis est, & fiant tabellæ  
ponderis 3 j. vel ij.

200 DE CURAN. VULNER.

*Conservæ ad pituitam.*

*Conservæ* { auri : eryngiorum : anthos :  
{ salviæ : enulæ camp.  
{ corticum citri : ireos :  
{ cyperi : zinziberis : citruli.

Nota, quod istarum conservarum dosis est à 3 j. ad 3 iij. vel minus, & earum plus requiritur pro condito faciendo quam pro tabellis. dosis in tabellis semper est à 3 j. ad ij. in conditis ab 3 j. ad ij. & si plura commiscenda sunt, singulorum est minuenda dosis. & hoc de omnibus aliis intelligendum, & multitudine mistorum à medicis non probatur.

*Syrupi ad humorem melancholicum.*

*Syrupi* { de agresta : de buglossa :  
{ de boragine : de eupatorio :  
{ è fumaria : byzantinus :  
{ è calamintha : è scolopendrio :  
{ è lupulis : de epithymo :  
{ è tamarice.  
Dosis ab 3 j. ad 3 ij.

*Aquæ ad humorem melancholicum.*

*Aquæ* { borraginis : Buglossæ : Tamaricis :  
{ fraxini : Lupulorum : Genistæ :  
{ fumariæ : Rosarum : Melissæ :  
{ calaminthæ : Scolopendrij.  
Dosis 3 ij. vel iij.

*Ele-*

*Electuaria humoris melancholico con-  
ferentia post evacuationes &  
purgationes exhibenda.*

Pliris arcoticon Diambra

Lætificans Galeni Elect de gemmis

Diatrion: Santalon; Diarhodon Abbatis.

Diamargariton.

Dosis istorum est  $\frac{3}{4}$  ℥.

Si electuaria parata, & ad manus non  
habeas accipe eorundum species. Singu-  
lorum dosis erit  $\frac{3}{4}$  j. si multa simul com-  
misseantur addito saccharo eo modo,  
quo pulvis ducis parari consuevit, hoc  
paecto.

R. Specierum elect. pliris cum moscho, spe-  
cierum lætificantis Galeni, specierum  
elect. de gemmis ana  $\frac{3}{4}$  j.

sacchari quod satis est, fiat electuarium  
in tabellis, vel ad modum pulveris ducis,  
eius singulis diebus summo mane exhi-  
bendum erit cochleare unum cum aqua  
buglossæ,

*Conseruae ad humorem melan-  
cholicum.*

Conf. { borraginis: buglossæ:  
violarum: anthos: capill. ven.  
rosarum: Dosis istarum est  
ab  $\frac{3}{4}$  ℥. ad  $\frac{3}{4}$  j.

*Opiatæ ad humorem melancho-  
licum.*

Requies magna cum aqua endiviæ, Ru-  
bea trochiscata, diarhodon. dosis ista-  
rum est 3 j.

Nota, quod præter dictas aliæ etiam  
sunt rationes componendorum medica-  
mentorum, quibus medicus indiget, ut  
sunt clysteres, pessi, vomitoria, apo-  
phlegmatismi, errhina, & alia. ut itaque  
junioribus medicis consulamus, brevis-  
simè & per compendium illorum com-  
ponendorum rationem explicabimus,  
& rudiori quodammodo, ne horum  
ignorantia errent, & à pharmacopolis  
irrideantur.

*Clyster ad ægritudines è frigida  
materia.*

R. Quatuor emollientium ana m. j.  
absinthij, centaurij, abrotani, borraginis  
ana m. j.  
quatuor seminum calidorum minorum  
ana 3 ij.  
florum rosmarini, stœchadis, genistæ,  
majoranæ ana m. j.  
caricas pingues numero x.  
cicerum rubeorum pug. ij.  
fiat decoctio in aqua: in qua dissolvantur  
benedictæ. Hieræ picræ ana 3 j. olei

olei liliacei, laurini ana 3 j.

mellis communis desfumati 3 j. salis 3 j.

& fiat clyster, qui tepidus injiciatur.

Nota, quod in clysteribus herbæ illæ ponendæ sunt, quæ respiciunt partem affectam. ut si ægritudo in capite sit, addendæ erunt betonica & salvia, si in hepate, absinthium & eupatorium; si in matrice, nepeta si validiores cupis, addere poteris diacartatum, aut alia pituitam eduentia, ut agarici 3 j. aut turpum si corriganur.

### Clyster in materia calida.

R. Malvæ, betæ, parietarie, flo. cucurbitæ,  
laetucæ, endiviæ ana m. j.

quatuor sem. frigidorum mundatorum  
minorum ana 3 j.

flo. chamæmeli, buglossæ, borraginis  
ana p. j.

Pruna, jujubæ, sebesten, ana numero xij.  
fiat decoctio in aqua, in qua disolve dia-  
cartami 3 j.

electuarij de succo ros. 3 iij.

olei violacei 3 ij.

mellis 3 j.

salis 3 j.

succi betæ 3 ij.

fiat clyster, qui injiciendus est in modica  
quantitate.

Nota, quod si ægritudo composita

fuerit, debent medicamenta componi; calida. s. & frigida miscenda sunt semina similiter: si ægritudo autem simplex fuerit, unius generis medicamentis uteris. & si particulare aliquod membrum robore exoptas, adde simplicia, quæ membrum illud respiciant. in calida materia clysteribus addi poterunt folia bliti albi, & aliarum herbarum frigidarum, ad caliditatem intestinorum contemperandam. Alii succos etiam addere consueverunt, nempe cucurbitæ, aut betæ, aut melonum.

In ma- *Julebum in materia frigida.*  
teria fri-  
gida. Rx. Syr. è stœchade, de hyssopo, de mentha,  
de radicibus ana 3 ij.

aquarum menthæ, betonicæ, apii, melissæ,  
ana 3 v.

fiat julebum. aromatiza 3 ij.  
cinnamomi & 3 ij.

zinziberis, clarifica, ut decet, & utere.

Notandum, quod si morbus in capite fuerit, aut pectore, aut stomacho; tunc ea medicamenta, quæ membrum illud respiciunt, augenda erunt. Si caput laboret, Syrup. è stœchade, aut oxymel scilliticum, in majori dosi exhibendi erunt quam alii. si pectus sit male affeatum, tunc dosis fir. è prasio, aut de hysopo augenda erit. Si stomachus male ha-

habeat, syrump de eupatorio, & aquam absinthij augebis. si renes oxymel diureticum, & aquam quinque radicum. si matrix, syrump artemisiæ, & ejusdem aquam. & semper affectis membris sunt accommodanda medicamenta.

*Fulebum in materia calida.*

R. Syrupi de endivia, è capill. ven. ana 3 ij.  
oxysacchari comp. 3. v.  
aquarum lactucæ, endiviæ, buglossæ, acetosæ ana 3 iiiij.  
misce, & clarifica, & aromatiza cum  
3 ii.

santalorum rubeorum, & alborum. Et nota, quod syrups violaceus non debet admisceri oxysaccharo, vel syrupo acetoso: nunquam enim dulcia acidis sunt permiscenda in ægritudinibus pectoris, vel tussi: in passionibus nervorum exhiberi non debet oxysaccharum, aut syrups acetus, nec intinctus cum aceto, aut rebus acidis factus, illis convenit: & pro ratione membrorum affectorum medicamenta illa respicientia sunt exhibenda. ut si caput calida intemperie laboret, syrump è nymphæa, & ejusdem aquam augebis: si vero cor laboret, syrups de buglossa, & rosaceus augendi si stomachus vel hepar, syrups endiviæ, & aqua ejus.

*Julebum in materia melancholica.*

Rx. Syrupi ex epithymo, de buglossa, de borragine, de fumaria ana 3 ij.  
 aquarum lupulorum, tamaricis, fumaria, melissæ, buglossæ, ana 3 iiiij.  
 misce, clarifica, aromatiza cum 3 j.  
 santalornm & cinnamomi. & illud animadverte, ut medicamenta, quæ membrum affectum respiciunt, non obliviscaris, ut sæpius admonuimus.

*Julebum ad omnes humores.*

Rx. Syrupi è radicibus de hyssopo ana 3 ss.  
 syrupi è fumaria, de endivia ana 3 ij.  
 syrupi de epithymo, de buglossa ana 3 iiiij.  
 aquarum melissæ, acetosæ, borraginis,  
 buglossæ ana 3 iiiij.  
 misce, clarifica, aromatiza cum 3 j.  
 cinnamomi & utere.

*Julebum ad ventris fluxum compescendum.*

Rx. Syrupi myrrhini, syrupi è cydoniis: syrosati 3 iiiij.  
 aquarum prunellorum, plantaginis, foliorum quercus ana 3 iiiij.  
 misce cum aqua rosarum, clarifica, &  
 fiat julebum.

Ju-

## Julebum contra pestem.

R. Syrupi de limonibus, de acetositate citri,  
de agresta ana 3 ij.  
syrupi de endivia, & syrupi de prunis  
agrestibus ana 3 ℥.  
aquarum artemisiae, acetosae, rosarum bu-  
glossae, endiviæ ana 3 iij.  
misce & addita 3 j.  
santalorum alborum, fiat julebum.

De solventibus pituitosum  
humorem.

R. Fol. rosmarini, stachadis, borraginis,  
buglossæ ana p. j.  
quatuor seminum frigidorum majorum &  
minorum ana 3 i.  
cicerum rubeorum p. j.  
absinthij, betonicæ, hyssopi, borraginis  
ana m. ℥.  
senæ, thymi, epithymi, cuscitæ, agarici  
ana 3 i.  
glycyrrhizæ rasæ 3 ℥.  
passularum mundatarum 3 i.  
fiat decoctio in aqua, in cuius colatura  
dissolve turpeti 3 i.  
Zinziberis 3 ℥.  
& fiat potio. Aliter.  
R. Diacartami 3 ℥.  
dissolve in aqua menthæ, & fiat potio.

*Medicinæ solutivæ fortes quæ indigent corrigentibus, hæ sunt:*

Dacridium, agaricus, scammonium, colocynthis, fistula, turpetum, euphorbium, elleborus, mezereon, aloes, caputia, lapis lazuli, lapis armeniacus, sena.

*Medicamenta quæ non indigent corrigentibus.*

Casia fistula, tamarindi, pruna, rhabarbarum, fumaria, polypodium, myrobalanorum omne genus, epithymus, manna, passulæ, borago, & similia.

*Ad calorem febrilem.*

Rx. Conservæ rosarum, violarum, nymphæ, acetosæ ana  $\frac{3}{4}$  jij.

specierum antidoti diarhodon  $\frac{3}{4}$  ij.

Syrupi, rosati, & de acetositate citri, quod satis est.

*De medicamentis, prout peculiarem corporis partem respiciunt, & primo ad frigidas capitum ægritudines.*

Syrupus è stœchade, oxymel, mel rosatum: aqua salviæ; rutæ, betonicæ.

*Ad*

*Ad calidas capitum ægritudines.*

Syrupus violatus, è nymphæ : aqua melissæ, endiviæ, lactucæ.

*Ad ægritudines frigidas pectoris.*

Syrupus de epithymo, è glycyrrhiza, de prassio, de hyssopo : aquæ calaminthæ, enulæ.

*Ad calidas ægritudines pectoris.*

Syrupus violatus, jujubarum, papaveris, aquæ nymphæ, & lactucæ.

*Ad ægritudines frigidas cordis.*

Syrup. de boragine, de buglossa : aquæ melissæ, & enulæ camp.

*Ad calidas ægritudines cordis.*

Syrupus de agresta, violatus è nymphæ : aquæ violarum, roscarum, nymphæ.

*Ad calidas ægritudines stomachi.*

Syrupus de mentha, de absinthio, è calamintha : aquæ pulegij, levistici.

*Ad frigidas ægrit. intestinorum.*

Syrupus è mentha, de absinthio : aquæ pulegij & sambuci.

*Ad calidas ægrit, intestinorum.*

Syrupus myrrinus, de agresta, de cydoniis, rosatus: aquæ portulacæ, & plantaginis.

*Ad ægrit. frigidas hepatis.*

Syrupus de epithymo, de eupatorio, & fumaria: aquæ fumariæ, & scabiosæ.

*Ad ægrit. calidas hepatis.*

Syrupus è papavere, syrupus acidus, oxysaccharum: aquæ fumariæ, cichorij.

*Ad frigidas. ægrit. splenis.*

Syrupus è scolopendrio, è calamintha, oxymel, scilliticum: aquæ fœniculi, & de radicibus.

*Ad calidas ægrit. splenis.*

Syrupus è nymphæa, è capillis venoris, aquæ capill. ven. cichorij.

*Ad ægrit. frigidas renum.*

Syrupus de radicibus, oxymel, aquæ abrotani, & saxifragiæ.

*Ad ægrit. calidas renum.*

Syrupus de agresta, è portulaca, aquæ plantaginis, & portulacæ.

Ad

*Ad ægrit. frigidas matricis.*

Syrupus de hyssopo, de artemisia,  
de radicibus, de calamintia : aquæ arte-  
misiæ, salviæ, melissæ.

*Ad ægrit. calidas matricis.*

Syrupus de endivia, de portulaca :  
aquæ virgæpastoris, endiviæ.

*Ad ægrit. frigidas juncturarum.*

Syrupus è stœchade, acidus, scilliti-  
cus : aquæ calamintæ, pulegij.

Aloes humores biliosos, & pituitam  
purgat.

Agaricus pituitos humores, & adu-  
stos ; pulmonem, nervos juncturas.

Casia fistula bilem, & pituitam educit.

Rhabarbarum, bilem flavam, capitum  
humiditates, & omnium membrorum.

Elleborus albus, humorem melan-  
cholicum, & adustam bilem purgat ab  
universo corpore.

Fumaria adustos humores, cor, he-  
par, & cerebrum expurgat.

Sena, humorem melancholicum, &  
adustam bilem.

Polypodium, bilem adustam ; & hu-  
morem melancholicum educit.

R.

n.

, de  
, &rio,  
osæ.dus,  
orij.nin-  
eni-

ene-

quæ

quæ

Ad

Quæ.

212 DE CURAN. VULNER.

<i>Quatuor semina frigida minora.</i>	{ Semen lactucæ Semen portulacæ Semen endiviæ Semen scariolæ.
<i>Quatuor semina frigida majora :</i>	{ Melonum Cucurbitæ Cucumberis Citruli.
<i>Quatuor semina calida majora :</i>	{ Fœniculi Anisi Cumini Caryi.
<i>Quatuor semina calida minora :</i>	{ Ammeos Amomi Apij. Dauci.
<i>Quinque herbæ emollientes.</i>	{ Malva Parietaria Blitum Branca-ursina Mercurialis.
<i>Quatuor flores communes.</i>	{ Rosæ Violæ Flores borraginis Buglossæ.
<i>Quinque radices communes.</i>	{ Apij Petroselinii Rusci Asparagi Fœniculi.

Qua-

<i>Quatuor aquæ cordiales :</i>	{ <i>Aqua scabiosæ</i> <i>Endiviæ</i> <i>Cichorii</i> <i>Buglossæ.</i>
<i>Herbæ capillares:</i>	{ <i>Adiantus</i> <i>Polytrichon</i> <i>Scolopendrion</i> <i>Cuscuta.</i>
<i>Quatuor unguenta calida :</i>	{ <i>Unguentum de althæa</i> <i>Unguentum aregon</i> <i>Unguentum marciatū</i> <i>Unguentum agrippæ.</i>

*Diamargariton frigidū magistrale.*

R Margaritarum albarum 3 iiij.

hyacinthi 3 i. ℥.

coralli rubei, boli armenii, succini ana 3 i.  
 spodii, rasuræ eboris, cornu cervi, usq;  
 ostis de corde cervi, serici crudi, corticis  
 citri, sem. papaveris albi, sem. acetosæ,  
 sem. portulacæ ana 3 i. ℥.

tormentillæ, glycyrrhizæ, amyli, ligni  
 aloës ana 3 i. ℥.

santali albi, & rubei ana 3 ij.

santali citrini, coriandri præparati, gum-  
 mi arabici, gummi tragacanthi, ro-  
 sarum rub. ana 3 ij. camphoræ 3 i.  
 quatuor sem. frigidorum mundatorum ana  
 3 i.

moschi ambaris ana G. v. au-  
 ri & argenti ana numero x. misce, &  
 fiat pulvis. Pul-

*Pulveres roborantes magistrales.*

Rx. Glycyrrhizæ rosarum anis ana 3 ij.  
 sem. papaveris, succi glycyrrhizæ, amyli,  
 sem. portulacæ, sem. laetucæ, sem.  
 scariolæ, sem. cydoniorum, flo, bor-  
 ruginis ana 3 iiij.  
 diapapaveris 3 iiij.  
 gummi 3 j.  
 gummi arabici, santalorum alborum, &  
 rubeorum ana 3 iiiij.  
 cinnamomi, styracis, sem. bombacis.  
 sem. malvæ, berberi, florum nymphæ violarum ana 3 ij.  
 ambaris moschi ana G. vj.  
 misce, & fiat pulvis.

*Pulvis ad casum.*

Rx. Rhabarbari 3 j.  
 mumiæ 3 ij.  
 rubeæ tinctorum 3 j. f.  
 misce, & fiat pulvis.

*Confectio hyacynthorum magistralis.*

Cordia-  
lis con-  
flectio.

Rx. Hyacinthi, coralli rubei, terre sigillatæ,  
 tormentillæ, dictamni, grani tinctorii,  
 sem. citruli, croci, myrrhæ, rosarum  
 santalorum omnium, ossis de corde cer-  
 vi, sem. acetosæ, sem. portulaceæ,  
 rasuræ ana 3 iiiij.  
 sapphiri, margaritarum, topazii serici  
 crudi, auri argenti ana 3 ij.

cam-

camphoræ moschi ana 3 j.  
ambaris G. vj.

Syrupi limonum quod satis est, misce, &  
fiat confectio cordialis.

### Diamoschu magistrale.

R. Galangæ, Zedoarie, doronici, ben albi,  
& rubei, calami aromatici, garyophil-  
lorum, ocimi, serici combusti, carda-  
momi, mastichis, melissæ, menthæ frue  
spodii, ligni aloes, coriandri  
preparati fæniculi, anisi ana 3 j.  $\frac{1}{2}$ .  
spicæ, cinnamomi, rosarum, absinthii  
ana 3 j.  
mellis crudi quod satis est, misce.

### Theriaca è citro magistralis.

R. Sem. citri mundatorum, 3 iij.  
sem. acetosæ 3 ij.  
dictamni, sem. cydoniorum, sem. bom-  
bacis ana 3 v.  
medullæ nucum ad pondus omnium. syru-  
pi de acetositate citri quod satis est mis-  
ce, & fiat confectio.

### Limonata smaragdorum.

R. Smaragdi G. x.  
hyacinthi 3 j.  $\frac{1}{2}$ .  
sem. pœoniæ, cinnamomi, rad. pœoniæ  
ana, 3 iiiij.  
sem. citri, dictamni ana 3 vi.  
coralli rub. grani tinctorii, sem. acetosæ  
ana 3 iij. croci

*croci* 3 j.

*visci quercini*, *rasuræ eboris*, *galangæ limonatae* ana 3 ij.

*mellis* quod satis est, misce.

*Confectio ad humores melancholicos Gentilis.*

Rx. *Senæ*, *cinnamomi*, *croci*, *sem. anethi*,  
*apij petroselini* ana 3 j.

*melissæ*, *corticis*, *citri*, *caryophyllorum*,  
*ben. albi* & *rubei*, *zedoariæ*, *sem. ocimi caryophyllati* ana 3 j.

*ihymi*. *epithymi*, *flo. buglossæ*, *rosarum*,  
*borraginis*, *polypodij* ana 3 ij.

*turpeti* 3 v.

*hermodactylorum* 3 iiiij.

*lapidis lazuli*, *lapidis armeniaci*, *myrobalanorum*, *cepulorum*, *empeliicorum* ana 3 vj.

*dacridij* 3 ij.

cum duabus partibus *mellis*, & una *sacchari*, fiat *confectio*.

*Confectio cœlestis Guidonis.*

Rx. *Sem. juniperi* 3 j. §.

*caryophyllorum*, *maſtichis nucis moschatae*, *Zinziberis*, *Zedoarie*, ana 3 ij.  
*utrinusque aristolochiae*, *gentianæ*, *tomentillæ*, *dictamni*, enule  
ana 3 i. §.

*salviæ*, *rute*, *balsamitæ*, *polij montani*,  
*menthæ* ana 3 j.

bac-

baccarum lauri, doronici, croci, sem. citri,  
ocimi, mastichis, olibani, boli armenij,  
terræ sigillatæ, spodij, ossis de corde  
cervi, rasuræ eboris, margaritarum,  
fragmentorum smaragdi, zapphiri,  
coralli rubei, ligni aloes, santalorum  
rubeorum, moschatæ, ligneæ ana 3 ℥.  
conservæ rosarum, conservæ nymphæ,  
theriacæ ana 3 j.

sacchari ℥ iii.  
fiat electuarium cum aquis scabiosæ rosa-  
rum, & modico camphoræ.

*Composita medicamenta alvum  
laxantia.*

Diacatholicon	Nicol.
Diasena	Nicol.
Electuar. de succo ros.	Nicol.
Catharticum imperiale	Nicol.
Diaprunis solut.	Nicol.
Hiera picra comp.	Gal.
Diaprunis	Nicol.
Hiera ruffi	Mes.
Diacartatum	Arnol.
Hiera logadij	Nicol.
Confectio contra melancholiā	Gentilis
Hiera picra	Gal.
Confectio hamech	Mes.
Benedicta	Nicol.
Elect. elescoph.	Mes.
Diacassia	Nicol.

K

Elec-

## 218 DE CURAN. VULNER.

*Electuarium diacartarium ma-*  
*gistrale.*

Rx. Specierum diatragacanthi 3 ℥.

pulpæ cydoniorum 3 ij.

zinziberis, hermodactylorum ana iiiij.

pulpæ cartami 3 vij.

dacridii 3. iij.

turpeti 3 j.

mellis rosac. 3 ij.

sacchari 3 xvij.

*De conditis.*

Conserva rosarum Mes.

Conserva acori Mes.

Conserva violarum Mes.

Citra condita Mes.

Conserva borraginis Mes.

Conserva buglossæ Mes.

Conserva nymphææ Mes.

Conserva stœchadis Mes.

Loch de pino Mes.

Loch de succo scillæ Mes.

Loch de caulibus. Mes.

*Syrupi:*

Syrup. è fumaria. S. Mel rosatū colatū

Syr. è fumaria com. Mel emblicorum

Syr. de mentha Syr. de stœchade

Syr. byzantinus. Syr. è succo borrag.

Syr. de absinthio Syr. rosaceus

Syr. de eupatorio Diamoron

Sy. de scolopendrio Diacaryon

Syr.

Syr. acetosus simpl.	Miva aromaticā
Syr. acetosus comp.	Syr. è glycyrrhiza
Syr. de acetositate citri	Syr. de pomis
Syr. de agresta	Syr. de prassio
Oxymel scilliticū.	Syr. de hyssopo
Miva cydoniorum	Syr. de endivia
Syr. myrtinus	Syr. capill. ven.
	Oxymel diureticū

*De Pilulis.*

Pilulæ	de rhabarbaro :	è lapide lazuli:
	aléphanginæ :	affajeret
	è fumaria :	de lapide ar-
	aggregativæ :	menio :
	de opopanace :	è sagapeno :
	fœtidæ majores:	de mezereoo:
	fœtidæ minores:	aureæ :
	stomachicæ min:	de hiera :
	stomachicæ mai:	cochiæ :

contra pestem :

linguæ subditæ Nicol :

bechicæ Joan. Dam:

de hermodactylis :

è quinque generibus miroba-  
lanorum Nicol :

Notandum, quod cum quis humorem viscidum, & pituitosum educere vult, medicamento salis gemmæ modicum adjiciat: irritabit enim expultricem facultatem. Dosis scrupulum unum non excedat.