

in lipyria febre observanda; & materia peccante perspecta, syrupi illam præparantes sunt præscribendi, & jam dicta enæmata injicienda, & purgationes exhibendæ. Similiter si febris sit septimana, aut sextana, consideranda materia est, à qua fiunt; & pro varietate peccantis materiæ ejusdemque crassitie & tenuitatem syrupi variandi sunt, & variandæ confectiones, & potiones. Si verò fuerit quotidiana continua, phlegmatis, à quo fit, ratio habenda est, crassum ne sit attenuata, & pro illius diversitate varianda sunt præsidia. & hæc sunt quæ ad curationem pertinent febris, quæ à falso, dulci, vitreò, & cujuscunque speciei phlegmate ortum habet.

DE CURATIONE

Febris quartanæ ab humore melancholico.

C A P. VIII.

Si medicus ad ægrum accedens videat illum melancholicæ temperaturæ, coloris plumbei vel cinerei vel fusti, atque ejusdem membra gracilia fuerint & macilenta, qui in cibis, leporibus, & carne bubula, & antiquo caseo usus fuerit, & multis leguminibus, & alimentis sanguinem aduentibus, copiosis aro-

N 2 mati-

matibus, pipere, eruca, sinapi, & similibus, & qui ira & diurna tristitia labaverit, à quibus corpus admodum exsiccati consuevit, aut in quo præcesserint febres compositæ, aut erraticæ, aut diurna tertiana, in quibus humorum tenuiores partes absuntur, crassiores verò relinquuntur, & febris à principio cum frigore invadat; illa verò progrediente cum rigore frigori conjuncto extenuioribus humoris melancholici partibus putrefactis, si paroxysmus horas 24. perduret, & duos intermittat dies, & quarto revertatur, ægrum quartana febri laborare judicabit: in qua, quemadmodum & in aliis febribus, procedendum est, concoquenda est materia peccans, & purganda, cùm sit ex genere putridarum. itaque à communium superfluitatum eyacuatione exordiendum; & si alyus adstricta sit, tale injiciendum enæma.

Rx. Seminum anisi, fæniculi ana pug. j.

foliorum malvarum man. j.

cartami 3 ℥.

bulliant in aqua ad ℥ j.

in qua dissolve mellis communis, & olei ana 3 iiij.

& fiat enæma. Poterunt communes materiæ tali potionē educi.

Rx. Cæsiæ fistulæ, rhodamellis ana 3 j. dif-

dissolvantur in decocto communi, & fiat potio. consequenter exhibendi sunt syrupi concoquentes.

Rx. Oxymelitis. s.

syrupi è buglossa ana 3 j.

aquarum buglossæ, endivie ana 3 j. ss. quibus ad dies aliquot exhibitis, tali medicamento peccantes humores minues.

Rx. Diasenæ, casei fistulæ præparatæ cum saccharo ana 3 ss.

myrobalanorum Indorum 3 ij.

misce, & cum decocto communi fiat potio. Hac exhibita, si materia peccans adhuc contumax sit, & natura illam superare, & expellere non potest, ad concoquentia & purgantia validiora deve niendum, & symptomatibus, quæ hujusmodi febreim comitari consueverunt, occurrentum: inter hæc potissimum frigus est, à quo æger in paroxismi principio maximè affligitur. in illius itaque principio ea sunt exterius applicanda, quæ superius capite de febri phlegmatica simplici dicta sunt, lateres. s. ror emarino cooperti, & vino rubeo aromatico aspersi manibus & pedibus applicandi, quo usque frigus recedat. vel hoc pacto: Rx. Rosmarini, thymi, rutæ, chamædryos, chamæphytos, gariophyllo rum, nepetæ, marrubij, menthæ, chamaemeli, foliorum lauri portiones ali-

N 3 quas.

quas. fiat decoctio in vino albo, & aqua communi, in qua fortiter bulliant immisi lateres, & calidi linteis revoluti extremitatibus applicentur. Aut in praedicto decocto madefiat spongia, & expressa dorso admoveatur. hac enim ratione frigus quam citissime removebitur. Quod si haec non satis sint, tunc uxorem, si juvenis illa sit, aut juvenculam aliam arcte æger amplexetur: est enim remedium optimum. vel illi spinam & dorsum inunge oleis, *anethino*, *rutaceo*, *chamæelino*, *absinthino*, & *costino*: hujusmodi enim sunt, quæ partibus exterioribus applicare consuevimus. Internius vero, & potissimum signis concoctionis apparentibus, talia exhiberi poterunt.

Rx. Theriacæ magnæ Gal. 3 j.

aqua fœniculi 3 j. S.
misce, & fiat potio exhibenda in principio paroxismi. aliter:

Rx. Succi apij depurati 3 j.

mithridati 3 S.

misce, & fiat potio. aliter:

Rx. Succi absinthij 3 j.

casiæ ligneæ 3 j.

misce, & fiat potio. aliud:

Rx. Vini in quo decocta sit agrimonie 3 j.

theriacæ Galeni 3 j. S.

& fiat potio, haec potio in paroxismi principio exhibenda: spina vero & dorsum

sum

sum duabus horis ante paroxismum prædictis oleis inungeniur, & stragulis optimè cooperiendus æger ad frigoris incommoda evitanda. Si paroxismus cum vomitu invadat, utile erit illum provocare, & à debilioribus incipere, & ad validiora transire, ut superius diximus capite de curatiōne febris phlegmaticæ. poteris enim illi exhibere aquam calidam, cui admisceantur oleum & aqua florū aurantiorū. Si non satis sit, tunc exhibendum oxymel simplex cum decocto raphani, ut dictum est. Supervenientem sitim subsequentibus sedabis: decoquantur in aqua fœniculum & cinnamomum aut petroselinum, de qua bibat cum sequenti condito.

Rx. Conservæ violarum buglossæ, borraginis ana 3 ℥.

specierum frigid. diamargaritōn 3 ℥.

læticantis Galeni, & specierum aromatīci rosati ana 3 j.

sacchari q. s. est

misce, & fiat conditum aureis bræcis obductum. Poterit & tale parari julebum, quod aquæ admistum ebibere poterit.

Rx. Aquæ buglossæ, scolopendrij, majoranæ, scariolæ ana 3 iiii.

sacchari quod satis est, & fiat julebum. Si interim concoctionis signa appareant,

M 4 aut

aut sanguinis, & urina crassa sit, turbida & colorata; basilica sinistri brachij, aut salvatella manus sinistræ secari poterit. & validiora concoquentia præscribentur. ut;

Rx. Syrupi de epithymo, oxymelitis diuretici ana 3 ij.

aquarū fæniculi, & majoranæ ana 3 ij. ¶ misce, vel;

Rx. Syrupi byzantini acetosi simpl. ana 3 j.
aquarum absinthij, & buglossæ ana 3 ij.
vel paretur syrups magistralis hoc pacto.

Rx. Radicum apij, fæniculi, granorum rusci,
radicum asparagi, sambuci, fraxini, genistæ, tamaricis ana m. j.

commisceantur, & aceto fortissimo temperentur horis 24. deinde adde utriusque cichorij, stæchadis, utriusque calamintiæ, eupatoriij ana 3 j.

scolopendrij m. ¶.

absinthij, menthæ, endiviæ, scariolæ, melissæ ana 3 ij.

quatuor seminum frigid. minorum, spicæ celticæ ana 3 j. ¶.

mellis rosac. 2 ij. sans boup. 2 ij.
Sacchari 2 ij.

& fiat syrpus, de quo ad humores concoquendos manè & vespere exhibebis cum cicerum rubeorum decocto concoctis humoribus purgatio hoc pacto præscribetur.

Rx. Gly-

CURAN. RATIONE. 297

Rx. Glycyrbizæ rafæ ana 3 ℥.
polypodij folicorum senæ ana 3 iiij.
florum borraginis . stæchadis , lupulorum ,
buglossæ ana 3 ij.
passularum mundatarum P. f.
decoquantur in aqua ad 3 iiij. ℥.
quibus infundantur myrobalanorum Indo-
rum pulveris Epithymi ana 3 ij. ℥.
fiat deinde fortis expressio , & colatu-
ra , cui addantur diasenæ , castæ fi-
stulæ ana 3 ℥.

& fiat potio. Aliter.

Rx. Myrobalanorum Indorum citrinorum
ana 3 ij.
infundatur in 3 ij. ℥. aquæ lactis ad ho-
ras 12. deinde calefiat , & fiat fortis
expressio , cui adde
castæ fistulæ dissolutum aqua buglossæ 3 j.
Pulveris epithymi 3 j.

zinziberis G. vij.
rhodomellis 3 ℥.
misce , & fiat potio. Utiliter etiam exhi-
beri poterit 3 j. pilularum Indarum
quæ à proprietate humorem melancho-
licum educunt. Aliter ;

Rx. Lapidis armeniaci loti 3 j.
pulveris senæ 3 j. ℥.
agarici 3 ℥.
castæ fistulæ 3 j.

misce , & cum aqua majoranæ fiat potio.
Aliter in pulveris forma ;

Rx.

N S

Rx. Pulveris senæ, pulveris epithymi ana

3 ℥.

lapidis lazuli 3 j. ℥.

zinziberis 3 ℥.

cinnamomi 3 j.

salis gemmæ G. iiiij.

sacchari 3 x.

misce, & fiat pulvis, cuius dosis est 3 ℥
cum aqua fœniculi, & buglossæ, aut ab-
sinthij. Si verò humoribus per purgatio-
nes eductis adhuc febris perseveret, prout
in aliis dictum est, ad confectiones, sy-
rupos, apozemata, & electuaria deve-
niendum. ut;

Rx. Syrupi byzantini 3 viij.

syrupi de buglossa 3 iiiij.

aquarum quinque radicum tamaricis, &
majoranæ ana 3 iiiij.

cinnamomi: trochiscorum è capparibus
ana 3 j.

his in linteo, ligatis, fiat syrupus in mo-
dum apozematis. confectio talis sit.

Rx. Pulveris epithymi, senæ ana 3 ℥.

diasenæ 3 j.

lapidis armeniaci 3 j. ℥.

cum syrupo de epithymo: fiat confectio.

Electuarium hoc pacto paretur.

Rx. Specierum rosatæ novellæ, trochiscorum
de capparibus ana 3 j. ℥.

sacchari infusi in aqua buglossæ q.satis est;
misce & fiat electuarium in tabellis. Con-
fectio

CURAND. RATIONE. 299

fectio alia non adeò ventrem solvens.

Rx. Trochis corum de capparibus 3 iij.

trochis corum de absinthio 3 j. $\frac{1}{2}$.

myrobalanorum Indorum 3 iij.

conservae buglossae, diacori contusi ana

3 $\frac{1}{2}$.

cum syrupo buglossae, fiat confection. Ali-

ter hac ratione parari poterit.

Rx. Confectionis dialaccae 3 ij.

ponantur in vase vitro. sis perpetuo so-

licitus, ut alvus laxa sit, pro quo tali

enæmate uti poteris.

Rx. Malvae, bliti, florum chamæmeli ana m j.

furfuris p. j.

fiat decoction, in qua dissolve sacchari

rubei 3 iij.

benedictæ 3 j.

olei communis 3 iij.

mellis 3 iij.

salis gemmæ G. x.

misce, & fiat enæma. & quia hujus fe-
bris radix in splene sita est, ut plurimum
illi splenis obstructio conjungitur. sunt
itaque spleni præsidia admovenda, &
primo unguento hujusmodi uti poteris.

Rx. Olei è tamarice, è capparibus irini ana

3 $\frac{1}{2}$.

aceti modicum cera q. s.

fiat unguentum. Vel;

Rx. Olei è capparibus irini ana 3 j.

aceti scillitici 3 $\frac{1}{2}$.

300 DE FEBRIUM

trochisorum è capparibus 3 ij.

pinguedinis anatinæ, pingued. gallinæ ana 3 iiij.

cereæ q. s. est,

& fiat unguentum. Utile etiam erit fo-
mentum, tale.

Rx. *Corticu[m] radicu[m] capparum, corticu[m] radicis tamaricis, petroselini, mentasti, seminu[m] rutæ ana* 3 iiij.

salis nitri 3 ij.

caricas nigras num. x.

floru[m] chamæmeli, meliloti, seminu[m] anisi, feniculi ana m. **D.**

commisceantur, & bulliant omnia in
partibus duabus aquæ, & una aceti acer-
rimi; & cum spongia foveatur locus af-
fectus. In eundem usum parabitur em-
plastrum tale.

Rx. *Vtriusque emplasti diachylon ana quod satis est, pulveris radicum ireos* 3 j.

malaxentur cum oleo capparum, & ta-
mari[c]is: misce & fiat emplastrum, quod ex-
tendatur super alutam ad formam
splenis. Ad idem unguentum.

Rx. *Foliorum malvæ bismalvæ. radicum*
lilij ana 3 j.

farinæ seminis lini 3 iij.

caricarum pinguium passularum munda-
tarum ana 3 iiij.

contundantur omnia simul, & infun-
dantur in aceto acerrimo per horas octo;
deinde

CURAN. RATIONE. 301

deinde bulliant in aqua ad spissitudinem usque : deinde adde unguenti dialthææ , olei amygdalarum dulcium ana 3 j.

cerae quod satis est , & fiat unguentum.

Vel ;

Rx. Ammoniaci bdellij ana 3 j.

infundantur per noctem in aceto , & disolvantur : & accipe picis navalis , corticum radicis ireos , opopanaxis , seminum sinapi , foliorum & radicis scolopendrij ana 3 ℥ .

mucilaginis seminum lini 3 vi.

olei de capparibus irini ana 3 j. ℥ .

cerae quod satis est , misce ; & fiat unguentum Vel. paretur hujusmodi sacculus ad splenis flatus dissolvendos.

Rx. Foliorum rute , menthae , calaminthæ , eupatorij , absinthij , parietarie , scolopendrij , betonicae ana m. ℥ .

calefiant super calidam tegulam , & aspergantur vino albo , & modico aceti , & fiat sacculus , qui calidus spleni est admovendus. quod si & in stomacho per splenis consensum flatus generentur , fiat talis sacculus.

Rx. Milij , panici , surfuris frumentacei , fas lis modice triti ana p. j.

misce , & calefiant in vase æneo continuè illa movendo. ex his denum calidis factus sacculus stomacho & spleni applic-

candus , discutit enim flatus stomachi & splenis. & quoniam multoties obstru-
ctione ablata flatus in stomacho & sple-
ne remanere consueverunt, sequenti uta-
ris sacculo.

Rx. Seminum anisi , carui , fæniculi , florum
buglossæ ana 3 i. ℥.
radicum ireos 3 iiij.
florum chamæmeli meliloti , stœchadis ci-
trinæ & Arabicæ ana 3 iiij.

corticium citri siccorum 3 iiij. ℥,
commisceantur , & ex illis fiat sacculus
spleni applicandus. Poteris similiter post
cibum subscripti pulveris aliquid exhibere
ad vim concoctricem roborandam ,
& flatus discutiendos.

Rx. Cinnamomi 3 ℥.

seminum anisi , fæniculi ana 3 ℥.
glycyrrhizæ 3 iiij.

flo. buglossæ 3 j.

zinziberis 3 j.

fiat pulvis tenuissimus , cui adde sacchari
tantundem , atque illo utaris post cibum.
Quia verò ægritudo chronica est , & æ-
gri cum multis medicamentis assumptis
non curati medicis fidem adhibere &
obtemperare diutius nolunt , tunc æger
naturæ relinquendus est , & per inter-
valla à medicamentis abstinentur , &
alia præsidiorum genera tentanda sunt.
Verbi gratia , injiciendus illi timor est ,

nar-

narrando rumorem esse, illum furtum commisisse maximum, & pro illo ad suspendium quæri, aut aliud simile, ut quod aliquis illum capere quærerit, & ad fugam est concitandus. Posset etiam timor illi incuti, si ruina domus illi nuncietur, aut in fluvium divolvatur, ut madefiat: multi enim hac ratione curati sunt. Cogimur autem nos, cùm alia præsidia non prosunt, ad hujusmodi venire. Locusta collo appensa à proprietate quartanam curare dicitur: quod non ratione, sed experimento tantum est comprobatum. Aliquando fit quartana febris cum mistione sanguinis, tunc admiscenda sunt, quæ sanguinem coquere, & puriorem reddere possunt.

*Rx. Syrupi de endivia, de buglossa ana 3 j.
aquarum cichorij, buglossæ ana 3 j. H.*
post ebibitos syrupos hujusmodi erit adhibenda purgatio.

*Rx. Diacatholici 3 j.
diasenæ 3 iij.*

electuarij de succo rosarum 3 ij.
dissolvantur in aqua lupulorum, & fiat potio. Si verò humori melancholico cholera admista sit, tunc ijs quæ melancholicum humorem concoquunt, & purgant choleram, concoquentia & purgantia in debita proportione sunt admiscenda. Concoquentibus his uti poteris.

Rx. Sy-

Rx. Syrupi violacei è buglossa ana 3 j.
aquarum scolopendrij, lupulorum summa-
rie ana 3 j.

purgatio poterit per hæc fieri.

Rx. Confectionis hamech 3 iij.

casiæ fistulæ 3 j.

cum aqua scabioſe, & buglossæ: fiat potio,
eadem proportione, ut siti, & alijs sym-
ptomatibus occurras, procedendum est,
& præsidia quæ in hoc capite exposita
sunt, his quæ in capite de curatione ter-
tianæ simplicis præposuimus, sunt ad-
missenda. Si verò humoris melancholico
admistum sit phlegma, talibus conco-
quentibus uti poteris.

Rx. Rhodomellis syrupi de buglossa ana 3 j.
aquarum buglossæ, & fæniculi ana 3 j.

Vel;

Rx. Syrupi acetosi simplicis, oxymelitis sim-
plicis ana 3 j.
aquarum absinthij, scabiosæ, fumariæ
ana 3 j.

misce eadem ratione commisceri pote-
runt confectiones, opiata, electuaria
apozemata, utriusque humoris ratione
habita. Ex his patet, qua ratione quar-
tana febris curari possit, sive simplex sit,
sive composita. Pariter curari poterit
quartana continua: aut enim fiunt ab
humore simplici, aut composito: si à
simplici fiat, his quæ humorē melan-
cho-

CURAN. RATIONE. 305

cholicum concoquere & evacuare pos-
sunt, insistendum: si verò ab humoris-
bus permistis oriatur, tunc humor qui
melancholiæ conjungitur consideran-
dus, & pro illius natura concoquentia &
evacuantia sunt injungenda, ut docuimus
& ita absoluta est curatio febrium putri-
darum. Et si sint febres aliquæ quintanæ
& sextanæ, ut Nicolus dicit, sunt quar-
tanæ quinta vel sexta die repetentes:
quare materia quæ morbum facit, po-
tius indicat melancholiam, quia est tar-
di motus, quamvis fieri potest, ut hu-
jusmodi febres ab alijs humoribus orian-
tur. Sunt tamen signa consideranda, ut
ægritudines dignoscantur, & pro ratione
materiæ peccantis sunt applicanda præsi-
dia Hæc quidem præsidia sunt, quibus
medici prudentes uti consueverunt; illis
Hispani medici neque uti, neque ea di-
scere volunt. Vno præsidij genere sæpius
usus sum, quod tale est, ut pro illo omnes Deo
optimo maximo gratias reddere debeamus,
qui talem vim huic medicamento, prout &
alijs multis, concesserit. est autem tale, ut
cùm primum quis illo uti cœperit, statim illius
vires, commodum & utilitatem percipiat.
Est autem hoc medicamentum falsa parilia;
cujus decoctum eo quo dicimus modo para-
tum, ebitum quartanas brevi curat. Paucis
diebus etiā cujuscunque speciei hydropem fa-
nat,

nat, adeò ut illam magno miraculo Deus creasse videatur, & ejusdem usum nobis ostendat, ad hujusmodi & alias plurimas exigitudines propulsandas, cum tam brevi illas curet; nec insuavis adeò sit, ut quispiam abhorreat. Modus autem in quartanis curandis observandus talis erit. Præmittendæ sunt evacuationes aliquæ, prout hoc eodem capite declaravimus. Evacuatione facta, atque eadem, si oporteat iterata, decoctum falsæ pariliæ eo, quem hic tradimus, modo paratum, in prandio & cœna loco aquæ, aut vini pro potu est exhibendum; neque sudores provocandi sunt, aut alia adhibenda diligentia, nisi aliquæ huic febri aptæ evacuationes factæ fuerint. ab his curationem auspicaberis. Primo quinque diebus summo manè hujusmodi syrupsus exhibendus.

Rx. Oxymelitis. f.

syrupi de bugloßæ ana 3 j.
aquarum bugloßæ, endiviæ ana 3 j. ℥.
quibus absolutis, peccantes humores tali medicamentò minuendi.

Rx. Diasenæ, electuarij Indi ana 3 ℥.

myrobalanorum Indorum 3 ij.

misce, & cum decocto communi fiat potio: deinde ad ea quæ validius concoquunt & eyacuant, deveniendum, vide licet;

Rx. Ra-

CURAND. RATIONE. 307

R. Radicum apij, fæniculi, cichorij, eryngij,
contusarum ana $\frac{3}{4}$ ij.
polypodij quercini optimè contusi $\frac{3}{4}$ iiij.
foliculorum senæ $\frac{3}{4}$ j.
scolopendrij, dauci cretici ana m. j.
thymi, epithymi ana p. i.
decoquantur in aquæ $\frac{1}{2}$ xij.
& aceti $\frac{1}{2}$. j. $\frac{1}{2}$. ad $\frac{1}{2}$ x.
fiat deinde colatura cum fortissima expre-
sione; cui adde sacchari rubei $\frac{3}{4}$ viij.
rhodomellis $\frac{3}{4}$ iiij.
mellis communis despumati $\frac{3}{4}$ v.
misce, & fiat apozema, è quo æger si-
gulis diebus summo manè ebibat xij. $\frac{3}{4}$
& totidem vespere. Aliter etiam pote-
rit parari apozema hoc pacto.
R. Florum borraginis P. vij.
epithymi P. $\frac{1}{2}$.
polypodij $\frac{3}{4}$ iiiij.
senæ P. iij.
myrobalanorum Indorum $\frac{3}{4}$ ij.
ligni sancti $\frac{1}{2}$ j.
terantur optimè & decoquantur in $\frac{1}{2}$ xij.
aquæ ad quartæ partis consumptio-
nem: deinde fiat colatura cum fortissima
expressione, cui adde mellis commu-
nis $\frac{1}{2}$ i. $\frac{1}{2}$.
sacchari $\frac{3}{4}$ iiij.
conservæ, borraginis, stœchadis ana $\frac{3}{4}$ ij.
& fiat apozema. Concoctos humores
tali medicamento purgabis.

R.

308 DE FEBRIUM

*Rx. Massæ pilularum Indarum aggregativa-
rum ana* 3 ℥.

Dacridii G. ij.

misce, & fiant pilulæ v. absolutis eva-
cuationibus, salsæ pariliæ decoctum hoc
pacto parabitur.

Rx. Salsæ pariliæ 3 iiij.

contusæ in mortario, & minutissimè
incisæ, & decoquantur in aquæ ℥
xvj. cum senæ

3 ℥.

fiat autem decoctio lento igne, quo us-
que absumentur libræ iiij.

tunc illi adde epithymi

3 ℥.

*hermodactylorum electorum & contuso-
rum* 3 ij.

qui prius cum modico parati decocti
dissolvantur, & parumper insuper bul-
liant; deinde amoveantur ab igne; vas
optimè claudatur, quo usque decoctum
frigefiat: fiat colatura, qua utatur pro
potu in prandio & cœna, quantum ægro
satis est. Facta prioris decocti colatura,
aqua his quæ supersunt fæcibus in eo-
dem vase affundenda, & fiat altera deco-
ctio ad consumptionem ℥ j. alterum
hoc decoctum servandum est, ut in illo
quæ secundo coquenda erit salsa parilia
decoqui possit, cum sena epithymo, &
hermodactylis, ut jam diximus. erit au-
tem illi tantum aquæ superaddendum,
ut mensura prius à nobis constituta ℥

ex-

expleatur. Hujusmodi verò decoctum ad vigesimum diem usque bibendum erit: hoc enim temporis spatio quartanas curat, & in diebus x. hydropem. Interim necesse est, ut recta & accurata viētus ratione æger utatur, comedat carnes boni succi, ut vervecinas, & gallinarum elixas; à jure tamen carnium abstineat. Carnibus tantum vescatur & modico pane. Hœdorum etiam carnes, & montanarum avium, his conveniunt: in cœna à carnibus abstineat: & passulis vel amygdalis cum modico pane vesca tur, & ex parato decocto bibat, ut diximus. Illud animadvertendum est, quòd si quartana matutinis horis invaserit, ut æger cibum, & potum usque in vesperum differat, & febris declinatio expectanda; si vespere febris invadat, tunc sex vel octo horis ante illius principium æger cibandus erit.

Medici omnes, qui hucusque de tabe scripserunt, curari illam non posse affir mant. quòd autem, aut nullo modo, aut difficillimè curari possit, ex eo fieri af firmant, quia tabes fit ex acris & eroden tis humoris in pulmonem defluxu, ex quo ulceræ in pulmone fiunt: quæ qui dem curari non possunt, quia pulmo propter respirationem in perpetuo motu est; ulceræ vero si sanari debeant, quietem

310 DE FEBRIUM

tem requirunt. neque quæ hucusquæ scripta sunt præsidia, profuisse visa unquam sunt, neque medicus qui tabem curet, adhuc est inventus, cùm multos in pectore & dorso vulneratos curaverim, quibus omnino transfossus fuerat pulmo. qui omnes meis remedii sanati sunt, neque ullus, quod Dei bonitati adscribo, unquam periit. conjectura quadam ductus argumentabar. Si hi, quibus maximâ sunt in pulmone vulnera, & pulmo omnino transfossus est, & propter illius motum perpetuum tam copiosè sanguis effluit, his remedii, Deo juvante, sanantur omnes: quare & tabidi non sanabuntur, quorum ulceræ in pulmone tam parva sunt? cùm hæc animo revolverem, atque illos sanari posse judicarem, in uno curationem sum expertus, qui ita convaluit, & sanus evasit, ut nullus unquam melius: & tabidi febre continua laborantes, hoc remedio convalescunt, pingues fiunt, & boni habitus, & bene colorati, ut nihil supersit expetendum. Modus curationis talis est: Primo præcedente humorum præparatione purgandi sunt, & tribus diebus illis exhibendus hujusmodi syrpus.

R^q. Syrupi rosati, syrupi è capillis veneris
ana 3 j.

aqua

CURAN. RATIONE. 311

aquaæ scabiosæ 3 iij.

quarta die has pilulas devorent.

Rx. pilularum aggregativarum de agarico
ana 3 J.

acuantur & formentur pilulæ v. sequenti
die subscriptum apozema capere inci-
pient, quod die purgationis parandum
est, & coquendum; & in eodem vase
omnia relinquenda sunt usque in diem
sequentem, nam tunc summo manè co-
latura cum forti expressione facienda est,
& præparatio absolvenda.

F I N I S.



A. A. Adams

26

1883



