

†**Diascordium, Electuarium Diascordium** Ph.

Gall. [*Extr. Opii* 1 in 12 *Vin. Mad* gelöst, mit 48 *Mel rosat.* gemischt und 8 *Bol. Arm.*, 6 *Herb. Scord. pulv.*, *Flor. Ros. rubr.*, *Rad. Bist.*, *Rad. Gent.*, *Rad. Tormentill.*, *Sem. Berberid.*, *Cort. Cassiae*, *Cort. Cinnamom.*, *Herb. Dictamni cretic.*, *Styrax*, *Galban.* und *Gummi Arab. ana* 2, *Rad. Zingiber.* und *Piper. long. ana* 1 zugesetzt.]

Innerlich: unvermischt zu 2,0-8,0 *pro dosi*, mehrmals täglich. [In Frankreich als Stypticum bei catarrhalischen Diarrhoen sehr beliebt.]

†**Digitalinum.** *Digitalinum depuratum* Ph. Austr. Digitalin. [Chemisch indifferent, aber in hohem Grade giftiger Stoff aus der *Digitalis purpurea*; weissgelbliches Pulver von langsam sich entwickelndem, bitterem Geschmacke, schwer löslich in Wasser und Aether, leichter in Alkohol. — 0,01 etwa 6 Pf.]

Innerlich: 0,001-0,003 2-3 Mal täglich, in Pulvern, Pillen, alkoholischer Lösung [nicht anzurathen, weil bei der leichten Verdunstung des Alkohols der Gehalt desselben an Digitalin sich verändert; aus demselben Grunde ist Strohl's Vorschlag, das Digitalin in Aceton zu geben, verwerflich], in Syrup, *Sirup de Digitaline* [für diesen Syrup werden verschiedene Vorschriften mit (von 0,12-0,5 auf 1500,0) abweichendem Digitalingehalt gegeben; diese Anwendungsform ist aber eine unzuverlässige, weil die Dosirung des Mittels zu ungenau ausfällt], in Pastillen zu 0,001, in kleineren Zuckerpillen [Homolle's *Granules de Digitaline*, von denen jede 1 Milligramme enthält, und von denen 4-5 *pro die* genommen werden].

Aeusserlich: in Salbenform [1 in *Spir. vini q. s.* gelöst, mit 100 bis 150 Fett].

Elaeosacchara. Oelzucker. Ein inniges Gemenge von ätherischem Oel mit Zucker, im Verhältniss von Gtt. 1 auf 2,0, wird mit dem Namen Oelzucker bezeichnet und benutzt, wenn man ätherisches Oel einer wässrigen Flüssigkeit zusetzen will, mit der es sich sonst nicht vermengen würde, oder als Geschmacks corrigens oder Adjuvans für Pulver, oder endlich als Vehikel für die Darreichung des ätherischen Oeles selbst. — Ein stärkeres Verhältniss des Oelzuckers, als das oben bezeichnete officinelle, wird bei dem brennenden Geschmacke der ätherischen Oele niemals erforderlich sein, wohl aber kommt es bei einzelnen, sehr heftig wirkenden Oelen vor, dass man geringere Dosen verordnen will; man lässt dann entweder das officinelle *Elaeosacch.* mit Zucker verreiben, oder verordnet, da kein Oelzucker in der Apotheke vorrätig gehalten werden sollte, das beliebige Verhältniss von Oel und Zucker.

†**Elaterinum.** *Momordicin.* Elaterin. [Wirksamer Bestandtheil der *Momordica Elaterium*; kleine, farblose Krystalle, stark bitter schmeckend, wenig in Wasser löslich, schwer in Aether, leicht in Alkohol. — 0,1 etwa 6 Sgr.]

Innerlich: zu 0,003-0,004-0,008 2-3 Mal täglich, in Pulvern, Pillen oder alkoholischer Lösung [starkes, als *Acre* wirkendes Drasticum und Diureticum].

†**Electuarium anthelminthicum Hufelandii.**

El. anthelminthicum Störckii. Wurmlatwerge. [*Rad. Valerian* 3, *Tub. Jalap.* 2, *Flor. Cinae* 8, *Kali tart.* 6, *Oxymell Scill.* 15, *Syr. commun* 20.]

Sehr ähnlich dem eben erwähnten Präparate war das *Elect. Sem. Cinae comp.* Cod. med. Hamb.

† **Electuarium aromaticum** Ph. Austr. *Electuarium stomachicum.* Dargestellt aus *Pulv. Fol. Ment. pip., Fol. Salviae ana 100,0, Rhiz. Zingiberis, Rad. Angelicae ana 20,0, Cort. Cinnamom., Caryophyll., Nuc. moschat. ana 10,0, Mellis depurat. q. s.* Theelöffelweise zu nehmen.

Electuarium e Senna. *El. lenitivum s. eccoproticum.* Abführ-Latwerge, Abführ-Mus. [*Fol. Senn. pulv. 10, Sem. Coriandr. pulv. 1, Syr. simpl. 50, Pulp. Tamarind. 15. 10,0 1½ Sgr.* — Das *Elect. lenitiv. Ph. Austr.* besteht aus *Pulpa Tamarindorum 6, Syr. Sambuci 2, Fol. Senn. und Tart. depur. ana 1* mit *Mel. desp. q. s.* — Ausser den eben genannten führte die **Ph. Bav.** noch ein *Elect. lenitiv. Wintheri an,* bestehend aus *Manna electa. Pulpa Tamarind., Pulpa Cass. ana 4, Kali bitart., Fol. Senn. ana 3, Syr. Succ. Citr. 20.]*

Innerlich: $\frac{1}{2}$ -1 Theelöffel und mehr [etwa bis zu 50,0 *pro die*], am besten rein zu nehmen, unzweckmässiger in Schüttelmixturen, als Zusatz zu anderen Mixturen [1-3 auf 10], als Vehikel für Pulver.

553. R⁵
Kali carb. 3,0
[3] Acet. q. s.
ad Satur. cui adde
Aq. Ment. 50,0
Elect. e Senn. 25,0.
M. D. S. Stündlich 1 Esslöffel.

Aq. Flor. Aurant. 50,0
Elect. e Senn. 25,0
Aeth. acet. 0,5.
M. D. S. Esslöffelweise.

Heim.

554. R⁵
Acid. tart. 2,0
[3] Sacch. alb. 25,0

555. R⁵
Elix. Propriet. Paracelsi 1,5
[3] Pulv. Tub. Jalap. 3,0
Elect. e Senn. 25,0.
M. D. S. Morgens ein Theelöffel voll.

Heim.

Electuarium Theriaca. *s. theriacale s. opiatum s. aromatio-opiatum. Theriaca Andromachi.* Theriak. [Honig 72, Opium 1 in *Vin. hisp. 3* gelöst, *Rad. Angelicae 6, Rad. Serpent. virg. 4, Rad. Valer. min., Bulb. Scill., Rhiz. Zedoariae, Cort. Cinnam. Cass. ana 2, Fruct. Cardam. min. pulv., Myrrh., Ferr. sulfuric. pur. ana 1, 100 Th.* enthalten 1 Th. Opium. — Das *Electuarium aromaticum cum Opio, seu Electuarium anodynum s. Theriaca* der **Ph. Austr.** besteht aus 120 *Elect. aromat.* mit 1 Opium. — 10,0 1½ Sgr.]

Innerlich wird dieses veraltete Mittel nur noch selten gegeben und zwar zu 1,0-4,0 mehrmals täglich, in Bissen.

Aeusserlich: zuweilen zum Einreiben oder statt eines Pflasters aufgelegt.

Elemi. *Resina Elemi. Gummi Elemi.* Elemiharz. [Von einer unbekanntem, in Yucahan einheimischen Pflanze. — 10,0 1 Sgr.]
Aeusserlich: zu Salben und Pflastern.

† **Elixir ad longam vitam.** *Elixir longae vitae. Tinct. Aloës composita.* Lebenselixir. [*Aloës 15, Bol. Laric., Rad. Rhei, Zedoar., Gentian., Galang, Myrrh., Elect. Theriaca ana 4, Croc. 3, Sacchar. 48, Spir. dilut. 576,* acht Tage macerirt, gepresst, filtrirt. 40 Theile enthalten etwa 1 Aloës. — 30,0 etwa 4½ Sgr.] Vergl. *Tinct. Aloës composita.*

Innerlich: zu $\frac{1}{2}$ -1 Theelöffel, mehrmals täglich.

Ähnliche Präparate werden von Laboranten und Arkanisten unter

diversen Namen als Panaceen debitirt, so z. B. das Augsburger Lebens-Elixir, die Sulzberger'schen Tropfen u. s. w.

Elixir amarum. Bitteres Elixir. [*Extr. Trifol., Extr. Aurant. Cort. ana 2, Aq. Ment. pip., Spir. dil. ana 16, Spir. aeth. 1. — 10,0 2 Sgr.*]

Innerlich: 3-4 Mal täglich 1 Thee- bis $\frac{1}{2}$ Esslöffel.

Das *Elixir ammarum concentratum Ph. milit.* besteht aus *Extr. Absinth.* oder *Trifol.* und Wasser ana 8, *Tinct. Pom. Aurant. immatur. 4, Elaeosacch. Ment. pip. 1.* Ein Theil dieses Elixirs mit 6 Theilen Wasser bilden das *Elixir amarum ordinarium.*

***Elixir ammoniacale-opiatum.** [*Elixir e Succo Liquir. 40, Tinct. Op. croc. 1. — 400 des Elixirs enthält die löslichen Substanzen von etwas über 1 Opium. — 5,0 etwa 1 $\frac{1}{2}$ Sgr.*]

Innerlich: zu 2,0-15,0, 2-3 Mal täglich.

†**Elixir aperitivum Clauderi.** [*Aloës, Myrrhae ana 4, Croci 2, Kali carb. 8 mit Aq. Sambuc. 60 digerirt.*]

Elixir Aurantii compositum. *Elixir viscerale Hoffmanni.* Hoffmann'sches Magenelixir. [*Cort. Fruct. Aurant. 6, Cort. Cinnam. Cass. 2, Kali carb. pur. 1, Vin. Xerens. 50, Extr. Gent., Absinth., Trifol., Cascarill. ana 1; filtrirt. — 10,0 3 $\frac{1}{2}$ Sgr.*]

Innerlich: zu 1-2 Theelöffel 1-3 Mal täglich.

R₅ 556.

Elixir. Aurant. comp. 10,0

[3] *Tinct. Valerian. aeth.*

Tinct. aromat. ana 5,0

Aeth. acet. 2,5.

M. D. S. 3-4 Mal täglich 15-20-30 Tropfen. [Bei Magendarmkatarrhen und Koliken.] **Rummel.**

†**Elixir pectorale Hufelandii.** [*Rad. Helenü, Rhizom. Irid. florent., Bulb. Scill. ana 8, Benzoe's, Myrrh., Fruct. Anisi, Succ. Liquir., Ammoniaci ana 4, Croci 3, Spir. dil. 93. — 5,0 etwa 2 $\frac{1}{2}$ Sgr.*]
Theelöffelweise.

Elixir Proprietatis Paracelsi. *Elix. Proprietatis acidum. Elixir de Garus.* Saures Aloë-Elixir. [*Aloë, Myrrh. ana 2, Croc. 1, Spir. 24, Acid. sulfur. dil. 2.* (Ausser dieser Composition wird auch eine andere complicirtere mit dem Namen *Elixir de Garus* s. *Elixir cordiale* bezeichnet. Dieselbe wird nach folgender Formel angefertigt: R₅ *Myrrh., Aloës ana 3, Nuc. moschat., Caryophyll. ana 2, Spir. dil. 576, adde Syr. Flor. Aurant. 864, Aq. Flor. Aurant. 192, Coccionellae, Croci ana 2. Digere per aliquot horas et filtra.* In Frankreich dagegen ist folgende sehr einfache Formel gebräuchlich: *Tinct. Myrrh. 400,0, Tinct. Croci, Tinct. Aloës ana 300,0.*) — 10,0 2 $\frac{1}{2}$ Sgr.]

Innerlich: 1 Theelöffel einige Mal täglich, *pur* oder in Mixturen, als Zusatz zu Senna-Latwerge. [Besonders als Emmenagogum gerühmt.]

†**Elixir Proprietatis cum Rheo.** [*Aloë 6, Myrrh. 2, Croc. 1, Rheum 4, Vin. hisp. 64, Acid. hydrochl. 4.*]

†**Elixir Proprietatis sine Acido.** [*Aloë 6, Myrrh. 2, Croc. 1, Kali tart. 3, Aq. dest. 7, Spir. dil. 14.*]

Elixir e Succo Liquiritiae. *Elix. pectorale Ph Helv.*

Elixir Régis Daniae, Elixir Ringelmanni. Brustelixir. [Succ. Liquir., Liq. Ammon. anis. ana 1, Aq. Foeniculi 3. — 10,0 1½ Sgr.]

Theelöffelweise und als Zusatz zu Mixturen.

†*Elixir viscerale Hofmanni.* [Extr. Card. bened., Cascarill., Centaur. minor., Gentian., Myrrhae ana ¼, Vin. Malac. 24, Tinct. Cort. Aurant. 8.]

†*Elixir viscerale Kleinii.* [Cort. Fruct. Aurant. 8, Myrrh. 1, Vin. Xerens. 80, Extr. Card. bened. 3, Extr. Cascar. 1, Kali acet. 2. — 30,0 etwa 6½ Sgr. — Das *Elixir viscerale Kleinii* der früheren Ph. Hann. ist eine Mischung von 1 Kali acet. in 64 *Elixir viscer. Hofmanni*.]

**Elixir viscerale Ph. paup.* [Extr. Absinth., Gentian., Centaur. min., Trifol. ana 1 in Aq. aromat. Ph. p. 18 mit Tinct. aromat. Ph. p. 1. — 30,0 etwa 2½ Sgr.]

†*Emetinum purum.* *Cephaëlinum.* Emetin. [Alkaloid der *Rad. Ipecacuanhae*; weisses, geruchloses, schwach bitter, widerlich schmeckendes Pulver, wenig in Wasser, leicht in Alkohol und verdünnten Säuren, gar nicht in Aether und Oelen löslich. — 0,01 etwa ¼ Sgr.]

Innerlich: zu 0,005-0,01 auf einmal und nöthigenfalls noch eine oder zwei Dosen nachher zu nehmen, in Pulver oder Solution [mit etwas Säure]. [Wirkt stark reizend und macht leicht Gastritis (v. Schroff). Vorzüge vor der *Rad. Ipecac.* sind nicht ersichtlich]. Auch zur subcutanen Injection, um Erbrechen zu erzeugen versucht [etwa Emetin. 0,02, Acid. sulfur. Gutt. 1, Aq. dest. 5,0; davon 0,5 bis zu einer vollen Spritze (0,002-0,004)], hat sich bisher nicht bewährt (A. Eulenburg).

557.

R:

Emetini puri in pauc. Acid. nitr. soluti 0,05

[4] *Inf. Flor. Tiliae* 100,0

Syr. Alth. 25,0.

M. D. S. ¼stündlich 1 Esslöffel, bis Erbrechen erfolgt.

Magendie.

Emetinum coloratum seu impurum s. *Extract. Ipecacuanhae.*

†*Emplastrum ad Clavos pedum.* Hühneraugenpflaster. [*Galban.* 24 mit Essig zum Pflaster gekocht, *Fix nav.* 12, *Empl. Plumb.* 6, *Ammon. hydrochl.* und *Aerugo* ana 1.]

Emplastrum ad Fonticulos. Fontanellpflaster. [*Resina Pini* 3, *Sebum* 1, *Empl. Litharg. simpl.* 36 werden zusammengeschmolzen, auf Leinwand gestrichen und daraus runde Scheiben von 3 Centimeter Durchmesser ausgestochen. — 10,0 1½ Sgr.]

Emplastrum adhaesivum. *Empl. adhaesiv. flavum.* *Empl. Lithargyr. c. Colophon.* Heftpflaster, Klebepflaster. [18 Oelsäure, 10 Bleiglätte werden zu Pflaster gekocht und mit 3 *Colophon.* und 1 *Sebum* zusammengeschmolzen. — 10,0 ½ Sgr. Auf Leinen gestrichen 1 Bogen etwa 16 Sgr.]

Emplastrum adhaesivum Anglicum. *Empl. Anglicanum.* *Court-Pflaster.* *Sparadrap de Colle de Poisson.* Englisches Pflaster. [Rother, schwarzer oder weisser Taffet mit einer Lösung von *Colla piscium* in Wasser und später mit einer Lösung von *Colla piscium* in

Wasser und Spiritus, der etwas Glycerin zugesetzt worden, bestrichen und auf der Rückseite mit *Tinct. Benzoes* überzogen. — 10 Quadrat-Centimeter $\frac{1}{2}$ Sgr.] Statt des Taffets bedient man sich in neuerer Zeit des ähnlich präparirten Goldschlägerhäutchens, welches feiner, anschmiegender, impermeabel und durchsichtig ist.]

† **Emplastrum adhaesivum cum Oleo Lini.**

[Bleiweiss mit Leinöl unter Zutropfen von Wasser gekocht. — Wirkt weniger reizend, klebt aber nicht so gut als das gewöhnliche Heftpflaster.]

† **Emplastrum adhaesivum Edinburgense.**

Emplastr. piceum nigr. Schwarzes Pechpflaster. [*Empl. adhaesiv.*, zu dessen Constitution statt des Colophon eine gleiche Menge Schiffspech genommen ist. — 10,0 $\frac{1}{2}$ Sgr.]

Emplastrum Ammoniaci.

Ammoniak-Pflaster. [*Cer. flavae, Res. Pini burgund. ana 4, Ammoniac. 6, Galban. 2, Terebinth. 4.* — 10,0 $2\frac{1}{2}$ Sgr.]

† **Emplastrum antarthriticum (Bennigsen).**

[*Empl. Litharg. 13, Cera flava 2, Sapo hisp. 1, Camph. $\frac{1}{2}$, Castor. canad. $\frac{1}{2}$.*]

Emplastrum aromaticum.

Loco Empl. stomachici. Aromatisches Pflaster, Magenpflaster. [Wachs, *Sebum ovill., Terebinth. commun., Oliban., Benzoe, Ol. Nucistae, Ment. pip. und Caryophyllor.* — 10,0 $4\frac{1}{2}$ Sgr.]

† **Emplastrum basilicum.**

Königs-Pflaster. [*Cer. flav. 8, Coloph. und Pix naval. ana 10, Ol. Oliv. 3.*]

Emplastrum Belladonnae.

[*Cer. 4, Terebinth. und Ol. Oliv. ana 1, Fol. Bellad. 2.* — 10,0 2 Sgr.]

† **Emplastrum Calcariae piceum.**

Empl. antarthriticum Helgolandicum. [Vergl. *Calcium sulfurato-stibiatum.*]

Emplastrum Cantharidum ordinarium.

Empl. vesicatorium ord., Blistering-Plaster, Sparadrap vesicant. Gewöhnliches Spanisch-Fliegen-Pflaster. [*Cer. flav. 4, Cantharid. gr. pulv. 2, Terebinth., Ol. Oliv. ana 1.* — 10,0 $2\frac{1}{2}$ Sgr.] [Das *Emplastrum Cantharidum Ph. Austr.* besteht aus *Cerae flav., Terebinth. communis ana 4, Cantharid. pulv. 5, Ol. Oliv. 2.*]

Am besten mit einem Rande von Heftpflaster versehen [in der Regel der Art, dass man das Canthariden-Pflaster auf Heftpflaster streicht und den Rand frei lässt] oder durch Heftpflasterstreifen befestigt. Um Hautröthe hervorzurufen bedarf es 2-4, zum Blasenziehen 6-8 Stunden, jedoch variiren diese Zeiträume gar sehr nach der grösseren oder geringeren Vulnerabilität der Haut. — Zur Beschleunigung und Erhöhung der Wirkung kann man mit Vortheil das Pflaster mit einem Tropfen Oel bestreichen. — Soll nach der Production der Blase keine weitere Eiterung unterhalten werden, so schneidet man die Blase an ihrem unteren Theile an und verbindet sie dann mit einem Lappchen, das mit *Butyrum Cacao* oder *Unguent. cereum*, oder *Unguent. Flumbi* u. dgl. bestrichen worden. — Oft ver trägt eine derartige Hautstelle gar keine Salbe und selbst das mildeste Fett bewirkt eine immer mehr sich ausbreitende Ulceration; man thut dann am besten,

einfach mit Watte zu verbinden, unter welcher sich die Granulationen gut und schnell bilden. — Will man Eiterung unterhalten, so verbindet man, nachdem die Epidermis abgetragen, die oxcorierte Stelle mit *Ungt. Cantharidum* oder mit anderen minder reizenden Salben [*Ungt. basilicum*]. — Um das Spanisch-Fliegen-Pflaster eine allgemeine Wirkung erzielen zu lassen, legt man es in den Nacken oder an die Waden — zu lokaler Wirkung dem leidenden Theile möglichst nahe —; bei Ischias legt man Streifen des Pflasters an das kranke Glied, am besten in langen schmalen Streifen dem Verlaufe des Ischiadicus folgend, und wechselt öfter deren Stelle: *Vesicatoria volantis*. — Zur Verhütung der Strangurie soll man dem *Empl. Canth.* Campher und Opium zusetzen; es ist jedoch sehr fraglich, ob der Zweck dadurch erreicht wird. — Will man eine sehr schnelle Wirkung des Pflasters, so lege man vorher auf die betreffende Hautstelle einen Sinapismus, dem man etwas Canthariden-Pulver zusetzen kann, oder bestreiche die Stelle mit einer Mischung aus *Spirit. Sinapis* und *Tinct. Cantharid.*

Ricord liess ehemals gegen syphilitische Knochenschmerzen Blasenpflaster auflegen und die aufgeschnittene Blase mit Opiumsälbe verbinden. **Veiel** empfahl eine barbarische Kur gegen veraltete Fussgeschwüre, indem er sie mit Blasenpflaster bedeckte und dies 24 Stunden liegen liess, später das Geschwür mit einer Lösung von *Zinc. sulfuric.* behandelte, eine Kur, welche zuweilen, trotz dieser Maassregeln, durch die strenge Diät und Ruhe erfolgreich war. **Milton** empfahl in neuerer Zeit gegen chronische Tripper Blasenpflaster auf die untere Seite des Penis (!).

Emplastrum Cantharidum perpetuum. *Emplastrum Euphorbii. Empl. vesicator. perpetuum (s. Janini).* Anhaltendes oder immerwährendes Spanisch-Fliegen-Pflaster. [*Colophon.* und *Cera flava ana* 50, *Terebinth.* 37, *Resina Pini* 25, *Sebum* 20, *Cantharides subtt. pulv.* 18 und *Euphorb. pulv.* 6. — 10,0 2½ Sgr.] Die **Ph. Austr.** giebt folgende Vorschrift: *Terebinth. commun., Mastix ana* 4, *Cantharid. pulv.* 2, *Euphorbii* 1.

Aehnliche Compositionen sind folgende, in einzelnen Gegenden beliebte Pflaster:

† *Emplastrum Cantharidum Lübeckii.* [*Coloph., Res. burg. ana* 2, *Styrax, Pulv. Canth. ana* 1. Klebt, wenn es erwärmt wird, sehr gut und lässt sich später abnehmen, ohne dass die Epidermis mitgerissen wird.]

† *Emplastrum Cantharidum Parisiense.* [*Tinct. Canth., Resin. burgund., Viscum aucuparium (Ol. Lini inspissatum), Bals. Peruvian.*; mit dieser Masse werden kleine, Quadrat-Zoll grosse Stücke Englisch-Pflaster derart bestrichen, dass ein drei Linien breiter Rand frei bleibt; vor der Application werden die Pflaster schwach befeuchtet. — Eine sehr gute Formel. — **Delpech** und **Guichard** empfehlen das cantharidensaure Kali zum Pflaster und zwar nach folgender Formel: 2,0 Gelatine, 10,0 Wasser, 10,0 Alkohol, 0,2 cantharidensaures Kali und etwas Glycerin auf Guttaperchapapier, derart, dass jedes Quadrat-Decimeter 0,01 des Salzes enthält. Das Pflaster wird vor dem Gebrauche mit etwas Wasser benetzt.]

† *Emplastrum Cantharidum (vesicatorium) perpetuum Ph. P.* [*Empl. Cantharid. ord.* 1 und *Empl. citrin.* 3]

† *Emplastrum Cantharidum Anglicum.* [*Canthariden, Fett, Cerat. Resin. burgund. ana.*]

† *Emplastrum vesicatorium sericeum. Sericum vesicans. Tela serica vesicatoria. Taffetas vesicant.* [Aus einer *Tinct. Cantharid. aetherea* wird durch Abdestilliren des Aethers ein öliger Rückstand gebildet, mit dem doppelten Gewichte gelben Wachses versetzt und auf ein gewichenes Zeug gestrichen. — Der *Taffetas vesicans* der früheren **Ph. Austr.** wird mit einer Verbindung aus *Tinct. Canth. aetherea* 45,0 auf 120,0, *Mastix* 2,0, *Sandarach* 5,0, *Terebinth.* 1,25, *Ol. Lavandul.* (10 Tropfen) bestrichen.]

Emplastrum Cerussae. *Empl. Plumbi hydrico-carb. s. album coctum.* Bleiweisspflaster, Froschlaichpflaster. [*Cerussae* 18, *Lithargyr.* 10, *Ol. Oliv.* 25. — 10,0 1 Sgr.]

† **Emplastrum Cerussae rubrum.** [*Cera flav.* und *Seb. ana* 8, *Ol. Oliv.* 3, *Ceruss.* 2, *Minium* 1, *Camph.* $\frac{1}{2}$.]

Emplastrum Conii. *Emplastrum de Cicuta* *). Schierlings-Pflaster. [Wie das *Emplastrum Belladonnae* bereitet. — 10,0 2 Sgr. — Das *Emplastrum Conii macul. Ph. Austr.* besteht aus *Herb. Conii macul. pulv.* 2, *Terebinth. comm.* 1, *Cera flava* 10, *Azung. Porci* 5.]

Emplastrum Conii ammoniacatum. *Emplastr. Conii cum Ammoniaco.* [*Ammoniacum* und *Acet. scillae ana* 2 werden zu einer Art Mus gekocht und mit 9 *Empl. Conii* gemischt. — 10,0 3 Sgr.]

† **Emplastrum consolidans.** *Emplastrum griseum. Empl. calaminaris.* Heilpflaster. [*Empl. Cerussae* und *Plumb. simpl., Lapis calaminar., Oliban., Mastix.* — 30,0 etwa $4\frac{1}{2}$ Sgr.]

† **Emplastrum contra Tineam.** [*Resin. Pini burgund.* 32, *Ol. Olivar.* 3, *Farin. Tritic. tost.* 16. — 30,0 etwa $1\frac{1}{2}$ Sgr.]

† **Emplastrum Cumini.** [*Empl. Litharg., Cer. flav., Ol. Chamom. coct., Sem. Cumin. pulv., Ol. Cumin. aeth.*]

† **Emplastrum defensivum rubrum.** [*Cer. flav., Sebi ovill. ana* 24, *Cetacei* 2, *Minii* 12, *Ceruss.* 24, *Camph.* 3, *Ol. Oliv.* 12.]

† **Emplastrum diaphoreticum Mynsichti.** [Wachs, Colophonium, Ammoniak, Galban, Terpenthin u. s. w. — 5,0 etwa $1\frac{1}{4}$ Sgr.]

† **Emplastrum ferratum s. martiatum.** [Eisenchlorid mit *Sapo domesticus.*]

† **Emplastrum Foeni graeci compositum.** *Empl. malacticum.* [Eine Ceratmasse mit Harzen und *Pulv. Foeni graeci, Sem. Lini* und *Curcum.*]

Emplastrum foetidum. *Empl. Asae foetidae. Empl. resolvens Schmuckeri.* [*Ammoniacum* 1, *Asa foet.* 3, *Terebinth., Cera flava* und *Resina Pini ana* 2. — 30,0 $5\frac{1}{2}$ Sgr.]

Emplastrum fuscum. *Empl. Matris fuscum Ph. Saxon.* *Emplastr. Matris.* Schwarzes Mutterpflaster. [2 Mennige mit 4

*) In der Regel nehmen die Aerzte bei ihren Verordnungen *Cicuta* und *Conium* gleichbedeutend; dies ist jedoch nur insofern richtig, als es sich um die *Cicuta terrestris*, altes Synonym des *Con. macul.* handelt; die *Cicuta virosa* (Wasserschierling) ist heftiger wirkend und keines ihrer Präparate officinell.

Baumöl gekocht, 1 Wachs. — 10,0 1½ Sgr. — 8 Th. *Empl. fusc.* mit 5 Th. Baumöl geschmolzen, geben das *Unguent. matris, Ouguent de la mère.*]

Aehnlich das *Empl. Triapharmacum* u. a.

Emplastrum fuscum camphoratum. *Empl. nigrum s. universale s. Noricum. Empl. fuscum Ph. Bor. Empl. Minii adustum.* Universalpflaster. Schwarzes Mutterpflaster. Nürnberger Pflaster. [Campher 1 zu *Empl. fuscum* 100. — Aehnlich das Züllichauer, Hamburger und Hallesche Waisenhaus-Universalpflaster, sowie die *Legraud'sche Salbe.* — 10,0 1½ Sgr.]

Emplastrum Galbani crocatum. *Empl. de Galbano crocatum.* [Galban 24, Terpenthin 6, Crocus 1, Wachs 8 und *Empl. Lithargyri simpl.* 24. — 10,0 3½ Sgr.]

558. R
[9] *Empl. Galb. croc.* 25,0
leni calore emollit. adde
Opü pulv. c. pax. Ag. in pult.
redacti
Camph. trit. ana 5,0.
M. f. emplastr., ext. supr. cor. D. [Bei
Frostbeulen zweiten Grades.] **Rust**

[4] *leniss. calor. emoll. adde*
Opü pulv. c. pax. Ag. in pult.
redacti
Ammon. carbon. pyro-oleos. pulv.
ana 1,0
Camph. trit. 2,0
Ol. Cajeput. 1,0.
M. f. emplastr. D. S. Auf die Magen-
gegend zu legen.

Phoebus.

559. R
Empl. Galb. croc. 15,0

† **Emplastrum glutinalicum Clinici chirurg. Berolinens.** [*Empl. Plumbi* 6, *Pix burgund.* 1.]

Emplastrum Hydrargyri s. mercuriale. Quecksilber-Pflaster. [*Empl. Litharg. simpl.* 24, *Cer. flav.* 6, *Hydrarg. depur.* 8, *Terebinth. commun.* 4. Das *Emplastrum Hydrargyri Ph. Austr.* besteht aus *Hydrarg.* 13, *Terebinth.* 7, *Empl. diachyl. simpl.* 50, das der früheren *Ph. Bav.* aus *Seb.* 5, *Cer. flav.* 11, *Hydrarg.* 6, *Terebinth.* 2. — 10,0 2½ Sgr. — *Sparadrap de Vigo* besteht aus *Emplastrum adhaesivum* mit 20 pCt. Quecksilber, gegen ulcerirende Syphiliden besonders gerühmt: **C. Paul.**]

560. R
[3] *Empl. Conii*
Empl. Hydrarg. ana 10,0
Opü pulv. 0,6.
M. f. l. a. emplastrum. D. S. Auf Leder
gestrichen aufzulegen. [Bei Bubonen.]

562. R
Empl. Hydrarg. 15,0
[2] *Camph. trit.*
Opü pulv. ana 0,6-1,0.
M. f. l. emplastrum.

[Bei Parotitis oder anderen geschwollenen oder indurirten Drüsen.]

Rust.

561. R
Empl. Hydrarg. 25,0
[3] *Jodi* 0,5.
M. f. l. a. emplastrum. D. [Bei sero-
phulösen Drüsenanschwellungen.]

Emplastrum Hyoscyami. Bilsenkraut-Pflaster. [Wie *Empl. Belladonn.* — 10,0 2 Sgr.] 1 *Empl. Hyoscyami* mit ½ *Empl. opiatum* als schlafmachendes (?) Pflaster in die Schläfengegend gelegt.

† **Emplastrum irritans.** [*Empl. Litharg., Coloph., Cer. flav., Pix navalis, Tereb. comm., Ol. laurinum, Camph.*]

Emplastrum Lithargyri compositum. *Empl.*

Plumbi compositum. Empl. Diachylon compositum. Sparadrap commun. Zusammengesetztes Blei-Pflaster. Zuggpflaster, Gummipflaster. [Empl. Hydrarg. simpl. 24, Cer. flav. 3, Ammoniak, Galbanum, Terpenthin ana 2. — 10,0 2 Sgr. — Die Ph. Austr. hat folgende Vorschrift: Empl. diachyl. simpl. 200, Gummi Ammoniaci 25, Terpenthin 8, Cer. flav. 30, Resin. Pini 16.]

Emplastrum Lithargyri molle. *Empl. Plumbi molle. Empl. Matris album Ph. Saxon. Weisses Mutterpflaster. [Empl. Litharg. simpl. 3, Adipis suill. 2, Sebum und Cera flava ana 1. — 10,0 1½ Sgr.]*

Emplastrum Lithargyri simplex. *Empl. Plumbi simplex s. Diachylon simplex. Einfaches Blei-Pflaster. [Ol. Oliv., Adeps und Litharg. pulv. ana part. aeq. — 10,0 1 Sgr.]*

† **Emplastrum Matris Sieboldi.** [Aehnlich dem *Empl. Lithargyri molle*, nur braun gekocht. — 5,0 etwa 1 Sgr.]

Emplastrum Meliloti. [Wie *Empl. Belladonn.* — 10,0 2 Sgr. — Das *Empl. de Meliloto Ph. Austr.* besteht aus *Colophonium, Ol. Oliv. ana 40, Cer. flav. 80, Gummi Ammoniaci 10, Terebinth. comm. 25, Herb. Meliloti pulv. 60, Herb. Absinthii, Flor. Chamom., Fruct. Lauri ana 4.*]

563.

R
*Emplastri Meliloti q. suff.
extendatur supra chartam
magnitudinis hujus praecepti
Empl. consperge
Pulv. Opii*

*tanta quantitate, ut aequaliter
distribuatur, dein charta ce-
rata accurate obiectum convolve
Emplastrum de Meliloto cum Opio.*
[Bei Herpes Zoster.]

Hebra.

Emplastrum Mezerei cantharidatum. *Loco Emplastri Drouoti. Seidelbast-Pflaster. [Canth. 30,0, Cort. Mezerei 10,0 werden in Essigäther macerirt, dem Filtrate wird Sandarac 4,0, Elemi 2,0, Colophonium 2,0 zugesetzt und die Mischung auf einen dem *Empl. adhaesiv. anglicum* ähnlich präparirten Taffet von 300 Quadrat-Centimetern aufgetragen. Aehnlich der *Taffetas epispasticum Americanum*. — 10 Quadrat-Centimeter 6 Pf.]*

Emplastrum Minii rubrum. *Rothes Mennigepflaster. [Cera flava, Sebum, Minium und Ol. Olivarum ana 100 mit Camphora 3. — 10,0 1½ Sgr.]*

† **Emplastrum miraculosum Rademacheri.** [*Minium, Ol. Olivar., Succinum, Camphora, Alumen ustum.* — 30,0 etwa 4 Sgr. — Von *Rademacher* gegen jauchige chronische Geschwüre als „miraculöses“ Pflaster empfohlen. — Aehnlich das *Empl. balsamicum Siemerlingi*.]

† **Emplastrum narcoticum.** [Aus *Empl. Belladonn., Conii* und *Hyoscyami ana* gemischt.]

Emplastrum opiatum s. cephalicum s. odontalgicum. *Opium-Pflaster. Hauptpflaster. [Terpenthin 15, Opium 2, Benzoë 4, Elemi 8, Cera flava 5, Olibanum 8 und Balsamus peruvianus 1. — Sehr feste Consistenz, aber doch befeuchtet, gut klebend. — 10,0 3¼ Sgr.]*

Emplastrum oxycroceum. [*Res. Pini, gelbes Wachs, Co-*

lophonium ana 6, Ammoniak, Galbanum, Mastix, Myrrhe, Weihrauch ana 2, Terpenthin 3 und Safran 1. — 10,0 4 $\frac{1}{2}$ Sgr.] Das *Empl. oxycroc.* Ph. Austr. hat ein etwas verschiedenes Mischungsverhältniss.

†*Emplastrum piceum.* [Fichtenharz und Terpenthin. — Das marktschreierisch angepriesene Bruchpflaster von Krüsi-Altherr besteht aus 5 Th. *Resina Pini* und 2 Th. *Terebinthina*.]

Emplastrum Picis irritans. [*Resina Pini* 32, *Cer. flav.*, *Tereb. comm.* ana 12, *Euphorb.* 3. — 10,0 1 $\frac{1}{2}$ Sgr.]

†*Emplastrum Picis liquidae.* [*Resina Pini empyreumat.* liq. 16, *Cer. flav.* 8, *Resin. Pini burg.* 1. — 30,0 etwa 2 $\frac{1}{2}$ Sgr.]

†*Emplastrum ad Rupturas.* *Empl. ad Hernias.* Bruchpflaster. [Eine höchst componirte Ceratmasse mit Harzen, der *Bolus*, *Lapis Haematites* und *Rad. Consolidae* beigemischt ist.]

Emplastrum saponatum. Seifen-Pflaster. [*Empl. Litharg. simpl.* 72, *Cer. flav.* 12, *Sapo hisp. pulv.* 6, *Camph.* 1. — 10,0 1 $\frac{1}{2}$ Sgr.]

†*Emplastrum sulfuratum.* [Colophonium, Myrrhe, Asphalt, Ammoniak, Galbanum, Sagapenum, Terpenthin, *Ol. Lini sulfurat.*, *Ol. Terebinth.*, *Campher.* — Schmierig. — 30,0 etwa 4 $\frac{2}{3}$ Sgr.]

†*Emplastrum Tartari stibiati seu Stibio-Kali tartarici Form. magistr. in usum Paup.* [*Tart. stib.* 1, *Empl. Lithargyri comp.* 4. — 4,0 etwa 1 $\frac{1}{2}$ Sgr. — Das *Empl. Tartari stibiati* der früheren Ph. Hann. wird aus *Cerat. Res. Pini* 7 und *Tart. stib.* 1 *ex tempore* bereitet.]

†*Emplastrum de Vigo sine Mercurio.* [Ein antediluvianisches Pflaster, das lebende Frösche, Regenwürmer und anderes animalisches und vegetabilisches Ungeziefer zusammenkocht und welches, mit Mercur versetzt, das *Empl. de Vigo c. Mercurio* bildet. In neuerer Zeit hat man in Frankreich und England dieses letztere Pflaster wieder hervorgesucht, um es als Abortivmittel bei Variola zu verwenden; ein Erfolg ist schwerlich davon zu erwarten, und der etwaige Nutzen, den es gewährt, dürfte sich durch *Empl. Hydrargyri* gewiss eben so gut erzielen lassen. — Ueber ein vereinfachtes *Sparadrap de Vigo* vergl. *Emplastrum Hydrargyri*.]

†*Emplastrum Zinci.* Zinkpflaster. *Emplâtre diachylon à base de Zinc.* [Guénau de Mussy empfiehlt dieses Pflaster vorzugsweise deshalb, weil dabei die Gefahr einer Bleiintoxication, die er bei ausgedehntem Gebrauche des *Empl. Plumbi* fürchtet, vermieden werde. — Es wird dargestellt durch Zersetzung einer Lösung weisser Seife mit Zinkvitriol-Lösung; das fettsaure Zinkoxyd wird getrocknet und mit Oel und Harzen (nach Art des *Empl. Plumbi comp.*) versetzt.]

Emulsiones [vergl. den allgemeinen Theil S. 44].

Emulsio Amygdalarum composita. [*Amygdalae dulces* 4, *Sem. Hyoscyami* 1 mit *Aq. Amygdal. amar. dil.* 64 zur Emulsion gebracht und *Saccharum* 6 und *Magnesia usta* 1 zugefügt. Soll stets zur Dispensation frisch bereitet werden.]

Innerlich: theelöffelweise.

***Emulsio communis** Ph. mil. [*Amygd. dulc. vel Sem. Cannab. vel Sem. Papav. 1, Aq. commun. 12, Sacchar. $\frac{1}{2}$.*]

***Emulsio oleosa** Ph. mil. [*Ol. Oliv. 30,0, Gummi Arab. 15,0, Aq. commun. 250,0, Sacchar. 15,0.* — *Emulsio oleosa Ph. Helv.* besteht aus *Ol. Amygdal., Gummi Arab. ana 1, Aq. 8.*]

***Emulsio Papaveris Form. mag. Ber. in us. paup.** [*Sem. Papav. 15, Aq. comm. q. s. ut f. Emulsio 125, Syr. simpl. 15.*]

†**Ergotinum.** Ergotin. [Ein, nach **Wiggers**, aus dem *Secale cornutum*, nachdem dieses mittelst Aether von seinem fetten Oele befreit worden, durch Extraction mit *Spirit. dilut.* dargestellter indifferenten Stoff; rothbraunes Pulver von aromatischem Geruch, bitterem Geschmack, in Wasser nicht, in Aether wenig, in Alkohol und Essigsäure leicht löslich.] Ein wirklich reines Ergotin, das diesen Namen mit Recht verdient und constante Eigenschaften besitzt, ist überhaupt noch nicht dargestellt worden. Das Ergotin nach **Bonjean** darf noch viel weniger mit dem Namen Ergotin bezeichnet werden als das von **Wiggers**. [Vergl. *Extr. Secalis cornut.*]

Innerlich: zu 0,006-0,025, in Pulvern, Pillen. [Bisher noch wenig versucht; die therapeutischen Beobachtungen über Ergotin beziehen sich fast sämmtlich auf das fälschlich mit diesem Namen belegte **Bonjean'sche** *Extractum Secalis cornuti* (vergl. dieses)]

nEserinum. Eserin. *Physostigmin.* Aus der Calabarbohne dargestellt (**Fraser**), ist der wirksame Bestandtheil derselben. *Eserinum sulfuricum* 1 zu 10000 *Aqua*, auf die Conjunctiva gebracht, bewirkt innerhalb 1 Stunde Myosis. — Auch zu subcutaner Injection [circa 0,001] versucht (**Vée** und **Leven**).

Essentiae. Unter dieser Bezeichnung verstand die frühere **Ph. Sax.** Tincturen, welche aus dem frisch ausgepressten Saft der betreffenden Pflanze, mit gleichen Theilen verdünntem Weingeist gemischt, bestehen. Solcher Essenzen, zu denen die *Essentiae s. Tincturae radicales* oder *fortes* der Homöopathen den Anlass gegeben zu haben scheinen, und die in der That als zweckmässige Formeln bezeichnet zu werden verdienen, nennt die frühere **Ph. Sax.** folgende: *Essent. Aconiti, Belladonnae, Bryoniae, Cicutae [Conii], Digitalis purp., Hyoscyami, Lactuciae virosae, Rhois toxicodendri* und *Stramonii*. Von diesen werden *Ess. Belladonnae* und *Stramonii* bis zu 12 Tropfen *pro dosi* gereicht. Eine ähnliche Bereitungsart, wie die hier angegebene, wurde von der **Ph. Bor. Ed. VI.** für die *Tinct. Conii* und für *Tinct. Nicot.* [vgl. diese] vorgeschrieben. — Die meisten **Rademacher'schen** Tincturen, die wir weiter hinten aufführen, sind genau den *Essentiae Ph. Sax.* nachgebildet, nur dass sie mit Spiritus gemischt werden. *Essenz, Essence* in der **Ph. Gall.**, bezeichnet meist ätherische Oele, zuweilen auch schwach spirituöse Auszüge.

†**Essentia Asperulae odoratae s. Matrisylvae.** Waldmeister- oder Maitrank-Essenz. [Durch spirituöse Maceration aus dem frischen Kraute gewonnen. — Enthält Coumarin. — 30,0 etwa 8 Sgr.]

Innerlich: als passender Zusatz zu vielen, namentlich gelatinösen Arzneiformen.

†**Essentia ophthalmica Romershausen.** Romershausen'sche Augen-Essenz. [Dieses viel gebrauchte und nicht üble Stärkungsmittel für relaxirte oder catarrhalische Zustände der Augenlider besteht aus *Sem. Foeniculi recent.* 1, *Spirit. dil.* 12, *digere per horas* 24, *exprime et filtra.* — 30,0 etwa 3 Sgr.]

Aeusserlich: mit 5 Theilen *Aq. pluvial.* oder *destill.* zum Umschlag auf's Auge.

†**Essentia Rhamni frangulae** s. *Cort. Frangulae.*

†**Essentia Sarsaparillae.** Sarsaparill-Essenz. [*Rad. Sarsaparillae* 10 ausgekocht, das Decoct filtrirt, dann auf 9 eingedampft und *Spirit. Vin. gall.* 1 zugesetzt. — Eine von v. Arnim vorgeschlagene sehr zweckmässige und praktisch bewährte Form. — 1 Esslöffel enthält etwa das Solubile aus 15,0 Sarsaparille. — 10,0 2 Sgr.]

Innerlich: täglich 2-4 Esslöffel in St. Germain-Thee oder einem einfachen *Inf. Fol. Sennae.*

Essentia seripara s. *Liquor seriparus.*

Eucalyptolum. [Aetherisches Oel der *Fol. Eucalypti globuli.* — Vergl. diese.]

Euphorbium. Euphorbienharz. [An der Luft getrockneter Saft von *Euphorbia resinifera* Berg. — 10,0 *gross. pulv.* 1 Sgr., *subt. pulv.* 1½ Sgr.]

Aeusserlich: als Streupulver [mit *Magnesia* oder *Amylum* vermischt], als Zusatz zu Salben [1 auf 1½ Fett oder *Ungt. basilicum*, zum Offenhalten von künstlichen Geschwüren, wo man die Anwendung des *Cantharidins* vermeiden will], zu Pflastern [1 auf 8 Pflastermasse]

Extracta. Extracta. Der Eindickungsgrad der Extracte ist ein dreifach verschiedener: 1) dünnere Extract-Consistenz [Consistenz des frischen Honigs], 2) dickere Extract-Consistenz [können nicht mehr ausgegossen, aber mit einem hineingetauchten Spatel in Fäden ausgezogen werden], 3) trockene Consistenz [können zu Pulver verrieben werden]. Bei der Nennung der einzelnen Extracte ist deren Consistenz nach den hier gegebenen Bestimmungen mit 1, 2 oder 3 bezeichnet.

Die Anwendung der Extracte geschieht in folgenden Formen: in Pulvern, Consistenz 1 und 2 durch Verreibung mit anderen Pulvern, Consistenz 3 für sich oder gemischt. — Diese Form ist jedoch unzweckmässig, da solche Pulver leicht feucht werden und zusammenbacken. Für einzelne *Narcotica* ist noch eine complicirtere, zu Pulvern sich gut eignende Extractform unter der Bezeichnung **Extractum siccum** in Gebrauch, die dadurch hergestellt wird, dass gleiche Gewichtstheile Extract und Dextrin in einer Porzellanschale so lange bei 40-50°C. getrocknet werden, bis kein Gewichtsverlust mehr stattfindet. Die noch warme Masse wird mit so viel Dextrin verrieben, dass das ursprüngliche Gewicht des angewendeten Extractes verdoppelt ist. Die Dosis solcher Extracte wird vom Apotheker doppelt so hoch genommen, als sie der Arzt verordnet hat, wenn nicht dieser schon dem Namen des Extractes die Bezeichnung *siccum* hinzugefügt hat. In Pillen, die beste Form für die Extracte; Consi-

stanz 1 bedarf 2 Th. vegetabilischen Pulvers auf 1 Th. Extract zur Pillenmasse; Consistenz 2 1 Th. Extract mit $\frac{1}{2}$ — $\frac{2}{3}$ eines vegetabilischen oder 1 eines anderen Pulvers [*Sulfur.*, *Hydrarg. sulfur.*, schwer lösliche Salze]; Consistenz 3 bedarf etwas *Mucilag. Gummi Arab.* [selten etwas *Spiritus*, z. B. *Extr. Aloës*] zur Pillenmasse. In Latwergen, namentlich die Consistenz 1 und 2. In Solution; nur wenige Extracte lassen sich vollständig lösen [die bei der Bereitung filtrirten Extracte], die meisten geben eine Schüttelmixtur von trübem, mehr oder weniger braun gefärbtem Ansehen; Extracte von bedeutender Wirkung, die nur kleine Dosen erforderlich machen, werden häufig in Form von Tropfen gegeben. — Für den äusserlichen Gebrauch kommt der Zusatz von Extracten zu Salben, Pflastern und Klystieren vor.

Extractum Absinthii. Wermuth-Extract. [2 Th. des Krautes mit Wasser und *Spiritus ana* 6, der Rückstand mit Wasser und *Spiritus ana* 3 digerirt, gemischt, ausgepresst und bis zur Consistenz 2 eingedickt. — Trübe löslich. — 1,0 2 $\frac{1}{2}$ Sgr.]

Innerlich: zu 0,5-2,0 mehrmals täglich; in Pillen, Mixturen.

Extractum Aconiti. Eisenhut-Extract. [Gröblich zerkleinerte *Tubera Aconiti* werden mit *Spir. dil.* 8 Tage lang macerirt, die Flüssigkeit wird abgepresst, der Rückstand mit *Spir. dil.* in derselben Weise behandelt; die gemischten und filtrirten Tincturen zur Consistenz 2 abgedampft. — 1,0 1 $\frac{1}{2}$ Sgr.]

Innerlich: zu 0,006-0,025 [*ad* 0,025 *pro dosi*, *ad* 0,1 *pro die!*] mehrmals täglich, in Pillen und Solutionen [in *Vin. Colchici*, *Vin. stibiat.*, *Liq. Ammon. acet.*, *Aq. Laurocerasi*].

Aeusserlich: zu Pflastern, Einreibungen [*Extr. Aconiti* mit *Opium ana*, mit Speichel in die Schläfengegend einzureiben, bei arthritischer Ophthalmie: v. **Ammon**].

564. Ry

Extr. Aconiti

[2] *Hb. Aconiti pulv. ana* 0,5
Pulv. Rad. Liquir. q. s.
ut f. pil. No. 50. Consp. Lycop. D. S.
3-6 Mal täglich eine Pille.

M. D. S. 3 Mal täglich 5-10 Tropfen auf Zucker zu nehmen.

567. Ry

Extr. Aconiti 0,5

[3] *Tinct. Guajaci ammoniat.*
Vini stibiat. ana 10,0.

D. S. 3 Mal täglich 10-15 Tropfen. [Bei Arthritis.]

565. Ry

Extr. Aconiti 1,0

[3] *Vini Sem. Colchici* 25,0.
M. D. S. 3 Mal täglich 5 Tropfen.

568. Ry

Extr. Aconiti 3,0

[3] *Liquor. Ammon. caust.* 0,5
Azungiae 12,0.

M. D. S. Aeusserlich einzureiben. [Bei chronisch-rheumatischen oder neuralgischen Schmerzen.] **Turnbull.**

566. Ry

Extr. Aconiti 0,5

[2] *Liquor Ammon. acet.*
Aq. dest. ana 5,0.

Extractum Aconiti siccum s. pulveratum. Trock-

nes Eisenhut-Extract. [Vgl. das oben unter *Extracta* über Bereitung der trocknen Extracte Gesagte. — 1,0 1 Sgr.]

Innerlich: 0,01-0,05, in Pulvern, Pillen.

Extractum Aloës. Aloë-Extract. [1 Aloë mit 4 *Aq. dest.*

48 Stunden macerirt, dann colirt und bei mässiger Wärme bis zur Consistenz 3 abgedampft. — Trübe löslich. — 1,0 $\frac{2}{3}$ Sgr.]

Innerlich: zu 0,02-0,1 mehrmals täglich als Reizmittel, zu 0,05-0,25 als gelindes Purgans, zu 0,25-0,6 als Drasticum, in Pillen oder Bissen, selten in Pulvern oder Mixturen.

Aeusserlich: sum Clysmata [0,15-0,3], zu Augengewässern [Augentropfwässern: 0,1-0,3 auf 25,0; Augenbähungen: 0,2-1,0 auf 100,0], Verbandwässern [2,0-5,0 auf 100,0], Augensalben [0,1-0,5 auf 10,0].

569. Ry
Extr. Aloës 6,0
 [7] *Extr. Rhei comp.* 3,0
Extr. Colocyth. comp.
Ferr. pulv. ana 1,5.
M. f. pil. 100. Consp. Lycopod. D. S.
 [Nach Bedürfniss 1-2-3 Pillen zu nehmen]
Pilulae aperitivae Stahlii.

570. Ry
Extr. Aloës
 [2] *Soponis medicat. ana* 3,0.
M. f. pil. 50. Consp. Lycopod. D. S.
 Abends 1-2 Pillen zu nehmen. [Sehr empfehlenswerth, gelind wirkendes Abführmittel]

571. Ry
Extr. Aloës
 [4] *Ammon. chlorat. ferrat.*
Summitat. Sabinæ pulv. ana 2,5
Extr. Senegae 4,0.
M. f. pil. 90. Consp. Lycopod. D. S.
 3 Mal täglich 2-5 Stück.
Pilulae emmenagogae.

572. Ry
Extr. Aloës
 [4] *Sapon. Jalap. ana* 3,0

Spir. sapon. q. s.
ut f. pil. No. 50. Consp. Lycop. D. S.
 Morgens und Abends 1-3 Stück.
Pitul. purgant. d. früheren Ph. Sax.

573. Ry
Extr. Aloës 2,0
 [2] *Natr. carb. dep. sicci* 4,0
Extr. Taraxaci q. s.
ut f. pil. No. 60. Consp. Lycop. D. S.
 Morgens und Abends 2 Pillen. [Bei Icterus simplex.] **Oppolzer.**

574. Ry
Extr. Aloës
 [5] *Chin. sulfuric. ana* 1,2.
F. l. a. pil. No. 20. Consp. Lycopod. D. S.
 Abends 1 Pille. [Bei Oligocholie.] **Pitschaft.**

575. Ry
Extr. Aloës 0,75
 [3] *Ferri sulfuric.* 3,0
Sapon. med. q. s.
ut f. pil. No. 50. Consp. Lycop. D. S.
 Anfangs 3 Mal täglich kurz nach dem Essen 1-3 Pillen zu nehmen, später beim Eintritt dünnerer Stuhlgänge seltener.
 [Bei habitueller Stuhlverstopfung.]
John Kent Spender.

Extractum Aloës Acido sulfurico correctum.

[*Extr. Aloës* 4 in *Aq. destill.* 16 aufgelöst; *Acid. sulfur. rectificat.* $\frac{1}{2}$ tropfenweise zugesetzt, zur Cons. 3 eingedampft. — Trübe löslich. — 1,0 1 Sgr.] Dieses Präparat ist durch den Zusatz von Schwefelsäure so wesentlich verändert, dass es mit dem *Extr. Aloës* kaum mehr in eine Reihe zu stellen ist; die Bezeichnung *correctum* ist jedenfalls eine unpassende. — *Cave:* Verbindung mit Seife, da dieselbe durch die Schwefelsäure zersetzt wird und das ausgeschiedene fette Oel die Verbindung flüssig macht.

Innerlich: in höherer Dosis als das vorige [weil eben die Aloë grossentheils zersetzt und verkohlt ist].

576. Ry
Extr. Aloës Ac. sulfuric. corr. 2,0
 [2] *Pulv. Tub. Jalap.* 0,5.
M. f. l. a. pil. 20. Consp. D. in vitro bene clauso. S.
 Abends 1-3 Pillen.
 [Abführ-Pillen.]

Heim.

577. Ry
Pulv. Rad. Ipecac. 0,06
 [3] *Extr. Aloës Ac. sulfuric. corr.* 4,0
Ol. Menth. 0,25.
M. f. pil. 30. Consp. Pulv. Rad. Liquir. D. in vitro bene clauso. S.
 Morgens und Abends 1 Pille. [Bei Asthma.]
Heim.

†**Extractum amaricans.** [*Extr. Cichorei, Trifol. fibr., Rhei, Centaurii, Card. bened. ana.*]

†**Extractum Angelicae.** [1 der Wurzel mit 2 *Spirit. dilut.* digerirt, ausgepresst, der Rückstand nochmals mit 1 *Spir.* und 1 Wasser übergossen, digerirt, ausgepresst, beide Flüssigkeiten gemischt, decanthirt und zur *Cons.* 2 abgedampft. — Trübe löslich. — 1,0 etwa 2½ Sgr.]

Innerlich: zu 0,3-1,0 mehrmals täglich.

†**Extractum antiphthisicum.** *Liquor coriario-quer- cinus inspissatus.* Das von **Retschy** mit diesem Namen bezeichnete Präparat wird durch Filtriren und Abdampfen [bis zu *Cons.* 2] der klaren dunkelweingelben Flüssigkeit gewonnen, die sich beim Gerben der Kalbfelle mit Eichenrinde nach mehreren Wochen absetzt. **R.** empfiehlt dieses Extract als vorzügliches Mittel bei colliquativem Schweiß und Durchfall und reicht es in folgenden Formen [5,0 etwa 1½ Sgr.]:

578. R₅
Extr. antiphthis. 5,0
 [2] *Aq. Laurocer.* 20,0.
D. S. 3 Mal täglich 30-50 Tropfen.
Essentia antiphthisica.

579. R₅
Extr. antiphthis. 12,5
 [6] *Pulv. Rad. Rhei* 6,0
Pulv. Rad. Liquir. q. s.
ut f. pil. 100. Consp. Lycopod. D. S.
 3 Mal täglich 2-3 Pillen.

†**Extractum Arnicae (Radici).** Wohlverleih-Ex- tract. [Aus der Wurzel; Bereitung wie *Extr. Angelicae.* — Trübe löslich. — 1,0 etwa 2½ Sgr.]

Innerlich: zu 0,3-1,0 mehrmals täglich.

***Extractum Arnicae Florum.** [Aus den Blumen der Arnica mit Wasser extrahirt, bis zur *Cons.* 2 abgedampft. — 5,0 3½ Sgr.]

Innerlich: zu 0,1-0,6 mehrmals täglich in Pillen.

580. R₅
Extr. Arnicae Flor 2,0
 [2] *Acid. phosph. sicci* 4,0
Pulv. Rad. Serpentar. q. s.

ut f. pil. 30. Consp. Lycop. D. S. 3 Mal täglich 2 Pillen.
 [Bei nervöser Schwerhörigkeit.] **Oppolzer.**

†**Extractum Artemisiae.** Beißwurzels-Extract. [Aus der Wurzel, wie *Extr. Angelicae* bereitet. — 1,0 etwa ¾ Sgr.]

Innerlich: zu 0,1-0,3 in Pillen, in Emulsion [bei Eclampsie, Epilepsie u. s. w.].

581. R₅
Extr. Artemis. 0,25
 [2] *Gummi Arab.* 4,0
Sacch. alb. 12,0
Emuls. Amygd. 100,0.

M. D. S. Halbstündlich 1-2 Theelöffel [Bei Eclampsia infantum.]
Kölreuter.

†**Extractum Artemisiae aethereum.** Aetherisches Beißwurzels-Extract. [1 *Rad. Artemis.* mit 2 Aether acht Tage lang macerirt, ausgepresst, der Rückstand mit 1 *Spir. aether.* übergossen, macerirt, ausgepresst, die erhaltene Flüssigkeit filtrirt und zur *Consistenz* 2 abgedampft. — Nicht löslich. — 0,1 etwa 1½ Sgr.]

Innerlich: zu 0,05-0,2, in Pillen.

Extractum Aurantii Corticis. *Extractum Corticis Aurantii.* Pomeranzenschalen-Extract. [Cort. Fruct. Aurant. 1 mit Spiritus und Wasser ana 2 durch 3 Tage digerirt, ausgepresst und der Rückstand mit Spiritus und Wasser ana 1 ebenso behandelt, die Flüssigkeiten gemischt, filtrirt und bis zur Cons. 2 abgedampft. — Trübe löslich. — 1,0 2 Sgr.]

Innerlich: zu 1,0-2,5 mehrmals täglich, in Bissen, Latwergen, Mixturen, Elixiren.

† **Extractum Bardanae.** Klettenwurzel-Extract. [Aus der Rad. Bardan. wie Extr. Absinth. — Klar löslich. — 5,0 etwa 2½ Sgr.]

Innerlich: zu 0,3-1,0 mehrmals täglich [selten].

Aeusserlich: als Zusatz zu Haarwuchs befördernden Mitteln [Pomaden und Waschwässern].

Extractum Belae liquidum Ph. Brit. [Aus den halbreifen Fructus Belae (von *Aegle Marmelos*), mit ¼ Spiritus und 15 Th. Wasser bereitet. — In neuester Zeit gegen chronische Diarrhoe sehr gerühmt, namentlich in England und Schweden.]

Innerlich: zu 4,0-8,0 *pro dosi, pure.* [3 Mal täglich 1 Theelöffel voll.]

Extractum Belladonnae. *Extract. Solani furiosi.* Tollkirschen-Extract. [20 Th. der frischen Blätter der *Belladonna* werden mit 1 Th. Wasser zerstampft und ausgepresst und dies mit 3 Th. Wasser wiederholt; die erhaltenen Flüssigkeiten werden colirt und auf 2 Th. abgedampft; der Rückstand mit 2 Th. Spiritus 24 Stunden behandelt, colirt, nochmals mit 1 Th. Spiritus angerührt und abgepresst. Die gemischten Flüssigkeiten werden filtrirt und zur Consistenz 2 abgedampft. — Trübe löslich. — Die Ph. Austr. lässt ihr *Extr. Belladonnae* aus der getrockneten Wurzel darstellen. erhält dadurch ein wesentlich stärkeres Präparat, das deshalb auch nur in der halben Dosis bemessen werden darf, und wofür die Maximaldosis 0,05 *pro dosi!* 0,2 *pro die!* festgesetzt worden ist. — 1,0 2 Sgr.]

Innerlich: 0,01-0,05-0,1 [ad 0,1 *pro dosi, ad 0,4 pro die!*] 2-3 Mal täglich, in Pulvern, Pillen und Tropfen [mit *Aq. Laurocerasi*].

Aeusserlich: zu Zahnpillen, Zahnlatwergen, Bougies [bei krampfhaften Stricturen Kerzen, mit *Extract. Belladonnae* bestrichen, einzubringen: **Tyrrel**], Injektionen und Klystieren [0,05-0,1 auf 25,0], Augengewässern [zur Erweiterung der Pupille: 0,25-0,6 auf 10,0, jetzt die Lösung des Atropins, wegen ihrer sicheren und gleichmässigeren Wirkung, vorgezogen: als Augentropfwasser bei Ophthalmie: 0,1-0,5 auf 25,0], Pflastern [5,0 auf 20,0-25,0], Suppositorien, Salben [3,0-6,0 auf 25,0, bei Rigidity des Muttermundes, Blasenkrampf, eingeklemmten Brüchen], Augensalben [0,3-0,6 auf 10,0: bei scrophulöser Lichtscheu].

582.

R

Extr. Belladonnae[4] *Fol. Belladonn. pulv. ana 1,0**Succ. Liquir. q. s.*

ut f. pil. No. 100. D. S. Im ersten Monat Abends 1 Pille, im zweiten Monat Abends 2 Pillen u. s. w. zu steigen bis zu 6-7 Pillen. [Gegen Epilepsie.]

Trousseau.

583.

R

Extr. Belladonn.[3] *Extr. Opii ana 0,2**Lactucarii gallici 0,3**Flor. Malvae q. s.*

ut f. pil. 14. D. S. 3 Mal täglich 1 Pille, später mehr. [Bei hochgradiger Cholera.]

Barthez.

584. R;
Extr. Belladonn. 1,0
 [4] *Opii* 0,5
Myrrhae
Rad. Ipecac. pulc. ana 2,0
Mucil. Gummi Arab. q. s.
M. f. pil. 50. D. S. 3 Mal täglich 1 Pille;
 auf 2, später 3 Pillen zu steigen. [Bei
 Asthma.]
585. R;
Extr. Belladonn. 0,5
 [2] *Extr. Gentian. q. s.*
ut f. l. a. pil. No. 50. Consp. Lycopod.
D. S. 3 Mal täglich 1-4 Pillen zu
 nehmen. [Bei habitueller Stuhlver-
 stopfung.] **Nunneley.**
586. R;
Extr. Belladonn.
 [3] *Pulv. Sem. Strychn. ana* 0,1
Ferr. oxyd. fusc. 0,75
Sacch. alb. 2,5.
M. f. pulc. div. in decem part aequal.
D. S. Täglich 1 Pulver. [Gegen Enu-
 resis nocturna der Kinder.] **Faure.**
587. R;
Extr. Belladonn. 0,06
 [1] *Aq. comm.* 10,0
Spir. dil. 0,5.
M. D. S. 2 Mal täglich so viel Tropfen,
 als das Kind Jahre zählt. **Hufeland.**
588. R;
Extr. Belladonn. 0,3
 [2] *Liq. Ammon. anis.* 2,5
Aq. dest. 15,0.
D. S. 3stündlich 10-20 Tropfen. **Frerichs.**
589. R;
Extr. Belladonn. 0,3
 [2] *Aq. dest.* 100,0
Syr. Ipecac. 25,0
Vin. stibiat. 10,0.
M. D. S. 3 Mal täglich 1-2 Theelöffel.
 [Bei Keuchhusten.]
590. R;
Extr. Belladonn. 0,2
 [2] *Aq. dest.* 100,0
Syr. Aurant. Flor. 50,0.
D. D. Alle 10 Minuten 1 Theelöffel. [Bei
 Brucheingklemmung.] **Delarue.**
591. R;
Extr. Belladonn. 0,35
 [2] *Aq. Laurocerasi* 15,0.
D. S. 3-4 Mal täglich 30 Tropfen.
 [*Liquor Belladonnae cyanic.*]
Hufeland.
592. R;
Extr. Belladonn. 0,5
 [2] *Ungt. Hydrarg. ciner.* 10,0.
M. f. unguent. D. S. Zum Einreiben bei
 spastischer Phimosi und Paraphimosi
 im Gefolge des Trippers.
593. R;
Extr. Belladonn. 10,0
 [8] *solée in*
Aq. Laurocerasi 150,0
adde
Aether. 5,0.
D. S. Zum Umschlage oder zu Einrei-
 bungen bei neuralgischen oder gichti-
 schen Schmerzen. **Roux.**
594. R;
Extr. Belladonn. 6,0
 [5] *Tinct. Opii croc.* 3,0
Chloroformi 4,0.
M. D. S. Auf neuralgische und schmerz-
 hafte Theile 3-4 Mal täglich aufzu-
 legen. **Diday.**
595. R;
Extr. Belladonn.
 [2] *Opii pulc. ana* 1,0
Palc. Lign. Guojac. 4,0
Mucil. Tragacanth. q. s.
ut f. pil. 20 in loco calido torrendae. D.
 Von diesen Kügelchen werden des
 Nachts 2-3 in eine unterhalb der In-
 cisura ischiadica angebrachte Fonta-
 nelle eingelegt. [Bei Ischias.] **Trousseau.**
596. R;
Extr. Belladonn.
 [6] *Camph.*
Tinct. Opii ferment. ana 4,0
Ungt. Hydrarg. ciner. 30,0.
M. f. unguent. D. S. Zur Einreibung.
 [Bei chronischen Drüsenanschwellun-
 gen, Epididymitis u. s. w.]
Ricord's Pommade fondante.
597. R;
Extr. Belladonn.
 [7] *Ungt. Glycerini ana* 10,0.
F. unguent. D. S. Zur Einreibung in
 die Brustdrüse. [Bei Galactorrhoe.]
Fountain.

598. R₅
Extr. Belladonn. 0,1
 [2] *solve in*
Aq. dest. 100,0
Aq. Laurocerasi 5,0
M. D. S. Zur Injection bei Tripper mit starker Schmerzhaftigkeit und Ischurie.
599. R₅
Extr. Belladonn. 1,5-3,0
 [4] *Azung.* 50,0.
F. unguent. *D. S.* Bei Tenesmus in den After einzustreichen.
Rademacher.
600. R₅
Extr. Belladonn. 0,25
- [3] *Ol. Cacao* 15,0.
F. suppositorii No. 4. *D.* Bei Tenesmus.
Schönlein.
601. R₅
Extr. Belladonn. 3,0
 [4] *Plumbi acet.* 5,0
Adipis suilli 30,0.
M. F. unguentum. *D. S.* Zum Bestreichen des Anus bei Fistula ani.
Dupuytren.
602. R₅
Extr. Belladonn. 0,1
 [2] *Inf. Flor. Chamomill.* 125,0.
M. D. S. Zum Klystier. [Zur Reduction von Hernien.]
Ricord.

Extractum Belladonnae siccum. [Vergl. *Extracta.* — 1,0 1½ Sgr.]

†**Extractum Bistortae.** [Bereitet wie *Cascarill-Extract.* — Cons. 2. — Trübe löslich. — 1,0 etwa 1½ Sgr.]

Innerlich: zu 0,5-1,5 in Pillen [als schwaches Adstringens mit schwefelsaurem Eisen und Myrrhe: **Horn** bei Leukorrhoe].

Aeusserlich. als Zusatz zu Haarwuchs befördernden Mitteln.

†**Extractum Caineae.** [Spirituöses *Extract* aus der Wurzel.]

Innerlich: zu 1,0-2,0 *pro die* [als Zusatz zu diuretischen Pillen].

Extractum Calami. *Extr. Acori.* Kalmus-*Extract.* [Wie *Wermuth-Extract* bereitet. Consistenz 2. — Trübe löslich. — 1,0 2½ Sgr.]

Innerlich: zu 0,5-2,0 mehrmals täglich, in Pillen.

†**Extractum Calendulae.** Ringelblumen-*Extract.* [Bereitet wie *Extr. Bellad.* Consistenz 2. — Lösung trübe. — 1,0 etwa 1½ Sgr.]

Innerlich: zu 0,5-0,8 2-4 Mal täglich, in Pillen, Mixturen.

Aeusserlich: zu Verbandwässern, Salben [mit Wasser zur Salben-Consistenz angerührt oder als Zusatz zur Fettsalbe].

603. R₅
Extr. Calendulae
 [5] *Extr. Chamom. vulg. ana* 6,0
solve in
Aq. Laurocerasi 50,0
- adde*
Tinct. Opii simpl. 3,0.
M. D. S. Umgeschüttelt als Verbandwasser. [Bei Krebsgeschwüren.]
Rust.

Extractum Cannabis indicae. Indisches Hanf-*Extract.* [Alkoholisches *Extract* aus der *Herba Cannabis indicae.* — Cons. 2. — In Wasser unlöslich, in Alkohol mit grüner Farbe löslich. — 1,0 6½ Sgr.]

Innerlich: zu 0,03-0,1 [ad 0,1 *pro dosis* ad 0,3 *pro die!*] 2-3 Mal täglich [nach **Fronmüller** muss die Dosis bedeutend höher gegriffen werden, zu 0,25 bis 0,5 und selbst zuweilen bis 1,25 (!!!), um Schlaf zu erzielen, und haben sich ihm diese grossen Dosen bei einer Reihe von Krankheiten als sehr empfehlenswerthe Hypnotica bewährt. Auch **Berthier** reicht das *Extr. Cannabis indicae* in der Dosis von 0,25-1,0 als Hypnoticum bei Geisteskrankheiten], in Pillen, Pulvern, Trochiscen [Trochisci mit 0,06 *Extr. Cannabis indicae* sind meistens in den Apotheken vorrätzig] oder alkoholischer Lösung [*Tinctura Cannabis*

indicae], als Narcoticum in seiner Wirkung dem Opium ziemlich nahe stehend, aber milder und namentlich nicht hemmend auf die Stuhlentleerung [mit Erfolg versucht bei Geisteskranken von **Conollo**, **Moreau**, **Berthier** u. A. — in der Cholera asiatica von **Willemin** empfohlen, ohne besondere Vorzüge — von **Fronmüller** bei verschiedenen Krankheiten, namentlich Phthisis, Rheumatismus, Neurosen, Entzündungskrankheiten u. A. mit Erfolg als beruhigendes und schlafmachendes Mittel angewandt]. — Die im Orient gebräuchlichsten Präparate des Hanfes sind Haschich und Churrus. Die Zusammensetzung derselben ist keine constante. Nach einigen soll das *Extractum Cannabis* ihr Hauptbestandtheil sein. Das von **Sigmund** aus Egypten mitgebrachte Haschich enthielt die *Herba Cannabis indicae*, vornehmlich die blühenden Spitzen derselben (**v. Schroff**). Nach **Fronmüller** soll Haschich überhaupt aus gepulverter *Herba Cannabis indicae*, Zucker und Gummi bestehen, aber in nicht constanter Mischung; Churrus hingegen soll das gereinigte Cannabis-Harz darstellen.

Aeusserlich: in Salben oder Linimenten [zur Beschwichtigung localer entzündlicher, neuralgischer oder rheumatischer Schmerzen: **Fronmüller**].

604. \mathcal{R}
Extr. Cannab. indic. 1,5
 [4] *Acid. gallici 6,0.*
F. pil. No. 50. Consp. Lycopod. D. S.
 1-2 Pillen Abends zu nehmen. [Gegen colliquative Schweisse bei Phthisis.]
Pharmac. of the Brompton-Hospital.
- [3] *Extr. Hyoscyam. ana 0,03*
Sacch. alb. 0,3.
M. f. pulvis. Dispens. tal. dos. No. 8.
D. S. 3stündlich 1 Pulver. [Bei Gonorrhöe mit heftigen Schmerzen.]
Zeissl.
605. \mathcal{R}
Extr. Cannab. ind.
 [7] *Herb. Cannab. ind. pulv. ana 3,0 (i).*
M. f. pil. No. 50. Consp. Lycop. D. S.
 4 Pillen auf einmal zu nehmen. [Als Hypnoticum.]
Fronmüller.
607. \mathcal{R}
Extr. Cann. ind. 0,2
 [2] *Ol. Papav. 25,0.*
D. S. Zum Einreiben. Fronmüller.
608. \mathcal{R}
Extr. Cannab. ind. 0,2
 [2] *Liniment. ammoniato-camph. 25,0.*
D. S. Zur Einreibung. [Bei schmerzhaftem chronischem Rheumatismus.]
Fronmüller.
606. \mathcal{R}
Extr. Cannab. ind.

†**Extractum Cantharidum acetosum.** [Ein in England vorkommendes (obschon dort nicht officinelles) Präparat, das sich etwa in folgender Weise herstellen liesse: 1 Th. Canthariden mit 5 Th. Spiritus und 1 Th. Acetum 8 Tage digerirt, ausgepresst, filtrirt, der Alkohol abgedampft, als Rückstand eine butterweiche Masse, welche, dünn auf Papier oder englisch Pflaster gestrichen, in wenig Stunden eine Blase zieht; ein Präparat, das wohl der Nachahmung werth wäre.]

†**Extractum Capiti Papaveris.** *Affium. Opium indigène.* Mohnkopf-Extract. [Ein gesättigtes alkoholisches Extract, aus den unreifen Samenkapseln des Mohns bereitet, soll nach **Dublanc** etwa 1 Procent Morphinum enthalten.]

†**Extractum Capsici annui.** Spanisch-Pfeffer-Extract. [Alkoholisches Extract aus den *Fructus Capsici annui*.]

Innerlich: zu 0,3-0,1 als kräftiges Acre.

Extractum Cardui benedicti. Cardobenedikten-

Extract. [Wässeriger Auszug, zur Consistenz 2 abgedampft. — Trübe löslich. — 10,0 4 $\frac{1}{2}$ Sgr.]

Innerlich: zu 0,5-1,5 mehrmals täglich, in Pillen, Solutionen [mit *Aq. Laurocerasi*, mit aromatischen Tincturen u. s. w.].

R \bar{y} 609.

Extr. Cardui bened. 5,0

[3] *Aq. Laurocerasi* 25,0.

M. D. 3 Mal täglich 20-40 Tropfen. [Bei chronischen pituitösen Catarrhen.]

Extractum Carnis Liebig. Fleisch-Extract. [Eine höchst concentrirte, fettfreie Bouillon. Die Pharmakopoe schreibt vor, dass die Auflösung desselben, mit etwas Kochsalz versetzt, genau den Geschmack der Bouillon darbiete, eine Bedingung, die von dem aus Brasilien und Neuholland zu uns kommenden Fleischextract nicht immer erfüllt wird. — 10,0 4 $\frac{1}{2}$ Sgr.]

Innerlich: als Nahrungsmittel für Reconvalescenten, Magenleidende, Phthisiker, atrophische Kinder u. s. w. theelöffelweise *pur* oder auf Weissbrod gestrichen oder in heissem Wasser gelöst mit Salz und Gewürzen [$\frac{1}{2}$ -1 Theelöffel zu 1 Tasse heissen Wassers giebt eine kräftige Bouillon].

Extractum Cascarillae. [1 *Cort. Cascarill.* klein geschnitten mit 4 kochenden Wasser übergossen, 24 Stunden macerirt, ausgepresst, abermals mit 2 kochenden Wasser übergossen, wiederum macerirt, ausgepresst; beide Flüssigkeiten gemischt, decanthirt und zur Cons. 2 abgedampft. — Trübe löslich. — 10,0 9 Sgr.]

Innerlich: zu 0,5-1,5 mehrmals täglich, in Pillen und Mixturen.

Aeusserlich: zu Zahnfleisch-Latwergen.

610. R \bar{y}

Extr. Cascarill. 3,0

[3] *Pulv. Rad. Rhei* 1,0

Pulv. Rad. Colombo 2,0.

M. f. pil. No. 50. Consp. Cinnam. D. S.

3 Mal täglich 5 Stück.

Tinct. Cinnam. 7,5

Syr. Aurant. Cort. 30,0.

M. D. S. 2stündlich, umgeschüttelt, 1 Esslöffel [Bei Diarrhoe]. **Vogel.**

612. R \bar{y}

Extr. Cascarill. 15,0

[6] *Myrrh. pulv.* 5,0

Ol. Ment. pip. 0,25.

M. f. electuar. spiss. D. S. Zahnfleisch-Latwerge.

611. R \bar{y}

Extr. Cascarill.

[8] *Extr. Colombo ana* 5,0

Aq. Ment. pip. 150,0

***Extractum Catechu.** [Wie *Extr. Aloës* bereitet. Cons. 3. —

Trübe löslich. — 5,0 1 $\frac{1}{2}$ Sgr.]

Innerlich: wie Catechu.

613. R \bar{y}

Extr. Catechu 25,0

[8] *Ammon. chlorat.* 12,5

Aq. dest. 200,0

Gummi Arab. 25,0.

M. D. S. 1-2stündlich 1 Esslöffel. [Bei Diarrhoe.] **Rademacher.**

Extractum Centaurii. Tausendgüldenkraut-Extract. [Wie *Extr. Card. bened.* Cons. 2. — Trübe löslich. — 1,0 $\frac{1}{2}$ Sgr.]

Innerlich: zu 0,5-2,0 mehrmals täglich, in Pillen, Tropfen.

Extractum Chamomillae. Kamillen-Extract. [1 Th *Flor. Chamomill.* mit Wasser und Spiritus *ana* 4 Th. digerirt und ausgepresst und der Rückstand nochmals mit Wasser und Spiritus *ana* 2 digerirt und ausgepresst, die Flüssigkeiten gemischt, filtrirt und zur Consistenz 2 abgedampft. — Trübe löslich. — 1,0 2 $\frac{1}{2}$ Sgr.]

Innerlich: zu 0,5-2,0 mehrmals täglich, in Pillen, Mixturen.
 Aeusserlich: zu Pinselsäften und Verbandwässern.

Extractum Chelidonii. Schöllkraut-Extract. [Wie
Extr. Belladonn. bereitet. Cons. 2. — Trübe löslich. — 1,0 2 Sgr.]

Innerlich: zu 0,3-1,5 mehrmals täglich, in Pillen, Tropfen.

Extractum Chinae fuscae. [1 Th. *Cort. Chin. fusc.* wird
 mit 4 Tb. *Spir. dil.* 24 Stunden digerirt und ausgepresst. Der Rückstand in gleicher Weise mit 2 Th. *Spir. dil.* behandelt, die Flüssigkeiten gemischt, filtrirt und zur Consistenz 2 abgedampft. — Trübe löslich. — 1,0 1½ Sgr.]

Innerlich: zu 0,5-2,0 mehrmals täglich, in Pillen, Mixturen.

Aeusserlich: zu Mundwässern, Pinselsäften, als Zusatz zu
 Haarpomaden.

614. Ry

Extr. Chin. fusc.

[5] *Fol. Trifol. fibrini pulv. ana* 5,0.
F. pil. 100. Consp. Cinnam. D. S. Zweistündlich 5-10 Stück. [Bei milder Form von Intermittens.]

615. Ry

Extr. Chin. fusc. 10,0

[9] *solve in*
Aq. Menth. pip. 200,0

Sacch. alb. 10,0.

M. D. S. Stündlich 1 Esslöffel.

616. Ry

Medullae Bovis 25,0

[5] *Ol. Jasmini* 5,0

Extr. Chin. fusc. 3,0

Succi Citri

Tinct. Canth. ana 1,5.

M. f. unguent. D. Haarpomade.

Dupuytren.

Extractum Chinae frigide paratum. [1 Th. China-
 rinde mit 6 *Aq. destillat.* übergossen, 2 Tage macerirt, ausgepresst, abermals mit 3 Wasser übergossen, 2 Tage macerirt, ausgepresst; beide gemischt, filtrirt und bis zur Cons. 2 abgedampft. — Enthält fast nur Gerbstoff. — Wenig trübe löslich. — 1,0 2½ Sgr.]

Innerlich: zu 1,0-2,5.

617. Ry

Extr. Chin. frigid. parat. 2,0

[5] *Aq. dest.* 100,0

Aq. Aurant. Flor. 15,0

Syr. Aurant. Cort. 30,0.

D. S. 3-4 Mal täglich 1 Esslöffel. [Zur Unterstützung der Kräfte bei ulcerativer Scrophulose.] Lebert.

618. Ry

Extr. Chin. frigid. parat. 10,0

[7] *solue in*

Aq. Menth. pip. 150,0

Spir. Aether. acet. 5,0

Syr. Aurant. Cort. 50,0.

M. D. S. Stündlich 1 Esslöffel.

†**Extractum Chinae regiae s. Calisayae.** [Eben-
 so bereitet wie *Extr. Chin. fusc.* — Trübe löslich. — 1,0 etwa 2½ Sgr.]

Innerlich und äusserlich: wie *Extr. Chinae fusc.*, jedoch wirksamer, aber auch theurer als dieses.

†**Extractum Chinae regiae frigide paratum.**
 [Wie *Extr. Chin. frigide parat.* — 1,0 etwa 3½ Sgr.]

Wie *Extr. Chinae frig parat.*

†**Extractum Cichorei.** [Aus *Rad.* und *Fol. Cichor. ana* durch Auskochen und Eindampfen zur Cons. 2 bereitet. — 1,0 etwa ¾ Sgr.]
 Obsolet.

Extractum Cinae. *Extractum Cinae aethereum.* *Extr. Santonici.* *Extr. Flor. Artemisiae Vahlinae Ph. Norv.* Zittwer-
 Blüten-Extract. [2 Th. *Flor. Cin. pulc.* mit Aether und Spiritus *ana* 3

durch 3 Tage macerirt, ausgepresst und abermals mit Aether und Spiritus ana 2 Th. dieselbe Operation wiederholt, beide Flüssigkeiten gemischt, filtrirt, zur Consistenz 1 abgedampft; von dunkelgrüner Farbe, in Wasser unlöslich. — 1,0 3 $\frac{1}{2}$ Sgr.]

Innerlich: zu 0,3-1,0 [als Anthelminthicum], in Pillen oder Bissen, am besten in Capsules [0,3-0,6, von welchen letzteren 1 Dtzd. = 14 Sgr.]

619.

R \bar{y} *Extr. Cinae* 1,0[2] *Flor. Cinae q. s.*

ut f. pil. No. 16. *Consp. Pulv. Rad. Calam. D. S.* 2 Tage hinter einander Morgens nüchtern 8 Stück zu nehmen. [Bei Spulwürmern Erwachsener.] **Shapmann.**

†**Extractum Cinae spirituosum.** [Durch Extraction der *Flor. Cin.* mit *Spir. dil.* und Abdampfen bis zur Cons. 3.]

Innerlich: zu 0,15-0,3 *pro die* für Kinder, mehr für Erwachsene.

†**Extractum Coffeae spirituosum.** Kaffee-Extract. [Frische Kaffeebohnen gestossen und aus denselben in der Weise des *Angelica-Extracts* ein Extract bereitet. Cons. 2. — Trübe löslich. — 1,0 etwa 2 $\frac{1}{2}$ Sgr.]

Innerlich: zu 0,1-0,25-0,4, in Pillen [statt des viel theuern Coffein].

620.

R \bar{y} *Extr. Coff. spirit.* 5,0[5] *Pulv. Coff. q. s.*

ut f. pil. 50. *Consp. Cinnan. D. S.* $\frac{1}{2}$ -1tündlich 2-3 Pillen zu nehmen. [Bei Migräne.]

†**Extractum Colchici acidum e Bulbo** Ph. Lond. et Edinb. Saures Zeitlosen-Wurzel-Extract. [Aus den frischen Wurzeln mit Wasser und *Acet. concentr.* bereitet. Cons. 2.]

Innerlich: zu 0,1-0,4 mehrmals täglich.

621.

R \bar{y} *Extr. Colchici acid.*[12] *Extr. Colocynth. comp.**Chinini sulfur.**Pulv. Doveri ana* 5,0.

M. f. pil. No. 50. Consp. Lycop. D. S. 1 Pille täglich.

[Einige Tage vorher wird Morgens und Abends *Vin. Colchici Gutt.* 30-40 gereicht. — Gegen Gicht] **Halfort.**

†**Extractum Colchici acidum e Seminibus.** Saures Zeitlosen-Samen-Extract. [Aus 1 *Sem. Colchici pulv.* durch Maceration mit 8 Essig und wiederholter Maceration mit 4 Essig, Filtriren beider Flüssigkeiten und Eindampfen bis zur Cons. 2. — Klar löslich. — 1,0 etwa 1 $\frac{1}{2}$ Sgr.]

Innerlich: wie das vorige.

622.

R \bar{y} *Extr. Colchici acid. e Semin.*[4] *Aloës pulv. ana* 4,0.

F. l. a. pil. No. 60. Consp. Mag. ust. D. S. Morgens und Abends 1-2 Pillen.

[Bei Arthritis, Amenorrhoe.] *Pilulas antharthriticae albae.* **Wolff**

†**Extractum Colchici spirituosum e Bulbo** Ph. gall. [Durch Eindampfen eines spirituösen Auszuges bis zur Cons. 2.]

Innerlich: wie das vorige.

Extractum Colocynthis. Coloquinten-Extract. [2 Th. Coloquinten von den Samen befreit und gröblich zerschnitten, mit 12 Th. *Spir. dilut.* mehrere Tage lang digerirt, ausgepresst, mit 5 *Spir. dilut.* und 5 Th.

Wasser dieselbe Operation wiederholt, die Flüssigkeiten gemischt, decanthirt und zur Cons. 3 ausgetrocknet. — Trübe löslich. — 1,0 3 Sgr. [

Innerlich: zu 0,005-0,01 als Reizmittel, zu 0,01-0,06 [ad 0,06 pro dosi, ad 0,4 pro die!] als Purgans.

623. R₂
Extr. Colocynthis
 [4] *Aloës*
Extr. Rhei
Gutti ana 1,0
Extr. Hyoscyami 0,25
Ol. Anisi 0,1.

M. F. Pil. No. 20. Obduc. Argent. S.
 Abends 1 Pille zu nehmen. [Bei hartnäckiger Stuhlverstopfung.]

Trousseau.

624. R₂
Extr. Colocynth.

[7] *Aloës*
Scammonii ana 3,0
Kali stibici 0,2.

M. F. Pil. No. 50. D. S. Täglich 1 Pille zu nehmen.

[Purgans, zumal bei Hautkrankheiten.]

Fothergill.

Extractum Colocynthis compositum. *Extr.*

Colocynth. Londinense. [*Extr. Colocynth.* 3, *Extr. Rhei* 5, *Aloë* 10 und *Res. Scammoniae* 8 mit *Spir. dil.* besprengt und zur Consistenz 3 eingedampft. — 1,0 3½ Sgr.]

Innerlich: in etwas stärkerer Dosis als das vorige, in Pillen.

625. R₂
Extr. Colocynth. comp.

[3] *Sapon. medicat. ana* 2,0
Ol. Chamomill. citrati 0,5.

M. f. pil. No. 30, consp. Lycop. D. S. 1-2 Pillen.

Extractum Colombo. *Extr. Calumbae Ph. Austr.* [Wie

Extr. Aurant. Cort. bereitet und zur Consistenz 3 abgedampft. — Trübe löslich. — 1,0 4½ Sgr.]

Innerlich: zu 0,5-1,5 in Pillen oder Mixturen.

626. R₂
Extr. Colombo
 [5] *Fell. Tauri*
Pulv. Rad. Rhei ana 4,0.
F. pil. No. 100. Consp. Cinnam. D. S.
 Täglich 6-10 Stück zu verbrauchen.

628. R₂
Extr. Colombo 15,0

[11] *Aq. Cinnam. simpl.* 40,0.
D. S. Täglich 3 Mal ½-1 Esslöffel.

Behrends.

627. R₂
Extr. Colombo 12,5
 [11] *solve in*
Aq. Cinnam. simpl. 100,0
Spir. aether. 6,0
Tinct. Rhei aquos. 25,0.
M. D. S. Umgeschüttelt, 3 Mal täglich
 1 Esslöffel.
 Richter.

629. R₂
Extr. Colombo 4,0

[5] *Decoct. Satep.* 100,0
Elaeosacch. Foenic. 15,0.

M. D. S. Stündlich, umgeschüttelt, 1 Kinderlöffel.

[Bei Diarrh. chron. infantum.]

Wendt.

Extractum Conii. *Extractum Conii maculati Ph. Austr.*

s. Cicutae (terrestris). Schierlings-Extract. [Wie *Extr. Belladonn.* Cons. 2. — Fast klar löslich. — 1,0 1½ Sgr.]

Innerlich: zu 0,03-0,18 [ad 0,18 pro dosi, ad 0,6 pro die!] mehrmals täglich in Pillen und Solutionen. [Erst kürzlich wieder dringend zur Verhütung der durch Milchstauung entstehenden Mastitis der Wöchnerinnen und Stillenden zu 0,01-0,06 4-6 Mal täglich von Altstädter empfohlen.]

Aeusserlich: zu Pinselsäften, Augengewässern [zu Fomentationen

2-3 auf 100; zu Augentropfwässern 1 auf 25], Augensalben [1-3 auf 10-15 Fett], Verbandsalben, Pflastern.

630. R_y
Extr. Conii 3,0
 [3] *Pulv. Rad. Alth. q. s.*
ut f. pil. No. 50. Consp. Lycop. D. S.
 2-3 Mal täglich 1 Pille.

631. R_y
Extr. Conii macul. 3,0
 [8] *Extr. Bellad.* 0,5
Extr. Stramonii 0,6
Extr. Cannab. ind. 0,75
Extr. Aconiti 1,0
Extr. Opii 1,5
Extr. Hyoscyami 2,0
Pulv. Rad. Liquir. q. s.
F. pil. No. 50. D. S. 3-4-5 Mal
 täglich 1 Pille. [Bei hartnäckigen Neu-
 ralgien.] **Brown-Séquard.**

632. R_y
Rad. Ipecac. pulv. 1,0
 [4] *Stib. sulfurat. aurant.*
Extr. Senegae
Extr. Conii ana 2,0.
F. pil. No. 60, consp. Lycopod. D. S.
 3 Mal täglich 1-2 Pillen.
 [Bei chronischem Bronchial-Catarrh.]

†**Extractum Corticis Nucum Juglandis.** *Roob Juglandis.* Nusschalen-Extract. [Der Saft aus den grünen Nusschalen zur Cons. 2 abgedampft.]

†**Extractum Corticis Hippocastani.** Rosskastanien-Rinden-Extract. [Aus der *Cort. Hippocastani* wie *Extr. Chin.* bereitet. — Löslich — 1,0 etwa $\frac{1}{2}$ Sgr.]

Innerlich: zu 0,1-0,6 in Pillen und Mixturen.

†**Extractum Corticis Radicis Granatorum.** *Extractum Punicae Granati Ph. Austr.* Granatwurzelrinden-Extract. [Wie *Extr. Cascarill.* Cons. 2. — Trübe löslich. — 1,0 etwa $\frac{1}{2}$ Sgr.]

Innerlich: zu 5,0-12,0 *pro dosi* [in der Regel 3 Mal wiederholt], in Solution [von aromatischem Wasser].

†**Extractum Corticis Radicis Granatorum spirituosum** Ph. gall. [Mit *Spir. dil.* bereitet. Cons. 2. — Trübe löslich. — 1,0 etwa $3\frac{1}{2}$ Sgr.]

Innerlich: zu 4,0-8,0 3 Mal wiederholt.

636. R_y
Extr. Cort. Rad. Granat. spir. 25,0
 [33] *Aq. Menth.* 100,0
Succi Citri
Syr. Aurant. Cort. ana 25,0.

633. R_y
Extr. Conii 5,0
 [5] *Rad. Ipecac. pulv.* 1,0
Elect. Theriac. q. s.
ut f. pil. No. 50, consp. Lycop. D. S.
 Mehrmals täglich 1 Pille zu nehmen.
Pilul. Conii compos Ph. Brit.
 (Compound Pill of Hemlock.)

634. R_y
Extr. Conii 2,0
 [3] *solue in*
Aq. Laurocerasi 20,0.
D. S. 10 Tropfen mehrmals täglich zu
 nehmen.

635. R_y
Extr. Conii 2,5
 [3] *solue in*
Aq. Foenic. 60,0
Tinct. Opii benzoic. 15,0.
M. D. S. Theelöffelweise, umgeschüttelt.
 [Bei Keuchhusten.]

G. A. Richter
 [Die Dosis ist, namentlich für Kinder, zu hoch.]

M. D. S. In 3 Portionen in Zwischenräumen von $\frac{1}{2}$ Stunde zu nehmen.
 [Sehr theuer und stets mit Vortheil durch das *Decoct. Rad. Granat.* zu ersetzen.]

Von Schmidtmüller wird ein *Extr. Cort. Rad. Granat. aethereum* als das wirksamste Präparat der Granatwurzel-Rinde empfohlen. Dosis wie die des spirituösen Extracts.

†**Extractum Cotyledonis umbilici.** [Eingedickter frischer Saft von *Herba Cotyledonis umbilici*. — Cons. 2. — Trübe löslich. — 1,0 etwa 2 Sgr.]

Innerlich: zu 0,3-1,0 mehrmals täglich, in Pillen [gegen Epilepsie: v. Bullar].

637. R

Extr. Cotyled. umbil. 10,0

[12] *Pulv. Rad. Artemisiae* 5,0.

M. f. pil. No. 100. Consp. Lycop. D. S. 3 Mal täglich 5 Stück [bis zu 10 Stück steigend]. [Bei Epilepsie.]

†**Extractum Croci.** Safran-Extract. [Wie *Extr. Aurant. Cort.* — Cons. 2. — Lösung schön gelbbraun, aber trübe. — 1,0 etwa 5¼ Sgr.]
Obsolet.

Extractum Cubeborum. *Extr. Cubeborum aethereum Ph. Helv.* [Wie *Extr. Cinae*. — Cons. 1. — In Wasser kaum löslich. — 1,0 ¾ Sgr.]

Innerlich: 0,5-2,0 mehrmals täglich, in Pillen, Bissen, Electuarien und [am besten und billigsten] in Capsules [1 Dtzd. à 0,6 10 Sgr.].

638. R

Extr. Cubeb.

[7] *Bals. Copaiv.*

Cerae alb. rasae ana 4,0

Pulv. Cubeb. 12,0.

M. f. pil. No. 100. Consp. Cinnam. D. S.
2stündlich 5 Pillen.

639. R

Extr. Cubeb. 4,0

[6] *Gummi Arab.* 2,0

Ag. dest. 4,0

Magnes. carbon. 6,0.

M. f. pil. No. 100. Consp. Lycop. D. S.
3 Mal täglich 10 Pillen. [Bei Gonorrhoea secundaria.] Hausmann.

†**Extractum Cubeborum oleoso-resinosum** des früheren *Cod. med. Hamb.* [Nachdem das ätherische Oel abdestillirt worden, werden die Cubeben mit Wasser und dann mit Alkohol extrahirt und dem Gemisch beider Extracte das Oel zugesetzt. — Cons. 2. — Unlöslich in Wasser. — 1,0 etwa 1½ Sgr.]

Innerlich: zu 0,5-2,0 mehrmals täglich, in Pillen, Bissen und Electuarien.

640. R

Extr. Cubeb. oleoso-resin.

[35] *Bals. Copaiv. ana* 60,0

Vitelli ovi unius

exacte mixtis adde

Pulv. Rad. Alth. 60,0.

F. Boli oblongi ponder. 0,7, qui exsiccati
Sacch. consperg.

D. S. Trochisci (?) cubebini

Cod. med. Hamb.

[Aehnlich die *Copahine* und das in Frankreich gebrauchte *Copahine-Mège*.]

Die französische Pharmakopöe stellt aus dem *Extr. Cubeb. oleoso-resinosum* noch eine *Essence concentrée de Cubèbes* dar, durch Mischung des ersteren mit 3 *Spir. dil.* Dosis 5,0-15,0.

†**Extractum Cubeborum spirituosum** *Ph. Austr.*
[Die Cubeben mit Spiritus ausgezogen und das Extract zur Consistenz 1 abgedampft. Einfacher und ebenso zweckmässig, als die beiden genannten Extracte und billiger als das officinelle.]

Dosis und Anwendungsweise wie oben.

†**Extractum Dauci.** *Succus Dauci inspissatus depuratus. Rob Dauci depuratum. Rob de Carotte.* Möhrensaft Mohrrübensaft. [Von *Daucus Carota*. — Dicke Syrups-Consistenz. — 1,0

etwa $3\frac{1}{2}$ Sgr. — Man wählt in der Regel den viel billigeren *Succus Dauci venalis* (1,0 etwa 1 Sgr.), bei dem der Apotheker nur darauf zu achten hat, dass er nicht durch sorglose Bereitung empyreumatisch oder metallhaltig sei.]

Innerlich: als Constituens für Latwergen [namentlich anthelmintische], ausserdem als Expectorans esslöffelweise. [Der von der Confiseur-Industrie vielfach als Brustmittel angepriesene „geläuterte Möhrensaft“ ist ein aus 1 Th. *Succus Dauci recens expressus* und 2 Th. Zucker dargestellter Syrup.]

Aeusserlich: als Zusatz zu Mund- und Gurgelwässern, als Constituens für Pinselsäfte.

Extractum Digitalis. Fingerhut-Extract. [Wie *Extr. Bellad.* — Cons. 2. — Trübe löslich. — 1,0 2 Sgr.]

Innerlich: zu 0,03-0,1-0,2 [ad 0,2 pro dosi, ad 0,8 pro die!] mehrmals täglich, in Pillen, Solutionen.

Aeusserlich: zu Salben [1 auf 5-10 Fett].

641. Ry
Extr. Digital. 1,0

[2] *Vin. Scillae* 15,0.
M. D. S. 3stündlich 10-20 Tropfen.

[4] *Axung.* 25,0.

F. unguentum. D. S. Auf Leinwandläppchen gestrichen und aufgelegt. [Bei Mastitis, Parotitis.]

642. Ry
Extr. Digital. 3,0

Rademacher.

Extractum Digitalis siccum. [Vergl. *Extracta.* — 1,0 $1\frac{1}{2}$ Sgr.]

Innerlich: in doppelter Dosis wie das vorige.

Extractum Dulcamarae. Bittersüss-Extrat. [Aehnlich wie *Extr. Card. bened.* — Cons. 2. — Klar löslich. — 10,0 $4\frac{1}{2}$ Sgr.]

Innerlich: zu 0,5-1,5 mehrmals täglich, in Pillen oder Solutionen.

C43. Ry
Kali tartar. 2,5
[3] *Extr. Dulcamarae* 1,25
Aq. Foeniculi 5,0
Vin. stib. 6,0

Syr. Alth. 12,0.
M. D. S. Zweistündlich, umgeschüttelt,
1 Theelöffel.
[Bei Tussis convulsiva eines einjährigen Kindes.]
Osann.

†**Extractum Ebuli.** *Succus Ebuli inspissatus.* Roob *Ebuli.* Attichbeerenmus.

Innerlich: theelöffelweise pure oder als Zusatz zu diaphoretischen Mixturen.

†**Extractum Elaterii.** Eselsgurken- oder Springgurken-Extrakt. [Der eingedickte Saft der Früchte von *Ecballion Elaterium.* — Cons. 2. — Trübe löslich. — 1,0 etwa $1\frac{1}{2}$ Sgr.]

Innerlich: als Reizmittel 0,003-0,015, als Purgirmittel 0,015-0,06, in Pulvern, Pillen.

Extractum Fabae Calabaricae. *Extractum Phytostigmatis venenosi.* *Extractum Calabar.* Calabar-Extract. [*Faba Calabar.* 1 mit *Spirit. dil.* 5, der Rückstand mit 3 *Spirit. dil.* digerirt, gemischt, eingedampft. Cons. 2. — 0,1 $\frac{1}{2}$ Sgr.]

Innerlich: zu 0,005-0,01-0,02 [ad 0,02 pro dosi, ad 0,66 pro die!] in Lösung, Pulver oder Pillen [bei Neuralgien, Tetanus, Epilepsie, Chorea

und anderen Convulsionen, als Antidot gegen Belladonna und Strychnin (**Fraser-Watson** u. A.).

Aeusserlich: zu Einträufelungen in's Auge [1 zu 15 Glycerin], um Verengerungen der Pupille hervorzurufen, bei Mydriasis, als Antidot der Atropinwirkung (**v. Gräfe**). [Die Anwendung des Calabar-Papiers (**Hanbury**), bestehend aus Seidenpapier, welches mit *Extractum Calabar* durchtränkt ist, ist weniger empfehlenswerth, da das auf die Conjunctiva gelegte Papier als fremder Körper irritirend wirkt, eine starke Thränenabsonderung anregt und den grössten Theil des wirksamen Princips dadurch aus dem Auge herauschwemmt. Auch die mit Calabar-Extract bestrichenen Gelatinotafelchen (*Squire*) leiden an demselben Uebelstande.

644. R_y
Extr. Fab. Calab. 0,5
 [6] *Glycerini* 10,0.
M. D. S. 2-8 (!) Tropfen mehrere Male täglich. [Bei Chorea, Tetanus u. a. — Dieselbe Lösung zum Einträufeln in's Auge bei Mydriasis.]

645. R_y
Extr. Fab. Calabar. 0,5
 [6] *Spirit. aetherei* 5,0
Aq. Ment. pip. 20,0.
M. D. S. 5-20 (!) Tropfen mehrere Male täglich.

646. R_y
Extr. Fab. Calabar. 0,005
 [3] *Kali bromati*
Sacch. lactis ana 0,5
Ol. Foeniculi 0,05.
M. f. pulv. Dispens. tal. dos. No. 10
D. S. 3 Mal täglich 1 Pulver.

647. R_y
Extr. Fab. Calabar. 0,1
 [3] *Extr. Opii* 0,2
Succ. Liquir. dep. 2,0.
M. f. pil. No. 20. Consp. Lycop. D. S.
 3 Mal täglich 1 Pille.

Extractum Ferri pomatum. *Extractum Malatis Ferri Ph. Austr.* *Extr. Martis cum succo pomorum.* Apfelsaures Eisen-Extract. [Saure Aepfel 50 zerquetscht und ausgepresst, der Saft im Wasserbade mit 1 Th. gepulvertem Eisen erhitzt, die Flüssigkeit durch Hinzufügung von Wasser auf 48 Th. gebracht, filtrirt und zur Consistenz 2 abgedampft. — Fast klar löslich. — Enthält gewöhnlich 7-8 pCt. Eisen. — 10,0 9½ Sgr.] *Cave:* starke Säuren und alkalische Salze.

Innerlich: zu 0,3-0,6 mehrmals täglich, in Pillen und Solutionen [*Tinct. Ferri pom.*].

648. R_y
Extr. Ferri pomati
 [3] *Pulv. Cort. Chinae fusc. ana* 5,0.
M. f. pil. No. 100. Consp. Cinnam. D. S. 3 Mal täglich 6 Stück.
 [Das *Extr. Ferri cydoniatum* ist dasselbe Präparat, aus der Bereitung mit Quitten gewonnen.]

Extractum Filicis. *Extr. Filicis maris.* *Extr. Filicis aethereum.* *Oleum Filicis maris.* Farrenkrautwurzel-Extract. Johanniskraut-Extract. [*Rhizoma Filicis* 1 mit Aether 3 durch 3 Tage macerirt, ausgepresst, abermals mit Aether 2 in gleicher Weise behandelt. Die Flüssigkeiten gemischt, decanthirt und zur Cons. 1 abgedampft. — Unlöslich. — 1,0 5½ Sgr.]

Innerlich: zu 0,5-2,0 [gewöhnlich in 2 Portionen getheilt], in Pillen, Mixturen [unzweckmässig], Capsules [1 Dtzd. à 0,6 14 Sgr., mithin viel billiger als jede andere Darreichungsform].

649. R_y
Extr. Filicis
 [3] *Pulv. Filicis ana* 1,5.
M. f. pil. No. 20. Consp. Lycop. D. S.
 Abends 10 und Morgens 10 Pillen zu verbrauchen.

[In der Regel noch durch ein Clyisma aus *Extr. Filic.* 2,0 mit *Gummi Arab.* und Wasser unterstützt.]

[Bei Bandwurm.]

Peschier.

†**Extractum Foliorum Bucco** s. *Extr. Diosmae cre-natae*. [Wie *Extr. Aurant. Cort. Cons. 2.*]

Innerlich: zu 0,3-0,6 3 Mal täglich, in Pillen [bei Blasenkatarrh, Enuresis und anderen Leiden des uropoëtischen Systems]

***Extractum Foliorum Juglandis**. [Wie *Extr. Aurant. Cort. Cons. 2.* — Trübe löslich. — 1,0 etwa 2 Sgr.]

Innerlich: zu 0,3-1,5 mehrmals täglich, in Pillen oder Solutionen.
Aeusserlich: in Injectionen [bei scrophulösen Blennorrhöen], als Augenwasser [bei scrophulöser Ophthalmie], als Zusatz zu Salben [viel zu theuer für den äusserlichen Gebrauch. — Zu Hause bereitete Aufgüsse von Walnussblättern thun dasselbe!]

†**Extractum Fumariae**. Erdrauch-Extract. [Wässertiger Auszug. Cons. 2. — Klar löslich. — 5,0 etwa 2½ Sgr.]

Innerlich: zu 0,5-2,0 in Pillen, Solutionen.

Extractum Gelsemini liquidum. *Fluid extract of Gelsemine*. [Von *Gelsemium sempervirens*. Enthält ein sehr giftiges Alkaloid: Gelseminin, und eine Säure: Gelseminsäure (Wormsley).] Wird in den vereinigten Staaten von Nordamerika als Fiebermittel gleich dem Veratrin gebraucht. Auch gegen Blasenreizung und darauf beruhende Harnbeschwerden empfohlen: **Scott Hill**.

Innerlich: etwa zu 0,2-0,5 mehrmals täglich. [Das Mittel wirkt stark toxisch: 3 Theelöffel des Extracts tödteten innerhalb 7½ Stunden.]

[Hill giebt das Mittel in folgender Formel: *Extr. Gelsemini liquid., Kali bromat. ana 11,0, Kali carbon. 7,5, Aq. dest. 120,0. D. S. 3 Mal täglich 1 Theelöffel.*]

Extractum Gentianae. Enzian-Extract. [Auszug mit kaltem Wasser. Cons. 2. — Klar löslich. — 10,0 3¾ Sgr.]

Innerlich: zu 0,5-2,0 mehrmals täglich, in Pillen, Bissen, Mixturen.

650. Ry
Extr. Gentianae 8,0
[3] solve in
Aq. Cinnam. simpl. 200,0
adde
Spir. aether. 5,0.

M. D. S. Zweistündlich 1 Esslöffel.

Phoebus.

Extractum Glycyrrhizae s. *Succus Liquiritiae* und *Extractum Liquiritiae*.

Extractum Graminis. Quecken-Extract. [Auszug mit warmem Wasser wird zur Syrupconsistenz eingedampft, in 4 Th. destillirten Wassers gelöst, filtrirt und zu Cons. 2 abgedampft. Eigenthümlich süß. — Klar löslich. — 10,0 4¾ Sgr.]

Innerlich: zu 1,0-10,0 und mehr, ohne Beschränkung der Dosis, in Pillen oder Mixturen.

***Extractum Graminis liquidum** s. *Mellago Graminis*. [Wie das vorige bereitet, aber nur bis zur Cons. 1 abgedampft, oder zur Winterzeit durch Vermischung von 3 *Extractum Graminis* mit 1 *Aq. destill.* hergestellt.]

Innerlich: ohne Beschränkung der Dosis [etwa 2,0-15,0 und mehr] *pur* oder in Mixturen oder mit *Succ. Herb. rec.* gemischt.

Aeusserlich: zu Klystieren [selten und theuer].

Extractum Gratiolae. Gottesgnadenkraut-Extract. [Wie *Extr. Bellad.* Cons. 2. — Trübe löslich. — 1,0 2 $\frac{1}{2}$ Sgr.]

Innerlich: zu 0,05-0,2 [und darüber] mehrmals täglich, als stärkeres Purgans 0,5-1,0 *pro dosi*, in Pillen und Mixturen.

651. R₂
Extr. Gratiolae
[5] *Pulv. Herb. Gratiol. ana* 5,0.
M. f. pil. No. 100. Consp. Lycop. D. S.
Täglich 3 Mal 2-3 Stück zu nehmen.

652. R₂
Extr. Gratiolae
[4] *Pulv. Rad. Calami ana* 4,0.
F. pil. 60. Consp. Lycopod. D. S. Täglich 3 Mal 1-5 Stück. [Bei Atonie der Unterleibsorgane.] **Radius.**

653. R₂
Extr. Gratiolae 6,0
[7] *Bulb. Scill. pulv.* 1,5
Ammoniaci 3,0.
F. l. a. pil. 100. Consp. Lycop. D. S.
3 Mal tägl. 3-5 Stück. [Bei Hydrops.]

Extractum Helenii. *Extr. Enulae.* Alant-Extract. [Wie *Extr. Aurant. Cort.* Cons. 2. Trübe löslich. — 10,0 1 $\frac{1}{2}$ Sgr.]

Innerlich: zu 0,5-2,0 mehrmals täglich in Pillen oder Mixturen.

656. R₂
Extr. Helenii 10,0
[6] *Succ. Liquir. dep.* 5,0.
Aq. Foenic. 150,0
Liquor. Ammonii anis. 10,0.

M. D. S. Dreistündlich, umgeschüttelt, 1 Esslöffel.

Phoebus.

† **Extractum Hellebori.** *Extractum Hellebori viridis.* Niesswurzel-Extract. [Wie *Extr. Aurant. Cort.* Cons. 2. — Trübe löslich. — 1,0 etwa 2 $\frac{1}{2}$ Sgr.]

Innerlich: zu 0,03-0,05-0,1 mehrmals täglich [die frühere **Ph. Bor.**, in der das Mittel officinell war, schrieb vor: *ad 0,1 pro dosi, ad 0,5 pro die!*], in Pillen, Mixturen.

657. R₂
Extr. Helleb.
[5] *Extr. Myrrh. ana* 3,0
Pulv. Herb. Card. benedict. q. s.
F. pil. 50. Consp. Cass. Cinnam. D. S.
2 Mal täglich 2-3 Stück.
[Bei Hydrops, Amenorrhoe u. s. w.] **Bacher.**

658. R₂
Rad. Helleb. 1,0
[6] *Ammoniaci*
Extr. Chelid.
Sapon. med. ana 4,0

654. R₂
Extr. Gratiolae 2,5
[5] *Aq. Amygd. amar. dil.* 150,0
Syr. simpl. 25,0.
M. D. S. Umgeschüttelt, alle 2 Stunden 1 Esslöffel.

655. R₂
Extr. Gratiolae 10,0
[9] *solve in*
Aq. Petroselin. 150,0
Spir. Aether. nitros. 5,0
Syr. simpl. 25,0.
M. D. S. Umgeschüttelt, zweistündlich 1 Esslöffel.

Rad. Rhei pulv. 3,0.
M. f. pil. 100. Consp. Pulv. Rad. Calami. D. S. 3 Mal täglich 5 Stück.
[Bei Ascites.] **Wendt.**

659. R₂
Ammon. chlorat. 8,0
[7] *Extr. Helleb.* 1,0
Extr. Absinth. 4,0
Aq. Ment. pip. 150,0.
D. S. 3stündlich, umgeschüttelt, 1 Esslöffel. [Bei Febris interm. quartana.] **Berndt.**

660. Ry
 Extr. Helleb. 2,5 (1)
 [5] Boracis
 Elaeosacch. Cinnam. ana 1,2
 solve in
 Aqua Cinnam. simpl. 100,0

adde
 Syr. Aurant. Cort. 15,0.
 M. D. S. Umgeschüttelt, 3 Mal täglich
 1 Esslöffel. [Bei Menostasie, Pfortader-
 stockungen.]

Richter.

Extractum Hyoscyami. Extr. Hyoscyami foliorum

Ph. Austr. Bilsenkraut-Extract. [Wie Extr. Bellad. Cons. 2. — Trübe
 löslich. — 1,0 2½ Sgr.]

Innerlich: zu 0,01-0,05-0,1-0,2 [ad 0,2 pro dosi, ad 1,0 pro die!]
 mehrmals täglich, in Pulvern, Pillen, Linctus, Mixturen, Emul-
 sionen.

Aeusserlich: zu Zahnpillen, Klystieren [0,03-0,2 ad clysm],
 Suppositorien [in gleicher Dosis], Augenbähungen [0,5-1,0 auf 50,0],
 Augentropfwässern [0,5-1,0 auf 25,0], Augensalben [0,5-2,0 auf
 10,0 Feil] und anderen Salben und Pflastern [1,0-2,5 auf 10,0].

661. Ry
 Extr. Hyosc.
 [2] Pulv. Hyosc. ana 2,0.
 M. f. pil. No. 30. D.
 Pil. sedativae Ph. paup.

666. Ry
 Extr. Hyoscyami 1,0
 [2] Aq. Amygd. amar. 20,0.
 D. S. Zweistündlich 10-20 Tropfen.

662. Ry
 Opii pulv. 0,2
 [3] Fol. Digit. pulv.
 Rad. Ipecac. ana 0,5
 Extr. Hyosc. 3,0
 Pulv. Rad. Alth. q. s.
 ut f. pil. 50. Consp. Lycop. D. S. Drei-
 stündlich 1 Pille.
 [Gegen Krampf Husten.]

Beim.

667. Ry
 Extr. Hyoscyami 1,0
 [2] Liquor. Ammon. anis. 15,0.
 D. S. 4 Mal täglich 15-20 Tropfen in
 Brustthee. [Liq. pectoralis der Berli-
 ner Charité.] Horn.

668. Ry
 Extr. Hyoscyami 1,0
 [2] Butyr. recent. insuls. 10,0.
 F. unguent. D. S. 3 Mal täglich erbsen-
 gross in die Gegend des Foramen su-
 praorbitale einzureiben. [Bei Photo-
 phobia scrophulosa.] Wutzer.

663. Ry
 Stibii sulfur. aurant.
 [3] Extr. Hyoscyami ana 2,5
 Pulv. Rad. Liquir. q. s.
 F. pil. No. 50. D. S. Stündlich 1 Pille.

669. Ry
 Extr. Hyoscyami 0,6
 [2] Extr. Opii 0,3
 Ungt. Hydrarg. cin. 4,0
 M. f. ungt. S. In die Stirn- und Schlä-
 fengegend einzureiben. [Bei Retinitis.]
 v. Gräfe.

664. Ry
 Extr. Hyoscyami 0,5
 [3] solve in
 Aq. dest. 150,0
 Vin. stib. 20,0
 Succ. Liquir. dep. 10,0.
 M. D. S. Dreistündlich 1 Esslöffel.

670. Ry
 Extr. Hyoscyami 0,2
 [3] Ol. Cacao 20,0.
 M. f. l. a. suppositoria No. 6. D. S.
 1-2 Stück des Tages einzulegen. [Bei
 schmerzhaftem Harnlassen und gleich-
 zeitigem Tenesmus Gonorrhoeiker.]
 Sigmond.

665. Ry
 Extr. Hyoscyami 0,3
 [3] Eliz. e Succo Liquir. 25,0
 Aq. Foeniculi 50,0
 Aq. Flor. Aurant. 100,0.
 M. D. S. 3-4 Mal täglich 1 Esslöffel.
 Frerichs.

671. Ry
 Extr. Hyoscyami 5,0
 [4] Empl. Hydrarg. 20,0.
 M. f. empl. [Bei schmerzhaften Drüsen-
 geschwüren.]

Extractum Hyoscyami siccum. [Vergl. *Extracta*. — 1,0 1½ Sgr.]

Innerlich: in doppelter Dosis wie das vorige.

†**Extractum Hyoscyami e Seminibus.** [1 Th. Samen von fettem Oel durch Pressen befreit, mit 2 Th. *Spir. dilut.* einen Tag lang digerirt und ausgepresst, diese Operation noch einmal wiederholt, die erhaltenen Flüssigkeiten gemischt, filtrirt und zur Consistenz 2 abgedampft, in 3 Th. Wasser aufgelöst, filtrirt und nach Entfernung des Harzes zur Consistenz 2 abgedampft. — 0,2 etwa 1 Sgr.]

Innerlich und äusserlich: wie *Extractum Hyoscyami* [aber in schwächerer Dosis].

Extractum Jalapae spirituosum s. *Resina Jalapae*.

***Extractum Ipecacuanhae.** *Emetinum coloratum s. impurum.* Brechwurz-Extract. Rohes Emetin. [Wiederholentliches spirituöses Extrahiren der Ipecacuanha, Abdampfen der gemischten Flüssigkeiten bis zur Consistenz 2, Auflösen des Extracts in Wasser, Filtriren, Wiedereindampfen zur Consistenz 3. — Klar löslich. — 0,1 etwa 1½ Sgr.]

Innerlich: zu 0,03-0,15 [nach den meisten Autoren sind 0,1-0,15 nothwendig, um Brechen zu erregen], in Pulvern, Pillen [selten], Pastillen [à 0,015 mit 0,03 *Tart. stibiat.*] und Solutionen.

672. R_y
Extr. Ipecacuanh. 0,5
 [4] *Sacch. alb.* 2,5.
M. f. pulv. div. in 4 part. aeq. D. S.
 ½stündlich 1 Pulver.

673. R_y
Extr. Ipecacuanh. 0,2
 [3] *Inf. Fol. Aurant.* 100,0
Syr. Flor. Aurant. 25,0.
M. D. S. Halbstündlich 1 Esslöffel. [Als Brechmittel.]

Magendie.

674. R_y
Extr. Ipecacuanh. 0,5
 [8] *Stibii sulfur. aur.* 1,0
Extr. Senegae 5,0
Ammoniac. 2,5.
F. pil. 100. Consp. Pulv. Rad. Alth.
D. S. 3 Mal täglich 5 Pillen. [Bei chronischem Bronchialcatarrh.]

*n***Extractum Iridis florentinae aquosum.** Als Febrifugum von Allsiardi empfohlen, 10,0 - 20,0 2 Mal in einem Intervall von 2 Stunden.

Extractum Juniperi s. *Succus Juniperi inspissatus.*

†**Extractum Kosso** s. *Flores Kosso.*

†**Extractum Lactis.** Milch-Extract. [Bis zur trocknen oder zur Extract-Consistenz abgedampfte Milch. — Das unter dem Namen: con-

675. R_y
Extr. Ipecac. 0,4
 [5] *Sacch.* 30,0
Mucil. Gummi Tragacanth. q. s.
ut f. Trochisci No. 72. D. S. Zwei- bis dreistündlich 1-2 Stück zu nehmen.
 [Zur Erleichterung der Expectoration bei chronischen Catarrhen und Keuchhusten.]

Pastilles d'émétine pectorales
 Magendie.

676. R_y
Extr. Ipecac. 1,0
 [7] *Sacch. pulv.* 40,0
Mucil. Gummi Tragacanth. q. s.
F. Trochisci pondere 1,0 No. 50.
 [1-2 Trochisken genügen, um bei einem dreijährigen Kinde Erbrechen hervorzurufen.]

Tablettes d'émétine vomitives.
 Magendie.

condensirte Milch im Handel vorkommende, meist mit Firmen aus der Schweiz decorirte Präparat ist wesentlich Zucker mit wenig Milch, so dass sein Nährwerth weit hinter dem ihm nachgerühmten zurückbleibt. Es liegt aber in der Natur der Milch, dass sie ohne Zucker oder ähnliche Zusätze nicht concentrirt werden kann, und ist es deshalb, wo seine Anwendung nöthig, immerhin ein brauchbares Präparat. — Nach **Schwabe** lässt sich aus der condensirten Milch ein künstlicher Kumys folgendermaassen bereiten: 100 Cem. condensirte Milch werden mit wenig kaltem Wasser gelöst, darauf 1,0 Milchsäure, 0,5 in etwas Wasser gelöste Citronensäure und 15,0 Rum hinzugefügt und dann mit Wasser auf 1000-1500 Cem. verdünnt. Diese Mischung wird in eine **Liebig'sche** Flasche gefüllt, mit Kohlensäure imprägnirt und einige Tage in einer warmen Stube stehen gelassen. Dieser künstliche Kumys hält sich nur etwa 8 Tage. Der Kumys wird becherweise verabreicht.]

Innerlich: Auf Reisen oder im heissen Sommer zur Ernährung Kranker oder von Kindern. Oft zweckmässiger durch das Gelbe eines Eies zu ersetzen.

Extractum Lactucæ virosæ. Giftlattich-Extract. [Wie *Extr. Belladonnae*. Consistenz 2. — Etwas trübe löslich. — 1,0 1½ Sgr.]

Innerlich: zu 0,03-0,15-0,3-0,6 [ad 0,6 pro dosi, ad 2,5 pro die!] mehrmals täglich, in Pulvern, Pillen, Mixturen.

677. Ry
Extr. Lactuc. virosæ 0,06
 [3] *Sacch. Lact.* 0,6.
M. f. pulv. D. tal. dos. No. 12 in chart.
cer. S. Zweistündlich 1 Pulver. [Bei
 Keuchhusten.] **Gumprecht.**

679. Ry
Extr. Lact. vir. 2,0
 [2] *Asae foet. dep.* 6,0.
F. l. a. pil. 30. Consp. Lycop. D. S.
 3 Mal täglich 3-4 Pillen.
 [Gegen Asthma.]

678. Ry
Fol. Digitalis 0,03
 [4] *Extr. Lactuc. vir.* 0,12
Sacch. ulb. 0,8.
M. f. pulv. D. tal. dos. No. 12 in chart.
cer. S. Zweistündlich 1 Pulver. [Bei
 Brustwassersucht.] **Hufeland.**

Sundelin.

680. Ry
Extr. Lact. vir. 2,5
 [2] *Aq. Amygd. amar.* 25,0.
D. S. 3 Mal täglich 15-20 Tropfen.

* **Extractum Lanæ Pini sylvestris.** Waldwoll-Extract. [Durch Eindicken der Kiefernadel-Abkochung zu Consistenz 2, grünlich-braun, stark aromatisch riechend. — 30,0 etwa 3 Sgr., 1 Flasche (½ Pfund) 7½ Sgr.]

Aeusserlich: als Zusatz zu Bädern, 100,0-500,0 auf ein Bad [für einen Erwachsenen].

† **Extractum Levistici.** Liebstöckel-Extract. [Wie *Extr. Angelicæ*. Cons. 2. — Trübe löslich. — 1,0 etwa 1½ Sgr.]

Innerlich: zu 0,5-1,5 mehrmals täglich, in Pillen, Mixturen.

Extractum Ligni Campechiani. Campechenholz-Extract. [Auszug mit kochendem Wasser. Cons. 3. — Mit dunkelbrauner, fast rother Farbe und ziemlich klar sich lösend. — 1,0 10 Pf.]

Innerlich: zu 0,5-1,5 mehrmals täglich, in Pulvern, Pillen, Mixturen [z. B. in Rothwein gelöst].

Aeusserlich: zu Zahnfleisch-Latwergen,

***Extractum Ligni Guajaci.** Guajakholz-Extract.
[Wie *Extr. Cascarill.* Cons. 2. — Trübe löslich. — 10,0 etwa $1\frac{1}{2}$ Sgr.]
Innerlich: zu 0,5-1,5 mehrmals täglich, in Pillen.

Extractum Liquiritiae Radicis. [Wie *Extr. Gentianae* aus *Rad. Liquiritiae glabra* bereitet. Cons. 2. — 1,0 $\frac{1}{2}$ Sgr.]

Innerlich: als Constituens fester und als Corrigenens flüssiger Arzneiformen. — Bedeutend theurer als *Succus Liquiritiae dep.*, ohne Vorzüge vor demselben.

†**Extractum Lobeliae.** [Wie *Extr. Angelicae.* Cons. 2. — Trübe löslich. — 5,0 etwa $6\frac{1}{2}$ Sgr.]

Innerlich: zu 0,05-0,2. [Wenig erprobt und fast gar nicht in Gebrauch.]

†**Extractum Lupuli.** Hopfen-Extract. [Wie *Extr. Aurant. Cort.* Cons. 2. — Trübe löslich. — 1,0 etwa $1\frac{1}{8}$ Sgr.]

Innerlich: zu 0,5-1,5 mehrmals täglich, in Pillen, Solutionen.

†**Extractum Lycii.** Lycium, Rusot. [Extract aus verschiedenen Berberis-Arten. Stark bitter.]

Innerlich: zu 1,0-2,0 mehrere Male täglich, in wässriger Lösung [als Antipyreticum].

Extractum Malti. Malz-Extract. [Gerstenmalz mit kaltem Wasser ausgezogen, zur Cons. 2 abgedampft. — Ein Volksmittel ist das Malzextract längst geworden, doch bedient man sich gewöhnlich des angenehmer und leichter zu dispensirenden, zu Cons. 1 abgedampften, und hiervon entsprechen etwa 6 Pfund Malz einem Pfunde Extract. — 150,0 *in vitro* $7\frac{1}{2}$ Sgr.]

Innerlich: theelöffelweise, mehrere Male täglich [als Expectorans bei katarrhalischen Affectionen des Respirationstractus, ferner als Nutriens], rein oder mit Milch, Bouillon, Bier oder Wein.

Aeusserlich: zu Bädern [$\frac{1}{2}$ -1 Pfund zu einem Bade].

Extractum Malti ferratum. Eisenhaltiges Malz-Extract. [3 *Ferrum pyrophosphoricum cum Ammonio citrico* in Wasser 2 gelöst und mit Malzextract 95 gemischt. Auch hiervon gilt, was oben bei *Extr. Malti* über Consistenz gesagt ist. — 150,0 *in vitro* 10 Sgr.]

Theelöffelweise wie das vorige [als Tonico-Nutriens].

***n*Extractum Malti jodat.** Jodhaltiges Malz-Extract. [0,025 *Kalium jodatum* in 250,0 *Extr. Malti.*] Diese Verbindung lässt sich wohl zweckmässiger, je nach der Intention des Arztes und der Individualität des Patienten, *ex tempore* bereiten. Dasselbe gilt von dem

***n*Extractum Malti chinatum.** [1,0 *Chininum sulfur.* in 250,0 *Extr. Malti.*]

†**Extractum Marrubii.** [Wie *Extr. Absinth.* Cons. 2. Klar löslich. — 4,0 etwa $1\frac{1}{2}$ Sgr.]

Innerlich: zu 0,5-2,0, mehrmals täglich.

Extractum Mezerei. *Extr. Mezerei spirituosum seu aethereum.* [*Cort. Mezerei* 1 Th. mit 4 Th. Spiritus einige Tage digerirt, nach dem Auspressen der Rückstand nochmals mit 3 Th. Spiritus ausgezogen, beide Flüssigkeiten zusammen abdestillirt und zur Cons. 1 eingedampft. — 1,0 $2\frac{1}{2}$ Sgr.]

Aeusserlich: als Rubefaciens.

Extractum Millefolii. Schaafgarben-Extract. [Wie *Extr. Absinth.*, aus Blüten und Blättern zu gleichen Theilen. Cons. 2. Klar löslich. — 1,0 3 Sgr.]

Innerlich: zu 0,5-1,5 mehrmals täglich, in Pillen, Mixturen.

†**Extractum Monesiae.** *Monesia, Buranham.* [Ein dunkelbrauner, zerreiblicher Körper, von süßlich-adstringirendem, kratzendem Geschmaek, in Wasser ziemlich löslich, dessen Ursprung noch nicht genau ermittelt; er soll aus der Rinde eines zur Familie der Sapoteen gehörigen südamerikanischen Baumes (*Chrysophyllum glycyphlaeum*) bereitet werden, ist aber wahrscheinlich ein künstliches Gemisch von verschiedenartigen adstringirenden Substanzen, dessen Handelsvertrieb nur in den Händen eines einzigen französischen Droguisten ruht, der dem Mittel durch pomphafte Anpreisungen einen unverdienten Ruf erworben hat. — 1,0 etwa 1½ Sgr.]

Innerlich: zu 1,0-4,0 *pro die*, in Pulver oder Pillen [gegen ziemlich alle Krankheiten der Verdauungs- und Respirationsorgane, gegen Scrophulosis u. s. w. empfohlen; nicht mehr leistend als andere Adstringentia bei blennorrhoidischen Zuständen und Hämorrhagien], im Syrup und in schwacher alkoholischer Lösung [*Tinctura Monesiae* = 1 Th. Extract auf 15 Wasser und 5 Alkohol].

Aeuserlich: als Streupulver [bei scrophulösen Geschwüren], zu Injectionen [1-3 auf 25, bei Gonorrhoe, Leukorrhoe, Otorrhoe], als Mundwasser [bei diphtheritischer Entzündung der Mundschleimhaut], als Augenwasser [10-25 Tropfen der Tinctur auf 25,0 bei purulenten Ophthalmien der Kinder, chronischer Ophthalmie], als Salbe [bei schmerzhaften und entzündeten Hämorrhoidalknoten, 1 *Extr. Monesiae*, 1 Wasser, 4 *Ol. Amygd.*, 2 *Cer. flav.*] zu Zahnpillen [allein oder mit Opium — besser wohl das Opium allein — bei Zahnschmerz von cariösen Zähnen].

Extractum Myrrhae. Myrrhen-Extract. [Myrrhe 1 mit *Aq. dest.* 5 durch 2 Tage macerirt, filtrirt. Cons. 3. Trübe löslich. — 1,0 ½ Sgr.] Eine Auflösung dieses Extractes in 5 Th. Wasser ist der *Liquor Myrrhae* [*loco Liquaminis Myrrhae* s. *Olei Myrrhae per deliquium*].

Innerlich: zu 0,3-1,0 mehrmals täglich, in Pulvern, Pillen, Mixturen.

Aeuserlich: zu Pinselsäften, Zahnpulvern, Zahnfleisch-Latwergen, Augenwässern.

681.

R

Extr. Myrrhae 3,0[3] *Aq. Melissa* 150,0*Oxymell. Scill.**Succ. Liquir. dep. ana* 3,0.

M. D. S. 2-3stündlich 1 Esslöffel. [In torpiden Formen der Phthisis mit starker Secretion.]

Koehler.

***Extractum Nicotianae.** Tabak-Extract. [Wie *Extr. Colocynthis*, jedoch nur bis zur Cons. 2 abgedampft. — Trübe löslich. — 5,0 etwa 4½ Sgr.]

Innerlich: zu 0,03-0,1, in Pulvern, Pillen oder Solutionen.

Aeuserlich: zu Klystieren bei *Hernia incarcerata*, Ileos [0,05-0,1 in einem *Inf. Sennae* durch Eigelb suspendirt], in Salben [zur Einreibung bei Neuralgien: 1 auf 5-10 *Ungt. cer.*], zu Haarpomaden [gegen das Ausfallen der Haare von *Dorvault* empfohlen: 1 Th. Extract auf 10 Th. *Medulla*].

682. R₂*Extr. Nicotianae* 0,02-0,1[4] *Elaeosacchar. Foeniculi* 0,6.*M. f. pulv. D. tal. dos. 12 in chart. cer. S. 3-4 Mal täglich 1 Pulver.*

[Bei Keuchhusten.

Wolfsheim.

***Extractum Nicotianae Rademacheri.** [Die frischen Blätter von *N. rustica* ausgepresst und der Saft zur Consistenz 2 eingedickt. — 1,0 etwa $\frac{5}{8}$ Sgr.]

Innerlich: zu 0,2-0,5 *pro die*, in Pillen.

***Extractum Nucum Juglandis.** *Extr. Fructuum Juglandis.* Wallnuss-Extract. [Der ausgepresste Saft der unreifen Wallnüsse zur Cons. 2 abgedampft. — Trübe löslich. — 5,0 etwa $2\frac{1}{2}$ Sgr.]

Innerlich: zu 0,5 1,5 mehrmals täglich, in Pillen, Bissen, Mixturen.

Aeusserlich: in Auflösung als Verbandwasser bei torpiden Geschwüren [5,0 auf 100,0], zum Aufpinseln [5,0 auf 25,0], zu Gurgelungen u. s. w.

Extractum Nucum vomicarum s. *Extr. Strychni.*

† **Extractum Oleae europaeae.** [Aus den Blättern des Olivenbaumes bereitet; von stark bitterem Geschmack.]

Innerlich: zu 0,1-0,3 mehrmals täglich, in Pillen [von Camerer mit Erfolg gegen intermittirende Neuralgien versucht].

Extractum Opii. *Extr. Meconii.* Mohnsaft-Extract. [Durch Extraction des Opium mit *Aq. dest.*, Filtration und Eindampfen zur Consistenz 3. — Trübe löslich. — 1,0 $4\frac{1}{2}$ Sgr.]

Innerlich: zu 0,006-0,01-0,03-0,1 [ad 0,1 *pro dosi*, ad 0,4 *pro die!*] in Pulvern, Pillen, Solutionen.

Aeusserlich: zu Mund- und Gurgelwässern [0,5-1,0 auf 150,0 bei schmerzhaften Geschwüren im Munde, Zahnschmerz u. s. w. — mit Vorsicht zu gebrauchen], zu Injectionen [0,1-0,5 auf 50,0 bei Nachtripper, Fluor albus], als Augenwasser [Fomentationen: 0,05-0,3 auf 25,0; Tropfwasser: 0,2-0,5 auf 25,0], zu Klystieren und Suppositorien [0,05-0,1] Salben [1,0-1,5 auf 10,0 Fett; zu Augensalben: 0,1-0,25 auf 10,0], Zahnpillen, Zahnfleisch-Latwergen.

683. R₂*Extr. Opii* 0,15[2] *Extr. Belladonn.* 0,1*Syr. Capillor. vener.* 100,0.*D. S. 3 Mal täglich 1 Theelöffel.* [Bei nervösen Irritationen, zumal Reizhusten.]

Bouchardat.

684. R₂*Extr. Opii*[2] *Extr. Strychni spir. ana* 0,1*Succ. Liquir. dep. q. s.**ut f. pil. 10. Consp. Cinnam. D. S.* 1-4stündlich 1 Pille [Bei Diarrhöen, Cholera nostras und im Anfangsstadium der Cholera asiatica.]685. R₂*Extr. Opii* 0,1[2] *Catechu pulv.* 2,5*Conserv. Rosar. q. s.**ut f. Boli 6. Consp. Pulv. Cort. Cinnam. D. S. Morgens 1 Stück.* [Gegen chronische Diarrhoe.]

Parmentier.

686. R₂*Extr. Opii* 1,0[4] *Boracis* 4,0*solve in**Inf. Fol. Salviae* 150,0*adde**Mell. depurat.* 25,0.*M. D. S. Gurgelwasser.* [Bei schmerzhaften Halsentzündungen.]

Oppolzer.

687. Ry

Extr. Opii 0,4

[2] Aq. Amygd. amar. dilut. 25,0.
D. S. Zum Einträufeln in's Auge. [Bei
chron. Augenentzündung, Blepharo-
spasmus.] **Oesterlen.**

688. Ry

Extr. Opii 1,0

[2] Aq. dest. 50,0
Aq. chlorat. 2,0.
D. S. 2 Mal täglich, umgeschüttelt, ein-
zuspritzen. [Bei Geschwüren der Harn-
röhre.] **Blett.**
[Unchemisch zwar, soll aber erprobt
sein.]

689. Ry

Extr. Opii 0,5
solve in

Aq. Rosarum 300,0

adde

Plumb. acet. 1,0

Mucil. Cydoniorum 5,0.

M. D. S. Zu Umschlägen. [Bei Entzün-
dung und Schwellung der äusseren Ge-
schlechtsheile nach der Entbindung.]
Hauck.

690. Ry

Extr. Opii 0,5

[3] Ol. Terebinth. rectific. 2,5

Ol. Caryophyll.

Ol. Cajeputi ana 0,75

Bals. Peruv. 3,0.

M. D. S. Zahnschmerzsalb.

[Ein Stückchen Watte, mit dieser Flüs-
sigkeit getränkt, wird in den hohlen Zahn
gelegt, und auch das Zahnfleisch etwas
damit eingerieben.] **Beasley.**

† **Extractum Opii sine Narcotino.** [Opium-Extract mit

Aether ausgezogen und dadurch seines Narcotin-Gehaltes beraubt. — Soll einfach beruhigend sein, ohne aufregende Nebenwirkung; wahrscheinlicher ist es jedoch, dass die genannte Operation dem Extracte einen weniger wirksamen Bestandtheil, das Narcotin, entzieht und dadurch die Wirkung des Extractes selbst gleichmässiger und sicherer macht. — Da der Narcotin-Gehalt des Extractes kein unbedeutender ist, so ist die Dosis des Extr. Opii sine Narcotino schwächer zu greifen, als die des gewöhnlichen Extractes: etwa 0,005-0,06.]

† **Extractum Osmundae regalis.** Königsfarren-Ex-
tract. [Wässrig-spirituöses Extract. Hin und wieder gegen Scropheln und Hel-
minthiasis, ja sogar zur Radicalkur der Hernien empfohlen (11). Zu 5,0-15,0.]

* **Extractum Pimpinellae.** Pimpinellen-Extract. [Wie
Extr. Angelic. Cons. 2. — Trübe löslich. — 1,0 etwa 2½ Sgr.]

Innerlich: zu 0,3-1,0 mehrmals täglich.

† **Extractum Polygalae amarae.** Bitteres Kreuz-
blumen-Extract. [Wie Extr. Absinth. Consistenz 2. — Klar löslich. — 5,0
etwa 2½ Sgr.]

Innerlich: zu 1,0-2,0 mehrmals täglich, in Pillen oder Mixturen.

Extractum Pulsatillae. Küchenschellen-Extract.
[Wie Extr. Bellad. Cons. 2. — Trübe löslich. — 1,0 1½ Sgr.]

Innerlich: zu 0,03-0,1-0,2 [ad 0,2 pro dosi, ad 1,0 pro die!] mehrmals
täglich, in Pulvern, Pillen, Auflösungen.

691. Ry

Extr. Pulsatill.

[3] Herb. Pulsatill. ana 3,0.

M. f. pil. 50. Consp. Lycopod. D. S.

3 Mal täglich 1-2 Pillen.

Pilulae e Pulsatilla nigricanti Clinici.

M. f. pulv. D. tal. dos. No. 12. S. Täg-
lich 3 Pulver. [Bei Keuchhusten.]**Seidler.**

693. Ry

Extr. Pulsatill. 2,5

[2] solve in

Aq. Lauroceras. 25,0.

M. D. S. 15-25 Tropfen 3 Mal täglich
zu nehmen.

692. Ry

Extr. Pulsatill. 0,03

[3] Sacch. lact. 1,0.

Extractum Quassiae. *Extr. Ligni Quassiae.* [Wie *Extr. Ligni Campechian.* Cons. 2. — Trübe löslich. — 1,0 2 Sgr.]

Innerlich: zu 0,3-0,6 mehrmals täglich, in Pillen, Solutionen.

***Extractum Quercus.** Eichen-Extract. [Wie *Extr. Cascarill.* Cons. 2. — Trübe löslich. — 5,0 etwa 2½ Sgr.]

Innerlich: zu 0,3-1,0, in Pillen.

Aeusserlich: in Salben [1 auf 5-10].

Extractum Ratanhae. [Kalter wässriger Auszug. Cons. 3. — Löst sich röthlich trübe. — 1,0 1½ Sgr.]

Innerlich: zu 0,5-1,5 mehrmals täglich, in Pillen, Bissen, Mixturen,

Aeusserlich: zu Mund- und Gurgelwässern [5,0-10,0 auf 100,0], Pinselsäften [1,0-5,0 auf 25,0], Klystieren [5,0-10,0 *ad clysm.*], Injektionen [1,0-2,0 auf 100,0], Zahnpillen, Zahnlatwergen, Zahnpulvern, Pflastern und Salben.

694. Ry

Extr. Ratanhae 5,0

[5] *Ag. Cinnam. simpl.* 150,0

Mixtur. sulf.-acid. 1,5

Syr. Aurant. Cort. 25,0.

M. D. S. Stündlich bis zweistündlich einen Esslöffel. [Bei Gebärmutterblutung.]

Oesterlen.

M. D. S. 4 Mal täglich einen halben Esslöffel. [Bei Nachtripper.]

696. Ry

Extr. Ratanhae 20,0

[10] *Alum.* 10,0

Inf. Fol. Salviae 200,0

Mellis depur. 50,0.

D. S. Gurgelwasser.

695. Ry

Extr. Ratanhae 15,0

[10] *solue in*

Vini rubri gallici 100,0

Spir. aeth. 5,0.

697. Ry

Extr. Ratanhae 5,0

[4] *Mell. rosat.* 25,0.

D. S. Pinselsaft.

†**Extractum Rhamni frangulae.** *Extr. Frangulae.*

Faulbaum-Rinden-Extract. [Wie *Extr. Cascar.* Cons. 2. — Ziemlich klar löslich. — 5,0 etwa 2 Sgr.]

Innerlich: zu 0,5-1,5 in Pillen oder Solution.

698. Ry

Extr. Rhamni frangulae

[4] *Pulv. Fruct. Carvi ana* 10,0.

F. pil. 100. Consp. Pulv. Rhiz. Irid. florent. *D. S.* 3 Mal täglich 5 Pillen.

[Bei Unterleibsbeschwerden mit Flatulenz.]

Extractum Rhei. Rhabarber-Extract. [Wie *Extr. Absinthii* bereitet. Cons. 2. — Trübe löslich. — 1,0 4½ Sgr.]

Innerlich: zu 0,1-0,3 [als Tonicum], zu 0,5-1,0 [als Purgans] mehrmals täglich, in Pillen, Mixturen.

699. Ry

Extr. Rhei

[12] *Extr. Chinae fusc.*

Extr. Ferri pomat. ana 5,0.

M. f. pil. No. 100. Consp. Cinnamom.

D. S. 3 Mal täglich 5 Pillen.

[6] *Fell. Tauri inspiss. ana* 3,0.

M. f. pil. 50. Consp. Cass. *D. S.* 3 Mal täglich 3 Pillen.

700. Ry

Extr. Rhei

701. Ry

Extr. Rhei

[8] *Rad. Rhei pulv. ana* 6,0.

M. f. pil. No. 100. Obduc. Argent. D.

S. 5-10 Pillen. [Zum Abführen.]

Extractum Rhei compositum. *Extractum catholicum s. panchymagogum.* Zusammengesetztes Rhabarber-Extract. [Extr. Rhei 3, Extr. Aloës, Sapon. Jolap. ana 1. Cons. 3. — Trübe löslich. — 1,0 5½ Sgr.]

Innerlich: als Reizmittel zu 0,1-0,3, als Abführmittel zu 0,5-1,0, in Pillen.

702. R̄

Extr. Rhei comp. 6,0[12] *Extr. Colocynthidis* 1,0.*M. f. ope Mucilaginis Gummi Arab. pil.*No. 50. *Consp. Lycop. D. S.* Abends

1-2 Pillen zu nehmen. [Bei chronischer Obstructio alvi.]

703. R̄

Extr. Rhei comp. 4,0[11] *Aloës* 3,0*Ferr. pulv.* 1,0.*M. f. pil. No. 60. Consp. Lycop. D. S.*

Morgens und Abends 1-2 Stück.

Pil. contra obstructionem Halenses.

†**Extractum Rubiae Tinctorum.** Färberröthe-Extract. [Wie *Extr. Cascar.* Cons. 2. — Trübe löslich. — 5,0 etwa 2½ Sgr.]

Innerlich: zu 1,0-1,5 mehrmals täglich, in Pillen.

†**Extractum Rutae.** Rauten-Extract. [Wie *Extr. Absinth.* Cons. 2. — Trübe löslich. — 5,0 etwa 2½ Sgr.]

Innerlich: zu 0,5-1,5. [Obsolet.]

†**Extractum Sabadillae.** Sabadill-Extract. [Weingeistiges Extract.]

Innerlich: zu 0,01-0,02 [von Turnbull gegen Neuralgien empfohlen — unzuweckmässig und dem Veratrin nachzusetzen].

Extractum Sabinæ. Sadebaum-Extract. [Wie *Extr. Absinth.* Cons. 2. — Trübe löslich. — 1,0 2½ Sgr.]

Innerlich: zu 0,03-0,1-0,2 [ad 0,2 pro dosi, ad 1,0 pro die!], in Pillen.

***Extractum Salicis.** Weidenrinden-Extract. [Wie *Extr. Cascar.* Cons. 2. — Trübe löslich. — 5,0 etwa 2½ Sgr.]

Innerlich und äusserlich: wie *Extractum Quercus.*

†**Extractum Salviae.** [Wie *Extr. Absinth.* Cons. 2. — Klar löslich. — 5,0 etwa 2½ Sgr.]

Innerlich: zu 0,5-1,5.

Äusserlich: zu Mund- und Gurgelwässern.

Extractum Sambuci s. Succus Sambuci inspissatus.

†**Extractum Sanguinis.** *Sanguis bovinus inspissatus.* Eingedicktes Ochsenblut. [Frisches Ochsenblut bei gelinder Temperatur zur trockenen Consistenz abgedampft; röthlich-braunes, in Wasser unvollständig lösliches Pulver. — 5,0 etwa 1½ Sgr.]

Innerlich: zu 0,5-1,0 3-4 Mal täglich, in Pulvern [gegen Atrophie, Chlorose u. s. w. von Mauthner empfohlen; die Wirksamkeit dieses Mittels ist indess ziemlich zweifelhaft].

†**Extractum Saponariae e radice.** Seifenwurzel-Extract. [Wie *Extr. Cascar.* Cons. 2. — Klar löslich. — 5,0 etwa 2 Sgr.]

Innerlich: zu 0,5-1,5 mehrmals täglich.

†**Extractum Sarsaparillae.** [Wie *Extr. Cascar.* Cons. 2. Trübe löslich. — 1,0 etwa ¾ Sgr.]

Innerlich: zu 0,5-1,5 mehrmals täglich, in Pillen, besser als Zusatz zu abführenden Decocten oder Infusen.

Extractum Scillae. Meerzwiebel-Extract. [*Bulbus Scillae* 1 mit *Spir. dil.* 4 durch 4 Tage macerirt, ausgepresst, filtrirt und zur Cons. 2 abgedampft. — Ziemlich klar löslich. — 1,0 1 Sgr.]

Innerlich: zu 0,03-0,1-0,2 mehrmals täglich, in Solution, Pillen oder Bissen. [Entbehrlich und wegen seiner stark hygroskopischen Eigenschaft kaum eine genaue Dosirung gestattend.]

704.

R₂

Extr. Scillae 0,25
[3] *solve in*
Dec. Rad. Ononid. spin. 200,0
adde
Syr. Cort. Aurant. 15,0.

D. S. Stündlich einen Esslöffel. [Bei Hydrops.] **Skoda.**

Extractum Secalis cornuti. *Extr. Secalis cornuti aquosum.* *Extr. haemostaticum Bonjean.* *Ergotinum impurum.* Wässeriges Mutterkorn-Extract. [1 Th. *Secal. cornut.* wird mit 2 Th. kaltem destillirten Wasser 2 Mal ausgezogen, die Extracte colirt, zur Syrup-Consistenz eingedampft, mit Spiritus 1 vermischt, filtrirt und zur Cons. 2 abgedampft. — Klar löslich. — 1,0 5 $\frac{1}{2}$ Sgr.]

Diesem Extracte hat sein erster Darsteller, **Bonjean**, den von **Wiggers** schon occupirten Namen „Ergotin“ vindicirt. Mit diesem Präparate sind die meisten Versuche gemacht und zum Vortheil desselben ausgefallen. Aller Wahrscheinlichkeit nach ist die Wirkung auf das in diesem Extracte [neben Gummi und Zucker] enthaltene **Wiggers'sche** Ergotin zu beziehen. Es klingt paradox, dass dasselbe in diesem wässerigen Extract enthalten sein solle, da **Wiggers** als Hauptcharacter für sein Präparat angiebt, dass es im Wasser unlöslich sei; dies bezieht sich jedoch nur auf das schon abgeschiedene reine Präparat, nicht auf den Zustand, in welchem es sich, verbunden mit Schleim, im Mutterkorn vorfindet. In dieser Verbindung lässt es sich leicht mit Wasser extrahiren, wie dies ähnlich beim Cantharidin der Fall ist.

Innerlich: zu 0,1-0,6 [die in Frankreich gebräuchliche Dosis wird auf 0,2-2,0 (!) angegeben; jedenfalls ist bei der Unbeständigkeit des Präparates und der unzweifelhaften Giftigkeit desselben Vorsicht geboten] 3-4 Mal täglich in Pillen, Pastillen [zu 0,06 in der Apotheke vorrätzig], Solution [als wehenbeförderndes und blutstillendes Mittel].

Aeusserlich: als Clysmata [2,0-3,0 auf 100,0-200,0 Wasser] bei Darmblutungen, zu Umschlägen und Einspritzungen (bei Blutungen), zu subcutanen Injectionen 0,05-0,25 *pro dosi*, selten mehr, bis 0,4 oder 0,5! [zuerst von **A. Eulenburg** versucht und zwar bei Tussis convulsiva, ferner mit Recht empfohlen gegen innere Haemorrhagien, namentlich Haemoptoë, Gebärmutterblutungen (bei Menorrhagie von **Ruben**, **v. Swiderski**, **v. Kaczorowski Martin** u. A. erfolgreich angewandt) u. a., in neuester Zeit ferner von **v. Langenbeck** gegen Aneurysmen in 2 Fällen bewährt gefunden (s. unten), endlich bei verschiedenen Uterinleiden, namentlich Metritis chronica und Lageabweichungen des Uterus (**v. Swiderski**) und sogar bei Fibro-Myomen des Uterus (**Hildebrandt**) erfolgreich angewendet; auch nach **Remak's** Vorschlag gegen Kohlenoxydgas-Ver-

giftung, in Anbetracht der Untersuchungen von **Klebs**, zu versuchen. — Man benutzt entweder eine einfache wässrige Lösung (s. unten R₇₁₃) oder eine glycerinhaltige wässrige (*Extr. Secal. cornut.* 3,0, *Aq. dest.*, *Glycerini ana* 7,5: **Hildebrandt**) oder eine glycerinhaltige spirituöse (**A. Eulenburg**, **v. Langenbeck** vgl. R₇₁₂).

705. R_{705.}
Extr. Secal. corn.
 [4] *Acid. tannic. ana* 1,2
Extr. Opii 0,3
Succ. Liquir. dep. q. s.
ut f. pil. No. 20. Consp. Magnes. D. S.
 2-3stündlich 1 Pille. [Bei Hämoptysis.]
Lebert.

706. R_{706.}
Extr. Secal. corn. 5,0
 [12] *Pulv. Rad. Liquir. q. s.*
ut f. pil. No. 60. Obduc. Argento. D. S.
 Täglich 6-10 Pillen zu nehmen. [Bei
 chronischen Affectionen des Uterus.]
Arnal.

707. R_{707.}
Extr. Secal. corn. 2,5
 [6] *Aq. dest.* 150,0.
M. D. S. 3stündlich einen Kinderlöffel.
 [Gegen Morbus maculosus Werlhofii,
 Purpura haemorrhagica.]
Henoch.

708. R_{708.}
Extr. Secal. corn. 2,0
 [5] *Mucil. Gummi Arab.*
Syr. Sacch. ana 15,0
Aq. Amygd. amar. dilut. 150,0.
M. D. S. 1-2stündlich einen Esslöffel.
 [Bei Metrorrhagie.] **Oesterlen.**

709. R_{709.}
Extr. Secal. corn. 1,0
 [4] *Aq. comm.* 100,0
Syr. Flor. Aurant. 30,0.
M. D. S. Stündlich einen Esslöffel. [Bei
 Gebärmutter- oder Darmblutung. —
 Viertelstündlich einen Esslöffel zur Be-
 förderung der Geburt bei Wehen-
 schwäche.] **Bonjean.**

†**Extractum Secalis cornuti spirituosum.** Wein-
 geistiges Mutterkorn-Extract. [Das *Secale cornutum* wird mit heissem
 Spiritus erschöpft, die Tincturen filtrirt und zur Consistenz 2 abgedampft. — Trübe
 löslich. — 1,0 etwa 5 Sgr.]

Dieses Präparat, welches in der früheren **Ph. Austr.** officinell und
 fälschlich auch mit der Bezeichnung „Ergotin“ versehen war. dürfte inso-
 fern keine besondere Empfehlung verdienen, als es zwar allerdings das
Wiggers'sche Ergotin enthält, aber verunreinigt durch fettes Oel und an-
 dere Substanzen. Exacte Beobachtungen über die therapeutische Wirkung
 dieses Extractes liegen nicht vor.

710. R_{710.}
Extr. Secal. corn. 1,0
 [3] *Acid. tannic.* 2,0
Aq. dest. 200,0
Syr. simpl. 30,0.
M. D. S. Stündlich einen Esslöffel. [Bei
 Hämaturie.] **Lange.**

711. R_{711.}
Extr. Secal. corn.
 [23] *Alumin. ana* 12,0
Acid. benzoic. sublim. 4,0
coq. per horam dimid. c.
Aq. font. q. s.
ad Colat. 100,0.
Filtra. D. S. Stündlich 1 Theelöffel.
Liquor haemostaticus Hannon.

712. R_{712.}
Extr. Secal. corn. 2,5
 [6] *Spir. dil.*
Glycerini ana 7,5.
M. D. S. Zur subcutanen Injection. Eine
 halbe bis zu einer vollen Spritze zu
 injiciren. [Bei Aneurysmen und Hä-
 morrhagien.] **v. Langenbeck.**

713. R_{713.}
Extr. Secal. corn.
 [11] *Aq. dest. ana* 5,0.
M. D. S. Zur subcutanen Injection. [Diese
 Mischung ist sehr empfehlenswerth.
 Etwa $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$ Spritze zu injiciren. Bei
 Hämoptoe mit momentanem Erfolg an-
 gewandt, aber ohne Verhütung von Re-
 cidiven. Von derselben Mischung kön-
 nen gleichzeitig innerlich 10-20 Tro-
 pfen 1-2stündlich gereicht werden.]
Waldenburg.

Innerlich: zu 0,06-0,3 in wässriger Lösung oder in Pillen.
 Aeusserlich: zu Umschlägen und Einspritzungen bei Haemorrhagien
 [etwa 5,0-10,0 zu 100,0 Wasser].

Extractum Senegae. [Wie *Extr. Colombo.* — Trübe löslich.
 — 1,0 2½ Sgr.]

Innerlich: zu 0,3-1,0 mehrmals täglich, in Pillen.

***Extractum Sennae.** [*Fol. Sennae* mit lauwarmem Wasser erschöpft, die Flüssigkeiten zur Extract-Consistenz eingedampft, in kaltem Wasser gelöst, filtrirt, zur Cons. 2 abgedampft. — Klar löslich. — 1,0 etwa 1 Sgr.]

Innerlich: zu 2,0-5,0 [als Abführmittel], in Pillen, Bissen. [Ganz unzweckmässig und entbehrlich.]

†**Extractum Simarubae aquosum.** Ruhr- und
 Extract. [Wie *Extr. Cascar.* Cons. 2. — Trübe löslich. — 1,0 etwa 1½ Sgr.]

Innerlich: zu 0,5-1,5 mehrmals täglich, in Pillen.

†**Extractum Simarubae spirituosum.** [Wie *Extr. Aurant. Cort.* Cons. 2. — Trübe löslich. — 1,0 etwa 3 Sgr.]

Innerlich: wie das vorige.

Extractum Stramonii. Stechapfel-Extract. [Wie
Extr. Bellad. Cons. 2. — Trübe löslich. — 1,0 1½ Sgr.]

Innerlich: zu 0,01-0,05-0,1 [ad 0,1 pro dosi, ad 0,4 pro die!] mehrmals täglich, in Pillen und Solutionen.

Aeusserlich: zu Augenwässern [zu Bähungen: 0,5-2,0 auf 100,0; zu Tropfwässern: 0,2-0,6 auf 25,0], zu Injectionen [0,5-1,5 auf 100,0], zu Salben [1,0-1,5 auf 25,0], Pflastern, Zahnpillen.

714. R

Extr. Stramonii

[3] *Extr. Opii ana* 0,5

Zinci oxydati 8,0.

M. f. pil. No. 40. Consp. Lycop. D. S.

1-8 Pillen täglich. [So lange mit der

Dosis zu steigen, bis Patient Sehstörungen zu empfinden beginnt; nach Aufhören der Schmerzen noch 14 Tage mit der Kur fortzufahren.]

[Gegen Neuralgien.]

Trousseau.

†**Extractum Stramonii e Seminibus.** [Wie *Extr. Hyoscyami e Semin.* bereitet. Cons. 2. — 0,1 etwa 1 Sgr.]

Innerlich: zu 0,01-0,06.

Extractum Strychni aquosum. *Extractum Seminis Strychni aquosum.* *Extr. Nucum vomicarum aquosum.* Wässriges Brechnuss- oder Krähenaugen-Extract. [Auszug mit kochendem Wasser. Cons. 2. — Trübe löslich. — 1,0 ½ Sgr.]

Innerlich: zu 0,03-0,1-0,2 [ad 0,2 pro dosi, ad 0,6 pro die!] mehrmals täglich, in Pulvern, Pillen, Solution.

Aeusserlich: zu Klystieren [0,05-0,2 ad clyisma]; endermatisch.

715. R

Extr. Strychn. aquos.

[4] *Pulv. Sem. Strychni ana* 6,0.

F. ope Mucil. Gummi Mim. q. s. Pil. 100.

Consp. Pulv. Rhiz. Irid. flor. D. S.

Morgens und Abends 1 Pille, allmählig

steigend. [Bei rheumatischer Lähmung]

Trinius.

716. R

Extr. Strychni aquos. 0,5

[3] *Aq. Cinnam. simpl.* 150,0

Mucil. Gummi Arab.

Syr. simpl. ana 30,0.

M. D. S. Zweistündlich einen Esslöffel.

[Bei Diarrhoe, Ruhr.]

Oesterlen.

717. R₇
Extr. Strychni aquos. 0,05-0,1
 1] *solve in*

Aq. dest. 50,0.

M. D. S. Umgeschüttelt, Säuglingen zu 2-3, älteren Kindern zu 6-12 Tropfen zu geben. [Bei Prolapsus ani.] **Schwartz.**

Extractum Strychni spirituosum. *Extractum Seminis Strychni spirituosum. Extractum Nucum vomicarum spirituosum.* [*Extr. Nucis vomicae Ph. Austr.*] Weingeistiges Brechnuss- oder Krähenaugen-Extract. [Spirituöses Extract, mit reinem *Spir. dil.* bereitet, zur Cons. 3 abgedampft. — Trübe löslich. — 0,1 5 Pf]

Innerlich: zu 0,01-0,03-0,05 [*ad 0,05 pro dosi! ad 0,15 pro die!*] in Pulvern, Pillen, Solutionen.

Aeusserlich: zu Einreibungen in spirituöser Lösung [0,1-0,25 auf 25,0 *Spir. dil.*] oder Salben [1,0-2,0 auf 25,0]; endermatisch [0,03 bis 0,05].

718. R₇
Extr. Strychni spir. 0,6
 [4] *Pulv. Rad. Liquir.*

Sacch. alb. ana 8,0.

M. f. pulv. div. in 20 part. aeq. D. S.
 Täglich 2 Mal 1 Pulver, allmählig steigend. **Oesterlen.**

Tinct. aromat.

Aether. acet. ana 3,0.

M. D. S. 2 Mal täglich 10 Tropfen. **Oesterlen.**

722. R₇
Extr. Strychni spir. 0,1
 [2] *Tinct. Canthar.* 1,0

Tinct. Calami 3,0.

D. S. 3 Mal täglich 10-15 Tropfen in *Decoct. Alth.* zu nehmen. [Bei Blasen- und Mastdarm-Lähmung.] **Schömann.**

719. R₇
Extr. Strychni spir.

[4] *Bism. subnit. ana* 0,03

Magn. carb. 0,2

Sacch. 0,6

Ol. Ment. pip. 0,1.

M. f. pulv. disp. tal. dos. 12. D. in charta cerata. S. 2stündlich 1 Pulver. [Bei Magenkrampf.] **Vogt.**

723. R₇
Extr. Strychni spir. 0,5
 [3] *solve in*

Spir. dilut. 15,0

adde

Tinct. Cantherid.

Liq. Ammon. caust. spir. ana 5,0.

M. D. S. Zum Einreiben.

724. R₇
Extr. Strychni spir. 0,05
 [4] *Sacch. alb.* 0,25.

M. f. pulv. D. tal. dos. No. 10. in chart. cer. S. Täglich 1 Pulver in die Vesicator-Stelle zu streuen.

720. R₇
Extr. Strychni spir. 5,0 (!)

[5] *Succ. Liquir. dep.* 7,5.

F. l. a. pil. 100. Consp. Lycop. D. S.
 Anfangs täglich 1 Pille (= 0,05), dann allmählig auf 2 bis 5 (!) täglich (1 *pro dosi*) steigend. [Bei Impotenz und Spermatorrhoe.] **Duclos.**

721. R₇
Extr. Strychni spir. 0,5
 [3] *solve in*

† **Extractum Tanacetii.** Reinfarn-Extract. [Wie *Extr. Absinth.* Cons. 2. — Trübe löslich. — 5,0 etwa 5½ Sgr.]

Innerlich: zu 0,5-1,5 mehrmals täglich, in Pillen.

Extractum Taraxaci. Löwenzahn-Extract. [Wie *Extr. Card. bened.* Cons. 2. — Fast klar löslich. — 5,0 2½ Sgr.]

Innerlich: zu 2,0-10,0 mehrere Male täglich in Bissen oder Solutionen.

† **Extractum Taraxaci liquidum.** *Loco Mellagin.*

Taraxaci. Löwenzahn-Honig. [3 Th. des obigen Extractes mit 1 Th. Wasser. Cons. 1.]

Innerlich: zu 25,0-50,0 *pro die, pur* oder in Mixturen.

Aeusserlich: zu Klystieren [25,0-50,0 *ad clysm*], selten angewendet und theuer.

† **Extractum Taxi baccatae.** Eibenbaum-Extract.

[Wie *Extr. Bellad.* Cons. 2. — Trübe löslich. — 1,0 etwa 2½ Sgr.]

Innerlich: zu 0,03-0,15, in Pillen.

† **Extractum Tormentillae.** Tormentillen-Extract.

[Wie *Extr. Cascar.* Cons. 2. — Trübe löslich. — 5,0 etwa 2½ Sgr.]

Innerlich: zu 0,5-1,0 mehrmals täglich.

Aeusserlich: zu adstringirenden Verbandwässern, Einspritzungen u. s. w. [5,0-15,0 auf 100,0].

† **Extractum Toxicodendri.** Giftsumach-Extract.

[Wie *Extr. Bellad.* Cons. 2. — Trübe löslich. — 1,0 etwa 2½ Sgr.]

Innerlich zu 0,01-0,03 mehrmals täglich, in Pillen [von **Trousseau** gegen Paraplegie empfohlen].

Extractum Trifolii fibrini. *Extr. Trifolii.* Fieberklee-, Bitterklee- oder Dreiblatt-Extract. [Wie *Extr. Card. bened.* Cons. 2. — Klar löslich. — 10,0 3¼ Sgr.]

Innerlich: zu 1,0-2,0 mehrmals täglich, in Pillen oder Solutionen.

† **Extractum Turionum Pini.** Fichtensprossen-

Extract. [Wie *Extr. Angelicae.* Cons. 2. — Trübe löslich. — 1,0 etwa ½ Sgr.]

Innerlich: als Zusatz oder Vehikel für diuretische Arzneien.

Aeusserlich: zu Bädern [25,0-50,0 *pro balneo*].

† **Extractum Uvae Ursi.** Bärentrauben-Extract. [Wie

Extr. Absinth. Cons. 2. — Trübe löslich. — 5,0 etwa 2½ Sgr.]

Innerlich: zu 0,5-2,0 mehrmals täglich, in Pillen oder Solutionen.

Venot rühmt das Extract einer anderen *Arbutus*-Art [*Arbutus unedo*] als eines der kräftigsten Adstringentien, namentlich bei Blennorrhagien: R_y *Extr. Arbuti, Ratanhae ana 2,5, f. pil. 30.* D. S. Morgens und Abends 2-3 Pillen.

Extractum Valerianae. Baldrian-Extract. [Wie *Extr.*

Aurant. Cort. Cons. 2. — Trübe löslich. — 1,0 3¼ Sgr.]

Innerlich: zu 1,0-2,5 mehrmals täglich, in Solutionen.

725. R_y

Extr. Valerianae 10,0

[8] *Aq. Cinnam. simpl.* 100,0

Spir. aether. 3,0.

M. D. S. 3 Mal täglich 1 Esslöffel.

Phoebus.

cui adde

Extr. Valerianae 2,0.

D. S. 6 bis 30 Tropfen Morgens und Abends einem schleimigen Getränk oder zu Zuckerwasser zuzusetzen.

Pierlot.

[Diese etwas willkürlich als *Valerianate d'Ammoniaque* bezeichnete Mischung ist in neuester Zeit in Frankreich gegen inveterirte Nervenleiden, zumal Epilepsie und Hysterie, gerühmt worden.]

726. R_y

Acid. valerian. 3,0

[6] *Ammon. carb. q. s.*

ut f. cum Aq. dest.

Saturatio 100,0

Extractum Veratri viridis. [Spirituöser Auszug aus der Wurzel von *Veratrum viride* (Thayer).]

Innerlich: 2-5 Tropfen 1-4stündlich.

****Extractum Vitis Pampinorum.*** Weinreben-Extract. [Wie *Extr. Bellad.* Cons. 2. — Trübe löslich. — 1,0 etwa 1 Sgr.]

Innerlich: zu 4,0-12,0 *pro die*, in Solutionen.

Faba Calabaria. *Faba Calabarensis. Semen Physostigmatis venenosi. Ordeal Bean of Calabar. Calabar-Bean.* Calabar-Bohne. Gottes-Urtheil-Bohne. [Diese in neuester Zeit durch Fraser, Robertson und v. Gräfe in die *Materia medica* eingeführten Samen einer im Königreiche Dahomeh an der Küste von Guinea heimischen Leguminose sind nierenförmig oder dreieckig, etwa 1 Zoll lang und $\frac{1}{2}$ Zoll breit, von einem festen, braunen, genarbtten Corium umkleidet und mit einer tief eingeschnittenen, roth umranderten Raphe versehen. — Die in hohem Grade toxische Wirkung der Calabar-Bohnen hat in ihrem Heimathlande den Anlass gegeben, sie zur Prüfung der Schuld oder Unschuld Angeklagter zu verwenden; daher der Name *Ordeal-Bean*, Gottes-Urtheil-Bohne. Als wirksamen Bestandtheil bezeichnet man das Physostigmin oder Eserin (vergl. *Eserinum* S. 272), von dem es jedoch fraglich, ob es etwas anderes ist, als ein eingedicktes Extract.]

Man wendet die Bohne selbst nicht an, sondern nur ein Extract derselben [vergl. *Extractum Fabae Calabar.* S. 287].

†***Fabae Pichurim majores et minores.*** *Semen Pichurim.* Grosse und kleine Pichurim-Bohnen. [Grosse *pulv.* etwa 5 Sgr., kleine 4 Sgr.]

Innerlich: als aromatisches Mittel, zu 0,5-1,5 mehrmals täglich, in Pulvern, Morsellen. — Völlig obsolet.

Farina Hordei praeparata. *Prepared Barley-meal. Farine d'orge préparée.* Präparirtes Gerstenmehl. [100,0 $3\frac{1}{2}$ Sgr.]

Die Präparation geschieht durch 30stündiges Erhitzen des Gerstenmehls in einem verdeckten, von dem zusammengepressten Mehl nur zu $\frac{2}{3}$ gefüllten, zinnernen Gefässe. Nach Entfernung der oberen, durch Feuchtigkeit zusammengeballten Schicht wird das darunter befindliche, meist etwas röthlicher gewordene Mehl durch ein Sieb geschlagen und trocken aufbewahrt. Dem ersten Darsteller schwebte jedenfalls der Gedanke vor, die Stärkekügelchen zu zersprengen, wie dies bei der Kleisterbildung geschieht. Es ist jedoch das mikroskopische Verhalten des präparirten Gerstenmehls genau dasselbe, wie das des rohen, so dass die ganze umständliche Procedur im Wesentlichen nichts erzielt, als eine Trocknung des Gerstenmehls, und der Ruf, den sich die *Farina Hordei praeparata* als Nährmittel für Reconvalescenten, Atrophische u. s. w. erworben hat, gleiche Grundlagen mit dem der Revalenta u. s. w. besitzt.

****Farina Secalis.*** *Rye-meal, Farine de blé, Farine de Seigle.* Roggenmehl. [30,0 etwa $\frac{2}{3}$ Sgr.]

Innerlich: als Nährmittel.

Ausserlich: zu trockenen Umschlägen, Cataplasmen [mit Honig], zu Streupulvern.