

1092. R_y
Jodi 0,03-0,06
 [2] *Kalii jodati* 0,6
Aq. Rosar. 100,0.
 D. S. Augenwasser; 4 Mal täglich zu appliciren. [Bei Ophthalmia scrophulosa.] **Magendie.**

1093. R_y
Jodi 1,0
 [3] *Kalii jodat.* 2,5
solue in
Aq. dest. 150,0
adde
Spir. dil. 30,0.
 M. D. [Bei Pruritus perinealis zweistündlich mittelst eines Schwämmchens anzuwenden; bei Pruritus vulvae um das Vierfache zu verdünnen.] **Hancke.**

1094. R_y
Jodi 1,0-1,5
 [5] *Kalii jodat.* 2,0-3,0
Ungt. simpl. 15,0.
 F. unguent. [Zur Einreibung bei Drüsenanschwellungen, bei beginnender Phthisis pulm.] **Little.**

1095. R_y
Jodi 0,6
 [4] *Kalii jodat.* 4,0
Azung. 50,0.
 F. unguent. [Bei scrophul. Ophthalmie.] **Lugol.**

1096. R_y
Jodi 1,0
 [5] *Kalii jodat.* 6,0
Tinct. Opii 8,0
Azung. 60,0.
 F. unguent. D. [Bei Tumor albus.] **Lugol.**

1097. R_y
Jodi 5,0
 [5] *Kalii jodat.* 2,0

† **Jujubae.** Brustbeeren. [Früchte von *Zizyphus vulgaris*.] Enthalten Zucker, Schleim und einen geringen Antheil Säure. Früherhin als Zusatz zur *Pasta Liquiritiae*, in Frankreich noch jetzt vielfach zur *Pâte pectorale de Jujubes* [Jujubae mit Gummi Arabic., Zucker und *Aq. Flor. Aurant.*] benutzt.

Kali aceticum. *Kalium aceticum* Ph. Helv.*). *Terra fo-*

*) Die Ph. Austr. und Helv. bezeichnen sämtliche Verbindungen des Kali als solche des Kalium, z. B. *Kalium carbonicum*, *Kalium chloricum*, *Kalium nitricum* u. s. w. (vergl. die Anmerkung zu *Natrium aceticum*).

Camphorae 1,0
Spir. dil. 40,0.
 M. F. Liniment. D. S. Zum Einreiben.
Linimentum Jodi Ph. Brit.

1098. R_y
Jodi 0,6
 [3] *Kalii jod.* 2,0
Medull. ossium 50,0.
 F. Liniment. D. [Bei Frostbeulen.] **Schmalz.**

1099. R_y
Jodi 1,5
 [3] *solue in*
Spir. dil. q. s.
Azung. porci 30,0.
 F. unguentum. D. [Bei acuten Krankheiten stündlich, bei chronischen zweibis dreimal täglich einzureiben.] **Rademacher.**

1100. R_y
Jodi 0,5
 [3] *Collodi* 25,0.
 M. D. S. Zum Bestreichen der Frostbeulen.

1101. R_y
Jodi 2,0
 [8] *Kalii jodat.* 2,5
Extr. Opii 8,0
terendo solue
in pauxillo Aq. dest.
adde
Empl. Plumbi simpl. 60,0.
 D. [Bei scrophulösen Geschwülsten, Tumor albus.] **Lugol.**

1102. R_y
Jodi
 [4] *Kalii jodati ana* 0,5-1,0
Empl. saponati 50,0.
 M. f. emplastr. [Bei syphilitischen und arthritischen Knoghengeschwülsten] **Ebers.**

liata Tartari, Acetas kalicus, Acetas Lixiviae, Acetas Potassae, Acetate of Potash. Essigsäures Kali. [An der Luft zerfließlich, in Wasser und Alkohol leicht löslich. — 10,0 1½ Sgr.] *Cave:* Mineralsäuren.

Innerlich: zu 0,5-4,0, meist in Solution [gewöhnlich als *Liquor Kali acet.*; vergl. diesen], in Pillen.

Aeusserlich: zu Riechpulvern [mit Zusatz von *Acid. tartaricum* oder *Kali sulfur. acid.*].

1103. R₃
Kali acet.
 [5] *Extr. Juniperi ana* 25,0
Spir. Aeth. nitr. 5,0
Aq. dest. q. s.
ad 200,0.
M. D. S. Stündlich 1 Esslöffel.

1104. R₃
Kali acet. 4,0
 [3] *Aq. Petroselini* 100,0
Oxym. Scill.
Sacch. alb. ana 12,0.
D. S. Zweistündlich 1 Kinderlöffel.
 Oesterlen.

1105. R₃
Kali acet. 15,0-30,0
 [5-6] *solue in*
Inf. Fol. Digital. (e 1,5) 150,0
Oxym. Scill. 50,0.
D. S. Zweistündlich 1 Esslöffel. [Bei
 Hydrops.]

1106. R₃
Kali acet. 20,0
solue in
 [10] *Inf. Rad. Rhei (e 10,0)* 200,0
adde

Extr. Taraxaci liquidi 25,0
Elaeosacch. Foenic. 100,0.
M. D. S. Zweistündlich 1 Esslöffel.

1107. R₃
Kali acet. 8,0-16,0
 [5] *solue in*
Aq. Menth. pip. 200,0
adde
Elix. Aurant. comp. 8,0.
D. S. Zweistündlich 1 Esslöffel. [Als
 Digestivmittel.]
 Phoebus.

1108. R₃
Kali acet.
 [3] *Pulv. Rad. Rhei ana* 4,0.
M. f. pil. 60. Consp. Cass. *D. S.* Mor-
 gens und Abends 2-5 Pillen. [Als
 Digestivmittel] **Horn.**
 [Bei Verordnung dieser Pillen ist
 die Hinzufügung eines Extractes oder
 eines *Mucilago* unnöthig, da beide Sub-
 stanzen, trocken verrieben, eine Pillen-
 masse ergeben.]

1109. R₃
Kali acet. 4,0
 [3] *Kali sulf. acid.* 6,0.
D. in vitro bene clauso. *S.* Riechmittel.

Kali aceticum solutum s. Liquor Kali acetici.

n Kali arsenicosum. *Arsénite de potasse.* Arsenig-
 saures Kali. Bei uns nur zur Bereitung des *Liquor Kali arsenicosi*
 verwendet. In Frankreich zu Arsenik-Cigarren von *Trousseau* benutzt.
 [*Kali arsenicosi* 1,0=2,0, *solue in Aq. dest.* 10,0. Zwei Gramm dieser Solution
 werden auf ein Blatt Papier gegossen, dieses dann getrocknet und zu kleinen Cigar-
 ren gerollt. Der Kranke raucht dieselbe, indem er 2-3-5 Mal den Dampf in die
 Bronchen einzieht. Bei Phthisis empfohlen.]

Kali arsenicosum solutum s. Liq. Kali arsenicosi.

Kali bicarbonicum. *Kali bicarbonicum purum.* *Kali*
carbonicum acidum. *Kalium bicarbonicum Ph. Helv.* *Bicarbonas*
kalicus c. Aqua. Potassae bicarbonas. Sal Tartari crystallisa-
tum. Hydro-Kali carbonicum. Bicarbonate of Potash. Doppelt
 kohlenensaures Kali. [10,0 1½ Sgr.] Leicht löslich in Wasser. *Cave:*
 Säuren.

Innerlich: zu 0,5-1,5, in Pulvern [zur Bereitung der Brausepulver ist

Natrum bicarbonicum vorzuziehen], Pillen [unzweckmässig], Trochisci [Trochisci d'Arcet zu 0,06], Solutionen [Brausemischungen].

1110. R₅

Kali bicarbon 0,6

[2] Cort. Aurant. 0,3.

M. f. pulvis. D. tal. dos. No. 10. S. Täglich 3 Mal 1 Pulver in Zuckerwasser zu nehmen. [Gegen Magen- und Darmsäure.] **G. A. Richter.**

1111. R₅

Kali bicarbon.

[2] Acid. tartar.

Sacch. alb. ana 0,5.

M. f. pulv. D. tal. dos. No. 12. S. Brausepulver.

1112-1113.

R₅

Kali bicarb. 0,6

[4] Elaeosacch. Citri 0,3.

M. f. pulv., disp. tal. dos. No. 8. D. in charta coerulea. S. No. 1.

R₅

Acid. tartar.

Sacch. ana 0,6.

F. pulv. disp. tal. dos. No. 8. D. in charta alba. S. No. 2. Stündlich 1 Pulver No. 1 in Wasser aufgelöst und 1 Pulver No. 2 zugesetzt.

1114. R₅

Kali bicarb. 10,0

[3] solve in

Aq. Ment. pip. 150,0

adde

Syr. Aurant. Cort. 25,0.

M. D. S. Stündlich 1 Esslöffel.

1115. R₅

Kali bicarb.

[2] Elaeosacch. Citri ana 6,0

Aq. dest. 100,0.

M. D. S. Von Zeit zu Zeit 1 Esslöffel zu nehmen, nachdem unmittelbar vorher 3-4 Theelöffel Citronensaft mit etwas Wasser und stark versüsst genommen worden. [Brausemischung.] **Phoebus.**

1116. R₅

Kali bicarb. 6,0

[3] Sacch. alb. 15,0

Aq. dest. 120,0.

D. S. Halbstündlich einen Esslöffel mit einem Theelöffel Citronensaft.

Oesterlen.

***Kali bichromicum.** Kali chromicum acidum. Kalium bichromicum Ph. Helv. Kali chromicum rubrum. Bichromas Potassae. Doppelt chromsaures Kali. [Rothe Krystalle von bitterlichem Geschmack, in Wasser leicht, in Alkohol nicht löslich. — 30,0 1½ Sgr.]

Innerlich: zu 0,008-0,015 mehrmals täglich, in Pillen oder Solution [bei der Verordnung von Pillen hüte man sich, auf lange Zeit zu verordnen: wegen der leicht erfolgenden Reduction der Chromsäure zu Chromoxyd].

Aeusserlich: als Pulver oder Solution [4,0-20,0 auf 100,0], zum Aetzen von Condylomen, Plaques muqueuses, scrophulösen und krebsigen Geschwüren. Vorzüglich geeignet zur Erhärtung anatomischer Präparate.

1117. R₅

Kali bichromici 1,0

[2] Extr. Gentianae 8,0

Pulv. Rad. Gentian. q. s.

ut f. pil. 80. Consp. Lycopod. D. S. Abends vor dem Schlafengehen eine Pille und ein Glas Zuckerwasser nachzutrinken; vom 4. Tage ab wird Morgens und Abends eine Pille genommen, vom 10. Tage Morgens, Mittags und Abends eine Pille, vom 16. Tage ab 4, vom 21. 5, vom 24. 6, so dass der Kranke bis zum 31. Tage 160 Pillen verbraucht hat, womit die Kur beendet ist. Erregt die Morgens genommene Dosis Uebelkeit und Erbrechen, so lässt man etwas Extr. Opii nachnehmen. Während der ganzen Kur strenge Diät, Gebrauch von Decoct. lignor.; bei vorhandenen Condylomen örtliche Medication.

[Bei inveterirter Lues]

Vincenti und Heyfelder.

***Kali bioxalicum.** Kali oxalicum (acidum). Oxalium. Oxalas acidus Potassae. Sal Acetosellae. Oxalsaures Kali.

Kleesalz, [Krystallinisches, ziemlich schwer lösliches Salz. — 30,0 *subt. pulv.* 4 Sgr.] *Cave*: Kalksalze, Gummischleim.

Innerlich: zu 0,05-0,1-0,2 3 Mal täglich [mit Vorsicht zu geben, da dieses Salz in grösseren Gaben giftige Wirkungen, wie die Oxalsäure selbst, hervorruft], in Pulvern oder wässriger Lösung [als kühlendes Mittel; in neuer Zeit gegen Enteritis und Metritis puerperalis empfohlen].

1118. R₁

Kali bioxal. 0,3

[2] *Aq. dest.* 150,0

Sacch. albi 6,0.

D. S. Stündlich 1 Esslöffel. [Bei Metroperitonitis puerperalis.]

v. Brenner.

***Kali bisulfuricum.** *Kali sulfuricum acidum. Tartarus vitriolatus acidus. Bisulfas kalicus.* Saures schwefelsaures Kali. [Leicht löslich. — 30,0 etwa 2½ Sgr. — Vgl. Anmerk. auf S. 390.]

Innerlich: selten zur Anwendung kommend, und dann nur in vorsichtiger Verdünnung, etwa in Solution von 2,0-4,0 auf 100,0.

Aeusserlich: mit essigsäuren Salzen als Riechmittel [vergl. *Kali aceticum*].

Kali bitartaricum depuratum s. *Tartarus depuratus*.

Kali carbonicum crudum. *Kalium carbon. crud.* *Ph. Austr. et Helv. Carbonas kalicus crudus. Carbonas Lixiviae, Potassa. Cineres clavellati. Pearl-ash.* Rohes kohlen-saures Kali, rohe Potasche. [10,0 3½ Sgr.]

Nur zu Bädern [100,0-200,0 für ein allgemeines, 5,0-10,0 auf 1000,0 Wasser zum örtlichen Bade — als Surrogat für diese Bäder kann man armen Leuten Ankochungen von Asche von harten Hölzern, zwei Esslöffel auf einen Liter, verordnen].

Kali carbonicum depuratum. *Kali carb. s. Carbonas kalicus e cineribus clavellatis. Cineres clavellati depurati.* Gereinigtes kohlen-saures Kali, gereinigte Potasche. [10,0 4 Sgr.] Zerfliesslich.

Ebenfalls nur äusserlich: zu Klystieren [vergl. die Stütz'sche Methode gegen Tetanus bei *Kali carb. pur.*], Injectionen [5,0-15,0 auf 1000,0 Wasser, bei Pruritus vaginae: **Trousseau**], Umschlägen, Waschungen [10,0-50,0 auf 500,0], örtlichen Bädern [die Hälfte der Quantität des vorigen Präparates], Linimenten [1 Th. *Kali carb. dep.* mit 2 Th. Wasser und 3 Th. Oel], Salben [1 auf 5-10].

1119. R₁

Kali carb. dep. 12,0

[4] *Natrii chlorati* 8,0

solve in

Aq. Rosarum 250,0

Aq. Flor. Aurant. 60,0.

D. S. Waschwasser. [Gegen Ephelides.]

Sundelin.

1120. R₁

Kali carb. depur. 15,0

[5] *Sapon. Hisp. albi rasi* 20,0

solve in

Aq. dest. tepid. 200,0

adde

Ol. Terebinth. rectific. 30,0

Ol. Cajeputi 5,0

Spir. Juniperi 20,0.

D. S. Umgeschüttelt zu Waschungen und Einreibungen. [Bei Lähmungen, Wassersuchten, Geschwülsten.]

Liquor nervinus Peerboomii.

1121. R₁
Kali carb. depur. 3,0
 [2] *Azung.* 25,0.
M. f. ungt. D. Zum Einreiben. [Bei
Tinea capitis nach Abweichung der
 Borken.]

1122. R₁
Kali carb. depur. 10,0
 [3] *Aq. font.* 20,0
Ol. Amygdal. 30,0.
F. linimentum. D. S. Umgeschüttelt, zur
 Einreibung. [Bei chronischen Haut-
 leiden.] **Conradi.**

Kali carbonicum purum. *Kalium carbonicum Ph.*
Helv. Kalium carbonicum depuratum Ph. Austr. Kali carbonicum
e Tartaro, Alkali vegetabile aëratum. Kali subcarbonicum, Sal
Tartari. Carbonas kalicus e Tartaro s. purus. Potassae carbonas.
Carbonate of Potash. Reines kohlen-saures Kali. [10,0 1½ Sgr.]
 An der Luft zerfließlich. *Cave:* Säuren [ausgenommen bei Saturationen und
 Brausemischungen], Erd- und Metallsalze, Alkaloide.

Innerlich: zu 0,1-0,5-1,0 2-4 Mal täglich, bei Convulsionen öfter,
 bei Steinbeschwerden 4,0-12,0 [in 300,0-1000,0 Wasser gelöst] *pro die* zu
 verbrauchen, bei Vergiftungen durch Säuren und durch Alkaloide durch
 entsprechendere Mittel [Magnesia resp. Tannin u. s. w.] verdrängt. In So-
 lution [mit bedeutender Quantität des Menstruums (vergl. *Liquor Kali carbon.*);
 in schleimigen Abkochungen, aromatischen Wässern, Bier, Selterwasser], in
 Brausemischungen und Saturationen [über die Saturations-Verhältnisse
 vergl. S. 42].

Aeusserlich: zu Mundwässern [1 auf 5-25 Flüssigkeit], Augen-
 wässern [0,05-1,0 auf 100,0 zum Augenwaschwasser, 0,1-0,5 auf 25,0 zum
 Augentropfwasser]; zu Inhalationen in zerstäubter Lösung [1,0-2,5-5,0
 auf 500,0 *Aq.*].

Stütz's Methode gegen Tetanus:

1123-1124.
 R₁
Kali carb. puri 12,5
solue in
 [5] *Aq. Chamom.*
Aq. Cinnamom. simpl. ana 100,0
adde
Syr. Papav. 30,0.
M. D. S. Alle 1-1½ Stunde, abwech-
 selnd mit dem folgenden, 1 Esslöffel.

R₁
 [1] *Tinct. Opii simpl.* 10,0.
D. S. 1-1½ stündlich, abwechselnd mit
 dem vorigen, 5-15 Tropfen. Dabei
 Seifenklystiere, mit Zusatz von 4,0-8,0
Kali carbon. depur., 1-2 Mal täglich
 ein warmes Bad mit ca. 100,0-150,0
Kali carbon. crud. oder 30,0-50,0 *Kali*
caust. sicc., oder Fomentationen oder
 Einreibungen des Unterleibes mit einer
 Lösung von *Kali caust. sicc.* 2,0 auf
 1 Liter Seifenwasser.

1125. R₁
Kali carb. pur. 4,0-6,0
 [5] *Aq. Ment. crisp.* 150,0
Syr. Aurant. Cort. 50,0.

Waldenburg u. Simon, Arzneiverordnungslehre. 8. Aufl.

M. D. S. Alle 2-3 Stunden 1 Esslöffel.
 [Säuretilgend, krampfstillend.]

Sundelin.

1126. R₁
Kali carb. pur. 4,0
 [3] *Aq. Meliss.* 120,0
Spir. aeth. 2,5
Syr. commun. 15,0.
M. D. S. Esslöffelweise. [Bei Asthma.]
Wolf.

1127. R₁
Kali carb. pur. 2,5
 [2] *Sacch. albi* 4,0
Aq. dest. 120,0
Aq. Cinnam. simpl. 60,0.
D. S. Halbstündlich 2 Esslöffel mit 1 Ess-
 löffel Citronensaft. *Potio Riveri.*
 [Die **Ph. Germ.** bezeichnet eine
 Natron-Solution als *Potio Riveri*, vergl.
 diese.]

1128. R₁
Kali carb. pur. 5,0
 [3] *Acet. q. s.*
ad perfectam saturationem 150,0
Syr. Sacch. 25,0.
D. S. 1-2 stündlich 1 Esslöffel

1129. R_y
Kali carb. pur. 0,1-0,3
 [5] *solue in*
Aq. dest. 25,0

Tinct. Opii simpl. 0,5.
 D. S. 3 Mal täglich mehrere Tropfen
 in's Auge zu tröpfeln. [Bei Hornhaut-
 flecken.] **Himly.**

Kali carbonicum solutum s. *Liquor Kali carbon.*

Kali causticum fusum. *Kali hydricum fusum. Hydras kalicus fusus. Potassa caustica Ph. Brit. Kalium hydricum Ph. Helv. Kalium hydro-oxydatum Ph. Austr. Lapis causticus Chirurgorum. Cauterium potenziale. Fused caustic Potash, Pierre à cautères.* Geschmolzenes Aetzkali, Aetzstein. [An der Luft sehr leicht zerfließlich. — 10,0 1½ Sgr.] *Cave:* Säuren, Salze, Alkaloide.

Innerlich: zu 0,01-0,1-0,15 [und darüber] 2-3 Mal täglich, in Solution mit bedeutender Menge einhüllenden Vehikels [1,0 in 50,0 *Aq. dest.*, davon mehrmals täglich einen Theelöffel in einer Tasse Haferschleim; vergl. ferner *Liquor Kali caustici*, welcher meistentheils vorzuziehen ist].

Aeusserlich: in Substanz als Aetzmittel [pure; wo man eine in die Tiefe reichende Wirkung beabsichtigt, so namentlich bei Bisswunden toller oder giftiger Thiere, zum allmäligen Oeffnen tiefliegender Abscesse. Ferner mit ziemlich gleichen Theilen *Calcaria usta* (vergl. diese) als *Pulvis escharoticus Viennensis*, welches entweder aufgestreut oder mit Weingeist zur Paste geformt wird; ein Gemisch von 4 Th. Kalk und 5 Th. *Kali causticum* lässt sich, obschon mit einiger Schwierigkeit, in Stangen giessen, die man, mit Wachs überzogen, in Glasröhren sehr gut conserviren kann, und die, nach der Anwendung, ohne irgend eine Vorsichtsmaassregel wieder trocknen], in Solution zu Injectionen [0,1-0,5 auf 100,0], Augentropfwässern [0,05-0,15 auf 25,0], Waschungen [10,0 bis 20,0 auf 1 Pfund Wasser: **Schönlein** im Eruptionsstadium der Miliaria rheumatica], Bädern [30,0-100,0 auf ein allgemeines Bad, 2,0-4,0 auf den Liter bei örtlichen Bädern], Verbandwässern [0,2-1,0 auf 100,0].

1130. R_y
Kali caust. fus. 0,5
 [4] *Aq. Citri* 25,0.
 D. S. 4 Mal täglich 12-20 Tropfen in
 Fleischbrühe. [Bei Scrophulosis.]
Wendt.

[4] *Sapon domest.* 15,0
Aq. comm. 1000,0
Ol. Lavandul. 4,0.
 M. D. S. Umgeschüttelt, zum Waschen.
Freiberg.

1131. R_y
Kali caust. fus. 0,03-0,1
 [2] *solue in*
Aq. Chamom. 15,0
Tinct. Opii simpl. Gutt. 5.
 M. D. S. Zur Injection in's Ohr. [Bei
 Otorrhoea purulenta.] **Rust.**

1134. R_y
Kali caust. fus. 6,0
 [4] *Camph.* 2,0
Sacch. 50,0
Aq. font. 600,0.
 M. D. S. Waschmittel. [Bei fungösen
 und torpiden Geschwüren.] **Saviard.**

1132. R_y
Kali caust. fus. 2,0
 [3] *Aq. dest.* 400,0.
 D. S. Täglich 3 Mal die afficirten Stellen
 damit zu waschen und damit befeuchtete
 Charpie darauf zu appliciren
 [Prophylacticum gegen Hydrophobie]
Rust.

1135. R_y
Kali caust. fus. 25,0
 [2] *Aq. font.* 300,0.
 D. [Mit einer solchen Auflösung lässt
Fischer in Köln Krätzkranke kräftig
 einreiben (mittelst eines Stückes Werg),
 nachdem die Haut durch eine Seifenfriction
 und ein einstündiges Bad aufgelockert
 worden. Nach ½ - ¾ stündlicher
 Einreibung laues Bad und kalte
 Brause, womit die ganze Kur beendet
 ist.]

1133. R_y
Kali caust. fus. 1,0

***Kali causticum siccum.** *Kali hydricum siccum. Hydras kalicus, Alkali causticum, White-lime-potash, Potasse caustique à la chaux.* Troeknes Aetzkali, Kaliumoxyd-Hydrat. [Ebenfalls zerfliesslich. — 30,0 3¼ Sgr.] Leicht löslich in Wasser und Weingeist. — *Cave:* Säuren, Salze, Alkaloide.

Innerlich und äusserlich: wie das vorige. [In der früheren **Ph. Bor.** war dieses Präparat officinell und wurde statt des vorigen namentlich zum innerlichen Gebrauche ausschliesslich benutzt, während *Kali causticum fusum* nur als Aetzstift angewendet wurde.]

Kali chloricum. *Kalium chloricum Ph. Austr. et Helv. Potassae chloras Ph. Brit. Kali muriaticum oxygenatum depuratum. Kali oxymuriaticum depuratum. Chloras kalicus depuratus.* Chlorsaures Kali. [10,0 1½ Sgr. — In 17 Th. kalten, in 3 Th. kochenden Wassers löslich.] *Cave:* stärkere Säuren, saure schwefelsaure Salze, Verordnungen in Pulver- und Pillenform, weil das Mittel, mit organischen und brennbaren Substanzen zusammen verrieben, leicht explodirt. [Man kürze im Recepte nicht *Kal. chlor.* ab, weil dies auch *Kalium chloratum* heissen kann.]

Innerlich: zu 0,1-1,0 mehrmals täglich, nur in Solution.

Äusserlich: als Streupulver [bei Krebsgeschwüren: **Burow**], in Solution [2,5-5,0 auf 100,0] als Mund- und Gurgelwasser [bei Aphthen, Stomatitis und Angina mercurialis, Diphtheritis, ferner als Prophylacticum zur Verhütung der Salivation und der Stomatitis bei Mercurialkuren (**Herpin, Blache**), endlich auch bei Zahnschmerz, der durch die Einwirkung scharfer Mundsaften auf die freiliegende Pulpa bedingt wird: **Neumann**], zur Inhalation in zerstäubter Lösung [vergl. S. 106, bei Soor, Angina mercurialis, Diphtheritis u. a.], zu Injectionen in die Urethra [bei Gonorrhoe: 5,0 zu 150,0 *Aq.*, Anfangs Morgens und Abends je eine Injection, später je zwei: **Pascual Candela y Sanchez**], zur Bereitung von Moxen [Charpiebäuschehen mit concentrirter Lösung getränkt].

1136. Rj
Kali chlorici 2,0
[2] solve in
Aq. dest. 100,0-150,0
Syr. Sacch. 50,0.

M. D. S. 1-2stündlich einen Kinderlöffel.
[Bei Soor, Mundfäule.] **Romberg.**

1137. Rj
Kali chlorici 2,0-4,0
[3] *Extr. Chin. frig. parat.* 4,0
Aq. dest. 150,0
Syr. Aurant. Cort. 30,0.

D. S. Stündlich einen Esslöffel. [Bei Gangraena oris.] **Lebert.**

1138. Rj
Kali chlorici 5,0
[2] *Aq. dest.* 150,0

Kali chromicum acidum s. *Kali bichromicum.*

†**Kali chromicum neutrale.** *K. chromicum flavum, Potassae Chromas.* Einfach chromsaures Kali. [Schwefelgelbe Krystalle, leicht in Wasser löslich. — 5,0 etwa ½ Sgr.]

Tinct. Ferri chlorat. aeth. 5,0-10,0
Syr. Rub. Idae 25,0.
M. D. S. Stündlich einen Esslöffel. [Bei Diphtherie.] **Waldenburg.**

1139. Rj
Kali chlorici 5,0
[2] *Aq. dest.* 150,0
Tinct. Pimpinell. 5,0
Syr. Sacch. 25,0.

D. S. Stündlich einen Esslöffel. [Bei Diphtheritis pharyngea.]

1140. Rj
Kali chlorici 6,0
[2] *Aq. dest.* 120,0.
D. S. Zweistündlich einen Esslöffel. [Bei hartnäckigen rheumatischen Neuralgien] **Knod v. Helmenstreich.**

Innerlich: als Alterans zu 0,01-0,06, als Emeticum zu 0,1-0,25, in Solution.

Aeusserlich: in Solution als Verbandwasser bei Geschwüren, chronischen Exanthenen, Kopfgrind [5,0-20,0 auf 100,0 Wasser], als Augewasser [Solution von 1 Th. auf 10 Th. Wasser, davon täglich einen Tropfen in's Auge zu bringen: bei pustulöser rheumatischer Augenentzündung], als Aetzmittel [zur Wegbeizung von Fungositäten] in concentrirter Lösung oder Streupulver; zur Bereitung von Moxen [mit einer Solution von 1 Th. in 16 Th. Wasser wird Löschpapier durchtränkt und zu kleinen Cylindern geformt: *Moxae chromatae* (1 Stück 1 Sgr.)]. Eine Auflösung von 5,0 in 1000,0 Wasser wird von Jacobson als Antisepticum zur Aufbewahrung von anatomischen Präparaten empfohlen [*Liquor conservator Jacobsonii*].

1141. R
Kali chromici neutr. 0,1
 [3] *Aq. dest.* 150,0
Succ. Liquir. 6,0.

M. D. S. 2stündlich einen Esslöffel. [Bei catarrhalischen Affectionen der Athemorgane.] Jensen.

1142. R
Kali chrom. neutr. 0,2
 [1] *Aq. dest.* 60,0.

D. S. Alle zehn Minuten einen Esslöffel voll, bis 3 Mal Erbrechen erfolgt ist.

†**Kali citricum.** *Potassae Citras.* Citronensaures Kali. [Weisse salinische Masse — sieht das Präparat schwarz aus, so liegt dies an der unzuweckmässigen Bereitung mit *Succus Citri* statt mit *Acid. citr.* — Leicht löslich, an der Luft zerfliesslich. — 5,0 etwa 2½ Sgr.]

Innerlich: zu 0,5-2,0 mehrmals täglich, in Solution [vollständig entbehrlich und durch die *Potio Rivieri* sehr gut zu ersetzen (vergl. R 1127)].

Kali hydricum s. *Kali causticum.*

Kali hydricum solutum s. *Liquor Kali caustici.*

Kali hypermanganicum crystallisatum. *Kalium hypermanganicum Ph. Helv. Kali oxymanganicum. Potassae Permanganas.* Uebermangansaures Kali. Löslich in Wasser; die Lösungen haben ein schön violettes Ansehen. [1,0 ¼ Sgr.] Leicht zersetzlich, darum mit keinem organischen Zusatze zu verordnen.

Innerlich: zu 0,05-0,15 2-3 Mal täglich, in Lösung [gegen Diabetes mellitus von Sampson verordnet; gegen Diphtherie von Réveil: Solution von 1,0 in 150,0 *Aq. dest.*, 2-3stündlich 1 Theelöffel in einer halben Tasse Wasser].

Aeusserlich: als Desinficiens. [In dieser Eigenschaft hat das übermangansaure Kali in neuerer Zeit vielfache Anwendung gefunden. Die Tilgung übler Gerüche von eiternden, brandigen Wunden, cariösen Zähnen u. s. w. dürfte durch kein Mittel rascher und gründlicher beseitigt werden. Sehr zweckmässig bedient man sich zur Desinfection von Krankenzimmern des Pulverisateurs, indem man grosse Quantitäten saturirter Lösungen im Zimmer zerstäuben lässt.] Als desinficirendes Waschmittel [nach Sectionen, nach Untersuchungen bei Puerperalkranken u. s. w. — Lösung von 1,0 auf 100,0 *Aq.*, die noch verdünnt werden kann], als Verband- und Aetzmittel bei übelriechenden Ulcerationen [Böttger und Schwanda empfehlen Schiessbaumwolle oder Collodiumwolle mit *Solutio Kali hypermang.* zu tränken und aufzulegen: bei inficirten Wunden und Geschwüren], Injection bei Ozaena, Carcinoma uteri u. s. w. [Lösung von 0,5-1,0 auf 100,0], zu Mund- und Gurgelwässern [Lösung von 1,0 auf 100,0, wovon ein Theelöffel mit einem Glase Pfefferminzwasser oder reinem Wasser (unmittelbar vor dem Gebrauche gemischt) zum Ausspülen des Mundes verwendet

wird; Solution von 2,0-5,0 auf 50,0 Wasser zum Bepinseln diphtheritischer Stellen; mit einem Asbestpinsel aufzutragen]; zur Inhalation in zerstäubter Lösung [vgl. S. 106; gegen Diphtheritis, Stomatitis aphthosa, Soor von Réveil empfohlen], endlich als Zusatz zu Seifen [**Pincus'** desinficirende Seife]. [Das *Kali hypermanganicum* wird in der Seife leicht zersetzt; das Mittel darf daher nicht in Lösung, sondern nur in Krystallen zugesetzt werden; aber auch so kommt die Zersetzung binnen Kurzem zu Stande.]

1143. R̄
Kali hypermanganici 5,0
 [2] *solue in*
Aq. dest. 100,0.

M. [Diese Mischung habe zweckmässig jeder Arzt vorrätig. Etwa 1 Thee- bis Esslöffel derselben zum Wasser zugesetzt, zu desinficirenden Waschungen; 1 Theelöffel zu einem Wein- oder Wassergläse voll Wasser zum Ausspülen des Mundes und zu Gurgelungen nach dem Besuche

ansteckender Patienten, namentlich Diphtherie-Kranker.]

1144. R̄
Kali hypermanganici
 [3] *Calcariae carbon. pulv.*
Amyli ana 100,0.

M. F. Pulvis. D. S. Zum Verbinden überriechender Wunden, Geschwüre, Krebs u. s. w.

Demarquay.

Kali hypochlorosum solutum s. *Liquor Kali chlorati*.

†**Kali jodicum.** Jodsaures Kali. [Löslich.]

Innerlich: zu 0,2-0,6 mehrmals täglich, in Auflösungen [von Demarquay und Monod gegen Diphtheritis, Stomatitis mercurialis und gangraenosa empfohlen].

Kali manganicum. *Manganas Potassae.* Mangansaures Kali. An Stelle des hypermangansauren Kali's von Lex als Desinficiens empfohlen, vor dem es sich durch Wohlfeilheit auszeichnet, obgleich grössere Quantitäten nothwendig sind, um eine entsprechende Wirkung zu entfalten. Für grössere Spitäler zu empfehlen. [30,0 etwa 5 Sgr.]

Kali nitricum. *Nitrum depuratum.* *Kalium nitricum* Ph. Austr. et Helv. *Potassae nitras* Ph. Brit. *Nitras kalicus depuratus.* *Nitrate of Potash.* *Salpêtre.* *Azotate de Potasse.* *Sel de Nitre.* Gereinigtes salpetersaures Kali. Gereinigter Salpeter. [In warmem Wasser sehr leicht, in kaltem etwas schwerer löslich — 10,0 $\frac{1}{2}$ Sgr., *subt. pulv.* $\frac{2}{3}$ Sgr.] *Cave:* Schwefel-, Salz- und Phosphorsäure und deren saure Salze der Alkalien.

Innerlich: zu 0,3-1,0-1,5 1-2stündlich [2,0-10,0 *pro die*], in Pulvern oder Solution [zuweilen in Substanz als *Nitrum tabulatum* (*Sal Prunellae*, *Sore-throat-selt*, *Crystal minéral*), geschmolzener und auf eine kalte Platte getropfelter Salpeter (30,0 3 Sgr.), wovon $\frac{1}{2}$ -1stündlich 1 Stück, etwa 0,2 genommen wird].

Ausserlich: zu Mund- und Gurgelwässern [1,0-5,0 auf 100,0], Klystieren [4,0-10,0 *ad clysm.*], Waschungen [20,0-40,0 auf 1 Pfund], Fomentationen [als Kälte machendes Mittel sind die Schmucker'schen Fomentationen bekannt: 1 Salmiak, 3 (roher) Salpeter, gröblich gepulvert mit einer Mischung von 6 Essig und 12-24 Wasser so oft als nöthig befeuchtet, oder Kochsalz und Salpeter zu gleichen Theilen zwischen feuchte Compressen gelegt], Salben [selten], Streupulver [mit adstringirenden und aromatischen Pflanzenpulvern].

Nur bei Verordnung von grösseren Quantitäten für den äusserlichen Gebrauch wird das billigere *Kali nitricum crudum*, roher Salpeter, verwendet.

1145. R_y
Kali nitr.
 [3] *Tartar. dep.*
Sacch. albi ana 0,6.
M. f. pulv. Disp. tal. dos. No. 12. D.
 S. 1-2stündlich ein Pulver mit Hafer-
 schleim zu nehmen. **Rust.**
1146. R_y
Kali nitr.
 [2] *Kali sulfurici*
Conchar. praepar. ana 10,0.
M. f. pulv. D. S. Zweistündlich $\frac{1}{2}$ Thee-
löffel voll.
Pulvis antacidus et temperans.
Unger.
1147. R_y
Kali nitr. 5,0
 [3] *Tart. dep. 30,0*
Magnes. carbon. 10,0
Sacch. 20,0.
E. pulv. D. S. 2-3 Mal täglich einen
Theelöffel. **Radius.**
1148. R_y
Kali nitr. 0,5
 [3] *Fol. Digital. pulv. 0,1*
Sacch. Lactis 0,5.
M. f. pulv. Disp. tal. dos. No. 10. D.
 S. 2stündlich 1 Pulver.
1149. R_y
Kali nitr. 4,0
 [2] *Stibii sulfurat. aur. 0,4*
Camph. 0,2
Opii pulv. 0,1.
M. f. pulv. Div. in 6 part. aeq. D. S.
 Täglich 3-4 Mal 1 Pulver. [Bei Ca-
 tarrhus chronicus] **Pr. Jahn**
1150. R_y
Kali nitr 0,3
 [2] *Acidi tartar.*
Natr. bicarb. ana 0,6
Magn. carb. 0,12.
M. f. pulv. D. tal. dos. No. 6. S. Mit
 Wasser während des Aufbrausens zu
 nehmen.
Pulvis aërophorus nitratus.
1151. R_y
Kali nitr. 10,0
 [2] *Natri bicarb. 25,0*
Elaeosacch. Citri (Gutt. 5) 15,0.
M. f. pulvis D. S. 4 Mal täglich einen
- Theelöffel mit einem Theelöffel voll
 Citronensaft zu nehmen.
1152. R_y
Kali nitr.
 [2] *Kali sulfuric. ana 15,0.*
 D.
Pulvis temperans s. antispasmodicus
Ph. mil. et Cod. med. Hamb.
1153. R_y
Kali nitr.
 [3] *Kali sulfuric. dep. ana 5,0*
Tart. dep. 20,0.
M. f. pulv. D. S. 2-3stündlich einen
 Theelöffel.
Pulvis antiphlogisticus Ph. paup.
1154. R_y
Kali nitr. 8,0
 [2] *solve in*
Aq. commun. 250,0
adde
Syr. commun. 30,0.
 D. S. Stündlich 1 Esslöffel.
Mixtura nitrosa Ph. mil.
1155. R_y
Kali nitr. 6,0
 [2] *Aq. commun. 150,0*
Syr. simpl. 30,0.
 D.
Mixtura nitrosa Form. magistr. in
usum paup. Berol.
1156. R_y
Kali nitr.
 [2] *Aq. Laurocerasi ana 7,5*
Syr. Cerasor 30,0
Aq. dest. 180,0.
 D.
Potio antiphlogistica Clinici.
1157. R_y
Kali nitr. 8,0
 [5] *Gummi Arab. 15,0*
Aq. Rubi Idaei 200,0
Syr. Rubi Idaei 30,0.
 M. D. S. 2stündlich 1 Esslöffel.
v. Gräfe.
1158. R_y
Kali nitr. 50
 [2] *Natr. sulfuric. 10,0*
Aq. font. 200,0
Syr. Rubi Idaei 25,0.
 M. D. S. 1-2stündlich einen Esslöffel.

1159. Ry
Kali nitr. 2,0
 [2] *solue in*
Aq. Foeniculi 50,0
Mucil. Gummi Mim.
Syr. Mannae ana 25,0
Extr. Hyoscyami 0,2.
M. D. S. Stündlich einen Theelöffel.
 [Bei entzündlichen Krankheiten im kindlichen Alter.]
1160. Ry
Infus. Fol. Digital. (e 1,5) 15,0
 [3] *in quo solue*
Kali nitr. 5,0
Syr. Rubi Idaei 50,0.
M. D. S. 2stündlich einen Esslöffel.
1161. Ry
Kali nitr. 8,0
 [3] *solue in*
Decoct. Rad. Graminis (e 15,0) 200,0
adde
Oxymell. simpl. 30,0.
M. D. S. Stündlich einen Esslöffel.
Schönlein.
1162. Ry
Kali nitr. 1,0
 [4] *solue in*
Infus. Rad. Liquir.
Decoct. Sem. Lini ana 50,0
Oxymell. simpl. 12,0.
M. D. S. Stündlich 1 Kinderlöffel. [Bei acuten entzündlichen Krankheiten von Kindern, im Alter von etwa 2 Jahren.]
Gölis.
1163. Ry
Tart. stib. 0,05
 [3] *Kali nitr.* 5,0
solue in
Dec. Alth. 150,0
Syr. Alth. 25,0.
D. S. Stündlich einen Esslöffel.
1164. Ry
Kali nitr. 5,0
 [3] *solue in*
Dec. Sem. Lini 200,0
Aq. Amygdal. amar. 10,0.
D. S. Stündlich einen Esslöffel. [Bei Gonorrhoe.]
1165. Ry
Camph. 1,0
 [4] *Gummi Mim.* 6,0
J. c.
Aq. Ceras. q. s.
Emuls. 150,0
- in qua solue*
Extr. Opii 0,1
Kali nitr. 6,0
adde
Syr. Sennae 25,0.
M. D. S. Stündlich einen Esslöffel. [Bei erethischer Gonorrhoe.]
1166. Ry
Kali nitr. 8,0
 [4] *Extr. Hyoscyami* 0,6
solue in
Emulsionis Papaveris (e 15,0) 250,0
adde
Aq. Laurocerasi 8,0
Syr. Amygdal. 30,0.
M. D. S. Den Tag über zu verbrauchen.
 [Bei Gonorrhoe.] **Baltz.**
1167. Ry
Aceti Scillae 25,0
 [3] *Kali carb. q. s.*
ad perfect. Saturationem 150,0
in qua solue
Kali nitr. 5,0
Syr. simpl. 25,0.
M. D. S. 2stündlich einen Esslöffel.
1168. Ry
Kali nitr. 6,0
 [3] *Acid. nitr.* 3,0
Dec. Hordei 300,0
Spir. Aeth. nitr. 6,0
Sacch. 25,0.
M. D. S. 2stündlich 2 Esslöffel. [Bei Hydrops als kräftiges Diureticum.]
Graves.
1169. Ry
Kali nitr. 1,0
 [5] *solue in*
Decoct. Hordei 120,0
Syr. Moror. 30,0.
D. S. Gurgelwasser. [Bei Angina scarlatinosa.] **Wendt.**
1170. Ry
Kali nitr. 5,0
 [2] *solue in*
Seri lact. 100,0
Oxymell. simpl. 20,0.
D. S. Lauwarm zum Klystier.
1171. Ry
Kali nitr. 10,0
 [3] *Natrii chlorati* 20,0
Pulv. Rhiz. Calami 30,0.
F. pulv. D. S. Zum Einstreuen.
 [Bei brandigen und faulen Geschwüren.]

†**Kali picro-nitricum.** *Kali picricum. Kali nitro-xanthicum. Kali carbazoticum.* Picrin-salpetersaures Kali. Kohlenstickstoff-Kali. [Gelbe, krystallinische Masse, von intensiv bitterem Geschmack; schwer löslich in kaltem, etwas leichter in warmem Wasser, unlöslich in Alkohol. — 1,0 3¼ Sgr.]

Innerlich: zu 0,2-0,6 2-3 Mal täglich, in Pillen [von Braconnot gegen Intermittens empfohlen; die Versuche von Wolff und Gouzée machen die Heilwirkung dieser Substanz gegen Wechselfieber sehr problematisch; ebenso zweifelhaft erscheint ihr Nutzen bei Krämpfen, Neuralgien u. s. w. — In neuerer Zeit wurde das *Kali picro-nitricum* als Anthelminthicum namentlich gegen Darm- und Muskel-Trichinen empfohlen, ohne jedoch sichere Dienste zu leisten. — Kürzlich auch gegen Bandwurm von Rulle hülfreich gefunden, zugleich mit Drasticis zu verabreichen, bei streng geregelter Diät. — Das Mittel bewirkt icterische Färbung der Haut, der Conjunctiva und des Harns und wird deshalb zur Production eines simulirten Icterus verwendet].

1172. R

Kali picro-nitr.[4] *Gutti**Saponis Jalapini ana 1,0*

ut f. pilul. No. 15. D. S. Abends und Morgens 5 Pillen zu nehmen. [Gegen Bandwurm.]

1173. R

Kali picro-nitrici 2,0[4] *Pulv. Tub. Jalap. 4,0**Extr. Liquir. q. s.*

ut f. pil. 30. *Consp. Lycopod. D. S.*
3 Mal täglich 5 Pillen [Gegen Trichiniasis.]

Friedreich.

†**Kali silicicum.** *Silicate de potasse, Liqueur de Cail-lour.* Kieselsaures Kali, Wasserglas. [Durch Schmelzen von kohlen-saurem Kali mit Quarz gewonnen; gallertartige, lösliche Masse, welche bei lang-samem Verdunsten eine glasartige, an der Luft unveränderliche Substanz bildet. Nach Ure übt dieses Präparat eine auflösende Wirkung auf harnsaure Verbindungen und ist deshalb mit Vortheil zur Resolution arthritischer Tophi zu verwenden.]

Innerlich: zu 0,5-1,0 2 Mal täglich in Lösung

Aeusserlich: als Zahnschmerzmittel [mittelt eines Pinsels in die Höhle der cariösen Zähne applicirt: Clostermeyer], auf die Haut aufgetragen [gegen Bienen- und Mosquitostiche, Filzläuse, bei Zoster (in Verbindung mit *Extr. Opii*): Küchenmeister; neuerlichst auch gegen Erysipelas empfohlen: Piazza]. In neuester Zeit ist Wasserglas mit Pappe auch als Verbandmittel in der Chirurgie — anstatt des Kleisters und Gypses — bei Fracturen, Luxationen, überhaupt zur Fixirung von Gliedmaassen benutzt worden (v. Dumreicher und Hofmohl).

†**Kali stibicum.** *Stibium oxydatum album. Antimonium diaphoreticum ablutum.* Antimonsaures Kali. [Unlöslich. — 5,0 1 Sgr.]

Innerlich: [ganz obsolet] zu 0,5-1,0 2-3 Mal täglich, in Pulvern oder Pillen.

*n***Kali subsulfurosum.** *Kali hyposulfurosum. Hypo-sulphis Potassae.* Unterschweifligsaures Kali. Kali-Hypo-sulphit. Von Polli gleich den übrigen Sulphiten und Hyposulphiten von Kali, Natron und Magnesia als gährungswidriges Mittel empfohlen. [Vergl. hauptsächlich *Magnesia sulfurosa*.]

Innerlich: etwa 5,0-10,0 *pro die*, in vertheilten Dosen. [Das Präparat ist leicht zersetzbar.]

Kali sulfuricum. *Kali sulfuricum depuratum. Kalium sulfuricum Ph. Austr. et Helv. Tartarus vitriolatus dep. Sulfas Potassae s. kalicus. Arcanum duplicatum. Sal polychrestum Glaseri.* Gereinigtes schwefelsaures Kali. *Kali-Sulfat.* [Nicht leicht löslich (1:10). — 10,0 *subt pulv.* $\frac{3}{4}$ Sgr.] *Cave:* Kalk-, Baryt-, Blei- und Quecksilberoxydul-Salze. [Nicht abgekürzt *Kal. sulf.* zu schreiben, weil dies auch *Kalium sulfuratum* heißen kann.]

Innerlich: zu 1,0-2,5 mehrmals täglich, [man sei mit der Dosis nicht zu freigebig, da Fälle vorliegen, in denen schon 8,0-12,0, auf einmal genommen, heftige, selbst tödtliche Vergiftungszufälle hervorriefen], in Pulvern, Pillen, Solutionen [3,0-10,0 auf 100,0].

1174. R̄

Kali sulfuric.

- [3] *Tart. dep. ana* 10,0
Magnes. carb. 5,0
Elaeosacch. Foenic. 3,0
Sacch. 10,0.

M. f. pulv. D. in vitro. S. 3stündlich
 1 Theelöffel.

G. A. Richter

1175. R̄

Kali sulfuric.

- [4] *Pulv. Rad. Rhei*
Elaeosacch. Calami ana 10,0.
M. f. pulv. D. 2 Mal täglich 1 Theelöffel.

1176. R̄

Kali sulfuric. 0,6

- [1] *Pulv. Tub. Jalap.* 2,0.
F. pulv. D. S. Auf 1 Mal zu nehmen.
 Lincke.

1177. R̄

Kali sulfuric. 12,0

- [2] *Rad. Rhei pulv.* 4,0.
F. pulv. D.
Pulvis Rhei compos. Ph. mil.

1178. R̄

Kali sulfuric. 10,0

- [2] *Rad. Rhei pulv.* 5,0

Ammon. chlorat. 2,5.*M. f. pulv. D.**Pulvis digestivus* der fr. Ph. SI.

1179. R̄

Kali sulfuric. 3,0

- [3] *Sapon. Jalapin.* 1,0
Extr. Aloës 0,5.

M. f. c. Mucilag. Gummi Mim. pilul. 50.
Consp. Lycop. D. S. 2 Mal täglich
 2-4 Pillen.

1180. R̄

Kali sulfuric. 15,0

- [3] *solue in*
Inf. Fol. Sennae (e 15,0) 200,0
adde
Syr. Rhamn. cathart. 25,0.

M. D. S. 2stündlich 1 Esslöffel. [Als
 Abführmittel bei entwöhnenden Frauen,
 bei Milchmetastasen.]

1181. R̄

Kali sulfuric. 25,0

- [3] *solue in*
Inf. Fol. Digitalis (e 2,0) 200,0
adde
Mell. despumati 25,0.

M. D. S. 2stündlich 1 Esslöffel. [Bei
 Phlegmasia alba dolens.]

Martin.

Kali sulfuricum acidum s. *Kali bisulfuricum.*

Kali sulfurosum. *Sulfis Potassae.* Schwefligsaures Kali. Kali-Sulfit. Gleich den übrigen schwefligsauren und unterschwefligsauren Salzen [vergl. besonders *Magnesia sulfurosa*, das am meisten angewandte Mittel dieser Kategorie] von Polli als gährungswidriges Mittel bei Infektionskrankheiten, namentlich Typhus, Intermitens, Pyämie, Scarlatina u. s. w. empfohlen.

Innerlich: etwa 5,0-10,0 *pro die* in vertheilten Dosen, am besten in Lösung ohne weitem Zusatz, oder in Pulvern mit Zucker.

Kali sulfurosum acidum. Saures schwefligsaures Kali. Gleich dem vorigen Mittel von Bernatzik und G. Brauu versucht.

Kali tartaricum. *Kali tartaricum neutrum. Kalium tartaricum Ph. Austr. et Helv. Tartarus tartarisatus. Tartras kalicus.* Weinstein-saures Kali. [Leicht löslich. — 10,0 1½ Sgr., *subt. pulc.* 2 Sgr.] *Cave:* Säuren und Metallsalze.

Innerlich: [wegen seines unangenehmen Geschmacks selten in Gebrauch und stets durch *Natrum tartaricum* zu ersetzen] zu 1,0-2,0, als Laxans in stärkeren Dosen, in Pulvern, Pillen, Solutionen.

Aeusserlich [selten]: zu Klystieren.

- | | |
|---|---|
| <p>1182. Ry
 <i>Sulf. praecipit.</i> 2,0
 [4] <i>Pulv. Rad. Rhei</i> 3,0
 <i>Flaved. Cort. Aurant.</i>
 <i>Magn. carb. ana</i> 5,0
 <i>Kali tartar.</i>
 <i>Elaeosacch. Foenic ana</i> 10,0.
 <i>M. f. pulv. D. S.</i> 3 Mal täglich einen Theelöffel.
 <i>Solamen Hypochondriacorum Kleinii.</i></p> | <p><i>Aq. commun.</i> 200,0
 <i>adde</i>
 <i>Syr. commun.</i> 10,0.
 <i>D. S.</i> 1-2stündlich 1-2 Esslöffel.
 <i>Mixtura e Kali tart. Ph. mil.</i></p> |
| <p>1183. Ry
 <i>Kali tartar.</i>
 [5] <i>Rad. Rhei</i>
 <i>Flaved. Cort. Aurant. ana</i> 10,0.
 <i>F. pulv. D. S.</i> Messerspitzenweise,
 <i>Pulvis Rhei tartarisatus s. Pulvis leniens s. Pulvis digestivus Kleinii.</i></p> | <p>1185. Ry
 <i>Kali tartar.</i> 6,0
 [2] <i>solve in</i>
 <i>Aq. Foenic.</i> 60,0
 <i>Vini stibiat.</i> 4,0
 <i>Syr. Mannae</i> 15,0.
 <i>M. D. S.</i> 2stündlich 1 Theelöffel. [Gelind eröffnendes Mittel für Kinder von 1-2 Jahren.] Osann.</p> |
| <p>1184. Ry
 <i>Kali tartar.</i> 15,0
 [3] <i>solve in</i></p> | <p>1186 Ry
 <i>Kali tartar.</i>
 [4] <i>Pulv. Fol. Sennae ana</i> 10,0
 <i>Syr. Sennae</i> 20,0.
 <i>M. f. electuarium D. S.</i> 3 Mal täglich 1 Theelöffel voll.</p> |

Kali tartaricum boraxatum s. *Tartar. boraxatus.*

† **Kalium.** Kaliummetall.

Von Einigen zur Production von Brandschorfen benutzt, z. B. bei vergifteten Bisswunden.

Kalium bromatum. *Kali hydrobromic. Hydrobromas Potassae. Potassii bromidum Ph. Brit. Bromuretum potassicum*).* Bromide of Potassium. Brom-Kalium. [Weisse, geruchlose, scharf salzig schmeckende Krystalle, leicht in Wasser, schwer in Alkohol löslich. — 10,0 3½ Sgr.] *Cave:* Mineralsäuren, Chlor.

Innerlich: zu 0,3-0,5-1,0-2,0 3-4 Mal täglich, in Pulvern, Pillen oder Solutionen. [Die Engländer geben seit lange sehr grosse Dosen des Mittels, selbst 2,0-4,0 *pro dosi* und 6,0-12,0 *pro die*, ohne Schaden hiervon zu beobachten. Auch in Deutschland gewöhnt man sich in neuester Zeit an die grossen Dosen, indem man beobachtete, dass in Krampfzuständen, namentlich Epilepsie, wo kleine Dosen versagen, oft grosse Dosen (1,0-2,0 und noch mehr) von Erfolg begleitet sind. Wenn sehr grosse Dosen des *Kal. brom.* (6,0-12,0 *pro die*) erforderlich sind, empfehlen **Brown-Séquard** und **Vulpian** zur Verhinderung gewisser Intoxicationserscheinungen — grosse Schwäche, Incontinentia urinae et faecium etc.

*) Aus Versehen wird zuweilen *Kali bromicum* verschrieben, ein Präparat, welches bisher in der Medicin noch nicht verwendet ist und nicht aus Bromkalium, sondern aus bromsaurem Kali besteht.

— kleine Dosen Strychnin oder Arsenik dem Mittel zuzusetzen. Der in früherer Zeit übliche Gebrauch des Mittels als Antisyphiliticum, gleich dem Jodkalium, ist gegenwärtig ganz aufgegeben worden, indem man sich von der Nutzlosigkeit desselben gegen Syphilis überzeugt hat. Dagegen gilt das Bromkalium jetzt mit dem vollkommensten Rechte als eins der vorzüglichsten Nervina und besonders als ein unübertreffliches Antispasmodicum, und ist namentlich das beliebteste Mittel gegen Epilepsie (durch **Romberg's** Verdienst in Deutschland eingebürgert), gegen Chorea, auch bei *Eclampsia parturientium* empfohlen (stündlich 1,0: **Shoyer**), bei Tetanus (wo indess die Wirksamkeit weniger sicher ist), Keuchhusten (**Beaufort**). Das Mittel wirkt ferner als vorzügliches Hypnoticum bei nervöser Schlaflosigkeit; hier sind oft schon kleine Dosen (0,3-0,5 dreimal täglich) von Erfolg; in entgegengesetztem Falle sind grössere Dosen zu reichen. Der Schlaf tritt nicht als unmittelbare Folge des Mittels ein, wie nach Morphinum, sondern scheint nur durch Verminderung der nervösen Erregbarkeit bewirkt zu werden. Auch als Antiaphrodisiacum ist das Bromkalium bewährt, indem es den Geschlechtstrieb, namentlich beim Manne, herabsetzt; deshalb angewandt bei Chorda venerea, Satyriasis, zu reichlichen Pollutionen etc. Gegen Diphtherie wurde das Mittel gleichfalls empfohlen, ohne sich bewährt zu haben. Auch als Anæstheticum für die Schleimhäute, namentlich zur Herabsetzung der Sensibilität an den Schleimhäuten des Schlundes und der Conjunctiva (**Riemslogh**) ist es benutzt worden, scheint in dieser Beziehung meist nicht von wesentlicher Bedeutung zu sein. — In Frankreich wird ein Syrup aus Bromkalium *Sirup de Hensy Mure au bromure de potassium*, welcher in einem Esslöffel ca. 2,0 *Kal. bromat.* enthält, viel gebraucht.]

Aeusserlich: zu Waschungen und Fomentationen [5,0-20,0 auf 100,0 *Aqua* oder *Glycerin*. — Bei Spasmus des Sphincter ani empfiehlt **Ferraud** Compressen von 1 Bromkalium auf 5 *Glycerin*], zu Klystieren [gleichfalls von **Ferraud** bei Tenesmus empfohlen; etwa 5,0 auf 100,0], zu Injectionen [in die Vagina und Urethra zu versuchen], zu Mund- und Gurgelwässern [5,0 auf 100,0], zu Inhalationen in zerstäubter Lösung [vergl. S. 106 und 199], zum Touchiren des Pharynx und Larynx [zur Herabsetzung der Sensibilität, am besten mit *Glycerin*, 5,0 zu 25,0: **Waldenburg**], zu Augengewässern [0,5-1,0 auf 25,0], zu Salben [1,0-2,0 auf 10,0 Fett].

1187. Ry

Kalii bromati[3] *Sacch. alb. ana* 0,5.*M. f. pulv. Disp. tal. dos. No. 12. D. S.*

3 Mal täglich 1 Pulver in Wasser oder Baldrianthee gelöst zu nehmen.

[Bei Epilepsie, nervöser Schlaflosigkeit u. a., später mit der Dosis auf das Doppelte und mehr zu steigen.]

1188. Ry

Kalii bromati[3] *Kalii chlorati ana* 0,3*Sacch. lactis* 0,5.*M. f. pulv. Disp. tal. dos. No. 20. D.*

S. Wie das vorige.

1189. Ry

Kalii bromati 6,0[3] *Pulv. Rad. Gentian.**Extr. Gentian ana* 3,0.*M. f. pil. 100. Consp. Lycop. D. S.*
3 Mal täglich 5-15 Pillen.

1190. Ry

Kalii bromati 3,0[4] *Ammonii bromati* 1,0*Kalii chlorati* 4,0*Succ. Liquir. dep. q. s.**ut f. pil. No. 100. D. S.* 3 Mal täglich
5-10 Pillen zu nehmen.

1191. Ry

Kalii bromati 1,5[3] *Kalii jodati* 1,0*Extr. Gentian.* 3,0*Syr. Artemisiae q. s.**ut f. pil. 50. Consp. Lycopod. D. S.*
3 Mal täglich 1-3 Stück vor der
Mahlzeit zu nehmen.**Lunier's Médication bromojodurée.**

[L hat in mehreren Fällen von

Geisteskrankheit, Mania chronica und allgemeiner Lähmung, ferner bei Melancholischen, welche im Genesungsstadium in Hypochondrie verfielen und an vollständiger Appetitlosigkeit und Entkräftung litten, diese Brom-Jod-Pillen mit sichtlichen Erfolgen angewendet; ebenso bei Retentio mensium und deren Folgekrankheiten.]

1192. R₂
Kalii bromati 2,0
 [3] *Glandul. Lupuli* 4,0
Extr. Gentian. 2,0.
F. pil. 60. Consp. Lycop. D. S. Abends 3-4 Pillen zu nehmen. [Bei Chorda venerea.]

Henschel.

1193. R₂
Kalii bromati 30,0
 [C] *Kalii jodati* 4,0
Ammonii bromati 7,5
Kali bicarbon. 2,5
Infus. Colombo 180,0.
M. D. S. 1 Theelöffel voll vor jeder der drei Mahlzeiten und 1 Theelöffel vor dem Schlafengehen mit etwas Wasser zu nehmen. [Gegen Epilepsie.]

Brown-Séquard.

1194. R₂
Kalii bromati
 [3] *Ammonii bromati ana* 10,0
Aq. dest. 50,0.
M. D. S. Stündlich 1 Theelöffel. [Soll ausgezeichnet bei Delirium tremens wirken.]

Withe.

1195. R₂
Kalii bromati
 [4] *Kalii chlorati ana* 10,0
Aq. dest.
Syr. simpl. ana 100,0.
M. D. S. 3 Mal täglich 1 Esslöffel.

1196. R₂
Kalii bromati 12,0
 [3] *Aq. dest.* 150,0
Tinct. Strychn. 1,0
Syr. Aurant. Cort. 25,0.
M. D. S. 3 Mal täglich 2 Esslöffel voll. [Bei Epilepsie, nachdem kleinere Dosen des Mittels erfolglos gewesen.]

1197. R₂
Kalii bromati 1,5
 [4] *Tinct. Aconiti* 1,25
Syr. Balsam. Tolut. 100,0.

M. D. S. Kindern von 1 Jahr 1 Kaffeelöffel, von 2 Jahren 2, von 7 Jahren 5, von 14 Jahren 8 Kaffeelöffel voll mehrere Male täglich zu reichen. [Bei Keuchhusten.]

Beaufort.

1198. R₂
Kalii bromati 10,0
 [3] *solve in*
Aq. dest. 150,0
adde
Syr. Sennae 25,0.
M. D. S. 3 Mal täglich 1 Esslöffel.
 [Mehrere Tage vor einer Schlund-Operation zu verbrauchen.]

1199. R₂
Kalii bromati 4,0
 [3] *Ungt. cerei* 15,0.
M. f. unguentum. D. S. Zum Einreiben.
 [Bei bösamartigem Kopfgrind.]

Prieger.

1200. R₂
Kalii bromati 10,0
solve in
 [5] *Spir. dil.*
Aq. dest. ana 20,0
Sapon. medicat. 20,0
solve in
Spir. dil. 40,0
Solutionibus mixtis adde
Tinct. Conii 20,0.
Filtra D. S. Zur Einreibung.
Colignon's Kropfbalsam.

1201. R₂
Kalii bromati 1,5
Aq. dest. 50,0.
D. S. Augewasser. [Bei Photophobie.]

Rossignol.

1202. R₂
Kalii bromati 10,0
 [4] *Glycerini* 50,0.
M. D. S. Zum Touchiren des Pharynx und Larynx; zum Tränken von Compressen äusserlich aufzulegen; zu Einreibungen; mit Wasser verdünnt zu Klystieren und Injectionen.

1203. R₂
Kalii bromati 10,0
 [7] *Morph. acet.* 0,5
Glycerini 50,0
Chloroformii 10,0.
M. D. S. Wohl umzuschütteln. Als lokales Anästheticum, zum Touchiren des Pharynx und Larynx.

†**Kalium chloratum.** *Kali hydrochloricum s. muriaticum. Chloruretum potassicum. Hydrochloras Potassae. Salzsäures Kali. Chlor-Kalium.* [Leicht löslich in Wasser. — 30,0 etwa 1½ Sgr. — Im Recept auszuschreiben, nicht abzukürzen, da *Kal. chlor.* auch *Kali chloricum* gelesen werden kann!]

Innerlich: zu 1,0-5,0 mehrmals täglich, in Pulvern oder Solution. [*Kalium chloratum* besitzt die Wirkungen der Kalisalze, wie es scheint, in hohem Grade und verdient mehr, als es bisher, da man es irrtümlich dem *Chlornatrium* an die Seite stellte, geschah, benutzt zu werden; namentlich ist es als Antifebrile zu versuchen. Auch könnte es möglicherweise als sehr billiges Surrogat des Bromkalium dienen; wenigstens hat es sich in einer Anzahl Fällen von Epilepsie (**Sander**), gleich diesem, wirksam gezeigt. Früher wurde das Mittel als *Sal febrifugum Sylevii* auch gegen Intermittens benutzt.]

1204. Ry
Kalii chlorat. 1,0
 [4] *Kali bicarbon.*
Elaeosacch. Calami ana 0,5.
M. f. pulv. Disp. tal. dos. No. 20. D. S.
 3 Mal täglich 1 Pulver.

1205. Ry
Kalii chlorati
 [5] *Rad. Artemisiae pulv.*
Rad. Valerianae pulv.
Elaeos. Menthae pip. ana 25,0.
M. f. pulv. D. S. 3 Mal täglich 1 Theelöffel voll.
 [Bei Epilepsie.]

1206. Ry
Kalii chlorat. 25,0
 [3] *solve in*
Inf. Rad. Valerianae 200,0
Syr. simpl. 50,0.
M. D. S. 4 Mal täglich 1 Esslöffel.

1207. Ry
Kalii chlorati
 [3] *Kali nitr. ana* 5,0
Aq. fontan. 150,0
Syr. Rub. Idaei 25,0.
M. D. S. 2stündlich 1 Esslöffel.
 [Bei fieberhaften Krankheiten.]

†**Kalium cyanatum** *s. cyanogenatum. Kali Hydrocyanicum. Hydrocyanas Potassae. Cyanuretum Kalii. Cyan-Kalium. Blausäures Kali.* [Entweder weisses, krystallinisches, leicht zerfliessliches Pulver, oder (im geschmolzenen Zustande) amorphe, luftbeständige Masse, in trockener Luft geruchlos, in feuchter stark nach Blausäure riechend, in Wasser leicht, in Weingeist schwer löslich.] *Cave:* Säuren, langes Aufbewahren der Lösung [da bald Umwandlung in Ameisensäures Kali stattfindet. — 5,0 1 Sgr.]

Innerlich: [mit grösster Vorsicht!! Das Ministerial-Rescript vom 10. März 1844 bestimmt, dass jede Verordnung des *Kalium cyanatum* mit einem (!) zu begleiten sei, zum Zeichen, dass man dieses Medicament und nicht das *Kalium-Ferro cyanatum* meine] zu 0,01-0,02-0,03 (!) 2-3 Mal täglich, in Solution [vorzugsweise bei Gastralgie, krampfhaftem Asthma].

Ausserlich: in schwacher Solution [0,05-0,3 auf 25,0 Wasser], mittelst Charpie oder Compressen aufgelegt [bei verschiedenen Neuralgien], als Waschwasser [0,4 auf 100,0 *Emuls. Amygdal. amar.* gegen juckende Hautausschläge: **Louis**] oder in Salben [0,1-0,3 auf 25,0 Fett]. Auch bei der äusseren Anwendung ist Vorsicht dringend anzurathen.

1208. Ry
Kalii cyanati (!) 0,05
 [1] *solve in*
Aq. dest. 5,0.
D. S. 3 Mal täglich 15-30 Tropfen.

Oesterlen.

Kalium ferro-cyanatum. *Ferro-Kalium cyanatum flavum. Kalium ferro-cyanatum flavum. Kali ferrugin. hydrocyanicum. Kali ferroso-hydrocyanicum. Kali ferro-borussicum. Kali borussicum. Kali zooticum. Potassae Prussiae flava Ph. Brit. Cyanuretum Kalii et Ferri cum Aqua. Yellow Prussate of Potash. Ferrocyanide of Potassium. Blausaures Eisen-Kali. Cyan-Eisen-Kalium. Gelbes Blutlaugensalz.* [Leicht in Wasser löslich. — 10,0 etwa 1½ Sgr.] *Cave:* Metallsalze.

Innerlich: zu 0,5-1,0 in wässriger Lösung [wesentlicher Bestandtheil des in neuester Zeit pomphaft angepriesenen **Baud'schen** Fiebermittels].

Diese nicht giftige Substanz ist nicht zu verwechseln mit dem äusserst heftig wirkenden Cyan-Kalium, wozu der Name *Kali borussicum* leicht führen könnte.

Kalium jodatum. *Kali hydrojodicum. Joduretum kalicum. Potassii jodidum Ph. Brit. Hydrojodas kalicus. Jodide of Potassium. Jodure de potasse. Jod-Kalium. Jodwasserstoffsäures Kali. Kalium-Jodid.* [Sehr leicht in Wasser löslich, etwas schwerer in Spiritus. — 10,0 5½ Sgr.] *Cave:* Chlor- und Bromverbindungen, Säuren, Metallsalze; Verordnung in Salbenform geschehe nur auf kurze Zeit und mit möglichst wenig der Zersetzung unterworfenen Fetten [Paraffin, vegetabilische Fette].

Innerlich: zu 0,1-0,5 mehrmals täglich [von einigen, namentlich englischen Aerzten in viel grösserer Gabe: bis zu 10,0-15,0 täglich gegeben, was vielleicht in der so häufig vorkommenden Verfälschung des englischen *Kalium jodatum* mit Chlor-Kalium und kohlen-saurem Natron seinen Grund hat. Erst kürzlich wieder wurde von **H. Cooper** Jodkalium 0,6-2,0 *pro dosi*, 3 Mal täglich, gegen chronische constitutionelle Krankheiten, namentlich Syphilis und Rheumatismus, empfohlen, und sollen hierdurch niemals Vergiftungssymptome beobachtet worden sein. Die letzteren sollen bei kleineren Dosen mehr hervortreten (?), weshalb er diese bei katarthalschen Affectionen indicirt hält], in Pillen oder Solution [letztere gern in der Verbindung mit Jod; vergl. dieses], selten in Pulvern [nur in Verbindung mit schwer löslichen oder unlöslichen Substanzen] und in Trochisken. **Dorvault** empfiehlt *Biscuits jodurés* [10,0 *Kali jodati* zu 1000,0 Biscuitteig zugesetzt, 100 Biscuits daraus geformt und gebacken. 1-10 Stück täglich als Antisero-phulosum und Antisyphiliticum].

Aeusserlich: zu Mund- und Gurgelwässern [1,0-3,0 auf 100,0], Inhalationen in zerstäubter Lösung [vergl. S. 106], zu subcutanen und parenchymatösen Injectionen [**Thierfelder:** gegen Periostitis syphilitica und Dolores osteocopi. Dosis vergl. S. 88; **Jacobowitz:** Injectionen in hypertrophische Tonsillen, vergl. S. 89], Klystieren [1,0-5,0 zu 100,0-200,0], Einreibungen [5,0-15,0 auf 100,0 *Spir. dil.* oder *Spir. Lavand.*, mehrmals täglich auf verhärtete Drüsen einzureiben — dürfte zweckmässiger sein, als das häufig angewendete *Unguent. Kalii jodat.*, in welchem die sich bildende Fettsäure oft zersetzend auf das Jodkalium einwirkt], Waschungen [1,0-2,0 auf 100,0], Bädern [50,0-120,0 zum allgemeinen, 5,0-10,0 auf 1 Liter Wasser zum örtlichen Bade], Augewässern [0,03-0,1 auf 10,0], Salben [1-3 auf 25 Fett; vgl. oben], Augensalben [0,3-1,0 auf 10,0], Pflastern [1-5 auf 25].

1209. R

Kalii jodati 0,2

- [4] *Past. Cacao pulv.* 0,5.
M. f. pulvis. Disp. tal. doses No. 10.
D. S. 3 Mal täglich 1 Pulver

1210. R

Kalii jodati

- [3] *Hydrarg. chlorat. mit. ana* 0,06
Sacchar. lactis 0,3.
M. f. putv. Disp. tal. dos. No. 12. D. S.
 Stündlich 1 Pulver.
 [Bei Croup und Diphtheritis, nachdem durch ein Emeticum Erbrechen erzielt ist.]

Oppolzer.

1211. R

Kalii jodati

- [6] *Pulv. Fol. Jugland. ana* 3,0
Extr. Fol. Jugland. 6,0.
M. f. pil. 100. Consp. Lycopod. D. S.
 3 Mal täglich 5-10 Pillen zu nehmen.
 [Bei Scrophulosis.]

1212. R

Kalii jodati 5,0

- [5] *Sem. Cacao ab Oleo liberat.* 7,5
Tragacanth. q. s.
ut f. pil. No. 100. D. S. 3 Mal täglich
 3 Pillen zu nehmen.

1213. R

Kalii jodati 5,0

- [4] *solue in*
Aq. dest. 150,0.
D. S. 3-4 Mal täglich einen halben bis
 ganzen Esslöffel.
 [Bei Syphilis.]

1214. R

Kalii jodati 5,0

- [4] *solue in*
Aq. dest. 25,0.
D. S. Täglich 3 Mal 10 Tropfen zu
 nehmen, allmählig bis auf 40 Tropfen
 zu steigen.

1215. R

Kalii jodati 15,0

- [9] *Aq. dest.* 250,0
Aq. Aurant. Flor. 5,0
Tinctur Digital. 10,0
Syr. Rhoead. 50,0.
M. D. S. Morgens und Abends 1 Ess-
 löffel voll. [Bei Hypertrophia cordis.]
Solution atrophique.
Magendie.

1216. R

Kalii jodati 4,0. (Bei jeder neuen
Verordnung um 1,0, bis zu 8,0
steigend.)

- [3-4] *Aq. dest.* 120,0
Aq. Ment. pip. 60,0.
D. S. 3stündlich 1 Esslöffel.
 [Bei extraperitonealen Exsudaten in
 Puerperio.]

Schöller.

1217. R

Kalii jodati 4,0-8,0

- Aq. dest.* 200,0
Tinct. Colchici 15,0.
M. D. S. 3 Mal täglich 1 Esslöffel.
 [Bei chronischem Rheumatismus.]

Lebert.

1218. R

Kalii jodati 3,0

- [3] *solue in*
Aq. Selteranae
 [seu *Aq. carbonic.*] 250,0.
D. S. Den Tag über zu verbrauchen.
Aqua selterana jodata

1219. R

Kalii jodati 2,0

- [8] *Syr. Aurant. Cort.* 200,0.
D. S. Esslöffelweise.
Syr. Kalii jodati.
Ricord.

1220. R

Kalii jodati 2,5

- [8] *Ferr. sulfuric.* 2,0
Morph. acet. 0,06
solue in
Aq. Cinnamom. 30,0
Syr. Aurant. Flor. 200,0.
M. D. S. 2-3 Mal täglich 1 Esslöffel.
Lebert's Jodeisen-Syrup.

1221. R

Kalii jodati 5,0

- solue in*
 [4] *Infus. Rad. Senegae* (1,0) 55,0
Extr. Opii 0,1
Spir. dil.
Syr. simpl. ana 20,0.
M. D. S. Mehrmals täglich 1 Thee- bis
 Esslöffel.

[Dieses Recept entspricht im Wesentlichen dem **Aubrée'schen** Geheimmittel gegen Asthma. — Nach einer anderen Analyse von **Schröppel** besteht dasselbe aus *Kalii jodati* 4,5, *Lactucarii gall.* 0,5, *Spirit. Aeth. chlor.* 1,0, *Aq. dest.* 120,0, *Syr. simpl.* 24,0.]

1222. R
Kalii jodati 4,0
 [6] *Sem. Coffeae pulv.* 2,0
Sacchari 122,0
Tragacanthae in Infus. Coffeae
solut. q. s.
 ut *f. l. a. trochisci* No. 300. D. S.
 10 Stück mehrere Male täglich.
Ph. Piemont
1223. R
Kalii jodati 5,0
 [4] *solve in*
Inf. Fol. Salviae 200,0.
 D. S. Gurgelwasser. [Bei Angina syphi-
 litica.]
1224. R
Kalii jodati 0,2
 [2] *solve in*
Aq. Rosar. 50,0.
 D. S. Augenwasser. [Bei scrophulöser
 Ophthalmie.]
1225. R
Kalii jodati 2,0
 [3] *solve in*
Decoct. Fol. Jugland. 200,0
 D. S. Zum Umschlag auf die Augen.
 [Bei scrophulöser Ophthalmie und
 Photophobie, auch als Verbandwasser bei
 scrophulösen Geschwüren.]
1226. R
Kalii jodati 5,0
 [4] *solve in paux. Aq. dest.*
adde
Ungt. Hydrarg. cinerei 25,0
F. unguent. D. S. Zum Einreiben.
 [Bei Croup]
1227. R
Kalii jodat. 5,0
 [4] *Sapon. med.* 3,0
Aq. Rosae
Ol. Cojepati ana 10,0
Unguent. rosat. 30,0.
M. f. unguentum. D. S. 3 Mal täglich
 einzureiben. [Bei Geschwülsten.]
Riecke.
1228. R
Kalii jodati 5,0
 [5] *solve in paux. Aq. dest.*
adde
Opü puri 0,5
Ol. Oliv. 25,0
Ol. Cacao leni calore liquefacti et
semirefrigerati 10,0.
M. f. unguent. D. S. Zum Einreiben.
 [Bei scrophul. Geschwülsten, Kropf.]
1229. R
Kalii jodati 0,25
 [1] *solve in paux. Aq. dest.*
adde
Ungt. cerei 4,0-6,0.
 D. S. Täglich eine Erbse gross einzu-
 reiben. [Bei Chalazion.] **Fischer.**
1230. R
Kalii jodati 0,3
 [2] *Empl. Lithargyri simpl.* 4,0.
F. l. a. emplastr. D.
 [Bei Ueberbeinen.] **Ascherson.**
1231. R
Kalii jodati 1,0
 [3] *Empl. Ammoniac.*
Empl. foetidi
Empl. Lithargyri ana 6,0
M. f. l. a. emplastrum. D.
 [Bei Hodengeschwulst auf das Scro-
 tum zu legen.] **Hacker.**
1232. R
Kalii jodati 1,0
 [2] *Emplastr. Conii*
Emplastri adhaesiv. ana 5,0.
M. f. emplastr. D. S. Aeusserlich auf-
 zulegen.
 [Bei chronischer Gelenkentzündung.]
Guéneau de Mussy.
1233. R
Kalii jodati 1,0-2,0
 [2] *Tinct. Jodi* 10,0-20,0
Aq. dest. 200,0-250,0.
M. D. S. Zum Klystier. [Bei Dysenterie.]
Delieux.

***Kalium sulfurato-stibiatum.** *Hepar Antimonii.*
 Spiessglanz-Schwefelleber. [30,0 gross. pulv. 3½ Sgr.]

Innerlich und äusserlich: wie *Calcium sulfurato-stibiat.* [vgl. dieses].

Kalium sulfuratum. *Hepar sulfuris kalinum. Poly-*
sulfuretum potassicum. Potassa sulfurata **Ph Brit.** *Liver of sul-*
fur. Foie de soufre alkaline. Schwefelkalium. Schwefelleber.
 [An der Luft zerfliesslich, und dabei Schwefelwasserstoffgas entwickelnd — 5,0
 1½ Sgr.] *Cave:* Säuren, saure Salze, Metallsalze, Tannin, Chlor und Jod;

man verordne immer nur auf kurze Zeit; beim Einnehmen lasse man sich der Porzellanlöffel bedienen. [Man verschreibe nicht abgekürzt *Kal. sulf.*, da dies auch *Kali sulfuricum* bedeuten kann.]

Innerlich: zu 0,05-0,2-0,4 2-3 Mal täglich, in Pillen, Bissen, Solutionen. [Die meisten früherhin empfohlenen Geschmackscorrigentia entsprechen theils diesem Zwecke gar nicht, theils wirken sie durch ihre Säuren zersetzend ein, so z. B. der *Syrupus Croci*, *Succus Liquir.* u. a. — Am besten verordnet man ohne alle Zusätze die Auflösung in Wasser oder Pillen, denen man als Constituens Bolus beisetzt, und lässt jedesmal nach dem Einnehmen einen Löffel voll eines aromatischen Wassers (z. B. *Aq. Cinnam. spirit.*) zur Beseitigung des fatalen Geschmackes nehmen.]

Aeusserlich: zu Waschungen [5,0-15,0 auf 100,0], zu Bädern [hier lieber das folgende, viel wohlfeilere Mittel], Linimenten, Salben [1 auf 5-10 Seife oder Fett].

1234. R̄
Kalii sulfurati
 [2] *Argillae ana* 2,0.
F. c. Aq. dest. q. s. pilul. 30. Consp. Cinnam. D. in vitro. S. Zweistündlich 2 Pillen.

1235. R̄
Kalii sulfurati 1,0
 [3] *Balsami Peruvian.*
Sapon. medic. ana 5,0
Flor. Malvae pulv. q. s.
ut f. pil. No. 30. Consp. Cinnam. D. S.
 2-10 Stück täglich zu nehmen und
 1 Tasse aromatischen Thee nachzutrinken. [Bei Hautkrankheiten.]

Bouchardat

1236. R̄
Kalii sulfurati 0,3
 [2] *Ferri pulv.* 0,15
Extr. Quassiae 0,6
Carb. Spong. q. s.
ut f. Bolus. Consp. pulv. Rhiz. Iridis flor. Disp. tal. dos. No. 2. D. in vitro. S. Früh und Abends 1 Stück.
 [Bei Drüsenverhärtungen.]

Kortüm.

1237. R̄
Kalii sulfurati 0,6-1,5
 [2] *solvo in*
Aq. dest. 25,0
adde
Syr. simpl. 50,0.
D. S. Zweistündlich 1 Theelöffel voll.
 [Bei Croup.]

Chaussier.

Kalium sulfuratum ad balneum. *Hepar sulfuris*

pro balneo. [100,0 3¼ Sgr.]

Nur äusserlich: zu Waschungen [bei Aermeren], zu Bädern [50,0-150,0 *pro balneo* oder 30,0-60,0 und dann 15,0-30,0 *Acid. sulfuric. crud.* hinzugesetzt; um die reizende Einwirkung des Schwefelbades zu mildern, setzt man in französischen Hospitälern etwas *Colla animalis* (¼-½ Pfund) hinzu (*Boules de Nancy* — vergl. *Boules de Barèges* unter *Calcium sulfuratum*).

1238. R̄
Kalii sulfurati ad balneum 80,0
 [3] *solvo in*
Aq. dest. 250,0
adde
Acid. sulfuric. dilut. 2,0.
M. D. S. Zur Waschung und Einreibung.
 [Bei Scabies.]

Dupuytren.

Diese, so wie alle anderen Applicationsweisen des Schwefel-Kalium gegen Krätze, sind durch die neueren, viel sicherer und schneller wirkenden Metho-

den vollkommen verdrängt worden und deshalb kaum noch der Erwähnung werth.

1239. R̄
Kalii sulfurati ad balneum 50,0
 [14] *Sapon. venet.* 200,0
Ol. Papav. 400,0
Ol. Thymi 2,0.
M. F. Linimentum.
 [Bei Scabies.]

Jadelot.

1240. R
Kalii sulfurati ad balneum 5,0
 [3] *Spir.*
Aq. fontan. ana 40,0
Aq. Laurocerasi 5,0.
 M. D. S. Zum Waschen.
 [Gegen Sycosis.]

Zeissl.

1241. R
Kalii sulfurati ad balneum 15,0
 [4] *solue in*
Aq. dest. q. s.
adde
Sapon. Hispan. pulv. 60,0.
F. massa ex qua formentur ope preli globuli No. 2. D. S. Schwefelseife.
 [Zum Waschen bei chronischen Exanthenen.]

Kamala. *Glandulae Rottlerae.* [Ein ziegelrothes, leichtes Pulver, gewonnen beim Zerstoßen der Kapseln der *Rottlera tinctoria*, eines zu den Euphorbiaceen gehörigen, in Indien heimischen Baumes. Enthält ein schwaches ätherisches Oel und ein gelbes Harz: Rotlerin. — 1,0 1½ Sgr.]

Innerlich [zuerst von einigen anglo-indischen Aerzten als Bandwurmmittel empfohlen, namentlich deshalb, weil es gleichzeitig drastisch abführend wirkt; die Versuche in Deutschland haben die entschiedene Wirksamkeit des Mittels dargethan]: als Pulver zu 8,0-12,0 mit Wasser angerieben, in alkoholischem oder ätherischem Auszuge.

†**Kerosolen.** Eines der vielen Destillations-Producte aus dem Steinkohlentheer, welches sehr flüchtiger Natur ist und von Simpson als örtliches Anästheticum empfohlen wurde, ohne sich jedoch für diesen Zweck besser als der Aether zu bewähren.

Kino. *Gummi Kino.* [Erhärteter Saft von *Pterocarpus Marsupicum*, enthält hauptsächlich Gerbsäure und rothen Farbstoff; in Wasser und Alkohol fast gänzlich löslich. — 10 *subt. pulv.* 2 Sgr.]

Innerlich: zu 0,3-1,5 mehrmals täglich in Pulvern, Pillen, Bissen, Lösungen, im Decoct [5,0-10,0 auf 100,0].

Aeusserlich: in Pulver als Stypticum, zu Zahn- und Streupulvern, zu Zahnlatwergen, das Decoct zu Umschlägen, Einspritzungen, Pinselsäften, Mund- und Gurgelwässern, die alkoholische Lösung zu Zahntincturen.

Koussinum. Koussin. [Von Wittstein und Bedall aus den *Flores Kosso* dargestellt, zu 3 pCt. in diesen enthalten.]

Innerlich: 1,2 in Oblate zu nehmen, soll gegen Taenia wirksam sein. [Erregt leicht Erbrechen; deshalb soll es bei empfindlichen Personen in mehreren kleinen Gaben mit *Elaeosavch. Ment. pip.* gegeben werden. — Das Mittel ist bisher nicht genügend geprüft worden; wenigstens fehlen seit der ersten Publication noch nähere Angaben und Bestätigungen.]

Kusso s. *Flores Kosso.*

Kreosotum. *Creosotum. Creasotum.* Kreosot. [Farblose, das Licht in eigenthümlicher Weise brechende, höchst penetrant riechende Flüssigkeit, von scharf brennendem Geschmack, Haut und Schleimhaut anätzend, spec. Gew. 1,03-1,05; in kaltem Wasser schwer (1:5), in heissem Wasser, Alkohol, Aether, Essigsäure, fetten Oelen, ätzenden Alkalien leicht löslich. — 5,0 1½ Sgr.]

Innerlich: zu 0,01-0,03-0,05 [ad 0,05 *pro dosi*, ad 0,2 *pro die!*] 2-3 Mal täglich, allmählig steigend [und oft bis zu viel höheren Dosen gegeben], in Pillen [gelatinirten], Solution [meist mit schleimigen Vehikeln; vergl. *Aqua Kreosoti*], Gallertkapseln [unzweckmässig]. [Péchohier empfahl in neuester

Zeit Kreosot gegen Typhus und zwar innerlich täglich 0,15 (Solution in Wasser und Syrup) und 2 Mal täglich 0,12-0,25 *per anum*].

Aeusserlich: in Substanz [als Zahnschmerzmittel mittelst Watte auf den schmerzhaften Zahn gebracht], in wässriger oder spirituöser Lösung als Mundwasser [*Aq. Kreosoti* mit *Aq. dest. ana*] oder Zahntinctur [0,5 bis 1,0 auf 10,0], Zahnpillen [0,25-0,3 auf 5,0], Zahnlatwergen, im Pinselsaft [0,25-0,5 auf 25,0 *Mel*], zu Injectionen [meistens die *Aqua Kreosoti*], zu Umschlägen, Verbandwässern [Landerer empfiehlt, da sich das Kreosot leicht aus dem Wasser ausscheidet und dann beim Verbands heftige Schmerzen verursacht, statt der wässrigen Solution des Kreosots Emulsionen desselben mit *Gummi Arabicum* anzuwenden], Einreibungen [0,25-0,75 auf 25,0 Wasser], in Linimenten [0,25-0,5 auf 10,0-15,0 *Oel*], in Seifen, Salben [0,5-1,5 auf 25,0], zu Inhalationen [aus Inhalationsröhrchen oder aus einem mit wenigen Tropfen Kreosot befeuchteten Weinglase, oder endlich in zerstäubter Form; s. *Aqua Kreosoti*], Klystieren [in schleimigem Vehikel (s. oben): **Pécholier**].

1242. R̄

Kreosoti 1,0

[3] *Micæ panis et Mucil. Gummi q. s. ut f. pil. No. 40. Consp. Pulv. Cort. Cinnam. D. S.* 1-2 Pillen nach jeder Mahlzeit.

[Gegen Gastralgie durch abnorme Säurebildung im Magen in Folge von Pilzen. **Budd.**

1243. R̄

Kreosoti 4,0 (!)

[3] *Pulv. Rad. Alth. Succ. Liquiritiæ dep. ana 6,0. F. c. Aq. dest. q. s. pilul. 120. Consp. Lycop. D. S.* Morgens und Abends 2 Pillen, später steigend bis auf 3. [Bei Phthisis pulmon.] **Wolf.**

1244. R̄

Kreosoti 1,0

[3] *Plumb. acet. Opii puri ana 0,3. Succ. Liquiritiæ 6,0. M. f. pil. 50. Consp. Pulv. Rad. Liquirit. D. S.* 3 Mal täglich 2 Pillen. [Bei Phthisis im Erweichungsstadium.] **Fuchs.**

1245. R̄

Kreosoti 2,0

[4] *Cerae albae ras. Pulv. Rad. Alth. ana 2,0. Mucil. Gummi Mim. q. s. ut f. pil. 100. Obducant. gelatina. D. S.* Täglich 2-3 Mal 1-2 Pillen.

1246. R̄

*Kreosoti**Acid. acet. ana 1,0**Spirit. Juniperi 2,0**Syrupi 30,0**Aq. destill. 450,0.*

D. S. Mehrmals täglich 1-2 Esslöffel. **Mixtura Creosoti Ph. Brit.**

1247. R̄

Kreosoti[5] *Acid. acet. ana 0,4**Spirit. aeth.**Syrupi ana 15,0**Aq. destill. 210,0.*

M. D. S. 2-3 stündlich 2 Esslöffel. [Bei Typhus exanthematicus und bei adynamischer Bronchitis] **Murchison.**

1248. R̄

Kreosoti 0,1[2] *Dec. Lich. Island. 60,0**Syr. Papav. 25,0*

M. D. S. Zweistündlich 1½ Fesslöffel. [Allmählig auf *Kreos.* 0,3 (!) innerhalb 24 Stunden zu steigen. Bei Phthisis ohne Zeichen von Gefäss-Erthismus.] **Verbeck.**

1249. R̄

Kreosoti 0,05[2] *Spir. dilut. 0,2**Dec. Rad. Salep. 120,0.*

D. S. Zweistündlich ½ - 1 Theelöffel (bei kleineren Kindern — bei grösseren, zwischen 2 - 5 Jahren, 1 Kinderlöffel). [Bei Brechdurchfall.] **Jonas.**

1250. R̄

Kreosoti 0,2[2] *Aq. Aurant. Flor. 60,0**Tinct. Ferr. acet. aeth.**Aeth.**Syr. Aurant. Cort. ana 2,0.*

D. S. Zweistündlich einen Theelöffel. [Bei Vomitus gravidarum] **Krause.**

1251. R_y
Kreosoti 0,25
 [4] *Ol. Amygd.* 15,0
Gummi Arab. 7,5
F. c.
Aq. Foenic. 150,0
Emulsio,
cui adde
Syr. Sacch. 15,0.
 M. D. S. Stündlich 1 Esslöffel voll.
1252. R_y
Kreosoti 2,5
 [3] *Aeth. acet.* 5,0
Tinct. Cinnam. 20,0
 D. S. 6 Mal täglich 5-10 (!) Tropfen.
1253. R_y
Kreosoti 0,4-0,6
 [4] *Aetheris* 1,2
Syr. Aurant. Cort. 30,0
Aq. Meliss.
Aq. Menth. pip. ana 100,0.
 M. D. S. Halbstündlich bis stündlich
 1 Esslöffel. [Bei Cholera.]
Sacerdote.
1254. R_y
Kreosoti 5,0
 [2] *Alcohol. absol.* 15,0
 D.
Spiritus Kreosoti des früheren **Cod. med. Hamb.**
 [Statt des reinen Kreosot als Zahnschmerzmittel zu verwenden.]
1255. R_y
Kreosoti 0,5
 [3] *Tinct. Menth. pip.* 25,0.
 D. S. Zahntinctur.
 [Mittelst Baumwolle auf schmerzende Zähne gebracht.]
1256. R_y
Kreosoti
 [3] *Cerae alb. ras. ana* 1,0
Opü 0,2
Pulv. Caryophyll. 2,0.
F. ope Mucil. Gummi Mimos. pilul. 30.
Consp. Pulv. Caryophyll. D. S. Zahnpillen.
 [In den hohlen Zahn zu stecken.]
1257. R_y
Kreosoti 0,5
 [2] *Acidi acetic* 5,0
Aq. destill. 50,0.
 M. D. S. 1-2 Theelöffel mit 2-3 Ess-
- löffeln Wasser gemischt aus einem Fumigations-Apparate zu inhaliren.
 [Bei Bronchitis sicca.]
Mandl.
1258. R_y
Kreosoti 0,8
Carbonis gross. pulv. 7,5
 [2] *Kali nitr.* 0,2
Naphthalini 1,0
Acidi carbol. 0,4
Picis Lithanthr. 1,0
Tragacanth. 9,0.
 M. F. *Trochisci No. 6.* D. S. Zum Räuchern [In einem verschlossenen Zimmer, in welchem der Kranke sich befindet, werden die Trochisken angezündet. Für ein kleines Zimmer (von etwa 20 Cub.-Meter Raum-Inhalt) reicht ein Trochiskus aus, für grössere Zimmer 2 resp. 3. — Gegen Keuchhusten.]
Vichot.
1259. R_y
Kreosoti 1,0-2,0
 [6] *Aceti aromatici* 300,0.
 D. S. Verbandwasser. [Zum Fomentiren brandiger, fötider Stellen.]
Lebert.
1260. R_y
Kreosoti 1,2
 [3] *Tinct. Myrrh.*
Tinct. Lavandul. ana 0,5
Syr. simpl. 30,0
Aq. dest. 200,0.
 D. S. Gurgelwasser. [Bei Angina follicularis.]
Green.
1261. R_y
Kreosoti 0,5-1,0
 [2] *Ol. Olivar.* 25,0.
 M. D. S. Täglich 2 Mal die afficirten Stellen einzureiben. [Bei chronischen Exanthemen.]
Corneliani.
1262. R_y
Kreosoti 2,0
 [2] *Azung. porci* 16,0.
F. unguentum.
Unguent. Kreosoti des früheren **Cod. med. Hamb.**
1263. R_y
Kreosoti 0,5
 [2] *Ungt. simpl.* 25,0.
M. f. unguentum.
 [Gegen Pityriasis versicolor.]
Hutchinson und Hebra.

1264. R

Kreosoti 1,0

[1] Ungt. Cerei 3,0.

F. unguent. D. S. 2-3 Mal täglich mit einem Pinsel auf die Nasenschleimhaut aufzutragen. [Gegen Ozaena.]

Wetzlar.

Liq. Kali caust. 22,5

Calefact. f. sapo, cui adde

Pulv. Lapid. Pumicis 15,0

Kreosoti puri 4,0

Ol. Cinnamom. 1,2

Ol. Citri 2,5.

F. frust. pond. 75,0.

Kreosotseife.

[Bei den verschiedensten Hautkrankheiten, namentlich Eczem, Psoriasis, Prurigo, parasitären Hautaffectionen.]

Auspitz.

1265. R

Sebi bovini

Ol. Cocos ana 15,0

Kreosotum solutum s. *Aqua Kreosoti*.

†**Labdanum.** *Gummi Labdani* s. *Ladanum*. [Von *Cystus creticus*.] Ein obsoletes Harz, früherhin zur Bereitung mannigfacher Pflaster und Räucherspecies verwendet.

***Lac vaccinum.** Kuhmilch. [Hauptbestandtheile: Wasser (86 bis 96 pCt.), Fett (Butter), Eiweiss, Käsestoff, Zucker (Milchzucker) und wenig Salze.] Die Gerinnung der Milch, welche als eine natürliche Emulsion der Butter durch den Käsestoff in Wasser zu betrachten ist, erfolgt spontan durch Bildung von Milchsäure [in welche sich der Milchzucker umsetzt] oder durch Zusatz von Säuren, sauren Salzen, Alaun, Metallsalzen, Pepsin. Bei dem Gerinnungsprocess coaguliren die Käsetheilchen, indem sie die durch sie suspendirt gehaltenen Butterkügelchen einschliessen, so dass der flüssig gebliebene Theil der Milch [Molke] nur Zucker und Salze enthält.

Innerlich wird die Milch als eines der hauptsächlichsten Nahrungsmittel verwendet, da sie alle Bestandtheile zur Ernährung des Menschen [stickstoffhaltige Substanz (Käse), Fett (Butter), sogenanntes Kohlenhydrat (Milchzucker) und Salze] enthält. Die Milch ist eines der schätzbarsten und am leichtesten zu beschaffenden Antidota, namentlich bei Metallvergiftungen. — Bei vielen chronischen Krankheiten, besonders bei Phthisis, chronischen Entzündungen des Magens und des Darmkanals werden Milchkuren verordnet; dieselben bestehen darin, dass man entweder die Milch als hauptsächlichstes, ja fast ausschliessliches Nahrungsmittel verordnet und nur etwas Weissbrod dabei geniessen lässt [ganze Milchkur], oder dass die Patienten Morgens und Abends, oder 3-4 Mal $\frac{1}{2}$ -1 Liter Milch geniessen, und ihnen dabei eine leichte Diät, weisses Fleisch u. s. w. gestattet wird [halbe Milchkur]. Am besten wird die Milch bald nach dem Melken und noch lauwarm getrunken; wo sie dem Kranken Sodbrennen oder anderweitige Verdauungsbeschwerden erregt, lasse man gleichzeitig Antacida gebrauchen, z. B. jedes Mal nach dem Milchgenuss 1-2 *Trochisci Natri bicarbon*. Zuweilen wird die Milch mit Kalkwasser oder Selterwasser zugleich verordnet. — Während solcher Kuren sind saure, fette, blähende Speisen, Obst, sowie saure und spirituöse Getränke zu vermeiden. — Die Milch wird, wo es angeht, am besten von einer und derselben Kuh genommen, und diese selbst muss sorgfältig gefüttert und gehalten werden. — Meistens bedient man sich der Kuhmilch zu diesen Kuren, selten der an Fett ärmeren, an Zucker reicheren Eselinnenmilch; die Ziegenmilch kommt im Wesentlichen mit sehr guter Kuhmilch überein, dürfte aber wegen ihres grossen Fett- und Käsegehaltes sich in vielen Fällen, nament-