

P A R S I.
M A T E R I A
P H A R M A C E U T I C A .

PARS I
MATERIA
PHARMACEUTICA.

PARS



MATERIA PHARMACEUTICA.

I.

E REGNO MINERALI.

I. TERRAE ET LAPIDES.



LABASTRUM, Alabaster Dan. Mabafter Ger-
man.

Alabastrum candicans, Gypsi species.

BOLUS ALBA. Hviid Bolus. Weisser Bolus.

Argillae pinguis species ex Moravia, Silesia, Italia aliis-
que locis advecta.

BOLUS ARMENA. Armenisk Bolus. Armenischer Bolus.

Argillae pinguis species coloris rubri, vena lutea interstincti,
durioris compagis ac reliquae terrae bolares, promte linguae ad-
haerens.

haerens. Olim ex Oriente advecta, nunc etiam in Galliae & Germaniae nonnullis provinciis reperitur.

BOLUS RUBRA. Rød Bolus. Rother Bolus.

Argillae pinguis varietas rubra, ex Bohemia & Episcopatu Salisburgensi advecta, ad Spirituum Nitri & Salis destillationem inserviens.

CALX VIVA. Hæfled Kalk. Ungelöschter Kalk.

Paratur ex Lapidibus & terris calcareis pro externo; e Conchis marinis & Ostrearum calcinatis pro interno usu.

CRETA ALBA. Hvidt Krid. Weiße Kreide.

Terra macra alcalina, quae in Seelandia nostra reperitur. Praestantior alba, levis, non arenosa, ex Insula Moen adfertur.

SPECULARIS LAPIS. SELENITES. GLACIES MARIAE.

Marie Glas. Frauen-Eis.

Gypsum, lamellis rhomboidalibus pellucidum, varii, ut plurimum albicantis coloris, scissile.

TERRA SIGILLATA ALBA ET RUBRA. Hvidt og rød forseget Jord. Weiße und rothe versiegelte Erde.

Terrae bolares, ex Silesia & Turcia allatae, in placentas formatae, cum impresso Sigillo. Sint pingues, minus friabiles atque Sabuli expertes.

II. SALIA.

ALUMEN CRUDUM VULGARE. Allun. Alaun.

Alumen Lapide fissili mineralisatum album, ex Norvagia, Scania, Anglia, Germania & Italia advectum.

ALUMEN RUPEUM ROMANUM. Rød Allun. Rother Römischer Alaun.

Alu-

Alumen Lapide calcareo mineralifatum, ex Italia forma crystallorum advectum, coloris rosei pallidi.

BORAX. BORAX VENETA. CHRYSOCOLLA. Borax. Borras. Borax.

Sal, quod ex peculiari ab Indiis orientalibus advecta minera, *Tincal* dicta, Venetiis & in Hollandia paratur. Eligatur Borax alba, ex parvis transparentibus massulis constans, in igne facile fluens atque vitrescens.

COLCOTHAR VITRIOLI. Vitriol. Uebersteibset.

Terra rubra metallica post destillationem acidi vitriolici superstes.

NITRUM. Salpeter. Salpeter.

Eligatur purum, album, crystallos exhibens longas, sexangulares, prismaticas, carbonibus ignitis inspersum absque crepitatione promte deflagrans, atque in aqua facile solubile, quale ex India orientali adfertur.

NITRUM MURARIUM. ALKALI MINERALE. NATRUM. APHRONITRUM VETERUM. Mineralist Salt. Mineralisches Salz.

Sal Alkali compactum, muris cellisque humidioribus superficialiter adhaerens.

SAL ANGLICUM CATHARTICUM, EBSHAMENSE. Engelff Layer-Salt. Englisches Layer-Salt.

Sal neutrum artificiale Anglicanum, ex lixivio a crystallificatione Salis marini residuo, acido Vitrioli saturato paratum. Album sit, purum & in aqua facillime solubile.

SAL GEMMAE. Steen-Salt. Stein-Salz.

Muria fossilis pura, semipellucida, post longum satis tempus in aqua solubilis, dura, fortiter in igne crepitans. Ex Hungaria, Transylvania, Polonia adfertur.

SAL SEDLICENSE. Seidlitz'er-Salt. Seidlitz'er-Salz.

Neutrum acidulare Sedlicense, ex iisdem quibus Anglicum partibus constans, cum aliquo tamen proportionis discrimine. Eligatur album & crystallifatum.

VITRIOLUM ALBUM. Weiß Vitriol. Weißer Vitriol. Galigen-Stein. Augen-Stein.

Vitriolum Zinci album apud Gostarienses paratum, Sacchari instar album & non nimis durum.

VITRIOLUM COERULEUM. Blaa Vitriol. Blauer Vitriol.

Vitriolum Cupri coeruleum Sapphiri instar, crystallifatum.

VITRIOLUM VIRIDE. Grøn Vitriol. Grüner Vitriol. Eisen-Vitriol.

Vitriolum Ferri viride crystallifatum, ex Hungaria & Anglia advectum, coloris herbacei. Cuprum admistum prodit immissa lamina ferrea pura, cui Cuprum adhaeret.

III. INFLAMMABILIA.

AMBRA GRYSEA. AMBARUM. Ambra. Ambra.

Ambra binis vel trinis coloribus variegata, post praegressam fortem pelagi agitationem, in mari Indico ad partem Africae & vicinas insulas, a Mozambicis usque ad mare rubrum, odoratu piscata. Eligatur levis, parum odorata, quae laminae candenti imposita gratum edit odorem, & parum vel nihil relinquit, facile ad candelam liquefcit & bene cohaeret.

ASPHAL-

ASPHALTUM. BITUMEN JUDAICUM. Jode=Beeg.
Judenpech.

Bitumen solidum coagulatum, nigrum, fragile, resplendens,
magna copia mari mortuo innatans.

PETROLEUM ALBUM. OLEUM PETRAE. Hviid Steen-
Olie. Peter-Olie. Weisses Stein- oder Berg-Öel.

Bitumen levissimum & fluidissimum Naphta dictum, ex
terra aut rimis montium exsudans, aquae & spiritibus, si purum
est, supernatans, facillime inflammabile, aurum ex Aqua regis
attrahens & solvens; ex Sumatra insula, Persia & Ducatu Mode-
nensi allatum, non ingrati odoris, admodum rarum. Substitui-
tur plerumque

PETROLEUM FLAVUM subrubellum, crassius, ex Sicilia &
Italia advectum, Oleo Terebinthinae ut plurimum adulteratum.

SUCCINUM. ELECTRUM. CARABE. AMBARUM. Bern-
steen. Rab. Bernstein.

Succinum pellucidum. Substantia bituminosa flava & alba,
e terra effossa, aut ad littora maris Baltici collecta. Ex Jutia, in-
sula Moen, Prussia Polonica, & Pomerania adfertur.

SULPHUR CITRINUM. Guul Svovel. Gelber Schwefel.
Sulphur nativum, purum, flavum, ex Islandia, Germania,
Italia & Helvetia advectum.

IV. SEMIMETALLA.

ANTIMONIUM CRUDUM. STIBIUM. Spits-Glas. Spiesglas.
Sit longis & splendentibus striis praeditum, & sub igne stre-
nuo totum exhalet. Ex Hungaria advehitur.

ARGENTUM VIVUM. MERCURIUS VIVUS. HYDRAR-
GYRUM. Qveg-Solv. Quecksilber.

Sit

Sit purum, nullo alio metallo inquinatum, quod deflagratione in cochleari ferreo supra carbones detegitur, ubi avolat Mercurius, relicto metallo admisto.

ARSENICUM ALBUM. Rottekrud. Ragen- oder Mäusegift.

Arsenicum nativum farinaceum, quod Cobalti fuligo est, fortissimo igne, addita parca falis Alkali quantitate, in massam crystallinam vitream sublimata.

ARSENICUM CITRINUM. Guul Arsenik. Gelber Arsenik.

Arsenicum flavum, ex Sulphuris una & Arsenici decem partibus mixtis, sublimatione paratum.

ARSENICUM RUBRUM. Rugeel. Rauschgelb.

Arsenicum rubrum, ex Sulphuris duabus & Arsenici decem partibus sublimatione paratum.

AURIPIGMENTUM. SANDARACHA GRAECORUM. Operment. Operment. Auripigment.

Arsenicum Sulphure & Lapide spathoso ac micaceo mineralisatum, minera flavescens. Optimum ex India orientali, Turcia & Transylvania advehitur, punctulis sive micis velut aureis nitens, coloris citrini.

CALAMINARIS LAPIS. CADMIA. Galmey. Galmey.

Zinci minera terrea, coloris flavescens vel fusci, circa Aquisgranum, nec non in Anglia & Polonia ex terra eruta.

NIHILUM ALBUM. POMPHOLYX. Hvidt Nix. Weißes Nichts.

Tutia alba farinacea levissima. Flos Zinci albus inter fusionem minerarum Zinci superne lateribus camini adhaerens, atque inter fusionem Orychalei, instar fumi albi, rimas fictilium penetrans.

TUTIA,

TUTIA. CADMIA. NIHIL GRYSEUM. Tutia. Tutia.

Relicta sublimata zincina plus minus condensata, grysea, lateribus fornacum inferne adhærentia, in præparatione Orychalci pariter undequaque circa vasa fusoria reperiunda. Sint densa, modice gravia & dum franguntur, cinerea.

V. METALLA.

ARGENTUM CUPELLATUM. Gold. Silber.

Pro caustico lunari.

ARGENTUM FOLIATUM. Goldblade. Silber-Blätter.

AURUM FOLIATUM. Goldblade. Goldblätter.

CERUSSA VENETA. Bleeghvuid. Bleyweiß.

Ex Plumbo vaporibus acidorum exposito, aut iisdem soluto paratur. Sit alba & gustu dulcis.

CUPRUM. Raaber. Kupfer.

Cuprum præcipitatum, purum, ex solutione Vitrioli.

FERRUM. MARS. Jern. Eisen.

Ferrum selectum, Dannemoræ, Nordbergæ &c. reperiundum.

HAEMATITES LAPIS. Blod-Steen. Blut-Stein

Ferrum mineralisatum, *minera figurata rubra*, aut *tritura rubente*.

LITHARGYRIUM ARGENTI. Solberglod. Silberglette.

Plumbum inter depurationem Argenti semivitrificatum. Præstat quod ex puro acquiritur Plumbo, cujus solutio cum Alkali volatili coeruleum non induit colorem, quod contingit, si cuprum admixtum fuerit.

MINIUM. Mönne. Mennich. Kothel Meng.

Paratur ex Cerussa citrina ad rubedinem calcinata.

PLUMBUM. SATURNUS. PLUMBUM NIGRUM. Bly. Bley.
Plumbum Galena, mineralisatum, particulis cubicis.

STANNUM ANGLICUM. JUPITER. PLUMBUM ALBUM.
Engelst Zinn. Englisch Zinn.

Pro rasura purissimum nec Plumbo nec Arsenico inquinatum.

VIRIDE AERIS. AERUGO. Spansst Bron. Grünspan.

Factitium ex Cupro mediantibus vinaceris corrosio. Eligatur coloris ad coeruleum vergentis, Creta non adulteratum.

II.

E REGNO VEGETABILI.

I. FUNGI. ALGAE. MUSCI.

AGARICUS. Lerke-Swamp. Berchen-Schwamm.

Boletus suberosus, *Pini Larius annosae Fungus*, cujus sub Cortice cinereo subruffo calloso subest medulla alba, primum subdulcis dein amaricantis saporis, quae quo magis est fragilis, facile scissilis, candida, levis, eo est melior. Praestat ex Oriente advectus. Nigricans, decolor & in frustula duriora dehiscens, corruptus est.

BOVISTA. CREPITUS LUPI. Ilvefiis. Fiissop. Woffst.

Lyc-

Lycoperdon Bovista, sub cute externa membranacea parenchyma exhibens leve, spongiosum, admodum molle, pulverulentum. In campis collibusque pullulat.

FUNGUS QUERNUS. Gege = Swamp. Eichen = Euntenschwamm.

Boletus igniarius, in caudicibus nascens, Mensibus Augusti ac Septembris colligendus. Praeparationem vide in Parte II.

LICHEN TERRESTRIS CINEREUS. Hunde = Mos. Hunde = Moos.

Lichen caninus, foliaceus, repens, subtus venosus, villosus, pelta marginali adscendente, in sylvis, juxta lapides in terra reperiendus.

LYCOPODII SEMEN sive SULPHUR. Jordmos. Udsesod. Luusegræs. Kraakestiig. Kraakefod. Soenkraakefod. Hæve = Hæver. Bårappfamen.

Lycopodium clavatum, in montosis & sylvosis reperiundi, pollen. Flor. Dan. 126.

MUSCUS CUMATILIS. Alsnæver. Almnæver.

Lichen apthosus, in sylvis acerosis sterilibus sub Juniperis habitans.

MUSCUS ISLANDICUS. Islands Mos. Fiallegræs. Isländisch Lungen = Mos.

Lichen Islandicus foliaceus, adscendens, laciniatus, in Islandia, Norvagia, Lapponia montanis & alpinis, ad terram & saxa proveniens. Flor. Dan. 155.

MUSCUS QUERNUS ARBOREUS. USNEA VULGARIS. Gege Mos. Eichen = Moos.

Lichen plicatus, ad annosas quereus reperiendus.

QUERCUS MARINA. Strandfleber. Fattigmänds
Tarm. Butang. Kutang. Knoptang. Svinetang.

Fucus vesiculosus, pro Cineribus (Aethiope vegetabili Ric.
Ruffel) Menſe Auguſto colligendus.

SPONGIA. Vid. Regnum animale.

CANONES GENERALES.

I. CITO ficcata ab heterogeneis admixtis liberentur.

II. SERVENTUR loco ficco, ne mucorem contrahant.

II. RADICES.

ACETOSAE. Syre. Sauerampfer-Wurz.

Rumicis acetosae RADIX perennis, fibroſa, longa, ſublutea, verno tempore colligenda.

ACORI VULGARIS. Sværtſblad-Nod. Ackermanna-Wurzel.

Iridis Pseudacori RADIX perennis, in locis paludosis reperiunda, nodosa, extus & intus rubra.

ALKANNAE RUBRAE. ANCHUSAE. BUGLOSSI. Rod Dye-
tunge. Rothe Dchsenzungen-Wurz.

Anchusae officinalis RADIX perennis, teres, oblonga, foris rubens aut nigricans. Eligantur radices parvae, fibroſae, quae colorem purpureum in tota ſubſtantia magis diffuſum habent. Maiores intus albicant.

ALLII. Leg. Knoblauch.

Allii sativi RADIX bulboſa, tunicata, ſabulo ſervanda.

ALTHAEAE. BISMALVAE. Althee. Althee-Eibiſchwurz.

Althaeae officinalis RADIX perennis, alba, digitum crassa, mucagine lenta turgida. Flor. Dan. 530.

ANGELICAE. Angelik. Engelrod. Quanne. Quannerod. Stoike. Stofe. Fatno. Fadne. Bosk. Fadnorvotab. Fadnoransse. Angelikenwurk.

Angelicae Archangelicae RADIX biennis, oblonga, ex capite crassiore in fibras saepe pollicares vel tenuiores divisa, foris ex flavo rubescens, intus alba, in Aepibus Norvagicis & Lapponicis sponte; apud nos in hortis reperiunda, hyeme colligenda. Sit tenax, abunde fragrans, transversim secta puncta flava uberim exhibens. Flor. Dan. 206.

APII SATIVI. Seleri. Gartenepich. Seleri.

Apii graveolentis RADIX biennis.

ARI. Dansk Ingefer. Deutscher Ingwer. Arons-Wurk.

Ari maculati RADIX perennis, inaequaliter globosa aut oblonga, tuberculis hirta, recens, compacta, verno tempore, antequam floreat, collecta. In locis umbrosis habitans praefenda illi quae in apricis siccis offenditur. Per hyemem & aestatem sabulo tecta servetur & quotannis recens colligatur. Flor. Dan. 505.

ARISTOLOCHIAE FABACEAE. Huulrod. Rod Hane-
fam. Kleine runde Hofstwurk.

Fumariae bulbosae RADIX perennis, cava, in hortis reperiunda.

ARISTOLOCHIAE VERAЕ. Lange og runde Huulurtz-
rod. Osterluceywurk.

Aristolochiae longae & rotundae RADIX tuberosa, subrotunda aut oblonga, parum fibrosa, ex Europa australi allata, crassior, ponderosa, compacta, intus e gilvo olivaris, non farinacea, nec rugosa.

ARMORACIAE. RAPHANI RUSTICANI. Yeberrod. Meerettig.
Cochleariae Armoraciae RADIX fusiformis, biennis, recens
 fabulo servanda.

ARTHANITAE. Gastechnappe. Madefernerod. Sau-
 brodt.

Cyclaminis Europaei RADIX perennis, tuberosa, crassa,
 orbiculata, foris nigricans, intus candida, in hortis & sponte in
 montosis habitans; recens, saporis acris, urentis.

ASARI. Haselurtrod. Haselwurk.

Asari Europaei RADIX perennis, fibrosa, recens, odore
 nardino, Valerianae aemulo praedita, sub calidiore Germaniae
 coelo germinans.

ASPARAGI. Asparis. Aspargis. Spargelwurk.

Asparagi officinalis RADIX perennis.

BARDANAE. LAPPAE MAJORIS. Agerburre = Agerstreppe =
 Storstreppe = Tordensstreppe = Rod. Lungegras = Klun-
 ger = Klagg = Haarflagg = Burre = Burre = Rod. Klettens-
 wurk.

Arctii Lappae RADIX perennis, ramosa, foris nigricans,
 intus alba, fibrosa, saporis sub dulcis, sub austeri, ad vias in ru-
 detis reperiunda, Majo Mense colligenda. Rejiciatur vetusta
 lignosa.

BISTORTAE. Slangurtrod. Natterwurk.

Polygoni Bistortae in humidis sponte crescentis RADIX per-
 ennis, intorta, tuberosa, intus pallide rubella, ponderosa, fractu
 difficilis. Flor. Dan. 421.

BRITANNICAE. Bändstreppe. Grindwurk.

Rumicis aquatici RADIX perennis, lignea, magna, ob-
 scure ruffa, intus flava, in paludosis germinans.

BRUSCI. RUSCI. Muusetornrod. Bruschwurz. Mäuse-
dornwurz.

Rusci Hypophylli Suffruticis RADIX crassa, implexa, al-
bicans, saporis in initio subdulcis, postea amari, Italiae & Gal-
liae indigena.

BRYONIAE. Galdebær. Hundebær. Zannrübe. Gicht-
rübe.

Bryoniae albae RADIX perennis, fusiformis, praegrandis,
e circulis annulisque composita, in umbra juxta sepes reperiunda.

CALAMI AROMATICI. ACORI VERI Calmus. Kalmus.
Kalmus.

Acori Calami RADIX perennis, in paludosis & Aquis sta-
gnantibus luxurians, longa, obliqua, crebro geniculata, digitum
crassa, ex flavo rufescens, intus alba & fungosa, saporis acris &
aromatici.

CARDOPATHI. CARLINAE. Eberrod. Eberwurz.

Carlinae acaulis RADIX perennis, palmae unius vel alterius
longitudinis, crassitudinis pollicis, foris ruffa, intus albida, saporis
& odoris grati, aromatici, ex Italia & montosis Germaniae lo-
cis advecta.

CARYOPHYLLATAE. Benediktrod. Melliferod. Be-
nediktwurz. Nägeleinwurz.

Gei urbani RADIX fibrosa, subruffa, odoris & saporis aro-
matici, caryophyllacei, coloris intus carmesini. In sylvis & um-
brosis habitat.

CHELIDONI VULGARIS MAJORIS. Store Svaleurrod.
Selidon. Groß Schellkrautwurz.

Chelidoni majoris RADIX perennis, fibrosa, miniati colo-
ris, succo croceo intensiori turgens. Flor. Dan. 542.

CHELI-

CHELIDONII VULGARIS five MINORIS. Lisse Swale-
urtrod. Feigwarzenwurk. Scharbockskrautwurk.

Ranunculi ficariae in partis & umbrosis crescentis RADICES
perennes, fibrosae, primo vere colligendae. Flor. Dan. 499.

CHINAE. Chinarod. Chinawurk.

Smilacis Chinae RADIX nodosa, ex Indiis adveſta, ponde-
rosa, solida, firma, difficulter scissilis, pallide rubens, tentata
digitum, manducata linguam pinguedinis aliquo sensu afficiens.

CICHORES. Bægvardrod. Wegwartwurk. Hindlauffwurk.

Cichorei Intybi RADIX biennis, ramosa, pedem longa,
pollicem crassa, obliqua & fibrosa, succo lactescente turgida, ver-
no tempore colligenda. Lignosa & ingrata amara rejiciatur.
Sponte crescens hortensi praeferenda.

COLCHICI AUTUMNALIS. Rogne Zomfruer. Rogne
Horer. Zeitlose.

Colchici autumnalis RADIX gemina, tuberosa, carnosae,
quarum una exterior sterilis est & marcescens, altera intra pri-
orem latens, in fibras porrigitur. In pratis humidioribus re-
peritur.

CONTRAYERVAE. Giftröd. Bezoarwurk. Peruvianische
Giftwurk.

Dorsteniae Contrayervae RADIX e capitulo nodoso fibrosa,
ex Peru allata, odoris leviter aromatici, saporis sub adstringentis,
non ingrati, coloris obsolete rubelli. Rejiciantur fibrae te-
nuiores.

COSTI DULCIS. Sode Costusrod. Süsse Costuswurk.

Costi Arabici RADIX perennis, ex Occidente & Oriente
allata, solida, crassa, oblonga, foris cinerei, intus albicantis co-
loris, saporis aromatici, odoris ad Iridem Florentinam accedentis.

CUR-

CURCUMAE. Gurgemeie. Curcumei.

Curcumae longae RADIX Orientalis, extus lutea, intus e luteo ruffa, dura, densa, ponderosa, diffracta particulas resinofas micantes exhibens; faporis amaricantis, leviter aromatici.

CYNOGLOSSI Hundstunge. Udborre. Hundszungenwurk.

Cynoglossi officinalis RADIX biennis, ad vias reperiunda, recta, crassa, foris ex atro rubens, intus albida; odoris gravis, narcotici; faporis subdulcis, mucosi.

CYPERI ROTUNDI. Cyperrod. Trindvildgalgan. Runde Cyperwurk.

Cyperi rotundi RADIX perennis, turbinata, Olivae magnitudinis & figurae, scabra, striata, foris subruffa, intus albida, ex Aegypto & Oriente adveeta. Sit odorata, gravis, non cariosa.

DICTAMNI ALBI. FRAXINELLAE. Hvild Diptamrod. Weisser Diptam-Aschwurk.

Dictamni albi RADICES oblongae, multifidae, intus lignosae, in montosis Galliae, Germaniae & Italiae habitantes, albicantes, ab interiore parte lignosa liberae, non cariosae; faporis subamari, cum obscura acredine; odoris, si recentes sint, fragrantis, gravis.

DORONICI. Udeurtrod. Genssenwurk. Schwindelwurk.

Doronici pardalianchis RADICES tuberosae, in montibus Helvetiae, Tiriae, Stiriae & Austriae germinantes, albicantes; faporis subdulcis, aromatici, acris; non cariosae.

ENULAE. HELENII. Mandserod. St. Ellensrod. Mandwurk.

Inulae Helenii RADIX biennis, crassa, carnosâ, multifida, foris fusca, intus alba; saporis amari, aromatici; in hortis culta, & in locis humidis paludosis reperiunda, quae efficacior.

ERYNGII. Bergmandstroe: Mandstroe: Mandshiesprod. Mannstreu: Radendistel: Brackendistelwurh.

Eryngii campestris RADIX perennis, pedem longa, pollicem crassa, mollis & tenera, cum nervo in medio, extus nigricans, intus candida; saporis dulcis; in Germaniae, Italiae & Hispaniae campis siccis & in Norvagia habitans. Flor. Dan. 554.

FARFARAE. TUSSILAGINIS. Hestehov. Sollefod. Hovblad. Hovurterod. Skreppe. Leerstreppe. Leerfivel. Brand: Sattich: Husfattichwurh.

Tussilaginis Farfarae RADICES perennes, longae, tenues, candidae, saporis subacris cum levi lentore; in agris subhumidis & ad fossas reperiundae, primo vere colligendae.

FILICIS. Bregne. Hanbregne. Skiarbregne. Grofte Molfoor. Molfoorblom. Nlojaste. Bujaste. Skorv. Hanblom. Nystebblom. Trepeek. Cassa Gaiske. Jarnkrautwurh.

Polypodii Filicis maris RADIX perennis, crassa, ramosa, foris nigricans, intus pallida; saporis primum subdulcis, dein amariusculi, subadstringentis; autumnno colligenda.

FOENICULI. Fennikelrod. Fenchelwurh.

Anethi Foeniculi RADIX biennis, digitalis, recta, alba; saporis subdulcis, aromatici. In hortis colitur; pars corticosa in usum vocatur.

FRAGARIAE. Jordbarrod. Erdbeerkrautwurh.

Fragariae vescae RADICES perennes.

GALANGAE MINORIS. Galangerod. Galgant.

Maran-

Marantae Galangae RADIX tuberosa, nodosa, geniculata, dura, minimum digitum crassa. Seligantur ponderosae, non cariosae, aroma spirantes, extus e spadiceo rubrae, intus rubellae. Ex Oriente advehuntur.

GENTIANAE - RUBRAE. Sode. Sadrod. Sotfonge. Sliarsode. Rother Enzian.

Gentianae purpureae RADIX biennis, longa, pollicem unum aut alterum crassa, foris fusca, intus ex flavo rufescens, intense amara, in Norvagiae Alpibus habitans, quae luteae praeferenda. Flor. Dan. 50.

GLYCYRRHIZAE. LIQVIRITIAE. Lakritz. Süßholz. Licquiritienwurk.

Glycyrrhizae glabrae RADIX ramosa, late serpens, perennis. Sit recens, tenax, flexilis, dissecta laete flava, dulcis gratique saporis. Ex Franconia plerumque adfertur.

GRAMINIS. Hundegräs. Kroppegräs. Anagräsrod. Taggräs. Taggräs. Uroot. Uring. Skingräs. Quiffetaa. Quiffurod. Queck. Graswurk.

Tritici repentis RADIX perennis, repens, geniculata, e sarmentis tetuibus constans. Verno & autumnali, non aestivo tempore colligatur.

HELLEBORI ALBI. Hvild Nysseurtrod. Weiße Niesewurk.

Veratri albi RADIX ramosa, extrinsecus gilva, intus albescens, ex Germania australi advecta.

HELLEBORI NIGRI. MELAMPODII. Sort Nysseurtrod. Christwurk. Schwarze Niesewurk.

Hellebori nigri RADIX fibrosa, maximam partem in Lalandia, insula Moen, Germaniae australis & Helvetiae Alpibus collecta.

lecta. Probae radice caput tuberosum, nigrum, Nucem Moschatam aequat & sulcatum est. Fibrae sint extus tenues, laeves, intus albae, parum tenaces. Sapor nauseosus fit, acer & amaricans. Rejiciantur radices vetustae, fragiles, pulverulentae.

HERMODACTYLL. Hermodadeler. Hermodattelwurk. Fren-
de Zeitlofenwurk.

Iridis tuberosae RADICES trigonae, ex una parte compressae, ex altera tuberosae, ex Smirna, Aleppo & Syria advectae, extus albicantes, intus prorsus albae, saporis dulcescentis & acris, odoris nullius.

HIRUNDINARIAE. VINCETOXICI. Svalerod. Schwabenwurk. Gistwurk.

Asclepiadis Vincetoxici RADIX biennis, tuberosa, fibrosa, in sabulosis & montosis reperiunda; subacris fervidique saporis, & validi, nardini, subaromatici odoris.

JALAPPAE. Jalaprod. Jalappe.

Mirabilis Jalappae RADIX, vel potius taleoli radice, Zonulis cincti, externe ex lurido fusci, interne e fusco cinerei, ex America allati. Radix compacta fit, dura, ponderosa, igni admota inflammabilis, diffracta particulis resinosis resplendens. Admixta Bryoniae segmenta colore albo, textura spongiosa, annulisque illico se produnt.

IMPERATORIAE. OSTRUTH. Meisterrod. Meisterwurk.

Imperatoriae Ostruthii RADIX biennis, oblonga, pollicem crassa, rugosa, foris fusca, intus alba; gravis, acris & valde aromatici saporis atque odoris; in montosis Helvetiae & Stiriae habitans atque in hortis culta.

IPECACOANHAE. Americanst Brekrod. Americanische Brechwurk. Ruhrwurk.

Euphor-

Euphorbiae Ipecacoanhae RADIX repens, nodosa, geniculata, Brasiliensis fusca, aut Peruviana cinerea, quae priori praeferenda. Quae externe albicant radices, aut coloris gilvi sunt, spongiosae & sulcis haud notatae, rejiciuntur. Eligatur quae colorem exhibet ex cinereo obsolete castaneum, quae rugosa est, annulisque & incisuris profundis conspicua. Cortex crassus sit, durus, densus, fragilis, fractus particulis resinosis resplendens; sapor acris, amarus, parum nauseosus cum sensu mucilaginis. Rejiciantur fibrae adhaerentes cum medulla lignea alba, insipida.

IRIDIS FLORENTINAE. *Biolrod.* *Wolenswurk.*

Iridis Florentinae RADIX tuberosa, sublato Cortice ex Italia advecta, ponderosa, densa candida, punctis e fulvo fuscis distincta, *Violae Martiae* odorem spirans. Radices minores majoribus praestant.

IRIDIS NOSTRATIS. *Blaa Lillie.* *Sværdlilie.* *Schwertelwurk.* *Schwertlilienwurk.*

Iridis Germanicae RADIX tuberosa, articulata, ex inferiori parte fibrata, in clivosis habitans, non confundenda cum *Iridis palustris* (*Iridis pseudacori* Flor. Dan. 494.) Radice, in paludosis locis & lacubus crescente. Quae Autumno eruitur recens & succo plena, per hyemem in sabulo sicco conservari potest.

LEVISTICI. LIGUSTICI. LASERPITHI. *Lobstif.* *Lubstif.* *Viebsäckelwurk.* *Wadkrautwurk.* *Saukrautwurk.*

Ligustici Levistici RADICES perennes, grandes, torosae, foris nigricantes, intus albae, verno tempore colligendae. In hortis coluntur.

MECHOACANNAE ALBAE. *Wid Jalapperod.* *Weisser Jalapp.* *Weisse Rhabarber.*

Convolvuli Mechoacannae RADIX grandis, levis, externe cinerea, intus candida aut gilva, annulis interne cincta, ex America meridionali advecta; saporis primum farinacei, dein acris, a Bryoniae sapore distinguendi, qui nauseose amarus est.

MORSUS DIABOLI. SUCCISAE. Engelnop. Blaafnop. Dievelshid. Fareblade. Gronskoll. Blaafoll. Blaahorst. Skor. Gronblad. Teufelsabbiswurk.

Scabiosae Succisae RADIX perennis, oblonga, crassitie mi-nimi digiti, fibris longis & albis cincta; saporis acris, amari; in pascuis humidiusculis habitans. Flor. Dan. 279.

OXYLAPATHI. LAPATHI ACUTI. Hestesyre. Grind-wurk.

Rumicis acuti RADIX perennis, pollicem crassa, octo vel de-cem pollices longa; coloris extus obscure rubelli, intus flave-scentis.

PAREIRAE BRAVAE. Americanff Gruusrod. America-nische Grieswurk.

Cissampelos Pareirae RADICES, in America provenientes, extrinsecus plane nigricantes, intrinsecus ex fusco luteae; saporis dulcamari; crassiores, non cariosae.

PETASITIDIS. Pestilentserod. Pestilentwurk. Schweiswurk.

Tussilaginis Petasitidis RADICES perennes, fibrosae, a com-muni provenientes capite; odoris aromatici fragrantis; saporis acris, aromatici, amariusculi; in aquosis habitantes, vere col-ligendae.

PETROSELINI VULGARIS. Persilrod. Peterfilienwurk.

Apii Petroselini RADIX.

PIMPINELLAE ALBAE. Quaserod. Biergrad. Bild. Pimpinelle. Bibenell.

Pimpi-

Pimpinellae Saxifragae RADIX perennis, tenuis, fibras minores maxime ex capite crassiore emittens; coloris extus pallide flavescentis, intus albicantis; in siccis sabulosis ac saxosis affatim germinans. Eligatur recens, tenax, saporis eximie pungentis. Inertior est quae in pratis humidisque crecit locis. Flor. Dan. 92.

POEONIAE. Pœonienrod. Pœonienwurk. Pfingstrosenwurk. Sictrosenwurk.

Paeoniae Officinalis RADICES perennes, tuberosae; coloris extus rufi, intus pallidioris; saporis subdulcis, ingrati; primo vere colligendae. In hortis coluntur.

POLYPODII. Engelsöt. Egebregne. Mariebregne. Steensöte. Syffelroet. Heilsöta. Engelsüß.

Polypodii vulgaris RADIX perennis, fibrosa, geniculata, ad radices quercuum & in rudetis locisque siccis germinans; extus e spadiceo fusca, intus obsolete viridis, compagis tenacis; saporis dulcis leviter nauseosi.

PTARMICAE. Hvild Regnsan. Weisser Bertram. Weiß Meisarn. Wiesen Dragun.

Achillaeae Ptarmicae RADIX perennis, lignosa, capillata, ejusdem fere ac Radix Pyrethri virtutis.

PYRETHRI. Bertramörod. Bertramswurk.

Anthemidos Pyrethri RADIX fibrosa, tenuis, qualis ex Germania & Gallia Narbonensi adfertur. Praestat vero Tunetana, crassa, tenax, extus ferruginea, intus alba; saporis adeo feruidi, ut linguam faucesque adurat; ex Italia advecta.

RHABARBARI. Rhabarber. Rhabarber.

Rhei palmati RADIX tuberosa; saporis amari, levissime nauseosi; cum duritie aliqua fragilis, levis, probe sicca; externe dilute lutea, digitum flavedine non inficiens, interne dilute crocea cum

cum albis & rubellis venulis, nucis moschatae instar, eleganter variegata; ex India Orientali advecta.

RUBIAE TINCTORUM. Krapp. Krapp. Färberröthe.

Rubiae Tinctorum RADIX perennis, recens, non nigra aut maculis interspersa, sed eleganter & dilute rubens, atque a parenchymate lignoso, quantum fieri potest, liberata.

SALAB. SALEB. Salebrod. Salapwurk.

Orchidis morionis RADICES perennes, figurae ovalis, semipellucidae, coloris ex gryseo albi, ex Persia advectae. Conveniunt virtute cum *Orchidis morionis* nostratis radicibus. Flor. Dan. 253.

SAPONARIAE. Sebeurtrod. Seifenwurk.

Saponariae officinalis RADIX perennis, ramosa, geniculata, repens, ad rivos, fossas & in humidis habitans. Verno tempore collecta, saporis sit dulcis primum & glutinosi, dein acris, amaricantis. Non confundatur cum Radice *Lychnidis dioicae* aut *Cucubali Behen*. Flor. Dan. 543.

SARSAE. SARSAPARILLAE. Sarsaparillrod. Sarsaparillwurk.

Smilacis Sarsaparillae RADICES tenues, longae, ex America australi advectae, parum rugosae; sub cortice ex rubello viridescente materiam albam, ramentosam, quae medullam ligneam cingit, continentes. Durae, fragiles, lignosae, farinaceae rejiciantur.

SATYRII. Rævenoffer. Gögshid. Stendelwurk. Rauenfrantwurk.

Orchidis bifoliae RADICES perennes, bulbosae, rotundae aut palmatae, succulentae, albidae; saporis viscosi, subdulcis. In pascuis habitant. Flor. Dan. 235.

SCOR-

SCORZONERAE. Slangemyrder. Scorzonerwurk. Schlangewurk.

Scorzonerae humilis RADIX perennis, oblonga, crassitiei aut digiti aut calami scriptorii; coloris extus pallidi aut ferruginei, intus albi; in pratis reperiunda.

SCROPHULARIAE. Ormeurt. Braunrod. Braunwurk. Saukrautwurk. Feigwartwurk.

Scrophulariae nodosae RADIX perennis, repens, crassitudinis digitalis; coloris albi; saporis acris, ingrati; verno colligenda tempore. Ad vias & fossas non aquosas habitat.

SENEGAE. Senefarod. Senefawurk.

Polygalae Virginianae RADIX, ex America septentrionali advecta, tenuis, fusiformis, vertice nodoso, crista laterali acuta; saporis primum farinacei, mox subacidi, denique acris, pungentis.

SERPENTARIAE VIRGINIANAE. Slangeurtröd. Virginiſche Giftwurk.

Aristolochiae Serpentariae RADIX, e capite nodoso fibrosa, praemorſa; in Virginia & Carolina habitans; coloris extus e gilvo viridescens, intus pallide lutei; saporis acris pungentis; odoris gravis e Valerianae Camphoraeque odore confuſi.

SPICAE INDICAE. NARDI INDICI. Indiſch Spikrod. Indianiſche Spicanardwurk.

Laguri odorati RADICES, ex Oriente advectae, recentes, leves, coma longa praeditae; Cyperum redolentes.

SQUILLAE. Strandlegrod. Meerzwiebel.

Squillae maritimae in ora maris mediterranei sponte provenientis, RADIX bulbosa, tunicata, recens, torosa, ponderosa; in-

D

tus

tus albicans; sacco acri glutinoso, peramaro dives; non decolor, neque attrita & defricata.

SYMPHYTI. CONSOLIDAE MAJORIS. Rulsufferod. Gongsalverod. Schwarzwurk. Wallwurk.

Symphyti officinalis RADIX perennis, ramosa, in humidis habitans.

TARAXACI. Lovetand-Præstekrone-Munkeshovedrod. Zivel. Rabbelaup. Laxeblosterrod. Pfaffenröhelein- Löwenzahn- Löwenfrantwurk.

Leontodos Taraxaci RADIX perennis, oblonga, ramosa, minimi digiti crassitie; foris subfusca, intus pallida; saporis amaricantis. Recens verno colligatur tempore.

TORMENTILLAE. Tormentill-Rodme. Mundskaaferod. Zepperod. Blodrod. Zillerod. Solmandsrod. Tormentillwurk.

Tormentillae erectae RADIX perennis, tuberosa, pollicem crassa; coloris extus ruffi, intus ex flavo aut fusco rubentis; saporis austeriusculi; in arenosis luxurians.

TURBITH. Turbithrod. Turbithwurk.

Convolvuli Turpethi RADICES, ex Insula Ceylon & Malabarica advectae, resinosae, albicantes, non rugosae, nec cariosae; saporis subacris, nauseosi.

VALERIANAE SYLVESTRIS. Baldrian. Dienrod. Valerian. Bild Nardus. Belandsrod. Benderod. Wendmoßrod. Kleiner Baldrian.

Valerianae officinalis RADIX fibrosa, praemorfa, in sylvis, ad sepes & in hortis habitans. Sit tenuis, fibris pilosis hirta, tenax, e pullo obsolete virefcens. Rejiciatur crassior, minus pilosa, magis lignosa, fragilis, e cinereo castanci coloris. Cum subtilis radice

radicis hujus virtus facile in auras avolet, a squalore liberata & probe sicca, in vase vitreo probe clauso arctissime compingenda, & loco sicco frigidoque servanda est. Flor. Dan. 570.

URTICAE. Melde=Nældebrände=Nott=Brändehä-
terod. Nesseltwurz. Brennesseltwurz.

Urticae dioicae RADIX perennis, lignosa, nodosa, geniculata, fibrosa, digitum crassa; coloris pallide flavescentis; saporis leviter amaricantis.

ZEDOARIAE. Zitverrod. Zitwer.

Kaempferiae rotundae RADIX nodosa, brevis, quodammodo compressa, paucis fibris intertexta, digitum crassa, ex Indiis allata. Eligatur ponderosa, dura, tenax, probe sicca, tota cinerea, egregie fragrans & camphorati quid spirans.

ZINGIBERIS. Ingever. Ingfer.

Anomi Zingiberis RADIX ex Indiis advecta, brevis, tuberosa, nodosa, ramosa, paululum compressa; coloris extus albidus, subluteus, aut ex fusco rubellus, intus albicans; saporis valde acris, aromatici. Sit ponderosa, minus fibrosa, non cariota.

CANONES GENERALES.

I. ANNUAE Radices, quarum paucissima tamen in nostris Pharmacopoliis copia est, evellantur antequam caules floresque protrudant. Biennes altero, ex quo facta sunt semina, vere eruuntur. Si vero inopia urget, autumnus ejusdem anni, quo facta sunt, postquam folia caulesque emarcuere, colligi possunt. Perennes perinde est, vere an autumnus effodiantur. Autumnus tamen pleraeque sunt, si non efficaciores, certe aquoso succo non adeo turgidae.

II. IN delectu Radicum spongiosae farinaceae, cariosae, imprimis] vero exsucco Cortice testae, rejiciantur. Bonitatem enim Radicum determinat perfectus torosusque corticis habitus.

III. QUAE principiis aromaticis & resinosis praeditae sunt Radices, lotionem non purgantur. Sufficit, si de modice siccatis pulveres sordisque excutiantur.

IV. PRAEGRANDES & succulentae Radices in taleolos dissectae servantur.

V. SICCANTUR cito Radices, aut loco calido ventis perflato, aut fornacis leni cautoque calore.

VI. SICCATAE frigido siccoque servantur loco, ne situm mucoremque contrahant, aut uredine atque carie exedantur. Fragrantes vitreis coercentur vasibus.

VII. PATRIAE nostrae inquilinae, tum succulentae, multum gummosae, tum etiam subtilibus & facile avolantibus viribus praeditae, quotannis recentes legantur aut arcessantur.

VIII. QUIBUS siccatis exigua, recentibus vero multa virtus est, ut *Armoraciae*, *Iridis*, *Ari*, *Scillae*, *Bryoniae*, illae opportuna tempestate collectae, sabulo sicco reconditae, servantur.

III. LIGNA. CORTICES. STIPITES.

ALOES. AGALLOCHUM. Paradiſtra. Paradiſholz.

Agallochi LIGNUM, in Siamensi, Cambodiae & Sinenſi regnis reperiundum. Seligantur frusta solida, densa, resinosa, nigro-purpurea, ponderosa, amara; odoris, dum accenduntur aut durius perfricantur, fragrantis. Raro genuinum adfertur.

ASPA-

ASPALATHUM OFFICINALE. Rhodisertra. Rhodisertra
dornholz.

Aspalathi Linn. Mat. med. 524. LIGNI fragmenta resinosa,
Ligno Aloes leviora, laxiora & pallidiora, ex India orientali
advecta.

AURANTIORUM CORTEX. Vid. Fructus.

BUXI. Buxbomtra. Buxbaumholz.

Buxi LIGNUM.

CAMPESCANUM. Campefetra. Campeschenholz.

Haematoxyli Campefcani LIGNUM durum admodum &
compactum; coloris rubri; saporis dulcis, adstringentis.

CASCARILLAE. ELEUTHERII. Kassarille. Schaccarille.

Croton Cascarillae? CORTEX ex America allatus, coloris
extus cinerei, intus e ferrugineo fusci, quem etiam comminutus
scruat; saporis amari, multum aromatici; odoris, inprimis cum
incenditur, gratissime fragrantis. Praestat ponderosus, diffractus
particulis resinosis splendens.

CASSIAE CARYOPHYLLATAE. Nellikabarck. Nellikens
rinden. Nellikenszimnt.

Myrti caryophyllatae in India occidentali provenientis,
CORTEX tenuis, ex ruffo ferrugineus, in modum tubuli convo-
lutus, saporis & odoris caryophyllacei.

CASSIAE LIGNEAE. Moderkaneelbarck. Mutterzimnt.

Lauri Cassiae CORTEX, Cinnamomi similis, sed odore,
sapore, virtute debilior, ex Malabaria allatus.

CINNAMOMI. Kaneel. Zimnt. Caneel.

Lauri Cinnamomi CORTEX interior. Laudantur cortices
tenelli, tenues, longe cannulati, coloris e croceo laete fulvi,
D 3 fragran-

fragrantes; saporis acris aromatici, cum multa dulcedine & parco adstrictionis sensu.

CITRI CORTEX. Vid. Fructus.

CULILAVAN. Bedste Kaneelbarf. Bittere Zimmetrinde.
Arboris amboimensis CORTEX, pennae anserinae crassitiem vix aequans; odoris fortiter caryophyllacei; saporis admodum aromatici, mucilaginosi, subadstringentis; coloris extus dilute grysei, intus pallide rubri, lateritii.

DULCAMARAE. Bittersøde. Hundebær. Troldbær. Snipplyng. Bittersüß. Alfanken.

Solani Dulcamarae, ad fossas, & in locis paludosis habitantis, STIPITES, vel potius Cortex radices & ligni.

FRANGULAE. Torstetra. Brakald. Olsuekhæg. Troldæg. Hundehæg. Troldfierringhæg. Hundveed. Faulbaum. Hundesbaum. Zapfenholz.

Rhamni Frangulae CORTEX medius. Praestat radicem Cortex flavescens, amaricans. Fl. Dan. 278.

FRAXINI. Afl. Eschenbaum.

Fraxini excelsioris CORTEX ex cinereo pallefcens, ad viriditatem inclinans; saporis acris, amari, adstringentis.

GRANATORUM CORTEX. Vid. Fructus.

GUAJACI. Poffentra. Guajac. Franzosenholz.

Guajaci officinalis LIGNUM & CORTEX; illud extus fulvum, intus obsolete viride; hic e cinereo fuscus & e viridi variegatus, minus ligno efficax. Utrumque quo magis est ponderosum & resinofum, eo est melius. Sapor fit amarus, subacer, parum aromaticus. Carbonibus injectum non ingratum spargat & aromaticum odorem. Subfidat in aqua. Quod coloris dilutio-

ris

ris est, exoletum & verustum habeatur. Adfertur e nova Hispania & Insulis Americae.

JUNIPERI. Enebartra. Jenbartra. Enc. Ener. Cine. Briff. Bruse. Nædka. Goffas. Wacholderholz.

Juniperi communis LIGNUM album, solidum, fragrans, aut trunci aut radice. Lignum radice, quippe odoratum magis & efficax, priori praeferendum est.

PERUVIANUS. CHINACHINAE. Kina. Chinarinde. Sierberrinde.

Cinchonae officinalis CORTEX, ex America australi advectus. Variæ dantur species: e rubro ferruginea (Cascarilla colorada); e Cinnamomeo ruffa (Cascarilla amarylla); alba, crassa, fungosa (Cascarilla blanca); externe denique alba, intus cinnamomea, quæ vilissimi species frigidiori sub cælo germinat (Cascarilla crespilla). Utraeque priores adhibeantur, rejiciantur vero duæ posteriores. In selectu autem cautissime versandum est. Sapor sit amarus cum adstrictione aliqua, diu linguae inhærente, inprimis vero sapore suo specifico mucido se distinguat. Non sit parum fapidus, neque saporis viscidus, neque impense stypticus & nauseosus amarus, uti occurrit in specie viliori, aliarum arborum corticibus remixta, & subinde Aloes solutione imbuta. Odor sit paulum aromaticus, specificè mucidus, quem notabilem exhibet affusa pulveri aqua bulliens. Non vero nullus sit, neque putridus, nauseosus odor, quem spargit haud rite siccatus, aut in navi madefactus & corruptus Cortex. Tenuis sit, certe crassitudinis mediae; gravis tamen pro voluminis ratione. Neque laevis sit facies externa & quasi polita: sed scabra, subfusca, & Lichene albo cinereo hinc inde obducta; non nigra, qui corrupti Corticis color; neque pallide flava, qui Blancae & Crespillae esse suevit; neque lacte rutilans, cujusmodi de aliis arboribus deglubitur.

bitur. Internus color sit paucillum Cinnamomo obscurior, magisque obsoletus aut ferrugineus. Digito tentatus non tenax sit aut fungosus, neque in fibras lignosas decerpatur, aut in farinam cariosam dehiscat; sed compactus sit, aequaliter fragilis, & ad solem moleculis micantibus resplendeat. Decoctum Corticis aquosum, adhuc calidum vitro inditum ruffescat, frigefactum vero pallefcet. Lignum Cortici forte adhaerens, studiose separandum est. Qui in pulvere aliunde advehitur, propter admistas particulas lignosas, fibrosas, pilorum instar suspectus, rejiciatur.

QUASSIAE. Quassebark. Surinamisches Bitterholz.

Quassiae amarae LIGNUM subalbidum, compactum & valde amarum.

RHAMNI CATHARTICI. CERVISPINAE. Rorsbartorn. Brietorn. Bigretorn. Viebartorn. Hiortetorn. Tyttelbartorn. Træet hvorved Fanden flaaede Gieten. Creusbeer. Weichdorn.

Rhamni cathartici CORTEX.

RHODIUM. Rosentræ. Rosenholz.

Genistae canariensis LIGNUM radice durum, resinofum; saporis subamari. Eligatur ponderosum, odoris fragrantis, rosei.

SALICIS ALBAE. Hvid Piil. Weisse Weiden.

Salicis albae CORTEX.

SAMBUCI MEDIUS. Hylb. Hollunder-Rinde.

Sambuci nigrae CORTEX verno tempore detrahendus medius, qui externum cineritii coloris sequitur, viridis.

SANTALI FLAVI. Guul Sandel. Gelber Sandel.

Santali albi LIGNUM ex Indiis advectum, coloris eleganter citrini, densum, ponderosum, resinofum; odoris grati, ex Moscho & Ambra confusi; saporis amari, aromatici.

SAN-

SANTALI RUBRI. Rod Sandel. Rotes Sandelholz.

Caesalpiniae speciei LIGNUM ex America allatum, pro tingendo inserviens. Sit saporis acerbi, adstringentis; coloris sanguinei.

SASSAFRAS. Sassafras. Zenchelholz.

Lauri sassafras LIGNUM cum Cortice. Lignum sit obsolete rubrum, leve, spongiosum; odoris Foeniculi, tectum cortice ferrugineo aspero; saporis Foeniculi, sed validioris. Prunis injectum crepitet instar Salis communis. Vis major inest frustis ramusculorum inprimis radicis parvis, dilutioris coloris, quam trunci majoribus. Advehitur ex America.

SIMARUBAE. Simarube. Simarube. Rührinde.

Arboris Pistaciae similis CORTEX ex Gujana advectus, tum trunco, tum radici detractus. Qui a radice deglubitur, praestantior est, & fibris succis distinguitur. Est coloris dilute gilvi, tenax & flexilis fere ac sequax; saporis amaricantis & leniter adstringentis. Pars lignosa adhaerens, ut iners, abjiciatur; neque vetustior, lignosus & obscuri coloris Cortex servandus est.

TAMARISCI RADICIS. Slaaveed. Tamarissen Rinde.

Tamaricis Gallicae radicis CORTEX tenuis; coloris obscure fusci, intus ferruginei; saporis austeri, amari, adstringentis.

THURIS. THYMIAMATIS. Sort Birakbarf.

Wehbrauch = Rinde. Juden = Wehbrauch.

Styracis Thymiamae CORTICES coloris ferruginei; saporis acris, aromatici & amari; odoris suavis, ad Styracis & Balsami Peruviani accedentis. Praeferuntur Cortices pingues, odorati, crassiores. Ex India orientali advehuntur.

VISCUS QUERNUS. Fugleslim. Mestertienc. Wintergront med smale Blade. Eichenmistel.

Visci albi parafiti quercuum aliarumque arborum LIGNUM cum CORTICE, FOLIIS & BACCIS. Vetustius Viscum, utpote adstringens & balsamicum, juniore praestat.

WINTERANUS. *Sviid Caneel*. Wintercinde.

Winteranae Canellae CORTEX externe cinereus, interne coloris Cinnamomeo parumper obscurioris, compactus; saporis peracris aromatici; odoris non ingratis aromatici. E Terra Magellanica adfertur.

CANONES GENERALES.

I. STIPITES versus Autumnum, quo tempore succo efficaci, probe cocto scitent, refecentur.

II. CORTICES e fruticibus Autumnum; ex arboribus adulta hyeme, accedente vere, deglubantur.

III. LIGNA hiberno succidantur tempore.

IV. HERBAE. FOLIA. GEMMAE.

ABROTANI. *Abrod.* *Eberraute*. *Stabwurkfraut*.

Artemisiae Abrotani HERBA in hortis culta.

ABSINTHII. *Malurt.* *Wermuth*.

Artemisiae Absinthii HERBA, in ruderatis, aridis proveniens, Augusto colligenda.

ABSINTHII ROMANI. *Romerst Malurt.* *Römischer Wermuth*.

Artemisiae Ponticae HERBA, gratior vulgari, in hortis culta, in Hungaria & Pannonia habitans.

ACETOSAE. Syre. Sauerampf.

Rumicis Acetosae FOLIA recentia, primo vere colligenda.

ACETOSELLAE. Suurklever. Giogemad. Giogeurt.
Sauerflée.

Oxalidis Acetosellae HERBA recens.

ACONITI. Stormhat. Blaamunke. Munkehätte.
Narrenkappen. Münchekappen. Eisenhütlein. Blauer Sturmhut.

Aconiti Napelli HERBA recens, plerumque in hortis culta,
sed in Seelandia & Lalandia etiam sponte crescens, Julio
colligenda.

AGERATI. EUPATORII. Leverbalsamurt. Lebensbalsamkraut.

Achilleae Agerati HERBA, Galliae Narbonensis & Hetruriae
indigena, in hortis culta.

AGRIMONIAE. Agermaane. Rattestiert. Swine-
rumpe. Nakermennig. Odermennig.

Agrimoniae Eupatoriae HERBA, in pratis apricis argillaceis
crescens, Junio colligenda.

ALCHIMILLAE. Synab. Lovesod. Bor Frue Raabe.
Raapegras. Marikaabe. Maristak. Simnan. Löwenfuß.
Frauenmantel. Grosse Saniel.

Alchemillae vulgaris FOLIA, in pascuis & pratis humidis
crescentia, Majo colligenda.

ALTHEAE. Althee. Eibischkraut. Heilkraut.

Althaeae officinalis FOLIA, in hortis culta & sponte hinc inde
provenientia, Julio colligenda. Flor. Dan. 530.

ANAGALLIDIS. Rodarve. Gaaseheel. Grine ved
Dag. Grine ved Middag. Gauchheil. Vogelkraut.
Hånerdarm.

Anagallidis arvensis FOLIA & flores, Julio colligenda.
Flor. Dan. 88.

ANSERINAE. POTENTILLAE. Gaaseurt. Gånserich.
Siberkraut.

Potentillae Anserinae HERBA, Junio mense colligenda, in
pascuis & argillosis proveniens. Flor. Dan. 544.

ANTIRRHINI. Torsteflab. Hundehoved. Löwenmäu-
terkraut.

Antirrhini orontii HERBA, in agris & arvis crescens,
Junio colligenda.

ARNICAE. DORONICI MONTANI. Bolserley. Guld-
blomme. Hestblomme. Gionsockblomme. Hestsolvie.
Stoksvæve. Dillfonge. Gallkraut. Wasserley.

Arnicae montanae HERBA cum FLORIBUS, quae e mon-
tuoſis Bohemiae & Saxoniae locis allata, propter validiorem odo-
rem, alibi crescenti praefertur. Non confundenda est cum
Conyza media, *Astere flore luteo* (*Inula dysenterica*). *Arnicae*
folia magis sunt ovata, integra nervosaque, *Plantaginis* instar;
Conyzae vero oblonga, subromentosa. Flor. Dan. 63.

ASARI. Hasselurt. Haselwurzkraut.

Asari Europaei FOLIA, in dumeris & circa radices Corylo-
rum perpetuo virentia, in Scania crescentia, Majo & Junio
colligenda.

ASPENIL. Eiden Hiortetunge. Klein Hirschjungen.
Milskraut.

Asplenii Ceterach HERBA, in Italia & Wallia proveniens.

AURAN-

AURANTIORUM. Pomerantzblade. Pomeranzenblätter.
Citri Aurantii FOLIA.

BASILIC. Basilken. Basilienkraut.
Ocymi Basilici HERBA, in hortis proveniens.

BECCABUNGAE. Lemmike. Ledmye. Beckbung.
Bachbungenkraut.

Veronicae Beccabungae HERBA recens, ad rivulos habitans. Flor. Dan. 511.

BELLADONNAE. Natssade. Nachtschatten. Tollbeeren.
Atropae Belladonnae FOLIA, in hortis culta, Austriae & Angliae indigena, cum cautela seorsim siccanda, cavendo ne quid aliis herbis immisceatur. Proveniunt pariter in Falstria, & Junio colliguntur.

BETONICAE. Batonic. Batonien. Zehrkraut.
Betonicae officinalis FOLIA, Junio mense colligenda.

BONI HENRICI. Stolte Henrif. Aldgode. Guter Heinrich. Schmerbel.

Chenopodii Boni Henrici HERBA recens, in ruderalis crescens, Majo colligenda.

BORRAGINIS. Borrasurt. Borretschkraut.
Borraginis officinalis HERBA, in hortis culta.

BRANCAE URSINAE VERAЕ. Biernelabbe. Biorneslov.
Bärenflauen. Bärentragenkraut.

Acanthi mollis HERBA, in pratis humidioribus proveniens, Junio colligenda.

BUGLOSSI. Dytunge. Dychsenzungenkraut.

Anchusae officinalis FOLIA & FLORES, ad ruderalia, vias, agros, Majo colligenda.

CAPILLI VENERIS. Venushaar. Frauenhaar.

Adianthi Capilli Veneris HERBA, ex Italia & Gallia Narbonensi allata.

CARDUI BENEDICTI. Corbenedikt. Cardobenedikten.

Cnici Benedicti HERBA, in hortis culta, colligenda quo tempore flores protrudere coepit.

CHAEREFOLII. Kervel. Kyvel. Kerbel.

Scandicis Ceresfolii HERBA recens, in hortis omni, qua fieri potest tempestate colenda, sicca etiam servanda.

CHAMAEDRYOS. Gamanderurt. Gamanderlein.

Teucris Chamaedryos HERBA, folio ovato inciso crenulato petiolato, cujus loco non raro in officinis servatur *Veronica Chamaedrys*; odore Chamaedryos orbata, in pratis proveniens. Majo colligatur.

CHAMAEPITYOS. IVAE ARTHRITICAE. Schlagurt.

Schlagkraut. Je länger je lieber.

Teucris Chamaepityos HERBA, in hortis culta, Italiae, Galliae, Angliae, Hungariae & Helvetiae indigena; odoris balsamici terebinthinacei.

CHELIDONII MAJORIS, Svalcurt. Selidon. Groß

Schellkraut. Schwalbenkraut.

Chelidonii majoris HERBA, in ruderatis germinans, recens modo in usum vocanda, cum siccata nullarum virium sit. Flor. Dan. 542.

CICUTAE TERRESTRIS. Skarntyde. Schierling.

Comi maculati HERBA, in agris, ruderatis crescens, mensibus Junio & Julio, antequam flores protrudit, colligenda, caule laevi, glabro, maculato, foliis obscure viridibus, singularis foetoris, a reliquis Cicutae speciebus distinguenda. Pro Emplastro confi-

conficiendo, praefertur merito a Linnaeo *Cicuta aquatica* Wepferi Flor. Dan. 208.

COCHLEARIAE. Skeurt. Strandfskeurt. Skiorbugurt. Cochlearie. Finmarkkaal. Stort Erichsgræs. Bøffelkraut.

Cochleariae officinalis HERBA recens. Flor. Dan. 135.

CONSOLIDAE MAJORIS. Kulsukkeurt. Kongsalveurt. Wallwurfskraut.

Symphyti officinalis HERBA, in locis humidis, circa fossas pratorum proveniens, Majo colligenda.

CONSOLIDAE REGALIS. CALCATRIPPAE. Ribderspore. Hanespore. Blaa Hanefod. Wilder Rittersporn.

Delphinii Consolidae HERBA, in agris proveniens, Junio colligenda.

CUSCUTAE. Stor Hørsikke. Flachseiden. Silskraut.

Cuscutae Europaeae HERBA, Augusto colligenda. Flor. Dan. 199.

DATURAE. STRAMONII. Galurt. Stechapsel. Tollkraut. Stachelnuß - Kraut.

Daturae Stramonii HERBA. Flor. Dan. 436.

DICTAMNI CRETICI. Diptam. Cretischer Diptam.

Origani Dictamni FOLIA ex Creta advecta, tomentosa, recentia, odorata. Pro Theriaca modo adhibentur. Recentia Folia praestans exhibent Oleum essentiale.

EQUISETI MINORIS. Studesna. Næverumpe. Hakenwedel. Schaafheu. Zinnkraut.

Equiseti arvensis HERBA, in pratis & agris crescens, Junio colligenda.

ERYSIMI. Bild Senep. Wilder Wegsenf.
Erysimi officinalis HERBA, in ruderatis habitans, Majo
 colligenda. Flor. Dan. 560.

EUPHRASIAE. Dientrost. Augentrost.
Euphrasiae officinalis HERBA, Julio colligenda.

FUMARIAE. Jordrog. Aker Sissel. Erdrauch.
 Taubentropf.
Fumariae officinalis PLANTA recens, in agris reperiunda,
 Majo colligenda.

GALLII LUTEL. Trættegræs. Klammerurt. Marie
 Senghalm. Guul Mour. Tomfrue Marie Sengfoor.
 Marie Fægre. Opskreed Fægre. Meyerkraut. Waldstroh.
 Bettstroh.

Gallii veri HERBA, in rudetis crescens, Junio & Julio
 colligenda.

GENISTAE. Gyel. Gysvel. Ginster. Giensten.
Spartii scoparii HERBA, in arenosis proveniens, Junio
 colligenda. Flor. Dan. 313.

GENTIANELLAE. Lidén Enzian. Kleiner Enzian.
Gentianae Amarellae HERBA, in pratis habitans, Julio
 colligenda. Flor. Dan. 328.

GERANII MOSCHATI. Desmerstorkeneb. Bisamkraut.
Geranii cicutarii HERBA, in sterilibus proveniens, quae
 cum vires facile perdit, quotannis recens colligenda, mensē
 Majo.

GERANII ROBERTIANI. Robertskurt. Stinkende
 Storkeneb. Stinkende Skovslock. Stinkender Storch-
 schnabel.

Geranii

Geranii Robertiani HERBA, in rupibus borealibus crescens, recens quotannis Majo colligenda.

GRATIOLAE. Gudēnaadesurt. Gottesgnadenkraut.

Gratiolae officinalis HERBA, in uliginosis humidisque crescens, recens quotannis colligenda. Flor. Dan. 363.

HEDERAE TERRESTRIS. Jordvedbende. Gundermann. Huder.

Glechomae hederaceae HERBA, ad sepes & aggeres ubique obvia, Aprili colligenda.

HEPATICAE NOBILIS. Adelsklesver. Edel-Leberurt. Blaa Simmer. Leberkraut. Guldentlee.

Anemones hepaticae FOLIA, in sylvis & dumetis provenientia, Aprili colligenda.

HERNIARIAE. Pisseurt. Harnkraut. Bruchkraut.

Herniariae glabrae HERBA, in apricis, glareosis, siccis crescens, Junio & Julio colligenda. Flor. Dan. 529.

HORMINI. Skarleurt. Scharlachkraut.

Salviae Hormini HERBA, in hortis culta.

HYOSCYAMI. Fandensnoffer. Fandenspunger. Hensebane. Bulmeurt. Horsetænder. Soebonne. Bilsenkraut.

Hyoscyami nigri HERBA, in ruderatis, pinguibus proveniens, Julio colligenda, recens, pro Emplastro & Extracto.

LAURI. Loorbærblade. Lorbeerblätter.

Lauri nobilis FOLIA recentia, fortiter olida, non effoeta, coloris obsolete flavi, e gilvo olivaris.

LINARIAE. Horurt. Bildhor. Torffemund.
Torffeslab. Stranneblom. Dödningshöved. Veinfrant.
Stallfrant.

Antirrhini Linariae FOLIA, in ruderatis provenientia,
Julio colligenda.

LINI CATHARTICI. Bildhor. Purgeerliin. Purgier-
flachs. Klein Veinfrant.

Lini cathartici HERBA, in pascuis montosis Julio &
Augusto florens.

LINNEAE. Marissegæs. Marissegæs. Maris-
segæs. Noretsegæs.

Linnae borealis HERBA, ex Suecia & Norvagia adve-
niens. Flor. Dan. 3.

MAJORANAE. Meiran. Mirrian Majoran.

Origanum Majoranae HERBA, in hortis culta.

MALABATHRI. FOLIA INDI. Indianiske Blade.
Indianiske Blätter.

Lauri Cinnamomi FOLIA, ex Malabaria advecta, oblonga,
acuminata, densa & glabra, a pediculo ad apicem tribus
nervis excurrentibus; odoris grati; saporis aromatici. Pro
Theriaca requiruntur.

MALVAE. Ratteost. Käsepappel.

Malvae rotundifoliae FOLIA, mense Majo collecta, non
multum adulta.

MARI VERI, SYRIACI. Marumverum. Amber. Ma-
firkeant.

Teucrii Mari FOLIA cum petiolis & stipitibus, ex Hispa-
nia allata. Recentia eligantur & fragrantissima, non exoleta,
neque

neque petiolis & stipitibus multis scatentia. Electa in cista plumbo munita probe obturata ferventur.

MARRUBII ALBI. PRASII. Marrube. Weisse Andorn.
Marrubii vulgaris HERBA, ad sepes & in rudetis luxurians, Augusto & Septembri colligenda.

MATRICARIAE. Matrem. Mutterkraut.
Matricariae Parthenii HERBA cum floribus, in ruderatis & cultis crescens, Junio colligenda.

MATRISYLVAE. Skodmerke. Mysike. Bokar.
Bugar. Myske. Waldmeister.
Asperulae odoratae HERBA, in umbrosis proveniens, Majo colligenda.

Nota. Folia Matrysilvae cum Meliloti floribus mixta, gratissimum constituunt Errhinum.

MELISSAE CANARIENSIS. Canarisk Hiertensfryd.
Canarische Melisse.

Dracocephali Canariensis HERBA.

MELISSAE CITRATAE. Citron-Melisse. Citron-Melisse.
Melissae officinalis HERBA, junior & antequam verticillos florentes emittat colligenda. Colitur in hortis.

MELISSAE TURCICAE. Tyrkisk Melisse. Türksche Melisse.

Dracocephali Moldavicae HERBA, quae pro oleo stillatio parando requiritur.

MENTHAE CRISPAE. Krusemynte. Krausemünze.
Menthae crispae HERBA, colligenda antequam spicam florentem protrudat. In hortis provenit.

MENTHAE PIPERITIDIS. Pebermynte. Pfeffermünze.
Menthae Piperitae HERBA, in hortis culta.

MENTHASTRI. Akermynte. Bildmynte. Hørsemynthe.
 Agermynte. Kornmynte. Bild-Poley. Bachmünze.
Menthae arvensis FOLIA, in agris provenientia, Julio
 colligenda. Flor. Dan. 484.

MERCURIALIS. Hanbingel. Bingelurt. Bengelkraut.
 Hundskohl.

Mercurialis annuae FOLIA, in hortis & campis prove-
 nientia, Aprili colligenda. Flor. Dan. 400.

MYRRHIDIS MAJORIS. CICUTARIAE ODORATAE. Bes-
 lugtende Korbel. Wostriechender Kerfel.

Scandicis odoratae HERBA, in hortis culta, Junio florens.

NASTURTHI AQUATICI. Vandkarse. Brunnenkress.
Sisymbrii Nasturtii aquatici HERBA recens.

NEPETAE. Katteurt. Sissenbrant. Katzenmünz.

Nepetae catariae FOLIA, in rudetis provenientia, Julio
 & Augusto colligenda.

OREOSELINI. SESELI. DAUCI. Wilde guule Roder.
 Grundheil. Bergpetersilien.

Atkamantae Oreoselini HERBA, in collibus apricis ger-
 minans, Junio colligenda.

ORIGANI. Bild Meiran. Tostkonning. Rospons.
 Skaarekonge. Bergkonge. Bergmynte. Skovmynte.
 Skarmynte. Klevhumle. Bildmynte. Brauner Dosten.
 Winter-Majoran.

Origani vulgaris HERBA, in dumetis crescens, Julio
 colligenda.

PARIETARIAE. Dag og Nat. St. Pedersurt. Tag-
and Nacht-Kraut. St. Peterskraut. Nachtkraut.

Parietariae officinalis FOLIA, in ruderatis crescentia, Ju-
lio colligenda. Flor. Dan. 521.

PERSICAE. Pferskeblade. Pfersichblätter.

Amygdalae Persicae FOLIA tenella.

PETROSELINI. Persille. Petersilie.

Apii Petroselini HERBA recens, quamdiu obtineri poterit.
Servetur pariter sicca.

PHYTOLACCAE.

Phytolaccae Americanae HERBA, in hortis culta.

PINGUICULAE. SANICULAE MONTANAE. Biibefit.
Haarvart. Sættegræs. Melkeførs. Butterblume. Butters-
kraut. Sivittsfett.

Pinguiculae vulgaris HERBA, in uliginosis proveniens,
Majo colligenda. Flor. Dan. 93.

PINI, vulgo STROBILI. TURIONES. Granfnopper.
Junge Tannenknochen.

Pini Abietis tenelli e frondibus APICES, non nisi recen-
tes mense Majo adhibendi. Flor. Dan. 193.

PLANTAGINIS MAJORIS. Veibred. Faarefunge.
Groblad. Groebloffe. Wegerich. Fünfsaderblatt.

Plantaginis latifoliae FOLIA, mense Majo colligenda.
Flor. Dan. 461.

POLII CRETICI. Kretisk Poley. Cretischer Berg-Poley.

Teucii Cretici HERBA cum floribus, in Creta insula
proveniens. Eligenda recens odorata.

POLYGALAE. Raarsblomster. Creuzblumen.

Polygalae vulgaris HERBA vel planta tota, in pratis & pascuis ficcis proveniens, Majo & Junio colligenda. Flor. Dan. 516.

POLYGONI. Weigræs. Hundrede Knuder. Hønsgræs. Wegtritt. Weggræs. Blattkraut. Saukraut.

Polygoni avicularis HERBA, in cultis ruderatis habitans, Julio colligenda.

POPULI OCULL. Pappelspil. Pappelnospen.

Populi nigrae GEMMAE nondum evolutae, succo flavescente balsamico turgidae, Aprili mense decerptae. Praestant recentes.

PRUNELLAE. Brunell. Kierringrock. Blaa-kolle. Blåale. Gøtthensl. St. Antonikraut.

Prunellae vulgaris FOLIA, in pascuis provenientia, Junio colligenda.

PULEGII. Poley. Poley.

Menthae Pulegii HERBA, Junio & Julio colligenda. In hortis colitur.

PULMONARIAE MACULOSAE. Lungurt. Flecken-Lungenkraut.

Pulmonariae officinalis FOLIA, in nemoribus crescentia, Aprili & Majo colligenda. Flor. Dan. 482.

PYROLAE. Wintersilie. Bundsilie. Wintergrün. Holz- oder Wald-Mannold.

Pyrolae rotundifoliae HERBA, Janio & Julio colligenda. Flor. Dan. 110.

QUERCUS. Egeblade. Eichenlaub.

Quercus roboris FOLIA tenella.

RANUN-

RANUNCULI VESICATORII. Froernes Peyer. Wand-
peber. Brennender Hahnenfuß.

Ranunculi flammulae HERBA, in paludosis germinans;
recens in usum vocanda.

RIBIS NIGRAE. Soelbarblade. Schwarz Johannisbeerens-
blätter.

Ribis nigrae GEMMAE, cum nidore graveolentes, quae
praecisis stipitibus vel ramusculis, integrae siccantur. Flor.
Dan. 556.

RORIS SOLIS. Soeldug. Himmeldug. Vortegræs.
Diengræs. Ringormgræs. Luusegræs. Duggræs.
Lettegræs. Sonnenhan.

Droserae rotundifoliae HERBA, in humidis & palustribus
inter muscos proveniens, Junio mense colligenda.

ROSMARINI. Rosmarin. Rosmarin.

Rosmarini officinalis FOLIA, in hortis culta.

ROSMARINI SYLVESTRIS. Wild Rosmarin. Wildes
Rosmarin. Heidebienen-Kraut. Post.

Ledi palustris FOLIA, in paludibus uliginosis provenien-
tia, Junio colligenda; non confundenda cum foliis *Myricae*
Gale.

RUTAE. Rude. Raute. Wein-Raute.

Rutae graveolentis HERBA, recens imprimis adhibenda.
In hortis colitur.

SABINAE. Sevenbom. Sadenbaum. Sevenbaum.

Juniperi Sabinæ FOLIA, vel potius frondium apices,
verno imprimis tempore collecti, siccati. In hortis coluntur.

SALICARIAE. Ratturt. Bokkeblade. Drauner Weiderich. Blauer Fuchschwanz.

Lythri Salicariae HERBA, ad ripas proveniens, Julio & Augusto colligenda.

SALVIAE. Salsie. Salven.

Salviae officinalis FOLIA adultiora, quae efficaciora.

SAMBUCI TURIONES. Hyldekopper. Gliederknospen. Holunderknospen.

Sambuci nigrae GEMMAE.

SANICULAE. Sanikel. Sanifel. Bruchkraut.

Saniculae Europaeae FOLIA, in sylvis & montosis provenientia, Majo colligenda. Flor. Dan. 283.

SAPONARIAE. Flessurt. Sæbeurt. Seiffenkraut.

Saponariae officinalis HERBA, in arenosis juxta rivulos & torrentes nascens, Junio, dum floret, colligenda. Flor. Dan. 543.

SATUREJAE. Sat. Saturey. Garten-Ysop. Bohnenkraut.

Saturejae hortensis HERBA, Augusto mense colligenda.

SCABIOSAE. Skabios. Skaburt. Blaaht. Skotten. Rodknep. Scabiosen. Apostemkraut.

Scabiosae arvensis FOLIA, in pascuis & ad margines agrorum provenientia, Junio & Julio colligenda. Flor. Dan. 447.

SCHOENANTHI. Kameelstraa. Cameelheu. Cameelstrof.

Andropogonis Schoenanthi HERBA ex Arabia allata. Eligatur spicis instructa, saporis acris, amaricantis, suavis; odoris fragrantis. Pro Theriaca modo inservit.

SCLAREAE. Graakuse. Scharlachkraut.

Salviae Sclareae HERBA, in hortis culta.

SCOLOPENDRII. LINGUAE CERVINAE. Hiortetunge.
Hirschzungen.

Asplenii Scolopendrii FOLIA, in hortis & hinc inde
sponte provenientia.

SCORDII. Skordium. Logsburt. Rachenknoblauch.

Teucris Scordii HERBA, in paludosis germinans, Junio
colligenda.

SEMPERVIVI. SEDI MAJORIS. Huuslog. Huuslok.
Hauslauch.

Sempervivi Tectorum FOLIA recentia, pro succo expri-
mendo Julio mense colligenda.

SENECIONIS. Kaarsurt. Swineblom. Kong
Henrik. Mester Henrik. Flinken Henrik. Kreuz-
wurzkrout. Grindwurzkrout. Goldkrout.

Senecionis vulgaris HERBA, in cultis, ruderatis, succu-
lentis germinans, Aprili colligenda. Flor. Dan. 513.

SENNAE. Semsblade. Senne. Semsblätter.

Cassiae Sennae FOLIA, ex Arabia, aut Alexandria ad-
vecta. Sint e luteo subviridia, parva, subovata, in apice
multum acuminata, molliuscula tactu, non ingrate olentia;
saporis subacris, amari, aliquantum nauseosi. Impura, macu-
lata, prorsusque flava rejiciantur. Virtute ad Sennam
Alexandrinam accedit, sed nullo modo aequat, *Senna Tripo-
litana*, cujus folia elegantius sunt viridia, non adeo acumi-
nata & digito tentanti subhirsuta videntur. Deterioris adhuc

notae est *Senna Itala*, cujus folia latiora, obtusiora, laetius virentia, saporis subdulcis sunt & glutinosi.

SERPILLI. Bild Thymian. Bor Frue Sengehalm. Quendel. Marien Bettstroh.

Thymi Serpilli HERBA florens, Junio & Julio colligenda. In apricis & aridis habitat.

SOLANI. Svineurt. Soyber. Nachtschatten. Saukraut.

Solani nigri FOLIA recentia, inter Brassicam provenientia, Junio colligenda. Flor. Dan. 460.

SPIGELIAE. Americanst Ormeurt. Americanisches Wurmkraut.

Spigeliae anthelmiae PLANTA tota, e Jamaica & insulis Gallicis in America, Domingo & Martinica, ut & Danica S. Crucis, vel etiam e Brasilia, ubi sponte crescit, petenda.

TABACI. Toback. Toback.

Nicotianae Tabaci FOLIA, probe sicca, flava, nondum contorta.

TARAXACI, DENTIS LEONIS. Lovetand. Vid. Radix. Pfaffenröhrchen Hundeslume.

Leontodos Taraxaci PLANTA omnis cum radice, recens in usum vocanda.

TERTIANARIAE. Feberurt. Eiden Fredlos. Blaä Stierneurt. Fieberkraut.

Scutellariae galericulatae HERBA, in humidis proveniens, Junio & Julio colligenda.

THLASPI ARVENSIS. Pengeurt. Pengegras. Pfeningkraut. Klaffer.

Thlaspi

Thlaspi arvensis HERBA, in agris proveniens, Majo colligenda.

THYMI VULGARIS. Thymian. Thymian.

Thymi hortensis HERBA.

TRIFOLII FIBRINI. Buffleblade. Besse Klever. Gedeklov. Bitterklee. Dreyblatt.

Menyanthis trifoliatae FOLIOLA tenera, adhuc convoluta, succo lactescente saponaceo turgida, mensibus Majo & Aprili in pratis colligenda. Flor. Dan. 541.

TUSSILAGINIS. Hestehov. Vid. Radix. Husstättch.

Tussilaginis Farfarae, in humidis provenientis FOLIA, non adeo adulta, Majo mense colligenda.

VERBENAE. Zernurt. Hofveurt. Eisenkraut. Taubenkraut.

Verbae officinalis HERBA, juxta sepes & muros crescens, Junio & Julio colligenda.

VERONICAE. Veronica. Wrenpriis. Barsleik. Flesmegræs. Norss Thee. Ehrenpreis.

Veronicae officinalis HERBA, in arboretis & dumetis, siccoque in solo germinans, strigoso tomentosa; his notis ab aliis Veronicæ speciebus distinguenda, Junio & Julio colligenda. Flor. Dan. 248.

VIRGAE AUREAE. CONSOLIDAE SARACENICAE. Gyldebundurt. Edelsbundurt. Guldriis. Gylbenriis. Sougræs. Afeloje. Heidnisch Wundkraut.

Solidaginis virgae aureae HERBA, in pascuis ficcis proveniens, cum Coma florente Augusto mense colligenda.

URTICAE MINORIS. Nælde. Brende. Nott. Bren-
dehätte. Brennesseln. Heiter-Nesseln.

Urticae urentis HERBA Junio colligenda.

UVAE URSI. Meelbar. Meelbarrus. Mielbar.
Mielnebar. Sandbeere.

Arbuti Uvae Ursi FOLIA oblongo-ovata, ad basin an-
gustissima, subtus venis obscurioribus praedita; his notis di-
stinguenda a *Vaccinio Vitis Idaea*, de qua vid. *Fructus*.
Flor. Dan. 33.

VULVARIAE. Staggan. Wuhkraut. Wuhkraut.

Chenopodii Vulvariae HERBA, in cultis oleraceis habitans.

CANONES GENERALES.

I. TURIONES Gemmaeque primo vere, quo tempore
turgidulae sunt & ante explicationem foliorum decerpantur.

II. HERBAE colligantur adultae cum foliis rite expansis,
antequam flores sese explicuerint. Quae semper virent, quo-
vis tempore colligere licet, vernum tamen praestat.

III. FOLIA colligenda sunt tempestate sicca, non diu
post ortum solis, simulac rorem, quo nocte canescunt plan-
tae, Solis radii dissipaverint. Decerpantur vero postquam
deffloruit & antequam maturuit planta.

IV. HERBAE indigenae quotannis recentes comparari
debent. Effoetae superstites pro Sale Alcali Herbarum pa-
rando adhiberi possunt.

V. Ex-

V. EXSICCATIO Herbarum citissime fiat, aut calido, umbroso & ab aere perflato loco, aut lento cautoque fornacis calore.

V. FLORES ET COMAE FLORIDAE.

ACACIAE NOSTRATIS. Slaatornblomster. Kreigeberblomster. Schleblütze.

Pruni spinosae FLORES, Aprili mense colligendi.

ANTHOS. Rosmarinblomster. Rosmarinblütze.

Rosmarini officinalis FLORES, vel potius COMA florens.

ARNICAE. Wolferley. Vid. Herba. Wolferley.

Arnicae montanae FLORES papposi. Flor. Dan. 63.

ARTEMISIAE. Bynke. Graabynke. Graabonne. Buggræs. Bue. Buegræs. Graabue. Bysfus.

Artemisiae vulgaris COMA florens, in cultis & ad sepes habitans, Julio colligenda.

BALAUSTIORUM. Granatblomster. Granatblütze.

Punicae Granati FLOS e roseo spadiceus, in Europa australi & Africae ora collectus. Affertur calice obscure viridi cinctus. Eligantur Flores magni, obscure rubri, haud multis calycibus & unguis remixti.

BELLIDIS MINORIS. Gaaseurt. Tusinddyd. Tusindfynd. Gaa til Lifs. Put i Bug. Maastieben. Gånseblümtlein. Tausendschön.

Bellidis perennis FLORES, Aprili colligendi. Flor. Dan. 503.

- CALENDULAE. Ringblom. Soelsk. Ringelblumen.
Calendulae officinalis FLORES, in arvis crescentes.
- CARDAMINES. Engkarse. Bildkarse. Gogeblo-
 blomster. Gauchblume. Wiesenkreffe.
Cardamines pratensis FLORES, Majo in pascuis colligendi.
- CARTHAMI TINCTORII. Bild Safran. Wilder Safran.
Carthami tinctorii FLORES, in hortis culti.
- CARYOPHYLLI AROMATICI. Nellikær. Würch-Nägelein.
Caryophylli aromatici Amboina crescentis FLORUM CA-
 LYCES, cum flore nondum expanso. Eligantur egregie fusci,
 grandes, ponderosi, e quibus ungue pressis Olei quid exsudat.
- CENTAURII MINORIS. Tusindgylden. Algerum. Tau-
 sendgylden.
Gentianae Centaurii minoris COMA florens, in apricis,
 praesertim maritimis proveniens, Julio & Augusto colligenda.
- CHAMOMILLAE ROMANAE. Romerske Cameelblomster.
 Römische Camillen.
Anthemidos nobilis FLOS, sive simplex sit, sive plenus,
 in hortis proveniens.
- CHAMOMILLAE VULGARIS. Cameelblomster. Cam-
 meelblom. Barbroegræs. Munkekrone. Camillen.
Matricariae Chamomillae FLORES, in agris cultis cres-
 centes, Julio colligendi, qui a *Cotulae foetidae* floribus di-
 gnoscantur tum odore, tum paleis setaceis in *Cotulae* recep-
 taculo reperiundis.
- CHEIRI. Gulle Silitter. Gelse Weitschen.
Cheiranthi Cheiri FLORES, in hortis crescentes.

COTULAE FOETIDAE. Hundecurt. Gaaseurt. Gaas
sedild. Baldersbraa. Bafkerblom. Hundes-Cameel-
blomst. Siurguld. Gaaseguld. Gaasedill. Kröentill.
Hundstill. Hundes-Camissen.

Anthemidos Cotulae FLORES, in ruderatis crescentes,
Julio colligendi.

CROCI. Safran. Safran.

Crocii sativi PISTILLORUM STIGMATA. Prostat *Crocus*
Anglicus, in massas orbiculares pressione coactus, itemque
Hispanicus. Plerumque vero Gallicus e provincia *Gastinois*,
aut Austriacus ad nos pervenit. Sit coloris Aurantii, recens,
neque marcidus tactu, neque humidus; sed tenax, mollis,
pinguis, digitum tamen oleo non inquinans, sequax, ejusdem
intus ac foris coloris; saporis amariusculi; odoris gravis, cir-
cum quaque se diffundentis; insignis ratione voluminis levi-
tatis. Adulteratur, imprimis Gallicus, flore Carthami tinctorii,
qui colore dilutius luteo facile dignoscitur. Qui mucidi odo-
ris est, rejiciatur.

CYANI COERULEI. Kornblomster. Kornblumen.

Centaureae Cyani FLORES.

EUPATORII CANNABINI. Flocks. Runigundsurt.
Hiortekiever. Runigundenkraut.

Eupatorii Cannabini COMA florens, ad aquas crescens,
Julio colligenda.

FARFARAE. Hestehov. Vid. Herba. Huslattig.

Tussilaginis Farfarae FLORES, in argillofis, subtus hu-
midis, provenientes, Majo colligendi.

GENISTAE. Gysel. Gysvel. Ginster.

Spartii scoparii FLORES, in arenosis australibus provenientes, Julio colligendi. Flor. Dan. 313.

HYPERICI. Viricon. Hypericon. Jordhumle. Blodblomster. St. Hansurt. Mandeblod. Apotheker Vericom. Johanniskraut.

Hyperici perforati COMA florida, in pratis proveniens, antequam flos sese explicuerit, Junio & Julio decerpenda. Quod ejus loco non raro substituitur Hypericum quadrangulum, caule quadrato herbaceo folisque non pertusis dignoscitur.

HYSSOPI. Isop. Isop. Ispen.

Hyssopi officinalis COMA florida. Colitur in hortis.

LAMII ALBI. Dod Nelde. Dov Nelde. Blinde Nelde. Aker-Nessel. Taube-Nessel. Bieneufang.

Lamii albi FLORES, in cultis crescentes, Julio colligendi.

LAVENDULAE. Lavendel. Lavendel.

Lavendulae Spicae tum latifoliae, tum angustifoliae SPICA. Hujus, utpote gravioris, ficcandus flos est; illius pro oleo inservit.

LILIORUM ALBORUM. Hvide Lilier. Weisse Lilien.

Liliorum alborum PETALA, pro oleo parando. In hortis coluntur.

LILIORUM CONVALLIUM. Maymaanedsbloemster.

Lille Conval. Nyseblad. Mayenblümchen. Lilien Convallien.

Convallariae majalis COROLLA.

LUPU-

LUPULL. Humle. Hopfen.

Humuli Lupuli COMAE, Augusto colligendae.

MALVAE ARBOREAE. Ratost. Rattestoel. Stockrosen.
Pappetrosen.

Alcae roseae FLORES e violaceo pulli, sub autumnii initium colligendi.

MELILOTI. Amur. Steenkleeber. Steinklee. Meliloten.

Trifolii officinalis COMA, in campestribus habitans, floribus sive albis, sive luteis, Julio colligenda.

MILLEFOLII. Kollike. Harhaus. Warbrick.
Jordhumle. Schaafgarbe. Rölck.

Achilleae Millefolii CORYMBUS FLORIDUS, Julio colligendus.

NAPHAE. Drangenblomster. Pomeranzblütze.

Citri Aurantii FLOS recens.

NYPHAEAE ALBAE. Basgaas. Nakande. Kier-
ringsfrut. Wasserlilien. Seerosen.

Nymphaeae albae FLORES, in aquis dulcibus crescentes, Julio colligendi.

CRIGANI. Bild Meyran. Vid. Herba. Brauner
Dosten. Winter-Majoran.

Origani vulgaris COMA florida, in rupestribus habitans, Julio colligenda, quae a plerisque legitur pro oleo stillatio obrinendo, quod tamen majori largitur copia *Thymus vulgaris*.

PAPAVERIS ERRATICI. Kornrose. Agerfilke. Rother
Mohr. Katschrose.

Papaveris rhoeados FLORES, Junio & Julio colligendi.

PARALYSEOS. Haneleeg. Koedrosvel. Dredrif.
 Koedriver. Nogleblom. Vor Frues Noglebaand.
 Kuesimmer. Watengen. Schlüffelblumen.

Primulae Veris FLORES, in pratis reperiundi, Aprili &
 Majo colligendi. Flor. Dan. 434.

PERSICORUM. Persikeblomster. Pserichblütche.

Amygdali Persicae FLORES recentes.

POEONIAE. Pionrosen. Gichtrosen.

Paeoniae officinalis FLORES, Majo mense colligendi.

ROSARUM. Roser. Rothe Rosen. Essigrosen.

Rosae centifoliae & albae PETALA. Colligatur flos non-
 dum explicatus. Abjiciantur calices cum unguis, germen
 ac stamina.

SAMBUCL. Hylbblomster. Bliederblumen. Holunderblumen.

Sambuci nigrae FLORES. Flor. Dan. 545.

SCABIOSAE. Skabios. Skaburt. Vid. Herba.
 Apostemkraut. Scabiosen.

Scabiosae arvensis FLORES, in solo glareoso, juxta sege-
 tes & in pratis crescentes, Julio colligendi. Flor. Dan. 447.

SPICAE CELTICAE. Celtisch Nardus. Celtischer Nardus.

Valerianae celticae FLORES, seu potius Caudices, in al-
 pibus Helvetiae & Valesiae provenientes. In hortis coluntur.

STOECHADIS ARABICAE. Stochasblomster. Stochas-
 blumen. Welscher Lavendel.

Lavendulae Stoechadis FLORES, ex Gallia & Italia
 advecti.

STOECHADIS CITRINAE. Ewigheidsblomster. Matten-
 fraut. Steinblume. Schabenkraut. Zimmerschön. Reinblume.
 Flußblumen.

Gnaphalii arenarii FLORES, Junio & Julio florentes,
 in hortis provenientes.

TANACETI. Reinfand. Ormekrud. Landsue.
 Neufan. Ringefan. Roskonge. Roud Kollif.
 Reinfahnen.

Tanaceti vulgaris COMA florens, in aggeribus prove-
 niens, Julio colligenda.

TILIAE. Lindblomster. Lindenblütche.

Tiliae Europaeae FLORES recentes. Flor. Dan. 553.

TUNICAE. Nessikerblomster. Nesslenblütche.

Dianthi Caryophylli FLOS spadiceus.

VERBASCI. Kongelys. Staaderlys. Wollkraut.
 Königsfergen.

Verbasci Thapsi FLORES, in glareosis, sterilibus crescen-
 tes, Julio & Augusto colligendi.

VIOLAE MARTIAE. Martis-Fioler. Blaue März-Viole.

Violae odoratae FLOS recens. Flor. Dan. 309.

ULMARIAE. Modurt. Giedeskiæg. Nessurt.
 Gotgræs. Mourt. Miourt. Miurt. Maggræs.
 Korsgræs. Kallgræs. St. Hansgræs. Geißbart.

Spiraeae Ulmariae FLORES recentes, in pratis uliginosis,
 umbrosis provenientes, Julio colligendi. Flor. Dan. 547.

CANONES GENERALES.

I. FLORES decerpantur nuper expansi, certe antequam antherarum pollinem exploferint, eo tempore ubi radii foliorum dissipaverint.

II. COMA florens colligenda dum flos explicari incipit.

III. SICCANTUR ut herbae, & quidem quam fieri potest citissime.

VI. SEMINA.

ABELMOSCH. Desmerkorn. Bisamkörner.

Hibisci Abelmosch SEMINA reniformia; odoris ex Moscho Ambraque compositi, ex America australi allata.

ACETOSAE. Syrefroe. Saurampfer-Saamen.

Rumicis Acetosae in pascuis provenientis SEMEN nigrum, parvum, triangulare; puniceae coloris.

AGNI CASTI. Munkpeber. Keuschbaum-Saamen.

Viticis agni casti SEMINA rotunda, pipere minora; coloris cinerei; saporis acris, subadstringentis.

AMMEOS VERI. Ammyfroe. Cretischer Ammy-Saamen.

Sifonis Ammeos SEMEN ex Aegypto advectum, parvum, striis longis praeditum, e ruffo spadiceum; saporis acris, amaricantis; odoris aromatici. Substituatur subinde Semen *Petroselini*. (*Ammeos majoris*).

AMOMI VULGARIS. Amomfroe. Allehaande. Gemeiner Amom-Saamen.

Sifonis

Sifonis Amonii, Angliae indigeni, in hortis culti, SEMEN parvum, striatum, figurae ovalis; coloris ruffi. Tinctura spirituoſa viridem exhibet colorem.

AMYGDALAE DULCES & AMARAE. Søde og bittre Mandler. Süße und bittre Mandeln.

Amygdali communis NUCLEI, ex Europa australi allati. Recentēs sint, siccae, fragiles, torosae; pellicula tenui, aequali, non rugosa, e gilvo cinnamomei coloris tectae.

ANETHI. Dildfrøe. Dillsaamen.

Anethi graveolentis SEMEN recens, torosum, tribus striis notatum; coloris dilute fulci. Herba in agris feritur.

ANGELICAE. Angelikfrøe. Vid. Radix. Angelikens Saamen.

Angelicae Archangelicae in montosis & hortis crescentis SEMEN albicans, latum, compressum; saporis acris. Flor. Dan. 206.

ANISI. Anisfrøe. Anies.

Pimpinellae Anisi SEMEN recens, oblonge rotundum, striatum, torosum; coloris viridiusculi, graveolens. In Saxonia superiori feritur.

ANISI STELLATI. Stiern-Anis. Stern-Anies.

Illicii anisati (aliis *Padiani ferae*) CAPSULAE SEMINALES in orbem digestae, coriaceae, e cinereo spadiceae, cum feminibus ovatis glabris. Quo majores sunt, magisque odoraе, eo sunt meliores.

APII. Selerifrøe. Garten-Eppich. Seleri-Saamen.

Apii graveolentis in hortis culti SEMINA parva, striata, Petroselinii feminibus minora.

AQUILEGIAE. Blaaklockerfroe. Ukeleyefroe.
Ukeley= Saamen. Klockenblumen= Saamen.

Aquilegiae vulgaris, in nemoribus saxosis crescentis,
SEMEN nigrum, parvum, splendens.

BARDANAE. Agerburre= Froe. Vid. Radix. Kletten= Saamen.

Arctii Lappae in cultis rudieratis crescentis, SEMEN oblongum, fuscum, nigris striis intertinctum; saporis amaricantis.

CANNABIS. Hampfroe. Hanf= Saamen.

Cannabis sativae SEMEN.

CARDUI BENEDICTI. Kardebenedikt= Froe. Cardobenedicten= Saamen.

Cnici benedicti in hortis culti, SEMEN oblongum, teres, striatum; saporis amari.

CARDUI MARIAE. Marie Tidsel= Froe. Simpertine= Korn. Mariendistel= Saamen.

Cardui Mariani, Angliae & Italiae inquilini, in hortis culti, SEMEN oblongum, aliquantum compressum, fuscum; saporis amaricantis.

CARTHAMI. Wild Safran= Froe. Wilder Safran= Saamen.

Carthami tinctorii SEMINA, ex Germania australi adveeta, alba, oblonga, angularia, dulcia.

CARVI. Kummel. Danff Kummel. Carve. Karvi. Feld= Kummel.

Cari Carvi SEMEN parvum, striatum, oblongum, tenue, fuscum, paululum incurvum. In pratis herba offenditur.

CATAPUTIAE MAJORIS. Purgierhorn. Purgier = Körner.

Ricini communis SEMEN, ovalis figurae quodammodo compressum, Fabae minoris magnitudinis; coloris albi & cinericii, ex nigro variegati; sub putamine tenui, nucleum condens album; saporis acris. In hortis colitur & sponte provenit in India utraque.

CICHOREI. Bagvard. Zernurt = Froe. Wegwartens Saamen.

Cichorei Intybi, ad margines agrorum & viarum provenientis, SEMINA parva, oblonga, angularia, fusca.

CINAE. SANTONICI. ZEDOARIAE. Drm = Froe. Wurm = Saamen. Zitwer = Saamen. Seversaat.

Artemisiae Santonicae vel *Judaicae* SEMEN, e gilvo viridescens, crasse granulatum; saporis acris amaricantis; odoris Zedoariae validi. Rejiciatur impurum, discolor, & longiore feminum specie intermixtum. Ex Oriente & Africae ora maritima adfertur, & saepius adulteratum est.

CITRULLI. Angurien = Wand. Meloner = Froe. Angurien = Saamen. Wassermelonen = Saamen.

Cucurbitae Citrulli in hortis cultae, SEMEN recens, non rancidum.

COCHLEARIAE. Skeurt = Froe. Vid. Herba. Köffeltraut = Saamen.

Cochleariae officinalis, ad littora marina habitantis, SEMEN parvum, ex ruffo fuscum, rotundum; saporis acris, amaricantis. Flor. Dan. 135.

COCOENIDII. Kielderhals. Lived. Tutved. Tyrved. Riisved. Lisbast. Riisbas = Froe. Kellerhals. Seidenbast. Purgier = Körner.

Daph-

Daphnes Mezerei, in fylvis borealibus habitantis, SEMEN rotundum, Pipere paulo majus, fuscum, urentis saporis. Flor. Dan. 268.

COLOCYNTHIDIS. Roloquint: Froe. Coloquinten: Saamen.

Cucumeris Colocynthis in hortis culti, SEMEN albicans, oblongum, compressum

CORIANDRI. Coriander: Froe. Coriander.

Coriandri sativi SEMEN recens, rotundum, ponderosum; odoris grati. Leve, pulverulentum, a vermiculis exesum rejiciatur. Herba Italiae inquilina, in hortis colitur.

CUCUMERIS. Agurken: Froe. Gurken: Saamen.

Cucumeris sativi SEMEN.

CUCURBITAE. Græskar: Froe. Kürbiß: Saamen.

Cucurbitae Peponis SEMINA, e pomo quotannis recentia comparanda.

CUMINI. Kummel. Kümmel.

Cumini Cymini SEMEN recens, oblongum, striatum, torosum, purum, graveolens, vermiculis non exesum. In hortis herba provenit.

CYDONIORUM. Quedeforn. Quittenkerne.

Pyri cydoniae SEMINA, quae quo magis nitida sunt & e spadiceo fusca, eo meliora habentur. Rejiciantur vetusta, nigra, sordida.

CYNOSBATI. Hysentorn: Froe. Engeltorn: Froe. Hagenbutten: Saamen.

Rosae eglanteriae ad sepes habitantis, SEMEN, probe a lanugine liberandum.

DAUCI SYLVESTRIS. Wilde guule Rodder: Froe.
Derreroðs: Froe. Derreurtð: Froe. Wilder Möhren:
Saamen.

Dauci Carotae sylvestris SEMEN striatum, quod Dauci
hortensis Semine efficacius est. Herba in campis exaridis
offenditur.

ENDIVIAE. Endivie: Froe. Endivien: Saamen.

Cichorei Endiviae in hortis culti, SEMEN parvum,
oblongum.

ERUCAE. Hvíid Senneps: Korn. Weisser Senf:
Saamen.

Brassicae Erucae in hortis cultae, SEMEN rotundum, par-
vum, flavescens; saporis acris.

FABAE. Bonner. Bohnen.

Viciae Fabae SEMINA, pro farina.

FOENICULI. Fennikel: Froe. Fenchel: Saamen.

Anethi Foeniculi in hortis culti, SEMEN ponderosum, ob-
longum, subviride, striis eminentibus spadiceo - albicantibus,
aut pallide flavescens distinctum, oleo dives, gratique odoris.

FOENUGRAECL. Foenugraef: Bukshorn: Froe. Bock-
horn: Saamen.

Trigonellae Foenugraeci SEMINA, e Gallia, Germania
australi & Italia advecta; coloris lutei; figurae rhomboideae;
odoris fortis, ingrati; saporis mucilaginosi.

FRAXINI. Afke: Froe. Eschbaum: Saamen.

Fraxini excelsioris SEMEN fuscum; subacris & amari
saporis.

GRANATORUM. Granat: Froe. Granat: Saamen.

Punicae Granati SEMINA.

HORDEL. Byg. Gerste.

Hordei vulgaris SEMEN.

HORDEI PERLATUM. Perle: Gryn. Perlen: Graupen.

HORMINI. Skarleye: Skarlage: Froe. Scharlach:
kraut: Saamen.

Salviae Hormini in hortis cultae SEMEN; suavissimi
odoris.

HYOSCYAMI. Fandens Roffer: Froe. Vid. Herba.
Wissen: Saamen.

Hyoscyami nigri in ruderatis pinguibus crescentis, SEMEN
exiguum, subcinereum, subrotundum, rugosum, compressum.

LACTUCAE. Lactuf: Froe. Lattuf: Saamen. Lattich:
Saamen.

Lactuae sativae in hortis cultae SEMEN papposum, par-
vum, utrinque acuminatum, oblongum, compressum; cinerei
coloris.

LAPATHI ACUTI. Skreppe: Froe. Mengel: oder Grind:
wurk: Saamen.

Rumicis Lapathae in succulentis provenientis SEMEN
fuscum, triangulare.

LEVISTICI. Lobstick: Froe. Lubstill: Froe. Lieb:
stöckel: Saamen.

Ligustici Levistici in hortis culti, SEMEN oblongum, pla-
num, striatum, membranaceum, coloris pallidi; odoris fra-
grantis; saporis aromatici.

LINI SATIVI. Hor=Frøe. Ein=Saamen.

Lini usitatissimi SEMEN.

LUPULI CONI. Humle. Hopfen.

Humuli Lupuli SEMINA.

MANNAE. Mannagræs=Gryn. Suppegræs=Gryn.

Manna=Gruße.

Festucæ fluitantis, in fossis & paludibus habitantis SEMEN.

Flor. Dan. 237.

MELISSAE. Melisse=Frøe. Melissen=Saamen.

Melissæ officinalis, in hortis cultae, SEMEN exiguum, fuscum.

MELONUM. Melon=Rierne. Melonen=Saamen.

Cucumeris Melonis, in hortis culti SEMEN.

MESPILORUM. Mespil=Frøe. Mispel=Saamen.

Mespili germanicae, in hortis cultae, SEMEN planum, subnigrum.

MILII SOLIS. Steenbræk=Frøe. Stein=Saamen.

Perlen=Hirse.

Lithospermi officinalis, in ruderatis habitantis, SEMEN rotundum, glabrum, splendidum, album.

NAPI. Røpe=Frøe. Stechrüben=Saamen.

Brassicæ Napi, in arenosis, maritimis provenientis, SEMINA parva, rotunda, ex rubro nigra; saporis acris, amaricantis.

NASTURTHI HORTENSIS. Rarse=Frøe. Kressen=Saamen.

Lepidii Sativi SEMEN parvum, oblongum, ex flavo fuscum; saporis acris.

NIGELLAE. Sort: Coriander. Sort Rummel.
Schwarz Kummel.

Nigellae sativae SEMEN torosum, probe maturum; odoris gravis, parum aromatici. Herba inter olera & in agris provenit. Circumforanei Daturae Semen immiscent, quod studiose vitandum.

ORYZAE. Riisen: Froe. Reis.

Oryzae sativae, in Indiae paludosis cultae SEMINA.

PAEONIAE. Pæonien: Froe. Gicht: Rosen: Saamen.
Pæonien: Saamen.

Paeoniae officinalis, in hortis cultae SEMEN nigrum, pifi magnitudinis.

PAPAVERIS ALBI. Hviid Balmue: Froe. Weisser Mohn.
Mohn: Saamen.

Papaveris somniferi albi SEMEN; *Nigri* CAPSULAE SEMINALES recentes pro Syrupo Diacodii parando inserviunt.

PETROSELINI. Persille: Froe. Petersilien: Saamen.

Apii Petroselini SEMEN recens, oblongum, striatum, parvum, graveolens. Sufficit Nostras, & recens praestat prae vetusto *Petroselini Macedonici* (*Bubonis Macedonici*) Semine.

PHELLANDRII. vulgo FOENICULI AQUATICI. Skarn: tyde: Froe. Wasser: Schierling: Saamen. Veer: Saat.

Phellandrii aquatici, in fossis provenientes SEMEN oblongum, striatum. Vid. Lange de Remediis domesticis Brunsvic. pag. 222.

PLANTAGINIS. Beibred: Froe. Vid. Herba. Wegerich: Saamen.

Plan-

Plantaginis majoris, ad vias crescentis SEMINA minutissima, longiuscula, fulva; saporis mucilaginosi. Flor. Dan. 461.

PORTULACAE. Portulack: Frœ. Portulac: Saamen.
Dürckelkraut: Saamen.

Portulacae oleraceae, in hortis cultae SEMEN valde exiguum, nigrum; saporis oleosi.

PSYLLII. Loppe: Frœ. Flöh: Saat.

Plantaginis Psyllii, aut *Cynopos* SEMINA, ex Europa australi allata, puliciformia, fusca.

RAPARUM. Rofœ: Frœ. Rüben: Saamen. Weisser Rüben: Saamen.

Brassicæ Rapae, in agris cultae SEMEN.

RICINI VULGARIS. Vid. *Cataputiae majoris* SEMINA.

RUTAE. Rude: Frœ. Weinrauten: Köpfe.

Rutae graveolentis, in hortis cultae CAPSULAE SEMINALES, nigrae, parvae, figurae semilunaris, quae foliis praestantiores sunt.

SABADILLI. Luuse: Frœ. Cavadill. Läuse: Saat.

E specie *Aconiti*, aut *Delphinii* in regno Mexicano collectum, & in Capsulis oblongis, gibbosis, quasi corniculatis, trilocularibus allatum SEMEN, figura & colore nigricante Muscardam referens. Praestat Semine *Staphisagriae*.

SILERIS MONTANI. Sefel: Frœ. Bierg: Kummel.
Sefel: Saamen. Berg: Kummel.

Laserpitii Sileris SEMINA, e Gallia Narbonensi & Provincia allata. Sint viridiuscule pallida; saporis acris, aromatici & succi plena. Pro Theriaca requiruntur.

SINAPL. Senepß-Korn. Senf-Saamen.

Sinapi nigrae SEMEN recens; saporis acris, fervidi.

SOPHIAE CHIRURGORUM. Bartfliars Wißdom-

Barbeer-Forstand-Froe. Sophienkraut-Saamen. Hobicht-Saamen.

Sisymbrii Sophiae, in muris tectisque crescentis SEMINA minutissima, oblonga, ruffa; saporis acris. Flor. Dan. 528.

TANACETI. Reinfand-Froe. Ormekrub-Froe. Reinfaren-Saamen. Gemein Wurmsaat.

Tanaceti vulgaris in aggeribus crescentis SEMEN, cum Cinnæ Semine conveniens.

THLASPI CRETICI. Cretisk Thlaspi-Froe. Cretischer Thlaspi-Saamen.

Iberidis umbellatae SEMINA.

THLASPI VULGARIS. Pengeurt-Froe. Pengegras-Froe. Dauern-Senf. Besenkraut-Saamen.

Thlaspi arvensis in agris reperiundi SEMINA oblonge rotunda, parva, fusca; saporis viscosi, acris.

THYMI. Thymian-Froe. Thymian-Saamen.

Thymi vulgaris in hortis culti SEMINA oblonga, fusca.

VIOLARUM. Martß-Fioler-Froe. Blauer Violens-Saamen.

Violae odoratae in nemoribus & pascuis provenientis SEMEN albicans, rotundum, splendidum; saporis oleosi subacris. Flor. Dan. 309.

URTICAE MAJORIS. Brandenælde-Froe. Brennesseln-Saamen.

Urticae dioicae in ruderatis crescentis SEMEN parvum, compressum, spadiceum; saporis subacris.

URTICAE ROMANAE. Romisch Nælde=Frøe. Römische
Nesseln=Saamen.

Urticae piluliferae in hortis cultae SEMINA fusca, splendens,
Lini semine minora; saporis subacris.

CANONES GENERALES.

I. SEMINA colligantur perfecte matura, antequam sponte
excidant, locoque ab aëre perflato probe siccentur, sine ignis
adminiculo.

II. QUAE capsulas, involucria &c. retinent Semina, ea his
munita ferventur.

III. PLERORUMQUE autem Seminum delectus ita instituen-
dus est, ut aquae immittantur, & quicquid supernatat abjiciatur;
quod vero fundum petit iterum siccetur.

VII. FRUCTUS.

ACACIAE BACCAE. Slaa=Kreigebær. Schleen.

Pruni spinosae BACCAE immaturae pro Roob.

ALKEKENGII BACCAE. Boborel. Todiske Kirsebær.
Juden=Kirschen. Boborellen.

Physalidis Alkekengi BACCAE, in vineis & sylvis umbrosis
Galliae & Germaniae provenientes.

AMOMUM. PIPER JAMAICENSE. PIMENTA. Allehaande.
Allermanns=Gewürz.

Myrti Pimenti Jamaicensis BACCAE rotundae, e subruffo ni-
gricantes, immaturae; odoris & saporis aromatici, ex Cinnamo-
mi, Myristicae & Caryophyllorum sapore confusi, proxime ta-
men ad Caryophyllorum accedentis. Eligatur non admodum
leve

leve aut rugosum, graveolens, grandius. Rejiciatur quod vetustate in frustra pulveremque dilabitur.

AURANTIA MALA. Pomeranzer. Pomeranzen.

Citri Aurantii BACCAE immaturae, *Aurantia Curassavensis* dictae; atque maturae, quarum etiam *Cortex* externus sub *Flavedinis* nomine servatur.

BACCAE NORLANDICAE. Akerbær. Su.

Rubi arctici FRUCTUS, prae reliquis omnibus odore fragrante, suavi sapore, ac vi analeptica pollens, & laete in hortis germinans.

BERBERUM BACCAE. Berberisbær. Berberis-Beeren.

Berberidis vulgaris BACCAE recentes, pro Gelatina aut Syrupo.

CACAO. Cacaoonner. Cacao. Chocolate-Frucht.

Theobromatis Cacao FRUCTUS ex America australi allatus.

CARDAMOMMUM MINUS. Cardamomen. Cardamomen.

Amoni Cardamomi FOLLICULI ventricosi, triquetri, trilobulares, continentes Semina angulosa, e subrufo fusca si recentia, quae praeferenda; temporis mora vero e cinero ferruginea, multum aromatica, notabilis Camphorae odoris.

CARICAE. FICUS. Figen. Feigen.

Ficus Caricae RECEPTACULUM FRUCTIFICATIONIS carnosum. Eligantur pingues, i. e. recentes, ponderosae, molles, grandes, torosae, parenchymate melleo, tenaci, flavo; seminibus flavis turgentes. Rejiciantur nigrae, durae, sordibus vermiformis inquinatae.

CASSIA FISTULA. Cassie. Cassie.

Cassiae

Cassiae fistulae SILIQUA teres, cylindracea, cubitalis, sub putamine lignoso nigro, interne dissepimento interstincto, continens semina compressa, fulva, & pulpam subdulcem, nigredinis splendentis. Seligatur recens, ponderosa, a scarabaeis non exesa, concussa sonum a feminibus non edens, medulla dulci scatens, non valde acida aut amariuscula, neque odorem spargens mucidum. *Indica*, quae vere efficax est, rarissime ad nos pervenit. Accedit ad eam *Alexandrina*: vilior est *Americana* in Americae insulis luxurians. Prior cortice laevi, tenuiore, obscurioris coloris tecta est, & pulpam continet dulciorem, parum nauseosam. Posterior externe rugosa, aspera, crassior, pulpam fovet acidam magis & nauseosam. Quidam e deteriore *Cassiae* specie pulpam melle syrupisque conditam extrahunt, sub *Floris Cassiae* nomine, quae vero mora temporis mucorem & acredinem noxiam contrahit.

CERASA ACIDA. Kirscher. Kirschen.

Pruni Cerasi DRAPA, cujus Caro recens ad Roob adhibetur.

CITREA MALA. Citroner. Citronen.

Citri medicae MALA, Succus, Cortex ficcatus.

COCULI INDICI DE LEVANTE. Rofke-Kierner. Rofke-Körner. Fisch-Körner.

Menispermi Coculi FRUCTUS reniformis, fuscus, rugoso Cortice tectus, venenatus. Ad necandos pediculos, & pisces captandos, exposcitur.

COLOCYNTHIDIS POMA. Coloquinder. Coloquinten.

Cucumeris Colocynthidis POMA, ex Oriente allata, candida, levia, fungosa, peramara, integra, cortice duro ex albo luteo cincta.

CUBEBAE. Cubeber. Cubeben. Schwindelförner.

Ignoti Vegetabilis e *Piperitarum*, ut videtur, familia, quod Hederae arboreae more arbores cingit, BACCAE petiolatae, ex Indiis advectae. Eligendae sunt maturae, torosae, ponderosae, oleosae, neque senio, neque immatura aetate emaciatae aut corrugatae; fragrantis, aromatici odoris; saporis acris atque aromatici.

CUCUMERIS ASININI. Asen-Agurke. Esels-Gurken.

Momordicae Elaterii POMUM recens, cujus succus pro Elaterio conficiendo adhibetur.

CYDONIA MALA. Queder. Quitten.

Pyri *Cydoniae* FRUCTUS, pro Gelatina aut Roob.

CYNOSBATA. Nyper. Hanbutten.

Rosae *caninae* FRUCTUS, pro Roob.

EBULI BACCAE. Attickber. Attichbeeren.

Sambuci Ebuli BACCAE recentes.

FABA PICHURIM. PECURIS. PECAIRO.

Copaiserae officinalis FRUCTUS, Amygdalae majoris per longitudinem dissectae & excavatae similitudinem referens; coloris nigricantis, tenui epidermide tectus, longitudinis unius, latitudinis dimidii pollicis; intus coloris fusci instar Nucis Moschatae; odoris & saporis ex Nucis Moschatae & ligni Sassafras mixti. Ex Brasilia & insula Marahan adfertur.

FABA SANCTI IGNATII. Ignatius-Bonner. Ignatius-Bohnen.

Ignoti Vegetabilis FRUCTUS orbiculares, magnitudinis Avellanae, externe nitentes, nodosi, inaequales; coloris ex murino glauci semipellucidi; compaginis durae, corneae; saporis

ris intense amari. Semen continetur Pomo, Cucurbitae non abfimili, *Catalongay* indigenis Philippinarum insularum, ubi provenit, dicto. Eligantur recentes, ponderosae, grandiores, quamvis & ipsis cariosis non desit virtus.

FRAGA. Jordbær. Erdbeeren.

Fragariae vescae FRUCTUS recentes, pro Aqua stillatitia & Syrup.

GRANA PARADISI. CARDAMOMUM MAXIMUM. Paradies-Korn. Paradies-Körner.

Anomi Grana Paradisi FRUCTUS ex India orientali allatus, Ficus magnitudinis, interne in tres cellulas divisus, in quarum singula duo ordines exiguorum seminum, instar Cardamomi continentur. Pro Theriaca requiritur.

GRANATORUM MALA. Granat-Ebler. Granat-Aepfel. *Punicae Granati* FRUCTUS & Cortex.

JUGLANDIS FRUCTUS. Walnoder. Walnüsse.

Juglandis regiae DRAPA immatura, pro Condito & Extracto vermifugo.

JUNIPERI BACCAE. Enebær. Wachholder-Beeren.

Juniperi communis BACCAE grandes, nigrae, resinosae, ponderosae; odoris gravis.

LAURI BACCAE. Laurbær. Lorbeeren.

Lauri nobilis BACCAE recentes, nigricantes, oleo divites; odoris ac saporis gravis, aromatici; non flaccidae nec cariosae.

LILIORUM CONVALLIUM BACCAE. Lillconvall-Bær. Mayenblumen-Beeren.

Convallariae majalis BACCAE.

MACIS. Muskat-Blommer. Muschaten-Blumen.

Myristicae Drupae inter duplicem nucem, super nucleum expansus CORTEX interior, reticularis, laciniatus. Sit recens, tenax, fragrans, oleo dives; coloris nitidi, e cinnamomeo aurei, magnis frustis & laciniis conspicuus. Qui e laciniis parvis compositus fragilis est, albicans aut dilutius flavescens, rejiciatur.

MESPILA EXSICCATA. Mespilcr. Mispeln.

Mespili Germanicae FRUCTUS exsiccati.

MOMORDICAE FRUCTUS. Balsam=Äbler. Balsam=Äpfel.

Balsaminae Momordicae FRUCTUS recens, in hortis cultus, verrucosus, tuberculatus, parum carnosus.

MORA. Morbar. Maulbeeren.

Mori nigrae BACCAE, pro Roob aut Syrupo.

MYRTILLI EXSICCATI. Blaabar. Boller. Boller=riis. Heidelbeeren.

Vaccinii Myrtilli BACCAE, Julio & Augusto colligendae.

NUX MOSCHATA vel MYRISTICA. Muskat=Rod. Muschaten=Nuß.

Myristicae Drupae e duplici nucе NUCLEUS, ex insulis Oceani Indici advectus. Nux rotunda, vulgo femina, praestat oblongae, vulgo mari, non adeo efficaci. Sit grandis, ponderosa, extus e murino fusca, intus e fusco & ruffo variegata, fragrans multum, & acu puncta multum olei exsudans. Rejiciatur cariosa & vilior species, Rümpfe, Germanis vocata.

NUX VOMICA. Krants=Oien. Krähen=Augen. Krans=Augen.

Strychnos Nux Vomica. Est NUCLEUS compressè ovatus, cinereus, corneae duritiei; ex Malabaria advectus.

PASSULAE MAJORES. Rosiner. Rosinen.

Vitis viniferae UVAE solem passae & ficcatae. Eligantur longae, pauca continentes semina, torosae, pingues, tenera cuticula tectae, lumini admotae paucillum pellucidae, in fistilibus sub denominatione *Pottrosiner* allatae. Damascenae & Syriacae praestant prae Hispanicis & Italicis.

PIPER ALBUM. Hvidt Peber. Weisser Pfeffer.

Est PIPER nigrum maceratum & Cortice spoliatum. Sunt qui detestabili fraude, Piper decorticatum nec dum ficcatum, in magmate ex Amylo & Cerussa volutant, ut majora, candidiora & ponderosiora evadant grana.

PIPER LONGUM. Lang Peber. Langer Pfeffer.

Piperis longi BACCAE immaturae, amentorum more congestae, ex India orientali advectae. Rejiciantur cariosae, a vermibus exesae.

PIPER NIGRUM. Sort Peber. Schwarzer Pfeffer.

Piperis nigri, *Sirium Rumphio* dicti, ex India orientali allatae BACCAE monospermae. Eligantur grana magna, compacta, ponderosa, non rugosa.

PISTACIAE EXCORTICATAE. Pistaser. Pistacien.

Pistacia verae FRUCTUS, ex Persia, Syria, nec non Hispania & Italia advecti, angulosi, oblongi, Avellanae magnitudinis, sub putamine tenui, ruffo, nucleum viridescens, oleosum, saporis subdulcis, grati, includentes. Eligantur recentes, ponderosae, non rancidae.

POMA BORSDORFIANA. Borsdorfer Äbler. Borsdorfer Apffel.

Pyri mali Borsdorfiani POMA recentia, pro Tinctura, si lubet, Martis.

PRUNA. Blommer. Pflaumen.

Pruni domesticae DRAPAE siccatae, torosae & carnosae, sine ingrato a fumigatione odore.

PRUNEOLA. Brunesser. Prunellen.

Pruni Brignolensis DRAPAE a nuce separata Caro. Sine recentia, semipellucida; coloris e buxco spadicii, mollia, humidula. Afferuntur e Gallo provincia.

RIBESIA RUBRA. Røde Ribb. Rothe Johannis Beeren.

Ribis rubrae BACCAE, pro Roob aut Gelatina.

RUBI CHAMAEMORI BACCAE. Muldebær. Myrebær.

Laamanaf. Latoch. Laddof. Pautkenbeeren.

Rubi Chamaemori FRUCTUS, ex Norvagia saccharo conditi advecti. Flor. Dan. I.

RUBI IDAEI BACCAE. Hindbær. Hinbeeren.

Rubi Idaei BACCAE recentes, pro Syrupo.

SAMBUCI BACCAE. Hyldebær. Gliederbeeren.

Sambuci nigrae BACCAE recentes.

SILIQUA DULCIS. St. Hans Brod. Johannis Brod.

Ceratoniae Siliquae SILIQUA, callo laevi, dulci, e spadiceo ferrugineo tecta; semina continens e fusco spadicea, compressa, pulpamque coloris e fusco buxei, duram, subdulcem. Sit recens atque torosa. Ex Hispania, Italia ac Oriente advehitur.

SPINAE CERVINAE BACCAE. Korsbær. Brietorn.

Wiebær. Hiortebær. Tyttelbær. Creutzbeeren. Weichdornbeeren.

Rhamni cathartici BACCAE, semine triangulari & succo ex purpureo viridescente ab aliis baccis admistis distinguendae.

TAMARINDI. Tamarinder. Tamarinden.

Tamarindi Indicae ex filiquis deprompta PULPA, e fusco nigricans, viscida & quasi subpinguis, filamentis lignosis ac seminibus compressis, duris, quadratis, spadiceis, splendidis permixta; saporis acidi, vinosi, pungentis, parumper nauseosi, quibus notis facile a Prunorum pulpa, ubi larga manu admista fuerit, dignoscitur. Eligatur recens, tenax, spissa, ex subrufo nigricans; saporis acrioris. Vitanda est, quae in cellis locisque humidis diu fuit recondita, quod patebit ex superficie externa uda, seminibusque emollitis, tumidulis, neque adeo splendentibus. Quidam ficiorem pulpam Aceto madefactam Saccharo condiunt, quod ex minus sequaci visco & sapore mitiore patefit. Carnem filiquae exemptam, Indi Arabesque cum aqua & aceto in vasis cupreis in pulpam, vulgo in officinis prostantem, redigunt, quae vero ut noxia rejicienda. Praestaret igitur e filiquis ipsis conficere Pulpam. Est vero haec filiqua Legumen, duplici filiqua constans, interna & externa. Externa est e spadiceo fusca aut viridescens, protuberantiis, iis in locis, ubi semina latent, notata. Interna viridescit. Ambas inter recondita est pulpa cum semine & filamentis tenacibus, quae ab alterutro leguminis apice ad alterum decurrunt. Quae in variis Americae regionibus colitur Arbor, non adeo generosae indolis pulpam supeditat. Dignoscitur Siliquae patria ex seminum numero, quae sena sunt aut septena in Orientali, non nisi terna aut quaterna in Occidentali.

VANILLAE. Vaniller. Vanilien.

Epidendri Vanillae FRUCTUS, sive Siliquae compressae, semipedem longae, calami scriptorii majoris crassitiei; coloris ex atro fusci; saporis aromatici; odoris grati; pulpam seu medul-

medullam cum minutissimis acinis pinguem continentes. Ex America & inprimis nova Hispania advehuntur. Eligendae sunt Siliquae mediae magnitudinis, pingues, recentes, aromatici saporis atque odoris.

VITIS IDAEAE. Tytteber. Rosingber. Roslinger. Tyteber. Tytling. Preiselbeeren. Kranbeeren.

Vacciniae Vitis idaeae FRUCTUS saccharo conditi, e Norvagia ad nos pervenientes. Flor. Dan. 40.

CANON.

FRUCTUS non nisi maturi decerpantur, si excipias *Acaciae* & *Aurantii* FRUCTUS, de quibus supra.

VIII. SUCCI VEGETABILIIUM ARIDI.

ALOE HEPATICA. SUCCOTRINA. Aloe. Aloe.

Aloës variegatae Guineensis; *Aloës perfoliatae* Chinenfis & Barbadenfis; *Aloës perfoliatae Succotrinae*, Alexandria advectae Succus, e foliis collectus, gummoso resinofus. *Cabalina* impura Hippitris relinquatur, & quae ex hac fraudulenter parata Aloë pura splendensque pro Succotrina venditur, ingrato, nauseoso sapore atque odore se prodit. *Succotrina* proba splendens est, pellucida, e spadiceo fusca, minuta coloris ex aureo fulvi, calore manus flexilis, saporis multum amari, non ingrati tamen & paulum aromatici, odoris Myrrham mentientis, gummosae magis indolis quam *Hepatica*, quae obscurior est, opaca, compactior. Hujus nobilior species in putaminibus cucurbitarum ex Indiis & China; vilior

vilior in Cadis ex insulis Americanis, praecipue Barbados insula adfertur.

AMMONIACUM GUMMI. *Ammoniak.* Gummi Ammoniac.

Plantae ferulaceae Succus gummoso-resinosus, ex India orientali & Ægypto adductus; externe obsolete flavus, interne ex albescente, rubente & obsolete flavo variegatus, lentus, & calore manus mollescens; odoris mirum nauseosi, alliacei multum, castoreati paucillum spirantis; saporis nauseosi, amaricantis; feminibus, Anethi non absimilibus, fabuloque plerumque interpolatus. Pro usu interno non nisi *Electum*, purissimum, *Thrausna* Veteribus dictum, adhibeatur, i. e. vel Ammoniacum in granis puris emtum, vel grumi candidiores, variegati, subsplendentes, e Massa selecti. Quod jam Colatum venditur, suspectum est, cum nonnunquam Peucedani succum, aliaque viliora admista habeat.

ANIME. *Anime.* Anime.

Hymenacae Courbariae RESINA, ex America australi, Guajana & Brasilia imprimis allata. A Lusitanis advectum Anime Æthiopicum, nunc raro occurrit. Eligitur ex albo citrinum, pellucidum; odoris ad storacinum accedentis; saporis grati, parum fervidi.

ASA FOETIDA. *Dyvelsdreck.* Stinkender Asand. *Teufelsdreck.*

Ferulae Asae foetidae, *Kaemfero Hingisch* dictae, *Gummiresina*, e radice faucata potissimum elicita, ex Persia Indiisque allata; odoris foetidi, tetri, ex alliaceo virosi. Eligatur gravissimo odore praedita, instar cerae flexilis & lenta, plurimisque massulis albetibus, luteis, roseis, murinis, amethystinis, cum splendore aliquo variegata.

BALSAMUS TOLUTANUS. Balsam of Tolu. Balsam von Tolu.

Tolviserae Balsami Succus resinofus, ex Americae provincia Tolu (*Honduras*) in putaminibus cucurbitarum allatus; coloris e lacte flavo fulvi, variegati, consistentiae primum viscofae, sequacis, dein durae fragilisque; odoris fragrantis, ad Benzoës Citrique proxime accedentis; saporis dulcis, grati. Eligatur recens, putaminibus non exemptus, prementi digito cedens, & si forte induruerit, ore detentus non fragilis, sed Mastichis instar in pastam tenacem coalescens. Rejiciantur frustra vetustiora, e putaminibus exempta, utpote nullius virtutis. Supplet abunde hic Balsamus locum OPOBALSAMI SICCI, *Pistaciae Lentisci* ut volunt, sobolis, nec non BALSAMI DE MECCA, *Amarydis Opobalsami Gileadensis*, vel plane non obvii vel adulterati.

BDELLIUM. Bdellium Gummi. Gummi Bdellium.

Arboris incognitae, aut nondum descriptae, in Guinea, Arabia, Media & India nascentis, LACHRYMA; coloris ferruginei, nigricantis, in guttas seu grana concreta, sapore ac odore ad Myrrham accedens. Saepius cum Myrrha in cistis permistum reperitur. Praefertur amarum, translucidum, dum frangitur pingue ac odoratum.

BENZOE. Benzoe. Benzoe.

Lauri Benzoinae RESINA ex Indiis allata, fere opaca, facile fragilis, fragrans; coloris e flavo, ruffo alboque variegati. Quo magis abundat massulis ejusmodi albicantibus, flaventibus, *Amygdaloides* tunc dicta, eo est praestantior. Rejiciatur fusca, impura.

CAMPHORA. Campher. Campher.

Lauri

Lauri Camphoriferae CONCRETUM resinoso-oleosum, volatile, in glebis deformibus sordidis e Japonia, per Batavos allatum, & ab iisdem nova, uti videtur, sublimatione, ope Calcis vivae per se extinctae ac dilapsae, depuratum, & in panes seu massas orbiculares coactum. Quum ocyssime in auras avolet, vesicae ope ab aëris accessu custodienda est.

CARANNA. Caranna Gummi. Caranna.

Ignotae Arboris GUMMI RESINA tenax & dura, quae recens picis instar ductilis, inveterata vero fragilis est & dura; coloris ex viridi nigricantis; saporis amari ingrati; odoris fragrantis, praesertim dum accenditur. Ex nova Hispania in fructis cylindraceis, foliis Junci involutis, advehitur.

CATECHU. TERRA JAPONICA. Japonisch Jord. Catechu.

Arecae Catechu, e Palmarum familia, *Pinanga* Rumphio dictae, in Indiis germinantis, Fructuum seu Druparum Sucus, maximam partem gummosus. Optimum Catechu, sed rarum, coloris est spadicei, purissimum, lamellatim dispositum; lenissime adstringentis primum, dein subdulcis gratique saporis. Vulgare bonae notae Catechu, coloris est e badio nigri, interne paucillum laetioris & cum splendore nitidi, saporis non ingrate adstringentis, totumque in ore deliquescit, nullis relictis foecibus. Nigrum, adustum, cum nidore ingrate sapidum & acerbum, recementis terreis spurcatum, in aqua non omne solubile, rejiciatur.

CERASORUM GUMMI. Kirscher Gummi. Kirschen Harz. Kirschen Gummi.

Pruni Cerasi RESINA, locum Gummi Arabici supplens.

COLOPHONIUM. Harpir. Spiegel=Harz. Scigen=Harz.
Vid. *Oleum Terebinthinae*.

COPAL. PANCOPAL. Copal. Gummi Copal.

Rhois copalini RESINA duriuscula, diaphana, ex albo flavescens; dum carbonibus inspergitur odorata, ex nova Hispania allata, in usus pictorios praecipue adhibita.

ELEMI. Elemi. Elemi.

Amyridis Americanae RESINA. Celebratum olim ELEMI AETHIOPICUM, coloris ex albo lutei & languide viridis variegati, externe durum, interne tenax, molle; odoris Foeniculi, arundine involutum, non nisi rarissime invenitur. Sed ejusdem fere virtutis est ELEMI VULGARE *Amyridis*, modo probum sit, ejusdem ac Aethiopicum coloris, fere pellucidum, siccum & fragile, sed calefactum tenax & sequax; odoris subvinosi, fragrantis. Rejiciatur friabile, fuscum, cinereum. Sunt qui Resinam flavam cum Oleo Spicae & Terebinthina commiscunt, indeque *Elemi* artificiale componunt, quod facile ignis calore, quo odor Terebinthinae patescit, detegitur. E *Factitio Elemi* paratum Unguentum Arcaei, mox in superficie contrahit pelliculam aridam, duriusculam, gilvam: probum vero Elemi cum reliquis aequabiliter commistum manet.

EUPHORBIVM. Euphorbium=Gummi. Scharfes Euphorbium=Gummi.

Euphorbii Officinarum GUMMI RESINA, concreta in Guttas vel lacrymas ex pallido flavescences, aut coloris aurei splendidas, modo rotundas, modo oblongas, ramosas & cavernosas; saporis acerrimi, exurentis, nauseosi; odoris expers. Affertur ex Africae regionibus.

GALBANUM. Galbanum. Galbanum.

Bu-

Bubonis Galbani GUMMI RESINA, e Syria advecta, recens ex albo lutea; vetustior ex luteo subruffa, aqua solubilis & ad ignem flammam concipiens. Eligatur Gummi recens, siccum quidem, sed calore manus lentescens & ductile, impense & nauseose specificè olidum. Praefertur in granis allatum, quamvis variis interdum quisquiliis interpolatum. Neque tamen quod in massis ad nos pervenit, rejiciendum est, modo copiosas particulas albicantes, parum splendentis, spiritum vini aureo colore tingentes contineant. Abjiciatur vero impurum, coloris luridi, fusci, crassitudinis cereae. Adulteratur variis vilioribus resinis, Ammoniaco aut Gummi subruffo *Ferulae Galbaniferae*, quae in Sicilia crescit, variisque ramentis vegetabilibus additis, quod e debiliore odore & defectu splendoris, colorisque variegati patescit. Depurationem indicat Pars II.

GLYCYRRHIZAE SUCCUS. Lakrits-Saft. Siquiritien-Saft.

Glycyrrhizae glabrae Succus expressus inspissatus. Praefertur vulgo Hispanicus, sed aequè admittendus Germanicus, modo sit e ruffo fusci, dum frangitur nigri splendentis, & ubi in fila distrahitur, nitide aurei coloris; saporis vero dulcis, radice ipsa gratioris; odoris suavis, non empyreumatici; linguae impositus omnis deliquescentis, & aqua solutus paucas faeces in fundo relinquens.

GUAJACI. Guajac-Gummi. Guajac-Harz.

Guajaci officinalis e ligno RESINA, ex America allata, fragilis, friabilis; saporis acris, pungentis; odoris nullius, grati vero si prunis injiciatur; coloris externe ex viridi pulli aut obscure ruffi, interne albicantis, subrubelli. Adulteratur additione aut Colophonii, aut Balsami Sulphuris Smalcaldici. Fraus detegitur facile super igne, qui sulphuris odorem extricat.

GUTTA. GUTTA GAMBA. CAMBOGIA. Gummigut.
Gummigutt.

Cambogiae Guttae GUMMI RESINA, e China atque Siam allata, opaca; coloris aurantii. Rejiciatur impura, fordida & nigricans.

HEDERAE. Bedbende: Gummi. Eysen: Harz.

Hederae Helicis RESINA, e fulvo, castaneo aut viridi ferruginea; fragilis, pellucidula, interne subrufa, maculis ferrugineis variegata; saporis acris, subadstringentis, aromatici; odoris nullius, super igne vero grati cum vivida flamma. Affertur maximam partem ex Indiis, subinde etiam e Gallia Narbonensi.

HYPOCYSTIDIS.

Asari Hypocystidis Succus inspissatus, e Turcia, Creta, Gallia Narbonensi nobis advectus; ficcus, niger, splendens; aliquid odorati habens; intense amarus, adstringens.

LADANUM. Ladanum Gummi. Ladanum.

Cisti Ladaniferae GUMMI RESINA, in Creta maximam partem collecta. Optima, sed rarior est, quae pelliculis involuta, in massis coloris e ruffo fere nigri, Emplastri in modum ductilis, lentaque, gratissimi odoris, adfertur. Vulgaris in spiras contorta, cereorum instar dura est, e murino aut olivari pulla, arena nigra scatens. Eligatur sabulo non nimium abundans, facile a manus calore mollescens, spiritu vini maximam partem solubilis & fragrans.

MANNA. Manna. Manna.

Fraxini Orni, dum junior est, aut LACRYMA sponte stilans, aut Succus ex arbore vulnerata elicitus, gummoso mel-leus, maximam partem e Calabria ac Sicilia advectus. Multa circa Mannam fraudulenter aguntur. Laudatur vulgo *Cannu-
lata*

lata (en *Marons*), reliquisque jure praefertur; sed in ipsa Mannae patria rarior est & pretiosa, & quae nobis sub hoc titulo obtruditur, factitia esse solet, e Manna fordida, exoleta, Amylo, Saccharo & Scammoneo in varias formas efficta. Ejusdem farinae venditur *Tabulata*, quae e variis compacta, non nisi pondere majore a sincera dignoscitur; & merito repudiatur. Rejiciatur itidem omnis Manna in glebis majoribus iisque sordidis allata; nec non quae crassitudinis melleae (*Manne grasse*), aut impura est, pinguis, tenax, coloris ruffi, fufci, (*Manne rousse*). Adulteratur enim variis supra dictis, melle, Glauberi Sale, variis succis purgantibus, e Tithymali vel Efulae speciebus depromtis, quibus *Manna* imprimis *Brigantina* (*Manne de Briançon*) scaterere dicitur, quae si sincera, Lacryma est Laricis, Mannae aemula, virtutis laxantis. Eligatur autem, si non *Bombycina* alba, dura & in vermium figuram contorta, sed rarior; certe *Mastichina*, in granulis, lacrymis aut grumis majoribus, minoribusve (*Manne en larmes*), pallide lutei coloris, allata. Sit vero recens, diffracta paucillum Mannae liquidae, Mellis instar, exsudans, levis, pura, parum pellucida, ab attractu in grumos minores diffiliens, non tenax aut sequax; saporis dulcis specifici; super lingua plane deliquescens. Sicco calidoque fervetur loco; in humidis enim diffluit in tabum ingratum, inertem.

MASTIX. Mastig. Mastir.

Pistaciae Lentisci cicuris & ferae, in Europa australi & Archipelagi insulis crescentis, in Chio praecipue cultae, LACRUMA, ex sauciato cortice stillans, resinosa. Eligantur *Grana*, coloris albi, citrini, pellucida, fragrantia, splendentia. Dentibus tentata Mastix fragilis est, cerae instar lentescit, & pressione in pastam compingitur. In terram stillans resina sordes
con-

contrahit, unde his abundantes grumi, *Mastix in sortis* dicti, merito rejiciuntur, aut saltem puriora ex his frustra studiose seliguntur. Suspecta pariter est, quae in sic dictis Panibus affertur, cum ex vulgari impura, Aqua bulliente, ut candidior fiat, soluta, compingatur. Addunt etiam verae Mastichi, quam *Masculam* incolae vocant, *Foeminam*, quae est lacryma *Pistaciae verae* & *Terebinthi* opaca, viscosa, Terebinthinae non abfimilis. Haec cum vera Mastiche confusa, siccos externa specie panes refert, qui vero diffracti, non perspicuis particulis, viscosa indole, & mollitie fraudem patefaciunt.

MYRRHA. Mirre. Myrrhen.

Plantae nondum cognitae, in Aethiopia crescentis GUMMI RESINA. Laudant *Stactem*, sive sponte exsudantem, quae vero rarissime, si unquam, occurrit. Optima est quae in Granis sive lacrymis affertur. Eligatur vero pura, fulva, aut e fulvo ferruginea, spiritu afflato magis rubescens, levis, fragilis, tactu pinguis, pellucidula, splendens, fracta strias semicirculares, albas, caesias exhibens, in ore omnis fere deliquescentis; saporis multum amari, aromatici; odoris validi, specifici, non adeo ingrati. Rejiciatur fusca, nigra, tenax, tota resinosa, albicans, impura, & odore nauseoso praedita.

OLIBANUM. Thus. Bireg. Weisbrauch.

Juniperi Thuriferae, ex Oriente vel Aegypto allata RESINA, ex albo sublutea, semipellucida, dente tentata friabilis, dein lenta, sequax, non tamen, uti Mastix, in pastam conglutinata; saporis amari, non ingrati; odoris fragrantis; super igne non liquefcentis, sed cum luculenta flamma deflagrans. Opacum, rufum, impurum, ramentis corticosis & quisquiliis intermixtum, rejiciatur. Adulteratur resina Pini & Laricis, inprimis Lacryma Pini *Piceae*, quae *Thus vulgare* vocatur.

Est

Est vero haec coloris e flavo & ruffo variegati; faporis amari non adeo grati; & super igne explorata Terebinthinam redolet.

OPIUM. Opium. Mohnsaft.

Papaveris orientalis Succus gummeo resinofus. Primaria ex incisis Papaverum capitibus exsudans lacruma, verum Antiquorum Opium, *Affion* inquilinis dictum, ac folis calore in massulas obscure fulvas ruffasque coactum, ad nos non pervenit. Affertur vero Succus posthac expressus, aut e capitibus contufis ecoctus, & ignis ope in massas majores inspissatus, quem tamen ab admistis succis heterogeneis, affinis imprimis *Glaucii* & *Papaveris corniculati*, (*Chelidonii Glaucii* & *corniculati*) non plane immunem esse perhibent. Formae glebae aut panis foliis involuti, externe fusci, subinde pulli coloris, advehitur. *Thebaicum* vulgo expostulatur *Opium*; sed perinde est, qua patria gaudeat, Aegypto, Persia an Anatolia, quae prae reliquis est papaverifera; modo sequentibus se commendat dotibus. Sit densum, ponderosum, coloris externe e fulvo, ruffo vel spadiceo fusci, fractum particulis splendentibus micans, comminutum coloris fulvi, digito diutius tractatum paucillum tenax, purum, odoris validi, terti, virosi; faporis amari, acris, fervoris aliquo sensu fauces adurentis; promte flammam concipiens; integre fere aqua solubile & rubicundam exhibens tincturam. Quod variis vegetabilium fragmentis, sabulo & quisquiliis scatet, colorem obsolete pullum, aut e murino pullum exhibet, & odoris adusti vel exigui est atque friabile, rejiciatur.

OPOPANAX. Panax-Gummi. Panax-Gummi.

Pastinacae Opopanacis GUMMI RESINA oppido rara, & pretiosa, in Syria, Boeotia & Macedonia proveniens, e granulis pisi magnitudinis externe ruffis, interne fulvis aut albi-

cantibus, parum viscidis & fragilibus; saporis amaricantis, acris, ingrati; odoris gravis nauseosi, constans. Rejiciatur fuscum, nigrum, durum, molle, multis quisquiliis intermixtum, in majoribus pollicis crassitici frustis allatum; in aqua non solubile & lactescens.

RESINA FLAVA. Guul Beeg. Gelb Harz. Kübel-Harz.

Pini sylvestris aut piceae LACRUMA, e fauciato cortice destillans, coctione in Refinam flavam, aut e cinereo variegatam, fragilem inspissata. Seligatur nitide flava. Surrogatur merito in locum PICIS, quae eadem est Refina, sed ignis ope elicit, impurius, empyreumate & fuligine lignorum abietinorum contemnerata. Neque a Refina multum differt sic dictum COLOPHONIUM, quod est Pix liquida, prima coctione in aridam, altera, aceto addito, in aridissimam, fragilem, e fusco ruffam massam mutata. Vices pariter PICIS BURGUNDICAE abunde supplere posse videtur.

SAGAPENUM. Sagapen Gummi. Sagapen.

Ferulae cujusdam GUMMI RESINA, in Media, Persia & aliis orientalibus regionibus proveniens. Eligatur granularum, translucidum; foris fulvi aut ruffi coloris, intus dilutioris; saporis acris ad porrum accedentis. Rejiciantur glebae concretæ & veluti fusæ; coloris obscuri, sordidi.

SAGU. Sago. Sago.

Cycadis circinalis, quae e Palmarum familia est, vel potius, secundum *Rumphium*, *Sagus* MEDULLA granulata, siccata.

SANDARACH. JUNIPERI. Enebar Gummi. Wachholder-Harz. Firnis.

Juniperi vel *communis* vel *Oxycedri* RESINA, ab ora Africae adveſta. Eligantur grana pura, albicantia, ex albo citrina, ſplendida, pellucida, odoris grati, maſſichini.

SANGUIS DRACONIS. *Drage-Blod.* *Drachen-Blut.*

Dracaenae RESINA, ex Indiis & Africae inſulis allata. Glebae oviformes, minores, arundine involutae (in lacrumis), majoribus difformibus praeferendae ſunt, quippe puriores magisque compactae. Eſt vero genuinus Sanguis Draconis aequaliter fragilis cum laevi utrinque ſuperficie, luci ſolis admotus ſubpellucidus, coloris obſcure badii, in pulvere eleganter kermefini. Liqueſcit ſuper igne, & totus inflammabilis eſt cum odore paulum ſtoracino, nec niſi in Spiritu Vini ſolvitur. Sunt qui factitium Sanguinem Draconis *in tabulis* componunt, e variis Gummi-reſinis, ſanguine hirci aut pigmentis terreis confuſis, ligno Braſilienſi aut Draconis reſina tinctis, & Gummi Arabici ſuccedaneorum ope conglutinatis. Hic vero ex parte aqua ſolvitur, in igne ſcintillat & crepitat, flammam luculentam haud concipit, nec facile in ſubtilem teritur pulverem.

SARCOCOLLA. *Rodliim-Gummi.* *Fleiſchleim-Gummi.*

Pineae Sarcocollae GRANULA GUMMOſA, parva, ex albo ruſſeſcentia, friabilia; ſaporis amaricantis, acris, ſubdulcis; odoris nullius, e Perſia allata. Eligatur recens, (vetuſta enim ruſſeſcit), coloris pallidi, ſaporis amari, ſubſtantiae poroſae, glutinoſae.

SCAMMONEUM. *Scammonium.* *Scammonium.*

Convolvuli Scammonei SUCCUS gummoſo reſinoſus, ex Oriente allatus. Rejjiciatur *Smyrnaeum*, e variis aliis Convolvuli ſpeciebus plantisque lacteſcentibus, Eſulae, Tithymali, Apocyni, Periplocae &c. ſobole coactum, impurius, gravius,

nigricans, non adeo friabile, parum olidum. Eligendum vero Scammoneum *Aleppense* levius, spongiosum, friabile; e gilvo aut murino pullum cum splendore aliquo; in pulverem reductum ex albo cinereum; aqua aut saliva solutum, ex obsolete viridi aut cumatili lactescens; odoris ingrati virosi; saporis acris nauseosi. Sed neque hoc castum semper purumque, verum callidis artibus ita adulteratum adfertur, ut contracta labes cognosci nequeat. Hoc solum scimus, nonnunquam interponi *Scammoneum Monspeliacum* (*Cynanchi Monspeliaci* succum lactescens, coctione inspissatum), paulo gravius, magisque nigrum; sed virtutis catharticae debilioris.

SENEGAL. GUMMI ARABICUM, Arabisch Gummi, Arabisch Gummi.

Mimosae Senegal, e Guinea & ora Nigritarum in frustis conspicuae molis, foris asperis, allatum GUMMI, quod utpote minoris pretii, ejusdem tamen virtutis, in officinis prostat loco *Gummi Arabici* (*Mimosae* sive *Akakiae* Aegyptiacae & *Arabicae*) pallide latei, fragilis, fractum splendentis, pellucidi. *Bdellii* frustula, *Senegal Gummi* nonnunquam interpolata, odore se produnt.

STORAX CALAMITA. Storax. Storax.

Styracis officinalis GUMMI RESINA, e Syria & vicinis locis allata, cujus optima species, arundine excepta, *Cannulata* vel *Calamita* dicta, rarissime prostat & valde pretiosa est. Nostris in officinis vulgo illa tantum species occurrit, quae e lignorum ramentis ac ferragine, *Styracis* ope conglutinatis constat, & *Scobs storacina* dicitur, cui vero *Styracis* paucum inest, cum jam maximam partem expressa, pro conficienda *Storace granulata* ad nos perveniat. Pro usu medico praeferenda *Storax* in granis sive lacrumis albicantibus,

bus, luteis, rubentibus, variegatis, suaveolentibus, compagis densae, in ore tenacibus pinguiusculis; saporis grati pungentis, in grumos vel massas e flavo rubroque fuscas coalitis, nulla tamen ferragine intertextis. *Storax liquida vera*, lacruma arboris nativa, ad nos non pervenit, sed e Storace vino aut oleo soluta, cum Terebinthinae additione effingitur.

TACAMAHACA. Haf og Taf. Haf umb Taf.

Populi balsamiferae, Americae meridionalis ac septentrionalis & Sibiriae indigenae, LACRUMA resinosa, in putaminibus cucurbitarum collecta & advecta, coloris pallide lutei aut subruffi, languide viridis seu olivaris. Sit recens, non dura & arida, sed digito prementi cedens, tenax; odoris fragrantissimi, lavendulam ambramque spirantis, putaminibus supradictis contenta. Deterior est, & vix ulla virtute praedita, quae in grumis glebisque adfertur, aut quae fuscum, e cinereo pullum colorem acquisivit. Nonnunquam aliis resinis, ut *Chibou*, quae ex *Amiridis* aliqua specie destillat, interpolata offenditur. Datur & alia TACAMAHACA SPURIA, e leguminoso fructu *Fagarae octandrae* Linnæi, *Elaphrii tomentosi* Jacquini, parata.

TRAGACANTHA. Tragant. Dragant.

Astragali Tragacanthae ex Oriente, Graeciaeque insulis advectum GUMMI, vermiculorum instar contortum, purum, candidum. Rejiciatur flavescens, obscurioris coloris, in massis impuris sordidis allatum, super lingua non deliquesens.

IX. SUCCI VEGETABILES LIQUIDI.

ACETUM VINI. Weinedike. Weinessig.

E Vino, nova fermentatione, fermento acido addito, in regionibus viniferis paratur. Praestat limpidum, purum, acidum, gratum. Quod minori quam quadragesima sui parte salis alcalini saturatur, effoetum est. Admixtum acidum Vitrioli cognoscitur, si librae uni Aceti ad unciam unam evaporatae, adjiciatur salis alcalini fixi in aqua uncia soluti, drachma una, & ad drachmas duas residui exhalent. Si cryftalli inde natae Tartaro vitriolato aemulae fuerint, nec in spiritu vini solvantur, signum est commixti cum Aceto acidi vitriolici. Idem innotescet, si terrae calcareae in aceto forti solutio, aceto mangonii suspecto, instillatur. Limpidum inde persistit, quod purum est; lactescit vero, turbatur & sedimentum album deponit, quod acidum vitriolicum admixtum habet.

BALSAMUS COPAHU, DE COPAIVA. *Copaiva-Balsam.*
Copaiva-Balsam.

Nondum definitae arboris, indigenis *Copayba* dictae, in America australi germinantis, LACRUMA oleoso resinosa. Praestat Balsamus limpidior dilutiorque, tum consistentia, tum colore, fragrantior nec ingratis amarus, qui successu temporis tenax evadit & crassitudinem melleam adipiscitur. Rejiciatur opacus, non tenax, subturbidus, gravi odore destitutus, cujus in fundo deprehenditur liquor aquosus turbidus. Adulteratur Terebinthina, oleo expresso unguinoso, uti Amygdalarum, nupta. Innotescit hoc partim e colore non adeo laete aurantio, aut flavescente, parum opaco & subglaucos, sapore non adeo amaro, & odore minus fragrante; partim vero ex admixta Tinctura Tartari, a qua sincerus Balsamus omnis fere solvitur, limpidusque evadit; oleo expresso vero adulteratus lactescit, turbidamque ostendit mixturam.

BALSAMUS DE MECHA. Balsam fra Mecha. Balsam von Mecha.

Opobalsami RESINA liquida, albicans aut leviter flavescens, odoris fragrantis, ad Citri odorem accedentis, saporis acris & aromatici. Rarissime genuinus ad nos pervenit. Signum bonitatis est, si guttula ex duorum pollicum altitudine aquae instillata, in rotundam expanditur cuticulam, & colorem flavescensem in albicantem splendidum mutat. Cuticula haec post quadrantem horae adeo tenax evadit, ut cultri apice attingi possit.

BALSAMUS PERUVIANUS NIGER. Peruvianischer Balsam. Peruvianischer Balsam.

Ex non descriptae arboris in America australi crescentis cortice, coctione paratus Succus oleoso-resinosus. Albus enim, spontaneo exsudans stillicidio, vix ad nos pervenit. Sit e spadiceo nigricans, crassitudinis melleae, ponderosus; saporis acris, aromatici; odoris fragrantis, quasi e Caryophyllis, Benzoë & Balsamo Tolutano confusi; super carbonibus gratum spargens odorem; opacus; inter digitos tractus fila subtilia pellicidula exhibens; frigidae guttatim instillatus, fundum petens; bullienti vero, in pelliculam oleosam penetrantis saporis, aquae innatantem, & in partem graviorem, crudiorem, fundum petentem, dehiscens. Chartae instillata gutta nigra manens & adhaerens, probi; rubicunda vero promteque defluens falsitatis signum esse dicitur. Olei, interveniente cera, commixtio cum Balsamo Peruviano, patescit super ignem lenem, ubi quid balsami sinceri inest, secedit & fundum petit. Conficitur etiam Balsamum spurium ex Populi gemmis cum oleo secundario Benzoës digestis. Mentitur hic Balsamus quidem veri odorem, sed minus suavis est & validus. Alii Benzoës partes

partes quatuor, styracis unam, cum oleo coquunt & Asphaltum tingunt; quae fraus in alcohole Vini facile detegitur, in quo Balsamus verus omnis solvitur. Alii denique Benzoës oleo secundario & styracis pauxillo, vilioris pretii Balsamum de Copahu admiscunt; quod si non ex odore, saltem experimento cum oleo Vitrioli instituto, quocum Balsamus Copahu commistus, agitur, insignem ebullitionem fumosque foetentes, cum colore rubicundo edit; Peruvianus vero sine calore in mixturam rubicundissimam coccineam coit, patescit.

BETULAE SUCCUS. Birkesaft. Birkenwasser.

Betulae albae LACRUMA, e vulnerato trunco aut ramis sponte stillans. Eliciatum verno tempore, antequam frondeat arbor, & studiose vitris inditus, superfuso pauxillo olei Olivarum, contra aëris accessum defendatur.

OLEUM BEHEN. Behenöl. Behenöl.

Guilandinae Moringae e nucleis, *Balani Myrsinae* dictis, expressum OLEUM eleganter flavum, quod exiguo frigoris gradu figitur, omniumque difficillime rancescit. Quare tum ad defendendos succos vegetabiles expressos, tum ad extrahendos suaves fragrantium, ut *Jasmini* aliorumque florum odores adhibetur. Nuclei ex Aegypto ad nos veniunt.

OLEUM BERGAMOTTAE. Bergamotöl. Bergamotöl.

Citri medicae e specie *Bergamotta* dicta, expressione elicatum OLEUM essentiale, ex Italia advectum.

OLEUM BETULINUM. RUSCL. ERUSCL. Schwarzer Degen = Birkentheer.

Be-

Betulae albae e cortice exusto per descensum destillans OLEUM empyreumaticum, e Lithuania maximam partem allatum, corium bubulum Rufficum (Zuchten) redolens; quo odore dignoscitur a suppositio, e cortice Juniperi aliisque destillato.

OLEUM CAJEPUT. Cajeput: Olie. Cajeput: Del.

Cardamomi majoris filiquati, Trevis teste, e granis OLEUM essentiale, odoris Cardamomi, pellucidum, coloris laete virentis, ex India allatum.

OLEUM DE CEDRO. Citron: Olie. Citronen: Del.

Citri medicae e Fructibus OLEUM essentiale, expressione aut destillatione obtentum, ex Italia allatum. Sit flavum, pellucidum, graveolens, non turbidum.

OLEUM JASMINI. Jasmin: Olie. Jesmin: Del.

Jasmini officinalis Florum OLEUM infusum, aliunde ad nos perveniens. Vid. *Oleum Beben*.

OLEUM JUNIPERI. Enebær: Olie. Wachholder: Del. Krummholz: Del.

Juniperi vulgaris e ligno & cortice destillatum OLEUM, e sylva Hercinia allatum, non raro Oleo Pini & Terebinthinae adulteratum. Vid. *Canones pro Oleis essentialibus in Parte II.*

OLEUM LAURINUM. Lorbær: Olie. Lor: Del.

Lauri nobilis e Baccis contusis, affusaque aqua coctis expressum OLEUM, ex Italia, maximam vero partem e Gallia australi allatum. Plerumque adipe suilla, Terebinthina & colore viridi (Sastgrün vocant) adulteratum ad nos pervenit.

OLEUM LINI. Linn: Olie. Lein: Del.

Lini usitatissimi OLEUM expressum recens. Vid. *Pars II.*

OLEUM MOMORDICAE. Balsam: Nepsel: Del.

Balsaminae momordicae Fructuum OLEUM infusum, ex
Hollandia advectum.

OLEUM NUCIS MOSCHATAE. Muskat: Olie. Muskat:
Del.

Myristicae Drupae OLEUM expressum, ex Indiis allatum,
fragrantissimum, consistentiae melleae; coloris ex aureo cinna-
momei. Rejiciatur durum, pallide coloratum, non admodum
fragrans, varia pinguedine interpolatum. *Vid. Pars II.*

OLEUM NUCUM JUGLANDIUM. Walnød: Olie. Nuss:
Del.

Juglandis regia Fructus OLEUM expressum recens,
non rancidum.

OLEUM OLIVARUM. Bom: Olie. Baum: Del.

Oleae Europaeae in Europa australi cultae, e fructibus
expressum OLEUM. Praestat e Lusitania, Italia & Gallo-pro-
vincia allatum, ex albo leviter viridescens, sine amurca, absque
sapore aut falso, aut rancido, & inodorum. Quod secunda
obtinetur expressione, magis flavescit, & cum fordibus muc-
laginosi quid praecipitat, unde facilius rancefcit. Sunt, qui
detestabilis lucri causa, olea Raparum aut Lini, ab ingrato &
nidoroso odore additis praeparatis saturninis liberata, loco olei
Olivarum vendunt. Tetra fraus detegitur commixto liquore
vini probatorio, i. e. Auripigmenti Uncia, Calcis vivae Un-
ciis duabus, Aqua pluvialis Unciis duodecim infusis & di-
gestis, quae tinctura oleo, aut vino addita, illa quae plum-
beis contaminata sunt praeparatis, fusco tingit colore.

OLEUM PALMAE. Palm: Olie. Palm: Del.

Palmae

Palmae foliorum pediculis spinosis, fructu pruniformi, luteo oleoso, Sloane, OLEUM e nucleis fructuum expressum e Jamaica & Barbados insulis advectum, spissum, coloris aurantii; odoris fortis non ingrati; saporis vix ullius. Rejjiciatur album, vetustum.

OLEUM RAPARUM. Roe: Olie. Rüb: Del.

Brassicae Rapae OLEUM e seminibus expressum, recens, non rancidum.

OLEUM SPICAE. Spis: Olie. Spick: Del.

Lavendulae Spicae OLEUM stillaticium, ex Hollandia allatum.

OLEUM TEREBINTHINAE. Terpentiu: Olie. Terpentins: Del.

Oleum Terebinthinae essentiale destillatione prolicium, locum *Olei Templini* sive *Pini* supplens. Non raro adulteratur oleo *Pini*, quod tum odore, tum experimentis cum concretis resinosis variis, uti *Sandarach*, *Copal* &c. quae non nisi in vero *Terebinthinae* oleo solvuntur, innotescit.

PIX LIQUIDA. Tiar. Theer.

E variis *Pini* speciebus, lento tectoque igne concrematis, obtentum MAGMA, unctuosum, salino-oleoso-resinosum empyreumaticum, ex *Norvagia*, aut *Suecia* potissimum advectum.

SPIRITUS VINI. Brandeviin. Branntwein.

Spiritus inflammabilis destillatione e *Vino*, *Vini* faecibus, *Cerealibus*, *Syrupo de Saccharo* defluente &c. prolicitus. Ad tincturas aliaque medicamenta paranda, non nisi *Spiritus Vini Gallicus*, isque probe rectificatus, adhibeatur.

STYRAX LIQUIDA. Styrag: Balsam. Styrag: Balsam.

Liquidambaris styracifluae LACRUMA resinosa, e nova Hispania & America septentrionali advecta. Quod in Officinis Storacis liquidae titulo insignitum prostat, magma est factitium, e cinereo spadiceum, aut pullum, opacum unctuosum, e Terebinthina, oleo vinoque compositum, cui Storacis siccae pauxillo addito, ambrosiacus hujus odor conciliatus fuit. Sincera & nativa Storax liquida antiquis celebrata, nunquam ad nos pervenit. Colligitur in maris rubri insula Cobros, Moccamque adfertur, quo ipso loco & rara est & praecara. Est vero pellucida, coloris rubelli, aut e murino fulvi, & valde fragrans. In hac genuinae Storacis inopia, Americana accipitur, limpida, coloris ad lucem aurei, & fragrantissima.

TEREBINTHINA. *Serpentin.* *Serpentin.*

Pistaciae Terebinthin LACRUMA, coloris albi, splendidi, argentei, varie in subglaucum, flavum viridemque, pro varia versus lucem collocatione mutabilis. *Cypria*, sive *Chia* sincera, gratioris magis amaritiei, tenacior, prunis inspersa odorem spargens mastichinum, rarissime ad nos pervenit. Praefertur paulo opaca, crassior, tenacior. Quae *Veneta* dicitur, ex America septentrionali adfertur, aut in Germania australi, Sabaudia, Helvetia, Delphinatu & vicinis colligitur locis, atque in utribus e pellibus hircinis confutis ad nos pervenit. Sunt vero Terebinthinae duae species, *larigna* (*Pini Laricis*) *Serchen = Serpentin*, & *abiegna* (*Pini Abietis*) *Tammen = Serpentin*, quae sequentibus distinguuntur notis: abiegna limpidior est, & magis pellucida; larigna pallide magis flavet: abiegna non adeo tenax est; larigna saporis est acrioris, pungentis, ingrati, oleo tamen ditior: abiegnae sapor magis amarus est, grate citrinus; odor gratior, citrum redolens, nec prunis injecta foetet uti larigna. Est autem abi-

abiegnæ species, quam alii *Pini Balsamicæ*, alii *Laricis Canadensis* lacrumam esse perhibent, gratissima quidem Terebinthina, Britannis, Gallisque sub titulo *Balsami Canadensis*, sive *de Gilead* usitata. *Terebinthina communis* dicta (*Pini Taedæ*) Söhrenkieu: *Serpentin*, coloris fusci, non adeo pellucida, ingrati odoris ac saporis, non raro etiam impura, pro usibus medicis non adhibeatur.

VINUM. Wein. Wein.

Vitis viniferae ex uvis Succus expressus, calore temperato fermentatus, & a faecibus decantatus. In Pharmacopoliis praesto sint: VINUM GALLICUM ALBUM vetustius; GALLICUM RUBRUM, lignis tinctoriis, aut Myrtilli baccis non imbutum; HISPANICUM nobilius; RHENANUM vetustius, gratum, non acidi crudique saporis. Syruporum aut mellis cum Vino commixtio noto cognoscitur experimento, ubi vino repletum angustioris colli vitrum, super vase aqua pleno inveritur, unde dulcem aqua nanciscitur saporem. Rejiciantur pariter vina suffitu nimio sulphurato temerata, quod tam odore, quam instillata solutione argenti in Aqua forti, unde subniger, aut fuscus vino conciliatur color, patefcit. Deleteria vero illa, a praeparatis saturninis, Bismutho, ipsoque Arsenico Vino inducta labes, detegitur, aut instillatis Vini binis unciis, Olei Vitrioli optimi guttis senis, unde lactescet & calcem in fundum demittet; aut immisto liquore vini probatorio, sub *Oleo Olivarum* descripto; aut addita denique Tinctura Sulphuris Hoffmanni, a quibus Vinum adulteratum nigrificantem induit colorem.

X. SALIA VEGETABILIA.

CINERES CLAVELLATI. Pott: Afke. Pott: Afche.

Sal Alkali impurum, e crematis arboribus durioribus, Fagis imprimis paratum. Plerumque continent sal medium, Tartari vitriolati, aut Salis marini aemulum. Quare nova in aqua frigida solutione, & filtratione & exsiccatione, ad Alkali purum obtinendum, indigent. Germanici Cineres, quo puriores sunt, magisque albentes, levesque, (Vertasche vocant,) eo purius largiuntur Alkali. Ad mechanicos vero usus praestant Cineres Russici, in massis grandibus, duris, obscurioris coloris, non facile humidum ex aëre attrahentibus, allati, ob interpolata inter cremandum segmenta abiogna, acido vegetabili scatentes, & revera diversum a vero Alkali sal exhibentes.

FULIGO. Spejl. Soed. Rus.

Concretum salino-oleosum empyreumaticum e fumo lignorum combustorum.

SACCHARUM. Suffer. Zucker.

Sacchari officinalis SAL essentielle ex America allatum. Crudum, neque repetito depuratum *Thomaeum*; farinaceum, Puder: Suffer, Muscovade; repetita solutione addito lixivio alcalino crystallifatum: *Canariense* Fiin fiin; in grandiores denique crystallos redactum *Candum flavum*, Suffer: Candies, vocatur.

SACCHARUM LACTIS. Melk: Suffer. Milch: Zucker.

Seri, quod sponte e lacte secessit, SAL essentielle, ex Helvetia plerumque allatum.

SAL ACETOSSELLAE. Skovsyre: Salt. Sauerklee: Salz.

Oxa-

Oxalidis Acetofellae SAL. essentielle acidum. Sincerum hoc sal aliunde advectum, pulverem exhibet non adeo subtilem, in lamellulas dispositum, ex albo gilvi, aut subfusci coloris. Saepius vero crystallis Tartari & acido vitrioli remixtum deprehenditur; quod ex saporis differentia, & solutione in aqua, quae admistas Tartari crystallos praecipitat, patescit.

SAPo ALICANTINUS. Spanst Sebe. Spanische Seife.

Ex Oleo *Olivarum* atque lixivio quod e binis Sodae; una calcis vivae partibus paratur, coctione inspissatus SAPo, maximam partem Massiliae confectus. Sit albicans, durus, levis, digitos pinguedine non inquinans, neque ingrato rancidoque odore corruptam pinguedinis adhibitae indolem prodens. Rejiciatur variegatus, nec unquam usibus internis inferviat, quippe Auripigmenti non exiguam quantitatem admistam habens. Praestat vero Sapo Alicantinus prae Veneto.

SODA HISPANICA. Sode. Sode. Glas. Schmalz. Asch. Sals.

Sal ex Alkali vegetabili & minerali, cum aliqua salis communis portione constans, e Plantarum marinarum ac salifarum, *Chenopodii* imprimis *maritimi* ac *falsi*, *Salicorniae Europaeae*, *Salsolae Kali* ac *Sodae*, *Fucorum* etiam, praecipue *Fuci vesicularis* cineribus in foveam collectis, in quibus in massam duram, gryseam, glaucam coalescit, conflatum. Paratur in Aegypto, ora Africae, Hispania, Gallia, Italia, nec non in regno Astracan. *Alexandrina* non nisi ad Venetos perveniens, ad artem vitrariam adhibetur. Optima quae nobis adfertur, Alicantina est, & prae reliquis species illa, quae de *Berilla*, sive *la Bariglia* vocatur. Mediae bonitatis censetur *Carthaginensis*, ex Hispania advecta; obscurioris coloris, multum tamen Alicantinae postponenda. Vilior omnium est, ideo-

ideoque rejicienda, quae ex aliis regionibus adfertur, imprimis ea, quae *de Bourdine*, aut *de Barech* vocatur; Saponariorum magis quam Medicorum accommodata. Proba autem Alicantina sit dura, sicca, tinniens, multis foraminibus conspicua, coloris e gryseo glauci, particulis parvis albetibus, majoribus nigricantibus remixta. Sodae frustulum saliva madefactum, odorem spargat violaceum & parum urinosum volatilem. Adfertur etiam genuina Alicantina in frustis minoribus, filicum magnitudinis, *Cailloti* vocatis. Quae vero in doliis junco involuta dividitur, plerumque vilior est. Rejiciatur humida, pinguis, facile in aëre madescens; capillis & sabulo scatens; e nigro virescens aut albicans; madefacta ingratum, uliginosum & paludosum foetorem edens; saporem eundem, aut falsum non lixiviosum linguae imprimens; cum acidis haud promte effervescent, & foraminibus non conspicua.

TARTARUS. *Winsteen.* *Weinstein.*

Sal essentielle Musti, fermentationem vinosam experti. Tartarus *crudus* albus est aut ruber. Praestat e Rhenano Vino albus, plus salis continens. Sit autem purus, ponderosus, solidus, non spongiosus, externe crystallis multis puris resplendens. Crystalli Tartari secundum regulas in Parte II. praescriptas parandae, non aliunde arcessendae sunt. His enim saepius aut Alumen admistum est, aut Nitrum. Prius addito Gallarum infuso, unde pulvis albus praecipitatur; posterus detonatione detegitur.

III.

E REGNO ANIMALI.

I. TERRAE ANIMALES.

CANCORUM LAPIDES, sive OCULI. Krebs-Steene.
Krebs-Augen.

Cancri macrouri, rostro supra ferrato, basi utrinque dente simplici LAPIDES, ventriculo accreti, e lamellis sibi superincumbentibus vel striis compositi; qua nota ab adulteratis, factitiisque dignoscuntur.

CERVI CORNU. Hiorte-Saffe. Hirsch-Horn.

Cervi elaphi CORNU.

CONCHAE. Musling-Schaller. Muschel-Schaalen.

Vermium testaceorum bivalvium TEGMENTA calcarea.

CORALLIA ALBA. Hvide Coraller. Weiße Corallen.

Madrepora oculata in mari Siculo, ac Tyrrheno habitans.

CORALLIA RUBRA. Rode-Coraller. Rote Corallen.

Madrepora rubra, stellis parvis, obsoletis, lateralibus.
Lithophytum in mari Numidico reperiundum. Eligatur pulchre rubens, a sordibus liberum.

MATER PERLARUM. Perle: Moer. Perle: Mutter.

Ostreae Ephyppii TESTA, in mari Asiatico reperiunda.

OSTREARUM TESTAE. Osters: Skaller. Austern:
Schaalen.

Ostreae edulis TESTAE ad calcem parandam.

SEPIAE OS. Fiske: Been. Fisch: Bein.

Sepiae octopodae OS dorsale corneum.

II. VERMES ET INSECTA.

CANTHARIDES. Spanske: Fluer. Spanische Fliegen.

Meloë vesicatorius, in regionibus calidioribus, Hispania, Gallia, Germania &c. abundans; Fraxinum, Ligustrum, Populum albam, Sambucum, praecipue amans. Praeferuntur minores, recentes, integrae non pulverulentae.

COCCINELLA. Carmesin:Orm. Cuzzinell.

In *Cocci cacti coccinelliferi* Surculis collecta INSECTA, certa encheiresi in grana abeuntia. Advehuntur e nova Hispania, & regno Mexicano. Sint integra, granulata, externe albicantia; trita vero purpurea, ponderosa.

FORMICAE. Myrer. Ameisen.

Formicae ruffae.

GALLAE. Galbæbler. Galläpfel.

Cynipis Quercus a puncturis insectorum natae EXCRESCENTIAE fungosae, ex Aleppo & Smyrna allatae.

HIRU-

HIRUDO. Blodigel. Blutigel.

Hirudo medicinalis depressa, fusca, lineis flavis dorsali-
bus sex, intermediis immaculatis, subtus cinerea, nigro - ma-
culata.

KERMES. Kermesforn. Carmosin- oder Scharlachbeern.

Cocci quercus cocciferae EXCRESCENTIAE, a puncturis &
depositione ovulorum infecti cujusdam natae, ex Monspeliensi
agro advectae. Eligantur grana e rubicundo fusca, integra.

LUMBRICUS. Jordmaddik. Regenwurm.

Lumbricus terrestris.

MILLEPEDES. Rielderorm. Eselorm. Kellerefel.
Mauerefel.

Onisci Aselli.

MUSCUS CORALLINUS. Strand-Moos. Corallen-Moos.

Corallina officinalis trichotoma. ZOOPHYTON in Oceano
Europaeo habitans, integrum, sabulo & conchis variis non
remixtum.

SCARABAEUS UNCTUOSUS MAJALIS.

Meloë Proscarabaeus, apterus, corpore violaceo, in apri-
cis campis habitans, vivus melli immerfus.

SCORPIO. Scorpion. Scorpion.

Scorpio Europaeus, pectinibus octodecim dentatis, mani-
bus unguulatis, pro Scorpionum oleo parando.

SPONGIA. Svampe. Schwamm.

Spongia officinalis. ZOOPHYTON in mari mediterraneo
magna quantitate reperiundum, album, foraminibus exiguis
pervium, leve.

STINCUS MARINUS. See: Stintz. Meer: Stintz.

Lacertis simile ANIMAL, cum dorso latiore, magis glabro, in Nilo fluvio & mari rubro degens.

VIPERA. Odderslange. Viper.

Coluber Vipera ex Italia advecta.

III. SUCCI ANIMALES ARIDI ET FLUIDI.

AXUNGIA CANIS. Hunde: Fett. Hunds: Schmalz.

Canis familiaris PINGUEDO eliquata recens.

AXUNGIA LEPORIS. Hare: Fett. Hasen: Fett.

Leporis timidi PINGUEDO recens.

AXUNGIA LUCII PISCIS. Giedde: Fett. Hecht: Schmalz.

Esocis Lucii PINGUEDO recens.

AXUNGIA PORCI. Swine: Fett. Schwein: Schmalz.

Suis scrofae PINGUEDO recens.

AXUNGIA VIPERAE. Odderslange: Fett. Vipern: Schmalz.

Colubri Viperae PINGUEDO recens.

AXUNGIA URSI. Biorne: Fett. Bären: Schmalz.

Ursi PINGUEDO recens.

CASTOREUM. Bevergeel. Viebergeil.

HUMOR pinguis, oleaginosus, in folliculis propriis, juxta anum *Castoris*, *Fiber* dicti, secretus. Aestumatur Dantifica-

tiscanum, Prussicum, Polonicum, durum, ponderosum, rufum, tenuibus membranulis intermixtum; odoris penetrantis ingrati, saporis amari subnauseosi. Inferioris quidem notae, sed botum satis est Castoreum Russicum, ut & Anglicum ex America allatum, siccius, minus fortis odoris, minoribus magisque nigris contentum sacculis. Saepe etiam corrumpitur Ammoniaco, Sagapeno, arenis, melle; odore & sapore fraus detegitur.

CERA. Bøf. Wachs.

Apis melliferae e florum staminibus & nectariis collecta & elaborata SUBSTANTIA GLUTINOSA, ex favis, expresso prius omni melle, igne liquatis, adjecta aqua lotis, & in panes fufis, parata, sub *Cerae flavae* nomine, quae reperita ad ignem fusione purificata, lota, aëre, sole, aliisque artificiis dealbata *Ceram albam* exhibet.

CERVI SEBUM. Hiorte: Tælle. Hirsch: Talg.

Cervi elaphi PINGUEDO eliquata recens.

CETI SPERMA. Hvalraff. Walrath.

Physeteris Macrocephali e ventriculis cerebri LIQUOR UNCTUOSUS, coctione aridus redditus. Eligatur album, dulce, recens. Flavum rancidum est.

FEL LUCII PISCIS. Giedde: Galde. Hecht: Galle.

Esocis Lucii BILIS inspissata.

FEL TAURI. Oye: Galde. Ochsen: Galle.

Bovis Tauri BILIS ad inspissandum.

GUMMI LACCAE. Gummi: Laf. Gummi: Lac.

Gummiresina ceracea, a formicis volantibus Indiae ex arboribus collecta; accensa odorem primo gratum, dein foetidum,

tidum, animalis substantiae spargens, colorem rubrum a Chrysalidum exuviis adipiscens. Quae *Lacca in Granis* dicitur, deterior est tota, & infecto orba. Ejusdem census est *Lacca in Tabulis*, e granulata fusa & a faecibus purgata confecta, e flavo rubens, pellucida & fragmentis Vitri Antimonii similis: Praestat LACCA IN BACULIS, sive in ramulis, subamara adstringens, salivam colore purpureo tingens.

HIRCI SANGUIS. Bocke: Blod. Voets: Blut.

Caprae Hirci, herbis vulnerariis per tempus pasti & mactati, SANGUIS in clibano siccatus.

HIRCI SEBUM. Bocke: Telle. Voets: Zalg.

Caprae Hirci PINGUEDO recens.

ICHTHYOCOLLA. COLLA PISCIIUM. Huus: Blas. Haus: Blasen.

Ex *Acipenseris Husonis* pinnis, intestinis, corio excoctum GLUTEN, quod refrigeratum in pelliculas deductum & in spiras contortum prostat. Advehitur maximam partem ex Moscovia. Eligatur alba, ponderosa, solida, facile ac tota dissolubilis.

MEL. Honning. Honig.

Apis melliferae e nectare & polline florum PRODUCTUM resinose-mucilaginosum, spissioris consistentiae; saporis dulcissimi; odoris grati; coloris vel albicantis, vel pallide flaventis; vel etiam saturatoris. Praeter plantarum, ex quibus mel colligitur,

rum, diversitatem, unde salubritas, odoris saporisque differentia pendent, adhuc magnum ratione coloris, consistentiae, puritatis, bonitatis discrimen patitur. Optimum est VIRGINEUM, *Zomfrue Honning, Jungfern-Honig*, nulla adhibita arte ex favis diffractis, craticulae impositis, defluxum. Delicatus deprehenditur MEL NARBONENSE, ubi Rosmarinus, aliaeque nobiliores plantae occurrunt. Deterius est *expressum*, ceram redolens; deterrimum elutum, coctum. Adulteratum farina magis albidum est, vix odorum, glutinosum. Consistentia, color, odor, sapor, aliarum fraudum criteria sunt. MEL DESPUMATUM, *Blavet Honning, geläuteter Honig*, in vase fictili, moderato calore, lente parandum est.

MOSCHUS. Desmer. Bisam.

SUBSTANTIA UNCTUOSA, ambrosiaca, e folliculis prope umbilicum *Moschi moschiferi* collecta. Optimus sed rarus est *Tunquinius*; Ordine bonitatis succedit ex *Bengalia & Agria* allatus; pessimus est *Moscoviticus*. Optima Moschi species affertur in vesicis tenuibus, rotundis, magnitudinis ovi columbini, crinibus ruffis brevibus tectis, integre repletis. Mucus ipse siccus est, parum unctuosus, obscure rubri, ruffi aut e ferrugineo nigricantis coloris; in parvis rotundis granis, perpaucis duris nigris frustulis intermixtus, sine ulla, aut fabuli, aut aliarum substantiarum admistione. Manducata aut cultro abrasa frustula, particulis quasi resinosis micantia, flavescunt; saporem amaricantem odoremque fragrantem produnt; & laminae candenti imposita tota evaporant, relicto cineris

neris gryfei pauxillo. Adulteratus enim est Moschus, qui aliquid carbonis instar adustum relinquit.

SAL AMMONIACUS. Salmiac. Salmiac.

SAL e fuligine stercoreum animalium concrematorum, ex acido salis falsi & alcali urinoso conflatus. Ex Aegypto advehitur; nunc vero Brunsvigae etiam non secus ac in Scotia paratur, & forma conorum, instar sacchari adfertur. Eligatur candidum & purum, quod addito sale alcali statim odorem salis volatilis spargit.