

## III.

## E REGNO ANIMALI.

## I. TERRAE ANIMALES.

**C**ANCRORUM LAPIDES, sive OCULI. Krebs-Steene.  
Krebs-Augen.

*Cancri macrouri*, rostro supra serrato, basi utrinque den-  
te simplici LAPIDES, ventriculo accreti, e lamellis fibi super-  
incumbentibus vel striis compositi; qua nota ab adulteratis,  
factitiisque dignoscuntur.

CERVI CORNU. Hjorte-Takke. Hirsch-Horn.

*Cervi elaphi* CORNU.

CONCHAE. Musling-Skaller. Muschel-Schaalen.

*Vermium testaceorum bivalvium* SEGMENTA calcarea.

CORALLIA ALBA. Hvide Coraller. Weisse Corallen.

*Madrepora oculata* in mari Siculo, ac Tyrrheno ha-  
bitans.

CORALLIA RUBRA. Nede-Coraller. Rothe Corallen.

*Madrepora rubra*, stellis parvis, obsoletis, lateralibus.  
Lithophytum in mari Numidico reperiendum. Eligatur  
pulchre rubens, a Fordibus liberum.

O

MATER

MATER PERLARUM. Perle-Moer. Perle-Mutter.

*Ostreae Ephippii TESTA*, in mari Asiatico reperiunda.

OSTREARUM TESTAE. Oster-Skaller. Austern-Schaalen.

*Ostreae edulis TESTAE* ad calcem parandam.

SEPIAE OS. Fiscke-Been. Fisch-Bein,

*Sepiae octopodae OS dorsale* corneum.

## II. VERMES ET INSECTA.

CANTHARIDES. Spanische-Fluer. Spanische Fliegen.

*Meloë vesicatorius*, in regionibus calidioribus, Hispania, Gallia, Germania &c. abundans; Fraxinum, Ligustrum, Populum album, Sambucum, praecipue amans. Praefuruntur minores, recentes, integrae non pulverulentae.

COCCINELLA. Carmesin-Orm. Cuzzinell.

In *Cocci cacti coccinelliferi* Surculis collecta INSECTA, certa encheiresi in grana abeuntia. Advehuntur e nova Hispania, & regno Mexicano. Sint integra, granulata, externe albicantia; trita vero purpurea, ponderosa.

FORMICAE. Myrer. Ameisen.

*Formicae ruffae.*

GALLAE. Galdebler. Galläpfel.

*Cynipis Quercus* a puncturis insectorum natae EXCENTIAE fungosae, ex Aleppo & Smyrna allatae.

HIRU-

HIRUDO. Blodigel. Blutigel.

*Hirudo medicinalis* depressa, fusca, lineis flavis dorsali-  
bus sex, intermediis immaculatis, subtus cinerea, nigro - ma-  
culata.

KERMES. Kermeskorn. Carmosin- oder Scharlachbeern.

*Cocci quercus cocciferae* EXCRESCENTIAE, a puncturis &  
depositione ovulorum insecti cuiusdam natae, ex Monspeliensi  
agro advectae. Elegantur grana e rubicundo fusca, integra.

LUMBRICUS. Jordmaddel. Regenwurm.

*Lumbricus terrestris*.

MILLEPEDES. Kielderorm. Eselorm. Kellereisel.

Maueresel.

*Onisci Afelli*.

MUSCUS CORALLINUS. Strand-Moos. Corallen-Moos.

*Corallina officinalis trichotoma*. ZOOPHYTON in Oceano  
Europaeo habitans, integrum, fabulo & conchis variis non  
remixtum.

SCARABAEUS UNCTUOSUS MAJALIS.

*Meloë Proscarabaeus*, apterus, corpore violaceo, in apri-  
cis campis habitans, vivus melli immersus.

SCORPIO. Scorpion. Scorpion.

*Scorpio Europaeus*, pectinibus octodecim dentatis, mani-  
bus ungulatis, pro Scorpionum oleo parando.

SPONGIA. Svampe. Schwamm.

*Spongia officinalis*. ZOOPHYTON in mari mediterraneo  
magna quantitate reperiundum, album, foraminibus exiguis  
pervium, leve.

STINCUS MARINUS. See: Stintz. Meer-Stink.

Lacertis simile ANIMAL, cum dorso latoire, magis glabro, in Nilo fluvio & mari rubro degens.

VIPERA. Odderlange. Viper.

Coluber Vipera ex Italia advepta.

### III. SUCCI ANIMALES ARIDI ET FLUIDI.

AXUNGIA CANIS. Hunde-Fitt. Hunds-Schmalz.

*Canis familiaris* PINGUEDO eliquata recens.

AXUNGIA LEPORIS. Hare-Fitt. Hasen-Fett.

*Leporis timidus* PINGUEDO recens.

AXUNGIA LUCHI PISCIS. Giedde-Fitt. Hecht-Schmalz.

*Esox Lucius* PINGUEDO recens.

AXUNGIA PORCI. Swine-Fitt. Schwein-Schmalz.

*Suis scrofae* PINGUEDO recens.

AXUNGIA VIPERAE. Odderlange-Fitt. Vipern-Schmalz.

*Colubri Viperae* PINGUEDO recens.

AXUNGIA URSI. Biorne-Fitt. Bären-Schmalz.

*Ursi* PINGUEDO recens.

CASTOREUM. Bevergeel. Biebergeil.

HUMOR pinguis, oleaginosus, in folliculis propriis, juxta anum *Castoris*, Fiber dicti, secretus. Aestumatur Dantifica-

tiscanum, Prussicum, Polonicum, durum, ponderosum, rufum, tenuibus membranulis intermixtum; odoris penetrantis ingrati, saporis amari subnauseosi. Inferioris quidem notae, sed borium satis est Castoreum Russicum, ut & Anglicum ex America allatum, siccus, minus fortis odoris, minoribus magisque nigris contentum sacculis. Saepe etiam corrumpitur Ammoniaco, Sagapeno, arenis, melle; odore & sapore fraus detegitur.

## CERA. Vor. Wachs.

*Apis melliferae* e florum staminibus & nectariis collecta & elaborata SUBSTANTIA GLUTINOSA, ex favis, expresso prius omni melle, igne liquatis, adjecta aqua lotis, & in panes fusis, parata, sub *Cerae flavae* nomine, quae repetita ad ignem fusione purificata, lota, aere, sole, aliisque artificiis dealbata *Ceram album* exhibet.

## CERVI SEBUM. Hiorte-Telle. Hirsch-Talg.

*Cervi elaphi* PINGUEUDO eliquata recens.

## CETI SPERMA. Hvalraff. Wallrath.

*Physeteris Macrocephali* e ventriculis cerebri LIQUOR UNCTUOSUS, coctione aridus redditus. Eligatur album, dulce, recens. Flavum rancidum est.

## FEL LUCII PISCIS. Giedde-Galde. Hecht-Galle.

*Esocis Lucii* BILIS inspissata.

## FEL TAURI. Dre-Galde. Ochsen-Galle.

*Bovis Tauri* BILIS ad inspissandum.

## GUMMI LACCAE. Gummi-Lak. Gummi-Lac.

*Gummiresina ceracea*, a formicis volantibus Indiae ex arboribus collecta; accensa odorem primo gratum, dein foetidum,

tidum, animalis substantiae spargens, colorem rubrum a Chrysalidum exuviis adipiscens. Quae *Lacca in Granis* dicitur, deterior est tota, & infecto orba. Ejusdem censu est *Lacca in Tabulis*, e granulata fusa & a faecibus purgata confecta, e flavo rubens, pellucida & fragmentis Vitri Antimonii similis: Praestat *LACCA IN BACULIS*, sive in ramulis, subamara adstringens, salivam colore purpureo tingens.

*HIRCI SANGUIS.* Buffe-Bloß. Bock's. Blut.

*Caprae Hirci*, herbis vulnerariis per tempus pasti & maestati, *SANGUIS* in cibano siccatus.

*HIRCI SEBUM.* Buffe-Tælle. Bock's. Talg.

*Caprae Hirci PINGUEDO* recens.

*ICHTHYOCILLA.* *COLLA PISCUM.* Huus-Blas.  
Haus-Blasen.

Ex *Acipenseris Husonis* pinnis, intestinis, corio excoctum **GLUTEN**, quod refrigeratum in pelliculas deductum & in spiras contortum prostat. Advehitur maximam partem ex Moscovia. Eligatur alba, ponderosa, solida, facile ac tota dissolubilis.

*MEL.* Honning. Honig.

*Apis melliferae* e nectare & polline florum **PRODUCTUM** resinoso-mucilaginosum, spissioris consistentiae; saporis dulcissimi; odoris grati; coloris vel albicantis, vel pallide flaventis; vel etiam saturationis. Praeter plantarum, ex quibus mel colligitur,

tur, diversitatem, unde salubritas, odoris saporisque differentia pendent, adhuc magnum ratione coloris, consistentiae, puritatis, bonitatis discrimen patitur. Optimum est VIRGINEUM, *Zomfrue Honning*, *Jungfern-Honig*, nulla adhibita arte ex favis diffractis, craticulae impositis, defluxum. Delicatus deprehenditur MEL NARBONENSE, ubi Rosmarinus, aliaeque nobiliores plantae occurunt. Deterius est *expressum*, ceram redolens; deterrium elutum, coctum. Adulteratum farina magis albidum est, vix odorum, glutinosum. Consistentia, color, odor, sapor, aliarum fraudum criteria sunt. MEL DESPUMATUM, *Klaret Honning*, geläuterter Honig, in vase fictili, moderato calore, lente parandum est.

## MOSCHUS. Desmer. Bisam.

SUBSTANTIA UNCTUOSA, ambrosiaca, e folliculis prope umbilicum *Moschi moschiferi* collecta. Optimus sed rarus est *Tunquinius*; Ordine bonitatis succedit ex *Bengalia & Agria* allatus; pessimus est *Moscoviticus*. Optima Moschi species affertur in vesicis tenuibus, rotundis, magnitudinis ovi columbini, crinibus ruffis brevibus tectis, integre repletis. Muscus ipse siccus est, parum unctuosus, obscure rubri, ruffi aut e ferrugineo nigricantis coloris; in parvis rotundis granis, perpaucis duris nigris frustulis intermixtus, sine ulla, aut fabuli, aut aliarum substantiarum admitione. Manducata aut cultro abrasa frustula, particulis quasi resinosis micantia, flavescent; saporem amaricantem odoremque fragrantem produnt; & laminae candenti imposta tota evaporant, relicto cineris

neris grysei pauxillo. Adulteratus enim est Moschus, qui aliquid carbonis instar adustum relinquit.

SAL AMMONIACUS. *Salmiac.* *Salmiac.*

SAL e fuligine stercorum animalium concrematorum, ex acido salis falsi & alcali urinoso conflatus. Ex Aegypto advehitur; nunc vero Brunsvigae etiam non secus ac in Scotia paratur, & forma conorum, instar sacchari adfertur. Eligatur candidum & purum, quod addito sale alcali statim odorem salis volatilis spargit.