

Argentum. Silber.

Metallo album, ductile, via secca oxygenium respuens in acido nitrico solubile, oxydatum cum acido muriatico connubium indissolubile contrahens.

Arsenicum album. Weisser Arsenik.

Arsenicum oxydatum sublimando paratum massam refert scoriformem, compactam, albam, recens subpellucidam, tempore opacam. In igne fumi albi instar avolat, odorem alliaceum spargens.

Asa foetida. Stinkender Asand.

Ferula Asa foetida. Planta perennis Persiae.

Gummi-resina tenax, vel ex flavo fusca, vel ex fusco rosea. Immixta sunt nonnunquam granula subdiaphana. Sapor ex acri amaricantis est, odor autem maxime nauseosus, odori alliaceo affinis. Laetis instar ex radice transversim secta effluit in superficie sauciata.

Asphaltum s. Bitumen judaicum, Judenpech.

Schlackiges Erdpech.

Bitumen solidum ex fusco nigrum, friabile atque in fractura nitens. Optimum est, quod mari mortuo, mari rubro et aliis quibusdam Asiae meridionalis et Europae lacubus asphalticis innat. Vulgare in fodinis Galliae aliarumque Europae provinciarum occurrit.

Baccae Berberidis. Berberis-Beeren.

Berberis vulgaris. Frutex Germaniae.

Baccae oblongae, rubrae, peracidæ.

Juniperi. (7)

Baccae Lauri. Wacholder-Beren.

Juniperus communis. Arbor aut frutex Europae borealis,

Fructus baccati nigri, resinosi, odore graveolente et sapore subamaro praediti.

Baccae Lauri. Lorbeeren.

Laurus nobilis. Arbor Europae meridionalis.

Fructus recentes nigrantes, oleosi, aromatici.

Balsamum Copaivae. *Copaiva Balsam.*

Copaifera officinalis. Arbor Americae meridionalis, in Brasilia frequens.

Ex arbore stillans pellucidum est, flavescentia, odor aromatico et sapore amaricante non ingratu praeditum. Adulteratur praesertim terebinthina et oleum amygdalarum dulcium. Terebinthina, balsamo ferro candenti insperso, odore proprio sese prodit; oleum amygdalarum autem, balsamo in spiritu vini soluto, in fundo remanet.

Balsamum Indicum s. Peruvianum nigrum.

Schwarzer Peruischer Balsam.

Myroxylon perufiferum. Arbor Americae meridionalis, praesertim in regno Peruviano frequens.

Sapore praeditum est ex acri aromatico mixto et odore grato benzoino, quem etiam dispergit carbonibus aut ferro ignito injectum. Obtinetur coctione ramulorum in aqua. Bullienti aquae instillatum separatur in partem leviorum, quae aquae pelliculam superinducit, et in partem graviorem, quae

fundum vasculi petit. Solvitur in spiritu vini; con-
nubium cum oleis plane respuens. Acidum sulphuri-
cum, additis aliquot balsami peruviani nigri guttulis,
colore tingitur intense coccineo.

Balsamum Peruvianum album. *Weisser Peruani-
scher Balsam.* Ex arbore sponte destillans rarissimum
est.

**Baryta sulphurica nativa f. Spathum ponde-
rosum.** *Schwerspath.*

In medallifodinis Hercinia, Saxoniae aliisque ve-
nas implet. Eligantur frustula alba, lamellosa, hete-
rogenes minus inquinata. Baryta acido sulphurico
nupta in aqua plane indissolubilis est.

Benzoë f. Gummi Benzoëes f. Asa dulcis.
Penzoë.

Styrax Benzoë Dryanderi? *Arbor Indiae orientalis.*

Resina e ramis exsudans, subfusca, granulis albis
immixtis variegata, friabilis, nitens, saporis subacris
et odoris grati, praesertim si liquatur.

Bismuthum, vulgo Marcasita. *Wismuth.*

Metallum fragilissimum, ex albo subrubicundum,
lamellis compositum, leni igne admoto liquefcens, in-
tensiore autem actum in vase clauso volatile. Acido
nitrico nuptum per aquam sub forma oxydi albi
praecipitatur.

Bole-

Boletus igniarius. *Feuerschwamm.*

Boletus igniarius. *Per totam Germaniam frequentissimus.*

Fungus tenuissime porosus, superne cinereus, margine albescens, inferne albidus. Quercubus, Betulis et Fagis adhaeret.

Boletus Laricis s. Agaricum. *Lärchenschwamm.*

Boletus Laricis Jacquinii. *In Austria et Sarmatia frequens; forsitan varietas Boleti igniarii?*

Fungus suberosus tubulis subtilissimis instruclus, recens subaurantiacus. Siccatus, extus cinereus, intus albus, atque in tenues laminas facile scissilis est, et tunc *Agaricum praeparatum* nominatur.

Boletus Salicis. *Weidenschwamm.*

Boletus suaveolens. *In Europa boreali frequens.*

Fungus inaequaliter porosus, salicibus accrescens, et odorem aromaticum spargens, praesertim post pluviam.

Bolus armenia. *Armenischer Bolus.*

Argilla ex luteo rubra, ferro oxydato turgida. Quae in Germania, Gallia vicinisque regionibus effoditur, parum differt a genuina ex Armenia allata.

Borax. *Borax.*

Tincal, Asiae mediae sal nativum, e Natro et Acidio boracico constans, peracta depuratione et crystal-

lisatione, nomine Boracis insignitur. Albus sit, crystallinus et leni calore fusilis.

Cacao. Cacaobohnen.

Theobroma Cacao. Arbuscula in America meridionali frequenter culta.

Semina oleoso-farinacea, ex fusco nigricantia, seminibus Viciae Fabae similia.

Calcaria, vulgo Calx. Kalkerde.

Terra propria, acido carbonico juncta, quo amisso in aquae partibus quingentis solubilis fit. Cum Acido sulphurico gypsum constituit. Eligatur heterogeneis libera, qualem praebent Marmor album, Testae Ostrearum, etc.

Camphora. Kampher.

Laurus Champhora. Arbor Indiae orientalis, praesertim in Japonia frequens.

Champhora cruda constat massulis globulosis, flavis, subluteis et cinereis, quae destillatione ramulorum et foliorum cum aqua, a reliquis Lauri Camphorae partibus constitutivis separatae, statim sublimantur.

Camphora depurata, nova sublimatione Camphorae crudae parata, concrescit in massas magnas orbicularis, subtus concavas. Optima nivea est et glaciei instar subdiaphana. Super ignem liquata olei instar fluit et accensa deflagrat omnis. Odorem proprium fragantissimum spargit.