

lisatione, nomine Boracis insignitur. Albus sit, crystallinus et leni calore fusilis.

Cacao. Cacaobohnen.

Theobroma Cacao. Arbuscula in America meridionali frequenter culta.

Semina oleoso-farinacea, ex fusco nigricantia, seminibus Viciae Fabae similia.

Calcaria, vulgo Calx. Kalkerde.

Terra propria, acido carbonico juncta, quo amisso in aquae partibus quingentis solubilis fit. Cum Acido sulphurico gypsum constituit. Eligatur heterogeneis libera, qualem praebent Marmor album, Testae Ostrearum, etc.

Camphora. Kampher.

Laurus Champhora. Arbor Indiae orientalis, praesertim in Japonia frequens.

Champhora cruda constat massulis globulosis, flavis, subluteis et cinereis, quae destillatione ramulorum et foliorum cum aqua, a reliquis Lauri Camphorae partibus constitutivis separatae, statim sublimantur.

Camphora depurata, nova sublimatione Camphorae crudae parata, concrescit in massas magnas orbicularis, subtus concavas. Optima nivea est et glaciei instar subdiaphana. Super ignem liquata olei instar fluit et accensa deflagrat omnis. Odorem proprium fragantissimum spargit.

Canella alba. *Weisser Zimmet.*

Winterania Canella. *Arbor Indiae occidentalis, in Jamai-*
ca frequens.

Cortex aromaticus, in superficie externa passim
 vel ex albo flavescentia, vel virescens, vel ex fusco
 rubens, subtus autem albicans.

Cantharides. *Spanische Fliegen.*

Meloë vesicatorius f. *Lytta vesicatoria* Fabricii.

Insecta coleoptera oblonga, ex viridi splendentia,
 antennis nigris filiformibus, mense Junio et Julio,
 dum Fraxinum, Syringam et Ligustrum gregarie de-
 pascunt, colligenda et leniter siccanda.

Cardamomum minus. *Kleine Cardamomen.*

Amomum Cardamomum. *Planta perennis palustris In-*
diae orientalis.

Fructus triquetri, utrinque acuminati, longitudine
 semipolllicari, pericarpio fragili ex luteo subfuscō, et
 seminibus aromaticis nigricantibus, instructi.

Caricae f. *Ficus passae.* *Feigen.*

Ficus Carica. *Arbor Europae meridionalis et Orientis.*

Thalami incrassati succulentī, principio saccha-
 rino et mucilaginoso imbuti, semina includentes,

Cariophylli. Gewürznelken.

Cariophyllum aromaticus f. *Eugenia cariophyllata* Thunbergii. Arbor Indiae orientalis, insulis Moluccis frequens.

Colliguntur flores vix aperti, qui, claviculis formae similes, oleo aethereo turgent. Leniter siccati ex fusco nigricant, et non solum saporem acrem aromaticum, sed et odorem fragrantissimum fundunt.

Cassia cinnamomea. Zimmet-Cassia.

Laurus Cassia. Lauri Cinnamomi forsan varietas?

Cortex internus ramorum, odore et sapore aromatico ad Cinnamomum acutum quidem proxime accedens, sed colore intensiore, crassitie, et sapore acriore distinguendus.

Cassia Fistula. Rohr-Cassia.

Cassia Fistula. Arbor Arabiae et utriusque Indiae.

Frueltus siliquosi, nigricantes, cylindrici, subincurvati, fardti pulpa dulci nigerrima, quae semina involvit, dissepimentis transversis distinda. Praestant siliquae longiores ex India orientali allatae, quarum pulpa, magis dulcis, tardius corruptitur.

Castoreum. Bibergeil.

Castor Fiber.

Humor sebaceus, odoris nauseosi et saporis amaricantis, propriis in saccis, qui abdomini inter genitalia et anum adjacent, secretus. In saccis re-

centibus albus et spissus, in siccatis sumo, quales plerumque ocurrunt, fuscus.

Castoreum Sibiricum s. **Russicum**, cui etiam **Polonicum**, **Borussicum** et **Germanicum** annumeratur, in saccis majoribus, ovi gallinacei magnitudinem aequantibus, intertextum est membranulis tenuioribus. Omne **Castoreum**, ex aliis terrarum regionibus allatum, antecellit.

Castoreum Canadense, ex America septentrionali adveatum, continetur saccis minoribus magisque nigris, tunicae cellulosaes tenaciori interiacens.

Catechū, vulgo Terra Japonica. Catechu.

Mimosa Catechu. Arbor Bengalensis.

Extractum aquosum ligni *Mimosae Catechu*, ad siccitatem inspissatum. Color sit nigrescens, non nigerrimus, sapor adstringens.

Cera. Wachs.

Apis mellifica. Insectum hymenopterum.

Materia vegetabilis propriae indolis.

Cera flava. Gelbes Wachs. Cera cruda, ab apibus collecta, et a melle separata.

Cera alba. Weisses Wachs. Cera per apricationem, sub frequente aquae adspersione, albata.

Cerasa acida. *Saure Kirschen,*

Prunus Cerasus; varietas, quae vernacula schwarze saure Kirsche audit. Arbor in hortis frequentissima.

Drupae nigrae, grata aciditate praeditae.

Cerasa nigra. *Schwarze Kirschen, Vogelkirschen,*

Prunus avium. Arbor Germaniae praesertim meridionalis,

Cerussa alba. *Bleyweiss.*

Plumbum carbonicum, paratum dum plumbum metallicum vapore aceti corroditur.

Cetaceum, vulgo Sperma Ceti. *Wallrath,*

Physeter Macrocephalus. *Oceani incola.*

Liquor unguinosus ventricorum cerebri, qui, macerando lixivio kalino diluto, exprimendo et lavando, ab adipi oleosa separatus, in massam induratur albissimam, lamellosam, subpelludam, nitentem, et in spiritu vini calido solubilem.

Coccionella. *Cochenille,*

Coccus Cacti. *Insectum hemipterum.*

Insecta parva, adveleta ex regno Mexicano, ubi Cactum cochenilliferam inhabitant; siccata granula referunt atro-purpurea, striis transversis rugosa et quasi pruina albido aspersa. Pulvis ex contritis refert colorem coccineum.

Colocynthis. *Coloquinthen.**Cucumis Colocynthis.* *Planta annua orientalis.*

Fru&ellus pallidus, amarissimus, magnitudine et
figura pomo similis, pulpa secca repletus.

Colophonium. *Geigenharz.**Pinus sylvestris.* *Arbor Europae borealis frequentissima.*

Resina diaphana, quae super ignem liquata colo-
rem ex succino aurantiacum nanciscitur.

Conchae. *Austerschalen.**Ostrea edulis.* *Maris Germanici incola.*

Testa, ac omni sorde depuratae.

Cornu cervi. *Hirschhorn.**Cervus Elaphus.***Cortex Augusturae.** *Augusturarinde.*

Brucea ferruginea? l'Heritier; aut *Magnoliae species?*
Frutex Americae meridionalis, in *Insula Trinidad*
frequens.

Cortex facie externa ex pallido albicans, facie
interna autem ex luteo subfuscus, saporis aroma-
tici acris et praesertim intense amari, atque odo-
ris ingratii.

Cortices Aurantiorum. *Pomeranzenschalen.*

Citrus Aurantium. *Arbor in Europa meridionali et in
Oriente frequens.*

Cortex fructus maturi, amaritie non ingrata gaudens.

Cortices Aurantiorum Curassaviensium.*Curassao Pomeranzenschalen.**Citrus Aurantium, var. Curassaviensis. Arbor Indiae occidentalis et Americae meridionalis.*

Cortex fructus maturi, tenuitate et amaritie corticibus Aurantiorum Europaeorum praestans.

Cortex Caribaeus. Caraibische Rinde.*Cinchona Caribaea. Arbor Indiae occidentalis et praesertim Jamaicæ.*

Cortex subsuscus amaro-acris.

Cortex Cascarillæ. Cascarillrinde.*Croton Cascarilla. An potius Clutia Eluteria? Frutex calidarum Americae meridionalis regionum, in Peru et Paraguay frequens.*

Cortex extus cinereus, subtus ex fusco ferrugineus, fragilis et in fractura nitens; prunis injectus gratum spargens odorem.

Cortex Chinæ fuscus s. officinalis; Cortex Peruvianus, olim Cortex Kin-Kinae, Ge-wöhnliche Chinarinde.*Cinchona officinalis. Arbor Peruviana, nuper etiam in silvis provinciae, cui nomen Terra Firma est, detecta.*

Cortex ex amaro subromaticus et subadstringens. Appareat in superficiebus frustulorum corticis diffracti particulae ad solem splendentes.

Cor-

Cortex Chinæ flavus f. regius. *Gelbe Chin-*
rindē, Königs Chinarinde.

Cinchonae species nondum satis definita.

Cortex ex eadem regione allatus, crassior et ma-
gis lignosus, qui colore cinnamomeo et principio
amero subaromatico omnibus aliis Cinchonae cortici-
bus antecellit.

Cortex Chinæ ruber. *Rothe Chinarinde.*

Cinchonae species nondum satis definita.

Cortex ex fusco ruber, cuius frustula ponderosi-
ora plerumque etiam crassiora occurunt. Principio
resinoso et adstringente præ caeteris Cinchonae cor-
ticibus eminet.

Cortex Geoffreæ Surinamensis. *Surinamische*
Geoffreerinde.

Geoffrea inermis Swarzii. Arbor Americae meridionalis, in
nemoribus Surinamiae frequens.

Cortex crassus fibrosus, externe, ubi Lichenibus
cinereis tegitur, ex fusco nigricans, interne subfuscus,
odoris, si recens est, nauseoso ingrati.

Cortex Granatorum f. Malicorium. *Granat-*
apfelschale.

Punica Granatum. Arbor Europæ meridionalis, praeser-
tim in Hispania frequens.

Cortex fructus ex fusco rubens, principio adstrin-
gente commendatus.

Cortex Guajaci. Guajakrinde.*Guajacum officinale. Arbor Indiae occidentalis.*

Cortex tenuis, acris, ex lamellis cinereis aut fuseis compositus, superficie externa ex cinereo nigricante.

Cortex Hippocastani. Rosskastanienrinde.*Aesculus Hippocastanum. Arbor in Germania frequens.*

Cortex ramorum peramarus, adstringens, subluteus, epidermide superinductus ex rubro fusca.

Cortex Mezerei. Seidelbastrinde.

Daphne Mezereum et Daphne Laureola. Frutices in Gallia, Hispania et Germania meridionali, frequentes.

Cortex tenuis, striatus, peracris, subluteus, epidermide ex viridi fusca superinductus.

Cortex Quassiae. Quassiarinde.

Quassia excelsa. Arbor Americae meridionalis, in Jamaica et Guiana frequens.

Cortex tenuis, fragilis, peramarus, ex albo cinereus.

Cortex Quercus. Eichenrinde.

Quercus Robur. Arbor Germaniae indigena.

Cortex Salicis laureae. Lorbeerweidenrinde.

Salix pentandra. Arbor in Germania, praesertim meridionali, frequens.

Cortex tenuis, flexilis, extrorsum fuscus, principio adstringente, et amaritie non ingrata, praeditus.

Cortex Simarubae. Simarubarinde.

Quassia Simaruba. Arbor Americana, in Guiana frequentissima.

Cortex radicis fibrosus, ex albo lutescens, peramarus.

Cortex Ulmi interior. Ulmenrinde, Rüsterrinde.

Ulmus campestris. Arbor Germaniae.

Cortex internus subfuscus, subacris, ex lamellis tenuibus compositus.

Crocus. Saffran.

Crocus sativus, var. autumnalis, s. Crocus autumnalis Hoffmanni. Planta perennis, in Europa meridionali et in Oriente sponte nascens, nec non in Anglia, Gallia, Austria et aliis Germaniae meridionalis provinciis, culta.

Stigmata e floribus resecta et siccata, versus apicem latiora, principio luteo-tinctorio ditissima.

Cubebae. Cubeben.

Piper Cubeba, s. Piper caudatum Bergii. Frutex Indiae orientalis.

Fructus pedunculati, globosi, amaro-aromatici.

Cuprum. Kupfer.

Metallum du^cile, colore rufum, quod Acido carbonico in oxydum viride mutatur.

Elemi, vulgo Gummi Elemi. Oehlbaumharz.

Amyris Elemifera. Arbor Americae meridionalis.

Resina lutea, subpellucida, digitis agitata tenax odorem Foenieuli quodammodo spirans. Ex truncu arboris vulnerato liquida destillans mox induatur.

Euphorbium. Euphorbium.

Euphorbia officinarum, et verisimiliter nonnullae aliae Euphorbiae species. *Frutices Africæ meridionalis.*

Gummii-resina flavesrens, saporis acerrimi urentis, quae pruni injecta odorem spargit non ingratum. Frustula variae sunt magnitudinis, plerumque angulata, quia in ipsis spinis fruticis induruerunt.

Fel Tauri. Chsengalle.

Bos Taurus domesticus.

Ferrum. Eisen.

Metallum ex cinereo nigrescens, magneti obediens, quod, acidis solutum, principio adstringente adhibito, nigricans praecipitatur.