

Cuprum. Kupfer.

Metallum du^ctile, colore rufum, quod Acido carbonico in oxydum viride mutatur.

Elemi, vulgo Gummi Elemi. Oehlbaumharz.

Amyris Elemifera. Arbor Americae meridionalis.

Resina lutea, subpellucida, digitis agitata tenax odorem Foenieuli quodammodo spirans. Ex truncu arboris vulnerato liquida destillans mox induatur.

Euphorbium. Euphorbium.

Euphorbia officinarum, et verisimiliter nonnullae aliae Euphorbiae species. *Frutices Africæ meridionalis.*

Gummii-resina flavesrens, saporis acerrimi urentis, quae pruniis injecta odorem spargit non ingratum. Frustula variae sunt magnitudinis, plerumque angulata, quia in ipsis spinis fruticis induruerunt.

Fel Tauri. Chsengalle.

Bos Taurus domesticus.

Ferrum. Eisen.

Metallum ex cinereo nigrescens, magneti obediens, quod, acidis solutum, principio adstringente adhibito, nigricans praecipitatur.

Flores Arnicae. *Wohlverleihblumen.*

Arnica montana. *Planta perennis Germaniae.*

Flores compositi lutei, ex acri amari, digitis confricati sternutationem moventes, squamulis calycinis brevioribus non setosis, apice purpureis.

Flores Chamomillae Romanae. *Römische Kamillen.*

Anthemis nobilis. *Planta perennis Europae meridionalis.*

Flores compositi radiati, receptaculo fere plano, flosculis disci flavis, aromaticis, flosculis autem radii numerosis, brevibus, insipidis.

Flores Chamomillae vulgaris. *Gemeine Kamillen.*

Matricaria Chamomilla. *Planta annua, in Germania frequens.*

Flores compositi radiati, receptaculo conico, flosculis disci flavis, amaris et fragrantibus, flosculis radii albis, reflexis, insipidis.

Flores Convallariae majalis, s. **Flores Liliorum convallium.** *Mayblumen.*

Convallaria majalis. *Planta perennis sylvatica Germaniae.*

Corollae campanulatae, albae, subaromaticae.

Flores Granati s. Ralaustia. *Granatblumen.*

Punica Granatum.

Flores, petalis coccineis et calycibus coriaceis rubris conspicui, principio adstringente praediti.¹³

Flores Lavendulae. *Lavendelblumen, Spieke.*

Lavandula Spica. *Fruticulus Galliae meridionalis.*

Corollae cylindricae caeruleae, odoris aromatici gratissimi.

Flores Malvae arboreae. *Pappelrosen.*

Alcea rosea. *Planta biennis, origine orientalis, in hortis Germaniae culta.*

Corollae mucilaginosae, atrofuscae.

Flores Malvae vulgaris. *Gemeine Pappelblumen.*

Malva rotundifolia. *Planta annua, in ruderatis frequen-*
tissima.

Malva silvestris. *Planta perennis Germaniae.*

Flores mucilaginei, corollis vel albis, vel caeruleis, vel rubicundis, venis aut rubris aut caeruleis pictis.

Flores Meliloti citrini. *Melilotenblumen.*

Trifolium Melilotus officinalis, var. *floribus citrinis.*
Planta biennis, per totam Germaniam frequens.

Rami florentes, floribus luteis, odorem proprium aromaticum spirantibus.

Flores Millefolii. *Schafgarbenblumen.*

Achillea Millefolium. *Planta perennis frequentissima, floribus albis et rubicundis varians.*

Flores compositi exigui, saporis amari subacris, et odoris subaromatici.

Flores Rhoeados. Klatschrosen.

Papaver Rhoeas. Planta annua, inter segetes frequen-
tissima.

Petala papaverina rubra, ob odorem subvaporoso-
sum ingrata.

Flores Rosarum incarnatarum. Rothe Ro-
sen.

Rosa centifolia. Frutex in bortis frequens.

Petala pallide rubentia, odoris grattissimi et sapo-
ris subadstringentis.

Flores Rosarum rubrarum. Essigrosen, Damas-
cener Rosen.

Rosa Gallica s. Damascena. Frutex Galliae meridionalis,
apud nos hortensis.

Petala ex fusco rubentia, sapore adstringente
praedita.

Flores Sambuci. Fliederblumen, Holunderblumen.

Sambucus nigra. Arbor per totam Germaniam frequen-
tissima.

Cymae florentes, floribus albis subvaporosis.

Flores Tanaceti. Rainfarnblumen.

Tanacetum vulgare. Planta Germaniae perennis, ad vias
et inter segetes frequens.

Flores compositi tubulosi, flavi, sapore amaro et
odore aromatico nauseoso praediti.

Flores Verbasci. *Wollkrautblumen.*

Verbascum Thapsus. *Planta biennis, in solo arenoso frequens.*

Corollae mucilaginosae luteae, odoris rosacei.

Flores Violarum. *Blaue Veilchen.*

Viola odorata. *Planta perennis Germaniae, in bordis frequenter culta.*

Flores intense caerulei, odore grati.

Folia Aurantii. *Pomeranzenblätter.*

Citrus Aurantium.

Folia ovata, appendice cordata, ad basin aucta, saporis amari.

Folia Ilicis Aquifolii. *Stechpalmenblätter.*

Ilex Aquifolium. *Frutex Germaniae sempervirens.*

Folia ovata, angulata, dentato-spinosa, coriacea, saturata viridia, saporis amaricantis-subacris.

Folia Lauro-Cerasi. *Kirschlorbeerblätter.*

Prunus Lauro-Cerasus. *Arbor Orientis et Europae meridionalis.*

Folia ovata, subintegra, nitida, coriacea, quae siccata fere insipida inveniuntur.

Folia Quercus. *Eichenblätter.*

Quercus Robur.

Folia

Folia Sennae. *Sennesblätter.*

Cassia Senna. *Frutex in Europa meridionali et in Oriente frequens.*

Folia ovato-acuta, inaequalia, longitudine semi-pollicari, saporis amaro-acris et plerisque nauseosi. Optima sunt folia Sennae Alexandrinae, quae colore gaudent ex flavo viridi.

Folia Uvae ursi. *Bärentraubenblätter.*

Arbutus Uva ursi. *Fruticulus Germaniae sempervirens.*

Folia obovata, saporis adstringentis; in superficie inferiori, a foliis Vaccinii Vitis Ideae subtus punctatis, reticulo facile distinguenda.

Formicae. *Ameisen.*

Formica rufa.

Insectum hymenopterum, Acido volatili proprio praeditum.

Fructus Mororum. *Schwarze Maulbeeren.*

Morus nigra. *Arbor originis sinicae, in Europa culta.*

Baccae compositae nigrescentes, succo acidulo grato turgidae.

Fructus Prunorum. *Pflaumen.*

Prunus domestica. *Arbor Germaniae, in pomariis frequens.*

Drupae oblongae nigrescentes, pruina caerulea aspersae, quae pulpam subdulcem largiuntur.

Fructus Ribium ruborum. Johannisbeeren.

Ribes rubrum. Frutex Germaniae, in hortis cultus.

Baccae globosae, rubrae, subdiaphanae, succo acido grato turgentes.

Fructus Rubi Idaei. Himbeeren.

Rubus Idaeus. Frutex Germaniae, in vinetis et hortis cultus;

Baccae compositae, subrotundae, rubentes, succo subacidulo gratae.

Gallae. Galläpfel.

Quercus Cerris. Frutex orientalis, praesertim in Syria frequens.

Tumores morbosi foliorum, a Cynipe foliorum Quercus, insecto hymenoptero, punctura produeli, globosi, tuberculati; principio adstringente uberrime repleti. Praeféruntur ex Aleppo allatae, quae colore ex nigro caerulescente innotescunt.

Glandes Quercus. Eicheln.

Quercus Robur.

Fruēlus maturi absque eupulis.

Galbanum s. Gummi Galbanum. Mutterhärz.

Bubon Galbanum. Planta perennis umbellifera, in Arabia, Syria, Mauritania et India orientali sponte crescens.

Gummi-resina, granis ex albo lutescentibus, sibi invicem vel agglutinatis, vel massae moliori luteae.