

immixtis, composita. Sapore amaro acri, et odore gravi, plerisque ingrato, praedita est, atque tempore fusca redditur. Fluit ex trunko, prope radicem transversim seculo, mox indurescens.

Gummi Mimosae s. Gummi arabicum. Arabisches Gummi, Senegal-Gummi.

Mimosa nilotica et Mimosa Senegal. Arbores, quae in variis Africae mediae regionibus frequenter occurunt.

Gummi purissimum, ex cortice exsudans, albicans aut lutescens, subdiaphanum, et diffractum nitens.

Gummi Tragacanthae. Traganth.

Astragalus creticus Lamarck. Frutex in insulis Archipelagi et in Oriente sponte nascens.

Substantia gummeo-mucilaginosa, alba, vel sponte ex fructuoso exsudans, vel ex vulnerato cortice stilans, quae condensata frustula incurvata format.

Gutti s. Gummi Guttae. Gummigutt.

Stalagmitis Cambogiales Murrayi s. *Guttifera vera* Koenigii. Arbor Indiae orientalis.

Succus induratus gummeo resinosus, flavus, opacus, splendens, ex acri subdulcis. Exsudat vel ex ramis resecatis, vel ex cortice arboris vulnerato.

Helmintochorton. Wurmmoos.

Conferva Helmintochorton. In mare mediterraneo, ad litus Corsicae frequens.

Conferva subfusca, dichotoma, sapore subsalso nauseoso et odore ingrato praedita.

Herba Abrotani. Eberraute.

Artemisia Abrotanum. Planta perennis Europae meridionalis et Orientis, nobis hortensis.

Herba amaro-aromatica, foliis multipartitis, ex viridi albenscentibus.

Herba Absinthii. Wermuth.

Artemisia Absinthium. Planta perennis frequentissima.

Herba florens amaro-aromatica, floribus compositis exiguis, subglobosis, pendulis, foliolis lobatis, tomento albo obsitis.

Herba Aconiti. Eisenhütlein.

Aconitum Napellus et Aconitum Cammarum. Plantae perennes in Sudetibus, Hercynia et Austria frequentes, in hortis cultae.

Folia palmata, quinquepartita, lobis dissectis, sapore acri praedita.

Herba Althaeae. Eibischkraut. Altheekraut.

Althaea officinalis. Planta perennis Germaniae.

Folia triangularia, tomento, cinereo mollissimo, tecta, quae multam continent mucilaginem.

Herba Anagallidis. Gauchheil.

Anagallis arvensis, var. flore phoeniceo s. Angallis phoenicea Hoffmanni. Planta annua agrestis Germaniae.

Herba humilis ramosa, floribus rubris, foliis parvis ellipticis.

Herba Arnicae. *Fallkraut, Wohlverleih.*

Arnica montana.

Folia ovata, superficie utraque hirta, margine integrinno, saporis subacris subamari.

Herba Basilici. *Basilienkraut.*

Ocymum Basilicum. *Planta annua Persiae et Indiae orientalis; nobis hortensis.*

Herba ramosa, interdum purpurascens, foliis ovato-acutis, integris, glabris, punctatis, gratissimo odore gaudens.

Herba Belladonnae. *Tollkirschenblätter, Belladonnablätter.*

Atropa Belladonna. *Planta perennis Europae meridionalis, in hortis medicis culta.*

Folia magna, petiolata, ovato-acuta, intense viridia, odoris narcotici.

Herba Cardui benedicti. *Cardobenedictenkraut.*

Centaurea Benedicta. *Planta annua, in insulis Archipelagi frequens, quae in hortis medicis colitur.*

Herba florens peramara, floribus compositus tubulosis luteis; calyce, cum foliis adjacentibus, ope texturæ arachnoideæ, collaerente.

Herba Centaurii minoris. *Tausendgüldenkraut.*

Gentiana Centaurium s. Chironia Centaurium Curtis.
Planta annua Germaniae.

Herba florens, floribus rubentibus, foliis ovatis, ob amaritatem acrem celebris.

Herba Chenopodii ambrosiaci s. Botryos Mexicanae. Mexicanisches Traubenkraut.

Chenopodium ambrosioides. Planta annua Mexicana, nobis hortensis.

Herba florens odoris ambrosiaci, racemis foliatis simplicibus, foliis lanceolatis dentatis.

Herba Cicutae virosae. Wasserschierling, Wüterich.

Cicuta virosa. Planta perennis aquatica Germaniae.

Folia composita, foliolis oblongis, acutis, margine dentatis, dentationibus apice albidis, quae recenter collecta, odorem spirant gravem.

Herba Clematidis erectae s. Flammulae Jovis. Brennkraut.

Clematis erecta. Planta perennis Germaniae meridionalis.

Herba florens, peracris, corollis albis tetrapetalis aut pentapetalis, foliis pinnatis, foliolis ovato-lanceolatis, integerrimis.

Herba Cochleariae. Löffelkraut.

Cochlearia officinalis. Planta annua, ad littora maritima Europae borealis frequens; apud nos in hortis culta.

Herba florens, principio acri volatili praedita; foliis radicalibus subrotundis, caulinis oblongis, sinuatis,

Herba Conii maculati s. Cicutae maculatae.
Erdschierling.

Conium maculatum. *Planta biennis in Germania frequens.*

*Herba odoris nauseoso-vaporosi, foliis compositis,
foliolis lanceolatis incisis glabris, caule et ramis ma-
joribus maculis purpureis aspersis.*

Herba Digitalis. Rother Fingerhut.

Digitalis purpurea. *Planta silvestris montana Helvetiae et
Germaniae, in hortis quoque culta.*

*Folia elliptica, rugosa, hirsuta, margine serrata,
saporis amari acris.*

Herba Farfarae. Huflattig.

Tussilago Farfara. *Planta perennis Germaniae.*

*Folia subcordato-angulata, denticulata, saporis
subadstringentis subamari.*

Herba Fumariae. Erdrauch.

Fumaria officinalis. *Planta annua, inter segetes frequens.*

*Herba peramara, foliis compositis, foliolis trilo-
batis.*

Herba Gratiolae. Gnadenkraut.

Gratiola officinalis. *Planta perennis pratensis et riparia
Germaniae.*

*Herba florens, amaro-acris, foliis lanceolatis
serratis, glabris, floribus ringentibus, subalbidis,
diandris.*

Herba Hederae terrestris. Gundermanu.*Glecoma hederacea. Planta perennis frequentissima.*

Folia reniformia, crenata, saporis subaromatici.

Herba Hyoscyami. Bilsenkraut.*Hyoscyamus niger. Planta annua, in ruderatis et ad vias frequens.*

Folia semiamplexicaulia, sinuata, hirsuta, odoris summe narcotici.

Herba Hyperici. Johanniskraut.*Hypericum perforatum. Planta perennis pratensis et silvestris Germaniae.*

Herba florens subacris, foliis ovato-obtusis, pellucido-punctatis, petalis luteis oblique truncatis, crenulatis, puncto atro inter crenam notatis.

Herba Hyssopi. Isop.*Hyssopus officinalis. Fruticulus Europae meridionalis, nobis hortensis.*

Herba aromatica, foliis lanceolatis glabris.

Herba Ledi palustris. Wilder Rosmarin, Porsch.*Ledum palustre. Fruticulus in cespitosis et uliginosis Germaniae frequens.*

Folia linear-lanceolata, superficie superiori glabra, saturate viridi, inferiori autem hirsuta, fusca, sapore amaro adstringente et odore gravi praedita.

Herba

Herba Lichenis Islandici. *Isländisches Moos.*

Lichen Islandicus. In Sudetibus, Hercynia, monte Brüctero, aliisque Germaniae montibus frequens.

Lichen amaricans, coriaceus, sinuatus, lacunosus, superficie superiori cinereus, inferiori autem fuscus, multa mucilagine repletus.

Herba Linariae. *Leinkraut.*

Antirrhinum Linaria. Planta perennis frequens.

Herba florens, foliis lanceolato-linearibus, floribus luteis, saporis subamari et odoris subvaporosi.

Herba Majoranae. *Majoran.*

Origanum Majorana. Planta annua Europae meridionalis, in hortis culta.

Herba aromatica, foliis ovatis obtusis, ex viridi albicantibus.

Herba Malvae. *Pappelkraut; Käsepappeln.*

Malva rotundifolia.

Folia cordato-orbiculata, subquinqueloba, mucilaginea.

Herba Mari veri. *Amberkraut.*

Teucrium Marum. Fruticulus Europae meridionalis et Orientis, praesertim in Hispania et Syria frequens.

Herba aromatica, fragrans, foliis ovatis petiolatis, superficie inferiore, una cum petiolis et ramulis, tomento albo superinductis, floribus racemosis purpureis.

Herba Marrubii. Weisser Andorn.

Marrubium vulgare. Planta perennis, in ruderatis frequens.

Herba amara, hirsuta, ex viridi albicans, foliis ovatis, crenatis, rugosis.

Herba Matricariae. Mutterkraut.

Matricaria Parthenium. Planta perennis Germaniae.

Rami florentes amaro-aromatici, floribus compositis radiatis, disco flavo, radio albo brevi, foliis compositis planis, foliolis ovatis incisis.

Herba Melissae s. Melissae citratae. Melisse, Citronenmelisse.

Melissa officinalis. Planta perennis Germaniae meridionalis, in hortis culta.

Herba aromatica odoris citrei, foliis ovato-cordatis, villosis.

Herba Menthae crispae: Krausemünze.

Mentha crispa. Planta perennis originis Sibiricae, in hortis culta.

Herba aromatica, foliis cordatis, dentatis, rugosis, undulatis.

Herba Menthae piperitae. Pfeffermünze.

Mentha piperita. Planta perennis Angliae, in hortis medicis culta.

Herba aromatico-camphorata, foliis petiolatis, ovato-acutis, serratis, glabris.

Herba Millefolii. Schafgarbe.

Achillea Millefolium.

Herba amaro-aromatica, foliis bipinnatis, lacinias linearibus dentatis.

Herba Nicotianae. Tabak.

*Nicotiana Tabacum. Planta annua Americae meridionalis;
apud nos culta.*

Folia oblongo lanceolata, magna, odoris subau-
seosi et saporis peramari, quae exsiccata fuscum in-
duunt colorem.

**Herba Origani vulgaris. Gemeiner Dost, Wohlt-
gemuth.**

Origanum vulgare. Planta perennis Germaniae.

Herba aromatica, ramis quadrangulis rubentibus,
foliis oppositis ovatis, bracteis ovatis calyce longior-
ibus.

Herba Origani cretici. Spanischer Hopfen.

Origanum Creticum. Planta perennis Europae australis.

Spicae ex viridi subfuscæ, saporis acris, aromatica.

Herba Pulegii. Poley.

*Mentha Pulegium. Planta perennis Germaniae, in locis
humidis crescens.*

Herba florens aromatica, floribus verticillatis rubi-
cundis, foliis ovato-lanceolatis, serratis, hirsutis.

Herba Roris marini. Rosmarin.

Rosmarinus officinalis. Frutex Europæ meridionalis.

Herba florens aromatica, aeris, floribus ringenti-
bus, dilute caeruleis, foliis linear-lanceolatis, pa-
gina superiori intense viridibus.

Herba Ruteae. Raute, Gartenraute.

Ruta graveolens. Frutex hortensis, Europae meridionalis indigenus.

Herba amaro-acris, graveolens, ex viridi caeruleo-vires, foliis decompositis, foliolis subrotundis.

Herba Sabinae. Sadebaum.

Juniperus Sabina. Arbor orientalis sempervirens, nobis hortensis.

Summitates ramorum, foliis oppositis erectis, decurrentibus, saporis amaro-acris, et odoris gravissimi.

Herba Salviae. Salbey.

Salvia officinalis. Fruticulus hortensis, in Europa meridionali sponte crescens.

Herba amaro-aromatica et subadstringens, foliis lanceolato-subovatis, integris, rugosis, crenulatis.

Herba Saponariae. Seifenkraut.

Saponaria officinalis. Planta perennis Germaniae.

Herba submucilaginea, foliis ovato-lanceolatis, trinerviis.

Herba Scordii. Lachenknoblauch.

Teucrium Scordium. Planta perennis Germaniae.

Herba amara, odoris alliacei, foliis oblongis sessilibus, dentato-serratis.

Herba Serpylli. Quendel.*Thymus Serpyllum. Fruticulus Germaniae frequentissimus.*

Herba amaro-aromatica, caule repente, foliis planis, ovatis, obtusis, basi ciliatis, floribus capitatis purpurascensibus.

Herba Solani nigri. Nachtschatten.*Solanum nigrum. Planta annua, ubivis occurrens.*

Herba foliis ovatis, vel integris, vel dentato-angustatis, odoris nauseosi, subnarcotici.

Herba Tanaceti. Rainfarn.*Tanacetum vulgare.*

Herba amaro-aromatica, foliis bipinnatis, incisis, serratis.

Herba Taraxaci. Löwenzahn.*Leontodon Taraxacum. Planta perennis frequentissima.*

Herba americana, floribus compositis lingulatis, flavis, foliis runcinatis, denticulatis, laevibus.

Herba Thymi. Thymian.*Thymus vulgaris. Fruticulus hortensis, in Europa meridionalis sponte crescens.*

Herba aromatica, caule erecto ramoso, foliis ovatis, revolutis, floribus verticillato-spicatis, albis.

Herba Trifolii fibrini. *Fieberklee.*

Menyanthes trifoliata. *Planta perennis palustris Germaniae.*

Herba amara, foliis ovatis, ternis.

Herba Verbasci. *Wollkraut,*

Verbascum Thapsus.

Herba mucilaginea, foliis decurrentibus, utrinque tomento molli albo tegitis.

Herba Veronicae. *Ehrenpreis.*

Veronica officinalis. *Planta perennis Germaniae.*

Herba americana, caule procumbente, spicis lateribus pedunculatis, floribus caeruleis, foliis oppositis, ovatis, crenatis.

Herba Violae tricoloris s. Jaceae. *Dreifaltigkeitsblume, Fraissamkraut.*

Viola tricolor. *Planta annua frequens.*

Herba subacris, foliis ovatis dentatis, floribus calyce glabro duplo majoribus.

Hirudines vivae. *Blutegel.*

Hirudo medicinalis. *Vermis ex ordine Intestinorum.*

Hirudo in dorso fusca, lineis flavis sex notata, intermediis maculatis, subtus cinerea, maculis nigris.

Hydrargyrum s. Mercurius vivus. *Quecksilber.*

Metallum album, volatile, sub nostro coelo liquidum.