

Poma Aurantiorum immatura. *Uurreife Pome-
ranzen.*

Citrus Aurantium.

Fruclus immaturi virides.

Poma Citri. *Citronen.*

Citrus Medica.

Poma acidula. *Säuerliche Aepfel.*

Pyrus Malus. Arbor Europae, in hortis culta.

Radix Althaeæ. *Eibischwurz, Altheewurzel.*

Althæ officinalis.

Radix perennis, alba, crassirie calami scriptorii,
multa mucilagine repleta.

Radix Angelicae. *Angelikwurzel.*

*Angelica Archangelica. Planta biennis Norwegiae et Lap-
poniae, in hortis culta.*

Radix fragrans, fibrosa, capite oblongo crasso, ex-
tus ex flavo rubens, in superficiebus segmentorum
transversorum alba, maculis numerosis flavis, oleo
aethereo repletis, punctata.

Radix Ari. *Aronswurzel.*

Arum maculatum Planta perennis Germaniae.

Radix tuberosa subrotunda, alba, crassitie partis
tertiae pollicis. Recens sapore acerrimo praedita est,
siccata autem, acredine fere orbata, farinosa fit.

Radix

Radix Aristolochiae rotundae. *Runde Osterluceywurzel.*

Aristolochia rotunda. *Planta perennis Europae meridionalis.*

Radix tuberosa, subglobosa, ponderosa, crassitie pollicis, saporis amaro acris.

Radix Armoraciae s. Raphani-rusticani. *Meerrettig.*

Cochlearia Armoracia. *Planta perennis palustris Europae australioris, apud nos culta.*

Radix cylindrica, albida, succulenta, principio volatile peracri turgida.

Radix Arnicae. *Wohlverleihwurzel.*

Arnica montana.

Radix subamara, subacris, intense fusca.

Radix Asari. *Haselwurz.*

Asarum Europaeum. *Planta perennis Germaniae.*

Radix fibrosa, ex cinereo fusca, saporis amaro acris nauseosi, et odoris subaromatici.

Radix Bardanae. *Klettenwurzel.*

Arctium Lappa. *Planta biennis, ubique obvia.*

Radix ramosa, levis, spongiosa, extus nigricans, intus alba, saporis ex acri subdulcis.

Radix Belladonnae. *Belladonnawurzel.*

Atropa Belladonna.

Radix sublignosa, ramosa, geniculata, ex cinereo
flavescens.

Radix Bryoniae. *Cichorienwurzel, Zaunrüben-
wurzel.*

Bryonia alba s. *Bryonia dioica* Jacquinii. *Planta peren-
nis Germaniae.*

Radix fusiformis, praegrandis, alba, quae, in ta-
leolas transversas dissecia, annulis sibi invicem in-
cumbentibus, et radiis, conspicua est. Sapore gau-
det amaro-acri.

Radix Calami. *Kalmuswurzel.*

Acorus Calamus. *Planta perennis palustris Germaniae.*

Radix amaro-aromatica, geniculata, spongiosa,
crassitie pollicari, extus rubens, intus alba.

Radix Caricis arenariae s. *Graminis rubri.*
Grosse Graswurzel.

Carex arenaria. *Gramen perenne, in arenosis Germaniae
frequens.*

Radix repens, articulata, extus rubens, intus alba,
odoris terebinthinei.

Radix Carlinae s. *Cardopatiae.* *Eberwurz.*

Carlina acaulis. *Planta perennis alpestris Germaniae et
Helvetiae, in Sudetibus montibus frequens.*

Radix ramosa, crassitie pollicis, extus fusca, intus
pallida, saporis peramari, acris, et odoris subaro-
matici, nauseosi.

Radix Caryophyllatae. Nelkenwurz.

Geum urbanum. Planta perennis frequens.

Radix fibrosa, fusca, intus rubens, quae recesso
odorem Caryophylorum aromaticorum quodammodo
spirat.

Radix Chinæ s. Chinæ ponderosæ. Chinawurzel.

*Smilax China. Frutex Indiae orientalis, in imperio Chi-
nensi frequens.*

Radix lignosa, subfuscæ, nodosa, magna, submu-
cilaginea, subdulcis.

Radix Cichorei. Cichorienwurzel.

*Cichoreum Intybus. Planta biennis Germaniae, frequen-
ter culta.*

Radix ramosa, subflava, crassitie pollicis, laclès-
cens, saporis amaricantis.

Radix Columbo. Columbowurzel.

*Planta nondum satis cognita, forte Bryoniae, in Africa prope
Mozambique crescens.*

Radix lignosa, lutea, extus subfuscæ, intus ex vi-
ridi lutea, in taleolas transversim secla, saporis ama-
ro-aromatici. Affertur ex insula Ceilon.

Radix Contrajervae. Giftwurzel.

Dorstenia Houstoni. Planta perennis Peruviana.

Radix fibrosa, capitulo oblongo tenui, extus rufa,
intus alba, saporis aromatici subadstringentis, et odo-
ris aromatici.

Radix Curcumae. Gelbwurzel.

*Amomum Curcuma Jaquini. Planta perennis Indiae orientalis.*Radix oblonga, rugosa, ponderosa, extus lutea,
intus intense flava, saporis amaro aromatici.

Radix Dauci. Möhre, Mohrrübe.

*Daucus Carota, var. sativa. Planta biennis Germaniae,
in hortis culta.*Radix fusiformis, vel flava, vel ex flavo rubens,
succo dulci repleta.Radix Dictamni albi f. Fraxinellae. Weisse
Diptanwurzel.*Dictamnus albus. Planta perennis in montosis Germaniae,
praesertim meridionalis.*Cortex radicis albicans, sapore amaricante subacri,
et odore, si recens est, gravi praeditus.

Radix Filicis. Farnkrautwurzel.

*Polyodium Filix mas. In silvis Germaniae frequens.*Radix squamosa, magna, extus subfuscā; intus
pallida, sapore gaudens ex dulci subadstringente et
dein subamaricante, atque odore, si recens est, sub-
nauseoso.

Radix Foeniculi. Fenchelwurzel.

*Anethum Foeniculum. Planta perennis Galliae meridiona-
lis et Helvetiae, in hortis culta.*Radicis ramosae rami biennes, albi, crassitiae digitī,
sapore subdulci et odore grato praediti.

Radix Galangae. *Galgautwurzel.*

Maranta Galanga. s. *Alpinia Galanga* Swartzii. *Planta perennis Indiae orientalis.*

Radix nodosa, dura, crassitie digitii, extus ex fusco rubra, intus rubicunda; saporis acris et odoris aromatici.

Radix Gentianae rubrae. *Rother Enzian.*

Gentiana lutea. *Planta perennis alpina.*

Radix crassitie pollicis et quod excurrit, extus ex rubro fusca, intus aurantiaca, saporis intense amari.

Radix Graminis s. Graminis albi. *Quecken, Päden.*

Triticum repens. *Gramen perenne, agros obsidens.*

Radix tenuis, repens, articulata, alba, suco dulci repleta.

Radix Helenii s. Enulae. *Alantwurzel.*

Inula Helenium. *Planta perennis montana Germaniae et Helvetiac.*

Radix carnosa, mucilaginea, crassitie pollicis, extus fusca, intus alba, saporis ex acri amaricantis, subnauseosi, odoris subaromatici.

Radix Hellebori nigri. *Schwarze Niesewurz,*

Christwurz.

Helleborus niger. *Planta perennis alpina.*

Radix fibrosa, capite subrotundo, fibrillis crassioribus extus nigris, intus albis, saporis acris, subamari et nauseosi.

Radix Jalappae. *Jalappewurzel.*

Convolvulus Jalappa? *Planta perennis Americae calidioris.*

Radices ponderosae, compaetae, rugosae, magnae, plerumque subrotundae, vel integrae, vel in taleolas dissectae, compositae ex lamellis concentricis, resinosis, fuscis, textu celluloso subfuscis distinctis. Gaudent sapore et odore acri et nauseoso.

Radix Ipecacuanhae. *Brechwurzel.*

Psychotria emetica. *Planta perennis, in regno Mexicano praesertim frequens.*

Radix flexuosa, tenuis, annulis eminentibus inaequalibus numerosis conspicua. Constat ex epidermide cinerea, ex cortice albiente, fragili, amaro-acri et nauseoso, atque ex parte interiori lignea, subflavescente, insipida.

Radix Iridis Florentinae. *Violenwurzel.*

Iris Florentina. *Planta perennis Italiae, in hortis culta.*

Radix tuberosa, nodosa, ponderosa, compaeta, crassitie pollicis, post resectum corticem alba, punctis subfuscis notata. Odore ad flores Violae odoratae accedente, et sapore amaricante subacri, praedita est.

Radix Lapathi acuti. *Grindwurzel.*

Rumex acutus. *Planta perennis Germaniae, ad fossas frequens.*

Radix ramosa, superne erassitie pollicari, extus fusca, intus flavescens, saporis amaro-acris et subadstringentis.

Radix Levistici. Liebstökelwurzel.

Ligusticum Levisticum. Planta perennis alpina, in hortis medicis culta.

Radix praelonga, carnosa, extus Intescens, intus alba, saporis atque odoris acris aromatici.

Radix Liquiritiae. Süßholz.

Glycyrrhiza glabra. Planta perennis Europae meridionalis.

Glycyrrhiza echinata. Planta perennis Russiae meridionalis.

Radix praelonga, cylindrica, lignea, crassitie pollicis, extus ex cinereo fusca, intus lutescens, saporis dulcis, dein amaricantis.

Radix Paeoniae. Päonienwurzel.

Paeonia officinalis. Planta perennis alpina.

Radix tuberosa, tuberibus rubrotundis, crassitie pollicis, extus ex rubro fuscis, intus albidis, sapore ex subamaro et subdulci mixto.

Radix Pimpinellae albae. Weisse Pimpinell-wurz.

Pimpinella Saxifraga. Planta perennis Germaniae.

Radix fibrosa, capite oblongo, crassitie digitii, extus subfuscata, intus albida, saporis acris, pungentis.

Radix Polygalae amarae. *Bittere Kreuzblumenwurzel.*

Polygala amara. *Planta perennis montana Germaniae et Galliae meridionalis.*

Radix fibrosa, fibrillis tenuibus subluteis, intus albidis, saporis subamaro-subdulcis.

Radix Polypodii. *Engelsüß.*

Polypodium vulgare. *Filix in silvis Germaniae frequens.*

Radix dentato-articulata, tenax, extus fusca, intus lutescens, saporis dulcis, subadstringentis.

Radix Pyrethri. *Bertramwurzel.*

Anthemis Pyrethrum. *Planta perennis Asiae et Africæ, ad oras Maris mediterranei sponte crescens; nunc in Germania culta.*

Radix cylindrica, rugosa, gracilis, extus subfusca, intus albida, fibrillis rarioribus obsita, saporis per aeris urentis, odoris plane expers.

Radix Rhei. *Rhabarber.*

Species Rhei, nondum certo cognita. *Planta perennis Chinensis.*

Segmenta magna radicis, ex occidentalibus imperii Chinensis regionibus allata. Extus, reseclo cortice, ex luteo aut croceo rubent, intus autem iisdem coloribus, et interdum etiam colore albido variegata, inventiuntur. Salivam flavedine tingunt; sapore et odore specifico, plerisque nauseam moyente, gaudent.

Radix

Radix Rubiae. Färberröthe.

Rubia tinctorum. Planta perennis Europae mediae, frequenter culta.

Radix repens, geniculata, ex fusco rubra, saporis adstringentis, subamari.

Radix Salep. Salepwurzel.

Orchides variae, imprimis Orchis Morio et Orchis mascula. Plantae perennes pratenses.

Radices oblongae, tuberosae, subdiaphanae, ponderosae, ex subfusco cinereae, e toto mucilagineae. Praestant ex China, Syria et Persia allatae.

Radix Saponariae. Seifenkrautwurzel.

Saponaria officinalis.

Radix fibrosa, extus rubens, intus flavescens saporis subdulcis, dein amaricantis, subacris.

Radix Sarsaparillae. Sarsaparilwurzel.

Smilax Sarsaparilla. Planta perennis Americana, in Mexicana et Brasiliensi regionibus frequens.

Radix repens, flexuosa, fragilis, farinacea, crassitie calami scriptorii, subrugosa, extus fusca, intus alba, saporis submucilaginei.

Radix Scillae. Meerzwiebelwurzel.

Scilla maritima. Planta perennis, in oris Maris mediterranei frequens.

Bulbus praegrandis, ponderosus, epidermide ex fusco rubente tunicatus. Squamae albidae recentes succo mucilagineo peracri turgent; leni calore exsiccate saepe per amaro praeditae sunt.

Radix Scorzonerae. *Scorzonewurzel.*

Scorzonera Hispanica et Scorzonera humilis.

Plantae perennes Europae meridionalis.

Radix fusiformis, subdulcis, intus alba, epidermis
de fusca.

Radix Senegae. *Senegawurzel.*

Polygala Senega. *Planta perennis Virginiae et Pensylvaniae.*

Radix superne nodosa, inferne in ramos incurvatos desinens, extus ex cinereo lutescens, intus alba, sapore aeri pungente praedita.

Radix Serpentariae Virginianae. *Virginische Schlangenwurzel.*

Aristolochia Serpentaria. *Planta perennis Virginiae.*

Radix fibrosa, ex viridi lutescens, fibris tenuissimis, inter se tricatis, odoris fragrantis camphorati.

Radix Taraxaci. *Löwenzahnwurzel.*

Leontodon Taraxacum.

Radix fibrosa, extus fusca, intus alba, saporis ex dulci amaricantis.

Radix Tormentillae. *Tomentillwurzel.*

Tomentilla erecta. *Planta perennis Germaniae.*

Radix nodosa, fibrillis numerosis obsessa, extus ex rubro fusca, intus dilute rosea, saporis peradstringentis.

Radix Valerianae minoris. *Baldriamwurzel.*

Valeriana officinalis. *Planta perennis Germaniae, in montosis colligenda.*

Radix fibrosa, capitulo oblongo, quodammodo truncato, fibris subfuscis, tenuibus, hirtis, tenacibus, saporis amaro-acris et odoris gravis, subnauseosi.

Radix Zedoariae. *Zedoarwurzel.*

Kaempferia rotunda f. *Amomum Zedoaria* Bergii.
Planta perennis Indiae orientalis.

Radix aromatica, tuberosa, ponderosa, extus cinea-
rea, intus subfuscata, in segmenta vel rotunda vel
longa dissecta; saporis acris amaricantis, odoris fra-
grantis subcamphorati.

Radix Zingiberis albi. *Weisser Ingber.*

Amomum Zingiber. *Planta perennis Indiae orientalis.*

Radix tuberosa, articulata, compressa, rugosa,
ponderosa, extus ex albo cinerea, intus alba, saporis
peracris, odoris aromaticae.

Resina Guajaci nativa. *Guajakharz.*

Guajacum officinale.

Resina ex fuseo virescens, subdiaphana, friabilis,
saporis acris, quae prunis injecta odorem spargit haud
ingratum.

Resina Pini f. communis. *Gemeines Harz.*

Pinus silvestris et Pinus Abies.

Resina aurantiaca, ex arbore exsudans et dein in-
durata.

Saccharum album. *Weisser Zucker.*

Saccharum officinarum. *Gramen perenne palustre utrius-
que Indiae.*

Principium proprium dulce, a mucilagine aliisque
heterogeneis depuratione separatum et in formam Sa-
lis concreti redactum.