

Radix Zedoariae. Zedoarwurzel.

Kaempferia rotunda s. *Amomum Zedoaria* Bergii.
Planta perennis Indiae orientalis.

Radix aromatica, tuberosa, ponderosa, extus cinerea, intus subfusca, in segmenta vel rotunda vel longa dissecta; saporis acris amaricantis, odoris fragrantis subcamphorati.

Radix Zingiberis albi. Weisser Ingber.

Amomum Zingiber. *Planta perennis Indiae orientalis.*

Radix tuberosa, articulata, compressa, rugosa, ponderosa, extus ex albo cinerea, intus alba, saporis peracris, odoris aromatici.

Resina Guajaci nativa. Guajakharz.

Guajacum officinale.

Resina ex fuso virescens, subdiaphana, friabilis, saporis acris, quae prunis injecta odorem spargit haud ingratum.

Resina Pini s. communis. Gemeines Harz.

Pinus silvestris et *Pinus Abies.*

Resina aurantiaca, ex arbore exsudans et dein indurata.

Saccharum album. Weisser Zucker.

Saccharum officinarum. *Gramen perenne palustre utriusque Indiae.*

Principium proprium dulce, a mucilagine aliisque heterogeneis depuratione separatum et in formam Salsis concreti redactum.

Saccharum Lactis. *Milchzucker.*

Bos Taurus.

Sal essenziale Seri Lactis, aegre solubile, praesertim in Helvetia paratum.

Saccharum Saturni. *Bleyzucker.*

Plumbum aceticum impurum, maxima ex parte in officinis Batavicis paratum.

Sagapenum. *Sagapengummi.*

Planta umbellata orientalis, nondum cognita; forsan Ferulae species.

Gummi-resina tenax, fusca, granulis albis nitentibus subpellucidis mixta, saporis amaro-acris, quodammodo alliacci.

Sandaraca. *Wachholderharz.*

Juniperus communis et Juniperus Oxycedrus. Arbor in oris Africae mediterraneis frequens.

Granula resinosa, subrotunda, elongata, vel citrina vel albida, splendentia, pellucida, prunis injecta odorem suavem spirantes.

Sanguis Draconis. *Drachenblut.*

Calamus Rotang. Frutex Indiae orientalis; et Pterocarpus Draco? Arbor Indiae orientalis.

Massa resinosa, rubra, ex fructibus exsudans, iisque superinducta indurescens, quae dein calore emolita in globulos formatur.

Sapo Hispanicus albus. *Spanische Seife.*

Fit, coquendo Oleum Olivarum cum Lixivio Natri caustici. Usui externo solummodo inservit; cum ab opifibus non satis purus garari soleat.

Scammonium Halepense. *Scammonium von Aleppo.*

Convolvulus Scammonia. *Planta perennis orientalis, praesertim in Syria frequens.*

Succus resinosus, concretus, cinereus, levis, subspongiosus, friabilis, acris, in fractura nitens, et aquam colore subviridi tingens.

Fertur, Scammonium ex superficie sectionis obliquae radicis liquidum effluere, dein vero radiis solis expositum sensim indurare.

Semen Amomi. *Englisch Gewürz.*

Myrtus Pimenta. *Arbor Americana, in Mexico et Jamaica frequens.*

Baccae immaturae globosae, post exsiccationem fuscae, pericarpis rugosis cinidae.

Semen Anisi stellati. *Sternaniess.*

Illicium anisatum. *Frutex Japonicus.*

Pericarpia stellata, coriacea, fusca, seminibus ovatis nitidis repleta, odoris aromatici.

Semen Anisi vulgaris. *Anieß.*

Pimpinella Anisum. *Planta annua orientalis, in Europa culta.*

Semina oblonga, striata, subviridula, ex subdulci aromatica.

Semen Cannabis. *Hanfamen.*

Cannabis sativa. *Planta annua Europae borealis.*

Semina rotunda, glabra, oleoso-mucilaginea.

Semen Carvi. *Kümmelsamen.*

Carum Carvi. *Planta perennis pratensis Germaniae.*

Semina aromatica, parva, oblonga, striata, ex fusco subincana, odoris fragrantis.

Semen Cinae s. Santonici. *Zitwersamen, Wurmsamen.*

Artemisia Santonici et Artemisia Judaica. *Fruticuli orientales. in Persia, Syria et Palaestina frequentes.*

Semina exigua, oblonga; ex flavo viridula, saporis amaro-acris et odoris nauseosi.

Semen Coriandri. *Koriandersamen.*

Coriandrum sativum. *Planta annua Europae meridionalis, in hortis frequenter culta.*

Semina globosa, sublutea, odoris subaromatici non ingrati.

Semen Cumini. *Römischer Kümmel.*

Cuminum Cuminum. *Planta annua orientalis, in Europa culta.*

Semina aromatica, oblonga, striata, seminibus Carvi quidem similia, sed duplo longiora.

Semen Cydoniorum. *Quittenkörner.*

Pyrus Cydonia. *Arbor Cretensis, in hortis culta.*

Semina oblongo-acuta, nitida, fusca, multa mucilage cineta.

Semen Erucae. *Weisser Senf.*

Sinapis alba et Brassica Eruca. *Plantae annuae agrestes Germaniae.*

Semina parva, globosa, lutescentia, acria.

Semen Foeniculi. *Fenchelsamen.*
Anethum Foeniculum.

Semina subaromatica, oblonga, striata, pallida,
odoris grati et saporis subdulcis.

Semen Foeni Graeci. *Bockshornsamem.*

Trigonella Foenum Graecum. *Planta annua Europae me-*
ridionalis, in hortis medicis culta.

Semina subquadrangularia, lutea, mucilaginea, sub-
aromatica, odoris nauseosi.

Semen Hordei excorticatum. *Gerstengraupe.*
Hordeum vulgare et Hordeum hexastychon.

Semen Lini. *Leinsamen.*

Linum usitatissimum. *Planta annua sativa Europae bo-*
realis.

Semina ovata, compressa, glaberrima, nitentia,
fusca, oleoso-mucilaginea.

Semen Melonum. *Melonenkörner.*

Cucumis Melo. *Planta annua Tartarica, in hortis culta.*

Semina oblongo-elliptica, compressa, glabra, vel
lutescentia vel albida, oleo dulci repleta.

Semen Papaveris albi. *Weißer Mohnsamen.*

Papaver somniferum, var. seminibus albis.

Semina globosa, minima, alba, saporis oleosi-dulcis.

Semen Petroselini *Petersiliensamen.*

Apium Petroselinum. *Planta biennis Sardiniae nobis hor-*
tensis.

Semina viridia, oblonga, striata, parva, odoris et
saporis ex acri aromatici.

Semen Phellandrii s. Foeniculi aquatici. *Wasserfenchelsamen.*

Phellandrium aquaticum. *Planta perennis palustris Germaniae.*

Semina oblonga, striata, subfusca, graveolentis, seminibus Foeniculi forma similia.

Semen Psyllii. *Flöhsamen.*

Plantago Psyllium. *Planta annua agrestis, et*

Plantago Cynops. *Fruticulus Europae meridionalis.*

Semina exigua, oblonga, ex nigro-fusca, nitentia, multa mucilagine repleta.

Semen Sabadilli. *Sabadilsamen.*

Veratrum Sabadilla Retzii? *Planta perennis Mexicana.*

Semina oblongo acuta, nigra, urentia, pericarpio membranaceo fusco tecta.

Semen Sinapeos. *Schwarzer Senfsamen.*

Sinapis nigra. *Planta annua sativa Germaniae.*

Semina exigua, globosa, nigricantia, peracria.

Sevum ovillum s. vervecinum. *Hammeltalg.*

Ovis Aries.

Pinguedo ex capsulis adipalibus renum et omentis eliquata.

Siliqua dulcis. *Johannisbrod.*

Ceratonia Siliqua. *Arbor in Oriente et Europa meridionali frequens.*

Siliqua coriacea, compressa, spadicea, longitudine quatuor vel quinque pollicum, pulpa dulci, seminibus interjacente, repleta.

Sili-

Siliqua hirsuta. *Juckende Fasel, Kuhkrätze.*

Dolichos pruriens. *Planta scandens utriusque Indiae.*

Siliqua longitudine duorum vel trium pollicum, crassitie digiti extus setis rigidis, ex rubro fuscis, undique obsita.

Spongia marina. *Badeschwamm.*

Spongia officinalis. *Zoophyton Maris mediterranei et Maris rubri.*

Spongia sublutescens, foraminibus exiguis pervia.

Stannum. *Zinn.*

Metallum album, molle, ductile, cum Acido nitrico Oxydum album vade refractarium constituens.

Stibium sulphuratum nigrum f. Antimonium crudum. *Roher Spießglanz.*

Minera Stibii sulphurati, per eliquationem in vasis clausis a matrice purgata, et cristallis acicularibus, nitentibus, conspicua.

Stipites Dulcamarae. *Bittersüßstengel, Alpranken.*

Solanum Dulcamara. *Frutex scandens, in silvaticis paludosis Germaniae frequens.*

Rami biennes vel triennes, cortice testis ex cinereo subfusco, et sapore ex dulci amaro praediti.

Strobuli Lupuli. *Hopsen.*

Humulus Lupulus. *Planta dioicae perennis Germaniae foemina.*

Amenta foeminea matura, saporis amari non ingrati.

Styrax in granis. *Storax in Körnern.*

Styrax officinalis. Arbor in Archipelagi insulis et in Oriente frequens.

Resina ex cortice arboris vulneratae effluens, indurata in granula vel lutea vel fusca, quae prunis injecta balsamicum spargunt odorem.

Styrax liquidus. *Flüssiger Storax.*

Lipuidambar Styraciflua. Arbor regionum calidarum Americae septentrionalis.

Balsamum nativum spissum, ex rubro nigrescens.

Succinum. *Bernstein.*

Bitumen solidum, pellucidum, fragile, citrinum aut flavum, Acidum concretum via sicca largiens. Colligitur in oris Maris Baltici, praesertim ubi Curlandiam, Borussiae et vicina Pomeraniae littora alluit.

Succus Citri. *Citronensaft.*

Citrus Medica.

Succus acidus, ex parte carnea fructus penitus maturi expressus.

Succus Liquiritiae. *Lakrizensaft.*

Glycyrrhiza glabra et G. echinata.

Extractum, ex radicibus recentibus coctione in aqua paratum et ad siccum fere condensatum. Ex Hispania et Sicilia, in massis foliis Lauri obvolutis, ad nos venit. Rejiciatur cupro inquinatum.

Sulphur. *Schwefel.*

Corpus solidum; friabile, colore citrino, quod, comburendo Oxygenio nuptum, Acidum sistit sulphuricum. Occurrit vel nativum, vel ex mineris Ferri sulphurati via sicca separatur.