

af Krystalkammerceller med Enkeltkrystaller. Spredt i Primær- og Sekunderbarken findes talrige Krystalstjerner og nogle Enkeltkrystaller, desuden smaaakornet Stivelse og rødgult Farvestof, der opløses af Vand og farver Bast- og Stenceller stærkt gule.

Skal være lagret mindst 1 Aar, forinden den benyttes.

### Rop.

*Cordice Linnæi crassus foliaceus f. partus  
Radice Senegae racemosi pars  
Aqua destillatae quantitate sufficiens ad coquitum  
perficitur.*

*Syrlig Saccharum Cypriani Decocatum*

### Decocta.

### Dekokter.

Dekokter ere Planteudtræk, som oftest fremstillede ved Kogning med destilleret Vand alene.

Hvis ingen anden Fremgangsmaade er foreskrevne, er Følgende at iagttagte:

Substanerne skæres eller knuses, hvorefter de, tillige med en tilstrækkelig Mængde kogende Vand, kommes i en Bøsse af Tin, fortinnet Kobber eller Porcelæn, forsynet med et godt sluttende Laag. Efter at Substanerne og det paahældte Vand ere vel blandede, tillukkes Bøssen og hensættes paa Vandbad, der holdes i Kog i en halv Time. Derpaa koleres den endnu varme Masse og presses. Man maa ikke til sætte en større Mængde Vand, end der udfordres for at tilberede den foreskrevne Dekoktmængde. Dersom Dekoktmængden skulde blive for ringe, blandes den udpressede Rest med saa meget kogende Vand, at efter fornyet Udpresning det Manglende erstattes. Derefter hensættes den samlede Vædske i nogen Tid til Bundfældning og dekanteres.

Af 1 Del Substans tilberedes 10 Dele Dekokt, men

kun 5 Dele koncentreret Dekokt (Decoctum concentratum).

Hvis der forlanges Dekokter af stærkt virkende Substanse, skal Styrken af Dekokten være angiven paa Recepten.

Dekokter tilberedes, hver Gang de skulle udleveres.

### Decoctum Chineae acidum.

#### Sur Kinadekokt.

Rcp.

Corticis Chineae crasse pulverati partes . . . . .	25
Acidi hydrochlorati diluti partes . . . . .	3
Aqvae destillatae quantum satis ad colaturam partium . . . . .	200.

Fiant decocti partes 200.

Den groft pulveriserede Kinabark koges i en Porcelænsbøsse med den fortyndede Saltsyre og den fornødne Mængde destilleret Vand, saa at der udvindes To Hundrede Dele Dekokt . . . . . 200.

Den afkølede Dekokt skal være uklar og smudsig gulbrun, med rigeligt Bundfald.

## Decoctum Chiae cum Senega.

### Kinadekolt med Senega.

Rcp.

Corticis Chiae crasse pulverati partes .....	20
Radicis Senegae concisae partes .....	10
Aqvae destillatae quantum satis ad colaturam partium .....	180
Syrupi Sacchari partes .....	20
Fiant decocti partes 200.	

Den groft pulveriserede Kinabark koges med den fornødne Mængde destilleret Vand, saa at der udvindes Hundrede og Firsindstyve Dele Dekolt.... 180.

Fem Minutter før Kogningens Slutning tilsættes Senegaroden.

Efter endt Kogning koleres Blandingen, og der tilsættes

Tyve Dele Sukkersaft..... 20  
saa der faas i Alt To Hundrede Dele Dekolt... 200.

Den afkølede Dekolt skal være uklar og gulbrun.