


DE SYRUPIS, Sectio II.

SYRUPUS est medicamenti forma liquidior, ex succis vel aliis plantarum partibus, cum humore aliquo percoctis, & mellitis vel saccharatis ad saporis gratiam, & custodiz diuturnitatem.



DE SYRUPIS OFFICINALIBUS CONCOQUENTIBUS
bilem in capite.

Syrupus de Nymphaea simplex.

FLORES Nymphaeae, quor. voles, macerato, ac ter flores inurato, horu infusionis accipies T^B iv. Sacchari quod sufficit, misceantur, & coquantur usq; ad syrupi consistentiam, deinde in vase vitreo, vel figulino vitrato servetur per annum. Dosis à fescuncia usque ad uncias duas, cum aqua appropriatae dupla quantitate. * Bilis flavæ fervorem extinguit, ideoq; mirifice ardentibus, aliis febribus acutis auxiliatur. Somnū quoque conciliat. *Nicolas.*

Syrupus de Nymphaea compositus.

R. Florum Nymphaeae albæ ꝑ ij.
Flor. Nymphaeae luteæ, Sem. P^lyllii integri,
Sem. Acerose ana ꝑ j.
Sem. Cucurbitæ, Citrulli, Cucumeris,
Melonum, Lactuce ana ꝑ ß.
Sem. Endivivæ sat. Endivivæ syl.
Portulacæ ana ꝑ ij.
Radicum Fœniculi ꝑ j.
Coquantur in aqua hordei sufficienti: & colaturæ adduntur
Sacchari T^B j.
Vini granat. acidorum, Aceti albi ana ꝑ ij.
Fit syrupus, & aromatizatur cum
Sandali citrini, Spicæ Indicæ ana ꝑ ß.
Conservatur in vase vitreo vel vitreato figulino ad annos duos. Dosis & actio, ut præcedentis. *Franciscus Pedemontanus.*

Syrupus de Papavere simplex.

R. Capium recentium Papaveris albi, nigri & cum seminibus ana ꝑ xl.
Aque pluvivæ T^B iix.
Decoquantur ad remanentiam libræ unius & dimidiæ, cui adde
Sacchari Penidiorum ana ꝑ iv.
Fit syrupus. Conservatur in vase vitreato cooperto per annum. * Valet ad catarrhū & tussim, somnūque conciliat. *Mesius.*

Syrupus de Papavere compositus.

R. Capium cum seminibus Papaveris albi & nigri ꝑ l.
Capillorum Veneris ꝑ xv.
Glycyrrhizæ ꝑ v.
Jubas N xxx.
Sem. Lactuce ꝑ xl.
Sem. Malvæ,
Sem. Cydoniorum ana ꝑ vj.
Coquantur in T^B iv. aque usque ad duas, & cum Penidiorum Sacchari ana ꝑ iix.
Fit Syrupus. Conservatur in vase vitreo, vel figulino vitreato ad annos duos. Datur à fescuncia usq; ad uncias duas, cum dupla aqua stillatiæ appropriatæ quantitate. * Valet ad tussim siccam, phthisin, catarrhum calidum & acrem, somnūque conciliat. *Mesius.*

DE SYRUPIS CONCOQUENTIBUS BILEM FLAVAM
in thoracē.

Syrupus infusionis Violarum.

R. Infusionis Rosatum T^B v.
Sacchari clarificati T^B iv.
Coquantur cum facilitate. Servetur in vase vitreato per annum. Dosis ab ꝑ j. ß. ad ꝑ ij. * Est conveniens ad extingvendam sitim in febribus acutis, & ad remittendum excessum caliditatis in eis, confortans stomachum relaxatum, & hepatis supercalefactum, & cor, resistens putredini, conveniens tempore pestilentie, & resistens venenositati.

Syrupus de succo Violarum.

R. Violarum recentium jamjam lectarum quantitatem satis magnam, & decerpe ab iis purpurea foliola, & ab ipse virides eorum cauliculos, quoniam herbacem habent acrimoniam, & floridum colorem hebetant. Contunde deinde decerpta Violarum folia in mortario marmoreo & exprime. Mox

R. Expressi succi T^B ij.
Sacchari T^B iv.
Saccharum prius clarificetur, & ad justam consistentiam coquantur: amoto deinde ab igne saccharo, superari finito, & succum infundito, & rursum lento igni ad spissitudinem coquito, & emicantem in decoquendo spumam continuo auferto. Quidam spumam non auferunt, ne color periat: sed cito corrumpitur, cum spuma repositus.

Conservatur per annum. Datur à fescuncia ad ꝑ ij. * Bilis acrimoniam obrundit, ac ob lentorem thoracis vitii est aptum.

Syrupus Violarum.

R. Violarum ꝑ ij.
Sem. Citoniorum, Sem. Malvæ ana ꝑ j.
Jububarum, Sebesten ana N. xx.
Aque cucurbitæ T^B vj. vel quantum sufficit,
Sacchari T^B j. ß.

Coquantur secundum artem. Conservetur in vase vitreato per annum. Datur à fescuncia usq; ad ꝑ ij. cum aqua stillatiæ appropriata. * Prodest pleuritidi & tussi à causa calida. *Mesius.*

Syrupus de Jujubis.

R. Jubarum N. lx.
Violarum, Sem. Malvarum ana ꝑ v.
Capillorum Veneris ꝑ j.
Sem. Cotoneorum,
Sem. Papaveris albi,
Sem. Melonum,
Sem. Lactuce, Tragacanthæ ana ꝑ iij.
Liquiritiæ, Hordei mundati ana ꝑ j.
Decoquantur in libris quatuor aut sex aque fontium secundum artem: vel aque pluvialis usque ad consumptionem medietatis. Deinde colentur, & in colatura addantur Sacchari clarificati T^B ij. & fiat syrupus debito modo decoquendo. Conservetur ad annos duos. Dosis, ut præcedentium.

cedentium. *Syrupus de Jujubis, confert ad raucedinem vocis, & tussim, & pleuresin, & in ulcere velicæ mirè prodest. *Mejues.*

Syrupus de Jujubis alius.

R. Jujubarum N. c.

Aquæ T^b iv.

Coque ad dimidias: adde Sacchari T^b j.

Coque iterum ad syrupi consistentiam. *Valeat ad asperitatem gutturis, & tussim juvat: sputum tenue incrassat, & facilius expelli facit. Ob id rauricitati & pleuritidi confert. *Mejues.*

Syrupus Granatorum dulcium.

R. Succi Granatorum dulcium T^b v.

Sacchari albillimi T^b ij.

Coquantur secundum artem. Conservetur in vase vitreo per annum. Dosis, ut præcedentium. *Stim, tussim & pleuritidem juvat. *Mejues.*

ANNOTATIO.

Male hodie faciunt Syrupum granatorum, indifferenter cum dulcibus acetofo granata miscentes: oportet enim utrumque Syrupum, tam acetosum quam dulcium grandiorum seorsim conficere: nam diversis morbis, morborumq; accidentibus mutantur. Cordus.

DE SYRUPIS CON-
coquentibus bilem flavam
in stomacho.

Syrupus acetosus simplex.

R. Aceti vini T^b ij.

Sacchari clarificati in aqua T^b v.

Coquantur secundum artem. *Est communis ad omnem materiam: digerit choleram, phlegma & melancholiam: rationesq; aceti attenuat crassos humores, incidit viscosos, duos mollit, ineptos evellit, ubique penetrat, oppilationes aperit, provocat urinam, putredini resistit, & corrigit malitiam humorum. idcirco in febris pestiferis juvat: sed ratione remissæ frigiditatis, tenuis & subtiles humorum partes inspissat, adæquat calorem, refrigerat, viscera lenit, & sitim sedat. *Mejues.*

Syrupus acetosus compositus.

R. Radicum Fœniculi,

Rad. Apii,

Rad. Endivivæ ana ʒ ij.

Seminis Anisi, Fœniculi,

Apii ana ʒ j.

Seminis Endivivæ ʒ iv.

Coquantur lento igne in libris decem aquæ ad dimidias: adde colaturæ

Sacchari optimi T^b ij.

Aceti acerrimi T^b ij.

Coquantur secundum artem. Conservatur ad annos duos. Dosis à fescuncia ad uncias duas cum aqua aliqua conveniente. *Syrupus acetosus cum radicibus: cujus operatio est ad choleram grossam, difficilem, & ad phlegma: incidit enim & abstergit, aperit oppilationes, quæ sunt in hepate, & splene, & in renibus. *Mejues.*

Syrupus acetosus Diarrhæoden.

R. Succi Intybi, Apii ana T^b ij ʒ.

Rad. Apii, Fœniculi, Intybi ana ʒ ij.

Rosarum ʒ j.

Glycyrrhizæ ʒ ss.

Spicæ Nard. ʒ ij ʒ.

Sem. Apii, Fœniculi,

Anisi ana ʒ vij.

Aquæ T^b vj.

Coque ad duarum partium consumptionem: adde Aceti T^b ij. Sacchari T^b ij.

Coque iterum & fiat syrupus. Datur ab ʒ j. usque ad ij. *Valeat ad febres complexas, & eas, quæ formam corporis corrumpunt. Obstructiones epatis & lienis idem aperit. *Mejues.*

*Syrupus acetosus de succis herbarum
cum aromatibus.*

R. Succorum Apii,

Fœniculi, Intybi,

Lupuli eod. & purg. ana T^b ij.

Buglossi T^b ij ʒ.

Rosarum ʒ j.

Spicæ nardi ʒ ij.

Glycyrrhizæ ʒ j.

Seminis Apii,

Fœniculi, Anisi,

Rhabarbari, Eupatorii,

Absinthii,

Castiæ ana ʒ v.

Sacchari T^b ij ʒ.

Aceti T^b ij.

Condiatur galliæ aromaticæ drachmis duabus. *Obstructiones aperit: ob id febres putridas, & implexas, & morbos alios obstructionibus succedentes curat. *Mejues.*

Syrupus Granatorum acetosorum.

R. Succi Granatorum acetosorum T^b v.

Sacchari albillimi T^b ij.

Coquantur secundum artem. *Febres biliosas, & quæ ex pituitosis flammam multam invehunt, juvat. *Mejues.*

Oxysacchara simplex.

R. Sacchari albi T^b j.

Succi malorum Granatorum acetosorum ʒ iix.

Aceti ʒ iv.

Coquantur cum facilitate, dum Syrupi crassamentum adsciscat. *Digerit materias cholericas phlegmati mistas, quæ gravant stomachum & præcordia, & faciunt tertianas duplas inordinatas, quas vocant erraticas, & similes quartanis duplis. *Nicolauus.*

Oxysacchara composita.

R. Capillorum Veneris,

Lingæ cervinæ, id est, Phyllidis,

Scolopendriæ, id est, Asplenii,

Polytrichi, Lichenis seu Hepaticæ,

Violarum, rad. Fœniculi, rad. Ruscii,

Rad. Asparagi, rad. Graminis ana T^b j.

Hoc modo confice: In succo malorum granatorum herbas, radices triduum macerato, quarto

die parum bullire finito, cum forti expressione A
percolato, postremo addito saccharo quod satis
fuerit, ad justam crassitiam coquito, & conserva-
to ad annos duos. Dosis, ut præcedentium. * Con-
calescunt corpora potum juvat: longis febribus,
quas sanguis aut bilis creavit, & calori jecinoris
auxilio est, & lienis obstructions tollit. Nicol.

Syrupus de Agresta.

R. Agrestæ T̄b v.
Sacchari clarificati T̄b iij ss.

Coquantur secundum artem. * In magnis æsti- B
bus ad sitim restringendam mirifice confert: vo-
mitum & alvi profluvium biliosum sistit, febribus
biliosis succurrit, gravidarum vomitum etiam re-
primit, ac ventriculorum earundem firmat, vene-
nisque adverteatur. Meisnes.

ANNOTATIO.

Agresta est succus uvarum immaturarum, qui
Græcè vocatur Omphacium, & inspissatus servatur:
hoc autem loco recipienda est Agresta nondum ad
spissitudinem decocta.

Agresta exprimi debet ex genere fissis uvis, apud
nos paulo ante maturitatem. Cordus.

Syrupus infusionis rosarum.

R. Infusionis rosarum T̄b v.

Sacchari clarificati T̄b v.
Coquantur cum facilitate, & conserventur per
annum in vase vitreato cooperto. Dosis, ut præ-
cedentium. * Est conveniens ad extinguendam
sitim in febribus acutis, & ad remittendum ex-
cessum caliditatis in eis, confortans stomachum
relaxarum, & hepar supercalfactum, & cor, resi-
stens putredini, conveniens tempore pestilentia,
& resistens venenositati.

Syrupus de succo rosarum.

R. Succo rosarum depuratarum,
Sacchari clarificati ana T̄b j ss.

Fiat syrupus secundum artem, ut decet. * Alvum
compressione solvit, uncis tribus sumptis: sed E
multo clementius, quam qui ex multis rosarum
recentium infusionibus paratus est. Meisnes.

Mixa Citoniorum simplex.

R. Succo citoniorum depurati T̄b xij.

Coquantur ad medietatem: & affunde vini albi
veteris opt. T̄b v.

Sacchari T̄b iij.
Coquantur lento igne semper despumando, ad
tertia partis consumptionem. Postquam refede-
rit, cola, & adde
Sacchari T̄b iij.

Iterum coquantur ad justam consistentiam. * Ven-
triculum roborat, & cibum in eo continet. Meisnes.

Mixa Citoniorum aromatica.

R. Succo Citoniorum acetosorum T̄b xx.

Mellis despumati optimi T̄b vj.

Vini veteris optimi T̄b x.

Potest tamen etiam cum Saccharo fieri. Coquan-
tur ad perfectionem, postea impone sequentia
aromata, in sindone ligata:

R. Cinnamomi electi,

Cardamomi majoris ana ʒ iij.

Caryophyllorum ʒ ij.

Zingiberis, Mastiches ana ʒ j ss.

Croci ʒ ij.

Xyloaloes, Macis ana ʒ j ss.

Omnia præter crocum parum terantur, & nodu-
lo ligata suspendantur, identidem conficando
in ipso medicamento, donec crassecat. Tolle ab
igne, & aromatiza

Moichi ʒ j.

Gallie Moschatae veræ ʒ ij.

Fiat secundum artem. * Ventriculum, hepar, &
cætera viscera roborat, appetentiam excitat, co-
ctionem juvat, vomitum & henteriam juvat. Nicol.

Syrupus de succo Myrtillorum, seu

Myrtinu simplex.

R. Succo Myrtillorum depurati T̄b viij.

Sacchari clarificati T̄b iv.

Coquantur secundum artem.
Curandum est, ut efforatur ex Italia, aut Narbo-
nensi Gallia Myrtillorum succus, si quis volet hunc
Syrupum conficere.

* Syrupus Myrtillorum ventriculum & viscera
roborat, ob id fluorem alvi antiquatum sistit, &
tussim mitigat. Meisnes.

Syrupus Myrtinu compositus.

R. Myrtillorum ʒ xx.

Sandali albi, Sumach,

Balaustiorum, Berberis ana ʒ xv.

Mespillorum ʒ ʒo.

Succi Granatorum vel cydoniorum,

Pomorum agrestium ana T̄b ss.

Omnia, exceptis succis, coquantur in aquæ fon-
tis libris octo, ad medias, coletur, & fiat syrupus
cum sacchari T̄b iij. additis in fine succis. * Hic
Syrupus sistit ventris fluorem, etiam antiquum,
& scireatum sanguinis. Meisnes.

DE SYRUPIS CON-
coquentibus bilem flavam
in corde.

Syrupus de succo acetosa.

R. Succo acetosæ depurati T̄b iij.

Sacchari clarificati T̄b ij.

Coquantur secundum artem. * Febribus biliosis
& pestilentialibus saluber est, cordis & ventricu-
li flammæ calorem extinguit, ipsaq; roborat.
Meisnes.

Syrupus de acetositate citri.

R. Succo acidæ mali citri, per pannum rarum
colati T̄b vj.

Sacchari albilimi T̄b iij. vel iv.

Coquantur secundum artem. * Ad omnes ægri-
tudines biliosas ex pura bile valet, & pestilentes,
vel quæ veneni naturam sapiant, & ad sitim ex-
tinguendam: ebrietati resistit, vertiginem juvat.
Meisnes.

ANNOTATIO.

Rard habent Pharmacopole Syrupum acetositate ci-
tri verum: nam plerumq; venditur pro eo Syrupus citri-
orum con-

rum conditorum. Porro cum quis bene conficeret voluerit, oportet ut per filtrum aut pannum defilletsur acetositas citriorum, sine ulla vi aut expressione: alioquin coagulatur, cum resixerit, syrupus. Cordus.

De syrupo Aranciorum acetosorum.

R. Succu Aranciorum acetosorum per pannum aut filtrum distillati ℥vj.

Sacchari albillimi ℥ij. vel iv.

Coquantur secundum artem.

Ad hunc modum potest etiam fieri ex succo Aranciorum dulcium.

Syrupus acetosificatis limonum.

R. Acetosificatis limonum maturorum, per filtrum defillatæ ℥vj.

Sacchari albillimi ℥ij. vel iv.

Coquantur secundum artem. * Vehementius infrigidat, & penetrat, quam syrupus acetosificatis citri: & valet contra putrefactionem, contra vermes, vehementiam caloris febrilis, & alios crudos humores.

**DE SYRUPIS CONCO-
quentibus bilem flavam
in hepate.**

**Syrupus de succo Endivie, vel Endivia
simplex.**

R. Succu Endivie depurati ℥viii.

Sacchari Tabarzeth ℥v. β.

Coquantur secundum artem. * Valet principaliter ad omnes supercalfactiones hepatis, & aliorum membrorum nutritivorum: & in morbo laterali maxime convenit.

Syrupus de Endivia compositus.

R. Endivie recentis, Borriginis, Scariolæ,

Hepaticæ, Melissæ, Buglossæ,

Lactucæ, Eupatorii ana M. j.

Seminum frigidorum majorum ana ℥j.

Sandali albi & rubri ana ℥j.

Florum cordialium ana ℥ij.

Coquantur secundum artem in sufficienti quantitate aquæ: deinde colat & colaturæ adde

Succu Endivie depurati ℥v.

Vini Granatorum ℥ij.

Sacchari albi ℥iv.

Fiat Syrupus secundum artem. * Valet precipue ad supercalfactiones hepatis, cordis, & aliorum membrorum nutritivorum: & generaliter confert cuilibet complexionis calidæ, & est aperitivus oppilationum, & confortativus membrorum debilitatorum à mala complexionis calidæ: est etiam digestivus materiæ cholericarum acutarum. *Gentilis.*

Syrupus Endivie compositus.

R. Succu Endivie, succu Hepaticæ ana ℥ij.

Clarificentur prædicti succi ad ignem, ut expediat: addantur

Rosarum, Violarum,

Lenticulæ aquæ, Polytrichi,

Flor. Nymphææ ana ℥β.

A Capillorum Veneris, Hordei mundati,

Sem. frig. majorum ana ℥j.

Contulæ & per horas 12. in dictis succis macerata coquantur, & colaturæ adduntur

Sacchari ℥ij. vel quod sufficit.

Fiat syrupus, & aromatizetur cum sandalis albis & rubris.

Berberis, Sem. cotoneorum, Ligni aloës, Cinnamonomi, Cort. citri ana ℥j.

Tunde & aromatiza secundum artem. * Valet ad supra dicta. *Gentilis de Fulg.*

Syrupus de Cichorea sine rhabarbaro.

R. Endivie domesticæ & sylvestris, Cichoreæ,

Taraxaci, id est, seridis sylvestris, ana M. ij.

Cicerbitæ, Hepaticæ,

Scariolæ, Lactucæ,

Fumi terræ, Lupulorum ana M. j.

Hordei non excorticati ℥ij.

Alkekengi, Liquiritiæ,

Capillorum Veneris,

Ceterach, sive Scolopendriæ,

Polytrichi, Adianthos, Culcutæ ana ℥vj.

Radicum Fœniculi, Apii,

Asparagi ana ℥ij.

Ferveant in aqua sufficienti, & coeantur, & cum

saccharo albo solido fiat syrupus. *Nicotianis.*

Syrupus de Olibano Rhasis.

R. Aceti veteris ℥ij.

Succu mal. granat. acet.

Acetosificatis citri,

Agrestæ, Acidulæ,

Morum, in quo sumach fuerit decoct.

Berberis ana ℥j.

Lactucæ, Endivie sylvest. ana ℥ij.

Decoctionis Jujubarum,

Infusionis lentium ana ℥j. β.

Sacchari ℥ij.

Fiat syrupus. Deinde

R. Spodii ℥β.

Caphuræ ℥j.

Terantur in mortario, & incorporentur cum syrupo, donec fiat unum corpus, & conspergatur ter cum frusto cucumeris. Oblatus ante originem variolarum & morbillorum abscindit eorum emersionem: quod si forte apparuerint, non perficienter decem refrigerando calorem & putrefactionem prohibendo, nisi quod videatur vehemens materiæ expulsio, quæ tunc juvetur. Idem datus cum calida, confert omnibus agri-tudinibus sing. cholereæ, bubonibus, anthraci, anginæ, & contumilibus.

**DE SYRUPIS CONCO-
quentibus pituitam in
capite.**

Syrupus de Betonica.

R. Succu Betonicæ crudi partes tres. Sacchari boni partes duas.

Coquantur simul, & despumantur, quoad syrupi consistentiâ acquirât. Vires ipsius herbæ retinee.

Syrupus de Beronica compositus.

R. Beronicæ M.ij. Majoranæ M.ij. B. Thymi, Rosarum ana M.ij. Violariæ, Stoechadis, ana M.ß. Sem. Fœniculi, Anisi, sem. Ameov ana ʒ ß. Rad. Peonix, Polypodii, rad. Fœnic. ana ʒ v. Fiat decoctio in f. q. aquæ ad medietatis consumptionem: colaturæ adde succi Beronicæ Tß ij. sacchari quantum satis est. Fiat syrupus. * Ad capitis & uteri vitia confert, menses movet: & simplici potius utitur, quam composito. Augustani.

Syrupus de Stoechade simplex.

R. Florum stoechadis ʒ xxx. Thymi, Calaminthæ, Origani ana ʒ x. Anisi ʒ vij. Passularum purgatarum ʒ iv. Aquæ quod satis est, Coquantur secundum artem, & colaturæ adde mellis, aut sacchari Tß iv ß. Condiatur cum Cinnamomi, Calami aromatici, Zingiberis ana ʒ jß. Ligentur in sindone, & in syrupo suspendantur. * Juvat omnes affectus frigidos cerebri & nervorum, ut paralytin, epilepsiam, convulsionem, spasimum cynicum, tremorem: ac ventriculum sanat.

Syrupus de Stoechade compositus.

R. Florum stoechadis ʒ xxx. Thymi, Calaminthæ, Origani ana ʒ x. Anisi, Pyrethri ana ʒ vij. Piperis longi ʒ ij. Zingiberis ʒ ij. Passularum enucleatarum ʒ iv. Aquæ quantum sufficit. Mellis aut sacchari optimi Tß v. Coquantur secundum artem lento igne: & eam reponis, tum condus sequentibus speciebus, in sindone rara & munda suspensis. R. Cinnamomi, Calami aromatici, Spicæ nardi Indicæ, Croci, Zingiberis, Piperis nigri, Piperis longi ana ʒ jß. Contundantur grosso modo. * Idem quod præcedens efficit. Mesius.

Mel Anacardinum Arabii.

Anacardios recentes tere, & in aqua decoque, donec melliginem quandam in rubeo colore fuscâ remittant, eam aquæ innatante n auferto, & reponito. * Memoriae pacturam refarcit, labætes sensus reficit, oblivionem discutit, & mentem evacuat, morbis cerebri frigidis, & humidis confert, nervorumq; resolutioni opitulatur.

DE SYRUPIS CONCOQUENTIBUS pituitam in thorace.

Syrupus de Hyssopo.

R. Hyssopi aridi, Rad. Apii, Fœniculi, Petroselinii, Glycyrrhizæ ana ʒ x. Hordei mundari ʒ ß.

A Sem. Malvæ, sem. Citroniorum, Fragacanthæ ana ʒ ij. Capilli Veneris ʒ vj. Jujubarum, Sebesten ana N. xxx. Passularum enucleatarum ʒ jß. Ficuunt siccarum, Daelylorum pinguium ana N. x. Penidiarum albarum Tß ij.

Confecte secundum artem. Conservatur ad annos duos in vase vitreato. * Ad vitia thoracis & pulmonis efficax est, humoresq; excreatu diti, ciles extenuat & educit. Mesius.

Syrupus de Præstio.

R. Marrubii ʒ ij. Glycyrrhizæ ʒ j. Capillorum Veneris, Hyssopi, Calaminthæ, Anisi ana ʒ vj. Rad. Apii, Fœniculi ana ʒ v. Sem. Malvæ, Fœnigræci, theos, Sem. Cydoniorum, Lini ana ʒ ij. Uvarum passularum purgatarum ʒ ij.

C Ficus passas pinguis N. xvj. Penidiarum, Mellis ana Tß ij. Aquæ quod sufficit. Fiat syrupus. * Thoracem & pulmones expurgat pituita crassa, leora, putris hinc asthma, & antiquæ tussi prodest: quales affectus senibus & natura frigidis sunt frequentes. Mesius.

Syrupus capillorum Veneris simplex.

R. Infusiois capill. Veneris recentium ter facta secundum artem Tß ij. sacchari albi Tß ij. Coque, & fiat syrupus.

Syrupus capillorum Veneris compositus.

R. Capillorum Veneris M.ij. Adianthi, Scelopendriæ, Polytremi ana M.ij. Jujubarum, Glycyrrhizæ ana ʒ ij. Fiat decoctio addendo sacchari Tß ij. Fiat syrupus.

Syrupus alius capillorum Veneris magistralis.

E R. Capillorum Veneris ʒ v. Glycyrrhizæ rase ʒ ij. Macerentur in aqua horis 24. deinde coque ad dimidii consumptionem. Colaturæ adde Sacchari clarificati, Penidiarum, Aquæ capill. Vener. ana ʒ viij. Coque, fiat syrupus. * Ad thoracis affectus calidos, distillationes & obstructions efficax, usq; creberrimus. Pleuritis initio convenit, cum materia calida, aut calido & frigido mixta, sua tenuitate gutturis testorum elidit. Eo syrupo ad obstructions primorum vasorum in purgatoris tentationibus, securitatis gratia utitur. Antonius Musa, & Annius Væsius.

Syrupus de Glycyrrhizæ.

R. Glycyrrhizæ rase ʒ ij. Capilli Veneris ʒ j. Hyssopi ʒ ß. Aquæ plavix Tß iv. Macerentur horis xxiv. Deinde coquantur ad dimidias. Colaturæ adde Mellis

Mellis optimi, Penidiorum, sacchari ana ℥ viij. A
Aque rosarum ℥ vj.
Fiat Syrupus secundum artem. * Thoracem &
pulmonem expurgat, ideoque diuturna tussis &
pleuritiidi auxiliatur. *Mesues.*

Syrupus de Calamintha.

R. Calaminthæ domestice,
Calaminthæ montanæ ana ℥ ij.
Sem. Levistici,
Sem. Dauici, Schœnuanthos ana ℥ v.
Passularum enucleatarum ℥ ℞.
Mellis ℥ ij.

Fiat Syrupus. In hoc Syrupo sex aquæ libræ reci-
piantur, quæ bulliant: primò passulas, deinde
alia secundum præscriptum ordinem ponendo,
usq; ad consumptionem medietatis: denique ad-
dito melle fiat Syrupus secundum artem. * Syru-
pus de calamintha, stenosis plurimum confert,
quibus durus est heca, & penè irresolubilis, & his
qui frigida viscera habent, & asthmate laborant,
præsertim in sensibus, & in habentibus antiquas
tusses: si quis enim vel pectus, vel ventriculum,
vel intestina, crassa tenaci, & irresolubili mate-
ria plena habeat, hoc Syrupo sanatur. *Mesues.*

Syrupus es scabiosæ succo.

R. Succis scabiosæ crudi ℥ vi.
Sacchari, Mellis Hispanici puris ana ℥ ij.
Coquantur initiò cum succo media pars utrius-
que, mellis scilicet: et sacchari: atque cola. Deinde
reliqua pars mellis & sacchari addatur, perfici-
turque coctio ad Syrupi formam. * Ad eadem,
ad quæ herba ipsa, valet. *Medici Colontenses.*

DE SYRUPIS CONCO-
quentibus pituitam in
co: de.

*Syrupus Dianæ sive de Bizantiis
simplex.*

R. Succis Endiviæ,
Succis Apii ana ℥ ij.
Succis Lupuli, Succis Buglossæ ana ℥ ij.
Succis depurentur & despumentur, dum ma-
neant ℥ iv.

Sacchari optimi ℥ ij ℞.
Coquantur cum facilitate, donec fiat Syrupus.
* Humores crassos & lentos incidit atque exte-
nuat, obstructions aufert, morboque regio suc-
currit. *Mesues.*

Syrupus de Bizantiis compositus.

R. Succis Endiviæ veræ,
Succis Apii, Succis Lupuli,
Succis Buglossæ ana ℥ ij.
In succis decoquantur Flor. rosarum rubr. ℥ ij.
Glycyrrhizæ ℥ ℞.
Sem. Anisi, Fœniculi,
Apri ana ℥ ij.
Spicæ Nardi Indicæ ℥ ij.
Colaturæ adde
Aceti ℥ ij.
Sacchari albis. ℥ ij.

Coquantur secundum artem diligenter. Inter-
dum ad singulas succi clarificati libras addunt
Aceti ℥ vj. Est efficacior simplici. *Mesues.*

DE SYRUPIS CONCO-
quentibus pituitam in sto-
macho.

Aqua mulsa seu Hydromel.

R. Mellis ℥ ij.
Aque pluvie ℥ iix.
Coque lento igne, donec amplius non spumet:
utere. Augetur quandoque mellis quantitas, &
decoquitur ad Julapii consistentiam: ne npe
quando à Medico præscribitur, aut quod ita illi
visum est, aut quod diutius servanda sit: & aro-
matizatur cinnamomo, zingibere, maci, croco,
& similibus.

Aqua mulsa alter modus.

R. Mellis bonæ partem j.
Aque fontanæ partes iij.
Fermenti panisillum panisillo ejusdem aque mel-
litæ dissolutum, videlicet in singulas centenas fa-
tæ mulsæ libras indantur fermenti dissoluti ℥ iij.
quæ omnia ligneo vase relecto trium digitorum
spacio vacuo, in quod, dum multi modo ferve-
bit, recipiatur, ubi fervere desierit, obturato vase
modo doriorum vini, tertio post mensis si pota-
bile Durat ad annos aliquot. * Affectus frigidos
cerebri, nervorum & juncturarum juvat. huius
sedat, puris & pituitæ crassæ expectorationem
promoves, colicis prodest, & calculum in meati-
bus urinæ gigni prohibet. *Medici Colontenses.*

Hydromel compositum.

R. Aquæ fontis ℥ xx.
Mellis despumati ℥ ij.
Salviæ, Origanî ana P. ℞.
Anisi, Coriandri ana ℥ j.
Glycyrrhizæ ℥ ij.
Cinnamomi ℥ j ℞.
E Bulliant ad consumptionem quartæ partis, & co-
lentur. *Augustani.*

Syrupus de Absinthio.

R. Absinthii Romani ℥ ℞.
Rosarum rubrarum ℥ ij.
Spicæ Indicæ ℥ ij.
Vini clari veteris opt.
Succis Citoniorum ana ℥ ij ℞.
Macerentur in vase marmoreo, aut fictili denso
per noctem unam: deinde decoquantur. Cola-
turæ adde
Sacchari ℥ ij.
Confice secundum artem. * Ventriculum robo-
rat & pectus, aliaque instrumenta nutritionis, ap-
petentiamque excitat: contra regium morbum
prodest, flatu discutit, humoresque per urinam
pellit. *Mesues.*

Syrupus de mentha major.

R. Succis Citoniorum Muzorum,
Citoniorum dulcium,
Granatorum acetosorum, Granat. dulcium,

Granatorum Muzorum T̄b j̄ β.

In succis macerentur per horas xxiv. sequentia:

R. Menthæ siccæ T̄b j̄ β.

Rosarum rubearum ʒ ij.

Coquantur deinde cum facilitate, usq; ad medietatis consumptionem: coeantur, & colaturæ adde Mellis vel sacchari T̄b ij.

Coquantur ad perfectionem: & quum reponis, aromata cum Galliæ Moscharæ tritæ veræ, & in sindone ligatæ, atque ex officio vasi suspensæ ʒ iij. * Ventriculum frigidum roborat: ob id nauſeam, vomitum, singultum, fluorem alvi sedat. *Mesues.*

Syrupus de mentha minor.

R. Succis menthæ depurati T̄b j.

Succis Granatorum dulcium.

Granatorum acetosorum, ad medietatem coeantur,

Sacchari vel mellis ana T̄b j.

Coquantur sentim secundum artem.

In hoc quoq; syrupo notandum est, quod in proximo syrupo de Mentha majore diximus de melle.

* Eandem ferè cum superiore facultatem habet. *Mesues.*

Mel rosatum.

R. Rosarum rubearum nondum penitus apertarum T̄b ij.

Mellis optimi T̄b vj.

Coquantur lento igne secundum artem. * Stomachum confortat & mundificat, & est digestivum materiarum phlegmaticarum in stomacho & meleratis contentarum. *Mesues.*

Mel rosatum aliud efficacius.

R. Foliorum rosarum rubearum nondum explicitarum contusorum T̄b ij.

Coquantur in aquæ celestis T̄b iv. Colaturæ fortiter expressæ adde

Succis rosarum rubearum depurati,

Mellis optimi despumati ana T̄b iv.

Coquantur secundum artem.

Oxymel simplex.

R. Mellis optimi despumati T̄b iv.

Aceti vini acerrimi, Aquæ clarissimæ ana T̄b ij.

Mel cum aqua despumetur iterum diligenter: & cum aqua fuerit consumpta, tunc adde acetum, & coque secundum artem. * Humores crassos, lentos ac pituitosos incidit, extenuat, & abstergit, atque adeo obstructions auferit. Sputum educit, spiritumque faciliorem reddit. *Mesues.*

Oxymel compositum.

R. Radicum Fœniculi, Apii,

Rad. Petroselinii, Rulci, Asparagi ana ʒ ij.

Sem. Apii, Fœniculi,

Petroselinii ana ʒ j.

Coquantur in aquæ claræ T̄b vj. aut quantum sufficit. Colaturæ adde

Aceti acerrimi T̄b j̄ β.

Mellis optimi despumati T̄b iij.

Coquantur secundum artem. * Humores crassos & pituitosos incidit, extenuat & abstergit:

A obstructions tollit jecinoris, lienis, ac renium, urinam movet, sudoremque evocat.

Oxymel Scylliticum simplex.

R. Mellis despumati T̄b ij.

Aceti Scyllitici T̄b ij.

Coquantur secundum artem. * Humores crassos, lentos, avulsu contumaces separat: ob id confert ventriculi & aliorum viscerum affectibus hos humores sequentibus: rictum acidum sanat, & vesicæ mollicationem, seu urinæ incontinentiam. *Mesues.*

Oxymel Scylliticum compositum.

R. Radicum Apii,

Fœniculi ana ʒ iv.

Radicum Petroselinii,

Rulci, Asparagi,

Sem. Apii, Fœniculi ana ʒ j.

Coquantur in aquæ T̄b vj. aut quantum sufficit. Colaturæ adde

Aceti Scyllitici T̄b j.

Mellis optimi despumati T̄b ij.

Fiat secundum artem. * Id potentius multo incidit, tenuat, terget, obstructa aperit, in diuturnis quartanis, & quotidianis, quam oxymel compositum de radicibus.

Oxymel Scylliticum Democriti.

R. Origani, Hyssopi,

Thymi, Ligustici,

Cardamomi, Stœchados ana ʒ v.

Aquæ T̄b ij.

Coque ad librarum duarum consumptionem: adde

Mellis T̄b ij.

Mellis passul. T̄b β.

Succis Bryoniae ʒ v.

Aceti scyllitici T̄b β.

Coque iterum semper despumando. * Epilepsiam, vertiginem, cephalalgiam, hemicraniam cerebri, & pulmonis obstructions ab humoribus valenter impactis sanat. *Mesues.*

Oxymel nostrum compositum.

R. Radic. Fœniculi, rad. Petroselinii ana ʒ β.

Sem Fœniculi, Anisi, Petrosel. ana ʒ j.

Gentianæ tritæ ʒ ij.

Zingiberis ʒ ij.

Coquantur in aqua sufficiens usque ad remanentiam ʒ v. Quibus adde

Mellis ʒ vj.

Aceti scyllitici ʒ iv.

F Iterum coquantur ad syrapi usq; consistentiam: * sanitatem conservat: febrientibus confert.

Oxymel ex Ligustico.

R. Rad. Apii, rad. Fœniculi, rad. Petrosel.

Calaminthes, Dauci ana ʒ j.

Zingiberis, sem. Ligustici, sem. Apii,

Sem. Fœniculi, sem. Anisi, sem. Cari,

Eupatorii, Afari, Abinthii ana ʒ β.

Caryophyllorum, Galangæ ana ʒ iij.

Spicæ Nardi ʒ ij.

Aceti T̄b x.

Coque

Coque ad dimidias: adde Mellis ℥ v.
Coque iterum ad syrupi consistentiam. Vales ad
pituitam crassam, lentam, putrem, obstructions
epatis & splenis aperendas, urinam movendam.
Mesues.

Oxymel ex Calamintha.

R. Rad. Apii, rad. Foeniculi, rad. Incybi ana ℥ j.
Schoenanthi ℥ ij.
Sem. Apii, sem. Foeniculi, sem. Anisi ana ℥ vj.
Calaminthæ montanæ & domesticæ,
Spicæ, Afari, Castiæ, Mastichis,
Dauci, Petroselinii ana ℥ ℥.
Caryophyllorum, Ligustici,
Zingiberis, Galangæ ana ℥ ij.
Aceti ℥ iix.
Aque ℥ vj.

Coque ad duarum partium consumptionem, adde
Mellis despumati ℥ v.

Coque. Datur ab ℥ j. usque ad ℥ ij. Calefacit, in-
cidit, terget humores crassos, lentos, putres: ob
id intemperiem frigidam ventriculi & epatis
corrigit, scirrhum lienis, & aliorum viscerum dis-
sipat, febres diuturnas iuvat. *Mesues.*

**DE SYRUPIS CONCO-
quentibus pituitam in
hepate.**

Syrupus de duabus radicibus.

R. Rad. Petroselinii, Foeniculi ana ℥ ij.
Aque quantum sufficit.
Sacchari clarificati ℥ ij.
Coquantur secundum artem.

Syrupus de quinq; radicibus.

R. Radicum Apii, Foeniculi,
Petroselinii, Ruscii,
Asparagi ana ℥ ij.
Aque fontis ℥ vj.
Coquantur ad tertie partis consumptionem, ex-
pressum coquatur denuo cum
Sacchari ℥ ij. Addendo ad finem
Aceti albi ℥ iix.
* Conferre febribus pituitosis & biliosis, & iis in-
cipientibus.

Syrupus de Eupatorio.

R. Rad. Foeniculi, Apii, Endivie ana ℥ ij.
Glycyrrhizæ, Schoenanthi, Cuscutæ,
Abinthii, Rosarum ana ℥ vj.
Capilli Veneris, Bedeguaris, Suchabæ, (Spinæ
Arab. aut Ægyptiæ) Flor. aut rad. Buglossæ, F
Anisi, Sem. Foeniculi, Eupatorii ana ℥ v.
Ravedseni, id est, R. habarbari Orientalis,
Mastichis ana ℥ iij.
Spicæ nardi Indicæ, Afari,
Folii, pro folio pone spicam Romanam ana ℥ ij.
Aque quantum sufficit, aut ℥ iix.
Succi Apii, Endivie ana ℥ ℥.
Sacchari ℥ iv.

Coquantur secundum artem. * Frigidis jecinori-
s vitii, ac ejusdem obstructionibus, aque inter-
cutem, maloque corporis habitus succurrat: hu-

A mores enim crassos extenuat, roburq; jecinori
adjicit. Urinas movet, & hypochondriorum ten-
sionem demolitur. *Mesues.*

**DE SYRUPIS CONCO-
quentibus pituitam in
matrice.**

Syrupus de Artemisia.

R. Artemisiæ M. ij.
B Pulegii, Calaminthæ, Origani, Melissæ,
Dictamni Crentici, Persicariæ, Sabinæ,
Amarici, id est, Majoranæ, Chamædryos,
Chamæpityos, seu Iva artericæ,
Perforatæ, id est, Hypericonis,
Comarum, Matricariæ, Centauræ minoris,
Rutæ, Betonice, Buglossæ, Rad. Foeniculi,
Apii, Petroselinii, Asparagi, Bruci,
Rad. Saxifragiæ (ejus loco accipiantur radices
Pimpinellæ) rad. Enulæ Campanæ, Cyperi,
Rad. Rubecintæ, Ireos, rad. Præoniæ, ana M. j.
Baccarum Juniperi, Sem. Ligustici,
Petroselinii, Apii, Anisi, Nigellæ,
Carpobalsami (aut succedanei ejus) Costi,
Rad. Afari, Rad. Pyrethri, Calicigneæ aroma-
ticæ, Cardamomi, Calami aromatici,
Phu, id est, radice ejus ana ℥ ℥.
Aque quantum sufficit.
Sacchari ℥ iv.

Coquantur omnia magna diligentia secundum
D artem, ne plus quam necesse sit aromata bulliãt.
* Medetur passionibus matricis, & retinet eam
in proprio loco: resoluit frigiditatem, ventosi-
tatem, & dolores, corroborat nervos, aperit
poros, sanguinem corrigit, menstruis imperat,
& provocat. *Mattheus de Gradibus.*

**DE SYRUPIS CONCO-
quentibus melancholiam
in corde.**

Syrupus de pomis.

R. Succi pomorum dulcium, Succi pomorum
acetosorum ana ℥ v.
Coquantur, despumetur, & colentur: deinde adde
Sacchari ℥ ij.
Coquantur secundum artem. * Cor imbecillum
roborat: ob id syncopen & cordis tremorem sa-
nat. *Mesues.*

Syrupus de pomis aliter.

R. Capill. Venetis, Ceterach,
Buglossæ, Borriginis ana M. j.
Flor. Buglossæ, Flor. Borriginis,
Fumarie, Summitatum thymi ana P. ij.
Senæ, Chani, Strechados ana ℥ j.
Chamæd. Squinanthi, Ellebori albi,
Flor. Amaranthi, Setamoidis ana ℥ ℥.
Succi agrimonie, Fumi terre ana ℥ iij.
Succi pomorum dulcium ℥ ij.
Passularum, Polypodii ana ℥ ij.
Croci ℥ j.

Fiat decoctio in aqua & aceto q. l. in qua dissol-

ve sacchari q. s. Fiat syrupus perfectæ coctionis. A
Dotis ab ℥ j. ad ℥ iij. Prodest morbo comitiali,
melancholice, morbo Gallico, & omnibus affe-
ctibus, à melancholia & pituita, præsertim falsa.
Rondeletius.

Syrupus de pomis regis Saponis.

R. Succi pomorum dulcium ℥ ij.
Borraginis, Buglossæ ana ℥ j. s.
Foliculorum lenæ ℥ ij. Croci ℥ j.
Sena contrita horis xxiv. succis maceretur: semel
aut bis fervefiat, coletur, expressum cum saccha-
ri libris duabus percoquatur in syrupum. Cro-
cus panno lino ligatus inter coquendum insi-
ceretur. *Mejus.*

Syrupus de succo Borriginis.

R. Succi Borriginis depurati ℥ ij.
Sacchari despumati ℥ ij.
Coquantur in syrupum.

ANNOTATIO.

Succus Borriginis prius est clarificandus cum
albuminibus ovorum: alioquin plures facit macilagi-
nosus fiet Syrupus.

* Cor ipsum roborat, ejusq; tremorem & syn-
penfanat: maniacos & melancholicos juvat.

Syrupus de succo Buglossæ.

R. Succu Buglossæ depurati ℥ ij.
Sacchari ℥ ij.
Coquantur usq; ad syrupi consistentiam. * Cor
confortat, latitiamque generat.

ANNOTATIO.

Succus Buglossæ difficulter exprimitur: nam fit
macilago, dum tunditur Buglossa: idè r. a dimit-
tenda est per noctem in frigido loco, & postea ex-
primendus succus, atq; cum albuminibus ovorum
clarificandus. *Cordus.*

DE SYRUPIS CONCO-
quentibus melancholiam
in hepate & hene.

Syrupus de Epithymo.

R. Epithymi ℥ xx.
Myrobalarum Citrinorum, Indorù ana ℥ xv.
Cuscute, Fumiterre ana ℥ x.
Thymi, Buglossæ, Galaminthæ,
Myrobalarum, Emblicorum,
Bellericorum, Glycyrrhizæ,
Polypodii, Agarici, Strechados ana ℥ vj.
Rolarum, Fernticuli, Anisi ana ℥ ij. s.
Prunorum N. xx.
Passularum enucleatarum ℥ iv.
Tamarindorum ℥ ij. s.
Aque ℥ x. vel quantum sufficit.
Bulliant secundum artem: colaturæ adde
Sacchari ℥ iv. Sape ℥ ij.
Fiat Syrupus.

Sapa est mustum optimum ad certum decoctum.
* Atram bilem, & alios humores istos vacuat:
ob id morbos ex his nascentes, elephantiam, can-
crum, ulcera maligna, fistulosâ, ploram, lepram
præcavet, curatq; *Mejus.*

Syrupus de lupulo.

R. Succu lupuli depurati ℥ iv.
Succi fumiterre depurati ℥ ij.
Sacchari ℥ vj.
Coquantur secundum artem.
* Refrigerat, & collectionum impetus lenit, bi-
lem regio morbo laborantibus detrahit, pitui-
tam in aqua inter cutem exigit per alvum.

Syrupus de Scolopendrio.

R. Scolopendrii veri, seu Ceterach,
Phyllidis, id est, Lingue cervinæ,
Endivie Hepaticæ,
Absinthii, Cichorii ana M. s.
Cuscute P. s. seu ℥ j.
Sem. communiun frig. majorum ana ℥ ij.
Flor. Borriginis,
Flor. Buglossæ, Capillorum Veneris ana M. j.
Rad. Feniculi, rad. Petroselinii,
Rad. Ruscii ana M. s.

Cum sufficiente quantitate aque & sacchari, fiat
syrupus secundum artem, qui aromatizetur cum
Laccæ, Cassiæ lignæ, Maceris pro Folio ana ℥ ij.
Ligentur in panno raro, & bulliant in syrupo.
Prodest in affectibus jecoris, & henis, eorundem
obstructionibus, & morbis inde enatis.

Syrupus splenicus.

R. Epithymi, Cort. rad. Capparorum,
Lingue cervinæ, fructuum Tamarici (pro qui-
bus substituitur cort. med. Fraxini) Cort. med.
rad. Salicis, rad. Rubiæ tinctorum,
Ireos Florentinæ, rad. Acori vulgaris,
Rad. Alari, Sem. Anisi, Fœnic. Cymini ana ℥ j.
Macerentur simul omnia in ℥ iv. aque & libris
duabus aceti, horis 24. Deinde coquantur omnia
ad consumptionem tertie partis, reducendo scilicet
ad libras quatuor. Expressioni colaturæ adde
mellis Hispanici despumati ℥ ij. s. Coquantur
secundum artem ad syrupi consistentiam. *Franc.
Pedemontanus.*

Syrupus de succo fumiterre major.

R. Myrobalarum Citrinarum,
Chebularum ana ℥ xx.
Flor. Borriginis, Buglossæ, Violarum,
Absinthii, Cuscute ana ℥ j.
Glycyrrhizæ Rosarum rub. ana ℥ s.
Epithymi, Polypodii ana ℥ vij.
Prunorum N. c.
Passularum enucleatarum ℥ s.
Tamarindorum, Pulpæ cassiæ fistulæ ana ℥ ij.
Aque fontis ℥ x.

Coquantur omnia præter Cassiam & Tamarin-
dos secundum artem ad tertias: deinde cola, &
colaturæ adde
Cassiam & Tamarindos, & succu fumiterre
depurati, sacchari albillimi ana ℥ ij.
Coquantur lento igne ad justam consistentiam,
& reponere. * Syrupus fumaricæ major ventricu-
lum & hepar roborat, obstructiones aperit, cum
morbo, præcipue ab humore falso vel isto na-
tos, ut ploram, lepram, impetiginem, serpigini-
nem curat. *Mejus.*

Syrupus fumarie minor.

R. Myrobálanorum flavarum ℥ ij.
 Violarum, Cassiuthæ, Absinthii ana ℥ j.
 Aquæ T̄b vij.
 Succī fumarie costī & purgati, sacchari ana
 T̄b ij.

Coque omnia usque ad partem tertiam. Expres-
 sum cum succo fumarie & saccharo percoque.
 Quidam scammonii ℥ ss. panno lineo raro liga-
 tam in eo suspendunt. * Syrupus fumarie mi-
 nor hepatis obstructionem aperit: ob id iterum
 sanat, pituitam salisam & bilem usam vacuat:
 proinde p̄foram, lepram, pruritum, & alia cutis
 vitia inde orta sanat, & corporis colorem flori-
 dum reddit. *Mesues.*

Syrupus è succo fumarie simplex.

R. Succī Fumiterre crudi T̄b ij.
 Sacchari boni T̄b ij. vel T̄b ij β.
 Coquantur simul, & despumantur, quoad syrupi
 consistentiam acquirant. * Ad eadem valet, ad
 quæ supradicti. *Medici Colonienſes.*

**DE SYRUPIS PUR-
gantibus bilem.****Infusio rosarum, seu Syrupus rosatus solu-
tius sive Muccharum.**

R. Infusionis rosarum secundum artem no-
 num iteratæ T̄b x.
 Sacchari tantundem.
 Coquantur in Syrupi consistentiam. Nonnulli
 cum melle faciunt. Dosis, ab unctis duabus
 ad ℥ iij. * Bilem purgat. *Mesues.*

Infusio violarum.

Infusio violarum eodem modo fit, quo rosa-
 rum infusio.

Syrupus ex floribus persicis.

R. Florum persicorum recentium T̄b ij.
 In aquæ vel toris majalis calefacti libris septem,
 & dimidia, per horas octo, septies aut novies
 macerantur, deinde hujus diluī libras duas, cum
 sacchari sesquialtera, aut duabus, ad syrupi spissi-
 tudinem incoquantur. * Hic Syrupus acres co-
 nquesq; humores in biliosis febribus, ut rosarum
 trium inciarum, vel quatuor instar exhibitus,
 educit. *Andernaces.*

Syrupus de cichorio cum rhabarbaro.

R. Endivie domesticae,
 Endivie sylvestris,
 Cichorii, Taraxacon ana M. j.
 Cicerbitæ, Epaticæ,
 Scamolæ, Lactucæ,
 Fumiterre, Lupulorum ana M. j.
 Hordei non excorticati ℥ ij.
 Vesicariæ, id est, Alkekengi,
 Glycyrrhizæ, Capillorum Veneris,
 Asplenii, Polytrichi,
 Adianti ana ℥ vj.
 Rad. Foeniculi, Apii, Asparagi ana ℥ ij.
 Coquantur in aqua sufficienti, & percolentur:

A deinde cum saccharo albo clarificato fiat syru-
 pus. pro cuius unaquaq; libra inter coquendum
 adjiciantur

Rhabarbari optimi ℥ ss.
 Spicæ nardi ℥ iv.

Colligato in linteolo raro, quod sepe exprima-
 tur, dum Syrupus consistentiam justam nancisca-
 tur. * Valet contra omnem materiam veneno-
 sam in alterando & mundificando eam, & pro-
 prie in anthrace, & similibus: valet in febre pe-
 tentiali. Confortat cor & nutritiva, mundifi-
 cat materias per urinam & secessum, & facti ap-
 petere cibum, ac inducit somnum. *Nicol. Florent.*

Syrupus de rhabarbaro solutivus.

R. Rhabarbari optimi ℥ ij β.
 Fol. Senæ ℥ j β.
 Florum Violarum M. j.
 Cinnamomi ℥ j β.
 Zingiberis ℥ ss.
 Aquarum Betonicæ,
 Cichorii,
 Buglossæ ana T̄b j β.

Fiat omnium infusio per noctem, manè ebulli-
 tione & expressione facta, colatura decoquatur
 in Syrupum cum sacchari albi libra, aut quantum
 sufficit, adde

Syrupi ros. lax. ℥ iv.

Hic paratur Augustæ Vindelicorum ad prædicta
 omnia valentior, citra molestiam in pueris, & de-
 licatulis alvum subducens, utramque bilem de-
 turbans, & est in usu propemodum quotidiana.
Augustiani.

**Mel Mercuriale, è succo herbe Mer-
curialis.**

R. Succī crudi Mercurialis T̄b ij.
 Mellis puri Hispanici T̄b ij.
 simul coquendo, despumandoque ad Syrupum,
Medici Colonienſes.

**DE SYRUPIS PURGAN-
tibus pituitam.****Syrupus ex Bryonia radicum succo.**

R. Succī crudi rad. Bryoniae, Mellis Hispani-
 ci, vino generoso despumati ana partes
 æquales.

Coquantur leniter in vase terreo vitreato, do-
 nec fluxilis syrupi consistentiam habeat, conti-
 nenter despumando. Exprimitur autem succus
 tempore Maji, cæli constitutione sicca: ferius
 etiam expresso, in luxuriantem herbam transfusa
 fuerit succositas radices.

Syrupus de bryonia compositus.

R. Succī bryoniae ℥ v.
 Aquæ decoctionis Origani,
 Hyssopi sicci, Libylici, Sceteleos,
 Cardamomi, Stœchados ana ℥ j.
 Sapa, Uvarum palliarum ana T̄b β.
 Mellis T̄b ij.

* Syrupus de bryonia idem valet, quod medica-
 mentum. Dantur ℥ ij. *Mesues.*

Oxymel phlegmagogum.

Oxymel phlegmagogum fit ut oxymel de radicibus, si inter coquendum medulla feminis Cnici panno lineo raro ligata mergatur, & identidem confricetur. Potentius vacuabit, si etiam Turbith cum Zingibere nodulo prædicto addatur. *Mesues.*

Syrupus hermodactylis.

R. Quinque radicum ana ℥ j.
Sem. 4. frigid. majorum ana ℥ j. β.
Hyssopi, Capillorum Veneris,
Aspleni ana M. β.
Violarum M. j. β.
Flor. Rorismarini, Borriginis ana M. j. β.
Cyperus ℥ iij.
Chamomilla ℥ ij.
Passularum ℥ j.
Senæ ℥ ij. (an potius ℥ ij.)
Hermodactylorum, Culecure ana ℥ β.
Anisi, Fœniculi, Carvi ana ℥ ij. β.
Polypodii ℥ ij.
Agarici ℥ ij.
Coquantur in aquæ Tβ iij. & colaturæ adde
Sacchari Tβ j. β.
Rosarum ℥ j.
Rhabarbari ℥ iv. β.
Turbith ℥ iij.

Hæc tenuissimè trita, inq; panno ligata suspendes in syrupo cocto secundum artem. *Nicolaus.*

Oxymel vacuans melancholiam.

R. Thymi, Calaminthes, Agarici,
Buglossi hortens. & erratici,
Glycyrrhizæ ana ℥ j.
Polypodii ℥ ij.
Chama dryos, Chamæpityos,
Stœchados, Spinæ albæ ana ℥ v.
Passularum Tβ β.

Macera 24. horis: adde

Aceti albi, succi buglossi ana Tβ ij. β.
Aque Tβ ij.

Coque igne lento ad dimidias, cola. & adde

Mellis Tβ iij.

Percoque, inter coquendum autem epithymi ℥ j.
Ellebori nigri aut. iij. nodulo ligata meriaq; saepe confricentur. *Mesues.*

DE SYRUPIS PURGANTIBUS humores mixtos.**Syrupus Diacereos.**

R. Intrybi, latifolii, Cichorii ana M. j.
Adianti albi, nigri, Agrimoniz,
Scolopendrii, Lupuli, Fumariz ana M. β.
Vesicariæ, id est, Alkekengi ℥ iij.
Violarum P. j.
Rad. Apii, Fœniculi, Asparagi ana ℥ β.
Polypodii quercini ℥ j.
Glycyrrhizæ ℥ vj.
Sem. Cnici ℥ j. β.

A Sem. 4. frigid. majorum ana ℥ ij.
Hordei non excorticati P. ij.
Sem. Endivizæ, Cichorii ana ℥ j. β.
Uvarum passlarum ℥ j.
Pruna Damascena paria x.
Florum Borriginis, Buglossi,
Violarum ana P. j.
Myrobalanorum Citrinorum,
Chebulorum ana ℥ β.

B Omnia in aqua ad tertias decoquantur, & in hujus decocti jure colati libra & semisse, macerentur seorsim

Rhabarbari electi ℥ ij. β.

Agarici trochiscati ℥ j.

Foliorum senæ ℥ j. β.

Zingiberis, Cinnamomi ana ℥ j.

Exprens. colatisque iterum adde

Sacchari optati Tβ j.

Syrupi rosarum solutivi ℥ iij.

C Mixta omnia rursus modice coquantur ad justam spissitudinem. * Ex hoc syrupo interdum

cochleare unum vel semunciam, cum modica hordei aqua, cui cinnamomi aliquid incoctum sit, pueris bile suffusa, vel obstructionem & duritiam viscerum expertis, aut lumbicis molestatis ante cibum salubriter exhibuimus: proventiosibus, tum viris, tum mulieribus, in similibus affectibus duo cochlearia, cum syrupo violaceti, aut rosacei solutivi uno & quateris aquæ intrybi, aut hordei, aut alterius, morbo convenientis, valentioribus uncias duas, cum una syrupi ros. solutivi, & aquæ cichorii duabus. Quod si æger

D delicatus sit, & febris careat, aquæ ex cinnamomo distillatæ cochleare unum aut alterum admisceatur. *Andernacus.*

Syrupus Diacnicus.

R. Adiantii, Hyssopi, Thymi,
Origani, Chama dryos, Chamæpityos,
Scolopendrii, Buglossæ ana M. β.
Culecure, Vesicariæ ana ℥ β.
Rad. Angelicæ, Glycyrrhizæ,
Fœniculi, Apii, Asparagi ana ℥ j.
Cort. Tamariacis ℥ β.

E Polypodii ℥ j. β.

Sem. Anisi, Fœnic. Ameos. Danci ana ℥ j.

Sem. Cnici contusi ℥ iv. β.

Passularum enucleatarum ℥ ij.

F Decoquantur in aqua ad tertias, colentur: dein-

de adde

Senæ Alexandrinæ ℥ j. β.

In jure decocti per noctem macerentur. adhæc

Agarici trochiscati ℥ β.

Zingiberis ℥ j.

Rhabarbari ℥ vj.

Hæc sequenti die colentur, valideq; exprimantur. postea

Sacchari albis. Tβ j.

Syrupi ros. solutivi,

Syrupi Violacei solutivi ana ℥ ij.

Syrupi acetosi simpl. ℥ ij.

Misceantur, atque iterum modice coquantur, dum

dum satis spissescant. Ex hoc syrupo uncia dux adultis cum aqua stillatitia hyssopi aut thymi, aut pulegii uncia instar, cinnamomi semuncia, aut cochleari recte exhibentur. Pueris & delicatis mulieribus ℥j. cum syrupo rosar. solutivi semuncia, & aqua cinnamomi stillatitia ex vino modica. * Idoneus est autumno, & hyemis Verisque initio: febribus longis, quotidianis, quartanis, & obstructionibus viscerum, lientis, & jecoris, ex pituita & crassis humoribus creatis, nec non & aqua inter cutè laborantibus. *Andernacus.*

DE SYRUPIS MINU'S usualibus alterantibus.

Syrupus alterans bilem flavam.

R. Scariole, Lactucæ, Rostri porcini, Buglossæ, Borriginis ana M. j.
Prunorum, Sebeiten ana paria v.
Sem. 4. frig. major. ana ℥ ij.
Sem. Anili ℥ j.
Flor. Borriginis, Violarum, Buglossæ ana P. j.
Fiat decoctio, & in Tÿj. dissolvetur sacchari quantum sufficit, & fiat syrupus. *Rondelinius.*

Syrupus contra pleuresin & peripneumoni- am phibificos & helicos.

R. Aquæ Tÿ iv.
Violarum ℥ ij. ß.
Glycyrrhizæ, papaveris albi ana ℥ ß.
Sem. Citoneorum, sem. Malvæ,
Medullæ sem. bombacis,
Medullæ sem. Citoneorum,
Melonum, Cucumeris, Cucurbitæ,
Portulacæ, Tragacanthæ,
Gummi Arabici ana ℥ ij.

Omnia in sacculo bene trita ponantur, & sacculus in prædicta aqua ponatur, & bulliat ad medietatem, & sacculo abstracto ab aqua Tÿ ij. sacchari ponantur, & fiat syrupus clarificatus. *Nicolaus.*

Syrupus Ambrosii provocans sudorem, & sitim extinguens, utilis in febribus.

R. Milii excorticati quantitatem convenientem, decoquatur donec crepet. Deinde R. ℥ v. vel circa ejus jusculi bullientis, & infunde vini albi odoriferi ℥ ij. & sic calidum da patienti, ac bene eum cooperias, tunc mirum in modum sudabit.

Syrupus contra acutas & peracutas passiones.

R. Succo Portulacæ,
Melonum ana Tÿ j.
Vel cum aqua decoctionis citrull. melon. & cucurb. vel cap. Ven. herbæ hepaticæ, polytrichi, adianti, Ceterach. in aqua ista, vel in succo prædicto sic bullire
Liquiritiæ mundatæ & tritæ,
Tragacanthæ, Violarum ana ℥ j.

A Prunorum N. v.
Sempervivæ aut Coryledonis ℥ j.
Deinde coletur. & colaturæ adde sacchari Tÿ j. & fiat syrupus & clarificetur: deinde psyllium & sem. Citon. ana ℥ j. In sacculo mitte sandali albi & rub. spodii, berberis, ros. pc. tul. lact. scariol. ana ℥ ß. pulverisato, & horum pulverem in eodem sacculo pone, & ibidem Rhabarb. pulver. ℥ j. Hæc simul bullite facias usque ad decoctionem. Datur contra acutas & peracutas sine Apotemate cum aqua frigida. *Nicolaus.*

Syrupus contra omnem fluxum ventris.

R. Sacchari Tÿ j.
Aquæ rosarum, vel pluvialis Tÿ j. ß.
Myrti ℥ j.
Rosarum, Sumach, Acaciæ, Balaustiar,
Spodii, Hypocistidis ana ℥ ß.
Sorbarum mundat N. x.
Mespilorum viridum N. v.
Cornarum, vel prunorum immatur. N. x.
Tragacanthæ, Glycyrrhizæ,
Gummi Arabici ana ℥ ß.

Terenda terantur, & bulliant in supra dicta aqua, donec ad quantitatem unius libræ deveniant, & colaturæ ponatur saccharum prædictum, & fiat syrupus & clarificetur. *Nicolaus.*

Syrupus de papavere contra omnem ventris solutionem.

D R. Capita papaveris recent. N. c. j.
Plantaginis,
Balaustiar, Gallarum,
Prunellarum immatur. ana ℥ j.

Conficitur sic: Omnia ista in aquæ pluvie q. s. dimitte per biduum, in tertio verò die coque aquam bene usque ad consumptionem medietatis, postea cola per pannum fortiter. Cum autem colata fuerit, admisce illi colaturæ tertiam partem mellis, & iterum coque, donec ad spissitudinem mellis redigatur, & tunc conde in vase vitreo, & cum opus fuerit, in ℥ j. aquæ mitte ℥ j. syrupi. *Nicolaus.*

DE SYRUPIS ALTE- rantibus pituitam.

Syrupus ad Epilepsiam.

R. Succo cardui benedicti, depurati, & ad spissitudinem cocti ℥ iv.
Succi millefolii eodem modo parati ℥ ij. ß.
Sacchari albi ℥ iv.
Decoquantur f. 2. De quo sumat in septimana bis vel ter cochlearium unum: vel cum ℥ j. Theriacæ, vel sine. *Crato.*

Syrupus alterans pituitam.

R. Rad. Apii, Petroselinii,
Fœniculi, Asparagi ana ℥ j.
Hyssopi, Betonicæ ana M. j.
Sem. anisi ℥ ij.
Passularum, Ficum ana paria xx.

Flor. Anthos, Storchados,
Borraginis, Buglossæ ana P. j.
Glycyrrhizæ ʒ j.
Fiat decoctio, & in libra una & semisse dissolve
mellis despumati vel ros. quantum satis est. *Ron-*
delatus.

Syrupus ex quinta essentia Fio-
TAVANTI.

R. Aquæ vitæ optimæ & circulatæ ʒ xij.
Olei sulphuris ʒ vj.
Olei vitrioli ʒ ʒ.
Olei Tartari ʒ vj.
Zulapni rosacei Tʒ iv.
Moschi ʒ ʒ.
Misce, & fiat syrupus. Magnarum virium est.

Syrupus saccharatus.

R. Vini optimi Tʒ ij.
Sacchari albi Tʒ j.
Coquantur ad lentum ignem more syrapi: serua
& utere cum duabus partibus aquæ decoctæ.
Sensibus frigidis & debilibus convenit, & quibus
humor nativus, & calor naturalis minuuntur.
Nutrit enim, & sanguinem generat, & replet par-
tes principales spiritibus. *Rabi Moyses.*

Syrupus de Cinnamomo, noster.

R. Mixtæ Cotoneorum, vel
Syrapi de Cort. mali Citri Tʒ ʒ.
Quintæ essentia Cinnamomi ʒ ʒ. vel
Olei Cinnamomi
Tincturæ auri ana ʒ ij.
Misce optimè. Ad eadem valet, ut supra dictus.

Syrupus de Cinnamomo, noster.

R. Syrapi de cort. mali Citri, vel mixtæ coto-
neorum ʒ iv.
Quintæ essentia Cinnamomi circulatæ ʒ ij. vel
ʒ ʒ. Tincturæ auri vitæ ʒ ij.
Misce. Sensibus debilibus confert.

Syrupus ad menses provocandos.

R. Rad. Apii, Fœniculi, Petroselinii,
Asparagi, Rulci ana ʒ ij.
Radie. Rubiæ major. ʒ ij.
Radie. Quinquefolii, Eryngii ana ʒ j.
Pulegii utriusque, Calaminthæ, Orig. ana M. j.
Semin. 4. frig. major. ana ʒ j.
Florum Anthos, Leucoji ana P. j.
Flor. Genistæ P. j.
Fiat decoctio in aqua & vino, in quibus per no-
ctem radices macerentur: & in colaturâ Tʒ ij. f
dissolve mellis despumati ʒ iv. Sacchari quan-
tum satis est: fiat syrupus aromat. cum Cinna-
momi ʒ j. Datur paulo antè quàm fluant men-
ses, aut cum instat tempus purgationis. *Ron-*
delatus.

ANNOTATIO.

Notandum, quòd si huiusmodi syrapi non tam co-
piosum saccharum, ut syrapi veri, recipiant, & non
ad perfectam syrapi usque consistentiam coquantur,
sed dilutione parentur, ea rectius apo-
theotica appellari.

ADE SYRUPIS ALTERAN-
tibus bilem atram.

Syrupus alterans bilem atram.

R. Endiviæ, Scariolæ, Buglossæ, Borraginis,
Violarum, Lactucæ, Portulacæ ana M. j.
Passularum ʒ ij.
Sem. 4. frig. major. ana ʒ ij.
Flor. Borraginis, Buglossæ ana P. j.
Violarum P. j.

B Fiat decoctio, & in colatura dissolve sacchari
quantum satis est: & fiat syrupus. *Rondelatus.*

Alius.

R. Rad. Buglossæ, Enulæ, Glycyrrhizæ ana ʒ j.
Rad. graminis, Asparagi, Apii ana ʒ ʒ.
Rad. Saryionis ʒ vj.
Passularum ʒ j.
Capillorum Veneris, Violarum, Melissæ,
Cichorii ana M. j.
Calaminthæ, Chamædryos, Chamæpityos
ana M. ʒ.
Sem. 4. frig. major. ana ʒ j.
Sem. Bombacis ʒ ij.
Sem. Apii, Petroselinii ana ʒ ij.
Flor. Buglossæ, Borraginis, Anthos,
Violarum ana P. j.

Fiat decoctio. In colatura dissolve sacchari quan-
tum satis est: & fiat syrupus. *Rondelatus.*

Syrupus ad atram bilem, alius.

D R. Flor. Borraginis, Flor. Buglossæ, Flor. Melissæ,
Flor. Violarum, Capillorum Ven.
Endiviæ, Cuscutæ, Polypodii, Senæ,
Epithymi ana M. j.
Prunorum Damasce. N. xx.
Pomorum odoratorum N. x.
Passularum ʒ j.
Glycyrrhizæ ʒ ʒ.

Coquantur in aqua omnia præter Epithimum
& aromata, donec pars tertia consumatur. De-
coctio expressa postea cum saccharo iterum &
Epithymo moderatè coquantur: postremò infun-
dantur aromata, scilicet cinnamomum atq; cro-
cus. Huius syrapi aurora calfacti ʒ ij. bibantur
simulque ʒ ij. aut ʒ ij. aquæ Buglossæ. *Marsilius*
Ficinus.

Syrupus ad Melancholiam.

R. Aquarum Fumiterræ, Lupulorum,
Absinthii, Capill. Ven. ana Tʒ v.
Polypodii Quercini Tʒ j.
Fol. Senæ, Epithymi ana ʒ iv.
Flor. Borrag. Buglossæ ana M. j.
Capill. Ven. M. j.
Glycyrrhizæ, Passularum, Cinnamomi,
Quatuor sem. frig. ana ʒ ij.

Fiat decoctio Ca. de Colatura R. Tʒ iv. qbus addè
Succi Borraginis, succi Buglossæ, succi Lupu-
lorum ana ʒ ij.

Mellis ʒ vj.
Sacchari albi q. s. est.

Fiat syrupus secundum artem: aromatizetur cum
molcho & ambra. *Fioravanti.*

DE SYRUPIS PUR-
gantibus.*Syrupus purgans bilem.*

℞. Rad. Cichorii ℥j.
Glycyrrhizæ rasæ ℥ij.
Cichorii, Scariolæ, Buglossæ, Borraginis,
Rosæ porcini, id est, sonchi, Dentis leonis
ana Mj.
Prunorum, Sebesten ana paria xx.
Passularum paria x.
Anisi ℥ij.
Tamarindorum ℥j.
Senæ Orient. Medullæ sem. Carthami ana ℥ij.
Flor. Borraginis, Buglossæ, Violarum ana P. j.
Fiat decoctio. In colatura dissolve sacchari quan-
tum satis est: fiat syrupus, addendo post clarifica-
tionem, vel in clarificatione ipsa, succi rosarum
℥ij. vel syrupi rosati laxativi ℥iv. cinnamomi
℥ij. Misce, & fiat syrupus. *Rondeletius.*

*Syrupus purgans pituitam ex
thorace.*

℞. Radicum Apii, Foeniculi, Apii, vel
Asparagi ana ℥j.
Hysso, Betonicæ ana Mj.
Marrubii M. B.
Sem. Anisi ℥ij.
Passularum, Ficum ana paria xx.
Florum Anthos, Stœchados, Borraginis,
Buglossæ ana P. j.
Glycyrrhizæ ℥j.
Fiat decoctio. In colaturæ T̄b ij adde
Polypodii ℥j.
Medullæ sem. Carthami contusi ℥ij.
Agarici trochiscati ℥ij.
Anisi, Foeniculi ana ℥j.
Concoquantur: colaturæ adde
Mellis violati, vel rosæ cœci, quantum satis est: &
fiat syrupus. *Rondeletius.*

Syrupus purgans melancholiam.

℞. Radicum Buglossæ, Glycyrrhizæ rasæ ana ℥j.
Cichorii, Scariolæ, Borraginis, Buglossæ,
Fumæ terræ, Violarum, Mercurialis ana Mj.
Passularum ℥ij.
Seminis Cucurbitæ, Melonum, Citrulli,
Cucumeris, Anisi ana ℥ij.
Senæ Orientalis, Polypodii, Origani,
Epithymi ana ℥ij.
Tamarindorum ℥j.
Flor. Borraginis, Buglossæ, Violarum ana P. ij.
Misce, & fiat decoctio. In colatura dissolve sac-
chari quantum satis est: & fiat syrupus. Addantur
syrupi rosarum laxativi ℥iv. * Bilem & melan-
choliâ purgat. *Rondeletius.*

Syrupus de Polypodio fortis.

℞. Polypodii recentis T̄b j.
Corticum Ellebori nigri præparatorum ℥j.
Foliorum senæ T̄b j.
Epithymi,

A Radicum Buglossæ.
Flor. Borraginis, Stœchados,
Passularum, Prunorum ana ℥j.
Liquiritiæ rasæ,
Sem. Foeniculi,
Turbit. Agarici ana ℥j.
Fumariæ, Mellillæ, Betonicæ ana Mj.
Cinnamomi, Nucis myristicæ ana ℥j.
Crocij ℥j.

Fiat decoctio ex aqua: macerentur horis duode-

B cim: colaturæ adde
Succi Fumariæ T̄b x.
Lupulorum, Betonicæ ana T̄b j.
Pomorum T̄b j.
Sacchari optimi quod satis sit.

Fiat syrupus: hic valide Melancholiâ purgat, &
sumantur ℥iv. bis aut ter in mense. *Heurnius.*

Syrupus de Elleboro.

℞. Ellebori nigri ℥j.
Succi pomorum dulcium ℥x.
C Radicum Buglossæ, Borraginis, Polypodii,
Epithymi ana ℥j.
Folliculorum & foliorum Senæ,
Chamæpityos, Stœchados ana ℥vj.
Flor. Borraginis, Buglossæ,
Fumariæ, Lupulorum ana P. j.
Capillorum Veneris, Agrimonie,
Chamædryos ana Mj.
Schoenanthi ℥j.

Fiat decoctio ad libras duas: huic decoctio adde

D Succi pomorum,
Sacchari albi ana T̄b ij.

Fiat syrupus. Dosis est quantitas duarum uncia-
rum. *Heurnius.*

*Oxymel elleboratum majus Juliani, purgans
phlegma & melancholiam.*

℞. Rutæ, Thymi, Dictamni Cretici, Hysso,
Pulegii, Marrubii, Cardui benedicti,
Spicæ Celt. cort. sambuci interior. ana Mj.
Calami montani Pj.
Sem. Anisi, Ocymi, urticæ Rom. anethi ana ℥ij.
Rad. angelicæ, althææ, aris, scillæ,
Aristolochiæ longæ, rotundæ, Clematitidis,
Turbit. ana ℥j.
Iridis nostræ, Costi, Polypodii ana ℥j.
Ellebori nigri, Esulæ,
Cort. rad. Ellebori albi,
Agarici ana ℥ij.

F Omnia trita infunde in aceti acerrimi T̄b vj. vel
quantum sufficit: tritum in Sole, vel ad fornacem,
in vitreo vase obturato. Tum decoquantur in ol-
la vitreata ad dimidium ferè, tum colabis modi-
cè exprimendo, addesq; mellis despumati, sac-
chari ana T̄b j. ad consumptionem aceti deco-
ques ad syrupi consistentiam. Dosis, ad moven-
dam alvum, ab ℥j. usq; ad ℥vj. cum decoctio-
ne senæ & polypodii, vel syrupo violato, aliòve
solutivo. * Conferit Epilepsia, asthmata & om-
nibus morbis, à materia frigida, crassa, tena-
ci, à phlegmate & melancholia dependente.
Gesnerus.

Oxymel elleboratum, minus.

R. Calamenchii, Thymi, Pulegii, Cardui benedicti,
Rosarum rubr. Menthae crispae ana P.j.
Sem. anisi, Ocymi, sem. Urticae Romanae,
Sem. Anethi ana ʒj.
Rad. Angel. rad. Foeniculi, Althaeae, Scillae,
Iris nostrae, Turbith ana ʒʒ.
Ellebori albi, Esulae preparatae ana ʒij.
Rad. Asari ʒjʒ.
Galanga, Cinnamomi,
Calami aromatici ana ʒj.

Infunde in aceti fortissimi Tʒijʒ. ut praedictum est, & cum media pars bulliendo fuerit absumpta, adde Sacchari, Mellis despumati ana ʒv.
Fiat Syrupus, qui aromatizetur, cum Croci, Cinnamomi, Macis, Zingiberis ana ʒj. in facculo intus suspensis. Dosis ac vires, ut in majore. *Gesnerus.*

Oxymel compositum Gesneri, valide Melancholiam purgans.

R. Epithymi ʒx.
Polypodii ʒvj.
Buglossi ʒxy.
Thymi, Hyssopi, Chamepityos ana ʒʒ.
Capillorum Veneris ʒv.
Turbith ʒvj.
Ocymi, Mellis, Caryophyllorum, Spicenardi, Malgathri, Cardamomi ana ʒij.
Radici & semini Endiviae,
Seminis cassuthae ana ʒxij.
Conservae rosatae ad pondus omnium.

Infunde haec in aceto puro, horis 24. (sit copia aceti, qua obruantur cuncta) postmodum adde aquae libras quinque; leniter excoquantur, dum redeat ad aceti primam copiam: fiat colatura, & adjecto saccharo coquantur. Datur ad uncias duas cum semelle. *Gesnerus*, cujus descriptio epistolae ejus annexa est.

Syrupus ad ascitem.

R. Passularum ʒij.
Pol. Brasicae marinae M.j.
Thymelaeae vel Chamelaeae M.ʒ.
Seminis Hederae, sem. Seseleos ana ʒij.
Fiat decoctio. In libra una dissolve Syrupi Endiviae simplicis Tʒij. vel Syrupi Endiviae comp. Tʒʒ.
Fiat Syrupus aromatizatus cum Cinnamomi ʒij. vel Spicae Celticae ʒj. Loco Syrupi poni possunt species cichorii & herbae capill. atque Syrupus inde confici hoc modo.

Alius ad idem.

R. Rad. Valerianae, rad. Rubiae major. Cyclaminis ana ʒij.
Rad. Apii, Petroselinii ana ʒj.
Endiviae, Scariolae, Capill. Veneris, Agrimoniae ana M.j.
Seminis Hederae ʒj.
Brasicae marinae M.j.
Chamelaeae, Thymelaeae ana ʒj.

A Passularum mundat. ʒiv.
Anisi ʒij.

Fiat decoctio. & in Tʒijʒ. dissolve sacchari quantum satis est, fiatque Syrupus aromat. cum specie Celticae ʒij. vel cinnamomi. Datur ʒiv. per se, si sit medicae coctionis: vel cum aquis endiviae & cichorii, si sit coctus ad perfectionem. *Rondeletius.*

Syrupus ad anasarcam.

Si sit anasarca, praedictis adjungenda erunt medicamenta magis incidentia, attenuantia, & alterantia: ut Enulae camp. rad. Apii, Petroselinii, Rubiae majoris, in majori quantitate: & pituitam purgantia: ut Agaricus, semina Carthami, Senae, Polypodium: aut praedicta medicamenta trahentia aquas, decoquenda in Syrupis ad pituitam purgantiam praescriptis. *Rondeletius.*

Syrupus ad tympanitem.

R. Passularum ʒij.
Sem. Petroselinii, Apii, Seseleos ana ʒij.
Rad. Asari, Valerianae ana ʒʒ.
Menthae, Absinthii, Beronicae ana M.ʒ.
Marrubii M.j.
Mercurialis, Brasicae marinae ana M.ʒ.
Senae Orientalis, seminis Carthami ana ʒvj.
Florum Anthis, Genistae ana P.j.

Fiat decoctio. In Tʒijʒ. dissolve sacchari quantum satis est: fiat Syrupus aromat. cum diagalanga ʒij. vel aromat. ros. ʒj. de alternis diebus. *Rondeletius.*

ANNOTATIO.

D Caterum si hydrops est cum scirrbo lienis, tunc incidentia & splenica adjungimus: ut cori. rad. Cap. parorum, Sambuci, vel Fraxini, Populi, aut Tamarici: ne in aceto macerentur. & decoquantur, ut supra dictum. *Rondeletius.*

DE SYRUPIS PURGANTIBUS MIXTOS HUMORES.

Syrupus Hepaticus ad humores mixtos.

R. Hepaticae nobilis, Acidulae, Cichorii, Dentis leonis, Endiviae, sonchi laevis ana M.j.
Capillorum Veneris, Eupatorii vulgi, Linguae cervinae, Lupulorum, Fumi terrae ana M.ʒ.
(addi potest Cassutha, Alarum, Anisum)
Florum cordi studentium ana P.j.
Rad. aperitivarum,
Fructuum alkekengi ana ʒʒ.
Polypodii quercini recentis ʒj.
Glycyrrhizae rasa ʒvj.
Seminis carthami ʒij.
Semina quatuor frigidorum malorum ana ʒij.
Hordei P.j.
Sem. Endiviae, Cichorii ana ʒjʒ.
Passularum ʒjʒ.
Pruna N.xij.
Myrobalanorum citrinorum & Chebulorum ana ʒʒ.

Coque ex aqua ad tertias, in colati juris sesquialibra, macerentur.

Agarici

Agarici recenter trochiscati ℥j.
 Foliorum Senæ mandatorum à pulvere &
 stipitibus ℥j β.
 Zingiberis, Cinnamomi ana ℥j.
 Iterum expressis adde Sacchari ℥j.
 Syrupi rosati solutori ℥iij.
 Iterum igni reddantur, dū lentescat succus. Datur
 ℥ β. pueris cum aqua hordei, cui cinnamomū in-
 coxit, in ictero & viscerū infarctū ac eorum duri-
 tie provectionibus propinatur ℥j. cum ℥ij. Syrupi
 violati, aut rosati solutori: adjecto liquore iney-
 bi aut Aqua hordei: robustioribus ℥ij. cū ana Sy-
 rupi rosati: quòd si febris implicitus æger non sit,
 cum ℥j. Aquæ cinnamomi sumi poterit. *Hern.*

*Syrupus domesticus sive de spina
 infectoria.*

R. Baccarum fruticis illitis, quem spinam cer-
 vinam vocant, circa finem Septembris, aut Octo-
 bris initio collectarum, quantitatem sufficien-
 tem. Contundantur in pila lapidea, deinde ex-
 primendo colentur. Succus expressus coquatur
 lento igne, donec quarta pars absumatur, atque
 iterum coletur.

R. Hujus colati ℥j.

Mellis despumati ℥xvj.

Coquantur unà, donec syrupi benè cocti consi-
 stentiam acquirat, adjiciendo in fine Mastice
 ℥iij. ℥j. Alii Zingiber, Anisum, Cinnamomum
 addunt eodem pondere. Bacca semicōctas qua-
 tuor diebus in sicili vitreato per se loco calido
 permittito, & efficacior succus reddetur. Cujus
 libras duas, sacchari vel mellis libram unam &
 semis decoquunt ad syrupi consistentiam: demum
 linteolo rariore colato, addunt Cinnamomi,
 Zingiberis ana ℥ β. Caryophyllorum ℥ij. Fiat
 syrupus. Hunc ita Matthiolum in Dioscoridem,
 præparat. * Bilem, pituitam & serosos maxime
 humores purgat: unde ejus usus præcipuus in
 cachexia & hydrope. *Augustani.*

Syrupus solutivus Fioravanti.

R. Salvia, Ruta, Rosmarini, Abinthii, Ci-
 chorii,

Cardui benedicti, Urticæ, Origani ana M.j.

Ficum, Passularum, Dactylorum,

Amygdal. dulc. ana ℥iij.

Salis gemmæ ℥iv.

Colocynthidis, Aloës hepaticæ,

Cinnamomi, Myrob. citrinorum ana ℥ij.

Mellis communis ℥ij.

Aquæ fontanæ ℥xix.

Contundenda contundantur crasse, misceantur,
 & macerentur per noctem: deinde coquantur
 usq; ad medietatis consumptionem: coletur, &
 aromatizetur cum Moschi ℥ β. aquæ ros. ℥j &
 servetur in vase vitreo optimè clauso. Dosis ℥iv.
 usq; ad ℥vj. * Purgat humores crassos. Confert
 febribus, morbo Gallico, podagræ, arthritidi,
 catarrho, tussi, capitis dolori, & omnibus infir-
 mitatibus, ab humoribus corruptis & putridis
 generatis, præsertim si quis eo per
 xv. dies utatur.

Alius solutivus.

R. Fol. Senæ ℥j.

Fumi terræ, Capill. Ven. Scolopendrii, Hepa-
 ticæ,

Epithymi, Polypod. quercini, Flor. borraginis,

Flor. Buglossæ, Glycyrrhizæ rase ana ℥iij.

Colocynthidis, Ellebori nigri,

Aloës hepaticæ, Myrob. Indorum ana ℥j.

Prunorum Damalc. N. xiv.

Sebesten N. xij.

Tamaricis ℥j.

Aquæ fumi terræ ℥x.

Contundenda contundantur, misceantur, & re-
 linquantur in infusione per noctem, deinde co-
 quantur usq; ad tertie partis consumptionem:
 fiatque colatura, cui adde
 Syrupi de storachæ ℥j.

Mellis rosati col. ℥vj.

Croci ℥j.

Servetur in vase vitreo obturato. Dosis ℥ij. usq;

ad ℥iv. * Purgat, & curat morbum Gallicum,

Fioravanti.

Alius in febre Biliosa cum pituita.

R. Endiviæ novæ, Cichorii, Adianthi, Scolo-
 pendriæ ana M.j.

Quatuor seminum frigid. malorum ana ℥iij.

Sem. Carthami ℥j β.

Polypodii quercini ℥ij.

Tamarindorum pinguium ℥j β.

Semin. Endiviæ, Cichorii,

Liquiritiæ rase ana ℥ij.

Passularum mundatarum ℥j β.

Pruna N. xv.

Trium florum cordialium ana P.j.

Fiat coctio ad libram: cui infunde

Foliorum Senæ ℥j β.

Agarici recenter trochiscati ℥j.

In expressione colata dissolve

Syrupi violati & capill. Veneris ana ℥iij.

Sacchari albillimi ℥ij.

Fiat Syrupus coctus lentissimo foco: expressioni

inde Rhabarbari electi ℥vj.

Fiat Serapion perfectè coctum, & aroma illi affle-
 tur, & Cinnamomi ℥j β. & Sandalorum ℥j. Utile

est istud Serapion febribus omnibus, quæ citus

sui principium agnoscunt bilem pituita remix-
 tam. Accipiant binas uncias cum sero lactis, vel

cum aqua aut decocto endiviæ: si segnius alvum

evocari, adjicies diluti Rhabarbari, vel Agarici

drachmam. *Hernius.*

DE SYRUPIS EDUCEN-

tibus urinam.

Oxymel diureticum.

R. Mellis despumati ℥xv.

Aceti, Aquæ ana ℥ij.

Rad. raphani ℥j.

Fœniculi, Apii, Petroselinii, Geniæ,

Asari, Levistici ana ℥iij.

Sem. Fœniculi, Petroselinii, Asparagi,

Rufci ana ℥ij.

Coriandri præparati, Cumini ana ʒ ʒ.
Coquantur secundum artem. Nostris nõ est usui.
* Urinam tamen impeditam, & calculos renum
promovet. *Ambrosius Jung, senior.*

Syrupus diureticus.

℞. Apii, Petroselinii, Fœniculi,
Anisi, Ameos, Dauci, Bauciz,
Pentaphylli Alexandrini ana ʒ iij.
Asparagi, Brusci,
Peucedani, Meui,
Scolopendria,
Capill. Ven. Adianthi,
Polytrichi, Splendilidon,
Capparis,
Tamarici,
Seseleos, Fumerina,
Grana Solis,
Sem. Melonis,
Sem. Citrullorum,
Sem. Cucumeris,
Sem. Cucurbitæ,
Cretami, Saxifragiæ,
Sem. Citri,
Lapide spongiz,
Pul. Cicadarum,
Amomi, Thymi,
Chamæpityos,
Ossium Cerasorum, Pomorum,
Ossium Persicorum,
Cardamomi, Ireos,
Spicæ Nardi,
Caryophyllorum, Costi,
Nucis moschate ana ʒ iij.

A Galangæ, Thymi,
Epithymi, Filipendulæ,
Pimpinellæ,
Ciceris nigri ana ʒ j ʒ.
Aque sacchari q. l.
Fiat tyropus s. artem.

Syrupus compositus aquas ducens.

℞. Radicum Valerianæ,
Quinq; radicum aperitivarum ana ʒ ij.
Endivæ, Cichorii, Adianthi,
B Eupatorii ana M. j.
Seminis Hederae ʒ j.
Brassicæ marinæ M. j.
Foliorum daphnoïdis rectè preparatorum ʒ j ʒ.
Pallularum mundatarum ʒ ij.
Anisi ʒ ʒ.

Fiat decoctio ad Tʒ j ʒ. asperge sacchari quan-
tum opus erit ut fiat syrupus: aromatizetur Spi-
cæ Celnicæ ʒ iij. vel Cinnamomi ʒ ʒ. Propinan-
tur ʒ iij. hujus syrupi. Pauperes coquant succum
C Caccarum nigrarum sambuci cum saccharo, ut fiat
syrupus: & in fine coctionis adiciant aliquid
Cinnamomi, Zingiberis, vel nucis myristicæ: su-
mant duo vel tria co. hlearia ex decocto gratio-
læ, anisi & caryophyllorum. *Heurnius.*

Syrupus ad calculum.

℞. Succo fol. & flor. Anthemidis, Mellis colati
ana q. l.
Misce, & coquantur usque ad syrupi consisten-
D tiam. Dosis cochlearium unum, in introitu bal-
nei aque dulcis stomacho vacuo. *Regina Maria,
Caroli V. soror.*

DE JULAPIIS, Sectio III.

De Julapio rosaceo.

℞. Aquæ Rosarum Tʒ iv.
Sacchari clarificati Tʒ ij vel iv.
Fiat Julapium cum diligentia secundum artem.
* Febrium, thoracis, & ventriculi incendium, ca-
loremque flammæum extinguit, sitim inexple-
tam sedat.

Julapium violarum.

℞. Aquæ violarum Tʒ iv.
Sacchari clarificati Tʒ ij. vel iv.
Coque ad Julapii consistentiam. * Febres, phle-
gmonas, pleuritidem, asperitatem gutturis & tho-
racis, ac tussim mitigat.

Julapium oxalidis.

Julapium oxalidis fit ter coquendo herbam
acetosæ reiteratam seu renovatam ex aqua mo-
dica, quantum pro tegenda seu mergenda herba
sufficit: & postea decoque ad consistentiam, cum
æquali portione sacchari. Hoc album permanet,
& est jucundum & utile: siquidem sub æstivis
fervoribus aqua vel simplici vel distillata pro
libitu diluitur, grateq; bibitur. *Colomienſis.*

*Julepus in calore flagrante Itali
usitatus.*

E ℞. Aquæ limpidissimæ,
Sacchari optimi ana.
Quæque libra Aquæ accipiat Albumen ovire-
centissimum, vehementerq; quantantur: hinc affun-
de saccharum: lentoq; igne coquantur, ut tota
spuma abiciatur. Deinde bis terve per filtrum
trajiciatur: hinc iterum coquantur dum cerevisiæ
Gedanæ crassitudinem referat. Aqua autem hæc
primò accipit vim Rosarum ex frequenti infu-
sione, vel quarumcunque herbarum vim bibit.
Ad ʒ ij. hujus Julepi, remiscet aquæ limpidissi-
mæ ʒ iv. poterit etiam ex aquis componi, ut
aquæ buglossi & sacchari libra, eoque dum spu-
mant & sandali lutei drachma imbuatur. *Heurn.*

Aliud.

℞. Aquæ rosarum Tʒ j ʒ.
Sacchari Tʒ j.
Ovi albo perpurgetur & ad formam Julepi co-
quatur. Accipe hujus ʒ j. Aquæ optimæ ʒ iv.
Misce: gratissimum in febribus, & sitim restin-
guit, quo Franciscus Rex Galliz utebatur. *Idem.*

Aliud.