

DE OPIATIS, Sectio XXII.

Athanasia major.

R. Croci, Myrrhae,
Opii, Castorii,
Sem. Julquami albi,
Costi, Cardamomi,
Sem. Papaveris nigri,
Spicae nardi, Eupatorii,
Hepatis Lupi,
Cornu dextri Caprae vel Cervi ana partes æ-
quales.

Terenda terantur, & alia in vino liquefiant. Ex-
cipe omnia Melle despumato, & post sex men-
ses utere cum vino dulci & grato, aut cum sapa
& succo Incybi & Apii. Servantur annis tribus.
* Obstructionem hepatis & lienis liberat, do-
lorem sedat tum ventriculi, tum renum, hæmor-
rhoidum, &c. thoracem pulmonesq; expurgat,
ob id asthma & veterem tussim juvat, hæmor-
rhagiam, diarrhoeam, lienteriam antiquam, dy-
senteriam cohibet. *Mejues.*

Athanasia alia.

R. Cinnamomi, Cassiæ lignæ ana ʒ ij. G. vij.
Croci, Schemanthi, Styracis calamitæ,
Phu, Scf. h. sem. Hyoscyami, Betonicæ,
Sem. Apii, sem. Dauici, Anisi,
Opii ana ʒ j. G. iij.
Nardi Indicæ, Folii, Castorii,
Myrrhæ, Lapidis hæmatitis,
Carabæ, sanguinis Draconis,
Coralli rubri, Costi, Sili Armeni,
Mumie, Consolidæ majoris,
Terræ sigillatæ, Acori, Asari,
Cort. rad. Mandragoræ, Polii montani,
Pulegii, Baccarum Lauri,
Meu, Piperis albi longi,
Sem. Petroseliniani ana ʒ ʒ.
Mellis quantum sufficit.

Confice ut artis est, & serva in vase siccili vitrea-
to ad annos tres. * Dysenteria laborantibus &
coeliacis confert, atq; ad fluxum muliebre m-
utilis est. Facit ad profluvium sanguinis narium,
& eos, qui cibum non retinent in ventriculo.
Sanguinis præterea à quacunq; causâ natis re-
jectionibus auxiliatur. *Nicolaus.*

*Philonis Tharcensis antidotus, simulis ei,
quem Mejues describit.*

R. Croci ʒ v.
Pyrethri, Euphorbii,
Nardi Indicæ ana ʒ j.
Piperis albi, sem. Hyoscyami ana ʒ xx.
Opii ʒ x.
Mellis quantum sufficit.

Confice secundum artem. * Expertissima ad sed-
dandos vehementes & lethales partium dolo-
res, ventriculi, coli, hypochondriorum, hepatis,
lienis, renum, uteri, excitatos à crudis humori-
bus, aut flatu crasso, aut amborum causâ intem-

A perie frigida: valet etiam ad suffocationis peri-
culum, singultum vehementem, & urinæ diffi-
cultatem. *Galenus.*

Philonium Hamech.

R. Melanthii, Castorei, Piperis,
Ameos, Baccarum Lauri, Cymini,
Fol. Rutæ, Calaminthes, Opii,
Hyoscyami, Cort. rad. Mandragoræ ana par-
tes æquales.

B Excipe Melle. Datur à ʒ ij. ad aur. ij. * Ad eadem
valet, ut præcedens.

Philonium majus, sive Romanum.

R. Piperis albi,
Sem. Hyoscyami albiana ʒ v.
Opii ʒ ij. ʒ.
Cassie veræ ʒ j. ʒ.
Sem. Apii ʒ j.
Sem. Petroseliniani, sem. Fœniculi,
Sem. Dauici ana ʒ ij. G. v.

C Croci ʒ ʒ.
Nardi Indicæ, Pyrethri, Zedoariæ ana G. xv.
Cinnamomi ʒ j. ʒ.
Euphorbii, Costi ana ʒ j.
Mellis despumati quantum sufficit.
Confice ut artis est. * Idem quod præcedens
potest. *Nicolaus.*

Philonium Persicum.

R. Piperis albi, Hyoscyami ana ʒ xx.
D Opii, Terræ Lemniæ ana ʒ x.
Lapidis hæmatitis, Croci ana ʒ v.
Castorii, Nardi Indicæ,
Euphorbii, Pyrethri,
Margantarum, Carabæ,
Doronici, Zedoariæ,
Trochisc. Ranich ana ʒ j.
Caphuræ ʒ j.
Mellis quantum sufficit.

E Confice. * Ad sanguinem undecunque manan-
tem confert: quo propter menses immodicè e-
rumpentes, hæmorrhoidas, & cruentas excre-
tiones per inferna, itemque sanguinis ipsum
compellit, ac factum in utero retinet. *Mejues.*

Paulina.

R. Cinnamomi, Costi, Galbani, Castorii,
Opii, Piperis longi, nigri,
Styracis ana ʒ j.
Mellis quantum sufficit.

F Tunduntur quæ tundenda sunt, & cribrantur
per angustissimum cribrum: Galbanum in Melle
dissolvitur, & factum electuarium in consistenti
forma reponitur in pyxidem vitream aut argen-
team. * Facit hæmoptoicis, tussientibus, pathi-
ficis, peripneumoniacis, ad convulsâ, ruptâ, sto-
machi subversionem, bilem vomentes ac tacer-
nentes, coeliacos, dysentericos, ad affectiones
circa vesicam, suffocationes uteri, febres per cir-
cuitum repetentes, hora una ante exacerbatio-
nem

nem exhibita: facit in malum habitum delapsis. A cibum non sentientibus, ac pharmaca lethalia & plagas venenum jaculantium bestiarum. *Galen.*

Tryphera magna.

R. Opii ʒ ij.

Cinnamomi, Caryophyllorum,
Galangæ, Nardi Indicæ,
Zedoariæ, Zingiberis,
Costi, Styracis calamitæ,
Calami aromatici, Calaminthæ,
Rad. Iridis, Peucedani, Acori,
Cort. Mandragoræ, Nardi Celticæ,
Rosarum rubrarum, Piperis,
Anisi, Apii,
Petroselinii, Foeniculi,
Dauci, Hyosciami, Cymini,
Sem. Ocyami ana ʒ j.
Mellis despumati q. s.

Confice ut artis est, & serva ad annos tres. * Auxiliatur dolori stomachi ex frigidityte: sumpta namque statim sudorem provocat, phreniticis, mulieribus ex uteri dolore in omnibus rheumaticis, peripneumoniacis, & qui excrementa cum sanguine excernunt, utilissima est. *Nicolau.*

Requies.

R. Rosarum rubr.

Violarum ana ʒ ij.
Opii, sem. Hyosciami,
Sem. Papaveris albi, nigri,
Cort. Mandragoræ,
Sem. Scariolæ,
Sem. Lactucæ, sem. Portulacæ,
Sem. Pysylli, Nucis moschatae,
Cinnamomi, Zingiberis,
Sacchari ana ʒ j.
Sandali albi, rubri, citrini,
Spodii, Tragacanthæ ana ʒ ij. G. v.
Mellis despumati q. s.

Confice secundum artem. Durat ad decennium. * Ad febres continuas & ardentis, omnemque febrilem affectum, ad febres denique acutas confert. Est autem utilis temporibus & pulsibus manuum inanetis, ac cordis dolorem mitigat, somnumque conciliat. *Nicolau.*

Sotera.

R. Nardi Indicæ, Castorei ana ʒ xxxix.
Myrrhæ ʒ xxvij.
Croci ʒ xxxvij.
Opii, ochreæ nardi ana ʒ xxxvj.
Petroselinii ʒ xiv.
Anisi ʒ ix.
Apii ʒ vij.
Castoræ ʒ xij.
Piperis longi, Amomi,
Seteli ana ʒ xij.
Sisonis ʒ vi.
Styracis, Hedyochroi, Costi,
Alari ana ʒ xix.
Mellis quantum sufficit.

Fiat optata. Servatur ad decennium. *Paulus.*

Musa Enea, sive Zazenea.

R. Castorei, Myrrhæ, Opii,
Piperis nigri, longi, Galbani, Costi,
Cinnamomi, Phu, Meu,
Dauci, Alari, Croci ana ʒ j.
Mellis Hispanici despumati triplum.

Misce. Servatur ad annos decem. * Valer ad omnes passionis frigidas & ventositates crassas, & dolorem dentium, & corrosionem eorum, & ad frigus stomachi, & tarditatem digestionis, & colicam, & difficultatem urinæ, & ad frigus & phlegma, & ad mucositatem urinæ. *Mejus.*

Diabolbanum.

R. Castorei, Opii, Hyosciami ana ʒ iv.
Castoræ lignæ ʒ ij. ʒ ij.
Folii, Croci, Thuris masculi ana ʒ ij.
Rheupontici, Amomi ana ʒ j. ʒ ij.
Myrrhæ ʒ j. ʒ j.
Spicæ Indicæ, Pyrethri,
Euphorbii, Leucopiperis ana ʒ ij. ʒ j.
Pæoniæ, Styracis calamitæ,
Macropiperis ana ʒ j.
Mellis despumati triplex pondus.

Fiat optata. Servatur ad annos tres. * Utile est ad diversas passionis capitis: hemicranicum dolorem placat, & superciliis lachrymas potenter stringit, fauces rheumaticas & arterias lenit, hæmoptoicis & tussientibus medetur, vomitum compescit, dolorem stomachi & nauseam aufert, peripneumoniacis, pleuriticis, empyicis sine dubio subvenit, gonorrhœam & satyrasiam emendat, & menstrualem sanguinem sistit. *Nicolau.*

Aurea Alexandrina.

R. Afari, Carpobalsami,
Sem. Hyosciami albi ana ʒ ij. ʒ j.
Caryophyllorum, Opii Thebaici,
Myrrhæ (Baccarum Myriæ Actuarii)
Cyperi rotundi ana ʒ j.
Opobalsami, seu olei Caryophyllorum,
Cinnamomi, Euphorbii, Folii,
Zedoariæ, Zingiberis, Costi veri,
Coralii, Castoræ lignæ, Tragacanthæ,
Thuris masc. Meu, Styracis calamitæ,
Spicæ Celticæ, Cardamomi minoris,
Sem. Seseleos, sem. Napi,
Sem. Saxifragæ,
Sem. Anethi, Anisi ana ʒ j.
Ligni Aloës, Rhubarbari,
Aliptæ moschatae, Castorei,
Spicæ Indicæ, Galangæ,
Opopanax, Anacardii, Masticis,
Sulphuris vivi, rad. Pæoniæ,
Rad. Eryngii, Rosarum, Thymi,
Acori veri, id est, Calami aromat.
Pulegii, Aristolochiæ longæ, Gentianæ,
Cort. rad. Mandragoræ, Chamædryos,
Rad. Phu, Baccarum Lauri,
Ammeos, Dauci Cretici,
Macropiperis, Leucopiperis,
Xylobalsami, Carvi, Amomi,
Petroselinii, sem. Ligustici,

D 5

Seminis Rutæ,
Seminis Sinonis ana ʒ ss.
Auri fingeri,
Argenti meri,
Margaritarum albarum,
Blattæ Byzantiæ,
Oſſium de corde Cervi ana ʒ j. G. xiiij.
Limaturæ Eboris,
Calami aromatiæ,
Pyrethri ana ʒ iij.
Mellis deſpumati triplum.

Fiat optata. Servatur annis quinque. * Contra defluxiones capitis, frigore conceptas, efficaciſt: oculorum lachrymas extirpat, dentium dolores lenit, adverſus capitis cruciatum ſummopere prodeſt, illitum fronti, comitales, inſanos, vertiginofos, & in univerſum omnem capitis noxam mulcet, tabidis, tuſſiculofis, humorem à thorace rejicientibus, cardiacis, ſanguinem excreantibus præſenti eſt auxilio, iſchiadicis, coli & renum cruciatibus. Adverſus illorum noxam, difficultatem urinæ, & ejuſdem ſtillicidium valet, calculos comminuit, omni ventris malo liberat, quotidianis & tertianis febribus circa acceſſionis initium, ſub ſerveſcæto Stœchadis juſculo medetur. *Nicolaus.*

Theriaca Andromachi ſenioris.

ʒ. Trochiſcorum ſcilliticorum ʒ xliix.
Trochiſcorum Theriacorum,
Hedychrof,
Piperis longi,
Opii ana ʒ xxiv.
Roſarum rubrarum purgatarum,
Indis Illyriæ,
Succi Glycyrrhizæ,
Seminis Napi ſylveſtris,
Scordii,
Opoballami,
Cinnamomi,
Agarici ana ʒ xij.
Myrrhæ,
Coſti,
Croci,
Caſſiæ lignæ veræ,
Nardi Indicæ,
Schoenanthi,
Thuris electi,
Piperis nigri, albi,
Dictamni Cretici,
Comarum Marrubii,
Rhapontici,
Stœchadis,
Seminis Petroſelini,
Calamithæ montanæ,
Terebinthinæ,
Zingiberis,
Rad. Quinquæfolii ana ʒ vj.
Poli montani,
Chamaepyrros,
Styracis calamitæ,
Meu, Amomi,

A Nardi Celvicæ,
Terræ Lemniæ,
Phu, Chamædryos,
Foli, Chalcedidis toſtæ,
Gentianæ,
Aniſi torrefacti,
Succi Hypocitidis,
Catpoballami,
Gummi Arabici ſplendidi,
Seminis Fœniculi,
Cardamomi,
Sefeli, Acaciæ,
Thlaſpi, Hyperici,
Ammi, Sagapeni,
Acori ana ʒ iv.
Caſtorii,
Aritolochiæ tenuis,
Seminis Dauci Cretici (Pimpinellæ noſtræ)
Bituminis Judaici,
Opopanacis,
Centaurii minoris,
Galbani ana ʒ ij.
Mellis deſpumati lb xiv. ʒ v. ʒ ij.
Vini opiani q. l. eſt.

Galenus ætate plus aromatum admixebant ad ſingulas libras Mellis, & medicamentum ſolidius erat, quàm nunc fit. Jam enim ſumunt Mellis lb xx. Conſtititur autem hoc modo ſecundum Galenum.

Herbæ, flores, fructus, ſemina, radices, cortices, trochiſci, terra Lemniæ, chalcidicæ, & bitumen diligentiffimè conteruntur pilillo ferreo in mortario æneo, & cribro lubriſſimo cibrantur, ſemine Thlaſpi, Napi ſylveſtris, & Croco exceptis, quæ per ſe teruntur, vinoque rigantur, ne mortario interiori inhereant, & ut continuo diuſ terantur, Gummi, ſucci, & Caſtorium per ſe teruntur, aduſo vino, ut etiam commodius teri poſſint. In ipſo compoſiti omniſ tempore comminuntur; rerum inmixtura, primum liquet Terebinthina in duplici vaſe cum Mellis pauxillo, deinde etiam Opopanax, Galbanum, Sagapenum, bene antea per ſe trita, aduſo pauculo Mellis, ut facilius uigitiſ explanentur, commiſceanturque, atque uniantur. Poſtea coquantur in ipſo duplici vaſe cum Terebinthina, donec ad juſtam conſiſtentiam redacta ſint: hiſ admixceatur pars aliqua contritorum, tum etiam in vino diſſolutorum, donec Mellis conſiſtentiam conſequantur: deinde in mortarium vaſte magnitudinis effundantur in hęc modum. Primum, pars aliqua eorum, quæ vino diſſoluta ſunt, & ad eam formam redacta: deinde mellis nonnihil cocti per ſe, & deſpumati: poſtremo, pars aliqua eorum, quæ in pulverem redacta fuerant: ad hæc nonnihil eorum, quæ liquefacta in duplici vaſe, eaque tepida: hæc omnia probe agitentur rudicula, & ſic conſequenter de reſiduo faciendum, donec omnia probe unita ſint: & hæc quidem ad Solem, ut facilius fiat, continuo agitando, & tundendo pila ferrea, inuncta Opoballamo, ut facilius agitari poſſint: & commiſceatur etiam Opobal-

Opobalsamum reliquis: alioqui facile adhaeret
pistillo medicamentum, & difficilior fiet agitatio.
Hæc continue per quatuor aut quinque dies
agitanda sunt: & rursus elapsis sex aut septem die-
bus iteranda agitatio per duos menses: deinde
reponitur medicamentum vasculis plumbeis, aut
terreis bene coactis & vitratis: & servatur per an-
nos triginta.

Chalcitis, quæ in hoc medicamen venit, sic
preparanda est. Illius bona quantitas in olla
cruda, succensis carbonibus coquitur: eaque li-
quefacta, ubi bullas emisit, partem supernam
in marmor effundes, atque illic fines in umbra,
donec frigeat. Hinc postea solummodo capies
quod superne spumeum fuerit, quodque cinere
est coloris, aut præsili, non quod flavum est:
theriacam enim colore flavo, non nigro, infice-
ret. * Exitialibus venenis, & ferarum virus eja-
ciantium ictibus adversatur. In veteris capi-
tis doloribus, vertigini, aurium gravitati, comi-
tialibus, atonitis, apoplecticis, resolutis, oculo-
rum hebetudini, vocamissa, asthmaticis, re-
centi & vetusta tussi, sanguinem rejicientibus,
agrè excreantibus, & non nisi recta cervice spi-
raantibus, ventriculi imbecillitatibus ac inflatio-
nibus, colicis cruciatibus, cholericis, cœliacis,
regio morbo correptis opitulatur: indura-
tum lienem liquefacit, calculos in renibus com-
minuit, urinæ difficultati, & vesicæ exulceratio-
nibus medetur. Febrim horribis & rigori-
bus, hydropicis, elephantia laborantibus sæpè
presenti est auxilio. Menstrua citè, sextam mor-
tuum excutit, articulorum doloribus adjuvamento
est. Non autem corpus modo, sed & animi mor-
bos perlanat. Melancholicis itaque, lymphaticis
aque pavorebus & id genus aliis malis jugiter da-
ta succurrit. Cæterum in pestifera lue vix aliud
presentius, magis idoneum praesidium hæc ipsa
inveniri potest. *Galenus.*

*Theriaca Andromachi, à Medicis Roma-
nis & Bononiensibus correctæ,
& preparata.*

R. Trochiscorum Scilliticorum ℥vj.
Trochisc. de Vipercis,
Trochisc. Hedychroci,
Piperis nigri ana ℥ijj.
Trochisc. de Caphura. Opii,
Succi infusionis Rosarum inspissati,
Scordii Cretici, & nostri, F
Seminis Napsivivestris,
Iridis Florentinæ,
Succi Glycyrrhizæ,
Agarici,
Cinnamomi,
Foliorum Cardui benedicti,
Balsami Indici,
Croci Orientalis ana ℥ß,
Myrrha, Zingiberis,
Rhapontici veri,
Rad. Pentaphylli,

Radici Tormentillæ,
Calaminthæ montanæ,
Comarum Marrubii,
Stoechados,
Radici Costi,
Zedoariz,
Piperis albi,
Piperis longi,
Dictamni Cretici,
Thuris masculi,
Seminis Perrochelini Macedonici, vel Smyrni,
Flor. Schœnanthos,
Mysobalanorum Emblicorum, vel Cæbulæ-
rum,
Terebinthinæ Cypriz,
Calliæ liguzæ,
Spicæ Indicæ ana ℥vj.
Gentianæ,
Comæ Polii montani,
Styracis calamitæ,
Sileris montani,
Abrotani,
Seminis Thlaspios, seu
Iberidis, seu
Nasturtii albi,
Seminis Ammias,
Chamædyos,
Succi Hypocistidis,
Succi Lentisci,
Foliorum Malabathri, seu Macis,
Nardi Celticæ, seu
Spicæ Romanæ,
Seminis Anisi,
Seminis Fœniculi,
Radici Meui, vel
Imperatorizæ,
Terræ Lemniæ veræ,
Chalcitidis semiastræ,
Amomi, vel
Caryophyllorum, vel
Calami odorati,
Radici Phu minoris,
Carpobalsami, seu
Granorum Juniperi,
Cubebarum,
Comarum Hyperici,
Acaciæ, vel
Succi Lentisci,
Gummi Arabici, vel Juniperi,
Cardamomi majoris (minus melius)
Radici Angelicæ optimæ,
Rad. Imperatorizæ,
Rad. Vincetoxicæ,
Rad. Aristolochiæ rotundæ,
Rad. Alati, rad. Succisæ,
Rad. Serpentariæ,
Rad. Diptamni albi,
Rosmarini, Salviæ minoris,
Scabiosæ,
Cornu Cervi ussi,
Enulæ campanæ,
Pimpinellæ, Origani Cretici ana ℥ß.

Seminis Dauici Cretici, vel
Seminis Pimpinellæ,
Galbani, Opopanacis,
Sagapeni, Asphalti, vel
Succini albi,
Rad. Cruciatæ,
Castorei, Aristolochiæ longæ,
Baccarum Lauri ana ʒ ij.
Mellis duplum,
Vini Cretici quantum satis est.
Conficiatur secundum artem. *Angustani.*

*Theriaca Andromachi, à Bartholomæo
Maranta correctæ.*

I. ORDO.

R. Trochisc. de Scilla recent. & non situ ob-
ductorum ʒ xlviij. id est, ʒ vj.

II. ORDO.

R. 1. Trochisc. Viperinorum recent. & non
mucidorum.
2. Trochisc. Hedychroi benè exicatorum.
3. Piperis longi, non exesi, neq; adulterati, in-
tegrî, bono odore, & acutissimo sapore præditi
ana ʒ xxiv. id est, ʒ iij.
4. Opii collecti instar lachrymæ, & non per
expressionem aut decoctionem facti, quod grave
sit, densum, amarum, purum, & facile dissolvatur,
ʒ xxiv. id est, ʒ iij.

III. ORDO.

R. 1. Rosarum rubr. quinq; frondium, depu-
ratarum, non situ equalidarum.
2. Rad. Iridis Illyricæ, sive Florentinæ, quæ
dura sit, densa, acuti gustus, brevis, non exesa, non
situ corrupta.
3. Succî Glycyrrhiæ non adulterati.
4. Sem. Buniadis: aut de Rapo recentî & ma-
turo, acuti gustus.
5. Scordii, id est, frondium, florum, & simul
feminum, in secco loco collecti.
6. Opobalsami. Ipsius loco olei Nucis mo-
schatæ per expressionem.
7. Cinnamomi electi. Ejus loco Cassiæ du-
plex pondus.
8. Agarici boni, friabilis, levis, rari, & feminæ
ana ʒ xij. id est, ʒ j β.

IV. ORDO.

R. 1. Myrrhæ succolentæ, pinguis & bonæ,
saporis amari, acris, boni odoris, caloris splendidi
& pallidi, quæ fracta interiùs habet venas quas-
dam albas, instar unguium.
2. Costi. Ejus loco Zedoariæ.
3. Croci Orient. recent. colorati, longi, inte-
gri, non fragilis, pleni, quod habeat in suis fila-
mentis non nihil albicantis, & quod madefactum
benè tingat manus, non situm oleat, neq; sit hu-
midum, & non nihil acutum.

A 4. Cassiæ subtilis, & benè contortæ, habentis
plures quàm unam cannulam, levis, non aspera,
aromaticæ, modicæ astrictionis, saporis acutif-
simi.

5. Nardi Indicæ, saporis & odoris nõ expertis.

6. Schœnanthi, id est, florum ejus, & summi-
tar. Junci odorati.

7. Thuris nitidi, rotundi, integri, albi, intus
pinguis, non adulterati.

8. Distamni Cretensis, id est, frondium ejus
B recentium odorat.

9. Rhapontici, id est, rad. recent. non exesa-
rum, gustu non mucilaginosarum.

10. Stechadis recentis, odoratæ, amaræ, id est,
frondium sive spicarum ejus, cum floribus & ra-
musculis.

11. Marrubii recentis, id est, foliorum cum se-
minibus.

12. Sem. Petroselinî veri, recentium, odorat,
amar. & acrum.

C 13. Calamenthi collecti in montibus, id est,
foliorum cum floribus & seminibus.

14. Terebinthiæ veræ.

15. Zingiberis, id est, rad. albarum, non exesa-
rum, bono odore, & acerrimo sapore præditarum
ana ʒ vj.

V. ORDO.

R. 1. Quinquefolii, id est, radicem collecta-
rum in locis siccioribus.

2. Poli, id est, sua coma cum floribus, semi-
nibus & foliis, odoris validi, & collecti de mon-
tibus.

3. Chamæpityos florentis: universa plan-
ta, excepta radice & lignosa ejus parte.

4. Nardi Celticæ, id est, radicem recent. odo-
rat. radicibus crebris, duris & plenis.

5. Amomi. Ejus loco Galangæ majoris.

6. Stryacis, id est, gummi, & non fursura-
cum ejus, pinguis, resinosa, albicantis, odoratif-
simæ.

7. Mei, id est, radicem collectarum in mon-
tibus siccis, odorat. non exesarum, in umbra sicca-
tarum.

8. Chamædryos, id est, frondium, florum, &
feminum cum ramis teneris, odorat. & ex mon-
tibus siccioribus.

9. Phu Pontici & Calabrinî, id est, rad. solida-
rum, non exesarum, odoratarum. Vulgaris verò
Valeriana non debet illius loco accipi.

F 10. Terræ Lemniæ. Ejus loco Bolus Armena,
vulgò Orientalis dicta: coloris ruffi, aut Terra
Melitensis: aut Bolus verus.

11. Malabathri. Ejus loco Nardus, & tertia il-
lius insuper pars.

12. Chalchitidis semiustæ, quadam peculiari
arte.

13. Gentianæ, id est, radicis plene, dense, ama-
rissimæ, de siccioribus montibus collectæ.

14. Gummi, id est, Arabici, puri & pellacidi.

15. Succî Hypocistidis veri, non mixti aliis re-
bus & arte extracti.

16. Carobalfami. Ejus loco vulgares Cube-
bae, quae adhuc in siliquis reperiuntur.

17. Anisi, id est, seminis recentis, pleni, æqua-
lis, odorati, acris gustum, & dulcissimi.

18. Seseleos veri, id est, seminis, colore nigri-
cantis, quod Venetis apportatur.

19. Cardamomi minoris, aut medii, id est, se-
minum ipsius recentium, odoratorum, & saporis
acris.

20. Fœniculi, id est, seminis æqualis, pleni,
odorati, acris gustu.

21. Acacix, illius succus. Et ejus loco succus
Sumach.

22. Thlaspi, id est, seminis veri, recentis, acris
sapore præditi, & amari.

23. Hyperici, id est, virgulta tenera cum flo-
ribus frondibus, & seminibus.

24. Ammi, id est, seminis ipsius, Apio finis,
odorati, recentis, non pulverulenti, & quod Ori-
ganum non parum referat ana ʒʒ.

VI. ORDO.

R. 1. Sagapenti, id est, succi vulgò Serapinum
dicti, non adulterati, duri, granula minutis con-
stantis, colore Myrrhæ, saporis acris, fortis ruffe-
scentis, interius candidi.

2. Castorii non falsi, resinosi, gravis odoris,
acris saporis, fragilis.

3. Aristolochix tenuis, aut, ut ita dicam, sar-
mentosæ, siccatæ ad umbram, non mucore cor-
ruptæ, sed recentis.

4. Bituminis Judaici, non adulterati, in nigro
purpurascens.

5. Dauci, id est, seminis recentis, odore suavi
præditi, veri.

6. Opopanacis, id est, succi non adulterati,
pinguis, lavigati, fragilibus, gravis odoris, ama-
rissimi, & qui in aqua faciliè dissolvatur.

7. Centaurii minoris, id est, ymarum flore-
scentium, cum frondibus & stipibus veri.

8. Galbani, id est, succi puri, granulosi, odo-
ris ingrati, sicuti & saporis: non lignosi, in se con-
tinentis adhuc semina aliquot ex sua ferula, qui
non liquefiat, nisi ad ignem, debetque bene pur-
gari ana ʒ ij.

9. Vini veteris, vinosi, dulcis, non austeri, non
fumosi, non corruptioni obnoxii, coloris flavi,
lucidi, transparentis, non crassi aut turbidi, odo-
re aromati, præditi: quale est Malvatici veteris
non adulteratum, ʒ xl. id est, sextar. ij. vel quan-
tum satis est ad dissolvenda simplicia humida, F
qualia sunt gummi, liquores & lacrymæ.

10. Mellis dulcissimi, acerrimi, nullo externo
sapore constantis, coloris flavi, relucens, & pu-
ri, odorati, mediocriter crassitie, uniformis, æqua-
lis, tenacis, & quod filum ducat instar visci, aut
lini, gravis, firmi, collesti tempore verno: confec-
ti ab Apibus in loco Thymis frequentibus, Ros-
marino & albis aromaticis, & calidis & siccis her-
bis confito: expressi de favis semel tantum: non
resinosi: quod sit duorum annorum, neque re-
centius, aut antiquius: quale est Sipontinum, aut

A Tarentinum. Sumantur autem hujus T. x. vel
quantum satis est ad incorporanda ucca.

Theriaca ex Lilio Pauli, ab Armeno composita.

R. Piperis albi.

Sem. Hyoscyami albi ana ʒ xx.

Opii ʒ x.

Croci ʒ ʒ.

Euphorbii, Amomi, Pyrethri,

Castorei, fol. Dauci, sem. Ruta sylv.

Rosarium rub. siccat. Serapini,

Rhabarbari, Costi, Styracis calamitæ,

Myrrhæ rubæ, Anisi, Carvi,

Cassix lignæ, Mentastri, Cardamomi,

Baccarum Lauri ana ʒ j.

Spicæ nardi, sem. Apii, Balsami,

Olei Rosacei, Cyperi ana ʒ ij.

Mellis despumati quasi T. ij.

Incorporantur, & referuntur. * Ab antiquis re-
perta, ceteris theriacis præstantior ad morbus vi-
perarum, & poriones venenosas, & mortuæ,
Confert illis, hepatis dolori, & pleuriticis, cum
Hydromelle: splenicis cum Oxymelle: stom-
achicis cum Aceto: nephriticis, calculosis cum a-
qua calida, guttatum in mgenitibus, ictericis & hy-
dropicis. Expellit fetum unam cum decoct. Fœ-
nigræ, & prodest omnibus doloribus matricis.
Denti corroso imposta confert, & ad plura alia.

Theriaca communis.

D R. Rad. Enulæ ʒ xv.
Rad. Aristolochix rotundæ ʒ x.
Granorum Juniperi, Zedoariæ, Scordii,
Chamaedrys, Chamaepityos ana ʒ ʒ.
Aristolochix longæ, comarum Hyperici,
Scabiosæ, sem. Ruta, Sarynæ ana ʒ ij.
Betonice, Salviæ domesticæ, Prælii,
Spicæ Romanae, baccarum Lauri,
Gentianæ, Diptamni albi, Tormentillæ,
Calami aromatici ana ʒ ij.
E Rad. Meui, Phu, rad. Pimpinellæ,
Sem. Ammi, sem. Carvi, Macis,
Sandali rubei, Succini curini,
Flor. Melissæ, Menthæ, Rubæ ana ʒ j.
Castorei, Absinthii, Calamentii montani,
Zingiberis, Piperis nigri ana ʒ ʒ.
Nucum juglandium N. x.
Olei Terebinthinæ ʒ j.
Oxymellis scilicet ʒ iv.
Mellis despumati triplum.

Hæc quoque Theriaca nobis usui est & paratu
facilis, non tamen minus efficax in constitutio-
ne pestilenti, cujus usus est plebeis maxime, ut
minus preciosa. Pro oleo Terebinthinæ sumpsi
mediocritatem, id est, unicam semis, & addidi ran-
tundem olei è bacis Juniperi, & suavius fit me-
dicamentum. *Augustani.*

Mi: bridaetum Andromachi.

R. Glycyrrhizæ ʒ iij. ʒ ʒ.

Opii ʒ iv. ʒ j.

Folij, Nardi Celticæ, sem. Fœniculi,

Gentianæ, Meu, R ofarum siccarum,
 Cardamomi ana ʒ iv.
 Castori, Thuris, Myrrhæ,
 Succo Hypocistidis ana ʒ vj.
 Polii, Costi, Sefeli, Casiæ ana ʒ v. ʒ j.
 Nardi Indicæ, Scordii,
 Cyphi, Schœnanthi,
 Opopanacis, Terebinthinæ ana ʒ vj. ʒ j.
 Aconi, Phu, Hyperici, Acaciz, Gummi,
 Carpobalsami, Sagapeni ana ʒ ij.
 Croci, Cinnamomi,
 Zingiberis ana ʒ vj. ʒ j.
 Stryracis ʒ v. ʒ ij.
 Dauci ʒ vj. ʒ ij. ʒ ij.
 Petroselinii ʒ iv ʒ.
 Piperis longi ʒ ij ʒ.
 Anisi ʒ ij.
 Thlaspi, Opobalsami ana ʒ vj. ʒ ij.
 Galbani ʒ vj.
 Scinci ʒ ij. ʒ j.
 Vini optimi, Mellis despumati q. s. est.

Compono in modum theriacæ. Servatur per annos decem. * Ad eadem, ad quæ theriaca valet, & ad pleraque perniciofa medicamenta & venena est efficacior: in viperæ autem morsu curatione, theriaca inferior. Privatim verò facit ad diurnas ventriculi & thoracis fluxiones, & ad omnes inveteratas in profundo corporis exulcerationes & abscessus. Tabidis, ventrisque inflationibus medetur, appetentiam emendat & restituit, ac bonum corpori colorem conciliat. Calculos conterit, ac urinæ difficultatem sanat: acuit visum eorum, qui illo crebrius utuntur. Mortuum sætum ejicit, & ad muliebria omnis generis mala frigida, atque is quæ non concipiunt, conducit. Item melancholiam non sinit consistere. Omne denique capitis malum, ex frigiditate ortum, dolores aurium, lacrymantes oculos, dentium cruciatus, oris, palati, autumque omnia vitia, emplastri forma imposita, sanat. *Galenus.*

Mithridatium Damocratis.

R. Myrrhæ, Croci, Agarici, Zingiberis,
 Cinnamomi, Nardi Indicæ,
 Thuris electi, Thlaspi ana ʒ x.
 Sefeli, Opobalsami,
 Schœnanthi, Stœchadis,
 Terebinthinæ, Galbani,
 Costi, Piperis longi,
 Castori, succi Hypocistidis, Stryracis,
 Opopanacis, Folii ana ʒ j.
 Casiæ, Polii montani, Piperis albi,
 Scordii, sem. Dauci Cretici, Carpobalsami,
 Cyphi, Bdellii ana ʒ vj.
 Nardi Celticæ, Gummi, sem. Petroselini,
 Opii, Cardamomi,
 Sem. Fœniculi, Gentianæ,
 Rosarum, Dictamni Cretici ana ʒ v.
 Anisi, Aristolochiæ rotundæ,
 Aconi, Phu, Sagapeni ana ʒ ij.
 Meu, Acaciz, Scinci,
 Summitatum Hyperici ana ʒ ij ʒ.

A Vini quantum sufficit.
 Mellis despumati tripulum.
 Confice secundum artem. *Damocrates.*

Mithridatium Damocratis, à Bartholomæo Maranta Venusino correctum.

I. CLASSIS.

- B R. 1. Myrrhæ, id est, lachrymæ suæ recentis, pinguis, succulentæ, venis in interna parte instar unguium albicantibus præditæ.
 2. Croci recentis, colorati, non humidus, aut mucorem habentis, integri, longi, neque fragilis, odoratissimi, acuti saporis, & non exsiccati.
 3. Agarici femine, rari, levis, candidi, friabilis.
 4. Zingiberis radicis, acutissimi saporis, odoratissimi, non exsiccati, albi.
 5. Cinnamomi, vel illius loco duplæ Cassiæ, cujus cortex sit crassus, fistula verò subtilis, optimo odore & sapore prædita.
 6. Spicæ Nardi, id est, ejus radicis odoriferæ, recentis, & quæ seci terram odoratam retineat.
 7. Thuris lucidi, integri, rotundi, albi, pinguis interioris, & non adulterati.
 8. Thlaspi veri, id est, seminis recentis, acutissimi, amari ana ʒ x.

II. CLASSIS.

- D R. 1. Sefeli veri, coloris nigricantis, quod semen Venetis affertur.
 2. Opobalsami, aut illius loco olei Nucis moschatae, factæ per expressionem.
 3. Junci odorati, id est, ejus Cymarum recentium, & odoratissimarum.
 4. Stœchadis recentis, odoratæ, amaræ, & acutæ: sumantur frondes, spicæ cum floribus, & ramisculis.
 5. Costi radicis veræ, aut illius loco Zedoariæ recentis, non exsiccatae, boni odoris.
 6. Galbani, id est, succi ipsius, depurati à granis, odore & sapore ingrato, non lignosi, cui sint commissa aliquot semina, ex propria ferula, neque liquefaciat sine igne, debetque optimè purgari.
 7. Terebinthinæ legitimæ & veræ.
 8. Piperis longi, integri, duri, non exsiccati, acutissimi saporis, boni odoris, non adulterati.
 9. Castorei Pontici, non falsi, gravissimi odoris, saporis acuti, resinosi, fragilis, cujus testiculi ab uno principio exortu sint.
 10. Succo Hypocistidos veri, non misti, vera ratione extracti.
 11. Stryracis gummi, & non surfurum, quod pingue sit, resinosum, albicans, odoratissimum.
 12. Opopanacis, succi non adulterati, pinguis, frangibilis, gravis odoris, levis, amarissimi, qui aqua facile dissolvatur.
 13. Folii Malabathi, vel suo loco radicis, aut stipitem Nardi Celticæ, aut radicis Phu, aut Spicæ Nardi, cū tertua in super ejus parte ana drachmas octo.

III. CLASSIS.

- R. 1. Cassiæ nigrae, cum signis indicatis in theriaca.
2. Polii, id est, suarum cymarum cum floribus, seminibus, & foliis, perfecti odoris, & collecti ex montibus saxosis.
3. Piperis albi, pleni, sine rugis, odorati, & foliis, amarescentis, & aceritimi saporis.
4. Scordii, id est, suarum frondium, florum, & seminum, ex sicca locis desumpti.
5. Seminibus Dauci Cretici, recentis, odorati, & legitimi.
6. Carpobalsami, aut illius loco Cubebæ vulgarium, in siliquis existentium.
7. Cypheos, id est, trochiscorum.
8. Bdellii, recentis, amari, pinguis, pellucidi, instar glutinis taurini, quod facile liquefcit, simileque sit ungui humano, atque accensum spiret gratum odorem, non adulteratum cum gummi. Eo deficiente accipiat Ammoniacum, Thymiana ana ʒ vij.

IV. CLASSIS.

- R. 1. Nardi Celtici purgati, id est, suarum radicum & stipitum recentium, odoratissimarum, quod plures habent radices, duras & plenas.
2. Gummi Arabici, pellucidi, & sine fordibus.
3. Petroselinii, id est, seminum recentium, odoratorum, & acrium: sitque legitimum.
4. Meconii, vel potius Opii collecti, ut lacrymæ solent colligi, non per expressionem facti, vel decoctionem: sitque grave, densum, amarum, purum, & dissolubile.
5. Cardamomi, id est, minoris, vel medii: semina sint recentia, odorata & acris sapore prædita.
6. Sem. Feniculi, æqualium, plenorum, odoratorum, & saporis acris.
7. Gentianæ, id est, radice plena, densa, amarissima, collectæ ex montibus aridis.
8. Frondium rosarum, quæ habeant quinque frondes, purgatarum, non mucidarum.
9. Dictamni Cretici, id est, frondium recentium, odoratarum, non nimis tenerarum ana ʒ v. boni ponderis.

V. CLASSIS.

- R. 1. Anisi, seminis recentis, pleni, æqualis, odorati, puri, acris saporis dulcissimi.
2. Alari, id est, radice recentis, odorati, & foliis.
3. Acori, id est, Galangæ majoris, radice recentis, odoris boni, & acris saporis.
4. Phu, id est, radicum odoratissimarum, non exesarum, & solidarum.
5. Sagapeoi, succi usitati, minutis granulis, duri coloris ut Myrrha, puri, saporis acris, exterius rufescentis, interius albi, non adulterati.
6. Succu Glycyrrhizæ recentis, non falsi ana drachmas tres.

VI. CLASSIS.

- R. 1. Mei Athamantici, id est, radicum colle-

A starum ex montibus siccis, ponderosarum, gratissimi odoris, non cariosarum, & in umbra exicatorum.

2. Acaciæ, id est, ipsius succi: & ipso deficiente succus ex Rhu.
3. Ventrem Scinci veri, caudam rotundam habentis, caput oblongius, cum linea casti coloris per dorsum, aut cum alio signis suo loco enumeratis.
4. Sem. Hyperici, id est, cymarum cum floribus, seminibus & frondibus ana ʒ ij ʒ.
- B Vini quantum satis erit ad omnia liquabalia dissolvenda: sitque vetus, quod diu duraverit, vinosum, dulce, non austerum, neque fumosum, incorruptum, colore flavo, claro, pellucido præditum, non crassum, vel turbidum, odoris aromatici: quale est Malvaticum, non adulteratum. Pondus legitimum est ʒ xx.
- Mellis quantum satis est. Sitque dulcissimum, acutissimum, expertis omnis saporis externi, colore flavo & lucido præditum: odoratum, tenuis formæ, m. diocris crassitie, tenax, æquale, quod instar visci filis demittat, ponderosum, firmum, collectum initio Veris, &c. Quantum ad pondus, accipiuntur Tʒ vij. & eo plus, quanto plus requirunt simplicia duplicata pondere, propter substitutionem aliquam.

Ambrosia Archibii.

- R. Anisi, sem. Apii ana ʒ iv.
- D Myrrhæ, Opopanacis ana ʒ j.
- Cinnamomi, seminis Loti amari, Cassiæ, Spicæ Indicæ ana ʒ ij.
- Croci ʒ ij ʒ.
- Piperis ʒ ʒ.
- Opii ʒ iv.

Mellis despumati quantum satis est.

E Confice secundum artem. * Ad omnes internas affectiones utilis est pota: ad intestinorum tormina quidem ex vini Myrrini, & aquæ quartæ hemina parte: ad hepar autem ex aquæ mullæ hemina dimidia. Item ad vigilias, ophthalmiam, & lateris morbum ex aqua mullâ: ad stomachi demum vitia, ex vini Granatorum cyathis duobus, & aquæ totidem. Galenus.

Esdra antidorus.

- R. Amomi ʒ xij.
- Squinanthi ʒ ix.
- Pyrethri ʒ vj.
- Croci ʒ xxxvj.
- Cinnamomi ʒ vj.
- Myrrhæ troglodyticæ ʒ xij.
- Scyracis calamitæ ʒ xix.
- Petroselinii, sem. Dauci ana ʒ iij.
- Tragacanthæ ʒ vj.
- Succi Hypocistidis ʒ ix.
- Ireos, Abrotami ana ʒ xv.
- Sem. Feniculi ʒ vj.
- Bdellii ʒ ix. Thuris ʒ j.
- Sulphuris vivi ʒ vj.
- Sem. Hyosciami albi ʒ xxvj.
- Cassia lignæ ʒ ix.

Sem. Papaveris ℥ xxx.
 Spicæ nardi ℥ xij.
 Sem. Rutæ, sem. O. ymi ana ʒ j.
 Rhos culinarii ℥ iv.
 Sem. Anethi ℥ xj.
 Asari ʒ j.
 Cardamomi ℥ vj.
 Opii ℥ xxvij.
 Euphorbii ℥ vj.
 Piperis nigri ℥ xxx.
 Rosarum siccarum ℥ ix.
 Psyllii ℥ xij.
 Opobalsami, seu
 Olei Caryophyllorum ℥ xxiv.
 Ventris Mergi ℥ vj.
 Laccæ, Lycii Indici,
 Caryophyllorum ana ℥ xij.
 Stercoris reperti in alvo Mergi ℥ vj.
 Flor. Nerii ℥ iv ʒ ss.
 Rhabarbari ℥ xij.
 Mei Arabiamatici ℥ iv.
 Terra Cimolæ ℥ xij.
 Succ. Artemisiæ ℥ xx.
 Fol. Cichoræ ℥ ix.
 Spicæ Celticæ ℥ xij.
 Castorei ʒ j.
 Costi, Gentianæ ℥ xij.
 Consect. Hedychoi ℥ ix.
 Anisi ℥ vj.
 Sifons ℥ xix.
 Thymiamatis Hammoniæ,
 Fol. Citri ana ℥ xij.
 Vini veteris odorati q. s. fuerit succis & liquoribus resolyendis.

Mellis despumati optimi ℥ v. aut ℥ vj.
 Arida omnia minutissime contuditur. Opium verò & Myrrham, Hypocistidem, Bdellium, Lycium, Hammoniacum in vino dissoluto: Tragacantham deinde seorsum per se assulo vino dissoluto. Deinde omnia simul misceto, addendo etiam despumatum Artemisiæ succum. In uniuersum hanc confectionem eodem modo conficias, quo Theriacam, & eodem modo demittenda est ut effervescat, non omnino repleto vase. Per septem annos melior iudicatur. * Mirifice contra lethalia venena prodest: aliosq; usus multos habet, quos apud Aetium libro 13. cap. 101. Paulum lib. 7. cap. 11. Actuarium in libr. de Compos. medicament. reperias. *Aetium.*

Esära, aliter.

R. Mameræ ʒ j.
 Amomi ʒ ij.
 Squinanthi ʒ ss.
 Pyrethri ℥ iix.
 Croci ʒ j.
 Myrrhæ ʒ iv.
 Styracis ʒ ss. ℥ ij.
 Petroselinii ℥ iv.
 Tragacanthæ ʒ j.
 Succ. Hypocistidis ʒ iv.
 Ileos ʒ ss. ℥ ij.

A Sem. Fœniculi ʒ j.
 Foli ʒ iij.
 Rhabarbari, Rosarum siccarum,
 Glycyrrhizæ,
 Flor. sylvestris Punicæ,
 Cinnamomi ana ʒ iij.
 Nardi Celticæ ʒ j.
 Mellis despumati ℥ vj. ʒ ix. ʒ vij.
 Myrrham & Hypocistidem in vino dissolve modo, Tragacantham verò per se etiam dissolve.

B & confice secundum artem. *Actuarium.*
 Mamera loco sume *Dionisicum Romanum.* Cordus.

Adrianum.

R. Opii Thebaici ʒ iij.
 Castæ lignæ,
 Hyosciami ana ʒ ij. ℥ ij. ʒ ss.
 Euphorbii,
 Leucopiperis ana ʒ ij. G. vj.
 Seseleos, sem. Apii ana ʒ j. ℥ ss. G. ij.
 Foli, Origani.

C Tragacanthæ ana ʒ j.
 Opobalsami, Petroselinii, Macis,
 Styracis cal. Zingiberis,
 Xylobalsami, Cyperi,
 Carpobalsami Maced. ana ʒ j. minus G. vj.
 Sem. Marathi ℥ ij. G. iix.
 Calami arom. ℥ ij. G. ij.
 Cinnamomi, Croci, Costi, Rheupontici,
 Pyrethri, Acori, Dauici Cretici,
 Anisi ana ʒ ss. G. vj.

D Castorii ʒ ss.
 Setapini, Myrrhæ, Rosarum,
 Cardamomi, Amomi, Rutæ agrestis,
 Sem. Amos ana ℥ j. G. iv.
 Castæ fistulæ ʒ j.
 Mellis quantum sufficit.

Fiat opiata, in vase fictili vitrato seruandum, annis septem. * Valer proprie ad omne vitium capitis ex frigiditate, & ad gravedinem oculorum, & obscuritatem: contra hemiplegiam datur, cum vino calido, ubi cocta sit salvia cum iero, in modum avellanæ: datur etiam quartanariis, cum decocto Gentianæ, vel Origani ante horam accessionis, cum vino data, in quo Saxifragia sit decocta, vel Milium Solis, lapidem frangit. *Nicolaus.*

Opiata sopiens sensus.

R. Pyrethri, Euphorbii,
 Spicæ nardi ana ℥ j.
 Croci optimi ʒ j. ℥ ij.
 Lachrymæ Papaveris ʒ iij. ℥ j.
 Sem. Hyosciami albi ʒ ij. ℥ j.
 Sem. Papaveris albi ʒ v. ℥ ij.
 Mellis optimi non cocti q. s.

Misceantur, fiat opiata. *Ant. Chalmersus.*

Opiata.

R. Theriacæ optimæ,
 Mithridatii optimi ana ℥ ss.
 Opii Thebaici mund. G. ij. vel iij.
 Conser. Anthos ℥ j.
 Misce pro dosi. * Ulus vehementissimis doloribus colicis. *Calparius Banninus.*

DE CON-