

calentia asperguntur: vel saccharum unā cum A
succo coquitur, &c. *Idem.*

Ad saccharum flavo colore tin-
gendum.

Confecta jam absoluta, atq; adhuc in aheno
calida, diluto rhabarbari vel croci asperguntur.

Ad saccharum colore caruleo
tingendum.

R. Succi baccarum Sambuci, vel Florum fru-
menti, in aceto vel vino dilutorum q.l. quo con-
fecta adhuc calentia asperguntur.


Ad saccharum colore purpureo
tingendum.

R. Succi florum ireos q.l. & cum eo saccha-
rum coque.

Ad saccharum colore nigro tin-
gendum.

R. Succu Juglandium, vel Gallarum, vel Myro-
balanorum in aceto dilutorum quantum suffi-
cit, quo aspergatur saccharum. Quod si voles va-
ricolora reddere confecta in vicem modò hunc,
modò illum colorem asperge. *Colonianjes.*

DE GLANDIBUS & SUPPOSITORIIS,
Sectio XLIV.



DE GLANDIBUS B
lenibus.

GLANDES lenes ex farina hordei, aut tri-
tici, aut filiginis, ex aqua in massam reda-
cta, & modico sale condita: aut ex saponis
albo, aut ex pinguedine suilla salis: aut ex betæ
vel brassicæ, vel Mercurialis caule, sine radicibus
oleo inunctis, & modico sale respersis.

Glans lenis.

R. Farinæ hordei vel tritici, Aquæ coctæ, Sa-
lis parum ana quantum sufficit.

Fiant glandes, annularis digiti instar longæ, &
sicentur. Tempore usus, in oleo intinguntur,
atque in alyum induntur. *Andernacum.*

Glans ex radice Betæ.

R. Radicem Betæ, vel Mercurialis.
Fingatur indicis, aut annularis, aut minimi digiti
modo longa & crassa, oleoque intincta, & sale a-
sperfa, inferius indatur.

Glans lenis, alia.

R. Saponis albi ℥.ss. vel si adultior est. ℥.j.
Glans indicis aut digiti modo longa crassaq; aut
tenacior fiat. *Idem.*

Alia.

R. Carnis suillæ, pinguis, salis & concisæ
quantum sufficit.

Glandem minimi digiti instar longam parabis,
& subter alyum adhibebis. *Idem.*

Aliud suppositorium lenis.

R. Mellis probe cocti ℥.ss. vel ℥.j.
Glans instar indicis digiti longa crassaq; confi-
ciatur. *Idem.*

C DE GLANDIBUS ET
globulis lenioribus.

R. Ficum N. j.

Invertatur, & in glandis formam redigatur, in-
daturque.

Globulus excrementa ducons, lenis.

R. Mellis concreti, vel Massæ ex farina tritici,
vel hordei ex aqua coactæ ℥.ij.
Salis communis ℥.j.

D Redigantur in globulum crassitie digitalis, aut
pollicaris, qui ad Solem aut fornacem siccetur.
Ubi usus necessitas adfuerit, oleo vel butyro in-
tingantur, ac in alyum sic penitissimè demittatur.
Andernacum.

Nodus lenis.

R. Vitellorum ovorum N. j.
Salis communis ℥ j.

Probè permiscetur, linteoloq; excepta, ligen-
tur filo, cuius appendix aliqua relinquatur, ut tra-
hi possit: oleo intingatur, & indatur. *Idem.*

*Suppositorium, quo pueri etiam turò
possunt uri.*

Sume recentem ovi tosti vitellum, quem sale
consersum, cultroq; unà cum sale in tenuissi-
mas concisum particulas commisce. Hujus par-
tem reliquam magnitudine avellanæ linteolo
tenui insere, filoq; longiore constringe, id quod
propter commoditatem extractionis minime
præcidas. Postea in oleum fervens injice, ex quo
rursus exemptum mox in loca secretiora, dum
æolet, insere. *Ranzovius.*

Glandes alia.

R. Mel decoctum ad spissitudinem, misce cum
farina triticea: postea mitte in mensam, & addito
recenti butyro, non salito, in teretem longamq;
formam finge. Deinde immitte in oleû, ex quo
rursus exemptum loco secretiori insere. *Idem.*

DE GLANDIBUS
mediocribus.*Glans mediocris.*

R. Mellis concreti ℥ ß. vel ℥ j.
Salis communis, vel fossitii ℥ ß.
Misce, & formetur glans.

Suppositorium aliud mediocre.

R. Mellis concreti ℥ ß. vel ℥ j.
Salis communis ℥ ß.
Spec. Hieræ picræ, vel Aloës, vel Agarici ℥ j.
Misce, & fiat glans.

Aliud.

R. Salis communis ℥ ß. vel
Salis gemmæ ℥ ß. vel
Stercoris muris ℥ j. vel ℥ ij. aut specierum
Hieræ ℥ ß.
Mellis ℥ j.

Misce. Fiat suppositorium.
Addunt quidam pilos in tenuissimas partes
incisos ex melle tosto cum sale. *Hernius.*

DE SUPPOSITO-
riis acris.*Glans acris.*

R. Mellis ad spissitudinem cocti ℥ ß.
Veratri, Scammonii,
Salis in pulverem redactorum ana ℥ j.
Misce, & fingatur suppositorium.

Alia.

R. Mellis concreti ℥ ß.
Colocynthidis, vel succi Cyclamini, vel Scam-
monii, vel Grani Gnidiû ℥. v.

A In glandem indicis instar longam digesta, oleoq;
seu butyro inuncta. *Andernacus.*

Alia.

R. Mellis cocti & concreti ℥ ij.

Pulv. Euphorbii ℥ ß.

Pulv. Colocynthidis G. iv.

Pulv. Ellebori G. ij.

Salis communis ℥ j.

Misceantur singula, & digerantur in glandes.
Tempore necessitatis oleo vel butyro intingun-
tur & induntur. *Euchsius.*

*Species ad Glandes aut Suppositoria
acria conficienda.*

R. Hellebori albi, Gran. Colocynthidis ana
℥ j. ß.

Emulæ præparatæ, Hermodactylorum ana
℥ j.

Specierum Hieræ picræ simplicis Galeni ℥ ij.
Misceantur pulverisatæ. *Cordus.*

DE GLANDIBUS
& globulis flatus discuti-
entibus.*Suppositorium ad flatus.*

R. Mellis cocti ac concreti ℥ j. ß.

Sem. Anisi, Fœniculi ana ℥ j.

Sem. Carvi ℥ ij.

D Colocynthidis ℥ j.

Salis vulgaris ℥ j.

Tundenda tundantur, cribroq; secernantur,
misceantur, digeranturq; in glandes. *Idem.*

Glandes ad flatus.

R. Mellis ad spissitudinem cocti ℥ ß.

Sem. Rutæ, item Anisi, Cumini,

Colocynthidis, Salis fossitii ana ℥ ß.

Glans medii aut indicis instar magna, butyro re-
centi illita in alvum datur. *Andernacus.*

Globulus flatus discutiens.

R. Mellis ad spissitudinem cocti, vel

Massæ hordeaceæ ℥ j.

Sem. Rutæ, Cymini, Fœniculi ana ℥ ß.

Salis communis ℥ j. ß. vel

Colocynthidis, & Salis communis ana ℥ ß.

In globulos pollicares redigito, & butyro illitos
recenti, inferioribus penitus indito. *Idem.*

F DE GLANDIBUS
dolorem mitigan-
tibus.*Glans dolorem sedans.*

R. Opii ℥ j.

Croci, Castorei ana ℥ ß.

Tusa & cribrata cû melle cocto, aut cera & oleo
nympheæ in unum coëant, formenturq; glan-
des, quibus filum appensum est.