

Santali rubri . . drachmas duas.  
Alcoholis . . . uncias quindecim.  
Post sufficientem digestionem filtra.  
(Br. Wir.)

℞. Radicis Pyrethri drachmas decem.  
Alcoholis . . . libram unam.  
Post decem dies infusionis colaturae  
adde

Camphorae . . . unciam unam.  
Olei Rorismarini . . . semunciam.  
Tincturae Opii . . drachmas duas.  
Misce. (B\*. secundum Oxley.)

℞. Radicis Pyrethri,  
Nucis moschatae, sing. unc. unam.  
Caryophyllorum,  
Ligni Guajaci, sing. . . semunciam.  
Alcoholis (26°) . . . libras tres.  
Post sufficientem digestionem cola  
exprimendo et colaturae adde

Olei ess. Rorismarini gutt. decem.  
— — Bergamottae . . . guttas quatuor.

Reizend, bei Zahnkrankheiten und Zungenlähmung empfohlen — Man wendet sie etwas erwärmt als Mundwasser an, oder tränkt auch Baumwolle damit und bringt sie in den hohlen Zahn.

Tinctura Pyrethri aetherea; Oxley's  
tinct. of pyrethrum. (Au. Gr.)

℞. Radicis Pyrethri drachmas decem.  
Aetheris (Spir. Aeth. Gr.) sulph. . . libram unam.

Post dies decem digestionis cola et colaturae adde  
Camphorae . . . unciam unam.  
Olei Rorismarini . . . semunciam.  
Tincturae Opii . . drachmas duas.  
Ebenso gebraucht wie die vorige.

Spiritus Pyrethri. (GalF.)

℞. Radicis Pyrethri . . libram unam.  
Alcoholis (35°) . . libras quinque.  
Aqua . . . libram unam.  
Maceratis per dies duos librae quinque destillent.

Spiritus Pyrethri compositus. (GalH.)

℞. Spir. Pyrethri . . octarium (litre).  
Cinnamomi teneris scrup. quatuor.  
Vanillae,  
Coriandri,

Caryophyll., sing. drach. unam.  
Macidi,  
Coccionellae,  
Croci,

Salis Ammon., sing. gr. octodecim.  
Aqua Flor. Aurant. semunciam.  
Olei ess. Anisi,  
— — Citri, sing. . . gutt. octodecim.

— — Lavandulae,  
— — Thymi,  
Tinct. Ambrae, sing. gutt. novem.  
Post dies quatuordecim macerationis  
filtra.

Vinaigre dentifrique (Gr.): Radicis Pyrethri uncias duas, Cinnamomi, Caryophyll., Guajaci, sing. drachmas duas, Spiritus Cochleariae uncias duas, Aq. vulner. rubr. quatuor, Aceti opt. albi libras quatuor. — Bei Zahnschmerz oder cariösen Zähnen den Mund auszuspülen, allein oder verdünnt.

Pyrola.

Pyrola rotundifolia, L.; Waldman-  
gold, rundblättriges Wintergrün; Pyrole  
à feuilles rondes (Gal.); Wintergroen  
(D.).

Br. Gal. His. His3. Li. Sax. Wir. Be.  
Gr. M. Re. Sp.

♀ (Decandria Digynia, L.; Ericineae,  
J.) Eine Nordeuropäische Pflanze. (Blackw.  
t. 594. Plenck t. 335. Hayne IV. t. 21.  
Oed. Fl. Dan. t. 110)

Man wendet das Kraut (herba Pyrolae) an; es besteht aus einem Büschel runder, grüner, ledriger, langgestielter Wurzelblätter. Es hat keinen Geruch, aber einen bitteren und etwas styptischen Geschmack.

P. altera, secunda, fühlend, austrocknend; Blätter urintreibend, bei Wassersucht; P. umbellata, Chimaphila umbellata, Blätter harntreibend, tonisch. (Gr.)

Extractum Pyrolae umbellatae (Gr.).  
Decoctum Pyrolae. (Re.)

℞. Fol. Pyrolae umbell. unciam unam.  
Macerata per horas sex in  
Aqua mens. . . libris duabus,  
Contunde deinde herbam et in liquorem rejice, evapora, exprime, donec ad libram mens. redigeris.

Q.

Quassia.

Quassia amara, L.; Quassienholz, Americanisches Bitterholz; Quassie, Bois de Surinam (Gal.); Legno del Surinam

(L.); Quassia amarga (Lus.); Drzewo kwassya (Pol.).

Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4.  
Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal.  
Gen. Hau. Hun. Hass. HassP. LH. Li.



Lon. LonN. LP. Lus. O. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. Wür. WW. *Fi. Gr. Re. Va.*

Ein Baum (Decandria Monogynia, L.; Simarubeae, J.) Surinam's. (*Hayne IX. 14. Lam. Ill. gen. t. 343. fig. 1. Plenck t. 333. Curt. Bot. Mag. t. 497. Düss. off. Pl. XIII. t. 1. Desc. Fl. Ant. I. 5*)

Man wendet das Holz des Stommes und besonders der Wurzel (lignum Quassiae) an, welches mit seiner Rinde bekleidet, in Stücken von verschiedener Länge und Dichte, bisweilen kaum kleinen Fingers, bisweilen aber armsdick, von einem oder mehreren Fuß Länge, welche walzenförmig, glatt oder der Länge nach gespalten, meist gerade, selten krumm, bisweilen knotig und ästig sind, zu uns kommt. Die Rinde ist gelblichgrau, nicht sehr dick, glatt anzufühlen und hängt nur wenig am Holze. Letzteres ist gelblichweiß, leicht und innerlich von zartem Gewebe. Sie hat keinen Geruch, aber einen außerordentlich bitteren Geschmack.

Ihre Bitterkeit verdankt sie einem eigenthümlichen Stoffe, dem Quassin (Quassina).

Man leitet dieses Holz auch von Quassia excelsa, Sw., einem Baume Jamaica's (*Comm. Hort. I. p. 149. t. 942. Hayne IX. t. 16.*) ab.

Bitter, tonisch, magenstärkend, bei Verdauungsbeschwerden, Diarrhöe und Blutflüssen gebraucht. — Gabe des Pulvers, von einem Scrupel bis zur halben Drachme. Das Holz von Quassia polygama liefert ebenfalls einen guten bitteren Aufguss. (*Gr.*)

*Extractum Quassiae s. Ligni Quassiae (aquosum).* (Am. AmS. An. Ba. Bor. Bor4. Br. Han. Hass. HassP. Lus. O. Pm. Pol. R. Sax. Wür. C. *Fi. Gr. Pid. T.*)

℞. Rasurae Ligni Quassiae libr. unam. Aquae frigidae . . . libras decem.

Macera per duos dies, subinde agitando, cola, reponere ut desideat, liquorem cola et leni igne consume. (*Pol.*)

℞. Ligni Quassiae raspati . . . q. vis.

Coque in Aquae q. s. per horam unam, cola exprimendo, liquorem post subsidentiam decantha et vaporando ad mellis spissitudinem redige. (*Wür.*)

Lus. Ligni libram unam et sex Aquae.

℞. Rasur. Ligni Quassiae libr. unam.

Aquae fontanae . . . libras sex.

Digere per dies quatuor in loco frigido, tunc coque parumper; cola exprimendo et ad extracti consist. consume. (*Br.*)

Am. Hass. C. et *Pid.* coquere Ligni

libram unam in Aquae octo ad dimidii remanentiam.

℞. Rasur. Ligni Quassiae libr. unam. Aquae bullientis . . . libras octo.

Digere per horas 24, tunc coque per horae quadrantem et cola; residuum coquatur per horae quadrantem cum Aquae novae libris quatuor et coletur; liquores commixti post subsidentiam decanthati evaporent. (*Am.*)

Pm. Ligni libras duas coquere primo cum Aquae libris viginti quatuor per semihoram, colare et tunc cum Aquae libris duodecim coquere et praelo exprimere, liquores simul ad libras tres evaporare, refrigeratos filtrare et balnei maris ope extractum parare.

AmS. Bor. D. Han. O. Pol. R. et Sax. pluries e serie coquere Ligni partem unam cum Aquae decem et colaturas commixtas (sub finem Spiritus Vini rectific. aliquantulum addendo Bor.) consumere; — Bor4. Ligni libram unam cum Aquae sedecim ad dimidii remanentiam, residuum itidem cum Aquae sedecim ad octo decoquere et sic pergere quamdiu opus fuerit, liquores commixtos post subsidentiam decanthatos ad quatuor librarum remanentiam et has in balneo vaporis ad extr. absinthii consist. inspissare; — *Fi.* Ligni libram unam primum per semihoram cum duodecim, deinde cum sex Aquae decoquere, decocta commixta ad sesquilibrae remanentiam et post refrigerationem filtrata in balneo aquae ad extracti consist. consumere; — HassP. ut extractum colombo; — *T.* Ligni partem unam cum Aquae duodecim per semihoram coquere, colare cum expressione, decoctionem cum nova Aqua repetere etc.; — Ba. coquere Ligni partem unam primum cum quinque deinde cum decem Aquae partibus et liquores commiscere.

Gabe, sehen bis fünfzehn Gran.

*Extractum Quassiae s. Ligni Quassiae alcoholicum.* (*Ful. Li.*)

℞. Ligni Quassiae . . . libram unam.

Aquae Vitae . . . libras sex.

Post aliquot dies digestionis leni calore, exprime, filtra et ad mellis consist. consume; sedimentum coque cum Aquae libris tribus, exprime, filtra et itidem evapora; liquores syrupi formam prae se ferentes commixti ad extracti consist. evaporent. (*Ful.*)

Li. digerere Ligni semilibram primo in Alcoholis libris sex per dies duos, tunc per horas 24 cum Aquae bull. libris novem et tincturas commixtas consumere.

℞. Ex

Pul

Fiant

Stuf t

Au. P

Zingib.

rum du

ein Mal

Elixir

℞. Ex

Aq

Gabe

Infusur

(Am.

C. E

℞. Lig

Aq

Dige

Ed. C.)

B\* L

libram

Ligni

rium;

et Aqu

Lus. L

bram,

Aquae

℞. Li

Ser

Co

Aq

Infu

Bitte

mehrma

Infusur

℞. Ra

Su

Aq

Mac

Haustu

℞. Ra

Lip

Aq

ut infu

laturae

El

Ulm

Decoct

℞. Ra

Aq

Cog

tiam c



*Pilulae tonicae. (Au, E.)*

℞. Extracti Quassiae drachmam unam.  
Pulveris Gentianae . . . q. s.  
Fiant pilulae viginti. — Gabe, ein  
Stück täglich drei oder vier Mal. (E.)  
Au. Extracti drachmas duas et Pulv.  
Zingib. q. s. ut fiant pilulae grano-  
rum duorum. — Gabe, zehn Stück auf  
ein Mal.

*Elixir cum Aqua Calcariae ustae s. ant-  
acidum. (Au)*

℞. Extracti Quassiae drachmam unam.  
Aquaе Calcariae . . . uncias octo.  
Gabe, ein Rasseelöffel.

*Infusum Quassiae s. Quassiae excelsae.  
(Am. B\*. Ed. Lon. LonN. Lus. RG.  
C. E. Fi. Gr. Re. Sw. T.)*

℞. Ligni Quassiae rasi semidrachmam.  
Aquaе bullientis . . . uncias octo.  
Digere per horas duas et cola. (Am.  
Ed. C.)

B\*. Ligni drachmas quatuor et Aquaе  
libram; — B\*. Lon. LonN. Gr. Re.  
Ligni scrupulum et Aquaе semioctaria-  
rium; — RG. Sw. Ligni drachmas duas  
et Aquaе libram (octarium Paris); —  
Lus. Ligni drachmas tres et Aquaе li-  
bram; — Fi. T. Ligni drachmam,  
Aquaе libram.

℞. Ligni Quassiae,  
Serpentariae Virginicae,  
Cort. Aurant., sing. semunciam.  
Aquaе bullientis . . . octarios duos.  
Infunde et cola. (E.)  
Bitter. — Gabe, eine bis zwei Unzen  
mehrmals täglich.

*Infusum Quassiae cum Sulphate Zinci.  
(Am. C.)*

℞. Rasur. Ligni Quassiae  
drach. unam.  
Sulphatis Zinci . . . grana octo.  
Aquaе frigidae . . . semioctarium.  
Macerata per horas duas et cola.

*Haustus stomachicus, Potio stomachica.  
(B.)*

℞. Radicis Colombo drachmam unam.  
Ligni Quassiae sesquidrachmam.  
Aquaе . . . quantum sufficit  
ut infusi unciae octo obtineantur. Co-  
laturae adde

Elixir. stomach. Whytti  
drach. duas.

Allmältig zu nehmen.

*Decoctum Ligni Quassiae. (Ful. Ham.)*

℞. Rasur. Ligni Quass. unc. unam.  
Aquaе fontanae . . . libras duas.  
Coquendo ad sesquilibrae remanen-  
tiam consume. (Han)

℞. Rasur. Ligni Quass. sesquiunciam.  
Aquaе . . . libras quatuor.  
Ad libras tres coctione redige, sub fi-  
nem addendo

Florum Chamomillae sesquiunciam.  
Subsideant, tunc decantha. (Ful.) —  
Gabe, alle zwei oder drei Stunden ein Löf-  
fel.

*Decoctum Quassiae s. Ligni Quassiae  
compositum, Decoctum amarum. (Wür.  
Va.)*

℞. Rasur. Ligni Quass. unc. unam.  
Flor. Chamomillae sicc.

sesquiunciam.  
Subcarb. Potassae . . . drach. duas.  
Aquaе fontanae . . . libras quatuor.  
Parte quarta coctione consumptā,  
cola.

Va Subcarbonatem omittens ad quar-  
tae partis remanentiam decoquere.

*Tinctura Quassiae vinosa. (Han.)*

℞. Rasur. Ligni Quass. unc. quatuor.  
Vini Malacensis . . . libras duas.  
Post sufficientem digestionem filtra.  
— Bitter, tonisch. — Gabe, drei Drach-  
men bis eine halbe Unze, täglich zwei Mal.

*Vinum amarum. (Va.)*

℞. Rasur. Ligni Quass. unc. duas.  
Vini Malacens . . . libram unam.  
Caryophyll. pulv. . . scrupulum.  
Digere et filtra. — 1 bis 4 kleine  
Löffel täglich drei oder vier Mal bei Er-  
brechen Schwangerer u.

*Tinctura Quassiae s. Ligni Quassiae  
s. Quassiae excelsae (alcoholica). (Am.  
Ams. An. B. Bel. D. Du. Ed. Gen.  
Han. HassP. O. Sax. C. Fi. Gr. Re.  
Sw. T. Vm.)*

℞. Rasur. Ligni Quass. unc. unam.  
Alcoholis (0,930) . . . octarios duos.  
Digere per duos dies et filtra. (Am.  
Du. C. Gr. Re.)

Ed. Ligni unciam et Alcoholis (0,935)  
libras duas cum dimidia; — B. et Bel.  
Ligni partem unam et Alcoholis (15°)  
sex; — Ams. Alcoholis (0,917) sex; —  
Fi. Alcoholis (30°) sex; — Sw. Ligni  
uncias duas et Alcoholis (0,935) libras  
duas cum dimidia; — Vm. Ligni par-  
tem unam et Aquaе Vitae sex; — Han.  
et O. Ligni uncias quinque et Alcho-  
lis libras duas; — D. Ligni partem  
unam et quinque Alcoholis; — Sax.  
decem Alcoholis; — HassP. ut tinctu-  
ram colombo; — T. Ligni uncias  
quatuor cum Alcoholis 25° B. libris  
duabus per octo dies digerere.

℞. Ligni Quassiae . . . unciam unam.  
Alcoholis (20°) . . . uncias quatuor.



Digere per dies quatuor in balneo aquae tepido, cola et residuo infunde Alcoholis (20°) . . . uncias duas.

Post duos dies cola et colaturas mixtas filtra. (An.)

℞. Rasur. Ligni Quass. uncias duas.  
Corticis Aurantiorum unciam unam.  
Cardamomi minoris semunciam.  
Aquaе Vitae . . . libras duas.

Post dies quatuor macerationis cola. (Gen.)

Essence of camomill (Gr): Ligni Quassiae uncias octo Spir. rectific. congi-um, Ol. Chamaemeli q. s. ad odorem.

### Quercus.

In den Pharmacopöen sind angezeigt:

1) *Quercus alba*, L.; weiße Eiche; Chêne blanc (Gal.); White oak (Ang.) Am. C. Gr.

Ein Baum (Monoecia Polyandria, L.; Amentaceae, J.) der Vereinigten Staaten. (Mich. Arb. Amer. II. t. 1.)

Die Rinde, welche man anwendet, ist abstringierend und brechenenerregend.

2) *Quercus tinctoria*, L., *Q. nigra*; Quercitroneneiche, Färbereiche; Chêne quercitron (Gal.); Black oak (Ang.) Am. C. G. Gr.

Ein Baum der Vereinigten Staaten. (Mich. Arb. Amer. II. t. 22.)

Man wendet die Rinde an, welche stark abstringierend ist.

3) *Quercus Robur*, L.; gemeine Eiche; Chêne Rouvre (Gal.); Oak (Ang.); Dub (B.); Eeg (D.); Majup'hal (Hin. Sa.); Eik (Bel.); Querce, Quercia (I.); Kora debowa, Carvalho (Lus.); Ek (Suec.). Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. BorC. Bor4. Br. D. DD. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. His. His3. LH. Li. Lon. LonN. LP. Lus. O. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. WW. Be. Br. C. Fi. G. Gr. M. Par. Pid. Sp. Z.

Ein großer Baum, welcher in ganz Europa wächst. (Hayne VI. 35. 36. Blackw. t. 487. Plenck t. 670. Nouv. Duh. VII. 57. Bert. Bild. V. 68. fig 2.)

Man wendet die Rinde und die Früchte an.

Die Rinde der jungen Zweige (cortex *Quercus s. quercinus*) ist glatt, außen aschgrau, innen roth. Sie hat einen eigenthümlichen Geruch und einen bitteren und sehr abstringirenden Geschmack. — Die Früchte (Glandes s. Nuces *Quercus s. quercinae*), Eicheln; Glands (Gal.); Zoladz (Pol.) sind eiförmig oder eiförmig, länglich, geruchlos und haben einen herben, bitteren Geschmack. Ihre Becher (Cupulae s. Calyculi *Glandium Quercus*) bestehen

aus graulichen, dicht dachziegelförmig auf einander liegenden Schuppen.

B. Ba. Bor. Bor4. Br. D. Fenn. Ham. Han. Hass. O. Pol. Sax. Suec. Wür. Be. M.

*Quercus pedunculata*, Willd. Ba. Bor4. HassP. LonN. Re.

4) *Quercus Ilex*, L.; Steineiche; Chêne Yeuse (Gal.).

His. Hi. 3. Gr.

Ein Baum des südlichen Europa's und des nördlichen Africa's. (Zorn Ic. pl. t. 618.)

Die Eicheln, welche man anwendet, sind bisweilen süß und essbar, länglich und unten von Becherchen bekleidet, welche aus sehr kleinen, dicht dachziegelartig auf einander liegenden und siligen Schuppen bestehen.

Die Eichenrinden, besonders die von der gemeinen Eiche, enthalten viel Gärbesstoff (Concinnum, Tannin) mit einer extractivstoffigen Substanz. Sie besitzen eine sehr stark abstringirende Kraft, so daß man sie nicht in hoher Gabe anwenden kann, ohne die Verdauungswege zu reizen, ja ohne eine allgemeine Reaction zu bewirken. Man hat sie statt der China vorgeschlagen, allein sie hat als Fiebermittel, eine weit geringere Wirkung — Gabe des Pulvers, von einer Drachme bis zu einer Unze. Die Eicheln dienen, wenn sie süß sind, als Nahrungsmittel; die andern hat man, geröstet, als ein nützliches Reizmittel bei Drüsenkrankheiten, besonders Scropheln, empfohlen. Der Gärbesstoff als Magenmittel zu  $\frac{1}{2}$  — 1 Gran in Pulver, Pillen mit Rosenconserve ꝛc, als adstringens zu 2 bis 3 Gran in Pillen mit rob. sambuci q. s. alle 2 oder 3 Stunden.

5) *Quercus Suber*, L.; Korkeiche; Lid-ge (Gal.); Corktree (Ang.); Korketrae (D.); Alcorhoque (His.); Korkboom (Bel.); Saverio (I.); Saverioiro (Lus.); Korktraed (Suec.). Gal. Suec. Wir. Be. G. Gr. M. Re. Sp.

Ein Baum des südlichen und westlichen Europa's. (Blackw. t. 193. Plenck t. 671. Bert. Bild. I. 66. fig. 1. Nouv. Duh. VII. 45.)

Man wendet die Rinde und die Frucht an. Die Rinde (cortex *Suberi s. Suberi*) ist biegsam, leicht, rissig, schwammig, elastisch und von röthlichgelber Farbe.

Nach Chevreul besitzt sie als vorzügliches Agens einen eigenthümlichen Stoff, Suberin (Suberina), Subérine (Gal.). Chebedem wendete man sie innerlich als Adstringens an.

Die Eicheln haben im Allgemeinen einen süßen und angenehmen Geschmack.

Gr. führt außer diesen noch *Quercus Ballota*, deren Eicheln ein Del liefern,

und Q. ter auß

*Pulvis ticus* (Bor)

℞. Co Ra

Fiat

℞. Co

Ol

Fiat

℞. Pu

Cataple

(Va.)

℞. Pu

Pu

Ac

Misc

℞. Fa

Co

Ac

Coqu

— Ma

phorae

vigesim

antisept

s. cum

℞. Fa

Co

Coqu

titate

et add

Sa

S

℞. C

Ra

M

Infusu

℞. C

Ac

Liqu

Pu

T



und *Q. foliata* an, wovon man die Blätter äußerlich beim Brand braucht.

*Pulvis Quercus compositus, Pulvis Corticis Quercus et Anthemidis nobilis.* (BorC. RG. Au.)

℞. Corticis Quercus scrupulum unum.  
Rad. Galami,

— Gentianae, sing. gr. quinque.  
Fiat pulvis (BorC. Au.)

℞. Corticis Quercus grana quinque.  
— Aurantiorum,

Olibani, singulorum grana decem.  
Fiat pulvis. (Au.)

℞. Pulv. Corticis Quercus,  
— Flor. Anthemid. nob., sing.  
scrupulum. (RG.)

*Cataplasma antisepticum s. cum Concinno s. adstringens.* (GalM. LH. Li. Va.)

℞. Pulv. Corticis Quercus,  
Pulv. Salicis fragil., sing.  
part. unam.

Aceti camphorati . . . partes sex.  
Misce. (Li. Va. Hosp. milit.)

℞. Farinae Hordei,  
— secalitiae,  
Cort. Quercus pulv., sing.  
part. aeq.

Aquae . . . quantum sufficit.  
Coque ad consist. requisitam. (GalM.)

— Massae refrigeratae addendo Camphorae partem quinquagesimam vel vigesimam quintam, habes *Cataplasma antisepticum s. c. Concinno et Camphora s. cum Camphora.* (GalM.)

℞. Farinae Hordei,  
Corticis Quercus, singulorum  
sesquiunciam.

Coque cum Aquae sufficiente quantitate ad consistentiam cataplasmatiscum et adde

Salis Ammoniaci drachmas tres.  
(LH.)

*Suppositorium roborans.* (Ca.)

℞. Corticis Quercus,  
Rad. Tormentillae, sing.  
part. unam.

Mellis . . . partes duas.

*Infusum adstringens s. Corticis Quercus compositum.* (Gr)

℞. Corticis Quercus . . . semunciam.  
Aquae . . . semilibram.

Liquoris expressi sesquiunciae adde  
Pulveris Gallarum . grana decem.  
Tincturae Catechu,

— Cardamomi compositae,  
Syrupi Corticis Aurantii, sing.  
semidrachmam

Auf eine Gabe.

*Extractum Corticis Quercus.* (BorC. Du. Br. Gr. Re.)

℞. Corticis Quercus . libram unam.  
Aquae purae . . . libras octo.  
Coquendo dimidia parte consumpta cola exprimendo, et colaturam blando igne ad consist. pilularem consume. (Du. Gr. Re.)

℞. Corticis Quercus partem unam.  
Aquae . . . partes sex.  
Coque per horas duas et per cribrum trajice; residuo cum nova Aqua cocto, liquores commixti sufficienter evaporent. (Br.)

℞. Cort. Quercus pulv. libram unam.  
Aquae bullientis libras duodecim.

Digere, saepius agitando, per horas 24, tunc liquorem leviter ad consumptionem tertiae partis usque consume; post refrigerationem filtra et in balneo aquae ad extracti consist. usque inspissa. (BorC.)

*Tinctura Corticis Quercus.* (A.)

℞. Cort. Quercus grossiusc. pulv.  
unc. duas.

Alcoholis (0,910) . libram unam.  
Digere ad sufficientem extractionem usque et filtra. — Abstringirend.

*Decoctum Quercus s. Quercus Roboris s. Corticis Quercus, Tisana adstringens febrifuga.* (B\*. BorC. Ed. Lon. LonN. Fi. Gr. Re. T Va.)

℞. Corticis Quercus unciam unam.  
Aquae communis octarios (libras) duos.

Decoque ad unius octarii (librae) remanentiam et cola. (B\*. Lon. LonN. Gr. Re.)

Ed. Fi. Corticis unciam, Aquae libras duas cum dimidia et reductionem ad unciarum sedecim (ad dimidium, Fi.) remanentiam; — BorC. Corticis uncias duas, Aquae sedecim et decoctionem ad unciarum duodecim remanentiam; — T. Corticis uncias tres cum Aquae libris quatuor ad dimidii remanentiam decoquere; — Va. Corticis unciam, Aquae libras quatuor, ad dimid. decoquere, colare et edulcorare.

Abstringirend, tonisch, fiebertwüdrig, bei Wechselfiebern empfohlen. — Gabe, alle drei Stunden eine Lasse.

*Decoctum Corticis Suberi.* (Bo. Pie.)

℞. Suberi raspati . scrupulos duos.  
Aquae . . . octarios duos.

Decoque ad dimidii remanentiam. (Pie.)



Bo. addere jubet Syrupi Capilli Veneris uncias duas.

Gabe, acht Unzen, drei Mal täglich, acht oder zehn Tage lang. Man kann syrupus Nymphaeae zusetzen und die Wirkung durch ein Klystir von einer starken Abkochung der Korkeichenrinde oder von Petersilie, jeden Morgen gegeben, unterstützen.

*Fomentatio cum Concinno s. Corticis Quercus.* (Gal M.)

℞. Corticis Quercus unciam unam.  
Aqua . . . . . quantum sufficit  
ut coquendo octarius unus colaturae obtineatur.

*Injectio adstringens.* (Sw.)

℞. Cort. vel Fol. Quercus unc. unam  
ad duas.

Aqua . . . . . sesquilibram.  
Decoque ad librae unius colaturae remanentiam. — Zu Einspritzungen in die Harnröhre, drei oder vier Mal täglich, bei rebellischem chronischem Tripper. — Man kann diese Einspritzung auch mit einer halben Unze Galläpfelpulver bereiten.

*Injectio Quercus (Re):* Decocti Cort. Querc. octarium, Alumin. purif. semunciam. — Bei erschlafte Zustand der vagina und des rectum.

*Fomentatio adstringens s. roborans s. styptica, Fomentum quercinum.* (LH. Au. Ra. Va. Hosp. Mat.)

℞. Corticis Quercus . . . semunciam.  
Aqua . . . . . libras tres.  
Decoque ad dimidii remanentiam et adde

Florum Chamomillae unciam unam.  
Post semihoram infusionis colaturae adde

Aceti . . . . . uncias quatuor.  
Misc. (Au.)

℞. Summit. Millefolii . unc. unam.  
Rad. Caryophyllatae,  
Cort. Quercus, sing. semunciam.  
Aq. Calcariae unc. viginti quatuor.

Decoque ad unciarum duodecim colaturam et adde

Alcoholis . . . . . uncias tres.  
Misc. (Au.)

℞. Rad. Quinquifolii maj. unc. unam.  
Corticis Quercus pulverati,  
Rosarum rubr., sing. drach. sex.  
Aqua . . . . . libram unam.

Post sufficientem coctionem cola. (Ra. Va.)

℞. Rosarum rubrarum,  
Corticis Quercus, singulorum  
drachmas sex.

Digere per triduum cum  
Vini tincti (rubri?) . libra una,  
cola et exprime. (LH.)

*Lac adstringens.* (Sa.)  
℞. Corticis Quercus,  
— Granati,

Rad. Tormentill., sing. drach. duas.  
Aquaе fontanae,  
Lactis vaccini. sing. libram unam.  
Coque ad dimidii remanentiam, in sine addendo  
Cinnamomi pulv. drachmas duas.

*Decoctum Corticis Quercus cum Alumine s. Quercus aluminosum, Fetus s. Fomentatio adstringens.* (DD. RC. Sa. Sw.)

℞. Corticis Quercus . uncias duas.  
Aquaе purae uncias triginta sex.  
Coque ad unciarum octodecim liquidi remanentiam; cola fortiter exprimendo et adde

Aluminis crudi pulv. drach. tres.  
Dissolve. (DD.)

RC. Corticis drachmam, Aquaе font. libram, ad uncias octo decocto adde Aluminis drachmam, Syrupi simpl. semunciam. — Gabe, eine Unze drei oder vier Mal täglich, mehr oder weniger, seltener oder häufiger, je nach der Wirkung und den Umständen. Ohne Syrup, äußerstlich in Bähung und Gurgelwasser.

℞. Corticis Quercus libram unam.  
Balaustiorum . uncias quatuor.  
Aquaе fontanae . . . libras sex.  
Decoque ad dimidii remanentiam et colaturae adde

Aluminis . . . . . drachmas sex.  
Dissolve. (Sa.)

Sw. Corticis Quercus semilibram, Balaustiorum vel Cort. Granati uncias tres, Aquaе libras sex, reductionem ad tres, et Aluminis drachmas sex.

*Decoctum Corticis Quercus cum Aceto, Fetus antisepticus, Fomentatio antiseptica.* (DD. Ful. Ham.)

℞. Corticis Quercus unciam unam.  
Herbae Absinthii . uncias duas.  
Aquaе purae uncias triginta sex.

Coque ad unciarum viginti liquidi remanentiam; cola fortiter exprimendo et colaturae adde

Aceti . . . . . uncias quatuor.  
Misc bene. (DD.)

℞. Corticis Quercus . uncias duas.  
Aceti . . . . . uncias triginta sex.  
Coque, sub finem addendo

Herbae Rutae,  
— Scordii, sing. . drach. tres.

Salis Ammoniaci . . . semunciam.  
Cola. (Ful.)

Ham. Corticis Quercus unciam, Aceti libras duas, Rutae manip. unum, Scordii tantidem et in colaturae sesquilibra solvere Salis Ammoniaci semunciam.  
*Gargarisma Quercus s. antisepticum.* (RC. Gr. Re.)

℞. Dec. Quercus aluminosi (RC.)  
libram unam.



Aceti,  
Tinct. Myrrhae, sing. unc. unam.  
Misce. — Interdum loco aceti Acidi sulph. vel muriat. guttae quindecim.  
Gr. Re. Aluminis semiscrupulum, Corticis Quercus drachmas duas, Olei Vitrioli guttas triginta, Aquae fervidae uncias sex.

Cerevisia quercina s. adstringens. (Sw. Vm.)

℞. Glandium Quercus partem unam. Cerevisiae fortis partes sedecim. Infunde in balneo aquae tepido per plures dies et cola

Emulsio adstringens. (Bo.)

℞. Glandium Quercus excorticatarum, Amygdal. dulc., sing. . . no. 6. Infusi Verbasci . . . uncias sex. Syr Hederae terrest. unc. unam. Bei Harnruhr empfohlen. — Abends bei Schlafengehen zu nehmen.

Opiatum adstringens. (Bo.)

℞. Conservae Cynorrhodon uncias sex. Glandium Quercus pulv. unc. tres. Corallii rubri praeparati, Catechu, singulorum sesquiunciam. Cinnamomi . . . drachmas tres. Syrupi Rosarum rubrarum q. s. Bei Diarrhöe und chronischer Ruhr. — Gabe, eine Drachme alle vier Stunden.

Unguentum Autenriethii contra decubitus (Dulk): Cort. Querc. q. vis cum Aq. part. octo ad dimid. dec., colat. et add. Aceti Plumbi quamdiu praecipit. oriat, quod in colatorium charta em-

por. tectum impositum Aqua comm. sedulo elotum in tantum siccetur, ut pulvem unguinosam praebet, quae loco frigido servanda est. — Muß bald verbraucht oder, besser, jedesmal frisch bereitet werden.

Glandes s. Nuces Quercus s. quernae tostae. (Ba. HassP. Li. Sax)

℞. Glandium Quercus quantum vis. Cupulis et cortice separatis concide nucleos in partes quatuor, sicca prope ignem cribro impositos et tunc in pelvi ferrea torre, agitando continue, donec frusta brunnea et fragilia reddita sint; post refrigerationem molae ope in pulverem redige.

Infusum Glandium Quercus tostarum. (B. Fi.)

℞. Gland. Quercus tost. semunciam. Aquae bullientis uncias sex ad octo. Infunde et cola. — Bitter, bei Gefäßverstopfungen und Atrophie gepriesen. — Man kann den Aufguß angenehmer machen, wenn man eine Drachme Chocolate zusetzt.

Coffea Glandium. (Au.)

℞. Glandium Quercus tostarum drachmas sex. Coffeae ustae . drachmas duas. Aquae sufficientem quantitatem. Post brevem ebullitionem cola. — Dieser Trank mit Milch und Zucker gemischt, wird bei Scropheln und Rhachitis für nützlich gehalten. — Gabe, zwei oder drei Tassen täglich.

## R.

### Radix Lopeziana.

Radix Indica Lopezina, Lopezka jaar, Racine de Jean Lopez (Gal.)

Ams. An. B. Bel. Br. Fer. Ful. Gal. Vir. A. Gr. M. Sp.

Diese Wurzel kommt in sehr großen hölzigen Stücken vor, deren Holz gelblichweiß, derb, geädert, geruchlos und sehr bitter ist. Die Rinde besteht aus einer innern röthlichen, bitter und styptisch schmeckenden und einer äußern körnigen, pulverartigen, hellgelben Schicht, welche letztere wahrscheinlich von irgend einem Cryptogam herrührt.

Man kennt die Pflanze, von welcher diese Wurzel kommt, nicht genau. Sie wird aus Africa gebracht. Manche halten Morus indica dafür. Fer. leitet sie, aus einem sonderbaren Irrthum, von Lopezia racemosa, Cav., aus Mexico ab.

Reizend, tonisch, bei chronischer Diarrhöe

und im letzten Stadium der Abzehrung angewendet.

Gabe des Pulvers, sechs bis zwanzig Gran, drei oder vier Mal täglich.

Syrupus adstringens. (Sm.)

℞. Rad. Lopez. minutim concis. unc. unam. Aquae bullientis sesquioctarium. Digere inter cineres calidos per horas 48, coque deinde blando igne ad remanentiam liquoris octarii (chopine) unius, in quo colato solve Sacchari albi . . . libram unam. Semel vel bis ebulliant. — Gabe, täglich wenigstens sechs Loßel.

Electuarium adstringens. (Sm.)

℞. Radicis Lopezianae drachmas duas. Conserv. Rosarum rubrarum, — Cynorrhodon, sing. unc. duas. Syrupi Gunmi quantum sufficit.