

Poma Aurantiorum immatura. *Unreife Pomeranzen.*

Citrus Aurantium.

Fruuctus immaturi virides.

Poma Citri. *Citronen.*

Citrus Medica.

Poma acidula. *Säuerliche Aepfel.*

Pyrus Malus. Arbor Europae, in hortis culta.

Radix Althaeae. *Eibischwurz, Altheewurzel.*

Althaea officinalis.

Radix perennis, alba, crassitie calami scriptorii,
multa mucilagine repleta.

Radix Angelicae. *Angelikwurzel.*

Angelica Archangelica. Planta biennis Norwegiae et Lapponiae, in hortis culta.

Radix fragrans, fibrosa, capite oblongo crasso,
extus ex flavo rubens, in superficiebus segmentorum
transversorum alba, maculis numerosis flavis, oleo
aethereo repletis, punctata.

Radix Ari. *Aronswurzel.*

Arum maculatum. Planta perennis Germaniae.

Radix tuberosa subrotunda, alba, crassitie partis
tertiae pollicis. Recens sapore acerrimo praedita est,
siccata autem, acredine fere orbata, farinosa fit.

Radix

Radix Aristolochiae rotundae. *Runde Osterluceywurzel.*

Aristolochia rotunda. *Planta perennis Europae meridionalis.*

Radix tuberosa, subglobosa, ponderosa, crassitie pollicis, saporis amaro-acris.

Radix Armoraciae s. Raphani rusticani.
Meerrettig.

Cochlearia Armoracia. *Planta perennis palustris Europae australioris, apud nos culta.*

Radix cylindrica, albida, succulenta, principio volatile peracri turgida.

Radix Arnicae. *Wohlyverleihwurzel.*
Arnica montana.

Radix subamara, subacris, intense fusca.

Radix Asari. *Haselwurz.*

Asarum Europaeum. *Planta perennis Germaniae.*

Radix fibrosa, ex cinereo fusca, saporis amaro-acris nauseosi, et odoris subaromatici.

Radix Bardanae. *Klettenwurzel.*

Arctium Lappa. *Planta biennis, ubique obvia.*

Radix ramosa, levis, spongiosa, extus nigricans, intus alba, saporis ex acri subdulcis.

Radix Belladonnae. *Belladonnawurzel.*
Atropa Belladonna.

Radix sublignosa, ramosa, geniculata, ex cinereo
 flavescentia.

Radix Bryoniae. *Gichtrübenwurzel, Zaun-*
rübenwurzel.

Bryonia alba f. *Bryonia dioica* Jacquinii. *Planta*
perennis Germaniae.

Radix fusiformis, praegrandis, alba, quae, in ta-
 leolas transversas dissecta, annulis sibi invicem in-
 cumbentibus, et radiis, conspicua est. Sapore gaudet
 amaro-acri.

Radix Calami. *Kalmuswurzel.*

Acorus Calamus. *Planta perennis palustris Germaniae.*

Radix amaro-aromatica, geniculata, spongiosa,
 crassitie pollicari, extus rubens, intus alba.

Radix Caricis arenariae f. *Graminis ru-*
bri. *Große Graswurzel.*

Carex arenaria. *Gramen perenne, in arenosis Germa-*
niae frequens.

Radix repens, articulata, extus rubens, intus alba,
 odoris terebinthinei.

Radix Carlinae f. *Cardopatiae.* *Eberwurz.*

Carlina acaulis. *Planta perennis alpestris Germaniae*
et Helvetiae, in Sudetibus montibus frequens.

Radix ramosa, crassitie pollicis, extus fusca, intus
 pallida, saporis peramari, acris, et odoris subaro-
 matici, nauseosi.

Radix Caryophyllatae. Nelkenwurz.*Geum urbanum. Planta perennis frequens.*

Radix fibrosa, fusca, intus rubens, quae recens odorem Caryophyllorum aromaticorum quodammodo spirat.

Radix Chiae f. Chiae ponderosae.*Chinawurzel.*

Smilax China. Frutex Indiae orientalis, in imperio Chinensi frequens.

Radix lignosa, subfuscā, nodosa, magna, submucilaginea, subdulcis.

Radix Cichorei. Cichorienwurzel.

Cichoreum Intybus. Planta biennis Germaniae, frequenter culta.

Radix ramosa, subflava, crassitie pollicis, lactescens, saporis amaricantis.

Radix Columbo. Columbowurzel.

Planta nondum satis cognita, forte Bryoniae; in Africa prope Mozambique crescens.

Radix lignosa, lutea, extus subfuscā, intus ex viridi lutea, in taleolas transversim secta, saporis amaro-aromatici. Affertur ex insula Ceilon.

Radix Contrajervae. Giftwurzel.*Dorstenia Houstoni. Planta perennis Peruviana.*

Radix fibrosa, capitulo oblongo tenui, extus rufa, intus alba, saporis aromatici subadstringentis, et odoris aromatici.

Radix Curcumae. Gelbwurz.

Amomum Curcuma Jacquinii. *Planta perennis Indiae orientalis.*

Radix oblonga, rugosa, ponderosa, extus lutea, intus intense flava, saporis amaro-aromatici.

Radix Dauci. Möhre, Mohrrübe.

Daucus Carota, var. *satiya*. *Planta biennis Germaniae, in hortis culta.*

Radix fusiformis, vel flava, vel ex flavo rubens, succo dulci repleta.

Radix Dictamni albi s. Fraxinellae. Weisse Diptamwurzel.

Dictamnus albus. *Planta perennis in montosis Germaniae, praesertim meridionalis.*

Cortex radicis albicans, sapore amaricante subacri, et odore, si recens est, gravi praeditus.

Radix Filicis. Farnkrautwurzel.

Polypodium Filix mas. *In silvis Germaniae frequens.*

Radix squamosa, magna, extus subfuscata, intus pallida, sapore gaudens ex dulci subadstringente et dein subamaricante, atque odore, si recens est, subnauseoso.

Radix Foeniculi. Fenchelwurzel.

Anethum Foeniculum. *Planta perennis Galliae meridionalis et Helvetiae, in hortis culta.*

Radicis ramosae rami biennes, albi, crassitie digitati, sapore subdulci et odore grato praediti.

Radix Galangae. *Galgantwurzel.*

Maranta Galanga f. Alpinia Galanga Swartzii.
Planta perennis Indiae orientalis.

Radix nodosa, dura, crassitie digiti, extus ex fusco
rubra, intus rubicunda; saporis acris et odoris aro-
matici.

Radix Gentianae rubrae. *Rother Enzian.*

Gentiana lutea. *Planta perennis alpina.*

Radix crassitie pollicis et quod excurrit, extus ex
rubro fusca, intus aurantiaca, saporis intense amari.

Radix Graminis f. Graminis albi. *Quecken,*
Päden.

Triticum repens. *Gramen perenne, agros obsidens.*

Radix tenuis, repens, articulata, alba, succo dulci
repleta.

Radix Helenii f. Enulae. *Alantwurzel.*

Inula Helenium. *Planta perennis montana Germaniae
et Helvetiae.*

Radix carnosa, mucilaginea, crassitie pollicis, ex-
tus fusca, intus alba, saporis ex acri amaricantis,
subnauseosi, odoris subaromatici.

Radix Hellebori nigri. *Schwarze Niesewurz,*
Christwurz.

Helleborus niger. *Planta perennis alpina.*

Radix fibrosa, capite subrotundo, fibrillis crassio-
ribus extus nigris, intus albis, saporis acris, subamari
et nauseosi.

Radix Jalappae. *Jalappenwurzel.*

Convolvulus Jalappa? *Planta perennis Americae calidioris.*

Radices ponderosae, compactae, rugosae, magnae, plerumque subrotundae, vel integrae, vel in taleolas dissectae, compositae ex lamellis concentricis, resinosis, fuscis, textu celluloso subfuscō distinctis. Gaudent sapore et odore acri et nauseoso.

Radix Ipecacuanhae. *Brechwurzel.*

Psychotria emetica. *Planta perennis, in regno Mexicano praesertim frequens.*

Radix flexuosa, tenuis, annulis eminentibus inaequalibus numerosis conspicua. Constat ex epidermide cinerea, ex cortice albicante, fragili, amaro-acri et nauseoso, atque ex parte interiori lignea, subflavescente, insipida.

Radix Iridis Florentinae. *Violenwurzel.*

Iris Florentina. *Planta perennis Italiae, in hortis cultura.*

Radix tuberosa, nodosa, ponderosa, compacta, crassitie pollicis, post resectum corticem alba, punctis subfuscis notata. Odore ad flores Violae odoratae accedente, et sapore amaricante subacri, praedita est.

Radix Lapathi acuti. *Grindwurzel.*

Rumex acutus. *Planta perennis Germaniae, ad fossas frequens.*

Radix ramosa, superne crassitie pollicari, extus fusca, intus flavescentia, saporis amaro-acris et subadstringentis.

Radix Levistici. *Liebstöckelwurzel.*

Ligusticum Levisticum. *Planta perennis alpina, in
hortis medicis culta.*

Radix praelonga, carnosa, extus lutescens, intus
alba, saporis atque odoris acris aromatici.

Radix Liquiritiae. *Süffholz.*

Glycirrhiza glabra. *Planta perennis Europae meridio-
nalis.*

Glycirrhiza echinata. *Planta perennis Russiae meri-
dionalis.*

Radix praelonga, cylindrica, lignea, crassitie pol-
licis, extus ex cinero fusca, intus lutescens, saporis
¹⁷⁻ dulcis, dein amaricantis.

Radix Paeoniae. *Päonienwurzel.*

Paeonia officinalis. *Planta perennis alpina.*

Radix tuberosa, tuberibus subrotundis, crassitie
pollicis, extus ex rubro fuscis, intus albidis, sapore
ex subamaro et subdulci mixto.

Radix Pimpinellae albae. *Weisse Pimpi-
nellwurz.*

Pimpinella Saxifraga. *Planta perennis Germaniae.*

Radix fibrosa, capite oblongo, crassitie digiti, ex-
tus subfuscus, intus albida, saporis acris, pungentis.

Radix Polygalae amarae. *Bittere Kreuzblumenwurzel.* 17.5

Polygala amara. *Planta perennis montana Germaniae et Galliae meridionalis.*

Radix fibrosa, fibrillis tenuibus subluteis, intus albidis, saporis subamaro-subdulcis.

Radix Polypodii. *Engelsijs.* 18.

Polypodium vulgare. *Filix in silvis Germaniae frequens.*

Radix dentato-articulata, tenax, extus fusca, intus lutescens, saporis dulcis, subadstringentis.

Radix Pyrethri. *Bertramwurzel.* 19.

Anthemis Pyrethrum. *Planta perennis Asiae et Africæ, ad oras Maris mediterranei sponte crescens; nunc in Germania culta.*

Radix cylindrica, rugosa, gracilis, extus subfusca, intus albida, fibrillis rarioribus obsita, saporis peracris urentis, odoris plane expers.

Radix Rhei. *Rhabarber.* 20.

Species Rhei, nondum certo cognita. *Planta perennis Chinensis.*

Segmenta magna radicis, ex occidentalibus imperii Chinensis regionibus allata. Extus, resecto cortice, ex luteo aut croceo rubent, intus autem iisdem coloribus, et interdum etiam colore albido variegata, inventiuntur. Salivam flavedine tingunt; sapore et odore specifico, plerisque nauseam movente, gaudent.

Radix

Radix Rubiae. Färberröthe.

*Rubia tinctorum. Planta perennis Europae mediae,
frequenter culta.*

Radix repens, geniculata, ex fusco rubra, saporis
adstringentis, subamari.

Radix Salep. Salepwurzel.

*Orchides variae, imprimis Orchis Morio et Orchis
mascula. Plantae perennes pratenses.*

Radices oblongae, tuberosae, subdiaphanae, pon-
derosae, ex subfuscō cinereae, e toto mucilagineae.
Praestant ex China, Syria et Persia allatae.

Radix Saponariae. Seifenkrautwurzel.

Saponaria officinalis.

Radix fibrosa, extus rubens, intus flavescentis, sapo-
ris subdulcis, dein amaricantis, subacris.

Radix Sarsaparillae. Sarsaparilwurzel.

*Smilax Sarsaparilla. Planta perennis Americana, in
Mexicana et Brasiliensi regionibus frequens.*

Radix repens, flexuosa, fragilis, farinacea, cras-
sitie calami scriptorii, subrugosa, extus fusca, intus
alba, saporis submucilaginei.

Radix Scillae. Meerzwiebelwurzel.

*Scilla maritima. Planta perennis, in oris Maris medi-
terranei frequens.*

Bulbus praegrandis, ponderosus, epidermide ex
fuscō rubente tunicatus. Squamae albidae recentes
succo mucilagineo peracri turgent; leni calore ex-
siccatae sapore peramaro praeditae sunt.

Radix Scorzonerae. *Scorzonewurzel.*

Scorzonera Hispanica et Scorzonera humilis.

Plantae perennes Europae meridionalis.

Radix fusiformis, subdulcis, intus alba, epidermide fusca.

Radix Senegae. *Senegawurzel.*

Polygala Senega. *Planta perennis Virginiae et Pensylvaniæ.*

Radix superne nodosa, inferne in ramos incurvatos desinens, extus ex cinereo lutescens, intus alba, sapore acri pungente praedita.

Radix Serpentariae Virginianae. *Virginische Schlangenwurzel.*

Aristolochia Serpentaria. *Planta perennis Virginiae.*

Radix fibrosa, ex viridi lutescens, fibris tenuissimis, inter se tricatis, odoris fragrantis camphorati.

Radix Taraxaci. *Löwenzahnwurzel.*

Leontodon Taraxacum.

Radix fibrosa, extus fusca, intus alba, saporis ex dulci amaricantis.

Radix Tormentillae. *Tormentillwurzel.*

Tormentilla erecta. *Planta perennis Germaniae.*

Radix nodosa, fibrillis numerosis obsessa, extus ex rubro fusca, intus dilute rosea, saporis peradstringentis.

Radix Valerianae minoris. *Baldrianwurzel.*

Valeriana officinalis. *Planta perennis Germaniae, in montosis colligenda.*

Radix fibrosa, capitulo oblongo, quodammodo truncato, fibris subfuscis, tenuibus, hirtis, tenacibus, saporis amaro-acris et odoris gravis, subnauseosi.

Radix Zedoariae. *Zedoarwurzel.*

Kaempferia rotunda f. Amomum Zedoaria Bergii.
Planta perennis Indiae orientalis.

Radix aromatica, tuberosa, ponderosa, extus cinea-
rea, intus subfuscata, in segmenta vel rotunda vel longa
dissecta; saporis acris amaricantis, odoris fragrantis
subcamphorati.

Radix Zingiberis albi. *Weisser Ingber.*

Amomum Zingiber. *Planta perennis Indiae orientalis.*

Radix tuberosa, articulata, compressa, rugosa, pon-
derosa, extus ex albo cinerea, intus alba, saporis
peracris, odoris aromatici.

Resina Guajaci nativa. *Guajakharz.*

Guajacum officinale.

Resina ex fusco virescens, subdiaphana, friabilis,
saporis acris, quae prunis injecta odorem spargit
haud ingratum.

Resina Pini f. communis. *Gemeines Harz.*

Pinus silvestris et Pinus Abies.

Resina aurantiaca, ex arbore exsudans et dein in-
durata.

Saccharum album. *Weisser Zucker.*

Saccharum officinarum. *Gramen perenne palustre*
utriusque Indiae.

Principium proprium dulce, a mucilagine aliisque
heterogeneis depuratione separatum et in formam
Salis concreti redactum,