

immixtis, composita. Sapore amaro-acri, et odore gravi, plerisque ingrato, praedita est, atque tempore fusca redditur. Fluit ex trunco, prope radicem transversim seculo, mox indurescens.

Gummi Mimosae f. Gummi arabicum.

Arabisches Gummi, Senegal-Gummi.

Mimosa nilotica et Mimosa Senegal. Arbores,
quae in variis Africæ mediae regionibus frequenter
occurrunt.

Gummi purissimum, ex cortice exsudans, albicans aut lutescens, subdiaphanum, et diffractum nitens.

Gummi Tragacanthæ. Traganth.

Astragalus creticus Lamarck. Frutex in insulis
Archipelagi et in Oriente sponte nascens.

Substantia gummeo-mucilaginosa, alba, vel sponte ex fruticulis exsudans, vel ex vulnerato cortice stilans, quae condensata frustula incurvata format.

Gutti-f. Gummi Guttae. Gummigutt.

Stalagmitis Cambogioides Murrayi f. Guttifera
vera Koenigii. Arbor Indiae orientalis.

Succus induratus gummeo-resinosus, flavus, opacus, splendens, ex acri subdulcis. Exsudat vel ex ramis resecatis, vel ex cortice arboris vulnerato.

Helmintochorton. Wurmmoos.

Conserva Helmintochorton. In mare mediterraneo,
ad littus Corsicae frequens.

Conferva subfusca, dichotoma, sapore subsaldo nauseoso et odore ingrato praedita.

Herba Abrotani. Eberraute.

Artemisia Abrotanum. Planta perennis Europae meridionalis et Orientis, nobis hortensis.

Herba amaro-aromatica, foliis multipartitis, ex viridi albescientibus.

Herba Absinthii. Wermuth.

Artemisia Absinthium. Planta perennis frequentissima.

Herba florens amaro-aromatica, floribus compotis exiguis, subglobosis, pendulis, foliolis lobatis, tomento albo obsitis.

Herba Aconiti. Eisenhütlein.

Aconitum Napellus et Aconitum Cammarum. Plantae perennes in Sudetibus, Hercynia et Austria frequentes, in hortis cultae.

Folia palmata, quinquepartita, lobis dissectis, sapore acri praedita.

Herba Althaeae. Eibischkraut, Altheekraut.

Althaea officinalis. Planta perennis Germaniae.

Folia triangularia, tomento cinereo mollissimo tecta, quae multam continent mucilaginem.

Herba Anagallidis. Gauchheil.

Anagallis arvensis, var. flore phoeniceo f. Anagallis phoenicea Hoffmanni. Planta annua agrestis Germaniae.

Herba humilis ramosa, floribus rubris, foliis parvis ellipticis.

Herba Arnicae. *Fallkraut, Wohlverleih.*
Arnica montana.

Folia ovata, superficie utraque hirta, margine integerrimo, saporis subacris subamari.

Herba Basilici. *Basilienkraut.*

Ocymum Basilicum. *Planta annua Persiae et Indiae orientalis; nobis hortensis.*

Herba ramosa, interdum purpurascens, foliis ovato-acutis, integris, glabris, punctatis, gratissimo odore gaudens.

Herba Belladonnae. *Tollkirschenblätter,*
Belladonnablätter.

Atropa Belladonna. *Planta perennis Europae meridionalis, in hortis medicis culta.*

Folia magna, petiolata, ovato-acuta, intense viridia, odoris narcotici.

Herba Cardui benedicti. *Cardobenedictenkraut.*

Centaurea Benedicta. *Planta annua, in insulis Archipelagi frequens, quae in hortis medicis colitur.*

Herba florens peramara, floribus compositis tubulosis luteis; calyce, cum foliis adjacentibus, ope texturae arachnoideae, cohaerente.

Herba Centaurii minoris. *Tausendguldenkraut.*

Gentiana Centaurium f. Chironia Centaurium
Curtis. *Planta annua Germaniae.*

Herba florens, floribus rubentibus, foliis ovatis, obamaritatem acrem celebris.

Herba Chenopodii ambrosiaci f. Botryos Mexicanae. *Mexicanisches Traubenkraut.*

Chenopodium ambrosioides. *Planta annua Mexicana, nobis hortensis.*

Herba florens odoris ambrosiaci, racemis foliatis simplicibus, foliis lanceolatis dentatis.

Herba Cicutae virosae. *Wasserschierling, Wuterich.*

Cicuta virosa. *Planta perennis aquatica Germaniae.*

Folia composita, foliolis oblongis, acutis, margine dentatis, dentationibus apice albidis, quae, recen-ter collecta, odorem spirant gravem.

Herba Clematidis erectae f. Flammulae Jovis. *Brennkraut.*

Clematis erecta. *Planta perennis Germaniae meridio-nalis.*

Herba florens, peracris, corollis albis tetrapetalis aut pentapetalis, foliis pinnatis, foliolis ovato-lanceolatis, integerrimis.

Herba Cochleariae. *Löffelkraut.*

Cochlearia officinalis. *Planta annua, ad littora maritima Europae borealis frequens; apud nos in horis culta.*

Herba florens, principio acri volatili praedita; foliis radicalibus subrotundis, caulinis oblongis, sinuatis.

Herba Conii maculati s. Cicutae maculatae. *Erdschierling.*

Conium maculatum. *Planta biennis in Germania frequens.*

Herba odoris nauseoso-vaporosi, foliis compositis, foliolis lanceolatis incisis glabris, caule et ramis majoribus maculis purpureis aspersis.

Herba Digitalis. *Rother Fingerhut.*

Digitalis purpurea. *Planta silvestris montana Helvetiae et Germaniae, in hortis quoque culta.*

Folia elliptica, rugosa, hirsuta, margine serrata, saporis amari acris.

Herba Farsarae. *Huflattig.*

Tussilago Farsara. *Planta perennis Germaniae.*

Folia subcordato-angulata, denticulata, saporis subadstringentis subamari.

Herba Fumariae. *Erdrauch.*

Fumaria officinalis. *Planta annua, inter segetes frequens.*

Herba peramara, foliis compositis, foliolis trilobatis.

Herba Gratiolae. *Gnadenkraut.*

Gratiola officinalis. *Planta perennis pratensis et riparia Germaniae.*

Herba florens, amaro-acris, foliis lanceolatis serratis, glabris, floribus ringentibus, subalbidis, diandris.

Herba Hederae terrestris. *Gunderman.*

Glecoma hederacea. *Planta perennis frequentissima.*

Folia reniformia, crenata, saporis subaromatici.

Herba Hyoscyami. *Bilsenkraut.*

Hyoscyamus niger. *Planta annua, in ruderatis et ad vias frequens.*

Folia semiamplexicaulia, sinuata, hirsuta, odoris summe narcotici.

Herba Hyperici. *Johanniskraut.*

Hypericum perforatum. *Planta perennis pratensis et silvestris Germaniae.*

Herba florens subacris, foliis ovato-obtusis, pellucido-punctatis, petalis luteis oblique truncatis, crenulatis, puncto atro inter crenam notatis.

Herba Hyssopi. *Isop.*

Hyssopus officinalis. *Fruticulus Europae meridionalis, nobis hortensis.*

Herba aromatica, foliis lanceolatis glabris.

Herba Ledi palustris. *Wilder Rosmarin,*
Porsch.

Ledum palustre. *Fruticulus in cespitosis et uliginosis Germaniae frequens.*

Folia linear-lanceolata, superficie superiori glabra, saturate viridi, inferiori autem hirsuta, fusca, sapore amaro adstringente et odore gravi praedita.

Herba

Herba Lichenis Islandici. *Isländisches Moos.*

Lichen Islandicus. *In Sudetibus, Hercynia, monte Bruclero, aliisque Germaniae montibus frequens.*

Lichen amaricans, coriaceus, sinuatus, lacunosus, superficie superiori cinereus, inferiori autem fuscus, multa mucilagine repletus.

Herba Linariae. *Leinkraut.*

Antirrhinum Linaria. *Planta perennis frequens.*

Herba florens, foliis lanceolato-linearibus, floribus luteis, saporis subamari et odoris subvaporosi.

Herba Majoranae. *Majoran.*

Origanum Majorana. *Planta annua Europae meridionalis, in hortis culta.*

Herba aromatica, foliis ovatis obtusis, ex viridi albicantibus.

Herba Malvae. *Pappelkraut, Käsepappeln.*

Malva rotundifolia.

Folia cordato-orbiculata, subquinqueloba, mucilaginea.

Herba Mari veri. *Amberkraut.*

Teucrium Marum. *Fruticulus Europae meridionalis et Orientis, praesertim in Hispania et Syria frequens.*

Herba aromatica, fragrans, foliis ovatis petiolatis, superficie inferiore, una cum petiolis et ramulis, tomento albo superinductis, floribus racemosis purpureis.

Herba Marrubii. *Weisser Andorn.*

Marrubium vulgare. *Planta perennis, in ruderatis frequens.*

Herba amara, hirsuta, ex viridi albicans, foliis ovatis, crenatis, rugosis.

Herba Matricariae. *Mutterkraut.*

Matricaria Parthenium. *Planta perennis Germaniae.*

Rami florentes amaro-aromatici, floribus compositis radiatis, disco flavo, radio albo brevi, foliis compositis planis, foliolis ovatis incisis.

Herba Melissae f. Melissae citratae. *Me-*
lissee, Citronenmelisse.

Melissa officinalis. *Planta perennis Germaniae meridionalis, in hortis culta.*

Herba aromatica odoris citrei, foliis ovato-cordatis, villosis.

Herba Menthae crispae. *Krausemünze.*

Mentha crispa. *Planta perennis originis Sibiricae, in hortis culta.*

Herba aromatica, foliis cordatis, dentatis, rugosis, undulatis.

Herba Menthae piperitae. *Pfeffermünze.*

Mentha piperita. *Planta perennis Angliae, in hortis medicis culta.*

Herba aromatico-camphorata, foliis petiolatis, ovato-acutis, serratis, glabris.

Herba Millefolii. Schafgarbe.

Achillea Millefolium.

Herba amaro-aromatica, foliis bipinnatis, Iaciniis
linearibus dentatis.

Herba Nicotianae. Tabak.

*Nicotiana Tabacum. Planta annua Americae meri-
dionalis, apud nos culta.*

Folia oblongo-lanceolata, magna, odoris subnau-
seosi et saporis peramari, quae exsiccata fuscum
induunt colorem.

*Herba Origani vulgaris. Gemeiner Dost,
Wohlgemuth.*

Origanum vulgare. Planta perennis Germaniae.

Herba aromatica, ramis quadrangulis rubentibus,
foliis oppositis ovatis, bracteis ovatis calyce longio-
ribus.

Herba Pulegii. Poleyn.

*Mentha Pulegium. Planta perennis Germaniae, in
locis humidis crescens.*

Herba florens aromatica, floribus verticillatis rubi-
cundis, foliis ovato-lanceolatis, serratis, hirsutis.

Herba Roris marini. Rosmarin.

Rosmarinus officinalis. Frutex Europae meridionalis.

Herba florens aromatica, acris, floribus ringenti-
bus, dilute caeruleis, foliis linear-lanceolatis, pa-
gina superiori intense viridibus.

Herba Ruta e. Raute, Gartenraute.

Ruta graveolens. Frutex hortensis, Europae meridionalis indigenus.

Herba amaro-acris, graveolens, ex viridi caerulescens, foliis decompositis, foliolis subrotundis.

Herba Sabinae. Sadebaum.

Juniperus Sabina. Arbor orientalis sempervirens, nobis hortensis.

Summitates ramorum, foliis oppositis erectis, decurrentibus, saporis amaro-acris, et odoris gravissimi.

Herba Salviae. Salbey.

Salyia officinalis. Fruticulus hortensis, in Europa meridionali sponte crescens.

Herba amaro-aromatica et subadstringens, foliis lanceolato-subovatis, integris, rugosis, crenulatis.

Herba Saponariae. Seifenkraut.

Saponaria officinalis. Planta perennis Germaniae.

Herba submucilaginea, foliis ovato-lanceolatis, trinerviis.

Herba Scordii. Lachenknoblauch.

Teucrium Scordium. Planta perennis Germaniae.

Herba amara, odoris alliacei, foliis oblongis sessilibus, dentato-serratis.

Herba Serpylli. *Quendel.*

Thymus Serpyllum. *Fruticulus Germaniae frequen-*
tissimus.

Herba amaro-aromatica, caule repente, foliis planis, ovatis, obtusis, basi ciliatis, floribus capitatis purpurascensibus.

Herba Solani nigri. *Nachtschatten.*

Solanum nigrum. *Planta annua, ubivis occurrent.*

Herba foliis ovatis, vel integris, vel dentato-angulatis, odoris nauseosi, subnarcotici.

Herba Tanaceti. *Rainfarn.*

Tanacetum vulgare.

Herba amaro-aromatica, foliis bipinnatis, incisis, serratis.

Herba Taraxaci. *Löwenzahn.*

Leontodon Taraxacum. *Planta perennis frequen-*
tissima.

Herba amaricans, floribus compositis lingulatis, flavis, foliis runcinatis, denticulatis, laevibus.

Herba Thymi. *Thymian.*

Thymus vulgaris. *Fruticulus hortensis, in Europa*
meridionali sponte crescens.

Herba aromatica, caule erecto ramoso, foliis ovatis, revolutis, floribus verticillato-spicatis, albis.

Herba Trifolii fibrini. *Fieberklee.*

Menyanthes trifoliata. *Planta perennis palustris Germaniae.*

Herba amara, foliis ovatis, ternis.

Herba Verbasci. *Wollkraut.*

Verbascum Thapsus.

Herba mucilaginea, foliis decurrentibus, utrinque tomento molli albo tectis.

Herba Veronicae. *Ehrenpreis.*

Veronica officinalis. *Planta perennis Germaniae.*

Herba amaricans, caule procumbente, spicis lateribus pedunculatis, floribus caerulecentibus, foliis oppositis, ovatis, crenatis.

Herba Violae tricoloris f. Jaceae. *Dreifaltigkeitsblume,* *Fraissamkraut.*

Viola tricolor. *Planta annua frequens.*

Herba subacris, foliis ovatis dentatis, floribus calyce glabro duplo majoribus.

Hirudines vivae. *Blutegel.*

Hirudo medicinalis. *Vermis ex ordine Intestinorum.*

Hirudo in dorso fusca, lineis flavis sex notata, intermediis maculatis, subtus cinerea, maculis nigris.

Hydrargyrum f. Mercurius vivus. *Quecksilber.*

Metallum album, volatile, sub nostro coelo liquidum.

Ichthyocolla f. Collapiscium. *Hausenblase.*
Acipenser Sturio et A. stellatus.

Gluten ex vesica natatoria coctione extractum, refrigerio in pelliculas condensatum et dein convolutum. Sit alba, tenax, et in aqua facile solubilis.

Kali carbonicum crudum f. Cineres clavellati. *Pottasche.*

Massa salina, ex cineribus lignorum per elixivationem et inspissationem parata, et dein leniter usta. Plerumque Kali sulphurico, Kali muriatico et partibus terreis inquinatur.

Kali nitricum f. Nitrum crudum. *Salpeter.*

In Nitrariis nostris quidem dignitur, maxima autem copia ex India orientali affertur. Plerumque Kali muriaticum, Calcaream et Magnesiam muriaticam continet.

Kino f. Gummi Kino f. Gummi Gambiense.
Kinoharz.

Arbor Africæ interioris, nondum satis cognita.

Massa friabilis, opaca, ex rubro nigricans, aqua soluble, saporis peradstringentis.

Lacca in ramulis. *Stangenlack.*

Coccus Ficus. *Insectum hemipterum Indiae orientalis.*

Massa resinoso-ceracea, rubra, fragilis, exsudans super larvas Coccum Ficus, ex ramis Fici religiosae et Indicae. Afferri solet una cum ramulis, quibus adhaeret.