

Cuprum. *Kupfer.*

Metallum ductile, colore rufum, quod Acido carbonico in oxydum viride mutatur.

Elemi, vulgo Gummi Elemi. *Oehlbaumharz.*

Amyris Elemifera. *Arbor Americae meridionalis.*

Resina lutea, subpellucida, digitis agitata tenax, odorem foeniculi quodammodo spirans. Ex trunco arboris vulnerato liquida destillans mox induratur.

Euphorbium. *Euphorbium.*

Euphorbia officinarum, et verisimiliter nonnullae aliae Euphorbiae species. *Frutices Africae meridionalis.*

Gummi-resina flavescens, saporis acerrimi urentis, quae prunis injecta odorem spargit non ingratum. Frustula variae sunt magnitudinis, plerumque angulata, quia in ipsis spinis fruticis induruerunt.

Fel Tauri. *Ochsengalle.*

Bos Taurus domesticus.

Ferrum. *Eisen.*

Metallum ex cinereo nigrescens, magneti obediens, quod, acidis solutum, principio adstringente adhibito, nigricans praecipitatur.

Flores Arnicae. *Wohlverleihblumen.*

Arnica montana. *Planta perennis Germaniae.*

Flores compositi lutei, ex acri amari, digitis confricati sternutationem moventes, squamulis calycinis brevioribus non setosis, apice purpureis.

Flores Chamomillae Romanae. *Römische Kamillen.*

Anthemis nobilis. *Planta perennis Europae meridionalis.*

Flores compositi radiati, receptaculo fere plano, flosculis disci flavis, aromaticis, flosculis autem radii numerosis, brevibus, insipidis.

Flores Chamomillae vulgaris. *Gemeine Kamillen.*

Matricaria Chamomilla. *Planta annua, in Germania frequens.*

Flores compositi radiati, receptaculo conico, flosculis disci flavis, amaris et fragrantibus, flosculis radii albis, reflexis, insipidis.

Flores Convallariae majalis, f. Flores Liliorum convallium. *Mayblumen.*

Convallaria majalis. *Planta perennis silvatica Germaniae.*

Corollae campanulatae, albae, subaromaticae.

Flores Granati f. Balaustia. *Granatblumen.*

Punica Granatum.

Flores, petalis coccineis et calycibus coriaceis rubris conspicui, principio adstringente praediti.

Flores Lavendulae. *Lavendelblumen, Spiege.*

Lavandula Spica. Fruticulus Galliae meridionalis.

Corollae cylindricae caeruleae, odoris aromati-
catissimi.

Flores Malvae arboreae. *Pappelrosen.*

*Alcea rosea. Planta biennis, origine orientalis, in hor-
tis Germaniae culta.*

Corollae mucilaginosae, atrofuscae.

Flores Malvae vulgaris. *Gemeine Pappel-
blumen.*

*Malva rotundifolia. Planta annua, in ruderatis fre-
quentissima.*

Malva silvestris. Planta perennis Germaniae.

Flores mucilaginei, corollis vel albis, vel caeru-
lescentibus, vel rubicundis, venis aut rubris aut
caeruleis pictis.

Flores Meliloti citrini. *Melilotenblumen.*

*Trifolium Melilotus officinalis, var. floribus ci-
trinis. Planta biennis, per totam Germaniam
frequens.*

Rami florentes, floribus luteis, odorem proprium
aromaticum spirantibus.

Flores Millefolii. *Schafgarbenblumen.*

*Achillea Millefolium. Planta perennis frequentissima,
floribus albis et rubicundis varians.*

Flores compositi exigui, saporis amari subacris,
et odoris subaromatici.

Flores Rhoeados. *Klatschrösen.*

Papaver Rhoëas. *Planta annua, inter segetes frequentissima.*

Petala papaverina rubra, ob odorem subvaporosum ingrata.

Flores Rosarum incarnatarum. *Rothe Rosen.*

Rosa centifolia. *Frutex in hortis frequens.*

Petala pallide rubentia, odoris gratissimi et saporis subadstringentis.

Flores Rosarum rubrarum. *Essigrosen, Damascener Rosen.*

Rosa Gallica s. Damascena. *Frutex Galliae meridionalis, apud nos hortensis.*

Petala ex fusco rubentia, sapore adstringente praedita.

Flores Sambuci. *Fliederblumen, Hohlunderblumen.*

Sambucus nigra. *Arbor per totam Germaniam frequentissima.*

Cymae florentes, floribus albis subvaporosis.

Flores Tanaceti. *Rainfarnblumen.*

Tanacetum vulgare. *Planta Germaniae perennis, ad vias et inter segetes frequens.*

Flores compositi tubulosi, flavi, sapore amaro et odore aromatico nauseoso praediti.

Flores Verbasci. *Wollkrautblumen.*

Verbascum Thapsus. *Planta biennis, in solo arenoso frequens.*

Corollae mucilaginosae luteae, odoris rosacei.

Flores Violarum. *Blaue Veilchen.*

Viola odorata. *Planta perennis Germaniae, in hortis frequenter culta.*

Flores intense caerulei, odore grati.

Folia Aurantii. *Pomeranzenblätter.*

Citrus Aurantium.

Folia ovata, appendice cordata, ad basin aucta, saporis amari.

Folia Ilicis Aquifolii. *Stechpalmenblätter.*

Ilex Aquifolium. *Frutex Germaniae sempervirens.*

Folia ovata, angulata, dentato-spinosa, coriacea, saturate viridia, saporis amaricantis-subacris.

Folia Lauro-Cerasi. *Kirschlorbeerblätter.*

Prunus Lauro-Cerasus. *Arbor Orientis et Europae meridionalis.*

Folia ovata, subintegra, nitida, coriacea, quae siccata fere insipida inveniuntur.

Folia Quercus. *Eichenblätter.*

Quercus Robur.

Folia

Folia Sennae. *Sennesblätter.*

Cassia Senna. Frutex in Europa meridionali et in Oriente frequens.

Folia ovato-acuta, inaequalia, longitudine semipollicari, saporis amaro-acris et plerisque nauseosi. Optima sunt folia Sennae Alexandrinae, quae colore gaudent ex flavo viridi.

Folia Uvae ursi. *Bärentraubenblätter.*

Arbutus Uva ursi. Fruticulus Germaniae semper-virens.

Folia obovata, saporis adstringentis; in superficie inferiori, a foliis Vaccinii Vitis Ideae subtus punctatis, reticulo facile distinguenda.

Formicae. *Ameisen.*

Formica rufa.

Insectum hymenopterum, Acido volatile proprio praeditum.

Fructus Mororum. *Schwarze Maulbeeren.*

Morus nigra. Arbor originis sinicae, in Europa culta.

Baccae compositae nigrescentes, succo acidulo grato turgidae.

Fructus Prunorum. *Pflaumen.*

Prunus domestica. Arbor Germanicae, in pomariis frequens.

Drupae oblongae nigrescentes, pruina caerulea aspersae, quae pulpam subdulcem largiuntur.

Fructus Ribium rubrorum. *Johannisbeeren.*

Ribes rubrum. Frutex Germaniae, in hortis cultus.

Baccae globosae, rubrae, subdiaphanae, succo acido grato turgentes.

Fructus Rubi Idaei. *Himbeeren.*

Rubus Idaeus. Frutex Germaniae, in vinetis et hortis cultus.

Baccae compositae, subrotundae, rubentes, succo subacidulo gratae.

Gallae. *Galläpfel.*

Quercus Cerris. Frutex orientalis, praesertim in Syria frequens.

Tumores morbosi foliorum, a Cynipe foliorum Quercus, insecto hymenoptero, punctura producti, globosi, tuberculati, principio adstringente uberrime repleti. Praeferuntur ex Aleppo allatae, quae colore ex nigro caerulescente innotescunt.

Glandes Quercus. *Eicheln.*

Quercus Robur.

Fructus maturi absque cupulis.

Galbanum s. Gummi Galbanum. *Mutterharz.*

Bubon Galbanum. Planta perennis umbellifera, in Arabia, Syria, Mauritania et India orientali sponte crescens.

Gummi-resina, granis ex albo lutescentibus, sibi invicem vel agglutinatis, vel massae molliori luteae