

- c) spröde-brüchig, meist gleichlang, am Rande stumpf: Russula 1264—1308, S. 177,
- d) dünn, häutig-schlaff, in zwei Häutchen spaltbar:
 - α) Stiel knorpelig-röhrig:
 - αα) Hut gewölbt-eingerollt: Collybia 293—351, S. 41,
 - ββ) geraderandig, kegelig-glockig: Mycena 352 bis 439, S. 48;
 - β) Stiel fleischig, voll: Tricholoma 66—162, S. 14, Paxillus 483—484, S. 64, Pleurotus 454, S. 60, Lepiota 56—60, S. 13.

IX. Sporenstaub weiß, Stiel seitlich oder fehlt.

1. Lamellen leisten- oder faltenförmig:
 - a) auf Moosen, zart und weich: Leptoglossum 1387 bis 1391, S. 197,
 - b) an Hölzern, lederzäh: Trogia 1214, S. 170;
2. Lamellen blätterartig, nebst Substanz lederzäh:
 - a) mit längsgespaltener Schneide: Schizophyllum 1213, S. 169,
 - b) mit zerrissen-gesägter Schneide: Lentinus 1195 bis 1212, S. 167,
 - c) mit unversehrter Schneide: Panus 1187—1194, S. 165;
3. Lamellen weich, häutig, schlaff: Pleurotus 440—481, S. 58.

V. Bestimmungstafel für die Löcherpilze, vom Standort ausgehend.

I. Auf dem Erdboden, stets gestielt.

1. Weichfleischig, Röhrenschicht leicht ablösbar: Boletae 1—50, S. 200;
2. faserfleischig, Röhrenschicht kaum oder doch schwer ablösbar:
 - a) vielhütig-zusammenfließend: Merisma 51—57, S. 209,
 - b) einzeln, allenfalls büschelig: Polyporus 58—64 (66), S. 211;
3. saftlos, wergig-korkig, innen rostgelb: Polystictus 109 bis 115, S. 219.

II. Am Grunde lebender Stämme, gleichfalls gestielt:

1. Vielhütig mit gemeinsamem Strunk:
 - a) Substanz blaß, faserfleischig: Vielhüter 51—55, S. 209,
 - b) rostbraun, schwammig, Poren grünlich: Polyporus 81, S. 214;

2. einzeln, holzhart, lackiert-glänzend: Ganoderma 128, S. 222.

III. An lebenden Stämmen.

1. Zentral- oder seitlich gestielt:
 - a) Stiel abgegrenzt-schwarz: Schwarzfüße 65—68 (55), S. 212.
 - b) nicht abgegrenzt-schwarz: Polyporus 69—74, S. 212;
2. ungestielt, fächer-, muschel-, hufförmig:
 - a) Hut inkrustiert, Röhrechen mehrschichtig: Fomes 129—146, S. 222.
 - b) mit pergamentartiger Haut, Röhrechen einschichtig: Placoderma 147—153, S. 226,
 - c) weder überhäutet, noch inkrustiert:
 - α) dachziegelig-gehäuft: Polyporus 75—81, S. 213,
 - β) stets einzeln: Polyporus 82—88, S. 215,
 - γ) Substanz rostfuchsig: Polyporus 81—84, S. 214 (116—118, S. 220),
 - δ) Substanz marmoriert-fleischrot: Fistulina 184, S. 233.

IV. An faulen Hölzern oder Stümpfen.

1. Zentral- oder seitlich gestielt:
 - a) mit verästeltem Stiel, vielhütig: Merisma 51—55, S. 209,
 - b) mit abgegrenzt-schwarzem Stiel: Schwarzfüße 65—68 (55), S. 212,
 - c) Stiel einfach, nicht abgegrenzt-schwarz: Polyporus 69—74, S. 212;
2. ungestielt-ansitzend, fächer- oder muschelförmig:
 - a) Poren flach, netzig-faltig: Merulius 185—189, S. 234,
 - b) Poren labyrinthisch-gewunden: Daedalea 167—173, S. 230,
 - c) verschieden-tief, wie eingebohrt: Trametes 154—166, S. 227,
 - d) gleichtief, von Substanz abgegrenzt:
 - α) Substanz saftig-fleischig:
 - αα) Poren farbig: Polyporus 89—98, S. 216,
 - ββ) weißblau: Polyporus 99—108, S. 217;
 - β) von Anfang saftlos, wergig:
 - αα) Poren blaß: Zonenporlinge 119—127, S. 221,
 - ββ) fuchsig, schillernd: Schillerporlinge 114—118, S. 220.