

2176

w
b

Ex Libris

Lehmann DV 1303

Cluvin (d. l'Érux) Caroles.
1526-1609. Made it one of the occupations
of his own and busy life to travel and
publish the narratives of travellers and
collectors in distant lands. He studied at
several universities, searched the wilder
parts of western and central Europe for rare
plants, lived at Montpellier in the house of
the scholar, worked the imperial botanic
garden at Vienna, was intimate with
Boeckl and Dodonæus, a correspond.

Chesney. - Français =
2^e Edition -

Voici son article dans
la Biographie universelle
de Michaud, tome 23, page

519

Le traité suivant qui
n'est qu'une traduction,
n'y est pas mentionné

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK

- Medizinische Abt. -

DUSSELDORF

V 2992

Versteigerung 1852

~~Ermauerung~~
~~1852~~

UNIVERSITÄTS- UND
LANDESBIBLIOTHEK DÜSSELDORF

Antidotarium,

siue

DE EXACTA COMPONENTORVM
MISCENDORVM M-
QUE MEDICAMENTORVM RA-
TIONE
LIBRI TRES.

Omnibus Pharmacopæis longè utilissimis,

Ex græcorum, Arabum, & Recentiorum Medicorum scriptis maxima cura & diligentia collecti.

Nunc verò primum ex Italico sermone Latini facti.



LVGDVNÆ
APVD THEOBALDVM
PAGANVM.

1561.



ALPHABETICUM

liber

DE EXACTA COMPOSITIO

DE EXACTA COMPOSITIO

DE EXACTA COMPOSITIO

DE EXACTA COMPOSITIO

DE EXACTA COMPOSITIO

DE EXACTA COMPOSITIO



DE EXACTA COMPOSITIO

DE EXACTA COMPOSITIO

DE EXACTA COMPOSITIO

DE EXACTA COMPOSITIO

DE EXACTA COMPOSITIO

DE EXACTA COMPOSITIO



DE EXACTA COMPOSITIO

DE EXACTA COMPOSITIO

DE EXACTA COMPOSITIO

DE EXACTA COMPOSITIO

CAROLVS CLV-
SIVS PETRO COL-
DENBERGO PHAR-
MACO PŒO ANT-
VERPIANO S.

Rodit superioribus die-
bus Libellus Italicè con-
scriptus (Dispensarium
vocant) medicamento-
rum compositiones cōtinens. Eum
cūm perlēgissē, dignum iudicavi
qui & reliquis nationibus eius lin-
guæ ignaris communicaretur: nam
in eo medicamenta meliori metho-
do descripta conspiciebam, quā in
reliquis Antidotariis, & multas insu-
per veterū Medicorū composi-
tiones in vsum reuocari, quæ a maioribus
nostris planè neglectæ fuerant.
Quare tecum cōmunicata, hortari
me cœpisti, vt illum latinū facerem.

A 2 Ego.

Ego qui noueram me huic oneri im-
 parem, nec tam cōfirmato esse iudi-
 cio, vt in hac Medicinæ parte præ-
 clari quidquam à me expectari de-
 beat, quātum potui reluctatus sum,
 ne meam inscitiam proderem: scie-
 bam enim quā præclarè cum illis
 agatur, quibus hoc tempore priua-
 tim suis studiis frui licet. Sed cum ni-
 hil agerem, idque à me tu & Plauri-
 nus tantoperè expererētis, conatus
 sum mihi persuadere, vobis assentiē-
 dum esse, meum iudicium quantum
 potui fallens. Quòd si conceptæ spei
 noster conatus non respōderit, ve-
 stro periculo id esto, quādoquidem
 me huc impulistis. Vides igitur, mi
 Goldenberge, quā duram vterque
 ceperimus provinciā: tu, qui talem
 opinionem de me conceperis: ego,
 qui, dum eam veram esse mihi per-
 suaderi sino, negotium hoc sum ag-
 gressus. Versiōnem itaque ad finem
 perduxi

perduxi, de qua hoc affirmare pos-
sum, summam me operā adhibuisse,
vt, si minus feliciter, at certè fideliter
& propriè singula redderētur, & cō-
positiones aliquot corruptæ resti-
tuerētur: qua in re plurimū mihi pro-
fuit, quē admodū nonnullæ cōposi-
tiones à te emēdatę ac restitutę testa-
ri possunt. Ad hęc singulorū ferè me-
dicamētorū facultates ex ipsis Auto-
ribus collectas adieci, ne quid in aliis
esset, quod in hoc desiderari meritò
posset. Deniq; talē effeci, vt cū opti-
mis quibusq; Antidotariis conferri
posset. Cæterū, tametsi huius vti-
litatem satis pro dignitate cōmēdare
non queā: quoniam tamē varia sunt
hominū iudicia, atq; ille hoc, hic il-
lud præferendū censeat, fieri nō po-
test vt quis omnibus placeat, atque
adeò hæc ratio est, cur tot quotidie
prodeant nouæ Medicamētorū for-
mule. Sed vtinā, aut tu, (quod futu-
rum

6
rū spem fecisti) aut alij viri eruditi in
Nicolao restituendo operā aliquādo
collocetis, vt hic suo nitore ad veterū
exemplarium fidem restitutus, vnus
proponatur omnibus Pharmacopo-
lis, cuius normā in conficiendis me-
dicamentis sequātur, relictis vulga-
ribus Dispēsariis plerunq; corruptis-
simis: aut sanè D. Rondeletij viri do-
ctissimi pharmacopœa in publicum
tandē emittatur: hæc enim vna mul-
torum Dispēsariorum instar omni-
bus esse possit. Quod reliquū est,
non inconsultè me facturum existi-
maui, si opus iam absolutū tuæ fidei
cōmitterem, & veluti tuū facerem:
Nam, cū ad eius versionē me im-
puleris, eius etiam curam atque pa-
trocinium te suscipere æquum est,
illud apud te cogitans, vt si dignum
iudices, in publicum prodire sinas,
sin minus, supprimas. Vale, Pari-
sis 1561. Cal. Aprilis.

CLA

CLARISSIMIS VIRIS

Consulibus facultatis Medicæ &
Pharmacopœæ in vrbe Florentina,
collegium Medicorum S.



Agna cum ratione prudentiâque à ve
stris antecessoribus constitutum fuit,
viri Clarissimi, vt omnes huius no-
stræ vrbis Pharmacopœi, in Medica-
mentis componendis, idem Antido-
tarij exemplar sequerentur: ne, si qui fraudem

committere vellent, facultas illis adimeretur, in
eos animaduertendi. Quæ sanè fraus facilè latere
potuisset, si pharmacopœi Medicamenta sua ad
eandem normam componere coacti non fuissent.
Hinc factum est, vt qui id temporis Magistratu
fungebâtur, collegio Medicorum prouinciam de-
derint, singulas Medicamentorum compositiones,
Receptas vulgò appellant, examinâdi, ac in vnum
quâsi corpus colligendi: his animaduersionibus ad-
hibitis, quas Medicamentorû compositionibus ne-
cessarias iudicarent. Et hæc quidem omnia lingua
vulgari & vernacula, vt cum his qui in vrbe, tum
iis qui in hac vniuersa ditione sunt, communia es-
sent. Quibus summa cum diligètia peractis, Com-
positiones omnes quæ in vsu erant, in vnum volu-
men transcripserunt, quod in hunc vsque diem
omnibus Pharmacopœis commune fuit.

Cæterum cum perierit hic liber, & alia plera-
que noua medicamenta in lucem prodierint: iis-
dem impulsu rationibus, quibus maiores vestri, &
vestros Pharmacopœos eandem regulam in Medi-
camentorum compositione sequi cupientes, Medi-

A 4 CTS

8
cis huius ætatis præcepistis, vt, perlecto eo Antidotario quod olim in vsu fuit, ea insuper illi adderent, quæ magno cum iudicio euulgata sunt.

Dum autem per omnia vobis satisfacere, vt decet, studemus, ea qua potuimus breuitate & perspicuitate in hunc librum collegimus, quicquid ad munus nobis iniunctum necessariò requiri posse arbitrati sumus.

Vos itaque conatum hunc nostrum boni consuleret, & de eo, in Reipublicæ vtilitatem, ac Dei gloriam, pro vestra prudentia constituere, etiã atque etiam rogamus.

ARGVMENTA SINGVLO- RVM LIBRORVM.

PRIMVS, De Medicamentorum simplicium delectu ritè faciendorum de eorundem præparatione ac conseruatione agit: demique Medicamentorum compositorum genera, eorumq; miscendorum & administrandorum rationem explicat.

SECVNDVS, Omnis generis Medicamenta, que hodie in vsu sunt, continet eaque ex variis Autoribus excerpta, vt cuiuslibet ex Medicamentorum inscriptione perspicuum est.

TERTIVS, Isq; vltimus, Ponderum & Mensurarum descriptiones docet: deinceps Succedaneorum catalogum ex veteribus Medicis collectorum complectitur.

ANTI

ANTIDOTARII, SIVE DE
componendorum, miscendorumque
Medicamentorum exacta ratione

LIBER PRIMVS.

De Pharmacopœi officio.



Elici ingenio, & corpore bene
constituto, moribus item cõ-
positis Pharmacopœi esse de-
cet; liberalẽ, non auarũ, fidum,
& à pueris in simplicium cognitione di-
ligẽter nõ solũ versatũ, sed qui omnia
loca perlustrarit, vnde sibi plantas, aliãq;
medicamẽta colligere possit. Latine præ-
terea linguæ tam peritũ esse oportet, vt
Dioscoridẽ, Galenũ, Serapionẽ, Mesuẽ,
Auicẽnã, reliquosq; qui de materia *Phar-*
macopœi scripserunt, intelligere possit.

Eius officina salubri loco sita sit, quam
nec v̄ti perf̄et, nec Sol permeet, nec fu-
mus, nec teter odor vllus molestus sit: va-
riis præterea reponẽdis cõseruãdisq; ac-
cõmoda: nõnulla siquidẽ locis subterra-
neis, pleraq; aditioribus præparãda & cõ-
seruãda sunt. Hortũ insuper, aut locũ ali-
quũ Soli expositũ habeat, in quo & sic-
care quæ siccãda sunt, & albedinẽ etiam
quibusdã medicamẽtis cõciliare possit: in
quo deniq; omnia ea parari possint, quæ
ex Medicorũ præscripto ad Solẽ confici
debent.

A 5 DE

DE MEDICAMENTO-
RVM SIMPLICIUM DE-
lectu ac conseruatione.

Simplicium genera.



EDICAMENTA simplicia,
aut omnis generis Plantę sunt,
earũmq; partes, aut animalia &
earũ partes, aut Terrę genera,
aut Lapidum, aut Metallorum, quęq; ex
eorũ venis eruuntur, aut fodinis nascũtur
aut mari falsiſſe aquis aut dulcibus. Ex
his autem quędam apud nos nascuntur,
quędam aliunde adferuntur.

Noſtratia, quo tẽpore, quo loco, & qua
ratione colligi & reponi debeant, regulis
quibusdam comprehendemus.

Peregrina verò, quomodo ſint dignoſ-
cẽda & deligẽda docebimus: deinde (quia
plerunq; contingit, vt quę ex locis remo-
tioribus aduehantur, magno emanant,
eãmq; ob cauſam adulterentur, aut pluri-
mum de ſua generoſitate deperdant) ſigil-
latim notas perſequemur, quibus medica-
menta illa rara, quę facile adulterari ſo-
lent, aut alioqui exoleta ad nos veniunt
(tum quòd ſine vllò delectu collecta ſint,
aut malè ſeruata, tũ tẽporis diuturnitate
euanida) à veris & ſynceris diſcerni poſ-
ſint,

sint, ne medicamenta ea parte deficiant, in qua plerunq; maior illorūvis reposita est.

De Herbis Nostratibus.

Quæ apud nos nascuntur Herbæ in montibus, collibus, & planis locis: ipsis montibus altissimis colligi debent, locisque soli & vento expositis, paucis exceptis quæ collibus frequentiores, magisque odoratæ sunt, ut chamædrys & chamæpitys.

Quæ verò locis planis duntaxat nascuntur, ea locis siccioribus, & à lacubus & fluminibus procul distitis colligenda sunt, nisi riguis gaudeant, ut nymphæa, tribulus aquaticus, lens palustris & similes.

Cæterum iam florentes, & semen quodammodo conficientes colligi debent cælo sereno, nullis per aliquot ante dies decidentibus pluuiis, nec etiam rore nimium madetes, nimiove Solis calore retorridæ.

Deligendæ sunt succi plenæ, floridæ, fugiendæ grandiores, graciliores & marcidæ. Comæ ergo cum foliis & floribus sumendæ.

Siccantur in umbra loco ad Meridiem spectante, non humido, puluerisque & fumi experte.

Pyxidibus reponendæ, ne à prædictis offendi possint. Seruant suas vires an-

NUM

num vnum: itaque quotannis renouãdã, nisi si anno collectã fuerint, cuius temperies admodum sicca fuerit pluuiarumque expers & contra subsequatur æstas admodum humida: tunc enim præstat his vti, quæ sicco illo anno superiore collectæ sint, quàm quæ subsequenti pluuioso.

De Herbis Peregrinis.

QVOD ad Peregrinas herbas attinet, quæ apud Veteres in pretio erant, certis- que quibusdam locis nasceretur, ad quos nunc nõ datur accessus, eamq; ob causam non adferuntur: omni diligentia animaduertendum est, an apud nos nascatur: deinde an illis facultate respondeant, notisque à Dioscoride atq; aliis tum veteribus tum neotericis authoribus delineatis: an præterea natales conueniant, veluti si mōtes sint similes, quales hi erant in quibus nascebantur, quæ tantoperè ab illis laudabantur. His certè similes sunt in Italia multi, præsertim in Hetruria & Liguria, in quibus herbæ colliguntur non minus generosæ quàm quæ è Creta, aliisve locis celebratis petebantur, præsertim si nec ver, nec æstas admodum pluuiosa fuerit, obseruato scilicet tempore colligendi, & reponendi modo, vt supra dictum est.

De

*De herbis peregrinis quæ apud nos
non nascuntur.*

EÆ herbæ quæ apud nos non crescunt quâsque omnino aliunde aduehi oportet, ex Medicorum scriptis, vsuque quotidiano, notis quibusdam generalibus facile cognosci possunt, è quibus depræhendere licet, num ex plantæ collectæ fuerint loco, tempore, modoque conuenienti, tum etiã repositæ, ita vt nec temporis, nec loci, nec vecturæ ratione incommodum vllû passæ sint; quod ex odore, sapore, & earû colore depræhenditur, si insuper folia & flores ipsis ramis cohæreant.

De Floribus.

FLORES qui in quotidianum vsum veniunt, magna ex parte apud nos nascuntur: colligunturque iam aperti, antequam marcescant, iis locis in quibus ipsæ plantæ maximè celebres sunt. Siccantur & reponuntur vt ipsæ herbæ, durântque in sua facultate annum: singulis verò annis renouari debent, vt de Herbis dictum est.

Qui aliunde aduehuntur, ex odore, sapore, & natiuo colore dignoscuntur: si præterea adhuc integri sint, nec comminuti, vel si nullum aliàs vitium contraxerint.

De

De Seminibus.

SEMINA nostratia his locis colligenda sunt, quibus præstantissimæ herbæ nascuntur, eo nempe tempore, quo de herbis dictum est, cum videlicet maturuerunt, antè quàm decidât. Deligantur pleniora, non rugosa, & quæ odorem saporémq; sui generis perfectissimum seruât. Siccantur vt herbæ, deinde vasculis vitratis aut sacculis reponuntur, locóque sicciore & humiditatis experte. Cæterùm quæ certis regionibus celebrabantur (vt etiã ipsæ herbæ) his locis, si fieri potest, colligi debent quæ proximè accedant ad eorum similitudinem, quæ à veteribus cõmendabantur. Nostratia annum aut biennium durant.

Quæ foris, & peregrinis regionibus adferuntur, considerare oportet, an notis respondeant à Medicis præscriptis, & in eorũ cognitione exerceri, vt ex sapore & odore dignosci possint. Deligantur ea quæ corpulenta sunt, nec rugosa & cariõsa.

De Fructibus.

FRUCTVS nostrates his locis colliguntur, vbi eorum plantæ sunt præstantissima. Colligantur autè dum maturuerunt, antè quàm marcescant. Deligantur pleniores & bene habitæ. Siccantur sole aut cõlibano pro humiditatis illis innatæ ratione

tionem. Reponuntur armariis, pyxidibus, & locis quò neque humor ullus, neque fumus, neq; puluis pertingere possit, & mutantur quotannis.

Fructus peregrini ex ipsorum notis particularibus dignoscuntur, eorúmque præstantia illis ipsis cognoscitur signis, quibus etiam semina.

De Radicibus.

RADICES colligendæ sunt locis aptis, optimæ quæque, & præstantissimæ, fructu iam deperdito, & incipiente foliorum defluuiò, cælo sereno; pluuiæ namque illas imbecilliores reddunt, & humore crudo implent. Siccantur autem cum integræ, scilicet quæ sunt exiguæ, ut valerianæ radix, asari, ruscii, asparagi, & similia: tum in taleolas sectæ: tum etiam matrice exempta, & solo cortice reseruato: deinde filo trajecta paruis intervallis ne sese contingant, suspenduntur loco supra recitato, donec pbe siccate fuerint, veluti radices gentianæ, bionniæ, carlinæ, centaurij maioris, & similia, quæ plane eodem modo quo herba reponuntur. Exiguæ radices in annum seruantur: Maiores in biennium. Mutandæ autem sunt intra id tēpus, si anni temperies sicca fuerit: sin autem admodum humida fuerit, eo præsertim tēpore
que

quo radices colligendæ sunt, satius est illis vti quæ præcedente anno collectæ sint, modo ea qua dictû est ratiõe seruata sint.

Exoticæ Radices peculiaribus notis dignoscuntur: Deligendæ autem sunt quæ saporem, odorem, & colorem sui generis perfectissimum habeant, quæque sint bene habitæ, non cariosæ, non marcidæ, nec rugosæ si fieri possit.

De succis.

Succi ex plantis eliciuntur, virètium & tenerorum foliorum, cauliumve tritura, & manuum aut torcularis expressione. Horum statim ab expressione vsus est, ad seruandûq; aut liquidi, aut siccati, aut cû saccharo mixti in modû Syrupi. Qui liquidi seruandi sunt, igne aut insolatione à crassioribus partibus repurgantur, & in phialam iniiciuntur superfuso aliquâtulo oleo. Qui sicci reponēdi sunt, aut sole, aut igne probè siccantur: tum demum vasculis vitratis, aut pyxidibus reponuntur. Liquidi murantur quotannis. Sicci verò & apud nos expressi, aut singulis annis, aut ad summum biennio.

Externi generatim dignoscuntur, aut odoris, saporis, coloris præstantia, aut si non puluerulenti sint, aliõe modo corrupti.

De

De Liqueoribus, Lachrymis, & Gummiis.

LIQVORES, Lachrymæ, & Gummi quæ Medicis in vsu sunt, magna ex parte peregrina sunt. Nostra verò ex stirpibus adultioribus desuunt, aut ex succo prægnantibus exprimuntur.

Iisdem verò notis Peregrina cognoscuntur, quibus supra dictum est: eorum autè præstantia, aliorum quorundam collatione: quorum sigillatim mentionem faciemus, cum de simplicibus medicamentis agemus.

De Corticibus.

CORTICES quibus Medici vtuntur, partim è fructibus, partim ex radicibus, partim ex ramis sumuntur, loco, tempore, & modo conuenienti, vt dictum est.

Peregrini prædictis rationibus dignoscuntur: de quibus etiã sigillatim agemus: de his præsertim, quæ in frequentiore vsu sunt.

De Lignis.

LIGNA magna ex parte peregrina sunt. Nostra autem ex arboribus adultis decerpenda sunt.

Peregrina particulatim tractabimus.

De Medicamentis ex Animalibus desumptis.

EX ANIMALIBUS integris, aut eorum partibus medicamenta sumuntur: Præferenda autem ea sunt, quæ ex Animalibus medietatis,

B ætatis,

ætatis, bene pinguibus, benèq; habito corpore defumuntur. Quo modo autem præparentur & conseruetur, postea dicemus.

De iis quæ ex terra & aquis sumuntur, item de Metallicis, & Terris.

Hoc Medicamentorum genus plerûq; peregrinum est. Itaque de singulis quæ in maiore vsu sunt agemus, & aliis quibusdam, quæ, cum aliunde adferantur, difficile cognoscuntur. Horum autem descriptionem dabimus ex antiquis Scriptoribus, easque notas enumerabimus, quibus & eorum præstantia, & adulterium, si quæ sunt adulterina, facile deprehendatur, eaq; omnia ordine alphabetico trademus.

A C A C I A planta est spinosa, è cuius fructu succus acacia exprimitur, quem, quoniam non habemus, non necesse est describere, sed in succedaneis, quid eius loco sumendum sit, dicemus. Manat & gummi ex ea spina, quod videtur gummi tragacanthæ vulgare, vt in eius historia dicemus.

Acorus teste Diosc. folia fert iridis, radices non dissimiles, summo cespite sparsas, complicatas, geniculis interceptas, in obliquam actas, albicantes, gustu acres, & vt Gal. ait, modicè amaras & odoratas, Optima est densa, cædida, carie nō exesa,
plena,

plena, odorata. Ceterū omnes has ferè no-
tas habet ea radix, quę hodie vocatur cala-
mus aromaticus. Hęc ob causam, hęc sem-
per pro acoro sumenda est, siue ea quę in
Succedaneorum catalogo recensetur.

Adeps ex animali florente legitur. Eo-
dem autem tempore non colligitur om-
nium animalium adeps, quòd eodem tem-
pore non pinguescant. Reponitur autem
bene lotus, & ab omni cruento aliisque im-
munditiis repurgatus, loco sicco ad Aquil-
ones spectante: siue figulinis vasculis vi-
tratis, foliis lauri siccis conuolutus, & ob-
turator: aut exemptis membranis dili-
gentissimè tritus, & duplici vase liquatus,
sictili vitrato bene obturato locis siccis.
Recens etiam & sine sale vsurpatur: &
quando adipem absolutè reperies, sumes
adipem recentem illius anni, & sine sale
conditum, quia post illud tempus mutat
qualitatem, aliisque præditus est faeu-
tatibus.

Aes qua ratione vrendum sit, vt eius in
Medicina vsus esse possit, postea dicemus.
Aes verò vstum illud est, quod Italicorum
vulgo Ferretto di spagna vocatur. Pro-
batur rubrum, & quod tritum colore
cinnabarim imitatur.

Aloë succus plantę eiusdē nominis no-

B 2 rissima

tissima est. Eius apud Diosc. duo sunt genera: quoddã arenosum, quod sedimentũ purissimæ esse videtur: alterum iocinoris modo concretum, ex quo nomen vulgare sumpsit aloës hepaticæ. Eligi debet pinguis, syncera, calculorũ & arenularũ expers, nitida, rufi coloris friabilis, iocinoris modo coacta, facile liquefcens, & eximie amaritudinis. Improbatur nigra, difficile liquefcens. Adulteratur gummi, quod depræhenditur gustu: nã non valde amara est, neq; tam validi odoris, neq; digitis friata ad minima vsq; frustra resoluitur. Nonnulli, teste Diosc. illã succo acacię adulterat, quod maleficiũ gustu depræhẽditur, minus em̃ amara est, magisq; adstringit.

Aluminis apud veteres tria fuerũt genera, Liquidũ, Rotundũ, Scissile, quo dũtaxat vtimur sub nomine vulgari aluminis plumæ. Cæterũ quotiescunq; in medicamento alicuius compositione alumen simpliciter reperitur, scissile intelligendum est, veluti omnium efficacissimũ. Optimũ est candidissimũ, valde adstringens, graui odore, non lapidosum, non compactum, sed plerunq; in capillamenta quædam canescentia dehiscens. Ex Aegypto adfertur. Adulteratur lapide Amiantho, sed gustu dignoscitur, quod non adstringat.

Præter

Præter iam recitata aluminum genera, factitia tria reperiuntur: nempe alumen fixum, quod fit ex vini facibus Sole sicca tis donec albescant, deinde vstis. Alumen catinum, quod fit è cineribus herbæ Kali, seu sodæ vulgaris: Alumen scaiolæ, idque fit è lapide speculari, quem vulgò speculum asini vocant.

E' factitiis etiam sunt alumen roçæ, & zucharinum: illud ex lapide candido, interdum sub rubro sæpius præparato: hoc verò ex alumine roçæ, saccharo, & oui albumine paratur. Aluminis liquidi & rotundi loco, satis commodè vsurpare possimus alumen roçæ.

Ambra citrina, Latinis succinū, Græcis *λίχτηρον*, & Arabibus carabe dicta, ex quo rundā sententia nascitur è liquido bitumine, quod è littoribus defluēs in mare, concrefcit eo quo videmus modo. Reperitur in Germaniæ maritimis, pcellis in littus prouoluta. Eius sunt aliquot genera: Fulua, quæ pellucida est, cādida, & similibus aliis coloribus prædita: Candida verò, quòd leuior sit, & odoratior, optima cense tur. Probatum ea quæ attritū calefacta, illico paleas, aliásq; res minutas ad se trahat, & quæ accensa bituminis odorem reddit.

Ambra odorifera quæ ex Arabia fœlice, & India

& India defertur; iuxta quorandã sententiam etiam ex bitumine nascitur, eodem quo ambra fulua Germanica modo. Hæc plerunq; in ventre piscium reperitur, quæ copiosius vorata moriuntur. Laudatur quæ circa eorum renes reperitur: improbat quæ in stomacho est: ea verò optima habetur, quæ nondum à piscibus deuorata est, tamen in ipsis piscibus non aspernanda interdum reperitur. Optima est quæ ex India aduecta fuluescit: post eam, quæ ex Arabia fœlici adfertur. Est etiam Factitia ex moscho, ziberho, ligno aloës, styrace & ladano: Odor auem rerum ex quibus fit, & color qui plerunq; niger est, illam prodit: præterea aquæ imposita citius mollescit quàm natua.

Ammi hodie à nonnullis ostenditur, foliis fœniculo tenuioribus, caule gracili, umbella in qua candidi flores & semen minutissimum, cumino similis, non per omnia respondens veterum descriptioni. Plerique existimant, semen quoddam ex Hispaniis sub amomi nomine allatum, verum esse ammi, aut saltem eius loco usurpari posse. Vide succedanea.

Amomi planta hodie Italiæ incognita est, ideoque plura non attinet hîc dicere: Eius succedaneum reperies ad libri calcem.

Aristo

Aristolochie tria genera Dioscoridi recensentur, Rotunda, Longa, Clematidis. Rotunda hodie notissima, radicem habet rotundam rapi modo, reliquasque notas quas illi tribuit Diosc. Longa autem paucis adhuc cognita, quandoquidē ea quæ hodie pro Longa exhibetur vulgo, quibusdā est tertia species Clematidis dicta, quod non habeat radices quaternos digitos longas, velut Longa Diosc. sed longissimas & graciles, quales Clematidis describuntur, tamen si (si Diosc. textus non est mendosus, ut aliqui existimant) folia sempervivui minoris non illi conveniant. Itaque quænam sit aristolochia Longa & Clematidis, dubitatur. Cum verò Rotunda sit omnium efficacissima, eius usus esse debet, quotiescunq; aristolochiæ nomen absolute reperietur: imò etiam Longæ & Clematidis loco usurpari potest. Vulgaris Longa omnium imbecillima est.

Armoniacū, Græcis & Latinis Ammoniacum dictum, lachryma est ferulæ Dioscoridi. Notissimū est. Probatum bene coloratum, minutis glebis thuris similitudine, densum, syncerum, castoreum odore imitans, gustu amarum, ligni, calculorum, similitumque sordium expers.

Asa fetida, plātæ peregrinæ lachryma

B 4 aut

aut succus est. Sunt qui existiment silphij succum esse in Media aut Syria nascentis, qui, teste Diosc. grati odoris non erat, vt Armeniacus aut Lybicus, quem nonnulli asam odoratam esse arbitratur & belzoin officinarum: sed non conuenit. Nā Diosc. hunc vt præstantissimū & efficacissimū laudat: Arabes verò asam foetidam calidiorem & potentiolem asserunt: Multò minus belzoin esse potest, quod tantā ex-calfaciendi vi præditum non est, quantam illi tribuit Galenus, dum laserpitij loco euphorbium non recens substituit. Aspalathum, quòd nondum habeamus, & in officinis prorsus sit incognitum, non describemus: sed eius succedaneum inter cætera recensebimus.

Auripigmentū metallica res est, aurum colore imitās. Eius apud Diosc. duo genera. Vnū è multis squamis, vt altera alteri imposita videatur, cōstat: Id, si purū fuerit, nec vlli materię permistū, optimū existimatur. Alterū colore sandarachæ, hoc est rubrum, glandis effigie. Deligendū ergo aureo colore micans, è tenuibus squamis compactum, quod facillè finditur, & lapillis aut terræ permistum non est.

Ex auripigmēto natiuo fit Artificiale, at senicū videlicet & Reagal vulgo vocatū.

BAL

BALSAMO cum careamus, nulla eius hic fiet mentio, sed eius succedaneum inter reliqua ponemus.

Bdellium lachryma est sarracenicæ arboris, inquit Dioscorides. Probatum gustu amarum, translucentum taurini glutinis modo, intus pingue, & si tactu subigitur, mollescens, ligni ac fordis expers, odore unguis marini incensum. Facultate, secū dum, est veluti siccū, resinofum, liuescens. Tertium est Indicū, sordidum, nigrum, grandioribus glebis in offas cōvolutum. Adulteratur gūmi: sed id minus est amarum, & suffitu minus odoratum. Ex eo quod in vsu est deligendū quod maxime accedit ad prædicti notas, donec præstantius aliquod aduehatur.

Bedeguar, Dioscoridi spina alba dicta, ex quorundam sententia ea est planta spinosa, quæ folia habet longa, angusta, maculis albis distincta, capitula spinosa, & in his flores purpurascens: Nascitur in Hetruria locis mōtanis præsertim. Huic conueniūt omnes ferè notæ à Diosc. traditæ, ideo veræ loco vsurpari potest, aut illi substitui, vt infra dicemus.

Been album secundum quosdam polemionium est Dioscoridis, ea inquā planta quæ radice constat cubitali, candida, cau-

B 5 le ge

le geniculato, betonicę altili vocatę nō dif-
simili, ex quo depēdēt vesiculę seu folliculi
quidā rotūdi & cādidi, folia polygono ma-
ri similia, maiora tamē & lōgiora, ex in-
teruallis bina. Notissima est p̄ Hetruriā.

Been rubrum, aliqui Dioscoridis tripo-
lium esse volunt: Pro hac ostendūt plantā
quandam in maritimis nascentem, foliis
glasti, magis virentibus longioribusque;
caule per summa diuiso, flosculisque pur-
pureis onusto; radice rubra, palmum lō-
ga & contoita. Been rubrum cum hac de-
sriptione magis quadrat, quā albū cū
polemonia: donec tamen certius de ea iu-
diciū statuatur, eius succedaneō utemur.

Belozin gummi est arboris peregrinæ
(non autem laserpitium) agallochi forsi-
tan, vt quorundā est opinio, quod vulga-
re est lignū aloës. Optimū censetur trans-
lucens, albis præditū glebulis. thuris emu-
lum, rubescens, odore grato, & quādo vri-
tur xylo aloës odorem referēs: hac enim
ratione ab adulterino dignoscitur.

Berberis à Dioscoride spina acuta vo-
catur. Ceterū tametsi incertū est, an fru-
tex ille sit spinosus qui Italis Crespino di-
citur, an verò ea planta quæ passim in om-
nibus ferè sepibus nascitur, foliis inci-
sis, mespilo aronię similibus, an alia quę-
dam

dam planta: vulgari tamen berberi vti possumus, donec aliud statuatur.

Bitumen, Græcis *ἄσφαλτος* dictum, est veluti terra adeps qui facillimè ignè concipit. duùm est generum. Quod liquidum est vt oleum, vulgo petroleum vocatur, omnibus notū, Aliud densum picis modo quod, antequam concresecat, liquidum aquis supernatare solet: Huius generis est quod in Iudæa nascēs peculiariter asphaltos dicitur: videtur autē id esse quod vulgo sic hodie vocatur. Eius verò probatio est vt purpurex modo splendeat, sit'que ponderosum, & validum odorem vibret. Nigrum autem & sordidum vitiosum est. Adulteratur pice, quod color niger indicat, & picis odor.

Quod Babylone natū naphtha vocatur, teste Diosc. bituminis cādidū aut etiam nigri colatura est, Vis ei igniū rapax. Huius loco quia ad nos non adfertur, nostro petroleo vti possumus: quemadmodū etiam asphalti loco, si dubium esset an asphaltus sit bitumen Iudaicū. Si quis autem asphalti modo densare volet vase æneo aut ferreo illud coquet, & quia facilè flammam concipit, flamma, panno lineo madente in vas vbi percoquitur demisso, extinguetur. Hac ratione concretum petroleum

leum pro naphtha & asphalto vsurpari potest.

Quod in Apollonia Epirotarum nascitur, quòd mistam bitumini picem redolect, pissasphaltos appellatur, & mumia Arabum esse creditur, tametsi mumiam etiam appellét, Confectioné quandá quæ cadauera cõdiuntur. Factitia etiã est pissasphaltos, admixta pice bitumini.

Aliud porrò bituminis genus est lapidis modo induratũ, veluti terra pharmaticis, aut ampelitis: Deinde quod instar fragmẽtorum ligni terra effossum, sed atrũ vt carbo, multis locis reperitur: Multi præterea alij lapides & gummi bituminis naturam habent quæ omnia breuitatis causa prætereo.

Bolus Armenia hodie duorũ est generum: alterũ Orientale: alterum Nostras, quod multis locis nascitur vbi sunt ferri fodinæ, vtraq; rubricæ species est. Existimãt nõnulli bolum Orientalé ex Armenia aduehi, esséq; illã ipsam quã Galenus colore pallido, Arabes luteo, croco similem describunt. Cæterũ cum illa sit rubra, vt dictũ est nõ abs re dubitatur, an sit bolus Armenia. Alij putãt verã esse terram Lemniã, quæ olim Capræ imagine signabatur, aut eã potius quæ Galeno rubrica

brica Lemniã vocatur, à terra Lemnia differens, Nam rubrica manus inficit, terra verò minimè. Vt vt sit, existimamus alteram alterius loco vsurpari posse, vt postea dicemus. Nostrate vt possumus in medicamentis foris applicandis.

Borax notum est officinis. Fit è lapide translucido borace dicto nitri fossilis genere. Huius vsus est in medicamentis & Aurifabrorum officinis, quemadmodum apud veteres chryfocolle. Hęc metallica erat & factitia. Metallica in aurariis, argentariis, & ærariis fodinis reperiebatur: præstâtissima erat æraria, prasini coloris: sed & hodie adhuc in ærariis fodinis reperitur, arenę per se similis, aut materię metallicę permista, sed quę abrasa arenę similitudinē gerit. Factitia, ex pueri vrina in æreo mortario trita pistilo çreo fiebat: Hęc Medicis in vsu fuit. Sunt etiamnum alię factitię, quę Pictoribus tantum seruiunt.

CALAMVS aromaticus Dioscoridis hodie incognitus est. vulgaris autē calamus aromaticus, Acorũ fortè est, vt iam diximus. De eo nunc plura non dicemus: sed lectorem ad succedanea remitemus.

Camphora, Arabibus Indicę arboris lachryma est: Aliis verò, Indici bitumj-

nis genus. Ferūt Indos id bitumē quod ex cāphora natiua stillat excoquere, quod- que tenuissimarum est partiū albescere, & sublatum operculo adherere, caphurā- que in hunc modū conformari, vt illā vi- demus. Hinc fit vt Mercatores caphuræ bitumen plerunq; admisceant: sed nō ita candicat vt caphura illa modo iam dicto excocta. Eligatur alba, pellucida, synce- ra, valde odorata, quæ pani calido impo- sita madescit. Semine lini, aut milij, aut psyllij, aut pipere sepulta conseruatur, ne aëri exposita euanescat.

Cantharides officinis notæ sunt. Probā- tur in frumento inuentæ, versicolorēs, & & quæ luteas in albis transuersas lineas ha- bent, corpore oblongo. Cribro, aut fictili vase conduntur, cuius os raro linteo subli- gatū deorsum vertitur, vt excepto habē- tu aceti quā acerrimi feruētis æstu exa- minentur. Postea siccantur, & pyxidibus ligneis, aut fictilibus vitratis reponūtur. Biennium durant.

Cardamomum Græcorū, quod est cor- dumoni Arabum, tametsi multi dubitent quidnam sit. Illud tamen quod officinæ cardamomū maius appellāt, cardamomi Græcorum loco vsurpati posse videtur, quia aromaticam quādam acrimoniā,

nea

nec non amatitudinem, quamvis obscuram, habet. Aliud verò est cardamomum Arabū à Græcorum cardamomo: Eiusque duo genera cōstituunt, maius, & minus, vtrumq; nobis incognitum: nisi maius, illud intelligatur, quod melligerā aut granum Paradisi nuncupant. Semen est angulosum, acre linguam vellicans, non admodum aromaticum. Cardamomum minus officinarum nullo modo conuenit cum cardamomo minori Arabum, neq; ad aliquod cardamomi genus referri potest: sed est melanthij genus, vt in eius historia dicemus.

Cassia Græcorū, vt ex Dioscoride & Galeno colligere licet, cinnamomū siue canella officinarum videtur qua pro cassia commodè vti possumus. Præfertur longa, odorata, gustu cum acrimonia grato, rufescens: quod genus faciliè reperiri potest.

Cassia arabum, est cassia illa nigra solutiuā vulgo notissimā. Eligatur Alexandrina, amplis siliquis, grauis, quæ cōcusā, clausis intus granis non strepat, cortice læui & purpurascēte.

In Græcorū medicamētis, si cassia præscribatur, eius loco canella optima sumēda est: rum etiam in Arabum scriptis, vbi Græcorū remedia recensent: & iis etiam
medā

medicamentis quæ corpus non soluunt. Sin autē remedia ab Arabibus descripta sint: aut in eum vsum præscripta, vt corpus purgent, cassia nigra vti debemus.

Castoriū, castoris testes sunt. Eligi debent, inquit Diosc. qui ex vno principio committūtur, liquore in eis veluti ceroso, odore graui & virus redolēte, gūstu acrimordente, friabili, ac multis naturalibus tunicis circumdatō. Adulteratur gummi armoniaco cum castoris sanguine & castorio subactō, deinde in vesiculā cōiecto & siccato. Deprehenditur fraus ex notis prædictis, tum etiam quòd factitij testes, ipsis natiuis, qui plerunque sunt exigui, ampliores sunt.

Centaurium duorum est generū, maius, & minus. Maius Dioscoridi folia iuglandis habet, oblonga, viridi brassicarū colore, in ambitu ferrata, caulem ceu rumicis, binū aut ternū cubitorū, multis ab radice adnatis, in quibus capita ceu papaueris, in rotunditate oblōga, flos ex cæruleo candicans, cyanio flori perquam similis, verū maior: semen in floribus compactū, quale in floribus in papos euanescētibus esse solet: radix crassa, grauis, sesquicubitum longa, rubescens, succo prægnans rubescente, & cum adstrictione

ne quadam & dulcedine, acri. Huius radix sub rhapontici nomine officinis notissima est. Centaurium minus passim nascitur, notissimumque est ex Dioscoridis prescriptione. Maioris radix in usu est: Minoris coma cum floribus & semine.

Cera notissima est. Optima est subfulva, modicè pinguis, pura, odorata, mellis habitum quadantenus referens. Secundum locum obrinet candicans, & suapte natura pinguis. Laudatur Pontica & Cretica.

Chalcitis metallica est, in venis ærarijs nata, mediæ inter misy & sory facultatis, quibus caremus. De his vide succedanea.

Cinnamomum Dioscoridis hodie incognitum plerique existimant, tamen non desint qui in canellæ odoratioris capsulis facile reperiri posse putent, quia Diosc. cinnamomi quædam genera cassiæ similia facit. Vt cunque sit, canella optima, & cinnamomi, & cassiæ loco vsurpari potest, donec melius aliquod medicamentum quod substitui possit reperiatur.

Coagulum Leporis omnium præstantissimum est: deinde Hædi & Hinnuli. Excipitur antè quàm ipsa animalia aliud quiddam præter lac maternum degustauerint. Vituli marini coagulum excipitur prius quàm cum matre ad prædã natate possit.

C

Famo

Fumo aut sole exsiccata, & loco sicco ferriantur. Annum vnum aut biennium durant.

Costus Dioscoridi radix est candida, leuis, eximia odoris suauitate, qualem Arabicum esse dicit: hic præcellit. Secundum locū sibi vēdicat Indicus, crassus, leuis, vt ferula niger. Tertius est syriacus, grauis, colore buxeus, & odore nares feriēs. Optimus est recēs, albus, abundē plenus, dēsus, aridus, à teredinibus non erosus, sine graueolentia, gustu acuto ac linguam vellicans, & vt ait Galenus, aliquantulum amaro. Omnes ferē optimi costi notæ in angelicæ radice, quæ satis nota est, reperiuntur. Hinc fit vt nonnulli putent, eam pro vero costo substitui posse: vt verum fateamur, præstat eā costi loco vsurpare, quàm costum vulgare officinarum, quod à iam dictis notis alienissimum est.

Croci cum multus sit vsus, & sanis, & in Medicina, curā adhibenda est vt optimus, recens, & syncerus deligatur. Nam variis modis adulteratur: sed maleficium ex colore, odore, & pondere depræhenditur: siquidem adulteratus, nec vetus eam coloris gratiam habet, sed obscurior est, neque odoratus vt recens, sed situm redollet, & ponderosus est. Cæterum qui luteos quosd

quosdam flores admistos habet, odore & gustu dignoscitur, tum etiam quod eam coloris venustatem in tingendo non habet, quam syncerus. Qui sapa subtilis est, sapore dulci, & colore obscuro est. Cui permixta lithargyros, iusto ponderosior est.

Cubebæ, quarum in officinis usus, sunt fructus peregrinus, satis notus. Non sunt autem cubebæ Arabum, neque earum loco in Arabum præscriptionibus usurpari debent, sed canella: arbitratur enim Serapio cubebas esse carpesium; ex Galeni sententia eas facultates cubebis tribuens, quas Galenus carpesio tribuit, corticem cinnamomi simile esse asserens: imò cinnamomi loco carpesiū maiore quantitate substitui voluit.

Curcuma Arabū, radix est officinis nota. Creditur cyperi genus esse, quod Dioscorides in India nasci asserit.

Cuscuta, Græcis & Recentioribus casutha dicta, planta est capillaris, sine foliis, reliquas plantas inuoluens & enecās. Nota est. Deligenda est quæ in genista reperitur.

Cynoglossum vulgare omnibus notum, tametsi Dioscoridis cynoglossum nō sit, à Plinio tamen inter cynoglossi genera

C 2 ra des

ra descriptum putatur, & easdem cum illo habere facultates: quam ob causam eius vsus esse potest.

Cyperus iuncus est triangularis, interdum quadrangularis, cubitalis aut maior folia fert porracea, longiora & angustiora, in summo caude minuta, semen completentia: radices, quarum in Medicina vsus, inter se cohærentes, oleis oblongis similes, vel rotundæ, nigræ, suavi odore, & amaro gustu. Nascitur in palustribus. Duorum generum in Italia reperitur. Vnum exiguum, cui radices oleæ similes: hoc præfertur. Alterum maius, cuius radices inæquales & contortæ. Oprima ea est radix, inquit Dioscorides, quæ grauior est, densa, plena, dura, aspera, odorata cum quadam acrimonia, qualis est cilicia, syriaca, & à Cycladibus insulis petitur. Sic & quæ hodie quæ ex Oriente aduehitur, melior est nostrate.

Aliud Cyperi genus in India nasci Dioscorid. dicit, gingiberis effigie: quod croci modo tingit. Illud veterum curcuma esse non abs re plerique existimant.

DICTAMNUM, herba est in sola Creta nascens, pulegio similis, sed maioribus foliis, cana lanugine pubescentibus. Florem nullum aut semen profert, inquit Diosc.

Diosc. Theophrastus verò cæterique Auctores & caulem illi tribuunt, & florem, & semen, vt manifestè videre licet in dictamno quod hodie ex Creta adfertur, cui quidem conueniunt reliquæ Diosc. notæ, sed florem & semen profert.

Alia est planta, dictamnium album vulgo vocata, aliàs fraxinella, planè à dictamno Cretensi diuersa, quæ quamuis valde efficax sit, dictamno Cretensi substitui tamen non potest: hoc enim veteres intelligunt, cum absolutè dictamnium scribunt.

Diphryges, æris veluti subsidēs sæx est, quæ ære cocto, & post aquæ frigidæ effusionem sublato, ima fornacum parte coherens reperitur. Est etiamnum aliud genus factitium, quod ex pyrite æroso fit lapide multos dies vt calx cremato, donec rubescat vt rubrica. Deinde sublato reponitur.

Fiebat etiam eluti cuiusdam cyprij genere, hodie inusitatum. Priora verò duo genera facillè reperiri possunt. Adulteratur ochra exusta, quæ vt diphryges rubescit: Deprehenditur autem quod subito linguam non exsiccat, nec saporem æris reddit vt natium diphryges.

Dragagantum, Græcis tragacantha, lachryma est, quæ è radice plantæ cuiusdã

Spinofæ eiusdem nominis manans; concreuit. Præstat pellucens, leuis, gracilis, syncera & subdulcis. Videtur ea esse, quæ vulgo gummi Arabicum vocatur: Contra verò ea quæ tragacantha dicitur, gummi acaciæ esse, vt suprâ in acacia retulimus. Itaque cum vires habeant similes, altera alterius loco sumi potest.

ELATERIVM succuse est è fructu cucumeris syluestris, plantæ notissimæ. Optimū est leue, non ponderosum, cum candore leniter humectum, gustu amarissimum, quòdque lucernarū luminibus obiectum facile flagrat. Improbatur scabrum, turbidum, porracei coloris, medium erui & cineris colorem referens, & grave. Sunt qui amyllum immisceant, vt cadorem ipsum imitentur, ponderosiusq; sit. A' bimatū ad decennium vtile est inquit Diosc. tametsi aliter alij sentiant, Eius extrahendi ratio suo loco dicetur.

Ellebori duo sunt genera, album nimirum & nigrum. Album radicibus nititur multis, tenuibus, candidis, ab oblongo & exiguo capite exeuntibus cepatum modo: folia fert plâtaginis; caulem palmo altiore, cauum, tunicis conuolutum: satis notum est. Deligendæ sunt radices summis montibus collectæ tempore apto, candidæ,

dæ, mediocriter extentæ, friabiles, carnosæ, nullum in frangendo puluerem emittentes, quæq; sint medulla tenuis, gustu feruente, nec tamen id vehementer, quæ enim nimium acres sunt, strangulant.

Elleborû nigrû folia habet viridia, platanis similia, minora, foliis sphondylii proxima, pluribus diuisuris incisa, nigriora, & crassiora, subaspera: canlis asper, flores ex candido purpurei, cotoneis similes, racematim coherentes: in quibus est semen nigricans simile: radicibus nigris, tenuibus, elleboro albo similibus, quarum duntaxat est vsus. Eligi debet bene nigrum, corpulentum, plenum, in quo tenuis sit medulla, acie gustu feruensque.

Elleborû nigrû quo hodie plerunq; vitur, non est iam descriptum: verum tamen etiam in Hetruria reperitur cû prædictis notis, tamen rarò. Itaq; cura adhibenda est, vt id sumatur, quamuis non multum errent, qui in veri loco vtuntur vulgari.

Epithimum planta est cassuthæ similis, aut cassutha in thymo nascens, & illud cincinnis suis ambiens. Cùm autem hoc tẽpore thymi copiã non habeamus, caremus etiã epithymo. Illud em̃ quod vulgò in vsu est epithymbra est, quòd in thymbra, quæ thymi nomine vsurpatur, crescat.

C 4

Hac

scat. Hac autem hodie veri epithymi loco vti possumus: nam easdē facultates habet, aliquantò tamen debiliores. Quod ex Creta adfertur, epithymbra etiam videtur, epithymum enim non est, tamen si nostrate melior.

Esula, Græcis tithymalus dicitur. Sed veluti esulæ nomine tres plantæ intelliguntur, maior videlicet, minor, & rotunda: Sic etiã tithymali genera septem à Dioscoride aliisque pluribus describuntur. Esula maiore pyrinfa Dioscoridis intelligenda est, & alscebram maius Mesuæ: Esula minore, tithymalus cyparissias & alscebram minus: Esula rotunda, peplos: quæ omnes plantæ hodie sunt cognitæ. Cognoscendæ sunt etiam reliquæ tithymali species, præsertim characias, qui reliquis præferabatur, & Græcis erat in vsu. Hodie cognitus est, quemadmodū & reliqua tithymalorum genera, his præsertim qui in his uestigandis diligentiam aliquã adhibet: Nam omnes in *Hetruria* reperiuntur. Eorum descriptio, cum sit admodū prolixa, ex Dioscori. petenda est.

Eupatorium Græcorum, vulgaris agrimoniam est. Eupatorium Auicennæ id esse creditur quod vulgò eupatoriū appellant, foliis cannabis sylvestris, & secundum aquas

quas crescit: vulgò nota est. Eupatorium Mesuæ herba est amara, quibusdam camphorata, aliis herba giulia dicta, quæ Dioscoridis ageratum putatur. Cum itaque omnes hæ plantæ eupatorium appellentur, animaduertendum est ne indifferenter altera pro altera vsurpetur: Sed in Græcis compositionibus, agrimonix vsus est: In Auicenneis, Auicennæ: In Mesuæis, Mesuæ eupatorium vsurpandum est: singuli enim suo eupatorio peculiare ac diuersas facultates tribuunt.

Euphorbium est succus ex arbore ferulæ simili emanans. Duo eius genera Dioscoridi. Vnum sarcocollæ modo emicans, in granula concretum orobi magnitudine. Alterum veluti fæx quædam est, imbecillius. Adulteratur sarcocollæ & gummi Arabici mistione, sed difficile experimentum, quod leui gustu os accensum diu detineat. Eligendū translucens. Recenti, quia viribus est violentis, non vtendum, sed annotino. Annis quatuor integrū seruari potest cum milio, fabis, aut lentibus ne e-languescat: quinto enim vel sexto anno vis eius exoluitur. Ceterum cum plerumque cōtingat vt ad nos magis aduehatur vetustate corruptum, quàm recens; maior cura in eo adhibenda est.

C 5 Fel

Fel omne sumendū est ab animalibus mediæ ætatis, quæ neque famem, neq; sitim passa, neq; exercitio nimium defatigata sint, neque iræ nimiū indulserint. De tractū à iecore, & præligatis filo viis quibus & admittitur & egreditur bilis, in feruentem aquam demittitur aliquāto tempore, mox exemptum siccatur loco sicco, & reconditur. Siccatur etiam camino suspensum nec aquæ feruenti demissum: Interdum eo vtimur recenti iam primū ab animali exempto, veluti selle gallorū, perdicum, piscium, & similibus quæ facile comparari possunt, nec magno constant.

Flos æris grana quædam minutissima sunt panici effigie, rubentia æris modo, quæ exiliunt ac erumpunt, quando æs per cola funditur, & aqua pura & frigidissima affunditur. Facile reperiri potest in ærariis officinis. Optimus est friabilis, in attritu fuluescens, milij effigie, breuis, ponderosus, modicè splendens, gustu adstringens, qui delimatam æris scobem nō recepit, qua sæpe adulteratur: Sed id facile deprehenditur dentium allisione, scobs enim non atteritur, sed dilatarur.

GALANGA radix est nodulis scartēs, intus & foris rubra, per internodia cō
torta

torta, odorata, & acerrimi saporis, odore & figura quadam cyperi, unde quibusdam cyperus Babylonicus putatur. Eligenda grauis, rubra, sapore acerrimo linguam vellicans. Adulteratur cyperi vulgaris radicibus repurgatis, & in aceto cum pipere maceratis: sed abraso cortice fucus depræhenditur, nam pars interior neque galangæ acrimoniam neque saporē habet,

Galbanum ferulæ liquor est, vulgo notum est. Laudatur multis granulis constans, merum, thuris effigiem præbens, pingue, non lignosum, retinens nonnihil seminis è sua ferula, graue odore, neque humidum neque aridum. Adulteratur resina, fabæ farina, & ammoniaco: quod ex notis iam dictis depræhenditur.

Gummi elemi quibusdam cedri lachryma est, aut oleæ Aethiopicæ, aut arboris ignotæ. Laudatur quæ resinosa est, stillis exilibus constans, leuis, valido odore & sapore.

HARMEI Græcis harmala dicta, rutæ genus est Dioscoridi descriptum in ruta Galatica. Quibusdam dictamnium album vulgare creditur: non conuenit tamen illi semen subrusum & triangulare. Hanc ob causam eius succedaneo utimur, donec præstantius aliud reperiatur.

Hermo

Hermodactylus radix est officinis nota. Variæ sunt opiniones cuiusnam plantæ radix sit à veteribus descriptæ. Verisimilior tamen eorum est sententia, qui Colchici radicem esse existimant; tamen Diosc. venenosam esse affirmet: nam medicamentorum purgantium magna pars ferè est eiusmodi. Hermodactylum vnum idemq; esse & Græcis & Arabibus credimus: itaq; huius nostræ radices facultatibus freti, ea vtemur Hermodactyli veterum loco. Probatum candidum, corpulentum, plenum, grauis, non cariosum.

Hypocistis plantula est cisti radicibus adnascens, sine foliis, floris punici similitudine antequam explicetur, multis capitulis aut tuberculis constans rotundis, semini plantæ ab Italis *Grano d'India* vocatæ similibus, candidis, herbaceis, aut rufis. Præfertur subrufa. Ex Hypocistide liquor exprimitur præparaturq; vt postea dicemus. Animaduertendum est ne Hypocistidis loco, colligatur planta aliquantum ei similis, quæ vulgò cauda leonis vocatur, est enim orobanche Dioscoridis.

Hyssopum Græcorum herba est foliis & floribus origano similibus, hodie incognitum. Hyssopum Mesuræ domesticum, est Hyssopum vulgare quod in hortis colitur.

Sylue

Sylvestre nascitur in montibus, thymumque vulgare est. Vtrunque thymbrę species est, & Hyssoपो substitui potest, præsertim sylvestre, thymum dictum.

I E C V R. Lupi, cæterorumque animalium, sumi debet ex ipsis animalibus nondum adultis, vinóque odorato lauari: deinde vasi impositum, furnóque probè siccatum, sed nō exustū, vasis vitratis reponitur absinthio sicco inuolutū, ne putrescat.

L A C C A Arabum, Græcis cancamum dictum hodie non reperitur: ideóque eius succedaneo vtendum.

Ladanum liquor est, ex alterius cisthi ledon appellari foliis exsudans. Hodie & liquor & planta nota sunt. Optimū, minimeq; adulteratum, odoratum esse debet, subviride, facillè mollescens, pingue, resinofum, arenularum aliarumque sordium expers, quale in Cypro gignitur.

Lapis armenius, Italis verdazuro, quasi viride cæruleum dicas, tamen ex Armenia non aduehatur: multi tamen existimant, eo qui ex Germania adfertur, vti nos posse, eo delecto qui est leuis colore, cæruleo, per quam æquabilis, & friabilis. Sed cum nec eius magna sit copia, eius loco lapidem lazuli vsurpabimus.

Lapis lazuli, quem Græci cyaneū, Itali

azuro

azuro oltra marino, hoc est, cæruleum transmarinum appellant, lapis est cærulei coloris, qui in ærariis, argentariis & aurariis venis reperitur. Optimus est qui in aurariis oritur, saturi coloris, maculas quasdam aureas stellarum modo radiantes habens, qualis is esse solet è quo fit color ille cæruleus. Huius vsus esse debet, magna cura adhibita, ne factitij pro eo sumantur; hos enim Pictoribus relinquere debemus, natiuóque vri, postquam bene lotus erit vt dicemus.

Leuistico, quod Diosc. ligusticum, Galenus libisticum nominat, quamuis pleræq; plantæ multis partibus sint similes: nulla tamen adhuc reperta est, quæ eius omnibus notis respondeat. Itaque eius succedaneum cum reliquis vide.

Lignum aloës, Dioscoridi agallochum nominatum, lignum est quod ex India atque Arabia deportatur, varium, maculatum, odoratum, gustu adstringens cum quodam amatore; cortex eius corio similis, colore aliquantulum versicolore. Arabibus præfertur id quod ex India adfertur, crassum, nigrum, varium, solidum, graue, sine candore, & quod ignibus impositum diu perdurat.

Lignum guaiacum, quod nonnullis lignum

gnum sanctum dicitur, ebeni genus esse creditur. Optimum est graue, densum, in-
 teriore parte nigra, exteriori & illam am-
 biente subflaua: cortice leui, firmiter hæ-
 rente, ligni scobe, si manibus comprima-
 tur, simul cohærente, (quod pinguedinis
 eius indicium est) quod denique in sua
 decoctione multum odorem, saporem
 atque colorem relinquit: magnitudo au-
 tem aut paruitas fragmentorum nõ sunt
 tam magni momenti, quàm notæ suprâ
 dictæ: sed in hac parte mediocritas lau-
 dari potest. Aduertendum est cortice nos-
 tri scorsim, quem plerunque fraxini cor-
 tice adulterari contingit, aut similibus,
 qui tamen dignoscuntur sapore & odore
 quodam peculiari.

Lithargyros lapis est è plumbo factus;
 plumbū enim dum secunda fornace ex-
 coquitur aut solum, aut metallo aliquo
 permistum, partim in Lithargyron, par-
 tim in plumbagem vertitur. Duo sunt
 eius genera: vnum colore aureo: alterum
 argenteo: quò fit vt illud lithargyros au-
 ri, hoc lithargyros argenti nominetur.
 Inde verò hæc differentia nata est, quòd
 alterum altero maiorem vim ignis pas-
 sum sit. Lithargyrium auri præfertur, ho-
 die notissimum.

M A C I S

MACIS nucis moschatae exterior cortex est, in quo nux latet, quemadmodum auellana in suo putamine. Praefertur crassum, plenum, odoratum, sapore subacris; hodie notum.

Manna ros est, qui ex aëre in arbores, herbas, lapides, terramq; decidens, densatur & cogitur in grana minuta. Praefertur calabra, praefertim quae ex foliis arborum collecta est, quae ex hoc dignoscitur, quod grano constet exiguo, translucente, graui, similis mastiches granulis, candidis, & gustu dulcibus & suauibus. Secundum locum obtinet quae è ramis colligitur; Tertium quae in lapidibus. Haec crassiores sunt, & minus syncerae, colore turbido. Syriaca si sit perfectè granulata mastichaq; assimilis, valde etiam probatur, dulcis, & recens. Cum iam exoleuit; floccorum bombacis refert imaginè, leuis concauaq; est. Adulteratur amyli farina, rebúsq; similibus: sed maleficium facillè deprehenditur. Insuper & ea quae simul concreuit, saccharo & sena adulterata esse solet, ac croco, carthamive flore tincta: verum gustu deprehenditur.

Manna thuris, sunt minutissime thuris micæ. Laudatur alba, pura, micarumque frequentia praedita. Sunt qui cribrata pini
resina,

resina, ac polline, aut cortice thuris con-
tusi adulterant: sed hæc igne depræhen-
duntur, nam adulterata non æqualiter fla-
grat incensa, nec aërium vaporem, sed fu-
liginosum & impurum expuit, variūq;
odorem habet. Hodie minutissimæ thu-
ris micæ sunt in usu.

Marū, maiorana nobilior esse creditur,
videturq; ea mari loco substitui debere.

Mastiche lentiscina resina est. Præfer-
tur resplendescens nitedulæ modo, & can-
dore Hetruricæ ceræ similis, crassa, retor-
rida, odorata, friabilis; viridis inferior
est. Adulteratur thuris resinæque pineæ
nucis mistura.

Medulla ex florenti animali sumenda
est, vt in adipe demonstrauius. Colligi-
tur æstatis exitu, hyemis initio. Duo eius
genera; Medulla ex ossibus: altera è spina,
quæ multum inter se differunt, ideoque
singulæ seorsim reponendæ. Præparatur
reponiturque eodem quo in adipe dixi-
mus modo.

Mel optimum flauum, odore & sapore
iucundo, acre, purum, syncerum, totum
pellucens, tam sibi cohærens vt continui-
tatem suam quasi linea longissima non
intercisum seruet, si digito attollitur.

Melilotis flore est luteo, colore vicina

D croco

croco, odorato. Laudatissima foliis constat minutissimis pinguisque: semen in siliquis teretibus profert rarum, rotundum, sinapi minus, colore luteo. Ex his manifestum est, eam quæ hodie in usu est, non esse veram melilotum, non enim est odorata: nisi ex eius genere sit, quæ in Campania nascitur, odore infirmo, ut ait Dioscor. Diligentia itaque adhibenda est ut vera habeatur. Hanc nonnulli trifolium illud esse arbitrantur, quod locis montosis, sterili solo, ad meridiem spectante nascitur: foliis ciceri similibus, minoribus, maculis quibusdã stellarum modo distinctis: flore luteo fulvescente: semine exili siliqua, in cuspidem deficiente, flavum continetur. Tota planta gravissimo est odore, theriacæ proximo, quam Hærrurix incolæ herba bachaia appellant, quod ea infantium vermes enecant.

Meum anetho caule & foliis simile, sed eo crassius, binum plerumque cubitorum altitudine attollitur; sparsis in obliquum profundumque radicibus, longis, odoratis, tenuibus, linguam exalfacientibus. In altissimis Hærrurix montibus hodie planta quædam reperitur planè cum hac descriptione conveniens. Quam ob causam diligentes Pharmacopolæ hæc nosse discant, vulga

vulgarique meo vti desinant. Quid vero; si reperiri non possit, substitui debeat, in succedaneis dicemus.

Mezereon, aut Dioscoridis thymelæa, quo nomine aliqui etiam chamælæam complectuntur: vtraque nota est. Prior foliis & frutice lini aut linariæ similitudinem refert: Chamælæa folia oleæ habet, verum minora.

Moschus excrementū est cuiusdam animalis, certo anni tempore circa eius vmbilicum veluti in tumorem quendam concrementum. Melior est Orientalis, substauus. Adulteratur quemadmodum & cetera quæ rara sunt: sed ex colore, odore & sapore dignoscitur, præterea etiam & pondere; nam multa admiscuntur in eo adulterando. Verum cui syncerum & verum experientia cognitum est, ex his notis facile fucum deprehendet.

Mumia Arabum, compositio quædam est ex aloë, myrrha, croco, & balsamo, qua cadavera condiebant, deinde aliquantulo post tempore ex sepulchris eximebant, cum sanie quæ ex cadauere exudaerat, seruabantque in usum medicum. Sed quia pice & bitumine corpora condiri etiã solebant: easdē illi facultates tribuunt quas Diosc. pissasphalto, idēmq; efficere

D 2

dicunt

dicunt quod permixtum pici bitumen.
 Quod si verum est, cum neq; veram mu-
 niam, neq; Diosc. pissasphaltum habea-
 mus, arte conflare potest ex pice bitumi-
 ni permista, vt in bitumine dictum est.

Muscus arborum, quem vulgò vsneam
 appellant, lanugo sicca est, in quercu, abie-
 te, larice, multisque aliis arboribus na-
 scens. Optimus est candidus & odoratus.
 Laudatur cedrinus, proximè populneus:
 Reliquis verò præfertur odoratus, albus,
 vt iam diximus.

Myrobalani Arabum differunt à My-
 robalano, hoc est nuce vnguentaria Dio-
 scoridis, quã vulgus Ben appellat. Quinq;
 generibus distinguuntur, videlicet in
 Citrinas seu flauas, Chebular, Indas, Em-
 blicas & bellericas.

Citrinæ laudantur multum flauæ, in vi-
 ride inclinantes, densæ, graues, gummosæ,
 cortice crasso os paruum complectente.

Cepulæ siue chebulæ quo maiores eo
 meliores, nigræ, in rubrum inclinantes,
 graues, quæ aquæ impositæ statim mer-
 guntur, cortice crasso.

Indæ optimæ sunt nigræ, substantia
 solida si frangantur, densæ, magnæ, gra-
 ues sine ossibus.

Emblicæ sunt magnæ, graues, densæ,
 carne

earne multa, ossibus exiguis.

Bellericæ verò densæ, magnæ, graues,
& cortice crasso. Quæ his notis carent,
aut vetustate exoticæ sunt, aut aliud in-
commodum passæ sunt.

Myrrha Arabicæ arboris lachryma est.
Huic tametsi non quadrent omnes notæ
à Dioscoride descriptæ, cum tamen mul-
tis sit prædita bonis qualitatibus, existi-
mant nonnulli pro vera posse vsurpari.
Eligenda est pinguis, resinosa, rubescens,
densa, & splendens. Sunt qui affirmant sto-
racem liquidam, qua officinæ vtuntur,
stillatitiū myrrhæ liquoré esse, qui stacte
veteribus dicebatur. Quod nullo modo
conuenit: nam storax liquida factitiū po-
tius quiddam videtur, cuius nullus vsus
pro myrrhæ stacte esse debet. Quod verò
de opocalpaso scribit Galenus, quòd myr-
rhæ similitudinem gerat, sed venenosum
& exitiale sit, multosque sua ætate mor-
tuos esse, quòd in medicamentis opocal-
pasum pro myrrha assumpsissent, nemini
nostra ætate contigisse audiuius. Quod
magnum argumentum est, nos verà myr-
rha carere.

NIGELLA, quam Dioscorides gith
aut melanthium nominat, herbula est exi-
libus surcalis fruticans, binos dodrantes

D 3 aut

aut amplius altis; foliis minutis, aliquan-
tulum ad senecionis similitudinem accedentibus, sed multò tenuioribus: capitulo in cacumine tenui, paruo, ceu papaue-
ris, oblongo, intercurfantibus intus mem-
branis, quibus semen includitur nigrum,
acre, odoratū. Qua hodie vtuntur nigel-
la, non est verū melanthium, sed cumini
forte syluestris apud Dioscoridem genus.
Verum hodie reperitur, sed non passim,
itaq; ahibenda est diligentia. Melanthij
genus est, quod vulgò cardamomum mi-
nus creditur, nigellāque citrina vocatur,
quæ præter colorem, omnino cum melā-
thio supra descripto conuenit: eius itaque
vsus esse poterit veri melanthij loco, po-
tius quàm vulgari nigella, que non est o-
dorata, vt vera esse debet.

Nitri apud veteris multæ erant differē-
tiaz, natiuū factitium, & aphronitrū, quod
veluti nitri flos erat. Hodie vnicum habe-
mus nitri genus, nempe boracem non ex-
coctam, quæ quibusdā nitrum fossile est,
eoque nitri loco vti possumus.

Salnitri, tamen si proximè ad nitri natu-
ram accedat, nullus tamen eius in medi-
cina vsus esse potest, præsertim in his quæ
intrò assumuntur. Nitri in succedaneis
etiam fiet mentio.

Nur

Nux moschata, arboris Indicæ fructus est, perficæ arbori (vt scribunt) similis, In hac enim nux moschata nascitur macis suo inuoluta, veluti auellana membrana illa sua exteriori. Macis inuolucro tegitur, quemadmodum & in aliis nucibus, putamen durum, quod in se nucem moschatam continet qua utimur. Eligenda est recens, non exesa, grauis, succi plena, oleosa, odorata.

O E S Y P V S est succidarum lanarum pinguitudo quam vulgo hyssopum humidam appellant: Cuius parandi ratio hæc est. Succidæ lanæ molles è collo feminibusq; aqua feruente macerantur, in eaque lauantur donec sordibus bene expressis, purgata extrahuntur, deinde aqua magno impetu lignea rude agitatur, aut vasculo excepta in aliam ex alto infunditur, quò argius sordida spuma supernatet, qua dissoluta, pingue supernatans aquæ, excipitur: rursus aqua agitatur, pingueq; excipitur: & hoc deinceps tantisper fieri debet, dum consumpta pinguitudine, nihil prorsus spumæ extet. Collecta pinguitudo agitatur & aqua pura respergitur, perpetuoq; ad Solem manibus miscetur, donec candida spectetur, & aquam non amplius inficiat, tum in fictili vase denso & bene

D 4 cocto

cocto reconditur, & in cella locouē frigidō reponitur.

Opopanax succus est effluens ex incisa radice aut caule panacis quod Dioscoridi heracleū dicitur, Hodie cognita est planta & ipse succus, qui maximè probatur, quàm amarissimus; internè alb^s, aut subfuluus, foris colore croci, leuis, pinguis, friabilis, tener statim in aqua cliquescēs, graui odore: Niger improbatur ac molli. Adulteratur ammoniaco, aut cera: sed synceri experimētū est, si digitis in aqua friatus resoluatur & lactescat.

Opiū succus est è capitibus papaueris nigri. Duūm est generū, vnum ex capitibus & foliis expressum, Græcis meconiū vocatur; illud ignauius. Alterū ex capitibus paululū incisis exstillans, verum est opium. Optimum est densum, graue, amarum, odoratu soporiferum, quod facilè aqua dissoluitur, leue, candidum, neq; asperum, neque grumosum, quod colatum nō statim vt cera coëat, quod in Sole diffundatur, & admodum lucernis, clara luceat flāma, & extinctum odoris vim conseruet. Adulteratur glaucio, hoc est nemitha, aut gūmi, aut syluestris lactucæ succo. Verum glaucio fucatum in dilutione croci colorem reddit; lactucaceo succo deprau

deprauatum, inodorum est, & asperius:
gummi viciatum, infirmū est, & splende-
scit. Nec desunt qui adipem admisceant.

Origanum Dioscoridi trium est gene-
rum, heracleoticum, onitis, & syluestre:
Quorum postremū copiosè in nostris ma-
ritimis nascitur: Reliqua duo cognita qui-
dem sunt, sed rara. Tragoriganum est in-
cognitum. Quod hodie in vsu est, ad nul-
lum origani genus referri potest; primū
quod in maritimis nascatur, vbi dūtaxat
cetera crescunt origana; deinde quod gu-
statum, linguā non vellicat vt reliqua ori-
gana. Adulterinum igitur erit origanū,
quia reliquis notis ita cum origano con-
uenit, vt gustu solo ferè distingui possit.
Danda est opera vt legitimum habeatur,
atque hoc reiciendum. Verū hodie ex
Creta copiosè Venetias adfertur.

Orobis, siue eruum, illud est quod in
Hetruria moco vocatur, vulgòque, cūm
sit notissimum, seritur. Hoc itaque vtendū,
non alio. Aliud supradictō simile Creta
adfertur orobis illic nominatum, hoc
nonnulli verū esse existimant: foliis est
phasioli vulgaris, sed angustioribus, &
minoribus: semine subflauo quod cum
difficilè reperiatur supradictō vtendū est.

PAPAVERIS apud Dioscoridem sex

D 3 sunt

sunt genera. Primum syluestris rhæas dictum omnibus notum. Alterum, cædidū, capitibus oblōgis, candidis, semine albo: hoc etiam notum. Tertium & Quartum, nigrum, è quibus colligitur opiū: semine nigro; vtrumq; Dioscoride papauer syluestre etiā dicitur: & illud notum est. Quintum papauer corniculatum, sic dictum, quod caput non proferat, sed siliquam oblongam & rotundam in corniculi modum, florem luteum, vulgo notum. Sextum papauer spumeum vocatur, hoc incognitum est. Quoties papaueris simpliciter & sine adiectione mentio fit, semper domesticum, hoc est album intelligendum est.

Piper arbusculę in India nascentis fructus est: quæ inter initia vt ait Diosc. prælongum fructum veluti siliquam, quod piper longū vocamus, profert; habet intus aliquid tenui milio simile, quod dehiscentibus siliquis racemorum in modū prodit. Eorum grana acerbissima cædidum piper vocatur: matura verò, piper nigrum. Qui verò in Indiam nauigarunt. piperisque plantam viderunt, piper in planta bryonia simili nasci asserunt, diuersisque ex plantis longum & rotundū colligi. Nihil tamen interest. Nigrū eligi debet recens, **grauissi**

grauissimum, plenum. Candidum præfer-
tur, non rugosum, candidū, & graue. Lon-
gum optimū, quod dum frangitur, solidū
intus conspicitur & compactum, gustu
acerrimo linguamq; mordens. Adultera-
tur lōgū herba similis: sed focus deprehē-
ditur, si in aquā immittatur; nam adulteri-
nū liquescit, legitimū verò solidū manet.

Pix è lignis pinguibus & resinosis fluit,
præsertim è pino. Quibusdam tamen in
locis, propter pini penuriam, ex picea, ce-
dro, terebintho, cæterisq; similibus con-
gregatur eo què infra dicemus modo. Pix
naualis vulgò vocatur, èstque duorū ge-
nerum. Liquida & sicca. Liquida duorum
item est generū. Vna quæ primū effluit,
aquæ perquam similis, qua in Syria vtun-
tur in condiendis corporibus, & cedriam
appellant, quòd ex cedro fiat: nam pinos
non habent. Altera, secūdus est qui effluit
liquor, qui vasculis collectus densatur a-
ceto, sicq; coactus, pix brutia appellatur;
in hoc solū à priori differens, quòd
concreta sit, colore fusco, & pinguior, hac
picabantur vtres vinarij. Pix arida, fit è
liquida iterum cocta, huius sunt itidem
duo genera: vnum quod visci modo len-
tescit; alterum siccum & friabile. Præ-
ter hæc, aliud quoddam genus repe-
ritur,

ritur, quod pisselxon appellant: exprimitur ex lana qua excepti sunt vapores elati sursum quamdiu pix coquitur. Præfertur quod ex pice brutia fit. Aliud picis genus zopissam vocabant ex derasa nauibus resina & cera conflatâ. Omnes hæc picis differētix reperiuntur. Liquida præfertur splēdens, leuis, syncera. Sicca probatur pura, pinguis, odorata, subrufa, & resinosa. Improbatur adusta, fumum redolens, & acida. Probatur verò ea cuius fragmenta splendent, quæ dentibus pressa lentescit, & gustu est suauis.

Pix græca pini alteriùsue arboris resina est, aqua cocta, donec perduto natiuo odore, friabilis & arida reddatur: hæc colophonia vocatur, quòd è Colophone adueheretur. Per colophoniã igitur semper pix græca intelligenda est, non quòd resina incocta nõ euam colophonia vocetur, sed quòd in Medico vsu huiusmodi resinis nõ utimur nisi coctis, aut rarò admodum, præsertim cum liquidæ sunt.

Propolis in alueariorum foribus & rimis, cerosæ naturæ reperitur, eligi debet flaua, odorata, styracem referens, mollis, & mastiches more ductilis.

Pulmones animalium recentes & sicci vsurpantur. Sumantur ex animalibus pinguibus

guibus & robustis. Siccantur exēpta aspera arteria in vase figulino imposita clibanō, & refrigerati, foliisq; absinthij, sicci inuoluti reponuntur, vt de iecore dictū est.

R E S I N A liquor est ex pinu, picea, abiete, aliisq; similibus spōte profluēs. Eius duplex est differentia. Vna liquida, veluti terebinthina ex terebintho, larigna è larice, quę vulgaris Italię est terebinthina: nam eius quę è terebintho profluit copiam non habemus. Altera arida, vt quę ex pinu exit & è fructu arborum resiniferarum, thuri similis. Ex liquidis terebinthina resinas omnes antecedit, candida, perlucida, vitreo colore & in cæruleū vergente, odorata, terebinthum olens. In huius locū successit, vt dictū est. larigna, quę mellis colore & odore esse debet. Ex aridarum genere eligi debet odoratissima, translucens, non retorrída, neq; nimium humida, friabilis, & quendam cerę colorem præbens. Improbatur rubra, & dealbata. Ex his resinæ è picea & abiete cæteras antecedunt, & thus odore imitantur. Omnes hæ resinæ vno nomine pix græca vocantur, de qua superius.

Rha barbarum radix est inæqualiter crassa, non admodū longa, rheo pontico perquā similis colore & substantia. Eius tres

tres sunt differentia. Vnū Indicum, omnium præstātissimum: Alterū Barbarum, secundum locum obtinens: Tertium Turcicum omnium ignauissimum. Laudatur subnigrum in rubrum inclinans, recens, graue pro raritate sua, contractū, ex rufo & glauco alternās, & croci modo tingēs. Adulteratur, si aliquot diebus in aqua maceratur, vt facultas eximatur; fucus vero deprehenditur si in contracto ea varietas, quæ supra dicta est, non conspicitur, nec croci modo tingit, sed leuius est, & magis adstringit.

Rha ponticam, quod vulgo rheuponticum dicitur, radix est nigra, cętaurio magno similis, sed minor & rufior, sine odore, fungosa, leuis; quæ trita, manducataq; colorem reddit pallidum, ad crocum inclinantem à rhabarbaro dütaxat (vt nonnulli putant) solo loco in quo nascitur differens: nam rheum barbarū ex regione Meridionali aduehitur, rheum verò ponticū ex Septentrionali. Ad hæc rheum ponticum radice constat longa & tenui, rhabarbarum autem crassa & breui. Aliquorū præterea opinio est, eā plantā quæ hodie in hortis seritur rumici similis, quæque rhabarbarū existimata est, verū esse rha ponticū; sesq; expertos asserunt eandem

easdem quas rhabarbarū habere facultates, si detur dupla quantitate. Adfertur ad nos verum rhaponticū, non est autem eā quā supra centauriū maius esse diximus. Optimum habetur quod teredines non sensit, quod gustatu cum remissa adstrictione lentescat. Adulteratur decoctione: dignoscitur verò quod partes externae non sint densae & compactae, verum rara substantia, & gustu nihil, aut minimum adstringens.

Ribes rubescētibus fruticat ramis, ad viride inclinantibus, teneris, sapore cum aliquantula aciditate dulci: foliis rotundis, latis & magnis: acinis gustu acidis. Ribes quo hodie vntur, tametsi omnes iā dictae notae illi quadrare nō videātur, id tamē verò substitui posse existimamus.

Rubrica, sinopsis Dioscoridi dicta, quae in Sinope vrbē videretur, terra rubra est. Hodie ad nos ex plerisque aliis locis aduehitur sub boli armeni nomine, cuius supra in bolo meminimus. Maximè probatur ex Dioscoridis sententia, grauis, densa, ad iecinoris imaginem vergens, calculorum expers, concolor, cum dissoluitur admodum fusilis. Bolum autem intelligimus nostratē.

Rubrica, qua hodie fabri vntur, aliud
rubricae

rubricæ genus est, sitque ex ochra cocta.

SAL, natiuus est & factitiuus. Natiuus vel in terra, vel ad mare ex aqua marina, vel in lacubus, vel in fluminibus, aut in fontibus. Natiui (quãuis variæ sint differentia, diuersisq; locis reperiuntur) in vsum tamen medicũ tres recepti sunt, videlicet sal ammoniacus, vulgo armeniacus dictus, sal gemmæ, & sal Indus. Ex his verò salem gemmæ dũtaxat habemus, candidum, translucentẽ crystalli modo, estque sal fossilis. Sal armeniacus hodie dictus, non est natiuus, sed factitiuus

Ex eorum genere qui sponte in aquis generantur multæ sunt differentia. Qui in mari nascitur, & in scopulis reperitur ex spuma maris conflatu, spuma salis appellatur. Qui in Iudææ lacu gignitur, in quo & asphaltus nascitur, sodomeus vocatur, ab Arabibus sal naphthicus, amarus est. Hoc caremus, quemadmodum & reliquis natiuis in lacubus aut fluminibus reperiuntur.

Factitiuorum varia sunt genera, secũdum materiam ex qua fiunt differentia. Nam alij ex aquis falsis generantur, veluti marinus, & qui ex fontibus fiunt, vt sal communis: Alij ex cineribus, aliaũc materia, quemadmodũ sal alcali, qui fit ex herba cali,

cali, ex qua etiam soda appellata conficitur, & vulgaris armeniacus qui in Alexandria fit in balneis.

Cæterum hodie pro efficacissimo in medicina sale gemme utimur, qui fossilis est ut diximus, & in Germania aliisque locis eruitur. Præfertur deinde marinus. omnium infirmisissimus est vulgaris.

Saccharum candi tamen si Auicenna inter dum salem Indum appellet, inter sales tamen referendus non videtur.

Is præterea quæ Dioscorides salis florem, aut rectius maris floré nominat, salis multum dissimilis est, nihil enim aliud est quam pinguedo quadam crocei coloris mari, Nylo & aliis lacubus innatans: eotamen hodie etiam caeremus.

Qui propriè flos salis dicitur, in salis fodinis reperitur, & in ipsis etiam salignis velut pollen quidam crassiorem salem ambiens: tenuiorum multo est partium quàm sal, colore candidissimo, interdum cinereo, qui inferior est.

Sandaracha lapis est in metallicis venis, plerumque cum auripigmento nascens, rufa est, cinnabaris colore, non nihil ad luteum vergens, quæ cum uritur, fumum exhalat pallidum, sulphurisque virus redoler, tamen non consumatur. Facile hodie legi

E

tima

tima haberi potest: factitia tamen etiam fieri potest, si auripigmentum coquatur donec cinnabaris colorē contrahat, potest que vere sandarachæ loco substitui. Sed animadvertendum est sandarachæ vocabulo apud Arabes vernicem intelligi, quæ nihil aliud est quàm gomme iuniperi, non autem prædictum lapidem. Itaque curam adhibeant Medici ne altera alterius loco indifferenter utantur.

Sanguis, cuius in medicina vsus, ex multis animalibus colligitur dum adhuc a tæte florenti sunt. Sanguis Hircinus in hunc modum paratur. Maturescente vva Hircus quadrimus, bene habitus, iugulatur, mediūsq; effluēs sanguis fictili bene cocto excipitur; (nam primus tenuior, postremus crassior putatur) deinde coctus in aqua donec concreseat, arundine sissa secatur oblique & transversim, vt quod in coaqueum est effluat, deinde linteo raro retentus soli exponitur atque ita sicatur, curandū interea ne pluuīs aspergatur: deinde tritus vase vitreo, aut fictili vitrato bene obturato reponitur. Alij Hircū, diebus canicularibus, herbis calculum frangentibus nutriunt & vino albo odorato, donec vrina nigrescat, deinde iugulant, & in eū quem supra diximus modum preparant.

Hoc

Hoc præparationis genus etsi inutile non videatur, necessarium tamen non est, eum apud Græcos sanguinis Hirci non eo modo nutriti, etiam vsus fuerit: sed medicamenta calculum frangentia admiscbantur.

Sanguis Draconis, q̄ magno in vsu est, cinnabaris Dioscoridis esse creditur; an verò metallicum quiddam sit, an aliud simile, nihil certi ex veteribus elicere possumus. Plerique recentiorum gummi esse arbitrantur, ex arbore sui generis stillās, ut terebinthina nostra vulgaris ex larice: colore est intetè rubro ut sanguis videatur, transparēs, friabilis; vulgò sanguinis draconis lachryma vocatur, ad eius differentiam qui pro sanguine draconis venditur, adulterinūsq; est, eamq; ob causam reiciēdus. Sunt qui sanguinem draconis, achillex syderitidis succum defæcatū siccatum que esse putēt, cuius rei nullam habemus certitudinem: posset tamen sanguini draconis substitui, cum sit proximarum ei facturatum.

Sarcocolla lachryma est arboris in Perside nascentis, pollini thuris similis, colore candido aut rufo, gustu amaro: Præfertur rufa, gustu amarissima. Adulteratur gummi; sed gustu deprehenditur,

E 2

adult

adulterina enim amara non est.

Satyrii nomen apud Arabes omnibus orchios generibus commune est, eaq; distinguunt in testiculos canis & testiculos vulpis: per vulpinos intelligētes, quæ propriè à Græcis satyria vocātur, radice bulbosa, mali magnitudine, foris fulua, intus candida. Hodie testiculi canini pro vulpinis, Dioscoridisq; satyrio sunt in vsu: nam vero satyrio carere videmur: aut si habemus, nondum tamen dignosci possunt inter tam multas testiculorum differētiās, cum omnes, si cū descriptione conferātur testiculi canis videantur: eis pro vero satyrio uti nos posse arbitramur. Hodie noti sunt. Radix superior, quæ maior & plenior est, Venerem stimulare: inferior verò, quæ mollior ac rugosior est, inhibere creditur.

Scammoniū stillatitius liquor est plantæ Græcis scammonia dictæ. Laudatur nitidum, rarum, leue, colore quàm simillimū taurino glutini, fungosum, tenuibus fistulis. Addunt nonnulli, vt linguæ tactu albescat: sed vt ait Dioscorides huic notæ fidendum non est, hoc enim euenit adulterato, quod admisto fit tithy mali lacte: hæc autem nota longè certior est, nēpè, si gustatu linguam non vrit, quem admodum

modum tithymalus. Adulteratur tithymali lacte & farina orobi, sed ex notis prædictis dignoscitur.

Scordium planta chamædry similis, hodie cognita, Huius in medicina vsus esse debet, non alij syluestris.

Scoria, Latinis recremētum appellata, differt à squamma. Scoria autem illud est quod à vena metallica dum coquitur excidit, quòdque vbi metallum in catinum defluxit, ab eo detrahitur. Scoria itaq; veluti metalli spuma est, tametsi etiam ab eo derrahatur in secunda coctura, cùm videlicet argentum ab ære alijsve metallis separatur. Prima scoria grauissima est, quæ aliq̄d adhuc metalli admisti habet, ideo secundò & tertio recoquitur, donec totum metallum exemptum sit, & scoria quæ subsidit leuissima est, & veluti spōgia. Eximitur scoria ex venis auri, argenti, æris, plumbiq; candidi & nigri: Ex argenti verò vini, plumbique tertij generis, quod cinereo colore est, vena non detrahitur scoria: nam ex his prius effluit metallum, quam vena adeo cocta sit vt scoria fieri possit. Omnis scoria nitida esse debet nigroq; colore, ea excepta, quæ fit vbi argentum ab ære separatur (hec enim vario colore esse solet) & scoria plumbi nigri

E 3

quæ

quæ ad luteum colorem accedit, & tenuis est, plerunq; vitri luteo colore tincti splendorem imitatur: tamen si etiam reperiatur plumbi nigro supernatans, quæ colore argenteo spectatur.

Scoria plûbea ea optima est teste Dioscoride, quæ ad luteum colorem accedit, & vitri splendorem imitatur, densa, fractu conrumax, nihil plumbosum habens: cerusam representans. Diligens pharmacopœus scorias requirere debet ex officinis metallicis vbi metallica excoquantur.

Sérapium, quod Græcis sagapenû nuncupatur, ferulaceæ herbæ succus est. Optimum est translucens, fuluo forinsecus colore, & intus albo, nescio quid inter laser & galbanum redolens, gustu acri. His addit Mesue vt sit spissum, & leue, odore porri, facile in aqua resolubile, quia quod has notas non habet, adulteratum aliis gummis censetur. Præstantius est quod ex Oriente aduehitur, quàm quod aliunde.

Spica Celtica exigua plâta est folia habens oblonga in extremo lata, florem luteum; ad radices multa exigua habet adnata spicis minutis similia: hæc cum radiculis, abiectis, in vsu sunt & valde odorata. Adulterantur imposta herba simili: sed facilis cognitio; nam folia adnataque breu

Breviora habet, candidior est, neque amara, neque odorata. Vnde vera celtica spica est. Laudatur maxime recens, quicquid odoris, radice numerosa cohaerens, non fragilis, & plena.

Spica nardi teste Galeno radix est, non spica. Nota est. Eligitur syriaca diesta, cuius sicut sunt nota, ut sit brevis spica largam gerens comam, colore flava, odorata, aliquando tunc redolens cyperum, amaro sapore, linguam siccat, & quae diu in sua odoris gratia permaneat. Adulteratur sitibio cum aqua aut palmeo vino ponderis causa inspirato. Sed ex praecedentibus notis dignoscitur. Madefacta etiam vendi solet: quod vitium ex eo deprehenditur, quod candida sit spica, squalida, nulloque putneri obstrata.

Spodium in arboribus inuenitur, ubi & pompholyx, quae Arabum lingua est. Fiunt ex fauillis e metallo, dum coquitur, emicantibus, & specie differunt. Nam spodium siue partibus crystallis, & in arariarum officinarum pavimentis reperitur, ideo multum terrae colligit, & spurcicia refertur. Pompholyx siue tenuissima fauilla quae in altis enolat, & recto fornicique adhaerens, aquarum bullis simile prodit, quae per pluias inter visus.

initia erupunt, colore albo, quæ in tenuis-
 simum polliniquæ, & simile puluerem dissol-
 uuntur. Similes habent facultates, sed pô-
 pholyx tenuiorû est partiû. Hodie vtrun-
 que cognitum & facile ex Italia & Germa-
 nia, vbi sunt ærariæ officinæ, haberi pos-
 set: sed his substitui possunt Dioscoridis
 antispodia, aut officinarum thutia vt in
 succedaneis dicemus. los. m. m. o. s. p. r. o. e. n.
 Spodium Auicennæ fit ex arundinis radi-
 cibus, eiusq; vsus est in ab Auicenna præ-
 scriptis medicamentis, nam antispodij ge-
 nus est. Illud verò quod ex boui similitum-
 que animalium cruribus confectum offi-
 cinæ vsurpant, præstat, reicere, eiusq; lo-
 co, aut Auicennæ aut Dioscoridis aliquo
 antispodij genere vti in his præsertim
 quæ intrò sumenda sunt medicamētis: in
 his verò quæ foris adhibentur, aut vero
 spodio, aut pompholyge, aut thutia offi-
 narum præparata. S. all. u. l. x. s. p. o. t. l. l. i. a.
 Squamma est quæ malleorum ictibus
 de metallis, dū adhuc candent, excutitur:
 verum enimuerò ex ære duntaxat & fer-
 ro decutitur squamma. l. o. t. e. o. l. e. o. t. e. n. u.
 Aeris squamma eligenda est rufa çris mo-
 do, crassa, aceti respersu æruginè contra-
 hens, veluti ea est quæ ex ære rufo decu-
 titur, & olim ex ære Cyprio. Improbatur
 tenu

genius, inualida, candida aut nigra.

Stomoma ferri squāma est ex ferro decidens dum aqua extinguitur ad eius indurationem aliāve ob causam. Vtraque in fabrorum officinis reperitur.

Squinanthū, seu schœnu anthos, id est iunci odorati flos, omnibus notum est. Eligendum rufum, intento colore, recens, tenue, rubeuntibus fragmentis, quod manibus confricatum rosæ odorem emit, igneque mordacitatis ad linguam. Olim planta ipsa cum floribus aduehebatur, unde schœnu anthos nomen sumpsit; ideoque eligebatur floribus refertum. Hodie tamen ad nos culmi duntaxat & radix adferuntur. Itaque cura adhibenda est, ne alij culmi his admisceantur, quod ex iam dictis notis depræhendi potest.

Storax hodie duorum est generum. Vnum storax calamita appellatur, Græcis simpliciter styrax. Alterum storax liquidus qui myrrhæ stacte, quæ pinguissima myrrhæ pars est, plerisque esse creditur; hoc tamen falsum esse depræheditur in eo qui in officinis est. Styrax calamita gūmi est arboris malo cotoneæ similis. Præfertur flavus, crassus, resinofus, albicātibus grumis, quam plurimum in sua odoris gratia permanens, qui, dum mollitur, melleum

liquorē reddit. Deterior niger, friabilis,
& furfurosus. Adulteratur ligni ipsius sco-
be, melle; cera, adipe odoribus imbutis, &
quibusdam aliis. Dignoscitur quod adu-
teratus inualido sit odore; syncerus vend
admodum acer sit. Qui hodie officinis in
vsu est, aliqua ex parte Dioscoridis descri-
ptioni conuenit, eoque vtendum arbitra-
mur, donec melior proponatur.

TAMARINDI fructus sunt arboris,
vt volunt nonnulli, ex palmarum genere.
Eius folia ad hyperici folia multum acce-
dere conspecta sunt, etiam si à quibusdam
salicis folia illi tribuantur. Fructus, cuius
hodie vsus, notus est. Probantur colore è
nigro in rufum languescente, teneri, mul-
tis villis intertexti, recentes, pingues, nō
retorridi, ex dulcibus acidi, & vinoso sapo-
re. Adulterantur prunorum carne, sed in
his nigredo est obscura, humētiores sunt,
& prunorum odor & sapor illis inest. Ser-
uantur in fictile vitratum coacti, loco fri-
gido & sicco.

Terra sigillata officinarū terra Lemnia
Diosc. & Galeni esse debebat: Hoc tēpore
duo terrarum genera Constantinopoli ad-
feruntur; vna rubescens in placentulas
quasdam exiguas formata characteribus
Turcicis signata; altera ex cineritio colo-
re

re candicans, maioribus formata placen-
tulis, characteribus item signata Turci-
cis. Magno in pretio sunt apud Turcos,
maximèq; commendatur aduersus vene-
na, neq; facile earum copia haberi potest.
Quæ Constantinopolim adferuntur, non
è Lemno, sed aliis ex locis multòque lon-
gius distitis aduehuntur, itaque arbitran-
dum non est vllam ex iam dictis, terram
Lemniam esse. Rufa, quibusdam è Lemno
aduehi, veràq; terra Lemnia esse creditur.
Pleriq; bolum armeniam Orientalem ve-
ram esse terram Lemniam crediderunt.
Sed nihil certi statuere possumus: magis
tamen illi quadrare videntur terræ Le-
mniæ notæ, quam duabus prædictis. Re-
perta est etiam in Melita, terræ quod-
dam genus candidum, leue, quod à cir-
cunforaneis impostoribus venditur ad-
uersus venena efficax. Itaq; terræ Lemniæ
loco commodè, aut bolum armenia ex
Oriente petita, aut prædictarum aliqua
sumi potest, tamen si Turcicæ aduersus vi-
peræ morsus non admodum efficaces
sint, multòque minus quæ ex Melita
adfertur. Verum si bolum armenia aduersus
viperae morsus eam haberet vim quæ
terræ Lemniæ tribuunt, terra Lemnia legi-
tima sine cōtrouersia esset, aut saltem illi
secure

securè substitui posset; & facilè esset experimētum quemadmodum de Turcicis terris in canibus à vipera demorsis periculum fecimus, nam quibus allium cum vino datum est, hi liberati sunt; quibus verò terræ suprâ recitatae, hi mortui sunt, aut magna cum difficultate liberati.

Terræ sigillatae officinarum, cum ne vna quidē nota Lemniæ quadret, nullus vsus esse potest, nisi in iis duntaxat medicamentis quæ foris adhibentur: hæc enim nihil præter manifestarum qualitatuum operationem desiderant.

Thlaspi, herbula est Dioscoridi angustius foliis, digitali longitudine, in terram versis, subpinguibus, in cacumine diuisis: duūm dodrantum cauliculo, tenui, non sine adnascētibus ramis circa quos, folliculos quosdā in latius se pandentes, & compressos instar lentis, supremāq; parte fissos profert in quibus continetur semē nasturtio simile: flos albicat. Hodie cognitū est, & quamuis in Hetruria rarum sit, facilè tamen aliunde aduehi potest. Dioscorides aliud thlaspi genus ex Crateua describit, latioribus foliis, radicibus maioribus. Hoc frequentius est, possitque prioris loco vsurpari.

Thuris cortex, qui ex arbore thurifera detrah

detrahitur, præfertur pinguis, odoratus, recens, leuis, crassus, sine membranis. Adulteratur admisto pini aut nucis eius cortice: sed horū index ignis est: siquidem thuris cortex legitimus paulatim ardet, & cū odoris fragrātia vaporē eiacularur: adulteratus verò nequaquā incēditur, sed totus in fumum sine odore consumitur.

Thymum apud nos non crescit. Planta quædā peregrina adfertur foliis exiguis, odoratis, flore purpurascēte, quæ proximè ad thymum accedit: Eius verò cum in Hetruria copia nō sit, utemur succedaneo.

Trifolium, quod Græci oxytriphylon, aut asphaltion appellant quòd bitumen redoleat, multas habet virgas tenues, cubitum aut amplius longas: folia magna, acuminata, terna singulis germinationibus exeuntia, quibus recenter enatis rutæ odor inest, vbi autē adoleuerunt, bitumen olent: florem edit purpureum, semen latum, hirsutum, ex altera extremitate exertum corniculi modo: radix longa, tenuis, dura. Copiosè nascitur circa Elbam & Petram sanctam Hetruriæ: Huius vsus esse debet non trifolij pratensis, quod à vero trifolio maximè differt à Græcis descripto.

Turbith plantæ cuiusdam lacte manantis

tis

tis radix est. Hęc cādida est, & alypi radix Diosc. esse creditur; aut nigra, lutea ve, quā pityusam pleriq; esse arbitrātur. Verūm, vtcunq; sit, praefertur hodie candida, quæ ex Syria adfertur, verūmq; turbith albū esse creditur, aut ei substitui posse. Praefertur vacūum vt arundo, gummosum, cortice cineritio plano, fractu facili. Adulteratur, inducto foris gummi dissoluto: sed fractum fraudem detegit, nam nullum gummi in fragmentis apparet.

Thutia officinarum, veterū cadmia est. Gignitur in fornacibus æraris fuligine flatu egesta, veluti spodium, & pompholyx, quę vera est Arabum thutia. Cadmia ex crassiore sit materia, quæ aut in sublimē fertur, altioribūsq; fornacum locis insidet, vvarum modo concreta, botryitēsq; appellatur; aut ferreis virgis adhæret; in hunc finem fornacibus applicatis: aut parietibus fornacū insidet, hæc placites nuncupatur. Hōdie maiorem eius copiam habemus, quæ ferreis virgis adhæret, quā aliarum duarum, tamēsi plurima adulterata reperiatur ex lapide quodam trito, & cum aqua aliōve liquore, & sulphure in luti modum coacto virgisq; inducto deinde cocto. Dignoscitur colore qui non est ita fuliginosus neq; ad caruleum vergens vt in

in vera: tum ipsis granulis aut corpusculis, quæ veluti in vera simul coherere nõ conspiciuntur: deniq; ipso pondere, nam vera & legitima multò grauior est adulterata.

Reperitur etiam aliud cadmia genus lapidis similitudine in ærariis fodinis teste Galeno, tametsi Diosc. neget; imò hodie adhuc reperitur, hisque vsui est, qui auricalchum conficiunt. Melior est botrytis, quam rarò nostro hoc seculo videre contingit; aut quæ Alexandrina nuncupatur, hæc ea est quæ circum virgas aut rudes ferreas insidet, & modo iam dicto ab adulterata dignoscitur.

VALENTIANA, quæ secundum quosdam Dioscor. phu appellatur, hodie nota est. Eius duo genera reperiuntur. vna domestica & maior in hortis seritur: altera syluestris & minor in agris sponte nascitur. Maioris radix satis ad phu accedere creditur, eiusque loco substitui posse. In succedaneis, alia simplicia enumerabimus, quæ ex Galeni sententia phu substitui possunt.

Vitriolum, quod Græcis calcanthum, Latinis atramentum sutorium appellatur, duplex est: Factitium & Natium. Natium in terræ venis, aut saxorũ commissu

missuris concretum reperitur: aut dum ex iis guttatim distillat, partim ex iis stieriarum instar dependet, partim in canalicium fundum decidit.

Hodie aliud item genus in terræ superficie concretum reperitur, quod vulgò copparosa vocatur.

Factitium etiam duplex est. Vnum quod in Cypro peculiariter fiebat ex aqua quadam manante ex soryos, chalcitidis, & misyos fodinis, atque in piscinas quadratas effusa, ibi sponte concresebat. Alterum fit decocta aqua in qua maduerit terra quædam atramentosa, vt hodie moris est in multis locis.

Natiuum factitio præstantius est: ideo in eorum numerum copparosa Cypria referri potest, cum sit aliorum penuria.

E' factitij generibus, Cyprium excellebat: cum verò desit, vitriolum

Romanum aut Siculum vsur

pari potest, veluti præstan-

tissimum inter fa-

ctitiorum ge-

nera.

DE



DE MEDICAMEN- torum simplicium præpa- ratione.

Sectio secunda.

De Purgatione.

MEDICAMENTA simplicia purgare, nihil aliud est, quàm quicquid medicamenti inutile inest abiicere, seu pars medicamentorum sint, seu illis permixtæ sordes; veluti repurgantur aut eluuntur radices fructus, semina, & cætera similia, quando terra aut alia re commaculata sunt, vt in omnibus rebus fit vulgò: aut veluti gummi & resinæ, quibus plerunque aut terra admista est, aut lignum, aliæve res inutiles: hæc enim liquantur & colâtur, deinde purior pars in vsum venit medicum. Medicamenta etiam ab inutilioribus partibus repurgantur, veluti radices tum recentes, tum siccæ, membrana illa exteriore, quæ terram contingit, cultello abrafa: repurgantur etiam exempta medulla interiore, quæ in multis inutilis est, veluti in cucumere agresti, dauco, pastinaca, apio, multisque aliis huiusmodi, per medium

F dium

dium sectis, corticeque à matrice separato. Sicca macerantur, deinde mediæ secantur, eximiturque pars interior vt in recentibus.

Floribus eximuntur pediculi, culices, foliaq; sola reseruantur, quemadmodum violæ purpureæ, leuceij lutei: in quibusdam etiam foliorum pars aliqua demittitur: veluti in rosis ea pars qua calyci inhæret, vnguis appellata; vt si quando in compositionibus reperire est, vngue detracto, intelligendum est eam particulam ablatam esse debere.

Fructus à cortice repurgantur exteriore, & à semine suo, & ab interiore parte illa lignosa si sint recentes, densi, multæ carnis, & cortice tenero, veluti cydonia, mala, persica, hæc enim cultello depellata secantur, interioréq; parte lignosa, qua semina continentur, repurgantur. Si verò fructus sint exigui, veluti cerasa, pruna, similiaq; cribro transmittuntur, & sola pulpa, quæ utilis est, seruat. Illi ipsi fructus, si sicci sint, macerantur & coquantur, deinde cribro cernuntur, veluti vix passæ, pruna, tamar Indi, dactyli, & similes.

Fructus duro cortice præditi, vt amygdalæ, strobili, nuces, pistacia primum confracto putamine eximuntur: postea aqua frigi

frigida aliquandiu macerantur, tum effervent; aut sarraagine igni siccantur, donec corticem interiorem remittant, & manibus confricantur, aut sacculo aspero immissi agitantur, donec depellantur.

¶ Semina cortice denso vestita, sicuti faba, pisa, cicer, purgantur leuiter tundendo donec confringantur, deinde v. anno in aërem coniecta cortices euolant.

Alia sunt semina, quorum admodum operosa est decorticatio, propter corticem illis nimium inhaerentem, veluti cnici, & hordei quæ modo supra dicto siccantur, fricanturq; sed ea excorticandi ratio semina corrumpit. Præstat igitur ea semina macerare, hordeum præsertim, deinde in mortario magno & amplo concutere pistillo ligneo, & leuiter agitare ut quod in fundo est supernaret, separatur enim paulatim cortex. Verum si non amplius supernaret, sed cogitur in vnum, tum vase aut v. anno exceptum sursum conuoluitur, ut vento paleæ separentur; deinde iterum atque sepius idem faciendum est, donec mundum sit; postremo aut sole, aut igni in sarraagine persiccatum seruatur in pitasæ. Græcorum vsus: Eadem est cnici decorticandi ratio, sed operosior itaq; placuit quibusda v. t. semen cum cortice tritum

in aquam aliúmve humorem immittatur, & per linteum rarum coletur, nam cortice relicto sola pulpa cum humore transit.

Peponum & cucumerum femina eodem modo purgantur, præsertim si non sit otium singula sigillatim decorticandi: nam operosum id est, & ea quæ ante alia repurgata sunt faciliè inueterascunt & inutilia redduntur.

Adipes liquati colando à membranis repurgantur aut cultello. Eiusmodi sunt purgationum differentia quas pharmacopœum scire necesse est. Sunt præterea & alia, sed illæ ad eos qui metallica & chymistica tractant magis spectare videtur.

De Siccatione.

SVPERA dictum est qua ratione siccantur medicamenta simplicia recens collecta, veluti herbæ, flores, fructus, radices ut melius conseruari possint.

Nunc superest ut de ea parte agamus, quæ de medicamentorum præparatione reliqua est. Plerunque ergo necesse est ut magis siccantur medicamenta, quàm si simpliciter seruanda essent, veluti si terenda sunt. Siccantur autem aut Sole, aut igni, aut fumo, aut vento Septentrionali pro Medicorum arbitrio.

Siccan

Siccantur amygdalæ, strobili, pistacia, aliq; fructus, vt facilius illis inhæreat saccharum quo inducuntur, ne, dum adhuc humida sunt, saccharum suâ candoris gratiam deperdat: tum etiam vt facilius à secundo illo cortice seu pellicula liberetur.

De Salitura.

Salitura ad medicamentorum præparationem confert, & conditura genus est. Quemadmodum carnes viperinæ tanto sale insperguntur quantum ciborum conditura postulat. Confert item vt medicamenti qualitate aliqua imbuas: veluti fit hystrieibus, echinis terrestribus, multisque aliis animalibus, quæ in vsum medicum vruntur: sed his multo sale opus est, ita vt sale operiantur & replentur. Vtilis præterea est ad medicamentorum conseruationem; veluti sunt animalium partes, & pleraq; animalia, quæ multo sale indigent. Cæterum sale condiuntur, vt in siccitate conseruentur, & postquam conuenienti temporis spatio sale operata fuerint, eximantur, ventoque aut fumo exponantur, donec siccata sint. Aut sale condiuntur, vt humida permaneat, & ea primum in muriam immittuntur; aut in illa ipsa muria relinquuntur quæ ex sale animaliumque humiditate generatur.

F 3 De

De Humectatione.
VITILLUS est hęc humectatio, ad condiendos fructus, radices, peregrinosque cortices odoratos, quos cum recentes habere non possimus, macramus donec humiditatem contraxerint.

Hordeum præterea & cnicus, vt supra dictum est, aqua insperguntur vt à cortice repurgentur.

Humectantur autem odorata nonnulla veluti ambra, moschus, si terenda sint, ne tenuiores & odorata partes exhaleant.

Quædam verò herba veluti cotyledon, portulaca, semperuiuum, & similes, quæ paucum succum cumq; glutinosum fortiter sunt, humore aliquo simili humectantur, terendo, & superinspergendo dictum humorem, qui cum dictarum herbarum succo (aliàs enim nullum remitterent) exprimendo redditur: in hanc autem rem variorum humorum est vsus, secundum Medicorum præscriptionem.

De Nutritione.
NUTRITIO humectationi similis est, sed in hoc differt, quòd cum pauciore humore & subito fiat, quoniam id quod irrigatum est confestim Sole siccatur, aut igni, deinde idem quinto aut sexto repetitur, quemadmodum sarcocolla lacte

Asinæ

Afinæ aut muliebri nutritur, & semen cari, myrobalanique emblici, tâto lacte insperfi quantû imbibere possunt, siccâtur.

Cuminum insperfo aceto nutritur, & eadem ratione resiccatur.

De Infusione.

IN infusionibus, quæ ad medicamentorum præparationem conferunt, humor in quo fit infusio, considerâdus est; & eius temperamētum, calidûsne sit an frigidus; & quantitas; & tempus quo in infusione permanebit.

Infunduntur fructus & radices, quæ humectandæ sunt ad condituram, & conseruas, in aquam calidam copiosam, donec humorem ad sufficientiâ imbiberint, deinde coquuntur.

Sic quæ nutrienda sunt paucò humore calido frigidûe maceranda sunt, id que non diu.

Quæ coquenda sunt, præsertim ea quæ sicca sunt, veluti flores, herbæ, radices, semina & fructus (nam faciliùs ita coquuntur) in iusta humoris calidi frigidûe quantitate macerântur, pro præscriptionis scopo, & aliquâtulo spatio ibi reliquuntur, donec humecta sint: Hinc fit vt facilis eorû postea sit coctio. Sic & semina quæ ad

infundendas mucilagines infunduntur.

Rosæ & violæ sub vesperâ aqua bullita macerantur in proximum diem, deinde exprimuntur, & in eandem aquam alia recentēs infunduntur, idēmq; sæpius in eadem aqua fit, ad mel rosatū colatū, aut syrupum rosatum solutium, syrupum rosatum recentem, syrupum violatum simplicem, & syrupum violatum solutium conficiendum.

Ammoniacum, galbanum, opopanax & sagapenum aceto infunduntur, vt dissolutione purgari, & commodius misceri possint, vt dicemus.

Infunduntur medicamenta purgantia in varios humores, & cū variis aliis medicamentis, quæ malā eorum qualitatem corrigant, pro variis Medicorum scopis: exempli gratia, rhabarbarū plus vel minus tritum pauco vino albo inspergitur, donec colorem emittat, deinde in liquorem à Medico præscriptū infunditur ea quantitate vt rhabarbarū tegatur, addita spica nardi, aut alia aliqua re præscripta.

Agaricum, cæteraque medicamenta purgantia, sola infunduntur, aut aliis quibusdam adiuncta, eodem modo.

De Dissolutione.

DISSOLVTIO multorum medicamentorum

mentorū præparationi utilis est, sicuti & infusionem, vt à sordibus expurgentur ac commodè aptari possint.

Quod ad præparationem attinet: Medicamenta variis humoribus, variisq; modis dissoluuntur pro medicamento præscripti scopo, & peculiariter lachrymæ vt galbanum, ammoniacū, opopanax, & similes: nam vino aut aceto dissoluuntur, deinde ad locum agitantur vt colatione purgari possint, meliusque in medicamentorum compositione premisceri.

Vitriolum, misy, chalcitis, melantheria, & alumen, primùm trita, aqua, vino, & aceto dissoluuntur, pro rei exigentia.

Metallica quædã æstate dissoluuntur aceto, & ad Solem multos dies agitantur, quemadmodū ærugo, squamma, flos æris.

Lithargyros soluitur aqua, vino, oleo, & aceto, facilius tamen aceto, vt in oxelæo Galeni dicitur.

Conchæ, & vngues dissoluuntur succo limonum. Opium Thebaicum soluitur aqua, aut liquore, aut oleo, aut adipe: nam illorum substantiæ non permiscetur.

Solutio infusioni proxima est, & ab ea solum differt, quod in dissolutione minus humoris requiritur quàm in infusione: præterea quod in dissolutione mouendum

F 5 est id

est id quòd soluitur, in infusione nequaquam. Denique multa medicamenta vt dissoluantur igne egent.

De Liquatione.

L I Q U A T I O à solutione differt. Nā liquatio perpetuo fit aut ignis calore, aut Solis, rerumue putrefactione calefcentiū: Pleraque verò sine calore dissoluantur. Præterea, quæ soluntur humore aliquo semper opus habent: quæ verò liquantur nullo egēt humore, veluti adipēs, medullæ, olea concreta frigore; hæc siquidem exiguo igne liquantur, aut Sole, aut duplici vase.

Ambra carabe appellata, bitumen Iudaicum, pix, pix græca, cera, gummi, maiore calore opus habent, non tamen tanto vt frigantur.

Plumbum, argentum, aurum, æs, multo maiore calore opus habent: ferrum verò ægerrimè liquatur; tamen si rarò aut nunquam contingat pharmacopœos huiusmodi liquare, sed hos dūtaxat qui metallica tractant.

De Mollitione.

M O L L I T I O liquationi proxima est: nam quæ liquantur medicamēta, eadem mollescunt leuiter calefacta aut igne, aut sole, & pistillo calido subacta, aut mani-
bus

bus calidis tractata, vt fit cum emplastra
in corio aut aluta extenduntur. *De Duracione*
Pleraq; alia, nec pinguia, nec resinosa,
sed suapte natura dura & sicca mollescunt
affuso humore aliquo, vt in catapotis v-
su venit & aliis medicamentis.

De Duracione
DURATIONE fit, frigore coalescenti-
bus iis quæ liquantur, & molliuntur calo-
re: quædam verò admistis, pro rei necessi-
tate sicioribus durantur. *De Calfactione*

MEDICAMENTA igne, sole, & re-
rum putridarum calore calefiunt. Quæ
humida sunt, & igne calefiunt: commo-
diùs duplici vase calefiunt, quorum alte-
rum maius scilicet plenum sit aqua tepida
aut feruida, alterum verò plenum sit me-
dicamento quod calfaciendū est, ea ratio-
ne vt minus vas in aqua maioris consti-
tuatur: idq; à recentioribus balneum ma-
riæ, à veteribus duplex vas aut diploma
appellatur, eadem enim omium est signi-
ficatio.

De Insolatione, & ea quæ sub fimo,
vinacis, & sausa seu fraci-
bus oliuarum fit, pu-

trifactione.
INTERDYM hæc cōferunt ad calefaciē
da

da medicamēta: plerunq; ad ea cōponēda, & ad perfectionē reducēda: & instar coctiōis est. veluti olea simplicia quibus flores infunduntur, rosæ, violæ, chamæmelum & similia aliquot diebus insolantur: sic etiam ad saccharum candi perfectē coquendum, iuleb ampullis quibusdam insolatur.

Scillæ succus, vt dicemus, extrahitur insolatione: quod si Sol non splendeat, igne: aut quod commodius est, duplici vase, diu, & ex interuallis, & interdum bulliēdo.

Idem etiam fiet, si fimo, aut vinaceis, aut sausa oliuarum calfactarū obruantur. quemadmodum chalcitis, & cadmia, vt fiat sporicum: & iuleb ad saccharum candum conficiendum: & pleraque alia medicamentorum genera.

De Coctiōe.

MEDICAMENTA simplicia aliquo humore coquuntur aut vapore, hoc genus coctiōis elixatio vocatur: aut cum siccitate, & hoc assatio appellatur; Coctio autem fit ad præparationem, & ad compositionem. De præparatione nunc dicemus.

Quæ in humidis coquuntur, ea gratia id fit, vt ipsa medicamenta sic cocta vsui esse

esse possint, aut vt humoris duntaxat in quo cocta sunt vsus sūt.

Rursus quæ, vt coctis vtamur, coquuntur, plus cocturæ requirūt, quàm ea, quorum decoctio in vsu est. Sunt tamen certæ quædam notæ, quæ denotant, an huius aut illius rei gratia bene coctæ sint: vt herbæ, radices, flores & fructus cocta sunt, quando ita tenerescunt, vt tundi, & per cribum transmitti possint.

Semina quædam, veluti lini, sœnigræci, hordei, cocta cœsentur vbi crepuerint: alia quædam veluti anisi, coriandri, & cumini, quando tenerescunt.

Fructus peregrini & sicci, vt sunt myrobalani, cortices, ligna, & radices siccæ, multam desiderant cocturam.

Herbæ & flores facilè coquuntur & citò tenerescunt, tamen si inter sese differât, prout magis tenuium sunt partium, & illorū facultas in superficie sira est, vt chamæmelum, adianthum, serpillum & similia, quæ quando vna eum aliis coquuntur, primùm immitti debent cum illa prope modum cocta fuerint.

Eadem est ratio radicū tenuium partium aut odoratarum, vt est asarum, valeriana, spica, nardi, & alia aromata, quæ sub finem decoctionis iniiciuntur, sed post reliqua

reliqua medicamenta flores.

Elixationis autem multæ sunt differētia. Primus modus est, vt vasi certā quādam ac præscriptam humoris quantitatē cōtinenti infundātur quæ coquēda sunt, magis aut minus, pro medicamentorum siccitate aut recentia: deinde vase imposito igni, primum satis fortem patiētur bullitionem, deinde lētam, vt commodius ad eam quam optamus cocturam reducantur, neq; medicamenti vires exoluantur. Secundus modus est, vt eadem planē ratione in diplomate coquantur. Tertio elixationis modo vtitur Gal. in fructibus. Hos suspendit in vase aqua feruida semipieno, eōsq; voluit tantisper donec æqualiter teneantur: sic enim fit vt fructus facultas non exhalet, quemadmodum si calore sicco coqueretur: neque in humorem transit, quemadmodum si in aqua coqueretur.

Cæterum vasa in quibus coquēda sunt medicamenta, figurina esse possunt vitrata & macerata, vitrea, ærea, stannata, cuprea; præstantissima sunt vitrea, in duplici vase, aut apud ignem, aut in arena, aut cineribus, aut in fornace cui subit ignis. Ignis struendus ē carbonibus, aut prunis, & lignis siccis acapnis.

De

De *Affatione, & Frictione,*
& *Vstulatione.*

A S S A R E, est medicamenta humore aliquo prædita, veluti carnes, fructus & radices, sine humore alio externo coquere.

Frigere, est illa ipsa medicamēta, aut alia sicca, additis oleis, aut adipib², aut alio aliquo humore pauca quātitate coquere.

Vstulare, est medicamenta quædam, tantum humoris non habentia vt coqui possint, frustulati in secando calefacere, illis tegulæ impositis aut laminæ ferreæ calidæ, donec partes externæ siccentur & veluti torreantur, quemadmodum fit in rhabarbaro, myrobalanis, semine melanthij, & aliis.

Quæ assanda sunt, veru transfixa ad ignem perpetuò versantur, vt vndiq; ignē sentiant: aut in clibano coquantur, aut in vase fictili iuxta ignem posito, & testa cōtecto, supra positis prunis ardentibus; aut per sese: aut massa panis inuoluta, vt scilla: aut malo cydonio imposita, vt scamoniū quod corrigendum est: hoc nanq; malo cydonio concauo exempris seminibus impositum coquitur aut in clibano, aut in in olla fictili ad perfectionem; aut sub cineribus linteo aut foliis inuolutum, aut nudū: tamen si huiusmodi coctionis

nis

nis genere naturales medicamentorum facultates dissipentur: præstat igitur aliis modis uti, ut maximè oportunum videbitur: non enim peculiariter id præscriptum est.

Frixio fit aut in sartagine, aut in testa. Torrefactio ut ante dictum est.

In his autè omnibus modus seruandus est: nam neque cruda eximenda sunt, quæ aut assatione, aut frixiõe cocta esse debet: neq; etiam adeò coquenda ut torreantur aut vrantur, & inutilia eum in quem præscripta sunt scopum reddantur.

De Vstione.

V R V N T V R medicamenta aut per se accensa, ut sarmèta, rami ficus, cerri, herba cali, & pleræque aliæ: aut prunis ardentibus imposita, aut ollæ imposita cum sulphure, aut sola.

In olla vrantur abrotonum, anetum, cucurbita, imposita carbonibus ardentibus, quæ tantisper igniri sinitur, donec herbæ in cinerem reducantur.

Sericum sic vritur. folliculi recentes detracto glomere serici quo vestiuntur vrantur in olla carbonibus imposita: idque non ut in cinerem redigatur: sed eximuntur cum ea accessit vstio, ut commodè teri possint.

Vrantur

Vruntur pleraq; animalia, veluti Echini terrestres, hystrices & hirundines; sale insperfo, ollæ imponuntur supra carbones aut in fornace calida: operculo autem foraminulento tegenda est olla, vt ex sublatris halitibus cognosci possit, cum satis vsta fuerint. Cæterum cauendū est sibi ab halitibus qui è viperis & scorpionibus at tolluntur, noxij enim sunt.

Sal & nitrum eodem modo vrēda, vsta autem esse indicium est, cum nō amplius exiliunt, & strepunt.

Alumen, vitriolum, corallium vruntur in fictili aperto, vt videri possit cum cocta erunt, cuius indicium est si amplius non ebulliant, si perfectè inaruerint, si bullas excitare desierint: vitreolum seu calcantum, si colorem mutauerit.

Ossa, vngues, cornu ceruinum eodem planè modo vrenda supra carbones, donec nullum fumum amplius exhalent, coloremque mutant.

Canceri diebus canicularibus capti, Lunæ decimo octauo die, vruntur in sartagine xrea.

Lapides sub carbonibus vruntur à foliis vel stabellis excitatis donec planè igniti sint, deinde humore aliquo extinguuntur; ac rursus sub carbonibus ponuntur,

G

aut

aut commodiùs in vrceolo Aurifabrorù,
toties repetendo donec in puluerem redi-
gantur.

Aeris & plumbi laminæ tenuiffimæ, cū
sulphure & fale alternis ollæ crudæ impo-
nuntur: hæc carbonibus cingitur, aut in
fornace reconditur donec percocta fit: vel
vrceolo reponitur supra carbones donec
planè ignitus fuerit. Dum verò plumbum
ardet, affiduè verſandum eſt, donec totū
in puluerem redigatur. Poceſt etiam plū-
bum ſine ſulphure & fale vri in fornace
quæ duo habeat ora, mediâque ſit diuiſa
muro lateritio dimidium pedem alto: &
in vna parte ignis ſuccendatur, in altera
plūbū repositū affiduè verſetur donec to-
tum in puluerem redigatur: Hæc verò v-
rendi ratio vtilis eſt, cū plumbi copia
eſt vrenda, ſic enim & ſumptibus & tem-
pori parçitur.

Stibium pinſita farina circumlitum &
carbonibus obrutum torretur, donec ipſa
cuſta aduſta ſit: Si enim paulò magis cre-
metur, ſit plumbum.

Reſinæ, olea, pix, thus, ſtyrax, & ſimilia
vruntur ad fuliginem eorum excipien-
dam: nam aut his in vas cōiectis ignis im-
mittitur: aut in liquatis elichnium accē-
ſum imponitur, & patina fictili aut xrea in
ver

vertice foraminosa quo fumus exhalare possit, fuligo adhærens excipitur.

De Exinctione.

GEMMÆ & quædã metallica sæpius, antequam vrantur, ignita extinguuntur aqua, vino, oleo, melle, butyro, aut alio aliquo humore, donec refrixerint.

Quædam semel dūtaxat, aut sæpius extinguuntur, ex Medicorum præscripto.

De Tritura.

MEDICAMENTA terūtur, vt, quia commisceri propter crassitiem & duritiẽ non possunt, reducta in puluerẽ exactius misceri cum aliis possint: crassius autem aut tenuissimè teruntur pro Medici vario scopo. Terendi autem modus varius est, pro simplicium natura.

Metallica valenter, & diu terẽda sunt.

Medicamenta odorata veluti cassia seu canella, caryophylli, macis, & similia moderatè sunt tundenda, ne pars tenuior exhalet, & interdum illis aut amygdalæ adduntur, aut aqua rosacea inspeiguntur.

Radices odoratæ, vt angelica, valeriana, garyophyllata, asarum, eodem modo, eadẽmque diligentia terendæ sunt.

Quæ verò nõ sunt odoratæ, sed crassæ & solidæ, vt gèriana, peucedanũ, bryonia, violèto ictu & diuturno verberadæ sunt.

G 2 Herbx

Herbæ odoratæ, sicut calamintha montana, amaracus, serpillū, præterea flores, eodē modo terūtur, quo radices odoratæ.

Thus, mastiche, sarcocolla, & succi qui humorem, & lentorem retinent tundēdo non teruntur, sed elementer ducto pistillo per fundum ac latera mortarij.

Gummi & lachrymæ, quale est gummi arabicum, tragacantha, eodem modo terentur.

Rhabarbarū, & quædā aliæ radices alio quo humore præditæ eodē modo terēdę.

Galbanum, ammoniacum, opoponax, bdellium, myrrha, succus glycyrrhizę, hyocistidis, cucumeris syluestris, & opium thebaicum teruntur affusa aqua, vino, aceto, aut alio humore.

Moschus & ambra cum aqua rosacea, ne partes odoriferæ euanescent.

Similiter & semina quædam, quæ glutinosum quiddā & pingue habent, vt thlaspi semen.

Semen napi & sinapi sola non terūtur, sed aliis medicamentis siccis permixta teruntur, aut cum humore aliquo, pro rei necessitate.

Fructus recentes, & radices recentes, quarum usus est in compositis medicamentis, ante & post coctionem tunduntur, vel
frust

frustulatim secantur, aut mediocriter tantum cōfractæ infunduntur vt dictum est.

De Tritura crassiore.

T R I T V R A crassior fit dum medicamenta crassius duntaxat franguntur, nec in puluerem reducuntur vt in tritura absolute sumpta. Hæc plerisque medicamentis quorū talis vsus requiritur, utilis est: Aliis præterea multis medicamentis quæ alia præparatione indigent, veluti sunt herbaræ & radices quæ coquendæ sunt, & ea quæ in tenuissimum sunt reducenda puluerem.

De Tritura subtiliori, seu Attritione.

M O L V N T V R seu teruntur semina quædam, veluti triticum, lolium, lupini, semen lini, & sænigræci, quòd commodè tundi non possint; tum etiam quòd cortex vnà cum farina misceretur.

Teruntur præterea quædam metallica, quæ contusa in puluerem tenuissimum reduci non possunt, veluti thuria.

Sic & lapides pretiosi, lapis lazuli, armenius, teruntur in mortario marmoreo lato fundo, cum molula marmorea, inspersa interdum aqua rosacea, aut alio humore, ne puluis euolet.

Commodius item teruntur in porphyrio marmore plano, diu ducta per ipsum

G 3 marmor

marmor molula, donec prioribus digitis confricando medicamēta, nulla amplius inæqualitas sentiatur.

De Confricatione.

LAPIS Iudaicus, & hæmatites, multique trochisci & collaria ad oculorū morbos parata, liquantur confricatione ex aliquo humore ad corem medicam, qualis etiam nū hodie ex Naxo insula adfertur.

Plumbum verò liquatur in hunc modum. Infusus in plumbeum mortariū humor, pistilo plumbeo verberatur atq; agitur donec crassescat, deinde lauatur, ac plumbum subsidere finitur, tum aqua effusa plumbum reponitur.

Eodem modo liquatur æs ad chrysolam conficiendam.

De Cribratione.

CRIBRANTVR farinæ, vt à furfuribus, & à corticibus secernatur flos purior ac tenuior. Cribrantur etiam medicamenta quæ teruntur, vt puluis equalis sit, partēsq; crassiores in cribro retineantur.

Tela autem ex qua cribra sūt, densior aut rarior esse debet pro vario medicamentorum scopo.

Lithargyros pertelam secernitur, ne suo pondere cribrum stamineum confringat, crassiōrq; secernatur quàm opus sit.

Cribr

Cribratur etiã radices coctæ & fructus
vt à corticibus & seminibus repurgetur.

Pulpa itidẽ cassiæ solutiua cribro trãf-
mittitur, vt solus flos seu pulpa, à corticis
fragmētis & seminibus repurgetur: sic e-
tiam tamarindi, & dactyli humectati, aut
infusi, aut cocti pro rei necessitate.

De Lavatione.

LAVANTUR medicamenta, si foris
re aliqua sunt contaminata. Sed hoc lotio
nis genus præparationi medicamentorũ
peculiare non est, sed cæteris rebus com-
mune, quæ luto, vel re alia contaminatæ,
lauatione opus habent.

Lotionis autem, de qua hîc agendum,
duplex est finis: vt videlicet à medicamen-
tis qualitas aliqua tollatur: aut vt aliam
aliquam facultatem acquirant.

Cæterum ex his quæ ad serdium sepa-
rationem abluuntur: Calx & aloë tenuissi-
mè terendæ sunt: deinde affusa aquæ co-
pia satis magna simul miscentur & quies-
cere ac ad fundum vasis subsidere sinuntur
tum effunditur aqua: atq; id sæpius repeti-
turdonec aqua pura remaneat: deniq; me-
dicamentum siccatur ac reponitur.

Metallica tenuissimè leuigata, ac in a-
quam purã, aut marinã, aut acetũ, aut a-
liũ humorẽ immissa, in Sole feruidissimo

totum diem rudicula agitantur, & per noctem resident, mane aqua effunditur, atq; alia iniecta rursus eodem modo agitantur, quoad aqua quæ effunditur sit limpida.

Lapilli minutissime confracti, in aquam aliumve humorem iniiciuntur & manibus confricantur ac agitantur, deinde ubi subsederint, aqua effunditur, idq; toties repetitur, donec aqua pura emanet.

Sic lauantur acacia, & alij succi qui commode in pulverem redigi non possunt, gummi Arabicum, & lacea.

Resinæ, adipēs, medullæ, & olea liquantur, agitantur, aqua affunditur totius ac effunditur donec pura appareat. Oleum verò lauando minus est verberandum, ne aquæ adeo misceatur, ut post ægrè possit separari.

Quæ in decoctionibus aut succis lauantur medicamenta, ut de illorum facultate non nihil acquirant, cum tanta humoris copia lauari non debent ut prædicta, neque toties, neque ea adhibenda est diligentia in illis ab humore segregandis: quemadmodum si aloë succo rosarum, aut intybi, aut cum specierum decoctione lauetur ad pilulas alephanginas: & turbith cum agarici & tithimalorum decocto, ut valētius purgent.

De

De Succorum extractione.

Succus ex foliis & germinibus per se tritis exprimitur, & depuratus siccatur aut Sole aut igni, donec eam consistentiã nanciscatur vt in pastillos formari possit, ac ita seruari. aut liquidus seruatur in vase angusti oris, super fuso oleo digiti crassitudine.

Sic exprimuntur succi ex fructibus, veluti ex vua immatura, malis punicis, sorbis, mespilis, cydoniis, limonibus, & similibus, & interdũ scarificatione: sed liquidi seruãtur plerunq; eo quo iam dictum est modo, aut sale insperso, vt omphacium.

Quædam herbæ quæ pauco humore eòq; lento sunt præditæ, vt hedera, portulaca, cotyledon, semperuiuũ, opus habent admista aqua, aut alio liquore illarum facultatibus simili, inter terendum, vt expressione, vñ cum ipso humore extrahatur: aut si tusæ calathæ imponantur loco frigido, vt paulatim succus in subiectum catinum defluat.

Ex radicibus autem & herbis quibusdã siccis, aut pauco humore præditis, vt est lentiscus, absinthium, glycyrrhiza, cętaurium maius, gentiana, & similes, succus hac ratione extrahitur. Quinque diebus in aqua macerantur, deinde in eadem

G s aqua

aqua coquuntur donec crassescat: colata
postea aqua denuo coquitur quoad mel-
lis crassitiem habeat, tum in sole siccat,ur,
ac in pastillos conformata reponitur.

Ex ebulo, iride, cucumere asinino scari-
ficatis aut tritis, succus expressione extra-
hitur, vt suprâ dictum est.

E' thapsia autê & peucedano, scrobe cir-
eû radices facta cortex inciditur, liquôrq;
emanans subiectis foliis aut vase aliquo
purus excipitur. Thapsiæ succus sole, peu-
cedani verò vmbra siccat,ur. Ex his etiã
tritis, aut scarificatis, expressione succus
extrahitur: sed chirothecæ manibus indu-
cendæ, & facies velanda est, ne vapores è
thapsia exhalâtes faciê inflêt & exulcerêt.

E' tithymalis succus vindemiis expri-
mitur incisis summitatibus, & succus ef-
fluens vase exceptus Sole siccat,ur, aut fa-
rinæ orobi pmiscetur, aut fico sicca quin-
que aut sex guttulæ excipiuntur, ficusque
reponitur, vt ait Dioscorides.

Hypocistis quæ sub veris finem radici-
bus cisti adnascitur, teritur, & succus ex-
pressus Sole siccat,ur.

Ex cucumere agresti elaterium sic col-
ligitur. Decerpti cucumeres maturi, qui ta-
cti protinus exiliunt, imposito supra vas a-
liquod rariore cribro, sigillatim supino
cultro

tro sursum versus aciem habente finduntur, atq; per cribrū humor in subiectū vas exprimitur, simūlq; carnosum quod ha sit cribro, quo facilius excidat, eliditur: Coa-
 ceruata autē in cribro segmina dulci aqua perfundūtur & denuò pressa abiiciuntur: humor in pelui agitur, & linteo o-
 pertus duplicato, Soli exponitur: dūmque steterit, tota supernatās aqua cum spuma identidem effunditur, deinde conterendo cogitur in pastillos, & seruantur.

Scillæ succū sic extrahit Galenus. Scilla viginti diebus ante caniculæ exortū euulsa, atq; à Corticibus externis purgata, manibus in exiguas discerpitur particulas, & in vas coniicitur à quo recenter exemptum fuerit mel: postea bene adaptato operculo illud obturās, extrinsecūsq; pelle circundans & diligenter colligans, in loco meridiem spectante, qui à borealibus non perflatur ventis, Soli exponitur quadraginta diebus, interdum vas vertendo, vt ex omnibus similiter partibus Solem sentiat: deinde vas aperitur, & is humor qui supernatat, colatur, melle conditum coquitur ac seruatur. Ex scillæ carnibus fermento quodam inuolutis ac quasi coctis, deinde tufis & cū melle mistis fit elegma scilliticum, succo iam dicto p̄ simile.

Cu

Cucurbita, farina pista inuoluta, & in
 clibano cocta ad crusti frumentacei co-
 ctionem; aut scarificata deinde expressa,
 succum emittit cuius vsus est.

De Muccaginum extractione.

MVCCAGINES ex semine psyllij, li-
 ni, fœnigræci, cydoniorum, & è radicibus
 quarundam plantarum, vt est althæa, ma-
 lua, acanthus, infusis in aqua noctem
 vnam, extrahuntur: miscetur deinde dicta
 aqua, & calescit donec bulliat, & semina
 crepent, & mucago crassior supernatet:
 tum enim mantili ex tela noua forti im-
 ponitur ac colando exprimitur, aut vir-
 gis duabus intorquetur sacculus à sum-
 mo ad imum, ac alio bacillo percutitur
 succusque deraditur.

Psyllium item (vt eclegma de psyllio
 suauius fiat) maceratur aqua recenti per
 24. horas, deinde rudicula sæpius agita-
 tur, donec mucago supernatet, excepta
 inde mucago colatur ac in vsu seruatur.

Simile est mel anacardinum appellatum,
 quod fit ex recentibus anacardiis exiguis
 diutius coctis, ex his enim enarat liquor
 quidam aut mucago prædictæ similis.

De Destillatione.

HERBAE, flores, fructus, liquores, &
 animalia, potius vasis vitreis aut figulinis
 destil-

destillanda erant, quàm plumbeis vt vulgò fit: rameru experientia comprobatum fit, medicamenta plumbeis vasis destillata non tantam noxam adferre quam pleriq; metuunt: animaduertendù tamen est, omnino plumbeis vasis non esse destillandum acetum, omphaciù, limones, aliásq; res acres quæ intra corpus assumendæ sunt, nam faciliè incommodum adferrent. Optimus quidem esset is calor, quo in destillatione sursum vapores attolluntur, qui ex aqua feruente fit; minus enim medicamentorum facultatem corrumperet: difficilis tamen ea est destillandi ratio, magnarúmque impensarum, & aquæ sic destillatæ non diu perdurant, quin faciliè putrescant. Itaque necessarius est ignis è carbonibus accensis, aut lignis siccis nec fumum, nec tetrum odorem expirãtibz, moderatus, non magnus, æqualis. Commodissima ea est ratio quæ fit vase, quod materiam continet destillandam, sub cineribus aut arena in fornace sepulto, & igne cineribus aut arenæ subdito: sic enim temperatior est calor, commodiúsq; humor extillat, & melior est, priorq; posteriori similior est; etiam si ex omnibus quæ destillantur liquor qui primò, qui secundò, quique postremò elicitur aliquantulum

lum inter sese differant.

Fit etiam destillatio vase floribus aut ligno completo, quod foraminosum sit, aut telam, craticulamve habeat qua destillanda sustineantur, tegula aut operculo supra vasis orificium imposito, in quibus carbones accensi, calore suo destillare faciant in fundum subiecti vasis, aut aquam, aut oleum non minus odoratum, quàm quod vulgari modo elicitur.

Porrò aquæ destillatæ per aliquot dies Soli exponi debent in vasis linteo aut mēbrana perforata obturatis, vt quicquid excrementosum est resoluatur, simulque exhalet empireuma quod in aquis destillatis remanserat.

Alio præterea quàm ignis calore fit destillatio, nam & per simi calorem, vinaceorum, & fausa fiunt destillationes, verùm hæ in medicamentis præparandis non sunt admodum aptæ, sed potius ad chymistas referri debent.

De Oleorum extractione.

O L E A è fructibus, seminibus, liquoribus, lachrymis, rebúsque omnibus pinguis, & etiã è metallicis exprimi possunt.

E' fructibus, veluti ex amygdalis dulcibus & amaris, ex strobilis, pistaciis, balano myrepfica, nucibus, & nuce moschata.

E' cer

E' certis seminibus, veluti è semine lini, sesami, ricini, & aliorum. Exprimuntur autem in hunc modum.

Fructus & semina cortice duro prædita purgântur, teruntur, & loco calido, quo ad Solem, aut in duplici vase reponuntur: dein de rursus trita, torculari exprimuntur; aut, cum trita sunt, inspersa calida aqua, tantisper agitatur, donec oleum supernatet, tum manibus, aut torculari exprimuntur.

E' fructu oleæ, lauri, iuniperi, & lētisci maturo in aqua cocto, oleum supernatans aquæ colligitur: aut ex eis tuis inspersaq; aqua calida oleum vt supra exprimitur.

E' lignis, iuniperi, aloës, guaiaci, piceæ, oleum extrahitur. capitello figulino cocto, aut æreo sumpto, cum eiusdem materiæ receptorio cuius fundo craticula ferrea insi deat; receptorium illud ligni fragmentis impletum in pyramidis formam, vt applicatum capitellum super receptorio, quodammodo etiã impleatur. deinde supra aliud vas pedem altum imponuntur, quod tantum in terra reconditur, vt matella plena cum capitello suo huic imposita; matella quidem sub terram recondatur, capitellum verò solum extet, circa quod ignis extruendus est, cuius calore oleum ex lignis elicatur, ac in subiectum vas decidit.

E' lachry

E' lachrymis, resinis, & liquoribus, oleū alembico in matellis vitreis elicitur, quē admodum in destillatione dictum est.

Sulphur in exiguo vase vritur superimposito capitello lato quod vapores in altum elatos in humorem conuertat: sed is humor aqua potius, quàm oleum est.

Oleum verò etiam per alembicum elicitur ex sulphure, quemadmodum ex resinis, lignis, gummis, cæterisq; rebus, è quibus oleū, rationibus suprà dictis, extrahi potest. Sed etiam in hunc modum aliquādo extrahitur. Sulphur liquatum laterculique tenuissimè triti æquis partibus per alembicum destillantur, deinde fræces cum humore extracto rursus permistæ denuo destillantur.

Sic etiam è cera extrahitur, nisi quod humori primùm extracto adduntur vnciæ tres lumbricorum vino albo ablutorum, & drachmæ duæ croci tenuissimè leuigari, deinde iterum permista cum fræcibus prioris destillationis, destillātur.

E' calcantho sic fit. Calcanthum quàm optimum, quod ea facultate præditum sit, vt ferrum politum contactu suo æris colore tingat, tenuissimè tritum in matellam infunditur, & applicato capitello destillatus humor reponitur, ipsūmq; calcāthum

thum eò vsq; supra ignem relinquitur, do-
nec vstum sit & rubrum: deinde exemptū
teritur, & humori suo permistum, denuo
in vas coniicitur & per diploma destil-
latur donec oleum emanet.

Ex stibio sic. Stibium electissimum te-
nuissimè tritū in matellam coniicitur af-
fuso tanto aceto stillatitio, vt stibium te-
gat quatuor digitis: deinde obturato ore
vasis sub fumum calidum per octiduum
reconditur: postea destillatur lento igni
in fornace cineribus aut arena plena: & si
nullus humor amplius stillet, eximitur
vas & affuso aceto stillatitio, vt primū,
sub fimo calente quatrimum sepelitur,
deinde in duplici vase per vnam aut duas
horas coquitur: & vase exēpto, si quid hu-
midi remansit filtro colatur, & recenti ad-
dito aceto stillatitio, vt initio factū est,
permiscetur & toties per filterum colatur,
donec clarum emanet: tandem omne ace-
tum percolatū lento igni destillatur, &
cū nihil aceti amplius emanat, quod
reliquum est, oleum stibij seu antimo-
nij appellant.

Oleum tartari fit ex tartaro vsto in va-
se fictili lutato, in fornace, in qua vitra
aut laterculi coquantur, donec candi-
dum fiat: deinde in sacculo impositum

H in cella

in cella reponitur, ex quo liquor emanat aquæ quàm oleo similior.

Oleum ouorū sic fit. Vitelli ouorum eligendo duratorum manibus friati in sartagine terrea plumbata frigantur, igni mediocri, assidue mouēdo donec oleū ab his resoluatur, & sic calidi panno lineo inuoluantur, & torculari exprimatur oleum, quod refrigerari sinitur, donec limpidū fiat.

Ex frumento & sinapi torrefactis in patina terrea, oleū torculari exprimitur: aut trita, in patina lento igni friguntur, & inspersa aqua mouentur, deinde torculari exprimuntur.

De Expressione.

EXPRESSIONE, medicamento- rum humida & tenuis substantia extrahitur, & à crassa ac sicca separatur, veluti fructuum ex quibus oleum aut succi exprimuntur, herbarum, radicum: tum etiā decoctionum & infusionum quarum pars humidior in vsu est.

Expressionis instrumenta sunt manus, prelum, sacculus qui duobus baculis comprimitur & ceditur, tela aut stamen vulgare manibus contortum vt vulgò fit.

Debent autem medicamenta plus vel minus pro vsus necessitate exprimi.

Succi & olea forti expressione extrahuntur.

tur. De decoctionibus verò & infusionibus ex præscripto medicorum agendum.

De Colatione.

COLATIO fit vt pars crassior separetur, vt in succis, oleis, decoctionibus, infusionibus, iulepis, syrupis, gummis, lachrymīs & resinis liquatis.

Varia autem sunt colationis instrumenta, vt fistulæ seu tubi, stamen, pannus, sacculus, vasa figulina cruda, vasa heracea, quæ tenuem humorem transmittunt, crassiorem substantiam retinent, officinis ignota.

Humida, quales sunt succi, syrupi, infusiones, & decoctiones, per stamen vulgare colantur, aut laneis pannis extensis, aut per colatorium, quo solo, aut duplici, aut triplici vtimur, primo minore & rariore, secundo maiore vt summum ambire possit relicto tamen vndique trium digitorum intervallo, tertio eoque infimo, maiore secundo ad eandem proportionem, atque densiore: quibus humor eadem opera perfectissimè colari potest.

Iulepi, syrupi cum saccharo aut melle confecti, colantur linteo raro, aut stamine vulgari in ligno extenso, aut sacculo stamineo, iique calidi, nam frigidi transmeare non possent.

Colantur etiam nonnulla per filtrum, vt calcanthum aqua dissolutum, & alia similia venenosa facultate prædita, in hunc modum. Filtrum sumito quatuor digitos latum, longumque vt vasis fundum in quo medicamentum colandum continetur contingat, altera extremitate acuminata extra vas propendeat: illud enim assidue humorem imbibit, illumque in aliud vas contiguum effundit.

De Clarificatione.

L I Q U I D A medicamenta quibus multa materia admista est clarificantur: dum quiescere permittuntur, donec quod sæculentum est subsideat, sumendo quod clarificatum est: aut dum colantur vt antè dictum est: aut dum quæ ægrè clarescunt, Soli exponuntur; aut igni coquantur, ac despumantur, dein colantur; aut iniecto omphacio, vel succo limonium, vel aceto; vel ouorum albumine verberato (vt vulgo fit) dum bulliunt, dein despumator ac colator.

De Despumatone.

D E S P U M A T I O fit, de rasa, dum medicamenta coquantur, spuma quæ supernat, cochleari ferreo pertuso, ne cum spuma etiam humor, in quo fit coctio, abiiciatur: hæc omnibus quæ co-

quon

quantur communis est.

Despumantur etiam succi, mel, saccharum, reiectis partibus crassioribus & excrementiciis, dum coquantur, aut per se, aut albuminibus ouorum bacillo quassatis, vt in clarificatione dictum est: deinde spuma ablata cochleari perforato, aut colatione per stamen facta, aut per pânū laneum clauis affixum, aut per colatorium.

De Coloratione.

MEDICAMENTIS color acquiritur, admistis quibusdam coloratis, vt est ærugo rasilis, cinnabaris, minium vulgare, cerussa, & similia: aut diutina coctione quemadmodū ea quæ æruginē recipiunt.

Quædam viridia sunt, quædam rubra, quædam nigra: quædam lotione candida fiunt, vt oleum & terebinthina; quædam insolatiōe, vt cera, & sapo in taleolas aut laminas sectus: quædam coctione ad Solem, vt multa emplastra: quædam rudicula aut manibus diutius tractata albiora euadunt, vt penidia, eclegmata, manus Christi.

H 3

DE

DE MEDICAMEN- torum compositorum ge- neribus, eorumque miscen- di modo.

Sectio tertia.

De Conditis, aut Conferuis.



CONDITA aut conferuæ fiunt
è floribus, fructibus, radicibus
& corticibus.

Conferuæ florum, veluti rosa-
rum, violarum, buglossæ, fiunt è floribus
trititis aut minutim concisis, addendo tri-
plum aut quadruplum sacchari puluera-
ti, affusa aliquantula aqua stillaritia vt
commodius permisceri possint: deinde
Soli exponuntur bene obturato vase, &
interdum agitantur.

Fiunt etiam nonnunquam perfectè co-
cto iulepo, atque in eum iniecta tertia aut
quarta parte florum tritorum aut minu-
tim concisorum, deinde insolantur.

Fructus condiuntur aut conficiuntur
coctione; cocti enim, cribro cernuntur, &
ad singulas iulepi libras, pulpæ quatuor
vnciæ adiiciuntur, deinde lento igne co-
quantur donec ad eam cōsistentiam per-
ducti

ducti sint vt nec nimiū liquidi, nec nimia coctioe aridi & exsuccī sint redditi: quod experientia facile deprehendi potest: nā si guttula in marmor aut ferrum demissa, manus, ybi refrixerit, non inquinat, iustam esse coctionem, censebitur.

Condiūtur præterea fructus si primū repurgati à cortice & ossibus, æquis partibus cum saccharo & aqua lento igni coquantur, donec saccharum totam fructuū substantiā penetrarit, & ad iustā coctionē perducti sint: quod ex eo deprehendetur, si iulepus consistentiam habeat lentā, ita vt digitis ductus fila tenuia mittat, sed id experientia ipsa certius commonstrat.

Fiunt etiam conseruæ fructuum, ex eorum succi vncijs sex in singulas sacchari clarificati libras, coctis lento igni quoad gelatinæ crassitiem ademptæ sint, ac tum in pyxides coniciantur.

Formantur præterea in pastillos eadē florū & fructuū cōseruæ diutius coctæ.

Fructus peregrini primū macerantur, deinde cocti cum iulepo dilutiore, quem longum vocant, condiuntur.

Radices vt condiantur, primū terra & cortice exteriori purgatæ, & marrice, deinde in partes sectæ, coquantur in iulepo dilutiore donec radicū substantiam pe-

H 4 netrarit,

netrarit, & probè coctæ sint vt in fructibus dictum est.

Cortices quorundam fructuum, veluti citriorum, malorum medicorum & limonum, quòd substantia sint aliquantulum amara, primùm aliquot dies in aqua macerantur, sæpius aqua murata, deinde aque incoquantur donec tenerescant; tandem in aquam recentem semel atque iterum immittuntur; postremò in iulepum aut mel, cui multa sit aqua admista, iniecti coquantur ad iustam crassitiem.

Radices & cortices peregrini humectantur, deinde in iulepum impositi coquantur, vt de fructibus dictum est.

Conseruæ florum & fructuum annum durant & interdum biennium, cortices diutius: & in pyxidibus aut vasis bene obturatis reponuntur.

Interdum à Medicis adduntur iam distillarum conseruarum iulepis aromata, & medicamèta purgantia, vt infrà dicitur.

De Infusionibus.

S V P R A dictum est qua ratione fieri debeant infusiones ad medicamentorum præparationem, nunc verò de earum compositione agemus.

Duo sunt earum genera; nam aliæ per se corpus purgant: aliæ adduntur allis medicamen

dicamentis quorum nonnullas medicis recentioribus maximè vsurpatas describemus. Vtrunque infusionum genus sæpius à medico præscribitur, in quo humore, qua quantitate, qualitate, calidæ an frigidæ, quantòq; tēpore fieri debeant: item quales debeant fieri expressiones, fortes an imbecillæ. Hæc autem omnia diligenter perfici debent: & si quando contingat vt in medicamento non sit expressa quantitas, qualitas & tempus: aut (si scribatur, infunde secundum artem) tanta quantitas aquæ sumenda est, vt medicamenta, quæ maceranda sunt operiat.

Radices, fructus, ligna, aut cortices sicci, & sæuiente hyeme, macerari debent, primum contusa & confracta, aqua tepida aut calida per viginti quatuor horarum spatium, aut supra cineres, aut in vase calido, aut ad Solem, aut loco calido, aut pellibus operta aut pannis, vt diutius humoris calor conseruetur.

Flores, herbæ, aut fructus recentes, & æstiuo tempore, macerantur in humore frigido duodecim horarum spatio. In vtrisque expressio fortis facienda est

Medicamenta purgantia, veluti agari-

H s cum

cum, myrobalani & similia crassius aut minutius confringuntur ex medici præscripto, deinde macerantur, hyeme horis duodecim, æstate sex: expressio autem magis aut minus fortis esto pro medici præscripto.

Rhabarbarum & agaricū iam confracta aut trita insperguntur aliquāto vino albo, deinde admiscentur aliis rebus sequentibus: Rhabarbarū cum aqua cichorii, spica nardi, schænantho, aut canella: Agaricū cum tāto oxymelite vt incorporari possit, & aromatizatur gingiberis momento & canella: dimidius autem scrupulus gummi triti ad singulas agarici drachmas additur: deniq; in tāta aqua stillatitia aut decoctiōe maceratur vt totum operiatur: insuper sæpius agitādum est, vt commodiūs omnia misceantur.

Omnes autē hæ infusiones recentes fieri debent, non autē ex sumendæ quæ tempus legitimū aut præscriptum diu prætergressæ sint nam faciliè corrūpuntur: quòd si conseruandæ sint, vas arena obruendū est, nam sic melius perdurant.

De Decoctis.

DECOCTIS per se vtimur: aut medicamentis quibusdam admiscemus ad eorum compositionem, aut dissolutionem,

vt facilius assumi possint.

Præscribitur item humor, quantitas, qualitas decoctorum, & an primùm medicamenta macerari debeant, qualis item debeat esse decoctio, fortis, an mitis, & si, inter colandum, crassiorū, quæ remanent, partium debeat fieri expressio, & an valens, an clemens esse debeat.

Horum omnium summa ratio habenda est; & si quando non præscribantur à Medico, in hunc modum intelligendum est, scilicet: Flores, herbas recentes, & siccas odoratas, radices graciles & odoratas, fructus, cortices peregrinos & odoratos, vt sunt nux moschata, garyophylli, cinnamomum seu canella, & macis, non multam expetere coctionem. Radices crassiores, cortices & fructus non odoratos, multam coctionem desiderare, vt copiosè suprà dictum est.

Horum autem vsus esse debet statim à coctione, aut paulò pòst, & conseruari debent in vasis vitreis diligenter obturatis loco frigidus, aut arena sepeliri, si diutius sint asseruanda.

De Sapis, Iulepis, & Syrupis.

R o b, aut sapa succus est fructuum Solis aut ignis calore inspissatus, vt asseruari possit, & eo vti liceat in oris præsentim morbis

morbis aut per se, aut cum melle, aut saccharo, aut sapa.

Perfectæ coctionis indicium est, si tantum inspissata sit vt frigefacta vnitatem quandam & mellis crassitiē adipiscatur.

Reponitur vasis vitreis, aut figulinis vitratis ad annum vnum.

I V L E P V S Arabū, potionis genus est delicatæ apud Græcos, quæ parabatur ex aqua, vino, & succis cum melle.

Arabes id genus solum descripserunt quod ex aqua & succis componebatur, illudque iulep vocarunt: Græci recentiores ζουλάπιον κ̄ ιολάβον.

Fiunt autem cum aquis stillatitiis, & horum frequentior est vsus hodie: aut cum decoctionibus, & succis ori gratis, sed horum vsus nullus est, nam eorum loco syrupo simplici vtimur.

Rosaceus & violaceus parantur ex vnicis octodecim aquæ rosacæ aut violarū ad singulas sacchari libras & quia his statim vtimur tanta coctione non egent atque syrupi.

S Y R V P V S aut serapiū, simplex est, vel ex multis cōponitur. Simplex iulepo perquā similis est, hoc, solum differens, quod succus & decoctio è quibus syrupus fit, ingrator sit, quàm è quibus iulepus.

Compo

Compositus fit ex infusionibus, & variarum rerum decoctionibus: interdum post coctionem aromata accipit aut medicamenta purgantia trita ac in nodulum ligata. atque in ipso syrupo diu suspensa

Simplices syrupi fiunt è succis herbarum cichorij, endiviæ, fumarix, betonicæ, & similibus: aut è succo fructuû, vuzæ immaturæ, succo limonum, pomorum, citriorû; Coquuntur autem succi ad quartæ partis consumptionem, & depurari sinuntur: deinde huius succi sic depurati libra cum sacchari clarificati tantûdem coquitur ad iustam crassitiem, cuius indicium erit si guttula in marmor effusa hæreat; aut digitis accepta, horum adductione & diductione fila ducat.

Alij saccharum coquunt ad penidiorû vsque crassitiem, deinde succum admiscunt, & simul feruere semel sinût, postea igni exemptum insolant.

Simplices in sua bonitate annum seruantur. Compositi biennium. Reponuntur vt dictum est.

De Eclegmatis.

MEDICAMENTA ea quæ Arabib⁹ loch dicuntur, Græci ἐκλίγματα & ἐκλιτα vocant Latini linctus, quod linguntur & lambuntur, ac retenta in ore paulatim liquefc

liqueſcunt & in trachæam arteriam delabuntur, ſimplicia ſunt & compoſita.

Simplicia ex ſolius medicamenti ſimplicis decocto aut ſucco, & ſaccharo, melle, alioue liquore parantur.

Compoſita, gummi, fructus, & aromata recipiunt.

Eorum conſiſtentia media eſt inter ſyruſos & electaria: nam ſyruſis craſſiora ſunt, & electariis dilutiora, ne tam facile elabuntur atque ſyruſi, nec tam difficile in arteriam delabuntur vt electaria.

Post coctionem diu in cacabo agitantur, vt candida ſiant, ſintq; oculis gratiora: nam aliâs, cum eorû uſus ſit frequens, facile ſaſtidium generarent.

Simplicia in ſua perfectione annû ſeruantur: Compoſita bienniû, his exceptis, quæ amygdalas, ſtrobilos, piſtacia, & alia huiusmodi quæ facile ſeneſcunt, receperunt.

Reponuntur autê uas ſigulinis vitratæ.

De Electariis.

ELECTARIORVM, quæ Græcis antidota appellantur, multæ fuerunt differentia. Nos uerò in electaria guſtatu grata & iucûda diuidemus, in electaria amara & ingrata, in electaria purgantia & laxantia, in theriacas, & electaria opium accipientia, quæ omnia ſecundum hunc ordinem

dinem suo loco describemus.

Conficiuntur ex variis, & multis peculiaribus medicamentis, quorum delectus & præparatio maxima cum diligentia ex regulis suprâ traditis fieri debet.

Saccharum aut mel eousq; coquuntur, donec aromatibus inspersis, iustam habeant consistentiam, & possint deglutiri, aut dissolui, prout vsus postulabit: animaduertendū tamen est, vt saccharū aut mel tantum coquatur, vt repositū, situm non contrahat, quod fiet, quando ad fyrupi decoctionem proximè accessit.

Aromatum quantitas inspergenda, plerunque in ipsa compositione expressa est: quod si expressa non sit, & simpliciter sit additū, mellis aut sacchari quātum satis est; vnciæ tres aromatum in singulas sacchari aut mellis libras sumendæ erunt, & in electariis gustu iucundis vnciæ duæ.

Saccharo aut melle cocto & despumato, & igni exempto, aromata paulatim insperguntur, & assidue versantur donec perfectè mista sint.

Reponuntur vasis figulinis vitratis, aut plumbeis bene obruratis.

Electaria palato grata durant annum, amara & ingrata biennium, purgantia annum.

Theri

Theriaca ad vigesimum annum durat, reliquæ opiatae in decennium : neque exhiberi debent ante semestre, nisi medicus aliud præscribat.

Ex electariis dulcibus fiunt interdum morselli aut tabellæ: tum in singulas sacchari cocti libras dimidia vncia specierum inspergitur instar manus Christi.

De Pulveribus.

PVLVERES qui nobis describentur, partim intra corpus assumuntur, partim foris applicantur.

Qui per os assumuntur ex medicamentis componuntur aromaticis, aptis ad intemperiem corrigendam earum corporis partium quæ nutritioni deseruiunt; ea autem sunt interdum electaria, vt diacalaminta, diatrio pipereon Galeni & similia: & interdum admista habent quædam purgantia.

Qui foris applicantur, ex variis medicamentis commiscuntur simplicibus, iisq; diuersis corporis administrantur partibus, veluti qui à vulgò Medicorum & Pharmacopœorum epithemata cordialia & hepatica vocantur.

Alij sunt vtiles ad vulnera & vlcera, idq; in variis corporis partibus, & varias
ob

ob causas, vt pulueres capitales, adstringentes, sarcotici erodentes. Hi autem ex selectissimis fient medicamentis plus minusve tritis pro medicamento præscripti scopo, eoque ordine & diligentia, quo in tura dictum est.

In vniuersum autem, qui intrò assumè di sunt pulueres, & qui in epithemata ingrediuntur, tenuissimè teri debent, quòd ex aromatibus & odoratis constent, nisi quod interdù eos crassius terere oportet, vt diatrion pipereon, & similes, vt in què præscribuntur, scopum vsui esse possint.

Reponi verò debent sacculis coriaciis bene confutis, aut vasis vitreis diligenter clusis.

Singulis annis vt plurimùm renouari debent.

Qui foris applicandi sunt, non necesse est tã tenuiter terantur, & quòd frequenti in vsu non sint, neque magna eodem tẽpore copia opus sit, primùm componi solent cum iis vtendum est, & secundum medici scopum. nihilominus tamẽ quosdam vulgatiores, & magis probatos in Antidotarij libro secundo describemus.

De Pilulis seu Catapotiiis.

CATAPOTIA medicamenta sunt
I quæ

quæ intra corpus assumuntur, in hoc magna ex parte confecta, vt corpus purgent & euacuent: apud Arabes verò, vt etiã sensus stupefaciant, & catarrhos tollant, veluti catapotia de cinoglossa & similia, tum etiam vt tussim leniant.

Fiunt ex siccis medicamentis tenuissimè tritis, deinde cum succis, aquis stillatitiis, aut aqua communi in massam redactis quæ papyro inuoluatur, deinde, vbi horum vsus erit, rursus tritis, & cum succo aliquo in catapotia conformatis.

Seruari possunt, purgantia annū vnum; quæ verò opium acceperunt, duos, tres, & plures annos.

De Trochiscis & sieff.

VARIA sunt trochiscorum genera, quorum alij per se in corpus assumuntur; alij in compositiones aliorum medicamentorum recipiuntur, veluti pastilli de viperâ, & è scilla in theriacam: alij extra corpus applicantur, constantq; ex metallicis, & hi vtilis sunt vlceribus malignis, & oculorum morbis.

Ex eorum numero qui intra corpus assumuntur; alij ex aromatibus fructibus, herbis, & medicamentis quibusdã purgantibus constant, vt trochisci de agarico, & de rhabbaro: alij ad eorum compositionem

nem opium requirunt. Fiunt ex medicamentis siccis tritis, vt dictum est, & cū aqua, aut decoctione, aut succo mistis, donec ad eā crassitiem reducātur, qualis est massa pilularū. Formātur autē in rotulas, vnde Græcis τροχιλας, Latinis pastilli appellātur ab eorum forsitan figura. Siccantur in vmbra, & reponuntur vt in catapotiiis dictum est. Durant annum vnum & qui opium recipiunt, vt pilulæ opium recipientes.

Qui foris applicandi sunt, cūm ex medicamentis constant quæ non facile resoluntur, seruari possunt in annum vnū aut duos.

S I E F F Arabū nihil aliud quàm Græcorum trochisci & collyria sunt, quorum diximus vsū esse in oculorum morbis; & sola forma differunt.

In vtroque autem genere illud requiritur, vt medicamenta ex quibus constant sint tenuissimè trita, supra omnia alia medicamenta.

De Oleis.

O L E A quorum in officinis vsus est, nūc è fructibus & seminibus exprimuntur: nunc fiunt ex oleo oliuarum in quod infusa herbæ aut flores sint, & soli exponuntur, aut in duplici vase coquantur.

I 2 Ex

Ex his simplicia vocantur, quæ ex fructibus expressa sunt sine vlla alia admittione, aut quæ ex oleo cõflata sunt in quo macerati flores vnus generis insolantur aut coquantur.

Composita ea sunt quæ multa medicameta simplicia & odorata recipiunt, quæque plerunq; igni parantur: hæc apud veteres vnguenta nuncupabantur, quòd reciperent aromata, & lachrymas, eaq; de causa crassiora reddebantur.

Rationem extrahendorum oleorũ supra diximus.

Cæterum quæ ex fructibus & seminibus tẽporatæ qualitatibus sũt, quale est oleum amygdalarum, sesaminũ, elici debent cum horũ vsus necessarius est: nam si antè extrahantur, nouas acquirunt qualitates.

Quæ ex fructibus frigidi & adstringentis temperamenti parantur, vt ex lãrisco, myrto, ea durant annum vnum; post contrarias facultates adipiscuntur.

Quæ ex fructibus odoratis, vt sunt nuxmoschata & caryophylli, eliciuntur, semestri seruari possunt in sua virtute.

Quæ ex liquoribus, seminibus, & lignis calidis per alembicum extracta sunt: tamen si recens extracta, sint præstatißima, illorum tamen efficacia diu durat.

Olea

Olea simplicia fiunt maceratis in oleo oliuarum eiusdem anni, floribus aut herbis, ita vt oleo integatur, frigidis quidē in oleo lauato, calidis verò in oleo puro: Deinde insolatur per aliquot dies, vt præscriptū est, & facta expressione valida flores abiiciuntur, & recentes immittuntur, idq; sæpius: aut coquuntur in duplici vase, donec flores immissi tenerescant, deinde exprimuntur, recentésq; iniiciuntur, & coquuntur sæpius: id autem fit ob tēporis angustiam, aut quia subitò eorū vsus requiritur, aut quia flores qui medicamentum ingrediuntur, non sunt tam diuturni, vt macerari & insolari possint quantum necesse est. Hæc autem annum durant.

Composita magna ex parte coquuntur, admista oleo, aqua, aut vino, aut infuso, aut decoctione aliqua p̄ medicamēti præscripti ratione: Coquuntur autē lento igne ex carbonibus conflato, donec omnis ferè humor qui admistus est consumatur: aut coquuntur in vase duplici, quod præstat. Seruantur in annum. omnia olea reponi debent vasis vitreis ore angusto bene obturato, aut figulinis vitratis.

De Unguentis, Emplastris & Ceratis.

HÆC medicamentorū genera sub alia

I 3 appel

appellatione Græcis descripta sunt : nam vnguenta illis solùm vocabantur olea cõposita ex aromatibus, calore ignis aut Solis in eam consistentiam redacta, vt his facîle vti possent in vnguendis corporibus.

Arabes sub vnguenti vocabulo cerata græcorũ, malagmata, & ex emplastris etiam nonnulla complectuntur, non tamen coquebant ea consistentia qua Græci.

E M P L A S T R A Græcis sunt medicamenta, varia simplicium genera, & metallica præfertim recipientia. Ea verò coquebantur donec manus amplius non inficerent, & Arabibus recentioribusque ce rota nuncupantur.

Arabum verò emplastra ea sunt quæ Græcis malagmata, cataplasmata, & epithemata, ex herbis, floribus, farinis, oleis, & adipibus cõposita, quæ tã diuturnã coctionem non patiuntur atque emplastra; nam neq; simplicia, ex quibus constantur, neq; vsus, in quem parantur, id admittit.

C E R A T A veterum, vt iam dictũ est, sunt Græcorum emplastra.

Græcorum cerata ex oleo & cera fiunt, admistis interdum quibusdam odoratis. Quæ omnia medicamẽtorum genera, va
ria

ria sunt admodum, & in his regulam aliquam generalem præscribere difficillimum. De eorum autem compositione in singulis medicamentis, quæ libro secundo describentur, dicere præstabit.

DELECTV itaque medicamentorum facta, compositisque & repositis iis medicamentorum generibus quæ frequentiori sunt in usu, & in quorum præparatione diutius est inhærendum, quàm ut subito confici possint, (de quibus abundè in vniuersum supra dictum est) Pharmacopœo in medicamentis suis exhibendis & propinandis diligenter hæc sunt obseruanda.

Primum, ne suo ex ingenio, aut inconsulto medico cuiquam propinet medicamentum aliquod purgans, aut quod ex opio constat, aut cuius vsus noxam adferre possit.

Deinde, vt, dum Medicus medicamentum aliquod præscribet, attètè illum præscribentem audiat, medicaménq; in codice in hunc vsum officinæ parato præscribat, diligenter adnotans & pondus & quantitatem, & exhibitionis modum atq; tempus: tum descriptum medico perlegat, ne qua in re error aliquis cõmittatur, qui ho

minis vitæ magnam possit adferre calamitatem, & perniciem.

Præterea, vt medicamēta præparata habeat: & si fortè contingat aliquid illi medicamentum deesse, quod nec ex sua, nec ex alterius officina nancisci possit: ne illud negligat, aut aliud in eius locum substituat inconsulto qui illud præscripsit medico.

Deniq; vt exquisito pondere, & diligēti mensura facta medicamenta dissoluat, conformet, molliat, extēdat, & reliqua insuper in medicamentorum vsum necessaria peragat: deinde ea ad ægrum mittat, inscriptis vnicuiq; medicamento, tempore, & vtendi modo, iisque quæ, ex medici præscripto, ægro post medicamentū sumptum agenda sunt: aut ipse ægrum adeat & illi porrigat, si potiones sint molestæ, aut alioqui medicamentum quod præparatum diu seruari non possit, vt cassia solutiua, manna, quæ primum dissoluendæ sunt cum sumi debent, aut alioqui medicamenta quæ magna cum difficultate applicantur, vt in plerisque vsu venit.

ANTI

ANTIDOTARII,
SIVE

DE COMPO-
NDORUM, Miscendorumque Medi-
camentorum exacta ratione

LIBER SECVNDVS.

DE CONDITIS SIVE
CONSERVIS,

Sectio prima.

Diacydonium Galen.



RECIPI. succi malorū cydonio-
rum struthiorum, sunt autem
ea tenera, odorata, & mediæ ma-
gnitudinis,

Mellis ana ℥ iij. Aceti candidi ℥ ij.
Coctis supra prunas modicæ, & spuma de
tracta, adde.

Zingiberis ℥ iij. Piperis albi ℥ ij.
Dein rursus lento igne recoquatur, donec
mellis crassitudinem consequantur.

Fit etiam è succo malorum cydoniorū,
cū scilicet maior adstrictio requiritur;
& etiam sine pipere, aut zingibere, vel sal-
tem minori quāritate: præterea & alia a-
romata immitti possunt, pro rei exigētia.

I 5 *Vtile

*Vtile est tum ad excitandā appetentiā
iis quibus decocta est, tum ad ciborū con-
coctionem, & ventriculū roborat.

Mina cydoniorum simplex, Mesua.

R̄. succi cydoniorum ℥ xx.

Vini candidi austeri ℥ x.

Coquantur lento igni, semper despumando, ad tertiā partis consumptionem. Postquam resederit, cola, & adde

Sacchari ℥ vj.

Iterū coquantur ad iustam consistentiā.

*Aduersus alui profluvia biliosa valet, ventriculū & cætera viscera firmat, & vomitum reprimat.

Mina aromatica, Mesua.

R̄. succi malorum cydoniorum ℥ xx.

Vini albi potentis ℥ x.

Decoque igni lento ad tertiās, semper despumando, resideat, cola, & adde

Mellis despumati ℥ vj.

Iterum coque despumando, & impone hæc aromata,

Cinnamomi

Mastiches,

Cardamomi ana ℥ ij.

Ligni aloës,

Caryophyllorū ℥ ij.

Macis, ana ℥ j. β.

Zingiberis,

Croci ℥ ij.

Omnia præter crocum parum terantur, & nodulo ligara suspendantur, identidem eum fricando in ipso medicamēto donec

crasset

crassetat. Tolle ab igne & aromatiza.

Moschi ꝑ j.

Trochiscorum è Gallia mosch. ꝑ ij.

*Ventriculum, hepar, & cætera viscera
roborat, appetentiam excitat, concoctio-
nem iuuat, vomitum & lienteria cohibet.

Diacydonium purgans, Mesua.

Rz. Succy cydoniorum lb ij.

Mellis albi lb ij.

Coque continenter despumando, donec
manus non inficiat, quæ forma est miuæ
simplicis vsitata: deinde iniice sequentia,
Scammonij in malo cydonio correcti

ꝑ j. ß.

Gallia bonæ,

Caryophyllorum,

Zingiberis,

Mastiches,

Piperis longi,

Cinnamomi,

Nucis moschatae ana ꝑ ij.

Misce simul omnia.

*Colico dolori, & aliis partiũ nutrito-
riarum morbis salubre est. Aut

Rz. Scammonij ꝑ v.

Turbith ꝑ xij.

*Cholagogum erit simul & phlegma-
gogum. Aut

Abiecto scamonio misce turbith ꝑ xxv.

Cartami ꝑ v.

*Phleg

*Phlegmagogum solum erit.

*Sunt & nonnulli qui cum aliis medicamentis purgantibus componant, pro Medici scopo, & necessitate.

DE INFVSIS, ET DE COCTIS,

Sectio secunda.

Infusum seri lactis, seu aquæ casei, Mesuæ.

Recip. foliorum rosarum recentium, completarum, mundatarum ℥. ij.

Rhabarbari electi ℥. ij. ꝯ. xij.

Nardi indicæ ℥. j. β.

Rhabarbarum, & rosæ minutim incidantur, aut terantur, spica inciditur: macerentur per noctem in seri lactis, præsertim caprini ℔ ij. Cola, leuiter exprime, & propina.

*Bilem flauam clementer educendo, sanguinem purgat.

Infusum succi herbarum, Mesuæ.

Rz. Succorum, intybi,

Lupuli,

Buglossi, siue boraginis, purgatorum ana ℥. viij.

Myrobalani flauæ ℥. j.

Rhabarbari boni ℥. iiij.

Tamar

Tamar Indorum ζ j. β .

Pulpæ cassiæ solutiæ ζ iij.

Myrobalanus, & rhabbarbarum teruntur,
& per noctem in succis macerantur, deinde
manu cōpressum colatur, & propinatur.

*Idem quod præcedens præstat.

Infusum Hieræ, Mesuæ.

R̄. Hieræ s.

Aloës ana ζ v.

Macera decocto eupatorij infrà descripto
ad lb j.

In vase vitreo, insola dies decem.

*Ventriculum & caput purgat, proinde
amborum doloribus assiduis & hemicra-
niæ confert, ac febribus antiquis.

Macerantur etiam decocto epithymi; &
thymi.

*Sic purgat humorem crassum & me-
lancholicum; & phlegmagogum est.

*Infusum rosarum, & violarum, Mesuæ; Tu-
lepis rosato & violato, syrupis item rosato & vio-
lato solutiuis consiciendis aptum.*

R̄. Rosarum completarum, repurgata-
rum lb vi.

Aquæ puræ lb xv.

Ponantur rosæ in vrceo angusti oris, dein
infunde aquam calidam, macerentur per
horas octo, obstructo fictilis orificio, ex-
prime

prime leuiter, & cola infusionem abiectis
rosis: iterum inde recentes rosas, & infu-
sum excolatum calefac & infunde rosas,
macerentur &c. vt suprâ: idem fac tertio.
Erit vsui in iulep^o rosato conficiendo.

Syrupo verò rosato solutio componen-
do, eodem modo, septimo, & nono iterabi-
tur infusum: & vrceo angusti oris imposi-
tum, insolabitur dies quadraginta ali-
quantulo oleo superinfuso.

Similiter fit infusum violarum, ad iulep^o
violatum, & syrupum violatum laxatiuū.

Decoctum adianti seu capillorum

Veneris, Mesua.

R. Adianti veri recentis ℥ i. β.

Summitatum fumarix,

Summitatum lupuli,

Violarum siccarum ana ℥ j.

Pruna hispanica aut damascena xl.

Zizypha, x. iuiubas. xx.

Coque libris tribus aquæ lento igni, ad
duarum librarum consumptionem.

Infunde tadē pulpæ cassiæ solutiæ ℥ iij.

Tamar Indorum ℥ ij.

Mannæ ℥ j.

Rhabarbari boni ℥ iij.

Frigidum manibus frica, cola, & propina.

*Sanguinē purgat, clarūmq; reddit, ar-
dorēmq; ipsius ac flauæ bilis compestit.

Aqua

Aqua fructuum, Mesua.

R̄. Pruna xl.

Sebesten, siue myxa,

Iuiubas ana xxx.

Tamar Indorum ℥ ij.

Cassia recens extracta ℥ iij.

Manna ℥ j.

Macerentur fructus in aqua ℥ iij. deinde adde cassiam, tamar Indos, & mannam, fiat vt supra.

*Sanguinis & bilis flauæ feruorem reprimat, sanguinem clarum reddit, & bilem clementer educit.

Decoctum fumarie, Mesua.

R̄. Succorum cichorij,

Intybi, siue endiuia,

Lupuli,

Boraginis ana ℥ iij.

Succi fumarie ℥ viij.

Quibus coctis, & purgatis adde

Myrobalanorū flauarū indarū ana ℥ ij.

Passarum purgatarum ℥ j.

Tamar indorum ℥ iij.

Frica, cola, & serua.

*Sanguinem bile flaua & adustis humoribus purgat, hepatis obstructiones aperit, ac inde natum icterum sanat.

Decoctum Thymi, Mesua.

R̄. Thymi.

Cassutha,

Hyssopi

Hyssopi ana ξ j.
 Passarum purgatarum ξ iiij.
 Myrobalani emblicarum cepularum
 ana ξ j.
 Turbith ξ iiij.
 Stœchados.
 Polypodij ana ξ v.
 Eupatorij Mesuæ
 Absinthij, Anisi,
 Dauci ana ξ iiij.

Radicum { apij,
 fœniculi ana ξ viij.
 Coque omnia in libris tribus aquæ, ad li-
 brarum duarum consumptionem, cola:
 colato adde
 Turbith,
 Agarici, ana ξ j.
 Zingiberis ξ β .
 Macerari noctem sine, postridie cola, &
 vtere.

*Phlegmagogum est, ob id senibus, &
 aliter pituitosis salubre, ventriculum fir-
 mat, coctionem iuuat, flatus à visceribus,
 & hypochondriis dissoluit.

Decoctum Epithymi, Mesuæ.

R ξ . Myrobalanorum indarum,
 Stœchadis, Epithymi,
 Passarum purgatarum ana ξ j.
 Myrobalanorum cepularum,

Sum

Summitatum fumarix ana ʒ iiij.

Folliculorum fenæ ʒ viij.

Polypodij ʒ vj.

Turbith ʒ iiij.

Eupatorii ʒ v.

Omnia præter epithimum coquantur in
feri caprini libris tribus, ad duarum libra-
rum consumptionē: tunc adde epithimū,
& semel feruefac, tolle ab igne & adde.

Hellebori nigri ʒ j.

Agarici ʒ β.

Salis indi ʒ j. β.

Frica, cola, vtere.

*Bilem atram vacuat, ob id affectibus
melancholicis, vt cancro, elephantiasi, &
cæteris confert.

Decoctum Myrobalanorum, Mesua.

R̄. Myrobal. flauarum,

Cepularum,

Indarum ana ʒ j.

Tamar indorum ʒ j. β.

Comarum fumarix ʒ viij.

Abfinthij ʒ ij. Pruna xxx.

Passarum purgatarum ʒ j.

Coque in libris tribus aquæ, ad duarum
librarum consumptionem: cum imbecil-
lum voles medicamentum, reliquæ libræ
dimidio adde pulpæ cassiæ ʒ ij.

cum autem valentius,

K Pulpæ

Pulpæ cassiæ ℥ j. Turbith,
 Agarici ana ℥ β. Frica, cola.
 Præstantius fiet si in sero lactis caprini
 coquantur.

*Bilem vtramque, & pituitam purgat.

Decoctum Stœchados, Mesua.

Rz. Stœchadis,
 Origani cretici ana ℥ iiij.
 Seminum, apij,
 Fœniculi,
 Eupatorij Mesuæ ana ℥ iiij.
 Schœnanthi,
 Hyssoji ana ℥ ij.
 Passarum purgatarum ℥ viij.
 Turbith ℥ iiij.
 Coque vt suprâ, & vtere.

*Confert pituitosis affectibus, vt febris
 quotidianis, iuncturarum & neruo-
 rum dolori, & frigida intemperiei.

Decoctum Eupatorij, Mesua.

Rz. Eupatorij,
 Absinthij,
 Afari,
 Nardi indicæ,
 Adianti, hoc est capil. ven.
 Ciperi,
 Rhabarbari,
 Comarum fumaricæ ana ℥ iiij.
 Bedeguar,

Secacul

Secacul ana ʒ iiij.
 Myrobalanorum cepularum
 Indarum ana ʒ viij.
 Passarum purgatarum ʒ j.
 Coque & vtere.

*Hepatis & lienis obstructionem, &
 inde nascentes dolores & febres compo-
 fitas iuuat.

*Decoctum Magistrale commune, ad Me-
 dicamenta maceranda.*

Rʒ. Pruna xij.
 Sebesten x. Passarum ʒ j.
 Hordei decorticati ʒ β.
 Glycyrrhizæ repurgatæ Violarum,
 Folliculorum senæ, Polypodij,
 Epithymi, Cartami,
 Anisi, Dauci,
 Cinnamomi ana ʒ ij.
 Coque in aquæ communis lb. ij. donec
 dimidium absumatur, cola, & vtere.

Decoctum Magistrale refrigerans.

Rʒ. Pruna xij.
 Tamarindorum,
 Passarum ana ʒ β.
 Hordei mundati ʒ j. Violarum,
 Seminum communium maiorum ana ʒ ij.
 Coque in libris duabus aquæ, vt supra.

Decoctum Cordiale.

Rʒ. Pruna xij. K 2 Passa

Passarum ʒ j.

Sebesten xvj.

Iuiubas x.

Florum { boraginis,
buglossi,

Violarum,

Melissophyli,

Capillorum veneris ana M. β.

Seminis basilici,

Glycyrrhizæ,

Dauci ana ʒ ij.

Coque vt suprâ.

Decoctum verò cordiale refrigerans
fit additis seminibus communibus, iisque
seminibus quæ decoctum refrigerans su-
prâ descriptum ingrediuntur.

Decoctum Cephalicum calfaciens.

℞. Stœchadis,

Betonicæ,

Saluiæ ana M. β.

Radicum pœoniæ ʒ ij.

Passarum ʒ j.

Glycyrrhizæ,

Anisi,

Dauci ana ʒ iij.

Nucis moschatae ʒ β.

Coque vt suprâ.

Cum mitigare voles, addes

Hordei purgati ʒ j.

Tamar

Tamar indorum \bar{z} β .

Seminum cōmuniū maiorum ana \bar{z} ij.

Decoctum Pectorale.

R \bar{z} . passarum \bar{z} j.

Sebesten,

Iuibas ana xv.

Dactylos vj.

Hordei purgati \bar{z} j.

Glycyrrhizæ \bar{z} β .

Adianti M. β .

Hyslopi \bar{z} ij.

Coque vt suprà.

*Decoctum flatu pellens seu Carminati-
uum vt vocant.*

R \bar{z} . Anisi.

Dauci, Cymini,

Fœniculi ana \bar{z} iij.

Glycyrrhizæ \bar{z} β .

Florum chamæmeli M. β .

Passarum \bar{z} j. β .

Coque vt dictum est.

DE SAPIS SEV ROB, IV-
LEPIS, ET SYRVPIS,

Sectio tertia.

Diamoron Galeni.

R Ecip. succi mororū domesticorū ss v.
Mellis ss j.

K \bar{z}

Clari

Clarificatur primùm succus, dein vnà cū melle coquitur ad iustam consistentiam, & seruetur in vsu.

Fit etiam è succo mororum batinorum.

Diamoron compositum, Galeni præter suprà dicta, recipit

Myrrhæ

Croci ana ʒ j. β.

Omphacij, agrestam vocant, ʒ j.

Coquitur omphacium cum succo & melle: myrrha verò & crocum sub finem immittuntur, cū scilicet ab igne medicamentum tollitur.

*Cōtra depascentia oris vlcera, ad dentium affectus, & gingiuarum noxas vtilia sunt, atque ad omnia oris vitia.

Diamoron vsitatum Nicolai.

R̄. Succi mororum batinorum ℥ j.

Succi mororum domesticorum ℥ β.

Mellis ℥ β. Sapæ ʒ iij.

Coquuntur lento igne, ad mellis spissitudinem, serua.

*Idem quod superiora præstat.

Diarheon, Galeni.

R̄. Succi malorum granatorum, acidorū, dulcium, &

acidodulcium ana ℥ β.

Mellis ℥ j.

Coquitur succus ad mellis cōsistentiam, deinde

deinde addito melle iterum coquitur & seruetur.

Intemperiem calidam tollit, vomitum compescit & alui fluorem, & ventriculum roborat.

Diacaryon Galeni, tale est & Mesua.

Rz. Succi corticum viridium in gladium, diebus canicularibus extracti ℥ iiij. Mellis ℥ ij. Coque vt supra.

Aliqui sumunt mellis partē vnam, syrupi rosati partem vnam, & balauſtia addunt, aliāque simplicia pro rei necessitate.

*Destillationi tenuium & acrium humorum à capite, & phlegmonem excitantium, confert.

Iulepum rosatum Mesua, quod & Sympus rosarum recens.

Rz. Aquæ, in qua rosæ tertio sunt maceratae, ℥ v.

Sacchari ℥ iiij.

Coquantur lento igne vt supra.

*Febricitantium acutè sitim inexpletam sedat, ventriculi, cordis, & iecoris æstum mitigat.

Eodem modo fit iulepum ex infusionibus violarum; Componitur etiam vtrunque ex aqua stillatitia, & succo rosarum & violarum: exempli gratia.

Sumuntur rosarū aut violarū aquæ stillatitiae,

titia, aut succi ℥ iij.

Sacchari ℥ ij.

Coquantur vt supra.

Eadem ratione compositum est R hodo-
facton Pauli è melle & succo rosarum.

Hydromelum Pauli,

R. Succi malorum cydoniorum ℥ iij.

Mellis ℥ vj.

Aquæ ℥ viij.

Coque in modum iulepi.

*Aduersus alui profluuia biliosa valet,
ventriculū firmat, & ventriculū cohibet.

Hydromelon aliud Pauli.

R. Malorum cydoniorū pugatorum con-
cisorum ℥ v.

Aquæ fontanæ ℥ xij.

Coquito donec flaccida fiant, cola, & ad
ipsam aquam mellis despumati tantun-
dem admisceto, rursusque coquito donec
octaua pars fuerit consumpta.

*Idem potest quod præcedens.

Hydrorosatum Pauli.

R. Rosarum ablatis vnguibus, siue purga-
rarum ℥ iij.

Aquæ ℥ viij.

Mellis ℥ vj.

Coque despumans in iulepi modum, cola,
& serua.

Sitic

*Siticulosis in febre ardēte, & exolutis
ac stomacho male habentibus conuenit.

Apomeli ex Philagrino, D. Pauli.

℞. Fauorum melle plenorum alborum
℥ j.

Aquæ fontanæ ℥ iij. β.

Mel expressum in fictili coquito, donec
spuma & quod velur cerosum supernatat
ablatum fuerit, tūc diligenter vasis bene
obturatis reponito.

*Sputum educit, mouet vrinas, aluum
emollit, & humores attenuat.

Aqua mulsa.

℞. Mellis ℥ j.

Aquæ pluuiæ ℥ viij.

Coque lento igne, donec amplius nō spu-
met, vtere.

Augetur quandoque mellis quantitas, &
decoquitur ad iulepi consistentiam, nem-
pè quando à Medico præscribitur, aut
quòd ita illi visum est, aut quòd diutius
seruanda sit: & aromatizatur cinnamo-
mo, foliis saluix, & similibus, prout vsus
postulat.

*Affectus frigidus cerebri, neruorum,
& iuncturarum iuuat, sitim sedat, puris &
pituitæ crassæ expectorationem promo-
uet, colicis prodest, & calculum in me-
tibus vrinæ gigni prohibet.

K 5 Aqua

Aqua pectoralis fit his additis quæ decoctum pectorale supra descriptum ingrediuntur.

Oxymeli simplex Galeni.

R̄. Mellis despumati ℥ ij.

Aceti albi ℥ j.

Coquantur donec qualitates aceti & mellis probè permixtæ sint hoc est ad quartam partem.

Mesues addit

Aquæ fontanæ ℥ j.

Coquitque ad dimidias.

Fit etiã acetosius, aut minus acetosum, pro eius palato cui præscriptum est.

Fit etiam oxymeli imbecillius addita aqua, ab Arabibus secheniabin nuncupatum, hoc modo.

Mellis ℥ ij.

Aquæ fontanæ ℥ iiij.

Coquantur simul donec probè despumata sint; deinde addita Aceti ℥ j. Iterum coquantur, donec eorum qualitates planè unitæ fuerint.

Interdum mel, aqua, & acetum eodem momento permiscentur, decoquanturq; ad quartam, aut tertiam partem.

*Humores crassos, lētos, ac pituitosos incêdit, extenuat, & abstergit, obstructiōnes aufert, sputum educit, & sitim sedat.

Oxym

Oxymeli compositum.

℞. Corticum radicum eleoselini, (apium
vulgare intelligit)

Fœniculi,

Petroselini,

Asparagi,

Rusci ana ℥ ij.

Seminis apij vulgaris

Fœniculi ana ℥ j.

Aquæ ℔ xij.

Coque donec dimidium adsumatur, Co-
laturæ adde

Mellis despumati ℔ iij.

Aceti ℔ j.

Rursus coquito ad tertias.

*Humores crassos & pituitosos incidit,
& extergit : ob id iecoris, lienis, & renum
obstructiones tollit: vrinam mouet, sudo-
rémque euocat.

Oxymeli scilliticum Mesua.

℞. Mellis despumati ℔ iij.

Aceti scillitici ℔ ij.

Coquuntur vt prædicta.

*Humores crassos, lētos frigidos eradi-
catu difficiles extenuat, incidit & abster-
git, ideóq; ad ciendū vomitum efficax, ru-
ctū acidū sanat, & vrinae incontinentiam.

Oxymeli scilliticum compositum, fit
vt oxymeli compositum.

Acetum

*Acetum scylliticum Mesuae, quale
est & Galeni.*

R. Scillæ candidæ, mediæ magnitudinis, laminas inter corticē & cor medias, acu lignea filo traiectas tanto interuallo ne se contingant, siccabis in vmbra dies 40. postea concisam cultello ligneo, ℥ vñ insolabis in aceti boni ℥ viij. in vase vitrato angusti oris, bene obstrueto, dies alios 40. caniculares, postea frica, & cola.

Nicolaus scillæ sumit pane inuolutæ, & in clibano coctæ ℥ j. β.

Aceti acerrimi ℥ vij.

& in vase vitrato per dies 40. insolat.

*Efficacissimū est ad cerebri affectus frigidos, & curatu contumaces, epilepsiā & vertiginem: gingiuas laxas, & putrescentes sanat, dentes confirmat, oris odorem cōmendat fœtore illius dissipato: partes respiratorias iuuat & expurgat, & guttur roborat, ob id vocem clariorem efficit. Datur stomachicis, agrè cibū concoquētibz, concoctionem enim iuuat, hepar & lienem expurgat eorūque dolorem leuat. Intestinorum & vesicæ retētricem vim firmat, vuluarum strangulationibus & iuncturarum affectibus prodest. Admodum imbecillos recreat, corpus sanū reddit, bonūque colorem conciliat.

Syrup

Syrupus acetatus simplex Mesua.

R̄. Aceti potentis ℥ iij.

Sacchari aqua secundum artem clarificati
℥ v.

Coquito in vase lapideo aut figulino bene cocto vitrato & fit Syrupus.

*Affectibus biliosis, febribus maxime auxiliatur, quia bilem tenuitate & caliditate furiosam frangit & extinguit: humores autem crassos tenuat, incidit, obstructions aperit, urinas mouet ac sudores.

Syrupus acetatus cum radicibus Mesua.

R̄. Aquæ fontanæ ℥ x.

Radicum apij,

Fœniculi,

Intybi seu endiuæ ana ℥ iij.

Seminum apij.

Fœniculi,

Anisi ana,

Endiuæ ana ℥ j.

Coquantur lento igne ad dimidias, Colaturæ adde

Sacchari repurgati ℥ iij.

Aceti albi ℥ ij.

Coquito in syrups consistentiam.

Fit etiam sine aceto.

*Bilem crassam & auulso difficilem ac pituitam incidit, terget, obstructions hepatis, lienis, & renum aperit.

Syrup

Syrupus de quinque radicibus.

℞. Radicum apij,
Fœniculi,
Petroselini,
Rufci,
Asparagi ana ℥ ij.
Aquæ fontanæ ℔ vj.

Coque ad tertix partis consumptionem:
expressum coquitur cū sacchari ℔ iij.
addendo ad finem aceti albi ℥ viij.

*Prædicto efficacior, ad syrups Bizan-
tini vires proximè accedens.

Syrupus acetatus diarhodon Mesua.

℞. Succorum intybi,
Apij,
Lupuli ana ℔ ij. β.
Radicum intybi,
Apij,
Fœniculi ana ℥ ij.
Rosarum siccarum ℥ j.
Glycyrrhizæ ℥ β.
Nardi indicæ ℥ ij. β.
Seminum anisi,
Fœniculi,

Apij ana ℥ vij.
Macerata in aquæ ℔ vj. coque ad duarū
partium consumptionem, deinde cum
Sacchari ℔ iij.
Aceti ℔ ij. Fiat syrupus.

Ad

*Ad febres complexas, & eas quæ formam corporis corrumpunt utilis est, obstructions hepatis & lienis aperit.

Oxyfacchara simplex Nicolai.

R̄. Sacchari albi ℥ j.

Succi malorū granatorū acidorū ℥. viij.

Aceti ℥ iiij.

Coquantur ad iustam consistentiam.

Nonnulli, aceti loco, vinum malorum granatorum sumunt.

*Confert ad febres tertianas, tertianas duplices, ardentes & heclicas.

Oxyfacchara composita Nicolai.

R̄. Adianti siue capillorum veneris

Phyllitidis, siue linguæ ceruinæ,

Ceterach, id est aspleni,

Polytrichi,

Hepaticæ,

Violarum,

Radicum fœniculi,

Rufci,

Asparagi,

Graminis ana ℥ j.

In vino siue succo malorū granatorum omnia triduum macerato, deinde percoquito, forti expressioni addiro sacchari quod satis est. Coquito secundum artem.

*Concalesfacta corpora potum iuuat, longis febribus quas sanguis aut bilis creauit,

creauit, & calori iecoris auxilio est, & lienis obstructions tollit.

Syrupus acetositis citri Mesuae.

R̄. Succu citriorum acidi ℥ vi.
Sacchari ℥ iiij.

Coquantur secudum artem.

*Aestum ac feruorem bilis flauæ, febrimq; ardentium, & pestilentialem mitigat, sitim quoq; vehementē restinguit, ebrietati resistit, vertiginemq; iuuat.

Syrupus acetositis limonum.

R̄. Succu acidi limonū maturorum transcolati ℥ vi.

Sacchari albi ℥ iiij.

Coque vt artis est.

*Præcedente magis refrigerat & penetrat, Cor & stomachum roborat, putrefactioni resistit, & spiritus resolui prohibet.

Syrupus Bisantinus simplex Mesuae.

R̄. Succorum endiuix,

Apij, ana ℥ ij. Boraginis,

Succorum lupuli, Buglossi ana ℥ j.

Feruefiant semel, purgentur

eius succi clarificati ℥ iiij.

Sacchari albi ℥ ij. β.

Coquito lento igne, & fiat syrupus.

Interdum ad singulas succi clarificati libras, aceti ℥ vi. adduntur.

*Compositus fit hunc in modum.

Addunt

Adduntur prædictis

Rosarum aridarum ℥ ij.

Glycyrrhizæ ℥ β.

Nardi indicæ ℥ ij.

Seminum anisi,

Apij, Fœniculi ana ℥ iij.

Bulliant cum prædictis succis, Colaturæ
adde saccharum,

*Humores crassos & lentos incidit at-
que extenuat, obstructions aufert, mor-
bôq; regio succurrit. Compositus ad hæc
omnia efficacior est.

Syrupus rosatus solutiuus.

R̄. infusionis rosarum secundum artem
nonum iteratæ ℔ x.

Sacchari tantundem.

Coquuntur in syrupi consistentiam.

Nonnulli cum melle conficiunt.

*Bilem purgat.

Syrupus rosatus è rosis siccis.

R̄. infusionis rosarum aridarum,

Sacchari albi ana ℔ ij.

Percoquuntur secundum artem ad syru-
pi consistentiam.

*In febribus calorem extinguit: ob id
fitim quoq; sedat, & ventriculū roborat.

Syrupus violatus solutiuus.

R̄. infusionis violarum nonum iteratæ,

Sacchari clarificati ana ℔ v.

L

Coq

Coquuntur lento igne ad syrapi consistentiam.

* Ad eadem efficaciam ad quæ rosatus solutius.

Syrupus è succo violarum.

Rz. succi violarū in mortario marmoreo contusarum depurati ℥ iiij.

Sacchari clarificati tantundem.

Coquuntur lento igne ad iustam crassitudinem.

* Bilis acrimoniam frangit, ac thoracis vitiiis calidis confert.

Syrupus violatus Mesua.

Rz. Violarum ℥ ij.

Seminum cydoniorum &

Maluæ ana ℥ j.

Iuiabas

Sebesten ana xx.

Cum aquæ cucurbitæ ℥ vj.

Coque ad tertiam partem, & addita

Sacchari ℥ j. β.

Fiat syrup. secundum artem.

* Pleuritidi & tussi à causa calida pdest.

Syrupus Endiuia simplex.

Rz. succi endiuix clarificati & depurati ℥ vij.

Sacchari optimi libras totidem.

Coque lento igne in formam syrapi.

* Valet ad immodicum calorem hepatis, aliorumq; membrorum nutritiuorum:

in

in morbo laterali maximè conuenit.

Syrupus è cichorio eodem modo fit quo endiuix, similiter & syrupus è fumaria, reliquique syrupi simplices ex succis herbarum compositi, vt superiori libro dictum est cap. de Syrupis.

Syrupus Endiuix compositus.

Rz. Endiuix recentis,

Boraginis,

Scariolæ,

Hepaticæ,

Buglossæ,

Melissæ,

Eupatorij ana M j.

Seminum frigid. maiorum ana ʒ j.

Sandalorum albi, rubri ana ʒ j.

Florum cordialium ana ʒ iij.

Coquantur secundum artem in aqua, cola, & colaturæ adde

Succi endiuix depurati lb v.

Vini granatorum ʒ iij.

Sacchari albi lb iiij.

Fiat Syrupus secundum artem.

* Alia exemplaria habent succi endiuix depurati lb j.

Alius syrupus Endiuix compositus, Gentilis; qui in vsu est.

Rz. succi endiuix,

L 2

Succi

Succi hepaticæ ana ℥ iij.
 Clarificatis ad ignem, adduntur
 Violarum,
 Rosarum rubrarum,
 Florum nymphæ,
 Lenticulæ aquaticæ,
 Trichomanis, vulgò polytrichi ana

℥ β.

Capill. Veneris, hoc est adianti,
 Hordei mundati,
 Seminum frigidorū maiorum ana ℥ j.
 Contusa & horas xij. in dictis succis ma-
 cerata coquantur, & colaturæ adduntur
 Sacchari albi ℥ iij.
 Fiat syrupus: & aromatizetur cum

Santalorum { rubrorum,
 { alborum,

Berberis,
 Seminum cydoniorum,
 Ligni aloës,
 Cinnamomi,
 Corticum citri ana ℥ j.
 Tunde & aromatiza secundum artem.

*Valeat vterq; syrupus compositus endi-
 uicæ ad immodicum iecoris, cordis & alio-
 rum nutritioni seruientium instrumeto-
 rum calorem, in summa ad omnem cali-
 dam intemperie. Soluit obstructions &
 partes à calore debilitatas roborat.

Syrup

Syrupus de Cichorio compositus Nicolai Florentini.

R̄. intybi seu endiuix domesticæ & syluestris.

Cichorij, Glycyrrhizæ,

Taraxacō añ M. ij. Capillorū Veneris,

Cicerbitæ, Ceterach, i. aspleni,

Hepaticæ, Adianthi,

Lactucæ, Polytrichi,

Scariolæ, Cuscuthæ añ ʒ vj.

Fumariæ, Radicum fœniculi,

Lupuli ana M. j. Apij,

Hordei ʒ ij. Asparagi añ ʒ ij.

Vesicariæ, id est, alkekangi,

Coquantur in sufficienti aqua & percolen-

tur, & cum saccharo albo fiat syrupus: pro

singulis libris inter coquendum adde

Rhabarbari electi ʒ iiij.

Spicæ nardi ʒ iiij.

Tunduntur & in nodulo ligata suspendū-

tur in vase in quo syrupus iam coctus re-

feruatur, ac ibi relinquuntur.

*Confert aduersus omnem materiam

venenatam, & in febre pestilentiali. Cor-

roborat cor, & instrumenta nutritioni fa-

mulantia, expurgat per vrinas & aluum,

excitat appetentiam, & somnum inducit.

Syrupus è fumaria compositus Mesue.

R̄. Myrobalanorum flauarum,

L 3 Cepu

Cepularum ana \bar{z} ij. β .
 Florum boraginis,
 Buglossæ,
 Violarum, Absinthij,
 Cassuthæ ana \bar{z} j.
 Glycyrrhizæ,
 Rosarum rubrarum ana \bar{z} β .
 Epithymi,
 Polypodij ana \bar{z} vij.
 Pruna C.

Vuarum passarum purgatarum lb β .

Tamarindorum,

Pulpæ cassiæ ana \bar{z} ij.

Aquæ communis lb x.

Omnia præter cassiam & tamarindos len-
to igne percoquuntur secundum artem,
& colantur: in colatura dissoluntur ip-
sa cassia & tamarindi; deinde additis

Succi fumarizæ depurati,

Sacchari albi ana lb iij.

Rursus coquuntur in formam syrupi.

*Ventriculum & hepar roborat, obstru-
ctiones aperit, cutis morbos, præcipuè ab
humore falso vel vsto natos, vt psoram
lepram impetiginem, serpiginem curat.

Syrupus de Lupulo.

Rx. succi lupuli depurati lb iij.

Sacchari lb vj.

Succi

Succi fumarix depurati ℥ ij.

Fit syrupus secundum artem.

*Refrigerat, & collectionum impetus lenit, bilem ictero laborantibus detrahit, pituitam in hydrope per alium exigit.

Syrupus myrtinus simplex Mesua.

Rz. succi baccarū myrti depurati ℥ viij.

Sacchari clarificati ℥ iij.

Fiat Syrupus secundum artem.

*Ventriculū & viscera alia roborat, ob id fluorem alui antiquatum sistit & sitim mitigat.

Syrupus myrtinus compositus.

Rz. Baccarum myrti ʒ xx.

Santali albi,

Sumach, id est, Rhois,

Balaustiorum,

Berberis ana ʒ xv.

Mespilorum ʒ l.

Aquæ fontis ℥ viij.

Omnia coque ad medietatē, cola, colato adde

Succi granatorum,

Succi cydoniorum ana ℥ β.

Sacchari ℥ iij. & confice syrupū.

*Profluuium ventris etiam diuturnum sistit, & sanguinis excreationem cohibet.

Syrupus à Iuiubis Mesua.

Rz. Iuiubas nu. lx. Violarum,

L 4

Semi

Seminis maluæ ana ʒ v.
 Capillorum Veneris,
 Hordei mundati,
 Glycyrrhizæ ana ʒ j.
 Seminum cydoniorum,
 Papaueris albi,
 Melonis,
 Lactuæ,
 Tragacanthi ana ʒ iiij.
 Coquantur in aquæ fontanæ sufficienti
 quantitate, & cū sacchari lib. duabus fiat
 syrupus.

*Confert raucitati, tussi & pleuritidi.

Syrupus è Glycyrrhiza Mesuæ.

℞. Glycyrrhizæ ʒ ij.
 Capillorum Veneris ʒ j.
 Hyssopi ʒ β.
 Aquæ pluuiæ ℥ iiij.
 Macerentur horis xxiiij.
 Coque ad dimidias, colaturæ adde
 Mellis despumati,
 Sacchari clarificati,
 Penidiorum alborum ana ʒ viij.
 Aquæ rosarum ʒ vj.
 Fiat syrupus secundum artem.

*Thoracé & pulmoné expurgat, ideóq;
 diurnæ tussi, & pleuritidi auxiliatur.

Syrupus Capillorum Veneris simplex.

℞: Infusionis capillorum Veneris re-
 cent

centium terfactæ secundum artem ℥ iij.

Sacchari albi ℥ ij.

Coque, fiat syrupus.

Syrupus Capill. Ven. compositus

Magistralis.

℞. Capill. Veneris ℥ v.

Glycyrrhizæ rasæ ℥ ij.

Macerentur in aqua horas xxiiij. deinde

coque ad dimidij consumptionem: cola-

turæ adde

Sacchari clarificati, Penidiorum,

Aquæ capillorum Ven. ana ℥ viij.

Coque, fiat syrupus.

*Valent ad thoracis affectus calidos, & viscerum obstructions.

Syrupus è corticibus Citri.

℞. Corticum citri recentium ℥ j.

Chermes ℥ ij.

Aquæ fontanæ ℥ x.

Coquantur ad duarum tertiarū consum-

ptionē, & percolantur: colaturæ addūtur

Sacchari clarificati ℥ ij. β.

Fiat syrupus secundum artem, & aromati-

zetur cum moschi Orientalis Ḡ iiij.

*Cerebrum, cor, stomachum roborat, & oris grariam commendat.

Syrupus de Mentha maior Mesua.

℞. Succu pirorum cydoniorum,

Struthiorum,

L 5

Gran

Granatorum dulcium,
 Granatorum acidorum,
 Granatorum mezorū ana ℥ j. ꝑ.
 In quibus, horas 24. macera
 Menthæ siccæ ℥ j. ꝑ.
 Rosarum rubrarum ℥ ij.
 Coque igni lento ad dimidias, & cola, co-
 laturæ adde
 Mellis, siue Sacchari ℥ ij.
 Fiat syrupus vt artis est, & cum seponitur,
 aromatiza
 Galliæ moscharæ ℥ iij.
 Nodulo ligatis & ex orificio vasis suspēsis
 *Ventriculum frigidum roborat, ob id
 nauseam, vomitum, singultum, fluorem
 alui sedat.

Syrupus de Mentha minor Mesua.

R̄. Succī menthæ depurati,
 Granatorum dulcium,
 Granatorum acidorum ana ℥ j.
 Sacchari, aut Mellis ℥ j.
 Fiat syrupus secundum artem.
 *Eandē ferē cū superiore facultatē habet.

Syrupus de Absinthio M.

R̄. Absinthij Romani ℥ β.
 Rosarum rubrarum ℥ ij.
 Spicæ nardi ℥ iij.
 Vini albi, veteris, boni, odori,
 Succī cydoniorum ana ℥ ij. ꝑ.
 Maccr

Maceratur in vase vitrato per noctem
vnam, deinde decoquantur vt artis est, co-
laturæ adde

Mellis ℥ ij. Fiat syrupus.

*Ventriculum & hepar roborat, ob id
appetentiam excitat, retentricem vim fir-
mat: contra regium morbum prodest, flatus
discutit, humoresq; per vrinam pellit.

Syrupus de Calamintha eiusdem.

R̄. Calaminthæ montanæ,

Calaminthæ domesticæ ana ℥ ij.

Seminum leuistici, Dauci,

Schœnanthi ana ℥ v.

Passarum purgatarum ℥ β.

Aquæ quantum satis est,

Mellis ℥ ij.

Fiat syrupus.

*Asthma, tussim antiquā, intemperiem
viscerum frigidam, & splenicos iuuat.

Alius eiusdem.

R̄. Succi calaminthæ,

Granatorum acidorum

Vini albi odori ana ℥ iiij.

Coque ad dimidias, & clarificato adde

Sacchari albi ℥. iiij.

Fiat syrupus vt artis est, & aromatiza

Gallix moschatae ℥ ij.

*Singultum, & vomitum à pituita vel
bile flaua crassa sedat.

Syrus

Syrupus de Epithymo Mesua.

Rz. Epithymi ꝓ xx.
 Myrobalan. flauarum, indarū ana ꝓ xv.
 Cassuthæ,
 Fumariæ ana ꝓ x.
 Thymi,
 Buglossæ,
 Calaminthæ,
 Myrobal. emblicarum, bellericarum,
 Glycyrrhizæ,
 Polypodij,
 Agarici.
 Stœchadis ana ꝓ vi.
 Rosarum rubrarum,
 Fœniculi,
 Anisi ana ꝓ ij. β.
 Pruna nu. xx.
 Passarum purgatarum ꝓ iiij.
 Tamarindorum ꝓ ij. β.
 Aquæ quod satis est,
 Bulliant secundum artem: colaturæ adde
 Sacchari lb iiij.
 Sapæ lb ij.
 Fiat syrupus.

*Atram bilem, & alios humores vstos
 vacuat, ob id morbos ex his nascentes,
 elephantiam, cancrum, vlcera maligna,
 fistulosa, lepram psoriam, præcauet, cu-
 ratque.

Syr

Syrupus de Prasio Mesua.

Rz. Marrubij, hoc est, prasij \mathfrak{z} ij.
 Capillorum Veneris,
 Hyssopi, Calaminthæ,
 Anisi ana \mathfrak{z} vj.
 Radicum apij,
 Fœniculi ana \mathfrak{z} v.
 Seminum maluæ, Fœnigræci,
 Lini, Iridis ana \mathfrak{z} iij.
 Seminum cydoniorum \mathfrak{z} ij.
 Vuarum passarum purgatarum \mathfrak{z} ij.
 Ficus passas pingues nu. xvj.
 Penidiorum,
 Mellis ana \mathfrak{t} ij.
 Aquæ quod sufficit, Fiat syrupus.

*Thoracem & pulmones expurgat puita crassa, lenta, putri; hinc asthmatis, & antiquæ tussi prodest, quales affectus senibus & natura frigidis sunt frequentes.

Syrupus de Hyssopo Mesua.

Rz. Hyssopi sicci,
 Radicum apij,
 Fœniculi,
 Petroselini,
 Glycyrrhizæ ana \mathfrak{z} x.
 Hordei mundati \mathfrak{z} iij.
 Seminum maluæ
 Cydoniorum ana \mathfrak{z} iij.
 Capillorum Ven. \mathfrak{z} vj.

Iuiubas,

Iuibas,
 Sebesten ana nu. xxx.
 Passarum purgatarum ℥ j. β.
 Ficus passas pingues,
 Dactylos pingues ana nu. x.
 Penidiorū alborū ℥ ij. Fiat syrupus.

*Ad vitia thoracis & pulmonis efficac
 est, humorēsq; excreatu contumaces exte
 nuat & educit.

Syrupus de stoechade simplex.

R̄. Florum stoechadis ℥ xxx.
 Thymi,
 Calaminthæ,
 Origani ana ℥ x.
 Anisi ℥ vij.
 Passarum purgatarum ℥ iiij.
 Aquæ quod satis est.
 Coquantur secundum artem, & colaturæ
 adde

Mellis ℥ iiij. β.
 Condiatur cum Cinnamomi,
 Calami aromatici,
 Zingiberis ana ℥ j. β.
 Ligentur in sindone, & in syrupo suspen
 dantur.

*Iuuat omnes affectus frigidos cerebrū
 & neruorum, vt paralyfin, epilepsiam, cō
 uulsionem, spasmus cynicum, tremorem.

Syrupus de stoechade compositus Mesuæ.

R̄. Flo

℞. Florum stœchadis ʒ III.

Thymi,

Calaminthæ,

Origani ana ʒ x.

Anisi,

Pyrethri ana ʒ vij.

Piperis longi ʒ iij.

Zingiberis ʒ ij.

Passarum ʒ iiij.

Aquæ quod satis est,

Mellis ℔ v.

Fiat syrupus lento igni, deinde aromata
subsequentia leuiter contusa, panno raro
ligata in eo suspendes;

Cinnamomi,

Calami aromatici,

Spicæ nardi,

Croci,

Zingiberis,

Piperis longi, & nigri ana ʒ j. β.

*Idem quod præcedens efficit.

Syrupus de Nymphaea simplex Nicolai.

Flores nymphææ, quot voles macerato,
ac ter flores mutato, horum infusionis ac
cipies ℔ iiij.

Sacchari quod sufficit,

Fiat syrupus.

*Bilis flauæ feruorem extinguit, ideóq;
mirificè ardentibus aliisq; febribus acu-
tis auxiliatur. Somnum quoque conciliat.

Syrupus

Syrupus de Nymphaea compositus Francisci Pedemontani.

℞. Florum nymphaeae albae ℥ ij.
 Florum nymphaeae luteae,
 Semin. psyllij integri,
 Sem. acetosae ana ℥ j.
 Seminum cucurbitae,
 Citrulli, Cucumeris,
 Melonum, Lactucae ana ℥. β.
 Seminum endiuiae domesticae,
 Endiuiae syluestris,
 Portulacae ana ℥ ij.
 Radicum fœniculi ℥ j.
 Coquantur in aqua hordei sufficienti, &
 colaturae adduntur
 Sacchari ℔ j.
 Vini granatorum acidorum,
 Aceti albi ana ℥ ij.
 Fit syrupus, & aromatizatur cum
 Santali citrini,
 Spicae nardi indicae ana ℥ j. β.

*Idem quod praecedens potest, estque
 eo validius.

Syrupus è papauere simplex Mesua.

℞. Capitum papaueris albi, & nigri recentium ana ℥ lx.
 Aquae pluuiae ℔ iiij.
 Coquantur ad consumptionem librarum
 duarum & dimidia aquae, & additis

Sac

Sacchari,

Penidiorum ana \mathfrak{z} vi. Fiat syrupus.*Aduersus catarrhum, & sitim prodest,
somniaque conciliat.*Syrupus è papauere compositus Mesuae.*℞. Papaueris albi, & nigri ana \mathfrak{z} l.Capillorum Veneris \mathfrak{z} xv.Glycyrrhizæ \mathfrak{z} v.

Iuiubas num. xxx.

Seminum, lactucæ, Maluæ,

Cydoniorum ana \mathfrak{z} xj.

Coque in libris quatuor aquæ ad dimidij

Consumptionem, & cum Sacchari,

Penidiorum ana \mathfrak{z} viij.

Fiat syrupus.

*Valet ad tussim siccam, phthisim, ca-
tarrhum calidum & acrem, somniaque
conciliat.*Syrupus de Eupatorio Mesuae.*

℞. Radicum fœniculi,

Apij,

Endiuizæ ana \mathfrak{z} ij.

Glycyrrhizæ, Schœnanthi,

Cuscuthæ, Absinthij,

Rosarum ana \mathfrak{z} vi.

Capillorum Veneris,

Cardui benedicti,

Radicum cardui benedicti,

Florum buglossæ,

M

Anisi,

Anisi, Fœniculi,
 Eupatorij ana ʒ v.
 Rhabarbari electi,
 Mastichis ana ʒ iiij.
 Spicæ nardi, Afari,
 Folij ana ʒ ij.
 Aquæ lb viij.
 Succorum apij,
 Endiuæ ana lb ij.
 Sacchari lb iiij.
 Coquantur & fiat syrupus.

*Ventriculum & iecur roborat, ac frigidis iecoris vitiiis, & eiusdem obstructionibus, aquæ inter cutem incipienti, malôq; corporis habitui succurrit. Humores crassos incidit & extenuat, vrinas, flatus dissipat, & hypochondriorum tensionem demolitur.

Syrupus è Polypodio compositus.

Rz. Polypodij quercini ʒ x.
 Melissæ,
 Buglossæ ana M. β.
 Cyperi,
 Corticum radice capparis,
 Acori,
 Afari ana ʒ β.
 Senæ,
 Epithymi ana ʒ j.
 Seminum lactucæ,

Endi

Endiuæ, Scariolæ ana ℥ j. ꝑ.
Coquantur in aqua secundum artem, &
colaturæ adde

Rosati colati ℔ j. Fiat syrupus.

*Humores crassos ac lentos digerit ac
vacuat, bilem atram, & pituitam crassam
& lentam purgat etiam à iuncturis: Affe-
ctibus ob id melancholicis prædest, vt
quarranis, & splenis duritiei.

Syrupus de Pomis simplex Mesua.

Rz. Succum pomorum dulcium, & acetoso-
rum ana ℔ v.

Coque ad dimidij consumptionem, & co-
laturæ adiunge

Sacchari clarificati ℔ iiij.

Fiat syrupus.

*Cor imbecillum roborat, ob id cordis
syncopen & tremorem sanat.

Syrupus de Pomis Saporis.

Rz. Succorum boraginis,

Buglossæ ana ℔ iiij.

Succum pomorum dulcium ℔ iiij.

Foliorum senæ ℥ iiij.

Croci ℥ ij.

Maceretur sena in dictis succis horas
xxiiij.

Coque & cola, colaturæ adde

Sacchari ℔ iiij.

Fiat syrupus, Crocum autem coqui debet,

M 2 ligatum

ligatum in panno lineo raro.

*Efficacior est præcedenti.

Syrupus de Hermodactylis Nicolai.

R. Quinque radicum ana ℥ j.
 Seminum quatuor frigidorum maiorum
 ana ℥ j. β.
 Hyssopi,
 Capillorum Veneris,
 Ceterach id est, aspleni ana M. β.
 Violarum,
 Florū rorismarini boraginis ana M. j. β.
 Cyperi ℥ iij.
 Camomillæ ℥ ij.
 Passarum corinthiacarum ℥ i.
 Senæ ℥ ij.
 Hermodactylorum,
 Cuscuthæ, ana ℥ β.
 Anisi,
 Fœniculi,
 Carui ana ℥ ij. β.
 Polypodij ℥ iij.
 Agarici ℥ ij.
 Coquatur in aquæ ℥ iij. & colaturæ adde
 Sacchari ℥ j. β.
 Rosarum ℥ j.
 Rhabarbari ℥ iij. β.
 Turbith ℥ iij.
 Hæc tenuissimè trita, inque panno ligata
 suspendes in syrupo cocto secundū artem.

EC LEG

E C L E G M A T A, S E V

L O C H.

Sectio quarta.

Diacodion Galeni: hoc est Diacodion simplex.

R Ecip. capita papaveris albi, mediocri magnitudine, nec nimium viridibus, nec nimium maturis, num. xx.

Aquæ pluuiæ, aut fontanæ ℥ iij.

Macera viginti quatuor horas, post coque; donec capita contabuerint, cola & additis

Mellis ℥ ij. Coque in iustâ consistentiâ. Fit etiam hodie cum saccharo.

*Confert eis quibus ex capite ad pectus & ad pulmonē subriles catarrhi defluunt, & sunt causa tussis.

Diacodion cum sapa.

Rz. Decoctionis prædictæ ℥ ij.

Sapæ vini dulcis ℥ ij.

Glycyrrhizæ ℥ ij.

Coquitur in iustam consistentiam.

Diacodion compositum.

Rz. Capita papaveris flaccida num. x.

Aquæ pluuiæ ℥ j β.

Coquantur ad tertias: Colaturæ expressæ adde

M 3

Sapæ

Sapæ optimæ ℥ iij. Mellis ℥. j.
 Coquatur ad perfectionē, deinde addatur
 Acaciæ,
 Hypocistidis, Croci,
 Balauftiorum ana ℥ j.
 Confectionis ramich ℥ iij.
 Misce, serua.

*Præter simplicis facultates, sanguinis
 reiectionem à visceribus thoracis sistit.

Loch de Papauere Mesua.

R̄. Papaueris albi ℥ xxv.
 Amigdalarum dulcium depellatarum,
 Nucleorum pinearum nucum,
 Gummi Arabici,
 Tragacanthi,
 Succiglycyrrhizæ ana ℥ x.
 Amyli,
 Seminum portulacæ,
 Lactucæ,
 Cydoniorum ana ℥ iij.
 Croci ℥ j.
 Penidiorum alborum ℥ iij.
 Omnia contundatur, & fiat loch secundū
 artem cum syrupi papaueris ℔ iij.

Syrupus autē papauerinus fit in hunc
 modum.

R̄. Capitum papaueris albi,
 & nigri recentium,
 Seminum lactucæ, portulacæ,
 Florum

Florum violarum ana ℥ j.

Bulliant in aqua cucurbitæ

Fiat Syrupus cū Sacchari quod satis est.

*Iuuat tussim, & gutturis asperitatem à catarrho calido, tenui (quem sputum liquidū indicat) eum enim coquit & crassat. Confert etiam febribus ardentibus, dolenti thoraci, pleuritidi.

Loch de Psyllio.

℞. Mucaginis psyllij secundum artem extractæ ℥ ij.

Sacchari clarificati ℔ j.

Coquatur saccharum sufficienter donec candidum fiat, deinde admiscetur mucilago, & tandiu agitantur donec probe vinita sint & albescant.

Fit in hunc modum loch de semine lini, & alia huiusmodi eclegmata quæ mucilagines recipiant.

Loch de Tussilagine simplex.

℞. Radicum tussilaginis ℔ j.

Coquantur in aqua donec dissolutæ sint, Contunduntur & colantur, deinde additis Mellis ℔ ij.

Coquitur in iustam consistentiam: & Eodem modo fit loch de althæa, baucia & similia.

Loch de Tussilagine compositum Magistrale,

℞. Radicum tussilaginis ℥ yj.

M 4

Coquant

Coquantur in aqua, deinde contusis & dissolutis in ipsa decoctione, adduntur Sacchari ℥ j. β.

Igni adponuntur, & agitantur donec in commodam formam redigantur, adde

Nucleorum pinearum denudatorū ℥ i. β.

Passarum purgatarum ℥ ij.

Contusis in mortario lapideo, & permittis adde

Croci,

Caryophyllorum ana ℥ β.

Succi glycyrrhizæ ℥ iij. β.

Cinnamomi, Macis ana ℥ j.

Redigantur in pulcrem tenuem, misce; fiat loch.

Diatragacanthum frigidum Nicolai.

R. tragacanthæ albæ ℥ ij.

Gummi arabici ℥ x.

Glycyrrhizæ,

Seminum cucurbitæ,

Citruli, Cucumeris,

Melonum mundatorum, ana ℥ β.

Camphoræ ℥ β.

Penidiorum ℥ iij.

Amyli candidi ℥ β.

Omnibus probe tuis & in pulcrem redactis, cum

Sacchari clarificati quod sufficit

Fiat loch.

Mede

*Medetur omnibus pulmonum & thoracis vitis aridis, maxime tabidis, macie confectis: inflammatione lateris laborantibus, tussi calidæ & siccæ, exasperationi linguæ & faucium.

Diatragacanthum calidum Nicolai.

R̄. Tragacanthi,
 Hyssopi ana ℥ iiij.
 Nucleorum pinearum mundatorum,
 Amygdalarum depellatarum, ana ℥ vi.
 Seminis lini,
 Fœnigræci,
 Cinnamomi ana ℥ β.
 Glycyrrhizæ rasæ,
 Succiglycyrrhizæ,
 Zingiberis ana ℥ ij.
 Sacchari albi quod Satis est
 Fiat loch.

*Valet tussietibus ex frigido phlegmate, & non valentibus expuere, asthmaticis, empycis, anhelosis, suspiriosis, peripneumonicis, phtisicis, ad omnem pectoris coarctationem.

Loch sanum & expertum, Mesue.

R̄. Cinnamomi,
 Hyssopi,
 Glycyrrhizæ ana ℥ β.
 Iuiubas,
 Sebesten ana num. xxx.
 M 5 Vuar

Vuarum passarum,
 Ficuum pinguium,
 Dactylorum pinguium ana ξ ij.
 Fœnigræci ξ v.
 Capill. ven. M. j.

Anisi, Fœniculi,
 Iridis, Calaminthæ,
 Seminis lini ana ξ β .

Coquantur in libris quatuor aquæ ad dimidij consumptionem, Colaturæ bene expressæ adde

Penidiarum albarum \mathfrak{ss} ij.

Coquantur ad perfectionem, postea insperge subsequencia minutissimè trita.

Nucleorum pinearum mundatorum,
 Amygdalarum mundatarum ana ξ v.
 Succiglycyrrhizæ,

Tragacanthi, Gummi Arabici,
 Amyli candidi ana ξ β .

Iridis ξ ij.

Agitentur omnia simul in lebetè donec albescant.

*Tussi vocisq̄ue asperitati à frigiditate natæ auxilio est. Crassos in thorace & pulmone humores extenuar.

Loch de Pino Mesuæ.

Rz. Nucleorum pinearū mūdatorū ξ xxx.
 Amygdalarum,
 Auellanarum assatarum,

Tragac

Tragacanthi,
 Gummi Arabici,
 Succiglycyrrhizæ, Amyli,
 Capillorum ven. Iridis ana ζ β .
 Carnis dactylorum ζ xxxv.
 Amygdalarum amararum ζ iij.
 Mellis passularum, id est, Sapæ,
 Butyri recentis,
 Sacchari optimi ana ζ iij.
 Mellis optimi ss iij. ζ ij. Fiat loch.

*Tussi diurnæ, difficultati spiritus, &
 asthmæ succurrit, humores in thorace
 crassos incidit, & extenuat.

Loch Antipatri.

Rz. Nucleorum pinearū mundatorū ζ xij.
 Seminis lini assii ζ ix.
 Tragacanthi, Iridis ana ζ xij.
 Carnis dactylorum ζ xvij.
 Amygdalarum dulcium ζ xvj.
 Dissoluatur tragacantha in aqua violarū,
 & reliquis contusis, cum melle quantum
 sufficit fiat loch secundum artem.

*Earūdem ferè virium cum superiori.

Loch de Præstio Pauli.

Rz. Comarum marrubij.
 Iridis, Hysopi,
 Pulegij, Glycyrrhizæ,
 Seminis apij ana ζ iij.
 Ficum passarum pinguium,
 Nucle

Nucleorū pinearū mundatorū ana ʒ vj.
 Macerata in aqua sufficiente per noctem,
 decoquatur, & percolatis addatur mellis
 pars media. Coquatur ad perfectionem.
 *Tabescentibus maxime conuenit.

Loch ex Eruo Pauli.

R̄. Amigdalarum amararum ʒ β.
 Farinæ orobi,
 Hyssopi ana ʒ j. Iridis ʒ ij.
 Nucleorum pinearū mūdatorum ʒ j.
 Mellis quod satis est Fiat loch.

Diatris simplex.

R̄. Iridis ʒ β. Sacchari cādi,
 Specierum diatragacanthi ana ʒ ij.
 Sacchari quod satis est.
 Coque, fiat loch.

*Præstat fere idem quod sequens.

Diatris compositæ Nicolai.

R̄. Iridis ʒ j.
 Pulegij, Hyssopi,
 Glycyrrhizæ ana ʒ vj.
 Tragacanthi, Amygdalarum,
 Cinnamomi,
 Nucleorum pinearum,
 Zingiberis, Piperis nigri ana ʒ ij.
 Caricarum, Carnis dactylorum,
 Passarum ana ʒ iij. β.
 Styracis calamytæ ʒ vij.
 Mellis albi ʒ xxvij. Coque, fiat loch.
 Tussicu

*Tussiculosis, difficulter spiratibus auxiliatur, abscissæ vocis iacturam refarcit, quæ refrigeratione contractata sit.

Diapenidion Nicolai.

℞. Penidiarum ℥ xvj. β.
 Nucleorum pinearum mundatorum,
 Amygdalarum mundatarum,
 Seminis papaveris albi ana ℥ x.
 Cinnamomi,
 Caryophyllorum,
 Zingiberis,
 Succi glycyrrhizæ,
 Tragacanthæ,
 Gummi arabici,
 Amyli, Seminum citrulli,
 Melonis, Cucumeris,
 Cucurbitæ ana ℥ j. β.
 Camphoræ, ℥ viij.
 Syrupi violacei ℔ j. β.
 Coque; fiat loch.

*Valet aduersus omnem thoracis noxam, tussim à frigore contractam, vocis iacturam: tabidis denique, & purulenta excreantibus succurrit.

Dialysopu Nicolai.

℞. Hyssopi,
 Iridis,
 Thymi ana ℥ xxx.
 Piperis nigri,
 Pulegij,

Pulegij,
 Saturia, Rutæ,
 Cymini ana ʒ xx.
 Carnis dactylorum,
 Tragacanthæ,
 Glycyrrhizæ,
 Caricarum pinguium,
 Passarum enucleatarum,
 Fœniculi ana ʒ x.
 Zingiberis,
 Anisi, Carui,
 Seminis ligustici ana ʒ v.
 Sacchari, aut
 Mellis quod satis est,
 Fiat loch.

*Confert ad vitia capitis frigida, colu-
 mellam exsiccat, arteriam asperam pur-
 gat, tussim compefcit, omnia frigida tho-
 racis & stomachi vitia emendat, conco-
 ctionem iuuat.

Loch de succo scillæ Galeni,

R̄: Succo Scillæ diebus canicularibus ex-
 cepti vt dictum est ℞ j.
 Mellis ℞ j. β. Coque fiat loch.

*Crassos & lentos humores, quique in
 thorace difficulter cōcoquantur, incidit
 & extenuat: ideoque asthmaticis, & diffi-
 cilè spirantibus auxiliatur, thoracisque
 dolorem leuat.

Aliud

Aliud eiusdem.

Ipsum scyllæ corpus è qua succus extra-
ctus, libram vnam terito cum mellis

j. β.

Coque, fiat loch.

*Hoc facultate posterius est precedēti.

*Loch de scilla compositum Mesuae, Loch
ad Asthma nuncupatum.*

R̄. Scillæ in pane assatæ ℥ iiij.

Marrubij,

Hyslopi, ana ℥ j.

Iridis ℥ ij. Myrrhæ,

Croci ana ℥ β.

Mellis quod sufficit Fiat loch.

* Ad asthma & diuturnā tussim valet,
humorem enim crassum extenuat.

Loch de pulmone vulpi.

R̄. Pulmonis vulpini præparati,

Succi glycyrrhizæ,

Seminis fœniculi,

Capill. veneris ana ℥ j.

Mellis ℥ xvj. Fiat loch.

* Abstergit & consolidat vlcera pecto-
ris & pulmonis, & præferendum est aliis
remediis in pthisi.

Loch de Carthamo Mesuae.

R̄. Medullæ seminis carthami ℥ vj.

Amygdalarum mundatarum ℥ ij.

Nucleorum pinearum mundatorum ℥ j.

Mellis

Mellis cocti,
 Succiscillæ ana quod sufficit
 Fiat loch ad perfectionem.

ELECTARIA.

Sectio quinta.

*Aromaticum Rosatum Gabrielis,
 ex Mesue.*

Recip. foliorum rosarū rubrarū ℥ xv.
 Glycyrrhizæ rasæ ℥ vij.
 Ligni aloës,
 Sandali citrini ana ℥ iiij.
 Cinnamomi ℥ v.
 Macis,
 Caryophyllorum ana ℥ ij. β.
 Gummi Arabici,
 Tragacanthæ ana ℥ iiij. ʒ ij.
 Nucis moschatæ,
 Cardamomi,
 Galangæ ana ℥ j.
 Spicæ nardi ʒ ij.
 Moschi ʒ j.
 Ambre griseæ ʒ ij.
 Trita & in puluerem redacta permiscen-
 tur cum
 Syrupi rosari,
 Syrupi è corticibus citri,

Sacchari

Sacchari albi ana ζ ix.

Coque; fiat electuarium iustæ cōsistentiæ.

Fiunt etiam morselli in hunc modum.

℞. Sacchari clarificati ℥ j.

Specierum prædictarum ζ β.

Fiant morsuli secundum artem.

* Cerebrum, cor, ventriculum, & omnia nutritioni famulantia membra roborat, appetentiam excitat, concoctionem iuuat, viscerum excrementosam humiditatem absorbit, ac ex morbo conualescentibus auxiliatur.

Aromaticum Caryophyllatum Mesuæ.

℞. Caryophyllorum ζ vij.

Macis,

Zedoariæ,

Galangæ,

Santali citrini,

Trochiscorum diarhodon

Cinnamomi,

Lignialoës,

Spicæ nardi,

Piperis longi,

Cardamomi maioris ana ζ j.

Rosarum rubrarum ζ β.

Glycyrrhizæ rasæ,

Galliæ moschatæ ana ζ ij.

Folij,

Cubebæ ana \mathfrak{D} ij. Ḃ vj.

N

Amb

Ambræ ʒ j.

Moschi ʒ β.

His tenuissimè tritis & cum

Syrupi è citro,

Sacchari albi ana q. s. permistis

Fiat electarium.

*Cor, ventriculū, & reliqua nutritio-
nis membra roborat, nauseam, & vomitū
reprimit, flatus dissipat, putredinem hu-
morū in ventriculo arceat.

Diamoschū dulce, Mesua.

R̄. Croci,

Doronici,

Zedoariæ,

Ligni aloës,

Macis ana ʒ ij.

Margaritarum albarum,

Serici crudi vsti,

Charabe,

Coralli rubri ana ʒ ij. β.

Basilici citrati,

Galliæ moschatæ ana ʒ ij. β.

Been albi, & rubri,

Folij,

Spicæ nardi,

Caryophyllorum ana ʒ j.

Zingiberis,

Cubebæ,

Piperis longi ana ʒ j. β.

Mosc

Mofchi ʒ ij.

Excipe cum

Mellis crudi ℥ j. ʒ vj.

Coque, fiat electarium.

* Ad frigidos cerebri affectus sine febre, melancholiam, & illi comatam tristitiam sine causa manifesta, vertiginē, epilepsiam, resolutionem, oris torturā, cordis palpitationem, pulmonis affectus, & spirandi difficultatem conducit.

Diamoschu amarū fiet ad superiora additis.

Absinthij,

Rosarum rubrarum ana ʒ iiij.

Aloës lotæ ʒ iiij.

Castorij,

Ligustici ana ʒ j.

Cinnamomi ʒ ij. β.

Excipiuntur

Mellis quantitati sufficienti.

* Hæc confectio præcedenti efficacior est, & præterea ventriculi humores etiam putres potentiùs absorbit.

Diarthodan Abbatis.

℞. Santali albi,

Santali rubri ana ʒ ij. β.

Tragacanthæ,

Gummi arabici,

Spodij ana ʒ ij.

N 2 Afa

Afari,
 Mastiches,
 Spicæ nardi,
 Cardamomi,
 Succu Glycyrrhizæ,
 Croci,
 Ligni aloës,
 Caryophyllorum,
 Gallia moschata,
 Anisi,
 Fœniculi,
 Cinnamomi,
 Rhabarbari,
 Seminis basilici,
 Berberis,
 Seminis portulacæ
 Seminis Scariolæ,
 Seminum cucurbitæ,
 Citrulli,
 Cucumeris,
 Melonis,
 Papaueris albi ana \mathfrak{z} j.
 Margaritarum,
 Ossis de corde cerui ana \mathfrak{z} β .
 Sacchari candi,
 Rosarum rubrarum ana \mathfrak{z} j. \mathfrak{z} iij.
 Camphoræ \mathfrak{z} xv. Alij \mathfrak{z} vij.
 Moschi \mathfrak{z} iij. β .
 Conterantur, & fiat electarium cum
 Syrupi

Syrupi rosati,
Sacchari albi ana q. sufficit.

* Valet aduersus vētriculi calorem, icteris, lienis, pulmonumque, contra viscerum dolores, & omnem totius corporis noxam à calore proficiscentem.

Diatrion Santalan.

Recip. fantali albi,
Rubri,
Citrini
Rosarum,
Sacchari candi ana ʒ iiij.
Rhabarbari,
Spodij,
Succi glycyrrhizæ,
Seminis portulacæ ana ʒ vj. ʒ.
Gummi Arabici,
Tragacanthæ,
Seminum melonis,
Cucumeris,
Citrulli,
Cucurbitæ,
Scariolæ ana ʒ j. ʒ.
Camphoræ ʒ j.
Sacchari quod satis est fiat electarium.

* Aduersus hepatis & ventriculi calorem vtilis est; præterea mirum in modum tabidis & regio morbo correptis prodest.

N 3 *Dia*

Diamargariton frigidum, Nicolai.

R. Seminum citrulli,
 Cucurbitæ,
 Melonum,
 Cucumeris,
 Portulacæ,
 Papaueris albi,
 Sandali moschatellini, citrini,
 Ligni aloës.
 Zingiberis,
 Rosarum rubrarum,
 Florum nymphææ,
 Boraginis,
 Baccarum myrti ana ʒ j.
 Coralli albi,
 Rubri ana ʒ β.
 Margaritarum ʒ iij.
 Sacchari quod satis est
 Fiat electarium.

* Omnem virium imbecillitatem firmat, syncopé iuuat, asthmaticos, tabidos, ruffientes, longo morbo extenuatos, & imbecillitate languentes recreat, & ad pristinum recuperandum robur conducit.

Diamargariton calidum, Auicenna.

R. Margaritarum,
 Pyrethri ana ʒ j.
 Zingiberis,
 Mastichis ana ʒ iiij.

Zedoar

Zedoariæ,
 Seminis apij,
 Radicum thapsiæ,
 Cardamomi,
 Nucis moschatae,
 Macis ana ʒ ij.
 Been rubri,
 Piperis,
 Piperis longi ana ʒ iij.
 Cinnamomi ʒ v.
 Sacchari quod satis est
 Fiat electarium.

*Ad vniuersi corporis refrigerationem
 confert, mulieres vterum gerentes, præfo-
 cationes vteri, cordisque syncopen iuuat:
 priuatim verò imbecillitati stomachi &
 cruditati eiusdem, corporis ac cordis exo-
 lutioni succurrit.

Diambra Mesua.

Rz. Cinnamomi,
 Doronici,
 Caryophyllorum,
 Macis,
 Nucis moschatae,
 Folij,
 Galangæ ana ʒ iij.
 Spicæ nardi,
 Cardamomi maioris,
 Cardamomi minoris, ana ʒ j.
 N 4 Zi

Zingiberis ʒ j. β.

Ligni aloës,

Santali citrini,

Piperis longi ana ʒ ij.

Ambræ ʒ j.

Moschi ʒ β.

Excipiantur

Syrupi rosati,

Aquæ rosaceæ,

Sacchari albi ana sufficienti quantitate.

*Cerebrum, cor, ventriculū, ac ventrem reliquū inferiorem calefacit, & roborat, exhilarat, coctionem iuuat, affectibus vterinis, & omnibus aliis frigidis prodest, senibus ob id ac mulieribus salubre.

Pleres Archonticon Nicolai.

℞. Cinnamomi,

Caryophyllorum,

Ligni aloës,

Galangæ,

Spicæ nardi,

Nucis moschatæ,

Zingiberis,

Spodij,

Schœnanthi,

Cyperi,

Rosarum,

Violarum ana ʒ j. Ḡ xv.

Fol

Folij,
 Mastiches,
 Styracis,
 Maioranæ,
 Mentæ aquaticæ, id est, syfimbrii, balsa-
 mines,
 Cardamomi,
 Piperis longi,
 Piperis albi,
 Seminis basilici,
 Baccarum myrti,
 Corticum citri ana ʒ ij. ʒ v.
 Margaritarum,
 Been albi, & rubri
 Coralli rubri,
 Serici vsti ana ʒ j. ʒ ij. ʒ.
 Moschi ʒ vij. ʒ.
 Caphuræ ʒ v.
 Syrupi rosati,
 Sacchari albi añ ʒ viij. fiat electariū.

*Tristibus, melancholicis, imbecillo vē-
 triculo, deliquio animi à corde nato suc-
 currit; eos qui ex diutino morbo extenua-
 ti & imbecilles sunt corroborat: Memo-
 riam amissam recuperat, sensus acuit, co-
 mitialibus, & asthmaticis prodest, om-
 nēmq; cerebri debilitatem aufert.

Letificans Galeni, secundum Nicolaum.

Rz. Florum ocymi,

N 5

Croci

Croci,
 Zedoariz,
 Ligni aloës,
 Caryophyllorum,
 Corticum citri,
 Galangæ,
 Macis,
 Nucis moschatæ,
 Stryracis ana ʒ ij. β.
 Anisi,
 Rasuræ eboris,
 Thymi,
 Epithymi ana ʒ j.
 Caphuræ,
 Moschi,
 Ambræ,
 Margaritarum,
 Ossis e corde cerui ana ʒ β.
 Foliorum auri,
 Argenti ana ʒ j.

Sacchari quod sufficit fiat electarium.

*Lætitiam colorisq; bonitatem efficit,
 concoctionem iuuat, & caniciem arceat.

Lætificans Rasus ad Almanforem.

| | |
|------------------|-------------------|
| R. metisæ, | Croci, |
| Corticum citri, | Cinnamomi, |
| Caryophyllorum, | Nucis moschatæ, |
| Galliæ moschatæ, | Cardamomi maioris |
| Mastiches, | Seminis peroniz, |
| | Been |

Been albi, & rubri,
 Zedoariæ,
 Doronici,
 Seminis ocymi caryophyllati ana ζ β .
 Moschi \mathfrak{z} j. C v.
 Tritis omnibus & in puluerem redactis
 adde
 Sacchari quod satis est
 Fiat confectio in tabulis.

Si verò volueris forma electarij, ea sy-
 rupo sequenti excipies, qui

R. Myrobal. $\left\{ \begin{array}{l} \text{cepularum, num. xx.} \\ \text{emblicarum, num. xxx.} \end{array} \right.$

Trita, & in libris tribus aquæ communis,
 ad duarum tertiarum consumptione, co-
 cta percolabis: Colaturæ addes
 Mellis despumari lb ij.
 Coque, fiat syrupus quo prædicta exci-
 pies, & fiet electarium.

* Ad affectus cordis, ventriculi, ieco-
 ris, quas partes etiam roborat, admodum
 confert: palpitationem cordis emendat,
 valenter exhilarat, & coctionem iuuat, co-
 lorémq; viuudum efficit.

Diatrion pipercon Galeni.

R. Piperis nigri, Anisi,
 Albi, Thymi ana ζ j.
 Longi ana ζ l. Mellis quod satis est.
 Zingiberis, Fiat electarium.

Recip

Recipit etiam vniuscuiusque generis piperum ζ iij.

*Ventriculi refrigerationibus, acidoructui, quartanis, resolutis, iecinorosis, & inflationibus auxiliatur.

Diatrion pipereon Mesue.

R ζ . Trium piperum ana ζ v.

Zingiberis,

Thymi,

Anisi ana ζ ij.

Spicæ nardi,

Ammi,

Amomi,

Cinnamomi ana ζ j.

Casæ,

Seminis apij,

Seseleos,

Afari,

Radicum enulæ ana ζ β .

Mellis quod sufficit.

Fiat electarium.

*Hoc magis fluxionibus quæ à capite ad thoracem descendunt, couenit.

Diospoliticon Galeni.

R ζ . Cumini in aceto macerati & vsti,

Piperis longi,

Comarum rutæ flaccidarum ana ζ j.

Nitri ζ β .

Terantur crassius, & cum

Mellis despumati quod satis est

Fiat

Fiat electarium in bona forma.

*Aluum deiicit cibos qui in ventre corrupti sunt educendo; iisque conuenit quibus venter frigidus est, aut ad frigus propensior, siquidem pituitam extenuat & spiritum flatulentum expellit.

Diacyminum Mesue.

R̄. Cymini pridie in aceto macerati, dein de siccati ʒ x.

Zingiberis,

Cynnamomi ana ʒ β.

Caryophyllorum,

Ligni aloës,

Macis ana ʒ ij. β.

Galangæ,

Piperis longi,

Cardamomi ana ʒ ij.

Moschi ʒ β.

Mellis despumati q. f.

Fiat electarium forma conuenienti.

*Ventriculum & viscera reliqua calefacit, coctionem iuuat: flatus in dictis visceribus natos dissipat.

Diacyminum Nicolai.

R̄. Cymini in aceto præparati ʒ viij. ʒj.

Cinnamomi,

Caryophyllorum ana ʒ ij. β.

Zingiberis,

Piperis nigri ana ʒ ij. ʒ v.

Galangæ,

Galangæ,
 Thymbræ,
 Calaminthes ana ʒ j. ʒ ij.
 Ammi,
 Ligustici ana ʒ j. ʒ xvij.
 Piperis longi ʒ j.
 Spicæ nardi,
 Cardamomi,
 Nucis moschatæ ana ʒ ij. β.
 Omnibustritis & in puluerem redactis,
 Mellisque despumati. q. s. exceptis fit
 electarium.

Fit etiam forma solida cum saccharo,
 hoc est, ad singulas specierum dimidias
 vncias, libram sacchari commiscendo.

*Confert frigiditati thoracis, stomachi,
 inflatis, colicis, febre quartana laboranti
 bus, & ventriculi coctionem iuuat.

Diacalaminthes Galeni.

Rz. Calaminthes montanæ,
 Seminis petroselinii,
 Pulegij,
 Seseleos ana ʒ β.
 Seminis apij,
 Cacuminum thymi ana ʒ j.
 Ligustici ʒ iij.
 Piperis ʒ j.
 Terantur subtilissimè, &

Melle

Melle despumato quantum satis est exci-
pantur.

*Crassa & lenta attenuat, & discutit,
vrinas mouet, ac muliebres menses.

Diacalaminthe Mesua.

R \ddot{z} . Calaminthæ montanæ,

Calaminthæ campestris,

Seseleos,

Petroselini ana \mathfrak{z} vj.

Zingiberis,

Seminis apij,

Comarum thymi ana \mathfrak{z} iij.

Ligustici \mathfrak{z} vj.

Piperis \mathfrak{z} xij.

Excipe melle despumato quod satis est.

*Auxiliatur iis quos cibi fastidium vr-
get, appetentiam reuocans, ægrè quoque
spirantibus, ventriculo refrigerationem
sentienti, & flatibus distento confert.

Diacinnamomum Mesua.

R \ddot{z} . Cinnamomi \mathfrak{z} xv.

Casix,

Cymini,

Radicum enulæ ana \mathfrak{z} β .

Galangæ \mathfrak{z} vij.

Caryophyllorum,

Piperis longi,

Cardamomi maioris,

Cardamomi minoris,

Zingi

Zingiberis,
 Macis,
 Nucis moschatae,
 Ligni aloës ana ʒ iij.
 Croci ʒ i.
 Sacchari ʒ v.
 Moschi ʒ ij.
 Excepta
 Mellis despumati lb ij. ʒ viij.
 Coque, fiat electarium.

*Coctionem iuuat, etiam pituitæ putredinem prohibet, distributionem alimentum in corpus promouet.

Diagalanga Mesue.

R̄. Galangæ,
 Ligni aloës ana ʒ vj.
 Caryophyllorum,
 Macis,
 Ligustici ana ʒ ij.
 Zingiberis,
 Piperis longi,
 Piperis albi,
 Cinnamomi,
 Calami odorati ana ʒ j. β.
 Calaminthæ siccæ,
 Menthæ siccæ,
 Cardamomi,
 Spicæ nardi,
 Seminum apij,

Fœni

Fœniculi,

Anisi,

Carui ana ʒ j.

Sacchari albi ʒ x.

Mellis despumati q. s.

Fiat electarium vt decet.

*Ventriculi & hepatis intemperiem frigidam sanat: ob id coctionem iuuat, ructus acidos compescit, & flatus crassos potenter dissipat, atque ab eis natas inflationes: oris habitum commendat.

Diacurcuma, id est, Ἀγὸ κρόκον, Mesue.

ʒ. Tragacanthæ ʒ j.

Crocī,

Asari,

Seminum petroselini,

Apij,

Dauci,

Anisi ana ʒ iiij.

Rhabarbari optimi,

Mei,

Spicæ nardi ana ʒ vj.

Costi,

Myrrhæ,

Casia,

Schœnanthi,

Carpobalsami,

Rubiæ tinctorum,

Succi absinthij,

O

Succl

Succi eupatorij,
 Olei balsami ana ʒ ij.
 Calami aromatici,
 Cinnamomi ana ʒ j. β.
 Scordij,
 Ceterach. i. aspleni,
 Succi glycyrrhizæ ana ʒ ij. β.
 Trita, &
 Mellis despumati q. s. excepta.
 Fiat electarium.

*Ventriculi, iecoris, lienis morbos frigidos, ob idq; diuturnos sanat, & hinc orta symptomata, vt hydropem, cachexiã, colorem corporis fœdum, humorum in ventriculo corruptelam, renum & vesicæ vitia frigida, vrinãque euocat.

Diacurcuma minor Mesua.

R̄. Spicæ nardi,
 Myrrhæ,
 Casiæ,
 Croci,
 Schœnanthi,
 Costi,
 Cinnamomi ana ʒ j.
 Mellis despumati q. s.
 Fiat electarium.

*Idem pollet quod superior, sed imbecillius.

Dia

Dialacca.

℞. Laecæ lotæ,
 Rhabarbari ana ʒ iij.
 Spicæ nardi,
 Mastiches,
 Seminis apij
 Succī absinthij,
 Succī eupatorij,
 Ammi, Sabinæ,
 Amygdalarum amararum.
 Costi,
 Myrrhæ,
 Rubiæ,
 Fœniculi,
 Anisi, Afari,
 Aristolochiæ rotundæ,
 Gentianæ,
 Croci,
 Cinnamomi,
 Hyssopi, Casiæ,
 Schœnanthi,
 Bdellij ana ʒ j. β.
 Piperis,
 Zingiberis ana ʒ j.
 Myrrham & bdellium in vino infunde,
 cætera tenuissimè tere, & melle despuma-
 ro quantum satis est, excipe, fiat electariū.
 *Ventriculū & hepar roborat, hepatis
 obstructions aperit, eius scirrhu dissol-
 uir,

uit, & ex his nascentem cacheriam & hydropen sanat, vrinas mouet, lapidémque renum & vesicæ frangit.

Dianison Mesuae.

℞. Seminum anisi ℥ ij. β.

Glycyrrhizæ rasæ,

Mastiches ana ℥ j.

Seminum carui, fœniculi,

Macis,

Galangæ,

Zingiberis,

Cinnamomi ana ℥ v.

Piperis nigri,

Albi,

Longi,

Casæ,

Pyrethri,

Calaminthæ ana ℥ ij.

Cardamomi maioris,

Caryophyllorum,

Cubeborum,

Croci,

Spicæ nardi ana ℥ j. β.

Sacchari albi ℥ v.

Mellis despumati q. s.

Fiât electarium.

*Intemperiem frigidam ventriculi à pituita cruda, vel etiâ flatibus sanat, & tussim diuturnam à frigida causa genitam.

Dian

Dianthon Nicolai.

Rz. Florum rorismarini ℥ j.
 Rosarum rubrarum, Cinnamomi,
 Violarum, Zingiberis,
 Glycyrrhizæ ana ℥vj. Zedoariæ,
 Caryophyllorum, Macis,
 Nucis moschatae, Ligni aloës,
 Galangæ, Cardamomi,
 Spicæ nardi, Seminis anethi,
 Seminis anisi ana ℥iiij. Mellis q. s.
 Fiat electarium.

*Succurrit præter rationem tristibus,
 animi lætitiã auget; Item cardiacis, ele
 phantia correptis, animi defectionibus,
 & cordis syncopi, & in vniuersum omni
 corporis imbecillitati prodest.

Cyphoides andromachi.

Rz. Pulpæ passarum pinguium ℥ iiij.
 Croci,
 Calami aromatici,
 Bdellij ana ℥ ij. β.
 Casiæ,
 Cinnamomi ana ℥ j. β.
 Spicæ nardi ℥ iiij.
 Schœnanthi ℥ ij. β.
 Myrrhæ ℥ iiij.
 Radicum aspalathi ℥ ij.
 Terebinthiæ ℥ iiij.
 Mellis, &

O ℥ Vini

Vini odorati ana q. s.

Coque, fiat electarium vt artis est.

*Ad hepaticos, & thoracis affectiones
vtilis est.

Electarium de baccis Lauri Rafis.

R. Foliorum rutæ ʒ x.

Seminum Ammi,

Cymini,

Nigellæ,

Ligustici,

Carui,

Dauci,

Origani,

Amygdalarum amararum,

Piperis nigri, & longi,

Menthastri,

Baccarum lauri,

Castorij ana ʒ ij.

Sagapeni ʒ β.

Opopanacis ʒ iij.

Mellis ℥ j. ʒ iiij.

Tritis diligenter que triturlanda sunt, fiat
electuarium; deinde addantur lachrymæ
in vino dissolutæ.

*Valet ad colicam & iliacam passio-
nem, & doloribus intestinorum ex causa
frigida, vel flatuosa.

Electuarium de cineribus Auicenna.

R. Cinerum vitri,

SCOR

Scorpionum,
 Radicum brassicæ,
 Leporis,
 Putaminū ouorum è quibus pullus exem-
 ptus sit,
 Lapidis spongiæ,
 Sanguinis hirci præparati,
 Lapidis Iudaici,
 Gummi iuglandis,
 Acori ana ʒ j.
 Petroselinii,
 Dauci,
 Pulegij,
 Gummi arabici,
 Seminis altheæ,
 Piperis nigri ana ʒ j. ʒ.
 Mellis q. s.
 Fiat electarium.

Confectio Anacardina Mesua.

R̄. Piperis nigri, longi,
 Myrobala. cepularum,
 Emblicarum,
 Bellericarum, Indarum,
 Castorij, ana ʒ ij. Costi,
 Anacardij,
 Croci,
 Melanthij,
 Baccarum lauri ana ʒ vj.
 Cyperi ʒ iiij. O 4 Tere

Tere anacardia per se, & aliis tritis misce,
& factum

Electarium cum

Butyri recentis non saliti,

Mellis despumati ana q. s.

Coquatur vt artis est.

*Ad totius inferioris v̄tris, & cerebri
affectus frigidos conducit, sanguinem
puriorum reddit, & inde spiritu animali
facto purgatiore, & tenuiore, sensus om-
nes, apprehensionem, intellectum & me-
moriam iuuat, colorumque viuudum cor-
pori tribuit.

Alia Confectio Anacardina.

Rz. Aloës ʒ i. β.

Iridis,

Cassia ana ʒ vij.

Zingiberis,

Anacardij,

Carpobalsami ana ʒ iiij. β.

Folij,

Spicæ nardi,

Myrobal. fuluarum,

Cepularum,

Indarum,

Myrobalanorum.

Bellericarum,

Emblicarum,

Mei,

Epithymi ana iiij. ʒ j.

Caryophyllorum,

Schoen

Schœnanthi,
 Rhei pontici,
 Mastiches ana ʒ ij.
 Corticum radicum fœniculi lotorū ℥ j.
 Aceti optimi ℥ ij.
 Contusa & macerata in prædicto aceto
 dies septem, coquantur, & colentur; Cola-
 turæ bene expressæ adde
 Mellis despumati ℥ ij.
 Fiat electarium vt artis est.

*Electarium ex Asa fœtida seu
 Lasere, Mesua.*

R̄. Laseris,
 Piperis,
 Myrrhæ,
 Foliorum rutæ ana ʒ β.
 Terantur, & excepta cum
 Mellis despumati ʒ viij.
 Coquatur vt decet.

*Ad febres antiquas, & circuitum re-
 petentes, vt quartanas, quotidianas, som-
 num grauem, tremoré, venenosos mor-
 sus vtile est.

Hiera simplex Galeni.

R̄. Cinnamomi,
 Xylobalsami,
 Asari radicum,
 Nardi spicæ,

0 5 Masti

Mastiches chiæ, ana ʒ vj.

Croci ʒ v.

Aloës electæ ʒ xc.

Omnibus tritis & in puluerem redactis,
deinde

Mellis quantitate sufficienti exceptis fit
electarium.

Addita autem agarici præparati parte
dimidia fiet hiëra cū agarico. aliis quar-
ta sufficere videtur.

*Præstantissimum medicamentum est
ad vitiosos succos, qui in ventriculi tuni-
cis herēt. Vtiliter quoq; exhibetur iis qui
suffusorum imagines, & alia symptoma-
ta ex stomachi vitio patiūtur: & præterea
iis qui aluo sunt adstricta, & mulieribus
quæ non probè purgantur.

Hiëra composita Galeni.

℞. Colocinthidis ʒ viij.

Scillæ assatæ,

Agarici,

Ammoniaci,

Scammonij,

Corticum radicum hellebori nigri,

Sthæcadis,

Hyperici,

Pulegij.

Gentianæ,

Spicæ nardi,

Schoranathi ana ʒ xvj.

Polij montani,

Epith

Epithymi,
 Polypodij,
 Bdellij,
 Aloës,
 Chamædrios,
 Euphorbij,
 Marrubij,
 Casiæ ana ʒ viij.
 Myrrhæ,
 Sagapeni,
 Croci,
 Aristolochiæ rot.
 Trium piperum,
 Cinnamomi,
 Opopanacis,
 Castorij,
 Petroselinij ana ʒ iiij.

Omnia tenuissimè contrita excipe melle
ad specierum pondus.

* Medicamentum est efficacissimū ad
omnes morbos contumaces, & tutissimū.

Hiæra Archigenis ex Aëtio.

R̄. Colocynthidos ʒ j.
 Chamædryos,
 Agarici,
 Marrubij,
 Stœchadis ana ʒ x.
 Opopanacis,
 Sagapeni ana ʒ j.

Petrose

Petroſelini,
 Aſtolochiaꝝ rot.
 Piperis albi ana ꝑ v.
 Cinnamomi,
 Spicæ nardi,
 Myrrhaꝝ,
 Polij montani,
 Croci ana ꝑ iiij.
 Mellis deſpumati ad pondus ſpecierum
 Fiat electarium.

*Confert affectibus melancholicis, & ex pituita craſſa natis, vt vertigini, epilepſiæ, ſpaſmo, difficultati ſpirandi, pſoræ lepræ, & cæteris tuberculis à craſſa materia naſcentibus aut ſeroſo excremento, item in teſtibus, ventriculo, vtero à flatu dolentibus, aut prædictis humoribus.

Hiera Logadij ex Aëtio,

Rꝯ. Colocynthidis ꝑ xx.
 Scillæ aſſatæ,
 Agarici,
 Ammoniaci,
 Scammonij,
 Corticis radicum ellebori nigri,
 Hyperici ana ꝑ j.
 Epithymi, Polypodij,
 Bdellij,
 Aloës,
 Chamædryos,

Marrub

Marrubij,
 Casiæ ana ζ j.
 Myrrhæ,
 Piperis albi, nigri,
 Cinnamomi,
 Croci,
 Opopanacis,
 Sagapeni,
 Caltorij,
 Petroselini,
 Aristolochiæ ana ζ β .
 Mellis despumati ad pondus omnium
 specierum,

*Ad lateris dolorem, epilepsiam, maniam, melancoliam morbum, scotoma, cephalæam, suspiria, subitam præfocationem, incubum, tetanū, spasmiū cynicum, cōtusum corpus ex ictu, lapsu, tremorem, paralyfim, arthritidas, dolores spinæ, mamarum duritias, cancrōsque earum, stomachi imbecillitatem, ructum acidum, inflationem, tormina, nauseam, colicum dolorem, menses suppressos.

Hiæra Logadij, ex Nicolao.

\mathcal{R} . Pulpæ colocynthidis,
 Polipodij ana ζ ij.
 Euphorbij,
 Polij montani,
 Seminis thymelex ana ζ j. β . \mathcal{C} vj.
 Absin

Absinthij,
 Myrrhæ ana ʒ j. Ć xij.
 Centaurij.
 Agarici,
 Ammoniaci,
 Folij,
 Nardi indicæ,
 Scillæ,
 Scammonij præparati ana ʒ j.
 Aloës,
 Comarum thymi,
 Casiæ,
 Chamædryos.
 Bdellij,
 Marrubij ana ʒ j. Ć xiiij.
 Cinnamomi,
 Opopanacis,
 Castorij,
 Aristolochiæ,
 Trium piperum,
 Croci,
 Sagapeni,
 Petroselini ana ʒ β.
 Hellebori nigri, albi ana Ć vj.
 Mellis despumati ℞ j. ʒ j. β.
 Confice vt decet.

*Exterminat mala diuturna ex melan-
 cholia facta, epilepsiam, vertiginem, con-
 uulsiones, hemicraniam, elephantiam, im-
 petigin

perigines, lethargum, prodest, spumantibus & linguam mordentibus, his quis lethalia venena sumpserunt, iecinorosis, pleuriticis, ischiadicis, & lumborum dolore infestatis vitiosos humores educit & mulierum menstrua.

Benedicta simplex Nicolai.

R̄ Turbith electi,
 Sacchari ana ʒ x.
 Esulæ,
 Diagridij,
 Hermodactylorum,
 Rosarum rubrarum ana ʒ v.
 Caryophyllorum,
 Spicæ indicæ,
 Zingiberis,
 Croci,
 Saxifragiæ,
 Piperis longi,
 Amomi,
 Cardamomi,
 Seminis petroselinij,
 Lithospermi,
 Carui,
 Fœniculi,
 Asparagi,
 Rusci,
 Salis gemmæ,
 Galangæ,
 Macis ana ʒ j.
 Tritis

Tritis tritrandis, Fiat electarium cum
Mellis despumati ℥ iij.

*Humores pituitosos, ad articulos potissimum decumbentes elicit. A renibus quoque & vesica purgat.

Diasene Gentilis de Fulgine.

R̄. Foliorum senæ ℥ iij.

Auellanarum num.l.

Serici vsti ℥ ij.

Lapidis armeni ℥ j.

Sacchari ℥ v.

Mellis despumati ℥ vj.

Fiat electarium secundum artem.

Diasena Nicolai.

R̄. Senæ ℥ iij.

Auellanas tostas num.l.

Serici vsti ℥ ij.

Lapidis armeni lauati, ℥ j.

Lapidis lazuli loti ℥ iij.

Sacchari ℥ vj.

Cinnamomi,

Caryophyllorum,

Galangæ,

Piperis nigri,

Spicæ nardi indicæ,

Folij,

Seminis ocimi,

Cardamomi,

Croci,

Zingiberis,

Zedo

Zedoaria,
 Florum rorismarini,
 Piperis longi ana ʒ ij.
 Mellis despumati ℥ ij.
 Fiat electarium.

*Succurrit melancholicis, mania vexatis, quartana laborantibus, tristitia affectis, lienosis, elephantosis, & omnibus vitiis ex atra bile procreatis.

Diasena recens Rasii, quæ sub nomine Electuarij Lenitini in vsu est.

Rz. Passularum enucleatarum ʒ ij.
 Capillorum veneris,
 Violarum,
 Hordei mundati ana M. β.
 Sebesten,
 Iuiubas ana num.xx.
 Glycyrrhizæ ʒ β.
 Prunorum exemptis nucleis,
 Tamarindorum ana ʒ vj.
 Senæ mundatæ,
 Polipodij ana ʒ ij.
 Coctis ad tertię partis cōsumptionē, adde
 Mercurialis recentis M. j. β.
 Bulliant leuiter, cola. In colatura dissolue
 Pulpæ cassiæ,
 Tamarindorum,
 Prunorum,
 Per cribrum transcolentur, & adde
 P Sacch

Sacchari albi ℥ iij. β.

Sacchari violati ℥ vj.

Coquantur omnia, & fiat electarium in bona forma, vocaturque diasena senæ expers. Qui verò voluerit cum sena habere, ad singulas electarij vncias addat

Pulueris senæ ℥ j.

*Valet in febribus ex humorum putredine natis, & pleuritide. Emollit enim album; & vtramq; bilem sine molestia & innoxie educit.

Electarium de Sebeste, Montagnana.

Rz. Sebesten,

Prunorum siccorum,

Pulpæ tamarindorum ana ℥ v.

Aquæ violarum ℥ j.

Aquæ iridis,

Anguriæ ana ℥ vj.

Succi mercurialis depurati ℥ iiij.

Penidiorum ℥ viij.

Seminum cucurbitæ enucleatorum,

Cucumeris, Melonis,

Citrulli ana ℥ ij. Diagridij ℥ iiij.

Coquantur tamarindi, sebesten & pruna, & in aquis stillatitiis dissoluta commiscantur cum

Diapruni simplicis ℥ j. β.

Postea adduntur penidia, & his dissolutis reliqua commiscantur, & fit electuarium.

* Conf

*Cōfert febribus biliosis interpolatis, ac
continuis exquisitis, febriūmq; vehemē-
tiā sedat, sitim extinguit, vigilias arceat,
& acres humores per urinam educit.

*Diacassia Nicolai, sub nomine Cas-
sia condita.*

R \ddot{z} . Pulpæ cassiæ ℥ j.

Pulpæ tamarindorum.

Mannæ electæ,

Penidiorum,

Sacchari violati,

Sacchari candi ana ℥ j. β.

Syrupi violati ℥ iij.

Hæc omnia dissolue in decocto sequenti.

Prunorum,

Violarum,

Glycyrrhizæ,

Seminum communium enucleatorum,

Polypodij ana ℥ j.

Foliorum fenæ ℥ β.

Anisi,

Fœniculi ana ℥ j.

Coquantur in aqua ad tertiam partis con-
sumptionē, & colaturæ bene expressæ ad-
dātur suprascripta, ac in electarij formam
reducantur.

*Confert iis qui dura sunt aluo, hæc em̄
leniter & citra molestiā subducit, ac flauā
educit bilē, ac febres inde natas mitigat.

P 2 Thorax

Thoracis pulmonis, & asperæarteriæ
phlegmonas resoluit, &c.

Diacassia magistralis.

R. Iuinbarum,
Prunorum,
Capilli veneris,
Tamarindorum,
Sebesten,

Violarum ana M. j.

Coquantur in aqua secundam artem, & in
colatura dissolue

Pulpæ cassiæ lb̄ x.

Sacchari albi lb̄ v.

Coquantur ad perfectam consistentiam.

Cassia communis.

R. Violarix,

Maluæ,

Mercurialis,

Betræ,

Parietarix ana M. j.

Fiât horum viridium decoctio in

Aquæ communis lb̄ x.

Bulliant ad dimidij consumptionem: hac

colatura bene expressa extrahitur cassia,

& ad singulas libras pulpæ adduntur

Mellis despumati ℥̄ vj.

Coquitur in formam electuarij.

* Alium leniter & citra molestiã omnem
subducit, estq; p̄ delicatis ac molliorib⁹.

Dia

*Diaprunum non laxatiuum Nicolai.*R^z. pruna electa num. c.Coquantur perfecte in aqua sufficiente,
deinde cribro raro transmittantur, & re-
seruata pulpa decoctioni affunde.Violarum \mathfrak{z} β .Bulliant sufficienter, & colentur: colaturę
addanturSacchari \mathfrak{lb} ij.Pulpę supradictę \mathfrak{lb} j.

Pulpę cassię

Tamarindorum ana \mathfrak{z} j.Coquantur lento igni, & addantur subse-
quentes species tenuissimę tritę, semper
commouendo,

Santalorum albi, Rubri,

Spodij,

Rhabarbari electi,

Cinnamomi ana \mathfrak{z} iij.

Rosarum rubrarum,

Violarum,

Seminum portulacę,

Seminum scariolę,

Berberis,

Succi glycyrrhizę,

Tragacanthę ana \mathfrak{z} ij.

Seminum cucurbitę,

Cucumeris, Melonum ana \mathfrak{z} j.

Contundantur vt supra.

P \mathfrak{z}

*Facit

* Facit ad acutas, ardentés, omnésq; alias febres, nempè tertianas continuas, hecticas, marasmodos, lityrias, & in summa ad omnem febrilem affectum.

Diaprunum solutivum.

R̄. Diaprunis non laxatiui ℥ j.

Diagridij ℥ j.

Fiat electarium.

Diacatholicon Nicolai.

R̄. pulpæ cassiæ,

Tamarindorum,

Senæ mundatæ ana ℥ ij.

Rhabbarbari,

Polipodij,

Violarum,

Anisi ana ℥ j.

Glycyrrhizæ rasæ,

Penidiorum,

Sacchari candi,

Quatuor sem. frig. maior. ana ℥ ij.

Conterenda conterantur: Et sume

Polypodij recentis ℥ iij.

Seminis fœniculi ℥ ij.

Aquæ communis ℥ ix.

Coque ad dimidij consumptionem, & cola: colaturæ adde

Sacchari albi ℥ ij.

Coquantur ad syrapi consistentiam, & supra scriptis additis, fiat electarium.

* Omn

*Omnes corporis humores purgat. Confert acutis & peracutis morbis. Emollit enim, alterat, roburq; addit. Iocinerosis, lienosis, podagricis, arthriticis, tertianis, quartanis, & quotidianis, doloribus capitis succurrit.

Diapolypodion Magistrale.

R̄. Polypodij mundati ℥ ij.

Mellis despumati ℥ vi.

Aceti scillitici ℥ j. ℥ ij.

Zingiberis ℥ vj. Fiat electarium.

Diacarthamu Arnoldi de villa nova.

R̄. Specierū diatragacanthi frigidi ℥ β.

Pulpæ cydoniorum ℥ j.

Pulpæ carthami ℥ β.

Zingiberis ℥ ij.

Scammonij præparati ℥ iij.

Turbith ℥ vj.

Mannæ ℥ ij.

Mellis rosati colati,

Sacchari candi ana ℥ j.

Hermodytylorum ℥ β.

Sacchari albi ℥ x. β.

Fiat electarium liquidum.

*Flauæ bili & pituitæ educendæ mirificè conducit.

Electarium Episcopi siue Elefoph

Mesue.

R̄. Scammonij præparati,

P 4

Turb

Turbith ana ʒ vj.

Caryophyllorum,

Cinnamomi,

Zingiberis,

Myrobalanorum emblicarum,

Nucis moschatae,

Polypodij ana ʒ ij. β.

Sacchari optimi ʒ vj.

Mellis despumati lb j. ʒ iiij.

Coquantur fiat electarium.

* Bilem flauam & pituitā elicit, flatus quoque toto corpore expellit, doloribus articulorum, laterisq; prodest, item colicis cruciatibus: humores ad renes & vesicam decumbentes expurgat.

Diaphœnicum Mesuae.

Rz. Dactylorum mundatorum ʒ c.

Penidiorum ʒ l.

Amygdalarum purgatarum ʒ xxx.

Turbith electi ʒ xxxv.

Scammonij ʒ xij.

Zingiberis,

Piperis longi,

Florum rutae,

Cinnamomi,

Ligni aloës,

Macis,

Anisi,

Fœ

Fœniculi,

Dauci,

Galangæ ana ℥ ij. β.

Dactyli per triduum in aceto & totidem noctes macerantur, deinde in mortario cōtunduntur cum amygdalis & penidiis. Reliqua tenuissimè teruntur, & in electarium reducuntur cum

Mellis despumati ℔ vj.

*Febribus cōpositis & diuturnis auxiliatur, bilem enim flauam & pituitam ducit. Colicis cruciatibus mirificè confert, item doloribus ventriculi, & id genus aliis vitiis ex crudis humoribus ortis.

Electarium Hamech, Mesue.

Recip. myrobalanorum fuluarum ℥. iiij.

Cepularum,

Indarum,

Rhabarbari electi ana ℥ ij.

Agarici,

Colocynthis,

Polipodij ana ℥ xvij.

Absinthij.

Thymi,

Senæ ana ℥ vj.

Violarum ℥ j. β.

Epithymi ℥ ij.

Seminis anisi,

Fœniculi,

P 5

Rosa

Rosarum rubrarum ana ζ vj.

Succi fumarix ss j.

Pruna num. lx.

Passularum enucleatarum ζ vj.

Macerentur omnia in sero lactis caprini sufficiente, in vase vitrato angusti oris, per dies quinque. Postea ferueant vna aut altera ebullitione, Colentur, colaturæ bene expressæ adde

Pulpæ cassiæ ζ iiij.

Pulpæ tamarindorum ζ v.

Mannæ ζ iiij.

Frica manu, cola, & adde

Sacchari albi ss j. β .

Scammonij præparati ζ j. β .

Coque ad mellis consistentiam, & adde

Myrobalanorum fuluarum,

Cepularum,

Indarum,

Bellericarum,

Emblicarum,

Rhabarbari,

Seminis fumarix ana ζ β .

Spicæ nardi indicæ,

Anisi ana ζ ij.

Confice electuarium.

* Morbis omnibus ex flaua bile & pituita salsa natis, nempe impetigini, scabiei, elephantiæ, & cæcro succurrit. In summa omni
fœdit

foetidati cutis à biliosis & adustis humoribus procreatæ conuenit.

Electarium è succo Rosarum, Nicolai.

R̄. Succi rosarum rubrarum,
Sacchari albi ana ℥ j. ℥ iij.
Scammonij præparati ℥ j. β.
Santali rubri, albi, lutei ana ℥ vj.
Spodij ℥ ij.
Camphoræ ℥ j.

Coquatur saccharum cum succo rosarum, deinde reliqua trita adiiciantur, & fiat electarium.

*Expellit flauam bilem citra molestiam, ad morbos articularum ex biliosis & calidis humoribus natos, ad febrēsque tertianas confert.

Electarium rosatum, Mesua.

R̄. Succi rosarum rub. ℥ iij.
Sacchari optimi ℥ j. β.
Mannæ electæ & recentis ℥ vj.
Scammonij præparati ℥ j. β.
Coque igni lento ad mellis crassitudinem, tunc adde subsequenter bene trita,
& per cribrum transmissa,
Trochisc. de spodio ℥ j.
Galliæ moschatæ,
Crocii ana ℥ ij.
Trochisc. de berberis ℥ β.
Confice secundum artem.

Hoc

Hoc electario vtimur in conficiendis catapotiiis aggregatiuis, & de hermodactylis.

*Cholagogum est clemens, ob id salubre biliosis affectibus, arthritidi calidæ, cephalalgia calidæ, vertigini, oculorum dolori, ictero.

Electarium Indum maius Mesua.

R̄: Cinnamomi,
 Caryophyllorum,
 Spicæ nardi,
 Rosarum rubrarum,
 Casia,
 Macis,
 Cyperi ana ℥ β.
 Santali citrini ℥ ij. β.
 Ligni aloës,
 Nucis moschatæ ana ℥ ij.
 Turbith electi ℥ l.
 Sacchari optimi,
 Penidiorum ana ℥ xx.
 Galangæ,
 Cardamomi maioris,
 Cardamomi minoris,
 Afari,
 Mastichis ana ℥ j. β.
 Scammonij preparati ℥ j. β.
 Omnia tenuissimè conterantur, & manibus oleo amygdalarum dulcium recens

cens extracto, bene inunctis, fricentur,
& fiat electarium cum syrupo subsequen-
ti, qui

R̄. Succi apij,

Fœniculi,

Cydoniorum,

Granatorum ana ℥ vi.

Mellis despumati ℔ iij. β.

Coquantur in formam syrupi.

*Purgat ventrem totum inferiorem,
atque adeò iuncturas pituita etiam putri,
flatuſque dissipat: & affectibus inde natis,
dolori colico & nephritico, & ventriculi,
& aliorum viscerum, vtile est.

Electarium Indum minus Mesua.

R̄. Turbith electi,

Sacchari ana ℥ vi.

Macis,

Caryophyllorum,

Piperis,

Zingiberis,

Cinnamomi,

Nucis moschatæ,

Cardamomi ana ℥ vij.

Scammonij præparati ℥ j. β.

Mellis despumati ℔ iij.

*Ad eadem efficax est.

Electarium de Psyllis Mesua.

R̄. Succi

Rz. Succı buglossı siue boraginis dome-
sticæ & syluestris,

Endiuix,

Apij, ana ℥ ij.

Succi fumarix ℥ iiij.

Clarificentur, & in his infunde

Cuscutæ,

Anisi,

Senæ ana ℥ β.

Capillorum ven, M. j.

Asari ℥ β.

Nardi indicæ ℥ ij.

Macerentur vigintiquatuor horas, deinde
semel feruefiant, & adde

Violarum recentium ℥ iiij.

Epithymi ℥ ij.

Rursus feruefiant, colentur, colaturæ ad-
dantur

Psyllij ℥ iiij.

Macerentur vigintiquatuor horas iden-
titem agitando, post exprime totam muc-
caginem, in cuius ℥ iiij.

Coque igni lento

Sacchari optimi ℥ ij. β.

Scammonij præparati ℥ iiij. β.

Coctis omnibus adde, subsequencia sub-
tilissimè trita

Trochiscorum diarhodon, de spodio,

Rhabarbari ana ℥ j.

Tro

Trochiscorum de berberis \mathfrak{z} β .

Fiat electarium.

*Fluam bilem euocat, ob id febribus ardentibus, acutis, curatu difficilibus auxiliatur, dolori capitis, & vertigini à bilis vapore nascenti, ictero & intemperiei calidæ hepatis.

Triphera Persica Mesua.

Rz. Succu solani,

Endiuia,

Apij,

Lupuli ana \mathfrak{ss} \mathfrak{j} .

Violarum \mathfrak{z} iiij .

Cuscutæ \mathfrak{z} β .

Myrobalanorum, citrearum,

Cepularum,

Indarum ana \mathfrak{z} ij .

Foliorum senæ \mathfrak{z} ij .

Spicæ nardi indicæ \mathfrak{z} iiij .

Agarici electi \mathfrak{z} \mathfrak{j} .

Pruna damascena num. l .

Macerentur in prædictis succis, fricatis prius myrobalanis oleo amygdalarum dulcium: Coque igni lento ad tertias, dein aduice

Epithymi \mathfrak{z} xl .

Semel feruefiant, colentur, In dimidia parte colaturæ dissolue

Tamarindorum recentium \mathfrak{z} iiij .

Mannæ

Mannæ ζ j. β .
 Pulpæ cassiæ ζ iiij.
 Sacchari violati lb j.
 Alteri parti adde
 Sacchari optimi lb iiij.
 Aceti boni lb j.
 Coquantur lento igni & reliquis admisceantur, deinde adde
 Rhabarbari ζ ij.
 Myrobalanorum, citrinarum,
 Cepularum,
 Indarum ana ζ j.
 Bellericarum,
 Emblicarum ana ζ β .
 Seminis fumarix,
 Trochiscorum diarhodon,
 Macis,
 Mastichis,
 Cubebæ,
 Spodij,
 Santali citrini,
 Semen cucurbitæ,
 Citrulli,
 Melonum,
 Cucumeris ana ζ ij. β .
 Anisi ζ β .
 Spicæ nardi ζ ij.
 Tenuissimè trita inuoluantur oleo violato, & fiat electarium secundum artem.

*Aduer

*Aduersus acutas febres, calidam ventriculi & iecoris intemperiem efficac. Morbis omnibus ex humorum vltione natis confert, sitim restinguit, icterum calidum ex obstructione sanat, suffusionem à vaporibus biliosis visui incommodantem discutit.

Diaturbith Mesue.

R̄. Turbith albi & gummosi ʒ x.

Zingiberis ʒ v.

Mastiches ʒ iij.

Saccharialbi ʒ ij. β.

Fiat electarium cum

Mellis sufficienti quantitate.

*Pituitam, præsertim eam quæ est in ventriculo, elicit.

Diaturbith cum Rhabarbaro,

Montagnane.

R̄. Turbith,

Hermodytylorum ana ʒ j.

Rhabarbari ʒ x.

Scammonij præparati ʒ β.

Santali albi, rubri,

Violarum,

Zingiberis ana ʒ j. β.

Mastichis,

Anisi,

Cinnamomi,

Croci ana ʒ β.

Q

Sac

Sacchari albi ℥ j. ℥. iij.

Fiat electarium in forma competenti.

*Fluam bilem & pituitam educit, atq;
aqua intercutem laborantibus mirifice
confert.

Catharticum Imperiale, Nicolai.

Rz. Scammonij præparati,

Sacchari ana ℥ j.

Cinnamomi,

Spicæ nardi,

Radicum saxifragiæ,

Polypodij,

Zingiberis ana ℥ β.

Spicæ nardi celticæ,

Piperis longi,

Piperis albi,

Cardamomi,

Amomi,

Caryophyllorum ana ℥ iij.

Terantur omnia tenuissime & fiat electa-
rium cum

Mellis despumati q. s.

*Bilem vtranque & pituitam sine mo-
lestia educit, caput optimè purgat, & oris
spiritum commendat.

Diamanna Galeni ex Mesue.

Rz. Mannæ electæ ℥ j.

Scammonij præparati ℥ j.

Succi rosarum rubrarum ℥ j.

Diffol

Dissoluatur in succo manna, & coquatur
sufficiens lento igne, deinde adde
Mastiches pulverisatæ ʒ iij.
Fiat electarium.

*Bilem flavam educit sine molestia, ob
id omnibus morbis biliosis salubre.

Electarium lenitivum magistrale.

R. Myrobalanorum flavarum.

Cepularum,

Indarum ana ʒ ij.

Bellericarum,

Emblicarum ana ʒ j. β.

Sacchari optimi ʒ β.

Terantur triduum in vase lapideo, singu-
lis diebus bis vel ter aquam fontanam
inspergendo, deinde siccata terantur in
pulverem tenuem, cuius sumes ʒ j.

Turbith boni ʒ iij.

Zingiberis ʒ j. β.

Cinnamomi,

Anisi,

Sandali rubri ana ʒ j.

Scammonij preparati ʒ j. β.

Sacchari q. s.

Fiat electarium.

Theriaca Andromachi senioris

ex Galeno.

R. Trochiscorū scilliticorum ʒ xlviij.

Trochiscorum, theriacorum,

Q. 2 Hedicroi,

Hedicroi,
 Piperis longi,
 Opij ana ꝓ xxiiij.
 Rosarum rubrarum purgatarum,
 Iridis,
 Succu glycyrrhizæ,
 Seminis napi syluestris,
 Scordij,
 Opobalsami,
 Cinnamomi,
 Agarici ana ꝓ xij.
 Myrrhæ,
 Costi,
 Croci,
 Casiæ,
 Nardi indicæ,
 Schœnanthi,
 Thuris electi,
 Piperis nigri,
 Dictamni cretici,
 Comarum marrubij,
 Rhapontici,
 Stœchadis,
 Petroselini,
 Calaminthæ montanæ,
 Terebinthinæ,
 Zingiberis,
 Radicum quinquefolij ana ꝓ vj.
 Polij montani,

Cha

Chamæpytyos,
Styracis,
Meu,
Amomi,
Nardi celticæ,
Terræ lemniæ,
Phu,
Chamædryos,
Folij,
Chalcitidis tostæ,
Gentianæ,
Anisi,
Succi hypocistidis,
Carpobalsami,
Gummi,
Seminis fœniculi,
Cardamomi,
Sefeli,
Acaciæ,
Thlaspi,
Hyperici,
Ammi,
Sagapeni ana ʒ iiij.
Caltorij,
Aristolochiæ tenuis,
Dauci,
Bituminis iudaici,
Opopanacis,
Centaurij minoris,

℞ 3

Galbani

Galbani ana ꝑ ij.

Mellis despumati ꝑ x.

Vini optimi odorati q. satis est.

Galenus ætate plus aromatum admiscerant ad singulas libras mellis, & medicamentum solidius erat, quàm nunc fit. Iam enim sumunt mellis ꝑ xx.

Conficitur autem hoc modo secundum Galenum.

Herbæ, flores, fructus, semina, radices, cortices, trochisci, terra lenia, chalcitis, & bitumen, diligentissimè cõteruntur pistillo ferreo in mortario æneo, & cribro subtilissimo cribrantur, semine thlaspi, napi syuestris, & croco exceptis, quæ per se teruntur, vinòq; rigantur, ne mortario interiori inhæreant, & vt cõmodius cõterantur.

Gumi, succi, & castoriũ per se teruntur, adfuso vino, vt etiã cõmodi⁹ teri possint.

In ipso compositionis tẽpore, omniumque rerum mixtura, Primũ liquefit terebinthina in duplici vase cũ mellis pauculo, deinde etiã opopanax, galbanum, sagapenum, bene antea per se trita adfuso pauculo melle, vt facilius digitis explanentur, commisceanturque atque vniantur: Postea coquantur in ipso duplici vase cũ terebinthina, donec ad iustam consistentiam redacta sint, his admiscetur pars aliqua

quã cõrritorum, tum etiam in vino dis-
 lutorum, donec mellis cõsistentiam con-
 sequãtur, deinde in mortarium vastę ma-
 gnitudinis effunduntur in hunc modum.
 Primũ, pars aliqua eorum quę vino disso-
 luta sunt, & ad eam formã redacta: dein-
 de mellis nonnihil cocti per se & despu-
 mati: postremò, pars aliqua eorũ quę in
 puluerem redacta fuerant: ad hæc nonni-
 hil eorum quę liquefacta in duplici vase,
 eãq; tepida: Hęc omnia probè agitentur
 rudicula, & sic cõsequenter de residuo fa-
 ciendum, donec omnia probè vnita sint,
 & hæc quidem ad Solem, vt facilius fiat,
 continuo agitando, & tundendo pila fer-
 rea inuncta opobalsamo, vt facilius agita-
 ri possint, & commisceatur etiã opobalsa-
 mum reliquis: alioqui facilè adhæreret pi-
 stillo medicamentum, & difficilior fieret
 agitatio: Hęc continuè per quatuor aut
 quinque dies agitanda sunt, & rursus cla-
 ppsis sex aut septem diebus iteranda agita-
 tio per duos menses: deinde reponitur me-
 dicamentum vasculis plumbeis, aut ter-
 reis bene coctis & vitratis.

Chalcitis quę in hoc medicamẽ venit,
 sic præparãda est: Illus bona quãtitas in
 olla cruda, succẽsis carbonibus coquitur,
 eãq; liquefacta vbi bullas emiseric, partẽ

Q 4 supern

supernam in marmor effundes, atq; illic
fines in vmbra donec frigeat. Hinc postea
solúmodo capies quod supernè spumeū
fuerit, quódque cinerei est coloris, aut
prassij, non quod flauum est, theriacam
enim colore flauo non nigro inficeret.

Hic autem animaduertendum est, omnes
theriacæ compositiones quæ apud
Galenum variis locis reperiuntur, & di-
uerforum Authorum, recipere insuper

Acori ʒ iiij.

Piperis albi ʒ vj.

*Exitialibus venenis, & ferarum virus
eiaculantium ictibus aduersatur. Inuete-
ratis capitis doloribus, vertigini, aurium
grauitati, comitialibus, attonitis, appo-
plecticis, resolutis, oculorū hebetudi-
nis, voci amissæ, asthmaticis, recēti & ve-
rustæ tussi, sanguinē reiicientibus, agrè
excreantibus, & non nisi recta ceruice spi-
rantibus, ventriculi imbecillitatibus ac
inflationibus, colicis cruciatibus, ileosis,
cholericis, cæliacis, regio morbo corre-
ptis opitulatur. Induratum lienem lique-
facit, calculos in renibus cōminuit, vri-
næ difficultati & vesicæ exulcerationibus
medetur. Febriū horroribus & rigoribus,
hydropicis, elephātia laborantibus sæpe
præsenti est auxilio. Menstrua cit, foetum
mort

mortuum excutit, articulorum doloribus adiumento est. Non autem corpus modò, sed & animi morbos persanat. Melancholicis itaque, lymphaticis, aquæ pauoribus, & id genus aliis malis iugiter data succurrit. Ceterùm in pestifera luç vix aliud præsentius magisq̃ idoneum præfidium hac ipsa inueniri potest.

Theriaca dia tessaron Mesuæ.

R̃. Gentianæ,
Baccarum lauri,
Myrrhæ,
Aristolochiæ rot. ana ʒ ij.
Mellis despumati q. s.
Coquantur vt artis est.

* Ad affectus frigidos, tum cerebri, vt epilepsiam, paralyfin, spasmus cynicum, id est, oris torturam: tum ventriculi, vt inflationem, & ab eo dolorem, tardam coctionem: tum denique hepatis, vt hydropem cachexiam, obstructionem: præterea morsui scorpionis, & potioni veneni confert.

Mithridatium Andromachi secundum Galenum.

R̃. Glycyrrhizæ ʒ viij. ʒ ß.
Opij ʒ iiii. ʒ j.
Felij,
Q s Nardi

Nardi celticæ,
 Seminis fœniculi,
 Gentianæ,
 Meu,
 Rosarum siccarum,
 Cardamomi ana ʒ iiij.
 Castorij,
 Thuris,
 Myrrhæ,
 Succu hypocistidis ana ʒ vj.
 Polij,
 Costi,
 Sefeli,
 Casiæ ana ʒ v. ʒ j.
 Nardi indicæ,
 Scordij,
 Cyphi,
 Schœnanthi,
 Opopanacis,
 Terebinthinæ ana ʒ vj. ʒ j.
 Acori,
 Phu,
 Hyperici,
 Acaciæ,
 Gummi,
 Carpobalsami,
 Sagapeni ana ʒ ij.
 Croci,
 Cinnamomi,

Zingib

Zingiberis ana ʒ vij. ʒ j.
 Styracis ʒ v. ʒ ij.
 Dauci ʒ vj. ʒ β.
 Petroselini ʒ iiij. β.
 Piperis longi ʒ iiij. β.
 Anisi ʒ iiij.

Thlaspi,
 Opobalsami ana ʒ vj. ʒ ij.

Galbani ʒ vij.

Scinci ʒ ij. ʒ j.

Vini optimi quod satis est,

Mellis despumati q. s.

Compone in modum theriacæ.

*Ad eadē quæ theriace valet, & ad ple-
 raq; pernicioſa medicamenta & venena
 eſt efficacior: in viperæ autē morſus cura
 tione, theriaca inferior. Præſertim verò fa-
 cit ad diuturnas ventriculi & thoracis
 fluxiones, & ad omnes inueteratas in pro-
 fundo corporis exulcerationes & abſceſ-
 ſus. Tabidis ventrisq; inflationibus mede-
 tur, appetentiam emendat & reſtituit, ac
 bonum corpori colorem conciliat. Calcu-
 los conterit, ac vrinæ difficultatem ſanat,
 Acuit viſum eorum qui illo crebrius vtū-
 tur. Mortuum fœtum eiicit, & ad mulie-
 bria omnis generis mala frigida, atque
 iis quæ non concipiunt conducit. Item
 melancholiam non ſinit conſiſtere.

Omne

Omne denique capitis malum ex frigiditate ortum, dolores aurium, lachryman-tes oculos, dentium cruciatus, oris, palati, auriumque omnia vitia, emplastri forma imposita, sanat.

Mithridaticus Damocratis.

R̄. myrrhæ.

| | |
|------------------|--------------------|
| Croci, | Agarici, |
| Zingiberis, | Cinnamomi, |
| Nardi indicæ, | Thuris electi, |
| Thlaspi ana ʒ x. | Seseli. |
| Oprobalsami, | Schœnanthi, |
| Stœchadis, | Terebinthinæ, |
| Chalbani, | Costi, |
| Piperis longi, | Castorij, |
| Hypocistidis, | Styracis, |
| Opopanacis, | Folij ana ʒ viij. |
| Casix, | Polij montani, |
| Piperis albi, | Scordij, |
| Seminis dauci, | Carpobalsami, |
| Cyphi, | Bdellij ana ʒ vij. |
| Nardi celticæ, | Gummi, |
| Petroselini, | Opij, |
| Cardamomi, | Seminis fœniculi, |
| Gentianæ, | Rosarum, |
| Dictamni cretici | ana ʒ v. |
| Anisi, | Ari, |
| Acori, | Phu, |

Sagap

Sagapeni ana ʒ iij.
 Meu,
 Acaciæ,
 Scinchi,
 Seminis hyperici ana ʒ ij. ʒ.
 Vini q. f.
 Mellis despumati q. f.
 Confice secundum artem.

Diarceuthidon Damocratis ex Galeno.

℞. Baccarum iuniperi ʒ iiij.
 Terræ lemnix ʒ ij.
 Trita excipiantur
 Olei dulcis quantitate sufficienti.
 Alij butyrum recens loco olei sumunt.

* Accipientem tutum à venenis reddit:
 nam si venenum non subsit quæta manet:
 sint adsit, nauseam concitat, & euomere
 cogit, ita vt venenum quoque cum anti-
 doto reiiciatur.

*Ambrosia Archibij, ex Gale-
 no desumpta.*

℞. Anisi,
 Seminis apij ana ʒ iiij.
 Myrrhæ,
 Opopanacis ana ʒ j.
 Cinnamomi,
 Seminis loti amari,
 Casix,
 Spicæ indicæ ana ʒ ij.

Croci,

Crocī ʒ ij. β.

Piperis ʒ β.

Opij ʒ iiij.

Mellis despumati q. f.

Confice secundum artem.

*Ad omnes internas affectiones utilis est pora: ad intestinorū tormina quidem ex vini myrtini, & aquæ quarta heminae parte: ad hepar autem ex aquæ mulsæ hemina dimidia. Item ad vigiliæ, ophthalmiam, & lateris morbum ex aqua mulsæ: ad stomachi demum vitia, ex vini granatorum cyathis duobus, & aquæ totidem.

Athanasia Mithridatis ex Galeno.

R. Piperis albi ʒ xl.

Costi,

Mei,

Acori,

Agarici,

Scordi,

Dauci,

Perroselini ana ʒ iiij.

Crocī,

Myrrhæ ana ʒ viij.

Cinnamomi,

Cassæ,

Schœnanthi ana ʒ xij.

Mellis q. f.

Compone vt artis est.

Facit

*Facit ad venena, & omnium venenatorum morsus, quibusque cibis in ventriculo acescit, anguinemque reiciunt: antiquas insuper tussis, hepatis, lienis, vesicæ & vteri morbos sanat.

Athanasia Nicolai.

℞. Cinnamomi,
 Casiæ ana ʒ iij. ʒ v.
 Croci,
 Schœnathi,
 Styracis calamitæ,
 Phu,
 Sefeli,
 Hyoscyami,
 Betonicæ,
 Apij,
 Dauci,
 Anisi,
 Opij ana ʒ j. β. ʒ iij.
 Nardi indicæ,
 Folij,
 Castorij,
 Myrrhæ,
 Lapidis hæmatitis,
 Carabe,
 Sanguinis draconis,
 Coralli rubri,
 Costi,
 Boli armeni,
 Mummię

Mummia,
 Consolida maioris,
 Terræ sigillatæ,
 Acori,
 Asari,
 Corticum mandragoræ,
 Polij montani,
 Pulegij,
 Baccarum lauri,
 Mei,
 Piperis albi,
 Piperis longi,
 Petroselini ana ʒ β.
 Mellis q. s.
 Confice vt artis est.

*Dysenteria laborantibus & cœliacis
 confert, atq; ad fluxum muliebrem utilis
 est. Facit ad profluuiū sanguinis narium,
 & eos qui cibum nō retinent in ventricu
 lo. Sanguinis præterea à quacunq; cau-
 sa natis reiectionibus auxiliatur.

Paulina ex Galeno.

R̄. Cinnamomi,
 Costi, Piperis nigri,
 Galbani, Piperis longi,
 Castorij, Styracis ana ʒ j.
 Opij, Mellis q. s.
 Tunduntur quæ tundēda sunt, & cribran-
 tur per angustissimum cribrum, galba-
 num

num in melle dissoluitur, & factum electarium in consistenti forma reponitur in pyxidem vitream aut argenteam.

*Facit hæmoptoicis, tussitibus, phthisicis, peripneumonicis, ad cōuulsa, rupta, stomachi subuersionem, bilem vomētes, ac secernentes, cœliacos, dysentericos, ad affectiones circa vesicam, suffocationes vteri, febres per circuitum repetentes, hora vna ante exacerbationem exhibita, facit in malum habitum delapsis, cibū non sentientibus, ac pharmaca lethalia & plagas venenum iaculantium bestiarum.

Philonis Tharsensis Antidotus ex Galeno, similis ei quam Mesues describit.

R̄. Croci ʒ. v.
 Pyrethri,
 Euphorbij,
 Nardi indicæ ana ʒ. j.
 Piperis albi,
 Seminis hyoscyami ana ʒ. ii.
 Opij ʒ. x.
 Mellis q. s.
 Confice secundum artem.

*Expertissima ad sedandos vehemētes & lethales partium dolores, ventriculi, colli, hypochondriorum, hepatis, lienis, renum, vteri, excitatos à crudis humoribus

R aut

aut flatu crasso, aut ambrorum causa in-
temperie frigida: valet etiam ad suffoca-
tionis periculum, singultum vehementē,
& vrinæ difficultatem.

Philonium Romanum Nicolai.

Rz. Piperis albi,
Seminis hyoscyami ana ʒ v.
Opij ʒ ij. β.
Casia ʒ j. β.
Seminis apij ʒ j.
Petrofelini,
Seminis fœniculi,
Dauci ana ʒ ij. Ḅ. v.
Crocī ʒ β.
Nardi indicæ,
Pyrethri,
Zedoariæ ana Ḅ xv.
Cinnamomi ʒ j. β.
Euphorbij,
Costi ana ʒ j.
Mellis despumati q. s.
Confice &c.

*Idem quod præcedens potest;

Philonium Persicum Mesua.

Rz. Piperis albi,
Hyoscyami ana ʒ xx.
Opij,
Terræ lemnia ana ʒ x.
Lapidis hæmatitis,

Crocī

Croci ana ʒ v.
 Castorij,
 Nardi indicæ,
 Euphorbij,
 Pyrethri,
 Margaritarum,
 Carabe,
 Doronici,
 Zedoariæ,
 Trochiscorum ramich ana ʒ j.
 Camphoræ ʒ j.
 Mellis q.s.

* Ad sanguinem vndecunque manantem confert: quapropter menses immodicè erumpentes, hæmorrhoidas, & cruentas excretiones per inferna: itémque sanguinis sputum compescit, ac foetum in vtero retinet.

Tryphera magna Nicolai.

Rʒ. Opij ʒ ij.
 Cinnamomi,
 Caryophyllorum,
 Galangæ,
 Nardi indicæ,
 Zedoariæ,
 Zingiberis,
 Costi,
 Styracis calamitæ,
 Calami aromatici,

R 2 Calam

Calaminthæ,
 Iridis,
 Peucedani,
 Acori,
 Corticum mandragoræ,
 Nardi celticæ,
 Rosarum rubrarum,
 Piperis,
 Anisi,
 Apij,
 Petroselinj,
 Fœniculi,
 Dauci,
 Hyoscyami,
 Cymini,
 Seminis ocymi ana ʒ j.
 Mellis despumati q. s.

* Auxiliatur dolori stomachi ex frigiditate, sumpta namq; statim sudorẽ provocat, phreneticis, mulieribus ex vteri dolore insomnibus, rheumaticis, peripneumoniacis, & qui excrementa cum sanguine excernunt vtilissima est.

Requies Nicolai.

R̄. Rosarum rubrarum,
 Violarum ana ʒ iij.
 Opij,
 Hyoscyami,
 Papaueris albi,

Pap

Papaueris nigri,
 Corticis mandragoræ,
 Seminum scariolæ,
 Lactucæ,
 Portulacæ,
 Pfyllij,

Nucis moschatæ,
 Cinnamomi,
 Sacchari ana ʒ j. β.
 Santali albi,

Rubri, Citrini,
 Spodij,
 Tragacanthæ ana ʒ ij. Ḡ. v.
 Mellis despumati q. f.

Confice secundum artem electarium.
 *Ad febres cōtinuas & ardentis, omnem-
 que febrilem affectum, ad febres deniq;
 acutas confert. Est autem vtilis tempori-
 bus & pulsibus manuum inuncta, ac cor-
 dis dolorem mitigat, somnūmq; cōciliat.

Sotera Pauli.

R̄. Nardi indicæ,
 Castorij ana ʒ xxxix.
 Myrrhæ ʒ xxvij.
 Croci ʒ xxxvij.
 Opij,
 Schœnanthi ana ʒ xxxvij.
 Petroselini ʒ xlv.
 Anisi ʒ ix.

R ʒ Δpij

| | | | |
|----------------|--------|-----------|----------|
| Apij | ℥ vii. | Calix | ℥ xix. |
| Piperis longi, | | Amomi, | |
| Seseli ana | ℥ xij. | Sifonis | ℥ vii. |
| Stryracis, | | Hedycroi, | |
| Costi, | | Asari ana | ℥ xviii. |
| Mellis q. s. | | | |

PVLVERES.

Sectio sexta.

Puluis aduersus flatu magistralis.

R Ecip. Coriandri præparati,
 Anisi purgati ana ℥ ij.
 Sacchari optimi ℥ iiij.
 Cinnamomi ℥ ij.
 Caryophyllorum ℥ ij.
 Macis ℥ β.
 Fiat puluis tenuissimus.

Alius ad idem magistralis.

Rz. Cinnamomi electi ℥ j.
 Zingiberis ℥ β.
 Cymini,
 Piperis,
 Galangæ,
 Caryophyllorum ana ℥ ij.
 Sacchari optimi ℥ j.
 Fiat puluis tenuissimus.

Alius

Alius similis magistralis.

Rz. Cinnamomi ʒ j. β.
 Zingiberis ʒ j.
 Macis ʒ β.
 Nucis moschatae Ḡ viij.
 Sacchari albi ʒ ij.
 Fiat puluis tenuissimus.

Puluis Senæ preparatæ, Montagnana.

Rz. Foliorum senæ ʒ j. β.
 Zingiberis.
 Macis ana ʒ iij.
 Cinnamomi,
 Tartari ana ʒ j. β.
 Terantur tenuissime.

Purgat caput mirabiliter.

Puluis è turbith magistralis.

Rz. Turbith boni ʒ j.
 Zingiberis albi ʒ ij.
 Hermodactylorum ʒ β.
 Sacchari albi ʒ β. Fiat puluis.

Alius Auicenna.

Rz. Zingiberis albi,
 Mastiches electæ,
 Turbith electi ana ʒ x.
 Sacchari albi ʒ xxx.
 Trita misceantur.

*Purgant humores phlegmaticos, datur pueris, mulieribus, senibus, & humidis, delicatis, & ociosis.

R 4 Puluis

Puluis laxatiuus magistralis.

℞. Turbith \mathfrak{z} j.
 Zingiberis,
 Cinnamomi,
 Mastiches,
 Galangæ,
 Cardamomi,
 Caryophyllorum,
 Anisi,
 Hermodactylorum,
 Scammonij præparati, ana \mathfrak{z} β.
 Foliorum senæ \mathfrak{z} ij.
 Sacchari albi \mathfrak{z} iiij.

Terantur omnia & commisceantur.

*Purgat choleram, pituitam & melancholiam.

*Puluis ad suppositoria communia
magistralis.*

℞. Aloës, Salis gemmæ,
 Cymini, Rutæ ana \mathfrak{z} j.
 Terantur & fiat glans cum
 Mellis q. s.

Alius acutior.

℞. Aloës,
 Hellebori nigri,
 Centaurij,
 Cymini,
 Rutæ ana \mathfrak{z} ij.
 Fiat puluis vt supra.

Alius,

Alius, & sedans dolorem.

R̄. Cymini, Castorij,
Rutæ, Opij ana ʒ j.

Fiat puluis qui melle excipiat.

Puluis capitalis calidus Magistralis.

R̄. Stœchadis,
Nucis moschatæ,
Betonicæ,
Radicum betonicæ,
Seseleos,
Maioranæ,
Ligni aloës,
Caryophyllorum ana ʒ j.

Mofchi,
Ambræ ana ʒ ij.

Fiat puluis.

Puluis capitalis temperatus.

R̄. Rosarum,
Santali albi,
Labruscæ,
Betonicæ,
Stœchadis,
Radicum præoniæ,
Saluiæ,
Maioranæ,
Caryophyllorum, Sandaracæ ana ʒ j.
Terantur tenuissimè.

Puluis ad dentifricia.

R̄. Cornu ceruini vsti,

Pun

Punicis,
 Tutia præparata,
 Cinnamomi,
 Sideritidis tostæ ana ʒ j.
 Moschi, ʒ vj.
 Misce fiat puluis.

Puluis pro epithemate cordis refrigerans.

Rʒ. Santali albi,
 Rubri, Citrini ana ʒ β.
 Been albi, Rubri,
 Serici grano tinctorio infecti,
 Ossis e corde cerui ana ʒ j.
 Sericum minutim incidatur, reliqua per
 se terantur, misce, conferua in pixide vi-
 trea.

Alius exalfaciens.

Rʒ. Santali albi,
 Rubri, Citrini ana ʒ ij.
 Been albi,
 Rubri,
 Serici grano tinctorio infecti,
 Ossis de corde cerui ana ʒ j.
 Croci,
 Cinnamomi,
 Caryophyllorum,
 Ligni aloës ana ʒ β.
 Ambre,
 Moschi ana ʒ j.
 Confice vt supra.

Alius

Alius temperatus.

Rz. Rosarum rubrarum,
 Coralli rubri,
 Corticum citri,
 Ossis de corde cerui,
 Seri grano tinctorum infecti ana ʒ j.
 Santali albi, rubri, citrini ana ʒ β.
 Croci,
 Caryophyllorum,
 Cinnamomi,
 Lignialoës ana ʒ j.
 Ambræ ʒ β.
 Camphoræ ʒ ij.
 Terantur vt suprâ.

Species pro Epithemate hepatis refrigerantes.

Rz. Santali albi, rubri, citrini ana ʒ β.
 Rosarum, Coralli,
 Spodij ana ʒ j.
 Camphoræ ʒ j.
 Terantur vt suprâ.

Alia excafacientes.

Rz. Rosarum,
 Santali albi, rubri,
 Absinthij,
 Schœnanthi,
 Spodij, Nardi indicæ,
 Cinnamomi ana ʒ β.
 Moschi ʒ j. Fiat puluis tenuis,
 Puluis

Puluis aduersus Pestem Magistralis.

Rz. Dictamni Cretensis, Boli,
 Coralli albi Gentianæ ana ʒ j.
 Tormentillæ, Terræ lemnix ʒ β.
 Fiat puluis tenuis.

Alius.

Rz. Radicum tormentillæ,
 Santali citrini,
 Terræ lemnix,
 Sacchari albi ana ʒ ij.
 Santali rubri,
 Dictamni cretensis,
 Cornu ceruini vsti,
 Margaritarum,
 Rosarum rubrarum,
 Boli,
 Aristolochiæ rotundæ,
 Pimpinellæ,
 Myrtha,
 Zedoariæ ana ʒ j.
 Camphoræ,
 Seminum citri,
 Croci,
 Hyacinthi ana ʒ β.
 Fiat puluis tenuis.

*Puluis contra scabiem
 communis.*

Rz. Sulphuris flauī,
 Cymini,

Bacc

Baccarum lauri,
 Staphidis agricæ ana ʒ j.
 Fiat puluis qui oleo rosato excipiatur.

Alius Nicolai, efficacior.

℞. Lythargyri,
 Hellebori nigri ana ʒ j.
 Sulphuris,
 Nitri,
 Maioranæ ana ʒ ij.
 Trita in puluerem excipiantur, &c.

Puluis cephalicus Lucij ex Galeno.

℞. Iridis ʒ iiij.
 Aristolochiæ rotundæ,
 Pollinis thuris ana ʒ ij.
 Corticis radicum panacis ʒ iiij.
 Fiat puluis.

*Vtilis est etiam ad nomas.

Alius ex Galeno.

℞. Iridis,
 Aristolochiæ rot.
 Erui,
 Pollinis thuris ana ʒ j.
 Reducantur in puluerem tenuem. Non-
 nulli addunt radices panacis & cadmiam
 lotam.

Alius Xenocrati ex Galeno.

℞. Farinæ erui, xorobi ʒ viij.
 Iridis ʒ i.
 Thuris clari,

Aristo-

Aristolochiæ rot.

Squamæ aris ana ʒ v.

Terantur vt suprâ.

Alius Tryphonis.

R̄. Corticis piceæ,

Squamæ aris,

Punicis combusti ana ʒ vj.

Thuris,

Iridis,

Aristolochiæ rot.

Resinæ pini frictæ ana ʒ iiij.

Aloës,

Myrrhæ ana ʒ ij.

Conterantur in puluerem vt suprâ.

*Aufert squamas ostium.

Puluis constringens Galeni.

R̄. Aloës,

Mannæ thuris,

Corticis pini,

Terræ lemnix,

Boli armeni,

Lapidis hæmatidis,

Hypocistidis,

Croci,

Gallæ omphacitidis ana ʒ j.

Fiat puluis.

Puluis emplasticus eiusdem, & sanguinem sistens.

R̄. Resinæ frictæ,

Pollinis farinæ triticeæ,

Crypsi ana ʒ iiij.

Fiat puluis.

Alius

Alius eiusdem ad omnem hemorrhagiam.

Rz. Thuris ʒ j.

Aloës ʒ β.

Fiat puluis, qui cum oui albumine subactis ad mellis crassitiem pilis mollissimis leporis excipietur.

Puluis incarnans, & sanguinem restringens, Ioannis de Vigo.

Rz. Aloës,

Myrrhæ ana ʒ j.

Sarcocollæ ʒ j. β.

Thuris,

Pollinis farinae ana ʒ ij.

Sanguinis draconis,

Terræ lemnix ana ʒ ij. β.

Tutix,

Lytargiri,

Tragacanthæ ana ʒ j.

Fiat puluis tenuis.

*Puluis causticus sanguinem compri-
mens Galeni.*

Rz. Chalcitidis ʒ c.

Chalcanthi ʒ l.

Misyos torrefacti ʒ xxv.

Aeris vsti ʒ xij. β.

Fiat puluis.

Alius eiusdem.

Rz. Chartæ combustæ,

Plumbi vsti, Aeris vsti,

Arse

Arfenici,
 Squamæ ferri ana ℥ j.
 Sulphuris viui ℥ β.
 Fiat puluis.

Præcipitatum Ioannis de rico.

Rz. Salis nitri ℔ j. β.
 Vitrioli Romani,
 Aluminis ana ℔ j.
 Ex his per alembicum destillatis (quo fortius autem, eò melius) sumes ℔ j.
 Argenti viui ℔ j.

In vas vitreum pone cum capello bene lutato, sic etiam recipiens lutabis, ne eua-
 poret, & destillabis eousque, donec vas ru-
 bescat: aquam sepones, & fracto vase ar-
 gentum quod superest vltum erit, quod
 chymistæ præcipitatum vocant, hoc ten-
 uissimè terito in marmore, & cum aqua
 destillata quam seposueras rursus vasi vi-
 treo imponito, atque destilla donec aqua
 destillata sit: tum confracto vase, argen-
 tum quod superest, denuo teres in tabula
 marmorea, & ipsum in æneo vase repones,
 suppositoque igni valido, cum æneo
 baculo misce ac agita, per horæ ac dimi-
 diæ spatium: hoc enim pacto puluis me-
 lior efficitur, & ritè factus ipsum mi-
 nium coloris elegantia superat.

CATA

CATAPOTIA, SIVE

PILULAE.

Sectio septima.

Pilula bechica Mesua.

Recip. Succiglycyrrhizæ,
Sacchari albi ana ʒ x.

Amyli,

Tragacanthæ,

Amygdalarum dulcium ana ʒ ij. ʒ.

Muccaginis feminis cydoniorum q. f.

Tere fiant pilulæ.

*Ad tussim veterem & siccam, guttu-
risque & faucium asperitatem pollent.

Pilula bechica Rasis.

℞. Amyli,

Tragacanthæ,

Amygdalarum purgatarum,

Fabarum decorticatarum,

Seminis papaueris,

Capitum papaueris,

Gummi arabici,

Boli armeni ana ʒ ij.

Muccaginis psyllij q. f.

Pilula bechica alba magistrates.

℞. Sacchari candi,

Amyli ana ʒ vj.

S

Peni

Penidiorum ζ iij.
 Tragacanthæ ζ ij.
 Tragacantha dissoluatur in aqua rosacea
 per diem, & fiant pilulæ.

Pilula bechica emplastica Galeni.

Rz. Gummi,
 Tragacanthæ ana ζ β .
 Succiglycyrrhizæ ζ j.
 Sapæ q. f.
 Fiant pilulæ.

Pilula bechica cum terebinthina Galeni.

Rz. Piperis,
 Casiæ,
 Cinnamomi ana ζ ij.
 Galbani,
 Terebinthinæ ana ζ j.
 Mellis despumati q. f.
 Fiant pilulæ.

Pilula communes.

Rz. Aloës ζ j.
 Myrihæ,
 Croci ana ζ β .
 Vini albi q. f.
 Fiant pilulæ. aliis croci ζ ij. satis esse
 videntur.

*Mirificè aduersus pestiferæ luis con-
 tagia populatim grassantia pollent. Hu-
 mores etiã ventriculo immerfos educūt.

Pilulæ

Pilula contra pestem Magistrales.

℞. Myrrhæ,

Croci,

Boli armeni,

Coralli rubri,

Charabe ana ʒ ij.

Myrobalanorum cepularum ʒ ij.

Aloës ʒ viij.

Vini albi q. s.

Fiat massa.

Pilula de Hiera simplici Galeni.

℞. Specierum de hiera simpl. Gal. ʒ. ij.

Mellis rosati colati q. s.

Fiat massa.

*Aduersus vitia ventriculi ex humoribus biliosis & pituitosis nata profunt.

Pilula de Hiera cum Agarico.

℞. Specierum de hiera simpl. Gal.

Agarici trochiscati ana ʒ iij.

Aloës ʒ ij.

Mellis rosati colati q. s.

Fiant pilulæ.

*Auxiliantur stomachicis, asthmaticis, & aliis stomachi & thoracis vitiis à crassis & pituitosis humoribus natis.

*Pilula de Hiera cum Agarico Magistri**Antonij de Scarperia.*

℞. Cinnamomi,

Nardi indicæ,

Croci,

S 2

Schœ

Schœnanthi, Afari,
 Mastichis, Casiæ,
 Xylobalsami, Carpobalsami,
 Violarum, Epithymi,
 Colocynthidis ana ʒ j.

Agarici,
 Turbith ana ʒ ij.

Rhabarbari,
 Scammonij præparati, ana ʒ iiij.
 Confice cum vino albo & theriaca.

*Opem ferunt vitiis capitis neruo-
 rumque, & stomachi cruditatibus.

Pilula ad matricem Auicenna.

R̄. Doronici,
 Zedoariæ,
 Nucis moschatæ,
 Castorij ana ʒ j.

Seminis apij,
 Anethi,
 Margaritarum ana ʒ iiij.
 Hyoscyami ʒ iiij.

Fiant pilulæ cum aquæ arthemisæ q. ʒ.

Pilula Galeni, similes Alephangini.

R̄. Cinnamomi,
 Calami aromatici,
 Casiæ,
 Xylobalsami,
 Schœnanthi,
 Dactylorum ana ʒ j.

Trice

Trita omnia, macerentur in aquæ pluuiæ
sufficienti quantitate in olla noua, deinde
excoquantur ad medias, Cola & colaturæ
impono aloës sæpius lotæ in aqua plu-
uia, & puluerisatæ ℞ j.

Permisceantur, & insolētur per dies cani-
culæ, donec exsiccata sint, deinde addita.

Croci, Mastichis ana ℥ j.

Myrrhæ, Misce, fiant pilulæ.

*Idem præstant quod subsequentes.

Pilula Stephangina Mesue.

℞. Cinnamomi,

Cubebæ,

Ligni aloës,

Calami aromatici,

Macis,

Nucis moschatæ,

Cardamomi,

Caryophyllorum,

Asari,

Mastichis,

Schœnanthi,

Nardi indicæ,

Carpobalsami ana ℥ j.

Abinthij,

Rosarum rubrarum ana ℥ v.

Terantur crassius, & in libris duodecim
aquæ communis per diem macerata, co-
quantur ad dimidij consumptionem,

S 3 deinde

deinde fricentur & colentur, & in collaturæ ℥ ij. iniice

Aloës sapius lotæ secundum artem, & in puluerem redactæ ℥ j.

Insolabis donec siccentur sapius agitando, & addes

Myrrhæ,

Mastiches ana ʒ v.

Croci ʒ iij.

Tere curiosè, prædicti decocti reliquum ipsis affunde, agita in Sole, donec siccentur, & in iustam crassitiem reducantur, vt fieri possint pilulæ secundum artem.

Confici debent hæ pilulæ mense Iunio aut Iulio.

*Ventriculum, cerebrum, & sensoria humoribus crassis, putribus, puitosis purgant, & inde natum dolorem dissipant, ventriculum roborant, & concoctionem eius iuuant.

Pilulæ de tribus.

℞. Rhabarbari,

Agarici,

Aloës lotæ ana ʒ ij. β.

Fiant pilulæ cum syrupo rosato.

Pilulæ ex Rhabarbaro Mesua.

℞. Rhabarbari electi ʒ iij.

Succi glycyrrhizæ, Absinthij,

Mastiches ana ʒ j.

Myro

Myrobalanorum flauarum ʒ ij. β.
 Seminis apij, ʒ β.
 Fœniculi ana ʒ β.
 Trochiscorum diarhodon ʒ iij. β.
 Specierum hieræ simplicis ʒ x.
 Aquæ fœniculi q. f.
 Fiant pilulæ.

*In febribus diuturnis, iecinoris ob-
 structionibus, & aquæ inter cutem initiis
 conferunt.

Pilule Mastichina Conciliatori.

Rz. Mastiches ʒ iij.
 Agarici ʒ iij.
 Aloës ʒ x.
 Agaricum elimatum aut erasum mace-
 ratur in oxymelite, fiuntque pilulæ.

*Ventriculum, cerebrum, viscera reli-
 qua, oculos, vterum putribus humoribus
 purgant & roborant.

Pilula Assaeret Auicenna ex Gentile.

Rz. pulueris hieræ picræ Gal. ʒ ij.
 Mastiches, ʒ ij.
 Myrobalanorum ana ʒ j.
 Aloës ʒ iij.
 Succij aut aquæ maioranæ q. f.
 Fiant pilulæ.

*Bilem flauam & pituitam vacuant.

Pilula ex fumaris Auicenna.

Rz. Myrobalanorum flauarum,

S 4 Cep

Cepularum,
 Indarum ana ꝑ v.
 Aloës ꝑ vij.
 Scammonij præparati ꝑ v.
 Succi fumarix q. s.
 Omnia in puluerem redacta compræhen-
 de succo, & siccati finito: rursus trita suc-
 co excipiantur, siccantur: & sic tertium. &
 in pilulas formentur.

*Soluunt humores acres, biliosos, pi-
 tuitam salsam, & alios adustos, à quibus
 pruritus & scabies.

Pilula ex Agarico Mesua.

℞. Agarici ꝑ iij.
 Mastiches, Iridis,
 Marrubij ana ꝑ j.
 Turbith ꝑ v.
 Specierum hieræ picræ, ꝑ iiij.
 Myrrhæ ꝑ j.
 Colocynthidis,
 Sarcocollæ ana ꝑ ij.
 Agaricum lima in puluerē regiditur: reli-
 qua contunduntur, sūntque pilulæ cum
 Sapæ sufficienti quantitate.
 Colocynthidis loco, satius erit trochiscos
 alhandal sumere.

*Auxiliantur asthmaticis, & aliis tho-
 racis vitiiis à crassis & pituitosis humori-
 bus natis.

Pilul

Pilula Aggregativa Mesua.

℞. Myrobalanorum flauarum,
 Rhabarbari ana ʒ β.
 Succu eupatorij,
 Absinthij ana ʒ iij.
 Scammonij præparati ʒ vj.
 Myrobalanorum cepularum,
 Indarum,
 Agarici,
 Colocynthidis,
 Polipodij ana ʒ ii.
 Turbith,
 Aloës ana ʒ vj.
 Mastiches,
 Rosarum rubrarum,
 Salis gemmæ,
 Epithymi,
 Anisi,
 Zingiberis ana ʒ ij.
 Craffiufculè omnia conterantur, & fiant
 pilulæ cum
 Electuarij rosati Mesuæ q. ʒ.

*Valèt ad diuturnas febres, & vitia ca-
 pitis, ventriculi, & iecinoris. Humores itè
 biliosos, & pituitosos educunt.

Pilula sine quibus Nicolai.

℞. Aloës lotæ ʒ xiiij.
 Myrobalanorum flauarum,
 Cepularum,
 S ʒ Indaru

Indarum,
 Bellericarum,
 Emblicarum,
 Rhabarbari,
 Mastiches,
 Absinthij,
 Rosarum,
 Violarum,
 Senæ, Agarici,
 Cuscuthæ ana ʒ j.
 Scammonij præparati ʒ vj. β. ʒ.
 Macerato scammonio in succi fœniculi
 q. s.

Infusionem, panno lineo colligatam fortiter exprime manibus oleo violato inunctis, & cum expressione Fiat massa.

*Mirificè pituitam, bilem & humorem melancholicum purgant, & ad suffusiones, oculorumque claritatem conducunt, visum conseruantes: aurium dolorem sanant, & ileosis conferunt.

Pilulæ Lucis minores Mesuæ.

R̄. xylobassami,
 Carpobassami ana ʒ j.
 Radicum chelidoniæ ʒ v.
 Rosarum,
 Violarum,
 Absinthij,
 Euphrasiæ ana ʒ ii.
 Senæ,

Senæ,
 Epithymi,
 Myrobalanorum flauarum,
 Cepularum,
 Indarum,
 Bellericarum,
 Emblicarum,
 Agarici,
 Scœnanthi,
 Lycij,
 Lapidis lazuli ana ꝑ ij. β.
 Aloës lotæ ꝑ vj.
 Succī fœniculi, aut chelidonix q. s.
 Fiat massa.

*Excrementa capitis pituitosa educūt,
 visumque roborant, Atram tamen bilem
 magis vacuant.

Pilule Aurea Nicolai.

R̄. Aloës,
 Scammonij præparati ana ꝑ v.
 Rosarum rubrarum,
 Seminis apij ana ꝑ ij. β.
 Seminis fœniculi,
 Anisi ana ꝑ j. β.
 Mastiches,
 Croci,
 Pulpæ colocynthidis, ana ꝑ j.
 Trita crassius excipiantur tragacantha
 macerata in aqua fœniculi.

Caput

*Caput expurgant, aciem oculorú exa-
cuunt, flatus ventriculi & intestinorum
dissolunt, ac citra molestiam aluam
deiciunt.

Pilula ex Turbith aurea Mesua.

Rz. aloës ʒ vij.

Mastiches,

Rosarum rubrarum ana ʒ vij.

Myrobalanorum flauarum ʒ x.

Croci ʒ iiij.

Turbith gummosi ʒ xvj.

Puluerentur & cum

Succi absinthij q. s. Fiat massa.

*Bilem & pituitam sine molestia pur-
gant: hepar & ventriculum roborant, co-
ctionem iuuant.

Pilula cochia Rhafis.

Rz. Specierum de hiera simplici ʒ x.

Pulpæ colocynthidis ʒ iiij. ʒ j.

Scammonij præparati ʒ ij. ʒ.

Turbith,

Stœchadis ana ʒ v.

Vini albi q. s. Fiat massa.

*Caput magna efficacia expurgant, ex
côq; ac neruis humores crassos euacuât.

Pilula ex Colocynthide Galeni.

Rz. Colocynthidis,

Succi absinthij ana ʒ ʒ.

Aloës,

Scam

Scammonij præparati ana ℥ j.

Rhabarbari electi ℥ iij.

Trita omnia succo excipiantur.

Addimus rhabarbarum.

*Pituitā à cerebro & aliis nervosis vacuāt: ob id cōferūt dolori capitis frigido.

Pilula Alhandal. Mesue.

℞. Trochiscorum alhandal ℥ xij.

Specierum de hiera simpl. ℥ vij.

Mastiches ℥ ij.

Salis gemmæ ℥ j. β.

Ladani ℥ j.

Ladanum, & mastiche inuncta oleo nucum tundantur pistillo calido in mortario æneo: deinde reliqua trita addantur, & fiant pilulæ.

*Ad cephalæam, & hemicraniā difficilem, & affectus neruorū, & iuncturarum.

Pilule de Hermodactylis Mesue.

℞. Hermodactylorum,

Myrobalanorum citrinarum,

Aloës,

Turbith,

Colocynthidis,

Bdellij,

Sagapeni ana ℥ vj.

Castorij,

Sarcocollæ,

Euphorbij,

Opopan

Opopanacis,
 Seminis rutæ,
 Seminis apij ana ʒ iij.
 Croci ʒ i β.
 Succi brassicæ q. s. Fiat massa.
 *Valent ad podagram, & dolores frigidos aliarum iuncturarum.

Pilula ex Turbith Mesua, Catapotia stomachica dicta.

Rz. Turbith gummosi ʒ x.
 Mastiches ʒ iij.
 Rosarum rubrarum ʒ iij.
 Aloës ʒ ij. ʒ j.
 Succi abunthij q. s. Fiat massa.
 *Materia pituitosam, putrem, & aquosam ex ventriculo & cerebro vacuant.

Pilula Indæ Mesua.

Rz. Myrobalanorum indarum,
 Hellebori nigri,
 Polypodij ana ʒ v.
 Epithymi,
 Stœchadis ana ʒ vj.
 Agarici,
 Lapidis lazuli lauati,
 Colocynthidis,
 Salis indi ana ʒ iij.
 Succi eupatorij,
 Nardi indicæ ana ʒ ij.
 Zingiberis ʒ j.

Specier

Specierum de hiera simp. \mathfrak{z} j. \mathfrak{z} iij.

Succi apij q. f. Fiat massa.

*Valent ad affectus melancholicos, can-
crum non vlcera tum, elephantiã, alphis,
nigros curatu difficiles, melancholiam
morbum, & inde ortum timorem & mæ-
rorem, quartanam, icterum splenicum, &
splenis dolorem.

Pilula fetida maiores Mesua.

R \mathfrak{z} . Sagapeni, Esulæ ana \mathfrak{z} ij.

Ammoniacy, Scammonij præparati

Opopanacy, \mathfrak{z} iij.

Bdellij, Turbith \mathfrak{z} iij.

Colocynthidis, Cinnamomi,

Harmel, Nardi indicæ,

Aloës, Croci,

Epithymi añ \mathfrak{z} v. Costi ana \mathfrak{z} j.

Hermodactylo Zingiberis \mathfrak{z} i. β .

rum Euphorbij \mathfrak{z} ij.

Dissoluantur lachrymæ in succo porri, &
fiat massa.

*Vacuant pituitam crassam, crudam: ob-
id conferunt affectibus inde natis, arthri-
tidi, podagræ, gonagræ, dolori spinæ & a-
liarum iuncturarum, ventriculi, colico,
alphis, elephantiæ, aliisque cutis vitiis.

Pilula fetida minores Mesua.

R \mathfrak{z} . Sagapeni, Ammoniacy,

Opopanacy, Bdellij,

Myrrh

Myrrhæ ana ʒ v.

Turbith ʒ x.

Colocynthidis ʒ vj.

Fiant vt priores.

*Idem pollent.

Pilula Arabica Nicolai.

R. Aloës ʒ iiij.

Radicum bryoniæ,

Scammonij præparati,

Myrobalanorum citrinarum,

Cepularum,

Indarum,

Bellericarum,

Emblicarum,

Rosarum,

Mastiches,

Asari ana ʒ j.

Castorij ʒ iiij.

Croci ʒ j.

Succi fœniculi q. s. Fiat massa.

*Valent ad capitis dolorē, vertiginem, hemicraniamq; lætitiā generant, mentisque vigorem conseruant, visum acūt auditumque amissum reparant, ac stomachum à vitiosis humoribus purgant.

Pilula ex Sagapeno Mesua.

R. Sagapeni,

Ammonici,

Bdellij,

Opopan

Opopanacis, ana ʒ ij.
 Aloës, ana ʒ ij.
 Castorij, ana ʒ ij.
 Rutæ agrestis ana ʒ ij.
 Colocynthidis ʒ iij.
 Salis gemmæ ʒ i.

Cum succi porri q. s. fiat massa.
 *Pituitam lentam purgant: ob id iuuât
 paralyfim, spasmum, dolorem iunctura-
 rum, dorsi, podagrâmq; frigidam.

Pilula ex Bdellio Mesue.

Rz. Bdellij ʒ i ʒ.
 Myrobal. cepularum,
 Indarum,
 Bellericarum,
 Emblicarum,
 Concharum venerearum v starum,
 Charabe ana ʒ ij. ʒ.
 Ammi ʒ. iij.
 Succi porri q. s. excipiantur.

*Ad fluxum hemorrhoidum & vlce-
 rum in eis, & ad menses immodicos.

Pilula de Sarcocolla Mesue

Rz. Sarcocollæ ʒ iij.
 Turbith ʒ iij.
 Colocynthidis,
 Zingiberis ana ʒ ij. ʒ.
 Salis gemmæ ʒ i.
 Aquæ rosarum q. s. fiat massa.

T

*Pitui-

*Pituitam vacuant, ob id pituitosis affectibus commodant.

Pilula de Euphorbio Mesua.

R̄. Euphorbij, Sagapeni ana ʒ ij
 Agarici, Aloës ʒ v.
 Colocynthidis, Succiporri q. s.
 Bdellij,

* Pituitam frigidā & crudam ad nervos fluentē vacuāt: ob id cōferūt paralyti.

Pilula ex Opopanace Mesua.

R̄. Opopanacis,
 Hermodactylorum,
 Sagapeni,
 Bdellij,
 Ammoniaci,
 Colocynthidis ana ʒ v.
 Croci,
 Castorij,
 Myrrhæ,
 Zingiberis,
 Piperis nigri,
 Piperis longi,
 Casiæ,
 Myrobal. citrinarum,
 Indarum,
 Bellericarum,
 Emblicarum ana ʒ j.
 Scammonij præparati ʒ ij.
 Turbith ʒ β.

Aloës

Aloës ζ i. β .

Succi brassicæ q. f. Fiat massa.

*Ad paraly sim, spasmus cynicum, gonagram, podagram, & aliorum articulo-
rum dolores, morbósque partium neruo-
saram frigidos, vtilis sunt.

Pilula de lapide Lazuli Mesue.

R. Lapidis lazuli loti ζ v.

Epithymi,

Polypodij ana ζ j.

Caryophyllorum,

Anisi ana ζ β .

Specierum hieræ simpl. ζ xv.

Scammonij præparati,

Hellebori nigri,

Salis indi ana ζ ij. β .

Agarici electi ζ j.

Succi endiuix q. f. Fiat massa.

*Valent ad affectus melancholicos, &
bile vsta natos.

Pilula ex lapide Armeno Mesue.

R. Lapidis armeni loti,

Specierum hieræ ana ζ v.

Polypodij,

Epithymi ana ζ j.

Scammonij præparati ζ iij.

Caryophyllorum ζ ij.

Salis indi ζ j. β .

Succi solani q. f. Fiat massa

T 2

*Meja

*Melancholiam, & bilem vltam multiplicem vtramq; clementer vacuant: ob id morbis inde natis conferunt.

Pilula è sex rebus Galeni.

Rz. Aloës, Bdellij,
Scammonij, Gummi arabici,
Colocynthidis, Rhabarbari añ ʒ β.
Agarici, Tere, fiat massa.
Rhabarbarum à nobis additum est.

*Pituitam à cerebro & aliis neruosis euacuant.

Pilula de octo rebus Nicolai.

Rz. Aloës,
Scammonij præparati, ana ʒ ij.
Pulpæ colocynthidis,
Epithymi, Agarici,
Mastiches,
Dauci,
Myrobalanorum cepularum,
Absinthij ana ʒ j.
Tere, fiat massa cum
Succi solani q. s.

*Purgant humores crassos à capite, vltim acuunt, & suffusionem arcent.

Pilula ex Opio magistrales.

Rz. Opij, Casia ana ʒ β.
Crocij, Vini albi q. s.

*Faciunt ad tussim, & tenues fluxiones inspissant.

Pilu

Pilula de cynoglossa Nicolai.

Rz. Cynoglossæ,
 Opij,
 Seminis hyoscyami ana ʒ β.
 Myrrhæ ʒ vj.
 Thuris ʒ v.
 Caryophyllorum,
 Cinnamomi,
 Styracis calamitæ, ana ʒ ij.
 Aquæ rosacæ q. s.
 Fingatur massa.

*Magnam vim obtinent in tenuibus fistendis distillationibus, ac doloribus mitigandis.

Pilula de Arnoglossa magistrales.

Rz. Myrrhæ,
 Thuris,
 Succiglycyrrhizæ ana ʒ j.
 Succiplantaginis q. s. Fiat massa.

*Sistunt tenues destillationes, ac eandem ferè cū superioribus facultatem obtinent.

Pilula de Styrace Mesua.

Rz. Styracis liquidæ,
 Thuris,
 Myrrhæ,
 Succiglycyrrhizæ,
 Opij ana ʒ j.
 Fiat massa.

*Ad eadem efficaces ad quæ sequentes.

T 3

Pyl

Pylulæ Styracis Galeni.

R̄. Styracis ʒ ix.

Op̄ij,

Myrrhæ ana ʒ iiij.

Sapæ q. s. Finge catapotia.

* Faciunt ad tussim recentem, & hæ-
moptoicos, dolorem leuant, ac somnum
inducit.*Alia similes Galeni.*

R̄. Myrrhæ, Castorij,

Piperis, Galbani ana ʒ ij.

Op̄ij, Sapæ q. s.

Styracis, Fac pilulas.

* Faciunt ad destillationem, dolorem
capitis, ægrè spirantes, peripneumonicos,
ad vesicæ & vteri affectiones.*Pilulæ Harmoniæ Galeni.*

R̄. Styracis,

Castorij,

Piperis,

Cardamomi, ana ʒ iiij.

Op̄ij,

Myrrhæ,

Seminis hyoscyami ana ʒ iiij.

Sapæ q. s.

Reduc in catapotia.

* Ad destillationes & inexuperabilem
defluxum vtilis sunt.*Pilul*

Pilula Scribonij, ex Galeno.

R. Sagapeni,

Myrtæ ana ʒ ij.

Opij,

Cardamomi,

Castorij ana ʒ iiij.

Piperis albi ʒ j. β.

Sapæ q. f. Fiant pilulæ.

*Pthificis, sanguinem reiectantibus, suppuratis, educunt pelliculas & repurgant sufficienter: verum immorari pharmacopoter.

PASTILLI, SEV TRO- CHISCI, ET COLLYRIA SIVE SIEF.

Sectio Octaua.

Trochisci de Vipera Galeni.

R. Ecip. Viperas num. xx.

Sumendæ sunt autem, non quæ quouis tempore captæ sunt, sed à medio potissimum Aprile in finem vsq; Maij, aut paulò tardius, locisque procul à mari distitis. Eligendæ sunt scemina, quæque colore subflauo sint, non prægnantes, quæ caput latius habeant & depressum, collum lon-

T 4

gius

gius, graciliusque quam mares, ventre va-
 ftiores, cauda minore, quæ non involuta
 est, sed potius contorta & distensa, in cessu
 quieti proximo, quæ tamé postremas par-
 tes in incessu magis moueant, aspectu fe-
 rino & inuerecundo: oculis subrubenti-
 bus, & recens captæ. Capita primum &
 caudas amputabis quatuor digitorum lō-
 gitudine vtrinque: his amputatis confide-
 derandum est si motum quendam in ipsis
 residuum conspicias, sanguinemque mul-
 tum fundant, nam hæ ceu præstantissime,
 sumendæ sunt: Deinde pelle detracta, in-
 teranea cum adipe abiicienda erunt, reli-
 quum corpus in ollam nouam bene co-
 ctam immitendum, & coquendū in aqua
 fontana, additis anethi comis, & sub fi-
 nem pauillo salis, (ignis auté esto è car-
 bonibus accensis, aut sarmentis vitium)
 donec carnes à spinis separentur. Cùm co-
 ctæ fuerint, ollam ab igne depones, & car-
 nes diligenter à spinis exemptas, per se
 contundes nulla iusculi addita parte, &
 addito puluere panis biscocti maximè pu-
 ri, quantum pastillis formandis sufficiat,
 quæ erit secūdm Galenū tertia aut quar-
 ta pars, admisceto. Formabis in pastillos
 ponderis duarum drachmarum, & sicca-
 bis in superiori ædium parte, in cella ad
 merid

meridiem conuersa, à puluere diligenter mundata, Sæpe autem conuertendi sunt, per quindecim dies aut eo amplius, donec probè exsiccati fuerint, deinde in pyxidem vitream aut figulinam vitratam bene obturatam reponendi. Annum vnū integri perseverant, quanquam longè melius sit, haud multò postquam ipsos confeceris, theriacam conficere. Qui autem diutius conseruare volet, subinde abstergendi sunt à puluisculo quodam qui illis obnasci consuevit, qui si diutius inhæreat, pastillos perforabit. Hoc itaque modo, conseruari possunt integri ad tertium annum.

Trochisci de scylla Galeni.

Scyllam initio Iulij collectam, mediæ magnitudinis, plenam, candidam, cortice primo detracto, & parte duriore cui radiculæ adhærent, abiecta, farina subacta inuolues, & eousque in clibano coques, donec farina probè siccata sit, & ea perforata, stilo ligneo tentabis num scylla vndique tenera sit: Ea exempta partē interiorē diligenter teres, cui admiscebis farinæ erui tenuissimè cribratæ uncias octo ad singulas libras, & formabis in trochiscos ponderis duarum drachmarum, & sic cabis in superiore parte ædiū in cella probè mun

T 5

bè mun

bè mundata. Meridiem spectante, sæpius obuertendo, donec probe siccati sint, deinde repones vt supra dictum est de pastillis viperinis.

Hedycroum Andromachi ex

Galeno.

| | |
|--------------------|------------------|
| R̄. Mari, | Costi ana ʒ iij. |
| Afari, | Myrrhæ, |
| Maioranæ, | Folij, |
| Aspalathi añ ʒ ij. | Nardi indicæ, |
| Schœnanthi, | Croci, |
| Calami odorati, | Casæ, ana ʒ vj. |
| Phu, | Amomi ʒ xij. |
| Xylobalsami, | Mastiches ʒ j. |
| Opobalsami, | Vini q. s. |
| Cinnamomi, | |

Fiant trochisci, inũctis prius manibus opobalsamo, deinde siccãtur vt superiores.

Crocomagma Democratis ex Galeno.

| | |
|-------------------------|-------------------|
| R̄. Croci ʒ c. | Amyli, |
| Myrrhæ, | Gummi arabici ana |
| Rosarum rubrarum ʒ xxx. | |
| ana ʒ l. | Vini q. s. |

Fiant trochisci.

Cyphi Democratis.

| | |
|-------------------------------|--|
| R̄. Pulpæ passularum, | |
| Terebinthinæ coctæ ana ʒ iij. | |
| Myrrhæ, | |
| Schœnanthi ana ʒ j. β. | |

Cala

Calami aromatici ℥ ix.
 Cinnamomi ℥ iiij.
 Vnguis odorati,
 Nardi indicæ,
 Casiæ,
 Cyperi,
 Baccarum iuniperi ana ℥ iiij.
 Aspalathi ℥ ij. β.
 Croci ℥ j.
 Mellis q. s.
 Vini modicum,
 Forma trochiscos.

* Valent ad pulmonum, iecoris, aliarumque internarumque partium exulcerationes.

Trochisci Alhandal. Mesue.

R̄. Pulpæ colocynthidis ℥ x.
 Minutim incisa fricetur cum
 Olei rosati ℥ j. Gummi arabici,
 Tragacanthi, Bdellij ana ℥ vj.
 Macerentur quatrimum in aqua rosacea
 his colatis & expressis partem vnā cum
 colocynthide permiscebis, & fiet massa,
 quæ siccata in Sole, rursus teretur, atque
 addetur altera pars colaturæ, & forma-
 buntur trochisci, qui iniici possunt in
 omnes compositiones quæ colocynthidem
 recipiunt, & ipsa colocynthide salubri-
 res sunt.

Troch

Trochisci de Agarico Mesua.

R̄. Agarici ℥ iij.

Salis gemmæ ℥ β.

Zingiberis ℥ iij.

Oxymelitis q. f.

Agaricum lima confringendum, & formandi trochisci.

*Purgant ex cerebro, & capite phelgma crassum cum cholera mixtum. Et precipuè educunt ex pectore crassos humores, putridos & viscosos.

Agaricum Trochiscatum Mesua.

R̄. Agarici electi ℥ iiij.

Vini in quo maceratum sit Zingiber q. f.

Agaricum limandum est, & formandi trochisci.

Additur insuper gummi, aut tragacantha vt in vniuersalibus dictum est, & potest iniici in omnes cōpositiones in quas agaricū ingreditur, vires enim habet agarici, & tutius agit minoréq; vetriculi noxa.

Trochisci Diarhodon Nicolai.

R̄. Rosarum recentium ℥ iiij.

Spodij ℥ ij.

Santali rubri ℥ j. β. Ć vij.

Santali albi ℥ j. Ć xij.

Crocī ℥ ij. Ć vij.

Camphoræ Ć xij.

Fiunt in hunc modum. Rosas recentes in
mor

mortario contundes lapideo, sine intermissione, & reliqua in puluerem redacta addes, ac cum aqua rosacea q. s. formabis, sub finem camphoram addito, sicca in vmbra, ac serua.

*Hæc compositio administratur in magis compositionibus Nicolai.

Trochisci Diarhodon Mesue.

Rz. Rosarum rubrarum ʒ ix.

Ligni aloës.

Nardi indicæ ana ʒ iij.

Glycyrrhizæ ʒ iiij. β.

Spodij ʒ j. β.

Mastiches ʒ ij.

Croci ʒ ij. β.

Vini albi q. s. Fiant trochisci.

*Efficacissimi ad febres pituitosas, antiquatas, aliis implexas, ventriculi dolorem leniendum, & humores ipsi adhærentes detergendos.

Trochisci de Rosis. Rasus ex Mesue.

Rz. Rosarum rubrarum ʒ β.

Ligni aloës ʒ ij. Nardi indicæ,

Mastiches ʒ j. β. Casiæ,

Absinthij, Schœnanthi ana ʒ j.

Cinnamomi,

Fac trochiscos cum vino antiquo, & decoctione quinque radicum.

*Sunt efficaces ad multos affectus, præter

ser

fertim ad ventriculi dolorem, malam coctionem, febres antiquas, hydropem incipientem, & illos maximè, quibus forma corrumpitur.

Trochisci de Camphora Mesua.

℞. Foliorum rosarum rubrarum ʒ iiij.

Spodij ʒ ij.

Santali citrini ʒ ij. β.

Croci ʒ j.

Glycyrrhizæ ʒ ij.

Seminum citruli,

Melonis,

Cucumeris,

Cucurbitæ,

Tragacanthæ,

Gummi arabici,

Nardi indicæ ana ʒ j.

Ligni aloës,

Cardamomi maioris,

Amyli,

Camphoræ ana ʒ ij.

Sacchari albi,

Mannæ ana ʒ iiij.

Forma trochiscos cum mucagine seminis psyllij extracta cum aqua rosacea.

*Ad febres ardentes, bilis & sanguinis feruorem, ventriculi & hepatis intemperiem calidam, & ab his sitim inexpletam, icterum quoque, ac phtisim & hecticam

cam conferunt.

Trochisci de Gallia Moschata Mesue.

R̄. Ligni aloës ʒ v.

Ambra ʒ iij.

Moschi ʒ j.

Muccaginis tragacanthæ, extractæ cum aqua rosarum q. s.

Fiant trochisci parui.

*Cerebrum, corque roborat, oris atque ad eò corporis totius odorem commendat, compositionibus aliis miscetur.

Alipta Moschata Nicolai.

R̄. Ladani ʒ iij.

Styracis ʒ j. β.

Styracis rubræ ʒ j.

Ligni aloës ʒ ij.

Ambra ʒ j.

Camphoræ ʒ j. β.

Moschi ʒ β.

Aquæ rosaceæ q. s.

Formentur trochisci secundum artem.

*Valet pueris laborantibus asthmate, & iis qui angusto sunt thorace, nec lac haustum retinent, præstatque vsum optimi & odoriferi suffitus.

Trochisci Ramich Mesue.

R̄. Succiacetosa ʒ xvj.

Rosarum ʒ j.

Baccarum myrti ʒ ij.

Boji

Boli pauxillum, colentur, & colaturæ
adiunge

Gallarum tritarum z iij.

Coque aliquantulum, cola, & adde infu-
per subsequencia bene trituro.

Rosarum z j.

Santali citrini z x.

Gummi arabici z j. β .

Sumach,

Spodij ana z j.

Omphacij seu agrestæ z vij.

Baccarum myrti bene tritarum z iij.

Ligni aloës,

Caryophyllorum,

Macis,

Nucis moschatæ ana z iij.

Misce omnia, & siccentur in scutella figu-
lina, & tere minutim, & fiant trochisci cū

z j. β . de camphora & aqua rosacea q. s.

Succi acetosæ loco, sumi potest vinum
è codoniis acerbis: sunt qui aromatizent

z xvij. moschi.

*Ventriculum, cor, hepar, imbecilla fir-
mant, & lubrica viscera ac intestina, cho-
leram morbum sistunt, acrimoniam ob-
tundunt, animum reddunt tranquillum,
omnem hæmorrhagiam cohibet: os quā
naribus sanguine cohibet, os quam nari-
bus sanguine fluentibus flando impelli-
tur,

tur, aliis medicamentis miscetur.

Trochisci de Rhabarbaro Mesua.

R̄. Rhabarbari boni ʒ x.

Succi eupatori,

Amygdalarum amararum ana ʒ iiij.

Rosarum, Seminis apij,

Nardi indicæ, Absinthij,

Anisi, Afari ana ʒ j.

Rubiæ, Aquæ cuscuthæ q. ʒ.

Fiant trochisci ponderis drachmæ vnus cum dimidia.

*Valent ad hepatis obstructionem, dolorem, tumores præter naturam, affectus inueteratos eiusdem, & hydropem, & icterum, & formæ corruptionem.

Trochisci de Violis magistrales.

R̄. Violarum nigrarum ʒ vj.

Turbith ʒ iiij.

Succi glycyrrhizæ,

Mannæ,

Scammonij præparati ana ʒ ij.

Formentur trochisci. fiunt etiam sine scammonio.

*Aguas, pituitam crassam & bilem purgant, flatúsque dissipant.

Trochisci ligni aloës Mesua.

R̄. Ligni aloës,

Rosarum rubrarum ana ʒ ij.

Mastiches, Cinnamomi,

v

Caryo

Caryophyllorum, Nardi indicæ,
Macis,

Nucis moschata,

Cubebarum,

Cardamomi minoris,

Cardamomi maioris,

Pastinacæ, Gallia,

Corticis citri ana ʒ j. β.

Moschi,

Ambra ana ʒ β.

Mellis passulati q. s.

Formentur trochisci.

*Ventriculum, cor, hepar imbecilla roborant: ob id valent ad oris fetorem, pulsum cordis, & syncopen & hydropem.

Trochisci de Croco Nicolai.

Rz. Croci ʒ iij. Myrrha ana ʒ j. β.

Rosarū rubrarū, Ligni aloës ʒ ij.

Ammi, Aquæ rosacæ q. s.

Fiant trochisci.

Trochisci de Eupatorio Mesue.

Rz. Mannæ electæ,

Succi eupatorij ana ʒ j.

Rosarum rubrarum ʒ β.

Nardi indicæ ʒ iij.

Spodij ʒ iij. β.

Rhabarbari electi,

Asari,

Anisi ana ʒ ij.

Fiant

Fiant trochisci cum succo eupatorii.

*Obstructionem & tumorem præter naturam hepatis & lienis sanant, ac inde natas febres antiquas, & harum rigorem, icterum, ac incipientem hydropem.

Trochisci de Absinthio Mesue.

R. Rosarum, Seminis apij,
Absinthij. Amygdalarū amararū,
Anisi ana ʒ ij. Nardi indicæ,
Rhabbarbari, Mastichis,
Succi eupatorii, Folij ana ʒ ij.
Asari, Succi endiuicæ q. s.
Fermentur trochisci.

*Obstructiones ventriculi & hepatis, & ab his dolorem, & febres antiquas tollunt, dictas partes, reliquasque nutritorias roborant, ac appetentiam excitant.

Trochisci de Aniso Mesue.

R. Anisi,
Succi eupatorii ana ʒ ij.
Seminis anethi,
Nardi indicæ,
Mastichis, Folij
Foliorum absinthij,
Asari, Apij, ana ʒ β.
Amygdalarum amararum ana ʒ β.
Aloës ʒ ij.
Syrupi absinthij q. s.
Fermentur trochisci.

V 2

*Obstru

*Obstructiones hepatis, & alios eius morbos & inde natas febres antiquas sanant.

Trochisci seu Pastilli Hepatici Asclepiadis ex Galeno.

R̄. Anisi, Amygdalarum,
Seminis apij, Absinthij ana ʒ iiij.
Asari, Aquę pluuię q. ʒ.
Fiant trochisci.

*Hepaticos iuuant, habent enim hepatis expurgandi per vrinas, dantur cum vino, febrientibus cum aqua.

Trochisci seu Pastilli ex Amygdalis amaris Pauli.

R̄. Anisi,
Apij,
Asari,
Comarum absinthij,
Amygdalarum amararum ana ʒ ij.
Aquę q. ʒ. Fiant pastilli.

*Idem præstant. Dantur febri carentibus ex mulso, febricitantibus cum hydromelite.

Trochisci de Capparibus Mesue.

R̄. Corticum radicum capparis.
Seminis agni ana ʒ vj.
Seminis nigellę,
Calaminti,
Succi eupatorij,
Acori,
Amyg

Amygdalarum amararum,
 Foliorum rutæ,
 Aristolochiæ rotundæ,
 Seminis nasturtij,
 Ammoniaci ana ʒ ij.
 Cyperi, Ceterach ana ʒ j.
 Ammoniacum dissoluito, & reliqua tri-
 turato: deinde Fiant trochisci.

*Ad splenis duritiem & flatus eius dis-
 sipandos valent.

Trochisci de Myrrha Rhafis.

R̄. Myrrhæ ʒ iij. Cumini,
 Lupinorum ʒ v. Rubiæ,
 Foliorum rutæ, Asæ fœtidæ,
 Mentastri, Sagapeni,
 Pulegij, Opopanacis ana ʒ ij.
 Dissoluuntur gummi in aceto, forman-
 tûrque trochisci cum absinthij succo.

*Prouocant menstrua, & sedant dolo-
 res, qui ex retentis menstruis proueniunt.

Trochisci de Lacca Mesuæ.

R̄. Lacca,
 Succij { glycyrrhizæ,
 eupatorij,
 Absinthij, Asari,
 Berberis, Amygdalarû amara-
 Rhabarbari, Rubiæ, rû,
 Aristolochiæ lôgæ, Seminis apij,
 Costi, Seminis anisi,
 V 3 Schœn

Schœnanthi ana ʒ j.

Vini q. f.

Formentur trochisci.

*Valent ad obstructions hepatis & lie-
nis, & inde natas febres varias antiquas, &
ascitem per vrinās mouent.

Trochisci de Berberis Mesua.

℞. Berberis ʒ ij.

Spodij,

Ligni aloës,

Seminis acetosæ,

Mastichis,

Galliæ moschatæ,

Nardi indicæ ana ʒ j.

Gummi arabici ʒ iij.

Rosarum rubrarum ʒ v.

Aquæ rosarum q. f.

Formentur trochisci.

*Valent ad intemperiem calidam, fluo-
rem alui, & hepatis dolorem.

Trochisci de Spodio Mesua.

℞. Rosarum rubrarum ʒ j. β.

Spodij ʒ x.

Seminis acetosæ ʒ vj.

Seminis portulacæ,

Coriandri præparati,

Sumach ana ʒ ij. β.

Amyli vsti,

Balaustiorum,

Berbe

Berberis ana ʒ ij.

Gummi arabici assati ʒ j. β.

Agrestæ q. l.

Formentur trochisci.

*In febribus biliosis cū alui fluore effica-
caces sunt: Inflammationem ventriculi
& hepatis & sitim continuam sedant.

Pastilli diaspermaton Galeni.

R̄. Seminis apij,

Ammi ana ʒ j.

Anisi,

Fœniculi ana ʒ β.

Opij,

Casæ ana ʒ ij.

Aquæ pluviæ q. l.

Formentur trochisci.

*Dantur ex passō, aut aqua, sedant do-
lorē, ad omnes internos affectus, & pleu-
ritidas vtilēs sunt, & sanguinem reiectan-
tibus.

Trochisci de Corallo Nicolai.

R̄. Coralli rubri,

Cinnamoni,

Myrrhæ, Amomi,

Seminis papaueris ana ʒ β.

Schœnanthi,

Croci ana ʒ ij.

Calami aromatici,

Xilobalsami,

V 4

Casæ,

Casiæ, Phu,
 Folij, Polij montani,
 Mastiches, Afari,
 Pedis columbini ana ʒ j.
 Vini q. s. Formentur trochisci.

*Sanguinolenta excreantibus, dysentericis, cœliacis, cibum fastidientibus mire subueniunt.

Dia Corallu Galeni.

℞. Coralli rubri,
 Terræ samix ana ʒ j.
 Balauftiorum,
 Amyli,
 Terræ lemnix ana ʒ iiij.
 Seminis hyoscyami,
 Opij,
 Hypocistidis ana ʒ ij.
 Succij plantaginis,
 Formentur trochisci.

*Ad eadem efficax.

Trochisci de Terra sigillata Mesua.

℞. Sanguinis draconis,
 Gummi arabici assati,
 Trochiscorum ramich,
 Rosarum rubrarum,
 Spodij,
 Seminis rosarum,
 Amyli assati,
 Acaciæ,

Lapid

Lapidis hæmaritis,
 Hypocistidis,
 Balauftiorum,
 Boli armenici,
 Terræ sigillatæ,
 Coralli rubri,
 Charabæ ana ʒ ij.
 Margaritarum,
 Tragacanthæ,
 Seminis papaueris nigri, ana ʒ j. β.
 Seminis portulacæ,
 Cornu cerui vsti,
 Thuris,
 Gallarum,
 Croci ana ʒ ij.
 Aquæ plantaginis q. s.
 Formentur trochisci.
 Qui volet cum opio addat.
 Opij ʒ ij.

*Sunt admodum efficaces ad sputum
 sanguinis cum aqua plantaginis poti: ad
 fluorem verò sanguinis è naribus, fronti
 illiti: ad menses immodicos, vtero iniecti,
 vel pubi illiti: ad mictum sanguinis, in ve
 sicam iniecti: & ad alias hæmorrhagias,
 parti sanguine fluenti impositi.

Trochisci de Carabe Mesua.

R̄. Charabæ ʒ ix.
 Cornu cerui vsti,

V 5 Gum

Gummi arabici affati,
 Coralli rubei vsti,
 Tragacantha,
 Acacia,
 Hypocistidis,
 Balauftiorum,
 Mastiches,
 Laccæ,
 Papaueris nigri affati, ana ꝑ iiij.
 Thuris,
 Croci,
 Opij ana ꝑ ij. Ḡ xv.
 Mucilaginis pſyllij q. ſ.
 Formentur trochiſci.

*Vtiles ſunt ad conſtringendum ſanguinem vndecunq; fluentem, menſtrua, ſputum, fluxum ſanguineum, & hæmorrhoidalem: & conſolidant vlcera pectoris & pulmonis.

Paſtilli Dia electri Galeni.

R. Pſyllij,
 Iridis,
 Maſtiches,
 Succini ana ꝑ xxx.
 Opij ꝑ xv.
 Pſyllium aqua calida macerato, atq; iam expreſſa mucilage
 Paſtillos ſecundum artem formato.

*Fluxum ſanguinis præfertim à thora-
 ce,

ce, pulmone, hepate, renibus, vtero hæ-
morrhoidibus cum succo plantaginis vel
polygoni, aut vino granatorum sumpti.

Trochisci stellæ Auicennæ.

Rz. Lapidis stellaris ʒ v.

Costi,

Opij,

Croci ana ʒ v.

Myrrhæ,

Castorij,

Nardi indicæ,

Casiæ,

Terræ sigillatæ,

Corticis mandragoræ, ana ʒ β.

Papaueris albi,

Dauci,

Anisi,

Hyoscyami,

Apij,

Sileris montani,

Styracis liquidæ ana ʒ j.

Gummi macerantur in vino, reliqua te-
rantur, & formentur trochisci.

*Conueniūt stomachi eructationibus,
dolori capitis & dentium, catarrhis, san-
guinis sputum & profluuium sanant, &
periodicas febres.

Hæster Galeni.

Rz. Croci ʒ β.

Semi

Seminis { Hyofcyami,
 Apij ana ʒ vj.
 Anifi,
 Styracis,
 Dauci ana ʒ β.
 Castorei ʒ ij.
 Opij ʒ iij.
 Myrrhæ ʒ ij.
 Succimandragoræ ʒ β.
 Piperis albi ʒ vj.
 Aquæ pluuiæ q. s.
 Fiant trochisci.

*Datur ex aqua. sistit dolorem, hoc vti
 possumus ad omnem fluxum, dolorem, &
 omnes internos affectus, & destillationes,
 ad vesicam, ad suffocationes, fluxum
 muliebrem, stomachi fluxionem, dysen-
 tericos, & sanguinem reiicientes.

Trochisci Alkekengi Mesue.

R̄. Fructus alkekengi ʒ iij.
 Seminis { Citruli,
 Cucumeris,
 Cucurbitæ ana ʒ iij. β.

Boli armenici,
 Gummi arabici,
 Thuris,
 Sanguinis draconis,
 Seminis papaueris albi,
 Amygdalarum amararum,
 Succ

Succi glycyrrhizæ,
 Tragacanthæ,
 Amyli,
 Pinearum mundarum ana ʒ vj.
 Seminis apij,
 Carabæ,
 Terræ figillatæ,
 Hyoscyami,
 Opij ana ʒ ij.
 Iulepi violati q. ʒ.
 Formentur trochisci.

*Valent ad renum & vesicæ vlcera &
 natam inde dysuriam.

Pastillus Andronius ex Andromacho.

R̄. Florum mali punici ʒ x.
 Gallæ omphacitidis ʒ viij.
 Myrrhæ,
 Aristolochiæ ana ʒ iiij.
 Calcanthi
 Aluminis scissilis } ana ʒ ij.
 Misy
 Formentur trochisci cum
 Sapæ q. ʒ.

*Facit ad recētia vulnera & vetera, cu
 rat fistulas, aurēs suppurantes, ossa corru
 pra, reprimat omnem carnis excrescētiā:
 valet ad phagedænas & condylomata.

Pastilli Polyida ex Andromacho.

R̄. Florum mali punici ʒ xij.
 Alum

Aluminis scissilis ʒ iiij.

Thuris,

Myrrhæ ana ʒ iiij.

Calcanthi ʒ ij.

Fellis taurini ʒ vj.

Aloës ʒ viij.

Formentur pastilli cum

Vini austeri q. s.

*Ad nomas, & eadem ferè quæ præcedens potest.

Pastilli Musæ.

Rz. Aluminis scissilis,

Aloës,

Myrrhæ,

Calcanthi ana ʒ vj.

Croci Crocomagmatis ana ʒ iiij.

Florum malorum granatorum domesticorum ʒ iiij.

Formentur pastilli cum

Vini odorati &

Mellis ana q. s.

*Pastillus multiplicis vsus, pus educens, & relaxans.

Trochisci de Minio erodentes Ioannis

de Vigo.

Rz. Medullæ panis non cocti bene fermentati ʒ iiij.

Sublimati electi ʒ j.

Minij ʒ β. Aquæ rosarum q. s.

Form

Formentur trochisci, qui in clibano tepente resiccati seruentur.

*Omnes carnis prauas excrescentias liquat, sordida vlcera expurgat, callosa emollit, ac fistulas mirabiliter sanat.

Sief album Mesue.

Rz. Sarcocollæ in lacte asinino maceratae

ʒ v.

Amyli ʒ β.

Tragacanthæ ʒ iij.

Opij ʒ j.

Thuris ʒ i. β.

Ceruse lotæ ʒ x.

Aquæ pluuiæ q. s.

Fiat sief.

*Confert ophthalmiæ cum est in augmento, & dolorem sedat.

Aliud simile eiusdem.

Rz. Gummi arabici, Ceruse lotæ ʒ vj.

Tragacanthæ, Opij ʒ j.

Amyli ana ʒ iij. Fac sief cum

Oui albumine.

Fit etiam sine opio.

*His vtimur initio vehementis doloris à causa calida.

Trypherum Galeni.

Rz. Cadmiæ lotæ ʒ xvj.

Ceruse ʒ viij.

Amyli, Gummi,

Tragac

Tragacanthæ ana ʒ iiij.

Opij ʒ ij.

Fiat collyrium cum

Aquæ pluuiæ q. ʒ.

*Ad epiphoras, & affectiones oculorū:
vide sequens.

Aliud Galeni.

R̄. Cadmiæ lotæ ʒ xvj.

Amyli,

Thuris ana ʒ viij.

Cerufæ ʒ xlviij.

Opij ʒ vj.

Gummi ʒ xvj.

Fiat collyrium cum

Aquæ pluuiæ q. ʒ.

*Ad inustiones oculorū, pustulas, che-
moseis, maximè in his, qui nullam mor-
daciditatem perferre possunt.

Cygnus Galeni.

R̄. Cadmiæ ʒ xvj.

Cerufæ lotæ ʒ viij.

Amyli,

Tragacanthæ,

Acaciæ,

Opij ana ʒ ij.

Gummi ʒ xij.

Fiat collyrium cum

Aquæ pluuiæ q. ʒ.

*Ad maximos dolores & affectiones o-
culorum.

Dia

Diarhodon Nilei ex Galeno.

℞. Rosarum, ʒ iiij.

Crocī ʒ ij.

Gummi ʒ iiij.

Opīj,

Nardi indicæ ana ʒ j.

Aquæ pluuiæ q. s. Fiat collyrium.

*Ad doloris molestias, fluxum vberem,
ac tenuem, pustulas, prolapsus oculorū.*Aliud Mesuæ, sief de rosīs dictum.*

℞. Foliorum rosæ ʒ xv.

Crocī,

Gummi arabici ana ʒ viij.

Opīj,

Nardi indicæ ana ʒ ij.

Fiat sief cum

Aquæ pluuiæ q. s.

*Eadem quæ præcedens potest.

Collyrium seu sief de Thure.

℞. Cadmiæ, Opīj,

Pompholigis, Gummi ana ʒ vj.

Thuris ana ʒ x. Aquæ pluuiæ q. s.

Cerusæ ʒ xl. Fiat collyrium.

*Ad fluxiones oculorum & chemoseis.

Aliud Mesuæ.

℞. Thuris ʒ x. Sarcocollæ añ ʒ v.

Ammoniāci, Crocī ʒ ij.

Fiat sief cum

Ma cilaginis scœnigræci q. s.

X

*Vlce

*Vlcera oculorum ducit ad maturitatem.

Collyrium Nardinum.

R̄. Cadmiæ, Acaciæ ana ʒ x.
 Croci, Nardi indicę ʒ iiij.
 Gummi ana ʒ xij. Opij,
 Aeris vsti ʒ v. Myrrhæ ana ʒ v.
 Stibij, id est, anti- Vini q. s.
 monij, Fiat collyrium.

*Ad doloris vexationes, fluxum renuē
 & multum, pustulas & aspretudines ocu-
 lorum.

Dia cnu.

R̄. Cadmiæ,
 Lapidis hæmatitæ,
 Alumnis scissilis ana ʒ x.
 Aeris vsti ʒ vij. β.
 Chalcitidis ʒ viij.
 Seminis papaueris ʒ v.
 Maceretur semen papaueris in aquæ plu-
 uiæ q. s. Exprimatur, & reliquis tritis fiat
 collyrium cum vini austeri q. s.

*Ad claritatem & cicatrices oculorū.

Diahæmatites.

R̄. Aeris vsti & loti ʒ xxiiij.
 Lapidis hæmatitæ ʒ j.
 Croci, Gummi ʒ xij.
 Opij ana ʒ iiij. Aceti q. s.
 Fiat collyrium.

*Aspr

* Aspersionibus commodum: facit ad veteres affectiones, ad sicca, & ad omnem extuberantiam oculorum.

Diamyrtha.

℞. Cadmiæ lotæ ℥ xxviii.
Lapidis hæmatitæ vsti & loti ℥ xxv.
Spodij ℥ xxiiiij. Piperis albi, ḡ nu.
Myrrhæ ℥ vj. xxx.
Crocī ℥ β. Gummi ℥ vj.
Opij ℥ j. Vini q. l.

* Accommodatum est ad veteres affectiones oculorum: facit & ad rhœadas & ægylopos.

Viride Antai.

℞. Cadmiæ ℥ vj.
Myrrhæ ℥ iiij.
Crocī ℥ vj.
Opij ℥ iiij.
Plumbi vsti & loti ℥ j.
Squammarum aris,
Nardi indicæ,
Acaciæ ana ℥ vj.
Gummi ℥ xxiiiij.
Fiat collyrium cum aquæ pluviæ q. l.

* Ad doloris molestias, pustulas, inustiones, prolapsus, confusiones oculorum.

Aliud viride.

℞. Cadmiæ vstæ, & vino odorato extinctæ
℥ j. Croci,

X 2

Sibi.

Stibij, id est, antimoniij vsti & in lacte ex-
tincti ana ʒ iiij.

Amyli ʒ i.

Gummi ʒ ij.

Succi anagallidis fœminæ q. s.

*Ad idem valet.

Aliud Mesua.

Rz. Aeruginis æris ʒ iiij.

Calcanthi vsti ʒ vj.

Auripigmenti rubri,

Spumæ nitri,

Spumæ maris ana ʒ ij.

Ammoniaci ʒ j. β.

Salis hammoniacci ʒ β.

Ammoniacum macerato in aqua rutæ, &
fac collyrium.

*Eiusdem facultatis est ferè cum sief
rubro sequenti.

sief rubrum Mesua.

Rz. Seminis cannabis ʒ iiij.

Aeris vsti,

Myrrhæ ana ʒ ij.

Croci ʒ j.

Piperis nigri ʒ β.

Aquæ pluuiæ q. s.

Si voles acrius, adde Aeruginis æris,

Salis hammoniacci ana ʒ β. Fiat sief.

*Vtile est oculorum scabritiei, prurigi
niq; suffusionibus & vngui.

Aliud

Aliud Galeni.

R̄. Cadmiæ ʒ xl. Piperis albi,
Chalcitidis vsta, Gummi ana ʒ xx.
Fiant pastilli cum Aquæ q. s.

* Ad lippitudinem, sycosin, & carnis
excrementas.

Sief luteum Mesua.

R̄. Cadmiæ lotæ, vsta, & in lacte mulie-
bri macerata ʒ x.

Ceruse lotæ ʒ viij.

Squammæ ferri ʒ iiij.

Opij ʒ ij.

Tragacanthæ,

Gummi arabici ana ʒ iiij.

Fiat sief cum

Aquæ pluuiæ q. s.

*Confert doloribus oculorum vehemē
tibus à causa calida.

E cornu Ceruino.

R̄. Cornu cerui vsti & loti,

Thuris,

Plūbi vsti & loti añ. ʒ iiij.

Squammæ æris lotæ ʒ ij.

cum Aquæ pluuiæ q. s.

*Facit ad vlcera & pustulas oculorum,
cicatrices exterit.

Aliud.

R̄. Plumbi vsti & loti,

Cornu ceruini vsti & loti ana ʒ xvj.

X

3

Thu

Thuris,
 Acaciae,
 Spodij ana ʒ viij.
 Amyli ʒ iiij.
 Opij,
 Squammæ aris ana ʒ ij.
 Croci ʒ viij.
 Myrrhæ ʒ iiij.
 Tragacanthæ ʒ j.
 Gummi,
 Seminis hyoscyami ana ʒ viij.
 Fiat collyrium cum mucagine seminis
 hyoscyami.

*Ad eadem efficax.

Libianum.

R. Cadmiæ vsta & lotæ,
 Cerusæ lotæ,
 Stibij, id est, antimonij vsti & loti ana
 ʒ xvj.
 Plumbi vsti & loti ʒ viij.
 Amyli ʒ xij.
 Pompholigis,
 Myrrhæ, Terræ samia,
 Tragacanthæ ana ʒ viij.
 Opij,
 Fiant pastilli cum albumine oui.

*Ad pustulas, inustiones, rupturas, con-
 cauitates, oculos purulêtos, chemoseis, sta-
 phylomata, & ad circum molestantem do-
 lorem

lorem facit, & cicatrices exterit.

Aliud.

Rz. Pompholigis ʒ viij.

Cadmia vitæ & lotæ ʒ xvj.

Stibij, id est antimonij vsti & loti ʒ xij.

Cerusa lotæ ʒ xvj.

Amyli ʒ xij.

Terræ samia,

Plumbi vsti ana ʒ viij.

Myrrha,

Opij,

Tragacanthæ ana ʒ ij.

Formentur pastilli cum

Aquæ pluuiæ q. l.

*Eiusdem cum priore facultatis.

sic de Plumbo Mesua.

Rz. Plumbi vsti,

Antimonij, Gummi arabici,

Tutiæ lotæ, Tragacanthæ añ ʒ viij

Aeris vsti, Opij ʒ β.

Fiat sicut cum Aquæ pluuiæ q. l.

*Replet & consolidat vulnera oculorū.

DE OLEIS.

Sectio nona.

Oleum Rosatum vulgare.

R Ecip. Olei communis lb iiij.

Rosarum rubrarū purgatarū ʒ xvj.

X 4 Macer

Macera, & infola per octo dies: Rosas exemptas bene exprime, atq; alias impone vt supra: atque ita tertium fac: Cola & serua.

Nonnulli in tertia infusione rosas relinquant.

*Refrigerat & adstringit, inflammatio- nibus præsidio est, æstuantem ventricu- lum restinguit, erosiones intestinorū cly- steribus inditum, & dolores dentium, si eo colluantur, sanat.

Oleum rosatum completum Mesua.

R. Olei ex oleis maturis, aqua fontana multoties loti, quantum voles: deinde im- mitte folia rosarum rubrarum apertarū repurgata quantum satis est in vitreum vas: obturetur vas, ac per dies septem in- sola: coque tribus horis in vase duplici. Expressis foliis & abiectis, noua immitte: infola iterum, coque in balneo, & expri- mie vt prius: tertio noua immitte rosarum folia, quibus addes aquæ infusionis rosa- rum (eo modo confectæ vt in syrupo rosa- to dictum est) quartam partem: misce, in- sola dies quadraginta in vase vitreo obtu- rato: post excola, exprime, & addito rosa- rum succo, iterum diu infola.

Alij partem infusionis sumunt, & succi rosarum partem alteram, & eo quo supra dict

dictum est modo conficiunt.

*Roborat, resoluit commodè, lenit, & sedat.

Oleum rosatum Pauli.

Rz. Rosarum exemptis vnguibus ℥ iiij.

Olei omphacini ℥ vi.

Immitte in vas vitreum obturatum ne ex piret: dies quadraginta insolato.

*Alij non insolant, sed puteo imponunt, suspensum proximè aquâ dies quadraginta.

*Inflammationes exstringit, roborat, cogit, densat, fluxiones sistit, & materiarum per corpus fluxum cohibet.

Oleum Rosatum Omphacium.

Rz. Olei oliuarû immaturarum loti ℥ j.

Rosarum rubrarum purgatarum ℥ iiij.

Tritis rosis, & oleo impositis, fac vt dictû est, ter rosas permutando.

*Eiusdem cum superiori facultatis.

Oleum Chamæmelinum Pauli.

Rz. Florum chamæmeli, dēptis foliis albis

℥ iiij. Olei oliuarum ℥ ij. β.

Siccentur flores in vmbra 24. horis, deinde immitte cum oleo in vas vitreum angusti oris, bene obturatum, & quadraginta dies insolato.

*Initio colici, arthritici, & aliorum dolorum præstantissimum est, parum enim repellit & modicè digerit.

X 5 *Oleum*

Oleum Cydoniorum Mesua.

Fit ex carnis cydoniorum præmaturorum cum cortice,

Succi cydoniorum ana ζ vj.

Olei oliuarum immaturarum lb iij.

Omnia in vas vitreum obturatum immit-
tito, & diebus quindecim insolato: dein-
de horis quatuor coquito in duplici vase.
Cola & exprime: in expressione caro &
succus mutetur: rursus insoletur, coqua-
tur, & exprimatur vt diximus: tertium sic
facito. postremò colatum reconde ne per-
spiret.

*Refrigerat, adstringit: ob id ventrem
totum inferioré, & nervos laxiores cogé-
do roborat, sudores immodicos sistit.

Oleum Mastichinum Mesua.

Rz. Olei rosati omphacini lb j.

Mastiches ζ iij.

Vini odoriferi ζ iiij

Omnia in vase vitreo imposita coquãtur
in duplici vase ad vini consumptionem.

*Cerebrum, nervos, iuncturas, ventricu-
lum, hepar corroborat, tumores duros le-
nit, dolores sedat.

Oleum Absinthij.

Rz. Comarum absinthij ζ iiij.

Olei Omphacini lb j.

Insolato in vase vitreo, absinthiumq; per-
mut

mutato ter, veluti de rosis dictum est in oleo rosato.

*Calfacit ac roborat ea quæ sunt refrigerata, potissimum verò ventriculū, excitat appetentiam, obstructions auferit, lumbricosque enecat.

Oleum Menthe.

R₂. Menthæ domestice ℥ iiij.

Olei omphacini ℔ j.

Fiat vt supra.

*Ventriculū refrigeratum & imbecillum calefacit: firmat nauſeam, vomitūque reprimit, appetentiam excitat, coctionemque iuuat.

Oleum Sambucinum.

R₂. Olei veteris ℔ j.

Florum sambuci ℥ iiij.

Fit vt oleum rosatū, ter flores innouando.

*Lenit, abstergit, & mundificat cutim, medetur ictēritiæ, & maximè hepatis infirmo, obstructo, & plurimum confert doloribus iuncturarum.

Oleum Populinum Nicolai.

R₂. Olei ℔ vij. ℥ ij.

Vini ℔ iiij.

Gemmarum populi arboris recentium ℔ iiij.

Gemmę populi diutissimè terantur, & macerentur in vino & oleo diebus septem, post

pòst coquantur in duplici vase vsque ad consumptionem vini, deinde exprimatür oleum & reponatur.

*Expedit ad capitis dolorem, arthriticis, nephriticis, & podagricis, & vbicunque dolor fit.

Oleum Liliorum simplex.

R̄. Florum liliorum alborū, abiecto quod croceum est ℥ iiij.

Olei veteris ℔ j.

Fit vt oleū rosatū, ter lilia renouāda sunt.

Oleum Liliorum compositum.

R̄. Foliorum liliorum alborum ℥ ix.

Mastiches,

Calami aromatici,

Carpobalsami ana ℥ j.

Caryophyllorum,

Cinnamomi ana ℥ β.

Croci ℥ iij.

Omnia præter liliorum folia aqua sufficiente viginti quatuor horis macerentur, deinde paululum coquantur, & additis liliis, oleique veteris ℔ ij. aliquantulum bulliant: Tunc omnia iniecta in vas vitreum in sola dies quadraginta: pòst colatum & bene obstructum reponatur.

*Calfaciunt, resoluunt: ob id à frigore dolores thoracis, ventriculi, coli, vteri, renum, vesicæ sedat, lenit & coquit.

Oleum

Oleum Irinum Mesuae.

Rz. Radicum ireos ℥ j.
 Florum eiusdem ℥ ij.
 Macerentur in decoctione aliarum radicum ireos q. s.
 Olei veteris ℥ ij.
 In vase duplici coque, exprime, radicésq; nouas & flores immitte, coquatur denuò, & tertium, colatum seruato & obturato.

*Terget, tenuat, coquit, resolu it porenter: ob id à frigido dolores aurium, hepatis, splenis, vteri, articularum sedat, phlegmonas coquendo suppurat, materias thoracis, & pulmonis coquit: strumas dissipat, & alios tumores duros, spasmus emendat, & narium foetorem.

Aliud Nicolai.

Rz. Olei veteris ℥ xiiij.
 Aqua ℥ iiij. ℥ ij.
 Radicum iridis ℥ iij. ℥ iiij.
 Florum liliorum alborum ℥ xv.

Radicum { Cyperi recentium ℥ vj.
 Helenij ℥ iiij.
 Buglossæ ℥ ij.

Cinnamomi,
 Nardi indicæ,
 Ase odoratæ ana ℥ i.
 Contundantur radices & aliæ species, & macerentur in oleo & aqua diebus quinque;
 ad So

ad Solem vel loco calido: postea in duplici vase coquito donec aqua consumpta fuerit. Refrigerare finito, colato, exprimito, & reponito.

*Vsurpatur ad diuturnum catharrum naribus illitum. Ozenas & putredines narium aufert, tinnitum aurium cum aceto & ruta ex amygdalis amaris commixtum & auribus iniectum tollit, asthmaticis gargarismo adhibito opitulatur: hemorrhoidas veteres inunctum sine colo iniectum educit.

Oleum Ligustrinum siue de Alcanna.

R. Florum ligultri ꝑ̄ iiij.

Olei veteris ꝑ̄ x.

Fit vt rosatum.

*Partes neruosas roborat, capillos a canicie vindicat.

Oleum Nardinum simplex Mesue.

R. Nardi indicæ ꝑ̄ iiij.

Vini,

Aquæ ana ꝑ̄ ij. β.

Olei loti ꝑ̄ j. β.

Minutim incisam macera, & coquantur in duplici vase, donec vinum & aqua per vaporem resoluantur, coletur deinde oleum & reponatur.

Oleum Nardinum compositum Mesue.

R. Nardi indicæ ꝑ̄ iiij.

Sam

Sampſuchi, id eſt, maioranæ ꝑ ij.

Ligni aloës,

Enulæ,

Folij indi,

Calami aromatici,

Foliorum lauri,

Cypero,

Schœnanthi,

Cardamomi ana ꝑ j. ꝑ.

Contundantur omnia leuiter, & illis
adſunde Vini,

Aquæ ana q. ſ.

Olei loti ꝑ vj.

Macerentur horis duodecim, deinde co-
quantur in duplici vaſe ſecundum artem.

*Calfaciunt, tenuant, digerunt, modicè
adſtringūt, proinde affectus omnes frigi-
dos & flatulentos cerebri, ventriculi, he-
patis, lienis, renum, veſicæ, vteri magno-
perè iuuant, naribus iniectum caput pur-
gant, corporis colorem & odorem com-
mendant.

Oleum ſampſuchinum.

R̄. Foliorum ſampſuchi, id eſt, maioranæ

M. iiii.

Serpilli M. ij.

Foliorum myrti M. j.

Abrotoni,

Sifymbrij ſeu menthæ aquaticæ ana M. ꝑ.

Caſiæ ꝑ ij.

Olei

Olei omphacini quantum sufficit.
 Concidito & contundito omnia & impone in vitreum vas, & insola diebus octo: postea exprime, & alias species infunde, coque rursus, & tertium idem facito: deinde colatum repone.

*Lassitudini vtile est, & morbis cerebri & neruorum frigidis prodest, ob id spinæ in balneo inunctum paralyfin iuuat, & spasmodicum cynicum, vulgò torturam oris, naribus iniectum: vt auribus immissum, à flatu tinnitum dissipat, menses ciet, morsui scorpionis prodest.

Oleum Moschellinū Nicolai Alexandrini.

R. Olei puri lb viij.

Aquæ lb iij.

Folij,

Nardi indicæ,

Costi,

Mastiches ana ꝑ iij.

Styracis calamitæ,

Croci,

Nuces moschatas num. iij.

Folium, myrrham, casiam, carpobalsamū & bdellium tere, & per biduum in aqua & oleo macera, postea coque supra lentum ignem in duplici vase vsque ad consumptionem aquæ: deinde cola, & reliqua in tenuissimum puluerem redacta insperge

præter

præter moschum: iterum macera & coque
parumper: vltimò moschum addito: pro-
bè omnia misceto & repone, & interdum
vas agitato.

*Est optimum ad omnem frigiditatem
corporis, potissimum vetriculi, & ad do-
lorem lateris foris inunctum: Stranguria
& colico vexatis, & ad omne neruorum
vitium illitum optimè facit, miscetur epi-
thematibus & emplastris quæ ad stoma-
chi & renum affectiones asciscuntur.

Oleum Hyperici.

℞. Summitatum hyperici ℥ iij.
Macerentur in vino odorifero diebus tri-
bus & noctibus, bulliant deinde in vase
duplici obturato orificio vasis: postea ex-
prime, & recentis hyperici summitatum
bene tritarum par pondus iniice, & ma-
cera dies tres ac noctes: postea adde.

Terebinthinx ℥ iij.

Olei veteris ℥ vj.

Croci ʒ j.

Coquantur in duplici vase vsque ad vini
consumptionem, cola & repone.

*Calidum est & siccum, & tenuium
partium: vulnera incisorum neruorum
consolidat & combustionem ignis: sedat
dolores fœmoris & vesicæ, & prouocat
vrinam.

Y

Oleum

Oleum Hyperici Magistrale.

R̄. Olei veteris ℥ iiij.
 Vini albi potentis ℥ j.
 Florum hyperici cum semine recentium
 M. iiij.

Tere & macera in vase vitreo, obturato
 eius orificio, duos dies: coque in duplici
 vase, & fortiter exprime: in colaturam
 iniice alios flores, vt dictum est, & tertio
 idem facito: deinde colato, & ad singulas
 colaturæ libras adde

Terebinthinæ ℥ vj.

Olei absinthij ℥ iiij.

Dictamni,

Gentianæ,

Cardui benedicti.

Tormentilla,

Carlinæ,

Calami aromatici ana ℥ ij.

Lumbricorū in vino pluries lotorū ℥ ij.

Terantur omnia & insolētur triginta aut
 quadraginta diebus, & bene obturatum
 reponas.

*Ad eadem vtile, superiori tamen effi-
 caciū est.

Oleum de Capparibus.

R̄. Corticis radicū capparis ℥ j.

Corticū tamarisci,

Foliorū tamarisci,

Seminis

Seminis agni,

Ceterach siue asplenij,

Cyperij ana ℥ ij.

Olei oliuarum ℔ j.

Aceti albi fortis,

Vini albi ana ℥ ij.

Trita leuiter coquantur in duplici vase
vsque ad vini consumptionem & aceti.

*Ad duritiem, obstructionem, & dolorē
splenis vtile est, & omnē eius ægitudinē.

Oleum Vulpinum Mesua.

R̄. Vulpē integram exemptis interaneis,

Aquæ fontanæ;

Aquæ marinæ ana q. s.

Olei veteris clari ℔ iiij.

Salis ℥ iij.

Coquantur, & inter coquendum adiace

Anethi,

Thymi ana ℔ j.

Coquantur autem donec ab ossibus rece-
dat caro, & aqua consumatur, deinde ex-
coletur oleum & reponatur.

*Ad podagras, reliquasque arthritidis
species, ac dorsū, renūque dolorem est
efficacissimum.

Oleum Scorpionum simplex Mesua.

R̄. Scorpiones num. xxx.

Olei amygdalarum amararum ℔ ij.

Macerentur in vase vitreo stricti orificij

Y 2 probè

pubè obstructo, & insolètur per dies xxx.
 caniculares, vel aliàs tota æstate calidiffi
 mis diebus, postea colatū ad vsus repone.

*Lapidem renum & vesicæ frangit &
 expellit, lumbis, pubi perineo illitum, aut
 per meatum vrinarium iniectum.

Oleum Scorpionum compositum Mesuæ.

R̄. Aristolochiæ rotundæ,

Gentianæ,

Cyperi,

Corticum radicum capparum ana ʒ i.

Olei amygdalarum amararum ℥ j. β.

Macerentur in oleo contusæ radices ad

Solem feruidum diebus xx. in vase vitreo

probè obturato: deinde coquantur aliquā

tulum in duplici vase, iniectis ad vltimū

scorpionibus viuis num. xx.

Iterum serenis diebus xxx. insolentur: po

stremò excolatum oleum reponatur.

*Hoc efficacius est priore, præterea mi
 randarū est virium contra venena omnia
 & pestilentiam.

Oleum castorei magistrale.

R̄. Castorei,

Opopanacis,

Styracis calamitæ,

Carpobalsami,

Galbani,

Spicæ nardi indicæ,

Euphorbij,

Costi ana ʒ ij.

Casiæ,

Cyperi,

Croci,

Schœnanthi,

Piperis

Piperis longi, Pyrethry ana \mathfrak{z} ij. β .
 Piperis nigri, Olei \mathfrak{lb} iij.
 Sabinæ, Vini \mathfrak{lb} ij.

Galbanum & opopanaxem in vini parte seorsim dissolues, deinde reliqua omnia contusa cum oleo & reliqua vini parte coques ad vini consumptionem in duplici vase: postea cola, & gummi dissoluta oleo adfundes, & iterum coques in duplici vase ad consumptionem vini, & sæpius miscens repone.

*Optimum est ad frigidos affectus partium omnium præsertim nervosarum, medetur paralyti, spasmo, tetano, & sedat acerrimos rigores & frigora febrium, si spina dorsi liniatur.

Oleum ex Euphorbio Mesua.

R \mathfrak{z} . Euphorbij \mathfrak{z} β .
 Olei cheyrini \mathfrak{z} v.
 Vini tantundem,
 Coque in duplici vase ad vini consumptionem.

*Iuuat maximè frigidos cerebri & nervorum affectus, cephalalgiam, hemicraniam, lethargum naribus immissum: articulorum quoque & hepatis & splenis dolores illitum iuuat.

Y 3 Oleum

Oleum Costinum Mesuae.

R̄. Costi ℥ ij.

Cassia ℥ j.

Summitatum sampsuchi ℥ viij.

Vini q. s.

Olei oliuarum ℔ iij.

Trita macerentur biduo: deinde coquantur in duplici vase ad consumptionē vini.

*Calfacit, obstructa aperit, neruosum genus roborat, vt neruos, musculos, tendones, ligamenta, ventriculum: præter hæc, hepar & capillos: canitiem ob id moratur, & corporis colorem ac odorem commendat.

Oleum ex Styrace.

R̄. Styracis ℥ iij.

Olei communis ℔ j.

Vini q. sufficit.

Coque in duplici vase ad vini consumptionem.

*Calfacit: ob id cōfert dolentibus à frigore renibus, vesicæ, vterio, neruis, musculis, tendonibus, iuncturis.

Oleum Papauerinum.

R̄. Caputum papaueris,

Foliorum papaueris,

Florum papaueris ana partes æquales,

Olei q. s.

Insolato

Incolato in vase vitreo per octiduū: deinde cola, & noua rursus immitte: idem terriò facito: postremò colatum repone.

*Intemperiem calidam sanat & interortum dolorē somnum quoq; conciliat.

Oleum Mandragoræ Nicolai.

Rz. Olei communis ℥ ij.

| | | | |
|-------|---|--------------------|---------|
| Succi | { | pomorum mandragoræ | ℥ iiii. |
| | | Hyoscyami albi | ℥ ij. |
| | | Papaueris nigri | ℥ iiij. |
| | | Violarum. | |
| | | Cicutæ ana | ℥ j. |

Opij,

Styracis calamitæ ana ℥ β.

Succi cum oleo decem diebus ad Solem macerentur, deinde coquantur in duplici vase ad succorum consumptionem: cola, & opium cum styrace dissolutum paulo oleo probe misceto, & repone.

*Ad nimios capitis dolores valet, & phreneticis male dormientibus, fronti illitum, & naribus iniectum vehementer opitulatur: pulsibus brachiorum & plantis pedū illitū quocunq; modo vigiliis fatigatū, celerrimè obdormiscere facit.

Oleum Nymphetum.

Rz. Florum nymphææ ℥ iiij.

Olei omphacini ℥ j.

Maceretur in Sole diebus decem: deinde

Y 4 exprim

exprime & novos flores immitte, tertio idem facito.

*Vires habet violati, refrigerat tamen magis quàm violatum, minus quàm papauerinum: hypnoticis, & intemperiem partium, vt renum, calidam sanātibus vtiliter miscetur, & veneris tentiginē prohibet genitali inunctum: somnum etiam conciliat.

Oleum Myrtinum Mesuae.

R̄. Succii Foliorum myrti lb̄ j.

Olei communis, id est, oliuarum lb̄ ij.

Coquantur in duplici vase ad succii consumptionem, & adde

Ladani ℥ j. Misce & repone.

*Cerebrum, neruos, cor, ventriculum roborat.

Oleum Lumbricorum,

R̄. Lumbricorum terrestrium lb̄ β.

Probè lauentur in vino, deinde immitantur in

Olei rosati omphacini lb̄ ij.

Vini ℥ ij.

Coquantur in duplici vase ad vini consumptionem, colatum repone.

*Neruos infrigidatos confortat, & vtile est doloribus iuncturarum.

Oleum Balsami Magistrale.

R̄. Terebinthinę lb̄ j. Olei veteris ℥ vj.

Olei

Olei laurini ℥ iiij.

Spicæ nardi,

Cinnamomi ana ℥ ij.

Tegularum recentium bene coctarum
℥ viij.

Tritis trituras, per alembicū destilla.

*Vrinam mouet, lapidem frangit, vermes enecat, aurium tinnitui à flatu crasso, paralyfi, spasmo cynico, ischiadi, gonagræ, podagræ, & cæterarum iuncturarum doloribus prodest, potum aut inunctum: sed parua eius portio, aquæ affectui aptæ mista, bibatur.

Oleum Balsami Petri de Ebano.

R̄. Myrrhæ,

Aloës,

Spicæ nardi,

Sanguinis draconis,

Thuris,

Mumiæ,

Opopanacis,

Carpobalsami,

Bdellij,

Hammoniæ,

Sarcocollæ,

Croci,

Mastiches,

Gummi arabici,

Styracis liquidæ ana ℥ ij.

Y 5

Ladani

Ladani,

Castorei ana ʒ ij. β.

Moschi ʒ β.

Terebinthinæ ad pondus omnium.

Tritis conterendis, miscentur omnia & a-
lembico destillentur secundum artem.*Eadem potest quæ præscriptum & ef-
ficacius.*Liquor exsicicans ad V ulnera.*

℞. Myrrhæ,

Aloës,

Thuris,

Mastiches ana ʒ j.

Terebinthinæ ℥ ij.

Resinæ abietinæ,

Radicum consolidæ ana ʒ iij.

Gummi elemi ʒ ij.

Croci ʒ j.

Aquæ vitæ ℥ iij.

Contusis contundēdis, & omnibus probè
mixtis, immitte in vitreū vas, obstructo
orificio, bulliāt omnia in duplici vase v-
na hora: deinde colatum recondatur in
phiala vitrea bene obturata.

DE

DE VNGVENTIS,
EMPLASTRIS, ET
CERATIS.

Sectio decima.

Vnguentum infrigidans Galeni.

Recip. Olei rosati omphacini ℥ j.
Cerae albæ ℥ iij.

Ceram in oleo liquabis, & sepius aqua frigida lauabis donec albescat: postremum aqua rosacea lauato, & paululum aceti rosati addito.

*Refrigerat febres ardentes, calorē hepatis, & sedat dolores capitis circū tēpora, super hepar, & per spinā dorsi linitum.

Vnguentum pectorale Magistrale.

R. Olei amygdalarum dulcium ℥ iiij.

Olei chamæmeli,

Olei violati ana ℥ iij.

Butyri recentis ℥ vi.

Adipis gallinæ,

Adipis anatis ana ℥ ij.

Iridis ℥ ij.

Croci ℥ β.

Cerae albæ ℥ iij.

Ceram & adipēs in oleis liquato, deinde sepius lauato aqua Capillorum veneris, aut aqua hordei,

His

His probè lotis, adde iridem & crocum
in tenuissimum puluerem redacta.

*Mitigat dolores pectoris & tussim, di-
gerit, maturat, faciliat sputim, & resoluit
pleuresim.

Vnguentum stomachicum Magistrale.

Rz. Olei absinthij.

Mastichini,

Nardini ana ʒ j.

Rosarum rubrarum,

Coralli rubri,

Caryophyllorum,

Cinnamomi,

Ligni aloës,

Mastiches,

Menthæ,

Schœnanthi ana ʒ j.

Ceræ quantum sufficit.

Fiat vnguentum secundum artem.

*Ventriculum & hepar roborat, horū
dolorem à frigido lenit, appetentiam ex-
citat, coctionem iuuat.

Vnguentum ad vermes magistrale.

Rz. Succ

Absintij,

Abrotoni,

Centaurij minoris,

Radici aristolochiæ rot.

Perficariæ,

Foliorum perficæ,

Foliorum lupini,

Radic

Radicum ebuli,

Balaustij ana ℥ j.

Succi Porri ℥ ij.

Nasturtij aquatici ℥ j.

Olei absinthij ℥ j. β.

Ceræ q. f.

Fiat vnguentum secundum artem.

Vnguentum ad oculos Magistrale.

℞. Carnis pinguis exsiccata,

Maluatici vini ana ℥ iiij.

Tutiæ præparata ℥ j.

Ceræ albæ q. f.

Caro cum maluatico coquatur vsque ad vini maluatici consumptionem, deinde cola, & cera liquata, adde postremò tutiã: probè commisceto & repone.

Aliud Magistrale.

℞. Butyri recentis ℥ iiij.

Ceræ albæ ℥ j.

Liqua, & laua sæpius aqua rosacea, & prunorum, & adde

Tutiæ præparata ℥ β.

Camphoræ ∅ ij. Fiat vnguentum.

Vnguentum ad Ambusta Magistrale.

℞. Olei rosati ℥ viij.

Olei ex ouis ℥ ij.

Nitri albi puluerisati tantundem,

Ceræ albæ ℥ j. β.

Corticis mediani sambuci M j.

Fiat

Fiat vnguentū lento igne secundū artem.

Aliud ad idem.

℞. Hedera foliorum,
Baccarum hedera ana part. æquales.
Contunde & succum exprime:
Ex huius autem succi ℥ j.
Olei communis tantundem
Cera q. s.
Fiat vnguentum.

Vnguentum de Artanita maius Mesua.

℞. Succu cyclaminis ℥ iij.
Cucumeris agrestis ℥ j.
Olei irini ℥ ij.
Butyri ℥ j.
Pulpæ colocynthidis ℥ iiij.
Polipodij ℥ vj.
Euphorbij ℥ β.
Contundenda terātur. & macerentur suc
cis & oleis dies octo in vase vitreo: post
semel feruefac in duplici vase, cola: Cola
tura adde.
Sagapeni ℥ vij. β.
Myrrha ℥ iij.
Dissoluantur hæc in aceto, & coquantur
in prædicta colatura ad succorum con
sumptionem: deinde adde
Cera ℥ v.
Fellis vaccini ℥ vij. β.
Feruefac simul donec cera liquecat: rone
insp

insperge paulatim puluerem subsequen-
tium medicamentorum.

Scammonij,

Aloës,

Colocynthis,

Mezerei,

Turbith ana ʒ vij. β.

Salis gemmæ ʒ iiij. β.

Euphorbij,

Piperis longi,

Zingiberis,

Chamæmeli ana ʒ iiij.

Misce & fiat vnguentum.

* Illitum stomacho, vomitu purgat:
hypogastrio autem inunctum, aluum
deiciit: ob id hydropicos mirè iuvat seor-
sum excrementum largè vacuando: ver-
mes quoque necat & educit. Adhibetur
non potentibus sumere medicamentum
purgans.

Vnguentum Rosatum Mesuæ.

R. Axungie porcine lb j.

Lauatur nouies aqua calente, & toties fri-
gida: deinde addito

Rosarum rubrarum recentium lb j.

Probè teratur, & marcescant cum ea dies
septè: coque igni lento, cola: rursus tātun-
dem rosarū recētiū cum ea tere vt supra:
idem

idem fac tertio: quarto autem præter ro-
sas affunde

Succi rosatum rubratum ℥ vi.

Olei amygdalarum dulcium ℥ v.

Coque igni lento ad succi consumptionem, cola & repone,

Alij addunt Opij ℥ j.

*Phlegmonas, erysipelata, herpetas sedat, cephalalgiam calidam, & ventriculi ac hepatis intemperiem calidam mitigat.

Vnguentum Violatum.

Fit vt rosatum, sed ex violis nigris.

*Idem quod rosatum pollet: præterea pleuritidi, & thoracis inflammationi prodest.

Vnguentum Somniferum.

R. Olei papauerini,

Nymphæ ana ℥ β.

Opij,

Cassæ,

Croci ana ℥ j.

miscæ cum pauca cera.

Vnguentum album Auicennæ, Vnguentum de Cerusa dictum

R. Lithargyri ℥ j.

Ceruse ℥ v.

Ceræ albæ ℥ vij.

Olei rosati ℥ ij.

Albuminis ouorum num. j.

Cera

Cera liquata in oleo rosato lento igni, in-
iice cerusam & lithargyrū probè contrita
miscē, & postremò adde albumen oui.

Alij addunt caphuræ momentum &
caphuratum vocant.

*Pollet aduersus vlcera, scabiem & adu-
stionem.

Vnguentum de Tutia Magistrale.

Rz. Olei rosati,

Olei omphacini ana ξ vj.

Olei myrtini,

Vnguenti populei ana ξ ij.

Foliorum plantaginis,

Solani ana M. ij.

Herbas minutim incisas cum oleis miscē
bis, & diebus octo marcescere sinēs: dein-
de coctas aliquantulum colabis, & cola-
turæ addes

Ceræ albæ ξ iiij. β .

Coquantur igni lento donec cera liquata
sit, semper agitādo, aufer ab igne & adde

Lithargyri ξ vj.

Pompholigis siue tutiæ præparatæ,

Ceruse tritæ ana ξ ij.

Plumbi vsti ξ vi.

Caphuræ ξ j.

Omnia in pilam plumbeam iniecta horis
duabus continuis agitentur, deinde in va-
se vitrato reponantur.

Z

Aliud

Aliud simile, Nicolai.

℞. Olei rosati,
 Cerae albæ ana ʒ ʒj.
 Succii solani ʒ j.
 Cerae lotæ ʒ ij.
 Plumbi vsti & loti,
 Tutie præparatæ ana ʒ j.
 Thuris ʒ β.

Ceram liqua cum oleo lento igni, & in pi-
 lam plumbeam iniice, additis quæ terêda
 sunt in tenuissimum puluerem reductis,
 moue continuo, & paulatim succum su-
 pradictum instillato, perpetuo mouens
 sex horis continuis.

*Vtilia sunt ad exsiccanda erysipelata, vul-
 nera sordida purganda, & sananda tibia-
 rû vlcera, aliorum locorum concaua vel
 dissipata replent, refrigerat & cicatrizat.

Vnguentum de Lithargyro.

℞. Lithargyri ʒ ij. Aceti ʒ j.
 Cerae ʒ β. Olei rosati q. s.
 Fiat vnguentum lento igni: Potest etiam
 fieri crudum in mortario plumbeo.

*Vlcera, & excoriationes à calore So-
 lis, strictiore calceo, itinere, equitatione,
 frictione, & coitu sanat.

Tripharmacum crudum Mesua.

℞. Lithargyri,
 Aceti fortis ana ʒ ij.

Olei

Olei communis ꝑ vj.

Lithargyros leuissimè tritus mouetur cōtinuò paulatim affusis oleis vicissim & aceto.

*Prodest scabiei, & cutis vlceribus, vt superius.

Vnguentum ad scabiem.

R̄. Styracis liquidæ,

Terebinthinæ lotæ,

Butyri loti ana ꝑ ij.

Succi limonum ꝑ j. β.

Hellebori nigri puluerisati ꝑ j.

Salis ꝑ ij.

Misce, fiat vnguentū in mortario plūbeo.

Vnguentum de Minio.

R̄. Minij leuissimè triti ꝑ ij.

Olei rosati,

Olei myrtini ana ꝑ ij.

Coquantur lento igni cum

Ceræ albæ ꝑ β.

Aliud de Minio Camphoratum.

R̄. Minij triti ꝑ iij.

Lithargyri ꝑ ij.

Cerulæ ꝑ j. β. Turia,

Camphoræ ana ꝑ iij.

Olei rosati ꝑ j. β.

Ceræ albæ ꝑ ij.

Liquatam ceram cū oleo lento igni, mis-

ce in mortario plūbeo cum reliquis rebus.

Z 2 tenu

tenuissimè tritis.

*Valent ad vlcera mala & antiqua.

Tetrapharmacon Galeni.

Rz. Picis nigræ,

Resinæ,

Ceræ,

Adipis vaccini,

Fiat vnguentum.

*Calfacit, humectat, dolorem sedat, & pus mouet.

Macedonicum ex iisdem constat: sed in super additur thuris vna pars.

Vnguentum Basilicon minus Mesue.

Rz. Ceræ flauæ, Picis græcæ ana ℥ j.

Resinæ pinguis, Olei communis q. s.

Fit vnguentum lento igni,

Alij terebinthinam addunt: Alij verò terebinthinam picis loco ponunt.

*Idem pollet quod basilicon maius, sed imbecillius: recentibus tamen capitis & neruosarum partium vulneribus & vlceribus aptius erit.

Vnguentum Basilicon maius Mesue, Galeni Enneapharmacum est.

Rz. Ceræ albæ, Terebinthinæ,

Resinæ pini, Thuris,

Sepi vaccini, Myrrhæ ana ℥ j.

Picis græcæ, Olei communis q. s.

Picis nigræ, Fiat vnguentum.

Ali

Aliter.

Ceræ ℥ vi. Reliquorū ana ℥ j. β.
 Picis græcæ ℥ iij. Olei q. s.

*Vlcera phlegmone carētia, præsertim
 partium neruofarū, terget, carne implet.

Vnguentum fuscum Nicolai.

R̄. Olei ℥ j. β.

Ceræ nouæ ℥ iij.

Picis græcæ } ana ℥ ij.
 Picis nigra }

Mastiches }
 Chalbani } ana ℥ j.
 Thuris }

Sagapeni ℥ ij.

Therebinthina ℥ j.

Fiat vnguentum.

*Sanandi vim habet & extrahendi.

Aliud.

R̄. Olei communis } ana ℥ j.
 Sepi hircini }

Picis nigra ℥ β.

Picis græcæ ℥ iij.

Mastiches,

Thuris,

Galbani,

Hammoniacy } ana ℥ β.
 Opopanacy }
 Sagapeny }
 Ceræ, }

Z 3 Ole

Oleum, sepum, & picem liquabis : deinde gummi dissoluta secundum artem adicies: deinde reliqua tenuissimè trita, semper agitando donec percoquantur. His ab igne sublatis adde

Terebinthinæ ℥ ij.

Probè misceantur & reponantur.

Vnguentum è Caprifolio Magistrale.

R̄. Caprifolij M. iiij.

Caprifolium minutim incisum, & in vino optimo maceratum die vno, coques ad tertias, cola, & colaturæ adde

Olei rosati ℥ vj.

Resinæ pinguis

Terebinthinæ } ana ℥ ij.

Ceræ flabæ

Fiat vnguentum vt artis est.

Vnguentum Capitale Conciliatorum.

R̄. Gummi elemi ℥ iiij.

Hammoniacy ℥ ij.

Terebinthinæ } ana ℥ iiij. β.

Resinæ pini

Ceræ q. s.

Fiat vnguentum, gummi dissolutis secundum artem:

Percoquitur etiam amplius vt cerati formam sumat.

Vng

Vnguentum è Caprifolio, Carpi.

R^e. Terebinthinæ

Resinæ pini

Ceræ nouæ

Olei rosati ℥ viij.

Mastiches

Thuris

Gummi elemi ℥ ij.

Caprifolij

Betonicæ

Vini optimi lb x.

Caprifolium & betonicam tenuissimè terito, & macera vino horis vigintiquatuor, deinde reliqua adde, præter gummi, thus, & mastichen. Coquantur luculento igni, donec vini pars dimidia consumpra sit. imò donec virescere incipiat, cola, & concreescere finito: deinde, effuso vino, rursus coquatur, donec quicquid remanserit vini absumptum sit: iterum cola, & reliqua adde in puluerem tenuem redacta, & coque lento igni donec coalescant semper agitando: aufer postmodum ab igne, & frigido loco reponè donec refrixerit perpetuò mouens.

*Ad capitis vulnera præstantissimū est.

Vnguentum è Calcè Magistrale

Calcem singulis diebus semel lauabis, & in fundo fidere permittes, & aquā spon-

Z 4 gia

gia exprimes decem diebus continuis: de
inde aqua rosacea lauabis, & siccari fines.

R. Huius calcis ita extinctæ \bar{z} iij.

Olei rosati lb j.

Ceræ albæ \bar{z} iij.

Ceram in oleo liquato. Huic ab igne exē-
ptę & iam concrefcere incipienti, Calcem
lęuiffimē tritam admisceto, & reponito.

*Ad ambufta valet.

Vnguentum Populeon Nicolai.

R. Oculorum populi arboris recentium
menfe Martio collectorum lb j. β .

Axungię porcine preparatę lb iij.

Oculi populi contundantur & maceren-
tur cum axungia, donec fequentes herbę
colligi queant: deinde

| | | |
|--------|--------------------------|---------------------|
| | Papaueris agrestis | } añ \bar{z} iij. |
| | Mandragorę | |
| | Hyofcyami | |
| | Solani | |
| | Vermicularis aut | |
| Folio- | crassulę | |
| rum. | Lactuę | |
| | Semperuiui | |
| | Bardanę | |
| | Portulacę | |
| | Violarię | |
| | Vmbilici veneris | |
| | Sumitatū pruni tenerarum | |

Herbę

Herbæ contundantur, & misceantur axū-
gix & oculis populi: adde
Vini optimi q. satis est.

Coquantur ad vini consumptionem: dein
de cola exprime, & fiat vnguentum.

* Contra nimium calorem valet, & tē-
poribus illitum somnum conciliat.

Vnguentum Dialthea simplex

Nicolai.

R. Rad. althææ ℥ ij.

Seminis lini } añ ℥ j. Cerae ℥ j.

Fœnigræci } Terebīthinę ℥ ij.

Olei ℥ iiij. Resinæ ℥ vj.

Radices sectæ, & cum seminibus contusæ
macerentur tribus diebus in aquæ ℥ viij.
deinde feruefiant, & mucilaginis inde ex-
pressæ ℥ ij. sume, & coque cū aliis rebus,
donec aquosum illud in mucilagine con-
sumptum fuerit: & fac vnguentum.

* Emolliendi vim habet, calefacit, &
humectat.

Vnguentum Dialthea cum Gummis

Nicolai.

R. Radicum althææ ℥ ij.

Seminis lini } añ ℥ j.

Fœnigræci } añ ℥ j.

Pulpæ scyllę ℥ vj. Terebinthinę ℥ ij.

Olei ℥ iiij. Resinæ } añ ℥ vj.

Cerae ℥ j. Picis græcæ } añ ℥ vj.

Z 5 Fiat

Fiat vnguetum vt superius: deinde addes
gummi subsequētia dissoluta in aceto,
Galbani

Gummi hederæ } ana } ij.

Misceantur probè & reponantur.

* Valet propriè addolorem pectoris ex
frigiditate & pleurisi, & super pectus in-
unctum sanat omnia loca infrigidata: ca-
lesfacit, mollificat, & humectat.

Vnguentum Comitissa Gulielmi de

Varignana.

Rt. Corticis } Glandium
mediani } Castanearū
 } Quercus ar-
 } boris

Baccarum myrty

Caudæ equinæ

Gallarum

Corticum fabarum

Acinorum vuarum

Calycum glandium

Sorborum immaturorum

siccorum

Mespilorum acerborum sic-
corum

Foliorum } Capparis
 } Prunioli syl-
 } uestris

Radicum chelidonij,

añ M. j.

Cont

Contundantur aliquantulum, & coquantur in decocti plantaginis q. s. ad dimidij consumptionem: cola & in dicta colatura laua subsequencia

Olei { Myrtini } ana lb j. β.
 { Mastichini }

Ceræ nouæ ℥ viij. β.

Liqua & laua vt dictū est: postea insperge frequentium rerum tenuissimū puluerem.

Corticis { Castanearum }
 { Glandium }
 { Quercus arboris } ana ℥ j.

Gallarum

Succi hypocistidis

Cineries ossium cruris bubuli ℥ β.

Baccharum myrti } ana ℥ β.

Acini vuarum }

Trochiscorum de charabe ℥ ij.

Misce, fiat vnguentum bonę consistentiæ.

*Inceptum abortum prohibet, hæmorrhoides sistit, ac laxatos renes conciliat.

Vnguentum Santalinum Mesua.

R̄. Rosarum rubrarum ℥ j.

Sandali { Rubri ℥ j. ℥ ij.

{ Citrini } ana ℥ vj.

{ Albi } ℥ vij.

Spodij

Spodij ζ β .
 Caphura ζ ii.
 Ceræ albæ ζ iii. ζ vi.
 Olei rosati lb i.

Ceram liquabis in oleo, & sæpius aqua frigida lauabis: deinde reliqua in tenuissimū puluerem trita addes, & facies vnguentū.

*Phlegmonas & intēperaturas omnes calidas ventriculi, hepatis, & partium aliarum potentissimè extinguit.

Defensiuum magistrale.

R ζ . Boli armeni
 Sanguinis draconis } ana ζ i.
 Terræ sigillatæ }
 Olei rosati ζ vi.

Ceræ ζ i. β . Aceti ζ iiiii.
 Coquantur simul oleum, cera, & acetum, donec acetum consumptum fuerit: deinde sublatur ab igne vbi refrigerari cœperit, adde reliqua in tenuissimum puluerem trita.

Mundificatiuum Magistrale.

R ζ . Mellis rosati colati ζ i. β .
 Terebinthinæ claræ ζ iii.

Succi { Apii } ana ζ β .
 { Prasij }

Succi absinthij ζ ii.

Simul coquantur, deinde addantur

Farin

Hordei }
 Fabarum } ana 3 vj.
 Farinæ }
 Lupinorum } 3 iiij.
 Orobi }

Sarcocollæ }
 Myrrhæ } ana 3 j. β.

Reduc in puluerem, & fac vnguentum.

Vnguentū viride Andromachi ex Galeno.

Rz. Resinæ pini ℥ ij.

Ceræ ℥ j. β.

Olei communis 3 viij.

Aeruginis æris 3 iiij.

Resinam & ceram in oleo liquabis: deinde æruginē æris tenuissimè tritā addito.

*Recentia vulnera, & quæcunque non magna sunt, sanat.

Vnguentum Apostolorum Auicenna.

Rz. Ceræ albæ.

Terebinthinæ }
 Resinæ } ana 3 xiiij.

Hammoniæ

Aristolochiæ longæ

Thuris } ana 3 vj.

Bdellij

Myrrhæ }
 Galbani } ana 3 iiij.

Lithargyri 3 viij.

Opopanacis } ana 3 ij.

Aeruginis

Olei

Olei communis ℥ ij.

Hyeme verò ℥ iij.

Gummi in aceto albo soluto coque cum oleo, cera, resina, terebinthina & lithargy ro ad aceti consumptionem: deinde reliqua adde tenuissimè trita.

*Efficax est contra vulnera, & vlcera difficilia & fistulas, consumit carnem mortuam, & consumptam restaurat, duram mollit, & plagas sanat.

Vnguentum Aegyptiacum Mesua.

Rz. Aeruginis ℥ v.

Mellis ℥ xiiij.

Aceti albi ℥ vij.

Coque igni, & tantisper moue, donec fiat rubrum.

Alij sumunt eius medicamenti ℥ vj.

Calcanthi vsti ℥ ij.

Olei rosati ℥ iij.

Ceræ q. s.

Fiat vnguentum.

*Confert ad vulnera antiqua, fistulasq; terget: Carnis excrescentiæ medetur, vehementerque exsiccat.

Aliud Ioannis de Vico.

Rz. Aquæ plantaginis

Vini malorum granatorum

Mellis

} ana ℥ ij.

Alumi

Aluminis rupis } ana 3 x.
 Aeruginis }
 Coque & moue donec fiat rubrum.

Aliud Guidonis.

Rz. Mellis lb j. Aeruginis 3 j.
 Aceti optimi 3 vj. Aluminis rupis 3 v.
 Coque & moue, donec rubrum fiat.

Emplastrum de Meliloto Mesua.

Rz. Meliloti 3 vj.

Florum chamæmeli

Fœnigræci

Baccarum lauri } ana 3 ij.

Radicum althææ

Comarum absinthij

Seminis absinthij

Cardamomi

Iridis

Cyperij } ana 3 j. β.

Spicæ nardi

Cassia

Seminis ammi

Foliorum persici 3 ij.

Hammoniæ 3 x.

Styracis } ana 3 v.

Bdellij }

Terebinthinæ 3 j. β.

Ficus pinguis num. xij.

Sepi hircini } ana 3 ij β.

Resinæ picis }

Ceræ

Cerae ℥ vj.

Olei sampfucini

Olei nardini

Confice, sic

Fit decoctio

Meliloti

Fœnigræci

Chamæmeli

} ana ℥ ij.

} ana q. s.

Coquantur ad medias, deinde in colaturam immixtis triturandis subtilissimè pulverisatis, rursus coquantur additis oleis, terebinthina, & similibus, gummisque in aceto dissolutis: postremò adduntur radices & ficus simul cocti & bene contusi. Misce, fiat emplastrum.

*Mollit duritiem omnem ventriculi, hepatis, lienis, viscerum, & reliquorum. Dolorem item vehementer sedat, hypochondriâque tensa sanat.

Dia Melilotou Andromachi ex Galeno.

℞. Nardi gallicæ

Cypero

Iridis

Myrrhæ

Croci ℥ iiij.

Meliloti ℥ xxv.

Hammoniæ

Terebinthinæ

} ana ℥ viij.

} ana ℥ i.

Cerae

Ceræ ꝑ c.
Olei cyprini ꝑ vj.
Aceti q. s.
Fiat emplastrum.

*Eadem quæ præcedens pollet.

Polyarchion Galeni.

R̄. Ceræ
Terebinthinæ
Bdellij
Hammoniacy
Cardamomi
Cyperi
Amomi

} ana ꝑ j.

Spicæ nardi
Crocij
Myrrhæ
Thuris
Cinnamomi

} ana ꝑ xxv.

Olei cyprini ꝑ xvj.
Vini odoriferi q. s.
Fiat emplastrum.

*Ad lienosos, & hepaticos.

Philagyanum Pauli.

R̄. Crocij ꝑ j. ꝑ.
Aloës
Hammoniacy
Bdellij
Styracis
Pinguedinis anserinæ ꝑ ij.

} ana ꝑ j.

A a Oesypi

Oesyphi \mathfrak{z} iij.
 Daçylorum \mathfrak{z} ij. Cerae \mathfrak{z} ij.
 Spica nardi } ana \mathfrak{z} vi.
 Olei melini }
 Vini q^o f.

Fiat emplastrum.
 *Idem praestat cum praecedenti.

Martiatum Pauli.

R^x. Mastiches }
 Cerae } ana \mathfrak{z} iij.
 Styracis }
 Oesyphi \mathfrak{z} vj.
 Terebinthinae \mathfrak{z} j.
 Fiat emplastrum.

*Ad articulorum morbos, & corporis
 languores ac resolutiones.

Martiatum Nicolai.

R^x. Foliorum { Lauri \mathfrak{z} iij.
 Rutae \mathfrak{z} ij. β .
 Maioranae \mathfrak{z} ij.
 Rosmarini \mathfrak{z} j. β .
 Myrti \mathfrak{z} j.
 Balsamitae } ana \mathfrak{z} vj.

Seminis ocymi
 Butyri \mathfrak{z} v.
 Styracis
 Medullae cervinae } ana \mathfrak{z} iij.
 Adipis vrsini }
 Adipis gallinacei }

Masti

Mastiches ζ iij.

Thuris ζ ij. β .

Olei nardini ζ j.

Olei communis lb vi.

Cera lb iij.

Confice vt artis est.

*Ad podagram frigidam siue calidam, paralyticos, arthriticos, nephriticos, ischidicos, & ad omnia vitia, & doleres neruorum valet.

Emplastrum Diaphanicon calidum Mesue.

R. Cera ζ ij.

Olei rosati ζ ana ζ iij.

Olei nardini ζ ana ζ iij.

Simul, liquentur: deinde

Dactyli ficci num. xl.

Panis biscocti ζ v.

Macerentur in vino odoro biduum: post

Carnis cydoniorum in vino coctorum

ζ j.

Per multum teres cum dactylis & pane biscocto: deinde misce cum cerato superiori ex cera oleo rosato & nardino, & adde subsequencia in mortario bene contusa

Mastiches

Thuris } ana ζ ij. β .

Absinthij }

A a 2 Ligni

Ligni aloës

Macis

Myrrhæ

Aloës lotæ

Spicæ nardi

Acaciæ

Gallię moschatae

Ramich

Calami aromatici

Ladani ℥ ij. Misce, fiat emplastrum.

*Ventriculū & hepar firmat: ob id lien-
teriam, & dysenteriam hepaticā adiuuat.*Emplastrum Diaphanicum frigi-
dum Mesuæ.*℞. Dactylorum maturitati proximorum
in vino austero coctorum ℥ v.

Panis biscōcti ℥ j.

Carnis cydoniorum in vino austero co-
ctorum ℥ j. β.

Styracis calamitæ

Mastiches

Ladani Acaciæ

Omphacij

Florum labruscæ

Rosarum rubrarum

Sandali citrini

Ramich

Myrrhæ

Ligni aloës

} ana ℥ j.

} ana ℥ iiij.

Cera

Ceræ ℥ iiij.
 Olei rosati ℥ xv.
 Vini austeri q. s.
 Fiat emplastrum.

*Ventre[m] totum inferiorem, ne aliarum partium recrementa suscipiat, roborat, coctionem iuuat: ad hæc vomitum, choleram morbum, lienteriam, dysenteriam hepaticam iuuat.

Emplastrum de baccis Lauri Mesue.

R̄. Thuris }
 Mastiches } ana ℥ j.
 Myrrhæ }
 Baccarum lauri ℥ ij.
 Cyperi } ana ℥ β.
 Costi }
 Mellis despumati q. s.
 Fiat emplastrum.

*Ventriculi, intestinorum, hepatis, renum, vesicæ, vteri, & partium aliarum dolorem à flatibus aut intemperie frigida ortum placat.

Emplastrum Galeni.

R̄. Farinæ }
 Fabarum }
 Orobi } ana ℥ j.
 Iridis }
 Oxymellis ℥ ij.
 Picis ℥ ii.
 Fiat emplastrum.

A 2 3

Empla

*Emplastrum de tribus farinis**Aucenna.*

Rz. Farinæ { Fabarum } ana ℥ ij.
 { Orobi }
 { Hordei }

Lixiuij q. ℥.

Coque lento igni & adde

Oxymellis simplicis q. ℥.

Emplastrum de quinque farinis eiusdem.

Rz. Farinæ { Fabarum } ana partes
 { Orobi } æquales
 { Ciceris }
 { Lupinorum }
 { Hordei }

Lixiuij, Oxymellis simpl. ana q. ℥.

*Emplastrum ex fermento Demo.**criti ex Mesue.*

Rz. Mellis } ana ℥ i.

Fermenti }
 Visci querni ℥ iij.

Hammoniaci in aqua fœnigræci, aut lacte mori arboris ℥ iij.

Fæcis olei veteris q. ℥.

Fiat emplastrum.

*Spinas & surculos extrahit, ac etiam ossa fracti cranij, meningibus infixæ etiam profundius.

Alind

Aliud simile.

Rz. Fermenti
 Mellis
 Olei communis
 Lactis muliebris
 Vitelli ouorum
 Fiat emplastrum.

ana ʒ ij.

*Coquit & maturat phlegmonas, abscessusque rumpit. Si bdellium & hordei farina miscetur, his spinas extrahit: idque valentius si his dissoluta aceto galbani pars dimidia iungatur.

Emplastrum de Crusta panis Montagnana.

Rz. Mastiches
 Menthæ
 Spodij
 Coralli rubri
 Santali } rubri
 } albi

ana ʒ ij.

Crustæ panis tostæ & maceratæ per horam mediam ʒ ij.

Olei mastichini } ana ʒ ij.

Olei cydoniorum }
 Farinæ hordei q. l.

Fiat emplastrum.

*Valet in vomitu puerorum, & his qui cibum retinere non possunt.

A a 4

Empla

Emplastrum è Calamintha.

R̄. Calaminthæ montanæ }
 Farinæ { hordei } ana ꝑ ij.
 { tritici }
 Oesypi
 Croci ḡ vj.
 Aquæ }
 Vini } ana q. s.
 Fiat emplastrum.

Emplastrum ex allis Aëtij.

R̄. Ceræ lb ij.
 Picis græcæ }
 Medullæ ceruinæ } ana ꝑ vj.
 Nitri albi ꝑ viij.
 Olei lb iiij.
 Allia num. xx.
 Allia mundata coque oleo, & his colatis
 adde ceram, postremò nitrum bene pul-
 ueratum: fiat emplastrum.

*Vim attractoriam habet: Facit ad om-
 nem duritiã, abscessus, furûculos, stru-
 mas, inguinum tumores, fistulas, impeti-
 gines humidas, ac mammas induratas.

Hydrelæon Galeni.

R̄. Lithargyri argenti lb j.
 Aquæ limpida }
 Olei puri } ana lb ij.
 Lithargyros leuissimè terendus est, & re-
 qua

liqua diligenter mouēda in mortario lapideo, deinde coquenda lento igni, ex lignis acapnis, aut carbonibus bene accensis: Ad Solem conficiendum est medicamentum die serena, vt albescat: pereunte igne alij carbones imponendi sunt, sed bene accensi: Coquatur autem semper agitando donec cerati crassitiem adipiscatur: Potest autem in vnguenti formam redigi si minus coquatur.

Fit etiam ex libris tribus olei & aquæ: etiam ex lithargyri ℥ iij. olei tātundem, & aquæ ℥ ij. tunc enim candidius fit citiusque coquitur.

* Refrigeratoriam habet v im medio-
crem, cuius auxilio exulceratis partibus
ne quid influat impedit, & quod iam influ-
xit, ad partes circūiacentes retrudit: hinc
pruritus desquamata, & parua hulcera
perfanat.

Oxelaum Galeni.

℞. Lithargyri argenti ℥ j.

Olei veteris } ana ℥ ij.

Aceti optimi }

Confice vt supra.

Componitur etiam ex olei & aceti ℥ ij.

β. Vel ex singulorum ℥ iij. tunc
enim nigrius est & valentius.

Aa s Exlc

*Exsiccat, fistulas quæ nõdum callũ dũ
rũ habent, curat: vulnẽra cruẽra glutinat.

Oenelaum Galeni.

R. Lithargyri argenti ℥ j.
Olei clari } ana ℥ ij.
Vini albi optimi }

Coque & confice vt superiora,

*Exsiccat, proinde in rheumaticis di-
spõsitionibus vrile est, & cruẽta vulnẽra
sanat.

Dia pipericos Galeni.

R. Lithargyri argenti } ana ℥ j.
Cerusæ }

Olei communis ℥ ij.

Ceræ ℥ vi.

Terebinthinæ ℥ iij.

Thuris ℥ j. β.

Aluminis ℥ vi.

Piperis ℥ iij.

Fit in hunc modum.

Lithargiros leuissimẽ tritus coquendus
est ad Solem in oleo, & tantisper mouen-
dus, donec emplastrĩ crassitiẽ habeat, nec
manus inquinet: deinde additur cera & te-
rebinthina: his liquatis iniice puluerẽ te-
nuissimum thuris aluminis, & piperis: po-
stremò cerusam tenuissimẽ pulueratam,
semper mouẽdo.

Confice ceratum ad iustam crassitiẽ.

*Iuuat senum vlcera, & corũ qui mol-
lem

lem habent cuticulam: denique omne vl-
cus curat quod non facile cicatricem ad-
mittit, & abrasa.

*Diachalciteos Galeni, Palmeum yn-
guentum dictum.*

R \bar{z} Axungia porci veteris à mēbranis per
liquationem & colationem purgata ℥ ij.

Olei veteris } ana ℥ iiij.

Lithargyri triti & creti }
Chalcitidis vsta } ℥ iiij.

Coque igni, & moue rudicula ex ramo
palmæ recētissimo cōfecta: cum ferè exco-
ctū erit, adde tenerorū palmæ ramorū mi-
nutim incisorū & nodulo ligatorū M. iiij.

Coque ad cerati crassitiem.
Vfus eius est liquati cum variis rebus pro
Medici instituto.

*Ad vulnera cruenta, tumores pesti-
lentes, & exituras, vsta, rupta, contusa &
inde nata ecchymomata.

Diachylon Mesu. e prima descriptionis.

R \bar{z} Muc- }
caginis } sem. fœni }
græci } ana } ℥ j.
sem. lini }
radicū altheæ }

Lithargyri } ℥ j. β.

Olei antiqui clari } ℥ iiij.

Lithargyrū tenuissime teratur, & cum o-
leo subigatur & misceatur: post igni lēto
coque

coque, spatha semper agitando donec probe mista sint. Exime igni, paulatim frigescat: postea mucagines affunde, permisce & recoque igni ad iustam crassitiem.

*Scirrhus hepatis, lienis, ventriculi, & aliarum partium, ipsas chœradas & durities reliquas emollit & iuuat.

Alij addunt pulueris }
iridis } ana ℥ j.

Mucaginis meliloti }
valentius tunc resoluit & maturat, magis item est anodynum.

Alij olei veteris loco, accipiunt

Olei chamæmelini } ℥ j β.
Olei irini }

Præstantius quoque fit

Addes etiam si voles

Galbani

Hammoniacy } ana partes æquas.

Sagapeni

Diachylon gummatum vulgus appellat.

Emplastrum Diachylon magnum
Mesua.

R̄. Lithargyri ℥ j.

Olei { Chamæmelini }
Trini } ana ℥ viij.

Anethini

semia

Muccagi nis { seminis lini
foenigræci
althææ
ficuū pinguium
vuarū passarum } ana ℥
xij. ℞.

Succi { Iris
Scillæ }
Oesypi
Ichthyocollæ
Terebinthinæ ℥ iij.

Resini pini } ana ℥ ij.
Ceræ flauæ }
Fiat ceratum vt prius.

Scirrhus emollit & digerit inflationes.

Emplastrum Diachylon paruum
Mesye.

℞. Lithargyri ℥ vj.
Olei veteris ℔ j.
Muccaginis psyllij ℥ iij.
Muccaginis seminis hyoscyami ℥ j. ℞.
Muccaginis { seminis lini
radicū althææ } ana ℥ ij.

Fiat vt primum.

*Tumores calidos digerit & maturat.

Diasandix Aegy.

℞. Maniæ leuissimæ triti ℔ j.
Olei clari ℔ ij.
Coque ad cerati crassitiem.

Vicera

*Vlcera maligna ac diuturna, & in tibiis oborta, solum per se adhibitum ad cicatricem perducit.

Ceratum è Cerusa.

R̄ Cerusæ ℥ j. β.

Olei rosati ℥ ij.

Ceræ candidæ ℥ iiij.

Cera in oleo liquata, adde cerusam tenuissimè leuigatam, & semper agitando coquantur donec nigrescant.

*Sanat ambusta, erysipelata, scabiens siccam, & vlcera calida.

Ceratum è Betonica, Carpensis.

R̄. Terebinthinæ

Resinæ pini

Ceræ flauæ

Betonicæ pulueratæ

Mastiches

Thuris

Mumiæ

Misce, fiat malagma.

*Ad capitis vulnera vtile.

Ceratum Capitale, Carpensis.

R̄. Terebinthinæ in vino

maluatico sapius lotæ

Resinæ pini

Ceræ albæ

Mumiæ ℥ j. β.

Tereb

Terebinthina, resina, & cera liquatis, ad-
de mumiam leuissimè tritā coque igni,
semper mouendo, deinde iniice in vas ar-
genteum, aliudue tersum, in quo habeas
aceti rosati è vino maluatico lb. iij.
Macerentur horis 24. deinde manu ex-
primè, donec acetum sit excolatum, repo-
ne vase vitreo.

Ceratum è styrace Magistrale.

Rz. Styracis liquidæ ℥ iij.

Ceræ fluxæ ℥ ij.

Thuris

Myrrhæ ana ℥ i.

Fiat ceratum secundum artem.

*Neruorum iuncturarumque tumores
duros lenit.

Ceratum Gratiæ Dei.

Rz. Galbani

Opopanacis

Aeruginis

Thuris

Aristolochiæ longæ

Mastiches

Myrrhæ

Hammoniæ ℥ j. 3 ij.

Ceræ ℥ viij.

Lithargyri

Olei communis ana ℥ xvij.

Bdellij ℥ ij.

Lapid

Lapidis calaminaris } ana ℥ i.
 Lapidis hæmatitis }
 Olei absinthij ℥ iiij.
 Terebinthinæ ℥ vi.
 Fiat Ceratum.

*Mollit, terget, glutinat.

Diacadmia Galeni.

R̄. Cadmiæ præparatæ } ana ℥ xvj.
 Chalcitidis vltra }
 Cere ℥ lxxx.

Colophonix ℥ lxiiij.

Olei myrtini ℥ i.

Cadmia & chalcitis bene tritæ cum tâto
 vino subigentur donec mellis crassitiem
 adeptæ sint: deinde cera & colophonia in
 oleo liquatis: Coque aliquâtulum, exime
 igni, & vbi refrixerint adde reliqua.

*Efficax est ad cicatricem ducendam
 in vlceribus.

Διαίτησις. De Salice.

R̄. Misy }
 Alumnis rotundi }
 Chalcitidis }
 Melantherij } ana ℥ vj.
 Aeruginis }
 Aluminis scissilis }
 Gallarum acerbarum }
 Cerusæ }

Ceræ

Cerae

Resinae frictae

Picis brutiae

Bituminis

Olei omphacini

Foliorum salicis tenerorum

} ana ℥ ij.

Coquantur folia in aceti fortis q. s. deinde
siccata puluerabis tenuissimè: Alia liqua-
bis, & coques ad sufficientiam, deinde fri-
gere sines, & addes pulueres.

*Facit ad vlcera curatu difficilia, item
ad erysipelata, aliósq; plurimos affectus
sine vlturis, & fistulas, impositum.

Barbarum paruum Galeni.

℞. Picis nigrae

Cerae

Resinae pini

Picis graecae

Bituminis

Lithargyri ʒ x.

Ceruleae

Aeruginis

Opopanacis ʒ iij.

Olei ʒ ix.

} ana ℥ j.

Terenda contendantur in mortario cum
aceto forti: reliqua liquentur misce, co-
que quousq; manus non amplius manus
inquinet.

Si voles sedádo dolori apti⁹ reddere, adde

Bb

Succi

Succi hyoscyami } ana ʒ β.
 Opij }

* Ad recentia vulnēra, sinus, canum hominumq; morsus, condylomata, inflammata ad articulorum vitia omnia in principio, & podagram valet.

Barbarum magnum Galeni.

R. Picis lb viij.
 Cerae lb vj. ʒ viij.
 Resinae pini lb v. ʒ iiij.
 Bituminis lb iiij.
 Olei lb j. ʒ vj.
 Lithargyri }
 Cerusae } ana ʒ iiij.
 Aeruginis }
 Thuris ʒ vj.
 Aluminis liquidi ʒ j. β.
 Aluminis scissilis ʒ iiij.
 Opopanacis }
 Squammæ aris } ana ʒ xij.
 Galbani }
 Aloës }
 Opij } ana ʒ iiij.
 Myrrhæ }
 Succi mandragoræ ʒ vj.
 Terebinthinæ lb ij.
 Aceti lb v.
 Confice vt in paruo dictum est.

Eiusdem

*Eiusdem cum superiori efficaciq: Hoc autem ad maxima vulnera adhibetur, vt præcedens ad minora.

Isis ex Galeno.

R \bar{z} . Cerae \bar{z} c.
 Terebinthinæ \bar{z} cc.
 Squammæ aris
 Aeruginis
 Aristolochiæ
 Thuris
 Salis hammoniæ
 Hammoniæ
 Aëris vsti
 Aluminis vsti \bar{z} vj.
 Mirrhæ
 Aloës
 Galbani } ana \bar{z} xij.
 Olei veteris \bar{z} x.

Coque vt supra: deinde subige manibus aceto forti lotis, fiant magdaliæ, quas in aceto repones diebus decem.

Alij addunt radicis dracontij \bar{z} viij.

*Capiti accommodatum est, ad chironia vlcera & curatu difficilia: est item cruentis idoneum.

*Ceratum viride Macharionis
 ex Galeno.*

R \bar{z} . Olei rosati omphacini \bar{z} vj.
 B b 2 Arist

| | | | | |
|-----------------|---|-----|---|------|
| Aristolochiæ | } | ana | ℥ | j. |
| Galbani | | | | |
| Opopanacis | | | | |
| Hammoniæ | | | | |
| Aeruginis | | | | |
| Myrrhæ | | | | |
| Iridis | } | ana | ℥ | vij. |
| Terebinthinæ | | | | |
| Ceræ tantundem, | | | | |
| Fiat ceratum. | | | | |

*Ad omnia recentia vulnera, conglutinat, & plegmonem arcer, vbi contusio fuerit: rabiosi canis morsum curat: irē ad aurium, naturaliumq; & narium vlcera facit: in ossibus denudatis carnē producit.

Dia dictamni Galeni.

| | | | |
|------------------|---|-----|-------|
| Rz. Olei veteris | ℔ | ij. | β. |
| Lithargyri | ℔ | j. | ℥ β. |
| Aeruginis | ℥ | j. | |
| Squammæ aris | ℥ | vj. | |
| Colophonæ | ℥ | vj. | ℥ ij. |
| Pollinis thuris | ℥ | j. | β. |
| Hammoniæ | ℥ | ij. | |
| Aeris vsti | ℥ | j. | |
| Diphrygis | } | ana | ℥ vj. |
| Gentianæ | | | |
| Propoleos | } | ana | ℥ j. |
| Aloës | | | |

Galba

Galbani \mathfrak{z} j. β .

Aristolochiæ rot.

Dictamni cretenf.

} ana \mathfrak{z} j. \mathfrak{z} ij.Cera \mathfrak{z} xxv.

Confice in hunc modum.

Lithargyrum cum oleo mixtum coques tantisper dum probè coierint, continenter agitando, & additis ærugine & squama æris, ferueat aliquantulum: exime igni, & dum adhuc bullit immitte resinâ & hammoniacum in aceto dissoluta, & eouf que mouebis donec deferbuerit, tum ceram & æs vstum immitte: Rursus coquatur igni, & cum non inficiet manus exime igni, & adde reliqua tenuissimè trita: probè moueto, & confice magdalias.

* Facit ad recentia vulnera, nervorum præcisiones, vetera vlcera, & cicatricem ægrè ducentia, abscessus, strumas, furunculos, duritias: tela educit, aculeos: ossa ex capite: & ad cuiuslibet virulenti ictus efficac est.

*Ceratum Oxyroceum Nicolai.*R \mathfrak{z} . Croci

Picis nigrae

Picis graeae

Cerae

} ana \mathfrak{z} iiij.

Bb 3

Tere

| | |
|--------------|-------------------|
| Terebinthina | } ana ʒ j. ʒ iij. |
| Galbani | |
| Hammoniacy | |
| Myrrhæ | |
| Thuris | |
| Mastiches | |

Galbanum & hammoniacum in aceti sufficienti quantitate dissoluantur, coque dum dissoluta sint, cola, & rursus coque donec acetum in vaporem euauerit: tunc adde picem, ceram, terebinthinam liquata, deinde mastiches, thuris, myrrhæ puluerem tenuissimum, continenter miscendo donec percocta sint ad cerati consistentiam. Infunde in aquam frigidam, exime, preme, & in tabula marmorea oleo laurino inuncta extende: postremò crocum in tenuissimum puluerem redactum admisce, fiat ceratum.

*Prodest ossibus fractis, item partibus quæ dolore aliquo affliguntur, duritiem denique omnem emollit & discutit.

Ceratum

*Ceratum ex pelle arietina Arnoldi
de villa nova.*

- ℞. Lithargyri
Lapidis hæmatitis
Sanguinis draconis
Boli armeni
Opij
Maltiches
Hammoniacy } ana ʒ β.
Mumiæ
Galbani
Thuris
Costi
Lumbricorum
Picis nigre
Picis græce } ana ʒ i.
Cere albæ
Cere rubre
- Radicū cōsolide } majoris } añ ʒ iij.
 } minoris }
Rosarum rubrarum }
Myrrhæ } ana ʒ xvij.
Aloës }
Succi hypocistidis
Gallarum immaturarum } ana ʒ vj.
Balauftiorum }
Aristolochiæ rotundæ }
Visci quercini } ana ʒ ij.
Terebinthinæ }
Bb 4 Sangui

Sanguinis hominis rufi § IX.

Fit autem in hunc modum.

Pellem arietinam integram cum omnibus pilis coques in aqua donec ferè omnino dissoluta sit in lentorem quandam quem colabis.

Huius colaturæ sume lb j. immitte in vas nouum in quo viscus liquabis igni lento, rudicula semper agitando, iniice deinde lumbricos, postea ceram, terebinthinam, & mastichen: his liquatis adde gummi aceto dissoluta & coque ad cerati crassitiem: postremò iniice quæ terenda sunt probè trita, probè misceto, & confice magdalias.

*Magnæ est efficacix in rupturis.

ANTID.

ANTIDOTARIUM,

SIVE

DE COMPO-
NDORUM, miscendorumque Medi-
camentorum exacta ratione,

LIBER TERTIVS.

DE PONDERIBVS ET MENSVRIS,

Sectio prima.

*Ponderum & Mensurarum expli-
catio & nota.*



Ibra duodecim uncias pendet:
& eius hæc est nota lb.

Uncia drachmas octo pendet,
apud Venetos verò drachmas
nouem, sic autem scribitur ʒ.

Drachma scrupulos tres constituit: huius
hæc est nota ʒ.

Scrupulus habet grana viginti quatuor:
vulgò verò inter Mercatores viginti
duntaxat: sic notatur ʒ.

Grani talis est nota ʒ.

Manipulus dicitur fasciculus herbarum
Bb 5 aur

aut similium qui manu comprehendere potest: sic scribitur

De Succedaneis.

Αἰθερακόμδα siue succedanea, simplicia sunt quæ aliorum facultate similia penuria supponi possunt Medici consilio. Eorum autem quæ subiungemus succedaneorum vsus esse poterit, donec tempus meliorem aliquem ordinem proferat, aut Illustrissimi nostri Ducis diligentia factum sit, vt vera ipsa simplicia aduehantur: quemadmodum pleraque alia nobis protulit ad bene viuendum plane necessaria. Eorum autem talis erit ordo, vt succedanea, illis (in quorum locum supponuntur) ex aduerso scribantur: quemadmodum pro

| | |
|--------------------|---|
| Acacia | Succus hypocistidis, aut pulpa rhois supponi potest. |
| Acoro | Radix asari, aut calamus aromaticus officinarum. |
| Aqua marina | Aquæ s̄bj. in qua salis ℥ iij. bullerint, aut muria piscis. |
| Ammi | Anisum, Cuminum. |
| Amomo | Asarū, aut calam ^o aromaticus officinarū. |

Asa

| | |
|-------------------------|--|
| Afa | Afa foetida offic. vel sagapenum. |
| Aspalato | Lignum aloës officina- narum. |
| Balsami liquore | Terebinthina stilla- titia, aut oleū ca- ryophyllorū, aut nucis moschatę, aut balsamū quod ex India aduehitur. |
| Balsami ligno | Macis, aut cyperus. |
| Balsami semine | Nux moschata, vel ca- ryophylli. |
| Been albo & | Radices pastinacę syl- uestris, aut satyrj, aut terebinthi sum- mirates. |
| Been rubro | |
| Bitumine | Asphaltum officina- rum, quod verum bitumen est, vel pi- sasphaltum. |
| Calamo aromatico | Schœnanthos. |
| Chalcitide | Vulgaris copparosa, aut vitreolū vetu- state cādidū factū. |
| Cardamomo | Cardamomū mai^r of- ficin. vel nasturtiū. |
| Charta vsta | Papyr^r vulgaris vsta. |
| Carui | Anisum, vel daucus. Carpesī |

| | |
|---------------------------|--|
| Carpesio & Casia | } Cinnamomum vulga- re electum. |
| Cinnabari Gæcorū | Lapis lazuli. |
| Cinnamomo | Cinnamomi vulga- ris, canellam vo- cant, duplum. |
| Costo | Radix angelicæ, aut gentianæ. |
| Chryfocolla mine- rali | Lapis armenius, & in medicaminibus chirurgicis adulte- terata ex Diosc. |
| Cubebe | Cinnamomum vulga- re selectum. |
| Dictamno cretenſi | Pulegium. |
| Diphryge | Marchesita vſtus, aut æs vſtum. |
| Doronico | Caryophylli. |
| Epithymo | Epithymbra cretica ſub nomine Epi- thymi. |
| Folio | Nardus indica. |
| Glaucio | Cityſus, aut memita vulgaris. |
| Harmel | Dictamnū albū vul- gare, aut ſemē ru- tæ ſylueſtris. |
| Hyſſopo | Hyſſopus vulgaris, aut ſatureia. |
| | Lacca |


| | |
|--------------------------------------|---|
| Lacca | Styrax. |
| Lapide prhygio | Marchasita, |
| Lapide armeno | Lapis lazuli. |
| Lapide smiri | Pumex. |
| Lapide scissili & Lapide stellari | } Lapis hæmatites. |
| Ligustico Diosc. | |
| Lycio | Rhamnus sylvestris, aut polygoni succ ^o . |
| Loto amara | Anagallis. |
| Macere Diosc. | Cupressus. |
| Melantheria | Vitreolum, aut coppa rosa dicta. |
| Minio veterum | Cinabrium vulgare factitium. |
| Molybdena | Litargyros. |
| Myfi | Vitreolum vetustum vstum. |
| Nitro | Borax non adultera- ta, vel sal fossile. |
| Oleo ricinino | Oleum vetus. |
| Petroselino | Smyrnum, vel cumi- num. |
| Plumbagine | Lithargyros. |
| Pisaspalto | Asphaltum officina- rū, aut pix cum bi- tumine mixta. |
| Pistaleo | Pix oleo mista. |
| | Nard |

| | |
|--------------------|---|
| Phu | Nardus celtica, aut valeriana. |
| Phyco | Sandix, hoc est Mi- niū vulgare, quæ est cerusa vsta. |
| Radice idea | Sumach. |
| Rheo pontico | Centaurium maius, aut rhabarbarum. |
| Sale indo | Sal gemmæ. |
| Sale hammoniaco | Sal gēme, aut factitiū. |
| Scaliola | Endiuia syluestris. |
| Secacul | Radix pastinacæ syl- uestris. |
| Seseli | Massiliense Diosc. aut Siler montanū vul- gare, aut peucedanī femen. |
| Sifone | Daucus. |
| Stratiote aquatica | Lens palustris. |
| Styrace rubra | Styra. |
| Taraxaco | Cichorium syluestre. |
| Terra samia | Lapis hæmatites. |
| Terebinthina | Resina laricea, quæ est vulgaris terebin- thina. |
| Thymo | Thymbra, aut thy- mum vulgare. |
| Veneræ concha | Ostreorum conchæ. |

F I N I S.

INDEX MEDI-
 CAMENTORVM
 COMP. QVAE HOC
 LIBRO CONTI-
 NENTVR.

Medicamenta autem simplicia nõ erunt
 hic quærenda, quando quidem ea ordi-
 ne Alphabetico descripta sunt.

| | |
|--|----------------------------------|
| A | |
|  | Cetum scylliticum. 156 |
| | Agaricum trochiscatum. 300 |
| | Alipta moschata. 303 |
| | Ambrosia Archibij. 252 |
| | Apomeli Philagrij 153 |
| | Aquis innascentia 18 |
| | Affatio. 95 |
| | Aqua fructuum. 143 |
| | Aqua malsa. 153 |
| | Aromaticum caryophyllatum. 195 |
| | Aromaticum rosatum. 192 |
| | Athanasia Mithridatis. 254 |
| | Athanasia Nicolai. 255 |
| B | |
| B | Enedicta simplex. 223 |
| C | |
| C | Alefactio. 91 |
| | Cassia communis. 228 |
| | Cassia condita. 227 |
| | Catapotia. vide Pilulas 229. 273 |
| | Catar 273 |

I N D E X.

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Catarticum imperiale. | 241 |
| Cerata | 134. & 347. 378 |
| Ceratum barbarum magnum G. | 386 |
| Ceratum barb. paruum G. | 385 |
| Cerat. capitale Carpenfis. | 382 |
| Cerat. de Betonica. | ibid. |
| Cerat. de Cerussa. | ibid. |
| Ceratum de minio | 355 |
| Cerat. de pelle arietina. | 391 |
| Cerat. de styrace. | 383 |
| Cerat. diacadmia. | 384 |
| Cerat. diachalcitis. | 379 |
| Cerat. diachyleon maius. | 380 |
| Cerat. diachyleon minus. | 381 |
| Cerat. diachyleon primæ descr. | 299 |
| Cerat. diadictamnium | 388 |
| Cerat. dia-iteon. | 384 |
| Cerat. dia-pipereos. | 378 |
| Cerat. Gratia Dei. | 383 |
| Cerat. Hydræleon. | 376 |
| Cerat. Isis. | 387 |
| Cerat. Oxæleon. | 377 |
| Cerat. Oeneleon. | 378 |
| Cerat. oxycroceum. | 389 |
| Cerat. Palmeum. | 379 |
| Cerat. viride Machærion. | 387 |
| Clarificatio. | 116 |
| Collyria. vide ſief. | 295A |
| Coctio. | 92 |
| Cocta. | 140 |
| Coctio ſub ſimo, vinaceis, &c. | 89 |
| Colatio. | 115 |
| Coloratio. | 117 |
| Condita. | 118, 137 |
| Conferuz. | 118, 137 |
| Confectio anacardina | 215-116, |
| | Con |

I N D E X.

| | |
|-----------------------|-------|
| Confectio Aſæ ſœtida. | 217 |
| Confectio hamech. | 232 |
| Confricatio. | 102 |
| Cortices. | 17 |
| Cribratio. | 102 |
| Crocomagma. | 198 |
| Cygnus Galeni. | 310 |
| Cyphi Damocratis. | ibid. |
| Cyphoides Andromachi. | 313 |

D

| | |
|--|-----|
| D ecoctiones. | 122 |
| Decoctio Adianthi. | 142 |
| Decoctio capitalis. | 148 |
| Decoctio carminatiua ſeu flatus diſſipans. | 149 |
| Decoctio communis. | 147 |
| Decoctio cordialis. | 148 |
| Decoctio epithymi. | 144 |
| Decoct. eupatorii. | 146 |
| Decoct. fructuum | 143 |
| Decoct. fumi terræ. | 143 |
| Decoct. myrobalanor. | 145 |
| Decoct. magiſtrale refrig. | 147 |
| Decoct. pectorale. | 149 |
| Decoct. refrigerans. | 147 |
| Decoct. ſtœchadis. | 146 |
| Decoct. Thymi. | 143 |
| Deſpumatio. | 116 |
| Deſtillatio. | 108 |
| Diacalamintha Gal. | 206 |
| Diacalamintha Meſu. | 207 |
| Diacarion. | 151 |
| Diacharthamum. | 231 |
| Diacaffia magiſtralis. | 228 |
| Diacaffia Nicolai. | 227 |
| Diacatholicon. | 230 |
| Diacinnamomum. | 208 |

Diachilon. 579. 380. 381

Ccⁱ Dia-

I N D E X.

| | |
|--------------------------|-------|
| Diacodion compos. | 187 |
| Diacodion-cum sapr. | ibid. |
| Diacodion simplex. | ibid. |
| Diacorallium. | 312 |
| Diacurcuma. | 209 |
| Diacurcuma minus. | 210 |
| Diacydonites Galeni. | 137 |
| Diacydonitum purgans. | 139 |
| Diacyminum Mefu. | 205 |
| Diacymim. Nicolai. | ibid. |
| Diaelectrum Galeni. | 314 |
| Diagalanga. | 208 |
| Diahyffopum. | 189 |
| Diairis compos. | 188 |
| Diairis simplex. | ibid. |
| Dialacca. | 210 |
| Diamanna. | 242 |
| Diamargariton calidum. | 198 |
| Diamargariton frigidum. | ibid. |
| Diambra. | 199 |
| Diamoron Galeni. | 149 |
| Diamoron Nicolai. | 150 |
| Diamofchum dulce. | 194 |
| Dianifum. | 212 |
| Dianthos. | 213 |
| Diacenu. | 322 |
| Diapenidion. | 189 |
| Diaphœnicum. | 231 |
| Diapolypodium. | 231 |
| Diaprunis non folutiuis. | 229 |
| Diaprunis folutiuis. | 230 |
| Diarceuthidon Gal. | 153 |
| Diarheon. | 150 |
| Diarhodon abbatis. | 195 |
| Diarhodon Mefuz. | 321 |
| Diarhodon Nilei. | ibid. |
| | Dia |

I N D E X.

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Diasandix. | 381 |
| Diafena Gentilis. | 214 |
| Diafena Nicolai. | 214 |
| Diafena recentis Rafis. | 225 |
| Diafpermation Galeni. | 311 |
| Diatrageantha cal. | 185 |
| Diatrageantha frig. | 184 |
| Diatrion pipereon Galeni. | 103 |
| Diatrion pipereon Mesuz. | 104 |
| Diatrion sandalon. | 197 |
| Diaturbith Mesuz. | 101 |
| Diaturbith. Montagnana. | 141 |
| Diospoliticon Galeni. | 104 |
| Dissolurio. | 88 |
| Duratio. | 91 |
| E Clegma vide Loch. | 125, 181 |
| Electaria. | 126, 192 |
| Electarium de baccis Lauri. | 214 |
| Electarium de cineribus. | ibid. |
| Electarium hamech Mesuz. | 233 |
| Electarium de Pfyllio | 218 |
| Electarium de Sebesten. | 226 |
| Electarium de succo rosar. Nicolai. | 237 |
| Electarium episcopi. | 231 |
| Electarium indum maius. | 236 |
| Electarium indum minus. | 237 |
| Electarium rosatum Mesuz. | 235 |
| Electarium solutium. | 235 |
| Electarium lenitium magistrale. | 243 |
| Emplastr. | 33 & 147 & 368 |
| Emplastrum de Alliis | 376 |
| Emplastrum de baccis lauri. | 371 |
| Emplastrum de calamintha. | 376 |
| Emplastrum de crusta panis. | ibid. |

Cc 2 Empla

I N D E X.

| | |
|---|--------|
| Emplastrum de frumento, | 347 |
| Emplastrum de frumento Democriti, | ibid. |
| Emplastrum de meliloto. | 367 |
| Emplastrum de meliloto Andromachi. | 368 |
| Emplastrum de quinque farinis. | 374 |
| Emplastrum de tribus farinis. | ibid. |
| Emplastrum diaphœnicon calidum. | 371 |
| Emplastrum diaphœnicon frigidum. | 372 |
| Emplastrum Galeni. | 373 |
| Emplastrum Martiatum Nicolai. | 370 |
| Emplastrum martiarum Pauli | ibid. |
| Emplastrum Philagrianum. | 369 |
| Emplastrum Poliarchium. | ibid. |
| <i>Tetraphar</i> Enneapharmacum Galeni. | 356 |
| Epithema cordiale calidum. | 366 |
| Epithema cordiale frigidum. | ibid. |
| Epithema cordiale temperatum. | 367 |
| Epithema hepaticum calidum. | ibid. |
| Epithema hepaticum frigidum. | ibid. |
| Expressio. | 114 |
| Extinctio. | 99 |
| F Lotes | 13, 82 |
| Frixio | 95 |
| Fructus. | 14, 82 |
| G Vmni. | 17 |
| H Edycroon Galeni | 2, 98 |
| Herbæ domesticæ | 11 |
| Herbæ nostrates. | 11 |
| Herbæ peregrinæ. | 12 |
| Hiera Archigenis | 219 |
| Hiera composita | 218 |
| Hiera Logadij ex Aëtio | 220 |
| Hiera logadij ex Nicolao | 22 |
| Hiera | 22 |

I N D E X.

| | |
|-----------------------------|-------|
| Hiera simplex de octo rebus | 217 |
| Hydrexon Galeni | 376 |
| Hume&atio | 86 |
| Hydromel Pauli. | 154 |
| Hydrososatum eiusdem. | ibid. |

I

| | |
|-------------------|-----------|
| I nduratio | 91 |
| Infusiones | 87 & 120 |
| Infusio Hieræ | 141 |
| Infusio rosarum. | 88 |
| Infusio seri. | 140 |
| Infusio succorum. | ibi. |
| Infusio violarum | 88 & 141 |
| Insolatio | 91 |
| Julebi | 123 |
| Juleb rosatum. | 141 & 151 |
| Juleb violatum | 141 |

L

| | |
|--------------------------|-------|
| L Achrimæ | 17 |
| Lætificans Galeni | 202 |
| Lætificans Rhafes | ibid. |
| Lauatio | 103 |
| Ligna | 17 |
| Liquatio | 90 |
| Liquor ad vulnera. | 45 |
| Liquores | 17 |
| Loch & | 191 |
| Loch ad asthma de scilla | 187 |
| Loch Antipatri | 192 |
| Loch de Carthamo | 188 |
| Loch de orobo | 182 |
| Loch de papauere | 186 |
| Loch de pino | 187 |
| Loch de praffio | 183 |
| Loch de psyllio | 151 |
| Loch de pulmone vulpis | 151 |

Cc 3 Loch

I N D E X.

| | |
|-----------------------------|-------|
| Loch sanum & expertum | 186 |
| Loch de succo scyllæ | 190 |
| Loch de tussilagine compos. | 183 |
| Loch de tussilagine simplex | ibid. |

M

| | |
|--|-------|
| M edicamenta ex animalibus sumpta | 17 |
| Medicamentorum compositorum genera | 118 |
| Medicamentorum simplicium genera | 10 |
| Mensuræ | 291 |
| Metalla | 18 |
| Mithridatium Andromachi. | 249 |
| Mithridatium Damocratis | 251 |
| Miua aromatica | 138 |
| Miua simplex | ibid. |
| Mollificatio | 90 |
| Muccaginum extractio. | 108 |
| Mulsa | 153 |

N

| | |
|------------------|----|
| N utritio | 86 |
|------------------|----|

O

| | |
|-------------------------------|-----------|
| O lea | 131 & 327 |
| Oleorum extractio | 110 |
| Oleum absinthij | 310 |
| Oleum amygdalarum | 308 |
| Oleum balsami | 344 |
| Oleum camomillæ | 329 |
| Oleum capparinum | 338 |
| Oleum Castorinum | 340 |
| Oleum costinum | 342 |
| Oleum cydoniorum | 330 |
| Oleum cyprinum seu de Alcanna | 334 |
| Oleum euphorbij | 341 |
| Oleum hyperici | 337 |
| Oleum hyperici magistrale | 338 |
| Oleum | |

I N D E X.

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Oleum Irinum Mesuz. | 335 |
| Oleum Irinum Nicolai | ibid. |
| Oleum Liliorum compositum | 332 |
| Oleum liliorum simplex | ibid. |
| Oleum ligustrinum siue de Alcanna | 334 |
| Oleum lumbricorum | 344 |
| Oleum mandragoræ | 343 |
| Oleum mastichinum | 330 |
| Oleum menthæ | 331 |
| Oleum moschellinum | 336 |
| Oleum myrrinum | 344 |
| Oleum nardinum compos. | 335 |
| Oleum nardinum simplex. | 334 |
| Oleum Nymphææ | 348 |
| Oleum papauerinum | 342 |
| Oleum populneum | 331 |
| Oleum rosatum commune. | 327 |
| Oleum ros. completum | 328 |
| Oleum ros. omphacinum | 329 |
| Oleum ros. Pauli | ibid. |
| Oleum Sambuccinum | 311 |
| Oleum sampsicinum | 335 |
| Oleum scorpionum compos. | 340 |
| Oleum scorpionum simplex. | 339 |
| Oleum styracinum | 342 |
| Oleum vulpinum | 339 |
| Oxymeli compos. | 155 |
| Oxymeli scilliticum | ibid. |
| Oxymeli simplex | 154 |
| Oxyfacchara compos. | 159 |
| Oxyfacchara simplex | ibid. |

P

| | |
|---|-------|
| P Aulinum Galeni | 256 |
| Pharmacopœi officina qualis esse debeat | 9 |
| Pharmacopœi officium | ibid. |

Cc 4 Philo

I N D E X.

| | |
|---------------------------------|---------|
| Philonium Persicum | 258 |
| Philonium romanum | ibid. |
| Philonium tarsense | 257 |
| Pilulæ | 119.273 |
| Pilulæ aggregatiuæ | 183 |
| Pilulæ alandahal Mesuæ | 185 |
| Pilulæ alephanginæ | 277 |
| Pilulæ Antonij de scarperia | 275 |
| Pilulæ arabicæ | 288 |
| Pilulæ assaieret | 279 |
| Pilulæ aureæ | 283 |
| Pilulæ aureæ turbithatæ | 184 |
| Pilulæ bechicæ albæ. | 274 |
| Pilulæ bechicæ emplasticæ | ibid |
| Pilulæ bechicæ Mesuæ | 273 |
| Pilulæ bechicæ Rasii | ibid. |
| Pilulæ bechicæ cum terebinthina | 274 |
| Pilulæ cochicæ | 284 |
| Pilulæ communes | 274 |
| Pilulæ contra pestem | 275 |
| Pilulæ de Agarico | 280 |
| Pilulæ de Arnoglossa | 293 |
| Pilulæ de bdellio | 289 |
| Pilulæ de colocynthide | 284 |
| Pilulæ de cynoglossa | 293 |
| Pilulæ de euphorbio | 290 |
| Pilulæ de fumo terræ | 279 |
| Pilulæ de hermodactylis | 286 |
| Pilulæ de hiera cum agarico | 275 |
| Pilulæ de hiera simplices | ibid. |
| Pilulæ de lapide armeno | 291 |
| Pilulæ de lapide lazuli | ibid. |
| Pilulæ de octo rebus | 292 |
| Pilulæ de opio | ibid. |
| Pilulæ de opopanace | 290 |
| Pilulæ de rhabarbaro | 278 |
| Pilulæ | |

I N D E X.

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Pilulæ de sagapeno | 289 |
| Pilulæ de sarcocolla | 290 |
| Pilulæ de sex rebus | 292 |
| Pilulæ de styrace Galeni | 294 |
| Pilulæ de styrace Mesuzæ | 293 |
| Pilulæ de tribus | 278 |
| Pilulæ de turbiti | 286 |
| Pilulæ foetidæ maiores | 287 |
| Pilulæ foetidæ minores | ibid. |
| Pilulæ Galeni Alephanginis similes | 276 |
| Pilulæ harmoniæ | 294 |
| Pilulæ Indæ | 286 |
| Pilulæ Lucis | 282 |
| Pilulæ mastichinæ Conciliatoris | 279 |
| Pilulæ pro matrice | 276 |
| Pilulæ Scribonij | 295 |
| Pilulæ Sine quibus | 281 |
| Pilulæ Stomâchicæ | 286 |
| Pleres archonticon | 200 |
| Pondera | 393 |
| Præparatio medic. simpl. | 81 |
| præcipitatum Ioannis de vico | 272 |
| Pulveres | 28 262 ibid. |
| Puluis capitalis calidus | 265 |
| Puluis capitalis temperatus. | ibid. |
| Puluis cephalicus Galeni | 269 |
| Puluis cephalicus Lucij | ibid. |
| Puluis cephalicus Triphonis | ibid. |
| Puluis cephalicus Xenocratis | ibid. |
| Puluis coustringens | 270 |
| Puluis dentes repurgans | 266 |
| Puluis emplasticus | 270 |
| Puluis flatus dissipans | 262 |
| Puluis laxatiuus | 264 |
| Puluis contra pestem | 268 |
| Puluis præcipitatus de vigo | 272 |
| Cc 5 | Pul |

I N D E X.

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Puluis fanguinem reprimens | 271 |
| Puluis sarcoticus | ibid. |
| Puluis contra Scabiem communis | 268 |
| Puluis contra Scabiem Nicolai | 269 |
| Puluis senæ præparatæ | 263 |
| Puluis Suppositorius acris | 264 |
| Puluis Suppositorius communis | ibid. |
| Puluis Suppositorius dolorem sedans | ibid. |
| Puluis Turbith | 263 |
| Puluis Turbith Auiçennæ | ibid. |
| Purgatio medicamentorum | 81 |

R

| | |
|-----------------|-----|
| R Adices | 15 |
| Requies Nicolai | 260 |
| Rob. | 121 |

S

| | |
|------------------------------------|---------|
| S Ales | 85 |
| Salitura | 85 |
| Semina | 14.83 |
| Siccatio | 84 |
| Sief | 130 195 |
| Sief album Galeni Tripherum distum | 319 |
| Sief album Mesuæ | 319 |
| Sief è cornu cerui | 325 |
| Sief cygnus Galeni | 321 |
| Sief de hæmatite myrrha | 322 323 |
| Sief de plumbo | 327 |
| Sief de thure | 321 |
| Sief dia cœnu Mesuæ | 322 |
| Sief dia-rhodon Nilci. | 321 |
| Sief Libianum | 326 |
| Sief luteum | 325 |
| Sief Nardinum | 322 |
| Sief rubrum Gal. | 329 |
| Sief rubrum Mes. | 324 |
| Sief viride | 323 |
| | Sief |

I N D E X.

| | |
|--|----------|
| Sief viride Anthei | 123. 149 |
| Sirupi | 170 |
| Sirupus de Absinthio | 158 |
| Sirupus acetosus diathedon | 157 |
| Sirupus acetosus simplex | 160 |
| Sirupus de acetositate citri | ibid. |
| Sirupus de acetositate limonum | ibid. |
| Sirupus de agresta | 160 |
| Sirupus de bisantiis | 171 |
| Sirupus de calamintha | 168 |
| Sirupus capillorum veneris compos. | ibid. |
| Sirupus capillorum veneris simplex | 168 |
| Sirupus de cichorio compos. | 169 |
| Sirupus de cichorio simplex | 163 |
| Sirupus de corticib. citri | 163 |
| Sirupus de endiuia compos. | ibid. |
| Sirupus de endiuia Gentilis | 162 |
| Sirupus de endiuia simplex | 172 |
| Sirupus de Epithymo | 177 |
| Sirupus de Eupatorio | 155 |
| Sirupus de fumaria compos. | 163 |
| Sirupus de fumaria simpl. | 168 |
| Sirupus de glycyrrhiza | 180 |
| Sirupus de hermodactylis | 173 |
| Sirupus de Hyssopo | 167 |
| Sirupus de iuiubis | 166 |
| Sirupus de Lupulis | 169 |
| Sirupus de mentha maior | 170 |
| Sirupus de mentha minor | 167 |
| Sirupus Myrtinus compos. | ibid. |
| Sirupus Myrtinus simpl. | 176 |
| Sirupus de nymphæa Francisci pedemontani | 175 |
| Sirupus de nymphæa Nicolai. | 177 |
| Sirupus de papauere compos. | 176 |
| Sirupus de papauere simpl. | 178 |
| Sirupus de polypodio | Sirupus |

I N D E X.

| | |
|------------------------------------|-------|
| Sirupus de pomis saporis | 179 |
| Sirupus de pomis simplex | ibid. |
| Sirupus de praffio | 173 |
| Sirupus de duabus radicibus | 157 |
| Sirupus de quinque radicibus | 158 |
| Sirupus rosatus laxatius | 161 |
| Sirupus rosatus è rosis recentibus | ibid. |
| Sirupus rosatus è rosis siccis | ibid. |
| Sirupus de Stœchade comp. | 175 |
| Sirupus de stœchade simpl. | 174 |
| Sirupus è violarum succo | 161 |
| Sirupus violatus Mesuræ | ibid. |
| Sirupus violatus solutius | 161 |
| Sotera Pauli | 261 |
| Succedanea | 394 |
| Succi | 16 |
| Succorum extrahendorum ratio | 109 |

T

| | |
|----------------------------------|---------|
| T Erræ | 18 |
| Theriaca andromachi | 243 |
| Theriaca diatessaron | 249 |
| Triphera magna | 259 |
| Triphera persica | 239 |
| Tritura | 99 101 |
| Trochisci | 130 295 |
| Trochisci de absinthio | 307 |
| Trochisci de agarico | 300 |
| Trochisci alandahal | 299 |
| Trochisci amygdalis amaris Pauli | 308 |
| Trochisci Andronij | 317 |
| Trochisci anisi | 307 |
| Trochisci aster Gal. | 315 |
| Trochisci de berberis | 310 |
| Trochisci de camphora | 302 |
| Trochisci de capparib. | 308 |

Troch

I N D E X.

| | |
|--|---------|
| Trochisci de carabe | 313 |
| Trochisci de corallo | 311 |
| Trochisci de corallo Gal. | 312 |
| Trochisci de croco | 306 |
| Trochisci dia electru | 314 |
| Trochisci dia rhodon Mesuz | 301 |
| Trochisci dia rhodon Nicolai | 300 |
| Trochisci diaspermaton | 311 |
| Trochisci de Eupatorio | 306 |
| Trochisci de gallia moschata | 303 |
| Trochisci hepatici | 308 |
| Trochisci de lacca | 309 |
| Trochisci de ligno aloës | 305 |
| Trochisci de minio | 318 |
| Trochisci Musz | ibid. |
| Trochisci de Myrrha | 309 |
| Trochisci Pollyidæ | 317 |
| Trochisci de rhabarbaro | 305 |
| Trochisci ramich Mesuz | 303 |
| Trochisci de rosif | 301 |
| Trochisci de scilla | 297 |
| Trochisci de spodio | 310 |
| Trochisci stella Auicennæ | 315 |
| Trochisci de terra sigillata | 312 |
| Trochisci de vipera | 295 |
| V | |
| Vnguenta | 333.347 |
| Vnguentum ægyptiacum Guidonis | 367 |
| Vnguentum ægyptiac. Ioannis de vigo. | 366 |
| Vnguentum ægyptiac. Mesuz | ibid. |
| Vnguentum album | 352 |
| Vnguentum de althæa | 364 |
| Vnguentum ad ambustâ de althæa cum gum- mis | 349.362 |
| Vnguentum apostolorum | 365 |
| Vnguentum arthanita | 350 |
| Vng | |

I N D E X.

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Vnguentum basilicon maius | 356 |
| Vnguentum basilicon minus | ibid. |
| Vnguentum de calce | 359 |
| Vnguentum capitale conciliatoris | 358 |
| Vnguentum de caprifolio | ibid. |
| Vnguentum de caprifolio Carpenfis | 359 |
| Vnguentum Comiciffa | 362 |
| Vnguentum defenfium | 364 |
| Vnguentum fufcum | 357 |
| Vnguentum fufcum Nicolai | ibid. |
| Vnguentum inftigidans | 347 |
| Vnguentum de lithargyro | 354 |
| Vnguentum de minio | 355 |
| Vnguentum de minio camphoratum | ibid. |
| Vnguentum mundificatiuum magiftrale | 364 |
| Vnguentum ad oculos | 349 |
| Vnguentum populcum | 360 |
| Vnguentum pectorale | 347 |
| Vnguentum rofatum | 352 |
| Vnguentum sandalinum | 363 |
| Vnguentum ad fcabiem | 355 |
| Vnguentum fonniferum | 352 |
| Vnguentum ftomachicum | 348 |
| Vnguentum tetrapharmacum | 356 |
| Vnguentum tripharmacum crudum | 354 |
| Vnguentum de tuthia | 353 |
| Vnguentum de tuthia Nicolai | 354 |
| Vnguentum ad vermes | 348 |
| Vnguentum violatum | 352 |
| Vnguentum viride | 365 |
| Vftio | 366 |
| Vftulatio | 367 |

+ Macedo-
nicu 356.
+

F I N I S.

530, -

QPEH-

of Brasilia, Governor. O. During
the latter half of his life he was a great
source of botanical information.
His troubles, among others an ex-
traordinary tendency to fracture
and dislocation of the limbs did not
spoil his power of work. *Philario-*
rum plantarum. 1601. and *Castro-*
rum libri decem 1605. contained
his most important results. A
them are accounts from by early por-
tuguese and Portugueses travellers of
animals, plants and drugs. His
discovery was often rewarded by
treasure seeking and highly curious
facts. (Oster)

Miall, The early naturalists
p. 72 (1520-1789)
London 1912.

