

50

341

Dv 26

coll N

147

8 Bll. (leht. w) + 999 SS + 18 Bll.

91
Spectat ad me Franciscum
Dominicum Taylör

20
173

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK
- Med. Histor. Abt. -
DÜSSELDORF
V 22

ANTIDOTARIUM
SPECIALE

à Io. Iacobo Vueckero

Basiliense,

Reipublicæ Colmariensis

Physico,

EX OPT. AVTHORVM TAM VET-
rum quàm recentiorū scriptis fideliter con-
gestū, methodicèq; digestum.

CVM ELENCHO LOCVPLETISS.



CVM PRIVILEGIO AD AN. DECEM.

BASILEAE

PER EVSEBIUM EPISCOPIVM,
& Nicolai Fr. haredes.

M D LXXIIII.

Christophorj Philippi Zolt à Bernegg

Dv 26

MAXIMILIANO II. CÆSARI
AVGVSTO

DD. FERDINANDI F. PHILIPPI N.
MAXIMILIANI I. PRON.
FRID. III. AEN.

VT AVITA MAIESTATE,
SIC VIRTUTE ET FORTVNA PROPRIA
ET COMITE VTRIVSQ.
'GLORIA
NOBILISS. CLARISS. Q.

IO. IACOBVS VVECKERVS
BASILIENSIS
ANTIDOTARIVM

HOC
SPECIALE
DEVOTO ANIMO
D D D.

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page, including a signature that appears to read 'J. J. Vvecker'.

IO. IACOBI VVECKERI
BASILIENSIS

In Antidotarium speciale
ad Medicinæ studiosos

PRAEFATIO.



ETSI multa ac uaria Antidotaria (uulgò Dispensatoria dicta) ab antiquis simul & recentioribus Medicis in lucem emissa sunt, rei medicæ studiose LECTOR: tamen, quod pace tantorum uirorum dictum uelim, ordinis diuersitas in multis suspecta, eiusdem interturbatio non paucos neglectæ methodi accusare uideretur: cum medicamenta nec promptè inueniri, nec cōmodè administrari possint. Inter Græcos primum meritò locum obtinet Galenus, qui medicamentorum historiam diuersis libris, pro occasione temporis, hortatu amicorum cōplexus est. Vndecim sanè de simplicium medicamentorum facultatibus: duos de Antidoris: septem de compositione medicamētorum per genera: de Theriaca ad Pisonem, unum: decem de compositione medicamētorum secundum locos edidit, non ea tantum quæ ad Sanitatem pertinent, uerumetiam quæ ad Ornatum faciunt, comprehendens. Paulus Aegineta, quem Galeni simiam quidam appellare non uerentur, in medicamētorum tractatione uel nullum, uel saltem alphabeticum ordinem obseruauit. Oribasius ingenio diligentiaq; magnus, non multam in dispositione medicamentorum curam impendit. Inter Arabes, in uentione præstantissimorum medicaminum insignes, tanquam Hybrida quidam Io. Mesue, ut ex Græcis & Arabibus multa collegit medicamenta, ita Galeni ordinem imitari uoluit. Proinde quemadmodum Galenus de medicamentorum tum genera-

a 2 lium

P R A E F A T I O

lium, tum cuiq; parti affectæ familiarium compositione, peculiare commentationes, insuper etiam de Antidotis scripsit: ita Mesueus libro de Antidotis, medicamenta generalia, sectionibus duodecim ueluti classibus cōprehendit: subinde uerò cuique singularium partium affectui propria medicamenta, libro quem ob id medicorum uulgus De appropriatis appellat, persecutus est. Auicēna libro primo de uniuersalibus, libro secundo de singularibus medicinis ordine alphabetico differuit: Antidotarium denique libro quinto subiunxit. Serapio librum de Antidotis, librum de temperamentis simplicium congeffit uerius quàm digessit. Nicolaus de compositis medicamentis Antidotarium edidit eo ordine, quem multi inuestigare, pauci inuenire possint. Ex recentioribus quamplurimi in hoc stadiū descendentes, uti studium uoluntatemq; suam Reipubl. comprobant, ita nunc particularia generalibus, nunc artificialia naturalibus, nunc ornantia curantibus commiscentes, à methodo exorbitasse uidentur. Ergo cum etiamnum in medio Antidotaria palma, ut ita loquar, proposita esset, cum medicis præstantissimis, ijsdem & ciuibus & collegis meis, consilio communicato, hoc Antidotarium magno animo sum aggressus, illudq; diuino auxilio ad finem perduxit. De cuius methodo si fortè queras, in tres illud libros partiti sumus. quorum priores duo de medicamentis tum simplicibus, tum compositis siue artificialibus, ad sanitatem conferentibus agunt: tertius uerò parerga medica (ne quid huic tractationi uideretur deesse) ad ornatum spectantia continet. Nam cum & Prisci, Archigenes, Asclepiades, Crito, Cleopatra, Heras, Soranus, quod apud Galenum libro de compositione medicamentorum secundum locos uidere licet, hac de materia scripserint: Neotericorum quinetiam non pauci, Itali potissimum & Galli, gentis suæ in ornandis corporibus morem secuti, Cosmetica tractauerint: nihil me ab officio medici alienum, si illos certa methodo sequerer, facturum putauit. In singularium medicamentorum enarratione causas, effectus

AD LECTOREM.

effectus & accidentia, quanta potuimus diligentia examinauimus & declarauimus, ex præstantissimis quibusque, non solum Græcis & Arabibus, uerum etiam Latinis, Italis, Gallis, Hispanis & Germanis (quorum catalogum paulo post subnectemus) optima quæq; & feligendo & digerendo: quorum usus & Medicis & Pharmacopœis maximus esse possit: Medicis quidem ob remediorum copiam, methodicamque rationem, ut qui sine labore ex hoc opere, medicamenta ad quæuis corporis mala, tanquam ex promptuario facile inuenire queant: Pharmacopœis uerò ad meliorem & diligentiore preparationem, tractationemque. Et hæc de re ipsa. Nunc quo ad nomen. Antidotarij Specialis appellationem commentariò huic indere placuit, quòd in eo de Antidotis tractetur: hoc est, de ijs medicamentis, quæ certa ratione inuenta, administrata & exhibita, corporis humani noxas uel mitigant, uel abigunt, uel præcauent. Qua quidem uniuersali significatione nominis ante nos & Galenus & Mesueus & Nicolaus usi sunt. Speciale, differentia causa addidimus: ut illud à Generali, quod etsi natura prius, tempore tamen posterius, non multo post à nobis edetur, si conatibus nostris Deus opt. max. fauerit, distingueremus. Differt enim Speciale à Generali, ut multa paucis complectar, sicuti praxis seu Historia à Theoria, uel ut exempla singularia à præceptis uniuersalibus. Præcepta uniuersalia sunt, & conceptus uniuersales, ex singularium rerum obseruatione natos exprimunt: Exempla uerò singularem historiam persequuntur. Proinde etiam in hoc genere Antidotarium Generale medicamentorum Theoriam, Speciale uerò Praxim siue Historiam medicamentorum complectetur. Hæc sunt, amice Lector, quæ tecum de nostro hoc opere conferre uolui. Quod si tuis usibus ulla ratione inseruiet, ut mihi id gratissimum erit, ita operam deinceps dabo, ut ocij nostri inter media negocia rationem in Generali Antidotario perficiendo Asclepiadarum amplissimo ordini comprobem. Tu interea hisce fruire: & si nostrum hunc

PRAEFAT. AD LECTOREM.

laborem Reip. utilem putas, generoso heroi LAZARO SVEN-
DIO, Cæs. M. Polemarcho, belli pacisq; artibus clarissimo gra-
tias habe: cuius hortatu animus saepe, quantumuis languenti-
bus corporis uiribus, nobis ad hæc conficienda restitutus uel
saltem excitatus fuit. Cuius itidem suasu tantum nobis accessit
audaciæ, ut inuicto Cæsari uigilias hæc nostras dedicaremus,
eiq; uni præ cæteris studia nostra comprobare niteremur,
cui placuisse non ultima sed solidissima laus est.

Vale. Colmaria, Idibus August.

M. D. LXXIIII.

AVTHO.

AVTHORES EX QVIBVS
HOC OPVS CONCINNATVM EST.

<i>Actuarius.</i>	<i>Fernelius.</i>
<i>Aetius.</i>	<i>Florauantus.</i>
<i>Albertus Magnus.</i>	<i>Fænon.</i>
<i>Alchindus.</i>	<i>Fæsius.</i>
<i>Alexander Benedictus.</i>	<i>Fontanus.</i>
<i>Alexius.</i>	<i>Franciscus Pedemontanus.</i>
<i>Andernacus.</i>	<i>Fuchsius.</i>
<i>Andreas à Lacuna.</i>	<i>Fumanellus.</i>
<i>Andromachus.</i>	<i>Gabriel.</i>
<i>Antonius Musa.</i>	<i>Galenus.</i>
<i>Antonius de Scarparia.</i>	<i>Gentilis Fulginas.</i>
<i>Apollo</i>	<i>Gesnerus.</i>
<i>Archigenes.</i>	<i>Gilbertus de Anglia.</i>
<i>Arnoldus de Villa noua.</i>	<i>Gordonius. Guido.</i>
<i>Auicenna.</i>	<i>Hieronymus Herold.</i>
<i>Bernardini.</i>	<i>Hippocrates.</i>
<i>Bertapalia.</i>	<i>Hollerius.</i>
<i>Brassauolus.</i>	<i>Iacobus de Manlijs.</i>
<i>Cardanus.</i>	<i>Ioannes Crato.</i>
<i>Carpensis.</i>	<i>Ioannes Langius.</i>
<i>Carpus.</i>	<i>Ioannes de Vigo.</i>
<i>Cleopatra.</i>	<i>Ioannes de Thenis.</i>
<i>Cordus.</i>	<i>Ioannes Mag.</i>
<i>Crescentius.</i>	<i>Ioannes Bauhinus.</i>
<i>Crito.</i>	<i>Ioannes Marinellus.</i>
<i>Cronenburgius.</i>	<i>Ioannes Baptista Porta.</i>
<i>Damocrates.</i>	<i>Ioannes de Sancto Amando.</i>
<i>Dioscorides.</i>	<i>Isabella Cortese.</i>
<i>Euonymus.</i>	<i>Leonardus de Prædapia.</i>
<i>Fallopis.</i>	<i>Luminare maius.</i>
	<i>Leonellus.</i>

Leonellus.
Leo Suavius.
Lumen Apothecariorum.
Manardus.
Magenbuch.
Matthæus de Gradis.
Mathiolus Senensis.
Medici Colonienfes.
Medici Florentini.
Medici Ferrarienfes.
Medici Auguftani.
Mefue.
Montagnana.
Muraltus.
Nicolaus Myrepsus.
Oribafius.
Paulus Aegineta.
Paracelfus.
Petrus Andreas Perufinus.
Petrus Aponenfis.
Petrus Hispanus.
Petrus Bayrus.

Philippus Vlfadius.
Placotomus.
Plinius.
Rhafis.
Rogerius.
Rondeletius.
Ruffus.
Saladinus.
Serapio.
Seruitor.
Syluius.
Theodorus Zuingerus.
Theophrastus.
Thefaurus Aromatariorum.
Thomas Eraftus.
Trincauellus.
Trotula
Tryphon.
Varignana.
Xenocrates.
Zezar.

ANTID O-

ANTIDOTARII SPECIALIS PRAECIPVORVM
capitulum dispositio.

Medicamento =
rū differētiā in spe-
cie à causis deducun-
tur. Primam ergo
differentiam sumi-
mus à sine: & quē-
libet rursus distingui-
mus ex materia: quā
materiam formae e-
tiā diuersitas sequi-
tur. Forma rursus ex
Efficientis uarietate
distinguenta. Medi-
camenta igitur alia
conferunt ad

Sanitatē
uel conser-
uandā, uel
praeseruā-
dam, uel re-
stituēdam.
Hec autē
medicamē-
ta cum sint
mixta, mix-
tio ipsorū
fit uel

Natura, quā
uis leuis praepa-
ratio ab artifi-
ce adhibeatur,
ita tamē, ut suā
formam retine-
at. Sic Medicus
adipem praepa-
rat. Et de his LI-
BER PRI-
MVS Antido-
tarij nostri di-
spūtabit. Diui-
ditur rursus:
quia colligun-
tur uel ex cor-
poribus

Simplicibus di-
ctis: non quōd reue-
rā sint simplicia, sed
sensu, aut certē re-
spectiue, quōd com-
paratione aliorum,
minimū habeant ad-
missionis. Talia sunt,
quae sumuntur ab

Igne.
Cap. I.
fol. 1.
Aere.
Cap. II.
fol. 3.
Aqua.
III. 5
Terra.
III. 9

Mix-
tis { Ina-
nima-
tis, ut
quae
repe-
riuntur
uel in
Aqua, seu
Mari. VII.
39.
Animatis. Vide in
seq. signum A.


Me-
talla.
V. 12
Ter-
ra:
La-
pides
VI.
27.

Arte. Vide in sequentibus signum D.

Ornatum & pulchritudinem. In quibus LIBER TERTIVS
nostri Antidotarij consumetur.


β A. Medici

ANTIDOTARII SPECIALIS




B. Mea


DISPOSITIO.



ANTIDOTARIII SPECIALIS





DISPOSITIO.



ANTIDOTARII SPECIALIS DISP.

E. Medica= menta figu= ram haben= tia non flui= dam, habent eam uel	Dissipatam: ut	Pulueres.	
		Tragemata, &c. XX. 449	
	Actu: ut	Electuaria. XXI. 469	
		Opiata. XXII. 521	
	Humi= dam	Conserua. XXIII. 531	
		Eclegmata. XXIII. 538	
	Potētia, me= dio calore, ut ea quæ ex pin= guibus: ut	Condita. XXV. 546	
		Extracta, &c. XXVI. 554	
	Coa= ctā: uel	Linimenta. XXVII. 562	
		Vnguenta. XXVIII. 565	
Siccā, eamq; acqui= runt ar te rei uel	Emplastra. XXIX. 603		
	Cataplasmata. XXX. 622		
Non natura= lis: qua= les sunt	Cerata. XXXI. 630		
	Dropaces. XXXII. 635		
	Sinapismi. XXXIII. 636		
	Ceræ colorata. XXXIII. fol. 637		
	Salsa ex rebus diuersis. XXXV. fol. 638		
	Naturalis: uidelicet Metallū	Vitrum Stibij. XXXVI. 641	
		Flores Sulphuris, &c. Caput XXXVII. 642	
	Pilula. XXXVIII. 642		
	Tabula, Orbiculi. XXXIX. 665		
	Trochisci. XL. 674		
	Collyria. XLI. 689.		
	Apophlegmatismi. XLII. 695		
	Confecta. XLIII. 696		
	Glandes. XLIII. 701		
	Pesi. XLV. 704		
	Sacculi. XLVI. 706		
	Dentificia. XLVII. 709		
	Odoramenta. XLVIII. 710		
	Suffimenta. XLIX. 713.		






A^INTIDOTARII

SPECIALIS

per IO. IACOBVM Vvecherum editi

LIBER PRIMVS.

DE IGNE CAP. I.



IGNIS eligendus est flammę euatę, ex quercu, uel ilice, uel sube-
re, uel fago, uel salice, uel sarinētis uitium, non corruptis & putridis,
non uiridibus, & fumum facientibus, non uallosis, sed montanis &
siccis tactus. Talis namq; corpora sana, maximę tēpore frigidiore, cōseruat,
refrigerata calefacit, humectata siccat, densata laxat, astricta & clausa rarefa-
cit & aperit, aeris malitiam corrigit, &c. Hippocrates, & Galenus.

CANDELAB & LUCERNÆ. In cubiculis sanorum uel ægrorum, tē-
pore nocturno primum locum habent candelę, ex cęra flaua, recenti, munda,
deinde ex seuo taurino recēti, moderato calore liquato, & colato, ellych-
nioq; puro, albo & æquali, confectę. Sic etiam lucernę ex oleo commu-
ni seu oliuarum recenti, claro, mundo, & ellychnio bombacino, puro ac sub-
tili, meliores habentur. Huiusmodi enim ad aerem tenebrosum illuminan-
dum, uigilias producendas, cucurbitulasq; affigendas, &c. accommodatio-
res habentur. Quę uerò ex pinguedine ouina, uel porcina, rancida, antiqua,
adusta, impura, uel ex oleo nucum, uel ueteri, rancido & immundo sunt con-
fectę, prorsus sunt uitandę. Quoniam odorem spirāt grauem, uitalemq; spi-
ritum corrumpunt &c.

CARBONES IGNITI tum ad alimentorū tum medicamentorū pre-
parationem competunt. Eliguntur qui ex quercu, uel ilice, uel fago sunt cō-
fecti, non humidi, non semiusti, & fumum uel strepitū reddentes. Ceteri ue-
rò ex salice, picea, uel pino, inutiliores. Galenus.

a METALLA

METALLA IGNITA meliora habentur primò ex auro, deinde ex ar. **A**
gèto, postremò ex ferro. Conducunt ad cauteria facienda, carnem putridam
consumendâ, sanguinè promanantè sistendû. Ex lapidib. uerò ignitis, præfe-
runtur silicei. tales namque ad sudores eliciendos sunt aptiores. Galenus.

FVLIGO omnis exiccatoria est, ac proinde terrestris est essentiæ, habes
quasdam etiam ignis, qui materiam combussit, reliquias: sed id pusillum est.
Porro tota eius natura terrena est, tenuiû partium. Sed quæ speciatim in ea
differetiæ sunt, eæ p. uita materia eueniunt: ex acriore & calidiorè, tali etiã p.
ueniente fuligine: ex dulciore simili quoq; & hinc fuligine pueniète. Galen.

FVLIGINEM THVRIS sic facito. Forcipicula lucernis accensas singu-
latim thuris glebas, in nouam fictilè ollam concauam imposito: & æreo ua-
se, in medio perforato, deterfa diligenter sorde, obtegitò: alteram admoueto,
ex altera eius parte, aut utraque subiectis quaternûm digitorum altitudine
lapillis, quò faciliùs perspici queat, si urantur: & quà locus capax fuerit, gle-
bular alias supponito, & anteaquam prorsus prior gleba restinguatur, aliam
imposito, donec sufficientem fuliginem uidearis coegisse. Continuò tamen
externæ æramenti partes spongia, aqua frigida madefacta, abstergantur: ita
enim téperato æris feruore, fuligo omnis inhærebit, quæ alioqui per leuita-
tem decidua thuris cinerib. admiscetur. Derasa itaque fuligine, cinis crema-
ti thuris seorsum subtrahédus est. Idem opus quoad satisfactum tibi uidebi-
tur, obeundum. * Oculorum inflammationes mitigat, fluxiones suspèdit, ul-
cera purgat, cana explet, carcinomata sistit. Simili modo è myrrha, resina, sty-
race, reliquisq; lacrymis fuligo excipitur ad eadè conueniens. Dioscorides. **B**

FVLIGO è liquida pice fit hoc modo. In lucerna noua, quæ ellychni-
um habeat, nonnihil picis incendito, lucernamq; fictili uase in elibani spe-
ciem conformato, superius in angustum fornicato, inferius perforato, ut
elibani esse solent, operito, & adoleri finito: consumptoque liquore no-
uum infundito, quoad sufficientem usui fuliginem collegeris. * Vis ei a-
stringens, acrisque. Usui est ad pigmenta, quibus palpebras linunt, & uenu-
stant, & ad circûlitiones. Itè ubi glabris genis pilos restitui oportet, ad imbe-
cilles, lacrymososq; oculos: insuper ad eorundè ulcera nõ inutilis est. Diosc.

FVLIGO PICTORIA qua pictores utuntur, ex uitrarijs officinis colli-
gi solet: siquidem ei palma tribuitur. * Vis ei ad astringendum & erodendû
efficax: fracta, cû rosaceo cerato ad cicatricem perducit, Dioscorides.


CINIS combustorum lignorum reliquiæ sic nuncupantur, composi-
tæ ex contrarijs tum qualitibus, tum substantijs. Habet enim in se partim
terrenum, partim uelut fuliginosum, quod Græcè dicitur æthalodes, siue ly-
gniodes, siue quomodocunq; quis appellare uolet: atq; hæc sanè partes sunt
tenuës, & quæ maceratis aqua cineribus, & percolatis, unà asportantur atq;
abeunt. Quod uerò reliquum est, terrenû est, infirmum, & morsu carens, cali-
da facul-

A da facultate in lixiuium deposita. Sed non omnis cinis eadem temperatura præditus est, sed pro combustæ materiæ diuersitate uariatur. Galenus.

SARMENTORVM CINIS urendi uim habet: cum axungia aut uel oleo illitus, fractis neruis, articulorum collisionibus, & neruorum nodis prodest: cum nitro & aceto excrescentias carnis in scroto reprimat. Serpentiū canumq; morsibus illitus ex aceto medetur. Crustas obducentibus medicamentis admiscetur. Fit ex eo lixiuiū contra præcipitationes & fungorū uenena, cū aceto, sale & melle. Dioscorides.

CALX cineris quædam species est: fit hoc modo. Marinorum buccinorū testas igni cōdito, aut feruenti clibano nocte dimittito: postera die, si candidissimæ fuerint, extrahito: sin aliter, iterū urito, usq; dū uehemēter in albuerrint. Dein ubi in aquam frigidam demersæ fuerint, in fictile nouum cōijcito, & exactè pannis operiens, noctem unam conquiescere sinito: mane eam extrahens, ubi perfectō omni opere elaborata fuerit calx, recondito. Fit & è litoralibus calculis igne crematis, nec nō è uili & fusaneo marmore, & lapide calcario. * Vis omni calci in commune ignea, mordens, adurens, & crustas inducens: quibusdam alijs immista, ut adipi, olei, concoquendi uim assumit, mollit, & dissipat: ulcera ad cicatricē perducit. Efficacior existimatur recēs, nec aspersa aquis. Porro calx elota, medicamen est, citra morsum desiccans, magisq; si bis ter ue lauetur. Dioscorides, & Galenus.

DE AERE CAP. II.




AER tum corporum tum spirituum nostrorum elementum est. Eligen- **A**
 dus est purus, lucidus, nō qui stagni, nec paludis halitu est perturbatus, nec ex profundo specu pestilentem auram spirat: nec qui ex cloacis, quæ magnam aliquam urbem aut numerosum exercitum purgant, uitiū cōtrahit: nec qui ex animalium, olerū, leguminūq; putredine aut limo coinquinatur: nec qui ob stagnū, uel flumen uicinum nebulosus est: nec qui editis undique mōtib; in cauo loco clausus nullum recipit perflatum: nec qui uicinus est aquis, in quibus linum & canabis macerantur: sed qui purus omnino est, temperatis quidem hominibus, & temporibus temperatis, ab oriente, æstate, & calidioribus temperaturis à septentrione, uel occidente, hyme uerō & frigidioribus naturis à meridie uel oriente spirās. Quōd si aliquādo sua qualitate excedat, uel substātia uariat, ita ut nobis fuerit aduersus, frigidus quidem corrigēdus est tum ignibus ex quercu uel silice, tum aquis, uel decoctis rerum calidarum, uel suffumigijs, ex ladano, thure, sandaraca, styrace, gallia moschata, &c. Calidus uerō contemperādus, uel folijs salicis, uitiū, quercus, florib; rosarum, uiolarum, neunpharis, per cubicula stratis: uel aqua rosarum, neunpharis, & aceto & santalis: uel aqua & aceto aspersis. Quōd si corruptus uel putris fuerit aer, emundādus est tum ignibus maioribus ex quercu, uel lignis iuniperi, uel rorismarini, uel citri, citonij, uel myrthi, &c. tum suffumigijs odoratis, ex citro, iunipero, uel aceto rosaceo, uel caphura, **B** &c.* Cæterum frigidus aer, cuiusmodi est septētrionalis, cōdensat, corroborat, indurat, concoctionem iuuat, aerem pestilentem sanat. Calidus uerō rarefacit, laxat, poros aperit, humores agit, spiritus resoluit, sudorem prouocat, concoctionem impedit, uirtutem deijcit, febres ardentes gignit, &c. Humidus, ut meridionalis, humectat, sensus grauat, reciduationē facit, febres putridas & pestiferas generat. Siccus cutim exiccat, &c. Hippocrates, Galenus & Auicenna.

BALNEVM aëreum, quod Laconicum, & Calidarium uel Sudatorium uocatur, fit uel à uaporibus calidis & siccis ab igne accenso, sublatis (Barbaris stufa sicca dictū) uel à uaporibus calidis & humidis, ab herbis in uase aliquo decoctis, aut aqua supra ignitos lapides respersa (stufa humida Barbaris appellatū). * Sordes corporis abstergit, materias per totum corpus tum calefacit, tum uerō fundit: præterea quæ inæqualia sunt, æquat, & cutim laxat, & multa quæ detenta sub hac fuerunt, uacuat, ut merito sanè exercitij interdum neglecti uicem supplere queat. Fuchsius,

De A.

DE AQUA. 5.
DE AQUA CAP. III.

A



B

Aqua potabilis.

AQUA optima est, quæ pura, limpida, omnis saporis expers, gustu iucundo, clara, pellucida, tenuis, leuisq; reperitur: nec non quæ igni admota citò calefit, remota uerò ocysimè frigescit: & in qua carnes & legumina celerrimè coquuntur: quæ deniq; æstate frigida, hyeme uerò tepida existit, celeriterq; præcordia pertransit, & sine ulla uentriculi molestia labitur, & secedit. Talis autem ea esse solet, cuius fons ad orientem solem erumpit, curritq; super lapides, aut arenam, aut purissimam terram. Omnium tamen præstantissima est pluuialis, eaq; præsertim quæ in fine æstatis, uel principio autûni, uel etiâ media æstate pluit, silente cælo. Huic ferè illa respondet, quæ eodem tempo-

re cum tonitruis descendit. At ea, quæ maxima aeris ac uentorum procella, A
terrifico tonitruum, fulgurum, & grandinis impetu, ex uelociter concitatis
nubibus cælo demittitur, in humanæ uitæ usum admitti non debet. Porro
aqua cisternarum non æquè commendatur, tum quòd miscella quædam sit
diuersarum aquarum, quæ in diuersis anni temporibus inibi colliguntur ex
pluuia, ex grandine, & niuibus hyemali tēpore in tectis colliquatis: tū quòd
aquæ omnes stationariæ, putrefactioni facile sint obnoxia. Putealis præte-
rea aqua tertium in bonitate locum habet: grauis quidem est, egrèq; confici-
tur, nec omnis putredinis expers: ueruntamen tanto minus fuerit damnan-
da, quanto frequentius hauritur, uel si è subterraneo fonte scaturiat. Sequun-
tur lacustres & palustres: quæ omnino sunt improbandæ, nisi coctæ, uel igne
fuerint destillatæ. Fluiuatilis deniq; probatur, in qua nulla animalia putrefa-
cta, nulla excrementa, nullæ urbiū sordes inesse sentiuntur, &c. Galenus.

Thermarum differentie à metallis.

AQVAE minerales seu THERMAE. Balnea naturalia dicuntur, quæ per
se aut sponte, uel naturaliter scaturiunt: alioq; nomine, eo quòd illis inlit ca-
lescendi facultas, thermæ uocantur. Sunt autem quædam salia, quædam ni-
trofa, quædam aluminosa, quædam sulphurea, nonnulla bituminosa, aliqua
ferrea, aliqua ærea, aliqua cuprea, aliqua aurea, quædam ex pluribus horum
mixta, &c. B

BALNEA salia ad frigidam & humidam intemperiem, & ad eiusdem geni-
eris morbos conferunt. Proinde medentur hydropicis, frigidis neruorum do-
loribus, podagræ, resolutioni, asthmaticis: pectoris fluxiones cohibent: uen-
triculo frigido & humido conferunt, & tumoribus laxi, pituitosis, scabie in-
fectis, capiti thoraciq; fluxionibus obnoxio, &c. Galenus & alij.

NITROSA balnea à salis facultatibus non differunt, nisi quòd in omni-
bus illis ualentiores sunt, non adeò tamen adstringunt, sed ualenter abster-
gunt. quare & scabiosos mundant, & auriū ulceribus medentur, incertosq;
earum sonos atq; tumores discutiunt. Galen. & alij.

ALUMINOSA balnea, ad sanguinis reiectiones, uentriculum uomitu-
rientem, hæmorrhoidas immodicè profluētes, mulieres, quæ inordinatè pur-
gantur, & quæ frequenter abortiunt. Ad eos deniq; qui immodico sudore re-
soluuntur, & tibiæ uarices profunt. Galen.

SULPHUREA balnea calefaciunt, neruos emolliunt, dolores mitigant,
stomachum enervant & subuertunt, omnia cutis uitia exterunt: hydropicis,
alphis, leucis, impetiginibus, ulceribus antiquis, articulorū defluxioni, lieni
indurato, iecori, utero, resolutionibus, coxendicibus & scabiei subueniunt.
Galen. & alij.

BITUMINOSA balnea caput replent, sensuū instrumenta lædūt, enixè
tamen calefaciunt, & prolixè molliunt, si quis diutius immoretur, præsertim
uterum,

A uterū, uesicā & colūm. præterea aqua intercute affectis peridonea sunt. Galē.

FERRA balnea uentriculo, lieni ac renibus utilia sunt. Aerea oculis, ori, tonsillis, & uicq̄ conferūt. Cuprea articularū doloribus, podagricis, asthmaticis, nephriticis, ulceribusq̄; malignis auxiliantur. Aurea colicis doloribus, uoluulo, fistulis, podagrē, ac malignis ulceribus succurrunt. Fuchsius.

BALNEA quę ex mixtis qualitatibus cōstant, pro cuiusq̄ uincētis qualitatis ratione agūt. Proinde ex iam commemoratis facillimē omnium Germaniæ nostrę thermarum facultates dijudicare licebit, modō mixturam ac constitutionem illarum perspectam habeamus. Quare ne quid hac in parte desiderari possit, breuiter earundem, potissimū earum, quę cæteris antecellere uidentur, mixturę & uires exponendę sunt. Fuchsius.

Thermarum differentia à locis.

IN CVRIENSI diœcesi thermę sitę sunt, quę Germanis *Pfeffersbad* dicuntur: hoc est, piperina balnea. Constant mixtura auri, sulphuris & nitri. Harum aqua non continuò manat, sed tertio die Maij erūpit, decimo uerò quarto Septembris iterum sese subducit. * Mirificè doloribus capitis cōfert, memoriam roborat, uisum, auditumq̄; acuit: cerebri obstructions ac neruorū aufert, articularū doloribus, ulceribus fracturisq̄; ossiū succurrit. Fuchsius.

IN LOTHORINGIÆ montanis balnea sunt, quę *Plumbers*, quasi plumbea, ob nimirum copiosam plumbi mixturam, uocantur. Constant ex plūbi, sulphuris, & aluminis mixtione. * Auxiliantur malignis & curatu difficilibus ulceribus, cancro, phagedænis, fistulis, elephantia recēns cœptę, & omnibus cutis uitijis. Fuchsius.

Haud procul à **BADENIIS** Helueticorum salubres thermę habentur, quatum mixtura constat ex copioso sulphure, & exiguo alumine. * Profunt ad frigidam ac humidam capitis & cerebri passiones, lethargum scilicet, amissam memoriam, & similes. Calefaciunt & exiccant uentriculum, eiusq̄ concoctionem iuuant, iecoris & lienis obstructions tollunt. Detentos menses euocant, & sterilitatem auferūt. Mulieribus præterea magis quàm uiris conferunt. Fuchsius.

In inferiori **BADENIA**, ubi Marchio Badensis residet, sunt balnea mirę efficacię, quorū mixtura ex sulphure, sale & alumine existit. * Cōferūt difficile spirantibus & asthmaticis, doloribus articularū, & podagrē, à frigidis humoribus ortis, hydropicis, uteri morbis frigidis, albis potissimū mēsis: conceptionem promouent, sterilitatemq̄; remouent: & in summa uteri malis frigidis & humidis, præ ceteris balneis mirificè conueniunt: ulceribus & cutis uitijis medentur. Fuchsius.

In ducatu **VIRTENBERGENSI** haud procul à *Chalb* oppidulo, sunt thermę, quę à Martiana sylua *Vuildbad*, hoc est, ferinæ nominantur: ex eadem qua priores mixtura constant. Sunt tamē qui cupri & nitri mixtionem accedera:

accedere putent. * Viuè capitis passionibus frigidis, paralyfi, conuulſioni, A
ſtupori, & ſimilibus auxiliantur, inſtrumenta ſenſuum roborant, tinnitū au-
rium, iecoris & lienis obſtructiones tollunt, hydropicis & ictero laboranti-
bus, renum & ueſicę calculis, uentriculoq; ſuccurrunt, appetentiam excitāt,
& ferè omnia, quę Marchionis thermę, poſſunt. Viris tamē magis, quàm mu-
lieribus competunt. Fuchſius.

Haud procul à Martiana ſylua CELLENSES ſunt thermæ: quarum
mixtura ex modico ſulphure, alumine & cupro cōſtat. * Succurrunt diutur-
nis febribus, ex pituitofis ſimul & bilioſis humorib. ortis, ulceribus diutur-
nis & malignis, articulorum doloribus, appetentię caninę: ac præ cæteris
thermis conueniunt ijs, qui calido & ſiccō ſunt temperamento præpediti.
Fuchſius.

In VVIRTENBERGENSI ducatu ad Geppingam oppidum thermę
ſunt, quę Germanicè *Saurbrunn*, hoc eſt, acidus fons appellantur. Ex acidis,
quibus exigua ſulphuris acceſſit portio, harum mixtura conſtat. * Proſunt
partibus corporis luxatis, ideoq; uētriculum ac iecur potiffimū corrob-
rant. Hydropicis & regio morbo correptis, humoribus putrefactis, uoluu-
loq; opitulantur. Lumbricos quoq; ſi bibantur, enecant. Fuchſius.

THERMÆ, quę in AV ſunt, prope Rotenburgum ad Nicerum ſitum,
ſimilem cum modō dictis mixturam obtinent: copioſiore tamen ſulphuris B
portione conſtant, ideoq; minus prioribus acide: quo etiam nomine calidio-
res exiſtunt, maioriq; exiccandi eorū quę in partiū cavitatibus deliteſcunt,
facultate prædite. Fuchſius.

IN FINIBVS lacus Podmici, quem Conſtantiensem uocant, thermæ
habentur, EMS dictę, aluminis & nitri mixtura participantes. * Conferūt
doloribus capitis, neruorum reſolutionibus à coli doloribus factis, & ulce-
ribus malignis. Fuchſius.

IN ALSATIA propè *Gebersweiler* thermę ſunt, quę ex mixtura alumi-
nis, nitri & ferri conſtant. * Opitulantur lienofis, quartana laborantibus, ul-
ceribus ſordidis, & omnibus uitijs cutis. Fuchſius.

Apud ELENBOGIVM in Bohemia oppidum thermæ, ſulphuris & alu-
minis mixturam obtinent: quarum facultates ex iam cōmemoratis ſatis ſunt
notæ. Fuchſius.

VVISBADENSES thermæ ex ſulphure, alumine & exiguo nitro con-
ſtant. Fuchſius.

In BAIORARIA ſunt thermæ, quas GASTEIN nominant, quibus uehe-
mens adſtrictoria facultas ineſt, ideoq; omnia corporis excrementa diſſipāt
& abſumunt. Impregnandi facilitatem pariunt, & ne abortiant grauidę, pro-
hibent. Fuchſius

THERMÆ ſunt etiam apud Abudiacum Baioarię caſtellum ſupra Re-
ginoburgum,

A ginoburgum, quæ sulphuris, aluminis & nitri mixturam obtinent. Odore o-
ua frixa referunt. Facultates earundem, ut reliquarum, ex ijs quæ dicta sunt,
abundè constant. Fuchsius.

DE TERRIS CAP. IIII



TERRA seu BOLVS ARMENIA Galeni tempore, in graui illa pe-
stilentia primùm in lucem uenire cœpit, colore pallido. hodie duorum
est generum: alterũ Orientale, alterum nostras, quod multis locis na-
scitur, ubi sunt ferri fodinæ: utraq; rubricæ species est. Existimant nonnulli,
bolum Orientalem ex Armenia aduehi, esseq; illã ipsam, quam Galenus co-
lore pallido, Arabes luteo, croco similem describunt. Cæterum cũ illa sit ru-
bra, non abs re dubitatur, an sit bolus Armenia. Alij putant ueram esse terrã
Lemniã, quæ olim capræ imagine signabatur: aut eam potius, quæ Galeno
rubrica Lemnia uocatur, à terra Lemnia differens. Nam rubrica manus infi-
cit, terra uerò minimè. Vtut sit, existimamus alteram alterius loco usurpari
posse. Nostrate uti possumus in medicamentis foris applicandis: imò & in-
tus, si ritè præparetur, hoc modo: Abluatur uulgaris noster bolus aceto acer-
rimo, ut quàm purissimus ab arenosa cõmistiõne reddatur, & iterum pura-
tus exiccetur. Deinde quod siccatum est, ponderetur, tantundemq; ponderis
aceti capiatur cum quinta eiusdem ponderis parte olei: atq; ita in massam
subigatur totus bolus. qui ita paratus, in fictili Sigburgico reponatur, quoad
subfossus in uino uel terra asseruetur per aliquot menses pro fermentatio-
ne: imò

ne: imò quò diutius ita fermentetur, eò melior reddetur. * Huius boli ita parati usus non incongruus erit tempore pestilentie, quã misericorditer auertat Deus. Medici Colonienfes.

SIGILLVM LEMNIVM, siue **TERRA SIGILLATA** officinarũ, terra Lemnia Dioscoridis & Galeni esse debebat. Hodie duo terrarum genera Constantinopoli adferuntur: una rubescens, in placentulas exiguas formata, characteribus Turcicis signata: altera ex cinericio colore candicans, maioribus formata placentulis, characteribus item signata Turcicis. Magno in precio sunt apud Turcas, maximeque commendantur aduersus uenenat: neque facillè earum copia haberi potest. Quæ Constantinopolim adferuntur, non è Lemno, sed alijs, ex locis, multoque longius disitis aduehuntur. Itaque arbitrandum non est, ullam ex iam dictis terram Lemniam esse. Rufa quibusdam è Lemno aduehi, ueraque terra Lemnia esse creditur. Plerique bolus Armeniam Orientalem ueram esse terram Lemniam, crediderunt. Sed nihil certi statuere possumus: magis tamen illi quadrare uidentur terræ Lemniæ notæ, quàm duabus prædictis. Reperta est etiã in Melita: terræ quoddam genus candidum, leue, quod à circumforaneis impostoribus uenditur, aduersus uenena efficacis. Itaque terræ Lemniæ loco commodè, aut bolus Armenia ex Oriente petita, aut prædictarum aliqua sumi potest: tamen si Turcicæ aduersus uiperæ morsus non admodum efficaces sint, multoque minus, quæ ex Melita adfertur. Verùm si bolus Armenia aduersus uiperæ morsus eam haberet uim, quam terræ Lemniæ tribuunt: terra Lemnia legitima sine controuersia esset, aut saltem illi secure substitui posset, & facile esset experimentum, quemadmodum de Turcicis terris in canibus à uiperæ demorsis periculum fecimus. nam quibus allium cum uino datum est, hi liberati sunt: quibus uero terræ supra recitate, hi mortui sunt, aut magna cum difficultate liberati. Terræ sigillatæ officinarum, cum ne una quidem nota Lemniæ quadret, nullus usus esse potest, nisi in ijs duntaxat medicamentis, quæ foris adhibentur. hæ enim nihil præter manifestarum qualitatuum operationem desiderant. Medici Florentini & Colonienfes.

OCHRAM leuissimam, & omnino luteam eligere oportet, saturatam, non lapidosam, friabilem, natione Atticam. Vritur hæc, & lauatur cadmiæ modo. * Vis eius adstringere, erodere, collectiones & tubercula dissipare. Exerescetia in carne reprimat, caua cum cerato explet, & articularũ tophos comminuit. Dioscorides.

RUBRICA Sinopis maximè probatur grauis, densa, ad iecinoris imaginem uergens, calculorum expers, concolor, cum diluitur, impendio subtilis. Effoditur in Cappadocia, speluncis quibusdam, expurgataque defertur in Sinopem urbem, in qua uenditur: unde cognometum accepit. * Vim habet exiccatoriam, quasi inducendo obstruentem, & adstrictoriam, quapropter uulnerarijs

A vulnerarijs emplastris, & pastillis exiccantibus, & adstrictorijs commisceri solet. Alium sinit, in ovo sumpta, aut clystere infusa. Datur iecinoris uitio laborantibus. Dioscorides.

RVBRICA fabrilis ad omnia Sinopide inferior est. Optima Aegyptia & Carthaginensis, lapidum expers, friabilis. Gignitur etiam in Iberia, quæ ad Occidentem spectat, ochra exusta, & degenerante in rubricam. Diosc.

OMNIS terra, ad medendi usum recepta, summâ & primam vim habet refrigerandi, meatusq; obducendi, occludendiq;: sed specie distat, cum alia adiunctis quibusdam ad alia sit utilis. Dioscorides.

ERETRIADES duæ sunt: una uehementer alba est, altera cinericia. Optima habetur ad cinereum colorem uergens, perquam mollis: quæ si per æramenta tractim ducatur, lineam uiolaceam refert. Lauatur ut cerussa, aut hunc in modum. Teritur seorsum, & cum aqua, & ubi pessum ierit, humor leuiter excolatur: siccata solibus, iterum teritur interdum, adiecta aqua, ut uespere confidat: antelucanis colo excernitur & demum in sole trita, si fieri potest, digeritur in pastillos. Quod si tosta desideretur, pastilli magnitudine cineris in fictile perforatum conijciuntur, oreq; uasis diligenter obturato, supra carbones candentes continenter follibus persflantur: ubi uero cinis in fauillas se conuertit, aut aereum colorem contraxit, exempti reconduntur.

B * Vim habet astringentem, & refrigeratorem, leuiter mollientem: caua explet, & sanguinolenta conglutinat. Dioscorides.

SAMIA præfertur candida, leuis, tangenti linguæ glutinis modo adhærens, mollis, succosa, friabilis: cuiusmodi est, quam aliqui collyrion uocant. Duæ enim species eius: unam antè diximus: altera Aster appellatur. crustacea, & cotis modo prædensa. Vritur ac lauatur, ut Eretria. uimq; consimilem habet. * Sanguinis reiectiones sinit: foeminis fluxione uulvæ laborantibus, cum flore syluestris puniceæ datur. Testium & mammarum inflammationes, illita ex rosaceo & aqua, refrigerat: sudores arcer. contra serpentium morsus, & uenena, pota ex aqua auxiliatur. Quod si non sit in proprio, eius loco substituat lapis hæmatites. Dioscorides.

CHIA eligi debet candida, uergens ad cinerem, Samiæ similis. Est autem crustosa, albaq; sed fictitij formis differens. * Vis eadem, quæ & Samiæ extendit faciem, & erugat, atque splendidam reddit: colorem in facie, & corpore toto commendat. in balneo pro nitro deterget. Dioscorides.

Eadem præstat **SELINVSIA**. maximè laudatur, quæ uehementer resplendet, candida, friabilis, & humore dilui celerrima. Diosc.

CIMOLIAE duo genera: candida, & ad purpureum inclinans. Optima existimatur, quæ innatam habet pinguitudinem, tactuque frigida sentitur.

* Vtraque aceto diluta, parotidas, & alia tubercula discutit. Ambusta igne, si statim cimolia oblinantur, pustulas non sentiet: testium duritias, & totius corporis

corporis collectiones cohibet: igni sacro imponitur. In summa, utraq; multum in medicina commendatur, si incorruptæ originis, nec spuria assumatur. Dioscorides. A

Quæ **PNIGITIS** dicitur, colore ferè Eretriæ similis est, grandioribus tantum glebis: manum si quis admoueat, refrigerabit: tactu lingue usque adeo glutinosa, ut pensilis hæreat. Cui effectus idem, qui cimoliæ, paulo tamen infirmior. Hanc aliqui pro eretriade uendunt. Dioscorides.

MELIA colore cineream eritream imitatur, aspera tactu: ea digitis friata, derasi pumicis modo crepitat. * Vim habet aluminosam, sed remissiusculâ, id quod gustu deprehenditur: modicè linguam siccatur: purum corpus reddit, & colorem commendat: pilos extenuat: uirilignes & lepras abstergit. Pistoribus usum præbet, ut colores diutius perennent. Emplastris uiridibus, quæ chloræ dicuntur, efficaciter inseritur. Ex omni Melia terra, & omnia alia in uniuersum, eligi debet recens, mollis, non lapidosa, friabilis, quæ cum humorem attigerit, facillè resoluatur. Dioscorides.

EX AMPELITIDE terra, quæ pharmacitis nomine in Seleucia Syria nascitur, laudatur imprimis nigra, piceæ longos carbones referens, modicè alluosa, æquabili splendore, quæ detrita, accepta oleo, statim eliquescit. Vitiōsa censetur candida, & cinerea, quæ in liquorem non resoluatur. * Vim dissipandi & refrigerandi habet. ad calliblephara additur, tingendis capillis idonea. Vfus eius ad illinendas uites, sub germinationis tempus, utpote cum innascentes uermiculos enecet. Dioscorides. B

FORNACBÆ testæ uehementer tostæ, crustas ulceribus obducunt: quare prurigo, & papularû eruptionibus incedunt. Podagricis profunt: strumas discutunt, cerato exemptæ. Dioscorides.

FORNACVM terra, quæ retorrída fuluescit, eiusdem cum testa effectus. Dioscorides.


DE METALLIS CAP. V

Metallorum alia alterant	}	Conseruando, &c. Vide signum A.
		Corrumpendo: ut uenena

}	Argentum uiuum.
	Argenti spuma.
	Auripigmentum.
	Cerussa.
	Calx.
	Gypsum.
Sandaracha.	

A. Con-

DE METALLIS.



De metallis temperatis.

AVRVM omnium metallorum præstantissimum est, ductile, colore lucido, illiq; persimili, quo cuncta à sole illustratur. Insuper, ppria quadã attractrice vi pollet, qua respicientium animos allicit, & disponit, ut ab ipsis illicò desideretur. unde quidã existimarunt, auro proprias q̄ plurimas inesse dotes. In Italia propriæ sinceri auri fodinæ (quod sciam) nullibi extant. Atqui in Germania, Pannonia, ac Transylvania eã pluribus in locis habentur. Auri uenam ijs omnibus locis crediderim gigni, ubi cœlum id causę elementaris inffuat, ac disponat. Huius uenã uarijs lapidibus impacta uisitur in asperrimorum montium uisceribus. Verum ea omnium præstantissima auri uena censetur, cui cæruleus lapis fuerit admixtus. tanto enim melior hæc, quanto ponderosior, & colore uigentior: adeò ut illa cæteras præcellat, quæ pluribus auri guttis scintillet, uel in aqua plures auri lineæ intercurfantes conspiciantur. Est etiam auri ferax diuersorum fluminum arena. Siquidem proculdubio constat in Hispania Tagum, in Thracia Ebrum, in India Gangem & Pactolum, in Pannonia Istrum, in Germania Rhenum, in Italia Padum & Ticinum, aureas ducere arenas, à quibus arte quadam aurum omnium probatissimum elicitur. Veruntamen non omnibus eorum litoribus aureæ eadem sunt arenas. * Aurum in omnibus suis partibus æquale est, cor & uitalem facultatem mirum in modum corroborat. Inseritur medicamentis, quæ atrabilarijs cõpetunt morbis. Adhæc ubi actuali cauterio sit opus, ignitum aurum cæteris præstat metallis, quòd ulcus inde exortum citius confanescat. In ore contentum, anhelitus graueolentiam tollit. Auri scobs porphyrite lapide læuigata, in ea medicamenta additur, quæ ad alopecias, & lichenas parantur, tam intus in corpus sumptum, quàm extrã medicamentis exceptum. Hæc item eodem modo diutius læuigata, adeò ut tactum ferè effugiat, oculis immittitur ad roborandam eorum aciem. Bibitur autem & ad cordis affectus, & animi mœrores. Cardiacæ, melancholiæ, cordis palpitationi, morbo attonito, comitiali, elephantiaico medetur: adhæc spiritus animales, uitalesq; recreat. Utendi ratio est, cum uel candens iusculis, alijsue succis, uel destillatis intingitur, uel in puluerem redigitur, uel in oleum conuertitur. Si liquidum est, duæ, tres, aut plures guttæ ex uino maluatico assumuntur: si puluerem eius exhibere uoles, scrupuli dimidium satisfaciet: humoris candente auro imbuti cyathus. Eligitur purissimum quodque, siue ex asperrimorum montium uisceribus, siue ex fluminum arenis colligatur. Aucenna, Mathiolus, Andernacus.

De metallis calefacientibus & siccantibus in gradu secundo.

FERRVM extenuat, siccat, resoluit: scobs ipsius candens uino & aqua extincta, stomachi inbecillitati, cœliacis, dysentericis, lienisque abscessui auxiliatur.

A auxiliatur: profuuo urinæ, menstruorumq; & sputo sanguinis, aqua cui fer-
rum candens intingitur, potu conducit. Squama ferri ex ferro decidens,
dum aqua extinguitur ad eius indurationem, aliamue ob causam. In fabricorū
officinis reperitur. De croco Martis, uide suo loco. Andernacus: *op. 10111111*

CINNABARIS uera (quæ res mineralis erat) hodie ignoratur. Cin-
nabaris uerò neotericorum factitia, est quiddam ex sulphure uiuo & argen-
to uiuo simul, uis. proinde nulla ratione substitui debet pro cinnabari Gra-
corum, quæ uires habebat easdem cum hæmatite lapide, & tam rara erat, etiã
terate Dioscoridis, ut uersicoloribus pictorū lineis uix satisfaceret: unde eã
incognitam esse fateri cogimur. Medici Colonenses: *nomesibam mrolo 11111111*

De metallis calefacientibus & siccantibus in gradu tertio. *11111111*

FLORS æris grana quædam sunt minutissima, panici effigie, rubentia æ-
ris modo, quæ exiliunt ac erumpunt, quando æs per cola funditur, & aqua pu-
ra & frigidissima affunditur. Facile reperiri potest in ærarijs officinis. Opti-
mus est friabilis, in attritu fuluescens, nilij effigie & numero, breuis, ponde-
rosus, modicè splendenens atq; constringens, qui delinatam æris scobem non
recipit, quæ sæpe aduiteratur. Sed id facile deprehenditur, eum detitum illi
dilatantur ramenta. Fit autem cum æs fornacibus fustum, in receptacula dela-
bitur, per cola fistularum ad ea pertinentium. tunc huic negotio adiecti mi-
nistri, sordes expurgantes, aquam clarissimam infundunt, refrigerandi pro-
posito: itaque repentino concretu, ac addensatione, uelut expuitur, & erum-
pit antedictus flos. * Adstringit, & excrecentia coerces: offusam oculis cali-
ginem emendat, sed magnopere mordet. Quaternum obolorum pondere
datas, crassum humorè extrahit, cariosa narium, & sedis uitia absumit: eru-
ptiones papularum cum uino cohibet. Candidus contra diuturnas aurium
grauitates tritus, in eas per fistulam statim impellitur: uuam, tonsillasq; reprimi-
t, farina eius cum melle admota. Dioscorides.

ÆS uisum probatur rubrū, & quod cōtritu colore cinnabari imitetur:
nigrum uerò plus quàm deceat, exustum est. Fit autem è clauis solutarum
nauium, fictili crudo compositis: subsperfo sulphure cum sale pari, omni-
bus uicissim insperis, fictile, circūlito figulari creta spiramento, fornacibus
inditur, donec figlinum percoquatur. Quidam pro sulphure & sale alumen
inspergant. Alij sine sulphure ac sale, fictili multos dies urunt. Alij sulphure
solo utantur, fuliginem tamen excutiunt. Alij oblitos scissili alumine clauos
cum sulphure & aceto, fictili crudo cremāt. Alij in ænea olla aceto resperfos
urunt, ac iterum & tertio idem efficiunt, postea recondunt. Præcipem lo-
cum tenet, in Memphide combustum: proximum, in Cipro. * Adstringit, ex-
siccat, reprimi, extenuat, attrahit: ulcera purgat, & ad cicatricem perducit: ul-
tra oculorum emendat, excrecentia in carne consumit, nomas cohibet: ob-
mitus ciet cum hydromelite potum, aut cum melle delinctum, illitum ue. La-
uatur

11111111

uatur ut Cadmia, mutata quater die aqua, donec nulla prorsus sordes emer- **A**
gat. Dioscorides.

SQVAMA æris excussa ex Cyprijs officinarū clavis, crassa quidē ipsa p̄-
stantior, quæ helitis, id est, clauaris nominatur. Sed ex uili promiscuoq; æ-
re, aut candido, uitiosa intelligitur: quam, utpote tenuem & inualidam, da-
mnamus, maximē approbantes crassam, rufam, præsertim si aceti resper-
sæ æruginem contrahat. * Vim habet adstrictoriam, extenuantem, reprimen-
tem & erodentem: nomas coercet, ulcera ad cicatricem perducit. pota ex a-
qua mulla, aquam trahit. Aliqui farina subactū dant in catapotio. Additur ad
oculorum medicamenta: genarum namque scabritiam absumit, & fluxiones
exiccat. Dioscorides.

ÆRUGO rafa fit ijs modis. In cadum aut aliud cōsimile uas, acetū quàm
acerrimum infunditur: superponitur inde inuersum æneum uas, præsertim
concameratum: sin minus, planum: sitq; obstructū, nullumq; habeat spira-
mentum: exempto, quo doliolum obturaueris, operculo, decimum post diē
insidens ærugo deraditur. Aut æris lamina in cadis super acetum ita suspen-
ditur, ne ipsum attingat, & totidem post dies raditur. Aut massula æris, aut
lamina una plures uel uinaceis non recentibus, sed iam acescentibus condū-
tur, & simili modo uersantur. Quinetiam ex delimita æris scobe æruginem
facere licet: nec non ē laminis, quibus bractæe auri conclusæ malleo ducun- **B**
tur, si quis eas aceto respergat, & ter aut quater uerset, donec æruginem con-
trahant. Tradunt æruginem in Cyprijs metallis gigni, lapidibus quibusdam
non nihil æris habentibus, quibus ærugo efflorescit: adduntq; per Canicu-
læ æstus ē quodam specu manare: sed illam paucam, & optimam esse: hanc
speluncis effluentem, copiosam quidem, & boni coloris, sed uitiosam, quod
lapides multos collegerit. Pluribus autem modis adulterant: aliqui pumice
admissto, alij marmore, alij atramento sutorio. Sed deprehendemus pumi-
cem, aut marmor, dum pollice sinistrae manus madefacto, æruginis portiu-
culam altero atterimus: siquidem eam diffundi constat: marmoris autem,
pumicisque partes coeunt non dissipatæ, demumq; tractatione crebra, &
humoris complexu dealbescent. quin & dentium appressu: siquidem sine-
ra cedit, læuis, & sine asperitate. Atramētum uerò sutorium igne coarguitur:
namque si fictile, aut lamina adulterata æruginē illinatur, & feruenti cinere,
aut carbonibus incalescat alterutrum, mutabitur, rubescetq; id, quod atra-
mentum sutorium acceperit: quod id uisum suapte natura talem sortitur co-
lorem. Dioscorides.

ÆRUGINIS quam uocant scoleciam, duo sunt genera. quædam fossilis
est, altera factitia ad hunc modum. In mortario Cyprij æris dimidiam hemi-
nam aceti albi acrisq; pistillo cupreo conterito, donec strigenti crassitu-
dinem imitetur: deinde aluminis rotundi drachmam unā, cum salis fossitij
translucen-

A translucens, aut marini quàm albissimi, solidique, aut certè cum nitri pari pondere teritur in sole æstuosissimis diebus, sub sidus caniculæ, donec colorem æruginis contrahat, & concretu strigmentosum fiat: ubi autè se in uermiculorum Rhodiæ similibus speciebus coegerit, recondito. Efficax, & ualde boni coloris redditur, si duas partes ueteris, cum una aceti adieceris, & alia, quæ dicta sunt, peregeris. Sunt qui æruginem rasilem, quæ in apparatu nõ respondit, gummi misto digerant in formas, & ita uendat, quod genus, ut uitiolum, improbat. Fit & quædam ærugo ab aurificibus, mortario & pistillo Cyprij æris, cum urina pueri impubis, qua aurum ferruminant. Antedicta æruginum genera usto æri omnino respondent, sed magis effectu ualent. Sciedum, fossilem scoleciam præstantissimam esse: derasam sequi: postremo loco factitiam. mordacissima tamen est hæc, & magis astringens. Aurificum autem ærugo rasæ respondet. Aerugines omnes astringunt, extenuat, excalfaciunt. oculorum cicatrices emedant, lachrymas cient, nomas sistunt, uulnera ab inflammatione tuentur. Ulcera ex oleo ceraque ad cicatricem perducent: callos, & sordida ulcera purgant, cum melle coctæ: callum fistularum erodunt cum ammoniaco, collirij modo in eas adactæ, ad gingiuarum autem excrescentias, & extuberationem utiles. Magnopere extenuat genarum crustitiam, cum melle illitæ: uerum post illitionem spongia ex aqua calida locus fo-

B uendus est. resina therebinthina exceptæ, cum ære & nitro lepras abigunt. Vritur ærugo, quamcunque uelis, minutissimè fracta, comminutaque, in fictili patina, flagrantibus prunis superposita: uersaturque donec se mutet, & colorem cinereum concipiat: postea refrigerata reponitur ad usum. Sunt qui cruda olla eam urat, uti dictum est: sed non profus eundem colorem cremata reddit. Dioscorides. Porro æruginem, quod colore sit uiridi, officinæ ac medici in Italia æs uiride nuncupant, & uulgari sermone uerde rame. Verum quamuis officinæ eo in uniuersum abundant: sinceri tamen parum ostendunt. Scoleciæ ærugine, ac fossitia destituimur: quod altera (quod sciam) hoc tempore non paratur, altera uerò ab ærarijs fodinis, ubi fortasse plurima reperitur, à fossoribus non deferatur. Proinde cum harum copia nõ sit, ea tantum utimur, quæ ære in acetarijs cadis demisso, aut uinaceis iam acescentibus obruto, conficitur. Hallucinantur, qui credunt æruginem & æris florem, unam & eandem rem esse. Mathiolus.

DIPHRYGES quasi bis tostum, est perfecti æris ueluti fæx subsidens, & cohærens imæ fornacum parti: ablato ære post aquæ frigidæ effusionem uisitur. acre est, ut æs ustum. Præfertur quod saporem æris & æruginis habet, astringens & uehementer siccans linguam, quod exusta ochra sibi non uindicat, quæ tamen diphyrgis uice uenditur: adulteratur enim ochra uista, quæ uti diphyrges rubescit. Est etiam aliud genus factitium, quod ex pyrite eroso lapide fit, multos dies, ut calx cremato, donec rubescat, ut rubrica: deinde sub-

c de sub-

de sublatum reponitur. Fiebat etiam è luti cuiusdam Cyprij genere hodie in **A** usitatum: priora uerò duo genera facillè reperiri possunt. * Vis eius astringere, perpurigare, extergere, siccare, excrescentia consumere, ulcera serpentia, & quæ cacoethe uocant, ad cicatricem perducere. Suppurationes therebinthina aut cerato exceptum discutit. Quòd si ad manus nõ sit, eius loco Mar chasita ustus, aut æs ustum substitui poterit. Dioscorides.

ALUMINIS apud ueteres tria fuerunt genera, liquidum, rotundũ, scissile: quo duntaxat utimur sub nomine uulgaris aluminis plumæ. Cæterum quotiescunq; in medicamento alicuius compositione alumen simpliciter reperitur, scissile intelligendum est, ueluti omnium efficacissimum. Optimum est candidissimum, ualde astringens, graui odore, non lapidosum, non compactum, sed plerumque in capillamenta quædam canescentia dehiscens. Ex Aegypto adfertur. Adulteratur lapide Amiantho, sed gustu dignoscitur, qd non astringat. Præter iam recitata aluminum genera, factitia tria reperiuntur: nempe alumen fecum, quod fit ex uini fæcibus sole siccatis, donec albescant, deinde ustis. Alumè eatinũ, quod fit è cineribus herbæ kali, seu Sodæ uulgaris. Alumen scaiolæ: idq; fit è lapide speculari, quem uulgò speculũ Asini uocant. E' factitij etiam sunt alumè rocæ, & Zuccharinum: illud ex lapide cãdido, interdum subrubro sæpius præparato: hoc uerò ex alumine rocæ, saccharo, & oui albumine paratur. Aluminis liquidi & rotundi loco, **B** fatis comòdè usurpare possumus alumen rocæ. Alumen crassarũ partium est. * Vim habet excalfaciendi, astringendi & expurgandi. Ulcera putrida emendat: humida exiccat, carnem super excrescētē coercet: pruritus tollit, & scabiem sanat, &c. Galenus, Dioscorides, & Florentini Medici.

SAL natius est, & factitius. Natiuus uel in terra, uel ad mare ex aqua marina, uel in lacubus, uel in fluminibus, aut in fontibus. Natiui (quãuis uariæ sint differētia, diuersisq; locis reperiatur) in usum tamè medicũ tres recepti sunt: uidelicet sal Ammoniacus, uulgò Armeniacus dictus, sal gemmæ, & sal Indus. Ex his uerò salè gemmæ duntaxat habemus, candidũ, translucentè crystalli modo, estq; sal fossilis. Sal Armeniacus hodie dictus, nõ est natiuus, sed factitius. Ex eorum genere, qui sponte in aquis generatur, multæ sunt differētia. Qui in mari nascitur, & in scopulis reperitur, ex spuma maris conflatus, spuma salis appellatur. Qui in Iudææ lacu gignitur, in quo & asphaltus nascitur, Sodomeus uocatur, ab Arabib; sal naphiticus, amarus est. Hoc caremus, quemadmodum & reliquis natiuis in lacubus aut fluminibus repertis. Factitiorum uaria sunt genera, secundũ materiam, ex qua fiunt, differentia. Nam alia ex aquis salis generantur, ueluti marinus: & qui ex fontibus fiunt, ut sal communis: alij ex cineribus (de quibus suo loco) alia uè materia, quemadmodum sal Alkali, qui fit ex herba kali, & uulgaris Armeniacus, qui in Alexandria fit in balneis. Cæterum hodie pro efficacissimo in medicina sale gemmæ uti-

A mæ utimur, qui fossilis est, ut diximus, & in Germania, alijsq; locis eruitur. Præfertur deinde marinus. omnium infirmissimus est vulgaris. Saccharum candi tametsi Auicenna interdum salem Indum appellet, inter sales tamen referendus non uidetur. Is præterea quem Dioscorides salis florem, aut rectius maris florem nominat, sali multum dissimilis est: nihil enim aliud est quàm pinguedo quædam crocei coloris mari, Nylo, & alijs lacubus innatâs: eo tamen hodie etiam caremus. Qui propriè flos salis dicitur, in salis fodinis reperitur, & in ipsis etiam salignis, uelut pollen quidam crassiorè salem ambiens: tenuiorū multo est partium quàm sal, colore candidissimo, interdum cinereo, qui inferior est. * Porrò sal omnis digerit, atringit, calefacit, siccatur, abstergit, resoluit, & quicquid humidum est, consumit, dissipat: miscetur medicamentis purgantibus, & alijs, quæ intrinsecus adhibentur: nec non glandibus & clysteribus. Medici Florentini.

NITRI apud ueteres multæ erant differentiæ: natium, factitium, & a-phronitru, quod ueluti nitri flos erat. Hodie unicum habemus nitri genus, nempe boracem non excoctam, quæ quibusdam nitrum fossile est: eoq; nitri loco uti possumus. Sal nitri, tametsi proximè ad nitri naturâ accedat, nullus tamè eius in medicina usus esse potest, præsertim in his, quæ intrò assumuntur. Medici Colonienfes.

B **SULPHURIS** duo sunt genera: uiuum, quod spontè & per se nascitur: & ignem expertum, quod arte in fornacibus fit. Optimum existimatur uiuū, quod apyron uocant, nitedulæ modo splendidum, perlucens, minimè lapidosum. Probat in genere sulphuris ignem experti, quod uiret, ac præpingue spectatur. Plurimum in Melo & Lipara gignitur. Supradictum sulphur calefacit, discutit, & celeriter concoquit. * Prodest tussibus, suspensoriis, purulentis extusientibus. in ouo sumptū, aut suffitum: præterea partus uisti nidore extrahit. Lepras, lichenas, scabros ungues, cum resina terebinthina mistum auferit: cum aceto autem illitum, ad lepras efficax est: uirilignes tollit. Scorpionis ictibus, addita resina, medetur: cū aceto uerò, draconis marini, scorpionisq; plagas sanat. Pruritus toto corpore erumpentes, cum nitro deterfum sedat: regium morbum emendat, inpersum fronti cochlearis mensura, aut in forbili ouo sumptum. Facit ad grauedinem & destillatiões, sudores quoq; cōpersum inhibet. podagricis cum aqua & nitro illitum, conducit. grauitatem auditus, suffiti nidorem raptim per listulam hausto, sanat. Lethargicos suffitu excitat: erumpentem undecunq; sanguinem sistit. Contusis auribus, cum uino & melle illitum, medetur. Chimici oleum seu balsamum ex eo adeò efficax cōficiunt, ut neq; uiuum corpus, neq; mortuum ad putredinem transire sinat: sed adeò integrum tueatur, ut neq; ulla cœlestis impressio, uel ab elementis profecta corruptio, uel ab ipso iam ortu inducta obesse ei possit. de quo uide suo loco. Dioscorides, Andernacus.

CHALCITIS metallica res est, in uenis ærarijs nata, mediæ inter Mi- **A**
 fy & Sory facultatis, medijsq; situs. Præfertur similis æri, friabilis, nec lapido-
 sa, nec inueterata, intercurrentibus oblongis uenis, splendentibusq; : cuius-
 modi est, quæ in Thuscia Italiæ parte inuenitur. In Germania etiam Chalciti-
 dis genus reperitur, lapidosum, ponderosum, rubrum cum scintillis aureis.
 Præfertur Italica, potissimum ad Theriacæ compositionem: ad reliquorum
 uerò medicamentorum compositionem Germanica uti possumus. * Cæte-
 rum Chalcitidi absterforia uis inest, excalescens, & crustas ulceribus obdu-
 dens: purgat, quæ oculis, & eorundem angulis hærent. In genere leuiter ero-
 dentium est, &c. Dioscorides, Medici Florentini.

De metallis calidis & siccis in gradu quarto.

VITRIOLVM, quod Græcis Chalcanthum, Latinis atramentum sutoriū
 appellatur, duplex est: factitiū & natiuum. Natiuum in terræ uenis, aut saxo-
 rum commissuris concretum reperitur: aut dum ex ijs guttatim distillat, par-
 tim ex ijs stiriæ instar dependet, partim in canalium fundum decedit. Ho-
 die aliud itē genus in terræ superficie concretum reperitur, quod uulgò cop-
 parosa uocatur. Factitium etiā duplex est. Vnū quod in Cypro peculiariter
 fiebat, ex aqua quadā manante ex soryos, chalcitidis, & misyos fodinis, atq;
 in piscinas quadratas effusa, ibi sponte concresebat. Alterum fit decocta a-
 qua, in qua maauerit terra quædam atramentosa: ut hodie moris est in mul- **B**
 tis locis. Natiuum factitio præstantius est: ideo in eorum numerum coppa-
 rosa Cypria referri potest, cum sit aliorum penuria. E' factitij generibus, Cy-
 prium excellebat: cum uerò desit, uitriolum Romanum aut Siculum usurpa-
 ri potest, ueluti præstantissimum inter factitiorum genera. * Insigniter calefa-
 cit, maximeq; astringit: ideo totius carnis naturam siccatur, & in se contrahit.
 Chemici ex eo oleum hodie parant: de quo suo loco. Medici Florētini.

AURIPIGMENTVM aurum colore imitatur. Eius apud Dioscoridem
 duo genera. Vnum è multis squamis, ut altera alteri imposita uideatur, con-
 stat: id si purum fuerit, nec ulli materiæ permixtū, optimū existimatur. Alte-
 rum colore sandarachæ, hoc est rubrum, glandis effigie. Deligendum ergo au-
 reo colore micās, è tenuibus squamis compactum, quod facillè finditur, & la-
 pillis aut terræ permixtum non est. Ex auripigmento natiuo fit artificiale, Ar-
 senicum uidelicet & Reagal uulgò uocatum. * Vim habet adstrictoriam, & e-
 rodentem. Crustas cum uehementi uredine, & uiolēto morsu excitat. reprim-
 it quæ excrescunt, & capillos euellit. De oleo, quod ex eo cōficitur, uide in-
 frā suo loco. Medici Florentini.

SANDARACHA lapis est in metallicis uenis, plerunq; cum auripigmē-
 to nascens, rufa est, cinnabaris colore, nonnihil ad luteum uergens. quæ cum
 uritur, fumum exhalat pallidum, sulphurisq; uirus redolet, tametsi non con-
 sumatur. Facillè hodie legitima haberi potest: factitia tamē etiam fieri potest,
 si auripig-

A si auripigmentum coquatur, donec cinnabaris colorem contrahat, potestque uere sandarachæ loco substitui. Sed animaduertendum est, sandarachæ uocabulo apud Arabes uernicè intelligi, quæ nihil aliud est, quàm gummi iuniperi, non autem prædictum lapidè. Itaque curam adhibeant Medici, ne altera alterius loco indifferenter utantur. * Vis eadem, & uisio, quæ auripigmento. Explet alopecias, resina excepta, & scabros ungues cum pice exiunit. Contra phthiriasin ex oleo efficax est: tubercula cum adipe discutit. Prodest ad narium, orisque; ulcera, & cæteras papularum eruptiones cum rosaceo: itè codylomata. Datur ex mulso, purulenta extusisientibus. suffitur quoque cum resina, aduersus ueterem tussim, rapta per fistulam nidore: uocem expedit cum melle delincta: suspiriosis cum resina in catapotio optimè datur. Dioscorides, & Florentini.

CHRYSOCOLLA siue borax natium, genus nitri fossilis est, ab Armenia & Macedonia, & Cypro translatum, in aurarijs, argentarijs & ærarijs fodinis repertum. præstantissimum est Armenium, ærarium præsini coloris: saporis nitrosi cum aliquali amaritudine, & substantia dura. iisdem in locis reperitur, arenæ per se simile, aut materiæ metallicæ permixtum, sed quod ab arsum arenæ similitudinem gerit. Huius usus est in medicamentis & aurifabrorum officinis, quemadmodum apud ueteres chryfocollæ. Factitia Chryfocolla ex pueri urina in æreo mortario trita pistillo æreo fiebat. Hæc Medicis in usu fuit. Sunt etiamnum aliæ factitiæ, quæ pictoribus tantum seruiunt. * Vis Chryfocollæ ad purgandas cicatrices: excrescentem carnem coercet, astringit, purgat, excofacit, & modicè corpus mordèdo exest. Inter medicamenta intelligitur, quæ uomitiones cõcitant, & necè inferre possunt. Diosc.

MISY assumendum natione Cyprium, auri simile, durum, quod friando auri colorem imitatur, & stellæ modo splendet. * Vim habet & uisionem, cum chalcitide eandem, præterquam quòd psoricum ex eo non conficitur, excessus, defectusque; ratione tantum differens. Aegyptium aut cæteris præstat, utpote quod efficacius habeatur, sed ad ocularia medicamenta multò super prædicto inferius. Quod si deficiat, eius loco sumi poterit uitriolum uetustum. Dioscorides.

SORY existimantur aliqui melanteriam esse, aberrantes: siquidè sui generis est sory, ei non ab simile. Verum sory uirus inest graue, & nauseam mouens. Inuenitur, etiam in Aegypto, & alijs quibusdã regionibus, ut in Libya, Hispania & Cypro. Præfertur Aegyptium, quodque; frianti nigrius apparet, in multa foramina dehiscens, suppingue, insuper astringens, & olfactu deuorationeque magnum uirus oleus, ita ut stomachus in uomitiones effundatur. Quod autem friatum scintillas misyos modo non emittit, & alterius generis esse, & inualidum, censendum est. * Vim & uisionem supradictis similem habet. Dolori dentium cauernis inditum medetur, eosque; labâtes firmat: ischiadicis ex

dicis ex uino infusum auxiliatur: illitum cum aqua, uaros extinguit. Medica mentis admiscetur, quæ capillos denigrant. Hæc autem ferè omnia, & alia, quæ uisionem experta non sunt, perustis ualidiora esse existimantur: præter salem, & uini sæcem, nitrum, calcem, & cõsimilia, quæ cruda remissiora sunt: combusta enim uiribus efficaciora redduntur. Dioscorides.

MELANTERIA geminæ est originis. quædam in faucibus cuniculorũ, quibus es eruitur, salis modo cõcrescit. Alia uerò in summa facie supradictorum locorum coit, quæ terrena est. Quinetiam inuenitur in Cilicia, & alijs quibusdam regionibus, fossilis quædam. Præstat, quæ sulphuris colorem trahit, læuis, pura, æquabilis, & quæ contactu aquæ confestim nigrescit. * Vim causticam eam obtinet, quam & misy. Si deficiat, eius loco accipiatur uitriolum, aut copparosa dicta. Dioscorides.

De metallis frigidis in primo.

STIMMI uel **STIBIUM**, uulgò **ANTIMONIVM**, optimum, quod splendidissimum est, modoq; nitedularum emicat, con fractu crustosum, nihil terræ aut sordidi habens, friabile. * Vis eius alstringere, meatus obstruere, refrigerare, excrescentia in carne cohibere, ulcera ad cicatricem perducere, sordes & ulcera oculorum expurgare: sistit & sanguinem è cerebri membrana pfluere. & ut in uniuersum dicatur, uis usto plumbo similis est, &c. Ex stibio paratur oleũ, & u trũ, medicamẽtũ purgatoriũ: de quib. suo loco. Dios.

De metallis frigidis in secundo.

ARGENTI scõbs seu ramentum, quod limatura uocatur, aut scoria, aut helcysma, aut encauma, molybdenæ uim habet. * Confert humoribus uiscosis, scabiei pruriti, ulceribus, tremori cordis, & oris scetori. De liquore, qui ex argento chemice cõficitur, uide infra suo loco. Dioscorides, Andernacus.

SPVMA argenti, uulgò **LITHARGYRIVM** dicitur, lapis est è plumbo factus: plumbum enim dum secunda fornace excoquitur aut solum, aut metallo aliquo permistum, partim in lithargyron, partim in plumbagem uertitur. Duo sunt eius genera: unum colore aureo, alterum argenteo: quo fit, ut illud lithargyros auri, hoc lithargyros argenti nominetur. Inde uerò hæc differentia nata est, quòd alterum altero maiorem uim ignis passum sit. Lithargyrium auri præfertur: hodie notissimum. * Vis alstringere, mollire, caua explere, excrescentia in carne reprimere, ad cicatricem ducere, refrigerare, & occludere, &c. Medici Florentini.

ARGENTVM uiuum duplex est, natium & factitium. Fit ex minio, quod abusuè cinnabaris dicitur, patinis fictilibus imposita, ferrea concha cinnabarim continente, & calice cooperta, argilla superlita, carbonibus succendunt. Siquidem deterfa fuligo, qua calici insidet, refrigerata in argentum uiuum coit. Quinetiam inuenitur in argenti fodinarum teetis stillatim concretum.

A concretum. Alij per se in metallis inueniri tradunt. Seruatur in uitreis aut plumbeis, aut stagnis, aut argenteis uasis: siquidem aliam materiam omnem exedit, & defluere facit. * Potum uim perniciosam habet: suo enim pondere interna exest. Remedio est lac multum subinde potum, & uomitionibus reiectum, aut uinum cum absinthio, aut apij decoctum, aut semē hormini, aut origanum, aut hyssopum cum uino. Auri limata scobs, id est, ramentū quā tenuissimum epotum, mirabili est auxilio. Cæterum ex argento uiuo conficitur Mercurius sublimatus & præcipitatus, & oleum: de quibus suo loco. Dioscorides.

PLYMBVM humida constat natura, frigore congelatum: item aerea & terrestri, sed pauca. fit ex illo pila, seu mortarium, & pistillum, ad usum medicum. Quicumq; enim humor in eo aliquandiu residet, multo euadet frigidior, quā antea fuerit. Ideo oleum omphaceum, aut rosaceum, aut melinū, aut myrtinum, si illi infundatur, remedium optimum aduersus inflammationes, & ulcera contumacia, tum aliarum partium, tum naturalium, seu testiculorum, cancosq; & articulorum fluxiones præparatur. Quod si refrigerans aliquis succus, ut semperuiui, coryledonis, intybi, lactuæ, chondrille, pistillij, omphacij, portulacæ, mortario eiusmodi imponatur, subigaturq; in sole, aut aere, aliasue calefacto, præstantissimum efficitur medicamentum ad feruorem & calidas fluxiones restinguendas. Quinetiam plumbum in laminas deducitur: quæ lumbis ad motū, genituræ fluorem per insomnia prohibent, insigniter refrigerates. Bractea quoq; tenuis ex eo facta gangliū dissipat, propius ei alligata. Ex eo fit oleum: de quo suo loco. Andernacus.

PLYMBAGO, quæ Græcis Molybdæna uocatur, optima est flaua, argenteæ spumæ æmula, modicè splendens: cum teritur rufa, cocta cū oleo iecinis colorem trahit. Vitiosa est, quæ aerem, aut colorem plumbeum refert. Gignitur ex auro & argento. Est enim quædam fossilis, ad Sebastiam & Corycyrum inuenta. Quo in genere probatur, quæ lapidosa non sit, aut recrementosa, sed nitens, & flaua. * Vim habet spumæ argenti, aut recremento plumbi similem. Vritur, lauaturq; eodem modo. Miscetur conuenientissimè medicamentis, quæ liparas uocant, atque emplastris minimè mordentibus. Carnem recreat, & ulcera ad cicatricem perducit: glutinantibus tamen medicamentis aut abstergentibus non conuenit. Si deficiat, lythargyros eius loco sumi potest Dioscorides.

LOTVRA plumbi sic fit. In mortarium plumbeum aquam iniiciens, pistillo plumbeo terito, donec nigrescat aqua, & limi modo crassescat, aut lutu lenta reddatur: linteo deinde colato, aquā superinfundens, quod facilius quicquid est resolutum, incerni possit. hoc iterū facito, usq; dum satis tibi habuisse uideatur. Vbi cōfederit, priore aqua effusa, nouam adiciens, ut cadmiam lauato, donec nulla extet nigritia: postea in pastillos cogēs reponito. Quidā scobem

scobem mundi plumbi lima quæsitâ, mortario pistilloq; lapideis terunt, aut **A** manibus cum aqua paulatim adiecta fricant, donec nigrescat: mox ubi id persum ierit, effusa aqua, colligunt in pastillos. nam tritum uehementer, cerussa simile redditur. Alij elimatæ scobi modicam plumbagem adijciunt, affirmantes ita elotum plumbum præstantius esse. * Potest refrigerare, adstringere, inducere, mollire, caua explere, sistere oculorum fluxiones, & ulcerum excrecentia. Sanguinem supprimit: prodest contra sedis ulcera, condylomata, & hæmorrhoidas, ex rosaceo: item ad ea, quæ ægrè cicatricem ducunt: & in totum spodij effectus præbet, nisi quòd non obducit crustas. Sincerum plumbum affrictu, marini scorpionis, draconisq; plagis auxiliatur. Dioscorides.

VRITVR plumbum sic. Super quàm tenuissimas plumbi laminas, fictili nouo inditas, sulphur inspergito: additisque alijs rursus laminis, interiecto semper sulphure, usquedum uas expleueris, succendito. flagrante autè plumbum, ferrea rude uersato, donec perfectè redigatur in cinerem, nihilq; è plumbum non ustum hæserit. tum demum obstructis naribus eximito: alioquin halitus plumbi noxius sentitur. Aut elimatam plumbi scobem in olla sulphure urito. Alij laminas in fictili crudo, ut dictum est, imponunt fornaci, aut foco, & circumlinentes operculum, dato exili spiramento, urunt. Alij pro sulphure cerussam, aut hordeum inspergunt. Alij integras laminas imponentes, acri **B** igne utuntur, & rudicula ferrea continuè mouent, dum in cinerem soluantur. Sed difficilis huiusmodi ustio, & si uehementius uratur, contrahit spumę argenti colorem. Magis tamen nobis placet prima urendi ratio. Plumbum ustum lauatur, ut cadmia, & reconditur. * Eodè effectus habet, quos plumbum elotum, sed multò acriores. Dioscorides.

RECREMENTVM plumbi, quod scoriam uocant, optimum est, densum, fractu contumax, cerussam planè representans, nihil plumbosi habens, quod ad luteum colorem accedit, & urit, splendorem imitatur. * Eadè, quæ plumbum exustum potest, sed magis astringit. Lauatur in mortario infusa aqua, & refusa summa aquæ parte, quæ luteum colorem duxit: idque sæpius, dum recrementum absumatur. Dein ubi confederit crassamentum, aqua effusa, digeritur in pastillos. Dioscorides.

CERUSSA fit hoc modo. Infuso in urceum oris lati, aut fictile labellum, quàm acerrimo aceto, laminam plumbeam supra fictilis spiraculū, subiecta prius arundinea tegete, firmato: superiectisq; uelaminibus, ne halitū expiraret acetum, ubi resoluta fuerit, defluensq; deciderit, humorè purum ad summam delatum colato, crassamentumq; transfundito. debet quoque siccare in sole, mox trusatili mola teri, aut aliàs tritum cribari. postea quod superest duri, in tenues partes redigendum, cribrandumq; ue. uicissim eadem tertio, quartoq; facienda. Melior, quæ primò cribrata est, & medicamentis oculorum

A oculorum assumenda. Secundum locum tenet sequens, & reliquæ suo ordine. Nec desunt qui ligneas rudes in medio uase appendant: & de raso ceu situ imposito, ita ut acetum non contingat, in ditoq; operculo circumlinentes dimittunt. Post dies decem laxato obturamento uisunt: cumq; resoluta materia fuerit, reliqua, ut supra diximus, exequentur. Si autem quis in pastillos uelit digerere, aceto acri subacta, diuiditur in pastillos, qui in sole siccantur. *Æstate* tamen supradictum opus obeundum est: ita enim candida atq; efficax redditur. Quinetiam hyeme paratur, urceis supra furnos, balnea, aut fornaces impositis: ascendens enim calor idem, quod sol præstat. Laudatissima fieri putant Rhodi, & Corinthi, aut Lacedæmone: proximam Puteolis. Torretur hoc modo. Flagrantibus igni carbonibus, fictili nouo, maximè Attico, tritam cerussam imposito, & assidue uersato: cumq; cinereum colorem traxit, eximens refrigerato, & utitor. Est & aliud urendi genus. Trita patinis nouis supra prunas imponitur, & ferulacea rude mouetur, donec colore similis sandarache fiat, extractaq; ad usus ministratur. Quæ uerò ita parata est, Sandyx à quibusdam dicitur. Lauatur cerussa cadmiæ modo. * Cerussa frigida est & sicca secundo ordine: occludit, emollit, explet, extenuat: in super excrecentia leniter reprimat, & ad cicatricem perducit. Miscetur ceratis & emplastris, quæ liparæ uocantur, pastillisque. Est autem lethalis eius potus. Dioscorides.

B

De metallis astringentibus.

CADMIA fornacaria melior est botrytis, idem racemosa, in summo fornacis ærariæ affixa, densa, modicè grauis, in leuitatem magis inclinans, colore spodij, & quæ fracta cinerulenta & æruginosa est. Cadmia lapis, calaminaris uulgò dicitur, cuius puluere æs rubrū pallore tingunt, & augent etiam hodie fabri ærarij. Is alieno sapore mandenti est, & in farinam tritus, aceto subactus, in sole siccatus coit in lapidem, in igne manet, & fuliginem edit luteam uel æream: quæ lapidi cuidam in lapidum fodinis inuento, à nonnullis malè pro Cadmia supposito, conueniunt. Reperitur itaq; aliud Cadmiæ genus, lapidis similitudine, in ærarijs fodinis, test. Gal. tametsi Dioscorides negat: imò hodie adhuc reperitur, hisq; usui est, qui aurichalcum conficiunt. Medici Colonenses.

POMPHOLYX uera Arabum Thutia est. fit è tenuissimâ fauilla quæ in altum euolat, & tecto fornaciq; adhærens; principio cum fit, aquarum bullis simile prodit, quæ per pluias inter ueris initia erumpunt: colore albo, quæ in tenuissimum polliniq; similem puluerem dissoluuntur: similes habent facultates, sed pompholyx est tenuiorum partium. Pompholyga pharmacopœ Nihil album, Germani *Vueiß nicht*, appellant. Probatur quæ Norinbergæ conficitur. Hodie itaq; cognitum, & facillè ex ærarijs officinis haberi possit. sed

d

set. sed

set: sed his substitui possunt Dioscoridis antispodia, aut officinarum thutia. * Vim habet adstringendi, refrigerandi, explendi, purgandi, obstruendi, & aliquantum exiccandi. Inter medicamenta numeratur quę leniter crustas obducunt. Medici Colonienfes.

SPODIVM in eris fornacibus invenitur, ubi & pōpholyx, quę Arabum Thutia est (nam officinarū thutia, veterum Cadmia est, ut mox dicitur.) sūt ex fauillis ē metallo, dum coquitur, emicātibus, & specie differūt. nā spodiū fit ē partibus crassiorib & in ærariarū officinarū pavimentis reperitur. Ideo multū terrę colligit, & spurcitia reficitur. Hoc hodie in pharmacopolijs Nihil griseū, & à Germanis *Graunische* appellatur. Spodiū Auicēnē fit ex arundinis radicibus, eiusq; usus est in ab Auicenna præscriptis medicamētis: nam antispodij genus est. Illud uerò quod ex boum, similiūq; animalū cruribus confectū officinę usurpāt, præstat reijcere, eiusq; loco, aut Auicēnæ aut Dioscoridis aliquo antispodij genere uti, in his præsertim, quę intrò sumenda sunt, medicamētis: in his uerò quę foris adhibētur, aut uero spodio, aut pompholyge, aut thutia officinarum præparata. Medici Colonienfes.

THVTIA officinarum ueterū cadmia est, fornacaria scilicet. Gignitur in fornacibus ærarijs, fuligine statu egesta, ueluti spodium & pompholyx, quę uera est Arabum thutia. Medici Colonienfes.

GYP SVM ē quodā candido lapide fit, in laminas faciliē scissili: qui tamen non longa ignium ui torretur, & excoquitur. Fit etiam gypsum ē speculari lapide, qui Græcis *σπάγιον* dicitur. Item ex alio quodā lapide niuei candoris, ē quo in Hetruria torno patinæ & alia uasorum genera conficiuntur. Hunc Alabastrum appellāt, sed perperam. Gypsum & ipsum ad communē omnium terrenorum, lapidosorumq; corporum facultatem, qua desiccare dicta sunt, in super hoc adiunctum habet, quod est facultatis emplasticę. * Habet uim adstringendi, obstruendi: sanguinis eruptiones, sudoresq; cohibet. sed potum, strangulationis modo iugulat. Galenus, Dioscorides, Mathiolus.

De metallis uenenosis.

ARGENTVM VIVVM potū, stomacho, uētri, & interaneis grauitatem cum magnis torminibus adfert, & nonnunquam pondere suo intestina uulnerat: urināq; supprimit: corpus intumet, plumbeāq; deformitatem cōcipit. Lac copiosē potū auxiliari cōstat: sed postea euomat, qui hauserūt. Dioscor.

ARGENTI SPVMA pota eadem quę argentum uiuum infert. Quibus subuenit secundum uomitionem, potum syluestris hormini semen, myrrhæ drachmæ octo, absynthium, hyssopum, apij semen, aut piper, aut lugulstri flos ex uino: aridum palumbis fimum, cum nardo & uino. Dioscorides.

AVRIPIGMENTVM, CALX, & SANDARACHA, pota, aluum & intestina cum uehementi erosionē excruciant. Præbenda cuncta quę suo admittu.


A admistu illorum acrimoniam hebetant ac solvunt, & facilem lubricamq; aluum reddunt, cuiusmodi ibisci & maluæ succus est. Dandum decoctum seminis lini, uel semen tragi herbæ, uel oryzæ, lacq; cum aqua mulsa copiosum, iura pinguis, & boni succi. Dioscorides.


CERUSSA suo colore proditur: sumpta enim, mox palatum, gingiue, lingua, & commissuræ dentium, candore quodam inficiuntur: singultus, tussim, ac linguæ ariditatem excitat: ijs extrema frigescent, mens labat, membra torpescunt. Quibus dare conuenit aquam mulsam, aut ficuum aut maluæ decoctum, aut lac calidum, aut sesamam ex uino tritam, uel lixiuum ex sarmentis factam, amaracinum oleum, aut irinum, persicorum ossa cū hordei decocto: columbina oua cum thure, aut hordei decocto, aut prunis: aut gummi, quod ulmus plorauit: aut humorem, quem ulmea folia reddiderunt, cum aqua tepida: sed tum quoq; nouant. Conuenit etiam thapsiæ succus, aut scammoniæ, cum aqua mulsa potus. Dioscorides.

LAPIDES CENS GYPSVM strangulationem creat. Quare eadē proferenda sunt, quæ mansis fungis, auxilia: & adhæc maluæ decoctum, quod etiam olei uicem pensat: utpote cum pingue sit, euomendo lubricas uias & faciles reddit, deradiq; corpora nō sinit. quod ubi duratur in lapidem, gypsum efficit. Quinetiam prodest oleum ex aqua mulsa, aut ficorum decocto & lixiua ē ficulneo cinere, aut sarmentis facta, cum uino copiosiore pota: & origanum, aut thynnum cum lixiua, aut aceto, aut passo: hiq; decocto maluæ

B proluendi. Dioscorides.

DE LAPIDIBVS - CAP. VI.





A *De lapidibus preciosis, frigidis in gradu primo.*

HYACINTHORVM duæ sunt species: rubra, quæ nobilior est: & carbunculo similis, quæ ab igne illicò mutatur. uixq; qui lentem magnitudine excedat, inuenitur. Sed gémarij sæpe Granatum Æthiopicum pro eo ostendunt. Pro constãti creditur, hominem tutum reddere à fulminibus, pesteq;: & si peste quis laboret, nitorem amittere, coloremq; dilutiorem ac lægidiorem induere. * Cor etiam confirmat, ebibitum & gestatum: somnum conciliat, & honores auget, tum diuitias atq; prudentiam: quæ omnia etiam facit, qui colorem habet florum garyophilli Turcici, id est luteum, quasi lutei oui, sed splendidum & perspicuum. Venustus est, ac non facilè uitiat: est enim corneolo aliquãtulum durior. non est tamen adeò efficax, ut ille. Cardanus.

SAPPHIRVS gemmarum omnium pulcherrima est, cœli colorem refert miro splendore, & perspicuitate summa: non tamen margaritas, carbunculos, adamantes, neq; smaragdos precio uincit. omnium durissima, præter adamantem. Omnibus in morbis cutis gestando utilis est, ut ego expertus sum: anthraces enim nasci uetat pestifero tẽpore, & scabiem semper minuit, castum & pudicum etiam ob id reddit, & sudores eadem ratione comprimit. Et ex secundis quasi uiribus corpus confirmat, & colorem bonum facit. terrores uanos tollit: atræ bili aduersatur, cohibet, & iuxtà etiam pellit. Mores in melius mutat, tanquam ex tertijs uiribus: unde pios facit, & tranquillos oculos si tangat sapius, à uariolis præseruat: & anthraces eodem modo impositus mitigat & sedat. * Creditur necromantiæ auxiliari: sed prius constituere oportet, quomodo sit, an naturalis scilicet, idq; difficilè uidetur: nam animam ab errore liberat. hæc autem constat uiolata mentis & sensuum acie, uel à diuino numine. non par autem est, lapidi tantum tribuere. Malim tamen in dubijs experimẽto cedere. Ob duritiem, qui acerbus est, si per tres horas in auro excoquatur, in speciem transit adamantis, candidissimusq; euadit, ac splendidus. Vnde patet, exhalatione terrea tingi. antea enim non adeò perspicuus est: propterea etiam tincturam recipit nigram, cum reliquæ omnes gemmæ quæ adamantem referunt, tincturam non tangant, ne obscurerentur, sed solùm ab ea circũdentur. Cæterùm Sapphirus percussis à scorpione, potu prodesse existimatur. Contra intestinas exulcerationes bibitur. Excrescentia in oculis, uuasq; & pustulas inhibet, & ruptas membranas cogit. Additur hoc tempore in medicamenta ad cor facientia, & in antidota, quæ aduersus uenena & pestiferos affectus parantur. Cardanus, Dioscorides, & Galenus.

SMARAGDVS gemmarum omnium preciosissima, & fermè tenerissima. Scythicos præferri omnibus creditum est, inde Britãnicos: tum alij subsequuntur primi generis. Secundi autem sunt ex Peru, duriores, alacriores, sed non adeò prelsi coloris, atque herbacei, sed solùm uirides, ideoq; magis

d 3 perspicui.

perspicui. Tertium genus uile & abiectum, occidentalis etiam Indiae, primis **A** durius: sed uix perspicui, & hebetes. luce propria gaudent: ideo noctu pulchriores. An omnibus similes uires, & an smaragdorū ē genere sint, satis mihi dubium est. Prassium aliquando habui smaragdo proximiorē, smaragdus Peru & S. Marthę. Qui ex Peru sunt, uix unus est sine macula aut uitio. pleriq; etiā dilutū nimis habent colorem: alij paululum nigricant, quod omnem decorem aufert. Nullę gemmę tutius feruntur smaragdo, saphyro & hyacintho. Sed smaragdus facillimē frangitur, cum tamen precium sit ingens. Quoniam uerō nulla gemma colorem aliquem suscipit in regressu, ut in fractibus, & alijs uilioribus rebus accidit, necesse est ut frigida sit, & exustionis omnis experta: ideoq; uenerem cohibet. Ferunt etiam in uirginū defloratione egregias smaragdos frangi. Hę sunt, quę purę sunt, & presci coloris herbacei, cum tanto fulgore, ut aerem ipsum circumstātem, ac proximas res colore inficiant. quod experimentum licet euidens, rarum sit, frequens tamen est suboscure, propter coloris ipsius robur innatum. * Porro smaragdus comitiales & uertigines sanat, & memoriam confirmat. Sedat affectus animi, & ad diuinandum utilis est, sub lingua contēta. Visui perquā utilis, & cordis affectibus facundiam & amorem erga studia adauget. Elephantiscis utilis gestatus: sed magis ebibitus. & omnibus uenenis aduersatur: tum etiam dysentericis plurimū prodest. Inanes terrores discutit, quos Dæmonum uocat uulgus illusiones. bonos mores ob id præstat: nam improbitas **B** nil aliud est, quā inscitia, atque stultitia, iraq;. Auget opes deferentis. Cardanus, Albertus magnus.

De lapidibus preciosis seu gemmis frigidis in gradu secundo.

RUBINVS seu **CARBUNCVLVS** gemma est, quę ignibus diu resistit: cuius tres sunt species proprię, omisso Granato, Balasioq;, tanquam sui generis. Gemma est rubri coloris, ac micantis, ut ignis: uiolaceus color in eo etiam si gratiam addat, uitium tamen est, & precium minuit. Eius tria sunt genera: Orientalis, rubith seu rubin, id est spinela (ut dicunt) & Germanicus, durus sed nigricans, ideo parui admodum precij, etsi gemma uera sit, sed neque ad latitudinem pisi perueniunt hi unquam. cum uerō tenues sint, Gemmarij etiam tenuiores reddunt, ut melius lumen excipiant, nec obfuscantur adeo. Spinela clarior est, & iucundior aspectu, sed tenera: precium ob id uilius, duricies tamen in eis diuersa est. tenerimę quędam enim sunt, alię prope duriciem ueri carbunculi, quę paulo inferior est saphyri duritie. Omnis autem gemma durior teneriorem secat, adeo ut etiam crystallus durior vitrum secat, si præacutus sit. Adulterantur carbunculi sandaraci, id est, auripigmento rubro excocto, atque ita uenenum datur pro alexipharmaco. Dignoscuntur adulterinę, interposito colore: ut si albus carbunculus interposi-

DE LAPIDIBVS PRECIOSIS.

¶

A interposito minio aut cinnabari, crystallo supponatur ex angulis: quoniam colorem recipere non possunt transuersè inspiciendo. Orientalis carbunculi præterea duæ sunt species. nam qui ardens omnino est, ut superfusa noctu aqua splêdeat ut ignis, propriè carbunculus dici meretur, Græcèq; pyropus. alij autem instar fœminæ sunt. * Vires carbunculi sunt, libidines coercere, pestilentia resistere: idq; maximè e poti: in colume corpus feruare, malas auferre cogitationes: nam hæc omnia hoc ipso constât, quòd uitalem spiritum confirmet. Ex secūdis uiribus est, ut promptum & alacrem faciat hominem, atq; ideo bene fortunatum. Cardanus.

GRANATVS dictus est, quòd fulgeat, similisq; sit grano mali punici. Duæ species mihi notæ: Hispanus & Orientalis. Hispanus dilutioris est coloris: attamen si magnus sit, & egregius, flammam coruscantem æmulatur. Sine dubio collo suspensus, & ebibitus, etiam tristitiæ multum resistit, si quid aliud. Sed somnum ualde minuit, ut nil sit ex quaq; parte beatum. Est enim terrea igne q; substantiæ. * Cor cõfirmat, & tantundem cerebro nocet. Facit hominem iracundum, & sanguinem exagitat. Quæ uerò in Æthiopia inuenitur, Sorianaq; uocant Gémarij, longè pulchrior est: quoniã densior habet substantiam, ad hyacinthiq; colorem accedit, adeò ut ab illa uix distinguatur. uerùm non coruscat, ut prima. ideo neq; ad iram, neq; ad uigilias ita hominem pronũ efficit, ut prima species. Sed nec exhilarare tantũ potest.

B Existimant Occidentales, ignibus diu resistere, nec deturbari. Cardanus.

SARDA nomè cum sardonyche communicauit. Ipsa gemma uulgaris, & primũ Sardibus reperta. Sed laudatissima circa Babyloniam cum lapidicinq; quẽdã aperirètur, hères in saxi corde. Hocq; modo metallũ apud Persas defecisse traditur. Sed inueniuntur cõpluribus alijs locis, sicut in Ephyra & Asso. In India triũ generũ, rubrũ, & quod demiũ uocãt à pinguedine, tertium quod argenteis bracteis sublinitur. Indicè perlucet, crassiores sunt Arabicæ. Inueniuntur & circa Leucada Epiri, & circa Ægyptum, quæ bractea aurea sublinuntur. Et in his autem mares excitatius fulgent. Fœminæ pinguioribus sunt, & crassius nitent. Nec fuit alia gemma apud antiquos usu frequentior. * Gestata animum exhilarat, somnia mala prohibet, ingenium acuit, sanguinem & ipse compefcit. Vnde ex his fit, ut uictores reddat in litibus, & diuitias augeat. Plinius, Cardanus.

De gemmis frigidis in quarto.

ADAMAS candidus, nitidissimus & perspicuus, maximam etiam habet duritiem & luminis copiã. Vnde efficacissimus est, quacunq; uirtute præditus sit. Cõfricatus paleas trahit, ualèterq; p magnitudine. coercet nocturnos timores: quare necesse est, ut melancholiam & atram bilem fistat, animamq; confirmet. Est ex eo uitiosus ruber, & rarus: citrei uerò coloris frequens, ac durus,

ac durus, qui animum non adeo reddit purum. Verisimile autem est hoc a- A
gere, mutando vitalem spiritum. nam terrores in corde fiunt: indicio est cor-
dis palpitatio in timore. Inuenitur quandoq; in Scotia, ut referunt, pulcher-
rimi tamen ex Oriente aduehuntur. Inuentus est nostris temporibus iun-
ctus cum carbūculo magnitudine fabæ, & purus: quod mirum est. Frangitur
malleis etiam paruis faciliter, sed non tāgitur nisi sua scobe, qua etiam expo-
liri solet. Eius autem fragmenta ob duritiem gemmas omnes incidunt. unde
qui gemmas cælant, illis utuntur, postquam ere ac smiride crassiore Miner-
ua figuram effinxerint. * Infelicem creditur efficere gestantem. Sic enim ad
animum se habet, ut Sol ad oculum: ille enim potius obfuscat, quàm illu-
stret uisum. Facit etiam intrepidum. At nihil est, quod nos magis securos red-
dat, prudentia & timore. ideo timidis melior. Sed neq; his conuenit, cum ea
parte, qua non oportet, quandoq; audaces faciat, qua opus est, timorem non
adimat. hoc enim discrimen est affectuum naturalium & ex philosophia ac-
quisitorum, & ui externa: ueluti lapidum gestatione. Ignibus per aliquot
dies resistit. Cardanus.

De gemmis amuletis.

BELZOHARTICVS lacryma cerui dicitur. In India ex stomacho, uel
corde animalis cuiusdam extrahitur: * præstantissimum ac diuinum antido-
tum contra omne genus ueneni, ac pestilentiam. tabellæ ex eo, & aqua rosa B
cea parantur ad idem efficaces. Andernacus.

AMETHYSTVS eiusdem ferè molliciei est cum crystallo, simulq; sæpe
unà inuenitur: albusq; à crystallo uix discerni potest. Colore uiolæ purpu-
reæ, uisuiq; gratus. Indicus præfertur. * Efficit sedatum, uigilantem. Ebrieta-
tem reprimere, alligatum super umbilicum, testantur: ad pugnas quoq; & ue-
nationes utilem esse. acuit ingenium, & somnum minuit: uapores enim à ca-
pite arceat. lotio eius foecūdos efficit: & ueneni resistere creditur. Cardanus.

De lapidibus minus preciosis: ac primò de calidis.

HAEMATITES optimus habetur friabilis, saturato colore, niger, du-
rus, & suapte natura æqualis, nulla sorde admista, nulloq; Zonarum discursu.
Vim habet astringentem & excafactoriam aliquantum, extenuantemq;. Oculorum
cicatrices, & scabritiem cum melle purgat: cum lacte autem mu-
liebri, lippitudini, fractis, & oculis cruore suffulis conuenit. Bibitur contra
difficultatem urinæ, & fluxiones mulierum in uino: & ab ijs qui sanguinem
reiecerunt, cum succo punici mali. Vritur ut Phrygius, sine uino duntaxat.
Modus ustionis est, ut modicè leuis fiat, & bullis quibusdam intumescat. Sūt
qui eum sic adulterinū faciant. Densam, rotundamq; Schisti lapidis glebam,
quales sunt, quæ radices eius appellantur, in fictilem urceum qui cinerē fer-
uentem contineat, obruunt. ubi paululum dimiserint, eximunt: attrituq; in
cote

A cote probant, si hæmatitæ colorem duxit. si ita sit, reponit: sin minus, iterum in cinere cõdunt: & subinde conspiciunt, & periculũ faciũt. nam si diutius in eo cinere relinquatur, colorẽ mutat, moxq; diffunditur. Vitiatus deprehenditur, primũ lineis, quas pectinum modo per longitudinem diuisas habet, hæmatites uerò eas habet, ut fors tulit: tum colore, quem hic floridum reddit, hæmatites uerò profundiozem, & cinnabari similem. Inuenitur etiam in Sinopica rubrica: itemq; in magnete lapide permultũ cõbusto hæmatites fit. qui uerò per se nascitur, in Ægypto inter metalla prouenit. Dioscorides.

PYRITES lapidis genus est, à quo æs conflatur. Eligi debet æris similitudine, facilẽ scintillas edens. Vritur sic. Melle irrigatus, molli pruna continuẽ flatur follibus, donec rufescat. Alij in multos carbones igni candentes, lapidem copioso melle perfusum deijciunt, & ubi ad fuluũ colorem uergere cõperit, extrahunt: efflatoq; cinere, rursus madefactum cremat, donec æquabiliter assiccatus, friabilis reddatur: siquidem sepe facies summa solum uritur. ita crematus, siccatusq; reconditur. Si eloto opus sit, lauari debet, ut cadmia. * Tam crudi, quàm usti uis est excalfacere, abstergere, offusam oculis caliginem expurgare, duritias concoquere, & concoctas discutere. Resina exceptus excrescentia in carne cohibet, sed calorem quendam & adstrictionem parit. Ita ustum nonnulli diphuges appellant. Dioscorides.

LAPIS ASIUS probatur, qui pumicis colore, fungosus, leuis & friabilis sit, uenasq; in profundo luteas habet. Eius flos est salugo summo lapide insidens, tenui compage, colore cum albo, tum punici simili, ad luteum uergente. Lingua autem admotus eam leniter mordet. * Vim habet uterque adstrictoriam, & modicẽ erodẽtem. admistus liquidæ picis, aut terebinthinæ, tubercula discutit. Longẽ ualidior flos existimatur. De cætero siccatus flos uetera ulcera, & cicatrici repugnantia sanat. excrescentia cohibet: tetra ulcera & fungis similia, cum melle expurgat: ulcerum cana explet, & expurgat cum melle: depascentiaq; cum cerato sistit. Fit cataplasma ex eo podagris, misto fabæ lomento: & lienosis ex aceto, & uiua calce. Prodest flos ex melle phthificis linctũ. Fiunt ex hoc lapide folia, in quæ podagrici pedes mittentes iuuantur. sunt etiam pulueres carnem exedẽtes. corporaq; carne onusta, crassaq; extenuat in balneo, pro nitro illiti. si lauate hos quispiam uelit, cadmiæ modo lauabit. Dioscorides.

LAPIS THYITES in Æthiopia gignitur, subuiridi colore iaspidem imitatus: cum diluitur tamen, lacteum succum reddit. * Vehementer mordet: tenebras, quæ pupillis obuersantur, expurgat. Dioscorides.

SMYRIS lapis est, quo gemmas annularij scalptores extergunt. is in Samia terra inuenitur. * ad erodendum & urendum utilis: gingiuis, quas humor uexat, prodest: dentifricio commendatur. Si deficiat, eius loco substitui potest pumex. Dioscorides.

LAPIS SCHISTOS, hoc est scissilis, in Iberia Hispaniæ gignitur. Lau- **A**
 datissimus est, qui croci colorem æmulatur, estq; friabilis, & suapte natura
 bene scissilis. concretionem uero & mutuo linearum, quas pectinū modo ha-
 bet, discursu, Ammoniaco sali similis uidetur. * Vim exhibet hæmatitæ, sed ad
 omnia inferiorem. quin & caua replet muliebri lacte perfusus. ad prociden-
 tia, rupta, item genarum crassitiem, & uuas oculorū, magnopere efficax est.
 Si deficiat, pro eo sumi potest lapis hæmatites. Dioscorides.

De lapidibus frigidis.

CRYSTALLVS gignitur ex humore omnium purissimo, in terræ uisce-
 ribus condito: unde etiam Beryllus, adamas, & alij id genus lapides proue-
 niūt: nec nō in marinorū, aliorūq; lapidum & metallorū fodinis Germaniæ,
 Scythiæ, Cypri, Hispaniæ. sepe in agris, ubi coloni aratro ipsius glebas effo-
 diūt. * Idē facit, quod ferè gypsum altringēdo: eoq; in puluerē tenuissimum
 tritū, ex uino austero dysentericis opitulatur: nec nō alba uteri profluvia cō-
 pescit: lac nutricibus auget. quinetiam cauterium ex pila crystalli fieri solet:
 quo delicati homines, qui ferrū candens reformidant, urantur. Notandum
 est, ex eodem crystallo oleum arte chemica præstantissimum fieri (ut suo lo-
 co dicetur) quod drachmę semissis, uel integræ ad calculum ex aqua cardui
 benedicti datur: nec nō ad lac muliebrem augēdum ex lacte amygdalarū. quā-
 uis idem etiā crudus, in tenuissimum puluerē redactus, eodē pōdere, ex ea- **B**
 demq; aqua utiliter exhiberi possit. Matthiolus, & Andernacus.

PHRYGIVS lapis, quo infectores in Phrygia utuntur, à qua nomen ac-
 cepit, nascitur in Cappadocia. Optimus habetur pallidus, modicè grauis, nō
 solida corporis cōpage, intercedētibus albis segmētis, ut in Cadmia. Vritur
 aut uino optimo perfusus, uiuisq; carbonibus obrutus: perfatur assidue fol-
 libus, donec mutato colore rufescat: rursus extractus eodē uino restingui-
 tur. Hoc iterum, & trinis uicibus faciendum: attendēdum tamē ne minutim
 cōstringatur, & in fuliginem euanescat. * Vis crudo ustoq; adstrictoria, expur-
 gans: ulceribus crustas quadatenus inducit: ambustis cum cerato medetur.
 Lauatur ut Cadmia. Si nō sit ad manū, eius loco Marchasita sumi pōt. Diosc.

SAMIVS lapis in Samia terra inuenitur, quo aurifices utuntur poliēdo
 auro, ut resplendeat. Probat candore, & duritia. * Vis ei adstrictoria, & re-
 frigerans. Prodest stomachicis potus. sensus hebetat: uerū ad fluxiones o-
 culorum, & ulcera, cum lacte efficax est. Partus, ut tradunt, adligatus accele-
 rat, & conceptus fœminarum custodit. Dioscorides.

ARENA è litoribus sole feruefacta, hydropicorū tumores exugit, si capi-
 te tenuis in ea obruatur. Torreri solet ad aridos fotas, p milio aut sale. Diosc.

De lapidibus astringentibus.

E'COTE NAXIA, quod exacuēdo ferro deterior, illitum alopecias ad-
 pilum.

A pilum reducit. uirginum mammas cohibet, nec increfcere patitur. Potum ex aceto lienem abfumit, & comitialibus prodeft. Dioscorides.

GEODES lapis nascitur in Mifnia & Saxonia (fecundum Agricola.)

* Astringit, fccat, caligines oculorū difcutit. Illitus autem ex aqua, teftium, mammaramq; inflammationes fedat. Dioscorides.

PVMEX probatur, qui leuis, fiftuofus, fcifilis, & nō calculofus eft, quiq; teri facilē potest, & candidus eft. Vritur hoc modo. Cape eius quātum uelis, flagratiffimis carbonibus obrue. ubi igni cādens fit redditus, extrahe, uino odorato reftingue: iterumq; incēfum extingue. tertia uerō uftione peracta, fine ut per fe refrigeretur, & ad ufum repone. * Vis eius adstringere, gingiuas abftergere, purgat cū calfactione, quę pupillis caliginē offundūt. explet ulcera, & ad cicatricē perducit: excrefcētia cohibet. Fit ex farina eius dentifriciū. Corpori cruftā obducit: auellendis capillis aptus. Theophrastus author eft, fi quis in bulliēs uini doliū pumicē cōiecerit, feraorē ftatim fedari. Dioscor.

De lapidibus emollientibus.

ALABASTRITES uocatus onyx, notiffimus lapis eft ijs, qui Romana inuiferūt edificia. Hallucinātur tñ, qui credūt lapidē illum Alabastriten esse, è quo hac tēpēftate torno uaria fingūtur uafa, quibusdam subnigricantibus uenis difcurrētibus, pellucido lēuore, materię uerō adeo imbecilli, ut parum collifa facilē frangātur. Quādoquidem lapis hic Alabastritę species non eft, sed potius gypfi materia. Alabastrites enim, quem antiqui ad uafa unguētia cauabant, quo diutius unguenta à rancore uindicarent, nascitur (ut Plinius inquit) circa Thebas Ægyptias, & Damascum Sirię. Hic ceteris candidior. Probatiffimus uerō in Carmania, mox in India, iam pridem & in Syria, Asiaq;ue. Viliffimus autem, & sine ullo nitore, in Cappadocia. Probantur quām maximē mellei coloris in uertice maculofi. * Crematus, resina aut pice exceptus, duritias difcutit. stomachi dolores cum cerato leuat: gingiuas comprimit. Matthiolus, Dioscorides.

GAGATES probatur, qui celeriter accenditur: & odorem bituminis reddit. niger plerunq; est, squalidus, cruftosus, & ualde leuis. * Vis ei molliendi & difcutiendi. deprehendit fonticum morbum suffitus: recreatq; uulnū strangulationes: fugat serpentes nidore. Podagricis medicaminibus, & acopis additur. Nascitur in Lycia, inueniturq; prope ostia fluminis in mare exeuntis. flumen autem Gagas nominatur. Dioscorides.

THRACIUS in Scythia nascitur, in fluuio qui Pōtus uocatur. * Eadem ei uis, quę Gagatę. traditur aqua accendi, oleo reftingui: quod etiam in bitumine accidit. Dioscorides.

De lapidibus obstupescientibus.

LAPIS MEMPHITES in Ægypto ad urbem Mēphin inuenitur, calcu-

c 2 lorum

lorum magnitudine, pinguis, uersicolorq;. Aiunt hūc tritū & illitū locis, quæ **A**
urenda aut secanda sunt, sine periculo sensum eis adimere. Dioscorides.

IASPIDVM genera longè plura recensentur, quàm quæ à Dioscoride
describuntur. Quandoquidem quædam uisitur cœruleo copioso, aut glauco
pingui similis, id est uiridis, lacte suffusa. Alia purpurea: qualis nascitur in
Phrygia. Alia rosea, & quasi floribus tineta: qualis in Ida monte profundissi-
mis specubus foditur. Alia ex purpura cœrulea: qualis inuenitur in Cappa-
docia. Alia ex rubro nigra. Alia iecoris imitatur colorem: quæ si saturatiore
colore reperiatur, lineis eiusdem coloris diluti & nigri cingi solet. Quædā ni-
uè imitata rutilis punctis respersa. Quædā onyche pungitur, aut ex altera
parte iaspis est, ex altera onyx, proinde iasponyx uocata. Alia, cuius altera
parte sit purpurea, altera uiridis, nec utrinq; pellucēs, sed qua parte uirescit.
In summa uaria est Iaspidū natura. * Suspensas ad plura ualere aiunt: nempe
ad omnē sanguinis fluorē, ad protegēdum cōceptum, & partū iuuādum, ue-
nerēq; inhibendā, & febrē, & hydropem fugādā. Nec desunt superstitiosi,
qui dicāt Iaspidas homines reddere gratos, potentes, ac tutos, si quibusdam
magicis uerbis admurmurentur, priusquam suspendantur. Matthiolus.

OPHITES lapis alius est grauis, & niger: alius cinerei coloris: alius pun-
ctis uariatus: alius lineas cādidas habet. omnes alligati cōtra serpentum mor-
sus, & capitis dolores profunt. qui uerò cādidas habet lineas, * priuatim le-
thargo, & capitis doloribus auxiliari perhibetur. Dioscorides. **B**

De lapidibus abstergentibus.

ARABICVS lapis maculoso eborei similis est. * Is tritus illitus hæmor-
rhoidas exiccat. Eius cinis dentifricio optimus. Dioscorides.

De lapidibus glutinantibus.

GALACTITES dicitur, quòd lacteum succum ex se mittat: cinerei ta-
men coloris est, ac gusta dulcis. * Ad oculorum fluxiones & ulcera utiliter il-
linitur. is in aqua tritus pyxide plumbea reconditur, ob uim glutinosam quæ
in eo est. Dioscorides.

MELITES est in omnibus Galactitæ similis. hoc tantū differt, quòd
dulcissimum succum emittit. * Facit ad eadem, ad quæ Galactites. Dioscor.

De lapidibus cicatricem inducentibus.

MOROCHTVS, quem aliqui galaxiam, aut leucographida uocant, in
Ægypto nascitur. hoc lapide, quoniam mollis est, & facilè diluitur, linteo-
rum artifices ad candorem linteis indendum utuntur. * Spiracula corporis
obstruere uidetur: conueniens ijs, qui sanguinem expuunt, cœliacis, & uesi-
cæ doloribus, cum aqua potus. Itidem fluxionibus uulvæ, & impositus uel-
leri. Mollibus oculorum collyrijs miscetur: explet enim caua, atque dela-
crymationes sistit. Idem cerato exceptus, ulcera, quæ fiunt in teneris par-
tibus.

A tibus corporis, ad cicatricem perducit. Dioscorides.

De lapidibus calculum comminuentibus.

LAPIS LYNCIS ex genere succini est, quod suæ proprietate naturæ pennas ad se trahat, quemadmodum & cætera succini genera paleas, festucas, ac leuissima quæque alliciunt. Quantum uerò à legitimo lyncurio uulgaris ille lapillus differat, qui officinis lapis lyncis appellatur, & cuius est usus apud sepulchros, & medicos, qui simplicium medicamentorum scientiam negligunt, ij dijudicent, qui simplicium historias & facultates optimè norunt. Matthiolus.

IUDAICVS lapis in Iudæa exoritur, glandis effigie, candidus, forma quàm elegatissima, lineis inter se æqualibus, ueluti torno factis, distinguitur. is solutus nullâ qualitatem gustu affert. * Potest ciceris magnitudine tritus ad cotem, ut collyrium, cum calidæ aquæ cyathis tribus, potu difficultati urinæ auxiliari, & calculos in uesica comminuere. Dioscorides.

LAPIDES in spongijs reperti, omnibus notissimi sunt: quod rarissimè sint spongiæ, quæ his lapidibus uacent. * Cum uino poti, lapides qui in uesica sunt, rumpunt. Dioscorides.

De lapidibus fetum retinentibus.

AETITES lapis est ueluti prægnans, cum quatitur, alio in utero sonante. Huius genera sunt quatuor. In Aphrica nascens pusillus, & mollis intra se, ac uelut in aluo habes argillâ suauè, cadidam: friabilis, quem foeminei sexus putat. Mas, qui in Arabia nascitur, durus, gallæ similis, aut subrutilus, in aluo habens durum lapidem. Tertius in Cypro inuenitur, colore illis in Aphrica nascentibus similis, amplior tamen, atq; dilatatus. cæteris enim gibbosa facies. Habet in aluo arenam iucundam, & lapillos: ipse tamen mollis, ut etiam digitis frietur. Quarti generis Taphiusus appellatur, nascens iuxta Leucadem in Taphiufa: qui locus est dextra, nauigatibus ex hac ad Leucadem. Inuenitur in fluminibus candidus, & rotundus. Huic est in aluo lapis, qui uocatur callimus, nec quicquam tenerius. Præfertur Aphricus, & qui è nido aquilæ decerpitur. Pessimi rotundi, in fluminû alueis inuenti. * Grauidis continet partus, cum lubricæ sunt uulue, & parum tenaces, sinistro brachio adal ligatus: sed parturientibus è brachio amoueatur, & feminibus alligetur, ut sine doloribus pariant. Furem deprehendit, si quis in pane conditum offerat: fur enim mansum deuorare non poterit. Quinetiam concoctus furem coarguit: quippe decocta cum eo deuorare non poterit. Tritus, & cerato exceptus, cyprino, aut gleucino, aut alio excalfaciente, comitiales magnificè iuuat. Plinius & Dioscorides.

De lapidibus menses cientibus.

OSTRACITES testæ similitudinem habet, crustosus, & in laminas fil-

e 3 filis:

filis: quo mulieres ad detrahendos pilos, pro pumice utuntur. * Menses draconæ pondere potus ex uino fistit. Si quatuor diebus à purgatione bibatur sicilici pondere, foemini præstat ne cōcipiant. Cum melle autem impositus, mammarum inflammationes lenit, & nomas cohibet. Dioscorides.

De lapidibus amuletis.

SELENITES lapis, quem aliqui aphroselenon appellant, quoniam noctu inuenitur lunæ imaginem reddere: quæ cum ea quidē augetur, & decrescit. Nascitur in Arabia, candidus, translucens, leuis. * Huius ramenta conitibus in potu dari iubent. Eo ceu gestamine ad amuleta mulieres utuntur. Arbores adalligato eodem frugiferæ redduntur. Dioscorides.

AMIANTVS in Cypro nascitur: alumini scifsili æqualis: ex quo, utpote flexili, & telas faciunt. coniectus autem in ignem ardet, sed minimè crematus exit splendidior. * Hic ueneficij resistit omnibus, priuatim magorum. Dioscorides & Plinius.

MYEXIS lapis est, qui in capite bufonis inuenitur, magnitudinis miræ. est enim (ut Brasauolus auctor est) craneum illius animalis. Color est ferrugineus, in uiridi: nitet tamen. Pars exterior plana: est enim ipsum os. interior autem uerè lapis est, seu potius lapidea terra, quasi concreta diu. Rotundus est plerunq; & magnitudine latitudinis fabæ. Ego autem habeo longiorem faba multo, & crassiore: nec scio quomodo craneo bufonis conuenire possit, propter formam, cum tamē sit genuinus. * Vires eius expertæ sunt, quòd gestatus tollit renum dolores, etiam antiquos, & lapidis prohibet generationem. Sed lotio illius etiam plurimum confert, & presenti est auxilio. Ventriculi etiam affectibus & febribus eadem confert: sed, ut existimo, non omnibus. Venenatis etiā ictibus, sed nō magnum, affert auxilium. Cardanus.

De lapidibus purgantibus.

MAGNES optimus est, qui ferrum faciliè trahit, colore ad cœruleum uergente, densus, & non admodum grauis. * Vim habet crassos humores educendi, si cum aqua mulsa, pondere trium obolorum detur. Sunt qui magnetem crematum pro hæmatite uendant. Dioscorides.


LAPIS ARMENIUS, Italis *Verdazero*, quasi uiride cœruleum dicas, tametsi ex Armenia non aduehatur: multi tamen existimant, eo qui ex Germania adfertur, uti nos posse, eo delecto, qui est leuis, colore cœruleo, perquam æquabilis, & friabilis. Sed cum nec eius sit magna copia, eius loco lapidem lazuli usurpabimus. * Melancholiam purgat innoxie & ualidè: sed tamē uomitum excitat. cuius causa plerunq; est puluis admixtus, ideo sæpe aqua pura lauari debet. Pondus eius est sextula, hoc est, scrupuli quatuor, aut paulo plus minus ue, pro sumentis uiribus. Quinetiam usum habet ad pilos in palpebris alendos. Florentini, Dioscorides, & Cardanus.

LAPIS

DE LAPIDIBVS PURGANTIBVS. 39

A LAPIS LAZVLI, quem Græci cyaneum, Itali *Azzuro oltramaryno*, hoc est, cœruleum transmarinum appellant, lapis est cœrulei coloris, qui in ærarijs, argentarijs, & aurarijs uenis reperitur. Optimus est, qui in aurarijs oritur, saturi coloris, maculas quasdam aureas stellarum modo radiantes habens, qualis is esse solet, è quo fit color ille cœruleus. Huius usus esse debet, magna cura adhibita, ne factitij pro eo sumatur: hos enim pictoribus relinquere debemus, natiuoq; uti, postquam bene lotus erit. Lauatur ut Cadmia: uritur ut Chalcitis. * Vim habet reprimentem, & modicè erodentem. crustas gignit, & exulcerat. Purgat melâcholiâ egregiè, sed magis turbat Armenio lapide. Dosis est, ut lapidis Armenij. Gestatus confert uilui cõmuni ratione, & similiter exhilarat hominem. Peculiariter autem, præcipuè stellatus efficit hominem comem, bene fortunatum & diuitem, Florentini, Dioscorides & Cardanus.

DE MARINIS CAP. VII▶



De mariis

ALCYONII, quod vulgò SPUMA MARIS dicitur, quinque sunt genera. Vnū spissum, acerbis saporis, spōgia facie, tetri odoris, pōderosum, & piscem olens, quod plurimum in litoribus inuenitur. Alterum pinnulæ oculorum, aut spongiæ simile, fistulosum, & leue, odorem algæ referens. Tertium uermiculi forma, & colore magis purpureum: quod Milesium quidam uocant. Quartum succidis uelleribus non dissimile, multis inanitatibus hians, leue. Quintum figura fungi, sine odore, asperum, parte interna quodammodo pumicosum, foris læue, acre: quod plurimum in Propontide iuxta insulam Besbicon appellatam gignitur: patrio nomine halos achnen uocant. * Alcyonia omnia detergunt, ac digerunt, qualitatem habentia cremam, & calidam facultatem. Duo priora in forminarum sinegmata assumuntur, contra lētigines, lichenas, lepras, uitiligines, nigritias, & maculas in facie, reliquosq; corpore. Tertium ijs, qui difficili urina uexantur, aut arenulas in uesica colligunt, idoneum est: item renibus affectis, aquæ inter cutem, lieni. Vstum autem, & ex uino illitum, alopecias replet. Postremum dealbandis dentibus aptum est. in alia sinegmata, p̄slothraq; assumitur, cum sale mistum. Si quisquam alcyonium cremare uelit, cum sale in crudum fictile mittat, & oblinēs uasis spiraculum luto, ita fornaci mandet, & cum figlinum percoctum fuerit, extrahens ad usus recondat. Lauatur ut Cadmia. Dioscorides, Galenus.

FLOS SALIS, aut rectius maris flos, quem Dioscorides *ἀνδρὸν* no-
minat, sali multum dissimilis est. nihil enim aliud est, quàm pinguedo quædam crocei coloris, mari, Nylo, & alijs lacubus innatās, quem Valerius Cordus Sperma cæti uocatum esse non modò contendit, sed etiam demonstrat. Cæterum flos salis fucatus rubrica, aut scrupulosus, improbatur. Præterea sincerus non nisi oleo resoluitur: adulteratus nõnulla ex parte, etiam aqua, diluente factitium colorem. * Ad ulcera, quæ cacoëthe uocantur, & phagedænas, genitalium nomas & purulentas aures, efficax est: oculorum hebetudines, cicatrices albuginesq; tollit. Emplastris, unguentisq; coloris causa, ut rosaceo miscetur. Sudorem cit, aluū turbat, in uino aut aqua sumptus: stomachum malè habet. Additur acopis, & sinegmatis, quæ albandi capilli gratia componuntur. Et in uniuersum acris est, & feruentis naturæ, ut sal. Porrò qui propriè flos salis dicitur, in salis fodinis reperitur, & in ipsis etiam salignis. Medici Colonenses, & Dioscorides.

AMBRA odorifera, quæ ex Arabia fœlice, & India defertur, iuxta quorundam sententiã etiam ex bitumine nascitur, eodem quo ambra fulua Germanica, modo. Hæc plerunque in uentre piscium reperitur, qui ea copiosius uorata moriuntur. Laudatur, quæ circa eorum renes reperitur: improbatur, quæ in stomacho est: ea uerò optima habetur, quæ nondum à piscibus deuorata est, tametsi in ipsis piscibus non aspernanda interdū reperitur. Optima est, quæ

A est, quæ ex India aduecta fuluescit: post eam, quæ ex Arabia fœlice adfertur. Est etiam factitia ex moscho, zibetto, ligno aloës, styrace & ladano: odor autem rerum, ex quibus fit, & color, qui plerunq; niger est, illam prodit: præterea aquæ imposita citius mollescit quàm natiua. * Excalfacit & siccit, cerebrum & cor olfactu roborat. Senibus & naturâ frigidis opem mirificè præstat. Quare iisdem potius quàm iuuenibus, chirotecæ Ambra imbutæ concedi deberent. Vino infusa temulentos efficit. Medici Florent. & Matthiol.

BLATTA BIZANTIA à Mauritanis, Vnguis odoratus à Græcis dicitur, cochylis tegumentum est, odore castoreum referente, ad suffitus idoneum. Ipsa enim testa mox liquatur igni, bituminis modo, quòd etiam improbè ipsa olet. Quidam albicantem odoratam magis commédant. * Iidem suffitu excitant fœminas uulvæ strangulatu oppressas, comitialesque: potum uentrem molliunt. Crematum conchylum eadem efficit, quæ purpura, & buccinum. Medici Colonienfes, & Dioscorides.

De marinis frigidis.

CORALLIVM saxeus frutex est, in mari natus: triplici constat differentia: alba, rubra, & nigra. prima est preciosior: altera usitator: ultima rarior, quæ uocatur Græcè *ἀρραλίς*. * Omne corallij genus refrigerat, siccitq;, & astringit: menstrua nimis profluentia cõhibet potum: sic dysenterias iuuat: nec non seminis profluuium in uiris: album uteri fluorem in mulieribus reprimat: sanguinem reijcientibus medetur: contra fascinationes & ueneria in collo & brachijs gestatur. Quinetiam comitialibus rectè alligatur. Cinis ipsius oculorum medicamentis miscetur: ulcera carne explet: & cicatrices extenuat. Oleum coralliorum chemico more (de quo suo loco) paratum rubicundissimum, scrupuli instar ex uino generoso potum, summum est medicinæ artis mysterium, ad omnem partium, tum interiores, tum exteriores affectus euellendos: comitalem sanè quinque septimanarum spacio, tum in pueris, tum in iuuenibus propellit. similiter omnes alui, uteriq; fluores, & sanguinis quacunq; parte manantes sistit. Dioscorid. & Andern.

VNIONES seu **MARGARITAE**, ex quodam concharum genere auulsi, sint candidi, corpulenti, orbiculares, pòderosi, integri, non perforati. quia dum ferri acie perforantur, aere inficiuntur, uiresque earum immutantur. * Ad cordis affectus præcipuam opem ferunt. Quinetiam collyrijs admixtas oculorum nubeculas detergunt, & aquam eò defluentem absument. In antidota, uel pulueres corroborantes recipiuntur. Oleum ex ijs paratum (de quo suo loco) ad neruorum resolutionem, conuulsionem, marcorem senilem & phrenitidem conducit, si grana sena ex humore aliquo sumantur. Corpus sanum conseruat: læsum pristinae sanitati restituit: lac muliebre emendat, augetq;, &c. Andernacus & Matthiolus.

De marinis astringentibus.

AMBRA CITRINA, Latinis Succinum, Græcis *ἄμβρα*, & Arabibus Carabe dicta, ex quorundam sententia nascitur è liquido bitumine, quod è litoribus defluens in mare, concrefcit eo quo uidemus modo. Reperitur in Germaniæ maritimis, procellis in litus prouoluta. Eius sunt aliquot genera: fulua, quæ pellucida est: candida, & similibus alijs coloribus prædita. Candida uerò, quod leuior sit, & odorator, optima censetur. Probatu ea, quæ attritu calefacta, illicò paleas, aliasq; res minutas ad se trahat, & quæ accensa bituminis odorem reddit. * Exiccat leuiter calefaciendo: ideo etiam ad humidos capitis morbos ualet. Fumus eius comitiales restituit: tussi immoderate, & capitis defluxionibus medetur: dentium dolores mitigat: menses prouocat, uteri strangulatum singulariter compescit: grauidis gestationem leuiorem reddit. In puluerem redactum ex uino propinatur, ad album uteri fluorem, naturaliaq; corroboranda: sanguinem reijcientibus, & tabidis conuenit: profluuio seminis ex ouo molli, uel succo portulacæ, quotidie drachmę instar assumptum succurrit: intestinorū difficultati, & sanguinis ex naribus fluori subuenit: parturientibus drachmę semissis pondere ex uino albo potui datur, ad foetum maturandum, partumq; accelerandū utile: quod sæpe experientia didicimus, ad urinę difficultatē, simili pondere, ex aqua faxifragiæ bibitur. Quidam nuper ea cum semine paliuri ex uino epota, urinam quindecim diebus retentā excreuit. Articulari morbo conducit, si eius drachma semissis ex ligni Indici decocto, uncijs duabus exhibeatur. Oleū, quod inde (de quo suo loco) per chemiam singulari industria paratur, incidit, extenuat, aperit, & discutit: unde ex uino maluatico, uel alio liquore exhibitum, calculos, urinamq; educit. In strangulatu uteri efficacissimum est, si naturalia, & os eius ipso inungantur. Medici Florentini, & Andernacus.

De marinis emollientibus.

BITUMEN, Græcis *ἄσφαλτος* dictum, est ueluti terræ adeps, qui facillimè ignem concipit. Duūm est generum. Quod liquidum est, ut oleum, uulgò petroleum uocatur, omnibus notum. Aliud densum, picis modo, quod, antequam concrefcit, liquidum aquis supernatare solet. Huius generis est, quod in Iudæa nascens peculiariter asphaltos dicitur: uidetur autem id esse, quod uulgò sic hodie uocatur. Eius uerò probatio est, ut purpuræ modo splendeat, sitq; ponderosum, & ualidum odorem uibret. Nigrum autem & fordidum, uitiosum est. Adulteratur pice: quod color niger indicat, & picis odor. * Bitumen omne discutit, glutinat, emollit, ab inflammatione tuetur, uuluarum procidentia, strangulationesque olfactu, suffitu, imposito emendat. &c. Dioscorides, & Florentini.

QUOD Babylone natum **NAPHTA** uocatur, bituminis candidi aut etiam

A etiam nigri colatura est. Vis ei ignium rapax. Huius loco, quia ad nos non adfertur, nostro petroleo uti possumus: quemadmodum etiam asphalti loco, si dubium esset, an asphaltus sit bitumen Iudaicum. Si quis autem asphalti modo densare uolet, uase æneo aut ferreo illud coquet, & quia facile flammam concipit, flamma, panno lineo madente in uas ubi percoquitur demisso, extinguetur. Hac ratione concretum petroleum pro naphra & asphalto usurpari potest. * Extenuat, penetrat, siccat, digerit, omnemque materiam frigidam ex quauis corporis parte absumit: morbum comitalem, membrorum resolutionem, conuulsionem neruorum, articulorumque dolores mitigat: lienis, renum, uesicæ, uterique: frigidiores affectus sanat. Medici Florentini, Dioscorides & Andernacus.

PISSA ASPHALTVS in Apollonia Epirotarum nascitur: appellatur autem sic, quod mistam bitumini picem redoleat: & Mumia Arabum esse creditur: tametsi mumiam etiam appellent, confectionem quandam, qua cadauera condiuntur. Factitia etiam est pissasphaltos, admixta pice bitumini.

* Secundo ordine tum siccat, tum excalfacit: capitis dolores frigiditate obortos absque humorum presentia mulcet. Medetur hemicranie, paralyfi, oris distractionibus, comitialibus, uertiginosisque, si ex amaraci aqua naribus immittatur. Leucoij oleo, siæ hyoscyamo graui pondere subacta, ad aurium dolores frigidos utiliter in earum concauitatem infunditur. Prodest quatuor granorum pondere ex thymbra decocto resoluta, gula cruciatibus. Epota ex zizipharam, hordei, & myxorum decocto tribus diebus continuis, tussientibus opem non modicam præstat. Granorum item quatuor pondere sumpta ex aqua menthe, cordis affectus remouet: cum decocto uero cumini, ammi, & cari, tum uentriculi, tum intestinorum status discutit. Bibitur utiliter ab alto deuolutis ex siliquæ Egyptiæ medulla, additis Lemnia sfragide, & rubiæ radice. Haula trium uel quatuor granorum pondere singultum inhibet: si tamen ex cumini & apij decocto assumatur. Errhinis imposita, additis moscho, castoreo, caphura, & oleo balanino, naribus commode inditur ad diurnos capitis dolores, præfertimque cum adhibitis alijs contumax morbus non soluitur. Gargarizatur cum oxymellite aduersus anginam: & ad lienis affectus ex cari decocto utiliter bibitur: & contra lethalia uenena ex decocto tribuli marini, & scetidi laserpitij gummi iuuamento non modico sumitur, item ex mero contra scorpionum ictus bibitur, ictusque locis cum recenti bubulo butyro utilissimè imponitur. Adstringit mumia illita externa sanguinis profluuia, pota uero interna: proinde perutilis ad cruentas excreationes. Ex caprillo lacte pota, opitulatur ex ulceratæ uesicæ, internis penis desquamationibus, & urinam ægrè continentibus. Non desunt, qui credant, humanorum cadauerum ossa in puluerem redacta, & in potu exhibita, uarijs corporis languoribus prodesse, os

suum unicuique membro tribuentes. Si deficiat, eius loco Asphaltum officinarum, aut pix cum bitumine mixta sumemus. Medici Florentini, Dioscorides, Matthiolus, & Arabes. A

De marinis abstergentibus.

PURPURAE sunt pisces marini, eius sanè generis, quæ testa integuntur. Hæ illum magni precij florem retinent, purpureum propriè dictum, tingendis regum uestibus expetitur. Hunc in medijs faucibus gerunt, candida quadam uena conclusum, colore nigricantis rosæ pellucidum. Viuas capere contendunt, quia cum uita sua succum illum euomunt. Latent circa canis ortum tricenis diebus. Congregantur uerno tempore, mutuoq; attritu lentorem cuiusdam ceræ saluant, Lingua purpuræ digitali longitudine, qua pascitur perforando reliqua conchylia: tanta durtia aculeo est. Capiuntur autem purpuræ paruulis, rarisq; textu ueluti nassis, in alto iactis. Inest ijs esca, clusiles, mordacesq; conchæ, quales mitulos uidemus. has semineces, sed redditas mari auido hiatu reuiuifcentes, appetunt purpuræ, porrectisq; linguis infestant. At illæ aculeo extimulatæ claudunt sese, comprimuntq; mordentia: ita pendentis auiditate sua purpuræ tolluntur. Aqua dulci necantur, & sicubi flumini immerguntur: alioqui captæ diebus quinquagenis uiuant salua sua. Anno magnitudinem implèt, celerrimeq; crescunt, quemadmodum conchylia omnia. * Purpura usta exiccat, dētes abstergit, excrescentias in carne cohibet, ulcera purgat, & ad cicatricem perducit. Dioscorides, Plinius & Matthiolus. B

BUCGINVM in purpurarum genere est, ad similitudinem eius buccini, quo sonus editur: unde & causa nomini, & rotunditate oris in margine incisa. Sed maior est purpura, cuniculatim procurrente rostro, & cuniculi latere introrsus tubulato, qua pferatur lingua. Cui circum orbis aculeati, qui buccino non infant, sed utriusque orbis totidem, quot habent annos. Buccinum non nisi petris adhæret, circaq; scopulos legitur. Eadem præstant concremata buccina, sed uehementius urunt. Si quis salis plena fictili crudo adurat, dentificio conueniunt: ambustis utiliter illinuntur, quibus solui medicamentum non oportet: nam posteaquam uulnus cicatricem duxerit, ipsum in testæ modum induratum, sponte sua decidet. Fit etiam calx è buccinis. Buccinorum carnes ori gratæ sunt, & stomacho utiles, sed aluum non molliunt. Dioscorides & Matthiolus.

CIONIA uocantur purpurarum, buccinorumq; mediæ partes, circa quas testæ uolumen clauiculatim intorquetur. Cremata simili modo, maiorem purpuris, buccinisq; facultatem urendi consequuntur: quoniam apprimendi naturam obtinent. Dioscorides.

Quales **MITVLI** sint in Italia, qui hac nostra tempestate explicauerit, hæc ægenus

Astenus inueni neminem: præter unum Massarium Venetum, qui eos mitulos putat, quos Adriatici accolæ uulgò appellant Muscioli, quasi musculos dixerint. Cuius opinio nobis maximè probatur: quippe quòd & forma, & nomine conchylia ita uocata legitimos referant mitulos. Sunt enim tellinis paulo maiores, testa exterius lineis quibusdam scabra: intus uerò pellucida, & tota pondere leuis. Cæterùm Mituli in Ponto laudatissimi. * Cremati eundem buccinis effectum præbent. priuatim plumbi more eloti, oculorum medicamentis cum melle utiles habentur: palpebrarum crassitudines absumunt, albugines purgant, & cætera, quæ oculis caliginem offundunt. Carnes eorum ad canis morsus utiliter imponuntur. Dioscor. & Matthiol.

TELLINAE in Italia, præsertim Romæ, notissimæ sunt, ubi plurimè uenales circumferuntur, quòd edendo sint, & ori admodum gratæ, si tamen ab arena optimè repurgentur. * Recentes Tellinæ aluo utiles, sed maximè ius eorum. Salitæ urantur, tritæq; in cinerem, & cum cedria instillatæ, a uulso palpebrarum pilos renasci non patiuntur. Dioscorides & Matthiolus.

CHAMAE præter cæteras conchas id sibi peculiare asciscere, quòd plerunq; in litore hiantes inueniuntur. Idcirco eas rectè chamæ dici posse putauerim, quæ in marinis oris, pendentes sese læui testa contactæ reperiuntur. Harum quamplurimæ in Adriatici litore sunt. * Chamarum, aliarumq; conchularum in exigua aqua decoctarum ius, aluum ciet. id cum uino assumitur. Dioscorides & Matthiolus.

COCHLEAE marinæ in Italia mediterraneis perquam rarò in cibis ueniunt: quanquã ijs, qui maris litora inhabitant, frequentiori sint usui. * Stomacho idonea, & facilè aluo excernitur. Crematæ omnium testè excalescendi & urendi naturam fortiuntur: purgant lepras, uirilignes, dentesq; emendant oculorum cicatrices, & uitia cutis in facie, albugines, ac uisus hebetudines, si cum carne sua ustæ, tritæq; ex melle illinantur. Crudæ cum tegumentis impostæ, aquæ inter cutem tumores exugunt: sed non antè soluantur, quàm omnis hauriatur humor. Podagricas inflammationes leniunt: impactos corpori aculeos illitæ euocant: menses tritæ & admotæ ciunt. Carnes earum cum thure & myrrha illitæ, cum uulnere alia, tū maximè quæ nerui acceperunt, conglutinant: tritæ in aceto, sanguinem naribus erumpentem infrenant. Viuæ corpus, & præsertim Aphricanæ, cum aceto deuoratum, stomachi dolores mitigat. trita cum testa, uino & myrrha, si exiguum inde bibatur, coli, uesicæq; cruciatus sanat. Terrestris pilos incommodos replicat, si quis abrafo acu, lentore eius, pilum attingat. Dioscorides & Matthiolus.

CANCRORYM exustorum cinis, qui duo cochlearia expleat, adiecto dimidio radice gentianæ modo, triduo potus cum uino, magnopere profest canis

dest canis rabiosi moribus: rimas pedum sedisq; , perniunculos, & carcinõ. **A**
mata, cum decocto melle lenit. Triti crudi, potiõ; ex asinino lacte, auxiliantur
contra serpentium phalangiorumq; morsus, atque scorpionum icus.
Decocti autem, & cum iure esitati, ijs profunt, qui tabe conficiuntur, aut le-
porem marinum hauserunt. Necant scorpiones triti, & cum ocimo admoti.
Possunt eadem marini: uerum inefficacius omnia præstant. Dioscorides.

EST SEPIIS in dorso os candidum, superiori parte durum ac læue: in-
feriori autem fungosa quadam medulla repletum, quæ & leuiter aspera, &
ligni modo frequentibus uenis distincta uisitur. * Expetuntur Sepiæ ossa
aurifabris: facile enim in partem illam fungosam anulorum, cæ-
terarumq; rerum formas imprimas, quæ metallis
igne colliquatis expleri solent.


Matthiolus.


DE ANI-


DE ANIMATIS SINE SENSU

A TERRESTRIBVS, HOC EST, EX PLAN-
tis & arboribus sumptis: & primò de folijs.

CAPVT VIII.







ANTIDOTARIUM LIB. I.

	Caput	{ Betonica, Chamomilla, Calamintha. Feniculum, Folium, Folia lauri. Maiorana, Melilotum, Pulegium. Peonia, Ruta, Saturegia, Salvia. Serpillum, Siler montanus, Stoechas, &c.
	Pectus	{ Betonica, Capillus ueneris. Hyssopus, Melissa, Prasilium. Serpentaria, Vrtica, Scabiosa, &c.
	Cor	{ Borrago, Buglossa, Melissa. Folia citri, Enula. Ocimum, Rosmarinus, &c.
	Stomachum	{ Absinthium, Feniculum. Mentha, Serpyllum. Salvia, &c.
	Hepar	{ Absinthium, Asarum, Eupatorium. Feniculum, Fumus terrae. Hyssopus, Spica, Origanum.
	Calefaciunt	{ Absinthium, Asarum. Calamintha, Cuscuta. Thymus, Eupatorium. Nasturtium, Scolopendria. Epithimum, &c.
	Renes & uescam	{ Eruca, Parietaria. Pentaphyllum. Saxifragia. Spica nardi. Vrtica, &c.
C. Folia alterantia qualitate prima secundum locum, aut	Matricem	{ Arthemisia, Calamintha. Pulegium, Ruta. Sabina, &c.
	Iuncturas	{ Costum. Eupatorium. Chamomilla. Hypericum. Melilotum. Nasturtium. Rosmarinum. Ruta, Salvia. Stoechas, &c.

Frige faciunt, Vide in sequentibus signum D.

D. Folia

DE FOLIIS

D. Folia fige facientia	Caput	Fumus terræ, Folia falicis. Iusquiamus, Lactuca. Lupulus, Nenuphar, &c.
	Pectus	Mora Celsi. Papauer, &c.
	Cor	Acetosa. Nenuphar. Borrage, &c.
	Stomachum	Myrtus, Portulaca. Prunella, Solatrum. Semperuium, &c.
	Hepar	Cichorium. Endiuiia, Lactuca. Portulaca. Solatrum. Nenuphar. Lupulus. Fumus terræ, &c.
	Splenem	Lactuca. Endiuiia. Cichorium, &c.
	Renes & vesicam	Endiuiia, Lactuca. Portulaca. Plantago. Nenuphar. Semperuium, &c.
	Matricem	Endiuiia. Lactuca. Nenuphar. Portulaca. Semperuium, &c.
	Iuncturas	Endiuiia, Lactuca. Hyosciamus. Pssyllium. Semperuium. Solatrum. Myrtus. Gramen. Folia falicis. Folia vitis, &c.

		Absynthium, Amomum, Agnus. Bursa past. Brassica cocta, Cypressus. Equisetum, Ebulus, Hypocystis. Hedera, Helixine, Hieracium. Intybum, Lauri folia, Lyfimachium. Melilotum, Myrthus, Mentha. Oxalis, Polygonum, Pentaphyllum. Psillium, Plantago, Portulaca. Folia quercus, Ruta, Rhu obson. Semperuium, Salix, Verbascum. Vitex, Vitis, &c.
	Astringūt: <i>ut</i>	
	Aperiunt: <i>ut</i>	Allium. Cepa. Cyclaminus, &c.
	Emolliunt: <i>ut</i>	Atriplex, Althea. Cupressus, Laurus. Malua, Psillium, &c.
	Indurant: <i>ut</i>	Portulaca, Psillium. Lenticula palustris. Semperuium, Solanum, &c.
E. Folia al- terantia qua- litate secun- da, aut	Extenuant: <i>ut</i>	Artemisia, Chamæmelum. Hyssopus, Iuniperus. Pulegium, Stœchas, &c.
	Discutiunt: <i>ut</i>	Abrotanum, Althea, Anethum. Adiantum, Atriplex, Brassica. Chamæmelum, Lilij folia, Malua. Mentha, Melilotum, Origanum. Ruta, Stœchas, Sampsuchum, &c.
	Extrahunt: <i>ut</i>	Anagallis, Aristolochia. Cyclaminus, Dictamnus. Porrum, Thapsia, &c.
	Suppurant. Abstergunt. Glutinant. Flatus discutiunt. Semen generat. Menses mouet.	<i>Vide in sequentibus signum F.</i>
	Menses sistunt. Venenis resistunt. Ambustis medetur. Strumas discutiunt. Dolorem mitigant.	
		<i>Vide in sequentibus signum G.</i>

F. Folia

- F.
Folia alterantia qualitate secunda, aut
- Suppurant: ut { Amomum,
Althea,
Smyrnum, &c.
 - Abstergant: ut { Anagallis, Abrotanum.
Asparagus, Asplenos.
Atriplex, Absynthium.
Bertha, Chamæpithys.
Cassutha, Liche.
Marrubium, Parietaria.
Salicis folia, &c.
 - Glutinant, & cicatricem ducunt: ut { Althea, Anagallis.
Centaurium, Chamæpithys.
Chamædrys, Equisetum.
Eupatorium, Ebulus.
Fragaria, Isatis.
Myrthus, Plantago.
Quinquefolium.
Symphitum maius, Sanicula.
Tormentilia, Verbenaca, &c.
 - Flatus discutunt: ut { Absynthium, Allium.
Anethum, Apium.
Chamæmelum, Epithymum.
Fœniculum, Juniperus.
Maiorana, Origanum.
Petrofelinum, Ruta.
Squinanthum, Spica nardi.
Smyrnum, Sefeli, &c.
 - Semen generant: ut { Horminum.
Eruca, &c.
 - Menses movent: ut { Asarum, Abrotanum, Allium.
Adiantum, Amomum, Absynthium.
Arthemisia, Alisma, Ammi.
Brassica sat. Betonica, Centaurium.
Chamæmelum, Calamintha, Chamædrys.
Cassutha, Cyclaminus, Dictamnus, Daucus.
Gingidium, Fœniculum, Hypericum.
Heliochrysos, Lappathum, Maiorana.
Marrubium, Melissa, Nasturtium.
Origanum, Oeynum, Pulegium, Polium.
Petrofelinum, Oreofelinum, Raphanus.
Ruta, Rosmarinus, Smyrnum, Salvia.
Sabina, Sefeli, Serpillum, Scordium.
Thymus, Trifolium, Vitex, Vrtica, &c.

Menses sistunt: ut

- Bursa pastoris.
- Fragaria.
- Hyoſciamus.
- Limonium.
- Lyſimachia.
- Myrtus.
- Nymphaea.
- Plantago.
- Rubus.
- Semperuium.
- Symphitum.
- Solanum, &c.

Venenis reſiſtunt: ut

- Abrotonum.
- Abſynthium.
- Allium.
- Adianthum.
- Apium.
- Bräſſica.
- Beonica.
- Carduus benedictus.
- Chamaedrys.
- Cyclaminus.
- Calamintha.
- Eupatorium.
- Erythimum.
- Foeniculum.
- Iuniperus.
- Lybifticum.
- Marrubium.
- Origanum.
- Pulegium.
- Polium.
- Ruta.
- Scordium, &c.

Strumas diſcutiunt: ut

- Adiantum.
- Aparine.
- Althea.
- Lupinum.
- Lapathum.
- Meliffa.
- Galiopsis.
- Nalturtium.
- Pentaphyllum.
- Scordium, &c.

Dolorem, Vide in ſequentibus ſignum H.

G.
Folia alterantia qualitate ſecunda, aut

H. De.

- Anethum.
 Absynthium.
 Asclepias.
 Atriplex.
 Chamæmelum.
 Calamintha.
 Centaurium maius.
 Chamæpitys.
 H. Dolorem mitigant: ut — Hyosciamus.
 Lybisticum.
 Lupulus.
 Peucedanum.
 Petroselinum.
 Rosmarinus.
 Ruta.
 Silybrium.
 Serpyllum.
 Sampsucus, &c.

De folijs temperatis.

ADIANTI duo sunt genera, candidius & nigrum. Candidum (officinæ Capillum Veneris appellant) pusilla gerit folia, similia coriandri, in summo incisuris diuisa: cauliculi, quibus exoriuntur, nigro colore nitent, prætenues, palmum alti: radice superuacua: neq; caulem, neq; fructum, neq; florem profert. Nigrum (officinis Polytrichon & Trichomanes dictum) filice simile, sed exilius: folijs lenticulæ, tenuibus, in ordinem utrinq; digestis, aduersis in se, in ramulis tenuib. acerbis, fusco colore splendentibus. Ambo umbrosis & palustribus, circa parietum aspergines, & fontium specus enascuntur. Colligitur mense Septembri. Conseruatur uix per annum. * Aluum subducit, bilem & pituitam deijcit, crassaq; excrementa quæ

quæ diu interioribus inhæserunt. Pectus & pulmonem detergit, sanguinem A clarificat, bonum facit habitum, animam dilatat, & iecur & uentriculum purgat, præsertim si obstructione laborent: tamen ad eorum infarctus potentius sit eius dilutum ex apij, aut endiuæ aqua paratum, aut ex cicerum nigrorum iure, aut caprino sero. Sed si addatur saccharum, lateris inflammationes sanat, & urinam trahit. Eius præterea decoctum frequentius potum calculos frangit, & fœminas à partu purgat. Hos autem effectus præbet calida tantum facultate, quæ illi inest. At altringente ui, qua etiamnum pollet, defluxiones inhibet: fluentem sanguinem sistit, uentriculum roborat, & capillorum defluuium usque ad eò emendat, ut non modò eos cohibeat, sed & renasci faciat, præsertim emplastri modo impositum, myrtino oleo, ladano, & austero uino additis. Idem præstat & combusti cinis: quinetiam eius ex uino decoctum. Furfures reiteratis lotionibus depellit. Eius cinis hæc omnia potest, & ægilopas curat. Ipsius diluti libra epota commodissimè aliud subducitur. Dioscorides, Melues, Saladinus & Matthiolus.

ASPARAGI genera duo sunt, satiuus & syluestris. Syluestris Corrua dicitur: uulgaris est noticiæ. Satiuus, multis ramis fruticat, folijs fœniculi, longis, numerosis: radice rotunda, grandi, spongiam habente. Colliguntur mense Aprili. Non seruantur diu, sed uirides tantum in usum ueniunt. * Abstergunt, iecur infarctum liberant, & maximè radices. dentium dolores sanant. Stomacho utiles sunt, urinam cient, & parum præbent alimenti. oculis claritatem adferunt: pectoris & spinæ doloribus profunt. Venerem stimulant, & uentrem leniter molliunt: urinam fœtidam trahunt: regium morbum sanant. Dioscorides, Galenus & Plinius. B

ATTRACTYLIS, spina est cnico similis, folia multo longiora ferens in summis uirgis, magna parte nuda, aspera que, qua fœminæ profusis utuntur. capitula in cacumine spinis horrent: flos luteus, quibusdam in locis purpureus inuenitur: radix tenuis, superuacua. * Coma, semen, & folia cum pipere & uino teruntur utilissimè contra scorpionum ictus. Percussos tradunt quandiu ea teneatur herba, nullum experiri dolorem, ipsumque deposita statim recrudescere. Dioscorides.

De folijs seu herbis calidis in gradu primo.

ABSYNTHII genera tria sunt: uulgare, marinum, & Santonicum. Vulgare ab aliquibus bathi picron uocatur, herba uulgò cognita. Marinum quod aliqui Serephium uocant, copiosissimum in Tauro monte, iuxta Cappadociam gignitur. Herba est tenuis, abrotani parui similitudine, referta minutulis seminibus, subamara, stomacho inimica. grauius olet, & cum quadam calfactone adstringit. Santonicum, quo Gallia alpibus finitima scatet, absynthio uulgari non dissimile: uerum subamarum est, non adeò seminis fœcundum. Eligitur

A Eligitur vulgare, & potissimum Ponticum & Romanum. Colligitur in vere, uel principio æstatis, & autumno, ante solis ortum. Conseruatur autem per annum. Dosis eius decocti aut infusi potio est à ʒ v usq; ad vij. Et pulueris eius à ʒ ij usque ad ʒ iij. * Absynthium calefacit & astringit. Bilem expurgat, quæ & stomacho, & uentri inhæsit: urinam cit, & crapulam præsumptum arcet. ad inflationes uentris & stomachi dolores prodest: fastidia discutit, arquatos sanat, & febres diurnas: menses cit potum, &c. Dioscorides, Me- sue & Saladinus.

ALTHEA, quam alij Ibisum, alij Bismaluam, Itali uerò Maluauisco uocant, in syluestrium maluarum genere est, cui folia ut cyclamino rotunda, la nugine canescunt: flore rosaceo: bicubitali caule: radice lenta, intus alba. Althea appellatur, quòd inter primas sit utilis, & plurib. polleat remedijs. Colligitur cum floret. Conseruatur autem per annum. * Decocta in uino aut aqua mulsa, & per se cum imponitur tula, efficax est contra uulnera: item ad strumas, parotidas, abscessus, mammarum inflammationes, fracta sedis, inflationes, neruorum rigores: siquidem discutit, & excoquit, rumpit, & ad cicatricem perducit. Coctæ (ut dictum est) adiecto suillo adipe, aut anserino, terebinthinaue, ut malagmatis lentor fiat, facit ad uulnè inflammationes, præclusionesq; in pennis subdita. Decoctum eodem fungitur munere: onera uulnè, reliquiasq; à partu extrahit. Decoctæ radice succus ex uino potus, succurrit urinæ difficultati, calculosorum cruditatibus, dysentericis, ischiadicis, tremulis, ruptis. dentium mulcet dolorem, cum aceto decoctæ, colluto inde ore. Viride semen siccumq; tritum, uertiligines in sole cum aceto perunctas emendat. Eodem cū oleo & aceto peruncti, à uenenatis non feriuntur. Valet contra dysenteriam, & sanguinis reiectiones, aluiq; profluuiū. In posca aut uino decoctum bibitur, contra oēs uesparū, apum, similiumq; aculeatos ictus. Folia cū olei momento, morsibus, & igni ambustis illinuntur. Constat aquā, trita radice addita sub diuo addensari. In summa, facultatē habet digerendi, laxandi, phlegmone leuandi, mitigandi, concoquēdi difficilia coctū tubercula. Dioscorides & Galenus.

B BORRAGO, officinarū quasi Corago, Buglossu uerū fatiuū est: Verbafeo similis, folium in terra sparsum, nigrius, asperū, bubulas imitās linguas. Nascitur in campestribus & sabulosis locis. Iulio mense colligitur. Herba nō conseruatur. * Humidæ calidæq; temperiei est. Itaq; uinis iniecta, læticiæ ac hilaritatis causa esse creditū est. Sed & ijs, qui ob fauciu asperitatē tussiunt, coctū in melicrato cōuenit. Aiunt eam quæ tres thyrsos emittit, cū semine & radice tritā, potamq;, contra tertianos horrores prodesse: quæ quatuor, ad quartanos: ea in uino decoquitur. Herbam abscessibus utilē esse uolunt: cor confortat: sanguinem bonum generat, &c. Dioscorides & Galenus.

BVGLOSSVM VVLGARE folia habet longa, echio similia, nō usq; adeo

h adeo

adeò lata, ut bubulas referant linguas, minusq; humi depressa, quæ potius è toto fermè cespite sursum aspiciunt, nec aliqua ex parte uerbascum, aut symphitum alterum repræsentant. Nascitur iisdem in locis, quibus Borrago, eodemq; colligitur tempore, &c. Matthiolus.

BETA duorum generum est, cãdida & nigra: ubiq; in hortis nascitur frequentissima. In Germania tamen habetur & rufa, non modò folijs, sed etiam radice, quæ illi raporum oblongorum magnitudine extuberat: colore adeò rufescente, ut eius succus uiuum sanguinem referat. Iulio mense & Augusto fert tum flores, tum semina. Colligitur recens. Non conseruatur. * Nigra coquitur cum lenticula, ut uentrem sistat: quod magis radice eius præstatur. Candida aluo utilis est. Vtraq; tamen propter nitrosum humorem, quem habet in se, noxij succi est. Vnde succus earum, cum melle naribus inditus, caput purgat, aurium doloribus auxiliatur. Decoctum radicis & foliorum, furfures, lentesq; deterget: pernioles fotu mitigat. Crudis folijs utiligines, nitro antea perstrictas: alopeciarum inanitates, scapello prius exasperatas, atq; depascentia ulcera illini prodest. Eruptionibus papularum, igni sacro, ambullisq; cocta medetur. Dioscorides & Matthiolus.

BRASSICA satiuæ & syluestris est. Satiua in multiplici recensetur genere. Est enim crispa & capitata, &c. ubiq; in hortis nascitur. Non conseruatur. * Aluo idonea est, si modò leniter seruescãta edatur, nam percocta aluum sistit, sed multo magis bis cocta, aut quæ in lixiuio coquitur: stomachum autè malè habet. acrior est æstiuæ. In Aegypto propter amaritudinem non estur. Cæcutientibus & tremulis esse prodest. Summo cibo sumpta, crapulam discutit, & uini noxam restinguit. Melior stomacho cyma, sed acrior, & ad ciendum urinam ualidior. ea condita, stomacho inimica est: aluum conturbat. Crudus succus cum nitro & iri deuoratus, aluum emollit: cum uino quoq; epotus, viperarum moribus auxiliatur: cum sænigræci farina, podagris, & articulorum uitijs illinitur: prodest & sordidis ulceribus, & uetustis illitus: caput purgat, naribus infusus: menses extrahit, cum loliacea farina inditus. Folia per se illita, aut cum polenta trita, conferunt inflammationibus, tumoribusq; epinyctidas, ignem sacrum, leprãsq; sanant. carbunculos ex sale rumpunt: fluentes capillos retinent. Cocta addito melle aduersus depascentia ulcera, gangrænasq; ualent. Lienosisq; ex aceto cruda profunt. Mansa, deuorato succo, retusam uocem instaurant. Decoctum eius potu, aluum & menses ciet. Flos post conceptionem in pello subditus partum abortu uitiat. Semen eius, præsertim quæ in Aegypto nascitur, potum tineas repellit. In antidota theriaca additur. Faciei cutem, lentiginesq; expurgat. Virentes cauliculi cum radice cremati & adipe porci uetusto excepti, diurnos laterum dolores mitigant. Syluestris uerò brassaica, maritimis præruptisq; locis, magna ex parte gignitur: satiuæ similis, sed candidior, hirsutiorq; amara. Cuius cyma

A cyma in lixiuio cocta, ori non insuauis. Folia illi uulnera conglutinant, & inflammationes, tumoresq; discutunt. Dioscorides.

CHAMAEMELON, qd' & *Athemis* dicitur: eius genera tria sunt, tantum flore distantia: rami dodrantes, fruticosi, alis multis concavi: tenuibus foliolis, paruis, numerosis: rotundis capitulis: floribus in medio aureis, foris secus orbiculato ambitu candidis, melinis, aut purpureis, magnitudine foliorum rutæ. Nascitur in asperis, & iuxta semitas. Colligitur uere. Conseruatur per annum. * Vim habent radices, flores, & herba, exalfaciendi, extenuandiq;, potu & infusione: pellunt menstrua, partus, urinam, calculosq;: aduersus inflationes & ilei tormenta bibuntur. Bilem suffusam expurgant: icterorum uitia sanant. Decocto earum uesicæ fouentur. Ex omnibus his generibus ad calculos efficacissima est, quæ florem purpureum habet, cuius amplitudo maiuscula est. Hanc propriè herantheum uocant. Ea cui leucantheum nomen est, item quæ chrylantheum dicitur, uehementius urinam ciunt, Aegilopijs illitæ medentur: commaducate ulcerum eruptiones in ore sanât. Nonnulli in clysteribus ex oleo utuntur, terunturq; in farinâ, ad abigendos febrium circuitus. Flores & folia recondi debent, & priuatim tusa, in pastillos digeri: radix quoq; siccari, dumq; ingruit necessitas, binæ partes herbæ dari, modò floris aut radicis pars una, modò contra floris partes duæ, & herbæ una, permutatim duplicato pondere, alternis diebus, bibere autem oportet in uino mulso diluto. Dioscorides.

CVS CVTA, Græcis & recentioribus cassutha dicta, plâta est capillaris, sine folijs, reliquas plantas inuoluens & enecans. Flores edit albos, quàm plurimos, à quibus semen tenue prodit. Cirri rufescunt, uitium capreolis crassitudine & facie pares. Nota est. Deligenda est, quæ in genista reperitur. Colligitur mense Iunij. Conseruatur per annum, & ultra. * Excalfacit ordine primo, siccataq; secundo. Abstergit, & quadâ cum adstrictione roborat. Iecoris obstructions aperit, infarcti lienis uitia expedit: uenas pituitosis atq; biliosis exonerat humoribus: urinam pellit, & regio morbo subuenit. Puerorû febribus auxiliatur: sed diuturno usu uentriculum grauat, quæ tamen noxa tollitur, si anisi momentum adijciatur. Bilem deijcit, præsertim absynthio admista. In quem usum decoquitur, bibiturq; eius decocti selibra, cum sacchari sesquuncia. Matthiolus.

EVPATORIVM Græcorum, uulgaris agrimonia est. Eupatorium Auicennæ id esse creditur, quod uulgò eupatorium appellant, folijs canabis syluestris, & secundû aquas crescit: uulgò nota est. Eupatoriû Mesuæ herba est amara, quibusdâ camphorata, alijs herba giulia dicta, quæ Dioscoridis ageratum putatur. Cum itaq; omnes hæ plantæ eupatoriû appellentur, animaduertendum est, ne indifferenter altera pro altera usurpetur: sed in Græcis compositionibus, agrimonie usus est: in Auicennæ, Auicennæ: in Mesuæ,

Mesuz eupatorium usurpandum est: singuli enim suo Eupatorio peculiare^A ac diuersas facultates tribuunt. Ceterum eupatorium Dioscoridis enascitur in uliginosis locis, & in scrobium marginibus: Auicennæ uerò & Mesuz in campestribus. Colliguntur in fine ueris, uel principio æstatis. Conferuntur uerò per annum, tã herba quàm succus. Decoctionis potio est ab ʒ iij usq; ad ʒ vj: & pulueris eius à ʒ ij usque ad ʒ iij. Et loco eius ponitur in defectu ipsius absynthij & asari ana medium ponderis ipsius. * Calidũ est in primo, siccum in secundo: est partium tenuium, incidendi extergendiq; facultatem obtinet. quocirca obstructiões iecoris expurgat, hepar roborat. Medici Florentini, Galenus & Saladinus.

MELILOTVS siue fertula Cãpana, flore est luteo, colore uicino croco, odorato. Laudatissima folijs constat minutissimis, pinguisimisq;: semen in siliquis teretibus profert rarum, rotundũ, sinapi minus, colore luteo. Ex his manifestum est, eã quæ hodie in usu est, non esse uerã melilotum, non enim est odorata: nisi ex eius genere sit, quæ in Campania nascitur, odore infirmo, ut ait Dioscorides. Diligentia itaque adhibenda est, ut uera habeatur. Hanc nonnulli trifolium illud esse arbitrantur, quod locis montosis, sterili solo, ad meridiem spectante nascitur: folijs ciceri similibus, minoribus, maculis quibusdam stellarum modo distinctis: flore luteo fuluescente: semen exili siliqua, in cuspidem desinente, flauum continetur. Tota planta grauissimo est^B odore, theriacæ proximo, quam Hetruriæ incolæ herba bachia appellant, quod ea infantium uermes enecant. Colligitur mense Aprili. Conferuatur per annum. * Mistæ est facultatis: habet enim quiddam astringens, sed & digerit & concoquit: copiosior enim in eo est substantia calida quàm frigida. Inflammationem omnem emollit, præsertim quæ in oculis, uulua, sede, aut testibus erumpat, si ex passo cocta illinatur: interdum autem addito oui luteo assato, aut fœnigræci farina, lini semine, aut polline, aut capitulis papaueris, intyboũe. Recentes meliceridas per se cum aqua, & ulcera manantia in capite illita cum creta Chia, uino, aut galla sanat: stomachi dolores, & cruda, & cocta cum aliquo ex antè dictis leuat: doloribus aurium mitigandis cruda ex passo instillatur: in aceto, aut rosaceo madefacta, capitis dolorẽ lenit. Galenus, Dioscorides & Medici Florentini.

MALABATHRVM arbitrantur aliqui esse Indici nardi folium, falsi quadam odoris cognatione: permulta enim nardum olent, quemadmodum phu, asarum, niris. Secus autem res se habet: namque Malabathrum folium sui generis est, quod Indicæ gignunt paludes, lentis palustris modo innatans aquis, sine radice. Id collectum statim lino transfuitur, & siccatum recõditur. Tradunt siccatis æstiuo feruore aquis, humũ aridis fruticibus urit: quod ubi non euenerit, ne amplius quidẽ renasci. Laudatur recens, ex cãdio nigricans, integrũ, nec fragile, odore caput feriẽs, qđ diu in sua ui odore permaneat,

A permaneat, & nardum sapore imitetur, nullo salis gustu. Infirmum uerò, & minutim contusum, præsertim si cariosum uirus olet, uitiosum est. * Eisdem nardo fortitur uires: sed efficacius omnia præstat. Vrinam uehemētius ciet, ac stomacho magis prodest malabathri uis. Lippitudinibus, inflammationibusq; tritum, & in uino feruefactum commodè illinitur. Subditum linguæ, oris halitum & suauitatem commendat. Vestium quoq; odorem interpositū seruat, & ab erosione tuetur. Dioscorides.

OSYRIS, quòd folijs & caule lini faciem repræsentat, officinis **LINARIA** appellatur: frutex est niger, ramulos ferens tenues, lentos, fractuq; contumaces: & in his folia quaterna, quina, senaue, ceu lini. nigra in initio, dein colore mutato rubescunt. Huius flores numerosi à medio usque ad summū uisuntur, syluestris cumini secundi generis modo: uerū in hoc purpurei sunt, in illa sublutei. * Decoctum eius potum, iuuat arquatos. Dioscorides & Mathiolus.

NARDVM officinæ **NARDI SPICAM** appellat. Eius genera duo: unum Indicum, alterum Syriacum uocatur: non quòd in Syria proueniat, sed quòd mōtis in quo oritur, pars una ad Syrios pars altera ad Indos flectitur. Nota est. Eligitur Syriaca dicta: cuius hæc sunt notæ, ut sit breui spica, largam gerens comam, colore flaua, odorata, aliquantulum redolens cyperum, amaro sapore, linguam siccante, quæ diu in sua odoris gratia permaneat. Adulteratur sibi cum aqua aut palmeo uino ponderis causa inspirato. Sed ex præcedentibus notis dignoscitur. Madefacta etiam uendi solet: quod uitium ex eo deprehenditur, quòd candida sit spica, squalida, nulloq; puluere obrita. * Excalescit excessu primo, & desiccet secundo iam completo. Composita est ex altringente sufficienter substantia, & acri calida non multa, & quadam leuiter amara. Vrinam mouet, aluum potu sistit: uulua profuua, saniamque apposita supprimit. Nauseæ ex aqua frigida auxiliatur, & stomachi rosionib. inflationi, iocinori, regio morbo, renum uitijs. Aquæ autem incocta fotu ad in fessum, uulua inflammationibus medetur: ad glabras oculorum genas ualer: siquidem eas ad densiorem pilum reducit. perfusis humore corporibus inspergitur. Miscetur antidotis, & in fictili nouo non picato ad ocularia medicamenta reconditur, trita in farinam, ut cum uino in pastillos coacta. Cæterum longè ab omni Nardo distat nostra Nardus uulgaris (Spica nardi uocata:) cuius etiam generis ea est planta, quam aliqui uulgò appellant Lauanda, alij uerò Lauendula: adeò ut hæc fœmina, illa uerò mas in eo genere à quàm plurimis uocentur. Mas folio constat latiore, longiore, crassiore, robustiore, albidiorèq; quàm fœmina. Sed utraque planta fruticosa, & rosinari modo innumeris referta est folijs: è quorum medio iuncea exeunt cauliculi, quadranguli, tenues, dodrantalem longitudinem excedentes: in quorum cacumine flores exeunt spicati, colore purpureo, quauis in fœmina dilutio-

res, patentesq; odore fragrantes, uerum usque adeo acuto, ut nares feriat. **A**
Colliguntur ambo mēse Maio, uel Iunio. Cōseruātur uerò per annū. Excale-
faciunt & exiccant ordine secundo completo, uel tertio inchoante, uiribus
à nardis omnibus non longè recedentibus. Conferunt omnibus cerebri æ-
gritudinibus à frigido prouenientibus: conuulsis, resolutisq; auxiliātur: uen-
triculum roborant: & iecur ab infarctu liberant: quin & obstrusos lienes iu-
uant: uterum calefaciunt, & menses & secundas educunt. Fit è floribus stil-
latitium oleum uitreis organis, quod propriè unguentarij uocant Oleū spi-
cæ, odoris adeo acerrimi, ut cætera odorama superet. Dioscorides, Gale-
nus & Matthiolus.

SCOLOPENDRIVM uerum, Asplenium, Ceterah & Hemionitis uoca-
tur: uulgaris uerò Phyllitis & lingua ceruina est. Eligitur uerum & legitimū,
quod folijs est multis scolopendræ animalis similibus, ab radice una prodeū-
tibus. Nascitur in parietibus, saxisq; siliceis & opacis: nec caulem, nec florē,
nec semen habet. Folia polipodij modo diuiduntur, subterflauescencia hirsu-
taq; supernè uiridia. Colligitur mense Septembri. Conseruatur per annum.
* Vim hanc habēt folia, in aceto feruefacta, ut per dies quadraginta pota lie-
nem absument: quibus etiam contritis lienem ex uino illini oportet. Stran-
guriæ & regio morbo prodest, singultū sedat, calculos in uesica comminuit.
Conceptum adimere creditur, per sese, aut cum muli liene appensa. Tradūt **B**
noctū, silente luna, huius rei gratia effodiendam. Dioscorides.

SYMPHITI duo sunt genera: primum petræum, alterum consolida ma-
ior nuncupatur. Petræum nascitur in petris, ramis tenuibus, paruis, origano
similibus: capitulis & folijs thymi: lignosum totum, odoratum, gustu dulce,
saluam ciens: longa radice, subrufa, digitali crassitudine. * Decoctum in a-
qua mulla & potam, pulmonis uitia purgat: sanguinem reiicientibus, & re-
num malis ex aqua datur: ad dysenteriam, rubraq; fœminarum profluuia in
uino decoctum: ad conuulsa uerò & rupta, ex aceto mullo bibitur. Quin &
commaducatum sitim sedat, faucibus asperis subuenit, uulnera recentia, en-
terocelasq; conglutināt & illitu cohibet. Carnes autem cum symphito deco-
ctæ coalescunt. Alterum quod Consolida maior uocatur, caulem emittit bi-
cubitalem, aut maiorem, crassum, leuem, angulosum ut sonchi inanem: citra
quem breui interuacate spacio, folia exeunt angusta, buglosso proxima, ob-
longa, hirsuta: caule secundum angulos quosdam striato: folijs tenuibus, ex
alarum sinu prodeuntibus: in quibus flores lutei, & citra caulem uelut uer-
basc: femina emicāt. Tam caulis, quàm folia aspera lanugine horrent, tactū-
que pruritus concitant. Radices demittuntur foris nigræ, intus candidæ, ui-
scosæ. quarum est usus. Tritæ & potæ cruentis excreationibus, ruptisq; pro-
ficiunt: recentia uulnera illitæ conglutinant. carnes quoque si concoquan-
tur, cogūt additæ. Inflammationibus præsertim sedis, cum senecionis folijs,
utiliter

DE FOLIIS CALFACIEN. IN SECVNDO. 63

A utiliter illinuntur. Colliguntur ambo mense Augusto & Septembri. Conferuantur per annum. Dioscorides.

T V S S I L A G O Hetruscis uulgò dicitur Farfara, & Farfarella: ei folia sunt maiuscula, quàm hederæ, sex aut septè à radice, subalbida à terra, supernè uirentia, in plures angulos exeuntia. Caulis palmum altus, flos luteus, uere prodit, quo unà cum caule confestim exiit: inde nònulli his uacare existimauerunt. Radix tenuis est, & superuacua. Nascitur in amoenis & riguis.

* Folia ex melle trita igni sacro, & omnibus inflammationibus illitu medentur. Arida suffitu, ita ut fumus per infundibulum hianti ore rapiatur, hos fanant, qui sicca tussi, atque orthopnœa infestatur: pectoris uomicas rumpit. Eundem effectum præbet suffita radix. decocta in hydromelite, & pota, emortuos partus eijcit. Dioscorides.

De folijs seu herbis calidis in secundo.

ANETHVM hortis omnibus frequentissimum, omni ex parte fœniculū æmulatur, excepto gustu. * Calidum est in secundo, & siccum in primo. Digerit, dolorem sedat, somnum conciliat, & crudos & incoctos humores concoquit. Aridi anethi comæ, seminisq; decoctum, potu lac euocat: inflationes & tormina sedat: aluum uomitionesq; sistit: urinas ciet, singultus lenit: oculorum aciem hebetat, genituram restinguit, assidue potum. Decoctum eius fœminis uuluzæ malo opportunis, ad desefsiones utile. Condylomata illitus fœminis cremati cinis tollit. Colligitur mense Maio. Cõseruatur uerò per annum Galenus & Dioscorides.

ANGELICA cubitalem excedit altitudinem, caule geniculato, inani multis alarum cauis referto: folia profert oblonga, per ambitum serrata, in nigrum uirescentia: flores albos, in umbellam cohærentes: è quibus semè prodit tenue, lentium modo compressum. Radix ei subest crassa raphani modo, quæ in plures diuaticatur ramos, gustu acris, & suauiter odorata. * Excalefacit, pariterq; desiccet ordine secundo completo, aut tertio incipiente. Proinde aperit attenuat, & discutit. Venenis mirificè aduersatur: quare pestilentiam arcet hausta, aut frequenter commansa. Ipsa per se sumpta, pituitosos, lètosq; humores digerit. Idem præstat & radicis decoctum. quod etiam celerius ex frigore tussientibus auxiliatur: expectorat enim efficaciter crassam, lentamq; pituitam. Sanaatur eodem ex aqua aut uino interna uiscerum ulcera, concretusq; sanguis dissoluitur, & roboratur uentriculus. Radix in puluerem trita animi deliquijs, & cæteris cordis affectibus opem unice præstat. Valet ad rabiosorum & uenenosorum morsus, exterius cum ruta imposita, & intrò in corpus assumpta. Hinc fit, ut recentiores quidam magna opinione hanc suis inserant antidotis Matthiolus.

APIYM uulgare à Dioscoride Eleoselinum dicitur, petroselino gradius. In humi-

In humidis nascitur locis. Mense Iunio & Iulio tum flores, tum semina profert. * Calidum est in secundo. Vrinæ & menses ciet. Flatus quoque discutit, & magis semen, quam herba ipsa. Galenus & Dioscorides. A

ARTHEMISIA magna ex parte in maritimis nascitur, absynthij modo fruticosa, maioribus & pinguioribus folijs, ramisque. Huius quidē genera duo: unum lætius, habitiusque, folijs, uirgisque; latioribus: alterum tenuius, flore paruo, tenui, candido, graueolente. Æstate floret. Sunt, qui in mediterraneis uniuersalis nomine appellant tenuem herbulam, simplici caule & minuto, floribus scatente tenuibus, flauo colore. hæc iucundiorem, quam præcedens efflat odorem. Colliguntur ambo cælo sereno, in meridie, uel antè, mense Iunij. Conseruantur per annum in saccis lineis. * Vtraque excalefacit, extenuat, feruefactæ conuenienter in muliebres desessus adiiciuntur, ad detrahendos menses, partus, secundasque: item ad præclusiones uulue & eiusdem inflammationes: calculos comminuunt, remoratum urinam ciet: menses pellunt pube illitæ. Succus uulue inditus ex myrrha eadem, quæ in sepsio trahit. Co ma tribus drachmis eorundem educendorum gratia bibitur. Dioscorides.

CESTRON Psychotrophon uocatur, quoniam frigidis locis inueniatur: Latini **BETONICAM** appellant. Herba est caulem ferens tenuem, cubiti altitudine, aut maiorem, quadratum: folia quercus, mollia, longa, in ambitu diuisa, odorata, prope radicem maiora: in summis caulibus semen, ueluti fatuereia, spicatum est. Decerpta huius folia siccantur, plurimos ad usus. Radicibus nititur, ut ueratri, tenuibus, quæ ex hydromelite in potu, pituitosam uomitionem euocant. Folia dari debent ruptis, conuulsis, mulieribus uulue malo opportunis, & ad laxandos uteri strangulatus, denarij pondere cum hydromelite: tres in uini sextario drachmæ contra serpentium morsus ebibuntur. Herba magna utilitate illatis à serpente uulneribus illinitur. aduersus etiam uenena drachma ex uino pota conuenit: præsumpta ea, si uenum hauriatur, nihil nocebit. Vrinæ ciet, aluum subducit. Medetur comitialibus & insanis, pota ex aqua: & iecinoris, lienisque uitij drachmæ pondere in aceto mulso. concoctionem adiuuat, si quis cum fabæ magnitudine secundum cœnam cum melle cocto deuorauerit: modo consimili acida rustantibus propinatur. stomachicis eam manducare, & succum deuorare proderit, si postea dilutum uinum sorbeat. Datur sanguinem excreantibus, tribus obolis cum diluti uini cyatho: ischiadicis, renum & uesicæ doloribus, ex aqua: aquæ inter cutem binis drachmis ex hydromelite, si febricitant: sin aliter, ex mulso. regio morbo laborantes recreat: menses pellit, drachmæ pondere cum uino pota. aluum purgant drachmæ quatuor potæ in hydromelitis decem cyathis. facit cum melle ad tabem, & purulentam excreationem. Pariendi celeritatem affert, uterique cruciatus à frigiditate conceptos mulcet, si ex aqua calida, aut mulso duarum drachmarum pondere propinetur. Nascitur in B

DE FOLIIS CALFACIEN. IN SECVNDO. 65

A tur in pratis & muntibus mundis, & opacis, circa frutices. Colligitur mense Iunij. siccat in umbra. conseruatur per annum. Dioscorides.

AIVGA (quam Græci **CHAMÆPYTIN**, uulgus herbariorum suam **ARTHRITICAM** appellant) herba in terra repēs, subcurua: folijs semper uiui minoris, multo tenuioribus, hirsutis, & pinguioribus, circum ramos frequentibus, odore pinus: flore tenui, luteo, uel candido: radicibus cichorij.

* Expurgat, abstergitq; uiscera plus quàm calefacit. Folia septem diebus in uino pota regio morbo medentur: & quadraginia diebus ex hydromelite, ischiadicis sanant. Dantur peculiariter urinæ difficultatibus, iecinoris, & renum uitij: torminosi profunt. Ea apud Heracleam Ponticam, perinde atq; antidoto, contra aconitum utuntur, bibentes decoctum. Ad antedicta illinitur, cum polenta iure decocti subacta. Trita in farinam, & cum fico in pilulis sumpta, aluum emollit: excepta melle, cum æris squama & resina deijcit. apposita ex melle, uulua uitia extrahit: mammaram duritias discutit: uulnora glatinat: ulcera quæ serpunt, cum melle illita, cohibet. Alterum est genus aiugæ cubitalib. ramis, in anchoræ speciem incuruatis, prætenuibus: coma supradictæ, flore candido, semine nigro. hæc etiam pinum redolet. Tertia mas nominatur, paruula folijs exilibus, albis, scabris, caule aspero, cãdido: luteis flosculis, semine iuxta alas respit & hæc pinum. Hæc duæ uim superioris obtinent, sed non usque adeo efficacem. Colliguntur omnia tria genera mense

B Iunij, conseruanturq; per annum. Dioscorides.

HYPERICVM alij androsæmon, alij corion, alij chamæpytin appellant, quoniam semen odore resinam imitatur: furculaceo frutice, dodrantali, rubefcente: folio rutæ: flore luteo, leucoio simili, qui digitis attritus sanguineum succum remittit, qua ex causa androsæmō cognominatur: subhirsuta siliqua, & in rotundo oblonga, hordei magnitudine: semine intus nigro, resinosi odoris. * Vrinam cit, menstrua pellit appositum: tertianis, quartanis que cum uino potum liberat. Semen quadraginta diebus haustum, ischiadicis medetur. Folia cum semine illita, ambusta sanant. Nascitur in locis cultis & asperis. Colligitur mense Iunij: conseruatur autem per annum. Dioscorides.

HEDERA differentias multas in specie sortitur, summas autem genere tres. Nam quædam candida est, altera nigra, tertia helix. Cãdida fructum fert candidum: nigra nigrum, aut croci æmulum, quam uulgus Dionysiam uocat. Helix fructum non gignit, sed tenues habet uiticulas, & folia parua, angulosa, & rubra. * Hedera omnis acris est, & adstringens: neruos tentat. Flos trium digitorum carptu, facit ad dysentericos, in uino bis die potus: ambustis cum cerato tritus illinitur. Recentia folia ex aceto cocta, aut cruda cum pane detrita, lienes sanant. Foliorum & corymborum succus, cum irino unguento, melle aut nitro naribus infunditur: & contra ueteres capitis dolores, caput eo cum aceto & rosaceo perfundi utile est: purulentis auribus, aut
i dolentibus,

dolentibus, cum oleo medetur. Nigræ hederæ succus, aut e poti corymbi, cor-
pus infirmant, mentemque turbant largius sumpti. Acini quinque triti, calfa-
ctique in punici mali cortice cum rosaceo, si instillentur à contraria aure, do-
lorem dentium mitigant. Denigrant capillum illiti corymbi. Folia in uino
decocta illinuntur omnium ulcerum generi, etiam si cacoethe sint uitia cu-
tis in facie, & ambusta sanant, ut antea diximus, decocta. Mouent menses tri-
ti, & subditi corymbi: ijdem poti, post purgationes foeminarum, drachmæ
pondere, concipiendi spem adimunt. Pediculus foliorum melle irrigatus, ac
uulvæ inditus, menstrua & partus extrahit. Instillatus succus putrida tædia-
narium, graueolentiamque emendat, & sanitati restituit. Lacryma hederæ pfi-
lothrum est: illitu pediculus enecat. Succus radicum in aceto potus, contra
phalangia prodest. Dioscorides.

LVPVLVS seu lupus salictarius, caulibus aculeatis, longissimisque, in-
uepribus & salictis reprat, folijs uitis albæ, hispidis & nigrioribus, flore cine-
reo ac multis exilibus folliculis squammante compactili: caulis eius spinis
horret, cacuminibus tani & corrudæ modo in torulos turbinatis. Flores ha-
bet foliaceos, candicantes, qui ferè allium, uinumque suboleant. Herba præ-
fertim germen eius æqualis temperamenti est, ad frigiditatem declinantis:
flos uerò calidus in secundo, &c. * Educit bilé flauam, & mundificat sangui-
nem ab ea, & clarificat ipsum, & sedat ipsius inflammationem, & affert ei iu-
uamentum magnum infusio eius in aqua casei. Et syrupus eius remouet icte-
ritiam: confert febribus biliosis & sanguineis. Dosis infusionis in sero lactis
est circiter ℥j. Colligitur herba mense Martio & Aprili: flos mense Septem-
bri. Mesue.

MELISSOPHYLLON, Latinis Apiastrum & Citrago, Hetruscis Ce-
dronella & Melissa dicitur, uulgaris est noticiæ. Cauliculi & folia balloræ si-
milia sunt, sed maiora, tenuioraque, nec ita hirsuta: citreum malum olenta.
* Folia cum uino pota, aut illita, profunt contra ictus phalangiorum, scorpio-
numque: item aduersus canis morsum. Decocto eorundem gratia, foueri
prodest: defectionibus foeminarum ad ciundos menses conuenit: dentes eor-
dem in dolore colluuntur. dysentericis infunditur. Fungorum strangula-
tionibus folia, addito nitro, potu auxiliantur: torminibus, & orthopnoicis
delinctu. Illitu cum sale strumas discutunt, ulcera purgant: articulares do-
lores illitu sedant. Cæterum melissophylli proprium est, animum hilarem
reddere, humentis ac frigido uentriculo auxiliari, concoctionem adiuuare,
cerebri obstructions referare, deficientem animum reuocare, cordis imbe-
cillitatem roborare, eamque præsertim, qua somnus frequentius nocte in-
tercipi solet: quin & eius pulsam reprimere, animi sollicitudines fugare, ac so-
licitas imaginationes tollere, quæ tum ab atra bile, tum ab exusta pituita gi-
gnuntur. Excalefacit siccataque ordine secundo. Cor exhilarat, uitales fa-
cultates

DE FOLIIS CALFACIEN. IN SECUNDO. 67

A cultates roborat, odoris fragrantia, saporis austeritate, partiumque tenuitate. Colligitur mense Aprili, uel Maij, uel Iunij. Siccatur primò in sole, deinde in umbra. Conseruatur per annum. Dioscorides, Auicenna & Serapio.

MARRVBIUM seu Prassium, frutex est à radice ramosus, candicans, subhirsutus, quadrangularibus ramis: folium pollicem æquat, subrotundū, hispidum, rugosum, gustu amaro: semen in caulibus, & ex interuallis: flores uerticillato ambitu, asperi. * Huius folia sicca cū semine decocta in aqua, aut uiridium succus datur cum melle suspiriosis, tussientibus, & ad tabitudinem redactis. Crassam è pectore pituitam cum sicca iri eijcit. Mulieribus à partu non purgatis datur, ut menstrua & secundas extrahat: item in difficili partu, & his qui uenena hauserunt, aut à serpentibus demorsi sunt. Vesicam, renesque lædit. Folia cum melle illinuntur sordidis ulceribus purgandis: pterygia, nomasque sistunt. laterū dolores mitigant. Succus folijs contusis expressus, & sole coactus, ad eadem pollet: cum uino & melle illitus oculorum claritatem adiuuat: naribus regium morbum expurgat. aurium doloribus conuenienter instillatur per se, aut cum rosaceo. Nascitur prope ædificia, ruinas, & rudera. Colligitur mense Iunij. Seruatur per annum. Diosc.

MYRRHIS simillima est cicuta, caule, folijsque: radix ei oblonga, mollis, rotunda, odorata, cibo non insuauis. * Quæ pota in uino, phalangiorum moribus auxiliatur: cit menstrua, & partus secundos, purgatque à puerperio fœminas: subuenit & phthisicis cocta in sorbitione. Aiunt quoque eandem bis die ter uel potam ex uino, in pestilentia salutarem esse, & ne morbi contagia sentiantur, obstare. Diosc.

OCIMUM uulgò cognitum. * Id copiosiore cibo oculorū aciem hebetat, aluum mollit, spiritū mouet, urinam pellit, lac euocat: ægrè tamen conficitur. Illitum cum polline polentæ, aceto & rosaceo, pulmonum inflammationibus auxilio est. Draconis marini, & scorpionis ictibus per se prodest: & cum uino Chio, oculorum doloribus. Succus uisus caliginem abstergit: destillationes exiccat. Semen potum conuenit atram bilem gignentibus. difficili urinæ, inflatisque: naribus haustū, subinde mouet sternutamenta. quod idem herba efficit. Sed oculos premi necessum est, cum sternutamentum urget. Sunt qui in cibis abdicandum censeant: quandoquidem manducatum, & in sole positum uermiculos creat. Aphri autem adijciunt, si feriantur à scorpione, qui ocimum ederint, nullo conflictari dolore. Diosc.

PIMPINELLÆ duo habentur genera. Maior radice nititur longa: folijs circumquaque solo procumbentibus, dissectis, per ambitumque serratis: caule quadrangulati: floribus in umbellam coherētibus, tenuibus, albicantibusque. Minor caule exit rubenti: folijs minoribus, minus dissectis, minutiusque serratis. Vtraque tñ hircū redolet. Radix in qua uirtus tota consistit, excalefacit, siccaturque ordine secundo cōpleto, aut sanè tertio incipiēte. * Præstat hæc ad renū

i 2 & uelicæ

& uescæ morbos, quorū calculus est causa. Ob id enim renes à calculis ex- **A**
 pedit, & urinā remorata[m] pellit. Prodest expressus è radicib. succus ex uino
 hauustus, deleterijs medicamentis, & uenenosorū animaliu[m] morsib. Qua ra-
 tione non desunt, qui ad pestilentia[m], radicem hanc miris laudib. efferant. Est
 & alia Pimpinella, quæ ab Italis Solbastella nominatur, nullis nō cognita, ut-
 pote quæ acetarijs frequētissimè inseratur. Verūm hæc ab antedictis logè di-
 stat uirib. etsi foliorum facie satis inter se cōueniant. Siquidē ultima hæc gu-
 stata nō leuiter adstringens percipitur, & lentoris copiam præbet. Vnde faci-
 le conijcitur, eam esse adstrictoriæ facultatis. Hinc itaq; fit, ut muliebri pro-
 fluiū efficacissimè sistat: dysenteriam, & ceteros alui fluxus cohibeat: quin
 & biliosas uomitiones reprimat. Herba ipsa uulneta & ulcera sanat: misce-
 turq; unguētis, quæ tū ad capitis uulnera, tum ad carcinomata parantur. con-
 tagiosis, pestilentibusq; febribus maximè cōmendauit. Sunt qui eam Elati-
 nen esse putent. Matthioli.

PEUCEDANVM caulē emittit tenuem, gracilentū, sæniculo similē: co-
 mā habet statim ab terra copiosam, spissamq;: flore luteo: radice nigra, crassa.
 graui odore, succosa. Tenera radix cultello cōciditur, profluēsq;: è plaga suc-
 cus umbræ mandatur: in sole siquidem confestim euanescit. Colligitur capi-
 te prius & narib. rosaceo perfusis, ne capitis dolor premat, & uertigo sentia-
 tur. Assatione radix inutilis fit. Tam lac, quàm succus radice & caulib. extra- **B**
 hi solet, sicuti è mādragora: uerūm inefficacior succo lacryma habetur, & ue-
 locius expirat. Interdū etiam cōcreta inuenitur lacryma, thuris similitudine,
 caulib. radicibusq;: adhærens. Præfertur succus è Sardinia, & Samothrace,
 colore rufo, odore graui, feruens gustu. * Ex oleo & rosaceo illitum Peucedanum
 prodest lethargicis, phreniticis, uertiginosis, comitialib. & longis capi-
 tis doloribus, resolutis, ischia dicis, cōuulsis: omnib. in uniuersum uitij ner-
 uorum, ex oleo & aceto illitū, prodest. Eius olfactu respirāt uulua strāgula-
 tus, & ueternosi reuocantur. Incensum serpentes abigit. Aurium dolorib. cō-
 uenienter ex rosaceo instillatur: cauernis dentium inditum, mitigat dolo. è.
 contra tussim efficacissimè ex ouo assumitur: suspirijs, torminibus, & infla-
 tionib. subuenit. Ventrē leniter emollit, lienē absomit, difficiles partus mire
 adiuuat. Facit ad uescæ cruciatus, & renum distentiones potum: uulua ape-
 rit. Radix ad eadem utilis est, sed inefficacior: eius decoctum bibitur. Farina
 eius, sordida ulcera purgat, & uetera cicatrice obducit: squamas ossiū extra-
 hit. In cerata & calfacientia malagmata additur. Radix eligi debet recēs, quæ
 cariem non fenserit, firma, odoris plena. Succus ad potiones amaric amygda-
 lis, aut ruta, aut pane calido, aut anetho resoluitur. Gignitur in montib. opa-
 cis. Colligitur mense Septembri. Dioscorides.

ROSMARINVM, quo coronarij utuntur, ramos mittit tenues, & circa
 eos folia minuta, densa, longa, exilia, subter incaua, supernè uirētia, grauiter
 odorata.

DE FOLIIS CALEFACIEN. IN SECVNDO. 69

A odorata. * Excalfactoria uir præditum est. Regium morbum sanat, si decoctum in aqua, ante exercitationes bibatur: & ubi laboras exercitationi se crediderit, in balnea descendat, & merum potet. Acopis, gleucinoq; unguento admisceri solet. Flores fert bis in anno, uere scilicet & autumno. Colligitur a mense Maio usq; in autumnum. Conseruatur per annum. Dioscorides.

SALVIA, siue eleliphacon, frutex est ramosus, longus, uirgas habens quadrangulas, & canas: folia mali cotonei effigie, sed longiora, asperiora, crassiora, & quæ sensim attritarum quasi uestium scabritiæ referant, hirsuta, subalbida, perquam iucundo odore, sed graui: semen summis in caulibus syluestri hormino simile gerit. * Menses cit, & urinas decoctum foliorum, ramorumq; potum, & partus extrahit, & paltinacæ marinæ ictibus auxiliatur. Capillos denigrat, uulnerum sanguinem cohibet, tetra ulcera purgat. Testium pruritus sedant rami foliaq; si eorum decocto cum uino foueantur. Nascitur in locis asperis, incultis montibus, & ubiq; in hortis. Colligitur mense Iunij & Iulij, cum profert flores. Conseruatur per annum. Dioscorides.

SCABIOSA constat folijs laciniatis, subhirsutis: caulibus tenuibus, cubitali altitudine, atq; etiam maiore: in quorum cacumine flores emicant in cæruleo albicantes. * Pollet aduersus scabiem, decoctum potatum. Prodest omnibus pectoris uitijs, & respirationi inseruientibus organis: siquidem eorum inflammationes purulentas dissicit, & omnia pectoris excrementa expurgat. Anthracibus, siue carbuculis pestiferis utiliter illinitur: adeo utilitas hostethales abscessus trium horarum spacio prorsus abolere existimetur. Nascitur in campestribus, & pratis. Colligitur mense Iunij. Seruatur per annum. Matthiolus.

SCORDIUM planta chamædry similis, hodie cognita. Huius in medicina usus esse debet, non allij syluestris. * Herba uim excalfactoriã habet: urinã cit. Cocta recens, arida uero cum uino, aduersus uenenatos serpentium morsus bibitur: ad stomachi quoq; rosiones, dysenteriã, & urinæ difficultatem, binis drachmis cum hydromelite: crassamen purulentum pectore expellit. Facit aridæ farina ad ueterẽ tussim, rupta, conuulsa, si cum nasturtio, melle, & resina misceatur in eclegmate. Inflammata modicè præcordia, cerato excepta, recreat: cum aceto acris, aut aqua, podagris conuenienter illinitur: menses imposita mouet, uulnera conglutinat, uetera ulcera purgat, & ex melle cicatricem perducit. Siccas excrementas in carne cohibet. Succus ad eadem uitia bibitur. Inter prima efficax. Ponticum natione, Creticumq;. Nascitur in montibus & palustribus. Conseruatur per annum. Dioscorides.

STORCHAS, iuxta Galliã in insulis eiusdem nominis eregiõnẽ Mafsi-liã gignitur & in Arabia. Herba tenuibus furculis, coma thymi, longiore folio, subamara gustu, & aliquantum acris. * Cuius decoctum, hyssopi modo, ad pectoris uitia efficax est. Antidotis utiliter miscetur. Viscera omnia, & uersum.

uersum animatis habitū extenuat, cōfirmat, & ab obstructionib. & infarctu li
berat. Decoctionis eius potio est ab ʒ v usq; ad ʒ vij: & pulueris eius à ʒ iij usq;
ad v. Prefertur Arabica. Cōseruatur p annū, uel annos duos, Diosc. & Mesue.

PARTHENIUM folio est coriandri, amaro sapore, odore graui: flori-
bus per ambitum albis, intus melinis. Hetrusci matricariam uocant. Sicca-
tum cum aceto mulso, aut sale potum, non secus atq; epithimum, & bilem,
& pituitam detrahit: suspiriosis prodest, & melancholicis. Herba sine flore à
calculosis & anhelatoribus magna utilitate bibitur. Valet decoctum ad insi-
dendum in duritia uuluarum, & inflammationibus. Illinitur sacro igni, & col-
lectionibus cum flore. Nec desunt, qui uelint mas Parthenium appellare A-
thanasiam, quā & Tanacetum uocāt seplasiarij. * Utuntur tanaceto recentio-
res ad uentriculi & alui status discutiendos, item ad lumbricos ex uētre pel-
lentos. Utuntur & ad frangendos renum calculos, & ad ciendā urinā. Sed id
uiris magis, quā mulieribus commendāt: contrā uerò Matricariā dictā fœ-
minis tantū exhibendā præcipiunt. Nascuntur ambo in omnibus ferè hor-
tis: neque modò in ijs sata, sed in alijs quoque locis spontè proueniunt. Colli-
guntur mense Iunij. Conseruantur per annū. Dioscorides & Matthiolus.

De herbis seu folijs calidis, in gradu tertio.

ABROTANVM duorum est generum. Fœmina quadam arboris specie
fruticans, candicat, circum ramulos folijs, seriphi modo, minutim incisis: flo-
ribus referta est, comatibus in summo, fulgore auri, corymbis, quod per æsta-
tem prodijt, suauiter olet. cū grauitate quadam, & amaro gustu. Alterū mas
uocatus, sarmentosum gracilibus ramulis, uti absynthiū. * Vtriusq; semē cru-
dum tritū, & feruefactum ex aqua, in potu auxiliatur orthopnoicis, conuul-
sis, ruptis coxendicibus, urinæ angustijs, mēsis suppressis, aut remorati-
bus. In uino potum exitialium uenenorum antidotum est: horroribus ex o-
leo illinitur. Serpentes & substratu, & nidore fugat: contra ictus eorum cum
uino potum prodest, priuatim efficax contra scorpionum & phalangiorum
uenena. Oculorum inflammationibus commodè illinitur cū cotoneo cocto,
aut pane tritum cum farina hordeacea, decoctumq; tubercula discutit. Irini
compositionibus admiscetur. Nascuntur ambo in hortis & cāpestribus. Col-
liguntur mense Iunij: conseruantur autem per annum. Dioscorides.

ASARVM, quod & ipsum aliqui syluestre nardum appellant, hederæ fo-
lijs, minoribus multò, rotundioribusq;: floribus cytino hyoscyami similibus,
purpureis, inter folia proximè radicem emicantibus, odoratis: in quibus se-
mē acinosum. Cauliculos habet angulosos, asperos & molles: radices nume-
rosas, geniculatas, tenues, obliquas, gramine nō dissimiles, longè tamen gra-
ciliores, odoratas, exalfacientes, & quæ linguā uehementè mordēt. * Excal-
factoriā uim habet: urinā cit: hydropicis, & uetusto coxendicum dolori pro-
dest. Radices senis drachmis ex aqua mulsa potæ, menses trahunt, & ueratri
albi

A albi modo purgant. In unguenta additur. Umbrosis motibus prouenit: sed plurimū in Pōto, Phrygia, Ilyrico, & Italia Iustiniensi agro. Cōseruatur aut per annum. Dosis eius in infusionis est ab aur. ij usq; ad aur. iij. & pulueris eius a ʒ j usque ad aur. ij. Dioscorides & Mesue.

VITEX, siue salix Amerina, quā uulgus Herbariorum Agnū castū appellat, frutex est in arborem assurgēs: ramos gerit lōgos, fractu perueices: folia oliuę, sed molliora. Duo genera eius: una harū albū florē mittit cū purpureo: altera tātūm purpureū, & semē, ut piper. * Excalfactorias uires habet, & alitricorias. Semē eius potū, uenenatis icēibus, aquę quę curem subiit, lienosis q; auxiliatur: lac euocat: mēses ciet, drachmā pōdere in uino potū: genituram exoluit: caput tētat, & foporē affert. Decoctū herbę & seminis in defefsione, mulieribus uuluę malo opportunis opitulatur: itē inflāmationibus. Purgationes mouet semē cū pulegio potū, etiā suffitu uel appositu: capitis dolorem dissoluit illitū: instillatur cū aceto & oleo capiti in lethargo, & phrenitide. Folia suffitu aut substratu fugāt uenenata: illita quoq; serpentiū moribus auxiliantur: testiu duritias, cū butyro & folijs uitiū emolliunt. Rimas sedis semē cum aqua illitū mitigat: & cū folijs medetur luxatis, uulneribus q;. Virgā quā manu teneat, dum iter facit, negatur intertriginē sentire. Agnū quasi dicas castum, uocant Græci: quoniā matronę in Thesmophorijs Atheniensiu castitatem custodientes, folijs huius cubitus sibi ternūt. & lygon, quasi uimē, propter inuictā ferē ramorū flexilitatem. Nascitur in fluminum ripis, asperisq; locis, ac torrentium alueis. Dioscorides:

ARVM, apud Syros lupha uocitatū, folia emittit dracūculi, sed lōgiora, & paucioribus distincta maculis: caulē subpurpureū, dodratalē, pistilli specie, a quo croceū semē exit: radice dracunculi alba, quę decocta estur, utpote cū minus acris sit. Folia ad esum cōdiuntur, & arida per se, decocta manduntur. Arum terrena essentia constat, sed calida: * proinde extergendi uim possidet, uerūm non ualentem, sicut dracontiu. Radices eius maximē sunt utiles: siquidē comēs crassitiem humorum mediocriter incidunt, adeo ut & excretionibus expectore idoneę sint: sed magis tamen aptū est dracontiu. Nascitur in capestribus, in uineis, in scrobiū marginibus, & passim in semitis, ppe sepes. Cōseruatur per annum, præsertim radix. Dioscorides & Galenus.

AMOMVM exiguē fruticat, ex ligno se cōuoluēs in racemi modū: flore, ceu cādidę uiolę, paruo: folijs bryonię similib. Laudatur q; maximē Armenia cū, colore ad aurū uergens, ligno subrufo, abundē odorato. Medicū, quoniā in capestribus & aquosis enascitur, infirmius esse cōstat: est aut magnū, subuicide, taētū tenerū, frutice uenoso, odore origani. Ponticum uerō subrufum, paruum, fragile, racemosum, fructu turgens, & odore nares feriens. Deligito recens, candidum, uel subrubrum, quod nec alitricum cohæreat, nec conuoluatur; sed solutum diffundatur: semine plenum, uuis simile, graue, ualde.

ualde odoratum: modò cariem nò contraxerit, acre, gustu mordens, simplici **A**
 colore non euariante. * Vim habet calfaciendi, adstringendi, exiccãdi. Som-
 num allicit: & illitum fronti, doloris sensum aufert: inflàmationes & melice-
 ridas concoquit, discutitq̃: iuuat quos scorpius percussit, ex ocimo illitum:
 & podagricis confert: inflàmationes oculorum, uiscerumq̃: lenit ex uua pas-
 sa: ad uuluarum uitia in pelsis, aut in sefsionibus utile est. Decoctum iecinori,
 renibus, podagræ, potu conuenit. Antidotis immiscetur, & preciosissimis
 unguentis. Adulteratur Amomum herba simili, quæ Amomis uocatur, sed
 sine odore, sine fructu. Nascitur in Armenia, flore origani. Quare in huiusmo-
 di rerum probationibus fragmenta fugienda sunt: eligenda autem, quæ ab
 una radice suos integros surculos emittunt. Planta hæc apud nos incognita
 est. Quare succedaneum erit. asarum, aut calamus aromaticus officinarum.
 Dioscorides.

AMMI hodie à nonnullis ostenditur folijs sceniculo tenuioribus, caule
 gracili, umbella, in qua candidi flores & semen minutissimum, cumino simi-
 lis, non per omnia respondens ueterum descriptioni. Plerique existimât se-
 men quoddam ex Hispanijs sub amomi nomine allatum, uerum esse Ammi,
 aut saltè eius loco usurpari posse. Huius succedaneum est anisum, cuminũ.
 Florentini.

BACCHARIS herba fruticosa, quæ in coronas additur. cuius folia aspe- **B**
 ra sunt, media uiolæ & uerbasci magnitudine: caulis angulosus, cubiti altitu-
 dinem petens, aliquantulum asper, non sine appendicibus adnatis: flore pur-
 pureo, subalbicãte, odorato: radicibus ueratro nigro similibus, quibus odor
 inest cinnamomo proximus. Asperum squalidumq̃: solum amat. * Radix in
 aqua decocta, ruptis, uulsis, ex alto præcipitatis, spirãdi difficultati, salutaris:
 item diurnæ tussis, & urinæ difficili: menses pellit: contra serpentium mor-
 sus utilissimè datur in uino. Recens radix apposita partum extrahit. Puerpe-
 ris eius decoctum in defefsionibus prodest. In diapasmata utiliter inseritur
 iucundi odoris gratia. Folia, utpote quæ astringant, capitis doloribus illitu
 profunt: oculorum inflàmationibus, mammis tumentibus à partu, ægilo-
 pijs incipientibus, ignibusq̃e sacris auxiliantur. Odor somnum gignit.
 Dioscorides.

DICTAMNUM, herba est in sola Creta nascens, pulegio similis, sed ma-
 ioribus folijs, cana lanugine pubescentibus. Florem nullum aut semen pro-
 fert, inquit Dioscorides. Theophrastus uerò ceteriq̃: authores & caulem
 illi tribuunt, & florem & semen, ut manifestè uidere licet in dictamno, quod
 hodie ex Creta adfertur: cui quidem conueniunt reliquæ Diofc. notæ, sed
 florem & semen profert. Alia est planta, dictamnũ album uulgò uocata, aliàs
 fraxinella, planè à dictamno Cretensi diuersa: quæ quamuis ualde efficax sit,
 dictamno Cretensi substituitamè non potest: hoc enim ueteres intelligunt,
 cum

A cum absolutè dictamnum scribunt. * Cæterùm dictamnum legitimum præstat omnia, quæ fatiuum pulegiū, sed efficacius multò: nā non potum modò, sed appositum quoq; aut suffitum, defunctos partus eijcit. Produunt in Creta capras sagittis percussas, huius herbe partu eas excutere. Purgādi uim habet succus illitus, aut cū polenta tritus. Herba impactos pedibus, reliquoūe corpori aculeos, illitu refigit. Ad lienis dolorē efficax habetur: siquidem ipsum imminuit. Metunt æstate & autumno. Radix eius gustu calfacit: partus accerelat. Succus cū uino potus, cōtra serpentiū morsus præsidio est. Tanta herbe facultas est, ut olfacta abigat bestias, quæ uenenato ictu sequiant, appēsaq; contracta exanimet. Vulneribus ferro illatis, & uenenatis morsibus infusus succus, præsentaneo est remedio, si etiā ab instillatione statim in potu assumatur. Huius succedaneum pulegium est. Dioscorides & Medici Florentini.

CARYOPHYLLATA planta est non uulgaris, gignitur in montibus, & in uijs iuxta septa. Radix tenuis, nigra, & caryophylli spirās odorem. * Ea recentiores utuntur pota ad thoracis interna uulnera. Quin & eius succum admixta æruginè cuniculosis, contumacibusq; ulceribus utiliter iniiciunt. Eadem olfactu spiritus recreat, & frigidum roborat cerebrū. Epota prodest cæliacis, dysentericis, fœminarum profluuijs, & cruenta exuentibus. Tam intus sumpta, quàm foris illita enterocelis auxilio est. Temperamētum eius

B excalfaciens & exiccās, ut manifesto sunt indicio eius radices: quippe quæ gustu odoratæ, astringentesq; deprehendantur. Quibus qualitatibus nō modò attenuare, discutere, & adstringere ualent, sed etiam roborare. Colligitur mense Martij & Augusti. Conseruatur per annum. Matthiolus.

CHAMÆDRYS Græcis, alijs Chamædrops, Latinis Trissago dicitur. Sunt qui eam teucrion appellauere, propter eā, quā cum teucrion seruat similitudinem. Frutex est dodrantalis, folia habens exigua, amara, effigie & diuisura quercus: flore paruo, penè purpureo. * Recens in aqua decocta, potu tussibus, indurato lienī, urinæ difficultati, incipientibus hydropicis, auxiliatur: cit menses, partus extrahit: lienem ex aceto pota consumit: aduersus serpentium uenena ex uino, potu, illituq; efficacissima. Trita digeritur in pastillos, ad supradicta. Purgat uetera ulcera, cū melle: cum oleo illita, caliginē oculorum discutit. Natura eius est calfacere. Nascitur in petrosis & asperis. Colligitur mense Iunij, semine prægnās. Cōseruatur per annū. Dioscorides.

CNICVS, officinis **CARTAMVM** uocatur. folijs constat oblongis, per ambitum diuisis, asperis, spinosis: caule sesquipedali: capitulo magnitudine grandis oliuæ: flore croci: semine candido, alioqui rufo, longo, anguloso. Huius flore in obsonijs utuntur. * Seminis tussis & expressi succus, cū aqua mulsæ uel iare gallinacii, aluū purgat: sed stomacho aduersatur. Seminis succus lac cogit, & magis ipsum resoluendæ alui facultate donat. Dosis eius est à ʒ iij usque ad aur. v: & floris eius à ʒ j usque ad aur. ij. Conseruatur aut, & ma-

k ximè

ximè semen, annis tribus. Dioscorides, & Saladinus.

CENTAVRIVM MALVS, folia iuglandis habet, oblonga, viridi brassicarum colore, in ambitu ferrata caulem ceu rumicis, binum aut ternum cubitorum, multis ab radice adnatis, in quibus capita ceu papaveris, in rotunditate oblonga, flos ex cœruleo candicans, cyanio flori perquam similis, utrum maior: semen in floribus compactum, quale in floribus in pappos evanescentibus esse solet: radix crassa, grauis, sesquicubitum longa, rubescens, succo prægnans rubescens, & cum adstrictione quadam & dulcedine, aeri. Huius radix sub rhapontici nomine officinis notissima est. * Radix (que in usu est) conuenit ruptis, conuulsis, pleuriticis, spirandi difficultati, ueteribus: si sanguinem expuentibus, drachmis duabus trita datur, si febris sit, in aqua: cæteris in uino: item ad tormina, & uulua dolores. Ramenta eius in collyrij formam uulua subdita, menses atque partus extrahunt. Succus eadem præstat. Vulneribus prodest: nam recens tusa, aut arida antè madefacta, ea glutinat & coniungit. Carnes coalescunt, si tata simul decoquatur. In Lycia succum exprimunt, quo pro lycio utuntur. Amat solum pingue, & apricum, ac syluas & colles. Colligitur in principio ætatis. Conseruatur per annum. Dioscorides.

CENTAVRIVM MINVS, origano aut hyperico simile, caule anguloso, palmum excedente: flore lychnidis, è puniceo in purpuram uergente: folijs rutæ, prælongis & paruis: fructu tritico simili: radice pusilla, læui, & superuacua, quæ gustanti amaritudinè adfert. Amat loca rigua. Colligitur mense Iunij. Conseruatur autem per annum. * Herba recens tusa suo illitu uulnera conglutinat: uetera ulcera purgat & cicatrice obducit. Bilem crassosq; humores per aluum exigit, si decocta deuoretur. Ius decocti ischiadicis conuenientissimè infunditur: trahit enim sanguinem, & dolorem leuat. Succus oculorum medicamentis perquam utilis: siquidem cum melle caliginem oculorum expurgat. in uellere appositus, menses & partus extrahit: epotus peculiariter neruorum uitij succurrit. Dosis est à tertia parte drachmæ unius usque ad 3 j. Et in decoctionibus à drachma una usque ad 3 iij. Dioscorides.

CHELIDONIUM MALVS, caule est gracili, cubitali, aut altiore, agnatis foliosis: folijs ranunculi, mollioribus tamen, & colore cæsijs: flore uiolæ albæ secundum singula folia prodeunte. In eo succus croci, mordax, acris, & aliquantulum subamarus, grauiter olens. Radix supernè singularis, infernè in multa crocea capillamenta fibratur. Siliqua, ceu corniculari papaueris, tenuis, in metæ figuram longa: in qua semen papauere maius recluditur. Nascitur prope sepes, in scrobium ripis, secus uias, inter rudera, & in ædificiorum ruinis seu parietinis. Colligitur in principio ætatis. Conseruatur autem per annum. * Succus in æreo uase, cum melle prunis decoctus, oculis

A oculis claritatem adfert. Folijs, caule, radice, succus exprimitur ineunte æstate, & siccatus in umbra digeritur in pastillos. Radix cum aniso & uino albo pota, medetur regio morbo, & ulceribus quæ serpunt: imposita cum uino, aut manducata, dentium dolorem sedat. Hoc nomen uidetur sibi uendicasse, quòd aduentu hirundinum exoriatur, & discessu emarcescat. Sunt qui narrant, hirundines matres excæcatis pullis, admota herba, uisum restituere. Dioscorides.

CALAMINTHAE tres sunt species: una montibus familiaris, folia ocimi habens, incana: surculos & caules angulosos, purpureum florem. Altera pulegio similis est, sed maior: quam syluestre pulegium ideo appellarunt, quòd odore ipsum æmuletur. nepetam Latini uocant. Tertia mentastro cognata est, folijs oblongioribus, caule & ramis maioribus, quàm superiora, sed uiribus inefficior. Omnium folia gustu impensè feruentia, & acria: radix superuacua. Ex calaminthæ generibus frequentior est usus, quæ Latinis Nepeta uocatur. Nascitur in cæpestribus, asperis, & aquosis. Colligitur mense Iunij & Iulij. Conseruatur per annum. * Potu aut illitu demorsis à serpente opitulatur. Decoctum potu, menses & urinas expellit: ruptis, conuulsis, orthopnoæ, torminibus, cholericis, horroribusque auxiliatur: regium morbum expurgat. Præsumpta in uino uenenis resistit: tineas, cæterasque interaneorum animalia cum sale & melle pota, enecat: nec fecus cocta, crudæque, si teratur Elephanticos esitata adiuuat, si postea serum lactis ebibatur. Folia detrita si in uellere subijciantur, menses extrahunt, & partus enecant: accensa, aut substrata, serpentes fugant: nigris cicatricibus candorem reddunt in uino cocta & illita: sugillata tollunt. Calamintha ischiadicis imponitur, ut ex alto humores euocet, summam cutem exurens. Vermes necat succus auribus instillatus. Dioscorides.

B raneorum animalia cum sale & melle pota, enecat: nec fecus cocta, crudæque, si teratur Elephanticos esitata adiuuat, si postea serum lactis ebibatur. Folia detrita si in uellere subijciantur, menses extrahunt, & partus enecant: accensa, aut substrata, serpentes fugant: nigris cicatricibus candorem reddunt in uino cocta & illita: sugillata tollunt. Calamintha ischiadicis imponitur, ut ex alto humores euocet, summam cutem exurens. Vermes necat succus auribus instillatus. Dioscorides.

CONYZAE tria genera sunt: maior, minor, & media. Maior uulgò pulicaria dicitur, frutice altior, & folijs latioribus quàm minor, graui odore. Minor odore præstantior est. Vtriusque folia oliuæ similia, hirsuta, pingua. in maiore caulis binum cubitorum altitudine attollitur: in minore pedem æquat. flos fragilis, lutei coloris, qui in pappum abit. radices superuacuae. Nascuntur passim. Media conyza, caule crassiore ac molliore: folijs mediæ inter maiorem & minorem amplitudinis: minimè pinguis, multo tamen grauioris odoris, & iucundioris, sed inefficior. Prouenit locis humentibus. Priora duo genera eliguntur. * Suffitu, substratuque frutex totus serpentes fugat, culices abigit, & pulices necat. Folia conuenienter illinuntur serpentium plagis, & tuberculis ac uulneribus. Flores & folia cum uino ad menses, partusque eijciendos bibuntur: item contra urinæ stillicidia, arquatam morbum, & tormina: comitiales pota ex aceto adiunant. Decoctum in defelsionibus medetur uulux malis. Impositus succus abortum facit.

Herba ex oleo efficaciter horribus oblinitur. Capitis dolores tenuis illita **A**
fanat. Dioscorides.

FOENICVLVM omnibus notum est. Nascitur passim in hortis. Colli-
gitur caule turgescente. Florescit mense Iunij & Iulij. Seritur Februario men-
se, locis apricis & modicè saxosis. * Si herba edatur, aut semen cū ptisana bi-
batur, mammas lacte replet. Comæ decoctum in renum doloribus subditū
proficit, quippe quòd urinam excitet. Contra serpentium ictus in uino con-
uenienter bibitur: menses ciet: in febribus nauseam, & stomachi feruorem ex
aqua frigida potum sedat. Contritæ radices, & cum melle illitæ, moribus ca-
num medentur. Succus caule & folijs exprimitur, & in sole siccatus, in medi-
camenta adijcitur, quæ ad excitandam oculorum aciem commodè temper-
antur. Extrahitur succus ad eadem ualens, etiam semine uiridi, ramulis q̄;
& radicibus prima germinatione incisis. In Iberia, quæ ad Occidentem spe-
ctat, succum reddit gummi similem. Caulem medium, dum herba floret, ru-
stici demetunt, igniq̄; admouent, quòd facilius ui caloris exudans, gummi re-
mittat: quod efficacius succo est, ad medicamenta oculorū. Dioscorides.

IUNIPERI genera duo: altera maior, altera minor. utraque acris est.
Nascitur in montibus, locis maritimis & incultis. Colligitur & maximè
fructus in autumnò. * Excalfacit, & urinam mouet: accensa serpentes fugat.
Baccarum nonnullæ nucis iuglandis magnitudine nonnunquam grâdelce- **B**
re, aliæ nucem Ponticam æquare inueniuntur, rotundæ, odoratæ, in mādē-
do dulces, subamaræ, quæ arceuthides etiam, id est, baccæ iuniperi, nomi-
nantur. Modicè calfaciunt & astringunt. stomacho utiles: contra pectoris ui-
tia, tussim, inflationes, tormina, & serpentium ictus efficacissimè bibuntur:
urinam ciet. unde ruptis, conuulsis, & uulnæ strangulatui subueniunt. Fo-
lia acrimoniam habent: ideo tā ipsam, quàm eorum succū ex uino contra ni-
perarum morsus illini aut bibi prodest. Corticis cinis cū aqua illitus, lepras
eximit. Dioscorides.

HELENIVM folia habet uerbasci angustioris folij asperiora, oblonga:
caulem quibusdam in locis non emittit: radicem subalbidam, interdū sub-
rufam, odoratam, subacrem, uegetam, magnam: ex qua agnatæ propagines
liliorum, aut ari modo feruntur. Mōtanis, umbrosis, & siccis locis prouenit.
Foditur æstate radix, particulatim q̄; dissecta siccatur. * Potum radice deco-
ctum menses & urinas ciet. Ipsa q̄; in eclegmate ex melle prodest tussi, or-
thopnoæ, ruptis, conuulsis, inflationibus, & serpentium moribus. In sum-
ma, excalfaciens est. Folia eius ex uino costā utiliter ischiadicis illinūtur. He-
lenij radix & stomacho utilis est in passo condita: siquidem salgamarij pau-
lulum siccata eam, mox decoctam, & frigida aqua in adfectam, in sapam
conijciunt, & ad usus recondunt. Trita, potaque ad cruentas excreationes
efficax est. Alterum Helenij genus in Aegypto gigni Crateuas tradit. Herba
est

A est cubitalibus ramulis, serpylli modo per humum repentibus: folijs lenticulæ circa ramos, sed longioribus, crebrisq̄: radice pallida, digiti minoris crassitudine, per ima tenui, supernè crassiore, cortice nigro. Nascitur in maritimis, collibusq̄. Radix una in uino epota, contra serpentium ictus auxiliatur. Dioscorides.

HYS SOPVM Græcorum herba est, folijs & floribus origano similibus, hodie incognitum. Hyssopum Mesuæ domesticū, est hyssopū uulgare, quod in hortis colitur. Syluestre nascitur in mōtib, thymumq̄ue uulgare est. Vtrūque thymbræ species est, & hyssopo subltitui potest, præsertim syluestre, thymum dictum. Colligitur mense Iunij. Conseruatur per annum. * Vim habet extenuandi & calfaciendi. Decoctum cum ficis, aqua, melle & ruta, potumq̄ue peripneumonicis, diuturnæ tussi, suspiriosis, destillationibus, & orthopnoicis auxiliatur: tineas enecat. Idem facit, si cū melle delingatur, crassum humorem per aluum extrahit, decoctum ex aceto mulso epotū. Ad subducendam aluum cum ficis uiridibus detritis manditur: uehementiusq̄ue addita iri, cardamomo, aut irione, deijcit: colorem in corpore fouet. Lienis & aquæ inter cutem, cum fico nitroq̄ue, inflammationibus quoque ex uino illinitur: cum feruente aqua impositum, fugillata discutit. cum decocto ficorū optimè anginis gargarizatur. Decoctum cum aceto dētium dolorem in col-

B lutione sedat: inflationes auricularum uaporis suffitu discutit. Dosis eius decoctionis est à ʒ v usque ad ʒ x: & pulueris eius à ʒ ij usque ad ʒ β. Dioscorides & Saladinus.

LAVRVS quædam tenui folio constar, altera latiore. * Vtraque excalfactoriam naturam habet, & emollientem. Vnde decoctum earū in muliebres infessus additum, uulvæ & uescicæ uitij conuenit. Virentia folia sensim substringunt: illita quoque ac trita, uesparum apiumq̄ue ictibus opitulatur: eadem cum polenta & pane illita inflammationem omnem mitigant: sed pota stomachum effundunt, & uomitiones mouent. Lauri baccæ magis quàm folia calfaciunt. Ergo in eclegmate tritæ cum melle & passo, profunt tabi, orthopnoæ, & omnibus thoracis rheumatismis: contra scorpionū ictus ex uino bibuntur: uirilignes emaculant. Succus baccarum utilissimè aurium dolori & grauitati instillatur cum uino uetere, & rosaceo. In medicamenta aut adijciuntur, quæ neruorum lassitudines reficiūt, acopa uocant: & ad unguenta, quæ calfaciūt & discutunt. Cortex radicis calculos rumpit, partus necat, hepaticis prodest, tribus obolis in uino odorato potus. Diosc.

MAIORANA, Amaraucus, Sampsuchus, herba est ramosa, per terram repens: folijs eius calaminthæ, quæ tenui folio constar, hirsutis & rotūdis. suauissimū odorem spirat: ideo coronis inferitur. Nascitur passim in hortis. Colligitur mense Aprilis & Maij. Conseruatur autem per annū. * Vis eius excalfaciens. Succus decocti porus, conuenit incipientib. hydropticis, & ijs quos

k 3 urinæ

urinæ difficultas, aut tormina excruciant. Illita ex melle arida folia, sugillata **A**
tollunt: menses subdita in pefso trahunt: contra fcorpionis ic̄tum ex aceto &
fale illinuntur: laxatis, tumoribusq; cerato excepta, imponuntur: aduerfus
oculorum inflammationes, cum polline polentæ, illini prodeft. Acopis, ma-
lagmatisq; calefaciendi gratia commifcetur. Diotcorides.

MENTHA cognita herba eft. Nafcitur pafsim in hortis. Colligitur men-
fe Aprili uel Maij. Siccat in umbra. Conferuatur per annum. * Calfaciēdi,
adltringendi, atq; exiccandi uim habet. Siftit fanguinem, potio ex aceto fuc-
co: tineas in uētre teretes enecat: uenerem ftimulat. Singultus, uomitiones,
cholerasq; fedant terni ramuli cum acidi granati fucco poti. Suppurationes
difcutit, fi cum polenta illinatur. Imposita fronti capitis dolores mulcet: mā-
mas, fi tendantur, aut lafte turgeant compescit: cum fale canum morfibus il-
linitur: aurium doloribus cum aqua multa subuenit: uulua ante coitum ad-
mota conceptioni refiftit: linguæ feabritiem confriēta læuigat. Lac coire, de
fariq; in cafeū non patitur, fi folia potionibus lactis immergantur. In summa
ftomacho utilis eft, & in condimentis peculiarem gratiam habet. Sylueftre
mentha (Latini mentatrum uocant) hirsutiore eit folio, & profus maiore,
q̄ fisymbrij grauiori odore. quare minus ad fanorum ufus expetitur. Diofc.

NIGELLA, Gith, Melanthium, exilibus furculis fruticat, læpe binos do-
drantes excedens: folijs, ut fenecionis minutis, fed multò tenuiorib. capitu- **B**
lo in cacumine tenui, paruo, ceu papaueris, oblōgo, intercurfantib. intus mē
branis: quibus femē includitur nigrū, acre, odoratum, quod panib. infpergi-
tur. Nafcitur in hortis & uiridarijs. Colligitur mense Iulij. * Capitis dolorib.
illitum fronti, subuenit. difcutit recentes oculorum fuffufiones, tritū ex iri-
no, & infufum narib. tollit lepras, lentigines, duritias, tumoresq; uetuftos, cū
aceto illitum: circumfcarificatos clanos excutit, cū uetere urina impositum.
dentium doloribus, cum aceto & teda decoctum & collutum prodeft. Tere-
tes uentris tineas expellit, peruncto ex aqua umbilico. Destillatione laborā-
tes adiuuat, tritum in linteo, & olfactum. Vrinā & menftrua ciet, multis die-
bus fumptū, & lac extrahit: difficultatē spirandi cum uino potum, leuat: pha-
langiorum morfibus ex aqua, drachmæ pondere, haufum auxiliatur. In cen-
fo serpentes fugantur. Tradunt largius epotum enecare. Diofc.

OENANTHAE folia habet pattinacę: florem candidum: caulē craffum,
palmi altitudine: femē atriplicis: radicē magnam, in multa rotunda capitula
extuberantē. Nafcitur in petris. * Huius fermen, caulis, & folia cū multo uino
pota, fecundas eijciunt. Radix è uino urinæ ftillicidio conuenit. Diofc.

ORIGANVM trium eft generum: heracleoticum, onitis, & fylueftre. He-
racleoticum folium habet hyffopo non diffimile: umbellam aut non in rotā
fpeciē orbiculatam, fed ueluti multifidā: femine in fummis uirgis haud qua-
quā denfo. Onitis cādidiore eft folio, & hyffopo fimilior. Semē ueluti cōiun-
ctos co-

A flos corymbos habet. Sylvestre uerò origanum aliqui Panaces Heraclion, alij cunilam uocât: folijs est origani: ramulis tenuib. dodrantem altis: in quibus umbellæ anethi insunt, flores candidi: radix tenuis, superuacua. Horum postremum in maritimis nascitur: reliqua duo cognita quidem sunt, sed rara. Tragoiganum est incognitū. Quod hodie in usu est, ad nullū origani genus referri potest: primū quod in maritimis nascatur, ubi dontaxat cætera crescunt origana: deinde quod gustatum, linguam non uellicat, ut reliqua origana. Adulterinū igitur erit origanum, quia reliquis notis ita cum origano conuenit, ut gustu solo ferè distingui possit. Danda est opera, ut legitimū habeatur, atq; hoc reiiciendum. Verū hodie ex Creta copiosè Venetias adfertur. * Cæterū origanum exalfacit: unde decoctum cum uino potum de morsu à serpente conuenit: qui aut cicutam, aut meconium hauserunt, ijs expulso: si uerò gypsum, aut ephemeron, ex aceto mulso propinatur. ruptis, cœuulis, hydropicis cum fico esui datur. Aridū acetabuli mēsurā potū in aqua mulsā, atros humores per aluū extrahit: mēses ciet, & tussi cū melle linctum medetur. Ad pruriginem, psoras, regiūq; morbum, decocti ius in balneis prodest. Succus uirentis, tonsillas, uuam, & oris ulcera sanat, & per nares ex oleo irino infusum trahit. Diosc. & Medici Florentini.

B **PBRICLIMENON** simplex fruticat, ex interuallis parua folia habens, ipsum amplectentia subcandida, hederacea: inter folia surculi exeūt, in quibus baccæ hederæ similes. flos fabæ, candidus, aliquantū rotundus, & quasi in folium procumbens: fomen durum, & quod difficilè euellatur: radice rotunda, crassa. Nascitur in aruis ac sepibus, conuoluēs se adminiculis propter absidentibus. * Semen eius postquam ematuruit collectum, & in umbra siccatum si drachmæ pondere detur in uino, quadragenis diebus, lienem absument, lassitudinem discutit: sed urinam ciet, statim à sexto die cruentā. orthopnœæ & singultui prodest: partum accelerat. Folia sunt eisdem uirib. prædita: quæ tricenis septenis diebus epota, sterilitatem facere produntur: perunctis ex oleo, febrium algores abigunt. Diosc.

PETROSELINVM hortis omnibus frequentissimum est: * urinam ciet & menstrua: contra stomachi & coli inflationes, & tormina prodest. Laterū, renū & uesicæ doloribus, in potu subuenit. Admiscetur antidotis urinam cientibus Dioscorides.

PTARMICA exiguus frutex est, surculos habēs paruos, multos, & rotundos, abrotano non dissimiles: & circa eos folia oleæ, longa, multa: & in cacamine capitulum, uti anthemidis, paruum, rotundum. * quod suo acri odore sternutamentum excitat: unde nomen accepit. Nascitur in montibus & petrosis. Folia cum floribus illita, fugillationes rapiunt. Flores sternutamenta efficacissimè mouent. Diosc.

PVLEGIVM herba est uulgaris noticiæ. Nascitur in locis cultis & aquis.

aquosis. Colligitur mense Iunij, Iulij & Augusti, dum floret. Siccatur in umbra. Conseruatur per annum. * Extenuat, calfacit, decoquit: potum mēstrua, secundas ac partus eijcit. Pulmonis uitia ex melle & aloe potum extrahit, & conuulsis auxiliatur. nauseas, stomachiq; erosiones ex posca permulcet. atrā bilem per aluum exigit. Bibitur in uino utilissimè contra serpentium morsus: defectos animo recreat, cum aceto naribus obiectum: gingiuas arefacti cinere corroborat. Illitum cum polenta inflammationes omnes sedat. podagris per se subuenit, impositum usquedum rubescat locus: cum cerato uaros extinguit: lienosis cum sale utiliter illinitur. Decoctum eius ablutas prurigenes mitigat: conuersas uuluas corrigit: contra inflationes, duritiasq; uuluz in defesiones conuenienter adijcitur. Diosc.

RUTA tam satiuā quā syluestris uulgaris est noticiæ. Nascitur passim in hortis. Amat solum siccum & apricum. Floret estate. Colligitur autumno. Siccatur in umbra, & conseruatur per annum. * Vtraque urit, calfacit, exulcerat, urinam ciet, menstrua pellit, aluum sistit potu, ciboue. Lethalium medicamentorum antidotum est, si semen ex uino acetabuli mensura ebibatur. Folia per se præsumpta, aut cum nucibus iuglandibus, aridisq; ficis, inefficaces uenenorum uires reddunt: contra serpentes simili modo sumere conuenit. Genituram cibo, potiuè extinguit: cum anetho sicco decocta, tormina sedat. Facit ad pectoris, laterumq; dolores, difficultatem spirandi, tusses, pulmonis inflammationem, coxendicum, articulorumq; cruciatus, & horrores febrium circuitu repetentes, potā, ut antè dictum est. Item ad inflationes colli, uuluz, rectique intestini cum oleo decocta, & infusa. Fœminas uuluz strā gulatu liberat, si à genitali sedētus cum melle subijciatur. Feruefacta ex oleo, & pota, uentris tineas excutit: articularijs doloribus ex melle, aquæ inter cutem cum ficis illinitur: eisdem in potu auxiliatur, decocta in uino ad dimidias partes. & oblita. Cruda conditaque cibo, uisus aciem excitat: dolores oculorum illita cum polenta lenit: doloribus capitis cum rosaceo & aceto illita auxiliatur: profluentem naribus sanguinem sistit trita, & indita. Testium inflammationibus cum laureis folijs imposita, & eruptionibus popularum cum myrtho & cerato prodest. cum pipere autem, uino & nitro affricta, albæ uiriligni medetur: cum eisdem illita fornicationes tollit, & uerrucas, quæ thymi florem repræsentant. Contra impetigines cum alumine & melle utilissimè imponitur. Succus in mali punici calice calfactus, aurium dolori efficaciter infunditur. Idem oculis, qui hebetudinem sensere, cum fœniculi succo ac melle inunctus, opitulatur. Ignem sacrum, ulcera quæ serpunt, aut in capite manant, cum aceto, rosaceo, & cerussa illitus persanat. mansa alliorum, ceparumque acrimoniam domat. Syluestris si copiosius estur, interficit. Dū florem promit, & ad murias colligitur, cutem inflat, & rubore quodam inficit, cum pruritu ac uehemēti inflammatione. oportet itaq; eam unctis antea manibus

DE FOLIIS CALIDIS IN TERTIO. 81

A manibus & facie colligere. Tradunt succum gallinaceis pullis inspersum, felles arcere. Adijciunt eam, quæ in Macedonia circa Haliacmon amnem prodeat, comedentes interimere. Mōtosus autem is locus, uiperis scatet. Semen eius potum contra intestina uitia efficax est. In antidota commodè additur. Contra incontinentiã urinæ tostum semen septenis diebus potui datur. Radix huius montanum molyuocatur. Syluestris ruta saluæ similis est. Prodest comitialibus, & coxendicum doloribus: menstrua mouet, partus enecat. Acrior est uiribus, quàm hortensis, & ualidior. Syluestris, utpote noxia, cibis abdicatur, Dioscorides.

SABINA duorum generum est. Vna folijs cupresso similis, spinis horridior, grauiter olens, acris, & feruens. arbor est coactæ breuitatis, quæ sese magis in latitudinem fundit. huius folijs nonnulli pro suffitu utuntur. Altera tamarici folio similis est. Nascitur passim in hortis. Colligitur autumnò. Conseruatur autem per annum. * Vtriusq; folia nomas sistunt, collectiones illitu mitigant: quin & cum melle illita nigritias, fordesq; repurgant, & carbunculos rumpunt: cum uino pota sanguinem per urinam eliciunt: partus apposita extrahunt, & suffitu idem præstant. Vnguentis calfacientibus immiscentur, & priuatim gleucino. Dioscorides.

SERPYPHYLLUM duorum generum est. Hortense odore sampsuchum imitatur, atq; in coronas addi solet. cui à serpendo nomen inditum est: quoniam **B** si qua eius particula terram attingat, inibi radices demittit. Folia & ramulos organi habet, sed candidiores. in macerijs multò procerius assurgit. Nascitur passim in hortis, locis apricis. Colligitur mense Iunij & Iulij. Siccatur in umbra, & conseruatur per annum. Syluestre, Zygis appellatum, non serpit, sed in altitudinem increfcit, ramulos edens tenues, furculosos, folijs reertos longioribus, quàm rutæ, & durioribus, angustis. Flores iucundè olent, gustanti acres. Radicis nullus usus. Nascitur in petris, satiuo efficacius, atque magis exalfaciens, & ad medendi usum aptius. * Menses trahit, & urinam potu ciet: torminibus, ruptis, uulsis, & iecinoris inflammationibus auxiliatur: & aduersus serpentes potu, illitu ue prodest. Capitis dolores mulcet coctum, adiecto rosaceo, & madefactum in aceto: maximè uerò phreneticis & lethargicis conuenit. Cruentos uomitus sedat succus, drachmis quatuor ex aceto potus. Dioscorides.

SISYMBRIVM (alij serpyllum syluestre uocant) menthæ hortensis similitudine, odoratius, latiore folio. Inseritur coronis. Nascitur in solo inculato. Colligitur mense Iunij. Conseruatur per annū * Calfaciendi uim habet. contra stillicidia urine, calculosq; semen ex uino bibitur: tormina & singultus sedat. Folia in capitis dolore, fronti, aut temporibus illinuntur: item contra uesparum, apumq; ictus. Vomitiones potu cohibet. Alterum sisymbrij genus, aliqui cardaminam, alij Sion appellat. Ea herba riguis gaudet, & eisdem in lo-

in locis, quibus Sion, prouenit: quæ ideo nonnullis Cardamina nominatur, A quod gustu cardamum, id est nasturtium repræsentet. Folia primum rotunda prodeunt, adulta erucæ modo finduntur. Id excalfacit, urinas mouet. crudum estur. Purgat lentigines, cutisq; uitia in facie, noctibus impositum, matutinisq; detractum. Dioscorides.

THYMVM ab omnib; cognoscitur, surculosus frutex, exilibus folijs, multis & angustis circumdatus: capitulis in cacumine flore purpurascente refer- tis. Gracili solo & petroso prouenit. Colligitur mense Iunij. Cõseruatur per annum. * Vim habet hanc, ut cum sale & aceto potum, pituitam per aluũ de- trahat. Decocti ius prodest orthopnoicis & anhelatoribus: tineas uentris exigit: menses, partus, & secundas pellit: urinas ciet. Cum melle in eclegma- te faciles facit excreationes: recentes tumores discutit, cum aceto illitum: concretum sanguinem dissoluit. verrucas thymi colorem reddentes pensilesq; tollit. Ischiadicis cum uino, & polenta impositum subuenit: hebetibus oculis in cibo prodest. Perquam utile pro condimento, duntaxat ad usus eor- um qui rectè ualent. Dioscorides.

TRIFOLIUM, quod Græci Oxytriphylon, aut Alphatiõ appellat, quod bitumẽ redoleat, multas habet uirgas tenues, cubitũ aut amplius lõgas: folia magna, acuminata, terna singulis germinationibus exeũtia, quibus recen- tenatis rure odor inest, ubi aut adoleuerũt, bitumen olẽt: florem edit purpu- reum, semẽ latũ, hirsutũ, ex altera extremitate exertũ corniculi modo: radix B longa, tenuis, dura. Copiosè nascitur circa Elbam & Petram sanctam Hetru- riæ. Huius usus esse debet, non trifolij pratensis, quod à uero trifolio maximè differt à Græcis descripto. * Semen & folla in aqua pota pleuriticis, urine dif- ficultati, comitialibus, & ijs qui aque inter cutem principia sentiũt, fœminis quoq; uulue uitijs opportunis, auxiliantur: menses ciunt. ternæ drachmæ è semine dari debent, è folijs uerò quaternæ. Contra serpentium ictus trita folia, & ex aceto mulso pota, præsidio sunt. Tradũt aliqui, totius fruticis, ra- dicis, foliorumq; decoctum fotum dolores eorum finire, quos serpẽtes per- cussierint. qua autem aqua sanatus quis fuerit, si ea quispiam alius foueatur, qui ulcus habuerit, perinde afficitur, ut à serpente demersus. Quidam terna folia aut semina, in tertianis, cum uino potui dedere: & in quartanis quarta- na, ut quæ febrium circuitus discuterent. Radix antidotis inferitur. Diosco- rides & Medici Florentini.

VERBENACA, Græcis Peristereon, dodrantis altitudine, & interdum amplius adolefcit. Folia è caule prodeunt incisa, & subalbida, ea singulari ra- mo, radiceq; sola, cõstare sæpius inuenitur. Nascitur in aquosis. * Folia cum suilla adipe receti, aut rosaceo imposita, uuluarũ dolores finire putatur: ignè sacrum illita ex aceto reprimunt: putrida ulcera cohibent: uulnera glutin- ant, ueteraq; ex melle ad cicatricem perducunt. Dioscorides.

VTRICA

DE FOLIIS CALIDIS IN QVARTO. 8;

A VRTICA adeò vulgaris est noticię, ut non modò interdū, sed etiam noctu in tenebris solo tactu ab omnibus facillimè cognoscat. Eius genera duo. Altera syluestrior, asperior: latioribus, nigrioribusq; folijs: semine lini, sed minore. Altera non æquè aspera, minuto semine. * Folia utriusq; illita, canis moribus, addito sale, medentur: gangrænas, carcinomata, sordida ulcera, & quæ cacoëthe uocantur, item luxata, panos, tubercula, parotidas, supurationesq; sanant: lienosis cum cerato imponuntur: faciunt ad profluvia narium cum succo trita, & naribus indita: menses ciunt eadem detrita cum myrrha, & imposta: procidentes uulvas recentia contactu resillire cogunt. Semen potum ex passo uenerem stimulat, & uulvæ ora patefacit: cum melle delinctum orthopnææ, lateris & pulmonum inflammationibus prodest: thoracem expurgat. erodentibus medicamentis admiscetur. Cocta cum conchis folia, aluum emolliunt, urinas mouent, inflationes discutunt: decocta cum ptisana, uitia pectoris extrahunt: mulierum menses euocant, cum myrrhæ modico pota. Inflammatione turgentem uiam gargarizatus succus reprimat. Dioscorides.

De folijs calidis in quarto.

B ALLIUM quoddam satiuum atq; hortense habetur, quod in Ægypto, singulari ut porrū capite constat, dulce, in purpureum uergens, paruū: reliqua uerò magna & candida, & pluribus coagmentatur nucleis, quos aglithas, id est spicas, Græci nominant. Aliud est syluestre, quod ophioscorodon, id est anguinū, uocant. * Vis allij acris est, excalfacit, mordet, excernit, aluum turbat, inflationes facit, stomachū exiccat, sitim gignit, flatum permouet, summam corporis cutem exulcerat, aciem oculorū elu hebetat. Eisdem effectus præbet anguinum, quod & elaphoscorodon dicitur: latas uentris tineas in cibo sumptū abigit, urinas detrahit: contra uiperarum ictus, & priuatim hæmorrhoi, prodest, ita ut nō aliud magis, si cum uinō iugiter assumatur, aut tritum in eodem ebibatur: contra rabiosorum morsus, & illitu, & cibo ualet. Magnę & allio utilitates contra aquarum mutationes: uocem clarificat: ueterem tussim crudum, coctum uel lenit: potum autem cum origani decocto, pediculos & lendes enecat: cremati cinis illitus saggillationibus cū melle & alopecijis cum nardino unguine, medetur: eruptiones papularum cum oleo & sale sanat: uirilignes, lichenas, lentigines, ulcera capitis manantia, lepras & furfures, cum melle eximit: cū thure & teda decoctū dentiū dolorem leuat, si in ore contineatur: contra uenenatos muris aranei morsus, cum ficulneis frondibus, & cumino illinitur. Feruēfactæ comæ ius, fœminarum desefsionibus additum, menses & secundos partus extrahit. Allium eiudem gratia suffitur. Factum ex eo, & nigra oliua intritum, quod mytton uocant, esu cit urinam, ora uenarum patefacit, hydropicis utile. Dioscorides.

LEPIDIVM vulgò notum est. muria cum lacte seruat. * Vis foliorum **A** acris & exulcerans. quapropter ischiadicis trita, præsentissimum est auxili-
lium, si cum helenij radice, quarta parte horæ illinatur: lienosis simili modo
prodest: lepras eximit. Radix appensa collo, dolore dentium liberare existi-
matur. Nascitur passim in hortis. Dioscorides.

NASTURTIVM SATIVVM hortis familiaris, & frequens herba est,
tenuis: folijs paruis, laciniatis: caule tenui, sesquipedali: flore albo: semine
in rubeum nigricante, folliculis rotundis ac pressis contento, thlasi modo.
* Omnium semen est acre: excalfacit, stomacho aduersatur, aluum turbat, tie-
neas excutit, lienem imminuit, partus exanimat, menses cit, uenereim stimu-
lat, sinapis & erucę simile intelligitur: lepras & impetigines abstergit. Illitum
cum melle lienem extenuat, fauos expurgat: pulmonum uitia extrahit, sor-
bitionibus incoctum: serpentium uenenis potum resistit, atq; eas suffitu fu-
gat: capillorum deauiua cohibet: carbunculos ad suppurationem perducit,
& rumpit: coxëdicibus cum polenta commodè ex aceto illinatur: tumores,
collectionesq; discutit: emittit furunculos illitum cum muria. Herba ad om-
nia idem effectus, licet minor. Dioscorides.

PORRVM capitatum inflationem parit, noxium succum creat, tumul-
tuosum somnium parit, urinam ciet, aluo accommodatur, extenuat, oculo-
rum aciem hebetat, menses pellit: sed lædit exulceratam uesicã, renesq; cum
ptifana uerò coctum, esu pectoris uitia extrahit. Coma eius in aqua maris, & **B**
aceto cocta, in defensionibus ad præclusiones uulua, & duritias, utilis habe-
tur. Porrum bis aqua mutata coctum, tum frigida maceratum, dulcescit, &
multò minus inflat. Semen acrius est, & quandam astrictoriam uim habet,
quare succus cum aceto, addito thure, aut manna, sanguinis profluuia sistit,
maximè si naribus erumpat. Venerem stimulat: contra omnium thoracis uis-
tia, tabe q; pro delineta efficax est: arteriam esu purgat: sed si asidue estur,
uisus obcurritatem inducit: stomacho aduersatur. Succus ex melle potus,
aut illitus, contra bestiarum morsus auxilio est. Ipsum quoq; cum aceto aut
thuris polline, lacte aut rosaceo, utiliter aurium doloribus & sonitui instilla-
tur. Varos tollunt folia illita cum rhoë, qua ad obsonia utuntur: epinyctidi
medentur: crustas ex sale illita rumpunt. Veteres sanguinis reiectiones co-
hibent, feminis drachmæ binæ, cum æquali baccarum myrthi pondere po-
tæ. Dioscorides.

STRUTHIVM, radícula, seu lanaria herba vulgò nota: qua purgandis
lanis utuntur, qui eas eluunt. * Huius radix est acris, urinam ciet: prodest
tussi, iocinerosis, orthopnææ ex melle sumpta, cochlearis mensura: aluum
soluit. Eadem cum panace & capparidis radice, calculos frangit, & cum urina
exturbat: duritiem lienis absumit: menses imposita trahit: partus efficaciter
enecat. Cum polenta autem & aceto illita, lepras tollit: tubercula discutit,
cum.

DE FOLIIS CALFAC. IN QVARTO. 85

A cum farina hordeacea & uino decocta. Miscetur & malagmatis, & oculari-
bus collyrijs, claritatis causa. Sternutamēta mouet: per os purgat, trita cum
melle, & naribus infusa. Dioscorides.

THAPSIA nomen ideo accepit, quod in Thapso eiusdem nominis insu-
la, primū inuenta sit. Tota uerō natura ferulæ similis est: graciliore caule:
folijs sceniculi: umbella anethi in cacumine, à singulis furculis erumpentes:
flore luteo: semen quale ferulæ, latiusculum, sed aliquantō minus: radix fo-
ris nigra, intus candida, longa, acris, crassiore libro uestita. * Tam cortex ra-
dicis, quàm succus purgandi uim habent, & lacteus succus in aqua mulsa po-
tus: nam utrinq; bilem extrahūt. Radicis modus, quaterni oboli, cum tribus
feminis anethi drachmis: succi, terni oboli: lactis, obolus unus, quod eo am-
plius assumitur, periculosū est. Huiusmodi purgatio conuenit suspiriosis,
& diuturnis laterum dōloribus, reiectionibusq;: datur in cibis, aut obsonio,
quibus difficile sit uomere. Tam radix quàm succus omnium maximē, quæ
pares cum eis uires adeptæ sunt, uim habēt extractoriam ex alto, ubi ex imo
aliquid euocandū est, aut meatuum laxitas aliō transferenda est. unde suc-
cus illitione, aut radix recēs affrictu alopecias explent. Radix, succusq; cum
æquis ceræ, thurisq; portionibus, sugillata, liuoresq; tollunt: sed non plus
binis horis dimittantur: locus deinde aqua maris calida foueatur. Vitia cu-
tis in facie emendat, cum mellē illitus succus: lepras tollit: tubercula discuti-
B tit, perunctus cum sulphure. In diuturnis pulmonum, laterum, pedum, arti-
culorumq; ualetudinibus utiliter illinitur. Valet ad integendam colis glan-
dem ijs, qui natura, non circuncisione curti sunt: tumorem enim excitat, qui
pinguium fotu emollitus, præputij iacturam refarcit. Dioscorides.

De folijs frigidis in primo.

ATRIPLEX cognitum olus est. Duo eius genera, syluestre & satium:
Satiuum passim in hortis gignitur. Floret mense Iunij & Iulij. Coctum estur,
ut olus: * aluum mollit. Panos discutit, siue crudum, siue coctum illinatur.
Semen cum aqua mulsa potum, regionum morbum sanat. Dioscorides.

FVMVS TERRAE seu **FVMARIA**, fruticosa herbula est, prætenera, co-
riandro similis: folijs candidioribus, undique numerosis, cineracei coloris:
flore purpureo. Nascitur passim in hortis & campestribus. Colligitur in ue-
re & autumno. Conseruatur per annum. * Huius succus acris est: claritatem
facit oculis, de lacrymationemq;: unde nomen traxit. Illitus cum gummi, e-
uulsas palpebras renasci prohibet. Commanducata herba, biliosam trahit
urinam. Dioscorides.

EX generibus runcicis, **OXYLAPATHVM** uocant, quod in acutum
rundit, duo habens extrema, in palustribus nascens. Alius est satiuus, illi dif-
similis. Tertium genus syluestre, paruum, plantagini proximum, humile &
molle.

molle. Quartum est, quod alij oxalia, alij anaxyrida, aut lapathon uocant. **A**
 Folia eius syluestri ac exiguo rumici similia: caule non magno: semine sub-
 acuto, rubente, acri, in caule, & agnatis appendicibus, emicante. * O-
 mnium decocto olere alius emollitur. Crudi illitu, melicerides, rosaceo
 aut croco adiecto, discutiuntur. Syluestris & oxylapathi, & eius quam o-
 xalida nominant, semen ex aqua aut uino utiliter bibitur contra dysen-
 terias, & coeliacorum affectus, stomachi fastidia, scorpionum ictus. Quod
 si quis in potu præsumat, nihil molesti ex ictu patietur. Radices ex aceto co-
 ctæ, aut illitæ crudæ, lepras, impetigines, & scabrosos ungues persanant:
 sed antea locus aceto & nitro in sole perfricandus est. Pruritus corporis,
 decoctum earum sedat, si foueatur, aut in folijs balnearum confricetur.
 Coctæ in uino, & instillatæ, aurium dentiumque dolore mulcent: strumas,
 parotidasque discutiunt: lienem cum aceto extenuant. Aliqui amolien-
 dis strumis radicum gestamine utuntur, eas collo appendentes. Tritæ,
 & admotæ, fœminarum profluvia sistunt: cum uino autem potæ, regio
 morbo medentur, calculos uesicæ comminuunt, menses cient, scorpio-
 num ictibus auxiliantur. Hippolapathon olus est magnum, in paludi-
 bus nascens. Eisdem habet uires, quas supradicta rumicis genera. Dio-
 scorides.

MALVA uulgaris noticiæ est: eius genera duo, syluestris & satiuua. Sa-
 tiuua nascitur passim in hortis. Colligitur uere & autumno. Conseruatur per **B**
 annum. Malua satiuua esui longè aptior est syluestri. * Stomacho aduersa-
 tur: aluum iuuat, sed multò magis caules: interaneis, & uesicæ utilis. Cru-
 da folia cum salis exiguo manducata, ægilopas ex melle sanant: uerùm
 cùm cicatricem trahere cœperint, ea demum citra salem utendum est.
 Contra aculeatos apium uesparumque ictus, illita efficax est: eadem cru-
 da cum oleo trita peruncti non feriuntur: ulcera manantia in capite, fur-
 furesque cum urina sanat. Sacris ignibus, & ambustis decocta folia, tritaque
 utilissimè ex oleo imponuntur. Eius decoctum uulnas infectione mollit:
 prodest erosionibus uesicæ, & intestinorum, uulnæ, sedisque, clystere in-
 fusum. Ius decoctæ cum radice sua, contra omnia uenena auxiliatur, si con-
 tinuò à bibentibus reuomatur. Contra phalangiorum morsus remedio est:
 lac euocat. Semen in uino potum, addito loti syluestris semine, uesicæ cru-
 ciatus lenit. Dioscorides.

MYRTVS arbor frequens in Italia nascitur. Cuius duo genera: sati-
 uum, quod in candidum & nigrum diuiditur: & syluestre, quo uniuersa
 ferè Tyrrheni litora uirescunt ac redolent. Satiuæ in arbores facilè ado-
 lescunt, ramis flexilibus ac lentis: rubro cortice: folijs longiusculis, per-
 petuoque uirentibus, punicæ æmulis: quanquam in nigris nigriora, in
 candidis

A candidis candidiora spectantur. Flores omnibus insident candidi, odorati: ideoque aqua ex ijs confecta, odoris suavitate unguentarijs plurimum expetitur. Satiuarum utrunque genus baccas fert oblongas, agrestes oleas quadantenus referentes, multo sanè sylvestribus maiores. Inter sylvestres alba quoque & nigra reperitur, quemadmodum & inter urbanas. Myrti montes non amant, quin & frigidos odere tractus: tamen cum in mediterraneis, nempe in hortis, uiridarijs, uinetis & campis maxime proueniunt, tum in maritimis præcipue, atque amœnis stagnorum & lacuum ripis à natura nullo studio editæ, mirifice proficiunt, uitamque lætam agunt. Myrtus satina nigra utilior est medicinæ, quàm candida, & in hoc genere multo magis montana: semen tamen imbecillius parit. * Vis & myrti, & feminis, altringit. Semen uiride aut aridum in cibo datur sanguinem excreantibus, & uescæ erosionibus. Succus uirentibus baccis expressus, eodem effectus exhibet: stomacho utilis, urinam cit: prodest contra phalangij morsum, & scorpionis ictus, in mero. Seminis decoctum capillum tingit. Ius decocti in uino ulcera in extremis membris nata sanat: oculorum inflammationes illitum cum polline polentæ lenit: contra ægilopas illinitur: crapulam arcet præsumptum uinum, quod seruefacto aliquantum eius semine exprimat: aliàs enim acorem contraheret. Præstat idem feminis effectus: utile procidentia uuluarum in defensionibus, sedis uitijs, & femininis fluxione uulua laborantibus: purgat furfures, ulcera capitis manantia, atque eruptiones papularum: fluentes capillos continet. Additur quoque in medicamenta, quas liparas uocant, uti oleum, quod ex folijs eius factum est. Decoctum foliorum ad defensiones balnearum conuenit, & contra laxatos artus, & malè solidascentes: eo fracta ferruminationi repugnancia utilissimè fouentur: vitiliginem emendat, purulentis auribus infunditur, & capillos denigrat. Succus eorum eadem efficit. Trita folia, & ex aqua illita humidis ulceribus, & partibus omnibus fluxione laborantibus, coeliacisq; profunt: & admisto omphacino oleo, aut exiguo rosaceo cum uino, ad ulcera serpentina, ignem sacrum, testium inflammationes, epinyctidas, & condylomata. Arentium foliorum farina utiliter inspergitur paronychijs, pterygijs, & contra alarum, feminumque perfusiones: cardiacorum sudores cohibet. Folia cruda, seu cremata cum cerato, ambustis, paronychijs, pterygijsque medentur. Exprimitur folijs succus, aduso uetere uino, aut aqua cœlesti, cuius recentis usus est: nam exiccatus planè cariem sentit, & uires amittit. Myrtidanum dicitur, adnatum, inæquabile, uerrucosum, intumescensque, & concolor: quod perinde quasi manus, myrti caudicem amplectitur, coactumque in pastillos siccatur in umbra: multo efficacius & folio, & semine. cerato.

cerato, pefsis, infefsionibus, cataplafmatis admittum, ubi adstringendum a-
liquid est. Dioscorides & Matthiölus.

PARIETARIA Græcis Helxine dicitur; nascitur in parietinis, sepibus
& macerijs. Folia ei mercurialis infunt; hirsuta: cauliculi subrubentes, &
circa eos ueluti semina aspera, adhærentia uestibus. * Folia refrigerandi,
spiffandiq; naturam habent. qua ex causa sanant illitu sacros ignes, adusta,
condylomata, panos incipientes, tumores, inflammationesq;. Succus eius
cum cerussa, ignibus sacris, & ulceribus quæ serpunt, commodè illinitur: im-
poniturq; podagris cum hircino adipe, aut cerato cyprino: ueterem tufsim
mendat, instar cyathi haustus: tonsillis inflammationem sentientibus uti-
liter & gargarizatur, & oblinitur: aurium dolorem cum rosaceo, instillatus
leuat. Dioscorides.

De folijs frigidis in secundo.

BLITVM duorum est generum, rubrum & album. Vtrunque notum, in
hortis & campis nascens. Rubro caulis & folia adeò rubescunt, ut coccineo
colore infecta uideantur, etsi temporis tractu tandem purpurefcent. Folia a-
marantium referunt, sicut etiam caulis. Quin & radix sanguineo succo ma-
det. Album prouenit iisdem folijs, latioribus tamen, & colore subalbidis.
Flores & semen racematim cohærentes, tenuibus insident ramusculis, ex a-
larum cauis prodeuntibus panicularum effigie, syluestris panici modo. B
* Oulus est esculentum, humidæ frigidæq; temperaturæ, in secundo maxime
excessu. Matthiölus.

CHONDRILLA syluestris cichorij species nimirum est: gracilioribus
tamen folijs, caule, floribus, ac semine. Nascitur in locis cultis, scrobium ag-
geribus, & secus uias. * In huius ramulis, gummi masticis simillimum, ma-
gnitudine fabæ inueniri solet: quod cum myrrha tritum, & linteo apposi-
tum, instar oliuæ, fœminarum menses trahit. Fusa cum radicibus herba, ad
iecto melle, diuiditur in pastillos: qui nitro admisti utiligines emaculant.
Gummi inordinatos pilos replicat. Quod item tenera radix efficit, si intin-
cta succo acus, pilis admoueat: contra uiperas in uino pota proficit. Suc-
cus decoctæ, in uino, aut per sese potus, aluum sistit. Aliud habetur chon-
drillæ genus, folium ferens oblongum, circumrosam, humi sparsum: caulem
succo madentem lacteo: radice tenui, rotunda, leui, uegeta, flauescente, suc-
cosa: cuius & caulis, & folia, concoquendi uim habêt. Succus in commodos
palpebrarum pilos reflectit. Dioscorides & Matthiölus.

LACTUCA satiuæ, omnium herbarum uulgò notissima est: * cui natura
refrigeratrix inest, stomacho grata: somnum conciliat, aluum emollit, lac
euocat: uerùm decocta magis alit. Stomachicis illotas esse prodest. Epi-
otum semen, assiduas libidinum imaginationes in somno cõpescit, & ueneri
refraga-

A refragatur. Ipse uerò frequentiores in cibo, claritati oculorum officium: inflammationibus, & ignibus sacris opitulatur. Muria condiuntur. Cū in caulem exierunt, uim quandam nanciscuntur succo, aut lacti syluestris lactucae similem. Syluestris lactuca fatiuae similis est: sed longior caulis, & candidiora folia, graciliora, & asperiora. Nascitur in campestribus. Amaro gustu est & uiribus aliquantum papaueri similis: unde lacteum eius succum aliqui meconio permiscuerunt. Aquam per aluum elicit, potus in aceto mulso succus ad duos obolos: argema, caliginemq; repurgat: contra adustiones efficaciter illinitur, cum lacte mulierum. In summa, somnum allicit, doloris leuamentum praestat, menses trahit: contra scorpionum & phalangiorum ictus bibitur. Semen non aliter quam fatiuae libidinum imaginationes in somno amolitur, ac uenerem arceat. Succus ad eadem ualet, sed uiribus infirmior. Reponitur in fictili nouo lac eius, antea, ut in alijs liquaminibus moris est, insolatum. Dioscorides.

INTYBVS duum generum est: syluestris, & hortensis. Syluestris, quidem duplex: altera picris, quae & cichorium uocatur: altera fatiua, latioribus folijs constat, stomacho quam hortensis utilior. Hortensis uerò duplex genus: una folio latiore prodit, lactucarum simillima: altera angustiore est folio, & gustu amara. Vtraque colligitur mense Iunij & Iulij. Conseruatur autem per annum. * Refrigerat & altringit, stomacho utilissima: aluum sistit costa, si cum aceto adsumatur. Syluestres stomacho meliores: quandoquidem aestuantem ipsum, & quem imbecillitas uexet, cibo leniunt. Cardiacis per se, aut cum polenta, utiliter illinuntur: podagris, & oculorum inflammationibus auxilio sunt. Herba cum radice illita, percussis à scorpione subuenit: igni sacro cum polenta medetur. Succus cum cerussa & aceto, ualet ad illitus eorum, quae refrigerationem desiderant. Diosc.

B HYACINTHVS folia habet bulbi: dodrantalem caulem, laeuem, minimo digito tenuiorem, herbacei coloris: comam procumbentem, florum purpureorum plenam, incuruam: radicem quoque bulbaceam. Nascitur in uniuersum in campestribus inter segetes, & in syluis prouenit. Floret cum uiolis circa finem Martij, & Aprilis initium. * Radix (ut creditur) pueris cū uino albo illita, pubertatem coercet, & non patitur erumpere: sistit aluum pota, & urinam impellit: phalangiorum moribus auxiliatur. Semen altringentius est, theriacis expetitur: regium morbum emendat, cum uino potum. Dioscorides.

OXALIS seu ACETOSA, duorum est generum: maius nimirum, & minus. Illi folia sunt hortensi similia: huic uerò sagittarum figura, mollia, laeua, quibusdam ueluti capillamentis sabrubentibus inspersa, succosa, folijsq; maioris acidiora. Semen utriusque idem, praeterquam quod maiori maius, minori uerò minus. Matthiolus.

DVO PLANTAGINIS genera. Minor folia habet angustiora, minora, A
 molliora, leuiora & tenuiora: cauliculo anguloso, in terram inclinato: florib.
 pallidis: semine summis caulibus emicante. Altera maior, lætior, uirētiorq̃,
 latis constans folijs, oleracei generis: cuius caulis cubiti altitudinem petit,
 angulosus, subruher, à medio ad uerticem tenui semine circumdatus: radici-
 bus nititur teneris, hirsutis, candidis, digitum crassitudine æquâtibus. Nasci-
 tur in lacunosis, sepibus, & locis humidis. Multò utilior magna est. * Vim ha-
 bent folia exiccatoriam, constringentem. quare omnibus malignis ulcerib.
 & fluxioni opportunis, atque elephâticis, sordidisq̃; illita profunt: profluuia
 sanguinis, ulcera quæ serpunt, epinyctidas, carbunculos nomasq̃; cohibent:
 uetera ulcera, & inæqualia, cicatrice obducunt: chironia sanant, sinus cõgla-
 tinant: morsibus canis, ambustis igni, inflammationibus, panis, parotidibus,
 strumis, ægilopijs, illita cum sale profunt. Coctum cum aceto & sale olus, dy-
 sentericis, cœliacisq̃; sumptum subuenit. Datur & in locum betę cum len-
 ticula coctum. & ad aquam inter cutem, cui leucophlegmatix nomen est, da-
 tur & herba decocta post aridas epulas, sic ut media antecedit. comitialibus
 & suspiriosis data proficit. Foliorum succus, colluta subinde oris ulcera pur-
 gat: cum cimolia aut cerusa igni sacro medetur: fistulis infusus prodest: lippit-
 udinibus & aurium doloribus idem succus instillatur. additur quoq̃; in ocu-
 lorum collyria: gingiuis cruore suffusis, & sanguinis reiectionibus, potu con- B
 fert: clystere dysentericis infunditur: contra tabem datur in potu: aduersus
 strangulationes uulvæ, in uellere subijcitur, etiam si uulua fluxione laboret.
 Semen ex uino potum alui fluxiones, & sanguinis excreationes sistit. Deco-
 cta radix, & manducatu, & collutione, dentium dolores sedat: eadem cum fo-
 lijs, ulceribus renum, & uesicæ in passo datur. Ferunt tres radices, cum trib.
 uini cyathis, & pari aquæ modo, tertianis auxiliari: & quatuor, quartanis.
 Sunt qui radice gestamine, discutiendis strumis utantur. Diosc.

POLYGONVM mas ramos habet teneros, & exiles, copiosos, genicu-
 lis cinctos, qui per terram, ut gramen repunt: folia rutæ, sed molliora, longio-
 raq̃; semine sub omnibus folijs turgescente, unde marem appellari uolunt:
 flos ei candidus, aut puniceus. Nascitur in campis, ædificiorum areis, & uijs
 publicis. * Vis epoti succi est, spissare, ac refrigerare. prodest cruentæ excre-
 tioni, cholerae, alui fluxionibus, & urinæ stillicidio: nam urinam apertè ciet,
 cum uino potus, contra serpētium morsus auxiliatur: datur in febribus per
 horam ante significationes. fœminarum profluuia imposito sistit. Idem suc-
 cus aurium doloribus, ijsdemq̃; purulentis instillatur. Facit eximie ad genita
 lium ulcera, cum uino adiecto melle decoctus. Stomachi feruori, sanguinis
 reiectionibus, ulceribus quæ serpunt, ignibus sacris, collectionibus, tumori-
 bus, & recentibus uulneribus folia illinuntur. Sanguinaria fœmina fruticat
 uno caule, arundini teneræ simili, densis geniculis, & in se tubarū modo far-
 ctis: ar-

Artis: articulos in orbem cingunt apices, foliolis similes: radicis nullus usus. Nascitur in riguis. Huic quoq; spissandi, refrigerandiq; natura ad eadem ualens, sed inefficacior. Dioscorides.

PSYLLION folijs est coronopo non dissimilibus, hirsutis, longioribus. farmentosa fœni modo in totum herbula, ramis dodrantalibus: coma à medio caule exoritur, duobus tribus uel conuolutis in cacumine capitulis: in his semine duro, nigro, pulicum simili, unde & nomen. in aruis & incultis nascitur. * Vis ei ad refrigerandum, inspissandum, & molliendum conueniens: articularum morbis, parotidibus, tuberculis, tumoribus, luxatis, illitū auxiliatur: imponitur in dolore capitis, cum rosaceo, aqua aut aceto: enterocelis infantium, & prominenti umbilico, illitum ex aceto medetur. Teritur acetabuli mensura, & in aquæ sextario madefactum, ubi conuenit aqua, illinitur: siquidem uehementer refrigerat, & in feruentem aquam deiectum calorem reprimat. Contra ignes sacros efficax est. Fama est, si uirēs domum importetur, non sinere in ea pulices gigni. Cum adipe tusum sordida ulcera, & quæ cacoethe uocantur, expurgat. Succus uermiculosis auribus, aut fluxione laborantibus, ex melle prodest. Dioscorides.

RHVS, quæ obsonijs aspergitur, ab aliquibus erythros appellata, semen est coriarij fruticis, sic uocati, quoniam coriorum infectores eo utuntur ad inspissandas pelles. Arbuscula est in petris nascens binum ferè cubitorum altitudine: folijs oblongis, subrubentibus, in ambitu ferratis, ilicis modo: acino uuarum gracilium, denso, magnitudine terebinthi, quadantenus lato: cuius corticosa tunica perquam utilis est. Nascitur in Syria, Aegypto, & Italia. * Folia uim habent astringendi, & acaciæ effectus præbent. Decoctum capillos denigrat: dysentericis infunditur, & in potus eorum, infususq; adijcitur: instillatur auribus purulentis. gangrænas & prerygia cohibent folia ex aceto aut melle illita. Liquamentum fit ex aridis folijs, ad crassitudinem mellis in aqua decoctis, ad eadem, ut lycium, conueniens. Semen eisdem effectus exhibet: cœliacorum, dysentericorumq; obsonijs inspergitur: fracta, desquamata, liuidaq; illitum ex aqua, ab inflammatione uindicat: linguæ asperitates cum melle abstergit: candida fœminarum profluvia sistit: hæmorrhoidas sanat, cum querno carbone intrito admotum. Aqua, in qua semen maduit, decocta cogitur, coitq; efficacior quodammodo ipso semine. Gummi defert, quod dentium cauis imprimitur, ad dolores finiendos. Dioscorides.

SOLANVM quatuor generum est: hortense, halicacabū, somniferum, & furiosum. Hortense solanum frutex est cibus idoneus, exilis, pusillus, multis concavis alis: folio nigro, maiore quam ocimi, & latiore: fructu rotundo, uiridi, qui post maturitatem nigricat, aut fuluescit. herba inuicentis gustus. * Natura ei refrigerandi: quare folia ulceribus quæ serpunt, & ignibus sacris,

conuenienter cum polline polentæ illinuntur, ægilopia, capitisque dolores, A
 trita & imposita per se sanant: æstuanti stomacho auxiliantur: parotidas cū
 sale detrita illitu discutiant. Valet succus eius aduersus ignem sacrum, at-
 que ulcera quæ serpunt, cum cerussa, rosaceo, & argenti spuma: ad ægilopas
 cum pane: infantium adustioni, quam syriam uocant, cum rosaceo perfusus
 proficit: in collyrijs, aquæ uel oui uicem exhibet, contra acutas fluxiones il-
 litus: aurium dolori instillatus prodest. mensium abundantiam sistit in uel-
 lere subditus. Succus fuluo gallinarum corticalium fimo subactus, & linteo ap-
 positus. ægilopijs præsentaneo est remedio. Solanum halicacabon, aut phy-
 salida, id est uesicaria, folijs antedicto similibus, uerum latioribus: cuius cau-
 les posteaquam adoleuerunt, prona terram spectant: folliculis orbiculatis,
 uesiculis similibus, in quibus semen continet fuluum, rotundum, læue aci-
 norum uuæ figura: quo coronarij utuntur, corollis intexentes. Vim usum-
 que hortensis solani habet: uerum cibus nequaquam expetitur. Regium
 morbum purgat, semine potu, & urinam pellit. Ex utraque herba succus
 extrahitur: qui siccatus in umbra reconditur, ad eadem ualens. Solanum
 somniferum, aliqui etiam halicacabon uocant: fruticat multis ramis, den-
 sis, candidosis, fractu contumacibus, pinguium foliorum, cotoneæque ma-
 li similibus plenis: flore grandi, rubro: fructu in folliculis crocato: radice
 grandi, subrubro cortice uestita. Nascitur in saxis, non procul à mari. B
 Radicis cortex, in uino drachmæ pondere potus, somnificam uim habet, opio
 mitiorem. Semen uehementer urinam cit. Corymbi duodecim hydropi-
 cis dantur: si quid numero adijciatur, alienationem mentis faciunt. Reme-
 dio est aqua copiosa mulsæ, potui data. Succus pastillis inseritur, & medica-
 mentis, quæ doloris leuamentum præbent. Decoctus in uino, si in ore con-
 tineatur, dentium doloribus auxiliatur. Radicis succus, cum melle illitus,
 oculorum hebetudines tollit. Solanum furiosum, aliqui perision, alij thryon
 appellauere. Huic folium erucæ simile, maius aliquantò, satis acantho,
 quem pæderota uocant, accedens: caules à radice proceros emittit decem
 aut duodecim, ulnæ altitudine adolentes: caput in cacumine oliuæ fi-
 gura, sed ut platani pilulæ hirsutius, uerum maius, latiusque: florem ni-
 grum. postquam eo exiit, racemus exit rotundus, niger, dens aut duo-
 denis acinis constans, similibus hederæ corymbis, ut uuæ mollibus: radi-
 ce firmatur candida, crassa, caua, cubitali. gignitur in montibus, uento per-
 flatis, & plataneatis. Radix drachmæ unius pondere pota ex uino, facit spe-
 cies uanas, imaginesque non iniucundas obuerfari: sed duplicatus hic mo-
 dus, ad tres usque dies mentis alienationem affert: quadruplicatus interi-
 mit. Remedio est aqua mulsæ copiosius pota, & uomitione reie-

ta. Duo posteriora genera apud nos non repe-
 riuntur. Dioscorides.

De fo-

A *De folijs frigidis in tertio.*

PORTULACA omnibus vulgarissima est. Duo eius habentur genera: unum satiuum, cui folia insunt latiora, & caulis crassior, in altum se attollens: alterum uero syluestre, humi repens, minoribus, tenuioribus, ac crebrioribus folijs. * Harum uis astringit. Capitis doloribus, inflammationibus oculorum, cæterisque cum polenta imponitur: ardoribus stomachi, sacro igni, uesicæ doloribus auxilio est: commanducata dentium stupores sedat: stomachi & intestinorum estuationem, fluxionesque mulcet: renes & uesicam adiuuat, etiã erosionem sentiant: ueneris impetus exoluit. Succus eporus simili effectu prodest, in febris ualens. Contra teretes uetris tineas, croentã excretionem, dysenteriam, hæmorrhoidas, & profluvia sanguinis, percocta efficax est: item contra sepius morsus. Ocularibus medicamentis utilissimè commiscetur: interaneis fluxione lab orantibus, atque uuluarum erosionibus infunditur: contra dolores, quos æstus excitauit, caput ex rosaceo & oleo fouetur: eruptiones papularum in capite, cum uino emendat: uulneribus, quæ ad syderationem spectant, ex polenta illinitur. Dioscorides & Matthiolus.

MANDRAGORAM aliqui antimelum, alij circæam uocant, quoniam uideatur radix ad amatoria conducere. Duo eius genera: niger, quæ femina existimatur, thridacias appellatus, angustioribus folijs, ac minoribus quàm

B lactucæ, uiridis ac graueolentibus, in terra sparsis: mala gerit sorbis similia, pallida, odorata, in quibus semen ueluti pyrorum: radicibus in hæret bene magnis, binis, ternisue, inter se cõuolutis, nigris foris, intus albis, crasso cortice uestitis: caulem non fert. Alter candidus, qui mas dicitur, nonnullis morion uocatur. huius folia magna, alba, lata, læuia ut betæ: mala quàm interiori duplò maiora, colore in crocum inclinãte, iucundè cum grauitate quadam olentia, quorum pomorum cibo aliquantum opiliones soporantur: radix alterius similis, maior & candidior, orbata & hæc caule. Nascitur in montibus & uiridarijs. Succus fit è cortice recentis radice tuso, & prælis subiecto: qui insolatus, ubi concreuerit, fictili reconditur. Malis quoque succus depromitur, sed aliquantò ignauior. Delibratur radix, & traiectus lino cortex, ad usum suspenditur. * Aliqui radices in uino ad tertias coquunt, & defæcatum eius feruant, cyathoque uno utuntur in peruigilijs, & doloribus, & ante sectiones, uisionesque, ne sentiantur. Succus duobus obolis ex mulso potus, ut ueratum, per uomitiones bilem atrã, pituitamque extrahit: uerum potu largiore uita adimitur. Medicamentis ocularibus, & his quæ dolores finiunt, pessis quoque emollientibus, admiscetur: semioboli pondere inditus, per se menses & partus expellit: subditus sedi pro balano, somnificus est. Radix ebur emollire fertur, quæ senis horis cum eo decocta fit: & ad accipiendã quã effingere optaueris formã, ipsum facillè præstat. Folia recentia conuenienter oculorum inflammationibus & collectionibus, quas ulcera citant, cum polenta

ta illinuntur: duritias omnes, suppuraciones, strumas, & tubercula discutiunt: **A**
 stigmata sine exulceratione delent, si quinis, senisue diebus sensim perfricentur. Folia seruantur in murijs eisdem ad usus. Trita radix ignibus sacris ex aceto, & serpentium ictibus ex melle, aut oleo medetur: strumas atq; tubercula cum aqua dissipat: articulorum cruciatus, cum polenta sedat. Fit citra coctionem uinum e cortice radice, ad hunc modum. Ternæ minæ in uini dulcis metretam conijciuntur. Dantur ex eo terni cyathi, ijs qui secari aut amburi debent, ut antedictum est: siquidem nullo tunc afficiuntur dolore, sed uetero quodam presli torpescunt. Mâla saporem afferunt olfactu, & etiam si mandantur: item expressus ex eis succus, nimio tamen odore percussis obmutescunt. Semen malorum potum uulvas purgat: appositumq; cum sulphure ignem non experto, rubra fœminarum profluuia sistit. Scarificata, punctisq; multifariam aperta radice erumpens lacryma, cauo uase recipitur. Liquamentum autem succo lacteo præstantius est, sed non ubique, ut experientia docet, radices lacteum succum delacrymant. Aliam tradunt esse mandragoram, nomine Morion, in opacis iuxta specus enatum: folijs albi mandragoræ minoribus, albis, dodrantalibus, radicem ambientibus: quæ mollis est, & candida, paulo maior palmo, pollicemq; crassitudine æquat. Tradunt eam in pane, ossa, obsonio uel drachmæ pondere deuoratam, usum rationis intercipere: obdormiscit enim homo, eo ferè quo comederit habitu, sensus impositus, ternis quaternisue, ex quo data est, horis. Hæc medici utuntur, cum sciendendi, uerendite necessitas adest. Antidotum esse uolunt radicem, cum manico solano potam. Dioscorides. **B**

SEMPERVIVVM, seu SEDVM, trium est generum: maius, minus, & andrachnis. Magnum ideo nominatur, quoniam perpetuo folia uireant, cuius caules cubiti altitudinem implent, interdum excedunt, pingues, crassitudine pollicari, uirentes, characiæ tithymali modo infecti: folia pinguia, carnosâ, longitudine pollicari, in cacumine linguæ similia, alia in terram conuexa, alia in capite stantia inuicem, ita ut ambitu effigiè imitentur oculi. Nascitur in montibus, & testaceis: supra domicilia etiam seritur. * Eius uis refrigerare & astringere. Medentur igni sacro, nomis, ulceribus quæ serpunt, oculorum inflammationibus, ambustis igni, podagris per se, & cum polenta illita folia. Succus capiti in doloribus, cum polenta, aut rosaceo perfunditur: datur in potu contra phalagiorum ictus, dysenteriam, aluiq; profluuia: teretes tineas potus in uino excutit: subditus in uellere, mulierum abundantiam sistit. Succus oculorum lippitudinibus, sanguinis uitio conceptis, inungitur. Semperuiuum paruum in petris, parietinis, & macerijs, nec non scrobibus opacis nascitur, caulibus ab una radice multis, tenuibus, crebro foliatis: exilibus folijs, rotundis, pinguibus, mucronatis: caule a medio emicante, palmum alto, umbellâ herbidosq; flores, & tenues gerente. Folia eisdem cum priore uiribus prædita sunt.

Tertium

A Tertium uidetur semperuiui genus, quã aliqui andrachnem agriã, aut telephion uocauerunt, Romani illecebram, pusillis, crassioribusq; folijs, hirsutis, portulacæ proximis. Nascitur in saxis. Vis ei excafactoria, acris, exulceras. illita cum axungia strumas discutit. Dioscorides.

HYOSCYAMVS, Jusquiamus, herba Apollinaris, seu Altercum, frutex est caules emittens crassos: folia lata, oblonga, diuisa, nigra, hirsuta: flores è latere caulis, ordine prodeunt, tanquã punicorũ cytini, leutulæ septi seminũ plenis ut papaueris. Tres eius differentia. Vna semine nigro, floribus penè purpureis, limilacis folijs, cytini præduris & spinosis. Alterius semẽ subflauũ, ut irionis: flores lutei, folia & filiquæ simpliciores. ambo insanã gignũt, & soporẽ: ideoq; in cõmuni usu dãantur. Tertiuũ genus, ut qd' mitissimũ esset, medici recepere: pingue, lanuginosum, molle, candidi floris seminisq; in maritimis ruderibusq; nascẽs. cuius occasio si nõ adfit, rufum usurpari oportet. niger ut deterrimus, improbatur. Recenti semine, caulibus, folijsq; tuis succus in sole exprimitur, & exiccato humore, usus ad annũ usq; progatur: nõ facillẽ corruptionẽ sentit. Extrahitur etiã ex sicco semine separatim in aqua calida tuso, & expresso. Liqumẽtũ aut succo lacteo præstãtius est, & magis dolores finit. Cõtusa herba recẽs, addita trimestri farina, digeritur in partillos, & recõditur. Liqumentũ primũ, & quod à sicco semine exemptũ est,

B collyrijs, quæ doloris sensum auferũt, cõmodissimẽ inferi solẽt. * Cõtra acutas, calidasq; fluxiones, dolores auriũ, atq; uuluzæ mala, p̄sunt: cũ farina aut, aut polenta, oculorũ, pedũ, cæterarũq; partiũ inflamationes placat. Semen eadẽ præbet: tussi, de stillationibus, oculorũ fluxioni, & dolorib. efficax: contra mẽsũ abũdantiã, & erũpentẽ aliunde sanguinẽ, oboli põdere cũ papaueris semine, & aqua mulsa bibitur: podagris subuenit: testib. inflatis, mãmisq; tumẽtib. à partu, tritũ ex uino illinitur. Alijs quoq; cataplasmatibus, quæ doloris leuamentũ præstãt, admisceri solet. Folia omnib. medicamẽtis dolorem sedãtib. per sese, & ex polẽta utilissimẽ imponũtur. recentia ad mitigãdos omne genus dolores oblinũtur: cũ uino terna, quaternaũe pota sanant algidas febres, quas epialos uocãt. Cocta olerũ modo folia, si acetabuli mensura mãduntur, mediocrẽ insanã gignũt. Idẽ efficere tradũt si colo ulcus sentiẽte, infundãtur. Radice in aceto decocta, dẽtes in dolore colluuntur. Colligitur mense Maij uel Iunij. Conseruatur per annum. Dioscorides.

De folijs frigidis in quarto.

CICUTA vulgaris noticiẽ est plãta: caule edit geniculatũ, ut sæculi gratidẽ: folia ferulæ, angustiora, graui odoratu: rami, mox umbellæ in summo prodeunt. flores quoq; albicantes, & semen aniso candidius: radice non alta, concaua. Nascitur plerũq; prope urbiũ & oppidorũ mœnia. * Cicutẽ lethale uenenũ inest, suaq; ui refrigeratoria necat. Remediõ est uini meraculi potus.

Succus

Succus exprimitur contusis cacuminibus, priusquã semina & comæ sicce. **A**
 scãt: qui sole densatur in pastillos. Multus ad medēdi rationē usus est aridi:
 commodè miscetur collyrijs, quæ leuandi doloris gratia temperantur: ignes
 sacros, & ulcera quæ serpunt, illitu restinguit. Herba cum coma trita, & testi-
 bus circumlita, libidinum imaginationes in somno compescit, sed genitale
 resoluit. lac puerperarum mammis apposita extinguit: in uirginitate m̃mas
 coerces, & crescere non patitur. pueris præstat, ut eorum testiculi cibũ nõ
 sentientes intabescãt. Efficacissima uis Creticæ, Megarensi, mox Atticæ, &
 in Chio & Cilicia nascenti. Dioscorides.

PAPAVERIS apud Dioscoridẽ sex sunt genera. Primũ syluestre, rheas
 dictum, omnibus notum. Alterum cãdidum, capitibus oblongis, cãdidis, se-
 mine albo: hoc etiã notum. Tertium & quartum, nigrum, è quibus colligitur
 opium: semine nigro: utrumq; Dioscoride papauer syluestre etiã dicitur: &
 illud notum. Quintum papauer corniculatum: sic dictum, quòd caput non
 proferat, sed siliquã oblongã & rotundã in corniculi modum, florem luteũ,
 uulgò notum. Sextum papauer spumeum uocatur: hoc incognitũ est. Quo-
 ties papaueris simpliciter & sine adiectione mentio fit, semper domesticum,
 hoc est album intelligendum est. Nascitur syluestre in campestribus. Colligi-
 tur mense Maij. Reliqua genera in uiridarijs & cãpestribus gignuntur. * **O-**
 mnium (excepto corniculato & spumeo) in commune natura refrigeratrix. **B**
 Quare si capita ipsa & folia decoquantur in aqua, somnum fotu conciliabũt.
 Bibitur decoctum contra uigilias. Calices cum polenta triti, & cataplasma-
 tis admisti, ignibus sacris, & inflãmationibus profunt. Tunduntur quoq; ui-
 rides, & digeruntur in pastillos, qui siccati ad usum recondũtur. Capita quo-
 que per se in aqua coquuntur ad dimidias, iterumq; adiecto melle, dum hu-
 mor coeat in eclegmatis lentorem. Id medicamētum in tussi, arteriæ fluxio-
 nibus, & coeliacorum affectu, doloris leuamentum præbet. efficacius tamen
 redditur, addito hypocistidis succo, & acacia. Papaueris nigri semen tritum
 cum uino bibitur, contra citam aluam, & foeminarum profluvia. in peruigi-
 lijs fronti, temporibusq; illinitur ex aqua. Dioscorides & Medici Florentini.

De folijs humidis in primo.

HUMIDA in primo sunt, Buglossum, Intybũ, Malua, Helxine, &c. de qui-
 bus suprã quære.

De folijs humidis in secundo.

VIOLA purpurea foliũ habet hedera minus, tenuius, ac nigrius, nec mul-
 tõ dissimile: cauliculus à radice medius prodit, in quo flosculus suauissimè
 olens, purpureus. Opacis & asperis nascitur. Colligitur mēse Aprili. * Refri-
 gerandi naturã habet. Folia per se, & ex polenta illinuntur aptissimè stoma-
 cho æstuanti, & oculorũ inflãmationibus, sedi q; procidenti. Dioscorides.

NYM.

A NYMPHAEA sepalsarijs Maurinano nomine Nenuphar nomine appellatur. Eius genera duo. Primum folijs fabæ Aegyptiæ, minoribus & longioribus, alijs in summa aqua, alijs demersis, pluribus ex radice eadem prodeuntibus: flore lilio simili, albo, & in medio crocos habente. cum defloruerit, ut rotundum malum, aut papaueris caput, extuberans nigro semine, denso, & lato, lenti gustus. Caulis est læuis, niger, minimè crassus, Aegyptiæ fabæ cognatus: radix nigra, scabra, clauæ similis, quæ autumno feratur. * Sicca cū uino pota cœliacis, dysentericisq; auxiliatur, & lienē absomit. Radix stomachi ac uesicæ doloribus illinitur: uitilignes ex aqua emendat: imposita cum pice, alopecijs medetur. eadem contra ueneris insomnia bibitur: siquidē ea prorsus adimit. pota assidue aliquot diebus, genitale infirmit. Idem semen potū efficit. Alterū genus nymphææ, cuius flos blephara dicitur, folijs antedictæ: radice alba, scabra: flore luteo, nitente, rosæ simili. Huius semen & radix contra fœminarum profluvia efficaciter ex uino nigro bibuntur. Nascitur utrūq; genus in paludibus, lacubus & aquis stagnantibus. Dioscorides.

SVNT ET HUMIDA in secundo, Atriplex, Blitum, Lactuca, Portulaca, &c. de quibus omnibus uide suprâ.

De folijs siccis in primo.

B VERBASCUM seu Tapsum barbatum differētias summas habet duas: hoc nigrum, illud album: in quo mas & fœmina intelligitur. Fœminæ igitur folia sunt brasiçæ, pilosiora multò, & latiora, candida: caulis albus, cubitalis, aut amplior, subhirsutus: flores albi, aut ex luteo pallescentes: semen nigrum: radix longa, gustu acerba, crassitudine digiti. Nascitur in campetribus. Verbascum, qui mas appellatur, oblōgius, albis folijs, & angustioribus, tenuiori caule. Sed nigrum prorsus albo simile esset, nisi nigriore, latioreq; constaret folio. Syluestre folia fert saluæ: altas uirgas, & lignosas, & circa eas ramulos, quales marrubium: flores luteos, auri æmulos. Sunt & Phlomidæ duæ, hirsutæ rotundis folijs, humiles. Tertia lychnitis appellatur, ab alijs autem thryallis, folijs ternis aut quaternis, uel paulo pluribus, hirsutis, crassis, pinguibusq;: apta ad lucernarum lumina. * Radix priorum duarum astringit: quare quod magnitudine ludicrum talum æquet, in alui profluuio, conuenienter ex uino datur. Decoctum ruptis, conuulsis, fractis, antiquæ tussi auxiliatur: dentium dolorem collutione mitigat. Verbascum, cui flos aureus capillos tingit, & quocunq; abijciatur, blattas in se contrahit. Cocta in aqua folia, aduersus tumores & oculorum inflammationes illinuntur: syderatis ulceribus ex uino & melle, cum aceto autem uulneribus medentur: contra scorpionum ictus sunt auxilio. Syluestris folia ambustis igni sunt cataplasmata. Aiunt in folijs eius, quam fœminam dicimus, aridos ficus omnino nō putrescere. Dioscorides.

SICCA in gradu primo etiam sunt Beta, Brasica, Chamomilla, Fœniculum,

lum, Hyacinthus, Malobathrum, Myrthus, &c. de quibus omnibus ui. A
de supra.

De folijs siccis in secundo.

MARINA brassica officinis Soldanella uocatur. à sativa prorsus abhorret, quòd folia ferat rotundæ aristolochiæ, longa, tenuia: singula à ramulis rubentibus exeunt, singulari, ut hedera, pediculo. Albo succo prædita est, sed pauco, falso gustu, & aliquantum amaro, pingui concreto. * Herba in totum stomacho inimica, acris: uehementissimè aluum ciet in cibo cocta. Coquitur propter acrimoniã cū pingui carne. Conseruatur per annū. Dioscorides.

BURSA PASTORIS, planta omnibus uulgò notissima est. * Ex refrigerantium, exiccantium & adstringentium genere est. Quapropter prodest attrita, & emplastri more imposita, inflammationibus & sacris ignibus. Decoquitur pluuiali aqua cum plantagine, & Armenio luto, bibiturque eius decoctum ad intestinorum difficultatem, & ad cruentes excreationes. Herbae succus recentia uulnera glutinat, & auribus purulentis infusus medetur. Sistit mensium abundantiam, si eius, & persicariæ decocto insideant mulieres. Esturq; ad idem, & contra denique omnes sanguinis fluxiones efficax est, tenui pulcicula circumlita, & in oleo frixa. Additur in emplastris quæ ad capitis uulnera componuntur, & in unguentis compluribus. Matthiolus.

EQUISETUM officinis cauda equina nominatur: in riguis & serobibus nascitur. cauliculi prodeunt inanes, geniculati, in se facti, rubescentes, leniter scabri: & iuncea circa eos folia, crebra, exilia. In sublime attollitur, uicinos arborum caudices scandens, obuolutumque dependet, comis multis, nigris, ut equorum cauda: radix lignosa, dura. * Vis herbae, spissare: quare sanguinem naribus erumpentem succus ipse sistit: prodest dysentericis in uino potus: urinam cit. Sanguinolenta uulnera glutinantur, tritis folijs, & illtis. Radix cum sua herba tussim, orthopnœam, ruptaque adiuuat. Folijs in aqua potus, dissectiones uesicæ & intestinorum, enterocelæque in unum coalescere, cogiq; feruntur. Alterum equisetum caulis est rectus, cubito maior, inanis: comis per interualla breuioribus, candidioribus, & mollioribus. Id cum aceto tritum, uulneribus remedio est, eademq; fungitur facultate. Dioscorides.

GINGIDIVM in Syria & Cilicia plurimum nascitur. Herbula est syluestri pastinacæ similis, tenuior, & amarior: radice parua, candicante, subamara. * Oulus hoc erudum, coctum, conditumue estur, magna stomachi utilitate: urinam cit. Decoctum ex uino potum uesicæ prodest. Dioscorides.

VIRGA PASTORIS, seu *Dipsacus*, aculeatarum generis est. Caulem habet altum, spinis horridum: folijs lactucæ, spinosis, binis, genicula singula complectentibus, prælongis, ceu quasdã bullas intus & extrã aculeatas, in dorsi medio habentibus, concauo alarũ sinu, in quo imber aut ros asseruetur:

A seruetur: unde diplaci, quasi sitientis, nomē traxit. In cacumine caulis, singula surculis capitula insunt, oblonga, echinata spinis: quæ arefacta, cā dida spectantur, dissectāq; medulla tenus, uermiculos ostendūt. * Sanat rimas sedis, fistulasq;, si tusa & decocta in uino radix, usq; dū sit crassitudo ceræ, immittatur. Medicamentū ærea pyxide recondendū. Aiunt fornicationibus, uerrucisq; pēsilibus remedio esse. Vermiculi capitulorū in folliculo alligati collo, aut brachio appēsī, produntur quartanis febribus remedio esse. Diplaci spinæ radix secundo ordine exiccatoria est, habetq; nonnihil absterforiū. Nascitur in cāpestribus, in agrorū & scrobiū aggeribus, in uijs iuxta sepes. Colligitur tempore autumnī. Dioscorides & Galenus.

SICCANT quoq; in secūdo Arthemisia, Anethū uiride, Cassutha, Intybum, Plantago, Mentha, Menthastrum, Spica nardi, Verbenaca, &c. de quibus uide suprā.

De folijs siccis in tertio.

FILIX mas, folijs sine caule, sine fructu, sine flore, ex uno pediculo cubitali longitudine exeuntibus, multifidis, & laterib. pinnatis, subgrauis odore: radice per summa cespitū, nigra, oblonga, filices multas fundente, subastringente gustu. * Radix latus tineas excutit, sumpta drachmis quatuor ex aqua multa: melius si cū scāmōniæ aut ueratri nigri totidē obolis detur: sed qui sumunt, alia prægustare debēt. laborātes lienis incremēto recreat. Radix & potu, & illitu cū axungia, uulneribus sagitta harūdīnea factis, est auxilio. cuius rei probatio talis fertur. Peribit filix, quā per ambitū sata copiosior harundo coronet: & contrā, euanescent abibit harūdo, quā obseprensus multa filix in orbē cinxerit. Filix scēmīna folijs est filicis, surculosis, altioribusq;, & quæ non singulari, ut illa, pediculo fulciantur: radicibus lōgis, pluribus, obliquis, quæ ex nigro in luteū flauescūt: aliquæ etiam nū rubræ inueniuntur. Pellunt latus interaneorū animalia, cū melle, eclegmate sumpto: potæ cū uino drachmis tribus teretes tineas eiiciunt. Datæ scēmīnis sterilitatē faciūt: & prægnantibus abortū, si supergrediantur. Farina humidis ulceribus, & cicatrici repugnātibus inspergitur: iumentorū ceruicibus, medetur. Folia recētia in oleribus, cocta māduntur, ut uentrem emolliant. Nascuntur ubiq;, sed maximè frigido solo, ut in montibus & saxosis. Effodi debent radices Vergilijs occidētibus. Siccari autem eas sole oportet. Conseruantur per annum. Dioscorides.

MILLEFOLIUM, Stratiotes, Myricophyllon, caulis est tener, singularis, unica nixus radice: plurimis folijs, læuibus, scēmīculo similibus, unde nomen accepit. Caulis flauescit, uariis, ac ueluti ex industria delineatus. * Vulnera recētia ab inflāmatione uindicat, si uel uiride, uel siccū ex aceto oblinatur: præcipitatis in potu cum aqua & sale datur. Nascitur in palustribus. Colligitur mense Iunij. Conuersatur autem per annum. Dioscorides.

QUINQUEFOLIUM Græcis Pentaphyllon uocatur: ramulos fert foliis

stucarū similitudine, tenues, dotrātales, in quib. semē: folia mēthæ: quina sin A
 gulis pediculis, rarò plura, in ambitu serrata: florē ex cādidò pallefcētē, auri
 æmulū. Subrubrā habet radicē, oblongam, ueratro nigro crassiorē. Plurimis
 pollet remedijs. * Ius radicis decoctæ ad tertias, si in ore cōtineatur, dentiū
 dolores sedat: putrida oris ulcera, collutione sistit: arteriæ scabritias, gargari
 zatu læuigat: contra alui profluuia & dysenterias auxiliatur: itē articuloſū,
 coxendicūq; cruciatib. potū. Coctā in aceto, & illita, serpētia ulcera cohibet:
 strumas, tumores, duritias, abscessūs, & collectiones discutit: ignes sacros, re
 duuias, cōdylomata, pforasq; sanat. Teneræ radicis succus, cōtra iocinoris,
 pulmonūq; uitia prodest: itē aduersum uenena. Cū hydromelite aut uel dilu
 to uino, & piperis exiguo, bibuntur folia cōtra febrīū circuitus: in quartana
 quidē, quaternū ramuloſū folia: in tertiana uerò, ternū: in quotidiana, u
 nius. Ea quoq; folia tricenis pota diebus, comiti lib. profunt. Folioſū succus
 tribus cyathis aliquot dieb. potus, celerrimè regio morbo medetur. Illita cū
 melle & sale, tā uulneribus, q̄ fistulis remedio sunt: enterocelicis auxiliū præ
 stāt. Quinquefoliū sanguinis pfluuia & potu, & illitu sistit. Ad expiationes,
 castimonias, & incantamenta inciditur. Nascitur in riguis & aquarijs ductib.
 Colligitur mense Iunij. Conseruatur autem per annum. Dioscorides.

POLII duo genera. Montanū, cui teuthrio nomē est, & cuius est usus. te- B
 nuis frutex est, candidus, dodrātalī, semine refertus: capitulo in cacumine
 quādā corymboſū speciē præ se ferente, paruo, cano hominis capillo simili,
 grauiter olēte, nō sine quādā suauitate. Alterū fruticosius, nō usque ad eò ua
 lēs odore, & uirib. infirmius. * Potū seruefacti ius auxiliatur serpentiū icti
 bus, hydropicis, morbo regio: & lienosis ex aceto: stomachū malè habet, ca
 put dolorib. afficit: aluū & mēses ciet. substratū, suffitum iue serpētes abigit: il
 litū uulnera conglutinat. Amarū est gustatibus, & modicè acre. Itaq; uiscera
 omnia obstructione liberat: urināq; ciet. Virūq; polij genus, in plurib. Italiæ
 locis puenit. Colligitur mēse Iunij. Cōseruatur aut p annū. Dioscor. & Gale.

TRIFOLIUM, quod Græci oxytriphylon, aut alphaltion appellāt, quòd
 bitumē redoleat, multas habet uirgas tenues, cubitū aut amplius lōgas: folia
 magna, acuminata, terna singulis germinationib. exeuntia, quibus recēter e
 natis rutæ odor inest, ubi aut adoluerūt, bitumē olēt: florē edit purpureum,
 semē latū, hirsutū, ex altera extremitate exertū corniculi modo: radix longa,
 tenuis, dura. Copiose nascitur circa Elbā & Petrā sanctā Hetruriæ. Vfus hu
 ius esse debet, nō trifolij pratensis, qđ à uero trifolio maximè differt, à Græ
 cis descripto. * Semē & folia in aqua pota pleuriticis, urinæ difficultati, comi
 tialibus & ijs qui aquæ inter cutē principia sentiūt, fœminis quoq; uulue ui
 tijs opportunis auxiliantur: menses ciunt ternæ drachmæ è semine dari de
 bēt, è folijs uerò quaternæ. Cōtra serpentiū ictus trita folia, & ex aceto mul
 so pota, præsidio sunt. Tradunt aliqui, totius fruticis, radicis, foliorumq; ue
 decoctum

A decoctū fotu dolores eorū finire, quos serpentes percusserint. qua aut aqua sanatus quis fuerit, si ea quispiam alius foueatur, qui ulcus habuerit, perinde afficitur, ut à serpente demorsus. Quidam terna folia aut semina, in tertianis, cum uino potui dedere: & in quartana quaternis, ut quæ febrium circuitus discuterent. Radix antidotis inseritur. Dioscorides & Medici Florentini.

SICCANT quoque ordine tertio, Abrotonum ustum, Anethum ustum, Apium, Asarum, Ammi, Absynthium, Calamintha, Chamædrys, Hyssopum, Iuniperus, Maiorana, Marrubium, Origanum, Peucedanum, Petroselinum, Ptarmica, Rhus obsoniorum, Ruta, Sabina, Salix, Sylibrium, &c. de quib. omnibus uide suprâ.

De folijs siccis in quarto.

VOCANT etiamnum **SYLVESTREM RVTAM**, quod in Cappadocia, & Galatia Asiæ finitima moly dicitur. Frutex est, qui ab una radice multos emittit cauliculos: folijs multò quàm alterius rutæ longioribus, tenerioribusq; odore graui: flore candido: capitulis in cacumine paulo maioribus, quàm satiuæ rutæ, quæ tribus maximè partibus constant: in quibus triangulum semen, subrufum, gustu amarum recluditur. cuius est usus. Semen autumno maturefcit. * quod cum melle, uino, croco, & fœniculi succo, ac gallina ceo felle, teritur contra retusam oculorum aciem. Sunt qui eam harmalâ uocent, Syri besahan: qui Cappadociam incolunt, moly, quoniam quandam cum moly seruet similitudinem: radice nigra, flore candido. In collibus, & lato solo prouenit. Dioscorides.

SICCANT quoq; in quarto, Allium, Nasturtium, Sinapi, &c.

De folijs astringentibus.

CVPRESSI genera duo: mas scilicet, & fœmina: hæc meta in fastigium conuoluta: ille uerò ramos in latus spargens. Harum patria, ac proprium natale solum Creta insula est. In Idæis etiam montibus, qui ad Troadem spectant, cupressus numerosa sponte profilit: alibi non nisi tempore, & per quàm diligenti cultura proueniens, & cultorem magnopere fastidiés. Mira est cupressi fœcunditas: etenim trisera est. Colliguntur eius coni mensibus Ianuario, Maio & Septembri. Semē ijs innascitur, granis adeò pusillis ac minimis, ut atomis comparari possit. Tradiderunt ueteres, cupressum Diti sacram: & ideo funebri signo eius ramos ante domos ponere solebant, ubi aliquis defunctus iaceret. * Cupressus refrigerat & astringit. Cuius folia ex passo, & exiguò myrrhæ pota, uesicæ rheumatismis, & urinæ difficultati auxiliantur. Pilulæ autem ex uino tusæ in dysenteria, alui fluxione, tussi, & orthopnœa, aut si reijciatur sanguis, conuenientissimè bibuntur. Earum decoctum eisdem præbet effectus: tusæ cum fico duritias emolliunt, narium que polypo medetur: in aceto coctæ, & cum lupinis detritæ scabros unguis eijciunt: hernias intestinorum prolapsu erumpentes illitu reprimunt. Folia eadem præstant.

Pilulæ cum arboris coma suffitæ, culices abigere existimantur. Folia trita, & A
imposita, uulnera conglutinant, sanguinem supprimunt: trita ex aceto capil-
lum tingunt: illinuntur per se, aut cum polëta ignibus sacris, ulceribus quæ
serpunt, carbunculis, & oculorum inflammationibus: admota cū cerato sto-
machum corroborant. Dioscorides & Matthiolus.

EBVLVS longè humilior est sambuco, magisq; herbaceo generi assignã-
dum: caule quadrangulo, geniculato: folijs amygdalæ, ex interuallo longio-
ribus, geniculatim expansis, pinnatisq; graueolentibus, in ambitu ferratis:
muscario sambuci, flore & acino eiusdem: radice nititur longa, crassitudine
digitali. * Vis & usus exiccans, aluo detrahens aquam, stomacho inutilis. Fo-
lia olerum more coquantur, ad pituitam, bilemque detrahendam. Caules te-
neri in patinis cocti, eadem efficiunt. Radix in uino decocta, & in cibis data,
hydropicos adiuuat: prodest uiperarum moribus, eodem pota modo. uul-
uas emollit insidentium, decocto: patefacit eorum spiracula, & uicia corrigit.
Acini in uino poti, eodem funguntur munere: denigrat capillos illiti. Folia,
si prætenera ac mollia ex polenta illinantur, inflammationem mitigant:ambu-
stis, & canum moribus illitu profunt: ulcera quæ dehiscunt in fistulam, ag-
glutinant. ijs qui podagra tentantur, cum feuo taurino aut hircino profunt
illita folia. Nascitur in opacis, asperis & campestribus. Colligitur mense Iu-
nij & Iulij. Conseruatur per annum. Diosc.

CISTVS, quem aliqui citharon, aut cissaron uocant, ramosus frutex est, B
sed improcerus, foliosus: rotundis folijs, acerbis, hirsutis. flos masculo ut ma-
li punicæ, fœminæ albet. Nascitur in saxosis, asperis, & præsertim in monte
Apenino Hetruriæ. Conseruatur per annum. * Vis astringens: unde flores
in uino austero bis in die poti, profunt dysentericis, & nomas per se illiti co-
hibent: uetustati ulcerum, & igni ambustis cum cerato medentur. Hypocis-
tis rhobethron, aut Cytinus à nonnullis cognominata, iuxta cisti radices na-
scitur, floris punici similitudine. Quædam rufa, altera herbacea, tertia candi-
da. Præfertur subrufa. Liquatur acaciæ modo. Aliqui tamen exiccant, fra-
ctamq; macerant, & incoquant, reliquaq; ut in lycio prosequuntur. Animad-
uertendū est, ne hypocistidis loco, colligatur planta aliquantulum ei similis,
quæ uulgò cauda leonis uocatur: est enim orobanchè Dioscoridis. Vires a-
caciæ habet, uerum aliquantum magis siccatur, & astringit. Prodest dysenteri-
cis, cœliacis, sanguinem excreantibus: fœminarum profluuiio & pota, & in-
dita. Dioscorides.

HIERACIUM magnum caulem emittit asperum, subrubrum, spinosum,
cauum: folia ex interuallis rariuscule diuisa, similia soncho per ambitum: lu-
teos flores, in oblongis capitalis. * Vim refrigerandi habet, & modicè sub-
stringendi: unde illitum, stomacho estuanti, inflammationibusque prodest.
Succus erosionem stomachi sorbitione mitigat. Herba cum radice illita, ui-
bratis

A bratis à scorpione ictibus auxiliatur. Hieracium paruum, folia ex intervallis habet, diuisa in ambitu: cauliculos teneros, uirentes: in quibus lutei flores, orbem circinantes, emicant. Vim suam ad eadem, ad quæ superior, impendit. Vtrunque ubique nascitur. Dioscorides.

LYSIMACHIA, quam aliqui lytron appellant, caules emittit cubitales, altiores uel fruticosos, tenues: prodeuntibus geniculatim folijs, tenuibus, falicis figura, gustu astringentibus: flore rufo, aut aureo. Gignitur in aquosis & palustribus. * Foliorum succus adstringente sua ui, sanguinis reiectionem supprimit: dysentericis potui datur, aut infunditur: mensium abundantiam sistit, in pesto. sanguinis profluuio subuenit, si nares ea herba obturentur: uulnerum cruorem cohibet. Acerrimum nidore suffita reddit: qua de causa serpentes fugat, & muscas interficit. Dioscorides.

QUERCUS omnis adstrictoriam uim habet, præsertim liber, qui cortici & ligno intercedit: quinetiam tunica putamini glandis subiecta. Decoctum ex ijs datur dysentericis, cæliacis, sanguinem excreantibus. Trita in pesto feminis fluxione uulua laborantibus subijcitur. Glandes eosdem effectus exhibent: urinam eiunt: capitis dolorem, & flatu in cibum sumptæ pariunt: resistunt esitata uenenatorum ictibus. Decoctum earum, & corticis cum lacte uaccino potum, prodest contra toxica. Intritæ crudæ inflammationes illitu leniunt: ad duritias, quas cacoethe uocant, & malefica ulcera cum salsa axungia conueniunt. Iligneæ glandes uiribus quernas antecellunt. Fagus & Ilex quercus generi assignantur, & consimile munus obeunt. Iligneæ radices cortex cum aqua coctus, dum mollitus intrabescat, & tota nocte illitus, denigrat capillos, prius cimolia terra purgatos. Folia omnium tusa & trita tumoribus profunt, & imbecillas membrorum partes corroborant. Diosc.

ASTRINGUNT QUOQUE Absynthium, Amomum, Agnus castus, Bursa pastoris, Brassica cocta, Equisetum, Hedera, Helxine, Intybum, Lauri folia, Melilotum, Myrthus, Mentha, Oxalis, Polygonum, Pentaphyllum, Psillium, Plantago, Portulaca, Rata, Rhu obsoniorum, Semperuiuum, Salix, Verbascum, Vitex, Vitis, &c. de quibus singulis uide in superioribus, suis locis.

De folijs aperientibus.

CYCLAMINVS uulgò panis porcinus dicitur: folia habet hederæ, purpurea, uaria, in quibus supra infraque albicant maculae: caule nudo, quaternos digitos æquante: floribus in eo purpureis, rosarum effigie: radice nigra, & aliquantum lata, ut rapum uideri possit. * Quæ cum hydromelite pota, pituitam, aquamque detrahit: menses potu, apposituue ciet. Tradunt, si prægnans radicem transgrediatur, abortum fieri. Partum appensa accelerat: contra uenena, præsertim leporis marini, ex uino bibitur: illita contra serpentium ictus: remedio.

remedio est: immista uino, inebriat: regium morbum discutit, tribus drachmis pota, cum passo, aut diluto mulso. Sed oportet eum qui ebibit, multis uentibus contactum, loco calido, & a perfrictionibus tuto, recumbere, quò facilius exudet: eiectiones autem sudores fellei colore inueniuntur. Succus eius ad purgandum caput, naribus infunditur: ad deijcienda quoque alui excrementa, in uellere sedi subijcitur: illito umbilico, & imo uentre coxarum tenus, aluum emollit, & abortum facit: suffusionibus, & retusæ oculorum aciei, oblitus cum melle succus prodest. medicamentis abortum inferentibus admiscetur. Succus cum aceto illitus, prociduam sedem restituit. Exprimatur tusa radice succus, & ad mellis crassitudinem decoquitur. Radix cutem purgat, eruptiones papularum reprimat: uulneribus ex aceto per se, aut cum melle medetur, lienem absomit: uitia cutis in facie, & alopecias emendat. Eius decocto luxata, podagras, & capitis ulcuscula, pernionesque foueri congruum est: ipsaque in oleo uetere feruefacta, illito oleo ulcera ad cicatricem perducit. Cauata radix oleo expletur, & cinere feruenti imponitur, adiecto interdum Tyrrhenicæ ceræ momento, ut strigenti crassitudinem unguentum contrahat, cum primis utile parnionibus. Radix, scillæ modo, concisa reponitur. Narrant, ad amatoria assumi confusam, & in pastillos diuisam. Nascitur passim in syluis & umbrosis. Colligitur mense Octobris. Conseruatur per annum. Dioscorides.

APERIUNT quoque Ceba & Allium, &c. de quibus uide supra.

De folijs emollientibus.

EMOLLIUNT Atriplex, Althea, Cupressus, Laurus, Malua, Psillium, &c. de quibus uide supra.

De folijs indurantibus.

LENS palustris inuenitur in aqua non fluente, muscus lenticulæ similis, refrigeratoriæ naturæ. * Propter quod conuenienter collectionibus, igni sacro, & podagris illinitur per se, & cum polenta: glutinat & procidencia puerorum interanea. Diosc.

INDURANT quoque Portulaca, Psillium, Semperuium, Solanum, &c. de quibus uide supra.

De folijs extenuantibus.

EXTENUANT Artemisia, Chamomilla, Hyssopum, Iuniperus, Pulegium, Stæchas, &c. de quibus uide supra.

De folijs discutientibus.

DISCUTIUNT Abrotanum, Althea, Anethum, Adiantum, Atriplex, Brassica, Chamomilla, Liliij folia, Malua, Mentha, Melilotum, Origanum, Ruta, Stæchas, Sampsucum, &c. de quibus uide supra suo loco.

De fo-

A

De folijs extrahentibus.

ANAGALLIS officinis Morsus gallinæ dicitur. eius duo sunt genera, quæ tantum flore distant. nam quæ cœruleo flore est, fœmina dicitur: mas, quæ phœniceo. Frutices sunt parui, in terra iacentes: folijs in quadrangulo caule pusillis, subrotundis, ad helxinæ folia accedentibus: semine rotundo. herba uulgatissima. * Vtraque uim habet mitigandi, inflammationē arcet, adactos corpori aculeos extrahit, nomas cohibet. Succus earum gargarizatus, capitis pituitam purgat: & naribus infusus, dolorem dentium lenit, si in aduersam narem iniiciatur: argema cum melle Attico emendat: retusæ oculorum aciei auxiliatur: contra uiperarum morsus, iecinoris, & renum uitia, si ex uino bibatur, prodest. Tradunt eam, quæ cœruleum edit florem, proceduam sedem reprimere: quæ uerò phœniceum, illitu euocare. Dioscorides.

EXTRAHVNT quoq; Aristolochia, Dictamnus, Porrû, Thapsia, Cyclaminus, &c. de quibus singulis uide suprâ suo loco.

De folijs suppurantibus.

SMYRNIUM caulem habet apij, & stolones multos: folia latiora, suppinguia, ad terram infracta, robusta, odore medicato, cum quadam acrimonia iucunda, colore in luteum languescente: capitibus caulium orbiculatis, ut anethi: semine brassicæ, rotundo, nigro, acri myrrhæ sapore, ita ut alterû alterius loco cedat. * Radix quoque odorata, gustu acri, fauces mordet, succosa, mollis. Cortex eius foris niger, intus uiridis, aut subalbidus. Nascitur in saxosis, & collibus, atque squalidis, & limitibus terrenis, & hortis. Colligitur mense Iunij uel Iulij. Conseruatur per annum. Vis radices, herbe & seminis, excalfacere. Folijs muria maceratis ad obsonia utuntur: aluum sistunt. Radicem contra serpentium ictus bibere cõuenit: tusses, & orthopnoeas mitigat: urinæ difficultati medetur. Illita recentes tumores, collectiones, duritiasq; discutit: uulnera ad cicatricem perducit, partus abortu uitiat, si feruefacta subijciatur: tumores suppurat. Semen lienis, renum & uesicæ uitij prodest: menses & secundas pellit. cõmodè datur ischiadicis in uino: inflationes stomachi lenit: sudores ciet, & ructus. Peculiariter datur hydropicis in potu, & contra febrium circuitus. Dioscorides.

SVPPVRANT quoq; Althea, Amomum, &c. de quibus uide suprâ.

De folijs abstergentibus.

LICHEN, qui saxis est familiaris, aliquibus bryon appellatur: aspergino sis petris adhæret, ut muscus. * Is illitus sanguinis profluuia sistit, inflammationes arcet, impetigini medetur. Iuuat regio morbo correptos, cum melle illitus: oris & linguæ defluxiones inhibet. Abstergentem, ac modicè refrigerantem facultatem habet, utramque uerò resiccantem. Dioscorides & Galenus.

o ABSTER-

ABSTERGUNT quoq; Anagallis, Abrotanum, Asparagus, Asplenos, Atriplex, Absynthium, Beta, Chamæpytis, Cassutha, Marrubium, Parietaria, Salicis folia, &c. de quibus singulis uide suprâ suo loco.

De folijs glutinantibus & cicatricem ducentibus.

FRAGARIA planta nemini ferè nō cognita. * Refrigerat ordine primo, ficcâtq; secundo. Folia & radix uulnera & ulcera sanant: muliebres fluxus, & dyfenterias cohibent, urinam cient, & lieni conferūt. Herbae & radicum decoctum potum, auxiliatur iecinoris inflammationibus, mundatq; renes, & uescam. Idem ore contentum, collutionisq; modo agitatam, gingiuas roborat, dentes commotos firmat, & destillationes sistit. At fraga præter id quod gustui astate in cibis arrideant, biliosis, æstuantibusq; uentriculis profunt, siticulososq; sitim sedant. Vinum quod exijs elicitor, ulcusculis, quæ in facie à caliditate proueniunt, mirificè medetur: item quæ uaros, & oculorum nubes, calidasq; defluxiones impositum tollit. Matthiolus.

ISATIS seu Glastum satiuum, quo infectores lanarum utuntur, folium habet plantaginis simile, uerū pinguius, nigriusq;: cuius caulis duūm cubitorum altitudinem excedit. * Illita folia tumores omnes discutiunt, cruenta uulnera glutinant, sanguinis profluvia sistunt: ignem sacrum, phagedœnas, putrescentia ulcera, & quæ serpunt, sanant. Syluestre glastum satiuo simile est. Folia fert maiora, lactucaceis proxima: caules tenuiores, multifidos, quadantenus rubentes, in quorum cacumine folliculi multi dependent, quandam linguarum offigiem referentes, in quibus semen: flore tenui, luteo. Eadem, quæ & suprâ dicta, præstat: potu & illitu lienosis auxiliatur. Dioscorides.

SANICULA exit folijs pentaphylli maioribus: radice candida, tam miro naturæ ipsius artificio nodulis ac lacinijs quibusdam elaborata, ut nō parum admirentur, qui tantum naturæ opus diligenter intuentur. * His utuntur in potionibus ad enterocelas, & ad interna uulnera, præsertim ad ea quæ in thoracis cauitatem penetrauerint. Plura insuper saniculæ ostendunt genera, quorum unum folium fert plantaginis magnitudine, sed crassiora, ueluti fabariæ uulgò uocata, lacinijs circum magno artificio factis à natura, colore in album flauescente. Hoc cæteris præferunt ad enterocelas, & thoracis uulnera, si quotidie in potu sumatur: quin & ad alia uulnera, tam intus sumptum, quàm exterius illitum. Nascitur in campestribus, syluis, montib. &c. Matthiolus.

TORMENTILLA folio pentaphylli minore, septenis incisuris diuiso: radice breui, nodosa, compacta, rubeo colore, sapore adstringenti: cauliculis tenuibus, subrubentibus: flore melino, ad eò ut in pentaphylli genere sit reponenda. Sunt qui à septenis foliorum diuisuris Heptaphyllon hanc uocent.

A uocent. * Herbarij compertum habent, hanc iisdem pollere facultatibus quibus Bistorta prædita est. Quamobrem utræque urinæ incontinentiam supprimunt: sistunt menses. si in earum decocto ad umbilicum usque conlederint fœminæ. Idem præstant (de radicibus tamen intellige) si tritæ, & ex melle atque spica subactæ, uentri ac pubi illinantur. Sanguinem è uulneribus manantem cohibent, superaspero earum puluere. Qui item potus biliofas coerces uomitiones, si ouorum albo exceptus super fictili tegula inassetur, mox comedatur. Aqua quæ ex his duplici organo elicitor, siue è radicibus decoctum, uenenis omnibus remedio est. Ex quo tantum apud nonnullos tormentillæ inualuit usus, ut ex eius radicibus etiam medicamenta componant aduersus pestilentiam. Utræque dysentericos sanant, & uulnera glutinant, præsertim quæ in intestinis & uisceribus fuerint illata, non modo ipsis uulneribus illitæ, sed & in potionibus haustæ. Rebellia, contumaciaque ulcera curant, & ea sistunt, quæ serpendo corpora erodunt. Mathioli.

GLVTINANT quoque Althea, Anagallis, Cétaurium, Chamæpitys, Chamædryd, Equisetum, Eupatoriū, Ebulus, Myrthus, Plantago, Quinquifolium, Symphitum maius, Verbenaca, &c. de quibus singulis uide supra suo loco.

B

De folijs flatu discutientibus.

SESELI Mafsiliense folia fœniculi habet crassiora: caulem uegetiorem, umbellam anethi, in qua semen oblongum, angulosum, degustanti statim acre: radix longa est, iucundi odoris. * Semen & radix excalfaciendi uim habent. Potu stranguriæ & orthopnœæ medentur: suffocationibus mulierum, comitialibusque profunt: menses & partus trahunt: ad omnia interna mala polleat: tulsim ueterem sanant. Semen cum uino potum, concoquit & tormina discutit: epialis febribus utile. contra perfrictiones in itineribus, cum pipere & uino bibitur. Capris ceterisque pecudibus datur in potu, quò facilius suos fœtus enitantur. Aethiopicum seseli, folia habet hederæ minoræ, & ad periclymeni modum oblonga. frutex nigricat, palmitibus in bina cubita extensis: ramis sesquipedalibus: capitulo anethi: semine in tritici modo denso, nigro, amaro. Mafsiliensi odoratiore & acriore, multum suauis. Peloponnese folia habet cicutæ, latiora & crassiora: caulem supra Mafsiliensis magnitudinem, ferulaceum: & latam in cacumine umbellam, in qua semine latius, odoratū, & carnosius pendet. Eisdem uiribus præditū est. Nascitur in asperis, riguis, & collibus. inuenitur etiamnum in insulis. Creticum seseli, iuxta Ciliciam in Amano monte nascitur, herbula surculosa, semine duplici rotundo, scutulorum effigie, odorato, subacri. Contra urinæ difficultatem bibitur: potu cit menses. Succo seminis, caulisque uirentis, ternis obolis ex passo decem diebus

o 2 diebus

diebus hausto, renes sanantur. Efficax est radix ad ciendas pectoris excrea- **A**
tiones, in delinctu cum melle. Diosc.

DISCVTIVNT quoque status, Absynthium, Anethum, Apium, Chamomilla, Epithymum, Fœniculum, Iuniperus, Allium, Maiorana, Origanū, Petroselinum, Squinanthum, Spica nardi, Smyrnum, Ruta, &c. de quibus singulis uide supra suo loco.

De folijs semen generantibus.

HORMINVM, Sclarea, Matrifaluia, fatiua, herba est folijs marrubio similis: caule semicubitali, quadrangulo, circa quem eminentiæ filiquis similes prodeunt, quæ ad radicem spectant, in quibus diuersum semen recluditur. Siquidem in syluestri rotundum, fuscumque inuenitur: in altero nigrū & oblongum, cuius est usus. Nascitur in hortis. Colligitur mense Iunij. Conseruatur per annum. * Ad uenerem stimulamdam, cum uino bibi uolunt. Purgat cum melle argemas, albuginesque: illitum ex aqua tumores discutit: eo etiam extrahuntur aculei ex corpore. Idem effectus est illitæ herbæ. Syluestre Gallitricum officinæ uocant: magis uiribus pollet. quare unguentis, præsertim gleucino, permiscetur. Nascitur passim in pratis. Dioscorides & Matthiolus.

ERVCA tam fatiua quàm spontè nascens, uulgaris admodum planta est, **B**
quòd frequentissimè in cœnis acerarijs inseratur. * Excalfacit manifestè. Uenerem largiore cibo concitat. Semen eius idem præstat, urinā cit. concoctio ni prodest, aluo perquam accommodata. Semine ad condimenta utuntur: muris aranei morsibus medetur. Ventris tineas enecat, lienemque extenuat. Tritum & cum felle bubulo mistum, nigras ulcerum cicatrices ad candorem reducit. Cum melle uerò perunctum, uitia cutis in facie emendat, & lentiginis emaculat. Herba, si sola edatur, caput magis dolore afficiet. Dioscorides & Galenus.

De folijs menses mouentibus.

ALISMA, alij Damasion appellant: folia ei plantaginis, nisi angustiora essent, laciniosa, conuexaque in terram: caule simplici, tenui, cubito altiore: capitibus thyrsi: flore tenui, candido, pallecente: radicibus tenuibus, ut ueratri nigri, acris, odoratis, modicè pinguib. aquosos amat tractus. * Radix, si drachma una aut altera bibatur, his conuenit, qui leporem marinum deuorant, aut à rubetis ranis demorsi sunt, aut opium hauserunt: torminib. atque disenteria per se, aut cum pari modo feminis dauci, potui datur. cōuulsis, & contra uitia uulvæ prodest. Herba sistit aluum, menstrua pellit, tumores illita mitigat. Dioscorides.

HYPERICVM alij Androsæmon, alij Corion, alij Chamæpityn appellant,

A lant, quoniã semen odore resinã imitatur: surculaceo frutice, dodrantali, rubescente: folio rutã: flore luteo, leucoio simili, qui digitis attritus sanguineũ succũ remittit, qua ex causa androsæmon cognominatur: subhirsuta liliqua, & in rotũdo oblonga, hordei magnitudine: semine intus nigro, resinosi odoris gignitur in locis cultis & asperis. Colligitur mense Iunij. Cõseruatur per annum. * Vrinam cit, menstrua pellit appositum: tertianis quartanisq; cum uino potum liberat. Semen quadraginta diebus haustum, ischiadicis medetur. Folia cum semine illita, ambusta sanant. Dioscorides.

HELICHRYSO N, quidã Chrysanthemum, nonnulli & id amarãton uocãt, quo deorũ simulacra coronãt. Ramulum habet cãdidum, uirẽtem, rectũ, firmum: folia intercedentibus spacijs angustã, abrotono similia: comã aureã lucis, in orbẽ: umbella rotunda, ueluti siccis corymbis dependẽtib; radice tenui. Nascitur in asperis, & torrentium alueis. * Contra serpentium ictus, coxendicum dolores: urinẽ stillicidia, ruptãq; coma è uino pota opitulatur: ciet menses. Sanguinem concretum uentris ac uesicã absomit, pota cũ mulso: ieiunis trium obolorum pondere, sistit destillationes, data in uino albo diluto. Vestibus inseritur, ut eas ab erodentium iniurijs tueatur. Dioscorides.

MENSES quoque mouent, Asarum, Abrotonũ, Allium, Adiantũ, Amomum, Absynthium, Arthemisia, Ammi, Brassica satiuã, Betonica, Centauriũ, Chamomilla, Calamintha, Chamædrys, Cassutha, Cyclaminus, Distamnus, Daucus, Gingidium, Feniculũ, Lapathũ, Maiorana, Marrubiũ, Melissa, Nasturtium, Origanũ, Ocimũ, Pulegiũ, Poliũ, Petroselinũ, Oreoselinũ, Raphanus, Ruta, Rosmarinus, Smyrniũ, Salvia, Sabina, Sefeli, Serpyllũ, Scordiũ, Trifoliũ, Vitex, Vrtica, Thymus, &c. de quibus singulis uide suprà suo loco.

De folijs menses sistentibus.

LIMONION folia habet betã, tenuiora & longiora, decem, sæpe plura: caulẽ tenuẽ, rectũ, lilio æqualẽ, seminib; rubris scatẽtẽ, quẽ gustata astringũt. * Semẽ tritũ, & ex uino acetabuli mẽsura potũ, dysẽtericis, cœliacisq; pdest: rubra fœminarũ profluuia sistit. Nascitur in pratis, & palustribus. Dioscor.

RVBVS noticiã uulgaris est. * Vim habet siccãdi & astringendi: capillũ tingit, Ramorum decoctum, potu aluum sistit, & fœminarum profluuia præsteris morsui accommodatissimum. Gingiuas firmat, & oris uitijs medentur folia commãducata: cohibent ulcera quã serpũt: ulceribus in capite manãtib; oculisq; prociãtib; remedio sunt: cõdylomatis & hæmorrhoidib; folia illinũtur. cardiacis & stomachi doloribus, trita cõuenienter imponũtur. Caules cũ folijs tundũtur, exprimiturq; succus, mox sole cogitur, singulari remedio contra omnia, quã modò dicta sunt. Mori in rubo nascentis quã optimẽ maturi succus, ad oris medicamenta conuenit. Sistitur aluus præmaturi cibo, nec non flore in uino potu. Dioscorides.

SISTUNT quoque menses Bursa pastoris, Fragaria, Hyosciamus, Lyf-
machia, Myrthus, Nymphaea, Plantago, Semperuium, Symphitum, Sola-
num, &c. de quibus singulis uide supra suo loco.

De folijs uenenis resistentibus.

ERYSIMON, Latini **IRIONEM** uocat, iuxta urbes, rudera, hortosq;
nascitur: folijs erucae syluestris: cauliculis in lori modum lentis, & obsequio-
fis: floribus luteis: siliquis in cacumine gracilibus, ut fœnogræco, cornicula-
tis: semine nasturtij, exiguo, urentis gustus. * Contra thoracis fluxiones ef-
ficax est, & si purulenta extusiuntur: regio morbo, & coxendicibus prodest:
contra uenena in delinctu cum melle datur. Illinitur ex aqua aut melle uti-
liter cecis carcinomatibus, parotidibus, duritijs mammarum, & testium inflam-
mationibus. In totum extenuat, & exalfacit. Mitius multo ad clysteres fiet,
si aqua madescat, atque torreatur, uel linteo illigatum, pinsita farina oblitum
perassetur. Dioscorides.

LEVISTICVM, quod Dioscorides **LIGUSTICVM**, Galenus **LY-
BISTICVM** nominat, quamuis pleræque plantæ multis partibus sint simi-
les: nulla tamen adhuc reperta est, quæ eius omnibus notis respõdeat. Itaq;
loco eius Leuisticus vulgaris, aut Cuminũ accipiendũ est. Nascitur passim
in hortis vulgaris. Colligitur mense Iulij. * Radicis seminisq; ueri ligustici uis
exalfactoria, concoquens. Prodest ad intestinos dolores, tumores, cõcoctio-
nes: item ad inflationes, præsertim quibus stomachus turgeat: & contra ser-
pentium ictus: urinas & menses potu trahit. Eisdem præstat effectus appo-
sita radix. Semen cum radice oxyporis, & medicamentis decoquẽtib; ad-
miscetur. ori perquam utile: quare pro pipere utuntur eo indigenæ ad obso-
nia. Adulteratur semine quodã simili: quod facillè gustu discernitur: amarum
enim est. Alij semen fœniculi aut fœveli admiscentes, ligusticum dolo uitiant.
Dioscorides & Florentini.

VENENIS quoq; resistent Abrotanum, Abfynthium, Allium, Adiantũ,
Apium, Brasica, Betonica, Carduus benedictus, Chamædrys, Cyclaminus,
Calaminthæ, Eupatorium, Fœniculum, Juniperus Marrubium, Origanum,
Pulegium, Polium, Ruta, Scordium, &c. de quibus singulis uide supra.

De folijs strumas discutientibus.

APARINE ramis multis & paruis fruticat, asperis, quadrangulis, per in-
terualla orbiculato foliorum ambitu, ut in rubia: flos albus: semen durum,
rotundum, cõcauum, album, umbilici figura, asperitate uestium tenaci. * Ea
pastores coli uice utuntur ad eximendos. è lacte pilos. Seminis, caulium, ac
foliorum succus, potu contra uiperarum, phalagiorumq; morsus auxiliatur:
infusu aurium dolori medetur. Herba cum axungia trita, strumas discutit.
Dioscorides.

GALLIOPSIS, seu urtica sætida, frutex in totũ caulem & folia habet
urticæ

DE FOLIIS SEV HERBIS VENENOSIS. III

A urticæ læuiores, & quæ grauem odorem trita reddant: flore purpureo, tenui. Nascitur circa sepes, ædificiorum areas, ac semitas ubique. * Folia, caules, semen, succusq; durities & careinomata dissipant: strumas, panos, & parotidas discutunt. Oportet bis die tepidum ex aceto cataplasma imponere, & eius decocto fouere. ad putrescentia, gangrænas, & nomas, cum sale efficaciter illinuntur. Dioscorides.

DISCUTIUNT quoque strumas, Adiantum, Althea, Lupinum, Lappathum, Melissa, Nasturtium, Pentaphyllum, Scordium, &c. de quibus singulis uide suprâ suo loco.

De folijs dolore mitigantibus.

ASCLEPIAS ramos emittit longos: folia hederæ longa: radices numerosas, tenues, odoratas: floris uirus graue: semē securidacæ. Nascitur in montibus. * Radices ex uino potæ torminibus auxiliantur, & contra serpentium ictus. Folia aduersus uulnæ, mammarumq; ulcera, quæ cacoethe uocant, illinuntur. Dioscorides.

DOLOREM quoque mitigant seu leniunt, Anethum, Absynthium, Atriplex, Chamæmelum, Calamintha, Centaurium maius, Chamæpitys, Hyosciamus, Lybisticum, Lupulus, Peucedanum, Petroselinum, Rosmarinus, Ruta, Sisymbrium, Serpyllum, Sampsucû, &c. de quib. singulis uide suo loco.

De folijs seu herbis uenenosis.

B ACONITVM statim in lingua inter bibendû, cû astrictiõe quadã dulcescit: & subinde potissimum cû exurgere conatur, uertigines offundit: lachrymas ciet: grauitatem pectori & præcordijs adfert, simulq; cerebri spiritus diffiantur. Quare uenenû uomitione abigi, aut clystere per aluû egeri opus est. Utimur inter propinadû origano, ruta, marrubio, uel absynthij decocto, cû uino absynthite, uel semperuino, uel abrotano, chamelæa, aut aiuga. Prodest etiamnum opobalsami drachma, cum melle aut lacte, cum castoreo, pipere, & ruta, æquis ponderibus ex uino: coagulum hœdi, leporis, aut hinnuli cû aceto: ferri quoq; stercus, itē uinû in quo aurû, ferrû, argētû cādens restinguatur. potû, lixiuiaq; cû gallina & uino decocta, aut carniû bubularû ppinguiû iura, cum uino sumpta Fertur & aiuga priuatim ipsis subuenire. Diosc.

CICUTA pota uertiginē excitat, oculisq; caliginē offundit, ita ut ne nimû cernatur: singultus ciet, mētē turbat, extremi artus gelatur: deniq; conuulsi, suppresso arteriæ spiritu, strâgulatur. * Quare inter initia, cicutâ uomitu excutiemus: postmodû deiectionē moluemur, ut quod ad intestina plapsum sit, excernamus: tû demû in meracâ potionē, quæ maximo est auxilio, deueniemus. repetendû p interualla, in quib. pderit, lac asininû aut bubulû potui datû, ut absynthiû cû pipere & uino, castorio, ruta, mentha cû uino, aut amomi, cardamomi, aut styracis uncia, aut piperis, cû semine urticæ & uino, aut lauri folia, itē laser ex oleo & passo, & passû p sese largius potû pfiat. Diosc.

DORYGNI

DORYCNIVM, quod aliqui manicon Solanū appellarūt, epotū, lactis **A** faporē in gustu refert: * continentēs singultus ciet, humor linguā uexat, sanguis cōfertim reijcitur: mucosa quædā perinde quasi dysentericis, aluo egeruntur. Itaq; antequā aliquid ex ijs eueniat, auxilio sunt uomitus, clyster, & quæcunq; potū uenenū expellere possunt. Priuatim ijs opitulatur aqua mulsa, lac caprillum, aut asininū, dulce uinū, quod tepidum cum aniso bibatur, amygdalæ amaræ, gallinacea pectora decocta. Quinetiā cochilia omnia, tam cruda quā tosta esse, salutare est. Conueniunt & locustæ marinæ, & gamma ri, & pota eorundem iuscula. Dioscorides.

HYOSCYAMVM potum, aut comesum, similem ebrijs abalienationē mouet: sed faciliē medicamentis cedit. * Auxiliatur aqua mulsa copiosè data, lacq; præfertim asininum: si id desideratur, caprillum uel bubulum, uel aridarum ficuum decoctum. Faciunt ad id etiā nuclei pinei, aut cucumis semen ex passo sumptum, & uinum falsum, cum adipe suilla recenti, passoq; itidem urticæ semen, aut nitrum ex aqua, & intubus erraticus, & sinapis, & nasturtium, radix, cepa, & allium: & hæc singula cum uino sumantur. Postea sinendi quiescere, quemadmodum qui uinum biberunt, ut excoquant. Dioscorides.

Quod **CORNICVLATVM PAPAVER** appellant, & potu, & cibo eadem inferre consuevit, quæ papaueris succus seu meconiū: nec alijs expugnatur auxilijs. Quare uide in meconio. **B**

Quod **PHARICON** uocant, sapore syluestre nardum imitatur. * Resolutionem neruorum potum adfert, cum cōuulsione & delirio. Oportet autē post uacuationes uinum absynthiten potui dare, cum cinnamomo aut myrrha, aut nardo Gallico: aut spicæ nardi duas drachmas, & myrrhæ totidē obolos, cum passo: aut irim cum croco ex uino: de rasumq; que caput illinire herdeacea farina cum aceto, & trita ruta. Dioscorides.

SMILAX, à quibusdā tithymalum, à Latinis taxus appellatur. * Frigus uniuerso corpori, strangulatus, & celerem interitum infert. Cui eadem quæ cicutæ conueniunt. Dioscorides.

THAPSIA strangulatus concitat, aut immodicas deiectiones. * Nimos deiectionum impetus, medicamentis, quæ excrementa supprimunt, coerebimus. Neque negligenda quæ parum quidem nocere uidentur, interim uerò uitam in discrimina agūt. Quo in numero sunt syluestris ruta, gith, nouæ glacies, pappi recentes: flores autem sunt eius spinæ quæ cactos dicitur. Eos qui sumplerint, sola uomitio recreat. Strangulatibus aut ea medentur, quæ infrā in fungorum mentione retulimus. Dioscorides.

TOXICVM ex eo nominari uidetur, quòd barbarorum sagittæ eo illinebantur. Qui biberint, labiorum & linguæ inflammatione torquentur. Incoercitus furor uarias ijs imagines obuerset: quare uix medicinæ locus

DE FOLIIS PURGANT. BILEM FLAVAM. 113

A locus est, raroq; qui hauserunt, euadent. * Vinculis ergo cohibendi, aut uinum dulce cum rosaceo bibere, & reuomere cogantur: rapi semen bibendum cum uino. Priuatim ijs cōuenit quinquefolij radix, & hircinus sanguis, aut caprillus, eodem modo sumptus: roboris, fagi, aut ilicis cortex cum lacte tritus: malaq; cotonea trita esse, aut cū pulegio & aqua bibere, cōueniet: amomū & balsami semē ex uino. Sed qui periculis defuncti sunt, diu lecticis decūbunt: & ubi surrexere, stupidi reliquū uitæ tempus degunt. Dioscorid.

De folijs purgantibus bilem flauam.

LUPVVS SALICTARIVS seu lupulus, folia habet aspera, cucumeris modo: flores exilibus folliculis squamatim compactos, racematimq; dependentes, colore subcinereo. Nascitur in sepibus. Colligitur mense Martij, uel Aprilis. Dosis decoctionis magnæ est circiter ʒ. iij. Et infusionis eius in aqua casei potio est circiter lb. j. * Flauam bilem detrahit, sanguinem ab ea expurgat, & eius inflammationes extinguit. Sero caprino maceratus, ualentior redditur. Succus cum saccharo decoctus syrapi modo, regio morbo laborantibus medetur. Iecinoris & uentriculi ætus mitigat. Syrupus ex saccharo & eius succo paratus, utilissimè exhibetur in febribus à bile & sanguine excitatis. Mesue.

MERCVRIALIS, Græcis Linozostis, aliquibus parthenion appellatur. **B** folijs constat ocimi, helxinæ cognatis, sed minoribus: ramulis duplici geniculorum modo cinctis, alarum cauis multis. fructu fœminæ copioso, quandam racemorum speciem præbente: mari è foliorum sinu dependente, paruo, rotundo, ceu binis testiculis unâ cohærentibus: frutice dodrantali, aut maiore. Nascuntur passim in campestribus cultis. Colligitur æstate. Conseruatur per annum. * Vtraq; in oleribus manditur, ad aluum ciendam. cocta in aqua, epoto iure, bilem aquamq; detrahit. Constat ut mares gignantur, hunc facere: ut fœminæ, illam, si à purgatione bibantur, & trita folia genitalibus admoueantur. Menses secundasq; ciunt, uulua cum melle, uel rosaceo, uel irino admota. Epiphoris, stranguriæ, & uesicæ, folia aluo imposita conueniunt. Aluo quidem soluendæ, uel in febre, decoquitur quantum manus capiat, in duobus sextarijs aquæ ad dimidias, bibitur sale & melle admixto, nec non cum ungula suis, aut gallinaceo decoctum salubrius. Thoracem purgant, bilem detrahunt, sed stomachum lædunt. Dioscorides & Plinius.

PERSICA arbor notissima: * cuius folia & flores, in aqua calida, sicut rosarum & uiolearum macerati, in zulapium, uel serapium rediguntur, ad uentrem subducendum, & bilem expurgandam efficaes, unciarum duarum instar. Andernacus.

PURGANT quoq; bilem flauam, Absynthium, Centaurium, Malua, &c. de quibus uide suprâ.

De folijs purgantibus bilem atram.

SENA folijs constat glycyrrhizæ, crassis, subpinguibus, fabarum sapore, caule cubitali, à quo ramuli exeunt, in lori modum flexibiles. Flores emicant aurei, ueluti brassicæ, purpureis intercurfantibus uenulis: quibus succedunt folliculi falcati, adeoq; natura compressi, ut superior membrana inferiori cohæreat, in quibus semen continetur in nigro subuiescens, uuarum uinaceis usque ad eò simile, ut non faciliè primo oculorum intuitu alterum ab altero discernatur: folliculi è ramusculis prominent, tenui pediculo appensi: quò fit, ut maturescentes paruo uentorum flatu faciliè decutiantur. Planta est frigoris impatiens, ob idq; seri uult Maio, nec ultra autumnum perdurat: siquidem prius sata faciliè frigore deperditur, serius uerò hyemem similiter non tolerat. Præstat quæ ex Alexandria Ægypti, uel ex Syria affertur. Folia autem uiridia sunt præstantiora subalbidis & tenuibus. * Calefacit initio secundi ordinis, siccatur primo. Terget, expurgat, digerit. Educit per inferna bilem tum atram, tum flauam, & pituitam. Mundat cerebrum, cor, iecur, lienem, pulmonem, & omnes corporis sensus, confertque omnibus eorum incommodis. Viscerum obstructions aperit, auget iuuentutem, seniumque retardat, & animi hilaritatem affert. Folia in capitis perfusionibus utiliter decoquantur, præsertim addita anthemide. Roborat enim hoc modo cerebrum, nervos, oculorum aciem, & auditoriam facultatem. Optima est medicina morbis omnibus diuturnis, & melancholicis, ut delirio, amentia, scissuris totius corporis, resolutioni neruorum, phthiriasi, cephalalgia, scabiei, pustulis, pruritu & epilepsia. Cor etiam roborat: si tamen ijs potissimum commisceatur medicamentis, quæ ipsum maximè confirmant, ueluti uiola. Datur commodè prægnantibus, & pueris, & cuiuscunque ætatis hominibus. Dilutum tamen magis præstat, quàm decoctum, quòd nulla ex parte exhalet: cuius uncia quinque uel sex aluum modestisimè, & sine molestia soluunt. Redditur medicamentum hoc in deijcienda aluo præstantius, atq; ualentius, si calisæ nigrae, aut mannae, aut rhabarbaro, aut rosarum diluto, aut syrupo rosato solutiuo cõmisceatur, aut si maceretur sena caprino sero. Corrigitur zingibere, uel sale gema. Dosis eius diluti est ab ʒ.ʒ. usq; ad ʒ.ʒ. pulueris uerò à ʒ.ʒ. usq; ad ʒ. duas. Matthiolus & Mesue.

FUMARIA, herba uulgaris admodum noticiæ, officinis passim uocatur. Fumus terræ: cuius descriptionem uide supra. Præstat quæ uirentior, folijs extēsis, nõ crispis, & quæ uiolaceo sit flore. Nascitur in hortis & segetibus. Colligitur uerno tēpore, & ex ea succus exprimitur. Cõseruatur aut per annum. Potio succi ipsius est ab uncia semi usq; ad ʒ.ʒ. & decoctionis eius ab ʒ.ʒ. usq; ad ʒ. xv. & pulueris eius à ʒ.ʒ. usq; ad ʒ. v. * Aluum soluit leuiter absquo ulla noxa, bilem trahit atq; humores adustos. Eius uis non modò ad hepar, sed ad uenas diffunditur. Quã obrem sanguinè expurgat, omnibusq; incommodis

DE FOLIIS PURGANTIB. ATRAM BILEM. 115

A modis medetur, à bile, aut exustis humoribus prouenientibus. Medetur elephantiassi, aduersus carcinomata efficax est: lichenas, & alia cutis uitia, mirificè emendat: quin & omnibus morbis auxiliatur, qui ex uiscerum infarctu originem ducunt. Roborat fumaria uentriculum, iecur, & cetera interna uiscera, biliofasq; finit febres, quemadmodum & eas, quæ ex uasorum obstructione excitantur. Roboratur deiectionis eius facultas, quòd non admodum sit ualentior, additis myrobalanis, fena, caprino sero, infectorio cocco, aut uuis pallsis. Mesue & Matthiolus.

EPITHYMYM planta est cassuthæ similis, aut cassutha in thymo nascens, & illud cincinnis suis ambiens. Cum autem hoc tempore thymi copiam non habeamus, caremus etiam epithymo. Illud autem quod uulgò in usu est, epithymbra est, quòd in thymbra, quæ thymi nomine usurpatur, crescat. Hac autem hodie ueri epithymi loco uti possimus: nam easdem facultates habet, aliquantò tamen debiliores. Quod ex Creta adfertur, epithymbra etiam uidetur: epithymum enim non est, tametsi nostrate melior. Seruatur per annum. Potio eius in decoctione est à drachmis quinque usque ad uiginti: & pulueris eius à drachmis tribus usque ad septem. * Atram bilem ceteris medicamentis ualentius excernit, idq; faciliè, & citra ullam molestiam præstat. Efficax est ad morbos cerebri, nempe melancholiam, epilepsiam, diurnos capitis dolores, aliasq; atrabiliaris ægritudines. Confert cordis

B tremoribus, & animi deliquijs. Præterea cunctis lienis affectibus mirè opitulatur: item renum uitijs, & hypochondriaca melancholia uexatis. Frequens epithymi usus: datur enim utilissimè aduersus carcinomata, elephantiasin, & ad ulcera maligna & atra. quin & quartana febre detentos liberat. Corroboratur eius operatio, multiplicatione quantitatis ipsius, & additis myrobalanis Indis, aut hellebori nigri momento, aut sero caprino. Mesue, Matthiolus & Medici Florentini.

PURGANT quoq; atrâ bilem, Cuscuta, &c. de qua uide suprâ suo loco.

De folijs purgantibus pituitam.

GRATIOLA nihil aliud est quàm Mesuæ Eupatorium: herba est cubitalis, eximie amaritudinis, folijs centaurij parui, uiridibus, asperis, incis, caule tenui, quæ siccata flauescit, floribus subluteis, oblongis. Quibusdam herba pulicum dicta, ob lentorem ei adhærentem: * calida est gradu primo, sicca secundo, duplici quoq; constas substãtia: calida tenui, qua bilem & pituitã faciliè purgat, tenuat, incidit, terget, expurgat, putredinè prohibet, resoluit sine attractione, obstructions tollit, & morbos ab his natos sanat, febribus diurnis mirè subuenit. Altera est terrea, adstringens, qua uentriculũ, hepã, & cetera uiscera cogendo roborat. Cũ sero lactis efficacius purgat, per se enim est imbecillum. Herba colligitur, succus exprimitur, ut ex absynthio.

fine ueris. Decoctum eius datur ab uncijis quatuor ad ̄ vj. puluis à drachmis A
duabus ad drachinas tres. Eius penuria absynthij & asari ana pondus di-
midium. Mesue.

PEPLVS frutex est lactei succi plenus, folijs paruis ut rutæ, paulo latioribus: rotunda coma, ferè dodrantali, humi respersa: semine sub folijs paruo, rotundo, minore quàm candidi papaueris. Pluribus scater auxilijs. Vnicam radicem habet, superuacuam, ex qua fruticat. Nascitur inter uites, & in hortis. Colligitur melsibus: siccatur in umbra, & continuè uersatur. Fructus tussus, & feruefactus reconditur. * Bilis ac pituita detrahitur acetabulo eius in hydromelitis cyatho poto. Obsonijs inspersa conturbat aluum. muria conditur. Dioscorides.

DAPHNOIDES, officinis laureola dicitur, cubiti altitudine fruticat, ramis flexilibus, obsequiosisq; multis, à medio sursum uersus foliosis: cortex supra modum uiscosus ramos uestit: folia lauri, graciliora & molliora, fractu contumacia, quorum gustatu os & fauces incenduntur: flores candidi: bacca cum ematur uerit, nigra: radix inutilis. Nascitur in montosis. * Pituitam extrahit folium recès, uel aridum in potu: menses ciet, & uomitum: caput inanit commanducatum: sternutamenta mouet. Baccæ quindecim potæ aluum resoluunt. Dioscorides.

De folijs serofos humores purgantibus.

SAMBUCI duo genera. Vnum in arborem assurgit, surculos spargens arundinaceos, teretes, cauos, candicantes, proceros: folia iuglãdis, terna quaternae ue, ex interuallis circa ramos exeunt, graui odore, minutim in ambitu secta: & in ramulorum cacuminibus, cauliculisq; circinatae umbellæ, quæ florem candidum pariunt: mox acinum terebintho similem, in nigredine subpurpleum, racemosum, succo madentem, uinosumque. Alterum genus Chamaeactæ uocatur, Romanis Ebulus: de quo uide supra. Nascitur in hortorum & uinearum sepibus. * Vis eadem ac Ebuli. Dioscorides.

CHAMELAEA surculosa fruticat, ramis dodrantalibus: folia oleæ similitudinem habent, tenuiora, & amara, quæ gustatu linguam mordent, & arteriam deradunt. * Detrahit pituitam, bilem q; folijs præsertim in catapotio deuoratis. namq; duæ absynthij partes, adiecta chameleæ una, hydromelite excipiuntur, & in catapotia coguntur. ea autem in uentre non liquefunt: siquidem quotquot tuere deuorata, regeruntur. Folijs cum melle tritis, sordida ulcera & crustosa repurgantur. Dioscorides.

ESVLA herbarum lactarium species, rusticorum purgatorium. Huius una est magna, radicibus rotundis, magnis, densis, & graui cortice intectis. Altera parua, radicebus exiguis, cortice tenui intectis. Maior uiscera ulcerat; ob id perniciosa. Parua est præstantior, præsertim cortice radice tenui, leui, fragili,

A fragili, subrubro cassiæ modo, ante sex menses collecto. Nam recens, quo mense collecta mala est, uti & niger, & orta loco aliquo prope thermas. Colligenda est ueris initio. Lac autem, quod calidius, acrius, ac ualentius, sine ueris. * Calida & sicca principio tertij gradus, substãtia constat tenui, ignea, acri, incidente, tenuante, fundente, siccante, aperiẽte, & terrea styptica, etiam siccante materias altius immerfas: purgat ualenter pituitam, aquas, atram bilem etiam à iuncturis: ob id harum doloribus confert, & hydropi insigniter: sed nocet cordi, stomacho, hepati: uiscera excoriat, uenarum ora dirumpit, corpus immodicè siccatur, semen absumit, febres inflammando excitat, lacte suo maximè. Ob id miscenda ei sunt cardiaca, stomachica, hepatica: ad hæc glutinosa, cogentia, & astringentia, glutinantia, ut gummi, tragacanthum, bdellium, mucago pŷyllij, succus portulacæ: postremò refrigerantia, & calorem illum extinguentia. Infundatur ergo in acetum, præsertim quo cydonia sunt macerata, aut decocta, & succum intybi, uel sonchi, uel portulacæ, uel solani: additis autem myrobalanis, absynthio, aloë, præstantior euadit. Iudæus infundendo in acetum, aut lac sæpe mutando, & siccando corrigebat. Si te autem immodicè purgat, sede in aqua frigida ex Rufi consilio. Frigus enim ambiens & medicamenti uirtutem in unum cogit, ipsumq; roborat, & per accidens iuuat, protrusis à se materijs ad meatus, per quos sunt uacuandæ, succurrendumq; est. Catapotia ex ea facta idem possunt. Recipiunt autem esulæ præparatæ, myrobalanorum citrinorum ana drachmas quatuor: aloës drachmas quinque, cum succo sceniculi, aut intybi misce. Dantur à drachma una & dimidia ad drachmas tres. Quidam ex lacte eius, & farina, faciunt oblatas purgatorias. Alij ex lacte, aceto, saccharo: alij carne cydoniorum, & mastiche. Datur autem cortex radice à siliquis duabus, usq; ad siliquas septem: lac uerò à siliqua una usq; ad tres. Mesue.

TITHYMALI genera septem: quorum masculus Characias appellatur, ab aliquibus amygdaloides: alter myrtites, qui scemina existimatur. eumq; myrsinitem, aut caryitem uocant: tertius paralius, quem tithymalida appellarunt: alius helioscopius: quintus cyparissias: sextus dendroides: septimus platyphyllos dicitur. Characiæ caules supra cubiti altitudinem attolluntur, rubri, lacteo succo, atq; acri madentes: folijs oleæ circum ramos, angustioribus, & longioribus: radice crassa, lignosa: pendet in cacuminibus caulium coma iunci, sub qua caueolæ foliolis balnearum similes, in quibus semen continetur. Nascitur in asperis & montibus. * Succus aluum purgat, trahit pituitam, bilemq; binis obolis in posca sumptis, & cum aqua multa uomitiones mouet. Appetente uindemiarum tempore succus, congeletis ramulis, mox dissectis, & uase conclusis, excipitur. Aliqui adijciunt farinam erui, & in pastillos digerunt, qui erui magnitudinem impleant. Alij in aridas ficos ternas quaternas ue guttas instillant, ut cum his increpant, quas ad usus recondunt.

Per se etiam tusus in pila, & in pastillos coactus reponitur. Porro cum ex- **A**
 trahitur lac, neque quò uentus aspiret, stare quenquam, neque manus o-
 culis adinouere conuenit: sed antequam colligas, corpus, præsertim faci-
 ciem, collum, scrotumque genitalis, adipe aut oleo cum uino perungere.
 Fauces autem exasperat: quapropter catapotia cera, aut decocto melle ob-
 lini par est, & hoc modo dari. binas tamen ternasue ficos purgationis gra-
 tia sumpsisse, satis est. Recens lac ex oleo, perunctos in sole capillos euel-
 lit, renascentesque flauos & exiles efficit, denique omnes perimit. Dentium
 cauernis inclusum, leuat dolores: sed cera dentes oblinendi, ne suo dela-
 psu fauces & linguam uitiet. Tollit illitum impetigines, formicantes uer-
 rucas, peniles, & quæ thymi florem repræsentant. Valet aduersus pterygia,
 carbunculos, phagedænas ulcerum, gangrænas, fistulasque. Legitur semen
 autumnò, & siccatum sole leuiter tunditur, feruefactumque loco mundo re-
 ponitur. Folia item siccantur. Semen & folia lactei succi effectum præbent,
 dimidio acetabulo pota. Sunt qui inueterant, admisto cum lacte lepidio, &
 caseo contuso. Radix drachmæ pondere in hydromelite pota: per inferna
 trahit. Decocta cum aceto, dentium dolori auxiliatur, colluto ore. Fœmina,
 quam myrsinitem, aut caryiten uocant, similis suapte natura daphnoidi: fo-
 lijs myrti, sed maioribus, firmis, in cacumine acutis, & pungentibus: ramu-
 los ab radice mittit dodrantes: fructum fert alternis annis, nuci similem,
 mordaci gustu. Nascitur in asperis. Succus, radix, semen, folia, consimilem **B**
 antedicto sortiuntur facultatem: sed ad citandas uomitiones inualidior hæc
 est. Aliud thymali genus dicitur Paralios, quem tithymalida, aut mecona
 aliqui appellauere. Nascitur in maritimis, ramis subrubentibus, palmum al-
 tis, quinis senisue à radice exeuntibus: folijs lini, angustis, paruis, oblon-
 gis, in uersus quosdam digestis: capite in cacumine orbiculato, in quo se-
 men, ut eruum, uario colore emicat: flos alnus. Frutex totus cum radice la-
 cteo succo turget. Similes ad usus reconditur. Helioscopius dicitur, folijs
 portulacæ, tenuioribus, rotundioribusque: ramulis prodeuntibus à radice
 quatuor aut quinque, rubentibus, dodranti altitudine, tenuibus, lactis
 copiosi plenis: capite anethi: semine uelut in capitulis incluso. Heliosco-
 pij nomen accepit, quoniam comas cum sole circumagat. Circa oppida na-
 scitur, potissimum in ruderibus. Colligitur succus, semenque, ut aliorum.
 Eadem, quæ superioribus, uires, non tamen usque adeò ualidæ. Cyparissias
 in caulem exit dodrantalem, uel maiorem, subrubrum: ex quo folia pini si-
 militudine exoriuntur, molliora tamen, & tenuiora: & in totum nascentem
 pinum æmulatur, unde nomen traxit. Candido succo madet: cui eadem uis,
 quæ superioribus. In petris nascens dendroides cognominatur, ampliter
 opacat, in cacumine frondosam spargens comam, succo lacteo prægnans,
 cauliculisque rubentibus, folijs myrti tenuioris, fructu characiæ. Eiusdem ef-
 fectus,


DE FOLIIS PURGANT. HUMOR. SEROSOS. 119

Afectus, cuius superiores: similiq; modo reconditur. Platyphyllos uerbasco similis est. Radix, succus, & folia per inferna trahunt aquas. Pisces necat, tufus & aquæ inspersus. Reliqua tithymalorum genera, quæ suprâ scribuntur, idem efficiunt. Dioscorides.

PITYVSAM specie à Cyparissia differre constat, etsi tithymalorum generi assignetur. Caulis supra cubiti altitudinem assurgit, geniculatus: folijs piceæ, acutis, exilibus: flore paruo, uelut purpureo: semine instar lenticulæ lato: radice crassa, candida, succo referta. quibusdam in locis frutex hic prægrandis inuenitur. * Detrahit per aluum radix drachmis duabus, data in aqua mulsa: item seminis drachma. Succum cum farina subacti cochlearium in catapotio datur. modus foliorum drachmæ tres. Dioscorides.


PURGANT quoque serosos humores, Cyclaminus, Ebulus, &c. de quibus uide suprâ suo loco.

DE FLO.



DE FLORIBVS CAP. IX.

A



B

Flores

A

- Caput { Anthos, Brunella.
Chamomilla.
Betonica, herbae Paralyfis.
Lauendula.
Meliloti, Pœonia.
Saluia.
Stœchados, Tilia, &c.
- Pectus { Betonica, lunci odorati.
Meliffa.
Scabiosa.
- Cor { Anthos, Borraginis.
Buglossa, Croci.
Meliffa, Spicanardi, &c.
- Stomachum, — Anthos, lunci odorati, &c.
- Hepar { Centauri, lunci odorati.
Sambuci, Betonica.
Chamomilla, Spica, &c.
- Splenem, — Betonica, Leucoij, Vitis, &c.
- Renes & ueficam { Betonica, lunci odorati.
Malua, Meliloti.
Spica, &c.
- Matricem { Betonica, lunci odorati.
Ireos, Saluig.
Spicanardi, &c.
- Iuncturas { Anthos, herbae Paralyfis.
Chamomilla.
Meliloti, &c.

Calefaciunt

B

A.
Flores secundum locum alterantes qualitate prima, aut

- Caput { Nenuphar, Papaueris albi.
Rosarum.
Violarum, &c.
- Pectus, — Papaueris, Violarum, &c.
- Cor { Nenupharis.
Rosarum.
Violarum.
- Stomachum, — Rosarum, Violarum, &c.
- Hepar { Cichorij.
Nenupharis.
Rosarum, &c.
- Splenem, — Cichorij, Nenupharis, &c.
- Renes & ueficam, — Nenupharis, &c.
- Matricem, — Nenupharis, Rosarum, &c.
- Iuncturas, — Rosarum, Violarum, &c.
- Pectus, — Violarum.
- Cor, { Borraginis.
Buglossa, &c.
- Siccant { Cor, — Anthos, Meliffa.
Meliffa.
Pectus { Betonica.
Scabiosa, &c.

Refrigerant

Humectant

Siccant

q

Flores alte-

Astringunt: ut { Balauftia, Croci, Cichorij.
Meliloti, Rofarum.
Verbafci, Viticis, &c.

A

Discutiunt { Aneti, Chamomilla.
Malua, Meliloti.
Stoehados, &c.

Abftergunt, — Fabarum, Tilia, &c.

Extenuant: ut { Chamomilla.
Iridis Illyrica.
Stoehados, &c.

Emolliunt { Croci.
Liliorum.
Malua, &c.

Suppurant { Croci.
Liliorum alborum, &c.

B.
Flores alte-
rantes qua-
litate fecun-
da, aut

Glutinant & cicatricem ducunt { Balauftia.
Centaurij.

B

Menfes movent { Betonica, Centaurij.
Chamomilla, Iunci odorati.
Leucoij, Meliffa.
Peonia, Rofmarini.
Salua, Viticis, &c.

Menfes fiſtunt { Balauftia.
Hyofciami.
Nymphaea, &c.

Flatus difcutiunt { Anethi, Chamomilla.
Iunci odorati.
Spicanardi, &c.

Ambuftis medentur { Liliorum alborum.
Malua.
Verbafci, &c.

Venenis reſiſtunt, — Betonica, Citri, &c.

Dolorem mitigant { Anethi, Chamomilla.
Centaurij, Hyofciami.
Meliloti, Rofmarini, &c.

De floribus

A *De floribus calidis in primo.*

FLORES BORAGINIS & BVGLOSSAE nascuntur passim in hortis, campestribus, & sabulosis. Colliguntur uere, & principio aestatis: ex quibus cōserua, serapiū, & aqua stillatitia paratur. Exiccatur etiā in umbra, & cōseruantur per annū in ligneis arculis. * Corroborant cor, eiusq; affectibus maximè opitulantur. conducunt ad febres humoresq; aduſtos, &c.

BETONIAE flores idem, quod herba ipsa efficiunt.

FLORES Bupthalmi lutei sunt, anthemide maiores, oculi similitudine, unde nomen traxerunt, Folia fœniculi. Circa oppida nascuntur, & in campestribus. Colliguntur uere: siccantur in umbra, & cōseruantur per annum.

* Cum cerato triti, tumores, duritiasq; discutunt. Dioscorides.

MELILOTVS flore est luteo, colore uicino croco, odorato. Nascitur locis montosis, sterili solo. Colligitur in uere: siccatur & seruatur per annum.

* Vim habet adstrictoriam & discutientem, &c. Dioscorides.

CHAMAEMELI flores in medio aurei, forinsecus orbiculato ambitu cādidi, melini, aut purpurei, magnitudine foliorū rutę. Nascuntur in asperis, & iuxta femitas. Colliguntur uere: siccantur in umbra, & seruantur per annum. * Excalfaciunt, discutunt, laxant, & rarefaciunt. Decoctum eorum febres citra uiscerum inflammationem ortas concoquit, discutit, ac resoluit:

B præsertim quæ ex cutis densitate, & humoribus biliosis proueniunt: præcordijs gratissimi, lassitudini conferunt: dolores sedant: tensa remittunt & resolunt: modicè indurata emolliūt: densata rarefaciūt. Dioscor. & Andernacus.

STOECHADOS summi apices, hoc est flores in officinis stœchados Arabici amari. Iuxta Galliam in insulis eiusdem nominis eregiōnē Mafsilię gignuntur: nec non in Arabia, quæ Gallica præstat. * Leuiter astringunt, extenuantq;, abstergunt, uiscera obstructione liberant: eoq; etiā totum corpus corroborant. Dioscorides.

De floribus calidis in secundo.

AMOMI, hoc est flores pomi Hierosolymitani, quia rarò & parcè admodum, sicut etiā tempore Galeni ad nos feruntur: acorus eadem facultate præditus, in uicem illorum substitui potest. Quidam illud, uuam odoratam, alij aliud esse prodiderunt. Andernacus.

CROCI cum multus sit usus & sanis, & in Medicina, cura adhibenda est, ut optimus, recens, & sincerus deligatur. Nam uarijs modis adulteratur: sed maleficcium ex colore, odore & pondere deprehenditur: siquidē adulteratus, nec uetus eam coloris gratiā habet, sed obscurior est, neq; odoratus ut recēs, sed sitū redoler, & pōderosus est. Ceterū qui luteos quosdā flores admistos habet, odore & gustu dignoscitur, tum etiā quòd eam coloris uenustatem in tingendo non habet, quàm sincerus. Qui sapa sublitus est, sapore dulci,

q 2 & colore

& colore obscuro est. Cui permixta lithargyros, iusto pōderosior est. * Vim **A**
 coquendi, emolliendi, atque substringendi habet. urinam cit: elegantem co-
 lorem præstat: qui ex passo biberint, crapulam non sentient: oculorum flu-
 xiones illitum cum humano lacte cohibet: additur in potiones, quæ intera-
 neorum causa temperantur: ad uulvæ etiam, sedisq̄ue cataplasmata, utiliter
 inditur: uenerem stimulat: uergentes ad ignem sacrum inflammationes
 mulcet: auricularijs collectionibus utile. Quò facilius conteratur, in calido
 fictili sole sicari oportet, celeriterq̄ uersari. Vrinam mouet radix ex passo
 pota. Dioscorides & Medici Florentini.

CARIOPHYLLORVM flores æstate colliguntur: quo tempore ex eis
 acetum conficitur, pestilētiae accommodatum. Conditum quoq̄ ex eis cum
 saccharo paratur. * Iecur, cor, & stomachum corroborat. Venerem auget,
 quatuor scrupulorum pondere cum lacte antè assumpti. Andernacus.

ERICA fruticosa arbor, myricæ similis, longè minor, cuius flore apes re-
 probum mel efficiunt. * Strumas discutiunt, aliasq̄ duritias per habitum di-
 gerunt, dissipantq̄. Dioscorides & Andernacus.

SQVINANTHVM, seu schœnu anthos, id est, iunci odorati flos, in Afri-
 ca & Arabia nascitur. Laudatissimum ex Nabathea: proximum Arabicum,
 quod aliqui Babylonium cognominant, alij teuchitin: pessimum ex Africa.
 Eligendū rufum, intento colore, recens, tenue, rubentibus fragmentis, quod **B**
 manibus confricatum rosæ odorem emittit, igneæ mordacitatis ad linguam.
 Floris, culmorum, radicisq̄ est usus. Olim plāta ipsa cum floribus adueheba-
 tur, unde schœnu anthos nomen sumpsit: ideoq̄, eligebatur floribus refertū.
 Hodie tamen ad nos culmi duntaxat & radix adferuntur. Itaque cura adhi-
 benda est, ne alij culmi his admisceantur: quod ex iam dictis notis deprehen-
 di potest. * Vim urinæ ciundæ habet: menses pellit, discutiit inflationes, ca-
 put aggrauat, modicè astringit, comminuit, excoquit, ac uenarum spiracula
 laxat. Flos eius in potu utilis sanguinem reijcientibus: doloribus stomachi,
 pulmonis, iecinoris, & renum: miscetur antidotis. Radix adstringentior est:
 ideo fastidijs stomachi, hydropicis, conuulsis, drachma una cum pari pon-
 dere piperis, per dies aliquot datur. Decoctum uulvæ inflammationibus, ad
 desidentium fetus utilis est. Medici Florentini ex Dioscoride.

LAVENDVLA, Nardi Italicæ species est: adeò ut illa fœmina, hæc uerò
 mas (uulgò spica nardi appellata) uocitetur. Mas folio constat latiore, lon-
 giore, crassiore, robustiore, albidioreq̄, quàm fœmina. Sed utraq̄ planta fru-
 ticosa, & rosinarini modo, innumeris referta est folijs: è quorum medio iun-
 cei exeunt cauliculi, quadranguli, tenues, dodrantalem longitudinem exce-
 dentes: in quorum cacumine flores exeunt spicati, colore purpureo, quam-
 uis in fœmina dilutiores, patentioresq̄, odore fragrantiores, uerùm usque adeò
 acuto, ut nares feriat. Nascitur passim in hortis. Colliguntur ambo initio æ-
 statis:

A statis: siccantur in umbra, & conseruantur per annum. * Excalfaciūt & excicant ordine secundo completo. Conferunt omnibus cerebri affectibus frigidis, conuulsis & resolutis: uentriculū frigidū corroborāt: iecur obstructū liberāt: lienis infarctus aperiūt: uterū calefaciūt: urinā, mēstrua, & secūdas educūt. Aqua ex illis destillatur, oleūq; cōficitur, qđ oleū spicę uocāt. Matthiol.

LVPVLI flores nascuntur in sepibus: colligūtur autūno: siccātur & conseruantur per annum. * Obstructiones uiscerum soluūt. Serapiū ex uiridibus confectum, & aqua stillatitia, febribus conueniunt. Andernacus.

MELIS & **AB** flores nascuntur pāsim in hortis, colliguntur estate, siccantur in umbra, & seruātur per annum. * Excalfaciunt siccātq; ordine secūdo. Cor exhilarant, uitalesq; facultates roborant, odoris fragrantia deficientem animum reuocant, animi sollicitudines fugant. Auicenna & Serapio.

RORIS MARINI flores colliguntur uere: siccantur & conseruātur per annum. * Emolliunt, incidunt, digerant, & abstergunt. Conditum ex eis uiridibus, & saccharo paratum, conserua anthos officinis dicitur, uentriculum roborat, & utero accōmodatur. Herbæ & radice eius succus melle mistus, hebetudinē oculorum à crasis humoribus ortā emēdat. Decoctū eius regio morbo siue arquato auxiliatur. Galenus, Dioscorides, Andernacus.

De floribus calidis in tertio.

B **AGNI CASTI** seu uiticis flores, quidam albi cum purpureo, quidam purpurei sunt. Nascuntur in palustribus cāpis. Calidi & sicci in tertio. * Flatus uentris discutiunt. Veneris impetus cohibent. Galenus.

EPITHYMI flores eandem uim, quā herba ipsa, obtinēt. de quib. uide s̄.

LEVCOION uulgaris est noticiæ, sed in floribus differentia quædam: namque aut cœrulei, aut albi, aut purpurei, aut lutei inueniuntur. Luteum uerò præcipui in medicina usus. Nascuntur in hortis ac uiridarijs, in ædium fenestris, & parietibus. Colliguntur uere: quo tempore oleum ex eis (keyrinum) paratur. * Aridi flores seruefacti in defensionibus, ualent contra uulnæ inflammationes, & menstrua expellunt: sanant oris ulcera, cum melle: cum cerato, rimas sedis, &c. Dioscorides.

OENANTHÆ, officinis labruscæ flos, fructus est uitis syluestris, & florescentis: * astringit, & stomacho familiaris. Dioscorides.

PERICLYMENI flores, fabæ non dissimiles, candidi, aliquantum rotundi, & quasi in foliū procūbentes. Nascūtur in aruis ac sepibus, plāta conuoluēs se adminiculis propter asidētibus. * Incidūt, urināq; mouēt: diutius poti, sicut etiā fructus eius, & folia, urinā sanguinolentā cient, lienosos & diffusulter spirātes drachmæ unius pōdere cū uino assumpta iuuāt. Dioscorid.

De floribus frigidis in primo.

MALVÆ flores, effigie floribus rosarum rubentibus, candidis uel sub-rubeis,

rubeis, nullo tamen odore fragrantibus. Nascuntur in hortis ac uiridarijs. **A** Colliguntur mense Maij, uel principio æstatis. * quo tempore ex eis fit mel maluatum, bonum pro asthma & tussi. Saladinus.

ROSARVM genera multa sunt. At uulgatissimæ sunt, albicantes, puniceæ, & quæ ex albo rufescunt, quas Itali appellant *incarnate*. Præstantissimæ, quæ puniceo colore rubent: proxima laus est ijs, quæ in rufum cadunt: utilissimæ albicantes: in quarum tamen genere ex odoratissimæ excipiuntur, quæ Hetruscis Damascenæ, & alijs Moschette uulgò dicuntur. Nascuntur passim in hortis ac uiridarijs. Colliguntur uero mense Maij, nõdum penitus explicati: quo tempore dilutum iulapium, syrupus, cõserua, mel rosarum, aqua stillatitia, & oleum ex eis conficiuntur. Siccantur etiã in umbra, folia continuo uersata, ne muceant, neque sitis in ijs infideant: & conseruantur per annum in arculis ligneis. * Refrigerant, astringunt, corroborantque uires, tum uitales, tum animales. Aridis rosis, & in uino decoctis expressus liquor, facit ad dolores capitis, aurium, oculorum, gingiuarum, sedis, recti intestini, ac uulvæ, pœna illitus, aut infusus. Eadem sine expressiõne tusa, præcordiorum inflammationibus, humidis stomachi uitijs, igni sacro illini prodest: siccis ac tritis semina asperguntur. Misceri solent uulnerarijs antidotis, atque compositionibus, quas antheras uocant. Folia uruntur in calliblephara. Flos, qui in medijs rosis inuenitur, siccatus, gingiuarum fluxionibus efficaciter inspergitur. Capita pota citam aluum, & cruentis reiectiones sistunt. Succus recentibus folijs exprimitur, defectis forfice unguibus (sic appellantur candidæ foliorum partes) reliquum in pila premi & teri debet in umbra, donec cogatur, & ita ad oculorum circumlitiones recondi. Dioscorides & Matthiolus. **B**

VIOLA purpurea folium habet hedera minus, tenuius, ac nigrius, nec multò dissimile: cauliculus à radice medius prodit, in quo flosculus suauissimè olens, purpureus. Nascitur in opacis, asperis, pratis, & iuxta sepes. Colligitur primo uere, tempore sereno. quo tempore dilutum, serapium, iulapium, conserua, aqua stillatitia, atque oleum uiolaceum ex eo conficiuntur. Siccantur etiã in umbra, & conseruantur per annum, in uasis ligneis. * Violæ recentes refrigerant & humectant ordine primo. in summa soporiferæ sunt, calidos dolores mulcent, inflammationes extinguunt, leniunt, & solunt. Bilem educunt, eiusque feruorem mitigant. Conferunt capitis doloribus, quos caliditas excitauerit: somnum conciliant: pectoris & asperæ arteriæ scabritiem leniunt: medetur anginis, & columellæ uitijs: præcipuo autem auxilio sunt pectoris & lateris inflammationibus: sitimque arcunt. Siccæ uiolæ minus refrigerant, & humectant: iecoris obstructions aperiant: regio morbo succurrunt: inflammationes discutiant. In puluerem redactæ drachmæ pondere, ex galli gallinacei, uel pisorum modicè coctorum iure, etiam uentrem subducunt, paulò ante cibum dati. Dioscorides & Mesues.

De floribus

De floribus frigidis in secundo.

A ANEMONES duo genera, unū syluestre, alterū in cultis nascens: Cuius multæ species: una phœniceū florem profert: altera candicantem, aut lacteū, aut purpureum. Harum folia coriandro similia, cæterū scissa tenuius in terram inclinantur: caules lanuginosi, tenues, in quibus flores, ut papaueris, & in medio capitula nigra, aut cœrulea: radix oleæ magnitudine, aut amplius paulò grandescit, ac ueluti geniculis quibusdam cingitur. Syluestri amplitudo profus maior, latioraq; folia, & duriora: oblongius caput: flore puniceo: tenuibus & multis radicum capillamentis. Acrior est, quæ nigra habet folia. * Vis utriusque acris. ea de causa succus naribus infusus purgat caput. Com-manducata radix pituitam trahit. decocta in passo, & illita, medetur oculorum inflammationibus: cicatrices eorundem, & hebetudines emendat: for-dida ulcera abstergit. Folia & caules, si cum ptisana decocti edantur, copiam lactis præbent: menstrua ciunt, uellere apposita: illita quoq; lepras eximūt. Flores eandem uim habent, quàm herba ipsa. extrahunt humores, & ora uorum aperiunt. Dioscorides.

HYACINTHVS in uniuersum in campestribus inter segetes, & in syluis prouenit: folijs & radicibus bulbaceis: caule dodrantali, uiridi, tenui, leuiq; floret cum uiolis circa finem Martij, & Aprilis initium: florentem emittit comam, ab ipso caulis medio usq; ad summum purpureis circūdatam floribus, qui maturescentes ad terram incuruantur, perdurantq; diu, antequam cōtā-bescant. * Refrigerant ordine secundo, siccant uerò primo. Matthiolus.

CICHORII flores nascuntur in campestribus, iuxta semitas. Colliguntur æstate: * ex quibus conficitur conferua, ad refrigerandum, corroborandumq;, & potissimū hepar.

NYMPHÆÆ seu Nenupharis flores lutei sunt, nitentes, rosæ similes. Nascuntur in paludibus, lacubus, & aquis stagnantibus. Colliguntur circa finem ueris, uel principium æstatis: * quo tempore aqua stillatitia conficitur, fronti uel naribus admota, capitis ex bile dolorem lenit: somnum inducit, omnemq; ardorem extinguit. Serapium ex eis, febribus pestilentibus & acutis: pectorisq;, columellæ, gutturisq; uitij aptissimum. Conditum cum saccharo ex eis factum semuncię instar somnum affert: item unguentum inde paratum cordis regioni, instar epithematis, cum opus est, ad refrigerium illinitur. Andernacus.

De floribus frigidis in tertio.

FLORES mali puniceę syluestris BALAVSTII uocantur, cytino similes. Quorum cōplura genera reperiuntur, candidi, fului, colore rosaceo. Nascuntur in Italia, Granata Hispaniæ regno. Colliguntur mense Iunij: siccantur & conseruantur per annum. * Astringunt, siccant, cohibent: sanguinolenta glutinant. Dioscorides.

De floribus:

De floribus frigidis in quarto.

FLORES HYOSCIAMI nascuntur in campestribus, ruderibus: colliguntur prima æstate, vel circa finem ueris: siccantur, & conseruantur. * Vis eadem, quæ herbæ inest. A

De floribus humidis in primo.

FLORES HUMIDI in primo, sunt Buglossæ, Maluæ, Intybi, &c. de quibus uide suprâ suo loco.

De floribus humidis in secundo.

FLORES humidi in secundo, sunt Nymphææ, Violarum, &c. de quibus uide suprâ

De floribus siccis in primo.

FLORES siccis in primo, Buphthalmi, Chamomillæ, Croci, Hyacinthi, Meliloti, Rosarum, &c. de quibus uide suprâ suo loco.

De floribus siccis in secundo.

FLORES PAEONIAE colliguntur mense Aprilis: * ex quibus conditum cum saccharo paratur, epilepsiæ accommodatum.

SICCANT quoque in secundo, flores Anemonæ, Amomi, Croci, Ericæ, Iunci odorati, Lauendulæ, Lupuli, Meliloti, Rosmarini, Spicanardi, &c. de quibus uide suprâ suo loco.

De floribus siccis in tertio.

IASMIM seu Zambaci flores, similes uiolis syluestribus, odorati. Colliguntur æstate. * Incidunt, aperiunt, relaxant. Ex his oleum fieri solet, quod Arabes Iesminum, & Zambach uocant. Andernacus. B

SICCANT quoque in tertio, flores Balauftij, Epithymi, Chamæpytheos, Periclymeni, &c. de quibus uide suprâ suo loco.

De floribus calefacientibus caput.

FLORES PRVNELLAE nascuntur in pratis, riguis: colliguntur uere: * ex quibus aqua stillatitia conficitur, ad oris ulcera idonea.

FLORES HERBAE PARALYSIS nascuntur in pratis: colliguntur uerò primo uere: quo tempore conditum cum saccharo ex eis conficitur, nec non aqua stillatitia. * Conuulsionibus medentur.

TILIA quædam mas est, quædam fœmina. Distant inter se tum materie, tum totius corporis forma, & quod altera sit fructifera, altera uerò sterilis. Nâ materies mas dura, flaua, nodosior, spissiorq: fœminæ candidior: & mas sterilis, nulloq: flore est: fœmina & florem, & fructû gignit. Flos calyculæ intus præter folij pediculû, amentûq: futurû, pediculo altero annexus, uiridis, dū in calycula est, detectus aut leuiter flauus: floret cū urbanis. Fructus oblongus, orbiculatus, magnitudine fabæ, similis hederæ acino, quinque angulis, ueluti neruis eminentib. inq: acutû, cū sese cōtrahētib. partitus, q: scilicet manusculus est, mi

DE FLORIBVS CALFACIENTIB. PECTVS. 129

A est, minutiusculus autem confusior cōstat. Folium & cortex dulcia, suauiaq;: folium forma hederaceum, nisi quòd in angulum acutiore rotundatur. Nascitur in campestribus, & asperis mōtibus. Colligūtur flores æstate: * ex quibus aqua stillatitia paratur, apoplexiæ idonea. Theophrastus.

CAPVT quoq; calefaciunt, atq; in eo pituita concoquunt flores anthos, Betonicæ, Chamomillæ, Lauendulæ, Meliloti, Pæoniæ, Saluiæ, Stæchados, &c. de quibus singulis uide suprâ suo loco.

De floribus calfacientibus pectus.

SCABIOSA folijs constat laciniatis, subhirsutis: caulibus tenuibus, cubitali altitudine, atq; etiâ maiore: in quorū cacumine flores emicant in cœruleo albicantes. Nascuntur in pratis & campestribus. Colligūtur in fine Maij, uel initio æstatis: siccantur in umbra, & seruatur per annum. * Pollent aduersus scabiem. Profunt omnibus pectoris uitij, & respirationi inferuentibus organis, &c. Matthiolus.

PECTVS quoq; calefaciunt flores Betonicæ, Iunci odorati, Mellissæ, &c. de quibus singulis uide suprâ.

De floribus calfacientibus reliquas corporis partes.

COR calefaciunt flores anthos, Borriginis, Buglossæ, Croci, Melissæ, Spicanardi, &c. de quibus singulis uide suprâ suo loco.

B **STOMACHVM** calefaciunt flores anthos, Iunci odorati, &c. de quibus uide suprâ suo loco.

FLORES CENTAVRII suprâ descripti sunt. Nascuntur in riguis. Colliguntur mense Iunij: siccantur, & conseruantur per annum. * Bilem & crassos humores per aluum expurgant: iecoris obstructions aperiunt: duratum lienem emolliunt, menstrua & fœtum euocant.

FLORES SAMBVCI nascuntur in hortorum sepibus. colliguntur mense Maij. * Emolliunt pectus: conferunt hydropicis: obstructions hepatis, lienis, & renum auferunt: tertianæ medentur: sanguinem mundant, &c.

HEPAR quoq; calefaciunt flores Betonicæ, Iunci odorati, Origani, Chamomillæ, Spicæ, &c. de quibus uide suprâ suo loco.

SPLENEM calefaciunt flores Betonicæ, Leucoij, Viticis, &c. de quibus uide suprâ suo loco.

VESICAM & RENES calefaciunt flores Betonicæ, Iunci odorati, Maluæ, Meliloti, Spicæ, &c. de quibus singulis uide suprâ suo loco.

MATRICEM calefaciunt flores Betonicæ, Iunci odorati, Ireos, Saluiæ, Spicanardi, &c. de quibus uide suprâ.

IUNCTVRAS calefaciunt flores anthos, Herbe paralyfis, Chamomillæ, Meliloti, &c. de quibus singulis uide suprâ suo loco.

HERBICA

r De

De floribus refrigerantibus singulas corporis partes. A

CAPUT refrigerant flores Neumpharis, Papaueris albi, Rosarum, Violarum, &c. de quibus uide supra suo loco.

PECTUS refrigerat flores Papaueris, Violarum, &c. de quibus uide supra.

COR refrigerant flores Neumpharis, Rosarum, Violarum, &c. de quibus uide supra suo loco.

VENTRICULUM refrigerant flores Rosarum, Violarum, &c. de quibus uide supra suo loco.

HEPAR refrigerant flores Cichorij, Neumpharis, Rosarum, &c. de quibus singulis uide supra.

SPLENEM refrigerant flores Cichorij, Neumpharis, &c. de quibus uide supra suo loco.

RENES & VESICAM refrigerant flores Neumpharis, &c. de quibus supra suo loco.

MATRICEM refrigerant flores Neumpharis, Rosarum, &c. de quibus uide supra suo loco.

INVICTURAS refrigerant flores Violarum, Rosarum, &c. de quibus supra suo loco.

De floribus humectantibus pectus, & cor.

PECTUS humectant flores Violarum, &c. de quibus uide supra suo loco.

COR humectant flores Borraginis, Buglossæ, &c. de quibus singulis uide supra suo loco. B

De floribus siccantibus cor, & pectus.

COR siccant flores anthos, Melissæ, &c. de quibus uide supra.

PECTUS siccant flores Melissæ, Betonicæ, Scabiosæ, &c. de quibus supra suo loco.

De floribus astringentibus.

VERBASCI flores nascuntur in campestribus, asperis, & hortis: colliguntur æstate & autumno. * Morbis sedis subueniunt mirificè: adstringunt, & exsiccant: asperas verrucas delet, &c. Matthiolus & Fuchsius.

ADSTRINGUNT quoq; flores Cichorij, Balauftij, Croci, Meliloti, Rosarum, Viticis, &c. de quibus singulis uide supra suo loco.

De floribus discutientibus.

DISCUTIUNT flores Anethi, Chamomillæ, Maluæ, Meliloti, Stæchados, &c. de quibus supra suo loco.

De folijs abstergentibus.

FABARVM flores in hortis & campis nascuntur: colliguntur uerò mense Maij: * ex quibus aqua stillatitia conficitur ad faciem abstergendam & uenustandam: fluxiones oculorum sistit.

ABSTER

A ABSTERGUNT quoq; flores Tiliæ, &c. de quibus uide supra suo loco.

De floribus extenuantibus.

EXTENUANT flores Chamomillæ, Iridis Illyricæ, Stœchados, &c. de quibus uide suo loco.

De floribus emollientibus.

EMOLLIVNT flores Liliorum, Croci, Maluæ, &c. de quibus uide supra suo loco.

De floribus suppurantibus.

SUPPURANT flores Liliorum alborum, Croci, &c. de quibus uide supra.

De floribus glutinantibus & cicatricem inducentibus.

GLUTINANT & cicatricem inducunt flores Balauftij, Centaurij, &c. de quibus supra suo loco.

De floribus menses mouentibus & sistentibus.

MENSES mouent flores Betonicæ, Centaurij, Chamomillæ, Iunci odorati, Leucoij, Melissæ, Pæoniæ, Rosmarini, Saluæ, Viticis, &c. de quibus singulis uide supra suo loco.

MENSES sistunt Balauftiæ, flores Hyosciami, Nymphææ, &c. de quibus supra suo loco.

B *De floribus flatus discutientibus.*

FLATUS discutiant flores Anethi, Chamomillæ, Iunci odorati, Spica nardi, &c. de quibus uide supra suo loco.

De floribus, quæ ambustis medentur.

AMBUSTIS medentur flores Liliorum alborum, Maluæ, Verbasci, &c. de quibus singulis uide supra.

De floribus uenenis resistentibus.

VENENIS resistent flores Betonicæ, Citri: de quibus suo loco.

De floribus dolorem mitigantibus.

DOLOREM mitigant flores Anethi, Chamomillæ, Centaurij, Hyosciami, Meliloti, Rosmarini, &c. de quibus singulis uide supra suo loco.

De floribus purgantibus bilem flauam.


PERSICAE arboris flores, & folia in aqua calida, sicut rosarū & uiolarum macerati, in zuparium uel serapium rediguntur, ad uentrem subducendum, & bilem expurgandam efficaces, unciarum duarū instar. Andernacus.

EX CERASI arboris, quæ dulcia profert cerasa, floribus dilutum fit, sicut rosarum & uiolarum: * aluum deijcit. Serapium ex ijs confectum, per totum annum asseruari potest. Andernacus.

EX ROSARVM persicarum floribus, quas incarnatas uulgò appellant,

r 2 succus

A DE FRUCTIBVS CAP X



	Caput	Anacardi. Cubeba. Nux Moschata, etc.	
	Thoracem	Amygdalæ amarg. Auellang. Caricæ. Cubebæ. Ficus. Nux pinea. Palmula, seu dactyli. Vuæ passæ, &c.	
	Cor	Mala Citria. Nux Indica. Nux Moschata, &c.	
Calfaciunt	Stomachū	Amygdalæ dulces. Ben. Cariophylli. Nux Moschata. Pineæ.	
	Splenē	Amygdalæ amarg. Cappares, &c.	
A. Fructus, secundum tales	Renes & uescicam	Amygdalæ amara. Baccæ iuniperi. Cubebæ. Nuclei pini. Vuæ passæ, &c.	B
	Vterum	Baccæ lauri. Baccæ iuniperi. Iuglans. Nux Moschata, &c. Itinubæ seu zizyphæ.	
	Thoracem	Sebesten, seu mixta, siue myxaria, &c.	
Refrigerant	Cor	Cotonea. Pira, &c.	
	Stomachum	Cotonea. Citrulli. Cucumeres. Cucurbita, Cornus. Cerasa, Limones, Mala. Melones. Mespila.	
	Hepar	Berberis. Cucurbita. Cucumeres, etc.	Mala aurantia, Granata, Oliu, Pira, Ribes, Sorbg.
	Renes, Fraga.		
	Vterum, Cucumeres, &c.		

Fru-

A

- Astringunt {
 - Baccæ Myrti, Berberes,
 - Castanea, Cornus,
 - Cotonea,
 - Galla, Glans,
 - Mespila, Mala punica,
 - Nux Moschata,
 - Oliua, Omphacium,
 - Palmula, Pira, Persica, &c.
- Discutiunt {
 - Cappares,
 - Piper, &c.
- Extenuant {
 - Amygdalæ dulces,
 - Baccæ iuniperi, &c.
- Glutinant {
 - Glans,
 - Palmula, &c.
- Flatus discutiunt {
 - Baccæ lauri,
 - Baccæ iuniperi,
 - Nux Moschata, Piper, &c.

B

B.
Fructus alteran-
tes qualitate secu-
da, aut

- Semen generant {
 - Ficus,
 - Nux pinea,
 - Nux Indica, etc.
- Vrinam ciunt, Halicacabus, etc.
- Menses mouent {
 - Baccæ hederæ,
 - Cappares, Nuclei Persicorum,
 - Piper, etc.
- Menses sstunt {
 - Berberis,
 - Vua passa cum nucleis, etc.
- Venenis resstunt {
 - Baccæ iuniperi,
 - Iuglans,
 - Mala Citria,
 - Piper, etc.
- Dolorem mitigant {
 - Baccæ iuniperi,
 - Baccæ hederæ,
 - Ficus, Iuglans,
 - Piper, etc.

Fructus

Agis autem cum farina triticea, si concoquere studeas: hordeacea, si magis dicultere, cum cera & rosaceo subacta: cicatricem ambustis obducit. Matthiolum & Medici Colonienfes.

NVX PINEA, nuclei pinei, Græcis *σφοδα* uocantur: præstant recentiores, pleni, albi, sicci, uidentur flauis, aut pallidi, oleosi, rancidi. * Boni ac crassi sunt succi: multum nutriunt, uiresq; reficiunt, & facillè coquuntur: pectoris & pulmonis uitijs accommodantur. Resoluunt & concoquunt pituitam: ad dolores capitis non conueniunt: quia illud uaporibus replent. Linctus inde fit, quem officinæ loch appellant. Galenus & Dioscorides.

DACTYLI, fructus palmæ: in Creta & Iudæa nascuntur. Probantur quæ in Iudæa proueniunt, & inter has maximè quæ in Hiericunte nascuntur, magni, flauis, parum rugosi, molles, pleni tamè, & carne intus multa, subdura, ad nucleum candicante, ad corticem rubescente, non pertusi, non uermiculosi: & qui concussi nihil aut minimū sonent, sapore uinoso. Deteriores sunt graciles, flaccidi, duri, quia excarnes, excusso pediculo pertusi: ijdem fermè uermiculis scateantes. * Vis eorum adstrictoria: sistunt ulcera quæ depascunt: laxatos artus committunt: triti miscentur cataplasmatibus & malagmatis: profunt præcordijs, imbecilli stomacho, & iecinori affecto, misti conferentibus cataplasmatibus. Eorum decoctum subinde deterfum, capillos denigrat: datur bibendum congruè renum, uesicæ & uiscerum uitijs: uulnæ ac uentris fluxiones sistit. Concoctum sunt difficiles, capitiq; dolorem inferant. Dioscorides & Medici Colonienfes.

SEBBESTEN, seu Myxa, siue myxaria in Syria & Ægypto nascuntur. Arbor est pruno ualde similis, ei tamen magnitudine cedens. Cortex caudici candicat, ramis uerò uiret. Folijs comatur rotundis ac firmis. Fructus adolefcunt exigui pruni magnitudine, nucleo intus triângulari forma, qui satis bæ proportionè respondet. Fructus maturitatem adepti, in atrum uirescunt, gustu sunt prædulci ac lenta, tenaciq; pulpa. Præferuntur acuminata, parum rugosa, graui, nigra, carne multa ex rubro nigricâte, firmiore, glutinosa, dulci & subacida, osse prunorum Damascenorū inæquali, nucleo intus exigui dulci. * Ventrem molliunt, ut pruna. Dantur utiliter ex bile febricitantibus, atq; linguæ asperitatem mirificè leniunt: quin & pectori atque tussi opitulatur: uentris tineas pellunt: urinæ ardoribus à bile, uel falsa pituita proueniētibus maximam opem præstant. Matthiolum & Medici Colonienfes.

VVAE PASSAE nascuntur in Creta, Cypro, Damasco, Corintho, &c. * Ad thoracis & iecoris affectus, speciali quadam facultate, uel (ut ita dicā) à tota essentia ualent: modò acinis, qui frigidi & sicci, exutæ sint. nam hi pectus alstringunt, obstructionsque pariunt: ob quod Medici huius temporis uuas passas Corinthiacas, absque acinis natas ægris præscribunt: quæ aqua aut uino elotæ, trium unciarum uel etiam minori, uel duorum aut trium cochlearium

chlearium instar sumptæ ante cibum, aluum mouent, & purgant. quæ uerò. **A**
 acinos adhuc habent, stomachum corroborant, & aluum à cibo integræ co-
 mestæ soluunt. Quinetiam eadem siue per se, siue cum pipere comestæ caput
 leuiter purgant: nec non leniendo, detergendoq; thoracis & pulmonis affe-
 ctibus probè subueniunt. Andernacus.

De fructibus calidis in primo.

AMYGDALAE dulces probantur flauissimæ, plenæ, integræ, non con-
 fractæ, neque erosæ, tamen læues, duræ & siccæ, quantum illis datum est ob
 id fragiles, intus albissimæ: sapore delicatæ, propè indicibili, in castaneam
 tostam, & panis purissimi bene cocti qualitatem inclinantes, odore ante esum
 nullo aut perquam exiguo, inter edendum autem iucundo. Improbantur al-
 bescentes, nigrescentes, rugosæ, molles, tortiles, oleosæ, rancidæ, sapore in-
 grato. Calidæ & humidæ in primo. * Extenuant & abstergunt, atq; uiscera
 purgant: ex pulmone & thorace sputa educunt. Sed quia omnia amygdala
 ob pinguedinem æstuosa sunt, eoq; bilem commouent, febricitantibus, aut
 certè ijs qui uentriculum habent biliosum, afferri non debent: quia in bilem
 conuertuntur: adhæc caput replent, neq; lac, neq; succus eorum illi prodest.
 Ideo ex cremore hordei, & lacte amygdalarum, cibus liquidior in febr. pa-
 rari debet, ut in Gallia solet. Viridia integra cum inuolucro comesta bonum. **B**
 reddunt uentriculum: humidum & frigidum emendant. Galenus, Anderna-
 cus, & Medici Colonienfes.

UIUEAB, Zizipha, uel Zinzipha Græcis recentioribus dictæ, nascuntur
 in Syria: laudantur recentes, amplæ, oblongæ, passæ, tamen tensæ, carne in-
 tus multa, succulenta, laxa, dulci, uinosa: plenæ, graues, sapore dulci & deli-
 cato, nucleo paruo, foris rufo, ac uerius rubentes, intus pallidæ aut albentes.
 (nam foris albæ nobis nondum uisæ) ossè prunorum rotundiore, paruo in-
 tus nucleo dulci. Improbantur uetustate nigricantes, læues, siccæ, pulueru-
 lentæ, friabiles, excarnes. * Sanguinem biliosum inspissant: densantq; humo-
 rem tenuiorem, ad pectus descendentem. Contra huiusmodi affectus etiam
 serapium ex Ziziphis, & decoctum cum alijs quibusdam pectori accommo-
 datis, conficitur. Andernacus & Medici Colonienfes.

NYCBS CVPRESSI, seu pilulæ, in Creta nascuntur: laudantur perfe-
 ctæ recentes, ob id molles, feminis plenæ, etiam in ipsis hiatibus. * Ulcera glu-
 tinant: in duris corporibus intestinorum ramices iuuant, roburq; partibus
 præ humore laxatis addunt. Pilulæ ex uino tuscæ, in dysenteria, alui fluxione,
 tussi, & orthopnoæ, aut si reijciatur sanguis, conuenientissimè bibuntur: ea-
 rum decoctum eosdem præbet effectus: tuscæ cum fico durities emolliūt, na-
 riumq; polypo medentur: in aceto coctæ, & cum lupinis detritæ scabros un-
 gues eijciunt. Dioscorides & Medici Colonienfes.

NYCBS

DE FRUCTIBVS CALIDIS IN PRIMO.

139

A NVCES IVGLANDES sunt concoctu difficiles, stomacho inutiles, bilioſæ, capitis dolorem inferentes, tuſſientibus inimicæ: * ieiuno tamen ſtomacho comestę. latos lumbricos pellunt: cum ficibus uerò & folijs rutæ & grumo ſalis contra uenenum & pestilentiam manè assumptę ualent. Recentes stomacho innocetiores sunt, utpote ſuauiores: itaq; allio miſtæ eximūt acrimoniã. Liuios in corpore illitu tollūt. Cęterum iuglãdes uirides decerptę mense Maio, uel Iunio appetente, antequam earum putamina obdureſcant, ſaccharo uel melle aſſeruatę stomacho utiles euadunt, & ori non ingratę. Dioſcorides & Matthiolus.

VVAE recentes aluum turbant, & ſtomachum inflant. innocetiores, quæ decerptæ diu pependere, ideo quòd in eis copia humoris exiccatur, utiles q; ſunt stomacho, ægris q;, atq; cibi auiditatę excitant. In uinaceis & ollis ſeruatę, ori & stomacho gratę ſunt. * Aluum ſiſtunt, ſed ueſicam & caput tentant: & ſanguinem excreatib. cõueniunt. Similes q;, quę in multo fuere. Sapa aut paſſo conditę, ſtomachum magis inflant. At quę ſolem prius paſſę, in aqua cœleſti cõduntur, minus uinoſę ſunt, ſiticolis, ardentibus & longis febris. ſalubres. Reconditi uinacei inflammatis mammis, rigētibus, ac præduris, cũ ſale illinuntur. Decoctura eorũ dyſentericos, cœliacos, & ſæminas fluxione uulvæ laborantes iuuat inuſa: ad deſeſſiones ac fetus aſſumitur. Nuclei acinorum adſtringendi uim obtinent: stomacho utiles ſunt. Inſpergitur farina roſtorum, polentæ modo, dyſentericis, & cœliacis, & ſolutis stomacho. Dioſcorides.

B NORUM adſtringendi uim obtinent: stomacho utiles ſunt. Inſpergitur farina roſtorum, polentæ modo, dyſentericis, & cœliacis, & ſolutis stomacho. Dioſcorides.

De fructibus calidis in ſecundo.

BEN, BALANVS MYREPSICA, nux unguetaria, auellanę magni tudinis, alba & triangularis ut plurimum, & cortice tenui prædita: intus aut nucleum pinguem continet, fungoſa & alba tunica cõtectum. Laudatur ampla, uetus, cortice læui, tenui, pleno, medulla læui, pingui. Parua uerò ex albo nigricans, uetus, plena, medulla alba, læui, pingui eſt innocentior. Naſcitur in Æthiopia, Ægypto, Arabia. * Ex nucleo oleum parari ſolet, quod Balaninum appellatur: aperit, mollit, & digerit. Andernacus & Medici Colonienses.

CAPPARIS aculeatus frutex eſt, qui in terra ſtratus magis in orbẽ euagatur. Spinæ, ut rubus, habet in hami modum aduncas: folia mali cotoneæ, rotunda: fructum oleę ſimilem, qui cum dehiſcens panditur, ſtorem candidum promi: quo excuſſo nonnihil glandis oblongę figura inuenitur: quod apertum grana acinis punicorum ſimilia oſtendit, parua, rubicanda: radices lignoſas ſpargit, grandes, numeroſas q;. Tenui plerũque ſolo, aſperis q; locis, in inſulis, & iuxta rudera naſcitur. Præſtantiſſimæ cappares ex Alexandria Ægypti Venetias aduehuntur. Caulis & fructus, cibi gratia condiuntur. * Aluum turbat, stomacho aduerſatur, ſitim gignit: cocta tñ stomacho, q̄ crudã utilior

utilior est. Fructus drachmis duabus in uino potus, quadraginta diebus, li-
nem absumit, & urinam, cruentumq; excrementum emittit: bibitur utilissi-
mè in coxarum doloribus, & neruorum resolutione, item ruptis & conuul-
sis: menses ciet, caput purgat. Dioscorides. A

NUX MOSCHATA, arboris Indicæ fructus est, persicæ arbori (ut scri-
bunt) similis. In hac enim nux Moschata nascitur, maci suo inuoluta, ueluti
auellana, membrana illa sua exteriori. Macis inuolucro tegitur, quemadmo-
dum & in alijs nucibus, putamen durum, quod in se nucem Moschatam con-
tinet, qua utimur. Eligenda est recens, non exesa, grauis, succi plena, oleosa,
odorata. * Excalfacit ordine secundo completo. Adstringit, oris suauitatem
emendat, uisum acuit, uentriculum & iecur roborat: lienum absumit, urinã
ciet, fluentem aluum sistit, flatu discutit, & frigidis uteri affectibus mirificè
prodest: maximè saccharo condita recens, qualis ex India adfertur, mane &
uesperi ante cibum sumpta, scrupuli instar. E' recentibus prius contusis, &
in cacabo calefactis prælo exprimitur liquor, qui refrigeratus ceræ nouæ
instar concrefcit, fragrantissimum spirans odorem, neruorum & articulo-
rũ diuturnis doloribus à frigore excitatis utilissimus. Matthiolus & Medici
Florentini.

PISTACIA ex Syria Venetias importari solent. Eliguntur recentia, nu-
cleo intus herbaceo, sapore iucundo. * Stomacho sunt amica. Iecinoris ob-
structiones auferunt: uentriculum & hepar roborant: ad uenerem incitant:
impingunt. Diosc. & Matthiolus. B

CALIDA quoque in secundo ordine sunt ficus, nuces siccæ, &c. de qui-
bus uide suprã suo loco.

De fructibus calidis in tertio.

BACCÆ IUNIPERI in syluis, asperis nascuntur, rotundæ, nigræ, o-
doratæ, in mandendo dulces, subamaræ. Colliguntur mèse Decembri. * Mo-
dicæ calfaciunt & astringunt, stomacho utiles: contra pectoris uitia, tussim,
inflationes, tormina, & serpentium ictus efficacissimè bibuntur: urinam ci-
ent, unde ruptis, conuulsis, & uulue strangulatui subueniunt: sed caput ten-
tant. Oleum ex baccis fit longè præstantissimum, cuius guttæ paucæ ex ui-
no potæ, calculos è renibus pellunt: ore calidum retetum, dentium dolores
tollit, si ex frigida defluxione contracti sunt: resolutionib. neruorum, extrin-
secus adhibitum confert. Diosc. & Andernacus.

CARIOPHYLLORVM arbor provenit in Orientali plaga, quibusdã
Indici pelagi insulis, non longè à Badan. Huius caudex buxo simillimus est,
eademq; materies. Folia uerò cinnamoni instar habet, sed rotũdiora. Fructu
est paruo, ex atro rufescente, in clauis modum capitato, exertis in aduersum
quatuor

DE FRUCTIBVS CALIDIS IN TERTIO. 141

A quatuor denticulis, sese stellatim decussantibus prominulo apice, quadrati alueoli sinu medio umbilicatum prodeunte. Cultores hirundinibus flagellant arborem, contrato prius circumquaq; tegetibus palmeis solo. * Calidi & sicci in tertio: iocinori, stomacho & cordi auxiliantur. Concoctionem adiuuant, & alui fluxiones cohibent. Quinetiam eorum puluis quatuor drachmarum pondere cum lacte sumptus, uenereas uires adauget. oculorū uisum exacuunt, & eorum nubeculas, argemasq; exterunt. Oleum ex eis, sicut ex cinnamomo, multò est efficacius. Matthiolus.

CARPOBALSAMVM fructus balsami est. Ab Alexandria comportatur. Optimum legitimumq; flauum, farctum, ponderosum, gustu mordens, & feruens in ore: non autem nigrum, leue, inane, non acre, & nullum spirans odorem, quale, quod circumfertur, deprehenditur. Quòd si uerum carpobalsamum haberi nequeat, cubebæ, uel grana iuniperi eius loco substitui possunt. Matthiolus.

B ANACARDIA, sunt fructus cuiusdam arboris, auicularum corculis nò dissimiles, unde & nomen: colore etiamnum cordis modo rufescente, cum scilicet ab arbore decerpuntur. Inest ijs liquor mellis crassitie, sub cortice residens, sanguinis modo rubicundus: sub quo est & nucleus paruæ amygdalæ effigie. Præstant pleniore & habiliores, fusci, resina in cortice multa, acri, nigra, nucleo intus albo: quo in melle cocto fit mel anacardinum. Hoc etiã titulo, potest oleum exprimi: sed longè diuersum ab eo, quod coctis in aqua corticibus supernat, & conchis colligitur, ad confectionem anacardinam. Cæterum liquoris in medicina usus est, etsi myropolè communi errore, & cortice & nucleo utantur. Nascuntur in Sicilia montibus, qui continuè igneas eructant flamas. * Excalfaciunt & exiccant tertio excessu. Labantes sensus reuocant, memoriæ iacturam refarciunt, & neruorū & cerebri affectibus, quos frigida causa attulerit, auxiliantur. Serapio, Actuarius, Paulus & Matthiolus.

De fructibus calidis in quarto.

PIPER arbusculæ in India nascentis fructus est: quæ inter initia (ut ait Dioscorides) prælongum fructum, ueluti siliquã, quod piper longum uocamus, profert: habet intus aliquid tenui milio simile, quod dehiscentibus siliquis racemorum in modum prodit. Eorum grana acerba candidum piper uocantur: matura uerò, piper nigrum. Qui uerò in Indiam nauigarunt, piperisq; plantã uiderunt, piper in planta bryoniæ simili nasci asserunt, diuersisq; explantis longum & rotundum colligi. Nihil tamen interest. Nigrum eligi debet recens, grauisimum, plenum. Candidum præfertur, non rugosum, candidum & graue. Longum optimum, quod, dum frangitur, solidum intus conspicitur, & compactum, gustu acerrimo, linguamq; mordens. Ad uiteratur longum herba simili: sed fucus deprehenditur, si in aqua immittatur: nã ad uerum liquefeit, legitimum uerò solidum manet. * Omnia piperis genera aduersus

aduersus uenenum ualent. Longum præcipuè colicæ medetur: eo quòd cale
faciat, & crassos humores incidat. Album magis astringit, & stomachum con-
firmat, sed rarò apparet. Nigrum ad condimenta utilius. Medici Florentini. A

De fructibus frigidis in primo.

CITRIA MALA nemini non cognita. Arbor ipsa omnibus anni tem-
poribus pomifera, alijs deciduis, alijs iubnascentibus. Malum oblongum
est, rugosum, colore aurum imitans, cum grauitate odoratum. Semen habet
pyri. Principem locum obtinent, quæ in lacus Benaci ripis proueniunt. quæ
uerò ex Liguria uiridarijs, & Adriatici & Aegæi pelagi insulis, alijsq; locis,
in cibis nõ æquè ac illa, præstât. Seruâtur diutius incorrupta, si hordei uel mi-
lij aceruis obruantur. * Venenis aduersantur, maximeq; semè eorum. Citrij
decoctum collutione, oris halitum cõmendat, suauitatemq; accersit. Ipsa aut
integra uestiarijs condita, uestes non modò gratissimo odore perfundunt,
sed eas etiam à tineis & blattis uindicant. Cruda cõmansa, non faciliè coctio-
ni obediunt: quin & crassum generant succum: ob hoc ueici ijs melle aut sac-
charo conditis satius est, quòd uentriculum cõmodè calfaciant, ac roborèt.
* Aduersus atram bilem, & morbos mæstos, quos illa excitat, opitulatur.
Semen priuatim scorpionum ictibus & potum, & appositum mirificè mede-
tur. Acidus eorum succus flauam reprimat bilem, arcetq; pestis contagia. B
Dioscorides & Matthiæolus.

MALA COTONEA * stomacho utilia, urinam cient: uerùm tosta mi-
tiora habentur. Profunt cæliacis, dysentericis, purulèta extusientibus, cho-
lericis, præsertim cruda. Macerato uel liquor cõmodè in stomachi aut uentris
fluxionibus, potui datur. Succus crudorum assumptus orthopnoicis saluta-
ris est. Decocto fouentur uulux, & fedes, si præcidant. Cotonea, quæ melle
condiuntur, urinam mouent: mel autem si constringentem illorum uim, &
inspissantem adsciscit. Quæ cum melle coquuntur, stomacho atq; ori gratiora
sunt, sed minus inspissant. Cruda cataplasmatibus adijciuntur, ad cohibendum
aluuium, aut si stomachus ætuet, aut in uomitiones effundatur, ad mammarũ
inflammationes, præduros leues, & condylomata. Fit uinum ex ipsis tuis,
expressisq;: sed quò perduret, quindecim sextarijs succi unus mellis adiungi-
tur, alioquin in acorem degenerat. Prodest ad omnia, quæ dicta sunt. Fit & o-
leum ex eis, quod melinum uocatur: quo utimur, quoties adstringenti oleo
est opus. Eliguntur uera, rotunda, parua & odorata. quæ uerò Struthia dicun-
tur, magna quidem sunt, sed minus utilia. Dioscorides.

PYRORVM multa genera, quorũ facultates ex saporibus gustu digno-
scuntur: cùm dulcia natura distent ab acerbis, acidis, austeris, & ab his, quæ
unum uel plures præ se ferunt sapores: & contrà, hæc deinceps ab illis sint
diuersa. * Pyra esu stomacho grata sunt: quin & uim habent exiccãdi. Atqui
syluestribus

DE FRUCTIBVS FRIGIDIS IN SECVNDO. 143

A syluestribus magis adstringendi facultas inest: ob id etiã magis præstant contra fluxiones. Galenus & Matthiolus.

PRVNA dulcia * aluum soluunt, bilis feruorem restinguunt, sed stomachũ malè habent. Acida, stomacho utilia sunt, & aluũ astringunt. Præferuntur Damascena, Vngarica, grandia, & oblonga. Matthiolus.

De fructibus frigidis in secundo.

CVCVRBITA * refrigerat & humectat ordine secũdo: sitim sedat: phlegmonas refrigerat, febres restinguit. Cruda, trita illitu tumores & abscessus mitigat. Ramenta eius infantibus contra capitis ardorẽ, quã syriam uocant, in syncipite illinuntur: ocolorũ inflamationes, podagrasq; refrigerat. Succus è rametis tuis, p se, aut cũ rosaceo infusus, aurium doloribus auxiliatur: adustiones cutis in ardenti febre illitu adiuuat. Totius feruefactæ & expressæ succus, cũ melle exiguo & nitro potus, aluũ leniter resoluit. Vinũ in cucurbitã recẽtẽ excauatã infusum, si mistũ sub diuo teneatur, potũ aluũ leuigabit. Diosco.

CVCVMIS satius * aluo & stomacho perquam utilis habetur: refrigerat, qui corruptionem non sentit: uesicæ prodest: olfactu reuocat, quos animus liquerit. Semen modicè urinam mouet: cum lacte aut passo, uesicæ exulcerationibus subuenit. Illita cum uino folia, morsus canum sanant: & epini-ctidas, cum melle. Dioscorides.

B GALLA fructus est quercus. Aliqua omphacitis, id est, immatura appellatur: altera plana, leuis, perforata. Eligitur omphacitis, parua, nodosa, grauis, solida, nõ perforata: minus utilis magna, rotundissima, polita, leuis, laxa, perforata, flaua, aut saltem rufa. Gallia Narbonensis & Lugdunensis præfert rosmarinas uulgò dictas, omnium minimas, graues, solidas, asperas, preciosissimas. * Vtriusq; uis, uehementer astringere. Tritæ excrementia in carne, fluxiones gingiuarum, & uuæ atq; oris ulcerationem cohibent. Nucleus dentium cauernis inditus, dolorem sedat. Crematæ carbonibus, donec igne flagent, & uino, aut aceto, aut acida muria extinctæ, sanguinem supprimunt. Decoctum quibus insidere expedit, efficax est, & contra uulvas procidetes, fluxionesq;. Capillos denigrant, aceto, aut aqua maceratæ: dysentericis, cœliacisq; cum uino aut aqua tritæ conuenienter illinuntur, aut bibuntur: obsonijs addi debent, aut integræ in aqua præcoqui, in qua nonnihil excoquendum est, quod his affectibus conferat. In summa his utendum ad astringenda, aut sistenda, aut sicanda, quæ opus sunt. Dioscorides.

AVRANTIORVM malorum tria in Italia obseruantur genera: dulcia, acida, & uinolenta, siue mixta. * Dulcia in omnibus partibus exalfaciunt. Aliorum uerò succus refrigerat, prout maiore seu minore referta sunt aciditate. Quocirca febricitantibus, ad restinguendam sitim, acida quidem & uinosa, nõ autem dulcia sunt exhibenda. Cortex amara est, ob id calidior limoniorum cortice censenda. Matthiolus.

LIMC.

LIMONIA mala gustu Citrijs & Aurantijs malis acidiora sunt: ob id succo & frigidiora & sicciora esse, argumento duci possit. * Fit ex succo, sicut & citriorum, serapium, ad restinguendum bilis feruorem non inutile. Item & ad pestilentes febres, & eas, quæ contagione non uacat. Aqua quæ est Limoniorum succo calentis aquæ balneo, & uitreis organis extrahitur, præterquam quod mulieribus expetitur pro fuco ad faciem expoliendâ, uirilignes ubicunq; sint, & totius corporis maculas emendat, uaros delet, & acaros interimit. Serapijs admixta, febribus acutis & contagiosis mirè succurrit. Epota uentris tineas enecat: id quod etiam præstat succus recèter expressus, unciæ pondere potus. Matthiolus.

MALA PUNICA in Italia, Hispania, in hortis, uinetis & uiridarijs nascuntur. Triplici distinguuntur specie: alia namq; dulcia, alia acida, alia uinosa sunt. Eliguntur cortice seu corio integro, rufo, duro, & denso, grauiâ, matura, granis intus rubris, uel roseis, succo prægnantibus uinosa plenissima. * Malum Punicum omne boni succi est, stomacho utile, perexiguum sufficiens alimentum. Dulcia stomacho utiliora habentur, sed aliquantulum in eo calorem gignunt, inflationes pariunt, unde in febre abdicantur. Acida astringunt, æstuanti stomacho auxiliantur, & multò magis contrahunt, ac urinâ cient: ora, gingiuasq; lædunt. Vinosa uerò mediam sortiuntur naturâ. Nuclei acidorum acidi punici in sole siccati, & obsonijs inspersi, concoctiue, fluentem aluum, stomachumq; sistunt: cœlesti aqua madescunt, bibunturq; commodè sanguinem excreantibus: ad defessus dysentericorum, fœminarumq; fluxione uulvæ laborantium utiles sunt. Expressus nucleorum succus coquitur cum melle, ad oris, uirilitalis, & sedis ulcera, nomas, reduuias, & ea quæ in corpore extuberant, aurium dolores, & narium uitia: præsertim acidorum. Huius flores cytini uocantur: qui astringunt, siccant, cohibent: sanguinolenta glutinant: quas punicum, præstant utilitates. humida gingiuarum uitia, mobilesq; dentes decocto colluuntur: herniam prolapsu intestini erumpentem, cataplasmate repellunt. Memoriam tradunt, qui tres quàm minimos cytinis deuorauerit, nullam in eo anno lippitudinem passurum. Eliquatur hypocyttidis exemplo. Malicorium asperum est mali punici putamen, quod aliqui Sirdion appellant. Id spissandi uim habet, & quos cytini, præbet usus. Decoctum radices potu latus uentris tineas expellit, & easdem euocat. Balauitium syluestris punicæ flos est: de quo supra suo loco. Dioscorides.

PEPONIS * caro in cibus, urinam cit: inflammationes oculorum illita sedat. Ramenta eius contra aduersionem infantium, quæ syriasis uocant, syncipiti imponuntur: fronti admota oculorum fluxiones auertunt. Succus cum femine, adiecta farina, siccatus in sole cogitur in smegmata, quæ faciè repurgant, & nitorem afferunt. Radix sicca, & ex hydromelite pota, drachmæ pondere, uomitionem mouet. Si quisquâ moderatè secundum cœnam uomere cupiat,

DE FRUCTIBVS FRIGIDIS IN SECVNDO. 145

A cupiat, geminis obolis sit contentus. Sanat quoq; illita cū melle, ulcera concreta in modum faui, quæ ceria uocant. Easdem quoque uires obtinent Melones, Dioscorides.

PERSICORVM plurimæ reperiuntur species. nam quædã rubent, alia aureo colore fulgent, alia uirescunt, alia candida sunt, alia sanguinea, alia duracina, alia cotonea uocantur. Ad hæc quædam habentur dulcia, quædã acida, quædam uinosa, quædam amariuscula, & quædam etiam austera. Prima laus in cibis duracinis, sic ex re dictis, quod caro tam pertinaciter hæreat ossi, ut nullo pacto ab eo auelli queat. Præcipua autem in hoc genere illis laus, quæ ab aurei coloris nitore, odoreq; perquam iucundo cotonea cognominant. Secundas sibi uendicât partes, quæ cortice detracto sanguineum succum fundunt, non propterea modò quod sint gustu reliquis suauiora: sed etiam quia magnitudine & colore sunt speciosa. Proxima sunt, nec prædicto generi fortasse cedunt, quæ à nucis similitudine Nucipersica cognominantur. hæc enim cum colore & sapore nõ refragetur persicis cotoneis, tum etiã non ingrata dētibus duritie, gustũ mira afficiunt uoluptate. Sunt præterea Armeniaca, quæ à Latinis præcocia dicuntur, minora prædictis. * Persica poma imatura tā stomacho, quã uentri utilia sunt. acerba aluum cohibent, sed sicca uehementius. Decoctum è siccis alui, stomachiq; fluxiones sistit. Armeniaca stomacho sunt utiliora. Matthioli & Dioscorides.

B *De fructibus humidis in primo.*

HVMIDI in primo sunt caro Citri, Ziziphæ, &c. de quibus uide suprã suo loco.

De fructibus humidis in secundo.

HVMIDI in secũdo ordine sunt Cucurbita, Melones, Pepones, Persica, Pruna Damascena, Vua matura, &c. de quibus uide suprã suo loco.

De fructibus siccis in primo.

SICCI in primo sunt Baccæ Iuniperi, &c. de quibus uide suprã suo loco.

De fructibus siccis in secundo.

BALANVS Myrepica, glans unguentaria, Arabes Ben appellant: auelanæ magnitudinis, alba, & triangularis: laudatur ampla, uetus, cortice læui, tenui, pleno, medulla læui, pingui: parua uerò ex albo nigricãs, uetus, plena, medulla alba, læui, pingui, est innocētior. * Ex hac oleum parari solet, quod Balaninũ appellatur: aperit, mollit, & digerit. Colonienses.

SICCI quoq; in secundo recessu sunt Capparis, Cotonea, Nux Cupressi, Nux Moschata, Pyra, Pistacia, &c. de quibus uide suprã suo loco.

De fructibus siccis in tertio.

SICCI in tertio gradu sunt Caryophylli, Carpobalsamum, Galla, &c. de quibus uide suprã suo loco.

r De

De fructibus calfacientibus caput.

CVBBÆ, quarum in officinis usus, sunt fructus piperi similes, ex Orientali plaga nobis peregrini allatæ. Eliguntur corpulentæ, plenæ, graues, aeres, minus tamen quàm piper, subamaræ, admodum aromaticæ, subdulces: annis decem seruantur. Non sunt autem Cubebæ Arabum, neq; earū loco in Arabum præscriptionibus usurpari debent, sed canella: arbitratur enim Serapio, cubebas esse carpesium: ex Galeni sententia eas facultates cubebis tribuens, quas Galenus carpesio tribuit, corticem cinnamomo similem esse asserens: imò cinnamomi loco carpesium maiore quantitate substitui uoluit. * Cæterum excalfaciunt cubebæ initio ordinis tertij, siccāt uerò in fine eius. Quamobrem languentem expituita uentriculum, uel etiam ex flatu roborant: pectus à lentis, crassisq; humoribus expurgant. Lienem iuuant, flatu discutiunt, & frigidis uteri affectibus auxiliantur. Diu cum mastiche mansæ, pituitā à capite trahūt, & cerebrū roborāt. Medici Florentini & Matthiolus. **CALEFACIUNT** quoq; caput, Anacardia, Nux Moschata, &c. de quibus uide suprā suo loco.

De fructibus calfacientibus thoracem.

AVELLANÆ sunt aut syluestres, aut domesticæ. Ex domesticis aliæ oblongæ, aliæ rotundæ sunt: ueruntamen oblongas & præstantiores, & gustui gratiores esse constat: & illæ præsertim, quæ putamine uehementer rubent, & fractu minimè sunt contumaces. * Auellanæ plus habent essentiæ terrestri, ac frigida, quàm iuglandes. quin & plus præbent alimenti: minus tamen amygdalis alunt, cibus in uentriculo supernatant, largius esitæ caput tentant: innocetiores tamen uirides quàm aridæ. Ipsæ tamen aridæ tritæ, & in aqua mulla potæ, tussi ueteri medentur: tostæ, & cum exiguo piperis potæ, destillationem concoquunt. Crematarum cinis cum axungia, aut adipe urfi perunctus, alopecij capillum reddit. Aiunt nonnulli, uista earum putamina, & in cineris speciem redacta, cum oleo cæsiorem oculorum pupillas infantibus denigrare, peruso syncipite. Matthiolus, Dioscorides & Galenus.

AMYGDALÆ amaræ probantur flauissimæ, plenæ, integræ, duræ & siccæ. * Calida in primo, & sicca in secundo: magis abstergunt quàm dulcia: meatusq; uiscerum expurgant, aperiuntq;: humores extenuant: crassos lentosq; ex pectore & pulmone mirè educunt: coli & renum dolores ex similibus creatos perfanant.

ZIBIBÆ sunt uuæ passæ grandiores, quæ ex Damasco, Cypro & Creta apportantur. * Eiusdem facultatis sunt cum minoribus uuis passis dulcibus.

CALEFACIUNT quoq; thoracem Caricæ, Ficus, Nux pinea, Palmulæ seu Dactyli, Vuæ recentes, &c. de quibus uide suprā suo loco.

De

DE FRUCTIBVS CALFACIENTIBVS COR. 147

A *De fructibus calfacientibus cor.*

NVCS INDICÆ myropolijs omnibus vulgatissimæ, fructus sunt arboris cuiusdam, palmæ effigie, prægrandes, magnorum melonum instar, ab arbore dependentes: namq; magna inuolucrorum mole obteguntur. Cortex ijs extimus colore constat in atrum rufescente, subdurus, tenax, callosusq;: intus uerò uillosa materie compactus, quæ in capillamenta manibus exterius fatiscit. Subtus est putamen triquetrum, uillosum, barbatumq;, cornu instar prædurum, eiusdem ferè coloris nucleum continens, oui anserini magnitudine, intus cõcauum: substantia illi pinguis, crassitudine semidigitali, duriuscula, tenax, callosaq;, albicans, sapore dulci, butyrum referens, tenui, sed aspero obtecta cortice, putaminis colore. Probantur recentes, eaq; præsertim, in cuius concauitate liquor quidam dulcis includitur: siquidem hoc argumento recentiores facile cognoscuntur. * Excalfaciunt secundo excessu, humectant uerò primo. In cibis sumptæ, etsi noxium admodum succum non gignant: uentriculo tamen laborem inferunt: semen augent, & uenerem excitant. Nux Indica lætiore sagina corpora reficit. Idcirco strigosas mulieres mirum in modum impinguat, & ad crassitiem reducit. Matthioli.

CALFACIUNT quoque cor, Mala Citria, Nux Moschata, &c. de quibus uide supra suo loco.

De fructibus calfacientibus stomachum.

B **STOMACHVM** calefaciunt Amygdalæ dulces, Ben, seu Balanus Myrepica, Cariophylli, Nux Moschata, Pineæ, &c. de quibus uide supra suo loco.

De fructibus renes & uesicam calfacientibus.

RENES & uesicam calefaciunt Amygdalæ amaræ, Baccæ iuniperi, Cubebæ, Nuclei pini, Vua passa, &c. de quibus uide supra suo loco.

De fructibus calfacientibus uterum.

LAVRI baccæ mense Decembri colliguntur. Magis quàm folia calfaciunt.

UTERVM calefaciunt Baccæ iuniperi, Iuglans, Nux Moschata, &c. de quibus uide supra suo loco.

De fructibus refrigerantibus thoracem & cor.

THORACEM refrigerant Iuubæ siue Ziziphæ, Sebesten, seu Myxa, siue Myxaria: de quibus singulis uide supra suo loco.

COR refrigerat Cotonea, Mala aurantia, Pyra, &c. de quibus singulis uide supra suo loco.

De fructibus refrigerantibus stomachum.

CERASA * dulcia, magis q; in intestinis sunt, subducunt, sed minus utilia stomacho sunt. Cõtrà austeræ. Quæcũq; uerò acida sunt, ea pituitosis, excrementosisq; stomachis conueniunt: siquidem austeris magis desiccant, & non nihil etiam incidunt. Galenus.

MALA * acerba astringunt: matura uerò longè secus. Mejimele siue dulcia uen-

cia uentrem emolliunt, & ab eo animalia expellūt: stomacho negociū exhibent: æstuationē faciunt. Epirotica m̄la, quæ Latinè orbiculata dicuntur, stomacho utilia, sistunt aluum, urinas euocant: malis tamen cotoneis inualidiora. Syluestria mala similia sunt uernis, & astringunt. Verna bilem gignūt, neruos omnes lædunt, inflationes pariunt. Dioscorides.

MESPILVS, quæ à nonnullis aronia uocatur, spinosa arbor est, folio pyracanthæ, siue oxyacanthæ. Fert pomum suaue, exiguo malo non dissimile, tribus intus ossiculis: qua ex causa id nonnulli tricoccon appellauēre. Tardè mature scit: * esu adstringit, stomacho gratum est, aluumq̄ue supprimit. Dioscorides.

OLIUIS muria asseruatis utuntur in cibis. Laudatissimè ex Hispania apportantur. * Astringunt & refrigerant.

RIBES fruticosum est, folio paruo, uitigineo, perinde ac albæ populo. Ramuli sunt ei lenti ac fluxibiles, è quibus fructus paruorum uuarum modo, racematim dependent, rotundis, simulq̄ue cohærentibus acinis magnitudine piperis, qui maturitatem adepti, maximè rubent, sapore subacido, admixto etiam dulci. Vulgaris est planta, in hortisq̄; frequens. * Febribus acutis opitulatur, æstuantem uentriculum refrigerat, sitim restinguit, nauseam & uomitiones sistit, cibi appetentiam incitat, cœliacos & lientericos iuuat, & biliosis defluxionibus uexatos: sanguinis feruorem demulcet, bilis acrimoniã retundit, impetumq̄; domat. Matthiolus.

CORNVS arbor uulgaris est noticiæ. * Fructus in cibo astringit: profluuiò alui, atq; dysentericæ salutares, siue in edulio, siue in defruto exhibeantur. Dioscorides.

SORBA fructus sunt uulgatissimi, nullisq̄; non cogniti. * Eandem astringendi naturã præstât quã mespila, sed imbecilliore effectu. Vtraq; tamen in medico usu magis, quàm in cibis expetuntur. Galenus.

REFRIGERANT quoq; uentriculū Cotonea, Citrulli, Cucumeres, Cucurbita Limones, Melones, Mala aurantia, Punica, Pyra, &c. de quibus singulis uide suprã.

De fructibus refrigerantibus hepar.

BERBERIS fructus est fruticis, acinis oblongis, racemo pendalis, q̄ maturitate maximè rubet, punicæ mali acinis haudquaquã abstmiles, quanquã figura longiores, gustu acido, & subaustero, paruis reconditis intus nucleis. * Sitim restinguit, sed biliosas, pestilētesq̄; exhalatiōes supprimit. Datur utiliter cœliacis, cibū reiicientib. & dysentericis, & ubi bilis à iocinere in uentriculū regurgitã cholericos excitauerit affectus. mensium profluuia cohibet. tinea uentris enecat. prodest cruentis excreationibus: firmat commotos dentes, si eo sæpius foueantur: gingiuas roborat, &c. Matthiolus.

HEPAR quoq; refrigerat Cucurbita, Cucumis, &c. de quibus s̄. suo loco.

De

A *De fructibus refrigerantibus renes & uterum.*

FRAGA fructus sunt nemini nō cogniti. Æstate in cibis arriidēt, biliofis, æstuantibusq; uentriculis profunt, siticulosissq; sitim sedant. * Vinum quod ex ijs elicitor, ulcusculis quæ in facie à caliditate proueniunt, mirificè medetur: itemq; uaros, & oculorum nubeculas, calidasq; defluxiones impositum tollit. Matthiolus.

UTERVM refrigerant Cucumeres, Cucurbita, &c. de quibus uide suprâ suo loco.

De fructibus astringentibus.

MYRTI baccæ probantur recentes plenæ, succolentæ, odoratæ, grâdes, & bene nutritæ. * Restringendi uim habent.

ASTRINGUNT quoque Berberis, Castanea, Cornus, Cotonea, Galla, Glans, Mespila, Mala punica, Nux Moschata, Oliuæ, Omphacium, Palmulæ, Pyra, Persica, &c. de quibus singulis uide suprâ suo loco.

De fructibus discutientibus.

DISCVTIUNT Cappares, Piper, &c. de quib. singulis uide s̄. suo loco.

De fructibus extenuantibus.

EXTENVANT Amygdalę dulces, Baccæ iuniperi: de quib. s̄. suo loco.

De fructibus glutinantibus.

B GLVTINANT Glans, Palmulæ, &c. de quibus singulis uide suprâ suo loco.

De fructibus flatus discutientibus.

FLATVS discutiant Baccæ lauri, Baccæ iuniperi, Nux Moschata, Piper, &c. de quibus suprâ suo loco.

De fructibus semen generantibus.

SEMEN generant Ficus, Nux pinea, Nux Indica, Pistacia, &c. de quibus uide suprâ suo loco.

De fructibus urinam cientibus.

HALICACABVM, seu uesicaria, solani species est: folijs hortēsi solano similibus, uerum latioribus: cuius caules, posteaquâ adoleuerunt, prona terram spectant, folliculis orbiculatis, uesiculis similibus, in quibus semen continet fuluum, rotundum, læue, acinorum uuæ figura: quo coronarij utuntur, corollis intexentes. * Vim usumq; hortensis solani habet: uerum cibis nequaquam expetitur. Regium morbum purgat semine potu, & urinam pellit. Matthiolus.

De fructibus menses mouentibus.

NVCLEI persicorum incidunt, extenuant, resoluunt, & digerunt: * unde uiscerum obstructions aperiant, renes affectos iuuant, hæmorrhoidum dolores sedant: tum in cibo, tum potu ex uino assumpti. Andernacus.

MENSES quoq; mouent Baccæ hederæ, Cappares, Piper, &c. de quib. A
singulis uide suprâ suo loco.

De fructibus menses sistentibus.

MENSES sistunt Berberis, Vua passa cum nucleis, &c. de quibus suprâ
suo loco.

De fructibus uenenis resistentibus.

VENENIS resistunt Baccæ iuniperi, Iuglans, Mala Citria, Piper, &c. de
quibus suprâ suo loco.

De fructibus dolorem mitigantibus.

DOLOREM mitigant Baccæ iuniperi, Baccæ hederæ, Ficus, Iuglans, Pi
per, &c. de quibus suprâ suo loco.

De fructibus purgantibus bilem flauam.

CASSIA Arabum, est cassia illa nigra solutiua, uulgò notissima. Eliga-
tur Alexandrina, amplis siliquis, grauis, plenior, quæ concussa, clausis intus
granis non strepat, cortice læui, & purpurascente: pulpa intus pingui, splen-
dente, succulenta, non situlenta nec putri, sapore prunorum delicato. Vten-
di tantùm tempore extrahenda: nam extra cannas promptè corrumpitur, &
in uasis seruata peior euadit. In Græcorum medicamentis, si cassia præscriba-
tur, eius loco canella sumenda est: tum etiam in Arabum scriptis, ubi Græco
rum remedia recensent, & ijs etiam medicamentis, quæ corpus non soluunt. B
Sin autem remedia ab Arabibus descripta sint: aut in eum usum præscripta,
ut corpus purgent, cassia nigra uti debemus. Datur omni ætati: imbecilliori
bus quidem drachmæ duæ uel quatuor: robustioribus autem & adultis un-
cia, uel sescuncia, uel drachmæ decem, cum sacchari momento, mane, uel an-
te cœnam. Calido frigido temperata est, nisi quòd paulò est calidior, humida
primo gradu: * clementer & innoxie à uentriculo bilem & pituitâ purgat le-
nièdo, febribus inde ortis confert, sanguinem hac ratione puriorem reddit,
ac eius sanguinis, & bilis flauæ acrimoniam frangit, resoluit thoracis & pul-
monis & asperæ arteriæ phlegmonas, easq; partes lenit ipsa morfus expers,
sitim sedat, præsertim sumpta cum succo intybi, uel cichorij, uel solani arte
depurato. Intemperiem deniq; renum calidam mitigat, cum diureticis sum-
pta, & glycyrrhiæ decocto, ob idq; calculum in his gigni prohibet. Quòd
si uiscera fuerint sicciora, cassiæ lubricitas augenda est oleo amygdalarum
dulcium: si debilia & lubrica sint, minuèda myrobalanis, uel rhabarbaro, uel
aqua cum mastice cocta, uel spica addita: si ad uias urinarias ferri eam uolu-
mus, uretica misceantur. Quoniam uerò tardius & imbecillius purgat, acro
aliquid (quale thymum, hyssopum) actionem eius intendens misceatur,
aut potius aliquid medicamentorum ualenter purgantium: efficaciusq; pur-
gat hæc, si ex sero lactis propinetur. Mesues, & Medici Florentini.

MYROBA-

DE FRUCTIB. PURGANTIB. BILEM FLAVAM. 157

A MYROBALANI Arabum fructus quidam prunis similes, callo corporis compactili, osse intus lignoso, differunt à Myrobalano, hoc est, nuce unguentaria Dioscoridis, quam uulgius Ben appellat. Quinque generib. distinguuntur: uidelicet in Citrinas seu flauas, Chebulas, Indas, Eimblicas, & Belliricas. Citrinę laudantur multum flauę, in uiride inclinantes, densę graues, gummosę, cortice crasso os paruū complectente. Dosis in substantia est à drachmis duabus, usque ad drachmas quinque: in infusione à drachmis quinque usque ad uiginti. Sunt frigidę in primo, siccę uerò in secundo. * Purgant uentriculum bile, ab eaq̃ tertianam, & reliquas febres biliosas, & ardorem extinguunt: calidis & biliosis naturis salubres. Cauendus tamen earum usus in uiscerum obstructionibus est. Siquidem harum decoctum ualenter obstruit. Assę item ipsę minus purgant, potentius constipant, & astringunt, & his magis ustę. Harum quoque tritarum puluis, quò tenuior, eò uehementius astringit. Quapropter maceratione seu infusione harum (ex sero caprino) nobis est utendum, præsertim cum solam euacuationem expetimus. Mesues.

PRUNA dulciã, quę hodie Vngarica uocant conseruantur per annum. * Modicę elixa, eorumq̃ iuscula, unius librę cum saccharo bibita, uentrem laxant. Mesues.

B SEBBSTEN seu myxa, sunt fructus arbuti, cuius fructus auellanae nucis, quam ponticam uocant, magnitudine, in racemo dulcis dum maturescit potissimum pallefcens, candido lentore plenus, cum interiore nucleo quasi oliuę siccatur: quo priuatim utimur in medicina. * Conseruantur per annũ. Febrientium uentrem laxant, sitim sedant, linguę ariditatem & scabritiem tollunt, pectoris uitia adimunt: humida in primo. Mesues.

TAMARINDI dactyli sunt acidi, fructus palmę syluestris Indicę. Eius folia ad hyperici folia multum accedere conspecta sunt, etiamsi à quibusdam salicis folia illi tribuantur. Fructus, cuius hodie usus, notus est. Probantur colore à nigro in rufum languescente, teneri, multis uillis intertexti, recentes, pingues, non retorridi, ex dulcibus acidi, & uinoso sapore. Adulterantur prunorum carne, sed in his nigredo est obscura, humentiores sunt, & prunorum odor & sapor illis inest. Seruantur in fictile uitratum coacti, loco frigido & sicco, per annos tres. Potio eorum est ab uncijis duabus usq̃ ad uncias quinque. Est medicamentum excellens atque innocens, frigidum siccum ordine secundo. * Ob id humorum acrimoniam reprimat, bilē purgat, eiusq̃ & sanguinis feruorem furoremq̃ compressit, febres acutas lenitione egētes, & regium morbum sanat, sitim ac omnem uentriculi hepatisq̃ ardorem extinguit, uomitum sistit. Mesues & Medici Florentini.

VVAE passę acinis exemptis, è uino aut aqua lotę, uncia unius uel alterius instar, uentrem laxant. Andernacus.

De fruct.

De fructibus purgantibus bilem atram.

A

MYROBALANI Indæ optimæ sunt nigræ, magnæ, carne densa, graues sine ossibus. Dosis pulueris à drachmis duabus ad unciam semis. Infusionis uerò ab uncia dimidia ad drachmas decem. Sunt frigidæ in primo, siccæ in secundo. * Bilem utramq; præsertim exustam purgant: tremoribus membrorum conferunt: colorem nitidum pariunt: elephanticos iuuant: incærores auferunt: & quartanam fugant. Mesues.

De fructibus purgantibus pituitam.

COLOCYNTHIS est cucurbitæ syluestris fructus, mali instar rotundus. Huius medulla in usu est. Laudatur pilæ mediocris in specie conglomerata, uehementer amara, matura, ampla, rara, ob id leuis: & quâto leuior, tantò melior: alba admodum lenis, eadem fœmina. Immatura, & his notis destituta, mala. Colligitur autumno cum flauescit, abeunte iam uirore. Conferuat per annos tres. Datur saltem robustis, & ætate florëtibus, à filiis sex ad decem, frigus & æstus uitantibus. Corrigitur eius malitia, mastiche, gummi tragacantho, uel bdellio. Calida & sicca ordine tertio. * Pituitam & alios humores crassos & glutinosos, magis ex profundis partibus & distantibus, ut cerebro, neruis, musculis, iuncturis, pulmone, thorace, quàm ex uenis attractos, purgat, ac etiam bilem flauam. Quapropter cephalalgia, dolori cranei totius, hemicranie, epilepsie, apoplexie, uertigini, aquæ fluxioni in oculum, podagra frigidæ, ischiadi, ac reliquis neruorum iuncturarumq; affectibus. mirificè subuenit: item asthmatis, ac tussi antiquæ, dispnoeæ ex thoracis repleti angustia. Ac præterea summè omnium prodest colico dolori tam pituita, quàm flatibus, & hydropi. Omnia autem hæc siue sumpta, siue clystere, aut balano intestinalis immissa præstat: utero autem imposta, fœtum necat. Eadem cum aceto forti affricata, alphas, psoram sanat. Oleum denique super cineres calidos incoctum cortici eius inanito, capillos illitu nigrat, eosq; ne cadant, firmat, canitiem tardat. Idem auri instillatum eius dolorem ac tinnitum sanat. Acetum autem similiter incoctum collutione dolorem dentium sanat: incidit enim, tenuat, terget ac digerit. Mesues.

B

CUCUMIS syluestris, seu asininus, fructu solo distat à satiui cucumere, quem longè minorem parit, oblongis glandibus non dissimilem, folia atque sarmenta satiui refert, radice candida, magna. Nascitur in sabuletis, & ruderibus, frutice in totum amaro. Colligitur succus ex fructibus per maturitatè pallentibus, exeunte ætate: siccatur ut scamonium: & triennio seruat. Datur à granis decem usque ad scrupulum unum. Corrigitur bdellio, aut tragacanthi lachryma, aut aqua mulsa cum salis modico adiecto, aut lactis portione. Calidus est & siccus ordine tertio, substantia ignea & terrea usta constat. * Purgat potenter pituitam uomitu & deiectione, & interdum bilem, si uacuati

DE FRVCTIB. PVRGANTIB. PITVITAM. 153

A cuari parata est: serosum quoq; excrementum, etiam euulso contumax, atq; adeo à iuncturis mirificè trahit. Mesues & Dioscorides.

MYROBALANI Chebuli, quò maiores, eò meliores, subnigræ, in rubrum inclinantes, graues, quæ aquæ impositæ statim merguntur, cortice crasso. Ex Memphiticis nundinis adferuntur. Dosis pulueris est à drachmis duabus ad quatuor. Infusionis uerò à drachmis quatuor ad decem. Humectati saccharo condiuntur. * Pituitam expurgant: mentem exacuunt: uisum reddunt clariorem. Saccharo uerò conditi uentriculum tum purgant, tum corroborant: hydropi & febribus diuturnis conducunt. Mesues.

MYROBALANI Emblici præstantiores sunt magni, carnis multæ, densi, graues, ossium paruorum. Ex Syria apportantur. Dosis pulueris est ab aureo uno usq; ad tres. Infusionis uerò ab aureis tribus usq; ad sex. * Purgant pituitam, cerebrum, neruos, uentriculum & cor corroborant: intellectum augent: stomachum à pituita & putrefactione mundificant: cordis tremori conferunt: appetitum excitant, & uomitum sedant. Mesues.


MYROBALANI Bellerici meliores sunt magni, densi, graues, & cortice crasso. Quæ his notis carent, aut uetustate exoleti sunt, aut aliud incommodum passi sunt. Ex nundinis Memphiticis feruntur. Dosis ut Emblicorum. * Frigidi sunt primo, sicci uerò secundo: cæ-

tera emblicis uiribus proximi. Mesues.

u

DE SEMI-


DE SEMINIBVS CAP. XI. A



A

A.
Semina se-
cundum lo-
cum alteran-
tia, aut

B



u 2 Semina

		Anthera, Berberorum. Bursa pastoris. Granum tinctorium. Miliū, Nuclei acinorum. Portulacæ, &c.	A
	Astringunt	Aneti, Dauci. Fœnumgræcum, Lini. Nigellæ, Sefami, &c.	
	Discutiunt	Faba, Eruum. Hordeum, Lupini. Vrticæ, &c.	
	Abstergunt	Fœnumgræcum. Lini, Maluæ. Nigellæ, &c.	
	Emolliunt	Portulacæ, &c.	
	Indurant	Fœnumgræcum. Hordeum, Lini. Lolium, &c.	
	Suppurant	Eruum, seu Orobus. Lolium.	
	Glutinant	Lupinus, &c.	
B. Semina qualitate se- cunda alte- rantia, aut	Elatus discutunt	Anisi, Anethi, Apij. Carei, Cumini. Dauci, Fœniculi. Nigellæ, Petroselini. Seseleos, Santonici, &c.	B
	Semen generant	Cicer, Faba. Eruca, Lini. Fraxini, &c.	
	Menses mouent	Amomi, Asparagi. Anisi, Ammi. Cicer, Dauci. Apij, Fœniculi. Petroselini. Seseleos. Leuistici, &c.	
	Calculum frangunt	Maluæ, Milij Solis, &c.	
	Menses festinant	Anthera, Cuminum, Pœonia, &c.	
	Venenis resoluunt	Ammij, Anisi, Apij. Cardamomum, Citrij mali. Fœniculi, Rapæ, &c.	
	Dolorem mitigant	Anethi, Amomi. Cardamomum, Cuminum. Dauci, Eruum, Fœnumgræcum. Lini, Hyoscjami, Miliū. Panicum, Petroselini, &c.	
	Strumas discutunt	Althææ, Coriandrum. Hordeum, Lentæ, Lupini. Lolium, Litospermum, &c.	

Semina

A

*De seminibus calidis in primo.*

SEMEN CORIANDRI nodosum est, intus cauum: nascitur in hortis. colligitur autumnò: seruetur repurgatum, & exiccatum in loco sicco, non calido, per annos duos. * In quibus parum calefaciendum, magis autem siccandum est, conuenit, ut in puluere ad caput & uentriculum, sic ut in tragematis à cibo sumatur. Quia uerò exhalationes ad caput excitat, aceto macerari debet. quod seplasiarij præparari dicunt. In uertigine & doloribus capitis, ex cõsensu factis, uitare prorsus oportet. Mesues, & Andernac.

FŒNIGRÆCI semen profert planta trifolio similis, corniculis quibusdam inclusum. Nascitur passim in campestribus. colligitur semen mense Iulio, uel Augusto. Seruetur à festucis & paleis repurgatum & exiccatum, per annos duos, in loco sicco. * Fœnigræci farina uim habet emolliendi, discutendi quæ: in aqua mulsa decocta aduersus tam internas, quàm externas inflàmationes, efficaciter illinitur: lienem cum aceto & nitro trita extenuat. Succus decocti eius fœminarum malis subuenit: & siue tumor, siue præclusio sit uulvæ, fontetur, & insident. Fœnigræci in aqua decocti cremor expressus, capillos, furfures, & manantia capitis ulcera purgat: locos dilatat, & emollit, si cum anserino adipe pessi uice subijciatur. Viride cum aceto utilissimū imbecillibus locis, & ulcera sentiētibus. Decoctū eius prodest aduersus tenesmos, fœtidāq; dysentericorū proluuiem. Oleū quod ex eo exprimitur, & myrto, capillos & genitaliū cicatrices absterget. Mesues & Dioscorides.

LINI semen uulgò notum est. Nascitur in cãpestribus cultis, & pinguib. Colligitur ætate, cum maturū est. Seruetur repurgatum & exiccatum in loco sicco per annos duos. * Easdem, quas fœnigræcum uires habet. Discutit & emollit omnē intus, forisq; inflammationem, cum melle, oleo, exiguaq; aqua decoctum, aut melle cocto exceptum: uitia cutis in facie, uarosq; crudū tollit: illitū cum nitro & siculneo cinere, parotidas, duritiasq; discutit: ulcera quæ serpunt, fauosq; cum uino decoctū expurgat: unguis scabros eximit, cum pari modo nasturtij & mellis: uitia pectoris extrahit, si ex melle in eclegmatis uicem substituatur: tussim lenit: uenerē stimulat, si farina piperis & melle exceptū, pro placenta largius adsumatur. Huius decoctum intera-

u 3

inflam.

inflammationes in defefsionibus perquam utile. Dioscorides.

LITHOSPERMUM à feminis duritie nomē accepit. Folijs est oleę longiorib. & latioribus, mollioribus, iacēt humi, quæ ab radice exiliūt: ramulis rectis, tenuib. firmis, crassitudine acuti iūci, lignosis: in quorū cacumine bifidi exortus cauliculorū speciē exhibēt: folijs longis, inter quę paruum semen rotundū, erui magnitudine, duritia lapidea. Nascitur in asperis & editis locis. Colligitur mēse Iulio. Cōseruatur p̄ annos duos in loco sicco. * Vim hanc habet, ut semine cū uino albo poto, calculos frangat, pellatq; urinam. Dioscor.

SATIVVS LUPINVS notus est. Nascitur in cāpestribus, & hortis. Colligitur mēse Iulio, uel Augusto, cum maturū est. Seruatur per annos duos. * Huius farina cū melle delinctu, aut potu, uētris animalia expellit. Ipsi quoque macerati, & cū sua amaritudine esitati, eadem efficiunt. Decoētū eorum idē munus pręstat, cū ruta & pipere potum: quare lienosis prodest. Eodem ulcera tetra, quæ theriomata uocāt, gāgrenas, incipiētē scabiē, eruptiones pustularū, ulcera in capite manātia, uirilignes, maculasq; fouere utilissimū: menses & partus extrahit, cū myrrha & melle subditū in uellere. Eorum farina cutem, liuoresq; corrigit: inflammationes cū polenta & aqua mitigat: tubercula & coxendicum cruciatus, ex aceto lenit: strumas in aceto cocta, illitaque dissipat: carbunculos rumpit. Decoēti cœlesti aqua, donec in cremorem lentescant, faciem abstergunt: medentur pecorum scabiei, cum radice nigri chamæleontis, ita ut tepente decoēto abluantur. Lupini triti, ubi macerata dulcescere cœperint, cum aceto poti, fastidiū detrahunt, & cibi auiditatem faciunt. Gignuntur & syluestres lupini, satiuis similes, sed omnino minores: qui eadem quæ satiuū possunt. Dioscorides.

ORYZA frugum generis est, in palustribus, riguisq; nascens. * Mediocriter alit: sed aluum supprimit. Dioscorides.

De feminibus calidis in secundo.

ANETHVM hortis omnibus frequētissimū, omni adeo ex parte fœniculum emulatur. Colligitur semen mēse Iulio uel Augusto, cum maturum est. Seruatur expurgatum in loco sicco, per annos tres. * Huius decoētum potu lac euocat: inflationes & tormina sedat: aluū, uomitionesq; sistit: urinas ciet, singultus lenit, oculorū aciem hebetat, genituram restinguit, assiduē potum. Fœminis uulue malo opportunis, ad defefsiones utile. Condylomata illitus feminis cremati cinis tollit. Dioscorides.

APII semē nascitur passim in hortis, & riguis. Colligitur mēse Iulio. Cōseruatur expurgatū & siccātū, per annum unum in loco sicco. * Vrinās & menstrua mouet, flatūsque discutit. Venenis resistit, & dolores internos sedat: uenarum, arteriarum, & renum obstructions, detergendo, extenuando discutit: comitialibus, grauidis & fœtui inimicum. Dioscorides & Galenus.

OROBY S siue **ERVVM**, illud est quod in *Hetruria* *Meco* uocatur, uulgoque cum sit

DE SEMINIBVS CALIDIS IN SECVNDO. 159

A cum sit notissimū, feritur. Hoc itaq; utendū, non alio. Aliud supradicto simile Creta adfertur. Orobus illic nominatū, hoc nōnulli uerū esse existimāt. folijs est phasioli vulgaris, sed angustioribus & minoribus: semine subflauo: quod cū difficilē reperiatur, supradicto utendum est. * Amarum est, incēdit, extergit, atq; obstructiones uiscerū expedit. Si sumatur copiosē, sanguinem per urinas euocat. ex linctū cum melle crassos pulmonis thoracisq; humores educit. cutis asperitatem læuigat, pruritus, lenticulas, maculas & ulcera cum melle detergit. Galenus, Dioscorides, & Medici Florentini.

ERYCÆ semē in hortis nascitur. Colligitur Iulio mēse, conseruatur uerō per annum. * Vrinā cit, uenerem cōcitāt, lemenq; auget. Ventris tineas euecat, liēnēq; extenuat. Syluestris erucæ semine pro sinapi quidam utuntur. Vrinam uehementius pellit, & multō satiuo acrius. Dioscorides & Galenus.

OCIMI seu **BASILICONIS** semen nigrum est. Nascitur in uiridarijs. Colligitur mense Iulio: cōseruatur autē per annū. * Cor exhilarat: eius defectionē tollit: humidū stomachū corroborat. Potū cōuenit atrā bilē gignētibus. difficili urinē, inflatisq; narib. haustū, subinde mouet sternutamēta. Sed oculis premi necepsū est, cū sternutamentū urget. Dioscorides & Crescentius.

VRTICÆ semen Iulio mense colligitur: repurgatur, & conseruatur per annū loco sicco. * Potū ex passo uenerē stimulat, & uulue ora patefacit: cum melle delinctum orthopnoæ, lateris & pulmonum inflammationibus prodest: thoracem expurgat. Erodentibus medicamentis admiscetur. Dioscor.

AMMI hodie à nōnullis ostēditur folijs fœniculo tenuiorib. caule gracili, umbella in qua cādidī flores, & semē minutissimum, cumino similis, nō p oīa respōdēs ueterū descriptiōi. Pleriq; existimāt semē quoddā ex Hispanijs sub Amomi nomine allatū, uerum esse Ammi, aut saltē eius loco usurpari posse. Quod si Ammi in prōptu nō sit, eius loco cuminū uel anisum accipiendū est. * Vis ei excafactoria, seruēs & exiccās. Facit ad tormina, urinæ difficultatē. serpentiū ictus, cū uino potū: mēstrua ciet. Miscetur derodētibus cātharidū medicamētis, quæ cedoria uocāt, ut inde exortis urinē difficultatib; resistat. Sugillata cū melle tollit. colorē potu aut illitu mutat in pallorem. Suffitum cum uua passa, aut resina, uuluas purgat. Dioscorides, & Medici Florentini.

ANISI semē uulgō notū est. Melius semper recēs, plenum, non furfurosum, odore præstās. Colligitur mēse Iunio uel Iulio: expurgatur à pediculis, festucis: siccat & cōseruatur p annū in loco sicco. Excafacit & siccat. oris halitū iucūdiore facit, doloris leuamētum præstat. Vrinā ciet, discutiēdi uim habet: hydropicis potū sitim extinguit. Animalium uenenis aduersatur: ualet ad inflationes: aluum, & alba fœminarum profluvia sistit: lac ad mammas elicit: uenerem stimulat: dolores capitis leuat, suffitum naribus. cum rosaceo tritum, instillatumq;, fractis auribus medetur. Dioscorides.

AMOMVM hodie passim desideratur, uidelicet semē candidū uel fufuū, simplici

simplici tamē colore, non uario, &c. Quod autem officinæ ostendūt, nigrum **A** est semen, & censetur esse Sion Dioscoridis. Proinde eius loco, Alarum aut Calamus aromaticus substituendus est. Medici Colonienfes.

CARYM semē est uulgaris noticię. Nascitur in pratis & collibus. Colligitur mēse Iunio: mūdatur, exiccatur, & ad usum seruatur in loco sicco p annū. * Excalfacit, urinā cōcitat, stomacho utile, os cōmendat, cōcoctionem adiuuat. Vtiliter miscetur antidotis & oxyporis. anisi uicem prębet. Dioscorides.

CARDAMOMVM Græcorum, quod est cordumemi Arabum, tametsi multi dubitēt quid nā sit. Illud tñ quod officinę cardamomū maius appellāt, cardamomi Græcorū loco usurpari posse uidetur, quia aromaticā quādam acrimoniā, nec non amaritudinē, quāuis obscuram, habet. Aliud uerō est cardamomū Arabū à Græcorū cardamomo: eiusq; duo genera cōstituunt, maius & minus, utrumq; nobis incognitum: nisi maius illud intelligatur, quod Melligetā, aut granum Paradisi nuncupant. Semen est angulosum, acre, linguam uellicās, non admodū aromaticum. Cardamomū minus officinarum nullo modo cōuenit cum cardamomo minori Arabum, neq; ad aliquod cardamomi genus referri potest: sed est melanthij genus. * Calefacit, discutit, humbricos enecat: scabiem ex aceto sanat: ex uino sumptum, renibus & urinæ difficultati medetur. Dioscorides & Medici Florentini.

FOENICVLI semen uulgaris est noticię. Nascitur passim in hortis. Colligitur mense Septembri: exiccatur, mundatur, & seruatur per annum, in loco sicco. * Excalfacit ordine tertio, exiccat uerō primo. Lac procreat: suffus auxiliatur: urinas, mensesq; ciet. Galenus. **B**

CYMINVM fatiuū omnibus notū est: ori gratū. Colligitur mense Iunij. Seruatur per annū. * Excalfacit, alstringit, exiccat. ad tormina, inflationesq; cōuenit, coctū, & cū oleo inditū, aut cū hordacea farina illitū. orthopnoicis datur in posca: demorsis à serpente, in uino. testium collectionibus auxiliatur, impositū cum uua passā, aut lolij farina, cerato ue: mēstrum abundantiam inhibet. Cōtritum autem in aceto, & naribus obiectum, sanguinis profluuia sistit. Colorem bibentium aut perūstorum mutat in pallorem. Dioscorides.

DAVCI tria sunt genera: primū Italicū, quod syluestre pastinacā imitatur: alterū Creticū, qd legitimū est. Id crescit etiā in Delphinatu. folia feniculi habet, & radicē ualde odoratā. huius loco pastinaca syluestri uti possumus. Terriū coriādri folijs apparet. * Omnia uenerē irritāt, quanquā syluestris semē flatu careat, eoq; urinā & mēstrua ciet. Cōmune officinarū, species quaedā syluestris pastinacæ existit. Quodlibet adeo mēstrua promouet, ut etiā fecūdas, foetumq; pellat, & strāgulatū sedet, calculosq; expellat. Foris impositū, multū discutit, & œdemata dissoluit. Andernacus ex Dioscoride & alijs.

NIGELLA, quam Dioscorides Gith, aut Melanthium nominat, herbula est exilibus surculis fruticans, binos dodrantes aut amplius altis: folijs minutis,

A nutis, aliquantulum ad senecionis similitudinem accedētibus, sed multò tenuioribus: capitulo in cacumine tenui, paruo, ceu papaueris, oblōgo, intercurtantibus intus membranis, quibus semen includitur nigrum, acre, odoratum. Qua hodie utuntur nigella, non est uerum melanthium, sed cumini fortè syluestris apud Dioscoridem genus. Verum hodie reperitur, sed non passim: itaq; adhibēda est diligentia. Melanthij genus est, quod uulgò cardamomum minus creditur, nigellaq; citrina uocatur, quæ præter colorem, omnino cum melanthio supra descripto conuenit. eius itaq; usus esse poterit ueri melanthij loco, potius quàm uulgari nigella, quæ nõ est odorata, ut uera esse debet. Nascitur melanthium uerum in hortis, uiridarijs, atq; etiam in alijs locis fatū. Colligitur æstate: siccatur, & seruatur per annos duos. * Capitis doloribus illitum fronti, subuenit: discutit recentes oculorum suffusiones, tritū ex irino, & infusum naribus: tollit lepras, lentigines, duritias, tumoresq; uelutulos, cum aceto illitū: circūscarificatos clauos excutit, cū uetere urina impositum. Dentium doloribus, cum aceto & teda decoctum & collutum prodest: teretes uentris tineas expellit, peruncto ex aqua umbilico. Destillatione laborantes adiuuat, tritum in linteo, & olfactum. Vrinā & menstrua ciet, multis diebus sumptum, & lac extrahit: difficultatem spirandi cum uino potum, leuat: phalangiorum morsibus ex aqua, drachmæ pondere, haustū auxiliatur. Incenso serpentes fugantur. Tradunt largius epotum enecare. Diosc.

NAPI non ubiq; nascuntur. Colligitur semen mense Iunio: siccatur & seruatur per annos duos. * Potum semen uenenorum uires hebetat: antidotis admiscetur: decoctum eius purgationibus sceminarum, & uesicæ conuenit: menstrua & urinas prouocans. Dioscorides.

PETROSELINI semen passim in hortis nascitur, gustu acre, cum amaritudine. Colligitur mense Iulio: exiccatur, & seruatur per annum. * Exalfacit ordine tertio: incidit. Hinc menses & urinam largè prouocat. Flatus quoq; discutit. Galenus.

SESELEOS, uulgò Sileris montani semē, hoc est Mafsiliēsis: nam aliud ad nos nõ conuehitur. Inuenitur Parisijs, Monspessuli, & alibi, quod est Peloponesiacū & Ægyptiacum. Mafsiliense uerò præcollit: proximū huic, quod in montibus calidis & siccis nascitur. Quando aut in cōpositionib. Sefeli citra adiectionem ponitur, Mafsiliense intelligi debet. Colligitur mense Iulio: & conseruatur per annum. * Optimum medicamentum in discutiendis flatibus: urinas mouet, extenuat: eoq; comitialibus & orthopnoicis opitulatur. Andernæus.

STAPHIS AGRIA, siue herba pedicularis, folia habet labruscæ, diuisa: & cauliculos rectos, molles, nigrosq;: fert florem glasti: & folliculos uirides, similes ciceri, & in his semen triangulum, scabrum, ex nigro subfuluescentē, intus album, gustu acrem. In Istria, Dalmatia, Apulia, & Calabria frequentissima

siua provenit. Colligitur semen mēse Iulio. * Grana quindecim si trita in aqua mulla dentur, crassum humorem per uomitum purgant: sed qui hauserunt, ambulare debent. Prudenter tamen attendere oportet, & aquam mullam continuo potui dare: quoniam pericula strangulationis inferūt, & fauces adurant. Trita, & ex oleo illita, phthiriasi prodest, item prurigini & psoriasis. Cit plurimā pituitam cōmanducata: decocta in aceto, dentium dolori, colluto ore subuenit: rheumatismum gingivarum sistit: ulcera oris manantia cum melle sanat. Vrentibus malagmatis imponitur. Dioscorides.

SEMIEN VITICIS colligitur mense Septembri: cōseruatur aut per annum. * Elatus discutit, ueneremq; compescit: uenenatis ictibus, aque quae cutem subiit, lienosisq; auxiliatur: lac euocat, menses ciet drachma pōdere in uino potum: caput tentat, & soporem affert. Dioscorides.

De feminibus calidis in quarto.

NASTVRTII semen uulgō notū est. Nasctur passim in hortis. Colligitur mēse Iunij, siccatur, mūdatur & cōseruatur per annum, in loco sicco. * Semen est acre: excalfacit, stomacho aduersatur, aluū turbat, tineas excutit, lienem imminuit, partus exanimat, menses cit, uenerē stimulat, sinapis & erucifimile intelligitur: lepras & impetigines abtergit. Illitum cū melle lienē extenuat, fauos expurgat: pulmonū uitia extrahit, sorbitionib. incoctū: serpentū uenenis potum resistit, atque eas suffitu fugat: capillorum defluuia cohibet: carbunculos ad suppurationem perducit, & rumpit: coxendicibus cum polenta cōmodē ex aceto illinetur: tumores, collectionesq; discutit: emittit furunculos illitum cum muria. Dioscorides.

SINAPI colligitur mense Iulio. Eligi debet adultū, ualde rufum, non magnopere siccū, sed quod fractū internē uirescat, & ueluti quodam succo maderat, cassum colore: siquidem recens id genus, tēpestiuū habetur. * Ad calefaciendum, extenuandū, extrahendum efficax est. Ad eliciendā capitis pituitam manditur: contra præduros tonsillarū tumores, ac ueterē, callosamq; arteriæ scabritiem, succus ex aqua & melle conuenienter gargarizatur: sternutamenta ciet, tritū, & narib. admotū: comitialib. quoq; auxiliatur: scēminas uulua strangulatu oppressas excitat: lethargicis de raso capite illinitur. Cum ficis admistū donec rubescat locus, & ad coxēdicū cruciatus impositum, ad benes, & omne genus dolores cōfert, cū permutadē ualeudinis causa ex alto uitia extrahenda sunt: alopecijs illitū medetur: faciē purgat: fugillata cum melle, adipe, aut cerato rapit: feræ impetigines & lepræ: eo cum aceto perunguntur: cōtra febrium circuitus aridum bibitur, aut potui, polētæ modo inspergitur: extrahentib. emplastris, scabitiemq; extenuantib. utiliter admisceri solet: tritum grauitati aurium, & sonitui, cū fico impositum prodest. Succus ad hēbetudines oculorū & genarum scabritias magna utilitate illinitur. Expressus recenti semine succus in sole siccatur. Dioscorides,

De femi-

A

De seminibus frigidis in primo.

HORDEVM vulgaris est noticię. Est candidū, purumq;. Id minus quān triticum alit. Ptisana tamē ob cremorem in decoctione redditum, plus alimēti præbet, quān polenta ex hordeo facta. * Contra acrimonias, atq; gutturis scabricias, exulcerationesq; pollet: quibus etiā triticea ptisana præidio est: sed plus alit, magisq; urinam mouet. Lac abundē suppeditat, si cum fœniculi semine cocta sorbeatur. Hordeum absterget, urinā ciet, inflationem parit, stomacho aduersatur, tumores concoquit. Farina hordeacea decoquitur in mulla aqua cū fico, ut inflammationes, collectionesq; discutiat: duritias cum resina & fimo columbarum concoquit: cum melileto aut, & papaueris calice dolores finit, qui latus exeruciant: aduersus intestinorū inflationes cū lini semine, fœnogræco, & ruta illini iuuat: strumas cum pice liquida, cera, oleo, & impubis pueri urina, ad concoctionem perducit: & cum myrto, aut uino, aut malicorio, aut syluestrib. pyris, aut rubo, alui profluuiā sistit: podagricis inflātionibus cū cotoneis aut aceto prodest: decocta in acri aceto, modo quo hordeaceum cataplasma, & calida imposita, lepris medetur. Cremor uerō farinæ ex aqua, atq; cum pice & oleo decoctus, puri mouendo est: cum aceto subactus, itidem & cum pice contra articularū fluxiones prodest. Farina ex his aluum cohibet, inflammationesq; mitigat. Dioscorides.

B

MILIVM quoq; vulgaris est noticiæ. Frigidum in primo, siccum uerō in tertio. In panes coactum, minus cæteris frugibus alit: * sistit pulte sua aluū, urinam cit. Torretur milium, feruensq; in sacco ponitur, ut torminibus, reliquisq; doloribus, si foueatur, auxilio sit. Dioscorides & Galenus.

De seminibus frigidis in secundo.

ACETOSAE semen passim in hortis & pratis nascitur. Colligitur mēse Junio, uel Iulio. * Ex aqua aut uino utiliter bibitur, contra dysenterias & cæliacorum affectus, stomachi fastidia, scorpionum iētus. Quod si quis in pota præsumat, nihil molesti ex iētū patietur. Dioscorides.

CICHORII semen passim in cāpestrib. nascitur. Colligitur mēse Iulio, uel Augusto: siccatur, mūdatur, & seruatur per annū, in loco calido. * Feruorem sanguinis & aliorum humorū lenit, ac ueneris appetentiā extinguit: uiscera, præsertim iecur obstructione liberat: biliosamq; materiam in illis collectam discutit, uiuidumq; faciei colorem restituit: eo quod amarū sit, & detergens. Præterea stomachum, magis aut iecur & renes astringit: quadam corroborat. Cichorij uerō semen adeo est salutare, ut etiam si asiduo uel edatur, uel bibatur, nihil incommodi adferat. Andernacus.

SOLANI VESICATORII semen, quod Græci HALICACABVM, Arabes, ALKAKENGI uocant, * urinæ ciendæ: efficax est, misceturq; medicamentis, ad iecur, renes & uesicam idoneis. Andernacus.

x 2 . *De semi-*

De seminibus frigidis in tertio.

A

CICVTAE semen astringens est, & uenenosum. * Porro internis remedijs non additur: in externis liberius, ubi stupefacere oportet, ut in mammis indurandis. Andernacus.

Semen IVSQUIAMI, seu ALTERCI, mense Iulio colligitur: siccatur, mundatur, & conseruatur per annum, in loco sicco. * Stuporem inducit, & colicis medicamentis admiscetur. Dioscorides.

Semen PAPAVERIS, albi, rubri & nigri, mense Maij colligitur: siccatur, mundatur à festucis, pulueribus, & per annum seruatur, in loco sicco. * Album familiare magis est, dolores obtundit, & somnum mediocriter conciliat. Dioscorides.

De seminibus humidis in primo.

MALVAE semen mense Augusto uel Septembri colligitur: seruatur aut per annum, in loco sicco. * In uino potum, addito loti syluestris semine, uescicæ cruciatus lenit. Dioscorides.

SESAAMI semen ex Græcia & Peloponneso ad nos cõuehitur. * Sefamũ stomacho inutilis cibus, halitus grauitatem facit, quoties inter mandendũ, commissuris dentium inhæsit: neruorum crassitiem illitu discutit: medetur auribus fractis, ambustis, inflammationibus, coli doloribus & cerastæ moribus: capitis dolores, qui æstuatione concitantur, ex rosaceo lenit. Dioscorides. B

De seminibus siccis in primo.

Faba uulgaris noticiæ est. * Inflationem excitat, ægrè cõcoquitur, tumultuosa somnia facit, tussi confert, carnem gignit, media calidi frigidique natura. Decocta in posca, & cum suo cortice esitata, dysenterias & cœliacorum profluua sistit: contra uomitiones conuenienter manditur. Inflatio leuior contrahitur, si aqua prior inter coquendum abijciatur. Viridis plus negocij stomacho exhibet, maioremque flatum parit. Lomētum eius & per se, & cum polenta illitum, inflammationes, quas uulnus excitauit, mitigat: cicatrices colores facit: turgentes grumoso lacte manimas, etiam si inflammatione tententur, adiuuat: lac restinguit: furunculos, sugillata, parotidasque, cum scæni-græci farina & melle discutit: cum rosa autem, thure, & oui candido, procidentes oculos, tumores, uuasque reprimat: subactum uino, suffusiones, & ictus oculorum recreat. Manducata sine cortice faba, ad auertendas fluxiones, fronti illinitur: decocta in uino, testium collectiones sanat: quò tardius pubes erumpat, pueris imo uentri illinitur: uiriliginem purgat. Fabarum cortice illiti capilli qui post euulsionem renascuntur, gracilescunt, & minus alimēti capessunt: cū polēta, scisso alumine, & uetere oleo impositi cortices, strumas discutunt. Decocto earum lanæ inficiuntur. Faba depto cortice in illas partes diuisa, in quas

DE SEMINIBVS SICCIS IN SECVNDO. 165

A in quas suapte natura scinditur, imponi solet sanguinis defluxionibus ab hirudine concitatis: nãq; eas suppressit, si semisecta apprimatur. Dioscorides.

SICCANT quoq; in primo semen Fœniculi, Fœnigræci, Hordeum, &c. de quibus uide suprâ suo loco.

De seminibus siccis in secundo.

LENTEs * ualenter altringunt, corpus desiccant, uentrê sistunt: sed decoctum earum resoluit: ideo ipsarum iuris prior aqua abijcitur, ubi recentioris causa adhibentur. Somnia tumultuosa excitant: capiti, neruis, ac pulmôni inutiles. Contra subuersionem stomachi, triginta grana lentis delibata deuorari proderit. Decocta cum polenta, & illita, podagras lenit: si uis cû melle glutinat, crustas rumpit, ulcera purgat. Decocta in aceto duritias & strumas discutit. Dioscorides & Galenus.

SICCANT quoq; in secundo, Eruum seu Orobus, Miliu, Oryza, semê Papaueris, Solani, &c. de quibus singulis uide suprâ suo loco.

De seminibus siccis in tertio.

B COCCVM, GRANVM TINCTORIVM, KERMES, quo insectores utuntur, frutex est furculosus, paruus, cui grana ceu lentes adhærent, quæ electa congeruntur. Optimum gignitur in Galatia & Armenia: deinde Asia & Cilicia: ultimum ex omnibus Hispanicum. * Vis huic spissandi: uulneribus, neruisq; præcis, conuenienter ex aceto tritum illinitur. Nascitur quoq; in Cilicia è quercubus, cochlearum exilium similitudine: quod illius regionis mulieres ore legunt, & coccum uocitant. Dioscorides.

SICCANT quoq; in tertio, semen Anethi, Apij, Ammi, Anisi, Cari, Cumini, Coriandri, Nigellæ, Petroselini, Miliu, &c. de quibus singulis uide suprâ suo loco.

De seminibus calfacientibus caput, thoracem, cor, & stomachum.

CAPVT excalfaciunt semen Fœniculi, Maioranæ, &c. de quibus uide suprâ suo loco.

THORACEM excalfaciunt semen Vrticæ, &c. de quo uide suprâ.

COR excalfaciunt semina Ocimi, &c. de quibus uide suprâ suo loco.

STOMACHVM uel VENTRICVLVM excalfaciunt semen Anisi, Cumini, Ameos, Cardamomum, Grana paradisi, &c. de quibus singulis uide suprâ suo loco.

De seminibus excalfaciuntibus iecur.

Semina ASPARAGI uulgaris sunt noticiæ. Nascuntur passim in hortis. Colliguntur æstate: & conseruantur per annum, in loco sicco. Vrinam ciunt: regium morbum, renû uitia, & coxendicû cruciatus perfanant. Dioscorides.

HEPAR quoq; excalfaciunt semen Anisi, Ameos, Amomi, Apij, Cumini, Cari, Dauçi, Fœniculi, &c. de quibus singulis uide suprâ suo loco.

De seminibus excalfaciunt splenem.

A

SPLENEM excalfaciunt semen Anisi, Cari, Nasturtij, &c. de quibus uide supra suo loco.

De seminibus calefacientibus renes & uesicam.

CICER fatiuum uulgò notum est. Colligitur in fine æstatis, uel principio autumni: siccatur, & conseruatur per annum. * Aluo idoneum est, urinam ciet, inflationem parit, colorem cõmendat, menses ac partus expellit: lac auget: uenerè excitat: calculos in renibus frangit. dato cū roremarino hydropicis, aut regio morbo laborantibus, eorū decocto. Cū eruo decoctū, illinitur ad inflamationes testiu, uerrucosas informicatiões: ad scabiē, ulcera capitis manātia, impetiginesq; in cõtra carcinomata, & ulcera que cacoethe uocantur, cū melle & hordeo pdest. Alterū genus nigrū, cæteris minus, qd' Arietinu uocant. Idem quod album uel rubeum præstat. Dioscorides & Galenus.

SEMINIS SAXIFRAGAB albæ plāta, mēse Maio prouenit, saxosis, arenosis, asperis, sitientibusq; locis: folijs humi procumbētibus, exiguis, rotūdis, in ambitu serratis, uulgaris terrestris hederę modo: pinguiorib. tamē, & molliorib. Caulē pfert tenuē, iunci modo, hirsutū, cubitalē: in cuius cacumine flores pdeunt albi, cādidiis uolis nō absimiles, q mēse Iunio absq; semine decidūt. Radix huic exilis, granulis qbusdā cohæres, coriandri magnitudi ne, q partim albicat, partim uerò rufescūt. & p semine serūtur, amaro gustu. **B**

* Tasa & deuorata urinā ciet, renū & uesicæ calculos pellunt. Matthiolus.

RENES & VESICAM quoq; excalfaciunt semen Eruçæ, Vrticæ, &c. de quibus uide supra suo loco.

De seminibus excalfaciunt uterum.

RUTAE semē uulgaris est noticiæ. Colligitur mense Iulio, uel autumno. * Potū cõtra intestina uitia efficax est. In antidota cõmodè additur. cõtra incontinentiā urinæ tostū semen septenis diebus potui datur. Est & aliud rutæ genus, Harmel seu Harmala dictū, & Dioscoridi descriptū in ruta Galatica. Quibusdā distamnū albū uulgare creditur: nō cõuenit tamē illi semē subrotūm & triangulare. Hæc ob causam eius loco, dictāno albo uulgari, aut semine rutæ syluestris uti licebit, donec præstantius aliud reperiatur. Maturescit semen Harmalæ, autumno: * quod cū melle, uino, croco, & fœniculi succo, ac gallinaceo felle, teritur cõtra retusam oculorū aciem. In collibus & læto solo prouenit. Dioscorides & Florentini.

De seminibus calefacientibus artus.

ARTVS calefaciunt semen Nasturtij, Rutæ, Sinapi, &c. de quibus uide supra suo loco.

De seminibus refrigerantibus caput.

LACTYCAE semē notū est. Colligitur mēse Iulio uel Augusto: siccatur, mundatur,

DE SEMINIB. REFRIGERANTIB. THORACEM, &c. 167

A mundatur, & seruat per annum, in loco sicco. * Epotum, assiduas libidinū imaginationes in somno compescit, & ueneri refragatur. Dioscorides.

CAPVT quoq; refrigerant semen Hyosciami, Papaueris albi, &c. de quibus uide supra suo loco.

De seminibus refrigerantibus thoracem, cor, & stomachum.

THORACEM refrigerant semen Papaueris albi, Violarum purpurearū, &c. de quibus uide supra suo loco.

CITRI semen uulgaris est noticiæ. refrigerat & siccatur ordine tertio. * Contra uenena plurimum ualeat: scorpionum ictibus & potū, & appositum mirificè medetur. Galenus. (supra suo loco.)

COR quoq; refrigerant semen Acetosæ, Coriandrum, &c. de quibus uide STOMACHVM refrigerat Coriandrum præparatum, secundum Auicennam, &c. de quo uide supra suo loco.

De seminibus refrigerantibus hepar.

CUCURBITAE semen notum est. Colligitur circa principium hyemis, cucurbita in uite sua ad hyemem usq; seruata, deinde insolata, aut in calido hypocaufto posita, donec penitus fuerit siccata: seruatur per annum in loco sicco. Frigidum & humidum in secūdo: * sanguinis & bilis feruorem, febriūque extinguit. GALENVS

B CUCUMERIS & CITRULLI semen colligitur mense Iulio, uel autūno: siccatur, & conseruatur per annum. Refrigerat & humectat ordine secundo: * aluo & stomacho utile: urinam mouet modicè: cum lacte, aut passo uesicæ exulcerationibus subuenit: bilem & sitim extinguit. Diosc. & Galenus.

MELONIS semen mense Iulio uel Augusto colligitur: mundatur, siccatur, & seruat per annum, in loco sicco. Refrigerat & humectat excessu secundo: * sitim, & febrium calorem extinguit: urinam cit: abstergit: uesicæ ac renum exulcerationibus subuenit. Dioscorides & Galenus.

PORTULACAE semen Iulio mense, & autumnii principio colligitur: siccatur, & conseruatur per annum. Frigidum in tertio. * Fluxiones repellit, & maximè biliosas & calidas, &c. Galenus.

SCARIOLAE semen Iulio mense colligitur: siccatur, & conseruatur per annum. Refrigerat atq; exiccat excessu secūdo: * hepatis calorem extinguit, bilem q; &c. Galenus. (supra suo loco.)

HEPAR quoq; refrigerant semen Endiuia, Lactuca, &c. de quibus uide

De seminibus refrigerantibus splenem.

SPLENEM refrigerant semē Citrulli, Cucurbitæ, Cucumeris, Endiuie, Lactucæ, Melonum, Portulacæ, Scariolæ, &c. de quibus singulis uide supra suo loco.

De seminibus refrigerantibus renes & uesicam.

RENES & VESICAM refrigerant semen Cucurbitæ, Citrulli, Cucumeris.

cumeris, Melonum, Endiuia, Lactuca, Portulacæ, Scariolæ, &c. de quibus A
uide suprâ suo loco.

De feminibus refrigerantibus artus.

ARTVS refrigerant semen Citrulli, Cucurbitæ, Cucumeris, Melonum,
Endiuia, Lactuca, Portulacæ, Scariolæ, &c. de quibus uide suprâ suo loco.

De feminibus astringentibus.

ANTHERA semen rosarum est. Colligitur autumnò: ficcatur & seruatur
per annum. Astringit: uomitiones, aluiq; fluores cohibet.

BERBERORVM semen colligitur autumnò, uel hyemis principio: sic-
catur, & conseruatur per annũ, ad usum. * Sitim restinguit, biliosas pestilen-
tesq; exhalationes supprimit. Datur cæliacis, dysentericis, & ubi bilis à ieco-
re in uentriculum regurgitans cholericos excitauerit affectus. Matthiolus.

Bursæ pastoris semen colligitur mense Maio uel Iunio: ficcatur, & conser-
uatur per annum. Refrigerat, exiccat, & astringit: * cruentas excreationes si-
stet: uulnera glutinat: mensum abundantiam sistit: contra omnes sanguinis
fluxiones efficax est, &c. Matthiolus.

NYCLEI ACINORVM astringendi uim obtinent: * stomacho utiles
sunt. Inspergitur farina tostorum, polentæ modo, dysentericis, & cæliacis, &
solutis stomacho. Dioscorides.

ASTRINGVNT quoq; Granum tinctorium, seu coccum, Milium, semé B
Portulacæ, &c. de quibus uide suprâ suo loco.

De feminibus discutientibus.

DISCVTIVNT semen Anethi, Dauci, Fœnigræci, Lini, Nigellæ, Sesa-
mi, &c. de quibus uide suprâ suo loco.

De feminibus abstergentibus.

ABSTERGVNT Faba, Eruum seu Orobus, Hordeum, Lupini, semen
Vrticæ, &c. de quibus singulis uide suprâ suo loco.

De feminibus emollientibus.

EMOLLIUNT Fœnumgræcum, semé Lini, Maluæ, Nigellæ, &c. de qui-
bus uide suprâ suo loco.

De feminibus indurantibus.

INDVRANT semina Portulacæ, &c. de quibus uide suprâ suo loco.

De feminibus suppurantibus.

LOLIVM in aruis è tritico & hordeo corruptis uligine feminibus nasci-
tur. * Molitum nomas, putrescentia ulcera, gangrænasq; compescit, cum ra-
phanis, & sale illitum: & ex aceto & sulphure uiuo feros lichenas, & lepras sa-
nat: strumas quoq; discutit, cum fimo columbino, & lini semine decoctum
in uino. Decoctum ex aqua mulsa, utilissimè ischiadicis illinitur: si cum po-
lenta, thure, myrrha, aut croco suffiatur, cõceptionem adiuuat. Dioscorides.

A SVPPVRANT quoq; Fœnumgræcum, Hordeum, Lini semen, &c. ue quibus suprà suo loco.

De feminibus glutinantibus.

GLVTINANT Eruum seu Orobus, Lolium, Lupinus: de quibus uide suprà suo loco.

De feminibus flatus discutientibus.

SANTI, SANTONICI, seu ZEDOARIAE semen è Sinarum regione ultra extremas Indiæ oras adfertur. Excalefacit: * flatus discutit, alui tinea necat, &c. Matthiolus.

FLATVS quoq; discutunt semen Anethi, Anisi, Apij, Cari, Cumini, Dau ci, Fœniculi, Nigellæ, Petroselini, Seseleos, &c. de quibus uide suprà suo loco.

De feminibus generantibus semen.

FRAXINI semen, seu lingua auis, * iocineris & lateris doloribus in uino sumptum medetur: aquam, quæ subit cutem, extrahit: corpus obesum onere leuat, & ipsam sensim ad maciem reducit: uenerem stimulat. Plinius.

SEMEN quoq; generant Cicer, Faba, semen Eruæ, Lini, &c. de quibus uide suprà suo loco.

De feminibus menstrua prouocantibus.

B LIGVSTICI semen nascitur in altissimis, asperisq; montibus, & hortis: colligitur mense Iulio: siccat, & conseruatur per annum in loco sicco. * Excalefacit, concoquit, flatus discutit, menses mouet, &c. Dioscorides.

MENSTRVA quoq; prouocant, Amomi, semen Asparagi, Anisi, Ammi, Dau ci, Apij, Fœniculi, Petroselini, Seseleos, Cicer, &c. de quibus uide suprà suo loco.

De feminibus menses sistentibus.

PAEONIAE semen uulgaris est noticiæ. Nascitur in hortis & montibus altissimis. Colligitur mense Augusto: siccat & seruat per annum. * Auxiliantur grana nigra suppressionibus nocturnis, uulvæ strangulationibus, & matricis doloribus, quindecim numero pota, in aqua multa aut uino. Rubra uerò grana menses sistunt, decem uel duodecim pota in uino austero, & nigro: stomachicis & erosionibus ea esse prodest: à pueris pota, initia calculorum eximunt. Dioscorides.

MENSES quoq; sistunt, Anthera, Cuminum, &c. de quibus uide suprà suo loco.

De feminibus calculum frangentibus.

CALCVLVM in renibus frangunt, Milium solis, semen Maluæ, &c. de quibus uide suprà suo loco.

De feminibus uenenis resistentibus.

RAPAE semē uulgaris est noticiæ: colligitur æstate, seruat per annū.

y Antia

* Antidotis & theriacis, præsertim quæ sensum doloris auferunt (anodyna uocant) idoneum est: potum contra uenena salutare est: uenerem concitat. Dioscorides.

VENENIS quoque resistunt Ammi, semen Anisi, Apij, Citrei mali, Fœniculi, Cardamomum, &c. de quibus uide supra suo loco.

De feminibus mitigantibus dolorem.

PANICVM milio specie simile, facultate exiccatoria. * Sistit nonnihil uentris fluxus. astringit minus quam milium. Galenus.

DOLOREM quoque mitigant semen Anethi, Amomi, Cumini, Cardamomi, Dauci, Eruum, Fœnum græcum, Hyosciami, Lini, Petroselinum, Milium, &c. de quibus uide supra suo loco.

De feminibus discutientibus strumas.

STRUMAS discutiant semen Althææ, Coriandrum, Hordeum, Lentesc, Lupini, Lolium, Lithospermum, &c. de quibus singulis uide supra suo loco.

De feminibus uenenosis.

CORIANDRVM ob odorem latere non potest. * Epotum autem uocæ exasperat: insaniam adfert, à temulentijs non abhorrentem. qui sumperunt, pudenda dictu blaterant, totiusque corporis odore, uenenum fatentur. Quibus post uomitionem irino oleo concitatam, uti retulimus, merum & per se, & ex absynthio potum auxiliatur: item oleum: nec secus oua in eodem exinanita, siliques facta in muria sorbeantur: & epota muria, & ius salsum ex gallina & anseris: passum quoque cum lixiuia sumptum. Dioscorides.

PSYLLION epotum, * corpori toti frigus, & torporem cum exolutione, & morore quodam adfert, ita ut animum despondeant. Cui omnia, quæ exhausto coriandro auxiliantur. Dioscorides.

De feminibus purgantibus bilem.

PSYLLION folijs est coronopo non dissimilibus, hirsutis, longioribus. Sarmentosa fœni modo in totum herbula, ramis dodrantalibus: coma à medio caule exoritur, duobus tribus uel conuolutis, in cacumine capitulis: in his semine duro, nigro, pulicum simili: cuius est usus in medicina. Eligitur absolutum, amplum, tam graue, ut aqua mergatur. Nascitur in aruis & incultis. Seruatur ab uno anno usque ad duos. Dosis uerò à drachma una usque ad tres. * Aqua frigida maceratum purgat choleram: febribus biliosis est salubre, & inflammationibus thoracis. Thoracem quoque lenit, sitim extinguit. Cum aceto autem agitatum, phlegmonas, erysipelata, herpetas, & cæteros tumores calidos extinguit, & harum dolorem sedat, præsertim cataplasmate impositum. Sic & cephalalgiam calidam mitigat. Frixum uerò, & conuassatum, fluorem biliosum, dyntericum, à medicamento acri, ut scamonio, excitatum, sedat cum oleo rosaceo sumptum uel intectum. Et psyllio sic macerato

Arato cum aqua fontana frigida, & quassato, mucosa potio, præcipuè cū oleo uiolato, aut syrupo uiolato, aluum subducit. Non sumendum aut, quibus uiscera sunt imbecilla, neq; etiam tritum. Dioscorides & Mesues.

THYMELAEAE seminis, seu grani Cnidij planta, uirgas edit pulchras, multas, tenues, binum cubitorum: folijs chameleæ, angustioribus & pinguioribus, uiscosis, gummosisq; si mordeatur: flore candido: fructu myrti in modum rotundo, qui inter initia uiret, & tandem rubescit: inuolucrum fructus durum, foris nigrum, intus album. Nascitur in montibus & asperis. Conferuatur per annos duos. Dosis à granis quatuor usq; ad uiginti. Datur robustis ac fortioribus hominibus: imbecillioribus nequaquam. * Hoc per inferna, bilem, pituitam, aquasq; detrahit: uerum fauces adurit. Itaq; cum farina, aut polenta, aut in uua acino dari debet, aut melle cocto obductum deuorari. Dioscorides.

THLASPI herbula est angustis folijs, digitali longitudine, in terram uersis, subpinguibus: binum dodrantum cauliculo, tenui, non sine adnascantibus ramis: fructu circa ipsam totum, ab extremo in latius se pendente: semine nasturtij, incluso uasis in cacumine diuisis, lenticulae effigie, nisi quod infringitur: unde nomen accepit. Flos albicat. Nascitur in semitis, & sepibus, fossisq;. Semè asperi gustus, exalfaciens: * bilè utrinq; extrahit, potum acetabuli mensura: prodest ischiadicis infusum: sanguinem potu educit, internas suppurationes rumpit: menses ciet, sed partus enecat. Dioscorides.

De seminibus purgantibus pituitam.

CARTAMI seu Cnici semen eligitur amplum, plenum, medulla pingui, album, angulosum, laeue. Nascitur in hortis. Colligitur aestate. Conferuatur autem per annos tres. Dosis est à drachmis quatuor ad aureos quinque. Corrigitur eius malitia aniso, galanga, macere, & cardamomo. * Pituitam per uentrem & uomitum purgat, & aquas. Ob id morbis inde natis, ut colico affectui, & similib. confert. Thoracem quoq; & pulmonem expurgat. Stomacho noxiu. Vnde eius noxa, ut supra, corrigenda. Mesues.

GENISTA arbor est montana, è cuius caudice quamplurimam funduntur uirgæ, rectæ, flexiles, fractu cotumaces, quibus uites & alia ligantur. Flores edit flauos, lunari figura: è quibus siliquæ prodeunt, erui magnitudine: & semina in eis lenti similia, interuallis distincta. Dosis seminis à drachmis duabus ad quatuor. Corrigitur aniso, semine fœniculi & dauci. * Epotum semen pituitam utrinque ualentissimè purgat, & ab articulis quoq; humores trahit. Renum excrementa pellit, urinam cit efficacissimè, & calculos disrumpit tam in renibus, quam in uesica: neq; in his materias figi, & in calculum durefcere sinit. Mesues.


LATHYRIS seu cataputiæ seminis planta, quam aliqui tithymalum appellant, caulem emittit cubiti altitudine, & digitali crassitudine, inanem. Gi-

gnuntur in cacumine alæ, & folia in caule oblonga, amygdalinis proxima, latiora, & læuiora: quæ autem in summis ramulis exierunt, minora conspiciuntur, aristolochiæ, aut oblongæ hederæ figura. In cacumine fructum summis furculis gerit, triplici loculamêto insignem, rotundum, ceu capparin, in quo grana intercurfantibus membranis, inter se distincta continentur, eruis maior, rotunda: quæ dum corticibus exuuntur, candida sunt, & gustu dulcia. Nullus radicis usus. * Totus frutex lacteo succo turget, uti tithymalus. Grana sex, aut septem in catapotio, aut cum ficis aut palmulis deuorata aluû purgant: sed aqua frigida postea sorbenda, trahunt autem bilem, pituitam, & aquas. Dioscorides.

RICINI feminis arbor provenit parvæ ficus altitudine, folio platani, maiore, læuiore, & nigriore, ramis caudicibusq; cauis, in arundinis morem: semine in uuis asperis, quod corticibus exutum, ricinum animal representat. ex quo oleum nomine Cicinum exprimitur, cibus sædum, lucernis, emplastrisq; utile. * Grana triginta numero purgata, trita potu pituitas, bilem, aquamq; per aluum extrahunt, uomitionesq; mouent. sed iniucunda admodum est, & molesta purgatio: siquidem stomachum uehementer subuertit. Tusa & imposita, uitia cutis in facie, uarosq; expurgat. Dioscorides.

DE RADI-

A DE RADICIBVS CAP. XII



	Caput	{ Fœniculi. Paonia, &c.	A	
	Thoracem	{ Aristolochiæ. Enulæ, Bedeguar. Glycyrrhizæ. Ireos, &c.		
	Cor	{ Ben album. Ben rubrum. Buglossæ. Zedoariæ.		
A. Radices secundum locum alterantur	Calefaciunt uel	Stomachū	{ Fœniculi. Calami aromatici Cariophyllatæ. Galanga. Raphanus, Zingiber, &c.	
		Hepar	{ Apij. Asparagi. Curcumæ. Fœniculi. Petrofelini. Rhaponticum. Rufci, &c.	B
		Splenem	{ Acori, Apij. Asparagi. Aristolochiæ rotundæ. Fœniculi, Capparorum. Fraxini. Gentianæ. Petrofelini, etc.	
		Renes	{ Pentaphylli, Apij, Petrofelini, Fragariæ. Saxifragæ, etc.	
		Vterum,	Rubiæ tinctorum, etc.	
		Iuncturas	{ Costi. Zingiber, etc.	
		Refrigerant	{ Ventriculū, Sonchi, etc. Hepar & splenem, Cichorij, etc.	

Radices

A

A	}	Astringunt	Cyperi, Gentianæ, Pentaphylli, Rhapontici, etc.		
		Discutiunt	Aristolochiæ Asphodeli, Bryoniæ, Capparorum, etc.		
		Abstergunt	Aristolochiæ, Ari. Asparagi, Asphodeli, Bulbi, Chelidoniæ, etc.		
		Aperiunt	Allium, Cepa, Curcuma, Rhaponticum, etc.		
		Extenuant	Iridis Illyricæ, etc.		
		Adurunt	Allium Pyrethrum, etc.		
		Emolliunt	Althea, Maluæ, etc.		
		Suppurant	Althea, Bryoniæ, Liliorum alborum, etc.		
		Glutinant	Aristolochiæ, Dracunculi. Gentianæ, Sigilli Salomonis, Symphyti, etc.		
		B.	}	Flatus dissi- siunt	Apij, Acori, Allij, Costi, Carnabadij, Dauci, Enulæ, Eryngij, Fœniculi, Galangæ, Petroselin. Peucedani, Zedoaria, Zurumbeth, Spica Celtica, Spica nardi, etc.
					Acori, Bulbi.
		B	}	Semen gene- rant	Eryngij, Galangæ. Satyrj, Secacul, etc.
					Afari, Ari, Acori, Aristolochiæ, Asphodeli, Allij, Bryoniæ, Centaurij maioris, Cyperi, Costi, Capparorum, Calami aromatici, Dauci, Dictamni, Eryngij, Filipendulæ, Fœniculi, Graminis, Heleni, Lilij, Ostrutij seu Mei: Petroselini, Pœoniæ, Raphani, Rubiæ, Rusci, Valerianæ, etc.
				Menses mo- uent	Symphyti, Tormentillæ, etc.
				Sudorem prouocant	Cinæ, Sarsæ Pariliæ, etc.
		Venenis resstuit	Angelica, Apij, Allij, Aristolochiæ longæ, Bryoniæ, Cyperi, Carnabadij seu Doronici, Costi, Fœniculi, Gentianæ, etc.		
		Ambustis medentur	Asphodeli, Bulbi. Hyacinthi. Liliorum alborum, etc.		
		Dolorem mitigant	Acori, Dauci. Eryngij, Ireos, Mandragoræ, Ononis, etc.		
		Strumas discutiunt	Capparorum. Ireos. Plantaginis, etc.		

De radici-

De radicibus calidis in primo.

A Lthæ radix vulgaris est noticiæ. Nascitur passim in hortis. Colligitur autumnò: siccatur in umbra, seruaturq; in arca lignea per annum. * Magis quàm herbæ ipsius folia discutit, extenuat, mitigat: difficiles affectus concoquit. Decoctum ad tormina intestinorum, uentris profluuiū, & sanguinis reiectionem conuenit. Galenus.

ACANTHI seu **BRANCAE VRSINAE** radicis plāta, folia habet multò lactucaceis latiora & longiora, erucæ diuisura, nigricantia, pingua, læuia: caulem binūm cubitorum, digitali crassitudine, læuem, prope uerticem ex interuallis circumdatum foliolis, ceu nucamenta quædam oblonga referentibus, spinosis, è quibus flos prodit albus: semen oblongum, luteum: caput thyrsi specie: radicibus nititur longis, mucosis, rubris, & glutinosis. Nascitur in hortis, petrosi, & riguis. Colligitur Augusto uel Septembri: mundatur, siccatur ad solem, conseruaturq; per annum unum uel duos. * Radix uftis igni, & luxatis artubus illita subuenit: pota urinam cit, sed aluum cohibet: ruptis, conuulsis, tabem sentientibus, mirè prodest. Dioscorides.

BETAE radix nota est: * cuius decoctum, & foliorum surfures, lentesq; deterget: perniones fotu mitigat. Radix abstergit, digerit. Dioscorides.

BVGLOSSAE radix nascitur in cæpestribus: colligitur autumnò. * Vino imposita, animi uoluptates auget. Dioscorides.

GLYCYRRHIZA seu radix dulcis, fruticosa est, ramis binūm cubitorum altitudine assurgentibus: folijs lentisci, densis, pinguibus, tactuq; gummosis: flore hyacinthi: fructu pilularum platani magnitudinis, asperiore, qui filiquas lentium modo habet rufas & paruas: radicibus longis, ut gentianæ, coloris buxei, subacerbis & dulcibus: quæ densantur in succum, lycij exemplo. Nascitur plurima in Cappadocia, Ponto, & Apulia. Visitur etiamnum in uiridarijs pluribus locis, in Italia, Gallia, & Germania. Colligitur mense Augusto, uel autumnò: siccatur ad solem, seruaturq; per annos duos. * Arteriæ scabritiam lenit: æstuanti stomacho, thoraci, ac iecinori conuenit: uesciæ scabiem & renum dolores sanat: sitim extinguit. Dioscorides.

De radicibus calidis in secundo.

APII fatiui, seu vulgaris petroselini radix, nulli nō cognita: colligitur autumnò: mundatur, siccatur in umbra, & conseruatur per annum. Recēs suauis est, & stomacho grata: * urinas menstruaq; mouet: flatus discutit, &c. Galenus.

CAPPARVM radix nascitur in Alexandria Ægypti & Apulia. Præstantissimæ Alexandrinæ. Colliguntur mense Septembri, siccantur in umbra, & seruātur in arcis ligneis per annum. * Abstergit, expurgat, incidit, discutitq; tum amaritudine, tum acrimonia: acerbitate uerò contrahit, stringit, & densat.

A fat. quapropter lienes induratos, & pota, & extrinsecus iuuat: menstrua pro-
uocat: pituitam per os educit: maligna ulcera sanat: dētium dolores mitigat:
tumores digerit: & uiligines discutit: auriumq; uermes enecat. Galenus.

PEVCE DANVM caulem emittit tenuem, gracilentum, fœniculo simi-
lem: comam habet statim ab terra copiosam, spillamq;: flore luteo: radice ni-
gra, crassa, graui odore, succosa. Eligitur recens, quæ cariem non senserit, fir-
ma, odoris plena. Gignitur in montibus opacis. Colligitur radix mense **Se-**
ptembri, siccatur in umbra, & seruat per annos duos uel tres. * Digerit, ex-
tenuat, absumitq; lienem, præsertim induratum, ex aceto, aut oxymelite po-
ta: perforatorum dētium dolores sanat, cavitati imposta: foris squamas ce-
lerrimè ab ofsibus detrahit: & arida illita ulceribus contumacibus medetur.
Dioscorides & Galenus.

PIMPINELLÆ duo habentur genera. Maior radice nititur longa: fo-
lijs circumquaq; solo procumbētibus, dissectis, per ambitumq; ferratis: caule
quadrangulari: floribus in umbellam cohærentibus, tenuibus, albicanti-
busq;. Minor caule exit rubenti: folijs minorib. minus dissectis, minutiusq;
ferratis. Vtraq; tamen hircum redolet. Nascitur in campestris. & syluis, Col-
ligitur mense **Augusto**: siccatur, & cōseruatur per annum. * Radix, in qua uis
rota est, excalfacit, siccaturq; ordine secundo completo, aut sanè tertio incipiē-
te. Præstat hæc ad renum & uesicæ morbos, quorum calculus est causa. Ob
B id enim renes à calculis expedit, & urinam remorata pellit. Matthiolus.

RAPVM uulgò notissimum est. * Decocta radix alit, inflammationē pa-
rit, humentem ac fluxam carnem creat, uenerem stimulat. Decocto podagræ,
pernionesq; fouentur: contritoq; rapo, atque imposito iuuantur. Si excaua-
tæ radici rosaceum, ceratum adigatur, & feruenti cinere eliquescat, exulcera-
tis pernionibus proficiet. Dioscorides.

SCILLA uulgaris est noticiæ: sit bonæ habitudinis (non tamen adeò ma-
gna & enormis) bene habita, & nutrita, alba, recens ex terra sumpta, cum fo-
lia eius & caulis exactè aruerint, seu quando triticum metunt, quia tunc po-
tissimum uiget. Alba est masculus, eaq; utilior quàm fœmina nigra. Scillæ al-
bæ segmenta seu taleolæ cultello ligneo separatæ, lino traiectæ, modicis in-
teruallis, ne se mutuò contingant, in umbra siccantur diebus sexaginta, ut ex
his fiat acetum scilliticum. * Scilla uim acrem atque feruentem habet: calida
in secundo. Incidit: urinam mouet: stomachicis, hydropicis, suspiriosis, tor-
minibus, & regio morbo subuenit. Dioscorides & Medici Colonienfes.

ZEDOARIA faciem gingiberis repræsentat: odoratior tamen, amariu-
scula, neque adeò ut gingiber acris. Conuehitur è Sinarum regione, ultra
extremas Indiæ oras. * Excalfacit & siccatur ordine secundo. Flatus discutit,
& pinguedinem auget propria quadam facultate, non quidem elementari.
Pōst sumpta, graue uirus anime, quod allium, cepa, uel uinū excitauit, abigit.

z uenenorum

uenenoforum animalium moribus opitulatur: alui fluxiones sistit, uteri ab-
fcessus resoluit, uomitiones reprimat, & coli cruciatus tollit, itemque ventri-
culi. Alui tineas quascunque enecat, & in antidotis additur. Matthiolus ex
Serapione.

De radicibus excalfacientibus in tertio.

ACORVS folia fert iridis, radices non dissimiles, summo cespite sparsas,
complicatas, geniculis interceptas, in obliquum actas, albicantes, gustu acres,
& ut Galenus ait, modicè amaras & odoratas. Optima est densa, candida, ca-
rie nõ exesa, plena, odorata: cuiusmodi est Colchidica & Galatica. Cæterum
omnes has ferè notas habet ea radix, quæ hodie uocatur Calamus aroma-
zicus. Hanc ob causam, hæc semper pro acoro sumenda est, uel asari radix.

* Acori radici uis excalfactoria. Decoctum potu urinam cit: prodest lateris
doloribus, & iecineris atque thoracis: item torminibus, uulsis, ruptis, lienem
absumit: urinæ stillicidio, & serpentum ictibus auxiliatur: insidentibus ad mu-
liebres affectus, iridis modo, utiliter imponitur. oculorû caligines succo di-
scutit. Antidotis radix magno usu commiscetur. Dioscorides & Medici Flo-
rentini.

ASARVM, hederæ folijs, minoribus multò, rotundioribusq;: floribus
cytino hyosciami similibus, purpureis, inter folia proximè radicem emican-
tibus, odoratis: in quibus semè acinosum. Cauliculos habet angulosos, aspe-
ros, & molles: radices numerosas, geniculatas, tenues, obliquas, gramini nõ
dissimiles, longè tamen graciliores, odoratas, excalfacientes, & quæ linguã
uehementer mordent. Umbrosis montibus prouenit. Augusto mense colligi-
tur, uel autumno: siccatur in umbra, & seruat per annum in arcibus ligneis.
* Ad solutionem uentris, dosis infusionis est ab aureis duobus ad quatuor:
pulueris uerò à drachma una usque ad aureos duos. Excalfactoriam uim ha-
bet: urinam cit: hydropicis, & uetusto coxendicum dolori prodest. Radices
senis drachmis ex aqua mulsæ potæ, menses trahunt: & ueratri albi modo pur-
gant. In unguenta additur. Dioscorides & Mesues.

ARON apud Syros Lupha uocitatum, folia emittit dracunculi, sed lon-
giora, & paucioribus distincta maculis: caulem subpurpureum, dodrantalè,
pistilli specie, à quo croceum semen exit: radice dracunculi alba. Nascitur in
campestribus, uineis, scrobium marginibus, & passim in semitis. Colligitur
mense Augusto: siccatur, & seruat per annum. Terrena essentia cõstat, sed
calida: * proinde extergendi uim possidet, uerum non ualentem sicut dracõ-
tium. Radices comessæ crassitiem humorum mediocriter incidunt, adeò ut
excreationibus ex pectore idoneæ sint. Ex fimo bubulo podagris illinitur.
Dioscorides & Galenus.

DICTAMNVM, herba est in sola Creta nascens, pulegio similis, sed ma-
ioribus folijs, cana lanugine pubescentibus. Florem nullum aut semen pro-
fert.

A fert, inquit Dioscorides. Theophrastus uerò, cæteriꝫ; authores & caulem illi tribuunt, & florem & semē: ut manifestè uidere licet in dictamno, quod hodie ex Creta adfertur: cui quidem conueniunt reliquæ Dioscoridis notæ, sed florem & semen profert. Alia est planta, dictamnium album uulgò uocata, aliàs fraxinella, plantè à dictamno Cretèsi diuersa: quæ quamuis ualde efficax sit, dictamno Cretensi substitui tamen non potest: hoc enim ueteres intelligunt, cùm absolutè dictamnium scribunt. * Calefacit: partus accelerat. Omnia præstat quæ fatium pulegium: quod eius loco substituen dum est. Medici Florentini, ex Dioscoride & Matthiolo.

DORONICVS, radices Ornithogali repræsentat. Affertur ex Alexandria Aegypti. * Ad cordis affectus cõmendatur: contra uenena, & deleteria medicamēta. Dilutum colatum pectoris & laterum humores expurgat, tussi confert. Doronicus Aëtuario Carnabadium dicitur. Eius loco caryophylli substituendi sunt. Matthiolus.

FOENICVLI radix uulgaris noticiæ est. Nascitur passim in hortis. Colligitur Augusto mēse uel autumno. Lauantur, siccantur, & à medulla intrinseca mundantur, deinde in umbra siccantur, conseruaturq; per annum in arsis ligneis. * Menstrua & urinas prouocat: arquat is auxiliatur.

B **GALANGA** est radix nodulis scatens, intus & foris rubra, per internodia contorta, odorata, & acerrimi saporis, odore & figura quadam cyperi: unde quibusdam Cyperus Babylonicus putatur. Eligenda grauis rubra, sapore acerrimo linguam uellicās. Adulteratur Cyperi uulgaris radicibus repurgatis, & in aceto cum pipere maceratis: sed abrafo cortice fucus deprehēditur: nam pars interior neq; galangæ acrimoniam neq; saporem habet. Calefacit & siccatur ordine tertio. * Proinde uentriculum roborat, & eius dolores tollit: si tamen à frigore uel flatu proueniant. Naribus admota frigefacto cerebro utilis est: ore retenta anhelitum cõmendat. Facit & ad cordis palpitationem, si è plantaginis succo bibatur: cœliacos sanat, & coli dolores mulcet, qui à flatu oriuntur. Prodest flatuosis uteri affectibus: uenerem roborat: renes refrigeratos calefacit: & frigidis morbis omnibus præstat. Medici Florentini ex Matthiolo.

HELENIVM folia habet uerbasci angustioris folij asperiora, oblonga: caule quibusdā in locis nõ emittit: radicē subalbidā, interdū subrufā, odoratam, subacré, uegetā, magnā: ex qua agnatæ propagines liliorum aut ari modo ferūtur. Mōtanis, umbrosis, & siccis locis prouenit. Foditur æstate radix, particulatimq; dissecta siccatur, & conseruatur ab anno uno usq; ad tres, in loco sicco. * Potum radicis decoctum, menses & urinas ciet. Ipsaq; in eclegmate ex melle prodest tussi, orthopnœæ, ruptis, conuulsis, inflationib. & serpentiu morib. In summa excalfaciēs est. Helenij radix & stomacho utilis est in passo cõdita. Trita potaq; ad cruētās excreationes efficax est. Diosc.

PETROSELINI, seu APII HORTENSIS radix nota est, cū passim ubiq; in hortis proueniat. * Vrinā & menses prouocat: stomacho nō ingrata.

RAPHANVS nemini nō cognitus. * Excalfacit, flatus gignit, ori suavis est: sed stomacho aduersatur, ruētus ciet, urinā pellit, aluo aptior: summo tñ cibo sumi debet, quō magis eius distributionē adiuuet: cū aut præsumentur, cibum suspēdit. quare uomituris cōmodissimē datur ante cibum. sensuum aciem excitat. Decocta contra ueterem tussim, & pituitæ crassitiē in pectore, efficax est. Cortex ex aceto mulso, celerius uomitiōes mouet: hydropicis cōmodissimē illinitur: lienosis utilis: sugillata cū melle rapit, & nomas amolitur: contra uiperarum ictus auxiliatur: alopecias ad pilū reducit: lentigines cum loliacea farina emendat: his qui fungis strangulātur, tam cibo quā potu salutaris est. Syluestris raphani, quam Romani armoraciā nominant, folia fatiuo similia, sed magis lampsanā imitantur: radix gracilis, tenera, subacris. Tam folium, quā radix in olera recipitur: sed hæc excalfacit, urinam concitat, æstuosa est. Dioscorides.

De radicibus calidis in quarto.

ALLIUM quoddam fatium atq; hortēse habetur. quod in Ægypto, singulari ut porrū, capite constat, dulce, in purpureum uergēs paruum: reliqua uerō magna & candida, ex pluribus coagmentantur nucleis, quos aglithas, id est spicas, Græci nominant. Aliud est syluestre, quod ophioscorodō, id est anguinum uocat. * Vis allij acris est: excalfacit, mordet, excernit, aluum turbat, inflationes facit, stomachum exiccat, sitim gignit, flatum permouet, summam corporis cutem exulcerat: aciem oculorum esu heberat. Eisdem effectus præbet anguinum, quod & elaphoscorodon dicitur: latas uentris tineas in cibo sumptū abigit, urinas detrahit: contra uiperarū ictus, & priuatim hæmorrhoi, prodest, ita ut non aliud magis, si cum uino iugiter assumatur, aut tritum in eodem ebibatur: contra rabiosorum morsum, & illitu, & cibo ualet. Magnæ & allio utilitates contra aquarum mutationes: uocem clarificat: ueterem tussim crudum, coctū uel lenit: potum autem cum origani decocto, pediculos & lendes enecat: cremati cinis illitus sugillationib. cum melle, & alopecijs, cum nardino unguine, medetur: eruptiones papularū cum oleo & sale sanat: uertiligines, lichenas, lentigines, ulcera capitis manantia, lepras & furfures, cum melle eximit: cum thure & teda decoctum, dentium dolorem leuat, si in ore contineatur: contra uenenatos muris aranei morsus, cū ficulneis frondibus & cumino illinitur. Feruefactæ comæ ius, sceminarum defensionibus additum, menses & secundos partus extrahit. Allium eiusdem gratia suffitur. Factum ex eo, & nigra oliua intritum, quod mytoton uocant, esu cit urinam, ora uenarum patefacit, hydropicis utile. Dioscorides.

C B P A longa acrior est quā rotunda, item flaua quā candida, & sic-

A & sicca quàm uiridis, & cruda quàm cocta, aut sale condita. * Omnes tamen mordent, flatus gignunt, appetentiam inuitant, sitim mouent & extenuant, fastidium pariunt & expurgant: aluo utiles sunt. Eæ detractis purgamentis in oleum coniectæ, hæmorrhoidas, reliquosq; excretionum exitus referant, subditæ pro balanis. Succus cum melle illitus, oculorum hebetudinibus, argemis, nubeculis, & incipientibus suffusionibus auxiliatur: anginæ eodem perunguntur: suppressos menses pellit: caput purgat, naribus infusus: canis moribus cū aceto, ruta & melle illinitur: cū aceto aut perunctas in sole utiligines sanat: & cum pari spodio, scabras lippitudines sedat: uaros cū sale reprimat: contra calceamentorum attritus, cū gallinaceo adipe utilis est: citæ aluo prodest: in auribus sonitum ac grauitatem emendat: ad purulentas aures, & eliciendam earundem aquâ, ualet: alopeciæ earū succo perfricantur, qui celerius quàm alcyonium pilos euocat. Largiore cibo cepa capitis dolores ciet, cocta q; uehementius urinam pellit: eos lethargicos efficit, qui ualitudinibus aduersis, ea etiâ cocta, plus æquo uescatur. Elixæ, & cū pãsis uuis & fico illita, tubercula concoquit, & celerrimè rumpit. Dioscorides.

COSTVS Dioscoridi radix est candida, leuis, eximia, odoris suauitate, qualem Arabicū esse dicit: hic præcellit. Secundum locū sibi uendicat Indicus, crassus, leuis, ut ferula niger. Tertius est Syriacus, grauis, colore boxeus, & odore nares feriens. Optimus est recens, albus, abundè plenus, densus, aridus, à teredinibus non erosus, sine graue olètia, gustu acuto, ac linguâ uellicans, & (ut ait Galenus) aliquantulū amaro. Omnes ferè optimi costi notæ in angelicæ radice, quæ satis nota est, reperiuntur. Hinc fit, ut nonnulli putent, eâ pro uero costo substitui posse. ut uerum fateamur, præstat eam costi loco usurpare, quàm costum uulgare officinarum, quod à iam dictis notis alienissimum est. * Vis ei excafactoria: urinam ciet: menses pellit: uitijis quæ uuluam malè habent, tam imposito, quàm fotu & suffitu auxiliatur. Contra uiperarum morsus sextantem bibere prodest: item aduersus pectoris dolores, conuulsa, inflationesq; ex uino & absynthio: uenerè ex mulso stimulat: latas uētris tineas ex aqua pellit: horroribus ex oleo ante februm accessiones, & neruorum resolutionibus oblinitur: uitia cutis in facie, cum aqua uel melle illitus, emendat. Additur in antidota & malagmata. Sunt, qui admistis helenij Comageni præduris radicibus adulterent. Quod deprehensu facile est: siquidem neq; gustu feruet helenium, neq; ualidum odorem uibrat, ut caput tentare possit. Medici Florentini ex Dioscoride & Matthiolo.

PORRYM capitatum * inflammationem parit, noxium succum creat, tumultuosum somnium parit, urinam ciet, aluo accomodatur, extenuat, oculorum aciem hebetat, menses pellit: sed lædit exulceratam uescicam, renesq;. cum ptisana uerò coctum, esu pectoris uitia extrahit. Coma eius in aqua maris, & aceto cocta, in desefsionibus ad præclusiones uulvæ, & duriti-

as, utilis habetur. Porrum bis aqua mutata coctum, tum frigida maceratum, dulcefcit, & multò minus inflat. Semen acius est, & quandam adstrictoriam uim habet. quare succus cum aceto, addito thure, aut manna, sanguinis profuua sistit, maximè si naribus erumpat. Venerem stimulat: contra omnia thoracis uitia, tabemq̃, pro delinctu efficax est: arteriam esu purgat: sed si assidue estur, uisus obscuritatem inducit: stomacho aduersatur. Succus ex melle potus, aut illitus, contra bestiarum morsus auxilio est. Ipsum quoque cum aceto, aut thuris polline, lacte aut rosaceo, utiliter aurium doloribus & sonitui instillatur. Varos tollunt folia illita cum rhoe, qua ad obsonia utuntur: epinyctidi medentur: crustas ex sale illita rumpunt. Veteres sanguinis reiectiones cohibent, feminis drachmæ binæ, cum æquali baccarum myrti pondere potæ. Dioscorides.

PYRETHRVM officinis omnibus notum (præsertim radix) Romani saliuarem uocât. Folia, caulemq̃ emitit, ut daucum syluestre, & fœniculum: umbellamq̃; anethi, circinatæ rotunditatis. Radix longa est, pollicis crassitudine, gustu feruidissimo. Nascitur in Orientalibus regionibus, ex quibus Venetias aduehitur. * Pituitam elicit: ideo in dolore dentium, decocta in aceto, colluto inde ore, auxiliatur: mansa pituitam extrahit. Sudores ciet, peruncto ex oleo corpore: diurnis horroribus efficax. contra perfrictiones membrorum, resolutionesq̃; eximiè conducit. Dioscorides.

De radicibus frigidis in primo.

MALVAE radix uulgò nota est. * Huius decoctum uulvas in fessione mollit: prodest erosionibus uesicæ & intestinorum, uulvæ, sedi que, clystere infusam. Contra omnia uenena ius decoctæ cum radice sua auxiliatur, si continuo à bibentibus reuomatur. contra phalangiorum morsus remedio est. Digerentis paululum, & leuiter emollientis facultatis est. Dioscorides.

De radicibus frigidis in secundo.

CICHORII radix uulgaris est noticiæ, quòd nostratibus mensibus frequentissimè in acetarijs apponatur. * Refrigerat siccataq̃; ordine secundo, & moderatè alstringit. quapropter hepar roborat: uenarū hepatis oscula extergit, obstructionsq̃; aperit. Galenus.

De radicibus frigidis in tertio.

MANDRAGORAM aliqui antimelum, alij circeam uocant, quoniam uideatur radix ad amatoria conducere. Duo eius genera: niger, quæ formina existimatur, thridacias appellatus, angustioribus folijs, ac minoribus quàm lactucæ, uirosis ac graueolentibus, in terra sparsis, mæla gerit forbis similia, pallida, odorata, in quibus semen ueluti pyrorum: radicibus inhæret bene magnis, binis, ternisue, inter se cõuolutis, nigris foris, intus albis, crasso cortice uestitis: caulem non fert. Alter candidus, qui mas dicitur, nonnullis mo-

tion, co-

DE RADICIBVS HVMIDIS IN PRIMO. 183

A rion, colore in croceum inclinante, iucundè cum grauitate quadam olentia, quorum pomorum cibo aliquantum opiliones soporantur: radix alterius similis, maior & candidior, orbata & hæc caule. Nascitur in montibus & uiridarijs. Colligitur mense Augusto, uel autumno. Delibratur radix, & traictus lino cortex, ad usum suspenditur. * Ex hoc uinum paratum, ijs q; exhiberi solet, quibus membrum aliquod præcidere aut urere cogitât. in somnâ namque altissimum ægros deducit. Dioscorides.

De radicibus humidis in primo.

SATYRII nomen apud Arabes omnibus orchios generibus commune est, eaq; distinguunt in testiculos canis, & testiculos uulpis: per uulpinos intelligentes, quæ propriè à Græcis satyria uocantur, radice bulbosa, mali magnitudine, foris fulua, intus candida. Hodie testiculi canini pro uulpinis, Dioscoridis quæ satyrio sunt in usu: nam uero satyrio carere uidemur: aut si habeamus, nondum tamen dignosci possunt inter tam multas testiculorum differentias, cum omnes, si cum descriptione conferantur, testiculi canis uideantur: eis pro uero satyrio uti nos posse arbitramur. Hodie noti sunt. * Radix superior, quæ maior & plenior est, uenerem stimulare: inferior uerò, quæ mollior ac rugosior est, inhibere creditur. Medici Florentini.

B HVMECTANT quoque in primo ordine, radix Buglossæ, Cichorij, Glycyrrhizæ, Maluæ, Rapæ, &c. de quibus singulis uide supra suo loco.

De radicibus siccis in primo.

BRYONIA, VITIS ALBA, nota omnibus ferè planta est, quod passim secus uias, & prope sepes proueniat. Folijs uiticulis, pampinis quæ fatiuam uitem imitatur, sed hirsutiora sunt omnia: ea, quos prope se nacta sit fructus, suis clauiculis complectitur: fructus rubens in uua dependet, quo coria pilis spoliatur. Colligitur radix mense Augusto, uel autumno: siccatur ad solem, & conseruatur per annos duos uel tres. * Corpus abstergit, & cutem erugat: uitia cutis in facie, uaros quæ, lentigines, & cicatrices nigras emendat, cum eruo, creta Chia, & scæno-græco. Datur comitialibus in potu, drachmæ pondere, quotidie anno toto: prodest attonitis, & uertigine laborantibus, similiter assumpta. Item lienes induratos liquat: urinam & menses prouocat. Dioscorides.

OENANTHE folia habet pastinacæ: florem candidum: caulem crassum, palmi altitudine: semen atriplicis: radicem magnam, in multa rotunda capitula extuberantem. Nascitur in petris. Colligitur autumno: siccatur ad solem, & conseruatur per annos duos. * Radix è uino urinæ stillicidio conuenit.

ERYTHRODANYM, Rubia, radix rubra est, qua tinguntur lana.

Vna.

Vna sponte prouenit: altera feritur, ut in Thebana Gallia, & Rauenna Italia: in Caria inter oleas, ut in aruis, solo creditur. Hanc non sine questu ferunt: namque maximum ex ea sentiunt prouentum. Asperi caules, & quadranguli, longi. aparinæ non dissimiles, robustiores, & multò prorsus maiores: folijs per interualla circum articulos, stellatim decussatis. Semen eius rotundum, inter initia uiride, mox rubrum, postea cum ematuruit, nigrum: radix tenuis, longa, rubra. * Vrinâ ciet: qua de causa regio morbo opitulatur, pota cum aqua mulsa: item ischiadicis, & resolutis. Crassam copiosamq; urinam pellit, nonnunquam & sanguinem: bibentes tamè quotidie lauari oportet, & excrementorum, quæ redduntur, differentiam spectare. Aduersus serpentium morsus, ramulos cum folijs uino bibere prodest. Semen ex aceto potû, lienem absomit. Imposita radix trahit partus, menses, secundas. Albæ uitiligini illita ex aceto medetur. Dioscorides.

MYRICAE seu TAMARICIS radix uulgò cognita est. * Elephantiasim ex lienis uitio obortam, huius decoctum, & cum passis uuis epotum sanare, tradidit Alcanzias Arabs: id quod se uidisse ait in duabus mulieribus. Matthiolus.

SICCANT quoque in primo excessu, radix Althetæ, Ari, Fœniculi, &c. de quibus uide suprâ suo loco.

De radicibus siccis in secundo.

SICCANT ordine secundo, radix Capparum, Cichorij, Raphani, &c. de quibus uide suprâ suo loco.

De radicibus siccis in tertio.

PENTAPHYLLI seu QVINQVEFOLII radix est subrubra, oblonga, ueratro nigro crassior. Nascitur in riguis & aquarijs ductibus. Colligitur Augusto mense: siccatur in umbra, & seruat per annum. * Ius radice decoctæ ad tertias, si in ore contineatur, dentium dolores sedat: putrida oris ulcera, collutione sistit: arteriæ scabritias gargarizatu laeuigat: contra alui profluvia & dysenterias auxiliatur: item articulorum, coxendicûq; cruciatibus potû. Costa in aceto, & illita, serpentina ulcera cohibet: strumas, tumores, duritias, abscessus, & collectiones discutit: ignes sacros, reduuias, condylomata, pforasq; sanat. Teneræ radice succus, contra iecineris, pulmonumque, morbos prodest: item aduersum uenena. Illita cum melle & sale, tam uulneribus, quàm fistulis remedio sunt: enterocelicis auxilium præstant. Dioscorides.

TRIFOLII, OXYTRIPHYLLI, uel ASPHALTII radix lóga, tenuis, & ualida est. Antidotis inseritur. * Laterû dolores ab obstructione natos iuuat: urinam, mensesque prouocat. Dioscorides & Galenus.

SICCANT etiam in ordine tertio, radix Acori, Afari, Apij, Doronici seu Carnabadij, Petroselini, &c. de quibus singulis uide suprâ suo loco.

De radi-

A *De radicibus excalfacientibus caput.*

PÆONIAE radix maris digitali crassitudine, & palmi longitudine, gustu astringens, alba. fœminæ radicibus ceu glandes circiter septem aut octo inhærent, ut in hastula regia. Nascitur in altissimis montibus, & præruptis. Colligitur mense Augusto: siccat, & conseruatur per annos duos uel tres. * Fœminis à partu non purgatis sicca radix datur, ciet menses amygdalæ magnitudine pota: uentris doloribus cum uino pota auxiliatur. ualet contra regium morbum, & renum, ac uesicæ dolores. decocta in uino aluum sistit. Alligata radix, puerorum epilepsias sanat. Dioscorides.

CAPVT quoque excalfaciunt, seu pituitam in capite concoquunt, radix Fœniculi, &c. de qua uide supra suo loco.

De radicibus excalfacientibus thoracem.

ARISTOLOCHIAE tria genera Dioscoridi recēsentur: rotunda, longa, Clematidis. Rotunda hodie notissima, radicem habet rotundam, rari modo, reliquasq; notas, quas illi tribuit Dioscorides: longa autem paucis adhuc cognita, quandoquidem ea quæ hodie pro longa exhibetur uulgò, quibusdam est tertia species, Clematidis dicta, quòd non habeat radices quater nos digitos longas, uelut longa Dioscoridis, sed longissimas & graciles, quales Clematidis describuntur, tametsi (si Dioscoridis textus non est mendosus, ut aliqui existimant) folia semperuiui minoris non illi conueniant. Itaque quæ nam sit Aristolochia longa, & Clematidis, dubitatur. Cum uerò rotunda sit omnium efficacissima, eius usus esse debet, quotiescunq; Aristolochiæ nomen absolutè reperietur: imò etiam longæ, & Clematidis loco usurpari potest. Vulgaris longa omnium imbecillissima est. Nascitur in campestribus, montibus, syluis. Colligitur autumnò, uel mense Augusto: siccat ad solem, & seruatur per annos duos uel tres. * Venenis resistit. Pota cum pipere & myrrha menses, partus, & omnia uuluarum onera eijcit. eadem efficit subdita in pecto. Singultibus, asthmaticis, horroribus, lieni, conuulsis, laterum doloribus, pota cum aqua, singulariter auxiliatur. Aculeos & spicula extrahit: osium squamas illitu adimit: ulcera putrida exest: & sordida expurgat: caua cum iri & melle explet: gingiuas & dentes extergit. Dioscorides, & Medici Florentini.

IRIS à cœlestis arcus similitudine nomen accepit. Folia fert gladioli, sed maiora, latiora, & pinguiora. Flores in summitate cuiusq; caulis, æqualibus inter se spacijs distant, incurui, uarij: siquidem candidi, pallentes, lutei, purpurei, aut cœrulei cōspiciuntur: qua diuersi coloris specie, quædam cœlestis arcus imago representari uidetur. Radices subiacent geniculatæ, solidæ, odoratæ: quæ frustatim dissectæ, in umbra siccantur, & traictæ lino reconduntur. Melior est Illyrica & Macedonica: & inter has laudatissima, quæ mu-

A tila

tila ferè, & densa constat radice, frangenti contumax, subrafo calore, gustu **A**
 amaro, odore perquam grato & sincero, ita ut nullum prorsus situm redoleat:
 quæ dum tunditur, sternutamenta mouet. Secundum locum habet Africa-
 na, candidans, gustu amara. Teredines in uetustate sentiunt: tunc tamen o-
 doratiores reddi solent. * Vis omnibus excalfactoria, extenuans, contra
 tuissimè efficax: humorum, qui ægrè reijciuntur, crassitiem digerunt: bilem,
 crassamque pituitam ex hydromeliti drachmis septem epotæ, purgant: som-
 num conciliant, lacrymas ciunt, torminibus mœdantur. Eadem potæ ex
 aceto auxiliantur serpentium ictibus, lienosis, cõuulsis, perfrictionibus, hor-
 roribus, & quibus genitura effluit: menses ex uino potè pellunt. Decoctum ea-
 rum, foëminarum fontibus utiliter imponitur, ad emolliendos locos, laxandaq;
 in eis uenarum spiracula: ischiadicis infunditur: fistulas ac sinus carne explet.
 Radices ex melle glâdis modo subditæ, partus extrahunt: quinetiam coctæ &
 illitæ, strumas, ueteresq; duritias emolliunt. Siccæ quoq; ulcera replent, &
 cum melle purgât: nudata ossa corpore operiunt: doloribus capitis cû aceto
 & rosaceo magna utilitate illinuntur. Admotæ cû albo ueratro, & duab; mel-
 lis partibus, lentigines & uitia cutis in facie à sole cõtracta emaculat. Pelsis,
 malagmatis, & acopis inferuntur. Succus hydropicis propinandus, quo-
 niam recenti Illyrica destituimur, è nostrate elicitur, ducitq; abundè aquas.
 Mansa oris halitum commendat: dentium dolores mulcet, si radices decocto
 ijdem foueantur. Coquit item, abstergit, digerit, resoluit, lenit, referat, expur-
 gat, & deijcit: uulnerarijs medicamentis immixta sarcotica est. Radices ex-
 pressus succus bilem flauam, pituitam, & aquas cutem subeuntes pellit: hæ-
 morrhoidas fotu elicit. Radix ipsa contrita, & ex aceto bibita, omnibus ad-
 uersatur uenenis. Succus naribus infusus cerebrum à pituita mirificè purgat:
 uentriculo tamen nocet, cum per se tantum bibitur. Dioscor. & Matthiolus.

BEDEGVAR, Dioscoridi **SPINA ALBA** dicta, ex quorundam sententia
 ea est plâta spinosa, quæ folia habet longa, angusta, maculis albis distincta, ca-
 pitula spinosa, & in his flores purpurascens. Nascitur in montanis. Colli-
 gitur radix autumno: siccatur & conseruatur per annum. * Pota cœliacis,
 stomachicis, & ijs qui cruenta extulsiunt, efficax est: urinam cit: tumoribus
 illinitur. Decocto eius dentes in dolore collui prodest. Dioscorides.

THORACEM etiam excalfaciunt, seu pituitam in thorace coquant, ra-
 dix *Enulæ*, *Glycyrrhizæ*, &c. de quibus uide supra suo loco.

De radicibus excalfaciuntibus cor.

BEEN album secundum quosdam polemoniū est Dioscoridis: ea inquam
 planta, quæ radice constat cubitali, candida, caule geniculato, betonicæ altit-
 uocata non dissimili, ex quo dependent uesiculæ, seu folliculi quidam ro-
 tundi & candidi, folia polygono mari similia, maiora tamen & longiora, &
 ex intera

DE RADICIB. EXCALFAC. STOMACHVM. 187

A ex interuallis bina. Notissima est per Hetruriam. Been rubrum, aliqui Dioscoridis tripolium esse uolunt: pro hac ostendunt plantam quãdam in maritimis nascentem, folijs glasti, magis uirẽtibus, longioribusq̃: caule per summa diuiso, flosculisq̃: purpureis onusto: radice rubra, palmum longa & contorta. Been rubrum cum hac descriptione magis quadrat, quã album cum polemonia: donec tamen certius de ea iudicium statuatur, radice pastinacæ syluestris, aut satyrij, aut terebinthi summitatibus utemur. * Ad cordis affectus conducunt. Medici Florentini.

COR etiam excalfaciũt, radix Buglossę, Zedoaria: de quib. uid. s. suo loco.

De radicibus stomachum excalfacientibus.

CALAMVS odoratus in India nascitur. Melior est fuluus, densẽ geniculatus, & qui assulosẽ frangitur, plena araneorũ fistula, albicatus, lætus in mandendo, & adstringens, cum aliquanta acrimonia. Is hodie incognitus est: uulgaris aut calamus aromaticus, Acorum fortẽ est, ut supra diximus. De eo nũc plura nõ dicemus, sed p̃ eo Schœnãcho utemur. * Calamus aromaticus urinã potu ciet: quare cũ graminis aut apij semine coct̃, in aquẽ subter cutẽ fusã morbo, renũ uitijs, stillicidio urinæ, ruptisq̃: cõmodẽ bibitur: menses & potu, & appositu pellit: tussi suffitu medetur p̃ se, aut ex resina terebinthina, hausto p̃ arundinẽ fumo: ad muliebres infusus decoquitur, & clysterib. imponitur. Malagmatis & suffitionibus odoris gratia cõmiscetur. Dioscorid.

B **CARYOPHYLLATAE** radix caryophylli spirat odorem, tenuis, nigra, & bene olens. Nascitur in montibus, & in uijs iuxta septa. Colligitur mense Martio: siccatur & conseruatur per annũ. * Hæc recentiores utuntur pota ad thoracis interna uulnera. Quin & eius succũ admixta æruginẽ cuniculosis, contumacibusq̃: ulceribus utiliter inijciunt. Eadẽ olfactu spiritus recreat, & frigidũ roborat cerebrũ. Epota prodest cæliacis, dysentericis, fœminarũ p̃fluuijs, & cruẽta expuẽtib. Tã intus sumpta q̃ foris illita, enterocelis auxilio est. Tẽperamentũ ei excalfaciẽs & exiccãs, ut manifesto sunt indicio ei? radices: quippe q̃ gustu odoratę, astringẽtesq̃: deprehẽdãtur. Quibus qualitatib. nõ modõ attenuare, discutere, & astringere ualẽt: sed etiã roborare. Matthio.

GINGIBER, ZINGIBER planta est, in Troglodytica Arabia magna ex parte nascens. Radix, est herbę graminis modo serpentis, candida, odorata, piperis sapore & uiribus, nisi quõd tardius, sed diutius calefacit, ut lögum piper. Dãnatur teredinibus exesum, puluerulẽtum, teetorio quouis circumfitum ad põdus, & magis ad exesionem tegendam. Cibo conueniens est, & cum condimento assumitur. * Excalfactoriam uim, & excoquentem habet: aluum leniter emollit: stomacho utilis est: efficax aduersus ea, quæ oculis caliginem offundũt, in antidota addi solet. Viride in India saccharo cõditum, senib. pituitosis, ac frigidis, maleq̃: cõcoquentib. accõmodatũ est. Dioscor.

STOMACHVM quoq̃: excalfaciũt, seu in eo pituitã concoquunt. radix

Foeniculi, Galangie, Raphani, &c. de quibus uide supra suo loco.

A

De radicibus excafcientibus hepar.

CYRCUMA Arabum, radix est officinis nota. Creditur Cyperi genus esse, quod Dioscorides in India nasci asserit: gingiberis effigie: * quod manducatum, croci uim reddit: gustu amaro sentitur, & illitum præsentem psilothri uim exhibet.

Radix **ASPARAGI** uulgò nota est. Nascitur in hortis. Colligitur autumno: siccatur, & seruatur per annos duos. * Cum uino aut aceto cocta, luxatos artus mulcet. Decocta cum ficis aut ciceribus, sumpta, regium morbum sanat: coxèdicis cruciatus, stranguriamq; leuat. Alligata radix, aut haustum eius decoctum, conceptum adimit, & sterilitatem adfert. Dioscorides.

RHAPONTICVM, quod uulgò Rheupoticum dicitur, radix est nigra, centaurio magno similis, sed minor, & rufior, sine odore, fungosa, leuis: quæ trita, manducataq; colorem reddit pallidum, ad crocum inclinantem, à Rhabarbaro duntaxat (ut nonnulli putant) solo loco, in quo nascitur, differens: nam rheum barbarum ex regione Meridionali aduehitur, rheum uerò ponticum ex Septentrionali. Ad hæc rheum ponticum radice constat longa & tenui: rhabarbarum autem crassa & breui. Aliquorum præterea opinio est, eam plantam quæ hodie in hortis seritur, rumici similis, quæq; rhabarbarum existimata est, uerum esse rhaponticum: seseq; expertes asserunt, easdè quas rhabarbarum habere facultates, si detur dupla quantitate. Adfertur ad nos uerum rhaponticum, non est autem centaurium maius. Optimum habetur, quod teredines non sensit, quod gustatu cum remissa adstrictione lentescat. Adulteratur decoctione: dignoscitur uerò, quòd partes externæ non sint densæ & compactæ, uerum rara substantia, & gustu nihil, aut minimum adstringens. Colligitur mense Augusto: siccatur ad solem, & seruatur per annos tres. * Id epotum, facit ad inflationes, stomachi imbecillitatem, & omne genus dolores, ad conuulsa, rupta, lienosos, hepaticos, tormina, & renum, uesicæ & pectoris uitia, aduersus intenta præcordia, & uuluxæ mala, coxèdicum dolores, sanguinis excreationes, suspiria, singultus, dysenterias, & cæliacorum affectus, contra febrium circuitus, & uenenatorum morsus. Datur in singulis ualitudinibus eodem, quo agaricum pondere, & cum eisdem liquoribus: si febris careant, in mulso: si dissolutio est stomachi, id est, cum cibi tenax non est, manditur, & sine sorbitione ulla deuoratur. Liuentia, lichenasque tollit, cum aceto illitum. Inflammationes omnes ueteres ex aqua oblitum dissipat. Summa eius uis adstringens, cum aliquanto calore. Dioscorides & Medici Florentini.

SYLVESTRIS MYRTVS, aliquibus **OXYMYRSINE**, aut, **MYRTACANTHA**, Latinis **RVSIVM** appellatur. Folium fert myrti, latius, in formam.

A formam lanceæ mucronatum. baccæ per maturitatem rufescunt, rotundæ, à medio folio dependentes, osseo intus nucleo: cubitales ramuli ab radice exeunt, uutilium modo lenti, fractu contumaces, foliosi, radice graminis simili, acerba, & subamara. In asperis & præcipitibus locis enascitur. Colligitur radix autumnò: siccatur & conseruatur per annos duos. * Pota urinam cit: menses pellit, uesicæ calculos frangit, stillicidio urinæ medetur, dolores capitis sanat, & regium morbum. Dioscorides.

HEPAR etiam excalfaciunt, siue pituitam in eo concoquunt, radix Apij, Fœniculi, Petroselini, &c. de quibus uide supra suo loco.

De radicibus excalfacientibus splenem.

FRAXINVS arbor nota est. * Cuius radices in uino potæ, lienis dolores auferunt.

B GENTIANÆ inuentio prima assignatur Gentio, Illyricorum regi, à quo cognomen tum habuit. Folijs partim proximè radicem, iuglandi, plantagini uel similibus, subrubris: partim à medio caule, & præsertim iuxta cacumen paulum dissectis. caule cauo & leui, digiti crassitudine, geniculato, ex interuallis maioribus foliato, binum cubitorum altitudine. semine in calycibus lato, læui, glutinoso, satis ad spondilij semen accedente. radice longæ aristolochiæ, longa, crassa, amara. Nascitur in sublimibus montium iugis, umbrosis locis, aquosisq;. Colligitur mense Augusto, uel autumnò: siccatur ad solem, & seruatur per annos tres. Eligitur foris colore buxæ, intus crocante, amarissima, dura, parum rugosa, frangi contumax. * Vis excalfactoria & adstringens: contra morsus serpentium, duabus drachmis, cum pipere, ruta, & uino pota auxiliatur. Extracti succi drachma, laterum doloribus, & ex sublimi deturbatis, ruptis & conuulsis prodest: hepaticis & stomachicis, pota cū aqua subuenit. Radix collyrii modo subdita, partus eijcit: imposita, ut lycium, uulneraria est, & ulcerum cuniculatim depascentium medela. Succus præcipuè eodem effectu prodest: oculis inflammatione laborantibus illinitur: pro meconio collyrijs acris immiscetur. Radix uutiliginem absterget. Dioscorides.

SPLENEM quoque excalfaciunt, seu in eo pituitam concoquunt, radix: Acori, Apij, Asparagi, Aristolochiæ rotundæ, Fœniculi, Capparorum, Petroselini, &c. de quibus singulis uide supra suo loco.

De radicibus excalfacientibus renes.

FRAGARIÆ radice & herbæ * decoctum, potum iecoris inflammationibus confert: renes & uesicam purgat: uulnera & ulcera sanat: muliebres fluxus, & læuitates intestinorum cohibet: cordis affectibus ualde succurrit. Andernacus.

SAXIFRAGÆ radix in petris & asperis locis nascitur. * Stranguriæ prodest.

prodest: urinam cit, renum & uesicæ calculos pellit. Dioscorides. A

RENES & VESICAM excalfaciunt quoq; radix Apij, Petroselini, Pentaphylli, &c. de quibus uide supra suo loco.

De radicibus excalfacientibus uterum & iuncturas.

MATRICEM excalfacit, seu in ea pituitam concoquit, radix Rubiæ: de qua uide supra suo loco.

IUNCTURAS calefaciunt radix Costi, Zingiberis, &c. de quibus uide supra suo loco.

De radicibus refrigerantibus stomachum, hepar, & splenem.

SONCHI radix refrigerat, modicè astringit. * unde æstuanti stomacho & inflammationibus illiti profunt. Succus eorū stomachi rosiones sorbitione mitigat: lac elicit. in uellere appositus, sedis ac uuluzæ collectionibus opitulatur. Dioscorides.

STOMACHVM, HEPAR, & SPLENEM quoq; refrigerat radix Cichorij, &c. de qua uide supra suo loco.

De radicibus astringentibus.

CYPERVS iuncus est triangularis, interdum quadrangularis, cubitalis aut maior: folia fert porracea, longiora & angustiora, in summo caude minuta, semè cōplectētia: radices, quarū in medicina usus, inter se coherētes, oleis oblongis similes, uel rotundæ, nigre, suauis odore, & amaro gustu. Nascitur in palustribus. Duorū generū in Italia reperitur. Vnū exigū, cui radices oleæ similes: hoc præfertur. Alterū maius, cui radices inæquales, & cōtortæ. Optima ea est radix, inquit Dioscor. quæ grauior est, dēsa, plena, dura, aspera, odorata cum quadā acrimonia, qualis est Cilicia, Syriaca, & quæ à Cycladibus insulis petitur. Sic & hodie, quæ ex Oriēte aduehitur, melior est nostratē. Aliud Cyperi genus in India nasci Dioscorides dicit, gingiberis effigie: quod croci modo tingit. Illud ueterū Curcuma esse, nō abs re pleriq; existimant. * Cypero uis calida inest. Venerum spiracula laxat: urinā ciet: ad calculos, aquaq; subtercutem utilissimè bibitur: aduersus scorpionum ictus remedio est: perfrictionibus uuluzæ, & præclusionibus fotu prodest: pellit mēses. Contra ulcera oris, etiam si depascant, uorentq; farina eius efficax est. Malagmatis calfacientibus, & unguētōrū spissamētis bene adijci solet. Medici Floren. ex Dioscor.

ASTRINGUNT quoq; radix Gentianæ, Pentaphylli, Rhapontici, &c. de quibus uide supra suo loco.

De radicibus discutientibus.

ASPHODELVS, hastula regia, uulgaris est noticiæ: folijs maioris porri: caule leui, ferente in cacumine florē, quem anthericon appellant: radices subiacent oblonge, rotundæ, glandibus similes, gustu acres. Nascitur in montibus, syluis, nec non hortis satus. Colligitur radix autumno. * Excalfacit: urinas

A urinas & menses citi lateris doloribus, ruptis, cōuulsis, & tussibus, drachmæ pōdere pota ex uino medetur. Ea uerò uomitiones adiuuat, ludieri tali magnitudine cōmanducata: à serpēte demorsis datur aptissimè, triū drachmarum pōdere, uerūm folijs, floribus, & radice ex uino morsus illinire oportet: itē ulcera sordida, & depascentia: māmaram quoq; & testū inflammationes, tubercula, furunculōs q; decoctis in fæce uini bulbis, recentibus inflammationibus ex polēta auxiliatur. Radicis succus, adiecto uetere uino dulci, myrrha & croco, decoquitur, sit q; perquā utile oculis medicamētum: ad purulētās aures p se, & cū thure, melle, uino, & myrrha tritus, pdest: in cōtrariam aurē infusus, dentiū dolorē mitigat. Cinis ē radice illitus, alopecias ad pilum reducit. oleū in excauatis radicib. igni decoctū, illitu exulceratis perionib. & ambustis igni, cōducit: & surditati instillatū in aurē auxiliatur. Cādidā tūtiliginem, linteo antea perfrictam in sole, illita radix emendat. Dioscorides.

DISCVTIVNT etiam radix Aristolochiæ rotundæ, Bryoniæ, Capparorum, &c. de quibus uide suprà suo loco.

De radicibus abstergentibus.

BVLBVS ESCULENTVS uulgò cognitus, à nobis estur. Stomacho & aluo utilis rufus, & qui ex Aphrica defertur. Amarus uerò, & scillinus, stomacho aptior est, & concoctionem adiuuat. * Bulbi omnes acrimoniam habēt, excafaciunt, uenerem stimulat, linguam, tonsillas q; exasperat, multum alimēti præbent, carnes creant, inflationē pariūt, luxatis, fractis, articularum doloribus efficaciter illinūt: spicula extrahunt: gangrænas, & podagras ex melle, aut per sese hydropicorum tumores, & canū morsus cum melle, & piperis polline illiti cohibent: sudores cōpescunt: stomachi dolores mitigant: furfures & ulcera, quæ in capite manant, cū tosto nitro abstergunt. sugillata, uaros q; per se, aut ex oui luteo, & lentigines cum melle uel aceto, emendat: fractis auriculis, unguibus q;, ex polenta medentur. Iidem calidis cineribus torrefacti, tollunt ficus: item cum cinere ē mœnarū capitibus, impositi. Cremati uerò, & cum alcyonio misti, uitia cutis in facie, atras q; cicatrices, in sole illiti emaculant. faciunt ad rupta, si cum aceto cocti edantur. Sed copiosiore eorum cibo abstinendum, quoniam neruos tentant. Dioscorides.

CHELIDONIAE radix supernè singularis, infernè in multa crocea capillamenta fibratur, in qua succus croci. * Abstergit: cum aniso & uino albo pota, medetur regio morbo, & ulceribus quæ serpunt: imposita cum uino, aut manducata, dentium dolorem sedat. Dioscorides.

ABSTERVNT quoq; radix Aristolochiæ rotundæ, Ari, Asparagi, Asphodeli, &c. de quibus uide suprà suo loco.

De radicibus aperientibus, extenuantibus, adurētib, & emolliētibus.

APERIVNT, Alliū, Cepa, Curcuma, Rhapōticum, &c. de quibus uide s.

EXTENVANT, radix Iridis Illyricæ, &c. de qua uide suprà suo loco.

ADVRVN

ADVRVNT Allium, Pyrethrum, &c. de quibus uide supra suo loco. A
EMOLLIVNT radix Altheæ, Maluæ, &c. de quibus uide supra suo loco.

De radicibus suppurantibus.

LILIORVM alborum radix colligitur quouis tempore, sed maximè autumnno. * Inassata, & ex rosaceo trita, igni ambusta sanat, uulua emollit, menses ciet, ulcera cicatrice obducit. Cū melle detrita neruis præcisīs, luxatisq; medetur: uirilignes, furfures, & lepras emendat: ulceraq; in capite manantia expurgat: abstergit faciem, & erugat. teritur in aceto cum hyosciami folijs, & farina tritici mulcendis testium inflammationibus. Dioscorides.

SPPVRANT quoque radix Altheæ, Bryoniæ, &c. de quibus uide supra suo loco.

De radicibus glutinantibus.

DRACVNCVLVS maior caulem habet rectum, læuem, duum cubitorum, baculi crassitudine, uersicoloribus draconū maculis purpureis tamen euinentibus: folia rumicis, sibi inuicem implicata. Fructum summo caule facit, racemosum, coloris primū cineracei, mox per maturitatē in crocum & purpuram uergentis: radicem prægrandem, rotundam, candidam, cortice tenui uestitam. Nascitur in sepibus umbrosis. Colligitur, dum maturefcit, & succus exprimitur, siccaturq; in umbra. Radix quoq; mensibus effoditur, elo taq; particulatim conciditur & funiculo transfixa siccatur in umbra. * Vis ei B calfaciendi cum diluta uini potione. Crudam, coctam uē cum melle delingi prodest contra orthopnœas, rupta, conuulsa, tussim & destillationes. pota cum uino uenerem stimulat: ulcera, quæ cacoëthe uocantur, atq; phagædenica expurgat, præsertim cum uite alba. ex ea, & melle, collyria ad fistulas, & partus euocandos componuntur. ad uirilignes cum melle, efficaciter illinitur: polypos & carcinomata absomit, &c. Dracunculus minor folio constat hederaceo magno, candidis notis insigni: caule recto, bicubitali, uersicolore, maculis resperso purpureis, ita ut anguem planè referat, baculi crassitudine: fructus summo caule racematim cohæret, colore primū herbaceo, & cū ematuruit, croceo, gustu feruens, mordaxq; radice aliquātulum rotunda, bulbosa, aro non absimili, tenui obducta cortice. Nascitur iisdem in locis, eisdemq; uires cum maiore obtinet. Dioscorides.

POLYGONATVM, SIGILLVM SALOMONIS, nascitur in montibus, frutice cubito altiore, folijs lauri latioribus, & læuioribus, sapore mali cotonei, aut punici, cum quadam adstrictione. Flores per singulos foliorum exortus promit, candidos, folijs numerosiores, incepta à radice supputatione. Radicem habet albam, mollem, longam, crebrò geniculatam, densam, graueolentem, digitum crassitudine æquantem. * Quæ uulneribus efficaciter illinitur: quinetiam maculas in facie delet. Dioscorides.

SYMPHY-

DE RADICIB. FLATVS DISCVTIENTIB. 193

A SYMPHYTVM, CONSOLIDA MAIOR, caulem emittit bicubitale, aut maiorem, crassum, leuem, angulosum, ut sonchi inanem: circa quē breui interuacante spacio, folia exeunt angusta, buglosso proxima, oblonga, hirsuta: caule secundum angulos quosdam striato: folijs tenuibus, ex alarum sinu prodeuntibus: in quibus flores lutei, & circa caulem uelut uerbasci semina emicant. Tam caulis, quā folia aspera lanugine horrent, tactuq; pruritus concitant. Radices demittuntur foris nigrae, intus candidae, uiscosae: quarum est usus. * Tritae & potae cruentis excreationibus, ruptisq; proficiunt: recentia uulnera illitae, conglutinant. carnes quoque si concoquantur, cogunt additae. Inflammationibus praesertim sedis, cum senecionis folijs, utiliter illinuntur. Dioscorides.

GLVTINANT quoque radix Aristolochiae, Gentianae, &c. de quibus uide supra suo loco.

De radicibus flatu discutientibus.

ERYNGION aculeatarum generis est. Cuius folia in principio, sale condita, in cibos recipiuntur. Lata autem sunt, & extremo ambitu aspera, gustu aromatica: sed ubi adoleuerunt, circa complures caulium eminentias in spinas aculeantur. in quorum summitatibus globosa capitula, durarum, acutissimarumque spinarum ambitu stellatim circumuallantur, quorum color alius uiridis, alius albus, interdum caeruleus inuenitur. Radix oblonga, lata, foris nigra, internē candida, pollicis crassitudine, odorata. Nascitur in asperis & campestribus. * Vim habet excafactoriam. Pota menses & urinas pellicit: tormina inflationesq; discutit: contra iocinerum uitia, serpentū morsus, & hausta uenena, cum uino prodest: bibitur aduersus plurima, cum seminis pastinacae drachma una. appensa, illitaue, tubercula discutere proditur. Pota cum hydromelite radix, opithotonis, & comitalib. medetur. Dioscorides.

ZVRVBETH apud Arabes nihil aliud designat, quā Arnabo apud Graecos. Est autē Arnabo, arbor procera, in Oriente proueniens: folijs longis, colore uiridi, in luteum languescente, salicis modo, ficuti & ramorū cortex. Infrugifera est, citreum odorem spirans. Matthiolus.

SPICA CELTICA exigua plāta est, folia habens oblonga, in extremo lata, florem luteum: ad radices multa exigua habet adnata, spicis minutis similia: haec cum radiculis, abiectis folijs, in usu sunt, & ualde odorata. Adulterantur imposita herba simili: sed facilis cognitio: nam folia adnataq; breuiora habet, candidior est, neq; amara, neq; odorata, ut uera Celtica est. Laudatur maximē recens, iucundi odoris, radice numerosa cohærens, non fragilis & plena. * Vrinam mouet uehementer, & stomacho utilius. Inflammationibus iecinoris, & felle suffusus auxiliatur. Contra stomachi inflationes, cum absynthij decocto bibitur: item aduersus lienē, renum & uesicę uitia, & uenenatos

B ietus

ictus ex uino. Additur in malagmata, potiones, & calfacientia unguēta. Me- A
dici Florentini ex Dioscoride.

SPICA NARDI, teste Galeno, radix est, nō spica. Nota est. Eligitur Sy-
riaca dicta: cuius hæ sunt notæ, ut sit breui spica, largā gerens comā, colore
flaua, odorata, aliquātulum redolens, cyperū, amaro sapore, linguā siccante,
quæ diu in sua odoris gratia permaneat. Adulteratur stibio cū aqua, aut pal-
meo uino ponderis causa inspirato. Sed ex præcedentibus notis dignosci-
tur. Madefacta etiā uēdi solet: quod uitium ex eo deprehenditur, quod cādi
da sit spica, squalida, nulloq; puluere óbfitā. * Vim habet exiccātem & excal-
factoriā, urinā mouet. Nauseę, stomachi rossonibus, inflationi, iecinori, regio
morbo, renum uitij auxiliatur, &c. Medici Florentini ex Dioscoride.

FLATVS quoque DISCVTIUNT, radix Apij, Acori, Allij, Costi, Car-
nabadij, Dauci, Enulæ, Fœniculi, Galangæ, Petroselinij, Peucedani, Zedoar-
iæ, &c. de quibus singulis uide supra suo loco.

De radicibus semen generantibus.

SECACVL non est Iringus, neque Iringus, qui habet folia Cretami ma-
rini, neque Sigillum Salomonis: sed uerū Secacul est ueterum Siser, hoc est,
radix illa, quæ Germanicè dicitur *Klingelmorn*, *Grintzelmorn*, *Nudlen*, & *Geylen*,
Gallicè *Bcheruis* & *Seruilles*. * Semen generat, & uenerem stimulat. Si in prom-
ptu non sit, eius loco radix pastinacæ syluestris accipienda est. Cordus. B

SEMEN quoque GENERANT, radix Acori, Bulbi, Eryngij, Galangæ,
Satyrij, &c. de quibus singulis uide supra suo loco.

De radicibus menses mouentibus.

CENTAVRIVM magnū folia habet iuglandis, oblonga, uiridi brasi-
ca colore, ferrata in ambitu: caulem, ceu rumicis, binūm, aut ternūm cubi-
torum, multis ab radice adnatis, in quibus capita, ceu papauerum, in rotun-
ditate oblonga. Flos cœruleus: semen cnico simile, ceu laneis floccis qui-
busdā inuolutum. Radix crassa, grauis, solida, tripedalis, succo prægnans, cū
adstrictione aliqua & dulcedine acris, & rubescens. Amat solum pingue &
apricum, ac syluas & colles. Colligitur autumnis: siccatur & conseruatur per
annos duos. * Radix conuenit ruptis, conuulsis, pleuriticis, spirandi difficul-
tati, ueteri tussi: sanguinem expuentibus, drachmis duabus trita datur, si fe-
bris sit, in aqua: cæteris in uino: item ad tormina, & uulnæ dolores. Ramen-
ta eius in collyrij formam uulnæ subdita, menses atque partus extrahunt.
Dioscorides.

FILIPENDVLÆ radix urinæ stillicidio auxiliatur: item renum tum
calculis, tum doloribus: stomachi inflationes discutit. Medetur suspiciosi &
anhelantibus, omnibusq; in uniuersum morbis, quos causa frigida excitauit.
Prodest comitialibus, insperso cibus radicum puluere Matthiolus.

GRAMEN uulgaris est noticię: cuius radix dulcis, articulis p̄cincta. * Hęc
trita.

DE RADICIBVS MENSTRVA MOVENTIBVS. 195

A trita illitu uulnera cōglutinat. Decoētū eius in potu, torminibus medetur, & urinæ difficultatibus: calculosa etiā uesicæ excrementa cōminuit. Dioscor.

MEON, OSTRVTIVM, MAGISTRANTIA, in Macedonia & Hispania plurimū gignitur, anatho folijs & caule simile, sed eo crassius: binūm fermē cubitorū altitudine attollitur: sparsis in obliquū, rectūq; radicibus, longis, tenuibus, odoratis, linguā excalfacientibus. Colligūtur Augusto mense.

* Quæ seruefactæ ex aqua, uel tritæ citra coctiōē, præcluserū renū, uesicęq; farctæ uitia potu leniunt: urinæ difficultati medentur: stomachi inflationes discutiant. Torminibus, affectæ uuluz, articulorū doloribus, atq; fluxionib. pectoris, tritæ cū melle in eclegmate auxiliantur. Sanguinē per inēstrua pelunt, deflesionibus seruefactæ: infantibus aut illitæ imo uētri, urinas mouēt. Quōd si plus quā debeat, ex his bibatur, caput dolore afficiūt. Dioscorid.

VALERIANA, quæ secundū quosdā Diosc. phu appellatur, hodie nota est. Eius duo genera reperiuntur: una domestica & maior in hortis feritur: altera syluestris & minor in agris spōte nascitur. Maioris radix satis ad phu accedere creditur, eiusq; loco substitui posse. Ex Galeni sententia Nardus Celtica substitui potest. * Excalfacit: urinā mouet, si sicca potui detur. Decoētū eadem præstare potest: ad lateris etiā dolorē efficax: mēses cit. antidotis inferitur. Adulteratur radice rusci admista. Sed maleficiū deprehēditur: quoniā hæc dura est, & frāgenti contumax, sine ulla odoris gratia. Medici Florentini, & Dioscorides.

B hæc dura est, & frāgenti contumax, sine ulla odoris gratia. Medici Florentini, & Dioscorides.

MENSTRVA quoq; **PROVOCANT**, radix Afari, Ari, Acori, Aristolochiæ longe, Asphodeli, Allij, Bryonię, Cyperi, Costi, Capparorū, Calami aromatici, Dauci, Dictāni, Eryngij, Fœniculi, Helenij, Lilij, Petrofelini, Pęonię, Raphani, Rubiæ, Rusci, &c. de quibus singulis uide suprā suo loco.

De radicibus menses sistētib.

TORMENTILLA folio pentaphylli minore, septenis incisuris diuiso: radice breui, nodosa, cōpacta rubeo colore, sapore astringenti: cauliculis tenuibus, subrubentibus: flore melino, adeō ut in pentaphylli genere sit reponēda. Sunt qui à septenis foliorū diuisuris Heptaphyllon uocēt. * Urinæ incōtinentiā supprimit: sistit mēses, si in earū decocto ad umbilicū usq; cōsederint fœminę: uel si tritę, & ex melle atq; spica subactæ, uētri ac pubi illinātur. Sanguinē ē uulnerib. manātē cohibēt, superaspero earū puluere. Matthiol.

MENSTRVA quoq; **SISTVNT** radices Symphyti, &c. de quibus uide suprā suo loco.

De radicibus sudorem pronocantibus.

CINA radix parua ex Indiæ regione Ciniana, ad nos apportatur, crocei ac subpallidi, seu pallidi coloris, gustus subacidi, obscuri, aut prorsus nullius odoris. * Valde extenuat: sudorē mouet & exiccat, idq; putredini resistit: iecur cōfirmat: hydropi auxiliatur: ulcera maligna sanat, leprā & elephātiā sin

B 2 curat:

curat: Gallico morbo succurrit: corpus alimēto destitutū reficit: scirrhis ieco **A**
ris maximè prodest: ligno Guaiaco tamē à Sarfa infirmius existit. Anderna.

SARSA PARILIA, radix longissima, ex India nuper importata, non dissimilis glycyrrhizę tenuissimę, rugosęque, quando siccatur, colore inter croceum & cinereum prædita: gustu subamara, odore obscuro, aut profus nullo. * Vncia eius in duabus libris aquę cocta, vini rubri turbidioris colorē refert, tenuemq; essentiã habet, & summè prouocat sudorē. Decoctū eius cū tenui uictu potū, per dies triginta luē uenereã, plus quàm lignū Indicum sanat. prodest morbis articularijs, ulceribus, laxis ex piuita & defluxione tumoribus: cerebri & capitis uitia emendat: iecur cõfi: nat: lienem extenuat: incipientem elephantiasin discutit. Andernacus.

De radicibus uenenis resistentibus.

ANGELICA cubitalē excedit altitudinē, caule geniculato, inani, multis alarū cauis referto: folia profert oblōga, per ambitū serrata, in nigrū uirescentia: flores albos, in umbellã cohæretes: ē quibus semē prodiit tenue, lentium modo cõpressum. Radix ei subest crassa, raphani modo, quę in plures diuariat unramos, gustu acris, & suauiter odorata. Nascitur in hortis. Colligitur autumno: siccatur, & cõseruatur per annos duos uel tres. * Excalcificat, pariterq; deficcac ordine secūdo cõpleto, aut tertio incipiēte. Proinde aperit, attenuat, & discutit. Venenis mirificè aduersatur: quare pestilentiã arcet hausta, aut frequenter cõmansa. Ipsa p se sumpta, pituitosos, lentosq; humores digerit. Idē præstat & radicis decoctū: quod etiã celerius ex frigore tulsientib. auxiliatur: expectorat enim efficaciter crassam, lentãq; pituitã. Sanantur eodē ex aqua aut uino interna uiscerū ulcera, cõcretusq; sanguis dissoluitur, & roboratur uētriculus. Radix in puluerē trita, animi deliquijs, & cæteris cordis affectibus opē unicè præstat. Valet ad rabiosorū & uenenosorū morsus, exterius cum ruta imposta, intrò in corpus assumpta. Matthiolus.

VENENIS etiã **RESISTUNT**, radix Apij, Allij, Aristolochiæ longæ, Bryoniæ, Cyperi, Carnabadij, seu Doronici, Costi, Fœniculi, Gentianæ, &c. de quibus uide suprã suo loco.

De radicibus ambustis conferentibus.

HYACINTHI radix bulbacea est. * Hęc pueris cum uino albo illita, puertatem coerct, & non patitur erumpere: sistit aluum pota, & urinam impellit: phalangiorum morsibus auxiliatur. Dioscorides.

AMBUSTIS quoque medentur, radix Asphodeli, Bulbi, Liliorum alborum, &c. de quibus uide suprã suo loco.

De radicibus dolorem sedantibus.

ANONIS seu **ONONIS**, ramos habet fruticosos, dodrãtales, aut maiores, frequētibus geniculis cinctos, cauis alarū multis, capitibus rotūdis: folijs laticulę, tenuibus, pusillis, ad rutę aut pratensis loti folia accedētibus, subhirsutis,

A hirsutis, odoratis, nō iniucūdē olentib. Muria conditur, antequā spinosa fiat, cibis gratissima. Rami acutioribus spinis, & ueluti spiculis firmioribus horrent. Radicem mittit candidam. * Quæ excalfacit, & extenuat. Huius cortex ex uino potus urinam ciet, calculos comminuit, margines ulcerum erodit. Radix cum decoquitur in posca, dolorem dentium collutione mitigat. Decoctum eius potu hæmorrhoidas sanare creditur. Dioscorides.

DOLOREM quoque sedant, radix Acori, Dauci, Eryngij, Ireos, Mandragoræ, &c. de quibus uide suprâ suo loco.

De radicibus discutientibus strumas.

PLANTAGINIS radix * & mâducatu, & collutione, dentium dolores sedat: eadem cum folijs, ulceribus renum, & uesciç in passo datur. Fertur tres radices, cum tribus uini cyathis, & pari aquæ modo, tertianis auxiliari: & quatuor, quartanis: Sunt qui radicis gestamine, discutiendis strumis utantur. Dioscorides.

DISCVTIUNT quoque STRUMAS, radix Capparorum, Ireos: de quibus uide suprâ suo loco.

De radicibus uenenosis.

B MANDRAGORA si bibatur, cōfestim sopor insequitur, exolutio, ac uehemens ueternus, nihil temerè distans à lethargo. * Cui, antequam aliquid ex ijs accidat, uomitus & aqua mulsa proderit: postea nitrum & absynthium ex uino dulci aut passo fumatur. caput rosaceo & aceto perfundatur. Proficit excitatio & motus corporis & olfactus eupatorij, & piperis, sinapis, castorij, & rutæ, tritorum in aceto: & liquidæ picis, & odor è lucernarum exustione, & extinctu. Quòd si ægrè ij reuocentur, sternutamenta mouere, alijs que communibus auxilijs uti conueniet. Dioscorides.

FYNGORVM alij genere, alij copia lædunt: omnes tamen strangulatus suspendio similes concitant. * Quibus cōfestim succurrendum: communiter ex oleo uomere cogendi: mirificè iuuat lixiuia ex sarmentis, aut pyrastri furculis, epota cum sale, posca & nitro. Fructus aut folia pyrastri cum fungis decocta, strangulantem illam uim auferunt, esitataq; eisdem auxiliantur. Aduersus fungos gallinacea oua cū posca proficiunt, adiecta aristolochiæ drachma: item absynthium cum uino melleq; sumptum, & ex aqua potum: apiastrum ex nitro: panacis radix, & semen in uino: fax uini cremata, cum aqua: atramentum futorium ex aceto: radix, uel sinapis, aut nasturtium esu profunt. Dioscorides.

Sumpto EPHEMERO, quod aliqui syluestrem bulbum appellant, * pruritus in toto corpore excitatur, nō secus atq; ijs qui urtica aut scilla laceffuntur: interna rosionem sentiunt, stomachus cum ingenti grauitate exæstuat. cæterum inualefcente morbo, cruor strigmentis admistus, per aluum exigitur.

tur. Quibus, ut ijs qui salamandram hauserunt, uomitione aut clysterib. auxiliari conueniet: sed antea quam uenenum inualescat, dandum est decoctum frondium quercus, aut glandiū, aut malicorij: lac bibere prodest, in quo serpyllum sit decoctum: item succum sanguinalis herbæ, aut ramorum uitis, aut rubi, aut medullæ recentis ferulæ, aut myrthi cum uino. Baccæ autem myrti tulsæ, tritæq̄, & aqua maceratæ, ut liquor inde sumatur, opem ferunt. Media castanearum tuniula similem effectum præbet, si cruda in aliquo supradictorum succo sumatur: origanum quoque cum lixiuio epotum. eximie iuuatur asinini lactis, aut bubuli calidi potu, etiamsi in ore contineant: ita ut quibus copia lactis huius adfit, non aliud desideretur. Dioscorides.

VERATRVM ALBUM * strangulatus concitat, aut immodicas alui deiectiones mouet. Quibus ea medentur, quæ in fungorum mentione retulimus. Nimios autem deiectionum impetus, medicamentis quæ excrementa supprimunt, coercebimus Dioscorides.

De radicibus purgantibus bilem flauam.

RHABARBARVM radix est inæqualiter crassâ, non admodum longa, rheopontico perquam similis colore & substantia. Eius tres sunt differentie: unum Indicum, omnium præstantissimum: alterum Barbarum, secundum locum obtinens: tertium Turcicum, omnium ignauissimum. Laudatur subnigram in rubram inclinans, recens graue, pro raritate sua, confractū, ex rufo & glauco alternans, & croci modo tingens. Adulteratur, si aliquot diebus in aqua maceratur, ut facultas eximatur: tucus uerò deprehenditur, si in confractō ea uarietas, quæ suprâ dicta est, non conspicitur, nec croci modo tingit, sed leuius est, & magis adstringit. Cōseruatur annos tres aut quatuor integrum incorruptūq̄, si cera sola, uel cera cum therebinthina liquata circumlinatur, aut melle albo, aut psyllio, aut milio mergatur. Corrigitur tertia parte spicæ uel squināthi, uel cinnamomi. Dosis infusionis à drachma una cum dimidia, usque ad decem: pulueris uerò à drachma una, usq̄: ad quatuor. Caslidum & siccum ordine secundo. * Purgat clementer bilem flauam, pituitaq̄, præcipuè à uentriculo & hepate, & inde sanguinem purgat: obstructions liberat, & affectus inde sanat, icterum, hydropem, splenis tumore, febres putridas, etiam diurnas, dolorem hypochondriorum puncturium, &c. Medici Florentini ex Mesue.

FILICI folia sine caule, sine fructu, sine flore, ex uno pediculo cubitali longitudine exeunt, multifida, & lateribus pinnata, subgrauis odore: radice per summa cespitum nigra, oblonga, filices multas fundente, subastringente gustu. Nasceitur in montibus & saxosis. Colligitur autumno, siccat & conseruatur per annum. * Radix laticineas excutit, sumpta drachmis quatuor ex aqua mulla: melius si cum scamoniæ, aut ueratri nigri totidem obolis detur: sed

DE RADICIB. PURGANTIB. BILEM ATRAM. 199

A sed qui fumunt, alia prægustare debent, &c. Dioscorides.

PURGANT quoque bilem flauam Rhaponticum, &c. de quo uide supra suo loco.

De radicibus purgantibus bilem atram.

ELLEBORVM NIGRVM folia habet uiridia, platani similia, minora, folijs sphodylij proxima, pluribus diuisuris incisa, nigriora, & crassiora, subspera: caulis asper, flores ex candido purpurei, cotoneis similes, racematim coherentes: in quibus est semen cnico simile: radicibus nigris, tenuibus, elleboro albo similibus, quarum duntaxat est usus. Eligi debet bene nigrum, corpulentum, plenum, in quo tenuis sit medulla, acre gustu, feruensque. Helleborum nigrum quo hodie plerunque utuntur, non est iam descriptum: uerum tamen etiam in Hetruria reperitur cum prædictis notis, tamen si raro. Itaque cura adhibenda est, ut id fumatur: quamuis non multum errent, qui in ueri loco utuntur uulgari. Colligitur in uere uel ætate: seruat uerò per annos duos uel tres. Corrigitur cinnamomo, fœniculo, aniso, mastiche, oxymelite, & passo. Solis animosis & robustis datur. Dosis pulueris à siliquis sex, usque ad scrupulum unum uel duos, cum passo, uel oxymelite. * Bilem utramque, & pituitam euacuat non citra difficultatem. Itaque febribus circuitu repetentibus, & diuturnis conuenit: item furore percitis: altera capitis parte dolentibus: & quos cæphalæa diu infestauit: infania & melancholia laborantibus, &c. Medici Florentini ex Mesue.

ELLEBORVM ALBVM radicibus nititur multis, tenuibus, candidis, ab oblongo & exiguo capite exeuntibus cepearum modo: folia fert plantaginis: caulem palmo altiore, cauum, tunicis cõuolutum: fatis notum est. Deligendæ sunt radices summis montibus collectæ tempore apto, candidæ, mediocriter extensæ, friabiles, carnosæ, nullum in frangendo puluerem emittentes, quæque sint medulla tenui, gustu feruente, nec tamen id uehementer: quæ enim nimium acres sunt, strangulant. Calidum & siccum in tertio. * Vomitu multo purgat, & sternutamenta uiolenter mouet. Vitandum autè hoc est, quod strangulet. Medici Florentini ex Dioscoride.

POLYPODIUM radice dulci, austerâ, digiti parui magnitudine, multum siccante, sed sine morsu. Probatum subdulce, subausterum, gustatu ad postremum subamaro, & nonnihil aromatico, solidum, cirris seu nodis plenum, ex rubro nigrescens, colore intus herbaceo pistacij modo, recens, quercuum & arborum aliarum glandiferarum truncis adnatum. Seruatur per annum. Corrigitur aniso, fœniculo, zingibere, uel simili odorato aliquo. Dosis à drachmis duabus, ad aureos quatuor. Calidum est in tertio: siccum uerò in secundo. * Humores crassos & lentos terget, digerit, siccatur bilem atram, & pituitam uel crassam uel lentam purgat etiam à iuncturis. Affectibus ob hæc melancholi-

melancholicis prodest, ut quartanis, præsertim cum mulsâ, &c. Medici Colonienses ex Mesue.

De radicibus purgantibus pituitam.

AGARICVM oritur in magnarum arborum truncis, uetustate iam putrescentium, & erosarum, tanquam earum uel apostema, uel fungus. Est duplex, mas & fœmina. Mas est malus, præsertim qui longus, niger, durus, densus, grauis, & in fragmentis ceu uillos neruorum ostendit. Fœmina si rotundior, alba, porosa, & rara ualde, & frangi facilis, leuis, dulcis primo gustatu, mox amara & stiptica, est melior, præcipuè summa corporis sui parte. Cõseruatur per annos quatuor. Corrigitur tertia parte zingiberis, uel salis gêmæ. Dosis à drachma una usque ad duas: infusionis uerò à drachmis duabus usque ad quinque. Calidum ordine primo, siccum uerò tertio. * Pituitam crassam, lentam, putridam, & bilem flauam & atrâ purgat à cerebro, neruis, musculis, sensorijs, spina dorsi, thorace, pulmone, uentriculo, hepate, liene, renibus, utero, iuncturis. Vrinam quoque mouet, ac menses utrumq; expurgat. Cutis colorem floridum reddit, lumbricos necat: ischiadi, & cæterorum articulorum doloribus confert, & febribus diuturnis, ex materia uaria natis, &c. Mesues.

CUCUMERIS SYLVESTRIS radix autumnò colligitur: siccatur in umbra, & conseruatur per annos sex. Dosis deiectionis: est à drachma una usque ad quatuor: pulueris uerò à granis quindecim usq; ad drachmam semis. * Pituitam & bilem deijcit, præsertim in hydropticis: deiectiones autem citra stomachi iniuriam mouet. Mesues & Dioscorides.

ESULA Græcis tithymallus dicitur. Sed ueluti esulæ nomine tres plantæ intelliguntur, maior uidelicet, minor, & rotunda: sic etiam tithymalli genera septem à Dioscoride alijsq; pluribus describuntur. Esula maiore pytuisa Dioscoridis iutelligenda est, & Alcebram maius Mesuæ: esula minore, tithymallus cyparissias & alcebram minus: esula rotunda, peplos: quæ omnes plantæ hodie sunt cognitæ. Cognoscendæ sunt etiam reliquæ tithymalli species, præsertim characias, qui reliquis præferebatur, & Græcis erat in usu. Hodie cognitus est, quemadmodum & reliqua tithymallorum genera, his præsertim qui in his inuestigandis diligentiam aliquam adhiber: nam omnes in Hetruria reperiuntur. Eorum descriptio cum sit admodum prolixa, ex Dioscoride petenda est: Cæterum ex omnibus esulæ generibus minoris radice cortex eligitur tenuis, lenis, fractu facilis, rubescens, Calsiæ fistulæ modo, post sex à collectu menses, ex loco libero collecta initio ueris. Conseruatur autem per annum. Corrigitur tragacantho. Dosis à siliquis duobus usq; ad tres. * Purgat ualenter pituitam, aquas, atram bilem & à iuncturis. Medici Florentini.

EBVLI radix longa est, crassitudine digitali. Nota est. Nascitur in montibus, syl-

A bus, syluis, & campeſtribus. * In uino decocta, & in cibis data, hydroficos iuuat. Dioſcorides.

HERMODACTYLVS radix eſt officinis nota. Variæ ſunt opiniones, cuius nam plantæ radix ſit à ueteribus deſcriptæ. Veriſimilior tamen eſt eorum ſententia, qui colchi radicem eſſe exiſtimant, tametiſi Dioſcorides uenenoſam eſſe affirmet: nam medicamentorum purgantium magna pars ferè eſt eiſmodi. Hermodactylum unum idemq; eſſe & Græcis & Arabibus credimus: itaque huius noſtræ radicis facultatibus freti, ea utemur hermodactyli ueterum loco. Probatur candidus, corpulentus, plenus, grauis, non cariouſus. Naſcitur in montibus. Colligitur uere: ſiccatur in umbra, & conſeruatur per annos tres. Corrigitur cumino, maſtice, zingibere, pipere longo, &c. Doſis ab aureo uno uſq; ad duos. Calidus & ſiccus ordine ſecundo, cum humiditate excrementoſa, flatulenta, nauſeabunda. * Pituitam craſſam, præfertim à iuncturis trahit: ob id podagræ, & alijs arthritidis differentijs confert. Medici Florentini & Meſues.

SAMBUCI radix uulgaris eſt noticiæ. Naſcitur in hortorum ſepibus. * Aquam detrahit: ſtomacho inimica: hydroficos adiuuat, &c. Dioſcorides.

B **TURBITH** plantæ cuiuſdam lacte manantis radix eſt. Hæc candida eſt, & alypi radix Dioſcoridis eſſe creditur: aut nigra, luteæue, quâ pityuſam pleriq; eſſe arbitrantur. Verùm, utcunq; ſit, præfertur hodie candida, quæ ex Syria adfertur, uerumq; turbith album eſſe creditur, aut ei ſubſtitui poſſe. Præfertur uacuum ut arundo gummoſum, cortice cinericio, plano, fractu facili. Adulteratur, inducto foris gummi diſſoluto: ſed fractum fraudem detegit, nam nullum gummi in fragmentis apparet. Conſeruatur annis quatuor, & ultra. Corrigitur tertia parte zingiberis. Doſis decoctionis à drachinis duabus uſque ad quatuor: pulueris uerò à drachma una uſque ad duas. Calidum ordine tertio. Pituitam craſſam ac lentam, & putrem, à uentriculo, thorace, neruis, & iuncturis purgat, &c. Medici Florentini ex Meſue.

C DE LI.

DE LIGNIS CAP. XIII

Ligna sunt partes plantarum firmisima, tanquam ossa in animalibus. durissima, horum alia.

Calida

Agallochum, Xyloaloes, Lignum aloes.
Aspalathus, Buxus.
Guaiacum, Sanctum, Indicum.
Ebenum.
Iuniperi lignum.
Nascaphum.
Viscum quercinum.
Xylocasia, &c.

Frigida

Cypressi, Loti arboris.
Santalum album.
Santalum rubrum.
Santalum citrinum.
Tamaricis.

De lignis calidis.

LIGNVM ALOES, Agallochum, Xyloaloes, lignum est quod ex India atq; Arabia deportatur, uarium, maculatum odoratum, gustu adstringens, cum quodam amaro: cortex eius corio similis, colore aliquantulum uersicolore. Arabibus praefertur id quod ex India adfertur, crassum, nigrum, uarium, solidum graue, sine candore, & quod ignibus impositum diu perdurat. * Mansum animae suauitatem commendat: pro thure ad suffimenta substituitur. Ramenta eius pota drachmae pondere, languidum ex humore uentriculum, resolutumq; confirmant: adhuc iocinerosis, dysentericis, pleuriticisq; opitulatur. Medici Florentini ex Dioscoride.

ASPALATHVM officinis incognitum esse creditur, eiq; substituitur lignum aloes. Syluio contraria est sententia, qui censet, lignum aloes officinarum, aspalathum uerius esse, quam agallochum. Optimus est grauis, detracto cortice rubescens, aut in purpuram uergens, densus, odoratus, gustu amarus. Est & alterum eius genus candidum, lignosum, sine odore: quod deterius habetur. Nascitur in Istro, Syria, & Rhodiorum insula. * Vim calefaciendi cum adstrictione obtinet. Vnde decoctum cum uino, ad tetra oris ulcera colluenda conuenit: ad nomas genitalium, & sordida ulcera infunditur: subiectum in pefso, partum extrahit. Aluum sistit eius decoctum: & sanguinis reiectione potu cohibet: urinę difficultate inflationesq; discutit. Diosc. & Medici Colonien.

BUXVS planta est notissima: gaudet frigidis & apricis: spississima, densissima, atq; poderosissima, adeo ut in aquis non fluitet, nec cariem sentiat. Hec et si nullius sit in medicina usus, ut ueteres prodidere, non desunt tamen e recentioribus, qui uelint, non aliud esse Italis Buxum, quam Indis lignum, quod Guaiacum appellat: ea tantum ratione ducti, quod pluries experimento conpertum sit, eius decocto etiam feliciter eos sanatos esse, qui Gallica lue affecti erant.

A erant. Quod etsi experientia concedi possit, illud buxi lignum præstare: at tamen quod buxus in Italia nascens, & Guaiacum ab Indis petitum, una & eadem sint planta, nunquam profecto crediderim. Matthiolus.

LIGNVM GVAIACVM, Sanctum, Indicum, ebeni genus esse creditur. Optimum est graue, desum, interiore parte nigra, exteriori, & illa ambiente, subflua: cortice læui, firmiter hærente, ligni scobe, si manibus comprimatur, simul coherente (quod pinguedinis eius indicium est) quod denique in sua decoctione multum odorem, saporem atque colorem relinquit: magnitudo autem, aut paruitas fragmentorum non sunt tam magni momenti, quam notæ supra dictæ: sed in hac parte mediocritas laudari potest. Aduertendum est, cortice nos uti seorsim: quem plerumque fraxini cortice adulterari contingit, aut similibus, qui tamen dignoscuntur sapore & odore quodam peculiari. * Exicat, attenuat, liquefacit, expurgat, sudorem mouet: contagioni atque putredini resistit: quapropter morbo Gallico mirè subuenit. Eius decoctum uetustis ulceribus, scabiei, & impetigini conuenit, decenti uictus ratione adhibita. Hodie per Chemiã, in aquam, in oleum, & in salem redigitur: quæ illius studiosi, Mercurium, sulphur, & salem nominant: quibus multo tutius & celerius lues Venerea curatur. Medici Florentini & Andernacus.

B **EBENVS** optima habetur Æthiopica, & nigra, nullos habens uenarum difcursus, factitij cornus læuore: cum frangitur, densa apparet, mordens gustu, atque adstringens. Suffitur iucundo odore supra carbones, sine fumi tædio. Recens autem ad ignem prolata, ob pinguedinem accenditur, & trita ad cotem rufescit. Altera est Indica, internatis legumētis candicantibus, & modicè fuluis, item frequentibus maculis. cæterum prior bonitate antecedit. Apud quosdam sesamina, aut spinea ligna cõsimilia pro ebena ueneunt. Quod discernitur ex eo, quod fungosa sunt, & in purpureas assulas resoluuntur, nihil mordacitatis in gustu, nec redolentiæ in suffitu præferentia. * Caliginem oculorum absterget: ad ueteres destillationes, pustulasque: mirum in modum pollet: si quispiã tacta ex eo coticula collyrijs utatur, melius proficiet. Ad oculorum medicamentum efficax est, si scobes, rametæue uino Chio die noctuque macerata, in collyria digerantur. Nonnulli præterita ipsa excolant, reliquaque eundem in modum peragunt. Alij pro uino aqua utuntur. Vritur in fictili nouo, donec in carbones redigatur. Lauatur plumbi usti modo: & ita siccis, scabrisque lippitudinibus conducit. Dioscorides.

IVNIPERI lignum ad cetenarios annos incorruptum perdurat: eiusque carbo accensus, & suo cinere obrutus, igne integro anno fouet. * Accensum serpentes fugat. Corticis cinis cum aqua illitus, lepras eximit. Matthiolus.

NARCAPHTHVM ex India defertur. lignum est corticosum, simile sycomori libro: & uelut putridum, antiquitatem nimiam præ se ferens: quod iucundi odoris gratia suffitur. Miscetur thymiamatis compositis. * Cõstrictio-

nibus uulæ suffitu prodest. Dioscorides.

VISCVM per se non est arbor, sed in arborib. nascitur, frõde plerûq; ppe tua. Laudatissimû quod in quercu prouenit, recês, intus porraceû, extrâ fuluum, quod asperi nihil, aut furfurosi cõceperit. Fit acinis in quercu nascëtib. buxeo fruticis folio. * Lignum tritum, potatum comitialib. prodest. Diosc.

XYLOCASSIA, XYLOCINNAMOMVM, Cassia Græcorum creditur esse cinnamomû siue canella crassior rudior' ue ex annosis arborib. cinnamomi arboris, lauro similis, aut saltẽ ex trũco potius, quàm ex teneriorib. eius ramis decerptus cortex. Quemadmodum enim cerdones coriarij ad operas suas grauatim admittût cortices quercuû annosarû crassiores, expetût uerò tenellos tenellarum & nouellarû quercuû cortices: ita constat tenellos & subtiliores cortices cinnamomi lôgẽ magis aromaticos esse crassiorib. Vnde tale cinnamomû Reges Portugaliæ agrẽ etiam dinitunt, ad eò ut prestãtissimum cinnamomû etiamnũ uix habeamus: imò & Actuario leptocinnamomû. i. tenue cinnamomû p optimo habetur. Cassia itaq; nobis allata, p̄fertur longa, odorata, gustu cum acrimonia grato, rufescens. Medici Colon.

De lignis frigidis.

CVPRESSI patria Creta insula est. Perpetua coma uiret, eiusq; materies nec cariem, nec uetustatẽ sentit, ut etiam cedri, ebeni, taxi, buxi, & oleæ. Lignum nulla temporis diurnitate sua uolentiam exuit. Matthiolus.


LOTI arboris lignum dyfentericis utile est, in scobem redactum, & in aqua ferrariorum maceratum, costumq; & per clysteris iniectum cum uarijs oleis, quæ eiusmodi affectibus profunt. Andernacus.

SANTALVM in utrâq; India syluis densissimis, ingentissimisq; nascitur. Cuius tria numerâtur genera: quorû p̄fertur pallidû, secundû locû habet albû, postremû rubrum, quòd nullo comẽdetur odore. priora duo suauiter spirant. Refrigerat excessu tertio, siccat uerò secundo. * Rubrû priuatim defluxiones prohibet: incandescens inflammationib. podagrisq; ex succo solani, aut sedi, uel portulacæ utiliter illinitur. Candidû ac pallidû, ex rosarû aqua frõti imposta, capitis dolores mulcent. Aduersantur omnia calidis febribus: epota æstuati uentriculo mirificè auxiliâtur. Fiunt ex ijs & aqua rosarû epithemata, quæ uentriculo illita eius feruorẽ in ardentissimis febribus extinguunt. Ad hæc santalum nõ modò cordi efficacissimè laticia affert, sed & robur non paruum addit. Quare his immiscetur medicamẽtis, quæ cordi, & cordis palpitationi maximam opem prestant. Matthiolus ex Auicenna.

TAMARIX seu **MYRICA**, arbor uulgò cognita est, cum apud pigras & stagnantes aquas enascatur, fructum quasi florem ferens, compage muscosum. * Potorios calices è caudice lienosis moliuntur, quòd datus in his potus proficiat. Cinis huius omnia ulcera ignis exustione cõtracta, efficaciter exicat. Dioscorides & Serapio.

DE COR-

DE CORTICIB. CAP. XIII.



C. 3. De cor-

De corticibus calidis in primo.

MACER ex Barbaria aduehitur: interior nucis moschatæ cortex cen-
setur, qui nucleum ipsum proximè ambit: lignosus, flauescens, cras-
sus, & gustu perquam adstringens: stomacho suavis. * Contra cruen-
tas excreationes, dysenterias, & alui fluxiones bibitur. Dioscorides.

Cortex GVAIACTI annosis niger, iuuenibus uerò subrutilus. Melior at-
que præstantior est, qui ex optimo ligno colligitur. * Vires easdem, quas
lignum obtinet.

TAMARICIS cortices cultello abraduntur: siccantur diligenter: &
conseruantur in arculis ligneis, per annum. * Dantur cruentæ excreationi
in potu, & cœliacis, & contra profluvia fœminarum, regium morbum, & pha-
langiorum morsus: illiti tumores inhihent. Decoctum cum uino, lienem ab-
sumit, &c. Dioscorides.

De corticibus calidis in secundo.

CINNAMOMVM Dioscoridis hodie incognitum pleriq; existimant,
tametsi non desint, qui in Canellæ odoratoris capsulis facile reperiri posse
putent, quia Dioscor. cinnamomi quædam genera calsiæ familia facit. Ut-
cunque sit, canella optima & cinnamomi, & calsiæ loco usurpari potest, do-
nec melius aliquod medicamentum quod substitui possit, reperiatur. * Excal-
facit, emollit, & concoquit: urinam ciet: tam menses, quam partus potum,
aut ex myrrha impositum pellit: contra bestias quæ uirus eiaculantur, ue-
nenaq; conuenit: caliginem pupillis oculorum obuersantem discerit: cras-
sitiem extenuat: lentigines, & uitia cutis in facie ex melle illitum detergit:
contra tussis, defluxiones, aquam subter cutem fusam, renum uitia, & urinæ
difficultatem efficax est. Vnguētis preciosis inseri solet. Et in summa, magni
ad omnia usus. Dioscorides, & Medici Florentini.

THYRSIS cortex, qui ex arbore thurifera detrahitur, præfertur pinguis,
odoratus, recens, læuis, crassus, sine membranis. Adulteratur admisto pini
aut nucis eius cortice: sed horum index ignis est: siquidem thuris cortex le-
gimus paulatim ardet, & cum odoris fragrantia uaporem eiaculatur: adul-
teratus uerò nequaquam incenditur, sed totus in fumum sine odore confu-
mitur. * Vis eadem quæ thuris, sed ualidior, adstringentioreq;. Quare potu
cruentis excreationibus, uuluis fluxione laborantibus in pello confert: ad
cicatrices oculorum, & eua, sordesq; efficax est. tostus scabris lippitudini-
bus auxiliatur. Dioscorides.

De corticibus calidis in tertio.

MACIS nucis moschatæ exterior cortex est, in quo nux latet, quemad-
modum auellana in suo putamine. Præfertur crassum, plenum, odoratum,
sapore

A sapore subacri: hodie notum. * Ventriculum roborat, & concoctionem adiuuat. Medici Florentini.

De corticibus aperientibus.

THYMIAMA ex India defertur, corticosum: simile sycomori libro: quod iucundi odoris gratia suffitur. * Constructionibus uulvæ ex suffitu prodest. Dioscorides.

De corticibus dolorem mitigantibus.

FRAXINI cortex cultello abscinditur, siccatur & conseruatur per annū. * Lateris, lienis doloribus medetur.

De corticibus purgantibus.

SAMBUCI cortex medius abraditur cultello: siccatur & seruatur per annum. * Aquas detrahitis: hydropicos iuuat.

De corticibus fructuum calidis.

MALI CITRI cortex cultello abscinditur: siccatur in umbra diligenter, & seruatur in arculis ligneis. * Venenis aduersatur. Decoctum collutione, oris halitum commendat, suauitatemq; accersit: uentriculū roborat, &c.

AVRANTII MALI cortex in umbra siccatur, conseruaturq; per annū in arculis ligneis. Calidior quàm mali citri uel Limonij cortex.

B *De corticibus fructuum adstringentibus.*

GLANDIS CALICVLVS, qui uulgo cupula dicitur, * ad fluorē muliebrem, & sanguinis sputum ualet.

MALICORIVM est mali punici putamen, quod aliqui Sidion appellat. * Spissandi uim habet: sanguinolenta glutinant, humida gingiuarū uicia mobilesq; dentes decocto colluuntur: herniam prolapsu intestini erumpentem, cataplasmate repellunt. Dioscorides.

IVGLANDES uirides decerpantur mense Iunio appetente, * antequā earum putamina obduruerint, saccharo uel melle asseruatæ, stomacho utiles euadunt, & ori non ingrata. Putamen combustum, tritumq; in oleo & uino, infantium capite peruncto, nutrit capillum, alopecias replet. Dioscorides & Matthiolus.

De radicibus corticibus calidis.

CAPPARIS cortex amarus, acer, acerbus, * abstergit, purgat, incidit, digerit, adstringit: ob quas uires lienem induratum, & coxarum affectus adiuuat, tum intro assumptus, tum extrinsecus, tum idoneis remedijs ad motus.

De corticibus radicibus frigidis.

MANDRAGORAE radix delibratur, & traiectus lino cortex ad usum suspenditur. * Vinum, in quo cortex fuerit infusus, ualet in pernicijs & doloribus, & ante sectiones, uisionesq; ne sentiantur. Dioscorides.

De corti-

De corticibus purgantibus bilem.

ESVLAE cortex * educit phlegma ueheméter, & aquam citrinam, & humores melancholicos, & materias à iuncturis. Dosis est à siliquis duabus usque ad septem. A

CUCUMERIS syluestris cortex * purgat potenter pituitam uomitu & deiectione, & interdum bilem, si uacuari parata est, serosum quoque excrementum, etiam euulsu contumax, atque adeò à iuncturis mirificè trahit. ob id earum dolores sanat, ischiadem etiam iuuat apertè cataplasmate impositus, uel clystere iniectus. Dosis est à granis quindecim ad drachmam semissem. Mesues.


SAMBUCI cortex idem præstat, quod sambucus ipsa: * nec non pituitam crassam & uiscosam purgat. Ebuli cortex eandem uim cum sambuci cortice habet.

DE SVC-

A DE SVCCIS CAP. XV

B

Succus est, qui contusione & quassatione exprimitur: & vel



De succis

D

De succis temperatis herbarum.

BETAE succus recens parari potest: fit folijs uiridibus tritis atque expressis. * Discutit, detergit, & per nares purgat: summam omnia prestat, quæ herba ipsa.

BYGLOSSAE succus ægrè exprimitur: parua coctione & residentia purgatur ante repositionem, in uase pleno, uel oleo superfuso reponitur. * Confirmare & exhilarare dicitur.

De herbarum succis calidis in primo.

ABSYNTHII succus fit in uere uel autumno, folijs tritis atq; expressis, deinde parua coctione & residentia purgatus ante repositionem, in uase angusti oris, superfuso oleo digiti crassitudine, uel in uesica inspissatus: seruetur per annum. * Succus differt ab herba: hæc enim adstringit: ille uerò magis aquosus detergit.

BRASSICAE succus fit recens ut Betæ. * Vim habet purgatoriam: coctus cum melle, lina conuenit arteriacæ.

De herbarum succis calidis in secundo.

APII succus adseruatur expressus liquidus superaffuso oleo, in uase uitreo angusti oris. * Obstructiones aperit: menses & urinas mouet.

CALAMINTHAE succus eodem modo, quo apij paratur, & conseruatur. * Ad anhelationem, tussim antiquam, frigidam uiscerum intemperiem: & lienosis cum saccharo coctus exhibetur. Andernacus.

ECHII succus fit addita aqua, aut alio liquore illj facultatibus simili, inter terendum, & expressione extrahitur, conseruaturq; ut absynthij. * Confortat atque exhilarat.

LYPLI succus mense Aprili extrahitur, & conseruatur, ut apij. * Sanguinem purgat: obstructiones uiscerum aperit: febribus compositis cõfert.

MENTHAE succus eodem, quo apij succus extrahitur, conseruaturque. * Ventriculum frigidum corroborat: nauisam & uomitum sedat.

RVTAE succus eodem modo paratur. * Humores lentos incidit, digerit, ficit, aperit: idq; magis quàm herba ipsa acida. Andernacus.

SCORDII succus compositionibus additur: * quia purgat uiscera, obstructiones aperit: urinas & menstrua citat. extrahitur & conseruatur, ut apij succus. Andernacus.

De herbarum succis calidis in tertio.

CHELIDONIAE succus folijs, caule, radice exprimitur ineute æstate, seruetur ut apij, uel in umbra siccatur, & in pastillos digeritur. * Oculis claritatem affert. Dioscorides.

De succis herbarum frigidis in primo.

FVMARIAE succus mense Aprili uel Maio exprimitur, serueturq; in uase uitreo.

DE SVCCIS HERB. FRIGID. IN SECVNDO. 211

A vitreo angusti oris, oleo supaffuso. * Melácholiá, & serofa excreméta purgat. **INTYBI** succus vere exprimitur, folijs ac radicibus tritis: seruatur in vitreo uase oris angusti, superaffuso oleo, digiti crassitudine. * Ad iecoris calorem immoderatum ualet.

ROSARVM succus mēse Maio, uel principio Iunij exprimitur folijs tuis: asseruatur liquidus superaffuso oleo, quod, tempore usus, lana bōbacea aufertur. * Ventrem laxat: stomachum roborat: iecoris calorem extinguit.

VIOLARVM Martio uel Aprili exprimitur, seruaturq; ut rosarum. * Bilis acrimoniam lenit: thoracis affectus calidos restinguit.

De succis herbarum frigidis in secundo.

ACETOSAE succus simili modo extrahitur & seruatur, ut rosarū. * Ad febres biliosas, & obstructions uiscerum ualet.

COTYLEDONIS succus * q̄tuāti uētriculo cōmodè imponitur: item ad erysipelas conducit. exprimitur, & seruatur ut rosarum. **Andernacus.**

LACTVCAE succus * ad stomachum biliosum ualet: ardorē restinguit: somnum prouocat. Ut rosarum extrahitur, conseruaturq;.

PLANTAGINIS succus * astringit, refrigerat, omnem calorem præter naturam extinguit. Exprimitur & conseruatur, ut rosarum.

SOLANI hortensis succus * ad refrigerandum & adstringendum utilis est. Extrahitur & conseruatur, ut præcedens.

De succis herbarum frigidis in tertio.

CICERBITAE succus stomachi rosiones lenit, & lactis copiam mulieribus suppeditat. Paratur & conseruatur, ut rosarum.

PORTVLACAE succus æstate exprimitur affusa aqua inter terendum, ut expressiōe unā cum ipso humore extrahatur: aut tusa calatho imponitur loco frigido, ut paulatim succus in subiectū catinū defluat: deinde seruatur ut rosarū. * Pueris, quos uermes & febris infestant, magno comodo exhibetur.

SEMPERVIVI succus eodem conficitur modo, quo portulacæ succus: * ad erysipelata, herpes, inflammationes à fluxione ortas accommodatur.

De succis herbarum frigidis in quarto.

PAPAVERIS nigri succus, seu meconium, fit ex folijs, caulibus, herbaq; ipsa tritis expressisq; ac in pastillos redactus. * Reliquorum medicamentorum uim obtundit, quando eis admiscetur.

De succis fructuum calidis.

MALORVM dulcium succus fit, contusis & expressis, deinde saccharo conditus seruatur ad usum. * Cor imbecillum roborat.

De succis fructuum frigidis.

CITONIORVM succus extrahitur ut Citoniorū: conseruatur aut ut rosarū. * Aduersus biliosa alui profuua ex melle uel saccharo ualet: uentriculum roborat.

MALORVM PVNICORVM succus * calidam intemperiem corrigit: A
uomitum compescit: & stomachum firmat. fit ut malorum dulcium.

BERBERORVM succus * uomitum ac fluorem alui sistit: saccharo con-
ditus, cōclususq; coteonati modo delicatus est: contra capitis defluxiones
calidas accommodatus. Andernacus.

RIBES succus frigidus, acidus, & acerbus est; * sitimq; extinguit. Con-
tra sitim in febribus ardentibus cum Iulapio rosaceo, aut uiolaceo potissi-
mum exhibetur: nec non ad biliosum uomitum coercendum, fluoremq; sto-
machicum restinguendum: sed frigidis, & pectoris angustijs aduersatur.
Andernacus.

De succis seminum calidis.

LINI cremor fit, aqua feminibus prius maceratis, deinde in eadem co-
ctis, expresisq;. * Dolores ex acri humore ortos mitigat, inflammationesq;
partium corporis lenit. Andernacus.

FŒNIGRAECI cremor simili modo ac lini cremor conficitur. * In-
flammationes minus calidas, sed duras magis sanat, magnas irritat & au-
get. Andernacus.


De succis seminum frigidis.

PSYLLI cremor * omnibus membris ardore infestatis auxiliatur: B
eoq; refrigerantibus medicinis conuenit. Eodem modo,
quo lini cremor, paratur. Andernacus.

DE LIQVO.

A DE LIQVORIBVS CAP. XVI

B Liquor est, qui incisa uel sacrificata, aut terebrata planta alienius parte extillat, sine emanat. Liqueores autem uel



De liquoribus frigidis.

OMPHACIVM ex omni immaturarum uuarum genere paratur: pluribus diebus expressus insolatur succus cum suis uinaceis in cado, crasso linteamine cooperto, donec excrementa subleuentur, saxe uerò subsidat, & inclarescat: deinde absq; sale seruatur per annum, tam ad ciborum, q̄ ad medicamentorū usum. * Calidis morbis omnib. magno iuuamento adhibetur. Refrigerat uniceq; ardorib. pdest, siue ori aëtris inpositū, siue totius hypochôdrijs, siue cuilibet alij, quod refrigerare uelimus. Matthiolus.

ACETVM fit ex uino, uel ceruisia putrescēte. Quod ex uino acerbo, crudoq; fit, magis astringit: quod ex optimo uino cōficitur, magis aperit: quod ex ceruisia apud inferiores Germanos paratur, magis refrigerat. Acetum omne mistæ est substantiæ, nempe frigida pariter & calidæ, eiusq; utriusque tenuium partiū: cæterum calidam frigida exuperat. * Exicat ordine tertio, astringit: stomacho utile, appetentiam excitat: erūpentem undecunque sanguinē, potu in fessu ue silit. Prodest alui fluxionibꝫ coctū cum cibus: cruētis uulnerib. inditur: in flāmationes arcet, in succidis lanis, aut spōgia inpositū: reprimat proci dētia sedis, uulueq; item abscedētes gingiuas, & sanguine manātes. Ad nomas & ignē sacrum, ulcera que serpūt, lepras, impetigines, pterygia, cū aliquo cōuenienti efficax est: phagedænas ulcerū, nomasq; fotu continuo cohibet: podagricis calido fotu, cū sulphure auxiliatur: sugillationes rapit, cū melle illitum. Cōtra capitis ardores cum rosaceo in succidis uelleribus, aut spōgia imponitur. Ad aquam inter cutem, grauitatem aurium, & sonitus, sibilosq; seruētis uapor proficit: instillatū quoq; aurium uermes necat. Panos coërcet tepidi fotus, aut si imbuta aceto spōgia admoueat: pruritus permulcet. Cōtra uenenatos serpentium ictus, qui refrigerādo nocēt, calidum cōmodē fouetur: & frigidū ijs, que exurēs uirus ei aculatur. Calidū potū atq; uomitionibus redditum, aduersus omnia uenena efficax est, præsertim cōtra meconiū, & haustā cicutā, cōglobatum in uētre sanguinē, lac coagulātū, fungos, ixiā, taxūq; cum sale. haustu uoratas hirudines, si sorbeatur, eijcit: tum ueterē mitigat, & recētem lacepsit. In orthopnœa calidū cōmodē sorbetur: gutturis fluxiones garg. rizatum inibet: anginis, & uuxæ proci dēti conuenit. contra dētium dolorem, calidum colluitur. Dioscorides & Galenus.

De liquoribus calidis.

SAPA fit multo igni decocto. * Detergit leniter: serapijs pectori idoneis accommodatur: nec non compositionibus Diacodion, ad defluxiones capitis sistendas, eādē mensura, qua saccharum, admiscetur.

VINO uetere * nerui læduntur, & reliq; sensus: qd' tñ gustu suauius est. quare cauēdum ijs, qui intestinē alicuius partis imbecillitatem sentiūt. attamē in secūda ualitudine paucū cum aqua dilutū, innoxie sumitur. Nouū inflat, ægrè coquitur, insomnia parit graua, & urinam ciet. Etate medium utraque pitia

A uitiā fugit: quare ad uictus sanorū, ægrorūq; usurpatur. Album, tenue, stomacho utile est, ac faciliē in membra distribuitur. Nigrum uerō crassum est, & concoctū difficile, carnem alit, & ebrietatē creat. Giluum, utpote quod mediū est, medias inter utrūq; uires habet. In secūda tamen, & sinistra ualitudine, cum primis laudatur album. Quin & uina sapore distāt. siquidem dulces crassis partibus cōstat, & difficilius à corpore expirat: stomachum inflat, aluū & interanea ut multū turbat, sed minus inebriat: renibus & uesicę aptissimū. Austerū per urinā celerius trāsit: sed capita dolore tētat, & temulentiā gignit. Acerbū ad ciborū per mēbra digestionē accōmodatissimū aluū & ceteras fluxiones cohibet, minusq; urinā expellit. Nouū neruos minus tētat. Vinū aqua marina factū, stomacho aduersatur, sitim stimulat, neruos infestat, aluo aptū, à ualitudine se recolligētibus inutile. Passum, quod uis sole siccatis in area, aut in sarmēto torrefactis exprimitur, Creticū cognomine. Inter Italica uina Falernū principē locū obtinet: quod inueteratū perquā faciliē coquitur, pulsus exuscitat, aluū adstringit, stomacho utile: sed uesicę nocet, atq; ijs qui uisus hebetudinē sentiūt, & ad potus crebros minimē idoneum. Albana crassioribus cōstant partib. dulcia: stomachū inflāt, uentrē emolliūt, sed cōcoctionē nō equē adiuuāt, & neruosa minus infestat: uetustate eādē austerū sapore cōcipiunt. Cecubū, cū sit dulce, est & Albano crassius: corpus & colorē alit: ægrē tamen coquitur. Surrentinū ualde austerū est: quare intestinorū, & stomachi fluxiones cohibet, & cum tenue sit, caput minus tentat: inueteratum suauius redditur, & stomacho utile. Adrianum, & Mamerinum in Sicilia æquē crassis partibus gignuntur: modicē astringūt, & oculisimē inueteratū, minusq; ob luā tenuitatē neruos tentant. Parętypianū, qđ ex Adriatico sinu defertur, odoratū ac tenuius est: quare liberaliter epotum fallit, diu seruat ebrietatē, & soporē adfert. Istricū Parętypiano simile est, sed urinā uehemētius pellit. Chiū tñ antedictis mollius, & aptum potui est. bene alit, & minus inebriat, fluxiones cohibet, oculorū medicamētis utile. Lesbiū faciliē mēbra subit, Chio leuius, & aluo idoneū. Ephesū eandē uim habet, qđ Phygelites nominatur. Verū Asianū è Tmolo mōte, Mesogites appellatū, capitis dolores ciet, & neruos lēdit. Coū uerō, & Clazomeniū, quoniam multam sibi maris aquā uēdicant, faciliē corrūpuntur: status mouēt, aluum turbant, neruis officiūt. Vinum omne (ut reliqua in cōmune dicātur) merum, ac sincerum, & sua natura austerū, excalfacit, faciliē in mēbra distribuitur, stomachum adiuuat, appetentiam ciborū inuitat: uires alit, ac robur auget: somnū conciliat, & cōmendat calorem. Potum liberalius auxilio est contra asumptā cicutā, coriādrum, pharicū, ixiā, meconiū, argēti spumā, taxum, ac onita, fungos ue: contra serpētium morsus, & omniū ictus, quæ refrigerando necant, aut stomachum in uomitiones effundunt. Facit ad longas inflationes, rosionesq; præcordiorum, ac distentiones, stomachi resolutionem, & si uenter,

si uenter, aut interanea rheumatismum sentiant. Conueniunt sudatoribus, A
& quibus corpus immodico sudore digeritur, maximè alba, uetera, & odo-
rata. Quæ tamen uetustate dulcescunt, renibus ac uesicæ accõmodatiõra red-
duntur: uulneribus, inflammationibusq; in succida lana imponuntur: tetra
ulcera, & phagedænica, & fluxionibus obnoxia commodè perfunduntur.
Quæ marinam non receperunt, austera, & alba, ad sanorum uictus usurpan-
tur. In his præstant Italica, Falernum, Surrentinum, Cecubum, Signinum, &
per multa Campaniæ, & Parætypianum ab Adriatico sinu, & Siculum, quod
Mamertinum appellatur. Ex Græcis Chium, Lesbium, & Phygelites ex E-
pheso. Crassa uerò & nigra stomacho negocium exhibent, inflationem pa-
riunt, corpus augent. Tenuia tamen & austera stomacho profunt, & minus
carnes alunt. Vetera ualde tenuia & candida uehementius urinam ciunt, &
dolores capitis mouent, neruosq; largius pota tentant. In mediâ ætate, ut à
septimo anno, potui saluberrima sunt. Modus autem pro ætate, & tempore
anni, & consuetudine, & qualitate uini definiatur. Non sitire, & modicè ci-
bos proliui, optimum est præceptum. Nocet ebrietas omnis, & maximè assidua:
liquidem obsessos neruos quotidie remittit: largiorq; potus acutorum
morborum adfert initia. Mediocris tamen uinolentia aliquot diebus, maxi-
mè post aquæ potus, utilis: namq; modo quodam ex alto euocat, sensilesq;
expurgat excretus, & per cæca corporis ducit spiracula. Sed aquâ post uino
lentiam bibere oportet: siquidem ualitudinis alicuius gratiæ factæ temulen-
tiæ remedium adfert frigida. Dioscorides. B

De liquoribus pinguibus calidis.

OLEVM ex oliuis maturis expressum, sit colore rufo, purum, perluci-
dum, tenue, odore exiguo, sed grato, sapore dulci, subacri, & indicibili, recès,
aut non ita uetustum, nisi uetusto egeatur: in quo uidelicet uetusto trigena-
rium trimo, & quadragenarium quadrimo est plurimò ualentius, ubiq; cras-
sius, graueolentius, calidius, acrius. * Calefacit omne oleum ex oliuis matu-
ris, emollit uentrem, à perfrictionibus corpus tuetur, ipsumq; promptius ad
obeunda munera reddit: aluum emollit, ulcerantium medicamentorum ui-
res permistum hebetat: contra uenena datur, assiduè potum redditumq; uo-
mitionibus: soluit aluum hemine mensura cum pari ptisanæ succo, aut aqua
potum: ad tormina calidum simul decocta ruta tribus sextarijs in potu da-
tur: uentris animalia pellit: idem maximè ilei intestini morbo laborantibus
infunditur. Vetus magis calfacit, & uehementius discutit: oculorum clarita-
ti sublitum confert. Si uetusti non sit occasio, in uase decoquitur ad mellis
crassitudinem, ut uetustatem repræsentet. Oleum omphacinum ex imma-
turis oliuis expressum, ad uiride inclinatur: recens sit, odoratũ, morsus expers,
sapore acerbum. Vnguentorum compositionibus idoneum est. Stomacho
utile est,

DE LIQVORIBVS PINGVIBVS CALIDIS. 217

A utile est, quòd adstringat: gingiuas contrahit, dentes firmat, si contineatur in ore: sudores cohibet. Oleum quod syluestres oliuæ fundunt, uehemèter adstringit, & ad sanorum usus secundum sibi locum uendicat. In doloribus capitis utiliter pro rosaceo substituitur: sudores arcet, defluentes capillos inhibet: furfures, ulcera capitis manantia, scabiem, leprasq; abstergit: tardius canitiem sentiunt, qui eo quotidie perunguntur. Dioscorides & Medici Colonienses.

AMYGDALAE dulces siccae, non tamen rancidæ, delibratæ, contūduntur minutissimè, postea in sartagine aliquantum torrefiunt, affuso aquæ rosaceæ modico, postea prælo exprimuntur. * Lenit asperitates pectoris, gutturis & pulmonis, duritiã & siccitatē iuncturarū: est suaue in cibis, & confert hecticis & phthisicis: impinguat, auget sperma, sedat tussim, & ardorem urinae, uesicæ & uulua excoriatæ, cum fistula iniectum. Mesues.

OLEVM AMYGDALARVM amararum eodem modo, quo ex dulcibus amygdalis fit. * Aperit oppilationes, & discutit uentositates & uapores, sed potissimum medetur surditati, sibilò, & dolori aurium: lenit duritiē neruorum, & delet maculas faciei. Mesues.

OLEVM BALANINVM fit ex Balano Myreplica, id est, glande unguentaria, quam Arabes uocant granum Ben: fit autem extuso, affusoq; affusa rosacea aqua, fructu isto. * Repurgat maculas, uaros, lentigines, cicatricū nigritias, fucos: aluum soluit, sed uentriculo aduersatur: dolores aurium emendat. Item si sonant aures, uel strepitum, aut sibilum edunt, cum adipe infusum auxiliatur. Mesues.

OLEVM NVCVM fit, ut oleum amygdalinum. * Flatus crassos dissipat, tumores discutit, neruis attritis uel punctis, præsertim cū calce lota confert, scabiem emarginat. Mesues.

OLEVM EX AVELLANIS fit ut amygdalinum. * Dolores neruorum & arthriticos sedat. Mesues.

OLEVM LAURINVM fit ex baccis lauri maturis & recentibus tritis in pila, ex aqua in lebetè cōctis, post torculari plano, non cauo expressis: & aqua supernatans oleum colligitur. Deinde affusa calente aqua iterum tritis, & torculari cauato expressis, colligitur oleum, & reponitur. * Ad partium omnium cerebri, neruorum, articularum, uentriculi, coli, hepatis, lienis, renun, uteri, affectus frigidos, & dolorem his succedentem. Mesues.

OLEVM LINI fit ut amygdalinum. * Spasmo, duritiei neruorum & iuncturarū, hæmorrhoidibus, sedis phlegmonis & rimis cōfert, ac dolori pulfatorio. Neruorum dolores sedat, uiribus proximū est oleo chamemelino. Mesues.

OLEVM SESAMINVM extrahitur ex Sesami semine, ut amygdalinum, nisi quòd prius semē sesami excorticandū sic est: Id semē ab excrementis purgatū, aqua parū salsa irrigetur, manibus fricetur: iterū irrigetur, donec
E madefiat:

ma defiat: siccetur, modicè affetur, sacco aspero multum diuq; confricando **A**
excorticetur, corticibus expurgetur, molatur in farinam, oleum exprimatur,
ut ex amygdalis. Ex eodè semine nõ excorticato, sed assato, & molito in fari-
nâ, oleû quoq; extrahitur, ut prius. Affertur aut ex Alexâdria Aegypti Vene-
tias, ubi ematur sincerû. nâ adulteratur oleo nucû & papaveris: sed odore &
sapore facilè deprehenditur à peritis dolus. * Impinguat, semen auget, lenit
guttur, & omnem asperitatem & duritiem, & clarificat uocem. Mesues.

De liquoribus pinguibus frigidis.

OLEVM PAPAVERIS fit ex utriusq; papaveris semine, tâ albi quàm
nigri, eodem modo, quo ex amygdalis. * Impinguat, asperam arteriam lenit,
februm ardorem mitigat, & infomnium. Mesues.

OLEVM Hyoscyaminû sic fit. Semen candidum, recens, ac siccû tundi-
tur, & calida aspergitur aqua: dumq; insolatur, siccatæ, quæ sub manu
sunt, partes cû reliqua massa permisceantur: hoc aut fieri oportet dū nigre-
scat, & grauitè oleat: mox pressum atq; excolatum reconditur. Fit quoq; eo
modo, quo amygdalinum. Ad aurium dolores efficax est: pelsis miscetur, ad
emolliendum utile. Dioscorides.

De liquoribus concretis calidis moderatè.

AMYLVM, quod uulgò Amydû officinis uocatur, omnibus notû est. Ex **B**
triticò cõficitur. Probatum aut leuitate, ac læuore, atq; ut recès sit, & candidû.
* Vim obtinet læuigâdi partes exasperatas. Cõtra fluxiones oculorû, pustul-
as, cauaq; ulcera efficax est: sanguinis reiectiones potu cohibet, exasperatas
fauces lenit. lacti, atq; obsonijs admiscetur. Dioscorides & Plinius.

GLYCYRRHIZÆ succus ex Creta insula optimus, hoc est, dulcissi-
mus, mollis, recens, purus, tenax, & qui cõtractus splendescat, nigerrimus, &
qui linguæ subditus tandè totus eliquescat. * In arteriæ scabritia efficax est:
æstuantî stomacho, thoraci, ac iecinori: sanat uesicæ scabiè, & renû dolores,
cû passò potus: idem eliquatus sitim sedat: uulneribus illitus accõmodatur:
commanducatus stomacho prodest. Dioscorides & Medici Colonienses.

LYCIVM uerû ignoratur. Ex emporijs quidè importatur, sed unde con-
ficiatur, non constat. Paretur non ex periclymeno, sed potius ex baccis pyra-
canthæ, id est, nostræ uulgaris *bagendorn*. Diuersis partibus constat: tû ijs quæ
extenuent, discutiantq;: tum crâsis, & modicè adstringentibus: * ideoq; ad
fugillata, oris inflammationes, ulcera, herpetas, putredines, aures purulen-
tas, intertrigines, & paronychias ualet. Indicium ad omnia est ualentius. Hu-
ius loco Rhamnus syluestris, aut polygoni succus substituendus est. Diosco-
rides & Medici Colonienses.

De liquoribus concretis calidis in primo.

SACCHARVM arundinum lachryma, seu liquor est, qui nimia succi co-
pia **a**

A pia aperto in latere calamo, perinde ac gummi, exterius concreuit. Vel saccharum fit ex sacchari calamis minutim incisis, ignisq; calore tamdiu decoctis, donec uniuersus liquor absorpta igni aqua diu efferuescens in saccharum salis modo, in uasis fundo concreuerit. Præstantissimum est, quod durum, solidum, & mutuo metarum allisu sonorum est, ligni sicci & solidi modo: tamen ob siccitatem & imperceptam raritatem leue, dulcissimum, candidissimum, & niuis in morem scintillans, cohærens: quale Valentinum in metas pyramidum æmulas (panes uocant) coactum paruas, ponderis libræ unius & dimidiæ, uel circiter, carissimum, & confecturis siccis aptissimum, penidijs ob siccitatem nimis friabilem, ineptum. Illi dotibus & precio est proximum, quod Madere appellant, sed in metas ponderis librarum sex, septem, octo, nouem, decem formatur, confecturis expetitur: quia minus preciosum, non multò tamen imperfectius. Tertium statuitur lentile, album quidem, sed pinguius, ob id uilius, neq; cōfecturis siccis aptum, sed penidijs idoneum. Quartum ex Canarijs nunc dictis insulis, olim Fortunatis aduehitur, etiã intus albicās, bonitate inferius prædictis, præstātius sequenti, metis constat maximis, pondere librarū decē, duodecim. Quintū ignobilissimum sancti Audomari dictū, foris albidū, intus subrubrū, tanquã alio factum, & foris dolo tectū, metis æqualibus, omniū glutinosissimum, cōdituris siccis in-

B eptissimū: liquidis seruit & syrupis, opiatis, cōseruis, & similibus, quia uilissimū, & uilitatē tegit aliorū mistura. Id si mare sentit (nã eo naues ob grauitatem saburrant) rubrū uulgò dictū fit: quanquã sunt, qui rubrū spumam & spurcitiã omnis sacchari se coquendo purgant existimāt. Ex micis horum collisu elisis etiam metas quidam cogunt, quæ simplicium naturas sequuntur. Ex his quod generosissimum, minimam coctionem sustinet, ne puluerescat: ignobilissimum contrã: cætera pro accessu aut recessu uariant. * Al- uo idoneum, & stomacho utile: detergit, digerit, linguæ asperitatem, & siccitatem in febribus tollit: uexatæ uelicæ renibusq; auxiliatur. Illitum ea discutit, quæ tenebras oculorum pupillis offundunt. Medici Colo- nienses.

De liquoribus concretis calidis in secundo.

LADANVM liquor est, ex alterius cisthi ledon appellati folijs exsudās. Hodie & liquor & plāta nota sunt. Optimū, minimeq; adulteratū, odoratū esse debet subuiride, facilè mollescēs, pingue, resinofum, arenularū aliarūq; fordiū expers, quale in Cypro gignitur. * Natura ei spissandi, calfaciēdi, molliendi: ora uenarū patefacit: capillum fluentē cōtinet, addito uino, myrrha. & myrteo oleo: cicatricibus decorem reddit, cum uino illitum: medetur aurium doloribus, cum hydromelite aut rosaceo infusum: suffitu secūdas eijcit: pelsis immistum, uuluz duritiem sanat. In medicamenta, quæ dolorem, ruf-

simq; finiunt, & malagmata utiliter inferitur: aluum sistit cū uino uetere potum, & urinam ciet. Dioscorides.

De liquoribus concretis calidis in tertio.

ASA dulcis, aromatica seu odorata est Laferis seu Sylphij opus siue liquor Cyrenaicus, seu potius Indicus hoc tempore. Etenim Indicus etiam à Mesue laudatur. Nā ex Taprobana insula in mari Indico maxima, hodie à Lusitanis conuehitur, teste Ludouico Romano patritio, Belzoe indigenis dictus, & nobis inde Belzoin, & corruptius Benzoin. Est autē Laferis, seu Laferpitij seu Sylphij herbæ liquor, caule ipsius ferulaceo aut radice scarificata defluens, acer, mordax, digerens, optimus, modicè rufus, non porraceus, colore trās lucēs, myrrhæ æmulus, odoratus, suauis gustu, dilutus, citò albescēs. Hæc quidē Siluio ita cōpilata sunt, partim ex Dioscoride & Galeno, partim ex Ludouici Romani nauigatione: fatius enim est fateri, Laferē seu Laferpitium, seu Sylphium, & proinde eius succos seu lachrymas nō extare amplius: quod prægnātibus rationib. docet Ioannes Langius Lembergus Selesius in epistolis medicinalib. suis. Asa itaq; dulcis seu Belzoin, quod apud Serapionē & Auicennā à Græcorum Laferpitio nihil differat, Laferis succus esse nequit. Secundò Ludouicus Romanus refert Belzoin esse gūmi arboris: at qui Lafer nō arbor, sed *βερδόν ή δάχρυον* ueteribus est. Tertio in Belzoin officinarū nulla ferè cōperitur acrimonia, nedū tāta, quātā Galenus ei tribuit, dū Laferpitij loco euphorbiū nō recēs substituit. Quid uerò officinarū Belzoin siue asa dulcis sit, indicabitur paulò post inter gummi & resinas sub Belzoin. Medici Colonienfes.

ASA fœtida, plātē peregrinę lachryma aut succus est. Sunt qui existimēt, Sylphij succū esse in Media aut Syria nascentis, qui, teste Diosc. grati odoris nō erat, ut Armeniacus aut Libycus, quē nōnulli asam odoratā esse arbitrantur, & Belzoin officinarū: sed nō cōuenit. Nā Dioscorides hūc ut præstātissimū & efficacissimū laudat: Arabes uerò Asam fœtidā calidiorē & potētiorē asserūt: multò minus Belzoin esse potest, quod tāta excafaciēdi uī præditum non est, quantum illi tribuit Galenus, dum laferpitij loco euphorbium non recens substituit. Medici Florentini.

De liquoribus concretis frigidis in primo.

ACACIA in Aegypto nascitur. plāta est spinosa, è cuius fructu succus acacia exprimitur: quē cū nō habeamus, substituere possumus succū hypocistidis, aut pulpā rhois, aut succū prunellorū, uel baccas pruni syluestris, in aqua maceratas. Fit mēse Iulio uel Augusto. * Refrigerat, adstringit & repellit.

SANGVIS DRACONIS ueterū & eadē Cinnabaris uera (q̄ res mineralis erat) hodie ignoratur. Qui uerò sanguis draconis ostenditur, factitiuus est ex sanguine hirci, bolo Armenia, & succo sorborum, & alijs: quo tamen pro sanguine draconis dicto rectius uti possis. Florentini præter hunc factitium

A. factitium sanguinem draconis, statuunt adhuc duo eius genera: nimirum lachrymam cuiusdam arboris gummiæ sui generis, de qua Aloysius Cadamutus patritius Venetus nauigationis suæ lib. 1. cap. 4. dicens esse lachrymā proceræ cuiusdam arboris in insula Africæ, Porto sancto dicta, genitæ, quæ quidem lachryma colore est intentè rubro, sanguineo, transparentis, friabilis: alter sanguis draconis illis est achilleæ syderitidis succus defæcatus atq; siccatus. * Refrigerat, adstringit & repellit. Medici Colonienfes.

De liquoribus concretis frigidis in tertio.

HYPOCISTIS quæ sub ueris finem radicibus cisti adnascitur, teritur, & succus expressus sole siccatur. Nobis desideratur, nisi ex emporijs adferatur. * Vires acaciæ habet.

De liquoribus concretis frigidis in quarto.

MECONIVM succus est papaueris nigri, ex folijs, caulibus, herbaq; ipsa tritis expressisq; collectus, ac in pastillos redactus. Fit mense Maio. * Granorum tantum pondere in colicis, arteriacis, & narcoticis præscribitur. * Stuporem infert, doloremq; sedat.

B. OPIVM succus est è capitibus papaueris nigri. Duum est generum: unum ex capitibus & folijs expressum, Græcis meconium (de quo antè dictum) uocatur, quod ignauius: alterum ex capitibus paululum incisus extillans, uerum est opium. Fit mense Maio. Optimum est densum, graue, amarum, odoratu saporiferum, quod facile aqua dissoluitur, lene, candidum, neq; asperum, neq; grumosum, quod colatum non statim ut cætera coeat, quod in sole diffundatur, & admotum lucernis, clara, non atra luceat flama, & extinctum odoris uim conferuet. Adulteratur glaucio, hoc est, menitha, aut gummi, aut syluestris lactucæ succo. Verum glaucio fucatum in dilutione croci colorè reddit: lactucæo succo deprauatum, inodorum est, & asperius: gummi uitiatum, infirmum est, & splendet: nec desunt, qui adipem admisceant. * Granorum pondere præscribitur in colicis & narcoticis. Mirum est, quod de Asiaticis Turcis refertur, qui in Natolia sua, id est, Asia minore, magno studio & frequentia papauer hodie colunt, & præparant Opium, quod uernacula lingua Mafslac uocant: cuius usus illis frequens satis est ad pisi magnitudinem de eo fumentibus, non pro somnolentia, sed animositate comparanda: atque in prælia ruituri aliquanto copiosius sumunt, unde ueluti insani disturbato nimirum cerebro feruntur in obuia quæq; pericula, nihil quicquã timentes. Sed Iannicæri hæc plerumq; faciunt, quibus summa militiæ uirtus commissa est. Medici Colonienfes & Florentini.

De liquoribus concretis purgantibus bilem.

ALOB succus plantæ eiusdem nominis notissima est. Eius apud Dioscoridem duo sunt genera: quoddam arenosum, quod sedimentum purissimæ uidetur:

detur: alterum iocineris modo concretum, ex quo nomen vulgare sumpsit **A**
 aloes hepaticæ. Eligi debet Indica, pinguis, sincera, calculorum & arenularum
 expers, nitida, rufi coloris, friabilis, iocineris modo coacta, facile liquefcens,
 & eximie amaritudinis. Improbatur nigra, difficile liquefcens. Adulteratur
 gummi, quod deprehenditur gustu: nam non ualde amara est, neque tam uali-
 di odoris, neque digitis friata ad minima usque frustra resoluitur. Nonnulli, te-
 ste Diosc. illam succo acaciæ adulterant. quod maleficium gustu deprehen-
 ditur: minus enim amara est, magisque adstringit. Colligitur mense Iunio. Co-
 seruatur usque ad annos decem, in loco sicco, & non humido, neque uentoso,
 neque ad solem, &c. Dosis est ab aureo semisse ad drachmas duas: in infusio-
 nibus uero ab aureo uno usque ad drachmas tres. * Bilem & pituitam pur-
 gat: ob id affectibus uentriculi, & cerebri, & reliquarum partium, inde natis,
 ut dolori, inflammationi, sic præcauet, ut eius creber usus sensuum instrumē-
 ta & corpus reliquum, nullo insanabili affectu tētari sinat, sed sensus acuat,
 cogitationem reddat meliorem. Hepati confert, icterum tollit, hæmorrhoidi-
 bus & sedi nocet: ob id uitanda his, quibus istæ partes dolent: & aere frigido,
 quia tunc sumpta excorticatis sanguine educit. Mesues & Medici Florētini.

MANNA ros est, qui ex aere in arbores, herbas, lapides, terraque decidēs,
 densatur & cogitur in grana minuta. Præfertur Calabria, præfertim quæ ex
 folijs arborum collecta est: quæ ex hoc dignoscitur, quod grano constat exi-
 guo, translucente, graui, similis mastiches granulis, candidis, & gustu dulci-
 bus & suauibus. Secundum locum obtinet, quæ è ramis colligitur. Tertium,
 quæ in lapidibus. Hæ crassiores sunt, & minus sincere, colore turbido. Syria-
 ca si sit perfecte granulata, mastichæque assimilis, ualde etiam probatur, dul-
 cis & reccēs. Cum iam exoleuit, floccorum bombacis refert imaginem, leuis
 concavaque est. Adulteratur amyli farina, rebusque similibus: sed maleficium fa-
 cile deprehenditur. Insuper & ea quæ simul concreuit, saccharo & sena adul-
 terata esse solet, ac croco, carthami uel flore tineta: uerum gustu deprehen-
 ditur, atque liquefcit, & tempore mollescit. Colligitur mense Maio. Durat & co-
 seruatur per annum, bene obturato uase. Dosis eius à drachmis sex usque ad
 quindecim. * Temperata est, aut paulo calidior: guttur, thoracem, uentricu-
 lum lenit, terget, bilem clementer purgat, sitim sedat. Quoniam uero imbe-
 cilliter uacuat, thymo & hyssopo, uel alio uis eius intenditur. Valentibus autē
 medicamentis mista, eorum actionem reddit meliorem, cum suo dulci sapo-
 re, illa naturæ magis familiaria reddat. Ob id eam Galenus scammonio mi-
 scuit, quod à posterioribus est laudatum: alij deinde turbiti, alij alijs. Mesues
 & Medici Florentini.

SCAMMONIUM stillatitius liquor est plantæ Græcis scammonia di-
 ctæ. Laudatur nitidum, rarum, leue, colore quam simillimum taurino gluti-
 ni, fungosum, tenuibus fistulis. Addunt nonnulli, ut linguæ tactu albescat: sed
 huic

A huic notæ fidendum non est: hoc enim euenit adulterato, quod admisto fit tithymali lacte: hæc aut nota longè certior est, nempe si gustatu linguâ nõ urit, quemadmodum tithymalus. Adulteratur tithymali lacte, & farina orobi, sed ex notis prædictis dignoscitur. Colligitur mēse Iunio. Viginti annos feruatur: sed quo antiquius, eò imbecillius. Datur per se à granis quinq; ad duo decim. Sunt qui ultra duodecim grana, & etiam scrupulum siue noxa dederunt. * Quinq; corporib. lēiones inferre potest. Prima est, quòd status quosdam mordaces gignit, usque ad eò uentriculum laceffentes, ut sumentib. nau seam commoueat. Noxa hæc tollitur, si in excauato cydonio malo, clibano, aut prunis inassetur, pasta undiq; circūlita: præsertim additis, aut sceniculi, aut dauci, aut apij semine, aut galanga. Inflammatur deinde ac redinis exuperantia corporis spiritus: quò fit, ut facillè febres excitet, ijs præcipuè, qui obstructionibus uiscerum, & humoribus putrescentib. obnoxij sunt. Sed id nocu menti aufertur, admittis inter coquendum, quæ refrigerant, & feruorem extingunt: cuiusmodi est psyllij seminis spissamentum, prunorum decoctum, seu potius pulpa, rosarum & uiolarum succus, aut dilutum, aut aqua: quinetiam si ante coctionem maceretur oleo rosaceo, aut uiolaceo, aut cotoneorū misti saporis succo, aut admisto rhoe, aut factitio spodio. Ad hæc quòd magna tum attrahendi, tum aperiendi facultate sit præditū, immoderatas alui fluxiones facit: uasorum enim oscula plus quàm par sit aperit. Hæc læsio adimitur admistis rebus adstringentibus, cohibentibusq;: nempe mastiche, cydonijs malis, succoq; ab eis expresso, & myrobalanis, præsertim flauis. Abradit præterea acri succo, quo scater, intestina: proinde & tormina, & dysenteriam, & tenasimum excitat. Sed deletur hoc incòmodū, additis humidis, pinguib. lentisq; medicamentis: cuiusmodi sunt, tragacanthum, bdellium, amygdalinum oleum, aut rosaceū: item prunorum pulpa per se, & saccharo asseruata, psyllij spissamentum, mastiche, cydonia mala post sumpta, & calida aqua post bibita: utpote quæ medicamentum ocys à uentriculo & intestinis expellant, & ita simul noxam prohibeant. Hinc est, quòd prudentes medici, quò celerius scammonium à uentriculo, & intestinis deiciant, hordei iusculum cum saccharo superbibendum præbent. Obest postremò scammoniū cordi, iecori, ac uentriculo, substantiæ suæ totius proprietate. Vitiū hoc aboletur, si illi tum calida, tum frigida admisceatur medicamenta, quæ cordi, iecori, uentriculoq; opem suam præstant. Deijcit scammonium ualentissimè bilem, quam à uasis & à sanguine exhaurit. Eius deijciendi facultas haud sanè alijs medicamentis absimilis est, quæ purgant cum labore & molestia. Dioscorides & Matthiolus ex Mesue.

De liquoribus concretis, purgantibus pituitam.


ELATERIVM succus est è fructu cucumeris syluestris, plantæ notissimæ. Optimum est leue, non ponderosum, cum candore leniter humectum, guttu

gusta amarissimum, quodq; lucernarum luminibus obiectum facile flagrat. **A**
 Improbatur scabrum, turbidum, porracei coloris, medium erui & cineris co-
 lorem referens, & graue. Sunt qui amyllum immisceant, ut candorem ipsum
 imitentur, ponderosusq; sit. Sic colligitur. Decerpti cucumeres maturi, qui
 tacti protinus exiliunt, imposito supra uas aliquod rariore cribro, sigillatim
 supino cultro sursum uersus aciem habente sinduntur, atque per cribrum hu-
 mor in subiectum uas exprimitur, simulq; carnosum, quod hæsit cribro, quò
 facilius excidat, eliditur: coaceruata autem in cribro segmina, dulci aqua p-
 funduntur, & denuò pressa abijciuntur: humor in pelui agitatur, & linteo o-
 pertus duplicato, soli exponitur: dumq; steterit, tota supernatans aqua cum
 spuma identidem effunditur: deinde conterendo cogitur in pastillos, & ser-
 uantur ab annis tribus usque ad duodecim. Dosis est à granis decem usq; ad
 drachmam unam. * Bilem ac pituitam extrahit. Optima suspiriosis est pur-
 gatio. Menses ciet, & partus enecat, in pessò subditum. morbo regio medetur.
 Medici Florentini ex Dioscoride.

O P O P A N A X succus est effluens ex incisa radice aut caule panacis, qd'
 Dioscoridi heracleū dicitur. Hodie cognita est planta, & ipse succus, qui ma-
 ximè probatur quàm amarissimus, internè albus, aut subfuluus, foris colore
 croci, leuis, pinguis, friabilis, tener, statim in aqua eliquescens, graui odore.
 Niger improbat, ac mollis. Adulteratur ammoniaco, aut cera: sed sinceri **B**
 experimentum est, si digitis in aqua friatus resoluatur & lactescat. Conferua
 tur annis quinque uel sex. Dosis eius est à drachma una usq; ad duas. Corri-
 gitur mastiche & spica. * Purgat phlegma crassum & uiscosum à partibus re-
 motis, & iuncturis, & propriè mundificat cerebrum & neruos. Et confert e-
 gritudinibus neruorum frigidis: pectus mundificat: tussi antiquæ cōfert: po-
 tum cum aceto hora una ante accessionem, & cum succo apij & oleo anethi-
 no spinæ illitum, rigorem febrilem prohibet. Ischiadæ, podagræ,
 gonagræ confert. Medici Florentini ex Mesue.

DE GVM.

A DE GUMMI ET RESINIS
CAP. XVII.



F De gum-

De gummi & resinis calidis temperatis.

LACCA Arabum, Græcis Cancamum dictum, hodie non reperitur: i-
deoq; eius loco Styrace utendum est. * Obesos extenuat: urinâ & men-
strua prouocat, &c. Medici Florentini.

GUMMI ELEMI quibusdam Cedri lachryma est, aut oleæ Æthiopice,
aut arboris ignotæ. Melius est Scammonio simile, resinofum, fuluum, stillis
exilibus cõstans, mordax. Damnatur Ammoniacò uel gummi Arabico simi-
le, colore nigricãs, morsus expers. Explora an uerum sit officinis: nam quod
preferunt, est resinæ piceæ aut pinus, quâ Burgundicam uocamus, colore &
consistentia simile, & odore primùm leui, deinde tamen ualentissimo, & mul-
tis graui. Seruatur in loco sicco per aliquot annos. * In caluariæ fracturis, ac
uulneribus mirificè unguentis & emplastris additur, adeò ut præstantissimũ
sit in his sanandis medicamentum. Medici Colonienfes.

TRAGACANTHVM, Græcis Tragacantha, lachryma est, quæ à radice
plantæ cuiusdam spinosæ eiusdem nominis manans, concreuit. Laudatur al-
ba, perlucens, gracilis, læuis, sincera, subdulcis: salua in ore diu lætescit. Quæ
uero est antiquata, magis pallefcit primùm, deinde rufescit, tandem etiam fla-
uescit (quod lachrymis propè omnibus commune est) fitq; tragacantha
hæc annis amara, ob idq; calidior, dulcium cæterorum more. Ob id etiam
multi tragacantham flauam antidoto aureæ Alexandri, antidoto Hadriani,
& diacurcumæ maiori, & alijs quibusdam compositis miscent, quæ calida
sunt, præsertim ubi cocta sunt, & (ut dicunt) fermentata, post annum scilicet
dimidium: alijs uero frigidis aut temperatis albam aut pallidam. Porrò
Florentinis uidetur gummi Arabicum esse uera tragacantha. Et tragacantha
dicta uidetur eis esse acacia: aiuntq; proinde alterâ alterius loco sumi pos-
se, cum uires habeant similes. * Cutis spiracula, ut gummi, obstruit. Huius
increbuit usus ad oculorum medicamenta, ad tussim, exasperatas fauces, re-
tusas uoces, cæterasq; destillationes, cum melle in delinctu: subdita quoque
linguæ liquefcit. In passo madefacta, drachmæ pondere bibitur contra renũ
dolorem, & uesicæ rosiones, mixto cornu cerui usto, & eloto, aut scissi alumi-
nis momento. Dioscorides & Medici Colonienfes.

De gummi calidis in primo.

BDELLIUM lachryma est arboris Saracenicæ, uel Sembrachenicæ.
Probatu gustu amarum, translucidum taurini glutinis modo, intus pingue,
& si tactu subigitur, mollescens, ligni ac sordis expers, odore unguis marini
incensum. Facultate secundum, est ueluti siccum, resinofum, liuescens. Ter-
tium est Indicum sordidum, nigrum, grandioribus glebis in ossas conuolu-
rum. Adulteratur gummi: sed id minus est amarum, & suffitu minus odora-
tum. Ex eo quod in usu est, deligendum quod inaximè accedit ad prædicti

notas,

A notas, donec præstantius aliquod aduehatur. * Calfacit & emollit: duritias, & turgentia guttura, humiditasq; hernias discutit cum ieiuna saliuâ dilutum: uulvæ spiracula laxat appositu & suffitu: & partus, humiditatesq; omnes extrahit: calculos potu comminuit, urinam mouet: tussientibus, & à serpente percussis utilissimè datur: ualet ad rupta, uulsa, laterum dolores, & discursantes spiritus. Malagmatis inseritur, quæ contra duritias & neruorum nodos profunt. Contusum resoluitur affuso uino, aut aqua calida. Medici Florètini ex Dioscoride.

GUMMI HEDERÆ, lachryma est ipsius hederæ. Colligitur mense Maio. Psilothrum est. * illitu pediculos enecat.

De gummi calidis in secundo.

GALBANVM ferulæ Syriacæ liquor est: uulgò notum est. Laudatur multis granulis constans, merum, thuris effigiem præbens, pingue, nõ lignosum, retinens nonnihil feminis è sua ferula, graue odore, neque humidum neque aridum. Adulteratur resina, fabæ farina, & ammoniaco: quod ex notis iam dictis deprehenditur. * Excalfacit, urit, extrahit, discutit: menses ac partus trahit appositu, uel suffitu. Lentigines aceto & nitro perunctas tollit. Deuoratur ad tussim ueterem, difficultatem spirandi, suspiria, rupta, con-

B uulsa. Aduersatur toxicis, potum cum uino & myrrha: simili modo sumptum mortuos partus extrahit. Imponitur lateris doloribus, & furunculis: comitiales, & uulvæ strangulatus, & uertiginosos olfactu suscitatur. Dioscorides.

MYRRA Arabicæ arboris lachryma est. Huic tamen non quadrent omnes notæ à Dioscoride descriptæ, cum tamen multis sit prædita bonis qualitatibus, existimant nonnulli pro uera posse usurpari. Eligenda est pinguis, resinosa, rubescens, densa, & splendens. Sunt qui affirmant storacem liquidam, qua officinæ utuntur, stillatitium myrrhæ liquorem esse, qui stacte ueteribus dicebatur. Quod nullo modo conuenit: nam storax liquida stetitium potius quiddam uidetur, cuius nullus usus pro myrrhæ stacte esse debet. Quod uerò de opocalpaso scribit Galenus, quod myrrhæ similitudinem gerat, sed uenenosum & exitiale sit, multosq; sua ætate mortuos esse, quod in medicamentis opocalpasum pro myrrha assumpsissent, nemini nostra ætate contigisse audiuius. Quod magnum argumentum est, nos uera myrrha carere. * Calfacit, cohibet. soporem gignit, glutinat, siccatur, adstringit, uulvam emollit, & præclusam aperit: menses & partus celeriter extrahit cum absynthio, lupinorum cremore, uel succo rutæ adnota: tuberculo fabæ deuoratur in uetere tussi, orthopnoea, in laterum pectorisq; doloribus, in alui profluuio, & dysenteria: horrores discutit duabus horis ante febrium accessiones, fabæ magnitudine pota cum pipere, & aqua: subdita linguæ liquataq;

quataq; scabritiem arteriæ expolit: obtusam uocem expedit, uentris tineas **A**
 enecat, contra grauem oris halitum mâditur, & aduersus alarum tædia cum
 liquido alumine illinitur: gingiuas & dentes stabilit, colluto cum uino & o-
 leo ore: uulnera capitis illitu glutinat: medetur fractis auribus, ac ofsibus
 nudatis, peruncta cum cochleæ carnibus: item purulentis auribus, inflam-
 matisq; cum meconio, castorio, & glaucio: ad uaros cum casia & melle
 illinitur: impetigines ex aceto purgat: defluentes capillos cum ladano & ui-
 no myrteo illita firmat: diurnas destillationes lenit, illitis penna naribus:
 oculorum ulcera complet, albugines tollit, caliginem discutit, scabritiem læ-
 uigat. Dioscorides & Medici Florentini.

MASTICHE létiscina resina est. Optima & copiosissima in insula Chio
 prouenit. Præfertur nitedulæ modo, resplendescens, & candore Tyrrenicę
 ceræ similis, adulta, retorrída, friabilis, odorata, stridorem edens. Viridis aut
 inferior est. Adulteratur thuris, resinæq; pineæ nucis mistura. * Pota uti-
 lis est sanguinem reijcientibus, & tussi ueteri: stomacho auxiliatur, sed ru-
 ctum mouet. additur in dentifricia, & illitiones faciei, ad nitorem cuti conci-
 liandum: palpebras oculis incommodas replicat: manducata halitum oris
 commendat, gingiuas contrahit. Dioscorides.

THVS, OLIBANVM, lachryma arboris Arabicæ, pinguis, albus,
 emplasticum: flauius & siccus, & antiquatum magis. Quod scemininum uo- **B**
 cant, resinofum magis est ac molle, citò ardens: masculum in thuris genere
 primatum tenet, suapte natura rotundum, guttarum formam retinens, indi-
 uiduum, candidum, cum frangitur intus pingue, in suffitu statim ardens. pri-
 mum quidem candicat, tandem etiam rufescit. Adulteratur resina piceæ, &
 gummi: sed thus ardet: gummi non inflammatur: resina in fumum abit: i-
 dem maleficium odor prodit. * Ad calefaciendum & adstringendum pol-
 let: oculorum caliginem discutit, caua ulcera complet, & ad cicatricem per-
 ducit: cruenta uulnera glutinat, infrenatq; cunctas sanguinis eruptiones,
 etiam si cerebri membranis effluat: ulcera quæ cacoethe uocantur, & sedis,
 & reliquarum partium permulcet tritum cum eo & lacte linamentum: formi-
 cantes uerrucas inter initia, impetiginesq; ex aceto & pice illitum tollit: am-
 busta igni, pernionesq; cum sullo adipe, aut anserino, & ulcera in capite ma-
 nantia cum nitro, si infricetur, sanat: paronichijs cum melle, auribus fractis
 cum pice, medetur: ad reliquos aurium dolores cum dulci uino infunditur:
 inflammata à partu mammæ cum cimolia & rosaceo magna utilitate perun-
 guntur: additur ad arteriæ, uiscerumq; medicamenta: prodest sanguinis ex-
 creationi potum. Sed in secunda ualitudine haustum insaniam mouet, & lar-
 gius cum uino potum, interficit. Dioscorides.

PIX è lignis pinguis & resinosis fluit, præsertim è pino. Quibusdam
 tamen in locis, propter pini penuriam ex picea, cedro, terebintho, cæterisq;
 similibus

A similibus cōgregatur. Pix naualis uulgò uocatur, estq; duorù generù: liquida & sicca. Liquida duorù itē est generum: una quæ primùm effluit, aquæ perquam similis, qua in Syria utuntur in cōdiendis corporibus, & cedriā appellant, quòd ex cedro fiat: nā pinos non habent. altera, secundus est qui effluit liquor, qui uasculis collectus densatur aceto, sicq; coactus, pix brutia appellatur: in hoc solùm à priori differens, quòd concreta sit, colore fusco, & pinguior: hac picabantur utres uinarij. Pix arida fit è liquida iterum cocta. huius sunt itidem duo genera: unum quod uisci modo lentescit: alterum, siccū & friabile. Præter hæc, aliud quoddam genus reperitur, quod pisselæon appellant: exprimitur ex lana qua excepti sunt uapores elati sursum, quandiu pix coquitur. Præfertur quod expice brutia fit. Aliud picis genus Zopissam uocabant, ex derafa nauibus resina & cera conflatam. Omnes hæ picis differentia reperuntur. Liquida præfertur splendens, læuis, sincera. Sicca probatur pura, pinguis, odorata, subrufa, & resinosa. Improbatur adusta, fumum redolens, & acida. Probatu uerò ea, cuius fragmenta splendent, quæ dentibus pressa lentescit, & gustu est suauis. * Pix liquida contra uenena, phthisin, purulentam excretionem, tusses, suspiria, & pectoris humores, qui difficilè extulsiantur, efficax est, eclegmate cyathi mensura cum melle dato: tonsillarum & uuæ inflammationes, anginaq; utiliter perunguntur: purulentis auribus infunditur cum rosaceo, & illinitur, cum trito sale serpentium moribus: adiecta uerò pari cera, scabros unguis extricat, impetiginesq; emendat: uulua duritias, ac sedis tubercula discutit: cum farinaq; hordeacea, & pueri impubis urina decocta, strumas rumpit: cohibet ulcera quæ serpunt, cum pineo cortice, aut sulphure, aut furfuribus illita. Cum thuris mâna & cerato profundos ulcerum sinus conglutinat: rimis sedis & pedum magno auxilio illinitur: ulcera replet, & cum melle purgat: quin & cum uua passa & melle carbunculos & putrida ulcera emarginat, disrumpitq;. Erodentibus medicamentis, quas septas uocant, probè immiscetur. Pix arida dura emollit, pus mouet, tubercula panoq; discutit, ulcera replet: uulnerarijs medicaminibus cominodè permiscetur. Zopissa uerò dissipandi naturam habet. Medici Florentini ex Dioscoride.

RESINA liquor est ex pinu, picea, abiete, alijsq; similibus sponte profluens. Eius duplex est differentia. Vna liquida, ueluti terebinthina ex terebintho, laringna è larice, quæ uulgus Italiæ terebinthina: nam eius quæ è terebintho profluit, copiam non habemus. Altera arida, ut quæ ex pinu exit, & è fructu arborum resiniferarum, thuri similis. Ex liquidis terebinthina resinas omnes antecedit, candida, perlucida, uitreo colore & in cœruleum uergente, odorata, terebinthum olens. In huius locum successit, ut dictum est, laringna, quæ mellis colore & odore esse debet. Ex aridarum genere eligi debet odoratissima, translucens, non retorrída, neque nimium humida, friabi-

lis, & quædam ceræ colorem præbens. Improbatur rubra & dealbata. Ex his A
resinæ è picea & abiete cæteras antecedunt, & thus odore imitatur. Omnes
hæ resinæ uno nomine pix Græca uocantur: de qua inferius *. Natura omni
bus calfacere, mollire, discutere, expurgare. Tussi ac tibi conueniunt per se,
aut in eclegmate ex melle: uitia pectoris expurgant, urinam cient, cruda con
coquunt, uentrem emolliunt, palpebras commodissimè replicant: lepras
tollunt, cum æruginè ac futorio atramento, nitroq̃: auribus saniem emanan
tibus cum melle & oleo, item in pruritu genitalium utiles, malagmatis, acop
isq̃: admiscuntur. Laterum doloribus per se, illitu & appositu auxilio sunt.
Dioscorides & Medici Florentini.

STYRAX hodie duorum est generû: unum Styrax calamita appellatur,
Græcis simpliciter styrax: alterum Styrax liquidus, qui myrrhæ stacte, quæ
pinguissima myrrhæ pars est, plerisque esse creditur. hoc tamen falsum esse
deprehenditur in eo, qui in officinis est. Styrax calamita gummi est arboris
malo cotoneæ similis. Præfertur flauus, crassus, resinofus, albicantibus gru
mis, quàm plurimum in sua odoris gratia permanens, qui, dum molitur, mel
leum liquorem reddit. Deterior niger, friabilis, & furfurosus. Adulteratur li
gni ipsius scobe, melle, cera, adipe odoribus imbuto, & quibusdam alijs. Di
gnoskitur, quòd adulteratus inualido sit odore: sincerus uerò admodum a
cer sit. Qui hodie officinis in usu est, aliqua ex parte Dioscoridis descriptio B
ni conuenit, eoq̃: utendum arbitramur, donec melior proponatur. * Cale
facit, emollit, & concoquit: medetur tussi, destillationibus, raucedini, gra
uedini, & interceptæ uoci: uulvæ præclusæ, duritiæue laboranti conuenit:
cit menses potu, apposituq̃: aluum leuiter mollit, si exiguum cum resina
terebinthina catapotij modo deuoretur. Miscetur utiliter discutientibus
malagmatis, acopisq̃: Adoletur autem, & igni torretur, ut fiat ex eo, uelu
ti ex thure, fuligo: ad eadem conueniens, ad quæ thuris fuligo. Ex eo etiam
in Syria Styracinum oleum componitur, quod calefacit uehementer, & e
mollit: uerùm caput dolore afficit, aggrauatq̃, & soporem adfert. Medici
Florentini & Dioscorides.

De gummi & resinis calidis in tertio.

AMMONIACVM, ARMONIACVM, ferulæ succus est, quam iu
xta Cyrenen Aphrica gignit: cuius fruticem cum radice agasyllim uocant.
Probatur bene coloratum, ligni & calculorum expers, thuris similitudine,
minutis glebis, densum, sincerum, nulla sorde spurcatum, castoreum odore
imitans, gustu amarum. Gignitur in Aphrica iuxta Ammonis oraculum, suc
cum stillante ferulacea arbore. Colligitur mense Iunio. * Mollit, extrahit, cal
facit: tubercula, duritiæq̃: discutit, potum aluum soluit, partus extrahit: lie
nem consumit, drachmæ pondere haustum: articulorum, coxendicumq̃
doloribus

A doloribus liberat. Auxilio est anhelatoribus, orthopnoicis, comitialibus: item quibus humor in pectore coit, si cum melle delingatur, aut cum prifana succo forbeatur. Cruentam urinam pellit, albugines oculorum absterget, genarum scabritiam absumit: tritum autem cum aceto, & impositum, iocineris, lienisque duritias sedat. discutit tophos, qui in artubus concaluerunt, cum melle aut cum pice illitum. Lasitudines & coxendicum dolores eo perungi utile est, cum nitro & cyprino oleo, uice acopi. Dioscorides.

CEDRIA PIX est, ex arbore cedri collecta. Optima est crassa, persucida, grauis odoris: quæ dum effunditur, guttatim non dissipata coit. * Cui ea uis inest, ut defuncta corpora conseruet, & uiuentia corrumpat: qua ex causa mortuorum uitam aliqui eam appellauere. Vestimenta quoque & pelles eximia calfaciendi & siccandi dote, corrumpit. magni ad ocularia medicamenta usus: quippe illita oculis claritatem affert, albugines, cicatricesq; detergit: instillata autem cum aceto, uermes aurium necat: cum hysopi decocto infusa sonitus, sibilo sique sedat: cauis dentium indita eos frangit, & dolores leuat: idem facit cum ex aceto colluitur: peruncto ante coitum genitali, concipiendi uim adimit: anginae ea perunguntur, tonsillarum inflammationibus auxilio est: lentes, pediculosq; illitu enecat: cerastæ moribus cum sale imposita subuenit: contra hausta leporis marini uenena, in passo sumpta, auxiliatur: in elephantia aut linctæ, aut perunctione proficit: pulmonû ulcera purgat, & si cyathus eius absorbeatur, persanat: uermes & tineas subter indita necat, & partus extrahit. Dioscorides.

De gummi & resinis calidis in quarto.

BELZOIN gummi est arboris peregrinae (non autem Laserpitium) agallochi forsitan, ut quorundam est opinio, quod uulgare est lignum aloes. Optimum censetur translucens, albis præditum glebulis, thuris æmulum, rubescens, odore grato, & quando uritur xyloaloes odorem referens: hac enim ratione ab adulterino dignoscitur Medici Florentini.

EYPHORBIVM est succus ex arbore ferulæ simili emanans. Duo eius genera: unum sarcocollæ modo emicans, in granula concretum, orobi magnitudine: alterum ueluti sæx quædam est, imbecillius. Adulteratur sarcocollæ & gummi Arabici mistione, sed difficile experimentum, quod leui gustu os accensum diu detineat. Eligendum translucens. Recenti, quia uiribus est uiolentis, non utendum, sed annotino. Annis quatuor integrum seruari potest cum milio, fabis, aut lentibus, ne elanguescat: quinto enim uel sexto anno uis eius exoluitur. Cæterum cum plerumque contingat, ut ad nos magis aduehatur uetustate corruptum, quam recens, maior cura in eo adhibenda est. * Illitu suffusiones discutit. potus tota die exurit: quare mel-
li, colly-

li, collyrijsque pro acrimoniæ ratione admisceri debet. Coxarum doloribus prodest in odorifera potione haustus. Squamas ossium eadem die eximit: uerùm eo utentes, necesse est linamentis, aut ceratis communire corpus, quo ossa conuestiuntur. Aliqui memoriæ prodiderunt, percussos à serpente nihil molesti passuros, si incisa osse tenus capitis cute, intritus succus infundatur, uulnusque postea consuatur. Dioscorides & Medici Florentini. A

De gummi & resinis frigidis.

CAMPHORA, uel CAPHURA, Arabibus Indiæ arboris lachryma est: alijs uerò, Indici bituminis genus. Ferunt Indos id bitumen, quod ex Camphora natiua stillat. excoquere, quodque tenuissimarum est partium, albescere, & sublatum operculo adhærere, caphuramque in hunc modum conformari, ut illam uideamus. Hinc fit, ut mercatores Caphuræ bitumen plerumque admisceant: sed non ita candicat, ut caphura illa modo iam dicto excocta. Eligatur alba, pellucida, sincera, ualde odorata, quæ pani calido imposta madescit. nam quæ spurca est, arefcit. Semine lini, aut psyllij, aut pipere sepulta conseruatur, ne aeri exposita euanescat. Deterior est crassa, fusca, nigra, assulis ligni sui implicita. * Refrigerat & siccatur ordine tertio: tenuium adeò partium, ut sæpe per se in auram euanescat. Capitis dolores mulcet illita, incandescens inflammationes restinguit, præsertimque iocineris. Renes & seminaria uasa refrigerat, sanguinemque cogit. Circumcisionibus imponitur ad cutis nitorem conciliandum, & ad arcendas tam uulnerum, quam ulcerum inflammationes. Erysipelas extinguit, & aduersus gonorrhœam, & albas uulvæ fluxiones efficacis est cum succino, & aqua nymphææ hausta. Idem præstat pubi, seu imo uentri, testibus, renibusque illita: quæ tamen antea psyllij seminis spissamento, aut omphacio, aut solani succo probè sit macerata. Sanguinem è naribus profluentem sistit, aut cum urticæ semine immissa, aut ex maioris sedi, & plantaginis succo fronti circumlita. Collyrijs ad calidas oculorum lippitudines utiliter imponitur. Renibus ac testibus illita uenerem extinguit. Corpora à putredine præseruat: proinde commodè antidotis admiscetur, quæ contra uenena, uenenosorum animalium ictum, & pestilentes affectus conficiuntur. In uniuersum uiribus innumeris pollet, quas breuitati consulentes præmittimus. Matthioli ex Auicenna & Serapione, & Medici Colonenses. B

GUMMI ARABICVM uulgò dictum, & gummi absolutè, ex Acacia Aegypti spina: laudatur uermiculorum in speciem contractum, uetri modo perlucidum purum: proximum est candidum: sordidum uerò ac resinofum inutile. * Vis ei ad spissandum, refrigerandūque, efficacis. Cutis meatus obstruit, & medicamentorum, quibus admiscetur, acrimoniam hebetat: ambustis ex ovo illitum, pustulas non patitur erumpere. Dioscorides.

De gum-

A *De gummi & resinis emollientibus.*

COLOPHONIA, seu **PIX GRÆCA**, pini alterius'ue arboris resina est, aqua cocta, donec perduto nativo odore, friabilis & arida reddatur: uocatur colophonia, quod è Colophone adueheretur. Per colophoniam igitur semper pix Græca intelligenda est: non quod resina incocta non etiam colophonia uocetur, sed quod in Medico usu huiusmodi resinis non utimur nisi coctis, aut raro admodum, præsertim cum liquidæ sunt. Medici Florentini.

De gummi & resinis adstringentibus.

GUMMI AMYGDALARVM notum est. * Calfacit & adstringit: reijcientibus sanguinem, potum auxilio est: impetigines, quæ summum corpus occupant, illitum cum aceto tollit: tussi uetustæ cum diluto uino potum medetur: calculosis cum passo bibere prodest. Dioscorides.

MANNA THVRIS sunt minutissimæ thuris micæ, ex magnis fasciculis concussu elisæ, à thure læuigato diuersæ. Laudatur albâ. pura, micarumq; frequentia prædita. Sunt qui cribrata pini resina, ac polline ac gummi, aut cortice thuris contusi adulterant: sed hæc igne deprehenduntur. Nam adulterata non æqualiter flagrat incensa, nec aereum uaporem, sed fuliginosum & impurum expuit, uariatumq; odorem habet, quia gummi non inflammatur, resina in fumum abit. Hodie minutissimæ thuris micæ sunt in usu. * Vini habet eandem, quam & thus, sed inualidiusculum. Medici Colonienfes ex Dioscoride.

SANDARACHA Arabum est gummi iuniperi, uulgò uernia, quia uerno tempore exudat, & rore uerno magis concrefcit, & legitur. Bonum est recens, perlucidum, pallidum: dum ueterauit, flauescit, & fit friabile mastiches modo, quam toto habitu multû mentitur. In usu frequentiori tamen est scriptoribus & pictoribus quàm medicis, præterquam in suffitibus. Sandaracham autem Arabum euidenter diximus, propter sandaracham Græcorum, quæ inter metallica enumerata est. Medici Colonienfes.

SARCOCOLLA lachryma est arboris in Perside nascētis, pollini thuris similis, colore candido aut rufo, gustu amaro. Præfertur rufa, gustu amarissima. Adulteratur gummi, sed gustu deprehenditur: adulterina enim amara non est. Vulnere glutinat, oculorum fluxiones inhibet, emplastris inseritur. Medici Florentini ex Dioscoride.

ADSTRINGUNT quoq; gummi tragacanthum, Arabicum: de quibus uide suprâ suo loco.

De gummi calculos pellantibus.

GUMMI, quo cerasi resudarunt, cum uino diluto, tussi uetustæ medetur: colorem commendat, uisum exacuit, appetentiam inuitat: idem ex uino potum calculosis auxilio est. Dioscorides.

G *De gummi*

De gummi purgantibus pituitam.

SERAPINVM, quod Græcis Sagapenum nuncupatur, ferulaceæ herbe succus est. Optimum est translucens, fuluo forinsecus colore, & intus albo, nescio quid inter laser & galbanum redolens, gustu acri. His addit Mesue, ut sit spissum & leue, odore porri, facile in aqua resolubile: quia quod has notas non habet, adulteratum alijs gummis censetur. Præstantius est, quod ex Oriente aduehitur, quàm quod aliunde. Datur à drachma semisse ad drachmam unam. Corrigitur mastiche & spica. * Purgat pituitam crassam, & alios humores lentos, & aquas à ventriculo, intestinis, cerebro, neruis, thorace, pulmone, iuncturis etiam longinquis & profundis. Morbis harum partium & aliarum frigidis inde natis succurrit, quouis modo usurpatum: ut cephalalgia antiquæ, hemicrania contumaci, epilepsia, paralyti, uertigini, spasmo cyaico tremori, dolori uentriculi, aut coli pituitoso, aut flatulento, cum succo rutæ & aceto distis partibus illitum, & attritis in musculis, uel cum liquore idoneo sumptum, & clystere iniectum: cum aqua rutæ uerò, aut heleni nutritum & potum, crassa & lenta ex pulmonibus & thorace potenter educit. Illitum quoq; tussi antiquæ, difficultati spiradi, dolori laterum prodest. Cum duplo item myrobalanorum citrearum in hydropo aquas serosas mirè extrahit. Splenis quoq; duritiem, & inflationem dissipat potum, & cum succo capparis, & aceto illitum, item cheradas, nodos, & alios tumores duros. Nutritum quoq; cum succo rutæ, aut forniculi, & felle auis alicuius rapacis uisum clariorem reddit. Fluxionem in oculum præcipuè factum ab ea cohol sanat, hordolum ex aceto illitum delet. Mentis quoq; potum & suppositum euocat, fetum necat: dolori uteri, & præfocationi prodest, quoniam tenuat, resoluunt, dissipat, prouocat, soluit. Medici Florentini ex Dioscoride & Mesue.

SARCOCOLLA est arboris fruticosæ, spinosæ, ramis nodosis arbori appressis, gummi album, thuris modo, uel pallidum, idq; amarius, & ob id ualentius. Datur à drachma una usque ad duas. Corrigitur zingibere & cardamomo. * Purgat pituitam crassam, & humores alios crassos, præcipuè à cerebro, neruis, iuncturis, ut ischio, pulmonibus. Ob id senibus pituitosis, asthmaticis tussientibus prodest, sed caluitium accersit, corpus impinguat, sperma auget. Ophthalmiam & lippitudinem, & alios oculorum morbos, mirè iuuat nutrita in uase uitreo dies quinque, in lacte asinæ, nouo quotidie affuso. Aurium ulceri putrido & sanioso utiliter imponitur, linimentum mullamersum, & puluere huius inspersum. Mesues.

OPOPANAX est liquor plantæ similis ferulæ, caule cubitali uel bicubitali pallido, folijs ferulæ, sed minoribus, floribus anethi modo in umbella dispositis, odoris flauis. Secto autem caule digitis duobus, aut circiter, supra radicem liquor effluit. Flauus, qui coagulatus est opopanax optimus, si intus albus est, foris flauus, amarus, fragilis, in aqua mox solubilis, odoris boni, sed sui

DE ANIMATIS AQUATILIBVS.

239

A sui. Adulterant ammoniaco, intestis scilicet ex ipso granis opopanace uero. Dolū prodit odor & albedo in fracturis. Datur à drachma una usq; ad duas. Corrigitur mastiche & spica. * Purgat pituitam crassam & lentam clàm à remotis partibus, cerebro, neruis, sensorijs, iuncturis, thorace. Ob id prodest harum partium affectibus frigidis inde natis, uisui imbecillo, tussi antiquæ, difficultati spirâdi, ischiadi, gonagræ, podagræ. Vino multeo incoctum post tres menses potu hydropem leuat, & lienis tumorem. Ex mulsa calente potum, stranguriam sanat, menses mouet, abortum facit, alioqui ab utero præfocioni, & frigidis uteri affectibus saluber. Idem aceto solutum collutionis, dentium dolorem & erosionem sanat. Potum cum aceto hora una ante accessionem, & cum succo apij, & oleo anethino spinæ illitum, & rigorem febrilem prohibet. Ex ipso autem, & succo apij, & aceto bono emplastrum lieini impositum ipsius duritiem dissipat. Mesues.

DE ANIMATIS AQUATILIBVS

BVS CAP. XVIII.

E SPONGIIS alias mares appellauere, tenui fistula spissas: quarum duriores tragos nominarunt: fœminas autem, quæ cōtrarias dotes habent. Vruntur eę, ut alcyonium. * Recètes sine pinguitudine uulnerariæ sunt, & tumores reprimunt. recentia uulnera ex aqua poscæue conglutinant: ueteres sinus ex decocto melle iungunt. Vetustę autem inutiles. Aridę ligatæ lino, si penicilli modo adigantur, oclusa ulcera, callosq; laxant. Siccę recentis, & uacua, senilia ulcera, & quæ fluxione laborant, aut cuniculatim exedūt, imposito siccāt. sanguinis profluuiū sistūt. Crematarū cinis ex aceto, aridę lippitudini auxiliatur: & ubi quid abstergere, aut adstringere opus est. Vtilius in oculorū medicamētis lauare cinerem. Omniū cinis cum pice crematarū, profluentē sanguinem sistit. Candidæ cura fiūt, è mollissimis recentis per æstus tinctę salis spuma, quæ petris cohæret: insolantur inuersę, hoc est, parte caua sursum spectante, & qua abscisse fuerunt, deorsum. Si uerò æstiuā serenitate ad lunam sternantur, perfusæ salis spuma, aut maris aqua, maximum candorem referent. Dioscorides.

DE ANIMALIBVS INTEGRIS

CAP. XIX.

De terrestribus.

CIMICES, qui in cubilibus enascuntur, * cauis fabarum inclusi, si ante februm significationes septeni deuorētūr, quartanis auxilio sunt: & citra fabas sumpti, percussis ab aspide profunt: uuluarū exanimationes olfactu reuocāt. Poti cū uino aut aceto, adhærentes sanguifugas abigunt: uiui urinarie fistulæ impositi, urinam ciunt. Dioscorides.

G 2 MILLE-

MILLEPEDAE, quæ sub aquario uase stabulantur, animalia sunt multis pedibus nitentia, quæ contacta manu contrahuntur in orbem. * Hæ ex uino potæ, difficili urinæ, & regio morbo auxiliantur. Millepedæ cum melle anginis utiliter illinuntur. tritæ, & in cortice mali punici calfactæ, doloribus aurium, addito rosaceo, conuenienter instillantur. Dioscorides.

SCORPIONES terrestres, animalia sunt: in Italia, & alijs in regionibus sub meridie sitæ, nota sunt, quòd in quacunq; domo, non modò in cubiculis, & cellis uinarijs, sed ubiq; passim reperiantur. * Triti crudi, & impositi, suæ plagæ remedium sunt. Quidam scorpionū cinere utuntur, qui uiui sint exusti, ad urinam ciendam, ijs præcipuè, qui renum aut uesicæ calculo obstruuntur. Dioscorides & Matthiolus.

LUMBRICI, seu **VERMES** terreni impositi, * præcisos nervos glutinant: tertianas discutunt. Decocti cum anserino adipe, infusi, affectis auribus medentur: cum oleo autem decocti, si in contrariam aurem instillentur, dentium doloribus præstant auxilium. Triti in potu ex passo urinam ciunt. Dioscorides.

COCHLEAE, seu **LIMACES** terrestres præferuntur, quæ in locis apricis, odoratis uicinat herbis. Eruuntur è terra hyeme in sepibus & fruticis, unicis quibusdam ferreis, prope fruticum radices terra circūfossa. * Stomacho utiles sunt, & non facillè corrumpuntur. Venerem, cum pipere, sale, & butyro coctæ, excitant. Crudæ cum tegumentis impositæ, aquæ inter cutem tumores exugunt: sed non antè soluantur, quàm omnis hauriatur humor. Podagricas inflammationes leniunt: impactos corpori aculeos illitæ euocant: menses tritæ & admotæ ciunt. Dioscorides & Matthiolus.

EX FORMICIS alatis * oleum cõficitur, ad uenerè augendâ idoneum.

VIPERINAE CARNES si coctæ edantur, * claritatem oculis afferunt: neruorum uitijs auxiliantur: incrementis strumas reprimunt. Detracta autem cute, caput caudaq;, quoniam carne uacant, amputari debet. Reliquum uerò corpus, exemptis interaneis elotū, dissectumq;, discoquitur cum oleo, uino, salis exiguo, & anetho. Aiunt eis, qui uiperas esitent, pediculos procreari: quod planè à ueritate abhorret. Adijciunt aliqui, longam senectutem agere, qui eo cibo uescuntur. Dioscorides.

De aquatilibus.

SCINCUS aut Ægypti, aut Indiæ, aut rubri maris alumnus, quamuis inueniatur in Lydia Mauritaniæ. Est autem terrestris crocodilus, sui generis, sale inueteratus cum nasturtio. * Aiunt carnes, quæ renes amplectantur, id sibi uirium uendicasse, ut si drachmæ pondere bibantur, uenerem accendat. Verum decocto lētis cum melle, aut semine lactucæ cum aqua potu, ueneris cupiditates inhibentur. Additur in antidota. Siccati seruantur, corpulenti, & non strigosi. Dioscorides.

CAN-

A CANCRORVM fluiatilium * exustorum cinis, qui duo cochlearia expleat, adiecto dimidio radicis gentianæ modo, triduo potus cum uino, magno opere prodest canis rabiosi moribus: rimas pedum sedisq; perniunculos & carcinomata, cum decocto melle lenit. Triti crudi, potiô; ex asinino lacte auxiliantur contra serpentium phalangiorumq; morsus, atque scorpionum ictus. Decocti autem, & cum iure esitati, ijs profunt, qui tabe conficiuntur, aut leporem marinum hauserunt. Dioscorides.

RANAE uulgaris noticiæ sunt. * Contra omnium serpentium uenena pro antidoto sunt, si ex sale & oleo uel butyro edantur, iusq; earû itidem sorbeatur: contra inueteratos tendinum rigores pollent. Illitus earum cinis, profluentis sanguinis impetus sistit: explendis alopeciarum inanitatibus ex liquida pice illinitur. Dioscorides.

De aereis & uolatilibus:

HIRVNDINES, uti ficedulæ, * in cibo, aciei uisus medicamentû præbent. Tam pullorum, quàm matrum in fictili olla crematarû cinis cum melle ôblitus, oculis claritatem adfert: anginæ eo comodè perunguntur: uuæ & tonsillarum inflammationibus hoc cinere succurritur. Et ipsæ, & pulli exiccati, si drachmæ pondere ex aqua bibantur, hos iuuant, qui anginæ morbo conflctantur. Dioscorides.

B GALLVS ad ius purgatorium eligatur rufus, plurimùm annosus, sed tamen adhuc ad motum, pugnam, coitum alacer, & in dimicando ualidus, macri & pinguis medius, hoc est, bene carnosus. Talis autem gallus fursure Galeno nutritus, alijs etiam melle & pauco sale, plurimùm fatigetur, uel à nobis uenantibus, uel potius dimicando decapitatus, & exenteratus, cum sale, aut sale gemmæ, igne lento, aqua sufficiente coquatur ad duarum aquæ partium consumptionem, alijs atque alijs simul incoctis, pro uarijs medicorum scopis. Medici Colonenses.

GALERITA auicula est parua, apicem in uertice, pauonis modo gestas. * Hæc assa, & in cibo sumpta, celiacos adiuuat. Dioscorides.

LOCUSTAE omnibus notæ. * Odoris suffitu urinæ difficultates adiuuant, præsertim quæ foeminas malè habent. Dioscorides.

CICADAE passim in Italia cognoscuntur, atq; adeò inibi uulgaris noticiæ sunt, ut sepe æstate asiduo cantu messorum, agricolas, ac uiatores in campis pestribus obtundant. * Quæ in assatæ manduntur, uesciæ doloribus profunt. Siccis quidam utuntur ad colicos affectus, cum paribus numero piperis granis, dantq; aut tres, aut quinque, aut septem, per intermissionem scilicet, & ipsos etiam paroxysmos. Dioscorides & Galenus.

CANTHARIDES officinis notæ sunt. Probantur in frumento inuenta, uersicolores, & quæ luteas in alijs transuersas lineas habent, corpore oblongo. Cri-

go. Cribro aut fictili nase conduntur, cuius os raro linteo subligatum deor-
sum uertitur, ut excepto habitu aceti quàm acerrimi feruentis æstu exani-
mentur. Postea siccantur, & pyxidibus ligneis, aut fictilibus uitratis reponun-
tur. Biennium durant. * In remedijs externis, tum ijs quæ uescas excitant,
tum alijs interdum totæ sumuntur. Recentiores autem alas & pedes aufe-
runt semper. Florentini.

DE ANIMALIBVS VENE-

NOSIS CAP. XX.

QVibus datæ sunt **CANTHARIDES**, signa eueniunt grauissima. Ab
ore enim ad uescâ usq; cuncta erodi sentiuntur: picâ aut simile quiddam
cedriæ respiciunt: dextra præcordia inflantur: urinâ ægrè reddunt, &
subinde cum lotio sanguinem emittunt: strigmenta non secus, atq; dysente-
ricis, aluo deferuntur: fastidia urgent: animo linquntur, obortaq; uertigi-
ne concidunt: postremò mente abalienantur. * Ergo antequam tale nonni-
hil accidat, dato oleo, aut supradictorû aliquo, uomere cogatur. mox ubi uo-
mitione plurima reiecerût, halicę aut oryze, tragi aut ptisanę cremor, aut de-
coctû maluę, aut seminis lini, aut scœnigræci, aut radicû altheæ clystere infun-
datur. Præterea nitrû eisdem dandum, ex hydromelite, ut quę stomacho ad-
huc, aut intestinis adhærent, eluendo excernantur, ac descendant. Quæ nisi
sic discutiantur, ingesta in aluum ex nitro aqua mulsa uacuari debent. Detur **B**
deinde uinum, aut passum, in quo pineoli nuclei, aut cucumeris semina con-
trita sint, aut ex lacte, aut mulsa, aut anserinus adeps in passo liquefactus. In-
flammatæ autem partes, hordei farina cum mulsa decocta perungantur. Ab
initio admota cataplasmata nocent, quòd citatus ab eis calor, illapsum uirus
ita remoratur, citò in principes se partes insinuet: ipsa tamen interiecto tem-
pore, molestissimis inflamationibus opitulatur, utpote quę dolores & per-
mulceant, & leniant. Tum ubi corpus calfaciente oleo inunctum fuerit, in so-
lium descendere oportet, ac lauare, ut per cutem summâ, quæ corpori noxia
inhæserunt, etiam excernantur. Et deiectiones multifariam moliri oportet, in
affectus infigatur, & stabilitatem capeffat. Gallinaceis carnibus, & hædinis
aut suillis, catulis maximè pinguibus, & tenerimis, ac cum lini semine co-
ctis, uesci debent: siquidem aluum cient, atq; uenenorum acrimonias hebe-
tant. Vinum dulce liberalius ebibatur. Prodest thuris cortex, & Samia terra,
si quaternæ singulorum drachmę cum passo sumantur. item pulegium ex a-
qua tritum: irinum aut rosaceum, cum rutæ decocto: recentes uitis ramuli,
cum passo detriti. Longè omnium potentissimè antidota auxiliantur, cum
aqua mulsa, drachmis quatuor pota. Dioscorides.

Iis qui **ERVCA S PINORVM** hauserint, illicò dolor in ore & palato ex-
oritur: uehemens alui, linguę, ac stomachi inflammatio torquet: intestina
dolor

A dolor ex cruciat, ita ut pruriginem sentire uideatur: corpus totum exaestuatur: fastidium urget. * Quibus est succurrendum remedijs, quæ deuoratis catharidibus datur. Peculiariter tamen pro simplici oleo & irino, melinum, quod è cotoneis pomis & oleo temperatur, accipiemus. Dioscorides.

Qui **BVPRESTIN** biberunt, non dissimile nitro uirus sapiunt: stomachi, uentrisque uehemens dolor insequitur: tam uenter quam stomachus mirum in modum, ut in aqua inter cutem difflatus, inturgescit. Vniuersa corporis facies contenditur: urina supprimitur. * Quibus eadem, quæ potis cantharidibus auxiliantur. Priuatim post uomitus & uacuationes, quas clysteribus molimur, aridæ ficus profunt: item earum decoctum, ex uino. Vbi uerò iam ferè pericula inclinantur, Thebaicarum palmularum cibo, aut earundem tritarum in mulso, aut lactis potu, iuuantur. Pyrorum etiamnum omne genus esse, & lac humanum bibere conuenit. Dioscorides.

Si **SALAMANDRAM** hauserunt, lingue inflammatio consequitur: mens & sermo præpeditur: tremor cum torpore, aut horrore quodam, ac exolutione accedit: partes nonnullæ corporis liuoribus circumquaq; sugillantur: sæpeq; diutius immorante ueneno, putrescentes desuunt. * Quibus præstabilimus cuncta, quæ potis cantharidibus. Peculiaria uerò remedia, resina pinus, aut galbanum ex melle linctum, & aiugæ decoctum, in quo nuclei pinei conterantur: urticæ quoq; folia, cum lilijs & oleo decocta. Profunt etiam oua **B** testudinis marinæ, aut terrestris cocta: item ranarum ius, cum quibus eringij radix incocta sit. Dioscorides.

Qui **LEPOREM MARINVM** biberunt, piscium uirus olent: procedente tempore, alius dolore afficitur, & urina sistitur: & si quando eam reddere conringat, purpureum colorem referet: omne piscis genus addersantur, & odio habent: fetido ac graui sudore manant: biliosus uomitus, interdum sanguini promiscuus, subsequitur. * His dandum lac asininum, uel passum continuè, aut radicis maluæ foliorumq; decoctum, aut trita cyclamini radix cum uino, aut ueratri nigri, aut scamonijs succi drachma, cum aqua mulsa, puniciq; mali acinis. Cedria contrita cum uino efficax est: anserinus sanguis, ut tepebit, potus. Sed cum pisces omnes respuant, aspernenturq;: solis fluuiatilibus cancris uesci possunt, bibuntq; eos admisto uino, adiutiq;: ab his percoquant. cumq; appetere & comesse pisces cœperint, suæ salutis indicium habent. Dioscorides.

RVBETA, aut **RANA PALVSTRIS** assumpta tumores ciet: pallor corpus uehementer decolorat, ut planè buxum spectetur: spirandi difficultas torquet: & grauis halitus oris, singultusq; inuita interdum genituræ profusio consequitur. * A diuantur secundum uomitionem: multo meri potu, & arundinis radicis binis drachmis, aut cyperi totidem. Breuiter, cogendi sunt, ut uehementi ambulationi & cursui se credant, ob torporem, quo corripuntur. quinetiam quotidie lauandi sunt. Dioscorides.

HIRVDI-

HIRVDINE S cum aqua deuorata, si ori uentriculi adherent, tractione A partium nonnullam suctionis imaginem præbent: eo enim argumento hausta hirudo deprehenditur. * Has muria sorbitione excutit, & Cyrenaicus succus, aut laserpitij folia, aut betæ, cū aceto, aut pota niuis glebula, cum posca. nitrum ex aqua gargarizatur, aut atramentum sutorium aceto dilutum. Si faucibus hæreant, in aquam calidam ingressis, aqua frigida ore contineatur, & ad eam hirudines exilient. Dioscorides.

De **R**ABIOSI CANIS morfu sermonem alijs præposuimus, quod id animal domesticum ac frequens esse consuevit, & in rabiem sæpius agitur, ac perit, ab eoq; cauere difficile, inde periculum ineuitabile hominem manet, nisi multis utatur auxilijs. Canis plerunq; flagrantissimis estibus in rabiem efferatur: interdum quoties frigora incellerunt. Rabiosus autem potum & escam auersatur: largam spumantemq; pituitam naribus & ore projicit: toruè & solito tristius intuetur: in omnes passim sine latratu irruit, & æquè feras hominesq;, tam familiares quàm ignotos mordet: nec protinus in festum quicquam infligit, nisi, ut uulnus, dolorem: exinde morbus ille, qui ab aquæ metu hydrophobicus Graia est uoce appellatus, contrahitur. Euenit autem cum distentione neruorum, totiusq; corporis rubore, præsertim faciei, cum sudore & languore quodam. Aliqui auræ splendorem fugiunt: alij sine ulla doloris intercapedine uexantur. Sunt etiam qui canum more latratus ædât, & obuiam factos morfu adoriantur, ac mordendo simili uitio labefactent. B Proinde ex ijs qui hoc uitium senserint, neminem seruatum uidimus, nisi forsitan ex historia unum aut alterum euasisse audiamus. siquidem Eudemus superasse quendam affirmat. Themisonem aliqui demersum in hunc furorem incidisse, & euasisse fatentur. Alij ipsum cū amico aquam expauescenti morem gereret, & officium exhiberet, quadam naturarum concordia, similem contraxisse affectum: sed post multos tandem cruciatus seruatum extitisse. Molestissimum itaq; genus morbi, à quo multos, anteaquam ipsum experirentur, uindicauimus, & complures ab alijs medicis seruatos nouimus. * Ratio medendi duplex: una communis, qua utendum in omnes morsus, quos uirulentæ animantes impresserunt: alia peculiaris, priuataq;, eorū duntaxat, quos rabiosi canes momorderint: quæ nonnullis quidem summam opem ferre consuevit: alijs uerò inutilis, maximè qui ex multo iam tempore ictum acceperunt. Quæ ad hanc pertinēt, primū exponemus: deinde cursim perstringemus, quæ ad communem medendi rationem pertinent. Cancros itaq; fluuiatiles in sarmentis albæ uitis cremare oportet, & cinerem eorum, quàm minutissimè tritum habere reconditum: itidem gentianæ radicem tusam, cribratamq; reponere. Quoties autem canis rabiosus morsum intulerit, in quaternos cyathos meraci uini, bina cineris cærorum cochlearia, unumq; gentianæ conijciantur: hæc in polentæ dilutioris modum subacta,

A acta, quatri duo bibantur. Inter principia medicamentum hoc modo detur. Atq; si ab illato morfu bini terniue dies fluxerint, curationem auspicabimur à triplicato pòdere, supra id quod ab initio retulimus. Optimum hoc aduersus rabiosorum morsus auxilium: quod & plerisq; unum satisfecit, eoq; cum fiducia uti licet. Sed ut alijs etiamnum auxilijs contra ineuitabile periculum muniamur, nihil cæteris uti prohibet. Satius autem multò fuerit, etiãsi in uanum recidat, medicamētorum inhumanos tolerare cruciatus, quàm per inertia ac desidia in discrimē adduci. Nec ita in demorsis à rabioso animali maiora uulnera uereri oportet, uti minora, & ulcusculis cutis similia: quippe maiori uulnere confertim copiosus sanguis emanans, potest nonnihil uirulentiliquoris exhaurire: quod in minoribus nò accidit, quin à maioribus abscedentes carnes hinc auferre, & labia acie scalpelli circūscribere, & prehensam hamulo aut uulsella carnem amputare oportet. In utrisq; circūstantia loca altioribus ulcusculis scarificanda, ut copiosior sanguinis uacuatio arceat, ne uenenum mēbratim insinuetur. Cucurbitulæ cū multa flāma agglutinataq; id iuuamenti præstant, ut ueneni uis extrahatur. Quæ uerò ad cōmunē mēdendi rationem pertinent, uide apud Dioscoridem lib. 6. Dioscorides.

I N T E R ferientiu uenenatoru notas, nihil de **VESPIS & APIBVS** particulatim digestimus, quòd cōspiciat omnibus sint, & nihil excellens, aut notatu dignu in his obseruetur: inter remedia tamen earu meminisse nò fuit alienum.* Igitur aduersus utraruq; ictus prodest illata malua, & hordeacea farina cum aceto, ficulneum lac in uulnus instillatum, & muria aut aque marinae fofus. Dioscorides.

D E M O R S I S A' P H A L A N G I I S locus quidē ipse, quasi ab impacto aculeo rubet, nò intumescens, nec per ambitum calidus est, sed mediocriter humescit: ubi uerò contrariorum occurſu refrixit, consequitur toto corpore tremor, distentiones poplitum & inguinum, conuulsionibus nò dissimiles. in lumbis collectio exoritur, & perpetua urinæ libido lacescit, multaq; reddendis excrementis colluctatio. Vniuersa cute frigidus sudor emanat, colla chrymant oculi, offusisq; nebulis caligat.* Horum ictibus ficulneum cinerē adiecto sale trito, & uino imponere oportet: aut radicem syluestris punice quam tenuissimè tritam: aut aristolochiam cum hordei farina & aceto subactam. Ulcera aque maris proluenda, aut apialtri decocto, foliaq; eiusdem illinenda. Lauacris perpetim utendum, & propinandum abrotani semen, anisum, aristolochia, cicer syluestre, cuminum Æthiopicum, cedrides trita, platanus cortex, & trifoliae herbae semen: priuatim autem singulorum ex ijs binas drachmas dare cū uini hemina conuenit: item myricæ fructus, & chamæpitios, & uiridium cupressi pilularum decoctum, admisto uino. Sunt qui fluuialilis cancri expressi succum cum lacte, assumpto apij semine, confestim molestijs liberare prodant. Dioscorides.

H S I S C O .

SE SCOLOPENDRA, aut dicta ophiostene, morsum intulit, locus ^A per ambitum liuore sugillatur, & computrescit: interdumq; licet raro, faeculentus atq; ruber cernitur. A morsu ipso exulcerari locus incipit, ulcusq; id negocium exhibet, ferè remedijs inuictum: præterea toto corpore prurigo quoque sentitur.

* Hæc ubi morsum infixit, sal quàm leuissimè tritus, ex aceto uulnèri inspergendus, aut ruta syluestris superponenda. Locus acida muria fouendus, & danda in potu aristolochia cum uino, aut serpyllum, aut calamintha, aut ruta syluestris. Dioscorides.

SCORPIONIS morsu inflammari statim incipit locus, & indurescit, ac intentus rubet, uicissimq; dolore premitur: modò siquidem exæstuat, modò frigore occupatur. Labor repètè fatigat, & aliquando meliusculè habet, aliquando recrudescit. Consequitur sudor, horrois sensus, & tremor. Extremæ corporis partes refrigescunt, inguina extolluntur, per sedem flatus exeunt, capilli eriguntur, pallor membra decolorat, & dolor, tanquam ex pun-gente acu, per uniuersam cutem sentitur.

* Percussis præsentis est auxilio ficulneum lac in uulnus instillatum. Scorpius ipse, qui ictum uibravit, tritus, & percusso loco impositus, suæ plagæ remedium est, ob cæcam quandam naturarum (ut constat) discordiam, quæ antipathia appellatur. Præterea tritus, & impositus cum sale, lini semi- ^B ne, & althea, scorpius conuenit. Sulphur ignem non expertum, resina terebinthina exceptum, & emplastri modo adiectum, auxiliatur. Itidem galbanum ad splenij formam ductum, & calamintha, quæ trita illinatur, & farina hordei in uino parata, in decocto rutæ. Semen trifoliæ herbæ tritum, & uulnèri iniectum opitulatur. Hæc ad affectum locum pertinent. Post hæc, quàm efficacissimis potionibus utendum, cuiusmodi sunt aristolochiæ, præsertim corticis binæ drachmæ cum uino, tusa gentiana, & pulegium decoctum, & baccæ lauri pauco numero tritæ, & calamintha cum posca, in qua magnopere discoqui debet: cupressus cum uino & ruta, nec secus ficulneum lac: laserpitium, si adsit: sin desideretur, peucedani succo utendum. efficax est potum trifolij & ocimi semen. Horum autem omnium uicem etiam pèsat ingis lauacri usus, euocatus sudor, & dilutæ uini potiones. Dioscorides.

Si MARINA PASTINACA percussit, protinus accidunt molesti dolores, assiduæ conuulsiones, lassitudo, & imbecillitas. mens percussis labat, postea obmutescunt: oculi caligant. Percussus autem locus in ambitu cum uicinis partibus denigratur, & ita obstupescit, ut tangentem non sentiat. hunc si quis premat, atra sanies, crassa, & malè olens excernitur.

* Et qui marina pastinaca icitur, omnia quæ de uiperarû morsu paulo post referemus, simili modo cõueniunt. Peculiariter autè ictus à marino scorpione, &

Ane, & dracone inferuntur, qui molestos cruciatus cient: interdum autem, sed raro, nomas excitat. Quibus absynthij, saluie, aut sulphuris ex aceto triti portio subuenit. Ipsi etiam dissecti, uulneribusq; impositi, sui cuiusq; ictus remedio sunt. Dioscorides.

A MVRE ARANEO percussis, circa morsum in orbem inflammatio exoritur, nigraq; pustula, diluta sanie turgens exurgit: proximæ partes liuēt. Rupta pustula, depascens ulcus, non ei dissimile quod serpit, occupat. Intestinorum quoq; tormina, difficultas urinæ, & frigida æsperginis offusio consequuntur. * Huius moribus auxiliatur ex galbano splenium, per se uulneri exterius impositum, ut medicamenti modo aceto tritum, & hordeacea farina cū aceto mulso illita. Quinetiam mus ipse, qui morsum intulit, si dissectus apponatur, ictus sui ueneficia luit. Resistant quoq; acini dulcis punice decocti, & illiti: item porri, & allia contrita, nec nō aquæ calida totus: sed hæc ad locum pertinent. Prodest potum abrotani decoctum, maximè si in uino detur. præterea serpyllum & galbanum, & eruca uino madefacta: recentes cupressi pilulæ cum aceto, & cyclaminus ex aceto mulso, & pyrethrum cum uino, & chameleonis herbæ radix. Nec desunt, qui literarum monumentis tradiderunt tritum murem araneum contra suos ictus commode bibi. Quâ historiam apud alios inuentam, dignam duntaxat censuimus, quæ adnotare **B** tur. Alij asseuerant, demorsum non aliàs exulcerari, nisi prægnans mus araneus fuerit: tum sanè auxiliari ferunt. Dioscorides.

Si **VIPERA** momordit, corpus intumet, uehemēter arefcit, subalbidūq; colorem concipit. Sanies à uulnere profunditur, primū subpinguis, mox cruenta. pustulæ adustis similes erumpunt: & antea depascēs ulcus, quod in proxima repens, non summa modò corporis, sed intima quoq; corripit. Gingiæ ijs cruore suffunduntur: inflammatio circa iecur erūpit: tormina, & biliosi uomitus sequuntur. Sopor, tremor, & urinæ difficultas accedit, & frigidus sudor offunditur. * Vbi uerò uipera morsum impressit, simum caprinū cum uino, studiōse impositum opitulatur. item laurus & abrotanum, & galbanum splenij loco superiectum, & origanum uiride inditum. pulli gallinarū discepti, & confestim admoti: erui farina uino subacta: radicis cortex usque eò tutus, ut in puluerem solutus abeat, & scilla tosta: detritum chamæmelū hordeaceæ farine cataplasma in aceto mulso præparatū, sed locus antè eo calido foueatur. hæc loco imponuntur. Cōtra uiperinos ictus rubus cū uino prodest. Aliqui anchusam tenui folio constantè auxiliari prodūt. Leporini coaguli in uino terni oboli bibūtur, & porracei succi hemina in mero, & foliorū apiastri succus, & syluestris ruta. hæc in uino potari debēt. Vinū frequēter bibendū, allia madēda, & cepæ, & porri recētes, salsamēta acerrima, & opipara. simplicia hæc sunt. Percussis à uipera p̄clarè auxiliatur medicamentū, quod myrrhæ, piperis, castorij, floris portulacæ seminisq; dimidio acetabulo cōstat:

H 2 hæc

hæc omnia in Cretico passo teruntur, aut in alio probato. Erasistratus in eo libro, qui de uiribus inscribitur, pleraque alia tradidit, quæ ictis à uipera auxilium ferre possunt: inter quæ talia maximè laudantur. Gallinæ cerebella cū uino pota, semen satiuæ brassicæ tritum, & acetabuli mensura cum uino potū. Quinetiā bonū est, digitum in liquidā picem intingere, deinde uinum, quo digitus fuerit elutus, bibere. Dioscorides.

CONSIMILIA supradictis in uipera eueniunt ijs, qui à CAECILIA nomine, & AMPHISBAENA demorsati sunt, eadēq; ferè auxiliantur. quare hoc uenenum priuatam descriptionem sortitum: nō est: neq; uisum est dignum, quod alio genere comprehendatur. De ijs autem mentionem hoc loco fecimus, quoniam ferè remedijs ad uiperas scriptis, percussi ab eis adiuuari soleant. Dioscorides.

A DRYINO morsis pustulæ, molestiq; dolores incidunt, præsertim quæ dilutæ saniei emissarium subest: quinetiam erosio, torminaq; cōsequuntur. * Ab eo ictis conuenit aristolochia cum uino pota, trifolium herba, radix hastulæ regiæ similiter assumpta, & fructus ex omni glandiferarum arborum genere: & tusæ ilicis radices, & illitæ parti ictæ auxiliantur. Dioscorides.

AB HÆMORRHO ictis uehementes cruciatus accidunt, qui angusta, contractaq; corpora ex continuo dolore reddunt. Ex plaga copiosus sudor effluit. & quacunq; parte corporis cicatrix ulla fuerit, ea sanguine manat. Excrementa per aluum cruenta eijciuntur, profluensq; sanguis in globo coit. A pulmone sanguinem extulsiunt, & in uomitiones effusi sine remedio commoriantur. Quos uerò dipsas percussit, solutus ac non contractus tumor premit, sitisq; usque eō pertinax, ut satiari non possit, ac sine ulla interapedine excruciet: & si potum pleno ore affatim trahant, illicō in eandem sitim relabuntur: proinde toto habitu similes sunt ijs, qui antea potus nihil hauserint. quare propter continuam sitim, & præster, & causon, aut dipsas appellatur. Hæmorrhoi, dipsadisq; morsus uelut immedicabiles à plerisque maiorum deplorati relinquebantur. quare si peculiaribus contra dipsadem remedijs egeamus, communia experiri operæ precium erit. * Protinus autem scarificatione uti, uisionem facere, & si locus patiat, extremorum amputatione opus erit: consequenter quàm acerrima cataplasmata adiuuere. de quibus sæpenumerò diximus. Nec me fugit, acres cibos, maximè à salsamentis, utiles esse. Meracæ potiones, & lauacra profunt, quæ subinde interiecto breui spacio assumenda sunt, priusquam morbi genus emerferit. quo semel erumpente, opem ferre non potest ulla medici opera. In ictu hæmorrhoi eadem profunt. Insuper quæ in commune opitulatur, ut scarificationes, uisiones, acres cibi, meraci potus, & quæ nunc in dipsade definiuimus. Quinetiam decocta uitis folia, & cum melle trita. Dioscorides.

AB NA

A AB NATRICE demorsis ulcus dilatatur, & liuidum ac ingens euadit. Sanies ex eo multa, & atra, & malè olens, non secus atque ijs quæ serpunt ulceribus, expuitur. * Si ergo morsum natrix adigit, prodest organum tritū, & aqua subactum: lixiua cum oleo indita, aut aristolochiæ cortex, aut querna radix minutim contrita, & hordei farina cum aqua & melle colliquata. Bibuntur etiam binæ aristolochiæ drachmæ in portione poscæ cyathis duobus, deinceps marrubij succus, uel decoctum alterius cum uino. fauus recens datur in aceto. Dioscorides.

CENCHRI morsum, qui uiperino ictui similis est, putridum ulcus sequitur. carnes antea, ut in aqua inter cutem, prætumidæ desfluunt. lethargo corripuntur, & ueterno pressi somnos captant. Erasistratus eos iecinore, intestino ieiuno, coliq; conflictari, auctor est. quippe dissectis ipsis, omnes ferè partes corruptæ reperiuntur. * Morsus à cenchro auxiliatur lactucæ fructus cum lini semine illitus, & satureia trita, & sylæstris ruta, & serpyllum, cum duabus hastulæ regiæ drachmis, & tribus uini cyathis, aut aristolochiæ radix, item cardamomum & gentiana. Dioscorides.

A CERASTE percussis locus attollitur, cum durtia pustulosus, è plaga sanies profluit, modò atra, modò pallidior, sed toto concretu uaricosus, intumescit: genitale intèditur, mens labat, & oculorum caligo exoritur: denique rigore neruorum distenti commoriuntur. * Si cerastes percusserit, citata partis amputatio suffragatur. quare sine mora ictâ partem amputare, aut scalpro confestim circumcidere, & ijs similia prosequi oportet. Vrentia insuper reliquijs admouenda: siquidem uirus hoc ueneno basilisci simile est. Dioscorides.

AB ASPIDE ictis uulnus exiguum prorsus, quasi ab adacta acu citratumorem conspicitur: sanguis exiguus ille quidem, sed ater distillat: caligo uelox oculos obnubit: labor in totum corpus multiplex, omnino leuis, & nō sine uoluptate consequitur. Ideo Nicander perpulchrè cecinit: At uir perit absque labore, uirens atque discolor. mediocris stomachi dolor afficit: frons perpetuò refellitur: genæ contremiscunt, quasi sine sensu in somno uellit. hos mors tollit ad diei trientem non dilata. * Cæterum ijs qui ab aspide feriuntur quæ de ceraste scripta sunt, auxilia dari debent. Nam uenenum hoc, quemadmodum basilisci, celerrimè in arterijs sanguinem cogit. Diosc.

ERASISTRATVS in libro què de medicaminibus & uenenis cōdidit, de uocato **BASILISCO** scitè ita refert: Cum basiliscus momorderit, uulnus ad auri colorem efflauescit. Itaque in plurimis, quæ uirus ei aculat, comites notæ ita se habent. * Ad basilisci morsum, ut idem Erasistratus auctor est, auxiliatur castorij drachma in uino pota: item papaueris succus. Ictuum remedia ita se habent. Dioscorides.

TARANTVLAE in Apulia innumeræ uagantur. Icti ab his diuersè torquentur:

quentur. siquidem alij perpetuò canunt, alij rident, alij plorant, alij clamitât, A
alij dormiunt, alij uigilijs afficiuntur: nonnulli saltant, plerique uomitionib.
laborant, fiuntq; phreniticis ac maniacis similes.* Huiusce ueneni uis musi-
ca mulcetur. Matthiolus.

DE ANIMALIUM PAR-

TIBVS CAP. XXI.

CEREBELLA passerum uere & autumnò captorum reponantur cû
uitello oui & melle: uel sole aut cinere siccata. Medici Colonienfes.

TERRESTRIS LEPORIS inassatum cerebrû manditur, * iu-
uandis tremoribus, qui ualetudine contracti sunt: affrictu aut cibo facilem
infantibus dentitionem præstat: exustum caput, & cum adipe urfino aut a-
ceto illitum, alopeciarum inanitatibus medetur. Dioscorides.

AGNINVS & SVILLVS, VRSINVS QVÈ pulmo impositu, * attri-
tus à calceamentis contractos, ab inflammatione tuetur. Præferuntur ex ani-
malibus pinguibus & robustis. Recentes & sicci in usum ueniunt. Siccan-
tur exempta aspera arteria in uase figulino imposita clibano, & refrigerati, fo-
lijsq; absynthij sicci inuoluti reponuntur in loco sicco per annum. Dioscori-
des & Medici Florentini.

PVLMO VVLPI SICCATUR, & cõseruatur, ut antè dicti pulmones. * Ad B
articularum affectus curandos ualet, item ad pulmonum uitia, & angustiam
peëtoris: unde eclegma, quod Arabes loch uocant, in officinis paratum pas-
sim habetur.

IECUR ERINACEI, cæterorumq; animalium sumi debet ex ipsis ani-
malibus nondum adultis, uinoq; odorato lauari: deinde uasi impositum, fur-
noq; probè siccatum, sed nõ exustum, uasis uitratris reponitur, absynthio sic-
co inuolutum, ne putrescat. Seruatur loco sicco per annum. * Cû aceto mul-
so potum, renum uitijs auxilio est: item aquæ, quæ cutem subijr: conuulsiõ-
nibus, elephantix, & malè habitis: uiscerum fluxiones exiccat. Dioscorides
& Medici Florentini.

HEPAR LVPINVM eodem quo iam dictum est modo præparatur. * In
puluerem tritum, confert iocinerosis fluxionibus, aqua inter cutem labo-
rantibus.

ASINI IECUR inassatum * esu comitialibus prodest, si ieiunis edendû
detur. Capræ uerò inassati decidua sanie, inungi lusciosos prodest: & dum
coquitur, apertos oculos halitu eius uaporari. prodest in cibo tostum ad ea-
dem. Tradunt hircini iocineris cibo comitiales deprehendi. Aprinium recès
si arefactum teratur, ex uino potum, contra serpentium, uolucrumq; mor-
sus auxilio est. Iecur canis, qui rabie exagitur, tostum, & in cibo ab emorsis
sumptum,

Asumptum, ne tententur metu aquæ, tueri creditur. Utuntur autem ad arcendos aque pavores dente eo, qui caninus dicitur. hunc à cane, qui momordit, exemptum, & folliculo inditum, pro amuleto brachio annectunt. In ueteratum autem sale mergi iecur, ex hydromelite binis ligulis potû, secundas pel- lit. Eodem modo quo cætera præparantur. Dioscorides.

TESTES GALLORVM nondum coeuntium, * deperditas in morbis vires mirificè restitunt: quam ob causam hecticis, & marasmo laborantib. morborumq; diuturnitate macrefactis utiliter exhibentur. Semen prolificû suppeditant, & uenereas vires roborant. Recentes usurpantur. Galenus.

CASTORIVM, castoris seu fibri testes sunt. Eligi debent, inquit Diosco- rides, qui ex uno principio committuntur, liquore intus ueluti seroso, odo- re graui & uirus redolente, gustu acri, mordente, friabili, ac multis naturalib. tunicis circumdato. Adulteratur gummi ammoniaco, cum castoris sanguine & castorio subactò, deindè in uesiculam coniecto & siccato. Deprehenditur fraus ex notis prædictis, tum etiam quòd factitij testes, ipsis natiuis, qui ple- runque sunt exigui, ampliores sunt. * Castoriam serpentium uenenis aduer- satur, sternutamenta mouet: menses ac partus ciet, duabus drachmis cû pu- legio poti: partus, secundasq; eijcit: cõtra inflationes, tormina, singultus, ue- nena, ixiãq; ex aceto bibitur. lethargicos, & utcuq; ueterno obdormiscẽ- tes excitat infusum: cum aceto aut & rosaceo olfactu, & odoris suffitu, idem facit: potum & illitum prodest tremulis, conuulsis, & omnibus neruorum ui- tiji. In summa, calfactoriam uim habet. Dioscorides & Florentini.

QVAB interiore uentriculi gallinæ sinu residet membrana, secti in lamĩ- nas cornus specie similis (ea uerò inter coquendum abijci solet) siccatur, * tritaq; in uino conuenientissimè stomachicis datur in potu. Dioscorides.

INTESTINA LVPI per longum & per transuersum digiti medij longi- tudine scindatur, & lauètur uino aut aqua fœniculi uel rutę: inde in clibano, ut alia exiccentur. * Ad colicos efficax est. Colonienfes.

GENITALE CERVI, sanguine prius probè expresso, uino aut aqua a- liqua abluitur: deindè in furno probè exiccatur, reponiturq; in loco sicco.

* Tritum & in uino potum, à uipera demorsis auxiliatur. remorantibus uri- nis ac coli cruciatibus affectis auxilio est, si ubi aqua probè fuerit elotum, i- ipsa statim ablutionis bibatur aqua. Aiunt in puluerem tritum, & ijs medica- mentis inditum, quæ uenerem excitant, ea ualètiora efficere. Quin & dysen- tericis mederi magno successu à nonnullis expertum est. Dioscorides & Matthiolus.

RENES SCINCORVM, qui crocodili sunt terrestres, siccati seruatur. * Venerem excitant: sperma augent.

DE OSSIBVS CAP. XXII. ^A

VNICORNVS Græciæ monoceros dicitur. * Huius animalis cornu ramentum ex uino potum, iuuat partum, & secundas educendas: nec non sudorem, uenena, pestilentiamq; abigendam, potu salubriter excitat. Datur à granis sex ad drachmam semissem, uel integram. Andernacus.

EVR nihil aliud est, quàm Elephantinorum dentium materies. * Vim astringendi obtinet. Scobs illitus paronychia sanat. Ad albas mulierum fluxiones præstat, si in tenuissimum puluerem, lapide porphyreo redigatur, propineturq; ex lactuæ seminis cremore, aqua, in qua chalybs extinctus fuerit, prius macerato semine. Rasura morbo regio laborantibus, ante cibum ex uino datur: si febris adest, ex aqua cichorij & lupulorum. Singulariter etiam ad uermes in febris ualeat: quia eos non, ut reliqua calfacientia, auget. Confert etiam diurnis obstructionibus, & stomachi dolores abigit: huius potu mulieres ad concipiendum sætum aptissimæ redduntur. Dioscorides, Matthiolus & Andernacus.

CERVINVM cornu * tostum & elotum, binis ligulis epotum, prodest dysentericis, excreantibus sanguinem, cæliacis, regio morbo, & uesicæ doloribus cum tragacantha: fœminis fluxione uulvæ laborantibus, cum liquore huic rei accommodato. Cerui cornu cõtusum, crudo fictili, luto circumlito, & in furnum indito, uritur donec albescat. Id cadmiæ modo elotum, ulceribus oculorum, & defluxionibus salutare est: infriatum dentes expurgat. Crudi cornu suffiti nidore serpentes fugantur: feruefactum in aceto, si eo gingiua colluantur, maxillarum à dentitione dolorem adimit. Dioscorides.

OS DE CORDE CERVI, * omnibus cordis affectibus confert. contra omnia uenena mirificè præstat, antidotisq; admiscetur, quæ pestilentia aduersantur. Sed cauendum est, ne huius loco seplasiarj bubulam tracheam arteriam accipiant in compositionibus, ut facere consueuerunt. Matthiolus.

CRANII HOMINIS * in puluerem redacti drachma ex aqua betonicæ assumpta, comitialibus prodest. Primum autem aqua elui, deinde uino debet, ut facilius ad partem affectam penetrare queat. In paralyti ex aqua betonicæ, uel hyssopi lauandum est detritum & paratum diligenter. Andernacus.

OSSICVLVM VERTICIS, triangulare, ad formam lapidis piscis cyprini, uulgò carpionis dicti, in caluariæ uertice, ubi saturæ committitur, intus subsistit. Id, ubi scalpello penetraueris, statim foras prosilit, anatomicis hæctenus incognitum. * Idem (inquam ossiculum) nummi Germanici cruciferi appellati magnitudine, diuinum epilepsiæ remedium est: quod morbum hunc adeò efficaciter curat, ut is nunquam reuertatur: siquidem Paracelso fides adhibenda est. Andernacus.

DE ME-

A DE MEDVLLIS CAP. XXIII.

CERVINA MEDVLLA laudatissima est. Colligitur, præparatur, & reponitur ut bubulina. * Ceruina perunctos uenenata fugiunt. Molitur, rarefacit, ulcera explet, &c. Dioscorides.

VITVLINA secundum locum in bonitate obtinet. Colligitur eodem tempore, eodemque modo conficitur, ut bubulina. * Vim habet indurata & scirrhusa corpora emolliendi, siue musculis, siue tendonibus, siue ligamentis id accidat, siue etiam uisceribus. Pelsi ex hac componuntur, uteros emollientes. Galenus.

BVBVLINA medulla tertium in bonitate locum habet: ex florenti tauro sumitur, ex ossibus, colligiturque æstatis exitu, hyemis initio. Reponitur autem uel per se, lota tantum, & ab omni immundicia repurgata, loco sicco, in uase figulino uitreato, & obturato: uel lento admodum igne, uel uase duplici liquata: postea per pannum densiorem colata, & in loco frigido seruata. * Calfacit, mollit, rarefacit, ulcera explet, &c. Dioscorides.

HIRCINA medulla quartum in bonitate ordinem tenet: * acrior ac fierior est. Colligitur atque præparatur ut præcedentes, &c.

B DE SANGVINE


CAP. XXIIII.

SANGVIS cuius in medicina usus, ex multis animalibus colligitur, dum adhuc ætate florenti sunt. Sanguis hircinus in hunc modum paratur. Maturescente uua hircus quadrimus, bene habitus, iugulatur, mediusque effluens sanguis fictili bene cocto excipitur (nam primus tenuior, postremus crassior putatur:) deinde coctus in aqua donec concresecat, arundine fissa secatur oblique & transuersim, ut quod in eo aqueum est, effluat, deinde linteo raro tectus soli exponitur, atque ita siccatur: curandum interea, ne pluujs aspergatur: deinde tritus uase nitreo, aut fictili uitreato bene obturato reponitur. Alij hircum diebus canicularibus, herbis calculum frangentibus nutriunt, & uino albo odorato, donec urina nigrescat: deinde iugulat, & in eum quem supra diximus modum præparant. Hoc præparationis genus etsi inutile non uideatur, necessarium tamen non est, cum apud Græcos sanguinis hirci non eo modo nutriti, etiam usus fuerit: sed medicamenta calculum frangentia admiscebantur. * Sanguis anseris, anatis, & hœdi, utilissimè in antidota miscetur. Palumbi autem, turturis, & columbæ, nec non perdicis, oculis cruore suffusis, & recentibus eorum uulneribus, lusciosisque illinuntur. Peculiariter columbæ sanguis, cruorem membranæ cerebri erumpentem inhibet. Hirci, capræ, cerui, & leporis sanguis in assatus sartagine, dysenterias,

terias, & cœliacorum profluua sistit: in uino potus contra toxica efficax est. A
 Leporinus sanguis ita ut teper illitus, uitia cutis in facie, lentiginesq; emacu-
 lat. Caninus comode ab his bibitur, quos efferata in rabiem bestia momor-
 derit: contra epotum toxicum auxilio est. Testudinis terrestres sanguinem
 epotû tradût prodesse comitialibus. Marinæ aut testudinis cum uino, & le-
 poris coagulo, cuminoq; contra serpentium morsus, & hausta rubetæ uene-
 na conuenienter bibitur. Taurinus cum polenta illitus, duritias discutit, e-
 molliq;. Sanguis equarum, quæ admissuram expertæ sunt, in medicamenta
 additur quæ erodunt: septica uocant. Sanguine chamæleonis genarum pal-
 pebras euelli creditum est. Hoc idem uiridium ranarum sanguine præstatur.
 Menstruus sanguis fœminarum, circumlitu conceptum inhibere existima-
 tur: aut si omnino mulier menstrua supergrediatur. leuat podagræ dolores,
 & ignem sacrum, illitus. Dioscorides & Florentini.

DE PINGVEDINE, ADIPE

ET SEVO CAP. XXV.



A **H**UMANA ADEPS ex florentibus, autumno uel hyeme colligitur. Reponitur autem uel per se, lota tantum, & ab omni cruento, alijsq; immundicijs repurgata, loco sicco ad aquilones spectante, siue figulis uasculis uitreatis, folijs lauri uel nucum siccis conuoluta & obturata: uel exemptis membranis diligentissimè trita, & duplici nase liquata, fictili uitrate bene obturato, locis siccis. * Ad ligationes neruorum, membra emaciata, contracta, indurataq; à chirurgis applicari solet. Medici Florentini.

SVILLA adeps, quæ tum Græcis tum Latinis Axungia appellatur, eodè modo colligitur, præparatur, ac reponitur, quo humana. Recens etiam & sine sale usurpatur. & quando adipem absolutè reperies, sumes adipem recentem illius anni, & sine sale conditum: quia post illud tempus mutat qualitatem: alijsq; præditus est facultatibus. * Contra uulua & sedis uitia idonea est: ambultis igni medetur. E sue uetustissima, quæque sale condita, excalfacit, & emollit: elota uino pleuriticis prodest: cinere aut calce excepta, inflammationibus, fistulis, ac tumoribus succurrit. Dioscorides & Medici Florentini.

ANSERINA adeps colligitur, præparatur & reponitur, ut humana & suilla. Calore suillam superat, & ob naturæ suæ subtilitatem magis penetrat: * eoq; rectè per anum ijs injici potest, qui rosionè in alto corporis sentiunt. Conuenit muliebribus malis. Dioscorides & Galenus.

B **G**ALLINARVM & CAPONVM adeps, ut præcedètes præparatur ac reponitur. Media inter anserinam & suillam consistit: * mollit, humorumque acrimoniam obtundit. Ad labiorum rimas, ad inangonizandam faciè, & cõtra aurium dolores conuenit. Galenus & Dioscorides.

ANATVM & ANSERVM SYLVESTRIVM, ut suilla & humana paratur & reponitur. * Efficacior est quàm domesticorum, & aliorum animalium.

VITVLINVM & HOEDINVM seuum, ut adipem præcedentes præparantur & seruantur. * Aliquantum astringunt, molliunt, &c. Dioscorides.

TAURINVM & BVBVLVM seuum conficitur & seruatur, ut adipem prænominatæ. Efficacius quàm uitulinum est: * ad rosionem in recto intestino, aut colo: nec non difficultatem intestinorum, & tenesimum experiuntibus accommodatum. Galenus.

HIRCINVM seuum ut prædictæ adipem præparatur, eodemq; modo reponitur. * Validissimè discutit, proinde podagricis auxiliatur, cum fimo capræ & croco impositum. Huic proportionem respondet ouillum. Diosc.

SEVVM CAPRINVM ut præcedentia paratur, conseruaturq;. Astringentius est: * qua ex causa decoctum cum polenta, rhoe, & caseo, dysentericis datur, & cum ptisanæ succo infunditur. Ius decocti phthisicis in forbitio- nibus prodest. datur quoque utiliter ijs, qui cantharidum uenena hauserunt. Dioscorides.

SEVVM CAPREOLI, DAMAE, & CERVI, eodem modo quo præcedentia colliguntur, præparantur, & reponuntur. Alia superius enumerata uincunt, eoq; magis sicca, terreaq; naturæ, & scirrhosis tumoribus emolliendis ex usu esse consueuerunt. Andernacus.

LEONINA adeps colligitur, præparatur & conseruatur, ut præcedetes. * In calore primas obtinet, & magis digerit: ob quod si medicamentis ad ulcera & inflammationes idoneis ipsam admisceas, plus offendes quàm iuabis, maiore nimirum adhibita acrimonia. Inueteratis autem tumoribus, atq; scirrhis, induratisq; neruorum tumoribus, ἀγκύλαι Græci uocât, maximè cõuenit. Andernacus.

PARDI & VRSI adeps præparatur ut prædicta. Minus quàm leonina sunt efficaces. Eisdem tamen uitijs accommodari possunt. * Cæterum ursinam cõstat raptos uitio alopeciæ capillos restituere, pernionibus subuenire. Dioscorides.

VULPINA adeps eodem modo colligitur, præparatur ac conseruatur, quo præcedentes. * Medetur aurium doloribus. Dioscorides.

VNGVLARVM ASINI combustarum * cinis per dies multos binis cochlearibus potus, proditur comitiales adiuuare. Eadem oleo subactæ strumas discutiunt: & illitæ pernionibus medentur. Caprinarum cinere perunctæ ex aceto alopeciæ sanantur. Dioscorides.

VNGVLARVM VACCÆ combustarum * cinis epotus, nutricibus lactis copiam præbet: mularum uerò, mulieres infœcundas reddit. Quinetiam mures earũ suffitu fugatur, ipsis carbonib. impostis, & accensis. Rasis. B

DE EXCREMENTIS V TILIBVS CAP. XXVI.

HVMANVM lac dulcissimũ est, * & maximè alit: mãmis aut exuctũ, prodest tabi, & stomachi rosionibus: contra haustũ leporẽ marinum præsidio est: oculis cruore ex ictu suffasis, cum thuris polline instillatur: podagricis utile est, cum meconio & cerato illitum. Dioscorides.

LAC omne probatur candidum, æquali crassitudine, quod ungui instillatum cogitur. VACCINVM crassum est, * corpus alit: stomachum & intestina inflatione uexat: renum & uesicæ dolori conuenit. Nocet spleniticis, hepaticis, comitialib. uertiginosis, febriculosis, & capite dolentib. Diosc.

LAC ASINAE parum nutrit: * eoq; ad ulcus in tabido abstergendũ magis, q̃ in alijs cõuenit. Idẽ etiã morbis uetriculi, renũ uesicę, p̃dest: nec nõ purgandi facultatem obtinet. Collutos dentes, gingiuasq; stabilis. Galenus.

LAC CAPRINVM * febris hectica laborantibus, & phthificis, consumptisq; ac emaciatis optimè conuenit. Post humanum, secundum in bonitate locum habet. Galenus.

OVILLVM

A OVILLVM LAC crassius est caprino, minusq; ferofum: & præpingue: * non autem usque adeò utile stomacho. Dioscorides.

E LACTE pinguisimo fit BUTYRVM, agitato in uasis lacte, donec pingue separetur. Butyrum naturà oleosum est, & emolliens: * unde largius epotum, uentrem resoluit: prodest, ubi oleum non adfuerit, contra uenena. Cum melle si infricetur, dētitiones adiuuat: gingiuarum pruritus, & oris ulcera infantibus emendat. Illitum foris capaciora alimētorum facit corpora, & ab albidis pustulis per summa scatentibus asserit. Contra inflammationes & duritias uulua, quod nec uirus respicit, nec uetustatem sentit butyrum, effi-
cax est: dysentericis, & coli excruciationibus infunditur. In medicamēta ad-
di solet, quæ pus mouent: utile præfertim cūn nerui, aut cerebri membranæ,
uesicæ ceruix, uulnera acceperit. Id autem purgat, replet, carnem creat: ab
aspide percussis utilissimè imponitur. Recens obsonijs additum olei uicem
pensat, & adipis uice fungitur in bellarijs. Dioscorides.

SERVM LACTIS macerationis materia est, & per se quidem inno-
cuum medicamentum. Præfertur, quod fit ex lacte nigrarum caprarū, in lau-
datis pascuis uisitantium, recenterq; fœtarum. * Excalfacit atq; siccit ordi-
ne primo completo, & usq; ad secundum. Quinetiam attenuat, abluuit, abster-
git, & nitrosa, qua referta est facultate, aluum absq; aliqua mordacitate leni-
ter subducit. Bilem tum flauam, tum atram ab exultis humoribus genitam
deijcit: quo fit, ut mirificè conferat maniacis, & melancholicis. Præstat item
ad uiscerum infarctus, & morbis inde prouenientibus opitulatur: nimirum
aqua intercute laborantibus, felle suffulis, & lienosis. Datur utiliter febrien-
tibus ex bile, & uiscerum ac uasorum obstructionibus. Competit etiam num-
uitijs in cute à bile, & perustis humoribus emergentibus. Quare licheni-
bus, uitiliginibus, alphis, psoris, leprisq; admodum conuenit. Mesues.

MEL optimum flauum, odore & sapore iucundo, acre, purum, since-
rum, totum pellucens, tam sibi cohærens, ut continuitatem suam quasi li-
nea longissima non intercisum seruet, si digito attollitur. Idem coquendo
paucam spumam emittit. Album etiam colore si fuerit, modò notarum bo-
nitatis aliarum nulla desit, nihilo deterius fuerit. Quin Hispani & Narbonen-
ses mittunt albissimum & longè præstantissimum, idemq; prædurum, qua-
le etiam flauum præferunt liquido: quippe quod humore aliquo est uitia-
tum. * Aluo idoneum, & stomacho utile, si aqua dilutum bibatur: uexatæ
uesicæ, renibusq; auxiliatur. Illitum ea discutit, quæ tenebras oculorum
pupillis offundunt. Abstergendi uim habet, ora uenarum aperit, humo-
res euocat, qua ratione in sordida ulcera, sinusq; commodissimè infun-
ditur. Primatum tenet uernum, deinde æstiuum. Dioscorides & Medici
Colonienfes.

CERA notissima est. Optima est subfulua, modicè pinguis, pura, odo-
rata, mel-

rata, mellis habitum quadantenus referens. Secundum locum obtinet candi ^A
cans, & suapte natura pinguis. Laudatur Pötica & Cretica. Estq; alba uel na-
tura, uel ablutione. Fit uiridis mista ærugine: rubea immissa anchusæ radice,
cinabrio tamen sæpe tingitur. * Cera omnis mollit, calfacit, modicè explet
corpora: datur in sorbitione dysentericis: ac milij magnitudine decem gra-
na ceræ hausta, lac in nutricibus non patiuntur coagulari. Dioscorides.

PROPOLIS in alueariorum foribus & rimis, cerosæ naturæ reperitur.
eligi debet flaua, odorata, styracem referens, mollis, & malthiches more ducti-
lis. * Magnopere calfacit, & euocat: aculeos, & omnia infixæ corpori extra-
hit: in uetere tussi suffita proficit: impetigines admota tollit Dioscorides.

OVVM molliculum plus alit forbili, & durum plus molli. * Luteum oui
contra oculorum dolores utile est: in assatū sedis inflammationibus prodest,
cum croco & rosaceo: & condylomatis, cum meliloto: cum uua aut fruticis
eius, quem rhoa dicunt, aut galla in patinis frigitur, ut cibo aluos sistat: per se
etiam offerri solet. Candidum oui crudum refrigerat: spirameta cutis occlu-
dit: inflammationes oculorum infusum lenit: ambusta, si statim eo perungan-
tur, pustulas non sentiunt: faciem à solis adustione tætur: fronti impositum
cū thure fluxiones arcet, auertitq;: inflammationes oculorū lana exceptū addi-
to rosaceo, melle & uino mitigat: utiliter cōtra hæmorrhoidis serpentis mor-
sus crudum sorbetur: summè tepidum prodest uesicæ rosionibus, renū exul-
cerationibus, gutturis scabritæ, reiectionibus sanguinis, destillationibus, ^B
& thoracis rheumatismis. Dioscorides.


SERICVM uermiculi, mori folijs uescentes conficiunt. Mirificè exhila-
rat. qua in re crudum eo longè præstat, quod ignem fuerit expertum: tamen-
si coctum quandoq; in usum ueniat, uerum antequā in insectorū cortinis im-
mersum inficiatur. * Excalfacit sericū, resiccatq;: ordine primo: exiccat, & at-
tenuat ea naturæ dote, ut cor recreet, lætumq;: efficiat. Quapropter laxat, fir-
mat, purificat, & illustrat spiritus. neque eius facultas uni tantum assignatur
spirituum generi in una tantum dispositione: sed ei proprium est, omnibus
æquè spiritibus opè ferre, ita ut spiritus tā uitales & animales, quam natura-
les referre ualeat, Matthiolus ex Auicenna.

DE EXCREMENTIS INVTI- LIBVS, PRIMAE COCTIONIS CAP. XXVII.

COAGVLVM LEPORIS omniū præstantissimū est: deinde hor-
di & hinnuli. Excipitur antequā ipsa animalia aliud quidquā præter
lac maternum degustauerint. Vituli marini coagulū excipitur prius
quàm cū matre ad prædā natate possit. Fumo aut sole exiccata, & loco sicco
feruantur. Annum unum, aut bienniū durant. * Leporis coagulū tribus obo-
lis ex

A lis ex uino, uenenatorū moribus, cœliacis, dysentericis, & fœminis fluxione uulvæ laborantibus, ac reiectionibus à pectore, auxiliatur. sanguinem in grumos concretum discutit. Post menstruas purgationes appositum uulvæ cum butyro, præstat mulieribus, ut cœcipiant: potum uero partus enecat, & à puerperio, pariendi spem adimit. Equi coagulum, quâ hippacem aliqui uocant, priuatim cœliacis, dysentericisq; conuenit. Hœdi, agni, hinnuli, capræ laticornis, & dorci, apri, cerui, uituli, bubaliq; coagula, similes naturas sortuntur: contra aconiti potum in uino, & concretum lac in aceto conuenienter assumuntur. Hinnuli priuatim triduo à purgationibus admotum, partus spem intercipit. Vituli marini, castorei uires representat: comitialibus, strangulatis uuluis, potu conferre existimatur. Sed si sit uituli marini, hoc experimentum est: aqua inspergitur, quâ paulisper cum alterius animantis, tū præcipuè agni coagulum, maderit: nã si erit sincerum, statim liquefit in aquâ: sin minus, conlimile permanet. In summa, coagulum omne dissipata cogit, & coacta dissoluit. Dioscorides & Medici Florentini.

DE STERCORE CAP. XXVIII.



STERCVS

STERCVS ANSERINVM exalfacit uehementer: * regium mor-
bum curat, drachma una cum uino albo potū, per dies octo continuos,
ieiuno stomacho. A

COLVMBARVM stercus uehementer exalfacit, & urit: * cum hordea
cea farina mixtum, strumas ex aceto discutit: carbunculos emarginat, tritum
cum melle, lini semine & oleo: ambustis igni medetur. Dioscorides.

CICONIÆ stercus * si ex aqua hauriatur, comitialibus prodesse cre-
dunt. Dioscorides.

ASININVM stercus, & **EQVINVM** * siue crudum, siue crematū, ad-
dito aceto, sanguinis eruptiones cohibet.

CANINVM stercus, * quod flagrantissimo canis sydere fuerit exceptū,
cum uino aut aqua potum, aluum silit. fistula gutturi insufflatum, angina
curat: sicuti & dysenteriam ex lacte caprino hauustum, in quo prius igniti cal-
culi fuerint extincti, aut ignitum ferrum. Quinetiā periodicas, circulare siue
fugat febres, si cochlearis mensura in accessu ex uino præbeatur bibendum
inicio patiente. Præstantius, quod candidius est, è canibus ossa comedenti-
bus. Galenus & Dioscorides.

VVLTVRINVM stercus * nidore partus excuti prodūtur. Dioscorides.

CAPRINVM stercus * ad sanguinis fluorem prodest: cum pipere, cumi-
no, & similibus potum, ad morbum regium conducit. cum pipere & cinna-
momo, menstrua prouocat, & aquam inter cutem educit: splenis etiam duri-
tiem discutit. ex aceto uenenis aduersatur. Extrinsecus adhibitum ad alope-
ciam confert, & ambusta ex aceto & oleo rosaceo curat. cum axungia autem
coxendicum dolori medetur: uentri impositum hydropicis auxiliatur. An-
dernacus ex Galeno. B

HVMANVM stercus * illitum, uulnera ab inflammatione uindicat, & os-
biter intumescere non patitur: sed ea statim glutinat. sicco ex melle angina
perungi commodissimè traduntur. Dioscorides.

BVBVLVM stercus * si recens admoueatur, uulnerum inflammationes
mitigat: folijs autem inuoluitur, & calfactum cinere feruenti superponitur.
coxendicis cruciatus fotu compescit: illitum ex aceto duritias, panos, &
strumas discutit. Exiccantis, attrahentisq; est facultatis: apum uespriumq;
morsus iuuat. Humidum uere collectum, cum boues herbas depascuntur,
impositum aqua intercute laborātes iuuat. Priuatim suffitu fimi, quod à ma-
sculo boue redditum est, procidentes uulnæ reprimuntur: accensi nidore cu-
lices abiguntur. Dioscorides & Galenus.

OVILLVM stercus * ex aceto illitum sanat epinyctidas, clauos, pensiles
uerrucas, thymos, & ambusta igni, rosaceo cerato exceptum. Dioscorides.

LVPINVM stercus * ex uino albo potum colicis confert. Galenus.

GALLINACEVM stercus * omnia eadem, quæ columbinū præstat, sed
inefficacius:

DE EXCREMEN. SECUNDAE COCTIONIS. 257

A inefficacius: priuatim tamen contra uenena fungorum, & coli cruciatus ex aceto aut uino bibitur. Dioscorides.

STERCUS SVIS SYLVESTRIS aridum, * in aqua aut uino potū, reiectiones sanguinis sistit: uetustū lateris dolorem mulcet: ad rupta & conuulsa ex aceto bibitur: luxatis cum aceto rosaceo medetur. Dioscorides.

MVRINVM STERCUS * detritum cum aceto, & illitum, alopecijis medetur: cum thure & mulso calculos expellit: subditæ infantibus muscerdæ, alui deiectionem promouent. Dioscorides.

CROCODILI TERRESTRIS stercus * mulieribus colorem nutrit in facie, nitoremq; seruat. Optimū est candidissimū, & friabile, amyli modo, minimè pōderosum, in humore statim eliquescens: quod cū teritur, fermenti acorem quadantenus refert. Adulterant id sturnorū stercore, quos captos oriza pascunt, ipsumq; non dissimile uendūt. Alij amyllum aut cimoliam miscēt, & adscito anchusæ colore per rarū cribrū paulatim exprimūt, ut se contrahat in uermiculorū speciem: qui siccati pro crocodilea uēdunt. Dioscor.

DE EXCREMENTIS SECUNDAE COCTIONIS CAP. XXIX.

FEL omne desumendum est ab animalibus mediæ ætatis, quæ neque famem, neq; sitim passa, neq; exercitio nimium defatigata sint, neq; iræ nimium indulerint. Detractū à iecore, & præligatis filo uijs, quibus & admittitur & egreditur bilis, in feruentem aquā demittitur aliquanto tēpore, mox exēptum siccatur loco sicco, & reconditur. Siccatur etiam camino suspensum, nec aquæ feruenti demissum. Interdum eo utimur recenti, iam primum ab animali exempto, ueluti felle gallorum, perdicū, piscium, & similiū, quæ facile cōparari possunt, nec magno constant. * Est autē omnis fellis uis acris, & exalfaciens: intensis tamen, & remissis uiribus differūt. Siquidem præstantius in effectu esse uidetur fel marini scorpionis, & pistis, qui Callionymus appellatur, marinæ testitudinis, hyenæq;: item perdicis, aquilæ, gallinæ candidæ, & syluestris capræ. quod priuatim prodest contra suffusiones incipientes, & oculorum caligines, argemas & genarum scabritias. Ouillo, suillo, hircino atq; ursino, taurium multò efficacius. Felle omni perfacilem, præsertim infantibus, deiectionem quis molietur, si intinctum eo tomētum, aut simbriam sedi subijciat. Priuatim taurino anginæ cum melle perunguntur: sedis ulcera sanant, & ad cicatricem usq; perducit. Idem auribus fractis, & purulentis cum muliebri lacte, aut caprino instillatum, medetur: & sibilo eorūdem ex porri succo. Admisceri insueuit uulnerarijs emplastris, & circumlitionibus, quæ contra uenenata parantur: phagedænicis ulceribus, colicis, & scroti doloribus ex melle prodest: lepras, furfures cū nitro & terra cimolia quàm optimè purgat. Ouillum & uerlinum contra eadem pollet, uerūm

K ineffica-

258. DE EXCREMEN. SECYNDÆ COCTIONIS.

inefficacius hæc præstant. Vrsinum eclegmate comitiales adiuuat. Fel testu- **A**
dinum anginis, & in ore infantium nomis prodest: naribus inditum comi-
tiales erigit. Syhæstrium caprarum felle peculiariter perûcti lusciosi sanan-
tur. Hircinum idem obit munus: thymia abolet, & luxuriantes elephantico-
rum extuberationes illito reprimat. Suillum autem contra aurium ulcera,
reliquaq; omnia magno usu assumitur. Dioscorides & Medici Florentini.

HUMANAM VRINAM * suam cuiq; bibere contra uiperæ morsus, ac
uenena, incipientemq; aquam intercutem proderit: scorpionis, uiperæ ma-
norum, draconisq; morsus ea conuenientissimè fouentur. Canina ad per-
fundendos canis morsus idonea est: pruritus & lepras nitro addito expur-
gat. Sed uetus ulcera capitis manantia, furfares, psoras, & feruidas eruptio-
nes, multò magis abstergit: nomas, & præcipuè genitalium, cohibet: auribus
infusa manans pus supprimit: decoctaq; in calyce mali punici, earum uermi-
culos abigit. Pueri impubis resorpta urina, orthopnoicis auxiliatur: decocta
in æreo uase cum melle emendat cicatrices, argema, caliginesq;. ex ea, & cu-
pro, idoneum auri ferrumen cõficitur. Quod in urina subsidit, illitu ignem sa-
crû mitigat: feruefactû cum cyprino, inditumq; uulæ dolores mulcet, stran-
gulatus leuat, genas deterget, oculorum cicatrices expurgat. Taurina si cum
myrrha instilletur, aurium dolores lenit. Aprina uiribus ijsdem prædita est:
priuatim comminuit uesicæ calculos, & potu expellit. Caprina ad aquâ quæ
cutem subiit, cum nardi spica quotidie binis cyathis cum aqua bibitur, uri- **B**
namq; per aluum extrahit: aurium doloribus instillata medetur. Asinina tra-
ditur renum uitijs mederi. Lyncis urinam, quam lyncurium appellat, simul-
ac excernitur, glaciari coire' ue in calculi duritiam uulgò creditum est. quare
quod de ea proditum est, uanum esse conuincitur. Est enim quod à nonnul-
lis uocatur succinum pterygophoron, ideo dictum, quòd pennas ad se alli-
ciat. Id potû ex aqua, stomacho, aluoq; fluxione laborati cõuenit. Dioscor.

DE EXCREMENTIS TER-
TIAE COCTIONIS CAP. XXX.

SVDOR omnis malus est, præsertim equi, asini & muli. * Siquidem po-
tus, uiridem tumidamq; reddit faciem: sudorem foetidû in uniuersum
excitat corpus, præsertim sub alis. Perturbat præterea tum uentricu-
lum, tum aluum uniuersam, genitis excitatisq; flatibus in intestinis. Quòd si
bibatur ex uino, delirium facit. Matthiolus.

STRIGMENTA à balneis * calefaciunt, molliunt, discutunt: ad sedis
rimas & condylomata illinuntur. Illa uerò quæ ex palæstris puluerem sibi
asciuerunt, in sordis speciem redacta, articulorum nodos imposita adiuuât:
ischiadici in foros, aut malagmatis locum, calida commodè sufficiuntur.
Derafæ gymnastorum parietibus, simulacrisq; sordes calfaciunt: tubercula
quæ

A quæ ægrè ad coctionem producantur, dissipant: desquamatis, & ulceribus antiquis profunt. Dioscorides.

MOSCHVS excrementum est cuiusdam animalis, certo anni tēpore circa eius umbilicum ueluti in tumorem quendam concretum. Melior est Orientalis, subflauus. Adulteratur quemadmodū & cætera, quæ rara sunt: sed ex calore, odore & sapore dignoscitur, præterea etiam & pondere: nam multa admiscuntur in eo adulterando. Verūm cui sincerum & uerum experientia cognitum est, & his notis facillè fucum deprehendet. Seruatur melius pyxide plumbea, cera obturata per se. Excalfacit ordine secundo, siccatur uerò tertio. * Cor frigidum ac tremulum roborat, & omnibus ipsius affectibus opem præstat potus atq; illitus. Deterget tenues oculorum albugines, & humidas defluxiones exiccat: cerebrum roborat, & diuturnum capitis dolorem muleet, si tamen pituitæ redundantia proueniat. Coles ex eo cicino oleo macerato perunctus, promptius in uenerem excitatur. Matthiolus ex Ruellio, & Medici Florentini.

OESYPVS est succidarum lanarum pinguitudo, quam uulgò hyssopum humidā appellant: cuius parandi ratio hæc est. Succidæ lanæ molles è collo feminibusq; aqua feruēte macerantur, in eaq; lauantur donec fordibus bene expressis, purgatæ extrahuntur: deinde aqua magno impetu lignea rude agitur: aut uasculo excepta in aliam ex alto infunditur, quò largius sordida spuma supernatet: qua dissoluta, pingue supernatans aque, excipitur: rursus aqua agitur, pingueq; excipitur: & hoc deinceps tantisper fieri debet, dum consumpta pinguitudine, nihil prorsus spumæ extet. Collecta pinguitudo agitur, & aqua pura respergitur, perpetuoq; ad solem manibus miscetur, donec candida spectetur, & aquam non amplius inficiat: tum in fictili uase denso & bene cocto recōditur, & in cella loco ue frigido reponitur. * Emolliat, resoluit, calefacit, dolores sedat. Medici Florentini ex Dioscoride.

SPOLIUM SERPENTIS seu senectus anguim * in uino decocta, dolori aurium, infusu: & dentium, collutione auxilio est. Addūt eam in medicamenta oculorum, sed præcipuè uiperinam. Dioscorides.

ZIBETTVM in exteriori testiculorum utriculo cuiusdam animalis, feli, qui ueteribus ædificiorum ruinis oberrat, non absimilis. Catos hæc animalia uocant, quos sæpius Venetijs uidi ex Syria delatos. Est autem Zibettum, tanquam sudor inter huiusce animalis testiculos concrefcens, calidæ humidæq; facultatis. Id cauernulæ umbilici impositum, uulua strangulationibus mirificè prodest: proinde nec mirum est, si eo uiri peni circumlito magnam mulieribus in coitu afferant solatium.

Matthiolus.


FINIS LIBRI PRIMI.

K 2

ANTIDO.

ANTIDOTARII^A SPECIALIS LIBER II. DE AQVIS DISTILLATIS CAPVT I.

ABSOLVTO primo libro, in quo de medicamētis natura procreatis egimus, ad secundum qui de artificialibus tractat, venire tempus est: initium ab aquis distillatis sumentes. Itaque



Aque

A

A.
Aqua destil-
lata calfaci-
tes, seu con-
coquentes

B

- Capite {
 - Betonica, Salvia.
 - Maiorana, Chamomilla.
 - Foeniculi, Calamintha.
 - Anchos, Liliorum conuall,
 - Primula ueris,
 - Euphrasia.
 - Tilia, &c.
- Thorace {
 - Adianthi.
 - Betonica.
 - Hysopi.
 - Prasij.
 - Cardui benedicti.
 - Scabiosa.
 - Ireos, Herbae Peti.
 - Melissa.
 - Brunella.
 - Consolida maioris, &c.
- Corde {
 - Cinnamomi.
 - Melissa.
 - Rosmarini, &c.
- Pitui-
tam in {
 - Stomacho {
 - Absynthij, Menthae.
 - Foeniculi, Cinnamomi,
 - Cerefolij.
 - Serpilli.
 - Calendulae.
 - Hepate {
 - Absynthij, Origani.
 - Centaureij minoris.
 - Eupatorij, Foeniculi.
 - Splene {
 - Aristolochia, Nasturtij.
 - Absynthij, Calamintha.
 - Gentiana, &c.
 - Renibus & uesica {
 - Eruca, Vrtica.
 - Saxifragia, Parietaria.
 - Quinquefolij, Raphani.
 - Enula, Pimpinella, &c.
 - Matrice {
 - Arthemisia, Calamenthi.
 - Pulegij, Sabinae.
 - Leuistici, &c.
- Atram
bilem in {
 - Capite, — Lupulorum, Fumiterrae, &c.
 - Thorace, — Melissa, Cardui benedicti, &c.
 - Corde {
 - Borraginis, Buglossae.
 - Melissa.
 - Rosmarini, &c.
 - Hepate {
 - Cichorij, Fumiterrae.
 - Lupulorum.
 - Afari, &c.
 - Splene {
 - Cuscuta, Scolopendrij.
 - Thamarisci.
 - Thymi, &c.

K 3

De aquis

De aquis refrigerantibus sanguinem.

A

LACTUCA domestica Maio mense colligitur, tunditur, & distillatur in balneo Mariæ, uasis uitreis: deinde per aliquot dies soli exponitur uase obturato linteo, uel membrana perforata, ut quicquid excrementosum est, resoluator, simulq; expiret empyreuma: demum seruatur per annum loco aliquo frigidiore, sicco. * Refrigerat sanguinem feruifacium, hepar, & caput: somnum inducit: lac generat: sitim extinguit, &c.

PORTULACA mense Iunio in cineribus, uel uapore sicco feruente distillanda est: deinde insolanda, & seruanda in uase aliquo uitreo obturato, per annum. * Refrigerat sanguinem & hepar: sitim extinguit. Sanguinis sputo, tussi calidæ, & pestilentia confert, &c.

FLORBS NENUPHARIS albi colliguntur, cum sunt in uigore, atque in balneo Mariæ distillantur: deinde insolatur aqua: demum in uase uitreo conseruatur per annum. * Refrigerat sanguinem supercalefactum, & uiscera omnia interna. morbo regio tussi calidæ, pleuritidi, & capitis dolori confert: sitim, & febrium pestilentialium calorem extinguit: hecticæ medetur, &c.

VIOLARVM flores mense Martio, in balneo feruentis aquæ, uasis uitreis distillandæ sunt: aqua in uase uitreo obstructo insolanda per aliquot dies: deinde conseruanda per annum. * Sanguinis feruorem, & cordis, hepatis, & pulmonis calorem, sitimq; extinguit, &c.

B

OXALIDIS substantia uniuersa contunditur mense Maio, distillaturq; uitreis organis in balneo feruentis aquæ. Insolatur per aliquot dies. Conseruatur per annum. * Sanguinem, cor, hepar & splenem refrigerat pota, & forinsecus superposita. Cum theriaca bibita, pestilentia medetur, &c.

ENDIUIA seu CICHORIVM unâ cum radice tusum mense Maio distillatur in balneo Mariæ. Insolatur & conseruatur per annum. * Contra uentriculi calorem efficax est, pota per quatuor dies, mane & uespero ad quantitatem uncię unius. Cor roborat, hepar refrigerat, foris apposita, &c.

FVMARIA cum radicibus, floribus & herba contusa, circa finem Maij distillanda est, in balneo aquæ calentis: postea insolanda: demum conseruanda per annum. * Regio morbo, & scabiei conuenit. Sanguinem mundificat: sudorẽ prouocat: uentriculum roborat: adustos humores educit, &c.

De aquis distillatis, refrigerantibus, seu concoquentibus bilem in capite.

SOLANI folia cum acini sunt adhuc uirides, contusa distillantur in balneo Mariæ: insolatur aqua, & seruatur per annum. * Capitis dolori ex calido confert: calculum expellit, &c.

PAPAVERIS albi folia circa principium Iunij contuenda sunt, atq; in balneo

A in balneo feruentis aquæ distillanda uasis uitreis: insolanda postea: demum per annum conseruanda. * Somnum inducit: capitis dolorem mitigat: calorem omnem præter naturam extinguit: uitis à sole prodest, &c.

IN CAPITE etiam bilem concoquunt, aqua Lactucæ, Nymphæ seu Nenupharis: de quibus uide supra.

De aquis concoquentibus bilem in thorace.

TUSSILAGO seu **VNGULA CABALINA** mense Maio, uel Iunio incipiente distillatur in balneo Mariæ, uel cineribus, moderato calore. Insolatur, & conseruatur ultra annum. * Contra uisionem efficacis est. Phthificis confert, &c.

IN THORACE etiam bilem concoquunt, aqua Violarum, Papaueris, &c. de quibus uide supra suo loco.

De aquis distillatis refrigerantibus cor.

MALA COTONEA matura, minutim concisa, in balneo calentis aquæ distillanda sunt: aqua quæ postea seruanda ab anno uno usque ad duos. * Cor & uentriculum confortat: cibum in uentriculo retinet, uomitum compefcit: alui fluorem sistit, &c.

ROSÆ DAMASCENÆ Maio mense uitreis organis in balneo Mariæ distillandæ sunt: postea aqua per aliquot dies insolata conseruatur ad annos duos uel tres, in uase uitreo, bene obstructo. * Cor refrigerat & confortat: syncopi confert: somnum inducit, &c.

IVGLANDES seu **NVCS VIRIDES** circa finem Iunij colliguntur, cõtunduntur, atque in uase duplici distillatur organis uitreis. aqua conseruatur ad annos duos. * Refrigerat, pestilentia atque hydropi medetur, &c.

COR etiam **REFRIGERANT**, aqua Acetosæ, Nenupharis, Violarum: de quibus uide supra suo loco.

De aquis distillatis refrigerantibus stomachum.

CUCURBITA maturæ, atque contusæ, in balneo Mariæ sunt distillandæ uasis uitreis: deinde aqua per aliquot dies insolata, conseruanda ad annum. * Sitim, & calorem febrilem extinguit: ad calculum renum utilis est: renes atque uesicam mundat, urinamque mouet, &c.

SEMPERVIVVM seu **SEDVM** mense Maio uel Iunio distillanda est in balneo calentis aquæ, uel cineribus calidis: postea insolanda, ac per annum conseruanda. * Refrigerat uehementer, &c.

STOMACHVM quoque **REFRIGERANT**, aqua Cotoneorum, Rosarum, Violarum, Portulacæ, Solatri: de quibus omnibus uide supra.

De aquis refrigerantibus hepar.

HEPAR **REFRIGERANT**, aqua Endiuicæ, Cichorij, Solatri, Portulacæ, Nenupharis, &c. de quibus omnibus uide supra suo loco.

De aquis

De aquis refrigerantibus renes & uescam.

A

PLANTAGO siue maior siue minor, mense Maio in balneo Mariæ distillanda est: postea per aliquot dies ad solem posita, conseruanda ad annos duos. * Phthisicis, hydropicis, dysentericis confert: quartanæ medetur: ulcera renum curat, &c.

MELONES maturi minutim scinduntur, & in balneo aquæ feruentis distillantur. * Renum calculo prodest: urinam mouet: renes mundificat: hepar refrigerat: sitim extinguit, &c. Eodem modo Citrulli distillanda sunt.

FRAGA matura in duplici uase, organis uitreis distillantur: aqua per aliquot dies soli exponitur: deinde conseruatur per annum. * Refrigerat: sitim extinguit: sanguinem clarificat: morbo regio succurrit: hepatis prodest: calculos expellit, &c.

GRAMEN unà cum suis radicibus mense Maio distillandum est, uitreis organis, in balneo Mariæ: deinde insolanda aqua, & per annum seruanda. * Alui fluorem cohibet: renes mundificat: urinam ciet: obstructiones tollit: uermes necat.

CERASA NIGRA matura in balneo aquæ calentis uitreis organis distillatur: soli exponitur aqua per dies aliquot: deinde seruatur per annum. * Hydropi medetur pota, pro potu ordinario: paralyti linguæ, apoplexiæ conuenit: urinam ducit.

De aquis refrigerantibus matricem.

B

MATRICEM REFRIGERANT, aqua Endiuix, Lactucæ, Nenupharis, Portulacæ, Rosarum: de quibus omnibus uide supra suo loco.

De aquis distillatis calfacientibus caput, seu conuoluentibus pituitam in capite.

BETONICA mense Maio colligenda atq; distillanda est, in uase duplici, uitreis uel stanneis organis: deinde ad solem per aliquot dies exposita, conseruanda per annum. * Contra hydropem, omne genus febrium ualeat. Hepati supercalfacto, lieni, pulmone, & capiti confert: partus accelerat: uenentorum animalium morsus per sanat, &c.

SALVIAM collige dum flores profert, ac in balneo Mariæ distilla: ad solem expone & conserua. Durat ad annos duos. * Apoplexiæ, paralyti linguæ, spasmo conuenit: cerebrum roborat: menstrua prouocat, &c.

MAIORANAM mense Maio uel Iunio collige: distilla in aquæ feruentis balneo, uasis uitreis uel stanneis: & conserua per annum. * Refrigerato cerebro confert: urinam mouet: uterum calefacit: menses mouet: apoplecticos iuuat: paralyti linguæ medetur: memoriam restaurat, &c.

CHAMOMILLAM circa finem Maij collige, ac distilla. * Dolores uentris, & maximè colicum mitigat: calculum in renibus frangit: menses prouocat:

A uocat: fœtum mortuum expellit: capitis dolorem aufert, &c.

FOENICVLVM Maio mense uitreis organis distillatur, & per annū seruatur. * Cerebrū & cor roborat: pectus dilatat: tussi medetur: menses ciet: lac in mulieribus auget: uisum clarificat, oculis imposita, &c.

CALAMINTHAM Maio mense collige, atque in duplici uase distilla, & conferua. * Matricem calfacit, mundificat: menses prouocat: capitis dolorem mitigat, &c.

FLORES ANTHOS recentes collige, atque distilla per se, uel cum uino, in balneo Mariæ, uitreis organis: & serua ad annos duos uel tres. Asthmaticis, regio morbo laborantibus mirè opitulatur: concoctionem uentriculi adiuuat: sanguinem mundat, &c.

FLORES LILIORVM CONVALL. mense Maio collige: in uino optimo macera, donec fundum petant: deinde in balneo aquæ calentis, uitreis organis distilla: atq; conferua ad annos duos uel tres, &c. * Cerebrum, cor, & sensus confortat. Epilepsiam, paralyfin linguæ persanat, &c.

PRIMVLAE VERIS flores unà cum herba initio ueris collige, atque distilla, &c. * Paralyfin linguæ curat: dolores capitis à frigore mulcet: mulieribus grauidis conducit, &c.

EYPHRAGIAM florentem collige, atq; in balneo uel duplici uase distilla, ac conferua. * Oculos clarificat imposita: uisum exacuit, &c.

TILIAE flores recentes collige, atq; in balneo Mariæ distilla moderato calore, & serua. * Apoplexiæ & paralyfi linguæ medetur, &c.

De herbis excalfacientibus thoracem.

ADIANTHVM mense Maio distilla, & conferua. * Hepar & pulmones mundat: sanguinem purum reddit: calculos frangit, &c.

HYSOPVM cum suis floribus mense Augusto contunde, atq; distilla in aquæ feruentis balneo, & conferua. * Asthmaticis confert: tussi medetur: pulmones à phlegmate purgat, &c.

PRASSIUM seu **MARRUBIUM** unà cum radicibus Maio uel Iunio collige, atque in balneo Mariæ uitreis organis distilla, & serua. * Ad tussim, pectoris angustiam ualet: pectus, uentriculum, pulmones, hepar & lienem corroborat: hydropicos iuuat, &c.

CARDVVS BENEDICTVS circa finē Maij est distillanda in balneo, uel uase duplici: deinde uase uitreo conferuanda per annum. * Capitis dolorem aufert: memoriam roborat: uertiginem & quartanam curat: sudorem prouocat, &c.

SCABIOSAM unà cum radicibus collige circa finem Maij: contunde, & distilla in balneo aquæ feruentis: deinde per aliquot dies pone ad solem: & conferua per annum. * Ad laterū punctiones, & apostemata interna, tussim, pestem, & pectoris angustiam ualet.

L FLORES

FLORES IREOS mense Maio, radices uerò Martio collige, atque distilla in balneo Mariæ uitreis organis: insola, & conferua. * Hydropicis & febricitantibus conuenit, pota quotidie, mane scilicet & uespero ad quantitatem unciaë unius. Dolorem uentris, & tormina sedat, &c.

HERBAM PETI, ab insula Florida nuper allatam collige mense Iunio uel Iulio: contunde, atque distilla in uase duplici, uitreis organis: mox insola, ac conferua per annum. * Hydropicis opitulatur mirificè pota quotidie stomacho ieiuno: asthmaticos curat cum aqua euphragiæ pota: oris ulcera emendat: dentiumq; dolores mitigat, &c.

IN MAIO sume MELISSAM, contunde, atq; in uino odorato optimo macera per aliquot dies: deinde in balneo Mariæ distilla, atque conferua ad tres. uel quatuor annos, uase uitreo optimè clauso. * Memoriam lapsam restituit: sensus omnes acuit: canitiem arceat: cor, cerebrum & uentriculum corroborat: lætitiã inducit: paralyfi linguæ medetur: dentium dolores mitigat: atq; anhelitum bonum conciliat, &c.

BRVNELLA unã cum floribus circa finem Martij colligenda, contundenda atq; distillanda est: deinde conferuanda. * Linguæ nigricanti in febribus ardentibus conuenit gargarizata: pectus expurgat: febribus omnibus conducit, &c.

CONSOLIDAE maioris radix Maio mense colligitur, & tusa in balneo Mariæ distillatur. * Ossa fracta conglutinat: ruptis medetur: sanguinem ex uulneribus manantem sistit, &c.

De aquis calfacientibus cor.

CINNAMOMVM crassè contunditur: deinde in aqua fontana, uel cotoneorum, uel rosarum maceratur sufficienti, per diẽ uel noctem, & in aquæ calentis uapore, uel balneo Mariæ distillatur: aquaq; seruatur ad annos usq; quatuor. * Egregiè reficit uires.

CINNAMOMVM electissimũ confringe in tenuissimas partes: deinde in sacculũ lineum indito: suspēdaturq; hic sacculus in uase, in quo aqua sit infundo, ita tamen, ut aqua sacculũ nõ cõtingat: ac clauso diligēter uase, immitatur hoc uas in cacabũ, plenũ aqua calefacta & feruida, ita ut aqua illa, quæ in eo uase cõtinetur, in quo cinnamomũ depēdet, bulliat: maneat hoc modo aliquãdiu cinnamomum in calido illo uapore, quoad bene attrahat. Deinde cinnamomũ sic madefactũ uapore aquæ bullientis, cõrundatur, & fiat quasi pasta quedã, & simul cũ impresso liquore, quẽ assumpsit, infundatur in alembicum: si opus uidebitur, poteris adhuc aliquid calidæ aquæ affundere: sed quãto minus aquæ affuderis, tãto habebis præstantiorẽ aquã cinnamomi, ac etiã olei aliquid. Si tãtũ cupis habere aquã nõ ita præstãtem, affunde aquã copiosè, sicut quidã faciunt, ad lucrũ cõparati magis, quàm hominũ utilitatẽ: sed sic aut nullũ, aut q̃ minimũ olei habebis. Ioan. Crato, Medicus Cæsareus.

COR

A COR quoq; CALFACIUNT, aqua Melissæ, Rosmarini, &c. de quibus uide suprâ.

De aquis calfacientibus stomachum.

ABSINTHIUM circa finem Maij collige, contunde, atque in uini pauca quantitate macera per duos uel tres dies: deinde in aquæ feruentis uapore distilla: uel per se absq; uino distilla, & conserua. * Ventriculum excalfacit ac roborat, eius concoctionem iuuat: uomitû cõpescit: uermes in uentriculo & intestinis necat: dentiû doloré mitigat: ad febres quascûq; ualet, &c.

MENTHAM Maio mense colligito, contundito, atq; in balneo aquæ calentis, uitreis organis distillato, & conseruato. * Ventriculum, hepar & splenem calefacit ac roborat: concoctionem adiuuat.

CEREFOLIUM circa finem Maij collige, contunde, distilla, atq; conserua. * Ruptis excasu, & calculosis prodest: languinem concretum dissipat: uentriculo & cordi confert.

SERPYLELLUM circa finem Iunij collige, contunde, atq; in balneo Mariæ distilla, ac conserua per annum. * Caput, cerebrum, & uentriculum corroborat: cibi appetentiam excitat: urinam mouet, calculos expellit, &c.

CALENDULA unâ cum floribus Iunio mense distillanda est, atque per annum conseruanda. * Oculis & capitis ferè morbis omnibus conducit.

B **VENTRICVLUM** quoq; EXCALFACIUNT, aqua Fœniculi, Cinnamonomi, &c. de quibus uide suprâ.

De aquis calfacientibus hepar.

ORIGANVM Maio mense collige, contunde, atq; in feruentis aquæ balneo, uitreis organis distilla, ac conserua per annû. * Tussi, hydropi, & quartanæ medetur, &c.

CENTAVRIVM minus Iunio mense tusum distilla in uase duplici, & conserua in uitreo uase per annum. * Lumbricos interim: febres curat: stomacho refrigerato competit: cibi appetentiam excitat, &c.

EVPA TORIVM mense Maio uel Iunio distilla in balneo aquæ calētis, & conserua per annum. * Ictericam curat: hepar corroborat, eiusq; obstructions aperit, hydropem curat, &c.

HEPAR quoq; EXCALFACIUNT, aqua Absynthij, Fœniculi, &c. de quibus uide suprâ suo loco.

De aquis splenem excalfacientibus.

ARISTOLOCHIAM circa Maij finem colligito, contundito, ac in duplici uase distillato, & seruato. * Ad spasimû, podagram ualet, superposita: tormina uentris bibita curat, nec non epilepsiam, punctiones laterum, &c.

NASTVRTIVM Maio mense distilla in balneo Mariæ, & per annû conserua. Variolas curat cum melle superposita: lumbricos expellit: urinam mouet, &c.

268 DE AQVIS EXCALFAC. RENES ET VESIC.

GENTIANAE radicem unà cū herba recenti, in Maio colligito, cōtundito atque uitreis organis duplici uase distillato, ac conserua. Vel radices saltem Iulio mense recentes minutatim incidito, atq; distilla, ut suprā. * Vitam prolongat, quotidie pota stomacho ieiuno ad fescuncię quantitatem: febres curat: prouocat menstrua: appetitum excitat: stomachum mundificat, atque hominem in sanitate conseruat.

SPLENEM quoque **EXCALFACIUNT**, aqua Absynthij, Calamem thi, &c. de quibus uide suprā suo loco.

De aquis excalfacientibus renes & uesicam.

ERVICAM Maio mense collige, atque distilla. * Excalfacit: urinam mouet: semen generat: uentrem laxat: stomachum confortat.

VRTICAM Iulio mense cum floret, colligito, ac distillato. * Ad uentris tormina calculum, tussim, asthma, & lumbricos ualet.

SAXIFRAGIAM mense Maio collige, contunde, atque in balneo Marię distilla, & conserua per annum. * Calculum frangit: arenas ex renibus & uesica educit: urinam ciet, &c.

PARIETARIA in fine Maij colligitur, contunditur, ac uasis uitreis in aquę feruentis balneo distillatur, conseruaturq; per annū. * Hepatis & lienis obstructiones referat pota per dies aliquot: renes & uesicā mundat: menstrua commouet: tormina uentris sedat.

QVINQVEFOLIUM seu **PENTHAPHYLLUM** mense Maio collige, contunde, atque in balneo distilla, & conserua per annum. * Calculos expellit: renes mundificat: uentrem laxat: febres putridas radicitus expellit, pota per aliquot dies, &c.

RAPHANI radices mense Septembri collige, contunde, atque in duplici uase, uitreis organis distilla, & conserua per annum. * Calculos renum frangit: renes mundificat: urinam promouet: menstrua ciet: regio morbo prodest.

ENVLAM unà cum herba & radicibus Maio mense contunde, & distilla. * Urinam ciet: renes & uesicam mundat: calculos & arenas educit: caput & uentriculum roborat, &c.

PIMPINELLA unà cum radicibus & herba mense Maio colligenda est, contundenda, atque in balneo Marię distillanda, & conseruanda per annum. * Calculos expellit: renes mundificat: menses ciet: pestilentię medetur, &c.

De aquis excalfacientibus matricem.

ARTHEMISIAM Maio mense colligito, contundito, atque in balneo distillato. * Ad tussim, mēstruorum suppressionem ualet: somnum inducit: uentriculum excalfacit: hydropem curat per 40. dies pota, &c.

PVLEGI-

A PVLEGIUM cum flores profert, legito, contundito, ac distillato. * Vterum exalfacit: menses commouet: secundinam expellit: crassos in pectore humores incidit: tormina uentris sedat: phlegma consumit, &c.

SABINAM Septembri mense collige, contunde, ac in balneo distilla, & per annum conserua. * Retentos menses prouocat: uertiginem aufert, fronti superposita.

LEVISTICUM mense Maio distilla, uitreis organis in balneo Mariæ: & conserua per annum. * Calculos expellit: dolores capitis mulcet, superposita: matricis ulcera curat, &c.

De aquis alterantibus bilem atram in capite.

LVPVLORVM summitates circa Aprilis finē legito, contundito, ac in balneo Mariæ distillato. * Sanguinem ab adustis & melancholicis humorib. purgat: scabiei, lepræ confert: lienis obstructions aperit, &c. Cæterum bilē quoq; atram in capite concoquit, aqua fumiterræ: de qua uide supra.

De aquis concoquentibus bilem atram in pectore.

IN PECTORE bilem atram concoquunt, aqua Melissæ, Cardui benedicti, &c. de quibus uide supra suo loco.

De aquis alterantibus bilem atram in corde.

B BORRAGO, cum floret, legenda est, unâ cum radicibus, herba, & floribus: contundenda, ac in duplici uase, uitreis organis distillanda. * Cor & cerebrum roborat: sanguinem mundat, &c.

BVGLOSSA mense Iunio distillanda est. * Syncopē, mœrorem aufert: lætitiâ parit: cor & cerebrum confortat, &c.

IN CORDE etiam bilem atram concoquunt, aqua Melissæ, Rosmarini, &c. de quibus uide supra suo loco.

De aquis concoquentibus bilem atram in hepate.

ASARVM mense Augusto uel Septembri colligito, contundito, ac distillato. * Febres omnis generis pellit: partum uiuum expellit, &c.

IN HEPATE quoque atram bilem cōcoquunt, aqua Cichorij, Fumiterræ, Lupulorum, &c. de quibus uide supra suo loco.

De aquis concoquentibus bilem atram in splene.

CVSCVTA, cum nodos uel semina profert, distillanda est. * Lienem, hepatis & palmones mundat: regium morbum curat: lapidem ex renibus pellit, &c.

SCOLOPENDRIUM mense Maio colligito, ac distillato. * Splenis & hepatis obstructions tollit: sanguinem mundificat: quartanam curat: cor roborat.

CORTICES & folia TAMARICIS Maio mense legito, ac uitreis organis, du-

270 DE AQVIS COMPOS. CONFORTANTIB.

nis, duplici vase distillato, & per annum seruato. * Lienis obstructiões, & du A
ritiem tollit: sanguinem mundat: splenem roborat, &c.

THYMVM Iunio mense distillandum est. * Cerebrum, uentriculum &
splenem roborat: quotidianam febrem curat, cum absinthij aqua pota, &c.

De aquis purgantibus.

EBVLVM, cum flores profert, legito, contundito, ac in balneo Mariæ ui
treis organis distillato: & conserua per annum. * Vêrem laxat pota ad ʒ. iij.
quantitatem: hydropem curat: quotidianam febrem tollit.

AQVA CORTICVM SAMBUCI * uentrem laxat, hydropem curat,
&c. Aqua foliorum sambuci refrigerat, capitis dolorem mulcet. Aqua uerò
florum sambuci pectus dilatat, hydropicis confert, hepatis, lienis ac renum
obstructiones aperit: tertianam febrem curat, uentriculum roborat, sangui-
nem mundificat, &c.

DE AQVIS COMPOSITIS CONFORTANTIBVS.

De aqua caponis.

CAPO generosus in aqua pura decoquitur, cum
Folijs Borriginis, Buglossæ ana M. i.

Conseruæ Violarum, Rosarum, Borriginis, Buglossæ ana ʒ. ij.

Addito modico ex pulueribus cordialibus.

Distillentur omnia in balneo Mariæ: deinde aromatiza cum puluere triafan B
tali, & propina creberrimè. Andreas à Lacuna.

Aqua caponis alia.

PVLP A unius capi, detracta pinguedine & pelle, minutim incidatur, &
cum aqua buglossæ abluatur. Deinde addita

Conseruæ Violarum, Borriginis, Buglossæ ana ʒ. j. β.

Conseruæ rosarum ʒ. j.

Foliorum auri n. vj.

Misceantur omnia diligenter, deinde in duplici vase reponantur, & secun-
dum artem distillentur. * Huius liquoris frequenter cochlear unum exhibi-
tum per se, aut cum iusculis dissolutum, collapsas uires restaurat. Gesnerus.

Aqua caponis alia.

R. PVLPAM unius capi, cursu fatigati, & uenati antequam iuguletur,
pelle & pinguedine detractis, & in aquis nenupharis & lactucæ abluatur,
addendo

Conseruæ Violarum, flor. Nenupharis ana ʒ. j.

Conseruæ Borriginis, Buglossæ ana ʒ. j. β.

Seminis Papaueris albi, Lactucæ ana ʒ. j.

Pul. diamargaritonis frig. ʒ. j. β.

Succi pomorum odorat. ʒ. ij.

Misceantur

A Misceantur omnia simul, & in duplici uase reponantur: destillentur secundum artem. Utatur ut supra. * Extremè dissolutis uiribus à febre conueniēs est. Gesnerus.

Aqua caponis alia.

CAPONI plurimum à nobis fatigato & occiso pennæ siccæ euellantur citra ullam aquæ immersionem seu macerationem: eumq; caponem ita deplumatum, & exinde euisceratum, minutim unà cum ossibus, stomacho, hepate & corde conscinde, atq; ad macerandum affunde

Aquæ rosarum lb. j. β.

Aquæ buglossæ lb. j.

Aquæ melissæ lb. β.

Vini maluatici lb. j. ꝑ. iij.

Cinnamomi electi ꝑ. ij.

Croci ꝑ. j.

Seminum endiuizæ ꝑ. iij.

Galangæ ꝑ. j.

Zingiberis, Nucis moschatæ, Macis, Santali citrini ana ꝑ. j.

Cor. citri ꝑ. j. β.

Florum cordialium ana ꝑ. j.

B Coriandri præparati, Seminis melonum ana ꝑ. ij.

Pinearum ꝑ. j.

Florum arantiorum conditorum ꝑ. β.

Stent hæc omnia in infusione per horas uiginti quatuor super fornacem, uel in alio loco calido: exinde superimposito adaptato alembico distilla per balneum Mariæ, & in distillato liquore extingue aurum candens, præsertim tempore usurpationis. Colonienses.

Aqua caponis alia.

CAPONES duos generosos sumito, quorum unum tam diu, donec ab ossibus carnes separentur, coquito: exprimito, atque ius ad usum seruato: alterum uerò caponem una saltem bullitione coquito, deinde minutim scindito. Quo facto, in uesticæ, seu cucurbitæ uitreæ fundo foliorum borraginis M. iij. ponito: mox supra hæc tantum medullæ panis, in supra dicto iure madefactæ, quantum ad sorbendum totum ius sufficiat, collocato: demum caponem indito, atque in cineribus, uel arena, uel balneo sicco, leui calore distillato: ac conseruato. Florentini.

Aqua cochlearum.

MENSE Martio uel Aprili cochleas quantum uoles sumito: atq; in loco aliquo per dies quatuor uel sex ad purgandum finito: postea in aqua coquito: extrahito, atq; primùm cum aceto, deinde cum aqua, demum cum uino mundato.

mundato. Quo facto, minutim scindito, & ut suprâ distillato, ponendo prius A in cucurbitæ fundo, aliquot folia borraginis, ut antè dictum: absq; tamen pane. Florentini.

DE AQVIS ALTERANTIBVS COMPOSITIS.

Aqua uita aurea.

℞. Florum liliorum conuall. bonam partem: flores infundatur in uino bono ueteri, per octo dies, deinde distillentur per balneum Mariæ lentissimo igne: deinde

℞. Aquæ stillatitiæ cerasorum nig. ℥. j. β.
Misce simul. Quibus aquis infunde

Florum lauendulæ M. j. β.

Florum anthos M. j.

Caryophyllorum ℥. j. uel ℥. ij.

Macis ℥. β. uel ℥. ij.

Scillæ præparatæ ℥. ij. β.

Diptamni albi ℥. ij.

Cubebæ ℥. β.

Visci quercini ℥. ij.

Rad. pæoniæ ℥. ij.

Incidenda incidantur, & conuassanda conuassentur, & in uapore aquæ calentis ter distillentur: aqua que in uase uitreo optimè clauso conseruetur.

* Est optima atq; expertissima contra epilepsiam. Ioannes Langius.

Aqua alia ualde bona.

℞. Aquarum Buglossæ, Betonicæ, aquæ florum Tiliæ ana ℥. j.

Aquæ ardentis optimæ ℥. β.

Flor. anthos, Rosarum rub. Maioranæ, flor. Buglossæ ana M. j.

Spec. confectionis Anacardinæ ℥. ij.

Infundantur flores aliquantulum contusi in aquis, quilibet recens, suo tempore, dum haberi potest, & tandem species: stent ita simul in sole, uel loco digestionis per mensem, postea extrahatur aqua per alembicum in balneo.

* Est medicina Diuina ad memoriam confortandam. Langius.

Aqua mirabilis.

℞. Florum Primulæ ueris, florum Rorismarini, Maioranæ, Iuæ arthetice ana M. j.

Spec. Diamoschi, Diaplrinis, Diambæ ana ℥. β.

Spec. confect. Anacardi ℥. j.

Cubebæ, Ligni aloes, Nucis moschatæ, Caryophyllorum, Macropiperis, Carpobalsami ana ℥. j.

Radicum Acori, Ireos, Aristol. rotundæ ana ℥. j. β.

Sem.

- A** Sem. Silari montani, Pæoniæ, Fœniculi ana ʒ. j.
 Aquæ herbæ paralyfis, Saluiæ, Betonicæ ana ℥. j.
 Aquæ florum tiliæ ℥. j. β.
 Serapini, Opopanacis, Myrrhæ, Gummi iuniperini ana ʒ. j. β.

Stent omnia simul mixta in infusione per dies octo: postea extrahatur per alembicum ter, in cineribus calidis, uel uapore siue balneo sicco. * Est mirabilis iuuamenti in præseruatione ab apoplexia, & omnibus ægitudinib. neruorum frigidis, curâs paralyfim, torturam, spasimum, & mirabiliter restituens loquelam, &c. Langius.

Aqua Bezoartica.

- ℞. Chelidoniæ cum rad. lotis M. iij. β.
 Rutæ M. j.
 Scordij M. ij.
 Diſtamni Cretici, Cardui benedicti ana M. j.
 Zedoariæ, Rad. Angelicæ ana ʒ. iij.
 Cort. mali citri, Cort. limonum ana ʒ. ij. β.
 Florum tunicæ, Rosarum ana ʒ. ij.
 Cinnamomi ʒ. ij. β.
 Caryophyllorum ʒ. ij.
- B** Incidenda incidantur, & triduum macerentur in ℥. iij. uini sublimati fortissimi,
 Vini maluatici, Aceti flor. tunicæ ana ℥. β.
 tandem lento igne per balneum Mariæ distillentur. Cui adde
 Theriacæ Alexand. ʒ. iij.
 Mithridatij ʒ. j. β.
 Caphuræ ʒ. ij.
 Trochiscorum de uipers ʒ. j.
 Macis ʒ. j.
 Cinnamomi ʒ. iij.
 Caryophyllorum ʒ. ij. β.
 Conseruæ florum tunicæ ʒ. ij.
 Cardui benedicti ʒ. j.
 Specierum liberantis ʒ. v.
 Vnicorni uel ceruini cornu ʒ. j. β.
 Macerentur in priore distillatione per biduum, & létissimo igne per balneum Mariæ distillentur bis uel ter. * Optima est atque probata contra pestem. Ioannes Langius.

Elixir, seu aqua uita.

- ℞. Caryophyllorum, Nucis moschatæ, Zingiberis, Galangæ, Piperis longi, Zedo-

M

gi, Zedoarie, Granorum iuniperi, Corticum aranuorum, Cort. citriorū, Ma-
ioranæ, Rorismarini, Menthæ, Baccarum lauri, Pulegij, Aristolochiæ rotun-
dæ, Stichados, Sigilli B. Mariæ, Cardui benedicti, Florum cheiri, Flor. primu-
læ ueris, Rosarum rubrarum, Flor. sambuci, Spicæ nardi Ligni aloes, Cube-
barum, Cardamomi, Cinnamomi electi, Calami aromatici, Saluæ, Basilici,
Gentianæ, Calamenti, Santalorum omnium, Rad. acori, Rad. pæoniæ, Gra-
norum pæoniæ, Macis, Nigellæ, Cornu ceruini, Rafuræ eboris, Chamædryos,
Chamæpityos, Melligetæ, Masticis, Thuris albi, Aloes hepaticæ, Myrrhæ,
Flor. chamomillæ, Anethi, Arthemisæ, Betonicæ ana ʒ. iij.

Flor. borraginis, Flor. buglossæ, Melissæ, Sem. anili, Fœniculi, Carui-
ana ʒ. ij.

Spec. elect. de gemmis, Diarrhodon, Triafandali, Aromat. ros. ana ʒ. ʒ.

Spec. Diamofci dulc. Diambra, Diagemmæ, Theriacæ, Diacori, Dian-
thos ana ʒ. ʒ.

Flor. lychnidis altilis rub. Flor. calendulæ, Radic. bardanæ, Radic. filicis.
ana ʒ. ʒ.

Chelidonie maioris cum radiculis à terrestri immundicia repurgatis, &
refectis folijs marcidis, ʒ. j.

Rhabbari electi ʒ. j. ʒ.

Olei terebinthinæ ʒ. j.

Omnia supradicta bene puluerizata ponantur quælibet & singula suo tem-
pore (incipiendo à uere, continuandoq; per æstatem) in aqua uitæ optima
quæ facta sit ex uino generosissimo, per alembicum uitreū, fermenteturq; in
ea toto singulorum præsertim florum & herbarum colligendorum tempore,
obturando quàm exquisitissimè uas uitreum, operculo uitreo circumluta-
to. Aqua autem uitæ, in qua macerabuntur dictæ species, sit ad pondus libra-
rum uigintisex, plus minus. Si in tres diuersas botias diuideres aquam, simi-
liter species, & res ad ratam diuide: quia securius distillabis in tribus uici-
bus quàm in una. Et pone botiam cum superimposito alembico in balneo
Mariæ sub moderato igne. Primum exhibit elixir uitæ & serua illud per se, be-
ne obturando uas uitreum, ne respiret. deinde stillabit aqua grossior, quæ so-
lùm ad uiliores usus ualet. Fæces uerò, quæ remanebunt in alembico, cucur-
bita uel uesica, æquivalent theriacæ, & seruiunt pauperibus ad plures infir-
mitates. Colonienfes.

Aqua theriacalis.

℞. Scobis ebeni ʒ. ij. uino maluatico macera, & uino albo ana ʒ. j. per
duas dies in loco calido, clauso uase, sæpe agitando.

Adde Cinnamomi, Granorum paradisi, Carui, Caryophyllorum, Pipe-
ris ana ʒ. j. ʒ.

Rad. pæonig, Nigelle, Iuniperi ana ʒ. j. ʒ.

Zingiberis.

- A** Zingiberis, Rad. angelicæ ana ʒ.ij.
 Afari, Visci recentis ana ʒ.ij.
 Croci ʒ.ij.
 Cort. rad. capparorum, Cort. tamaricis, Rad. enulæ, Rad. gentianæ, Poly-
 podij, Laphi, Cort. rad. fraxini, Epithimi, Ceterach ana q.ʒ.
 Theriacæ Alexand. lb.β.
 Distilla. Da ʒ.ij. pro dosi cum sero lactis caprini, purgato prius corpore. * Va-
 let plurimum in morbo Gallico. Syluius.

Aqua uitæ preciosissima.

- ʒ. Cardamomi, Piperis albi, Piperis longi ana ʒ.β.
 Galangæ, Macis, Caryophyllorum, Granorum paradisi ana ʒ.β.ʒ.j.
 Ligni aloes ʒ.ij.
 Zingiberis ʒ.ij.
 Cinnamomi, Cubeborum ana ʒ.β.
 Maioranæ, Rorismarini, Menthæ, Pulegij, Rutæ, Saluiæ, Nardi Gallicæ, A-
 sparagi, Florum anthos, Ros. rubrarum ana M.β.
 Sem. cumini syluestris ʒ.β.
 Anisi, Fœniculi ana ʒ.j.
B Coriandri, Sinapi ana ʒ.ij.
 Sem. pœoniæ ʒ.j.
 Sem. cumini Romani ʒ.ij.
 Rad. enulæ Camp. Rad. iridis ana ʒ.j.
 Rad. angelicæ ʒ.β.
 Rad. Teucrij, uulgò pimpinellæ ʒ.β.
 Rad. pœoniæ, Doronici ana ʒ.β.
 Dictamni albi ʒ.ij.
 Sacchari candi albi lb.ij.
 Singula inciduntur, modicèq; conteruntur, & ex uino generoso quinquies
 distillato. correctoq; macerantur in fimo, uel aqua calente diebus quatuor
 decim, ampulla diligētissimè obserata. Deinde operculum rostratum super-
 imponitur, & commissuris luto oblitis, ex balneo cum modico igne distilla-
 tur. Postea ampulla aperitur, & liquor qui effluxit, rursus super tæces fundi-
 tur, iterumq; euocatur ut antea: isq; labor quinquies reperitur. Tandem a-
 qua ardens distillata uitro conditur, & adiectis
 Croci Orientalis ʒ.j.
 Moschi, Ambræ ana ʒ.j.
 Fol. auri ʒ.β.
 optimè clauditur, siniturq; dum omnis uis extracta fuerit. * Præstâtissima est
 aqua uitæ ad morbum attonitum, comitialē, uertiginem, paralytism tum præ-
 cauendam,

cauendam, tum curandam: memoriam confirmat, roboratque: omnes facultates reficit, iuuat, & auget. Dantur guttæ tres, uel quatuor, ex aqua tilia, betonica, melissa, ceraforum, aut simili peculiari. Andernacus.

Alia minus sumptuosa.

℞. Calami aromatici ℥.ij.
Cinnamomi, Ligni aloës, Zingiberis ana ℥.j.
Caryophyllorum, Cardamomi, Macis, Cort. citri ana ℥.℞.
Florum rorismarini P.ij.
Florum lauendulæ, Florum saluiæ ana P.ij.
Flor. stæchados P.ij.
Fol. lauri, saluiæ ana M. ℞.
Nardi ℥.j.
Crocī ℥.℞.

Moschi optimi, Ambræ ana G. viij.

Omnia inciduntur, conterunturque, & ex uini stillatitij optimi ℔.j.℞. mace- rantur diebus octo, postea distillantur, exceptis croco, moscho, & ambræ. hæc enim in sindone ligata orificio operculi, aut uitro, in quo seruatur aqua distillata, imponere præstat. * Valet ad apoplexiam, paralyfim, aliosque frigidus capitis morbos: podagræ, & articularum doloribus salubris. Andernacus.

Aqua ad somnum.

℞. Succi papaueris utriusque ana ℔.j.℞.
Succi hyosciami albi & nigri ana ℥.ij.
Succi portulacæ, Succi lactucæ ana ℥.iiij.
Succi fabæ inuersæ ℔.℞.
Succi nenupharis ℥.iiij.
Seminis papaueris cuiusque, Rad. fabæ inuersæ ana ℥.ij.
Seminis lolij ℔.℞.
Sem. hyosciami albi & rub. ana ℥.iiij.
Xiloaloes, Nucis methel ana ℥.j.℞.
Portulacæ, Lactucæ ana ℥.j.
Scariolæ ℥.j.℞.
Endiuia ℥.j.

Contundantur & reponantur per dies tres in uase uitreo, & distillentur. Detur ℥.j. cum uino & aqua. Fumanellus.

Aqua uita ad pestem.

Rad. Angelicæ, Carlinæ, Gentianæ, Tormentillæ, Zedoariæ, Genitalis cerui ana ℥.ij.
Santalorum omnium ana ℥.j.

Theriaca

▲ Theriacæ optimæ, Mithridatij ana ʒ. iij.

Caphuræ ʒ. ij.

Moschi ʒ. j.

Radices inciduntur, miscenturq; reliquis: deinde vitro imposita, uini generosi optimè distillati libris tribus perfunduntur, & uase diligenter obserato, macerantur per mensem, sic ut quotidie commoueantur: postea colatur per linteum triplicatum, & uasi conduntur ad usum. Præseruandi gratia fumuntur guttæ duæ manè cum pane albo: curandi uerò datur uncia ex aqua cardui benedicti, hirundinariæ, scordij, uel simili. Andernacus.

Alia.

ʒ. Radicū angelicæ, Rad. tormentillæ, Zedoariæ, Pimpinellæ, Enulæ Campanæ, Dictamni ana ʒ. ij.

Cinnamomi ʒ. j. β.

Santali rubri & citrini, Cort. mali citri ana ʒ. j.

Hæc per biduum macerantur ex uini spiritus, uel aquæ fontanæ calentis libris duabus: deinde in duplici uase distillantur, condunturq;. Ex hac mane cochleare dimidium, uel per se, uel ex alio liquore sumi potest: in curatione integrum. Andernacus.

Aqua sudatoria ad pestem.

B ʒ. Pimpinellæ, Tormentillæ, Dictani albi, Serpentariæ, Gentianæ, Zedoariæ, Galangæ ana ʒ. v.

Piperis longi, Caryophyllorum, Macis ana ʒ. j.

Theriacæ Alexandrinæ ʒ. ij.

Caphuræ ʒ. j.

Cornu ceruini ʒ. β.

Triduo ex uini generosi, & aquæ scabiosæ æquis partibus macera, in duplici uase distillantur. Ex hac uncia tres, aut plures, pro ægri uiribus & natura dantur. Andernacus.

Alia facilis.

ʒ. Angelicæ, Galangæ, Ligni Guaiaci, Zarçæ parillæ, Cinnamomi, Baccharum iuniperi contus. ana ʒ. iij.

In uini generosi, & aquæ sambuci lb. j. β. macerantur: deinde in balneo Mariæ distillantur. Andernacus.

Alia efficacissima.

ʒ. Aquæ theriacalis caphurata ʒ. j. β.

Liquoris tartari correcti ʒ. j.

Spiritus calcanthini ʒ. β.

Olei unionum G. vj.

Olei coralliorum rub. ʒ. j.

M 3

Olei

278 DE AQVIS COMPOSITIS ALTERANTIBVS.

Olei terebinthinæ G.v. A
 Olei baccarum iuniperi G.iiij.
 Essentiæ chelidonæ ʒ.β.
 Aquæ rad. tussilaginis, Eringij ana ʒ.j.
 Aquæ florum sambuci, Violarum lutearum ana ʒ.β.
 Vini rubri dulcissimi ʒ.ij.β.
 Omnia miscentur, paraturq; potio sudorifera.
 Vel Theriacæ optimæ ʒ.ij.
 Myrrhæ ʒ.ij.
 Caryophyllorum, Zingiberis, Piperis ana ʒ.β.
 Cinnamomi, Croci, Euphorbij ana ʒ.j.
 Vini stillatitij ʒ.x.
 Liquoris tartari ʒ.ij.
 Miscentur, macerantur, colanturq;. Huius liquoris cochlear ex coralliorum
 succi ʒ.j. datur. Andernacus.

Liquor tartari.

℞. Tartari albi lb. iiij. In puluerem rediguntur: deinde retortæ induntur:
 hæc in fornacem locatur, & uase quod excipit amplo appposito, iuncturæ lu-
 to occluduntur: diligenter: postea igne per initia exiguo, tandem auctiore ur-
 getur, donec nulli amplius spiritus appareant. tunc refrigeratis uasis liquor B
 eximitur, infunditurq; ampullæ uitreæ erectæ, & in balneo calente corrigi-
 tur, separaturq; aqua ab oleo. Hæc drachmę instar ex aqua fumarie, chelido-
 niæ, uel simili instituto conueniente, rectè ad pustulas gallicas, exanthe-
 mata, erysipelas, arquatam, aquam inter cutem, febres, menses, aliosq; meatus
 referandos datur. Andernacus.

Aqua theriacalis caphurata.

℞. Spiritus chalcantini ʒ.j.
 Liquoris tartari correcti ʒ.iiij.
 Aquæ theriacalis sequentis ʒ.v.
 Miscentur, digerunturq; in balneo calido per mensem. Datur ʒ.j. ex uino ge-
 nerofo, uel alio humore idoneo. Ad iam dictos affectus uehementius ualet.
 Andernacus.

Aqua theriacalis.

℞. Theriacæ Alexandrinæ ʒ.v.
 Mirrhæ rubræ ʒ.ij.β.
 Croci Orientalis ʒ.β.
 Mixta ampullæ uitreæ induntur, perfundunturq; essentiæ, siue spiritus uini
 optimi ʒ.x. operculo diligenter superimposito. simul macerantur: paraturq;
 aqua, quę uitro probè reconditur. Andernacus.

Aqua

A

Aqua theriacalis alia.

℞. Scobis ligni guaiaci ℥.j.
 Theriacę Alex. optimę ℥.ij.
 Conseruę rosarum, Buglossę, Borriginis ana ℥.ij.
 Conseruę helenij, Anthos ana ℥.j.
 Spec. diagemmę, lætitię Galeni ana ℥.ij.

Fiat infusio in uase oppleto uini albi & aquę bonę ana quartarijs iij. super cineres calidos distillētur, in uase duplici cum cinnamomo. Dilue in eo quod distillatum fuerit, sacchari quātum satis est: cola per manicam Hippocratis: dato bibendum his, qui conualescunt à morbo Gallico. Rondeletius.

Aqua theriacalis alia.

℞. Theriacę ueteris ℥.j.
 Acetosę M. iij.
 Florum Chamomillę, Pulegij, Graminis, Cardui benedicti ana M. ij.

Temperentur in uino albo, distillēturq: aqua seruetur usui. capiat æger ℥. ij. cum uncijs tribus aquę acetosę, buglossę: & hoc cum ingreditur lectum uel stupham. * Hęc aqua curat dolores morbi Gallici, si per se detur, uel cū decocto milij solis, uel bardanę. Ego, inquit, optimo successu curauī multos pueros, senes & debiles hac potione, uel addendo guttas aliquot decoctioni communi Guaiaci: propter tenuitatem partium citò penetrat, & ad extra propellit. Hęc aqua cum aqua extinctionis auri omne vitium argenti uiui emundat & castigat. Rondeletius.

Aqua theriacalis alia.

℞. Ligni Guaiaci ℥.β.
 Aquę ℥. viij.
 Vini albi ℥. ij.
 Aquę fumarigę, Aquę cichorij, Aquę chamomillę ana ℥.j.
 Macerentur simul per noctem super cineres calidos. Adde
 Polypodij quercini ℥.β.
 Epithymi ℥. ij.
 Asparagi ℥. vj.
 Conseruę rosarum, Cichorij, Borriginis, Buglossę ana quart. ij.
 Theriacę bonę, Conseruę enulę ana quart. j.

Distillentur uase duplici bene obturato. Dosis ℥. ij. uel ℥. iij. Quod si uelis, poteris uncijs tribus aquę theriacalis, addere sacchari ℥. j. cinnamomi ℥. j. & rursus per manicam Hippocratis distillare. Datur in morbo Gallico manè in lecto ad sudores prouocandos. Siluius.

Aqua uita preciosā.

℞. Vini stillatiti, seu aquę uitę ℥. x.

Succi:

Succi Mellis, Olei chalcantini, Liquoris tartari ana ℥. vj. A
 Melissæ, Chelidoniæ, Saluiæ, Rorismarini, Maioranæ ana M. j.
 Zingiberis, Caryophyllorum, Piperis albi, Piperis nigri, Piperis longi, Cu-
 bebarum, Cinnamomi, Macis, Myrrhæ rubræ, Masticis ana ℥. ij.
 Cinerum fabarum ℥. v.

Aromata leuiter conteruntur, herbæ inciduntur, omniaq; miscentur, & am-
 pullæ uitræ induntur, ipsaq; obserata diebus duodecim in balneo maceran-
 tur: post lentissimo igne ex eodem distillantur, separanturq;. Deinde

Pulueris zingiberis ℥. j. β.

Pul. zedoariæ ℥. ij. β.

Pul. caryophyllorum ℥. ij.

Cubebarum ℥. j. β.

Amomi ℥. ij.

Granorum paradisi ℥. vj.

Nucis moschatæ ℥. j. β.

Cinnamomi electi, Macis ana ℥. ij.

Florum sulphuris, Florum auri ana ℥. ij.

Zibetti, Ambræ ana ℥. ij. β.

Moschi G. v.

Hæc in puluerem rediguntur, & pomo sub cineribus cocto imponuntur: po- B
 stea hoc aquæ uitæ supra distillatæ inijcitur, maceraturq; in calido loco per
 dies tres, aut quatuor: tum iterum separatur, & aqua uasè optimè recondita
 seruat: dantur guttæ quinq;. * Corpus penetrat, roborat, & renouat. An-
 dernacus.

Aqua uitæ optima.

℞. Chamomillæ, Meliloti, Flor. Lauendulæ, Sabinæ, Flor. Anthos ana M. j.
 Hæc in aquæ uitæ lib. iiij macerentur per horas uigintiquatuor: deinde ex
 balneo distillentur, separenturq; ita, ut si libra extillarit, hæc peculiari uasè
 condatur: atq; sic reliquæ deinceps excipiantur, reseruenturq;. Prima omniū
 est præstantissima: hinc secūda: postea tertia. * Multi felicissimè hac usi sunt
 in præcauenda apoplexia & paralyfi, hoc pacto. Si quis in balneum descen-
 dens, aquæ huius guttas tres ex aqua maioranæ uel saluiæ sumat, is à morbis
 tutiorem reddit, securè quoque singulis mensibus semel guttæ tres uel qua-
 tuor ex uino Cretico manè potui sumuntur. Andernacus.

Liquor auri.

℞. Auri finissimi calcinati q. s.
 Tantum spiritus uini super hanc clotam calcem funditur, quantum
 sex di-

A sex digitos transuersos superemineat: ac iuncturis uasis probè oblitis, mace-
rantur in aqua temperatè calida, siue balneo Mariæ, diebus uiginti aut trigin-
ta. Tum liquor citrinus, relicto in fundo uasis puluere candido, effunditur,
& spiritus uini ex ampulla uitrea per operculum à flauo auri liquore, modi-
cè ex balneo separatur. Postremò idem liquor auri extractus, ad summum
gradum usq; eleuari, hoc est, quinquies per ampullam incuruatam, retortu-
lam appellant, urgeri debet: atq; tunc quinta auri essentia absolutè parata
dicitur, summum chemicorum mysterium. Andernacus.

Elixir uitæ.

℞. Caryophyllorum, Nucis moschatæ, Zedoariæ, Zingiberis, Galangæ,
Piperis albi, Piperis nigri, Baccarum iuniperi, Corticum citri, Cort. arantio-
rum, Saluiæ, Basiliconis, Rorismarini, Menthæ, Maioranæ, Baccarum lauri,
Pulegij, Gentianæ, Calamèthi, Foliorum sambuci, Rosarum albarum, Rosa-
rum rubrarum, Spicæ nardi, Cubebarum, Aloës hepaticæ, Sem. arthemisiæ,
Sem. maioranæ ana ʒ. ij.

Ficum, Passularum, Dactylorum, Amygdalarum, Pinearum ana ʒ. vj.

Mellis albi lb. j.

Moschi optimi ʒ. j.

Sacchari fini lb. iij.

B Misce contulis omnibus contundendis, & in aquæ uitæ lb. xv. infundantur.
Stent ita in bociâ bene obturata, decem diebus, aut amplius: postea in bal-
neo distillantur usq; ad sæcum exiccationem. Postea extrahe aquam è reci-
piente, ponaturq; in Pellicano, & circuletur in sino equino per duos men-
ses continuos. Post circulationem tuam elixir habebis paratum. Post hæc
accipe bociam cum reliquijs sæcum, & distillantur in cineribus fortissimo
igne, etiam extillabit aqua rubra instar sanguinis, quæ admodum fætet, &
turbida est: quæ & ipsa circuletur, ut prior: & hæc est ignea substantia, quæ
etiam semimortuos suscitare potest. Post circulationem seruetur. * De priori
aqua, quæ per balneum est extracta, si tertio quòq; die per os ʒ. j. accipiatur,
corporis integritatem conseruat, & à morbis tuetur. Si uulnera ea madefiât
bis ter' ue ad summum, curantur: oculorum morbis omnibus apprimè con-
uenit, gutta una instillata uisum conseruat. Facies & pectus sæpius hac aqua
lota, iuuentutem conseruat. Per os assumpta uenerem stimulat, & mulieres
infœcundas, ad conceptum disponit. Posterior aqua rufo colore prædita, do-
loribus matricis medetur, per os sumpta: pondere duarum drachmarum as-
sumpta, pleuritidem soluit: colicos dolores inunctione curat, similiter & lie-
nis duritiem, dentium dolorem, anhelitus fætores, & alia huiusmodi sanat.
Omnis generis febres tollit, quia potenter omnes humores discutit & dissi-
pat. Si cui egroto uocis acciderit priuatio, dabis huius ʒ. j. cum altera drach-
ma prio-

N

ma prio-

ma prioris aquæ intra os, & loquetur: quod ego millies, inquit author, ex-
A
pertus sum. Fiorauantus.

Aqua mirabilis.

℞. Therebinthinæ ʒ. j.

Thuris masculi ʒ. ij

Aloës hepaticæ, Masticis, Caryophyllorum, Galangæ, Cinnamomi, Cro-
ci, Nucis moschatae, Cubebarum ana ʒ. j.

Gummi hederæ ʒ. v.

Omnia subtilissimè puluerizètur: deinde in alembico bene lutato, distillen-
tur lento igne. Prima aqua erit clara & alba, donec incipiat croceari & inspif-
fari: tunc remoue ipsam, & collige secundam, quæ erit crocea, spissa, & priori
supernatat. Cum aut color ille croceus magis intèditur, remoueat se cùda,
quia uenit tertia: quæ est sicut mel clarù, & propriè balsamum uocabitur, &
eius facultates quoq; obtinet. Si eius guttam cum cuspidè cultelli in fundo
cyathi aqua pleni posueris, nò dissoluitur, què admodum uerù balsamù: post-
quã steterit per unam horã, uenit in superficie aqua sine dissolutione. Ardet
quoq;. Deinde cògelat lac, si in una libra lactis ponatur una gutta tepida, sta-
tim cògelat illud, sicut balsamum. * Prima aqua balsamù dicitur, & hæc curat
fistulã, sonitum auriù, si de ea duas uel tres guttas imposueris. Secunda aqua
uocatur oleù balsaminum: quæ curat oculos expalpebratos, leprosos & la-
chrymosos subitò, si cù ea manè & serò laueris. Tertia uocatur balsaminum
oleù artificiale, quod in facultatibus idem est, quod naturale. Curat & strin-
git omnem tineam, scabiem, & superfluitatem, in quacùq; parte humani cor-
poris acciderit: omnia apostemata, & omnia ulcera recenter euenientia, om-
nèq; tumorè oculorù, si cum ea laueris. Repercussiuu est magis humorum
frigidorum, quàm ulla alia medicina. Omnè dolorem dentiù, uel ex uerme,
uel ex humore fluente, si cum ea laueris, curat, restringit, & interficit. Et in o-
mnibus uenenis frigidis, sicut bufonis, araneæ, serpentis, scorpionis, optimè
ualet: nec est possibile, ut hominem lædant, si aliquis ab illis pūctus, guttam
tepidã huius apposuerit. Omnia ulcera, quãtumq; profunda sint, siue in car-
ne, siue in neruis & osse, & apostemata saniosa, si cum ea laueris, sine aliqua
tenta curat intra nouè dies, quãtuncq; terribilia, seu immùda, fistulata seu
cancrata fuerint, etiã Noli me tãgere, & morbum Ægidij: habet etiam mira-
biles effectus in dulcificatione corporù metallicorum. Omnè guttam frigi-
dam, si cù ea laueris, & cù panno lineo supra locù doloris emplastraueris, cu-
rat, & percussiones lapide, uel casu, læsione loci facta, panno lineo in eo tin-
cto & superposito desiccat & restringit, neruosq; fortificat uel confortat. Et
scias quòd est calidissima supra omnem gradum, & nulla res calidior reperi-
ri potest: & est tantè penetrationis & caliditatis, quòd si unam guttam tepi-
dam.

A Jam posueris super manum, statim penetrat sine læsione, & non senties. Tumorem pedum, tibiæ, & dolorem iuncturarum læsione ibi facta superposita curat ex frigida causa, uel ex sanguine corrupto. Dicitur hic liquor Mater balsami: quem si probare uolueris, accipias pullum deplumatum, & mundatum à uisceribus: postea calefac eum ad ignem tandiu, quòd uix possit teneri in manu: postea line eum cum dicto oleo, & expone soli per duas horas ad exiccandum, & iterum iteretur unguendo cum dicto oleo, & deficeetur: postea ubi uis repone, quia nunquam putrefiet. & huius generis plures habet facultates. Bertapalia.

Aqua optima ad hydropem.

Eupatorij, Endiuæ, Scolopendrij ana M. j.

Herbæ Peti M. iij.

Florum ireos nostrat. Florum sambuci ana P. j.

Radicum Asparagi, Apij, Fraxini, Rubiæ, Tormentillæ, Acori ana ʒ. β.

Ebuli, Ireos nostr. ana ʒ. j. β.

Seminis Cucurbitæ, Melonum, Citrulli, Cucumeris, Endiuæ, Scariolæ,

Lactucæ, Portulacæ, Halicacabi ana ʒ. ij.

Corticum Tamaricis, Capparorum ana ʒ. β.

Cort. Sambuci, Ebuli ana ʒ. ij.

Hepatis lupini ʒ. ij. β.

B Ventriculorum gallinæ sicc. ʒ. β.

Scillæ ʒ. β.

Acinorum sambuci M. ij.

Cantharidarum ʒ. j.

Succi herbæ Peti lb. j.

Succi Ireos nostrat. Ebuli, Sambuci ana ʒ. iij.

Aquæ herbæ Peti lb. j. β.

Aquæ florum Sambuci, Ireos, rad. Ebuli, cort. Sambuci ana lb. β.

Aceti ʒ. ij.

Mellis ʒ. iij.

Cinnamomi electi ʒ. j.

Spicæ Indicæ ʒ. ij.

Contundenda contundantur bene, misceantur, & macerentur per horas 24. deinde in cineribus igne perquam lento distillentur. Aquæ addatur salis absinthij ʒ. β. & seruetur. Datur quotidie ʒ. j. β. uel ʒ. ij. manè stomacho ieiuno. Hac etiam uinum hydropicorum dilui potest. Experta est ad hydropem.

Aqua bona ad phthisim.

ʒ. Limac. seu cochlearum mundat. & incif. lb. j.

Carnis caponis incif. lb. β.

284 DE AQVIS COMPOSITIS ALTERNANTIB.

Caudarum cancrorum mund. & incif. ꝑ. iij. A
 Pinearum mundat. Amygdal. dulcium ana ꝑ. iij.
 Seminis Melonum, Cucurbitæ, Citrulli, Cucumeris ana ꝑ. β.
 Seminis Papaueris albi ꝑ. ij.
 Paffularum, Ficum, Sebesten, Iuiubarum, Glycyrrhizæ ana ꝑ. β.
 Gummi tragacanthi, Gummi Arabici ana ꝑ. ij.
 Thuris, Malticis ana ꝑ. j.
 Boli Armeni, Terræ sigillatæ ana ꝑ. vj.
 Radicis consolidæ maioris ꝑ. β.
 Conferuæ Rosarum, Violarum, Borriginis, Ireos, Enulæ ana ꝑ. j.
 Pulmonis uulpini ꝑ. vj.
 Sanguinis draconis ꝑ. ij.
 Spec. Diagemmæ, Diamarg. frig. Lætitiæ ana ꝑ. ij.
 Oſis de corde cerui ꝑ. j.
 Rosarum rubr. ꝑ. iij.
 Aquæ Consolidæ maioris, Tuſſilaginis ana ꝑ. j.
 Aquæ Meliffæ, Bugloſſæ ana ꝑ. β.
 Aquæ capillorum Veneris ꝑ. β.
 Medullæ panis albi, in uino maluatico infuſæ q. f. Contundenda contun-
 de, miſce, & in balneo Mariæ, uel cineribus lento igne diſtilla: ac conferua.

Aqua preçioſa. B

ꝙ. Vini maluatici opt. menſ. vj. ponatur in bocia, & diſtilletur ſuaui igne
 per cineres, ſeptem uel nouem uicibus: aquam uitæ ſic bene rectificatam
 pone in uitro cum ſequentibus:

ꝙ. Sperma ceti, Ambræ electæ, Rhabarbari optimi ana ꝑ. ij.
 Moſchi fini ꝑ. j.

Pone huiusmodi res in ſacculum uel pilam de panno raro, ſubtili, & bene
 mūdo. Huiusmodi ſacculus poſtea ponatur ad uinum ſuprà rectificatum, &
 bene claudatur oriſcium uitri: efficietur tale uinum aurei coloris. Poſſet &
 cinnamomi aliquid addi, & erit magis delectabile. * Virtutes huius aquæ:
 uenena curat & expellit. Ad præſeruandum contra peſtem detur gutta una
 manè, cum modica medulla panis, factis prius alijs purgationibus, & phle-
 botomia. Inſecto uerò da teſtam nucis moſchatæ plenam cum mica panis
 albi: deglutiendo curat. Euonymus.

Aqua mirabilis ad uiſum.

ꝙ. Succu Fœniculi, Chelidonij, Rutæ, Euphragiæ ana ꝑ. ij.
 Mellis ꝑ. x.
 Sarcocollæ, Antimonij, Tutæ, Aloës ana ꝑ. β.
 Fellis Caponum, Gallorum, Gallinarum ana ꝑ. ij.

Nucis

- A Nucis moschate, Croci, Caryophyllorum ana ℥.j.
 Sacchari candi de syrupo ros. ℥.vj.
 Hepatis hircini sani ℥.ij.β. Anthos M. β.
 Contundenda contundatur subtilissimè, & hepar frustatim incidatur: deinde omnia misceantur, & ponantur in alembico uitreo, & secundum artem bis distillentur. * Visum caliginosum mirabiliter clarificat, & sanitatem oculorum conseruat, intra oculos posita. Iohannes de Vigo.

Aqua ad uisum alia.

℞. Seminis Fœniculi, Petroselinii, Apij, Sileris montani, Anisi, Carui, Seminis Gallitrici, Rad. Chelidonig, Rad. Acori, Betonicæ, Agrimonix, Tormentillæ, Rutæ, Verbenæ ana part. æquales.

Terantur & ponantur prima die in urina pueri uirginis: secunda in uino albo: tertia in lacte mulieris, siue asinæ: quarta die distillentur hæc omnia, & serua ut balsamum, & obtura uas ne respirare possit. * Visum acuit, & oculos clarificat, & maculas & panum delet. Petrus Hispanus.

Aqua corrodens loco canterij.

℞. Salis nitri ℥.ij.

Vitrioli Romani lb. j.

Cinnabaris ℥.iiij.

- B Quælibet per se terantur, deinde simul misceantur, & per alembicum distillentur, & aquam collige. Bertapalia.

Alia.

℞. Vitrioli Romani ℥.vj.

Salis, Nitri ana ℥.ij.

Gallarum, Salis Ammoniaci ana ℥.viij.

Vitrioli non rubefacti ℥.ij.

Omnia distillentur alembico, & in uase seruentur uitreo. * Est ruptorium, quo omnem contingit incidere tumorem, uel abscessum absque ferro. Vfus quidem est, ut oliuæ sarmento ligno' ue acuto in hac madente aqua, tumor incidatur: qua pariter & porri tolluntur. Fumanellus.

Aqua ad dentes.

Salis ammoniaci, Salis gemmæ ana ℥.iiij.

Aluminis saccharini ℥.j.β.

Salis communis ℥.j.

Trita distillentur in alembico uitreo. Extracto inde liquore dentes cum petra fricentur: deinde abluatur os modico uino albo. Euonymus.

Aqua fortis.

℞. Salis nitri, Vitrioli ana lb. ij.

Aluminis usti ℥.viij.

286 DE AQVIS COMPOSITIS ALTERNANTIB.

Omnia subtilissimè terantur: postea ponantur in cucurbitam uitream bene Alutatam: da sibi ignem, per horas decem semper augendo. Euonymus.

Alia.

R. Auripigmenti, Floris æris ana ʒ.ij.

Vitrioli Romani lb. j. β.

Salis nitri lb. ij.

Aluminis lb. iij.

Omnia puluerizentur, & fiat secundum artem distillatio. Euonymus.

Alia.

R. Salis petræ, Vitrioli Romani ana lb. ij.

Aluminis usti lb. β.

Puluerizentur omnia, & in cucurbita ponantur, & distillentur. Euonymus.


DE SYRVPIS · CAP · II ·

Syrupus est medicamenti forma liquidior, ex succis uel alijs plantarum partibus, cum humore aliquo percoctis, & mellitis uel saccharatis, ad saporis gratiam, & custodiæ diuturnitatem. Sūt autem, &c. *Vide sign. 2.*

Vel simpli.

A

B



DE SYRVPIS.

A. Syrui simplices & compositi, alterantes seu concoquentes	Pituitam in	Capite {	Syrupus de betonica. Syrupus de stoechade	{	Compositus. Simplex.	A	
		Thorace: Syrupus {	De hyssopo. De prasio. Capillorum Veneris. De betonica. Glycyrrhizæ. De calamentho. Scabiosæ, &c.	{			
			Corde, — Syrupus Bifantinus.				
	Stomacho	{	Aqua mulsa. Syrupus — De absynth. De menta. Mel rosarum colatum. Oximel simplex. Oximel compositum. Oximel scilliticum.				
			Hepate: Syrupus {	Acetosus simplex. De duabus rad. De quinq; rad. De Eupatorio, &c.	{		
		Matrice: Syrupus de	{	Artemisia. Calamentho, &c.		B	
	Melancholiã in	Corde: Syrupus de	{	Pomis. Succo borraginis. Succo buglossæ.			
		Hepate & splene	{	Syrupus de epithymo. Syrupus lupulorum. Syrupus splenicus. Syrupus de fumo terræ.			

DE SYRVPIS OFFICINALIBVS, CONCOQUENTIBUS bilem in capite.

Syrupus de Nymphaea simplex.

Flores nymphae, quot uoles macerato, ac ter flores mutato. horum infusionis accipies lb. iij. sacchari quod sufficit. misceantur, & coquantur usque ad syrui consistentiam: deinde in uase uitreo, uel figulino uitrato seruetur per annum. Dosis à fescuncia, usque ad uncias duas, cum aquæ appropriatæ dupla quantitate. *Bilis flauæ feruoré extinguit, ideoq; mirificè ardentibus, alijsq; tebribus acutis auxiliatur. Somnum quoq; conciliat. Nicolaus.

Syrupus

A

Syrupus de nymphaea compositus.

℞. Florum nymphaeae albæ ʒ. ij.
 Nymphaeae luteae, Seminum psyllij integri, Acetosae ana ʒ. j.
 Cucurbitae, Citrulli, Cucumeris, Melonum, Lactucæ ana ʒ. β.
 Endiuiae sat. Endiuiae syl. Portulacæ ana ʒ. ij.
 Radicum fœniculi ʒ. j.

Coquantur in aqua hordei sufficienti: & colaturæ adduntur,
 Sacchari lb. j.

Vini granat. acidorum, Aceti albi ana ʒ. ij.

Fit syrupus, & aromatizatur cum

Santali citrini, Spicæ Indicæ ana ʒ. j. β.

Conseruatur in uase uitreo uel uitrato figulino ad annos duos. Dosis & actio, ut præcedentis. Franciscus Pedemontanus.

Syrupus de papauere simplex.

℞. Capitem recentium papaueris albi, nigri ana ʒ. lx.

Aquæ pluuiæ lb. iiij.

Coquantur ad consumptionem librarum duarum & dimidiæ aque: & additis
 Sacchari, Penidiorum ana ʒ. vj.

Fit syrupus. Conseruatur in uase uitreato cooperto per annum unum.

B * Valet ad catarrhum & tussim, somnumq; conciliat. Mesues.

Syrupus de papauere compositus.

℞. Papaueris albi, nigri ana ʒ. l.

Capillorum Veneris ʒ. xv.

Glycyrrhizæ ʒ. v.

Iuibas numero xxx.

Seminis lactucæ ʒ. xl.

Seminis maluæ, Cydoniorum ana ʒ. vj.

Coquantur in lb. iiij. aque, usq; ad duas, & cum

Penidiorum, Sacchari ana ʒ. viij.

Fit syrupus. Conseruatur in uase uitreo, uel figulino uitreato ad annos duos.
 Datur à fescuncia usq; ad uncias duas, cum dupla aque stillatitiæ appropriatæ quantitate. * Valet ad tussim siccam, phthisim, catarrhum calidum & acrem, somnumq; conciliat. Mesues.

DE SYRVPIS CONCOQVENTIBVS BILEM
 flauam in thorace.

Syrupus infusionis uiolarum.

℞. Infusionis rosarum lb. v.

Sacchari clarificati lb. iiij.

O

Coquan.

Coquantur cum facilitate. Seruetur in uase uitreato per annum. Dosis ab A
 ℥.j. ad ℥.ij. * Est conueniens ad extinguendam sitim in febribus acutis, &
 ad remittendum excessum caliditatis in eis, confortans stomachum relaxa-
 tum, & hepar supercalefactum, & cor, resistens putredini, cōueniens tempo-
 re pestilentia, & resistens uenositati.

Syrupus de succo uiolearum.

℞. Violarum recentium iamiam lectarum quantitatem satis magnam, &
 decerpe ab ijs purpurea foliola, & ab ijce uirides eorum cauliculos, quoniā
 herbaceam habent acrimoniam, & floridum colorem hebetant. Contunde
 deinde decerpta uiolearum folia in mortario marmoreo, & exprime. mox

℞. Expressi succi ℥.ij. Sacchari ℥.iiij.

Saccharum prius clarificetur, & ad iustam consistentiam coquatur: amoto deinde ab
 igne saccharo, tepe fieri finito, & succum infundito, & rursus lento igne ad spissitudinem
 coquito, & emicantem in coquendo spumam continuo auferto. Quidam spumam non au-
 ferunt, ne color pereat. Sed cito corrumpitur, cum spuma repositus.

Conseruatur per annum. Datur à fescuncia ad 3.ij.

* Bilis acrimoniam obtundit, ac ob lentorem thoracis uitijis est aptum.

Syrupus uiolarum.

℞. Violarum ℥.ij.

Seminis Cytoniorum, Maluę ana ℥.j.

Iuiubarum, Sebesten ana numero xx.

Aquę cucurbitę quantum sufficit. Sacchari ℥.j.℥.

Coquantur secundum artem. Conseruetur in uase uitreato per annū. Datur
 à fescuncia usq; ad 3.ij. cum aqua stillatitia appropriata. * Prodest pleurididi
 & tussi à causa calida. Mesues.

Syrupus de iuiubis.

℞. Iuiubarum num. lx.

Violarum, Seminis maluarum ana 3. v.

Capillorum Veneris 3. j.

Cotoneorū, Sem. papaueris albi, Melonū, Lactucę, Tragacathę ana 3. iij.

Liquiritiæ, Hordei mundati ana 3. j.

Decoquantur in libris quatuor aquę fontium secundum artem, uel aquę plu-
 uialis usq; ad consumptionem medietatis. Deinde colentur, & in colatura
 addantur zucchari clarificati ℥. iij. Et fiat syrupus debito modo decoquen-
 do. Cōseruetur ad annos duos. Dosis ut præcedentium. * Syrupus de iu-
 iubis, confert ad raucedinem uocis, & tussim, & pleuresim, & in ulcere uesi-
 cę mirè prodest Mesues.

Syrupus granatorum dulcium.

℞. Succij granatorum dulcium ℥. v.

Sacchari

A Sacchari albissimi lb. iij.

Coquantur secundum artem. Conseruatur in uase uitreo per annum. Dosis, ut præcedentium. * Sitim, tussim, & pleuritidem iuuat. Mesues.

ANNOTATIO.

Male hodie faciunt Syrupum granatorum, indifferenter cum dulcibus acetosa granata miscentes: oportet enim utrumq; Syrupum, tam acetosorum quam dulcium granatorum, seorsim conficere: nam diuersis morbis, morborumq; accidentibus medentur. Cordus.

DE SYRVPIS CONCOQVENTIBVS Bilem flauam in stomacho.

Syrupus acetosus simplex.

R. Aceti uini lb. iij. Sacchari clarificati in aqua lb. v.

Coquantur secundum artem. * Est communis ad omnem materiam: digerit choleram, phlegma, & melancholiam: ratione q; aceti attenuat crassos humores, incidit uiscosos, duros mollit, ineptos euellit, ubiq; penetrat, oppilationes aperit, prouocat urinam, putredini resistit, & corrigit malitiam humorum. idcirco in febribus pestiferis iuuat: sed ratione remissæ frigiditatis, tenues & subtiles humorum partes inspissat, adæquat calorē, refrigerat, uiscera lenit, & sitim sedat. Mesues.

Syrupus acetosus compositus.

B R. Radicum Fœniculi, Apij, Endiuia ana ℥. iij.

Seminis Anisi, Fœniculi, Apij ana ℥. j.

Seminis Endiuia ℥. iij.

Aquæ quantum sufficit lb. iij. Aceti acerrimi lb. ij.

Coquantur secundum artem. Conseruatur ad annos duos. Dosis à lescuncia ad uncias duas cum aqua aliqua conueniente. * Syrupus acetosus cū radicibus: cuius operatio est ad choleram grossam, difficilem, & ad phlegma: incidit enim & absterget, aperit oppilationes quæ sunt in hepate, & spleae, & in renibus. Mesues.

Syrupus granatorum acetosorum.

R. Succu granatorum acetosorum lb. v.

Sacchari albissimi lb. iij.

Coquantur secundum artem. * Febres biliosas, & quæ ex pituitosis flammâ multam inuehunt, iuuat. Mesues.

Oxysacchara simplex.

R. Sacchari albi lb. j.

Succu malorum granatorum acetosorum ℥. viij.

Aceti ℥. iij.

Coquantur cū facilitate ad ignē in uase stanneo, dū Syrupi crassamentū adsciscat. * Digerit materias cholericas phlegmati mistas, quæ grauant stomachum

machum & præcordia, & faciunt tertianas duplas inordinatas, quas uocant A erraticas, & similes quartanis duplis. Nicolaus.

Oxyfaccchava composita.

℞. Capillorum Veneris, Linguae ceruinæ, id est, Phyllitidis, Scolopendriæ, id est, Asplenij, Polytrichi, Hepaticæ, Violarum, Radicum Fœniculi, Rusci, Asparagi, Graminis ana ℥.j.

Hoc modo confice. In succo malorum granatorum, herbas, radices triduum macerato, quarto die parum bullire finito, cum forti expressione percolato, postremo addito saccharo quod satis fuerit, ad iustam crassitiem coquito, & conseruato ad annos duos. Dosis ut præcedentium. * Concalescens corpora potum iuuat: longis febribus, quas sanguis aut bilis creauit, & calori iecinoris auxilio est, & lienis obstructions tollit. Nicolaus.

Syrupus de Agresta.

℞. Agrestæ ℥.v.

Sacchari clarificati ℥.iij.β.

Coquantur secundum artem. * In magnis æstibus ad sitim restringendam mirificè confert, uomitum & alui profluuium biliosum sistit, febribus biliosis succurrit, grauidarum uomitum etiam reprimit, ac uentriculum earundè firmat, uenenisq; aduersatur. Mesues.

ANNOTATIO.

B

Agresta est succus uuarum immaturarum, qui Græcè uocatur Omphacium, & inspissatus seruatur: hoc autem loco recipienda est Agresta nondum ad spissitudinem decocta.

Agresta exprimi debet ex generosissimis uuis, apud nos paulò ante maturitatè. Cordus.

Syrupus infusionis rosarum.

℞. Infusionis rosarum ℥.v.

Sacchari clarificati ℥.iiij.

Coquantur cum facilitate, & conseruentur per annum in uase uitreato cooperato. Dosis ut præcedentium. * Est conueniens ad extinguendam sitim in febribus acutis, & ad remittendum excessum caliditatis in eis, confortans stomachum relaxatum, & hepar supercalfactum, & cor, resistens putredini, conueniens tempore pestilentie, & resistens ueneno sitati.

Syrupus de succo rosarum.

℞. Succu rosarum depuratarum ℥.j.β.

Zucchari clarificati ℥.j.β.

Fiat syrupus secundum artem, ut decet. * Aluum compressione soluit, uncijis tribus sumptis: sed multò clementius, quàm qui ex multis rosarū recentium infusionibus paratus est. Mesues.

Mina Citoniorum simplex.

℞. Succu citoniorum depurat. ℥.xij.

Coquan*

A Coquantur ad medietatem: & affunde uini ueteris opt. lb. viij.

Sacchari lb. xij.

Coquantur secundum artem. * Ventriculum roborat, & cibum in eo continet. Mesues.

Mina Citoniorum aromatica.

℞. Succu Citoniorum acetosorum lb. xx.

Vini ueteris optimi lb. x.

Mellis despumati optimi lb. vj.

Potest tamen etiam cum Saccharo fieri. Coquantur ad perfectionem, & aromatizentur, in sindone ligatis, cum Cinnamomi electi, Cardamomi maioris ana ʒ. iij.

Caryophyllorum ʒ. ij.

Zingiberis, Mastiches ana ʒ. j. β.

Croci ʒ. ij.

Xilaloos, Macis ana ʒ. j. β.

Moschi ʒ. j.

Galliæ Moscatæ ueræ ʒ. ij.

Fiat secundum artem. * Ventriculum, hepar, & cætera uiscera roborat, appetentiam excitat, coctionem iuuat, uomitum & lienteriam sedat. Nicolaus.

Syrupus de succo Myrtillorum.

B ℞. Succu Myrtillorum depurati lb. viij.

Sacchari clarificati lb. iij.

Coquantur secundum artem.

Curandum est ut efferratur ex Italia, aut Narbonensi Gallia Myrtillorum succus, si quis uolet hunc Syrupum conficere.

* Syrupus Myrtillorum uentriculum & uiscera roborat, ob id fluoré alui antiquatum sistit, & tussim mitigat. Mesues.

Syrupus Myrtinus compositus.

℞. Myrtillorum ʒ. xxx.

Santali albi, Sumach, Balauftiorum, Berberis ana ʒ. xxx.

Mespilorum ʒ. centum.

Succu Granatorum, Pomorum agrestium ana lb. ij.

Omnia in dictis succis coquantur, & fiat Syrupus cum

Sacchari lb. v.

secundum artem. * Hic Syrupus sistit uentris fluorem etiam antiquum, & sreatum sanguinis. Mesues.

DE SYRVPIS CONCOQVENTIBVS

bilem flauam in corde.

Syrupus de succo acetosæ.

℞. Succu acetosæ depurati lb. iij.

O 3

Sacchari

Sacchari clarificati lb. ij.

Coquantur secundum artem. * Febribus biliosis & pestilentialibus saluber est, cordis & uentriculi flammeū calorē extinguit, ipsaq̄ue roborat. Mesues. A

Syrupus de acetositate citri.

℞. Succī acetositatis citri lb. xij.

Decoque in uase uitreato super prunas cum facilitate, usque dū consumatur tertia pars ipsius: deinde coletur, & dimittatur donec clarificetur: & accipe ex eo quod clarum est lb. vij. & funde super ipsum ex Iuleb claro & depurato lb. v. & coquatur donec inspissetur. Si aut̄ æstas fuerit, dimittatur in sole, donec eius aquositas consumatur. * Syrupus de acetositate citri, ad omnes ægitudines biliosas ex pura bile ualet, & pestilentes, uel quæ ueneni naturam sapiant, & ad sitim extinguendam: ebrietati resistit, uertiginem iuuat. Mesues.

A N N O T A T I O.

Rarò habent pharmacopole syrupum acetositatis Citri uerum: nam plerung; uenditur pro eo syrupus citriorum conditorum. Porrò cum quis bene conficere uoluerit, oportet, ut per filtrum aut p̄anum destilletur acetositas citriorum, sine ulla ui aut expressione: alioquin coagulatur, cum refrixerit, Syrupus Cordus.

De syrupo Aranciorum acetosorum.

℞. Succī Aranciorum acetosorum per pannum aut filtrum distillati lb. vj. B
Sacchari albissimi lb. iij.

Coquantur secundum artem.

Ad hunc modum potest etiam fieri ex succo Aranciorum dulcium.

Syrupus acetositatis limonum.

℞. Acetositatis limonum maturorum, per filtrum destillatæ lb. vj.

Sacchari albissimi lb. iij.

Coquantur secundum artem. * Vehementius in frigidat, & penetrat, quàm syrupus acetositatis citri: & ualet contra putrefactionem, contra uermes, uehementiam caloris febrilis, & alios crudos humores.

DE SYRVPIS CONCOQVENTIBVS BILEM
flauam in hepate.

Syrupus de succo endiniæ.

℞. Succī Endiniæ depurati lb. viij.

Sacchari Tabarzeth lb. v

Coquantur secundum artem. * Valet principaliter ad omnes supercalfactiones hepatis, & aliorum membrorum nutritiuorum: & in morbo laterali maximè conuenit.

Syrupus

A

Syrupus de Endiuiâ compositus.

℞. Endiuiæ recentis, Borriginis, Scariolæ, Hepaticæ, Melissæ, Buglossæ,
Lactucæ, Eupatorij ana M.j.
Seminum frigidorum maiorum ana ʒ. j.
Santali albi, rubri ana ʒ. j.
Florum cordialium ana ʒ. iij.
Coquantur secundum artem, in sufficienti quantitate aquæ: deinde cola: &
colaturæ adde,
Succi Endiuiæ depurati ℥. j.
Vini Granatorum ʒ. iij.

Sacchari albi ℥. iij.
Fiat Syrupus secundum artem. * Valet præcipuè ad supercalefactiones
hepatis, cordis, & aliorum membrorum nutritiuorum: & generaliter cõfert
cuilibet complexionis calidæ, & est aperitiuus oppilationum, & cõfortatiuus
membrorũ debilitatorum à mala complexionis calida: est etiam digestiuus
materiaum cholericarum acutarum.

Syrupus Endiuiæ compositus.

℞. Succi Endiuiæ, Hepaticæ ana ℥. iij.
Clarificentur prædicti succi ad ignem ut expedit.
Rosarum, Violarum, Lenticulæ aquæ, Polytrichi ana ʒ. β.
B Capillorum Veneris, Hordei mundati, Sem. frig. maiorum ana ʒ. j.
Sacchari quod sufficit. Fiat syrupus, & aromatizetur cum santalis albis
& rubris.
Berberis, Sem. cotoneorum, Ligni aloes, Cinnamomi, Cort. citri ana ʒ. j.
Valet ad suprâ dicta. Gentilis de Fulgineo.

Syrupus de Cichorea, sine rhubarbaro.

℞. Endiuiæ domesticæ & syluestris, Cichoreæ, Taraxacum, id est, serum
syluestrem ana M. ij.
Cucurbitæ, Hepaticæ, Scariolæ, Lactucæ, Fumiterræ, Lupinorũ ana M. j.
Hordei non excorticati, Alkekengi ana ʒ. iij.
Liquiritiæ, Capillorum Veneris, Ceterac, siue scolopendriæ, Polytrichi,
Adianthos, Cuscutæ, id est, podagræ lini ana ʒ. vj.
Radicum Fœniculi, Apij, Asparagi ana ʒ. ij.
Ferueât in aqua sufficiētī, & colētur, & cū zuecharo albo solido fiat syrupus.

DE SYRVPIS CONCOQVENTI. (Nicolaus.)
bus pituitam in capite.

De syrupo de betonica.

℞. Succi betonicæ crudi partes tres. Sacchari boni partes duas.
Coquantur simul, & desumentur, quoad syrupi consistentiã acquirat. Vi-
res ipsius herbæ retinet.

Syrupus.

Syrupus de stœchade simplex.

A

℞. Florum stœchadis ʒ. xxx.
Thymi, Calaminthæ, Origani ana ʒ. x.
Anisi ʒ. vij.

Passarum purgatarum ʒ. iiij.

Aquæ quod satis est. Coquantur secundum artem, & colaturæ adde mellis ʒ. iiij. β. Condiatur cum

Cinnamomi, Calami aromatici, Zingiberis ana ʒ. j. β.
Ligentur in sindone, & in syrupo suspendantur. * Iuuat omnes affectus frigidos cerebri & neruorum, ut paralytim, epilepsiam, conuulsionem, spasmū cynicum, tremorem: ac uentriculum firmat.

Syrupus de stœchade compositus.

℞. Florum stœchadis ʒ. xxx.
Thymi, Calaminthæ, Origani ana ʒ. x.
Anisi, Pyrethri ana ʒ. vij.
Piperis longi ʒ. iiij.
Zingiberis ʒ. ij.

Passularum enucleatarum ʒ. iiij.

Aquæ quantum sufficit: Mellis optimi ʒ. v.

Coquantur secundum artem lento igne. Colaturæ adde mellis prædictas ʒ. v. & cum reponis, tum condias sequentibus speciebus, in sindone rara & mûda suspensis.

℞. Cinnamomi, Calami aromatici, Spicæ nardi Indicę, Croci, Zingiberis, Piperis nigri, Piperis longi ana ʒ. j. β.
Contundantur grosso modo. Idem quod præcedens efficit. Mesues.

DE SYRVPIS CONCOQVENTIBVS

pituitam in thorace.

Syrupus de hyssopo.

℞. Hyssopi aridi, Rad. Apij, Fœniculi, Petroselini, Glycyrrhizę ana ʒ. x.
Hordei mundati ʒ. β.
Seminis maluæ, Sem. citoniorum, Tragacanthæ ana ʒ. iiij.

Capill. Veneris ʒ. vij.

Iuiubarum, Sebesten ana n. xxx.

Passularum enucleatarum ʒ. j. β.

Ficum siccarum, Dactylorum pinguium ana n. x.

Penidiarum albarum ʒ. ij.

Confice secundum artem. Conseruatür ad annos duos in uase nitreato.

* Ad uitia thoracis & pulmonis efficax est, humores q̄ excreatu difficiles extenuat & educit. Mesues.

Syrupus

A

Syrupus de prafio.

℞. Marrubij ʒ. ij.
 Capillorum Veneris, Hyssopi, Calaminthæ, Anisi ana ʒ. vj.
 Rad. Apij, Fœniculi ana ʒ. v.
 Sem. Maluæ, Fœnigræci, Lini, Iridis ana ʒ. iij.
 Sem. Cydoniorum ʒ. ij.
 Vuarum passarum purgatarum ʒ. ij.
 Ficus passas pingues n. xvj.
 Penidiorum, Mellis ana lb. ij.
 Aquæ quod sufficit. Fiat syrupus.

* Thoracem & pulmones expurgat pituita crassa, lenta, putri: hinc asthma, & antiquæ tussi prodest: quales affectus senibus & naturâ frigidis sunt frequentes. Mesues.

Syrupus capillorum Veneris simplex.

℞. Infusionis capill. Veneris recentium ter factæ secundum artem lb. iij.
 Sacchari albi lb. ij. Coque, fiat syrupus.

Syrupus capillorum Veneris compositus.

℞. Capillorum Veneris M. ij.
 Adianti, Scolopendriæ, Polytrichi ana M. j.
 Iuiubarum, Glycyrrhizæ ana ʒ. ij.

B

Fiat decoctio, addendo Sacchari lb. iij. Fiat syrupus.

Syrupus alius capillorum Veneris.

℞. Capillorum Veneris ʒ. v.
 Glycyrrhizæ rasæ ʒ. ij.

Macerentur in aqua horis 24. deinde coque ad dimidij consumptionem. Colaturæ adde

Sacchari clarificati, Penidiorum, Aquæ capill. Ven. ana ʒ. viij.
 Coque, fiat syrupus. * Ad thoracis affectus calidos, destillationes & obstructions efficacis, usu creberrimus. Pleuritidis initio conuenit, cum materia calida, aut calido & frigido mixta, sua tenuitate gutturis rectorium eludit. Eo syrupo ad obstructions primorum uasorum in purgatorijs tentationibus securitatis gratia utimur. Antonius Musa, & Anutius Fœsius.

Syrupus de glycyrrhizæ.

℞. Glycyrrhizæ rasæ ʒ. ij.
 Capilli Veneris ʒ. j.
 Hyssopi ʒ. β.
 Aquæ lb. iij.

Macerentur horis xxiiij. Deinde coquantur ad dimidias. Colaturæ adde

Mellis optimi, Penidiorum, Sacchari ana ʒ. viij.
 Aquæ rosarum ʒ. vj.

P Fiat

Fiat Syrupus secundum artem. * Thoracem & pulmonem expurgat, ideoque A diuturnæ tussi & pleuritidi auxiliatur. Mesues.

Syrupus de Calamintha.

℞. Calaminthæ domesticæ, Calaminthæ agrestis ana ℥. ij.
Cheisin, id est, ligustici, id est, semin. Dauci, id est, seminis Schœnu anthos.
ana ℥. v.
Passularum enucleatarum ℔. β.
Mellis ℔. ij.

Fiat syrupus. In hoc syrupo sex aquæ libræ recipiantur, quæ bulliant: primò passulas, deinde alia secundum præscriptum ordinem ponendo, usque ad consumptionem medietatis: denique addito melle fiat syrupus secundum artem. * Syrupus de calamintha, lienosis plurimum confert, quibus durus est lien, & penè irresolubilis, & his qui frigida uiscera habent, & asthmate laborant, præsertim in senibus, & in habentibus antiquas tusses: si quis enim uel pectus, uel uentriculum, uel intestina, crassa, tenaci, & irresolubili materia plena habeat, hoc syrupo sanatur. Mesues.

Syrupus è scabiosæ succo.

℞. Succo scabiosæ crudi ℔. vj.
Sacchari, Mellis Hispanici puriss. ana ℔. ij.
Coquatur initio cum succo media pars utriusque, mellis scilicet & sacchari: B atque cola. Deinde reliqua pars mellis & sacchari addatur, perficiaturque coctio ad syrupi formam. * Ad eadem, ad quæ herba ipsa ualet. Medici Colonienses.

DE SYRVPIS CONCOQVENTIBVS.
pituitam in corde.

Syrupus Dinarij, siue de bizantijs simplex.

℞. Succo Endiuix, Apij ana ℔. ij.
Lupuli, Buglossæ ana ℔. j.
Succi depurentur & despumentur, dum maneant ℔. iiij.
Sacchari optimi ℔. ij. β.
Coquantur cum facilitate, donec fiat syrupus. * Humores crassos & lenos incidit atque extenuat, obstructions aufert, morboque regio succurrit. Mesues.

Syrupus de bizantijs compositus.

℞. Succo Endiuix ueræ, Apij, Lupuli, Buglossæ ana ℔. j.
In succis decoquantur, Florum rosarum ℥. ij.
Glycyrrhizæ ℥. β.
Sem. Anisi Fœniculi, Apij ana ℥. iiij.
Spicæ nardi Indicæ ℥. ij. Colaturæ adde

Aceti

A Aceti lb. ij.

Sacchari albifis. lb. iij.

Coquantur secundum artem diligenter. Est efficacior simplici. Mesues.

DE SYRVPIS CONCOQVENTIBVS
pituitam in stomacho.

Aqua mulsæ.

℞. Mellis lb. j.

Aquæ pluuiæ lb. viij.

Coque lento igne, donec amplius non spumet: utere. Augetur quandoq; mel-
lis quantitas, & decoquitur ad iulapij consistentiam: nempe quando à Medi-
co præscribitur, aut quòd ita illi uisum est, aut quòd diutius seruanda sit: &
aromatizatur cinnamomo, zingibere, maci, croco, & similibus.

Alter modus Aquæ mulsæ.

℞. Mellis boni partem j.

Aquæ fontanæ partes viij.

B Fermenti pauxillum pauxillo eiusdem aquæ mellitæ dissolutum, uidelicet in
singulas cætenas factæ mulsæ libras indatur fermèti dissoluti ℥. iij. quæ omnia
ligneo trade, relicto trium digitorum spacio uacuo, in quod, dum multi mo-
do feruebit, recipiatur: ubi feruere desierit, obturato uase modo loliorum ui-
ni, tertio post mense fit potabile. Durat ad annos aliquot. * Affectus frigi-
dos cerebri, neruorum & iuncturarum iuuat, sitim sedat, puris & pituitæ cras-
sæ expectorationem promouet, colicis prodest, & calculum in meatib. urinae
gigni prohibet. Medici Colonienfes.

Syrupus de absynthio.

℞. Absynthij Romani lb. β.

Rosarum rubrarum ℥. ij.

Spicæ Indicæ ℥. iij.

Vini clari ueteris opt. Succi Citoniorum ana lb. ij. β.

Macerentur in uase marmoreo, aut fictili denso per noctem unam: deinde
decoquantur. Colaturæ adde

Sacchari lb. ij.

Confice secundum artem. * Ventriculum roborat & iecur, aliaq; instrumè-
ta nutritionis, appetentiamq; excitat: contra regiū morbum prodest, flatu
discutit, humoresq; per urinam pellit. Mesues.

Syrupus de mentha maior.

℞. Succi Citoniorum Muzorum, Cytoniorum dulcium, Granatorum ace-
tosorum, Granatorum dulcium, Granatorum Muzorum ana lb. j. β.

In succis macerentur per horas xxiiij. sequentia:

P 2

℞. Men-

℞. Menthæ siccæ ℥.j.β.

Rosarum rubearum ℥.ij.

Coquantur deinde cum facilitate, usq; ad medietatis cōsumptionem: colentur, & colaturæ adde:

Mellis uel Sacchari ℥.ij.

Coquantur ad perfectionem: & cum reponis, aromatiza cū Gallia Moschata trita uera, & in sindone ligata, atq; ex orificio uasi suspensa. * Ventriculū frigidum roborat, ob id nauseam, uomitum, singultum, fluorem alui sedat. Mesues.

Syrupus de mentha minor.

℞. Succī Menthæ depurati ℥.j.

Succī Granatorum dulcium, Granatorum acetosorum, ad medietatē coctorum, Sacchari uel mellis ana ℥.j.

Coquantur sensim secundum artem.

In hoc quoque syrupo notandum est, quod in proximo syrupo de Mentha maiore diximus de melle.

* Eandem ferè cum superiore facultatem habet. Mesues.

Mel rosatum.

℞. Rosarum rubearum nondum penitus apertarum ℥.ij.

Mellis optimi ℥.vj.

Coquantur lento igne secundum artem. * Stomachum confortat & mundificat, & est digestiuum materiarum phlegmaticarum in stomacho & meseraicis contentarum. Mesues.

Mel rosatum aliud efficacius.

℞. Foliorum rosarum rubearum nondum explicitarū contusorum ℥.ij.

Coquantur in aquæ cœlestis ℥.iiij. Colaturæ fortiter expressæ adde,

Succī rosarum rubearum depurati, Mellis optimi despumati ana ℥.iiij.

Coquantur secundum artem.

Oxymel simplex.

℞. Mellis optimi despumati ℥.iiij.

Aceti uini acerrimi, Aquæ clarissimæ ana ℥.ij.

Mel cum aqua despumetur iterum diligenter: & cum aqua fuerit cōsumpta, tunc adde acetum, & coque secundum artem. * Humores crassos, lentos ac pituitosos incidit, extenuat, & abstergit, atq; aded obstructions aufert, spiritum educit, spiritumq; faciliorem reddit. Mesues.

Oxymel compositum.

℞. Radicum Fœniculi, Apij ana ℥.iiij.

Rad. Petroselini, Rufci, Asparagi, Sem. Apij, Fœniculi ana ℥.j.

Coquantur in aquæ claræ ℥.vj. aut quantum sufficit. Colaturæ adde Aceti acerrimi ℥.j.

Mellis

- A** Mellis optimi despumati lb. ij.
 Coquantur secundum artem. * Humores crassos & pituitosos incidit, extenuat, & abstergit: obstructions tollit iecinoris, lienis, ac renum urinam mouet, sudoremq; euocat.

Oxymel Scylliticum simplex.

℞. Mellis despumati lb. iij.

Aceti Scyllitici lb. ij.

Coquantur secundum artem. * Humores crassos, lentos, auulso contumaces separat: ob id cōfert uētriculi, & aliorū uiscerū affectib. hos humores sequētib. ructū acidū sanat, & uesciq; mollificationē, seu urinę incōtinētiā. Mes.

Oxymel Scylliticum compositum.

℞. Radicum Apij, Fœniculi ana ℥. iij.

Radicum Petroselinī, Rusci, Asparagi,

Seminis Apij, Fœniculi ana ℥. j.

Coquantur in aquæ lb. vj. aut quantum sufficit. Colaturæ adde,

Aceti Scyllitici lb. j.

Mellis optimi despumati lb. ij.

Fiat secundum artem. * Id potentius multo incidit, tenuat, terget, obstruēta aperit, in diurnis quartanis, & quotidianis, quàm oxymel compositum de radicibus.

B DE SYRVPIS CONCOQVENTIBVS

pituitam in hepate.

Syrupus de duabus radicibus.

℞. Radicum Petroselinī, Fœniculi ana ℥. iij.

Aquæ quantum sufficit. Sacchari clarificati lb. ij.

Coquantur secundum artem.

Syrupus de quinq; radicibus.

℞. Radicum Apij, Fœniculi, Petroselinī, Rusci, Asparagi ana ℥. iij.

Aquæ quantum sufficit. Sacchari lb. iij.

Coquantur secundum artem. * Confert febribus pituitosis & biliosis, & ijs incipientibus.

Syrupus de eupatorio.

℞. Radicum Fœniculi, Apij, Endiuix ana ℥. ij.

Glycyrrhizæ, Schoenanthi, Cuscutæ, Absinthij, Rosarum ana ℥. vj.

Capilli Veneris, Bedeguaris, Suchahæ, Florū aut radicū Buglossæ, Anisi, Fœniculi, Eupatorij ana ℥. v.

Raued seni, id est, Rhabarbari Orientalis, Mastiches ana ℥. iij.

Spicæ nardi Indicæ, Azari, Folij, pro folio pone Spicā Romanam ℥. ij.

Aquæ quantum sufficit, aut lb. viij.

Succi Apij, Endiuæ ana ℥.β.

Sacchari ℥.iiij.

Coquantur secundum artem. * Frigidis iecinoris uitijs, ac eiusdem obstructionibus, aquæ inter cutē, maloq; corporis habitui succurrit: humores enim crassos extenuat, roburq; iecinori adijcit. Vrinæ mouet, & hypochondriorum tensionem demolitur. Mefues.

DE SYRVPIS CONCOQVENTIBVS

pituitam in matrice.

Syrupus de Artemisia.

℞. Artemisiæ M.ʒ.

Pulegij, Calaminthæ, Origani, Melissa, Dictāni Cretici, Perficariæ, Sabina, Amaraci, id est, Maioranæ, Chamædryos, Perforatæ, id est, Hypericonis, Chamæpityos, id est, Iuæ aromatica, Comarum Matricariæ, Centauræ minoris, Rutæ, Betonicæ, Buglossæ, Radicum Fœniculi, Apij, Petroselinij, Asparagi, Brusci, Saxifragiæ (eius loco accipiantur radices Pimpinellæ,) Enulæ Campanæ, Cyperi, Rubæ tinctorum, Ireos, Pæoniæ ana M.ʒ.

Baccarū Iuniperi, Seminis Ligustici, Petroselinij, Apij, Anisi, Nigellæ, Carpobalsami (aut succedanei eius,) Costi, Radicum Afari, Radicum Pyrethri, Cassiæ lignæ aromaticæ, Cardamomi, Calami aromatici, Phu, id est, radices eius ana ℥.β.

Aquæ quantum sufficit.

Sacchari ℥.iiij.

Coquantur omnia magna diligentia, secundum artem, ne plus quàm necesse sit aromata bulliant. * Medetur passionibus matricis, & retinet eam in proprio loco: resoluit frigiditatem, uentositatem, & dolores, corroborat neruos, aperit poros, sanguinem corrigit, menstruis imperat, & prouocat. Mathæus de Gradibus.

DE SYRVPIS CONCOQVENTIBVS

melancholiam in corde.

Syrupus de pomis.

℞. Succi pomorum dulcium, acetosorum ana ℥.ʒ.

Coquantur, despumentur, & coentur: deinde adde Sacchari ℥.iiij.

Coquantur secundū artem. * Cor imbecillum roborat: ob id syncopen & cordis tremorem sanat. Mefues.

Syrupus de succo borraginis.

℞. Succi Borraginis depurati ℥.viij.

Sacchari despumati ℥.iiij.

Coquantur aliquandiu: deinde

℞. Florum

A ℞. Florum Borriginis recentium ℔.j.
Contendantur aliquantulum, & coquantur in aquæ quantitate sufficenti, & colaturam ad funde prædictis, & fac secundum artem.

ANNOTATIO.

Succus Borriginis prius est clarificandus cum albuminibus ouorum: alioquin plus satis mucilaginosus fieret Syrupus.

* Cor ipsum roborat, eiusq; tremorē & syncopē sanat, maniacos & melâcholicos iuuat.

Syrupus de succo buglossæ.

℞. Succu Buglossæ depurati ℔. viij.

Sacchari ℔. iiij.

Florum Buglossæ recentium ℔. j.

Flores tusi coquâtur in aqua, & colatura prioribus affusa simul ad perfectionem coquantur. * Cor confortat, lætitiâq; generat.

ANNOTATIO.

Succus Buglossæ difficulter exprimitur: nã fit mucilago dũ tenditur buglossa: ideo tusa dimittenda est per noctem in frigido loco, & postridie exprimendus succus, atq; cum albuminibus ouorum clarificandus. Cordus.

B DE SYRVPIS CONCOQVENTIBVS.
melancholiam in hepate & liene.

Syrupus de epithymo.

℞. Epithymi ʒ. xx.

Myrobalanorum Citrinorum, Indorum ana ʒ. xv.

Cuscutæ, Fumiterræ ana ʒ. x.

Thymi, Buglossæ, Calaminthæ, Emblicorû, Bellericorû, Glycyrrhizæ, Polypodij, Agarici, Stæchados ana ʒ. vj.

Rosarum, Fœniculi, Anisi ana ʒ. ij. β.

Prunorum num. xx.

Passularum enucleatarum ʒ. iiij.

Tamarindorum ʒ. ij. β.

Aquæ quantum sufficit.

Sacchari ℔. iiij. Sappæ ℔. ij.

Coquantur secundum artem.

Sapa est mustum optimum ad tertias decoctum.

* Atrâ bilē, & alios humores uastos uacuat: ob id morbos ex his nascētes, elephantiâ, câcrû, ulcera maligna, fistulosa, pforâ, leprâ præcauet, curatq;. Mésues.

Syrupus de lupulo.

℞. Succu lupuli depurati iiij. ℔.

Succu fumiterræ depurati ℔. ij.

Sacchari

Sacchari lb. vj.

Coquantur secundum artem. * Refrigerat, & collectionum impetus lenit, bilem regio morbo laborantibus detrahit, pituitam in aqua inter cutem exigit per aluum.

A

Syrupus splenicus.

℞. Epithymi, Cort. rad. Capparorū, Linguæ ceruinæ, Fructuū Tamarisci (pro quibus substitue cort. med. Fraxini) Cort. med. rad. Salicis, Rubiæ tinctorum, Ireos Florentinæ, Acori vulgaris, Afari, Sem. Anisi, Fœniculi, Cymini ana ℥. j.

Macerentur simul omnia in lb. iij. aquæ, & libris duabus aceti, horis 24. Deinde coquantur omnia ad consumptionem tertiæ partis, reducendo scilicet ad libras quatuor. Expressiōi colatę adde mellis Hispanici despumati lb. ij. β. Coquantur secundum artem ad syrupi consistentiam. Franciscus Pedemontanus.

Syrupus de succo fumiterræ maior.

℞. Myrobalanorum Citrinarum, Chebularum ana ʒ. xx.
Florum Borriginis, Buglosæ, Violarum, Absinthij, Cuscutæ ana ℥. j.
Glycyrrhizæ, Rosarum ana ℥. β.
Epithymi, Polypodij ana ʒ. vj.
Prunorum n. c.
Passularum enucleatarum lb. β.
Tamarindorum, Pulpæ calsiæ fistulæ ana ℥. ij.
Aquæ lb. x.

B

Coquantur secundum artem ad tertias. deinde cola. & colaturæ adde Succi fumiterræ depurati, Sacchari albisimi ana lb. iij.

Coquantur lento igne, ad iustam consistentiam, & repone. * Syrupus fumariz maior uentriculum & hepar roborat, obstructions aperit, cutis morbos, præcipuè ab humore falso uel usto natos, ut psofam, lepram, impetiginem, serpiginem curat. Mesues.

Syrupus fumariz minor.

℞. Myrobalanorum flauarum ℥. ij. Violarum, Cassuthæ, Absinthij ana ℥. j.
Aquæ lb. vj.

Succi fumariz costi & purgati, Sacchari ana lb. ij.

Aqua: coque omnia usque ad partem tertiam. Expressum cum succo fumariz & saccharo percoque. Quidam scammonij ℥. β. panno lineo raro ligatam, in eo suspendunt. * Syrupus fumariz minor hepatis obstructionem aperit: ob id icterum sanat, pituitam falsam & bilem uistam uacuat: proinde psofram, lepram, prurimum, & alia cutis uitia inde orta sanat, & corporis colorem floridum reddit. Mesues.

Syrupus

A

Syrupus de succo fumarie.

℞. Succum fumarie crudum ℥. iij.

Sacchari boni ℥. ij.

Coquantur simul, & desumentur, quoad syrupi consistentiam acquirant.

* Ad eadem valet, ad quæ supradicti. Medici Colonienfes.

DE SYRUPIS PURGANTIBVS BILEM.

Infusio rosarum, seu syrupus rosarum solutiuus.

℞. Infusionis rosarum secundum artem nonum iteratæ ℥. x.

Sacchari tantundem.

Coquantur in syrupi consistentiam. Nonnulli cum melle conficiunt. Dosis ab uncijs duabus ad ℥. iij. * Bilem purgat. Melues.

Infusio uiolarum.

Infusio uiolarum eodem modo fit, quo rosarum infusio.

Syrupus ex floribus persicis.

℞. Florum persicorum recentium ℥. iij.

In aquæ uel rosis maialis calefacti libris septem, & dimidia, per horas octo, septies aut nouies macerantur: deinde huius diluti libræ duæ, cum sacchari sesquilibra, aut duabus, ad syrupi spissitudinem incoquuntur. * Hic syrupus acres tenuesque humores in biliosis febribus, uti rosarum trium unciarum, uel quatuor instar exhibitus, educit. Andernacus.

Syrupus de cichorio cum rhabarbaro.

℞. Endiuie domesticæ, Endiuie syluestris, Cichorii, Taraxacon ana M. ij.

Cicerbitæ, Epaticæ, Scariolæ, Lactucæ, Fumiterre, Lupulorum ana M. j.

Hordei non excorticati ℥. ij.

Vesicariæ, id est, alkekengi, Glycyrrhizæ, Capillorum Veneris, Asplenij,

Polytrichi, Adianti ana ℥. vj.

Rad. Fœniculi, Apij, Asparagi ana ℥. ij.

Coquantur in aqua sufficiente, & percolentur: deinde cum saccharo albo clarificato fiat syrupus. pro cuius unaquaque libra inter coquendum adijciantur

Rhabarbari optimi ℥. β.

Spicæ nardi ℥. iij.

Colligato in linteolo raro, quod sæpe exprimatur, dum syrupus consistentiam iustam nanciscatur. * Valet contra omnem materiam uenenosam in alterando & mundificando eam, & propriè in anthraco, & similibus: valet & in febre pestilentiali. Confortat cor & nutritiua, mundificat materias per urinam & secessam, & facit appetere cibum, ac inducit somnum. Nicolaus Florentinus.

Q

DE SY-

DE SYRVPIS OFFICINALIBVS:
DE SYRVPIS PURGANTIB. PITVITAM. A

Syrupus ex bryonia & radicum succo.

℞. Succu crudi rad. Bryoniæ, Mellis Hispanici, uino generoso despumati
ana partes æquales.

Coquantur leniter in uase terreo uitreato, donec fluxilis syrupi consisten-
tiam habeat, continenter despumando. Exprimatur autem succus tempore
Maij, cœli constitutione sicca: serius enim expresso in luxuriantem herbam
transfusa fuerit succositas radicis.

Syrupus de bryonia compositus.

℞. Succu Bryonię ʒ. v.
Aque decoctionis Origani, Hyssopi sicci, Libyftici, Seseleos, Cardamomi,
Stœchados ana ʒ. j.
Sapę Vuarum passarum ana lb. ʒ.
Mellis lb. ij.

* Syrupus de Bryonia idem ualet quod medicamentũ. Dantur ʒ. ij. Mesues.

Syrupus de hermodactylis.

℞. Quinque radicum ana ʒ. j.
Sem. 4. frig. maiorum ana ʒ. j. ʒ.
Hyssopi, Capillorum Veneris, Aspleni ana M. ʒ.
Violarum M. j. ʒ.
Florum Rorismarini, Borruginis ana M. j. ʒ.
Cyperi ʒ. iij.
Chamomille ʒ. ij.
Passularum ʒ. j.
Senæ ʒ. ij.
Hermodactylorum, Cuscutæ ana ʒ. ʒ.
Anisi, Fœniculi, Carui ana ʒ. ij. ʒ.
Polypodij ʒ. iij.
Agarici ʒ. ij.

Coquantur in aque lb. iij. & collaturæ ad de-
Sacchari lb. j. ʒ. Rhabbarbari ʒ. iij. ʒ.
Rosarum ʒ. j. Turbith ʒ. iij.

Hæc tenuissimè trita, inque panno ligata suspendes in syrupo cocto secun-
dum artem. Nicolaus.

DE SYRVPIS PURGANTIBVS HVMO-
res mixtos.

Syrupus diasereos.

℞. Intybi latifolij, Cichorij ana M. j.

Adiantũ

- A** Adianti albi, nigri, Agrimonie, Scolopendrij, Lupuli, Fumarie ana M.β.
 Vesicarie, id est, alkekengi ʒ. iij.
 Violarum P. j.
 Rad. Apij, Fœniculi, Asparagi ana ʒ. β.
 Polypodij quercini ʒ. j.
 Glycyrrhizæ ʒ. vj.
 Seminis Cnici ʒ. j. β.
 Sem. 4. frigid. maiorum ana ʒ. ij.
 Hordei non excorticati P. ij.
 Semin. Endiuie, Cichorij ana ʒ. j. β.
 Vuarum passerarum ʒ. j.
 Pruna Damascena paria x.
 Florum Borriginis, Buglossæ, Violarum ana P. j.
 Myrobalanorum Citrinorum, Chebulorum ana ʒ. β.
 Omnia in aqua ad tertias decoquantur: & in huius decocti iure colati libra
 & semisse, macerentur seorsim
 Rhabarbari electi ʒ. ij. β.
 Agarici trochiscati ʒ. j.
 Foliorum senæ ʒ. j. β.
 Zingiberis, Cinnamomi ana ʒ. j.

- B** Expressis colatisq; iterum adde
 Sacchari optimi lb. j.
 Syrupi rosar. solutiui ʒ. iij.

Mixta omnia rursus modicè coquantur ad iustam spissitudinem. * Ex hoc syrupo interdum cochleare unum uel semūciam, cum modica hordei aqua, cui cinnamomi aliquid incoctum sit, pueris bile suffulsis, uel obstructionem & duritiem uiscerum expertis, aut lumbricis infestatis ante cibum salubriter exhibuimus: prouectioribus, tum uiris, tum mulieribus, in similibus affectibus duo cochlearia, cum syrupo uiolacei, aut rosacei solutiui uno & quaternis aquæ intybi, aut hordei, aut alterius, morbo conuenientis: ualentioribus uncias duas, cum una syrupi ros. solutiui, & aquæ cichorij duabus. Quod si æger delicatus sit, & febris careat, aquæ ex cinnamomo distillatæ cochleare unum aut alterum admisceatur. Andernacus.

Syrupus diacnicu.

- ʒ. Adianti, Hyssopi, Thymi, Origani, Chamædryos, Chamæpityos, Scolopendrij, Buglossæ ana M.β.
 Calcute, Vesicarie ana ʒ. β.
 Rad. Angelicæ, Glycyrrhizæ, Fœniculi, Apij, Asparagi ana ʒ. j.
 Cort. Tamaricis ʒ. β.
 Polypodij ʒ. j. β.

Q 2

Sem.

308 DE SYRVPIS MINVS VSVVALIBVS.

Sem. Anisi, Fœniculi, Ammeos, Dauci ana ʒ.ij.

Sem. Cnici, contusi ʒ.iiij.ʒ.

Passularum enucleatarum ʒ.ij.

Decoquantur in aqua, ad tertias, colentur: deinde adde

Senę Alexandrinę ʒ.ij.ʒ.

In iure decocti per noctem maceretur, ad hæc

Agarici trochiscati ʒ.ʒ.

Zingiberis ʒ.ij.

Rhabarbari ʒ.viij.

Hæc sequenti die colentur, ualideq; exprimantur. postea

Sacchari albiss. ʒ.ij.

Syrupi ros. solutiui, Violacei solutiui ana ʒ.ij.

Syrupi acetosi simpl. ʒ.ij.

Misceantur, atq; iterum modicè coquantur, dum satis spissescant. Ex hoc syrupo uncia duæ adultis cum aqua stillatitia hyssopi aut thymi, aut pulegij uncia instar, cinnamomi semuncia, aut cochleari rectè exhibentur. Pueris & delicatis mulieribus ʒ.ij. cum syrupo ros. solutiui semuncia, & aqua cinnamomi stillatitia ex uino modica. * Idoneus est autumno, & hyemis uerisq; initio: febribus longis, quotidianis, quartanis, & obstructionibus uiscerum, lienis & iecoris, ex pituita & crasis humoribus creatis, nec non & aqua inter cutem laborantibus. Andernacus.

Syrupus alterans bilem flauam.

ʒ. Scariolę, Lactucę, Rostris porcini, Buglossę, Borriginis ana M.ʒ.

Prunorum, Sebesten ana paria v.

Sem. 4. frig. maior. ana ʒ.ij.

Sem. Anisi ʒ.ij.

Flor. Borriginis, Violarum, Buglossę ana P.ʒ.

Fiat decoctio, & in ʒ.ij. dissolue sacchari quantum sufficit: & fiat syrupus. Rondeletius.

Syrupus alterans pituitam.

ʒ. Rad. Apij, Petroselini, Fœniculi, Asparagi ana ʒ.ij.

Hyssopi, Betonicę ana M.ʒ.

Sem. Anisi ʒ.iiij.

Passularum, Ficuum ana paria xx.

Flor. Anthos, Stœchados, Borriginis, Buglossę ana P.ʒ.

Glycyrrhizę ʒ.ij.

Fiat decoctio, & in libra una & semisse, dissolue mellis despumati uel ros. quantum satis est. Rondeletius.

ANNOTAT.

A

ANNOTATIO.

Notandum, quod si huiusmodi serapia non tam copiosum saccharum ut syrupi veri recipiant, & non ad perfectam syrupi usque consistentiam conquantur, sed dilutiora parentur, ea rectius apozemata appellari.

Syrupus alterans bilem atram.

℞. Endiuizæ, Scariolæ, Buglossæ, Borriginis, Violarum, Lactucæ, Portulacæ, ana M. j.
 Passularum ℥. ij.
 Sem. 4. frig. maior. ana ℥. iij.
 Flor. Borriginis, Buglossæ, Violarum ana P. ij.
 Fiat decoctio, & in colatura dissolue sacchari quantum satis est: & fiat syrupus. Rondeletius.

Alius.

℞. Rad. Buglossæ, Enulæ, Glycyrrhizæ ana ℥. j.
 Rad. Graminis, Asparagi, Apij ana ℥. β.
 Rad. Satyrionis ℥. vj.
 Passularum ℥. j.
 Capillorum Veneris, Violarum, Melissæ, Cichorij ana M. j.
 Calaminthæ, Chamædryos, Chamæpityos ana M. β.
 Sem. 4. frig. maior ana ℥. j.
 Sem. Bombacis ℥. iij.
 Sem. Apij, Petroselinij ana ℥. ij.
 Flor. Buglossæ, Borriginis, Anthos, Violarum ana P. j.
 Fiat decoctio. In colatura dissolue sacchari quantum satis est: & fiat syrupus. Rondeletius.

Syrupus purgans bilem.

℞. Rad. Cichorij ℥. j.
 Glycyrrhizæ rasæ ℥. ij.
 Cichorij, Scariolæ, Buglossæ, Borriginis, Rostri porcini, id est, sonchi, Dentis leonis ana M. j.
 Prunorum, Sebesten ana paria xxx.
 Passularum paria x.
 Anisi ℥. ij.
 Thamarindorum ℥. j.
 Senæ Orient. Medullæ sem. Chartami ana ℥. iij.
 Flor. Borriginis, Buglossæ, Violarum ana P. j.
 Fiat decoctio. In colatura dissolue sacchari quantum satis est: fiat syrupus, addendo post clarificationem, uel in clarificatione ipsa, succi rosarum ℥. ij. uel syrupi rosati laxatiui ℥. iij. cinnamomi ℥. ij. Misce, & fiat syrupus. Rondeletius.

Q 3

Syrupus

40 DE SYRUPIS MINVS VSVALIBVS.

Syrupus purgans pituitam ex thorace.

A

℞. Radicum Apij, Fœniculi, Apij, uel Asparagi ana ʒ. j.
Hyssopi, Betonicæ ana M. j.
Marrubij M. β.
Sem. Anisi ʒ. iij.
Passularum, Ficuum ana paria xx.
Florum Anthos, Stœchados, Borriginis, Buglossæ ana P. j.
Glycyrrhizæ ʒ. j.
Fiat decoctio. In colaturæ lb. ij. adde
Polypodij ʒ. j.
Medullę sem. Carthami contusi ʒ. ij.
Agarici trochiscati ʒ. ij.
Anisi, Fœniculi ana ʒ. j.
Concoquantur. colaturæ adde
Mellis uiolati, uel rosati, quantum satis est: & fiat syrupus. Rondeletius.

Syrupus purgans melancholiam.

℞. Radicum Buglossæ, Glycyrrhizæ rasæ ana ʒ. j.
Cichorij, Scariolæ, Borriginis, Buglossæ, Fumiterræ, Violarum, Mercurialis ana M. j.
Passularum ʒ. ij. B
Seminis Cucurbitæ, Melonum, Citrulli, Cucumeris, Anisi ana ʒ. iij.
Senæ Orientalis, Polypodij, Origani, Epithymi ana ʒ. ij.
Thamarindorum ʒ. β.
Flor. Borriginis, Buglossæ, Violarum ana P. ij.
Misce, & fiat decoctio. In colatura dissolue sacchari quantum satis est: & fiat syrupus. Addantur syrupi rosarum laxatiui ʒ. iij. * Bilem & melancholiam purgat. Rondeletius.

Syrupus ad ascitem.

℞. Passularum ʒ. ij.
Fol. Brasicæ marinæ M. j.
Thymelæ uel Chameleæ M. β.
Seminis Hederæ, Seseleos ana ʒ. iij.
Fiat decoctio. In libra una dissolue
Syrupi Endiuicæ simplicis lb. j. uel
Syrupi Endiuicæ comp. lb. β.
Fiat syrupus aromatizatus cum cinnamomi ʒ. ij. uel spicæ Celticæ ʒ. j. Loco syrupi poni possunt species cichorij & herbæ capill. atque syrupus inde confici hoc modo.

Alia

A.

Alius ad idem.

℞. Rad. Valerianæ, Rubiæ maior. Ciclamini ana ʒ. ij.

Rad. Apij, Petroselini ana ʒ. j.

Endiuic, Scariolæ, Capill. Veneris, Agrimonix ana M. j.

Semini Hedere ʒ. j.

Brassicæ marinæ M. j.

Chameleæ, Thymeleæ ana ʒ. j.

Passularum mundat. ʒ. iij.

Anisi ʒ. iij.

Fiat decoctio: & in lb. j. β. dissolue sacchari quantum satis est, fiatq; syrupus, aromat. cum spicæ Celticæ ʒ. iij. uel cinnamomi. Dentur ʒ. iij. per se, si sit mediæ coctionis: uel cum aquis endiuicæ & cichorij, si sit coctus ad perfectionem. Rondeletius.

Syrupus ad anasarcam.

Si sit anasarca, prædictis adiungenda erunt medicamenta magis incidentia, attenuantia, & alterantia: ut Enulæ camp. rad. Apij, Petroselini, Rubiæ maioris, in maiori quantitate: & pituitam purgantia: ut Agaricus, semen Carthami, Sena, Polypodium: aut prædicta medicamenta trahentia aquas, decoquenda in syrupis ad pituitam purgandam præscriptis. Rondeletius.

Syrupus ad tympanitem.

B.

℞. Passularum ʒ. ij.

Sem. Petroselini, Apij, Seseleos ana ʒ. ij.

Radicum Afari, Valerianæ ana ʒ. β.

Menthæ, Absinthij, Betonicæ ana M. β.

Marrubij M. j.

Mercurialis, Brassicæ marinæ ana M. β.

Senæ Orientalis, Semini Carthami ana ʒ. vj.

Florum Anthos, Genistæ ana P. j.

Fiat decoctio. In lb. j. β. dissolue sacchari quantum satis est: fiat syrupus aromat. cum diagalange ʒ. ij. uel aromat. ros. ʒ. j. Detur alternis diebus. Rodelet.

ANNOTATIO.

Ceterum si hydrops est cum scirrho lienis, tunc incidentia & splenitica adiungimus: ut cort. rad. Capparorum, Sambuci, uel Fraxini, Populi, aut Tamaricis: ac in aceto macerentur, & decoquantur, ut supra dictum. Rondeletius.

Syrupus ad menses prouocandos.

℞. Rad. Apij, Fœniculi, Petroselini, Asparagi, Rusci ʒ. iij.

Rad. Rubiæ maior. ʒ. ij.

Rad. Quinquefolij, Eryngij ana ʒ. j.

Pulegij utriusque, Calaminthæ, Origani ana M. j.

Sem. 4j.

Sem. 4. frig. maior. ana ʒ. j.
 Flor. Anthos, Leucoi ana P. ij.
 Flor. Genistæ P. j.

Fiat decoctio in aqua & uino, in quibus per noctem radices macerentur: & in colaturæ lb. ij. dissolue mellis despumati ʒ. iiij. Sacchari quantum satis est. fiat syrupus aromat. cum cinnamomi ʒ. j. Datur paulo antè quàm fluât menses, aut cum instat tempus purgationis. Rondeletius.

DE IULAPIIS CAP. III.

De Iulapio rosaceo.

R. Aquæ rosarum lb. iiij.
 Sacchari clarificati lb. ij. uel lb. iiij.

Fiat Iulapium cum diligentia secundum artem. * Febrium, thoracis, & uentriculi incendium, caloremq; flammeum extinguit, sitim inexpectam sedat.

Iulapium uiolatum.

R. Aquæ uiolearum lb. iiij.
 Sacchari clarificati lb. ij. uel iiij.

Coque ad iulapij consistentiam. * Febres, phlegmonas, pleuritidem, asperitatem gutturis & thoracis, ac tussim mitigat.

Iulapium oxalidis.

Iulapium oxalidis fit ter coquendo herbam acetosæ reiteratam seu renouatam ex aqua modica, quantum pro tegenda seu mergenda herba sufficit: & postea decoque ad consistentiam, cum æquali portione sacchari. Hoc album permanet, & est iucundum & utile, siquidem sub æstiuis feruoribus aqua uel simplici uel distillata pro libitu diluitur, grateq; bibitur. Colonienses.

Iulapium ad sistendum sanguinem.

R. Aquæ peculi ros.
 Aquæ sanguinarię, id est, centinodię.
 Aquæ bursę pastoris ana ʒ. iiij.
 Sacchari albi lb. β.

Fiat Iulapium. Rondeletius.

Iulapium ad hepatis refrigerationem.

R. Aquæ Cichorij, Lactucæ, Endiuie, Solani ana ʒ. iiij.
 Sacchari clarificati lb. β. uel j.

Coque ad iulapij consistentiam. Rondeletius.

Iulapium ad pectus.

R. Aquæ Violarum, Buglossę ana ʒ. iiij.
 Sacchari albi lb. β.

Fiat Iulapium. Rondeletius.

DE SVC.

A DE SVCCIS SEV ROB▶

CAP. IIII.

Rob de ribes simplex.

℞. Succī Ribes ℥. viij. Coquantur per se ad spissitudinem mellis.

Rob de ribes compositum.

℞. Succī Ribes ℥. iiij.

Sacchari optimi ℥. ij.

Coquantur secundum artem. * Ventriculum firmat, uomitum biliosum reprimat, sitim restinguit, aliasq; excretionēs biliosas sistit.

Rob de berberis simplex.

℞. Succī Berberis ℥. viij. Coquantur per se usq; ad mellis spissitudinem.

Rob de berberis compositum.

℞. Succī Berberis ℥. iiij.

Sacchari optimi ℥. ij.

Coquantur secundum artem. * Rob ex oxyocantha easdem quas præcedens facultates obtinet.

Rob nucum.

℞. Succī corticū uiridiū iuglandiū ℥. iiij.

Mellis optimi ℥. ij.

B Coquantur secundum artem. * Destillationi tenuium humorum à capite, & inflammationem excitantium confert. Mesues.

Diamoron.

℞. Succī Mororum Celsi ℥. β.

Succī Mororum rubi ℥. j.

Mellis optimi despumati ℥. j. Sapæ. ℥. iiij.

Coquantur secundum artem. * Contra depascentia oris ulcera, ad dentiū affectus, & gingiuarum noxas, atq; ad omnia oris uitia gargarizatus proficit. Nicolaus.

DE EMVLSIONIBVS▶

CAP. V.

Lac amygdalarum dulcium.

℞. Amygdalarum dulcium. ℥. β.

Mudentur à corticibus, contendantur in mortario lapideo optimè: deinde diluantur eū aquæ hordei mensura una, & per pannū linteum mundū exprimantur. * Reficit, somnumq; inducit.

Emulsio ad renum & uesicæ affectus.

℞. Sem. Melonū, Cucurbitæ, Citrulli, Cucum. recētiū & mūdatorū ana ℥. β.

R Amygdal.

Amygdal. dulcium mundat. \mathfrak{z} . j.
 Contundantur in mortario lapideo, ex aqua fontana prius cocta: deinde co-
 lentur ad libram, quæ uitreo uase condatur. * Vrinæ ardorem restinguit
 triens huius, uel sextans, tribus uel quatuor horis ante prædium assumptus.
 Andernacus.


Emulsio alia.


\mathfrak{R} . Seminis Papaueris albi \mathfrak{z} . β .
 Quatuor sem. frig. maior. ana \mathfrak{z} . iij.
 Amygdalarum dulcium \mathfrak{z} . β .

Omnia ex glycyrrhizæ decocti quadrante in mortario lapideo terantur: fy-
 rupi uiolacei, adianthi, & myrtorum sing. \mathfrak{z} . j. β . in iure decocti colato dissol-
 uantur: ac emulsio duabus uicibus manè horis quatuor ante prandium exhi-
 beatur. * Sitim compefcit, pectorisq; & pulmonum inflammationes restin-
 guit. Andernacus.

DE VINIS ARTIFICIALIBVS

CAPVT VI.





DE VINIS CALEFACIENTIBVS CAPVT.

Vinum è betonica.

Herbam semine maturo prægnantem, cum suis ramulis minæ pondo, congijs duobus uini macerant, & post septimum mensem transfundūt. * Ad multa interaneorum uitia, ut frutex ipse, pollet. Dioscorides.

Vinum eupragiæ.

℞ Eupragiæ q. s. est.
 Ponatur in doliolo, inusti pleno, & fiat uinum eupragiatum. * Huius usu oculi senum reuiuenscunt, & aufert impedimentum eorum, & defectum uisus in quocunq; homine de quacunq; ætate. Arnoldus.

Vinum rosmarinatum.

℞. Rosmarini quantum uoles.

R 2 Pone

Pone in dolio, superinfundendo mustum crudum siue coctum & despumatum, & in uinaria cella conserua. * Vtile est in omnibus ægri tudinibus frigidis. Confortat cerebrum, cor & neruos: appetitum rectificat: consumit phlegma: confortat dentes & gingiuas: cancrum ex eo sæpe lotū sanat: phthi sicis & hecticis prodest item quotidianæ, quartanæ, lethargo, paraly si & tremori mirificè confert: iuuentutem conseruat, & faciem iuuenilem reddit, si cum eo lauetur. Arnoldus.

Vinum stœchadites.

Congij sex stœchadis minam addere oportet. * Crasitiem, inflationes, laterum neruorumq; cruciatus, & perfrictiones discutit: comitialibus cōmodè datur cum pyrethro & sagapeno. Dioscorides.

Vinum saluiatum.

Saluiatum uinum diuersi diuersimodè faciunt. Aliqui. n. suspendunt fasciculum saluiæ in uafello: aliqui coquunt. * Quocunq; modorum fiat, ita ut nec corruptum, nec alteratum, sed in sua permanens bonitate: reperitur mirabilis eius usus in omni remollitione gingiuarū, & dolore dentium, & commotione eorum. Neruosa membra roborat: laxa rectificat, ut paralytica: epilepsia confert: stomachum, matricem, renes & uescicam cōfortat. Arnoldus.

Vinum feniculatum.

Feniculatum uinum propriè fit ex semine eius. * Valet contra caliginem oculorum: excitat uenerem: hydropem soluit, & elephantiam: obuiat uenis: multiplicat lac & sperma: tussi medetur: lateris dolores sedat, & mēstrua mouet. Arnoldus.

Vinum ad memoriam & obliuionem.

℞. Zingiberis, Piperis longi, Galangæ ana ℥. j.

Caryophyllorum, Cubebarum ana ℥. β.

Nucis Indicæ ℥. ii. β.

Fiat puluis, qui ligetur lentè in sacco, & ponatur in uini boni bullientis ℔. iij. & cooperiatur ne respiret, & permittatur clarificari: & cum opus est, assiduatur: nec sacculus de uino remoueatur. Arnoldus.

DE VINIS CALFACIENTIBVS COR.

Vinum borraginatum.

Vinum borraginatum & melissatum, cordialia sunt uina. * Valent propriè contra cardiacam, maniam, melancholiam & tremorem cordis: mundificant sanguinem: malas auferunt suspiciones: utiliaque sunt in omni specie corruptionis & scabiei & lepræ: inducunt lætitiā, & uentrem ad lubricitatem inclinant. Et fit hoc modo. In ℔. ipsius ponatur musti ℔. xiiij. & bulliant donec resideant & clarescant. Arnoldus.

Vinum

A

Vinum buglossatum.

℞. Rad. Buglossæ mundatarum quantum satis est.
Macerentur in musto, uel uino donec uinum saporem & uirtutē eius sumat,
& afsiduatur bibere. * Humores melancholicos adustos per urinam educit:
cerebrum rectificat: dementes & fatuos sanat, & ad sensum & discretionem
reducit. Arnoldus.

Vinum saccharatum.

℞. Vini optimi uel Cretici ℥. iij.
Sacchari albissimi ℥. ij.
Coquantur ad lentum ignem more syrapi. serua & utere cum duabus parti-
bus aquæ, uel aliter, ut ulus postulabit. * Senibus, frigidis & debilibus con-
uenit, & quibus humor natiuus & calor naturalis imminuuntur. nutrit enim,
& sanguinem generat. Arnoldus.

Vinum Hippocraticum.

℞. Vini austeri odorati sextarium.
Sacchari albi ℥. ℞.
Cinnamomi, Zingiberis ana ℥. ℞.
Galangæ ℥. j.

Misce, & cola secundum artem.

B Sunt qui cum lacte amygdalarum dulcium clarificant. * Valet ad cardiacos:
Alexander Benedictus.

Nectar.

℞. Cinnamomi ℥. j. ℞.
Zingiberis ℥. iij.
Cardamomi ℥. ij.
Folij, Galangæ ana ℥. j.
Spicæ nardi, Carui ana ℥. ℞.
Piperis longi ℥. iiij.
Caryophyllorum, Nucis moschatæ, Macis, Granorum paradisi ana ℥. ij.
Mellis despumati, pintam.
Vini boni, lotum Burgense.
Et si potes, loco mellis, pone sacchari libram. * Valet ad affectus frigidos: u-
tilisq; senibus, ac illis qui imbecilliores sunt ad uenerem. Cōuenit phlegma-
ticis & melancholicis mirificè. Tristitiam soluit, lætitiā confert. Splenis &
hepatis obstructiones aperit. Hydropem curat: & lapidē de renibus potēter
educit, si addatur parum saxifragæ & lapidis lyncis. Euonymus.

DE VINIS CALFACIENTIB. THORACEM.

Vinum hyssopites.

Vinum hyssopi uirtutem habet diureticam, dissoluendi, consumendi, &
R 3 attrahendi.

attrahendi. Est uinum senum: * ualet in tussi humida, & epilepsia: pulmones A
& matricem sanat: & aperit uias uocales, facitq; uocem claram: asthmati con-
fert. Arnoldus.

Vinum è marrubio.

Marrubij adulti folia tundito, & sextarios octo in musti metretâ demittito,
& reliqua consimiliter facito. * Conuenit pectoris uitijs, & omnibus, quibus
marrubium. Dioscorides.

Vinum enulatum.

Inulæ radices tessalitim incisas in olla fictili noua uitreata coques, in mu-
sti sextarijs duobus, aut amplius, donec partes aliquot consumantur. Dein-
de musti optimi dulcis sextarios uigintiquatuor, aut amplius, in cacabo de-
coques donec dulcescat: postea inulæ radices unâ cum musto in quo defer-
buerunt, affundes, & cum adhuc aliquantulum simul bullierint, depones ac
seruabis. Aliter. In musto dulci despumato, & ad tertie partis consumptione
decocto, cum iam ferè satis coctum fuerit, inulæ radices iniicies (pro cõgijs
uiginti quinque, uel circiter, uncias nouem) & cum modicè adhuc bullierit
mustû, depositum & refrigeratum serua: & inulæ radices (easdem scilicet, co-
lando separatas) in sacculo intra uas suspende. Debêt autem radices colligi
mense Octobri, crescente luna, aut ineute æstate, & sicari in sole. * Confert
cerebro, capiti, neruis: tussi medetur: ad affectus thoracis frigidos ualet: ué- B
triculû roborat: concoctione iuuat: menstrua & urinam mouet. Euonymus.

Vinum ad asthma.

Vinum in quo transiit uirtus anisi, fœniculi, & liquiritiæ, ita ut liquiritia
in duplo aliorum sit: * ualet contra uentositatem, raucedinem, tussim, &
asthma. Arnoldus.

Vinum passulatum.

Vinum passulatû fit passulis in uino uel musto decoctis, donec dulcescat,
quod mox in uase conditur: & passulæ contusæ in idem coniiciuntur. subsi-
dunt autem illæ in fæces. Arnoldus.

Vinum Hippocraticum.

℞. Cinnamomi optimi ʒ. i.

Caryophyllorum ʒ. i. β.

Anisi, Fœniculi ana ʒ. j.

Glycyrrhizæ ʒ. iij.

Macis, Cardamomi, Ireos ana ʒ. β.

Sacchari albissimi ʒ. iij.

Singula diligenter trita infundantur cum sequentibus.

℞. Vini maluatici ʒ. ix.

Aquæ Borriginis ℥. j.

Aquæ

A Aquæ rosacæ ꝑ. j. ß.

Aquæ Melissæ ꝑ. iij.

Per tres horas iuxta fornacem relicta, tandem sæpius per saccum filtri colato. fiat Hippocraticum uinum clarum. * Valer ad thoracis & pulmonis uitia. Euonymus.

DE VINIS EXCALFACIENTIBVS uentriculum.

Vinum absinthite.

Absinthium in dolio uini seu musti pleno immitti debet, antequam ferueat, ut per eius feruorem in uase, herbæ uis ei cõmiscetur, deinde per huiusmodi in uase relinqui, semper implendo iterum uas, si quid inde exhaustum fuerit. Alij diuersas herbas admiscent: ut carduum benedictum, melissam, cætaurium minus, hyssopum, & borraginem. * Stomacho frigido prodest, flatus discutit, colicam phlegmaticam, & ex flatibus natâ sanat: febribus omnibus, & regio morbo confert: uentriculum confirmat: uermes necat, &c. Arnoldus.

Vinum cerasorum nigrorum acetosorum.

B Alij per æstatem nigra cerasa acida integra, alij trita imponunt in uas, quartam partem relinquendo uacuum, superfuso ueteri uino albo, quod breui rubrum colorem trahit. Solent autem cum aliquid inde hauserint, mox iterum uas implere. Cor & stomachum roborat, sitim mitigat, refrigerat, siccatur, astringit. Potest & quouis anni tempore ex aridis fieri. Euonymus.

DE VINIS ROBORANTIBVS STOMACHVM.

Vinum raspitium.

Vinum Raspitium (nostri uocant Reppis) id est, linguam quadam acuta stypticitate mordens, * prouocat appetitum, uillos stomachi astringendo. Medetur corpori ob calorem dissoluto, potissimum æstate, cholericis, & sanguineis utile. Fit autem sic. Ponantur aliquæ uuæ acerbæ cum maturis in torculari, ut simul exprimantur. Vel, quod melius est, referuentur uuæ, & conterantur unâ cum raspitijs suis, & immittantur uasi cum musto. contrahet autem mustum illud à succo raspitorum illorum, & uinaceorum in uuis, quæ sunt acetosa, ponticitatem quandam & adstrictionem Arnoldus.

Aliud.

Nostri racemis integris bene maturis dolia implent, & mustum, uel uinum uetus superinfundunt, & quotiescunq; uinum inde hauserint, rursus implent. * Stomachum recreat, sitim remittit. Euonymus.

Vinum Hippocraticum.

℞. Cinnamomi electi ꝑ. ij.

Zingiberis

Zingiberis uel Galangæ ʒ. j.
 Non quassentur, sed itidem tenuissimè ceu laminatim conscindatur, stentq;
 per noctem in infusione duorum sextariorum uini, & inde percoletur per
 manicam Hippocratis, cui insint sacchari albi ʒ. viij. subinde reaffunde perco
 latum. Colonienfes.

A

DE VINIS EXCALFACIENTI-
 bus uentriculum.

℞. Cinnamomi electi ʒ. β.
 Zingiberis albi ʒ. ij.
 Caryophyllorum, Piperis longi, Nucis moschatæ ana obolos iijj.
 Bene tusa cum albi sacchari selibra, in meri albi congio commisceto, ac per-
 colabis.* Summū dissolutis stomacho remediū est. Alexander Benedictus.

Aliud.

℞. Cinnamomi ʒ. j.
 Zingiberis ʒ. β.
 Galangæ ʒ. ij.
 Granorum paradisi ʒ. ij.
 Caryophyllorum ʒ. j.
 Sacchari albi ʒ. viij.
 Vini optimi quantum sufficit.
 Misce, cola, & cum lacte amygdalarum dulcium clarifica secundum artem.
 Eunonymus.

B

Aliud.

℞. Cinnamomi electi ʒ. j. ʒ. v.
 Zingiberis ʒ. vj.
 Caryophyllorum, Galangæ ana ʒ. j.
 Macis, Nucis moschatæ ana ʒ. ij.
 Granorum paradisi, Cardamomi, Coriandri ana ʒ. j.
 Anisi ʒ. β.
 Sacchari ℥. ij.
 Vini rubri mensuras ij.
 Fiat secundum artem uinum Hippocraticum. Ioannes Langius.

Vinum Hippocraticum aliud.

℞. Cinnamomi electi ʒ. j.
 Galangæ ʒ. iij.
 Zingiberis ʒ. j.
 Caryophyllorum ʒ. ij.
 Nucis moschatæ ʒ. j.
 Sacchari ℥. j.

Vini

A Vini mensura j.
Fiat uinum Hippocraticum, ut artis est. Ioannes Langius.

Aliud.

℞. Cinnamomi electi ʒ. j. β.
Zingiberis ʒ. β.
Caryophyllorum ʒ. ij.
Granorum paradisi, Galangæ ana ʒ. j.
Sacchari lb. j. β.
Vini rubri mensuras ij.

Misce, & fiat Hippocraticum. Euonymus.

Claretum.

℞. Zingiberis, Galangæ ana ʒ. j.
Cinnamomi ʒ. ij.
Caryophyllorum ʒ. ij.
Granorum paradisi, Piperis longi ana. ʒ. j.
Mellis lb. j. β.
Sacchari lb. ij.
Vini albi mensuras iiij.

B Alij cum solo melle parant, & aliquid spicæ & nucis moschatæ addunt, & cū albumine oui clarificant. Euonymus.

Aliud.

℞. Vini albi optimi lb. iiij.
Sacchari albi ʒ. iiij.
Cinnamomi ʒ. j.
Coriandri præparati ʒ. iiij.
Caryophyllorum ʒ. ij.
Granorum paradisi, Zingiberis albi ana ʒ. j. β.
Piperis longi ʒ. ij.
Zedoariæ ʒ. β.

Omnia trita subtilissimè, & colata, referuentur in uase stanneo. Philippus Vltadius.

Aliud.

℞. Zingiberis ʒ. ij.
Cinnamomi ʒ. β.
Caryophyllorum ʒ. j.
Vini albi mensuras ij.
Mellis ʒ. j.
Sacchari albi lb. β.
Fiat claretum secundum artem. Arnoldus.

S

Aliud.

Aliud.

A

℞. Zingiberis ℥. ij.
Cinnamomi ℥. iij.
Caryophyllorum ℥. ij.
Galangæ ℥. ij.

Singula subtiliter trita, cribrataq; misceantur. Deinde croci Orientalis unciam bene tritam seorsim seruabis. Claretum facturus, mellis ℔. ij. ad ignē, in fictili nouo seruefacies: & cum bullire cœperit, aufer ab igne, & parua mora interposita despumato. Deinde mensuras duas uini optimi accipies, & admiscebis ei de speciebus prædictis ℥. ij. & croci ℥. j. aut amplius. Deinde per facculū colabis. Cuius pars superior linea sit, inferior lanea per unā tertiā tōzius facci, aut paulò plus. Cum uinum satis colatum fuerit, fæces infundere poteris in hydromeli siue apomeli, ut uulgò paratur, ut quod reliquum uitiū est, in id deponat. Hoc uino si mulier uti debeat, aut delicatus aliquis ꝑ melle saccharum pones. Euonymus.

Claretum uel nectar bonum.

℞. Cinnamomi ℔. j.
Galangæ, Zingiberis, Cardamomi, Granorum paradisi, Caryophyllorum, Cubebarum, Macis ana ℥. j.
Piperis longi, nigri ana ℥. β.
Spicæ nardi, Nucis moschati ana ℥. iij.
Squinanthi, Croci ℥. j.

B

Terantur omnia minutissimè, & misceantur. Sic habes species pro medietate oneris unius equi, id est pro barili uno. Nectar autem sic facies. Pone uinum totum in uasis. Deinde species pone in aliquo panno lineo satis amplo: & in barili, in quo nectar facere uolueris, pannum intromitte cū speciebus, ita quòd latera panni superemineant aliquantulum supra os barilis. Postea in aliquo uase pone ℔. iij. mellis, & fortiter cum uino misce, ita ut totum satis clarum sit. Tum uinum supra species colando infunde, & postremò uinū cum melle. Demum clauso barili species in eo relinque cum panno per biduum. Tandem aufer fortiter comprimendo: & habebis nectar optimum. Si uerò pro principe aut prædiuite aliquo parare uolueris, adde supradictis, ligni aloes optimi, folij, ana ℥. β. moschi ℥. β. & loco mellis pone saccharum minutissimè tritum in mortario, deinde solutum in uino. Euonymus.

Aliud nectar optimum.

℞. Cinnamomi ℔. β. ℥. β.
Zingiberis, Galangæ, Granorum paradisi, Caryophyllorum, Cubebarum, Macis, Cardamomi ana ℥. ij.
Piperis longi ℥. j.

Spicæ nar-

- A Spicæ nardi, Squinanthi ana ʒ.β.
Nucis moschatæ ʒ.β.

Croci ad pōdus denarij Turonensis. Hæc omnia minutissimè trita misce, & habebis species abundè pro loto nectaris ciuitatis Burgenfis. Deinde accipe libram mellis cum pinta aquæ fontanæ decoctum, usq; ad consumptionem aquæ: & refrigerandam sepone. Tunc accipe circiter lotum boni uini, & succo cum prædictis speciebus in uas immisso, uinum percolando, infundito paulatim, mel etiam cum uini parte prius mixtum paulatim infundendo, ita ut succus non comprimatur. Quod si preciosius facere uoles, saccharum pro melle pones in uino dissolutū, similiter pondere libræ, aut amplius. Percolabis autem ter uel quater, ut fortius & melius euadat uinum. Adde etiam prædictis agallochi optimi, folij ana grana duo, & moschi aliquantum. Euonymus.

Nectar aliud.

- ℞. Cinnamomi ʒ. ix.
Zingiberis ʒ. iij.
Nucis moschatæ, Piperis longi ana ʒ. iij.
Galangæ, Granorum paradisi, Macis, Cubebarum ana ʒ. ij.
Caryophyllorum ʒ. j.

- B Spicæ nardi ʒ. j.

Croci ʒ. β.

Sacchari ℥. j. uel Mellis pintam j.

quod bullierit in pauca aqua ad consumptionem aquæ, bene despumati. Misce in sesquilotum uini. Euonymus.

Aliud.

- ℞. Aristolochiæ rotundæ, Cinnamomi ana ʒ. j.
Zingiberis ʒ. β.
Galangæ, Granorum paradisi, Caryophyllorum, Cubebarum, Macis, Nucis moschatæ ana ʒ. ij.
Piperis longi ʒ. iij.
Spicæ nardi ʒ. j.
Croci ʒ. β.
Sacchari ℥. j. Vini, lotum.
Quod si pro diuite fuerit, adde agallochi optimi grana duo, & moschi granum unum. Vel secundum alios:
℞. Cinnamomi electi ʒ. ij.
Zingiberis ʒ. j.
Granorum paradisi, Piperis longi ana ʒ. β.
Nucis moschatæ, Caryophyllorum, Macis ana ʒ. ij.
Cubebarum, Cardamomi ana ʒ. j.

S 2

Spicæ nar-

Spicæ nardi, Squamanti, Calami aromatici ana ꝑ. j. A
Trita commisce cū tribus libris mellis, & loto uini, ut dictū est. Euonymus.

Vinum anisatum.

Vinum de aniso * aperit oppilationes meatuum & uiarum interiorū: præferuat à colica, à uentositate: & rectificat digestionem, & ruetuationem uentofam tollit usus eius: & propriè competit mulieribus nutricibus: quoniam aperiendo poros, & subtiliando sanguinem, atq; calefaciēdo multiplicat lac: & ipsum lac aquosum rectificat: & quandoque maceratur, & est melius. Tollit dolorem renum: & ipsum quidem uinum potest fieri cum igne, & absque igne. Arnoldus.

DE VINIS EXCALFACIENTI-
bus hepar.

Vinum chamædrytes.

Foliorum chamædryos tusorum libra in amphoram multi cōiecta, linteolo raro cum quibusdam lapillis folia inuoluuntur, ut degrauius pondusculo fasciculus sidat: uinum post quadraginta dies defecatum elutriatur. * Excalfacit, discutit: conuulsis, regio morbo, uulua inflationibus, tardæ concoctioni, incipienti aquæ inter cutem subuenit. Inueterascens melius redditur. Dioscorides. B

DE VINIS EXCALFACIENTI-
bus splenem.

Vinum tamaricis.

Corticibus tamaricis, in doliolo positis, mustū recens dulce superinfunditur, atque ad usum seruatur. * Sanguinem à melancholia mundat: quartanæ, ictero nigro confert: hepatis & lienis obstructions tollit.

DE VINIS EXCALFACIENTI-
bus renes & uesicam.

Vinum alkekengi.

Vinum alkekengi eodē modo fit, ut absinthite, super ijs contritis uinum colando. Pro dosi una accipies à quinq; ad decem. * Eductit materiam calculosam à renibus & uesica manifestè, & urinam retentam ducit. Sunt qui integra halicacabi grana in mustum ponant uase paruo, ut simul bulliant: & ad usum seruant. Euonymus ex Arnoldo.

Vinum saluiatum.

Saluiæ unciam unam in musti amphoram, quod idem cum ceramio est, mittito. * Valet contra renum, uesicæ & laterum dolores, reiectiones sanguinis, tussim, rupta, uulsa, & suppressos menses. Dioscorides.

DE

A DE VINIS ASTRINGENTIBVS.

Vinum cydonites.

Mala cotonea exemptis seminibus, frustatim rapi modo scinduntur, & duodecim minarum pondo, in multi metretam, triginta diebus maceratur: postea defæcatum uinum reponitur. * Altringit: prodest stomacho, dysenteria, hepaticis, renū uitijs, & urinæ difficultati. Dioscorides.

Vinum ex pyris.

Fit & è pyris, perinde atq; cotoneis, uinum, apyres nomine, sed ita ut pyra non magnopere maturescant. Ex siliquis etiam, mespilis, sorbis, simili modo téperatur. * Omnia hæc genera acerba sunt, & adstringunt. Stomacho utilia sunt, atq; intestinas fluxiones cohibent. Dioscorides.

Vinum œnanthinum.

Fit è feraci uite syluestri, quod uocatur Oenanthinum. Sicci flores minis duabus multi cado macerati, post triginta dies mutantur: mox colatū uinū reconditur. * Facit aduersus stomachi imbecillitatem, cibi fastidia, cœliacos & dysentericos. Dioscorides.

Vinum ex punicis.

B Fit è punicis malis maturis, succo expresso ab acinis eorum, quibus ligno sus nucleus abest, ac decocto ad tertias, & ita reposito. * Efficax est contra fluxiones internas, & febrim cum alui profluuiio exortā. stomacho utile, adstringit aluum, & urinam mouet. Dioscorides.

Vinum rosaceum.

Rhodites sic fit. Rosarum siccarum, tufarumq; minam linteolo deligatam in sextarios octo multi demergito: & post tres menses defæcatum uinum transfundens, recondito. * Utile ijs qui febre carent, & ad stomachi costiones, & dolores, à cibo potū: & contra humiditas aluos, & dysenterias. Diosco.

Vinum myrtites.

Myrtites uinum fit, baccis nigris, quæ maturitatē excefferint, tufis, & organo expressis. Aliqui ad tertias coquant. Alij baccas prius sole torrent, & quaternis sextarijs contusarū, ternas aquæ heminas adijciunt, & uini ueteris parem modū: postea exprimūt, & seruāt. * Magnopere adstringit. stomacho utile: fluxionibus uentris ac stomachi prodest, & contra intestinas ulcerationes & profluvia. denigrat capillos. Dioscorides.

Vinum palmeum.

Palmulas maturas in urceolo imo pertusum, & obstructū picata arūdine, demittito: lino foramen sit obturatū, & quadragenis sextarijs ternos aquæ cōgios infundito. Quod si ipsum ita dulce esse nō libeat, quinque cōgios infuisse satis est. Post decē dies detracto ab arundine linteo, assumito uinū crasum & dulce, & reponito. Suaue illud quidē, sed capiti noxiū. * cōtra fluxio-

nes propter adstrictoriam uim efficax: stomachicis, cœliacis, sanguinem ex- A
puentibus conuenit. Dioscorides.

Vinum è prunis syluestribus.

Vinum è prunis syluestribus eodem modo fit, ut cerasorum, per autu-
mnum, ubi iam satis mollia & bene matura fuerint. * Astringit uehemen-
ter, alui fluxiones cohibet. Euonymus.

DE VINIS SVDOREM PROVOCANTIBVS.

Vinum guaiacum.

℞: Ligni guaiaci præstantissimi, lima in scobem tenuissimam attriti ℥.iiij.
Corticum guaiaci ℥.ij.
Cardui benedicti ℥.j.β.
Adianti, Aspleni, Florum borraginis, Florum buglossæ ana ℥.j.
Cassie odoratæ ℥.vj.
Seminis anisi ℥.j.β.
Sacchari ℥.v.

Conijciantur omnia in cado uinario mundo aptæ capacitatis, desuper affu-
sis uini albi quàm optimi & feruentis, bis centum & quinquaginta: mox di-
ligenter uas operculetur, omniaq; sic macerari triduo dimittantur. Post tri- B
duum uerò linteo percolentur, allerueturq; huiusce macerationis uinum in
alio uase ad ægotantium potum. Siquidem bibitur hoc tã in prandio quàm
in cœna, secundi guaiaci decocti loco: non manè neq; uesperis, serapij uice,
quemadmodum temerè multi facere consueuerunt. Hoc idem uinum lon-
gè etiam melius, & maiore quantitate uindemiæ tempore confici po-
test, admixtis ligno, cortice, cæterisq; alijs, recentibus uuis albis in mu-
stum compressis: ibiq; tandiu dimissis, quousque mustum effervesce de-
finat, & pellucidum clarumq; reddatur: ueruntamen multiplicanda sunt
omnia, quæ conueniunt medicamenta, pro uuarum quantitate. * Hoc ui-
num non modò medetur cuiq; acerrimo Gallicæ pestis incommodo: sed e-
tiam diuturnis articulorum, capitis, neruorum, uentriculi, iecinoris, lienisq;
morbis pituita genitis mirificè succurrit. Nec minus etiam podagra labo-
rantibus opem fert, modò diuturna admodum non fuerit ægritudo. Iis tan-
tùm exhibendum est, qui pituita abundant: uere uel autumnò, temporibus:
præcedentibus prius euacuationibus decentibus. Matthiolus.

DE VINIS RESISTENTIBVS VENENIS.

Claretum.

℞: Vini optimi mensuram j.
Angelicæ ℥.β.

Boli

- A** Boli Armeni ʒ. j.
 Nucis moschatæ ʒ. ij.
 Galangæ, Piperis longi, Coriandriana ʒ. β.
 Zingiberis ʒ. j. β.
 Cinnamomi ʒ. vj.
 Sacchari lb. β.
 Misce, & fiat claretum, secundum artem. * Præferuat à peste. Euonymus.
Vinum zedoarticum.
 ℞. Zedoariæ, Cinnamomi ana ʒ. β.
 Galangæ ʒ. ij.
 Misce, fiat puluis, in sacco ligandus, atque in doliolo musti cocti pleno suspendendus. Euonymus.
Species pro uino zedoartico, quæ sufficiunt pro mensura uini, quæ Oma uulgò in Alsatia uocatur.
 ℞. Cinnamomi ʒ. iij.
 Caryophyllorum, Nucis moschatæ, Granorum paradisi, Cardamomi ana ʒ. β.
 Zedoariæ ʒ. vj.
 Cubebarum, Piperis longi ana ʒ. ij.
- B** Contunde crasiusculè, misce pro sacco. Euonymus.
Species pro uino zedoartico alia.
 ℞. Cinnamomi ʒ. ij.
 Zingiberis ʒ. β.
 Caryophyllorum, Piperis longi, Cardamomi, Cubebarum, Zedoariæ ana ʒ. j.
 Galangæ, Granorum paradisi ana ʒ. β.
 Trita crasiusculè misce pro sacco. Euonymus.

DE VINIS PURGANTIBVS PITVITAM:

Vinum scilliticum.

Vinum scillinum potui datum * omnem sanitatem adfert: humores enim attenuat, sed maximè pituitam, neque ipsam in stomacho, aut uentre, aut capite, aut iecore, aut liene, aut neruis, aut ossibus consistere permittit, neque alium id genus humorem tenacem obstructions facientem: sed omnia dissoluit, & uentrem lenit, atque ita subducit, & urinam mouet, & per ipsam causas attenuat, excernitque. Adeò uerò caput purgat, ut nares humiditate uacent. Comodè est podagræ, articulari, & comitiali morbo: denique omnis sanitatis est author. Ex his constat, Scillam albam, montanam, circiter canis ortum accipit in libræ pondere: per dies decem in umbra frigida: deinde scille laminas refrigeratas in uitreum uas mitte, & uini albi ueteris sextarios duodecim superinfunde.

funde, & suspensum uas per quadraginta dies habeto: postea scillam exime, **A**
& abijce, & uino ad antedicta uitia utere, & eius uim percipies. Subinde ante
cibū, uini duas uncias exhibe: sin à cibo, unciā mediā. Quòd si ipsum potui
commodum efficere uelis, ut magis delectet, mellis sextarios duos aut tres
admisceto. Galenus.

Acetum scillinum.

Salubre optimū acetum Scillinū à Pithagora scribitur, quo oēs imperato
res usi sunt. * Ab ipsius auctore fertur, quicūq; hoc utatur, longæ uitæ fore,
& eius extrema integra, usq; ad finē permāsura. Et ipse quidē Samius senex
huiusmodi extitit: quantū enim temporis uixerit, haud ignoras. de ipso in li-
bro traditū est, quòd cū suis cōsanguineis hāc facultatē cōmunicauit: cumq;
hoc medicamēto uti incœpit, quinquagesimū annū natus erat, & usq; ad cen-
tesimū decimūseptimū uitā produxit integer, & nulla unquā aduersa ualetu-
dine tentatus. Hæc sanè medicamenti auctor differuit, quòd fortasse uir phi-
losophus erat, mētiri nescius. Nos uerò uiri huius fidei periculū fecimus, ac
firmā, cōstantemq; huius medicamēti facultatē esse testamur. Oportet igitur
sumere Scillā montanā libræ unius ponderis, & dura circūcidere, & mollia
minutatim concidere, & aceti acerrimi sextarios octo in uitreū uas mittere,
atq; obturare, ac per triginta dies in Caniculæ caloribus, ut maceretur, per-
mittere: deinde scillā extractā exprimere. Id genus aceti parū mane sorbeto. **B**
Tibi aut hæc euenient, ut ne fauciu orisq; partes unquā remollescāt, os uen-
triculi bene ualebit, facilè spiritū duces, uox rectè habebit, oculi acutissimè
cernent, aures in officio manebūt, nullusq; flatuosus uapor in uentre unquā
excitabitur, nullū uiscus suspēsū erit, & bene spirās, bene coloratus deges.
Ad ciuilia negocia rectè affectus, nō acidū, non falsum ructabis, si aliquid a-
ceti huius assumpseris: & ieiunus ut assumes præcipio, septēq; postea stadios
deambules, ita enim dissoluetur. Hoc aceto qui utitur, in uictu quāuis licen-
tiosus esto: omnia enim cibaria cōficiet, & à nullo unquā offensam patietur:
neq; ualde implebitur, sed in melius proficere uidebitur. nihil superuacui in
corpore residebit, non flatus, nō bilis, non stercus, nō urina, sed omnia facilè
excernit, atq; educit. Aluus lubrica omnino est, totiusq; corporis purgatori-
um medicamentū, etiā si in ofsibus sordes inhæreāt. Itē phthysicos ab omni-
bus deploratos, hoc medicamento sanitati restitutos nouimus. Morbo comi-
tiali diuturno efficaciter profuit, ut nisi post longa temporis interualla, non
redierit: incipientem uerò ac nouum perfectè discutit, neq; reuerti amplius
hunc affectum permittit. Ad podagras præterea, & articulorū morbos, ieco-
ris, lienisq; duritias uehementer facit. Et particulares quidem aceti scillini
effectus hi sunt. Communes autem quàm plurimi: quibus nos cōmoti, salu-
tare hoc medicamentū, sanitatis, integritatisq; causa, tibi tradidimus. Gale.

Claretum

A

Claretum laxatiuum.

℞. Galangæ ʒ.vi.
Cinnamomi ʒ.j.
Turbiti, Esule, Cataputię, Hermodactylorum ana ʒ.β.
Tere, fiat claretum cum melle & saccharo. * Pituitam purgat. Euonymus.

Aliud pro epilepticis.

℞. Radicis pæonię, Seminis pæonię decort. ana ʒ.j.β.
Cinnamomi, Macis, Galangę, Zingiberis, Caryophyllorum ana ʒ.j.
Foliorum senę ʒ.j.
Turpeti ʒ.vj. uel
Rhabbarbari ʒ.iiij. uel
Agarici ʒ.v.
Sacchari ʒ.vj.
Vini ʒ.xij.
Aquę ʒ.viiij.
Macerata per horas 24. per filtrum sepius colentur. Thomas Eraſtus.

Vinum purgatorium in epilepsia.

℞. Absinthij, Cardui benedicti, Verbenę, Betonicę, uel Agrimonię, Eupatorii, Aspleni, Tamarisci, Rad. Capparorum ana M.j.
Cinnamomi, Macis, Galangę, Zingiberis ana ʒ.j. uel ʒ.ij.
B Flor. pæonię, uel rad. & sem. pæonię ana ʒ.j.β.
Seminis citri ʒ.β.
Fol. senę ʒ.ij.
Turpeti incisi, Agarici ana ʒ.β.
Vini ueteris mens. iij.

Misceantur in uase diligenter clauso. Capiat æger alternis diebus poculum unum initio partus. Eraſtus.

DE VINIS PURGANTIBVS BILEM flauam.

Vinum scammonites.

Scammonites uinum sic fit. Radices scammonię per messes effossę, trite, & linteo colligatę drachmas quinque in multi congium mittito ad dies triginta. * Aluum purgat: bilem & pituitam extrahit. Dioscorides.

DE VINIS PURGANTIBVS BILEM atram.

Vinum è ueratro nigro.

℞. Veratri drachmas uiginti, iunci odorati uncias duodecim, spice Syriacę uncias tredecim. cribratas, & linteolo colligatas, in septem uini Coisextarios,

T

tarios,

DE VINIS ARTIFICIALIBVS:

tarijs, diebus quadraginta macerandas indito, postmodum colato, dabis in A potu sesquiheminam. * Partus enecat. Atram bilem purgat. Dioscorides.

DE VINIS PURGANTIBVS AQVAM.

Vinum ebullatum.

Grana ebulorum quando sunt matura, decoquantur, & propriè tempore vjndemiarum cum musto: & remoueat spuma ebullitionis, donec tertia pars fuerit absorpta. In nocte ponatur ad aërem: in crastinum uerò per colatorium lineum distilletur, uel per filtrum: demù recipiatur quantitas istius colati, & ponatur in alio musto albo, donec tibi placeat color & sapor: & mitatur in uase, & expectetur donec deferuescat: & tunc clarificetur cum malaxatione clari ouorum, & sale, secùdum artem. * Est simile in operationibus uino de radicibus ebulorum, & magis amabile: sed non sic operosum. Ventrem laxat: aquam hydropicorum per inferna ducit. Arnoldus.

Vinum è thymelæa.

Ramorù thymelææ cù suis folijs & fructu triginta drachmas mittito in congijs tres mults, & leui igne coquito, donec cōgij duo supersint: defecatũq; recondito. * Aquosa purgat excrementa, & lienem absorbit. Dioscorides.

Vinum è chamelæa.

Chamelæa dum floret, cù folijs tusa, & cribrata, decē drachmarũ pondere, in multi congiũ additur: post duos menses uinũ in uas trãsfertur. Aquæ inter B cutem, hepaticis, & lassitudine contractis, efficax est: item mulieribus, quæ à partu egrè purgãtur. Chamæpityinum simili modo fit, ad eadem cõueniens: urinam quoq; ciet. Dioscorides.

Vinum miralti ad hydropem.

℞. Rad. quinq; aperientium, Glycyrrhizæ, Cort. rad. Cappar. Cort. med. Fraxini ana ʒ. j.

Rad. Iridis recent. Calami aromat. Cinnamomi ana ʒ. ʒ.

Capil. Veneris, Cetrach, Fol. Tamarisci, Flor. cordialium ana M. j.

Abſinthij Pontici, Cardui benedicti, Hyssopi, Præsij ana M. ʒ.

Sem. Anisi, Apij, Ameos, Fœniculi ana ʒ. j. ʒ.

Senæ ʒ. ij.

Ligni guaiaci, limati lb. j.

Sacchari lb. ij.

Vini generosi lb. 40.

Misce, & serua in uase obturato. Muraltus.

Vinum absinthite purgan.

℞. Absinthij M. j. ʒ.

Cardui benedicti M. j.

Agrimoniæ M. j.

Asplenij

- A Aspleni, Ericæ, Verbenæ ana M.β.
 Rad. Ireos Florent. ʒ. i. β.
 Rad. Capparorum, Afari, Polypodij ana ʒ. β.
 Rad. Cichorij ʒ. j. β.
 Rad. Fœniculi ʒ. j.
 Rad. Apij ʒ. β.
 Sem. Fœniculi, Apij, Petroselini, Anisi ana ʒ. j.
 Calami aromatici, Cinnamomi ana ʒ. ʒ.
 Senæ ʒ. j. β.
 Soldanellæ M. iij.
 Rad. Iridis concisæ ʒ. iij.
 Turpeti concisi ʒ. v.
 Vini albi generosi, in quo chalybs ignitus sæpius fuit extinctus lb. xviii.
 Miscæ. Vtere alternis diebus, initio partus poculum unum. Erastus.

DE VINIS PURGANTIB. HUMORES MIXTOS.

Vinum Hippocraticum laxatiuum.


- ʒ. Esulæ lb. j.
 Epithymi ʒ. vj.
 Polypodij, Cinnamomi, Passularum ana ʒ. β.
 B Masticeis Zingiberis, Zedoariæ, Caryophyllorum ana ʒ. j
 Sacchari quantum sufficit.
 * Contra quartanam, quotidianam & tertianam notham ualet: concoquit & preparat humores, & eosdem mox per aluum educit. Arnoldus.

Vinum guaiacum purgans.

- ʒ. Ligni guaiaci incisi lb. iij.
 Cardui benedicti M. vj.
 Adianti, Scolopendrij, Flor. Borraginis, Buglossæ, Rad. Cichorij ana M. iij.
 Betonicæ, Lupulorum, Cort. Tamaricis, Epithymi ana M. j. β.
 Polypodij ʒ. ʒ.
 Seminis Carthami lb. j.
 Seminis Anisi ʒ. iij.
 Foliorum senæ lb. j.
 Hellebori nigri ʒ. j.
 Turbith ʒ. iij.
 Cinnamomi electi ʒ. vj.
 Macis ʒ. j.
 Nucis moschatae, Caryophyllorum ana ʒ. β.
 Calami aromatici ʒ. ij.
 Incidenda incidantur, contundenda contundantur crasse, in sacculo ligen-
 tur,

tur, suspendantur in cado uinario mundo aptæ capacitatis, superinfunden. A
do multi optimi lb. c. omniaq; sic macerari finito, donec deferuescat, claruq;
euadat, &c. * Curat morbum Gallicum, & alios innumeros morbos. Dan-
tur ʒ. v. uel ʒ. vj. manè stomacho ieiuno.

DE DECOCTIS CAP. VII.



B.

DE DE.

A DE DECOCTIS OFFICINALIBVS
reficientibus.*De aqua hordei,*

R. Hordei integri fricati cum panno aspero usq; ad excussionem tenuium corticium, id est palearum partem unam, uerbi gratia libram unam. Et sit hordeum substantia laudabili, gratis medię inter antiquum & nouum, super quod non cecidit de odore corruptionis aliquid, nec de contagione fumi, aut pulueris, & conseruatum fuerit in loco aëris liberi, & iam habuerit perfectionem in maturitate sua, & pone illud electum in olla noua, mundata, lota, & exquisitè absterfa, ut non remanserit in illa de odore quidquam omnino: & proijce super ipsum aquę circiter partes uiginti, uerbi gratia libras uiginti: & sit aqua fontana leuissimā dulcissimā. Stet tamen prius hordeum in aqua per quatuor horas infusum: & inde facias cum igne claro & suauī ipsam feruere, primam abijciendo spumam. Et esto hordeum semper integrum, leuiter quidem fricatum panno aspero, & quasi depaleatum, si multam quęris absterfionem, atq; exoppilationem ualentiorē: integrè uerò ab utroq; cortice mundatum, si aquam hordeaceam habere uolueris ad sitim mitigandam, asperitatemq; leniendam, nec non inflammationem extinguendam. * Vnde talis aqua hordei conuenit in leniendo pectore atq; pulmone, humectandisq; præcordijs. Coctio præterea continuetur ad crepaturam hordei, perfectam quidem in priore illa intentione: perfectiorem uerò & diuturniorem plus minus in posteriore hac intentione. Colonienfes.

Aqua cicerum.

Decoque libram unam cicerum conseruatum adhuc nitrositatem suam, cum libris uiginti aquę facili decoctione, usq; dum redeant ad libras decem. Tunc erit aqua eorum potus medicinalis. Et si ulteriorem excipiat coctionem, & quidem cum plurima aqua, usq; dum acquirat mediocritatem inter tenue seu liquidum & unctum, est cibus bonus, præsertim colatus. Mesues.

Decoctum ptisana hordei.

Sed quando ptisana hordei, ad edulij uel sorbitionis usum decoqui debet, tunc semper accipere oportet hordeum exquisitè excorticatum, quod uulgo mundatum dicitur: idq; uel integrum, uel confractum, quod far hordei Latinis dicitur. Satius tamen fuerit, integrum quàm confractum sumere, ut euitemus metum Manardi: quandoquidem in hordeo integro absolutam, perfectamq; coctionem animaduertere commodius est, quàm in confractione: quia coctio eius semper perfici debet, usq; ad disperditionē & ueluti tabem ipsius hordei, nunc in largiore, nunc in pauciore aqua, pro uario intentionis medici scopo. Nam quando non admodum tenui uictu utendum erit, sed a liquantulo plenius cibare licebit, quum scilicet totam ptisanam exhibemus

(nam ptisana tota Galeno non est exquisitè tenuis uictus, nisi omnino pauca assumpta fuerit:) tunc uerbi gratia suffecerint ad partem unam hordei partes quinque aquæ, secundum placitum Auenzoar. sed si tenuius cibare propositum est, ut quando cremorè siue succum exhibemus, colatorio manibus uel cochleario expressum: tunc copiosiore aqua ptisanam decoquimus: uerbi gratia, decem partes aquæ ad unam hordei accipiēdo. plus autem aquæ accipimus, quando tenuissimè nutrire uolumus, aut saltem seruata proximè assignata aquæ quantitate, percoctam ptisanam sua sponte sensim per colatorium eliquari sinimus, sine adminiculo expressionis. unde uulgus practificantium, hanc uocant ptisanam colatam: illam uerò quæ expressa est, uocant ptisanam hordei non colatam. Hac decisione constituta, putamus omnem caliginem & nubem Arabicæ perplexitatis seu confusionis discussam iri. Colonienfes.

DE DECOCTIS ALTERANTIBVS
communibus.

Decoctum commune magistrale, ad medicamenta maceranda.

℞. Prunorum n. xij.

Sebesten n. x.

Passularum ʒ. j.

Hordei decorticati ʒ. β.

Glycyrrhizæ rasæ, Violarum, Folliculorum Senæ, Polypodij, Epithymi, Carthami, Anisi, Dauci, Cinnamomi ana ʒ. ij.

Coque in aquæ communis lb. ij. donec dimidium absumatur: cola, & utere. Florentini.

Decoctum commune refrigerans.

℞. Prunorum n. xij. Hordei mundi ʒ. j.

Tamarindorum, Violarum, Passarum ana ʒ. β.

Sein. communium maiorum ana ʒ. ij.

Coque in lb. ij. aquæ, ut supra.

DE DECOCTIS ALTERANTIBVS CAPVT.

Decoctum cephalicum calefaciens.

℞. Stæchadis, Betonicæ, Saluiæ ana M. β.

Rad. Pæoniæ ʒ. ij.

Passarum ʒ. j.

Glycyrrhizæ, Anisi, Dauci ana ʒ. iij.

Nucis Moschatæ ʒ. β.

Coque ut supra.

DE DECOCTIS ALTERANTIBVS PECTVS.

Decoctum pectorale.

℞. Passularum ʒ. j.

Sebesten, Iuiubarum ana n. xv.

Dactyloz

- A. Dactylorum n. vj.
Hordei purgati ℥. j.
Glycyrrhizæ ℥. β.
Adianti M. β.
Hyssopi ℥. ij.

Coque ut supra.

Decoctum pectorale aliud.

- ℞. Hyssopi sicci, Adianti albi, Ficum Palmularum, Myxariorum, Ziri-
phorum, Vuarum passarum, Hordei mundi, Glycyrrhizæ rasæ ana par-
tes æquales.

In aqua fontana quæta cõuenit, coquatur. * Horũ ius ad excremẽta pectoris,
& defluxiones pituitosas, sputaq; educẽda singulare est remediũ. Andernac.

Decoctum pectorale aliud.

- ℞. Anisi, Fœniculi, Adianti ana partes æquales.
Cinnamomi, Masticis ana ℥. j.

Omnia coquantur in aqua, donec quarta eius pars absumpta fuerit. * Huius
decocti ius, faucium & thoracis asperitates lenit: excremẽta ad excretionem
promouet: nec non robur uisceribus addit: uentriculi uires excitat, flatusq;
intestinatorum discutit. Andernacus.

DE DECOCTIS ALTERANTIBVS COR.

B.

Decoctum cordiale.

- ℞. Prunorum n. xij.
Passularum ℥. j.
Sebesten n. xvj.
Iuiubarum n. x.
Flor. Borriginis, Buglossæ, Violarũ, Melissophylli, Capill. Vener. ana M. β.
Seminis basilici, Glycyrrhizæ, Dauci ana ℥. ij.
Coque ut supra. * Decoctum uerò cordiale refrigerans fit, additis semini-
bus communibus, ijsq; feminibus quæ decoctum refrigerans supra descri-
ptum ingrediuntur.

Decoctum flatus pellens.

- ℞. Anisi, Dauci, Cymini, Fœniculi ana ℥. iij.
Glycyrrhizæ ℥. β.
Flor. Chamomillæ M. β.
Passularum ℥. j. β.
Coque in libris duabus aquæ ad medietatem ferè.

DE DECOCTIS SVDOREM PROVOCANTIBVS.

Decoctum ligni guaiaci, absq; cortice.

- ℞. Ligni guaiaci optimè incisi lb. j. Aquæ fontanæ lb. xij. Infusa.

Infundatur lignum in aqua calida per horas 24. in uase figulino uitreato, ob- A
turato: deinde coquantur igne lento usq; ad librarum octo cōsumptionem:
coletur, & seruetur in uase uitreo pro syrupo, ad sudorem mouendum.

Decoctum ligni, pro potu.

℞. Lignum guaiacum prioris decoctionis.

Aquæ fontanæ ℔. xij.

Iterum coque usq; ad consumptionem tertiæ partis: cola, & serua pro potu,
in prandio & cœna fumendo.

Decoctum ligni guaiaci cum corticibus.

℞. Ligni guaiaci optimè incisi ℥. x.

Cort. ligni guaiaci incisi ℥. ij.

Aquæ fontanæ ℔. xij.

Fiat ut suprâ.

Potest maior uel minor corticis quantitas addi, & cum aqua betonicæ uel
fumiterræ, pro medici scopo, decoqui.

Decoctum ligni guaiaci cum uino.

℞. Ligni guaiaci ℥. x.

Cort. ligni guaiaci ℥. iij.

Aquæ fontanæ ℔. xij.

Infundantur ut suprâ, & decoquantur usque ad consumptionem librarum B
nouem: deinde addantur uini optimi lib. iij. & iterum feruere modicè fini-
to, postea refrigeratū colato, & in uase uitreo, pro syrupo seruato. Florentini.

Decoctum ligni guaiaci cum uino, pro potu ordinario.

℞. Præcedentis decoctionis lignum.

Aquæ fontanæ ℔. xij.

Coquantur usq; ad consumptionem septem librarum: deinde addantur uini
albi optimi ℔. iij. & facta unica sola bullitione, ab igne auferatur, coletur, &
in uase uitreo seruetur, pro potu ordinario, cibis associando. Florentini.

Decoctum zarzæ parille.

℞. Rad. zarzæ parillæ ℥. iij.

Aquæ fontanæ ℔. xij.

Radices primò uino albo lauentur, deinde minutatim incidantur, & in su-
pradiçta aqua calida per horas duodecim infundantur, in uase figulino bene
operculo & pannis obstructo: mox coquantur igne lento, usq; ad consum-
ptionem librarum octo: postea coletur, atq; in uase uitreo optimè cooperto
pro syrupo seruetur. Secundum decoctum pro potu ordinario, fit ut ligni
guaiaci potus. Florentini.

Decoctum radice cinæ.

℞. Radic. cinæ opt. ℥. j. Aquæ fontanæ ℔. xij.

Radices

A Radices incidantur minutim, & in prædicta aqua tepida per horas duodecim infundantur in uase terreo uitriato: deinde igne lento coquantur usque ad consumptionem tertiæ partis: postea cola, & serua pro syrupo. Aliqui usq; ad librarum octo, aliqui ad medietatis consumptionem coquant. Florétini.

DE DECOCTIS PURGANTIBVS SANGVINEM.

Decoctum adianthi.

℞. Adianthi ueri recentis ℥. j. β.
Summitatum fumarie, Summitatum lupuli, Violarum siccarum ana ℥. j.
Prunorum Damasc. n. xl.
Zizipharum n. x.
Iuiubarum n. xx.

Coque libris tribus aquæ lento igne ad duarum librarum consumptionem: infunde tandem

Pulpæ chalsiæ solutiæ ℥. iij.

Tamarindorum ℥. ij.

Rhabarbari boni ℥. iij.

Frigidum manibus frica, cola, & propina. * Sanguinem purgat, clarumq; reddit, ardoremq; ipsius ac flauæ bilis compescit. Mesues.

Decoctum fumarie.

B ℞. Succu Cichorij, Endiuie, Lupulorum, Borriginis ana ℥. iij.

Succi Fumiterræ ℥. viij.

Quibus coctis & purgatis, adde

Myrob. citrinorum, Myrob. Indorum ana ℥. ij.

Passularum mundat. ℥. j.

Tamarindorum ℥. iij.

Frica, cola, & serua. * Sanguinem bile flaua & adustis humoribus purgat, hepatis obstructions aperit, ac inde natam icterum sanat. Mesues.

DE DECOCTIS PURGANTIBVS

bilem flauam.

Decoctum fructuum.

℞. Prunorum n. xl.

Sebesten, siue myxariorum n. xxx.

Iuiubarum n. xxx.

Tamarindorum ℥. ij.

Calsiæ recens extractæ ℥. iij.

Mannæ ℥. j.

Macerentur fructus in aquæ libris tribus: deinde adde cassiam, tamarindos, & mannâ: fiat ut suprâ. * Sanguinis & bilis flauæ feruorem reprimat,

V sanguinem

sanguinem clarum reddit, & bilem clementer educit. Mesues.

DE DECOCTIS PURGANTIBVS PITVITAM

Decoctum thymi.

℞. Thymi, Cassuthæ, Hyssopi ana ʒ. j.
 Passularum purg. ʒ. iiij.
 Miobal. Emblicarum, Chebularum ana ʒ. j.
 Turbith ʒ. iiij.
 Stœchados, Polypodij ana ʒ. v.
 Eupatorij Meluæ ʒ. iiij.
 Rad. Apij, Fœniculi ana ʒ. viij.
 Absinthij, Anisi, Dauçi ana ʒ. iiij.

Coque omnia in libris tribus aquæ, ad librarum duarum consumptionem: cola. Colato adde

Turbith, Agarici ana ʒ. j.
 Zingiberis ʒ. β.

Macerari noctem sine: postridie cola, & utere. * Phlegmagogum est: ob id senibus, & aliter pituitosis salubre: uentriculum firmat, coctionem iuuat, status à uisceribus & hypochondrijs dissoluit. Mesues.

Decoctum galli ad colicam.

Gallinaceum ueterē quatuor annorum interficito, exinanitoq; & repleto. salis fossiti, drachmis tribus, sem. cnici, polypodij, hyssopi ana ʒ. j. sem. dauçi, anethi, ameos ana ʒ. β. turpeti ʒ. iiij. Deinde resarto uentre, in duodecim aquæ libris ad dimidias coquito. iuris decocti ʒ. iiij. aut sex potui exhibeto. An. dernacus.

Decoctum stœchados.

℞. Stœchadis, Origani Cretici ana ʒ. iiij.
 Sem. Apij, Fœniculi, Eupatorij Meluæ ana ʒ. iiij.
 Schœnanthi, Hyssopi ana ʒ. j.
 Passularum mund. ʒ. viij.
 Turbith ʒ. iiij.

Coque ut supra, & utere. * Confert pituitosis affectibus, ut febribus quotidianis, iuncturarum & neruorum dolori, & frigidæ intemperiei. Mesues.

DE DECOCTIS BILEM ATRAM
 purgantibus.

Decoctum epithymi.

℞. Myrobal. Indarum, Stœchadis, Epithymi, Passularum mundat. ana ʒ. j.
 Myrobal. chebul. Summitatum fumarizæ ana ʒ. iiij.
 Folliculorum senæ ʒ. viij.
 Polypodij ʒ. vj.

Turbith

- A** Turbith ʒ.iiij.
 Eupatorij ʒ.v.
 Omnia præter epithymum coquantur in feri caprini libris tribus, ad dua-
 rum librarum consumptionem: tunc adde epithymum, & semel feruefac:
 tolle ab igne, & adde
 Hellebori nigri ʒ.j.
 Agarici ʒ.β.
 Salis Indi ʒ.j.β.
 Frica, cola, & utere. * Bilem atram uacuat: ob id affectibus melancholicis,
 ut cancro, elephantiasi, & cæteris confert. Mesues.

DE DECOCTIS PURGANTIBVS HV-
 mores mixtos.

Decoctum myrobalanorum.

- ℞. Myrobal. Citrinarum, Chebularum, Indarum ana ʒ.j.
 Tamarindorum ʒ.j.β.
 Comarum fumarie ʒ.viij.
 Absinthij ʒ.vj.
 Prunorum n. xxx.
 Passularum mundat. ʒ.j.
B Coque in libris tribus aquæ, ad duarum librarum consumptionem: cum im-
 becillum uoles medicamentum, reliquæ libræ dimidio adde
 Pulpæ calsiæ ʒ.vj.
 Cum autem ualentius, adde
 Pulpæ calsiæ ʒ.j.
 Turbith, Agarici ana ʒ.β.
 Frica, cola. Præstantius fiet, si in sero lactis caprini coquantur. * Bilem
 utramq;, & pituitam purgat Mesues.

Decoctum eupatorij.

- ℞. Eupatorij, Absinthij, Afari, Nardi Indicæ, Capill. Veneris, Cyperi, Rha-
 barbari, Comarum fumarie ana ʒ.iiij.
 Bedeguar, Secacul ana ʒ.iiij.
 Myrobal. Chebularum, Indarum ana ʒ.viij.
 Passularum purgatarum ʒ.j.
 Coque & utere. * Hepatis & lienis obstructions & inde nascentes dolo-
 res, & febres compositas iuuat. Mesues.

DE DECOCTIS ALTERANTIBVS PECTVS.

Decoctum pectorale.

- ℞. Hyssopi, Capill. Veneris ana M.β.
 Ficuum, Palmularum, Zizipharum, Myxariorum ana n.iiij.
 Vuarum passarum, Hordei, Glycyrrhizæ, Anisi ana ʒ.j.

V 2 Decoquan-

Decoquantur in aquæ mensura, quanta conuenit ad tertias. Quincunx una A
uice datur ad pectoris uitia, ut tulsim, rauce dinemq̄s, donec totum absuma-
tur. Andernacus.

DE DECOCTIS ALTERANTIBVS COR.

Decoctum cordiale.

℞. Prunorum Damasc. n. vj.
Palmularum Indicarum, Passarum ana ʒ.β.
Glycyrrhizæ ʒ. j.β.
Flor. Borræg. Buglossæ, Violarum, Hordei ana P. j.
Sem. 4. com. frig. ana ʒ.β.

Aquæ fontanæ, quantum alia medicamenta tres digitos superare possit: in
qua reliqua omnia coquantur ad tertias: deinde ex iure colato datur triens,
aut quincunx. Si sæpius exhiberi debet, maior tum aquæ, tum medicamen-
torum modus adhibeatur. Andernacus.

DE DECOCTIS ALTERANTIBVS BILEM.

Decoctum adianthi.

℞. Adianthi albi, Fumariæ, Lupuli ana M. j.
Violarum siccarum P. j. B
Prunorum n. xx.
Zizipharum n. x.

In aqua fontana, quanta sufficit, ad tertias usq; coquantur: unaq; uice uncia
quinq; exhibentur. Vel

Adianthi M.β.
Semiois Anisi, Fœniculi ana ʒ.β.
Cinnamomi, Malticis ana ʒ. j.

Coquantur, ut superius. * Hoc etiam uiscera roborat. Andernacus.

DE DECOCTIS ALTERANTIBVS

pituitam.

Decoctum ex thymo.

℞. Thymi, Cassuthæ, Hyssopi ana ʒ.β.
Rad. Apij, Fœniculi ana ʒ. vj.
Sem. Anisi, Dauci ana ʒ. j.
Passularum enucleatarum ʒ. ij.
Glycyrrhizæ ʒ. ij.

In aqua ad dimidias coquantur. In iure decocti, zinziberis minutim incisi
drachma semissis maceretur: manè uncia quinq; singulis uicibus exhibean-
tur. Andernacus.

DE DE-

A DE DECOCTIS ALTERANTIBVS Bilem atram.

Decoctum ex fumaris.

℞. Succifumaris ℥. iij.
 Succifuglossæ, Lupuli, Endiuicæ, Cichorij ana ℥. ij.
 Passularum enucleatarum contusarum q̄ ℥. j.
 Glycyrrhizæ ℥. ij.

Coquantur ad tertias, colenturq̄. Iuris uncia duæ cum recens est, aut quatuor, cum uetustior, propinantur. Andernacus.

DE DECOCTIS PURGANTIB. BILEM FLAVAM.

Decoctum bilem educens.

℞. Intybi, Cichorij, Eupatorij, id est, agrimonis ana M. β.
 Flor. Borriginis, Buglossæ, Violarum ana P. β.
 Tamarindorum ℥. j.
 Prunorum Damasc. n. v.
 Glycyrrhizæ rasæ ℥. j. β.

Decoquantur ut supra, in aqua ad tertias. Andernacus.

B DE DECOCTIS PURGANTIB. PITVITAM.

Decoctum pituitam educens.

℞. Hyssopi, Thymi ana P. β.
 Sem. Cnici ℥. vj.
 Sem. Anisi, Fœniculi ana ℥. j. β.
 Polypodij ℥. β.
 Glycyrrhizæ rasæ ℥. ij.

Decoquantur in aqua ad tertias, ut supra. Andernacus.

Decoctum atram bilem uacuans.


℞. Buglossæ, Scolopendrij ana M. β.
 Senæ Alexandrinæ ℥. j.
 Flor. Violarū, Thymi, Epithymi ana P. j.
 Sem. Anisi, Fœniculi ana ℥. β.
 Zingiberis ℥. j. β.
 Passularum ℥. β.
 Prunorum Damasc. n. x.

Decoquantur in aqua ad tertias. Ex iure hoc fumantur uncia quatuor. Andernacus.

DE INFUSIONIBVS.
DE INFUSIONIBVS.

A

CAP. VIII.



DE ACE-

ANTIDOTARII LIB. II
DE ACETIS.

143

A

Acetum rosaceum.

℞. Rosarum rubrarum mediæ maturitatis, præfectis & abiectis unguibus, hoc est imis foliorum partibus, absq; rore sine pluuia lectarum, in umbrâ extra solem ad triduum aut quatrimum expansarum & resiccatarum, libram unam.

Aceti sextarios octo.

Insolentur diebus quadraginta. Deinde reponantur, uel (quod melius est) abiectis folijs corruptis, acetum coletur ac reponatur. Quidam sæpius mutant folia rosarum, nec ita diu stare in sole sinunt (uerbi gratia, ad dies triginta, uel pauciores) ut elegantius colore aspectuq; & sapore odoreq; ualidius fiat acetum. Ad normam & exemplum aceti rosati parari etiam possent.

ACETVM SALVIATVM, ex floribus siccatis saluiæ.

SAMBUCATVM ex flor. siccatis sambuci.

ROSMARINATVM uulgò ANTHOSATVM dictum, ex floribus siccatis rorismarini.

ACETVM LAVANDVLAE, ex floribus siccatis.

ACETVM CARYOPHYLLATVM ex floribus caryophyllorum. Medici Colonienfes.

B

DE DILVTIS SEV INFVSIS PVR-
gantibus bilem.

Infusum seri lactis.

℞. Fol. rosarum recentium, completarum, mundatarum ʒ. ij.

Rhabarbari electi ʒ. ij. G. xij.

Nardi Indicæ ʒ. i. β.

Rhabarbarum, & rosæ minutim incidantur, aut terantur, spica inciditur: macerentur per noctem, in seri lactis, præsertim caprini, libris duabus. Cola, leuiter exprime, & propina. * Bilem flauam clementer educendo, sanguinem purgat. Mesues.

Infusum succi herbarum.

℞. Succu Intybi, Lupuli, Borraginis, purgatorum ana ʒ. viij.

Myrobalanorum citrinorum ʒ. j.

Rhabarbari electi ʒ. iij.

Tamarindorum ʒ. j. β.

Pulpæ casisæ solutiæ ʒ. iij.

Myrobalanus & rhabarbarum teruntur, & per noctem in succis macerantur: deinde manu compressum colatur, & propinatur. * Idem quod præcedens præstat. Mesues.

Infusio

Infusio ad bilem prima.

A

℞. Rhabarbari electi ʒ. ij.
Cinnamomi ʒ. β.
Myrobalanorum citriorum ʒ. β.

Macerentur in aquarum stillatitiarum, absinthij, & fumariz ana ʒ. ij. In iure colato syrupi rosati laxat. ʒ. j. additur, daturque ægrotantibus potui. Andernacus.

Infusio ad bilem secunda.

℞. Palmularum Indarum ʒ. j.
Flor. Borriginis, Buglossæ, Violarum ana P. β.
Glycyrrhizæ rasæ ʒ. j. β.
Prunorum Damasc. n. vj.

Decoquantur in aquæ libra. Palmulæ è iure decocti ualde exprimantur, & ubi id colatum fuerit, casisæ fistularis recentis uncia, uel drachmæ decem in eo diluantur, denturque potui. Andernacus.

Infusio ad bilem tertia.

℞. Diaprunon simplicis ʒ. β. uel ʒ. vj.
Diaprunon solutiui ʒ. j. β. uel ʒ. ij.
Syrupi adianthi ʒ. j.

Sin autem metuas offensionem ex diagrydio, rhabarbari expressi ʒ. j. uel ʒ. B
iiij. in locum illius surrogare poteris, & ex iure communi dilutum potui exhibere. Andernacus.

Infusio ad bilem quarta.

℞. Casisæ fistularis recent ʒ. j.
Rhabarbari minutim incisi ʒ. ij.
Spicæ nardi G. iij.

Ex decocti communis, uel aquæ intybi uncijs quatuor diluito, additoque sera pij ex aceto simplicis ʒ. j. & propinato. Andernacus.

Infusio ad bilem quinta.

℞. Vuarum passarum ʒ. iij.
Glycyrrhizæ rasæ, Anisi ana ʒ. j.
Prunorum Damasc. n. iij.
Palmularum Indarum ʒ. β.

Flor. Borriginis, Buglossæ, Violarū, Intybi recēt. Latifolij, Cichorij ana P. j. Decoquantur in aqua, colenturque. In iuris huius decocti uncijs quatuor, rhabarbari electi ʒ. j. uel ʒ. iiij. macerato per noctem: manè exprimito, ac in iure eodem casisæ fistularis recentis unciam, uel drachmas sex diluito: cui syrupi uiolacei ʒ. β. uel ʒ. j. admisceas. quinque uel sex horis ante prandium exhibeto. Andernacus.

Infusio

A

Infusio ad bilem alia.

Catholici unciam ex aqua hordei, aut uiolearum ℥. iij. diluito, additoq; syrupi uiolacei ℥. ij. ac propinato. Interdum licet syrupum ros. laxatiuū copiosorem addere, ubi aluum soluere cogitamus. Andernacus.

DE INFVSIS PVRGANTIB. PITVITAM.

Infusio hieræ simplicis.

℞. Hieræ simplicis, Aloes ana ℥. v.

Macera decocto eupatorij infra descripto ad ℔. j. In uase uitreo insola ad dies decem. * Ventriculum & caput purgat: proinde amborum doloribus assiduis & hemicranie confert, ac febribus antiquis. Macerantur etiā decocto epithymi & thymi. Sic purgat humorem crassum & melancholicum, & phlegmagogum est. Mesues.

Infusio ad pituitam prima.

℞. Rad. Apij, Fœniculi, Petroselini, Asparagi, Rusci ana ℥. j.

Rad. Ebuli ℥. ij.

Polypodij ℥. v.

Chamæpityos M. β.

Flor. Sambuci, Stœchados ana M. j.

Decoquantur in aquæ libra ad dimidias. In iure decocti seminis cnici ℥. iij. foliorum senæ ℥. ij. cinnamomi ℥. j. zingiberis ℥. β. per noctem macerantur. Manè percolatis syrupi diacnicu ℥. j. β. additur, & horis duabus ægro ante cibum propinatur. Andernacus.

Infusio ad pituitam secunda.

Ex communi decocto glycyrrhizæ, uuarum passarum, anisi, singulorū unciarum quatuor instar: diaphœnicon unciam semissem, uel (si ualentior assu met) drachmas sex: syrupi uiolacei unciā diluito, datoq; potui. Andernacus.

Infusio ad pituitam tertia.

℞. Diaphœniconis ℥. β.

Syrupi uiolacei ℥. j.

In iure decocti communis, uel aquæ hyssopi, uel méthę, pro una dosi dilues, dabisq; potui. Dosis autem iuris magna ex parte præter syrupum, & electuarium, unciarum quatuor esse debet. Andernacus.

Infusio ad pituitam alia.

℞. Decocti ad pituitam educendam, quantum satis est.

Agarici trochiscati ℥. j. uel ℥. iij. uel ℥. j. β. macerato.

Ex eodem iure colato, diacnicu, uel diaphœnicon, uel benedictæ ℥. iij. uel ℥. β. cum syrupi uiolacei ℥. j. dilues, potuiq; propinabis. Andernacus.

Infusio ad colicam.

℞. Hyssopi, Calaminthæ ana M. j.

X

Passula-

Passularum ʒ. j. β.

Anisi, Fœniculi, Carui ana ʒ. vj.

Sem. Cnici ʒ. ij.

Polypodij ʒ. j. β.

Flor. Borriginis, Buglossæ, Violarum ana P. j.

Flor. Chamomillæ P. β.

Omnia gallinæi cursu agitati defatigatiq; & præparati, ut decet, uentri imposita, ex aquæ sextarijs quinque ad tertias decoquito. In fine dum adhuc feruent, inijcito fol. senæ ʒ. ij. β. Agarici trochiscati ʒ. x. finito per noctem macerari: deinde ius coletur, serueturq; usui. Cum necessitas postulat, ʒ. iij. sumito, additoq; syrupi uiolacei ʒ. j. ac potui exhibeto. Si parum proficere medicina uidebitur, quod æger fortè aluum habeat difficilem, diaphœniconis, aut benedictæ ʒ. j. β. aut ʒ. ij. adjicito. *Hæc potio ad morbos, tum ex pituita, tum ex atra bile ortos plurimum ualèt: uerùm præcipuus eius usus est ad colicos dolores, partim ex pituita, partim ex flatuosa materia creatos. Andernacus.

DE INFUSIS PURGANTIBVS. B. I.

lem atram.

Infusio ad atram bilem primæ.

℞. Confectionis Hamech ʒ. β.

In aquæ fumaris, aut mercurialis, aut cyrrij uncijs quatuor diluito, addito syrupi lupulorum ʒ. j. & potui dato. Andernacus.

Infusio ad atram bilem secundæ.

℞. Catholici ʒ. β. uel ʒ. vj. In decocti proprii uncijs quatuor dilues, addesq; syrupi uiolacei ʒ. j. & potui dabis. Confectio Hamech etiam ex aquis idoneis, uel decocto mercurialis assumi potest. Andernacus.

Infusio ad atram bilem tertiæ.

℞. Fumiterræ, Lupulorum ana M. β.

Flor. Borriginis, Buglossæ, Violarum ana P. j.

Passularum ʒ. iij. uel ʒ. β.

Polypodij ʒ. ij.

Castuthæ, Epithymi ana ʒ. iij.

Anisi, Glycyrrhizæ ana ʒ. j. β.

In aquæ libra ad dimidias incoquentur. In iure decocti fol. senæ ʒ. iij. catholici ʒ. j. macerabuntur, syrupi uiolacei tantundem adiungetur. Tota potio una uice propinabitur. Andernacus.

Infusio alia ad scabiem.

℞. Brassicæ marinæ M. j.

Passularum ʒ. j.

In iufculo gallinæi, uel pulli coquito, & confectionis Hamech ʒ. iij. syrupi de su-

A de fumo terræ ʒ. j. in iuris prædicti triēte diluīto, datoq; potui. Andernacus.

Infusio alia ad atram bilem, ex sero lactis.

℞. Foliorum senæ ʒ. β.

Macerentur in sero lactis per noctem. In iure expresso colatoq; diluīto Diacatholici ʒ. j. uel ʒ. x. uel ʒ. j. β. ac potui assumantur. Andernacus.

Infusio alia ad idem.

℞. Epithymi Cretensis ʒ. j.

Inferuescat in sero lactis caprini. Hoc deinde coletur, & exprimatur ualidè, addita syrupi uiolacei ʒ. j. quæ si parum soluere uentrem uideatur, nonnihil catholici reliquis adijci poterit. Andernacus.

DE INFVSIS SANGVINEM. PVRIOR.
rem reddentibus.

Infusio purgans sanguinem.

℞. Capill. Veneris M. j.

Violarum P. j.

Glycyrrhizæ rasæ ʒ. ʒ.

Passularum ʒ. β.

Ficum n. viij.

B Myxariorum n. vj.

In aqua decoquantur ad dimidias. In iure decocti per noctem macerentur

Rhabarbari electi ʒ. j.


Spicæ nardi ʒ. j.

Senæ ʒ. iij.

Manè leuiter exprimantur, colenturq;: addatur iulapij uiolacei ʒ. j. potuiq; detur. Andernacus.

X 2 DE CLY-

DE CLYSTERIBVS CAP IX A



A DE CLYSTERIBVS NVTRIENTIBVS.

Clyster nutriens.

℞. Aquæ destillationis capi, uel decoctionis ℥. j. β.

Sacchari rosati ℥. β.

Misce, & iniiciatur post reiecta excrementa, uel cum dormiturit: alioqui excrementa miscerentur, & inficeretur id quod iniicitur. Rondeletius.

Clyster nutriens alius.

℞. Lactis uaccini ℥. j. β.

Mellis ℥. iij.

Iniiciatur ut suprâ. Rondeletius.

Alius nutriens.

℞. Decoctionis hordei mundati, in cremorem conuersi ℥. j. β.

Vini quart. j.

Misce, & iniiciatur, ut suprâ. Vinum addendum est ad distribuendum cremorem hordei, tumq; augenda est ipsius uini quantitas, pro crassitudine cremoris. Rondeletius.

Alius nutriens.

℞. Decoctionis pulli, uel hordei perfectè cocti ℥. j. β.

Vitellorum ouorum n. iij.

B Vini ℥. iij.

Misce, iniiciatur ut prius admonui. Optimè ægrotos nutrit. Rondeletius.

ANNOTATIO.

Ad nutriendum, clysteres aliquando sunt ex usu, cum ægri ob imbecillitatem ætatis, uel morbi, uel tenerâ ætatē cibū deuorare, aut deuoratum retinere non possunt. Rondeletius.

DE CLYSTERIBVS CALFACIENTIBVS.

Clyster ad morbos capitis frigidos & intestinorum.

℞. Mercurialis M. ij.

Origani, Calamenti, Rutæ ana M. j.

Flor. Centaurij minoris, Anthos, Stœchados, Chamomillæ ana P. j.

Agarici in panno ligati ℥. ij. uel Colocinthidis ℥. β.

Anisi, Fœnigræci ana ℥. iij.

Fiat decoctio in aqua maris uel fontis. In ℥. j. β. decoctionis dissolue Benedictæ ℥. j. Olei communis ℥. iij. fiat clyster. Rondeletius.

Clyster ad pituitam alterandam.

℞. Rutæ, Pulegij, Calaminthæ, Origani ana M. j.

Sem. Fœnigræci, Carui, Cumini, Seseleos ana ℥. j. β.

Flor. Chamomillæ, Meliloti, Anthos, Stœchados ana P. ij.

Decoquantur ex iure pingui interaneorum libra. huic uini maluatice, uel al-

X 3 bi uete-

bi ueteris, aut rufi triens: olei anethini tantundem addatur. mixta aluo, quando opus est, inijciantur. Andernacus.

DE CLYSTERIBVS REFRIGERANTIBVS.

℞. Maluæ, Violarum, Lactucæ, Fol. Cucurbitæ, uel Cucumeris, uel Peponum ana M. j.

Sem. Cucurbitæ, Cucumeris, Citrulli, Melonum ana ℥. j.

Prunorum Damasc. n. xx.

Florum Violarum, Buglossæ ana P. j.

Decoquuntur in aqua ad libram. In hac mellis uel sacchari rubri ℥. j. diluitur: olei uiolacei ℥. iij. Misce, & inijciantur. Andernacus.

Clyster ad bilem alterandam.

℞. Hordei excorticati, Seminis Lini ana ℥. ij.

In aqua coquantur. Iuris huius decocti libræ, olei communis ℥. iij. addatur, & per inferiora indantur. Andernacus.

Clyster ad bilem contemperandam, alius.

℞. Maluæ, Violarum ana M. j.

Hordei M. j.

Fiat decoctio in aqua, de qua accipe ℔. j. cui adde

Sacchari rubri ℥. j. β.

Vitell. ouorum n. j.

Olei uiolacei ℥. iij.

Salis parum.

Misce, & fiat clyster.

DE CLYSTERIBVS EMOLLIENTIBVS.

Clyster emolliens.

℞. Rad. Maluæ, Bismalæ, Liliorum ana quart. j.

Maluæ, Bismalæ ana M. j.

Sem. Lini ℥. j.

Ficum paria xx.

Florum Meliloti, Violarum ana P. j.

Anisi ℥. iij.

Decoquantur in iure pingui, uel in aqua fontis, & in ℔. j. dissolue

Olei communis, uel Butyri recentis, uel Axungię porci ℥. iij.

Misce, & fiat clyster. Rondeletius.

Clyster emolliens alius.

℞. Parietarïæ, Attriplicis, Mercurialis, Maluæ ana M. j.

Rad. Liliorum alb. Ebuli ana ℥. j.

Sem.

- A** Sem. Lini, Fœnigræci ana ʒ.β.
 Anisi ʒ.ʒ.
 Ficum n. iiii.
 Florum Chamomillæ, Violarum ana P. j.
 Prunorum n. v.
 Decoquantur usq; ad libram. In iure diluuntur
 Calsiæ, Diaprunu S. ana ʒ. j.
 Hieræ picræ ʒ. v.
 Mellis uiolacei, Butyri recentis ana ʒ. j.β.
 Olei uiolacei, liliacei ana ʒ. j.β.
 Inijciatur clyster tribus horis ante cibum. *Andernacus.*
Clyster ad scirrhum uteri, emolliens.
 ℞. Rad. Althææ ʒ. iij.
 Cort. rad. Vlmi ʒ.ʒ.
 Maluæ M.ʒ.
 Sem. Lini, Fœnigræci ana ʒ.β.
 Ficum par. xx.
 Sem. Apij, Petroselinii, Althææ ana ʒ.ʒ.
 Flor. Chamomillæ, Meliloti, Violarum, Maluæ ana P. j.
B Fiat decoctio in aqua, uel iure intestinorum porci, uel ueruecis, uel iure pingui. Decoctioni adde
 Pinguedinis porci, uel Butyri recentis, uel Olei lb.β.
 Inijciatur lb.β. frequenter. *Rondeletius.*

DE CLYSTERIBVS ASTRINGENTIBVS.

Clyster astringens & consolidans.

- ℞. Hordei integri afsi P. j.
 Bistortæ ʒ. iij.
 Plantaginis, Linguae passarinæ, Sumach ana M. j.
 Fiat decoctio. In lb. j. dissolue
 Seui hircini ʒ.ʒ. Misce & fiat clyster. Detur post clysteres deterforios, uel
 purgationem excrementorum. *Rondeletius.*

Alius astringens & consolidans.

- ℞. Rad. Tapfi barbati lb.β.
 Sumach, Plantaginis, uel Myrthi, uel Caudæ equinæ, uel Herniarie, uel
 Polygoni ana M. j.
 Cort. Mali granati, Balauftiorum ana ʒ. j.
 Ros. rub. P. j.
 Fiat decoctio in aqua ferrata. In lb. j. dissolue
 Succu plantaginis ʒ.ʒ.

Seui

Seui hirci ℥.j.β.
Misce. Rondeletius.

A

Clyster ad lienteriam & diarrhæam.

℞. Rad. Tapfi barbati, Rad. Bistortæ ana ℥.iiij.
Hippericonis, Myrthi, Summitatum rubi ana M.j.
Pyrorum syluestrium, uel Pomorum, uel Castanearum, paria xx.
Rosarum P.j.

Fiat extractio in aqua ferrata. In libra una dissolue
Acaciæ, uel Hypocistidos ℥.β.

Misce: inijciatur post aliquam detersionem, per medicamentum purgans &
astringens, ut Rhabarbaro, uel Myrobalanis. Rondeletius.

Clyster ad lienteriam.

℞. Rad. Cyperi, Tapfi barbati, Bistortæ ana ℥.j.
Absinthij, Fol. Cupressi ana M.j.
Nucum cupressi n.iiij.

Flor. Rosarum, Flor. Anthos, Stœchados, Saliuæ ana ℥.j.

Fiat extractio in aqua ferrata, & uino astringente. In libra una dissolue
Hypocistidos, Ladani ana ℥.β.

Fiat clyster: inijciatur. Rondeletius.

B

Clyster astringens & siccans.

℞. Hordei tosti P.ij.
Verbasci, uel Polygonij, uel utriusque Plantaginis, uel Myrthi, uel Len-
tisci P.ij.
Rosarum P.j.

Coquantur in aqua pluuiali, aut ferrata. In libra una dissolue
Mellis rosacei colati ℥.j.

Seui hircini ℥.j.

Succi plantaginis ℥.ij.

Misce: & per inferiora infundantur. Andernacus.

DE CLYSTERIBVS DETERGENTIBVS.

Clyster detergens in principio dysenteria & tenesmi.

℞. Hordei integri P.ij.
Fiat decoctio in aqua. In libra una dissolue
Sacchari rubri, uel Mellis communis ℥.j.
Misce, ac fiat clyster. Rondeletius.

Clyster detergens & siccans.

℞. Hordei integri, alsii P.ij.
Rosarum rub. P.j.
Fiat decoctio. In libra una dissolue

Mellis

A Mellis ros. ζ . β . Sacchari rosar. tabulati ζ .j.
Misce, & fiat clyster. Rondeletius.

Clyster detergens ualde.

R. Lentium, Lupinorum ana P.j.
Fol. Myrthi, Oleæ, Absinthij ana M.j.
Flor. Centaurij min. Rosarum rubr. ana P.j.
Fiat extractio, in aqua ferrata, uel lixiuio debili. In libra una dissolue
Mellis ros. ζ .iij.
Misce. capiat manè. Rondeletius.

DE CLYSTERIBVS CONSOLIDANTIBVS.

Clyster glutinatorius.

R. Succu utriusq; plantaginis, Succu portulacæ ana ζ .iij.
Boli Armeni, Sanguinis draconis, Amyli ana ζ . β .
Seui hircini uel caprilli ζ .j.
Mixta inijciantur. Andernacus.

Clyster consolidans ulcera intestinorum.

R. Rad. Verbalci, Consol. maior. ana ζ .ij.
Caudæ equinæ, Plantaginis ana P.j.
Rosarum rubrarum P.j.
B Fiat decoctio in aqua ferrata. In libra una dissolue
Seui hircini ζ .ij.
Misce: capiat redditis alui excrementis, & præcedente clystere deterforio.
Rondeletius.

Clyster consolidans.

R. Hordei integri torrefacti P.j.
Plantaginis, Fol. Myrthi ana M.j.
Flor. Rosarum P.j.
Fiat decoctio. In libra una dissolue
Trochiscorum alborum ras. ζ .j.
Amyli ζ . β .
Misce, & inijciatur. Rondeletius.

DE CLYSTERIBVS VRINAM PRO-
uocantibus.

Clyster ad urine retentionem.

R. Rad. Althææ ζ .iij.
Violarum M.ij.
Maluæ P.j. β .
Passularum, Iuiubarum ana ζ . β .

Y

Sem. Me-

DE CLYSTERIBVS.

Sem. Melonum, Cucurbitæ, Citrulli, Cucumeris, contuforum ana ʒ. iij. A
 Flor. Chamomillæ, Violarum ana P. j.
 Coquantur in aqua hordei. In ʒ. β. dissolue.
 Olei Violacei ʒ. iij.
 Adipis cuniculi, uel Butyri recentis ana ʒ. j.
 Misce, & fiat clyster. Andernacus.

DE CLYSTERIBVS COMMINVENTI-
bus calculum.*Clyster ad comminuendum calculum.*

℞. Rad. Graminis, Apji, Petrosel. Asparagi, Altheæ, Glycyrrhizæ ana ʒ. ij.
 Betonicæ, Saxifragiæ, Fœniculi marini, Lunariæ ana M. j.
 Sem. Alkekengi, Milij solis, Sem. Palyuri ana ʒ. j.
 Fiat decoctio. In libra una dissolue
 Succu Parietariæ, uel Fœniculi marini, uel Raphani ʒ. j.
 Olei scorpionum ʒ. iij.
 Misce, inijciatur. Rondeletius.

DE CLYSTERIBVS VERMES NE-
cantibus.

℞. Absinthij, Abrotani ana M. j. B
 Lupinorum P. β.
 Flor. Centaurij minoris P. j.
 Fiat decoctio. In libra una dissolue.
 Olei Amygdalarum amar. Olei Laurini ana ʒ. iij.
 Misce, inijciatur. Rondeletius.

Clyster ad ascarides.

℞. Rad. Gëtiani, Aristolochiæ rotundæ, Clematidis, uel Pistorlochæ ana ʒ. j.
 Florum Marrubij, Foliorum Persici, Absinthij ana M. j.
 Lupini, uel Orobi P. j.
 Fiat decoctio in lixiuio & aqua, æquis partibus. Inijciatur, sed sensim & bis
 eadem hora. Rondeletius.

Ad uermes in uentriculo.

℞. Hordei mundati P. j.
 Ficuum paria x.
 Anisi ʒ. j.
 Fiat decoctio. In ʒ. β. dissolue.
 Mellis uel Sacchari ʒ. iij. uel Sapæ ʒ. iij.
 Fiat clyster sine oleo & sale. Rondeletius.

Clyster

A

Clyster ad uermes cum feбри.

℞. Endiuia, Cichorij, Scariolæ, Portulacæ ana M. j.
Fiat decoctio in sero lactis, uel decoctione pulli. In libra una dissolue

Mellis ros. col. ℥. ij.

Succi rosarum ℥. β.

Misce, & fiat clyster. Rondeletius.

Clyster ad uermes cum alui fluore.

℞. Summitatum oleæ, Myrthi ana M. j.

Rosarum rubr. P. j.

Centaury minor. P. β.

Fiat decoctio, & iniiciatur. Rondeletius.

Clyster ad uermes cum alui fluxu, alius.

℞. Cort. mali granati ℥. j.

Myrobalan. citrinorum, chebulorum ana ℥. β.

Fiat decoctio in aqua hordei, perfecte cocti, & de colatura libra una iniicitur. Rondeletius.

Alius.

℞. Summitatum portulacæ M. ij.

Cichorij M. j.

Lentium P. j.

B Fiat decoctio, de qua libra una iniiciatur. Rondeletius.

DE CLYSTERIBVS DOLOREM
sedantibus.*Clyster ad colicum dolorem.*

℞. Rad. Althææ lb. β.

Maluæ, Branchæ urfinæ, Absinthij ana M. j.

Ficuum n. xx.

Sem. Lini, uel Fœnigræci ℥. j. uel ℥. ij.

Anisi, Carui, Fœniculi, Cymini ana ℥. ij. uel ℥. β.

Flor. Chamomillæ, Meliloti, Sambuci ana P. j.

Fiat decoctio. In lb. j. dissolue

Benedictæ ℥. j.

Olei Chamomillæ, uel Anethini ℥. iiij. uel

Butyri ℥. ij.

Vini ℥. iiij.

Misce, & fiat clyster. Rondeletius.

Clyster sedans dolorem colicum.

℞. Sem. Anisi, Fœniculi ana ℥. j.

— Y 2

Sem.

Sem. Apij, Petroselini, Anethi ana $\mathfrak{z} . \beta$. A
 Florum Chamomillæ, Meliloti, Sambuci ana P. \mathfrak{ij} .
 Fiat decoctio in aqua & uino. Fiat decoctio. In $\mathfrak{lb} . \beta$. dissolue.
 Olei Chamomillæ, Rutacei ana $\mathfrak{z} . \text{iiij}$.
 Fiat clyster. Rondeletius.

Clyster ad dolorem colicum à pituita uitrea.

℞. Fol. Myrthi, Pulegij utriusq;, Marrubij, Calaminthæ ana M. j.
 Fœnigræci $\mathfrak{z} . \text{j}$.
 Sem. Seseleos, Carui, Cymini ana $\mathfrak{z} . \beta$.
 Fiat decoctio. In libra una uel $\mathfrak{z} . \text{x}$. decocti dissolue.
 Vini maluatici, uel Vini albi ueteris $\mathfrak{z} . \text{iiij}$.
 Olei Anethini $\mathfrak{z} . \text{iiij}$.
 Misce, & fiat clyster. Inijciatur bis in die. Rondeletius.

Clyster ex uino Hippocratico.

Mulier quædam nobilis, grauisimo dolore coli cum teneretur, ut nihil aliud ad manum esset, uinum Hippocraticum inijciendum imperaui: & paulo post curata fuit. Rusticus etiam, qui uinum emerat aromatites ex melle ad hylaria celebranda, curatus fuit. Vina autem hæc uel saccharum, uel mel ad deterfionem: Hippocraticum uero uinum cinnamomum, aliud piper, zingiber, grana paradisi recipit. Rondeletius.

Clyster ad dolorem nephriticum.

℞. Rad. Althææ, Graminis, Asparagi, Glycyrrhizæ rasæ, uel Pedis columbini ana $\mathfrak{z} . \mathfrak{ij}$. B
 Betonicæ, Linariæ, Fol. Fœniculi marini ana M. j.
 Anisi, Sem. Lini, Fœnigræci ana $\mathfrak{z} . \beta$.
 Florum Chamomillæ, Meliloti ana P. j.
 Fiat decoctio. In huius libra una dissolue
 Butyri recentis, uel Axungię porci recentis $\mathfrak{z} . \mathfrak{ij}$.
 Olei scorpionum $\mathfrak{z} . \mathfrak{ij}$.
 Mellis communis $\mathfrak{z} . \mathfrak{ij}$.
 Misce, & fiat clyster. Rondeletius.

Alius clyster ad dolorem nephriticum.

℞. Maluarum cum rad. M. \mathfrak{ij} .
 Ficuum, Passularum ana par. xxx.
 Sem. Lini $\mathfrak{z} . \text{j}$.
 Sem. Maluæ, Alkekengi, Milij solis, Sem. Apij, Petroselini ana $\mathfrak{z} . \text{iiij}$.
 Baccarum lauri, iuniperi ana $\mathfrak{z} . \mathfrak{ij}$.
 Flor. Hypericonis, Chamomillæ ana P. j.
 Fiat decoctio in aquæ & uini æquis partibus. In $\mathfrak{lb} . \beta$. dissolue.

Olei

A. Olei Liliorum, Amygdal. amar. Scorpionum ana ʒ. iij.

Terebinthi. abietis ʒ. j.

Misce, & fiat clyster. Rondeletius.

Clyster ad passionem iliacam.

℞. Radicum altheæ ℥. β.

Maluæ cum rad. M. ij.

Violarum M. j.

Flor. Violar. Chamomillæ ana P. j.

Fiat decoctio. In ℥. j. decoctionis dissolue

Mel uiolarum, uel Calsiæ nouiter extractæ, uel Cymini cum saccharo ʒ. j.

Olei uiolacei ʒ. iij.

Misce, & fiat clyster. Rondeletius.

Clyster ad passionem iliacam, si maximus sentiatur æstus.

℞. Maluæ, Violarum ana M. j.

Sem. Melonum, Cucumeris, Cucurbitæ, Citrulli ana ʒ. iij.

Pomorum acidorum part. x.

Florum Violarum, Nenupharis, Buglossæ ana P. j.

Fiat decoctio. In libra una dissolue

Mucilaginis sem. psillij ʒ. j.

Olei uiolar. uel Olei nenupharis, Album. ouorū fortiter agitatorū ana ʒ. j.

B. Misce, & fiat clyster. Rondeletius.

Clyster ad dolorem coxendicum.

℞. Pulegij utriusq; Erysimi, Iberidis ana M. j.

Fœnigræci, Rutæ, Azari ana ʒ. j.

Flor. Chamomillæ, Meliloti, Sampfuci, Lauendulæ ana P. j.

Fiat decoctio. In libra una decoctionis infunde

Agarici trochiscati ʒ. iij.

Benedictæ lax. ʒ. β.

Olei Liliorum, Amygdal. ana ʒ. ij.

Olei de spica ʒ. β.

Misce, & fiat clyster. Rondeletius.

Clyster ad dysentericos magnosq; dolores.

℞. Lactis uaccini ℥. β. Medullæ ʒ. ij.

Olei communis, uel Olei Violacei ʒ. iij.

Misce, & fiat clyster. Andernacus.

Alius ad dolores dysentericos.

Cremorem ptisanæ, aut lac tepidum, aut oleum rosaceū, & butyrum cum albumine ouorum, aut decoctum seminis lini subter dato. Si uigiliæ urgeat, decoctū rosarum foliorum cū uitellis ouorū aluo inijciantur. Andernacus.

Alius clyster dolores dysentericos sedans.

A

℞. Tragacanthi ʒ. ij.
In rosarum decocti ʒ. iiij. soluuntur. his cremoris orizæ tantundem per clysterem infundatur. Andernacus.

Alius.

℞. Lactis caprini cyathos viij.
Amyli ʒ. β.
Lycij ʒ. ij.
Mista omnia aluo indantur. Andernacus.

DE CLYSTERIBVS PURGANTIBVS.

Enema ad bilem.

℞. Hordei excorticati, Sem. Lini ana ʒ. ij.
In aqua coquantur. Iuris huius decocti libræ adde
Olei communis ʒ. iiij.
Misce, & fiat clyster. Andernacus.

Clyster purgans pituitam.

℞. Rad. Enulæ, Pyrethri ana ʒ. j.
Marrubij, Pulegij, Calaminthæ, Rutæ ana M. j.
Agarici trochiscati, in panniculo ligati ʒ. β.
Flor. Chamomillæ, Rorismarini ana P. j.

Fiat decoctio. In huius libra dissolue

Benedictæ lax. ʒ. j.
Mellis scillitici ʒ. ij.
Diaphœniconis, uel Indi maioris ʒ. β.
Salis fossicij ʒ. j.
Olei nucum, uel olei rutæ ʒ. iiij.
Vini maluatici ʒ. ij.

Misce, & fiat clyster. Andernacus.

Clyster humores melancholicos purgans.

℞. Maluæ, Bismalæ, Parietariæ, Mercurialis ana M. j.
Epithymi, Scolopendrij, Betæ ana M. β.
Rad. Apij, Petroselinij, Fœniculi, Asparagi, Rusci ana ʒ. ij.
Polypodij ʒ. j.
Florum Borruginis, Buglossæ, Lupulorum, Fumarix, Meliloti, Chamomillæ, Anethi ana P. j.

Sem. Carthami, Anisi, Fœniculi ana ʒ. j.

Fiat decoctio. In huius libra una dissolue

Hieræ Ruffi, uel Confectionis Hamech, uel Diacatholiconis ʒ. j.
Sacchari rubri, uel Mellis uiolacei, uel Anthosati ʒ. j.

Olei

- A Olei Anethini, Liliorum alborum, Violacei ana ʒ. j.
Misce, & fiat clyster. Andernacus.

DE CLYSTERIB. PURGANTIB. AQVAM.

Clyster ad asciten.

ʒ. Parietarię, Pedis columbini, Rutę, Fol. Sambuci, Ciclę ana M. j.
Chamelęę, uel Brasicę marinę, uel Thymelęę ana M. ʒ.
Anisi, Fœniculi ana ʒ. ʒ.
Apij, Petroselini ana ʒ. j.
Flor. Anthos, Genistę ana P. j.
Azari ʒ. ʒ.

Fiat decoctio in aqua fontana. In libra una huius decocti dissolue.

Benedictę lax. ʒ. j. Vrinę pueri ʒ. ij.
Misce, & fiat clyster. Rondeletius.

Alius ad asciten.

ʒ. Rad. Apij, Petroselini, Graminis, Asparagi, Rubię, Pentaphylli ana ʒ. ij.
Azari, Iridis recent. ana ʒ. j.
Mercurialis, Brasicę marinę, Rutę, Ciclę, uel Cucumeris syluest. ana M. j.
Fol. Genistę P. ij.

Fiat decoctio. In lb. j. dissolue.

- B Vrinę pueri ʒ. iij.
Benedictę lax. ʒ. ʒ.
Salis parum.

Misce, & fiat clyster. Rondeletius.

Clyster ad tympanitem.

ʒ. Fol. Rutę M. j.
Anisi, Fœniculi, Carui, Cymini, Baccarum lauri ana ʒ. ʒ.
Florum Anthos, Stœchados ana P. j.
Azari, uel Agarici ʒ. ʒ.

Fiat decoctio. In libra una dissolue.

Benedictę lax. ʒ. j.
Olei Rutacei, uel Anethini ʒ. iij.
Vini ʒ. iij.

Misce, & fiat clyster. Rondeletius.

Clyster ad anasarcam.

ʒ. Pulegij utriusq;, Calaminthę, Maioranę ana M. j.
Agarici in panno ligati ʒ. j.
Sem. Anisi, Fœniculi, Rutę ana ʒ. ʒ.
Flor. Anthos, Stœchados ana P. j.

Fiat decoctio. In libra una dissolue.

Muris

Muriæ piscium, uel Vrinæ pueri ʒ. j.

Benedictæ lax. ʒ. ij.

Misce, & fiat clyster, Rondeletius.

Alius ad anasarcam.

℞. Rad. Enulæ camp. Rad. Ireos recent. ana ʒ. ij.

Azari ʒ. j.

Fœniculi, Carui, Maioranæ, Rutæ, Pulegij, Chamæpityos, Mercurialis ana M. j.

Scm. Apij, Petroselini ana ʒ. ij.

Flor. Lauendulæ, Genistæ ana P. j.

Fiat decoctio. In ℥. j. dissolue

Benedictæ lax. ʒ. β.

Mellis ros. col. ʒ. ij.

Salis communis ʒ. iij.

Misce, & fiat clyster. Rondeletius.

DE CLYSTERIBVS FLATVS DIS-
cutientibus.

Clyster ad flatus.

℞. Anisi, Fœniculi, Apij, Petroselini, Seseleos ana ʒ. β.

Flor. Chamomillæ, Meliloti, Rorismarini, Stœchados ana P. j.

Omnia ex uino & oleo decoquantur. Iuris libra aluo iniiciatur. Andernac.

Clyster ad flatus uteri.

℞. Mercurialis, Artemisiæ, Matricariæ ana M. j.

Flor. Anthos, Stœchados, Chamomillæ ana P. j.

Apij, Petroselini ana ʒ. iij.

Fiat decoctio. In ℥. j. dissolue

Benedictæ lax. ʒ. j. β. uel

Hieræ ʒ. j. β.

Olei nardini ʒ. iij.

Misce, & fiat clyster. Rondeletius.

DE INIECTIONIBVS IN VTERVM.

Iniectio in uterum menses prouocans.

℞. Quinq; rad. aperient Rad. Rubiæ maior. ana ʒ. ij.

Rad. Eryngij, Ciclamini, Iuniperi ana ʒ. iij.

Matricariæ, Sabinæ, Mercurialis ana M. j.

Cinnamomi, Spicæ utriusq; Azari ana ʒ. ij.

Seminis Nigellæ ʒ. β.

Fiat

A Fiat decoctio in aqua & uino albo, uel in uino & oleo chamomelino. Ex colatura fiat iniectio per metrenchitam. Rondeletius.

Iniectio in uterum, ad deterfionem ulceris post factum mortuum.

℞. Fol. Plantaginis, Agrimonix, Ceterach, Myrthi, Lentisci ana M. j.

Fiat decoctio in aqua fontis, uel extinctionis plumbi, & in colatura dissolue pro libra

Sacchari rubri, Mellis ros. col. uel

Syrupi de rosis siccis ℥. iij.

Misce, & fiat iniectio per metrenchitam. Rondeletius.

Iniectio in uterum ad scirrhum ipsius.

℞. Rad. Bismalux, Liliorum ana ℥. iij.

Pulegij, uel Origani, uel Arthemisix M. β.

Sem. Lini, Foenigræci ana ℥. j.

Flor. Chamomillæ, Violarum ana M. j.

Fiat decoctio in iure pingui intestinorum, uel in aqua & uino albo dulci, nõ astringente, aut sapa. fiat iniectio per metrenchitam. Rondeletius.

Iniectio in uterum ad suffocationem eius.

℞. Galbani, Opopanacis ana ℥. j.

Olei Amygdal. dulc. Olei Violarum ana ℥. β.

B Vini albi dulcis, uel Sapæ ℥. iij.

Macerentur in sapa, uel uino per noctem: deinde liquefiant, & colentur: rursus liquefiant in oleis, & iniiciantur. Rondeletius.

Iniectio in uescam ad ulcus eius.

℞. Rad. Consol. maioris ℥. j.

Caudæ equinæ, Plantaginis, Ceterach, Philosellæ, Herniariæ, Polygoni ana M. β.

Flor. ros. P. j.

Hypericonis P. β.

Fiat decoctio in aqua hordei uel extinctionis plumbi, aut ferri: fiat iniectio per metrenchitam. Rondeletius.

Z DE

DE GARGARISMATIS A

CAP. X.

Gargarismata ex diuersis rebus, pro uaria affectione ratione instituntur. Florum autem alia uel	{	Astringunt	Primum ad oris inflammationem, per initia exhibendum. Secundum. Tertium. Quartum. Quintum. Sextum. Septimum. Octauum.	
		Discutiunt	Gargarisma ad inflammationem oris. Aliud. Gargarisma ad anginam, &c.	
		Detergent	Gargarisma ad ulcerum oris deterfionem. Gargarisma ad deterfionem pituitæ. Gargarisma deterforium commune, &c.	
		Consolidant	Gargarisma ad oris ulcera exiccanda. Gargarisma ad oris ulcera in morbo Gallico. Gargarisma ad putrida oris ulcera.	B
		Dolorem sedant	Gargarisma ad dolorem dentium. Aliud. Aliud, &c.	
		Odorem oris gratum conciliant.		

Gargarisma ad inflammatas tonsillas per initia exhibendum.

℞ Plantaginis, Oxalidis, Portulacæ ana M.β.

Cort. mali granati, Rhus ana ℥.β.

Rosarum rubrarum P.j.

Cort. glandium ℥.iiij.

Decoquantur in aqua ad tertias. Iuri colato addantur.

Diamoron ℥.β.

Syrupi myrthini, Syrupi de papauere ana ℥.j.

Aceti ℥.j.

Misce, & fiat gargarisma. Andernacus.

Aliud.

℞. Lentium, Rosarum, Palmularum ana quantum satis est.

Decoquantur in aqua, ut supra, & fiat gargarisma. Andernacus.

Aliud

A

Aliud.

℞. Aceti communis, uel Aceti rosati ℥.iiij.
Aquæ cisternæ ℔.β.
Misce, & fiat gargarisma. Rondeletius.

Aliud.

℞. Aquæ Solani, Plantaginis, Caprifolij ana ℥.iiij.
Syrupi ros. lax. ℥.ij.
Misce, & fiat gargarisma. Rondeletius.

Aliud.

℞. Succo cotoneorum, uel Succo mali granati ℔.β.
Aquæ communis ℥.iiij.
Misce, & fiat gargarisma. Rondeletius.

Aliud.

℞. Aquæ peculi rosarum, uel Aquæ plantaginis, uel Aquæ caprifolij ℥.iiij.
Aceti rosati parum.
Misce, & fiat gargarisma. Rondeletius.

Aliud.

℞. Ceraforum acidorum, uel Ceraforum immaturorum M.ij.
Decoquantur in aquæ cisternæ ℔.ij. luri colato adde

B

Aceti ℥.ij.
Misce, & fiat gargarisma. Andernacus ex Rondeletio.

Aliud.

℞. Summitatum Rubi, uel Myrthi, uel Vitis, uel Pyri syluestris M.j.
Pilosellæ, Ceterach, Plantaginis ana M.β.
Rosarum rub. P.j.

Fiat decoctio in aqua pluuiali. In libra j.β. dissolue

Sacchari ℥.iiij. uel Syrupi rosati, uel Mellis rosati, uel Diamoronis.

Misce, & fiat gargarisma. Rondeletius.

DE GARGARISMATIS DISCVTIENTIBVS.

Gargarisma ad oris inflammationem.

℞. Hyssopi, uel Saturegiæ, uel Origani M.j.

Florum Anthos, Stæchados ana P.j.

Glycyrrhizæ rasæ ℥.j.

Passularum, Ficum ana paria xx.

Fiat decoctio in aqua hordei integri. In ℔.j.β. dissolue

Mellis rosati col. ℥.iiij.

Misce, & fiat gargarisma.

Gargarisma ad anginam.

℞. Spinæ Ægyptiæ ℥.j.

Z 2

Iridis

Iridis ʒ.β.
 Glycyrrhizæ ʒ.β.
 Furfuris frumenti P.β.
 Palmularum n. viij.

Ex fapa uel aqua decoquantur. Iuri paululum mellis addatur. Andernacus.

Aliud.

℞. Diamoronis ʒ. i. β.
 Mellis rosati, Aquæ plantaginis, Aquæ caprifolij ana ʒ. iiij.
 Ex his mixtis fiat gargarisma: eoq̄ue sæpius æger quotidie utatur. Ander-
 nacus.

DE GARGARISMATIS DETERGENTIBVS.

Gargarisma ad ulcerum oris detersionem.

℞. Agrimonix, Ceterach, Plantaginis, Summitatum rubi, Fol. Arbuti, Fol.
 Pyri syluest. Myrthi, Lentisci M.β.

Fiat decoctio in aqua hordei. In ℥b. j.β. dissolue

Mellis ros. col. ʒ. iiij.

Misce, & fiat gargarisma. Rondeletius.

Gargarisma ad detersionem pituitæ, quæ partibus oris adhaeret.

℞. Hyssopi, Origani ana M. j.

Glycyrrhizæ ʒ. iiij.

Fiat decoctio in aqua. In ℥b. j.β. dissolue

Mellis scillitici, uel Oxymellis scillitici, uel Syrupi de glycyrrhiza, uel Sy-
 rupi de stœchade ʒ. iiij.

Misce, & fiat gargarisma. Rondeletius.

Gargarisma deterforium commune.

℞. Pisorum P. ij.

Decoquantur modicè. In ℥b. β. adde

Mellis rosati ʒ. j.

Misce, & fiat gargarisma. Andernacus.

Gargarisma ad pituitam lentam detergendam.

℞. Hyssopi, Saluix, Thymi ana M. β.

Decoquantur in aqua ad tertias. In ℥b. j. dissolue

Oxymellitis ʒ. iiij.

Misce, & fiat gargarisma. Andernacus.

Aliud.

℞. Maioranæ, Saluix, Hyssopi, Origani ana M. j.

Passularum ʒ. j.

Cort. rad. Ebuli, Cort. capparorum ana ʒ. j.

Ex

- A Ex aqua decoquantur ad tertias. In lb. β. adde
Sem. Nigellæ, Condysi ana ℥. ij.
Syrupi de prafio, Mellis rosati col. ana ℥. j.
Misce, & fiat gargarisma. Andernacus.

DE GARGARISMATIS CONSOLIDANTIBVS.

Gargarisma ad oris ulcera putrida.

- ℞. Plantaginis utriusq;, Prunellæ, Fragariæ, Ligustri, Rosarum rub. Maluæ,
Flor. Intybi syluest. ana æqualis modus.
Decoquantur omnia in uase fictili nouo ex aqua, fiatq; gargarisma. Ander.

Gargarisma ad oris ulcera exiccanda.

- ℞. Plantaginis, Myrthi, Rosarum rub. Pyri syluestris ana M. j.
Fiat decoctio ad consumptionem tertiæ partis. In lib. j. dissolue
Aluminis ℥. j. uel ℥. ij. Vini albi parum.
Misce, & fiat gargarisma. Rondeletius.

Ad ulcera oris in morbo Gallico.

- In morbo Gallico frequenter utimur emplastris aut unguentis ex argëto uiuo paratis, unde dentes, lingua, aliæq; partes inficiuntur. Ad horum aut affectuum præcautionem utimur gargarismatis ex oleo amygdalarum dulcium, butyro, aut iusculo pingui. Prohibent enim hæc gargarismata exulcerationem, & pituitæ defluxum non impediunt. Rondeletius.

DE GARGARISMATIS DOLOREM SEDANTIB.

Gargarisma ad dolorem dentium in principio.

- ℞. Rad. Pentaphylli ℥. ij.
Hederæ M. j.
Rad. Cyperi, Nucum cupressi ana ℥. β.
Fiat decoctio in aqua & aceto, fiatq; gargarisma: quod in ore retinendum est.
Rondeletius.

Gargarisma ad dolorem dentium, fluxione iam facta.

- ℞. Pyrethri ℥. β.
Rad. Quinquefolij ℥. j.
Caryophyllorum, Cubebarum ana ℥. ij.
Piperis longi ℥. ij.
Hederæ M. ij.
Fiat decoctio in uino astringente, & aqua, fiatq; gargarisma: quo, ut priore utendum est. Rondeletius.

DE GARGARISMATIS ODORATIS.

Gargarisma ad oris factorem.

- ℞. Hordei integri torrefacti P. j.

Z 3 Rosarum

Rosarum P. β.

Corticis citri ꝑ. j. β.

Caryophyllorum, Cinnamomi ana ꝑ. iij.

Fiat decoctio in aqua cisternæ, & pauco aceto, qua colluatur os. Rondelet.

Aliud.

℞. Rad. Cyperi ꝑ. j.

Ros. rub. P. j.

Santali citrini, Cinnamomi ana ꝑ. ij.

Fiat decoctio in aqua cisternæ, uel chalybrata. Colluatur os. Rondeletius.

Aliud ad oris fetorem.

℞. Aquæ myrthi, Aquæ Rosarum ana ꝑ. ij.

Aquæ flor. Genistæ, uel Aquæ Citri ꝑ. β.

Moschi, uel Ambræ G. vj. Salis parum.

Quòd si ditioni paretur gargarisma, maior portio moschi uel ambræ poterit dari. Rondeletius.

DE ERRHINIS CAP. XI

Purgantia { Bilem.
Pituitam.
Melancholiam.Detergentia: ut { Errhinum detergens pituitam.
Errhinum ad ulceris erosionis deterfionem.
Errhinū ad ulcera narium detergenda & exiccanda.

Consolidantia: ut Errhinum ad ulcera purganda, & consolidanda.

Errhina sunt,
quæ narib. inseru-
tur: nulgus nãsa-
lia vocat. Sunt au-
tem uel

Erodentia: ut Errhinum carnem excrefcentem auferens.

Dolorem mitigãtia: ut { Errhinum ad capitis dolorem à pituita.
Errhinum ad uetustum capitis dolorem.
Aliud, Aliud.

Astringentia: ut Errhinum ad sanguinem reprimendum.

Odorata: ut Errhina ad fetorem narium.

DE ER-

A DE ERRHINIS PURGANTIBVS BILEM.

Errhinum purgans bilem.

℞. Succi rosarum ʒ.β.

Diagridij ʒ. j.

Mellis parum. Misce.

Si nimium liquida sint, adde ad inspissationē, farinæ lupinorum parum, aut hordei, aut orobi. Si autē ex syrupo ros. laxatiuo parare uelis, mel erit superfluum. Rondeletius.

DE ERRHINIS PURGANTIB. PITUITAM.

Errhinum purgans pituitam.

℞. Rad. Pyrethri, Ireos ana ʒ. j.

Pulegij, Calaminthæ, Origani ana M. j.

Agarici trochiscati ʒ. iij.

Flor. Anthos, Stæchados.

Fiat decoctio. In lb. j. dissolue Mellis Anthosati, Scillitici ana ʒ. iij.

Fiat caputpurgium. Rondeletius.

Aliud.

℞. Succi Ciclæ, Anagallidis ana ʒ. iij.

Vini albi ʒ. iij.

Mellis ʒ. ij. Misce.

Quod si efficaciora optes, adde

Diagridium, uel Agaricum, uel Colocynthidē, uel Veratrū. Rondeletius.

Aliud purgans pituitam.

℞. Succu Cucumeris asinini, uel Ciclæ, uel Mercurialis, uel Ciclamini ʒ. ij.

Agarici trochiscati ʒ. ij. Vini parum.

Fiat decoctio, quæ coletur. In colatura dissolue

Mellis quatum satis ad inspissationem: aut mel in decoctione ponatur sine uino, contritumq; sit agaricum, & decoquantur simul. Decoctio inspissatur ad mellis consistentiam. Rondeletius.

DE ERRHINIS PURGANTIBVS MELANCHOLIAM.

Errhina ad melancholiam ex iisdem parantur, quæ pituitam eliciunt: uerum ijs adduntur fena, polypodium, thymum, epithymum, & uerathrum. Rondeletius.

DE ERRHINIS DETERGENTIBVS.

Errhinum detergens pituitam.

℞. Hordei integri P. j.

Lentium, uel Lupinorum P. β.

Marrubij, uel Pulegij M. j.

Maiores.

Maioranæ M. β.
 Fiat decoctio. In lb. j. dissolue
 Mellis Anthofati, Squillitici ana ℥. iij.
 Misceantur, & per nares attrahantur. Rondeletius.

Ad ulceris erosionis detersionem.

℞. Decoctionis hordei lb. j.
 Mellis rosacei col. ℥. iij.
 Misce, & attrahantur per nares. Rondeletius.

Errhinum ad ulcera narium detergenda & exiccanda.

℞. Summitatum Myrthi, uel Lentisci M. j.
 Malorum punicorum integrorum, immaturorum, contusorum n. ij.
 Fiat decoctio cum aqua & uino, si non adsit inflammatio: quæ si adsit, cum a-
 ceto contundantur, deinde fortiter exprimantur. Colaturæ adde
 Mellis rosati col. ℥. iij.

Fiat errhinum, quo utatur in tumoribus & ulceribus malignis narium. Ron-
 deletius.

Errhinum ad ulcera purganda & consolidanda.

℞. Succu Plantaginis, Solani, Rosarum ana ℥. iij.
 Vini albi, aut Succu mal. punicorum, Mellis ana ℥. j. β.
 Misceantur, fiatq; errhinum. Andernacus.

Errhinum ad carnem excrescentem.

Omphacij in æneo uase parati quantum morbi magnitudo, & partis affe-
 ctus sensus postulat, humoribus iam supradictis diluatur, adhibeaturq; de-
 tergit, & carnem imminuit. Rondeletius.

DE ERRHINIS DOLOREM MITIGANTIBVS.

Errhinum ad capitis dolorem ex pituita.

℞. Succu Betæ, uel Ireos, uel Helenij, Succu Maioranæ ana ℥. j. β.
 Vini albi ℥. j.
 Zingiberis, Pyrethri ana P. j.
 Misceantur diligenter, utitorq; ut superioribus. Andernacus.

Errhinum ad uetustum capitis dolorem, & lippitudinem.

℞. Nigellæ ℥. ij. β.
 Salis Ammoniaci ℥. j.
 Elaterij ℥. iij.

Trita excipiuntur oleo Sycionio, aut Irino, ut cerati spissitudinem habeant.
 Hoc medicamēto nares subungentē attrahere sursum iubeto. Andernacus.

Aliud.

℞. Decocti Maioranæ ℥. j. β.

- A** Mannæ granatæ ʒ. vj.
Mixta ante cibum per nares attrahentur. Andernacus.

Aliud.

℞. Succī Maioranæ ʒ. j. β.

Nigellæ torrefactæ ʒ. j.

His tepēfactis ante cibum manē utendum est. Quōd si narium ulcera ægrū infestent, eaq; fōdida & fœdi odoris fuerint, commiscebuntur succi anagalididis, aut betæ, aut ciclamini quadrans, uini ℥. j. mellis anthos ʒ. iiij. Mixta naribus indentur. Andernacus.

DE ERRHINIS ASTRINGENTIBVS.

Errhinum ad sanguinem reprimendum.

℞. Thuris ʒ. ij.

Aloes ʒ. j.

Contrita in puluerem, ex alumine oui subigantur, & mollissimis pilis leporinis adiectis, in penicilli formulam redigantur. quod naribus indatur, tanquam peculiare parti affectæ remedium. uel

℞. Succī Polygoni, Plantaginis ana ʒ. j. β.

Succī stercoreis alini ʒ. ij.

- B** Pollinis ʒ. j. β.

Penicillum ex panno lineo formetur, quod his imbutum naribus indatur. Andernacus.

DE ERRHINIS ODORATIS.

Errhinum ad fœtorem narium.

℞. Succī rosarum, uel Maioranæ ʒ. ij.

Aquæ rosarum, uel flor. Aranciorum, uel Myrthi ʒ. j.

Mellis rosa. colati, ad adhesionem, parum: uel adde modicum gummi tragacanthi & Arabici ad inspissationem: naribus admoueantur. Quōd si fœtor narium sit cum ulcere, ex succo rosarum tantum, & aqua rosacea, uel aqua myrthi parari debet. Si uerò à nimia humiditate, aqua ex floribus citri,

succus maioranæ, & alia calidiora sunt usur-

panda. Rondeletius.

Aa DE FO.

A

Fomentum in febribus ardentibus.

Refrigerato lactucae succo, uuae acerbæ, portulacæ, solani, & umbilici Veneris, stomachum aut aliam partem inflammata, præsertim in febre marcorum expertæ, linamentis tinctis foueto. Andernacus.

Fomentum in febribus biliosis.

℞. Olei Rosacei, Chamomelini ana ʒ. ij.

Succi malorum aranciorum ʒ. iij.

Vini austeri ʒ. j. β.

His commixtis, calefactisq̄, stomachus per linteum aut spongiam expressã fouere debet. Andernacus.

Fomentum in febribus quotidianis.

℞. Olei Chamomelini, Mastichini ana lb. β.

Vini ʒ. iij.

His calentibus stomachus foueatur. Andernacus.

Aliud ad stomachi frigus.

℞. Chamomillæ ʒ. ij.

Masticis, Nardi Gallicæ, Absinthij Anethi ana ʒ. j.

Coquatur in quinq; uncijis uini, olei omphacini uncijis quatuor. Andernac.

B

DE FOMENTIS ASTRINGENTIBVS.

Fomentum ad alui fluxiones.

℞. Gallæ, Malicorij, Quinquefolij rad. Baccarum cupressi ana ʒ. β.

Olei communis lb. j.

Coquantur ad tertias. Spongia iure decocti madida ano admoueatur. Andernacus.

Fomentum ad uentriculum roborandum.

℞. Fol. Althææ, Menthæ, Absinthij ana M. j. β.

Cort. Citri ʒ. β.

Spicæ nardi, Squinanthi ana ʒ. ij.

Ros. rub. P. ij.

Decoquantur omnia in uino stiptico, ex quibus uentriculi regio foueatur. Rondeletius.

Aliud.

℞. Menthæ, Absinthij, Labruscæ, Sumach ana M. j.

Sem. Plantaginis, Portulacæ ana ʒ. ij.

Balaustiorum, Rosarum ana P. ij.

Cort. mali granati ʒ. β.

Fiat decoctio in uino stiptico, quo foueatur regio uentris inferioris. Rondeletius.

Aa 2

DEFO

DE FOMENTIS.
DE FOMENTIS APERIENTIBVS.

A

Fomentum ad menstrua prouocanda.

℞ Rad. Rubiæ maioris, Eryngij, Fœniculi, Apij, Petroselini, Graminis ana ʒ. iij.
Rad. Liliorum, Altheæ ana ʒ. ij.
Pulegij, Matricariæ ana M. j.
Sem. Apij, Petroselini, Seseleos, Fœnigræci, Altheæ ana ʒ. j.
Flor. Chamomillæ, Leucoi ana P. ij.
Fiat decoctio in aquæ duabus partibus, & una uini albi. Foueatur uterus.
Rondeletius.

Fomentum ad urina retentionem, & calculum.

℞ Rad. Altheæ ʒ. ij.
Calamenthi, Origani ana M. j.
Sem. Fœnigræci, Lini ana ʒ. j.
Sem. Apij, Petroselini, Seseleos ana ʒ. β.
Flor. Chamomillæ, Meliloti ana P. j.
Rad. Apij, Petroselini, Graminis, Asparagi ana ʒ. ij.
Fiat decoctio in aqua & uino uel oleo, fiatq; fofus cum spongijs uel filtro macerato in decoctione. Rondeletius.

B

DE FOMENTIS DISCVTIENTIBVS.

Fomentum refoluens, ac status discutiens.

℞. Maluæ cum rad. M. j.
Flor. Chamæmeli, Meliloti ana P. j.
Sem. Lini ʒ. j.
Anisi ʒ. β.
Ficum n. xl.
Decoquantur in aqua ad tertias. Vesicam iure hoc calente repletam, lateri affecto semel atq; iterum admoueto. Andernacus.

Fomentum ad lienis inflammationes.

℞. Thymi, Origani ana M. β.
Decoquantur ex oleo nardino, & uino: aut ex rosaceo cum uino, & aceto, aut austero uino, aut dulci, aut sapa, ne caput offendatur. Quod si ex frigido humore prodierit inflammatio, pulegium, thymum, & origanum in oleis & uino decoqui, & lienem ex iure illorum foueri oportet. Andernacus.

Fomentum relaxans.

℞. Rad. Liliorum, Altheæ ana ʒ. iij.
Rad. Cucumeris syluestris ʒ. ij.
Ficum n. xx.
Sem. Lini, Fœnigræci, Altheæ ana ʒ. j.

Sem.

A Sem. Apij, Petroselini ana \mathfrak{z} . β .

Flor. Chamæmeli, Meliloti ana P.ij.

Fiat decoctio in aqua, qua foueatur pars affecta calida. Rondeletius:

Fomentum ad ophthalmiam.

\mathfrak{z} . Fol. Euphrasie M.j.

Paleæ auenæ M.ij.

Fœnigræci in aqua fœniculi lot. \mathfrak{z} .ijj.

Sem. Anisi, Fœniculi ana \mathfrak{z} .j. β .

Flor. Stœchados P. β .

Fiat puluis: ex quo fiant duo sacculi quadrati, qui infundantur in modico uini albi, & aquæ fœniculi: deinde foueantur oculi. Rondeletius.

Fomentum discutiens œdemata.

\mathfrak{z} . Calamenthi, Origani, Betonicæ, Flor. Rorismarini, Ros. rubr. ana P.j.

Fol. Lauri, Saluiæ ana M. β . Lupinorum \mathfrak{z} .ij.

Calami odorati, Squinanthi, Spicæ nardi ana \mathfrak{z} .ij.

Flor. utriusq; Stœchados, Fol. Rorismarini ana P.j.

Fiat decoctio in aqua pluuiali: deinde adde aceti modicum: spongia fiat fottus. Rondeletius.

DE FOMENTIS EMOLLIENTIBVS.

B

Fomentum ad lienem induratum.

\mathfrak{z} . Florum Chamomillæ, Stœchados, Meliloti ana M.j.

Flor. Genistæ, Anethi, Scolopendrij ana M.j. β .

Fiat decoctio in uino albo & aqua: fiatq; fottus. Rondeletius.

Fomentum ad tumores emolliendos lienis.

\mathfrak{z} . Rad. Althææ \mathfrak{z} .ij.

Rad. Ireos \mathfrak{z} . β .

Fol. Althææ, Maluæ ana M.j.

Abinthij M. β .

Sem. Lini, Fœnigræci ana \mathfrak{z} . β .

Sem. Tamarisci, Stœchadis ana P.j.

Fiat decoctio in tribus aquæ partibus, una uini albi, addendo aceti modicum: deinde foueatur lien. Rondeletius.

DE FOMENTIS DOLOREM SEDANTIBVS.

Fomentum ad dolorem pleuriticum.

\mathfrak{z} . Maluæ, Saluiæ, Abinthij, Abrotani, Scabiosæ ana M. β .

In sextario aquæ ad tertias decoquito. spongia ex iure decocti expressa, partem affectam foueto. Andernacus.

Aliud ad dolorem lateris.

\mathfrak{z} . Maluæ cum rad. M.j. β .

Aa 3

Ficum

Ficuum n. xl.

Flor. Chamomillæ, Meliloti, Violarum ana P. j.

Sem. Lini, Fœnigræci ana ʒ. j.

Anisi ʒ. β.

Fiat decoctio in aqua pro fovu. Rondeletius.

Aliud in materia frigida.

℞. Maluæ cum rad. M. j. β.

Calaminthæ M. j.

Sem. Lini, Fœnigræci ana ʒ. j.

Anisi, Fœniculi ana ʒ. β.

Florum Anthos, Chamomillæ, Meliloti, Sambuci ana P. j.

Fiat decoctio quæ vesicæ aut cucurbitæ, aut uasi æneo infundenda, deinde parti applicanda. Vesica comodus lateri applicatur, uel spõgia mollis expressa, pannoq; raro sicco inuoluta, ne odor ægrotantis nares feriat. Frequenter aut mutandi sunt fovu, ne refrigerati lædant, Rondeletius.

Fomentum ad dolorem colicum.

℞. Radicum Althææ ʒ. ij.

Calamenthi, Origani ana M. j.

Sem. Lini, Fœnigræci ana ʒ. j.

Sem. Apij, Petroselini, Seseleos ana ʒ. β.

Flor. Chamomillæ, Meliloti, uel Flor. Sambuci ana P. j.

Fiat decoctio in aqua & uino, uel oleo: fiatq; fovu cū spongijis, uel filtro macerato in decoctione. Rondeletius.

Fomentum ad dolorem nephriticum.

Fomentum ad dolores nephriticos ex panniculis laneis nunc oleo dulci, nunc chamæmelino madidis paratur, lumbisq; imponitur. Andernacus.

Aliud ad dolorem nephriticum.

℞. Rad. Althææ ʒ. ij. β.

Parietariz, Maluæ, Althææ, Petroselini Macedonici ana M. j.

Sem. Milij solis ʒ. β.

Sem. Lini, Fœnigræci ana ʒ. j.

Flor. Chamomillæ, Meliloti, Anethi ana P. j.

Fiat decoctio in tribus partibus aquæ, uel una uini albi: ex qua foueatur regio renum, & ut æternum dolentium. Rondeletius.

Aliud fortius.

℞. Rad. Saxifragiæ, Raphani ana ʒ. j.

Rad. Liliorum alborum, Althææ ana ʒ. j.

Senecionis, Parietariz, Violariz, Syfimbrij aquatici ana M. j.

Maluæ, Branchæ Vrsinæ, Althææ ana M. β.

Sem.

A Sem. Saxifragæ, Milij solis ana ʒ.ʒ.
Fiat decoctio ut supra. His enim ad frangendos calculos vis non mediocris
inest. Rondeletius.

DE EPITHEMATIBVS

CAPVT XIII.

B Epithemata, malagma
ita dicuntur, quæ usceni-
bus, alijsq; partibus appli-
cantur. Hodie irrigatio-
nem, uel humectationem
uocant: sicut modo supra
cor, hepar & pectus totū
accommodantur: in hec-
ticis quidem & febrib. ar-
dentibus, pestilentialibus,
palpitatione & cardiaca.
Fiat autem ex aqua stilla-
titijs & pulueribus: ita ut
pro qualibet libra aqua-
rū, ponantur drach. ij. pul-
ueris seu specierum, uel
drach. j. ꝑ. Florum autē
alba alterant.

Vniuersaliter partes omnes: ut — Epithema commune omnium
partium.

Epithema ad frōtem { Primum.
Secundum.
Tertium.

Cere-
brum:

Epithema ad somnum { Primum.
Alterum.

Epithema ad capitis dolores.

Epithema ad faciei erysipelata, &c.

Epithema in febris continua { Primum.
Secundum.

Cor: ut

Epithema ad uirium imbecillitatem.
Epithema in febribus ardentibus.
Epithema ad febres ardentes & siccas.
Epithema ad palpitationē cordis ex bile.
Epithema ad frigidōs cordis affectus, &c.

Parti-
culari-
ter

Pectus: ut

Epithema ad hecticam { Primum.
Alterum, &c.

Ventri-
culū: ut

Epithema ad uentriculum corroborandū.
Epithema ad uentriculum biliosum.
Epithema ad uentriculum pituitosum.
Aliud.
Epithema ad dolorem ex frigido.
Epithema ad dolorem ex calore.

Hepar:
ut

Epithema ad calidam iecoris intemperiem, &c.
Epithema ad hepatis obstructionem & ca-
lorem.

Arterias iuxta manum: ut Epithema in febris cōtinua.
Testiculos, &c.

DE EPI

DE EPITHEMATIBVS AD OMNES PARTES. A

Epithema commune omnium partium.

℞. Succī Lactucæ, Væ immaturæ, Portulacæ, Solani, Umbilici Veneris ana ℥. iij.

His spongia aut linteum imbutum partibus, quæ febris ueluti fomites sunt, imponi debent. Andernacus.

DE EPITHEMATIBVS ALTERAN-
tibus cerebrum.*Epithema ad frontem primum.*

℞. Rosarum rub. P. j.

Macerentur in uino, ponanturq; inter duo linteola tres digitos lata, longitudine autem ab una aure ad alteram tendentia: & fronti applicetur. Galenus.

Secundum.

℞. Rosarum rubrarum, Florum Nymphææ, Flor. Violarum ana P. j.
Betonicæ, Meliloti ana P. β.

Reponatur inter duos sindones, uel duo linteola, fiatq; splenium intersutū, quod fronti ac temporibus applicetur. Andernacus.

Tertium.

℞. Aquæ rosarum ℥. β.

Olei rosacei ℥. β.

Album. ouorum n. j.

Aceti rosati ℥. j.

Misce, ac fiat epithema frontale.

Epithema ad somnum primum.

℞. Florum Nymphææ, Violarum, Meliloti ana P. j.

Fol. Lactucæ, Papaueris albi ana M. β.

Sem. Papaueris, Lactucæ, Anethi ana ℥. j.

Sem. Alterci ℥. β.

Contundantur omnia, & fronti inter duo linteā, uel pannos sericos, intersutos, appositis ligaculis applicentur. Andernacus.

Alterum.

℞. Aquæ Rosarum ℥. iij.

Aquæ Lactucæ, Papaueris ana ℥. j. β.

Olei uiolati uel ros. ℥. β.

Aceti rosati ℥. j.

Albumen oui j.

Misce, & fiat epithema, quo spōgia uel linteū imbutū frōti applicetur tepidū.

Epithema ad capitis dolores à frigore.

℞. Saluicę, Rorismarini, Chamomillę, Meliloti, Betonicę, Bryonię ana M. j.
Coquantur

A Coquantur in aqua: & fronti applicetur cum linteo imbuto in ea decoctione. Andernacus.

Epithema ad faciei erysipelata.

Epithemata ex aceto & aqua dulci, uel rosarum, uel plâtaginis, uel myrthi, uel nenupharis fiût. Ex succis pmixtis aceto uel aqua ad augendâ molê, uel ne nimis spiksi sint succi. Tinguntur panni rari, & applicantur. Rondeletius.

DE EPITHEMATIBVS ALTERANTIBUS cor.

Epithema in feбри continua primum.

℞. Aquæ Rosarum ʒ. viij.

Aquæ Acetosæ, Nymphææ, Buglossæ ana ʒ. iij.

Santalorum omnium, Corallij utriusq; ana ʒ. j. β.

Croci ʒ. β.

Aceti ʒ. β.

Caphuræ G. iij.

Misce, & fiat epithema, cordis regioni applicandum. Andernacus.

Epithema in feбри continua secundum.

℞. Aquæ Rosarum, Intybi, Buglossæ ana ʒ. ij. β.

Aquæ Cichorij ʒ. j. β.

B Spec. Diamarg. frig. ʒ. β.

Spec. Diagemmæ, Santali citrini, Coralli rubri ana ʒ. j.

Ramenti eboris ʒ. β.

Marg. preparat. G. xij.

Croci G. ij.

Vini, Aceti rosati ana ʒ. β.

Linteum uel spongia his omnibus imbuta, hora una uel sesquihora ante cibum, cordis regioni applicetur, per ætatem frigidum, sæpius que mutetur. Andernacus.

Epithema in febribus ardentibus.

℞. Aquæ Buglossæ, Rosarum ana ʒ. iij.

Aquæ Violarum ʒ. vj.

Spec. Diamarg. frig. ʒ. j.

Cristalli ʒ. j. β.

Succi citri ʒ. β.

Misce, & fiat epithema. Rondeletius.

Epithema aliud in uehementi febre.

℞. Aquæ Buglossæ, Acetosæ, ana ʒ. iij.

Aquæ rosarum ʒ. ij.

Vini albi ʒ. β.

Bb

Spec.

Spec. Diamarg. frig. Osis myrobalani ana ʒ. j.
Cinnamomi G. v.

Misce simul cum pauco scarlatæ granatæ, fiat epithema: quod tepidum ad-
moueat regiõni cordis. Rondeletius.

Aliud in febribus ardentibus circa statum.

℞. Aquæ Violarum, Acetosæ, Buglossæ ana ʒ. iij.
Aquæ Scabiosæ, Melissæ ana ʒ. β.
Spec. Diamarg. frig. Osis de corde cerui ana ʒ. j.
Cinnamomi G. v.

Fiat epithema, quod eo tempore admoueat, quo maius incendium ab æ-
groto percipitur. Rondeletius.

Epithema ad uirium imbecillitatem.

℞. Aquæ Melissæ, Flor. Aranciorum, Buglossæ ana ʒ. iij.
Aquæ ex flor. Myrthi, uel Aquæ rosarum ʒ. ij.
Vini Cretici ʒ. j.
Spec. Diagemmæ, uel Spec. Diamarg. cal. ʒ. j.
Trochiscorum de caphura ʒ. j.

Mixta cordi applicentur, Valet etiam ad palpitationem ex flatibus contra-
ctam. Rondeletius.

Epithema ad febres ardentes & siccas.

℞. Hordei mundati P. β.
Sem. Melonum, Cucurbitæ, Citrulli, Cucumeris ana ʒ. ij.
Flor. Violarum P. j.
Flor. Nenupharis P. β.

Eiat decoctio. In colaturæ ʒ. iij. dissolue

Olei Amygdalar. dulc. Violarum ana ʒ. iij.

Agitentur simul, & fiat epithema: supra totum thoracem applicetur. Maxi-
mè conuenit febribus hæcticis & squalidis. Rondeletius.

Epithema ad palpitationem cordis ex bile.

℞. Rosarum rubrarum, Flor. Buglossæ, Borriginis ana ʒ. j.
Santalorum omnium ana ʒ. ij.
Coralli rubri ʒ. j. β.
Been albi, rubri ana ʒ. j. β.

Hæc minutim contusa, sacco ex serico panno raro, qui pyramidis formam
referat, insuuntur, & aqua rosarum & buglossi modicè irrigatur, cordiq; ad-
mouetur. Andernacus.

Epithema ad frigidos cordis affectus.

℞. Florum Rosismarini, Stæchados ana ʒ. ij.

Sem.

- A** Sem. Ocyimi, Cort. Mali citri, Macis, Caryophyllorum ana ʒ. iij.
 Spec. Diamarg. cal. uel Diagemmę, uel Diathamaron ʒ. ij.
 Redacta in puluerem excipiuntur gossipio. Hoc deinde sacco indatur ex
 serico panno interfuto. Hic postea uino & aqua melissę irroretur, & tepidus
 cordi admoueat: siccatus remoueri debet. In cordis palpitatione trochi-
 sci de caphura addantur. Andernacus.

DE EPITHEMATIBVS ALTERAN-
 tibus pectus.

Epithema ad hecticam febrem.

- ℞. Hordei mundi P. ʒ.
 Flor. Violarum P. ij.
 Fiat leuis decoctio, & in ℥. j. dissolue
 Olei uiolacei ʒ. iij.
 Agitentur simul, & fiat epithema: supra totū thoracem applicetur. Rondelet.

Aliud.

- ℞. Hordei mundi P. ʒ.
 Flor. Violarum P. j.
 Quatuor sem. frig. maior. ana ʒ. ij.
 Flor. Nenupharis P. ʒ.
B Fiat decoctio. In ℥. iij. dissolue
 Olei Violati, Amygdal. dulc. ana ʒ. iij.
 Misceantur bene, & fiat epithema supra totum thoracem. Frequenter autem
 utendum sero & mane. Rondeletius.

DE EPITHEMATIBVS ALTERANTI-
 bus stomachum.

Epithema ad uentriculum corroborandum.

- ℞. Rosarum rubrarum P. ij.
 Plantaginis utriusque ana M. ʒ.
 Comarum Absinthij M. ʒ.
 Santalorum omnium ana ʒ. ij.
 Coralli rubri ʒ. iij.
 Omnia sacco imposta ex aqua cum momento aceti, cui aliquid uini adie-
 ctum sit, coquantur: linteum duplicatum hoc iure calido imbutum uentri-
 culo admoueat. Andernacus.

Epithema ad uentriculum biliosum.

- ℞. Acetosę, Endiuę satiuę ana M. j.
 Altheę cum rad. M. ʒ.
 Absinthij sicci M. ʒ.

Rosarum rubrarum P.j.
 Coriandri præparati ʒ.β.
 Santalorum omnium ana ʒ.ij.β.
 Baccarum berberorum ʒ.ij.
 Decoquantur ex aquæ libris duabus in sacculo ad tertias: postea addantur
 succi cotoneorum ʒ.ij. utitor ut superioribus. Andernacus.

Epithema ad uentriculum pituitosum.

ʒ. Meliloti, Chamomillæ, Maluæ, Altheæ, Menthe, Absinthij ana M.j.
 Nardi M.j.
 Omnia ex aqua in sacculo coquantur. Iuris decocti libræ addatur.
 Olei Rosacei ʒ.ij.
 Olei Absinthini, Mastichini ana ʒ.β.
 Adipis anserinæ ʒ.ij.

His omnibus commixtis lintea aut spōgiæ Imbutæ, uetri applicetur. Andern.

Aliud ad uentriculum pituitosum.

ʒ. Origani, Calaminthæ, Sifymbrij ana M.j.
 Menthe, Absinthij ana M.β.
 Sem. Cumini, Anisi, Fœniculi ana ʒ.ij.
 Caryophyllorum, Nucis moschatæ, Cinnamomi ana ʒ.ij.β.
 Decoquantur omnia in uino meraco, ac manè uesperiq; ante cibum uentri ʒ.
 imponantur, uel spongia uel linteo. Andernacus.

Epithema ad dolorem stomachi ex frigido.

ʒ. Menthe, Pulegij, Calaminthæ, Anethi ana M.j.
 Flor. Chamomille, Meliloti ana P.β.
 Flor. Ros. rubr. P.j. Nardi, Iunci odorati ana ʒ.ij.
 Sem. Anisi, Carui, Dauci, Anethi, Fœniculi ana ʒ.ij.
 Sem. Lini ʒ.ij.
 Galangæ, Zedoariæ ana ʒ.ij.
 Caryophyllorum, Nucis moschatæ, Ligni aloës ana ʒ.ij.
 In aquæ & uini equis partibus decoquantur. Iure ipsorū calido lintea duplicia
 imbuta, aut spōgiæ madentes, expressæq; stomacho applicetur. Andernacus.

Epithema ad dolorem stomachi ex calore.

ʒ. Acetosæ, Endiuie ana M.j.
 Altheæ cum rad. M.β.
 Absinthij P.β.
 Rosarum rubr. P.j.
 Coriandri præparati ʒ.β.
 Santalorum omnium ana ʒ.ij.β.
 Berberis ʒ.ij.

Deco-

A. Decoquantur ex aquæ libris duabus ad dimidias. Spongiæ; aut lintea, iure isto madida, & expressa, uentriculo imponantur. Andernacus.

DE EPITHEMATIBVS ALTERANTIBVS
hepar.

Epithema ad calidam hepatis intemperiem.

℞. Aquæ Endiuia, Scariolæ ana ʒ.iiij.

Aquæ Absinthij ʒ. j. β.

Aceti, Vini albi ana ʒ. β.

Sem. Acetosæ, Portulacæ ana ʒ. β.

Pul. Santalorum omnium ana ʒ. j.

Misce, & fiat epithema pro regione hepatis. Rondeletius.

Aliud ad calidam hepatis intemperiem.

℞. Aquæ Scariolæ, Solatri ana ʒ. j. β.

Aquæ Acetosæ, Endiuia, Buglossæ ana ʒ. iiij.

Aceti, Vini albi ana ʒ. j.

Trochiscorum de spodio ʒ. ij.

Spicæ Nardi ʒ. β.

Santalorum omnium ana ʒ. j.

Misce, & fiat epithema, ut prius. Rondeletius.

B. *Epithema ad hepatis obstructionem & calorem.*

℞. Cichorij cum rad. Intybi recentis, Agrimonie ana M j.

Absinthij M. β.

Flor. Cichorij P. j.

Quatuor sem. frig. maiorum & minorum ana ʒ. j. β.

Cyperij ʒ. ij.

Lupinorum ʒ. iiij.

Santalorum omnium ana ʒ. j.

Iunci odorati ʒ. β.

Hæc omnia in sacculum coniecta ex octo aquæ uncijs, uini & aceti utriusque uncijs duabus, in vase fictili cooperto simul ad ignem inferuescant, & epithematis modo applicentur. Andernacus.

DE EPITHEMATIBVS ALTERANTIBVS

corpus per arterias iuxta manum.

*Epithema in febre continua arterijs iuxta manum
applicandum.*

℞. Caryophyllorum, Nucis moschatæ, Ligni aloës, Cinnamomi ana ʒ. j.

Aquæ Rosarum, Cyrsij, Buglossæ ana ʒ. j.

Aceti Rosati ʒ. ij.

His commixtis linteum, aut pannum sericum duplex imbutum obducitur. **A**
Andernacus.

Epithema ad testiculos refrigerandos.

℞. Aquæ Rosarum ʒ. ij.

Aquæ Solani ʒ. j. β

Vini albi ʒ. j.


Trochiscorum de caphura ʒ. j.

Misce, & fiat epithema: ad moueatur testiculis, & ex decocto refrigerantium & astringentium, uel decocto florum nymphæ, uel rosarum rubr. balaustrorum, & similium, quibus in aqua decoctis paretur epithema. Sanguinem & uniuersum corporis habitum refrigerant: sanguinem inhibent, & minus red dūt fluxilem: unde in profluuiio sanguinis immoderato competūt. Rōdelet.

DE EMBROCHIS

CAPVT XIII.

Embroscha, Latini irrigatio dicitur: estq; proprie, ubi ex alto, pluuia indat, in partē aliquā sit distillatio. Vtuntur in capitis malis, aliarūq; partiu fracturis & cōtusionib. Com ponitur ex herbis, radicibus, semibus, florib. & id genus alijs, decoctis in aqua aut uino. Irrigationū aut alie alterant qualitate



DE EMBROCHIS CALFACIENTI-
bus caput.

Embroscha ad lethargum.

℞. Hyssopi, Origani, Calamenthi, Pulegij ana M. β.

Sem. Anisi, Sem. Fœnigræci, Coriandri præparati ana ʒ. ij.

Florum Stœchados Rosimarini ana P. j.

Decoquantur

A Decoquantur ad ℥.j. fiatq; embrocha, qua irrigetur caput. Rondeletius.

Irrigatio alia ad morbos capitis frigidos.

℞. Rad. Acori, Cyperi, Ireos ana ℥.ij.
 Betonice, Maioranę, Saluie, Origani, Calamenthi ana M.β.
 Cort. Citri sicci ℥.iiij.
 Sem. Anisi ℥.j.β.
 Coriandri preparati, Granorum tinctorum ana ℥.j.β.
 Flor. utriusq; stæchados ana P.j.

Coquantur in sufficienti quantitate aque, usque ad consumptionem partis dimidię, fiatq; embrocha, qua caput irrigetur, addendo si sit contumax morbus, aque uite ℥.β. Rondeletius.

Irrigatio calefaciens caput, alia.

℞. Betonice, Chamomille, Maioranę, Serpylli ana M.β.
 Laundule, Origani, Calaminthe, Hyssopi ana M.β.
 Coquatur in libris duabus aque fontanę, donec dimidium absūmatur, fiatq; embrocha. Fuchsius.

DE EMBROCHIS ALTERANTIBVS
 stomachum.

Embrocha ad stomachum imbecilem in febre quotidiana.

B ℞. Vini ℥.v.
 Omphacij ℥.iiij.
 Olei chamęmelini ℥.ij.
 Olei mastichini ℥.j.
 Misce & fiat embrocha. Andernacus.

DE EMBROCHIS REFRIGERANTI-
 bus caput.

Embrocha ad phrenitidem, in principio.

℞. Lactucę, Violarū, Plantaginis, Solatri, Sęperuii, Portulacę ana M.j.
 Flor. Violarum, Nenupharis, Rosarum ana P.j.
 Fol. Myrthi M.β.

Fiat decoctio, que per clepsydram paruam in caput instilletur.

Aliud embrocha in augmento.

℞. Violarum, Lactucę, Solatri, Plantaginis, Portulacę ana M.j.
 Rosarum, Flor. Violarum, Nenupharis ana P.j.
 Fol. Myrthi M.β.
 Flor. Chamomillę, Anthos, Meliloti ana P.j.

Coquantur ad dimidiū, fiatq; embrocha. In declinatione uerō additur huic decoctioni, betonica, spondilium, organum, & calamentum. Rondeletius.

Embrocha

Embrocha ad somnum conciliandum.

A

℞. Lactucæ, Violarū, Plantaginis, Solatri, Semperuiui, Portulacę ana M. j.
 Flor. Violarum, Nenupharis, Rosarum ana P. j.
 Fol. Myrthi M. β.

Sem. Lactucæ, Papaueris albi ana ʒ. ij.

Cort. Mandragoræ ʒ. j.

Decoquantur in lb. ij. aquæ usque ad consumptionem medietatis, fiatq; embrocha. Rondeletius.

Embrocha ad dolorem podagricum.

℞. Thymi, Origani, Saluiæ, Calaminthæ ana M. j.

In aqua decoquantur, iure eorum partes affectæ perfundantur, aut foueantur. Andernacus.

DE INSESSIONIBVS

CAPVT XV.

Insessus est quasi balneum uentris, partiūq; infernarum. Funt ex decoctione herbarū, radicum, florum, feminum, quorum residentia sacco imponitur, cui resideat eger. Vtuntur his in affectibus nephricæ, colicæ, uteri, ani, renum, uentris, ob æri imbecillitatem, uel balneorum defeculum. Florū autem alij

Astringunt: ut {
 Insessus ad anum prolapsum.
 Insessus ad nimium uteri fluorem.
 Insessus ad hemorrhoidas.
 Insessus ad alui fluorem.

Emolliunt: ut — Insessus ad tenesmum.

Aperiunt: ut {
 Insessus ad menstrua prouocanda.
 Alius.
 Alius.

Discutiunt: ut {
 Insessus ad inflammationes uteri.
 Insessus ad renes inflammatos.

Calculum frangunt: ut {
 Insessus ad calculos.
 Alius.
 Alius.

Dolorem sedant: ut {
 Insessus ad dolores colicos.
 Insessus ad dolorem nephriticum & colicum.

DE INSESSIONIBVS ASTRINGENTIBVS.

Insessus ad anum prolapsum.

℞. Plantaginis M. j.

Rosarum rubrarum M. β.

Decoquantur in aqua, cui chalybs antea extincta fuerit, Andernacus.

Insessus

A

Inseffus ad nimium uteri fluorem & ani hemorrhoidas.

℞. Plantaginis, Polygonij, Equiseti, Rubi foliorum ana M. j.

Rosarum P. iij.

Malicorij ℥. ij.

Radice Symphyti ℥. j. β.

Calicum glandium ℥. j.

Decoquantur in aqua chalybeata, fiatq; inseffus. Andernacus.

Inseffus ad hemorrhoidas.

℞. Verbasci, Plantaginis ana M. j.

Florum Verbasci P. j.

Semini Lini ℥. ij.

Cort. Malorum puniceorum, Balauftiorum, Rhus obsoniorum, Baccarum myrthi ana ℥. j. β.

In aqua & uino auctero decoquantur ad inseffum. Andernacus.

Inseffus ad fluorem alui.

℞. Rad. Bistortæ Consolidæ maior. ana ℥. ij.

Nucum cupressi, Nucum pini, Cort. mali granati ana ℥. ij.

Rosarum rubrarum, Balauftiorum, Granorum myrthi ana ℥. j. β.

B Decoquantur omnino in uino rubro astringente. Rondeletius.

Alius.

℞. Plantaginis, Polygoni, Bursæ pastoris, Equiseti ana M. ij.

Fol. Rubi, Lentisci, Sumach ana M. j. β.

Aluminis rochæ ℥. ij.

Rosarum rubrarum, Balauftiorum ana ℥. j. β.

Decoquantur omnia simul in uino rubro, aut aqua chalybeata: deinde huic decocto insideat æger. Rondeletius.

DE INSESSIONIBVS EMOLLIENTIBVS.

Inseffus ad tenesimum.

℞. Maluæ, Althææ, Violaris, Verbasci ana M. j.

Florum Verbasci P. j.

Semini Lini ℥. j. β.

In horum decocto ex aqua, æger ad umbilicum usq; sedeat. Andernacus.

DE INSESSIONIBVS APERIENTIBVS.

Inseffus ad menstrua promouenda.

℞. Artemisæ, Rorismarini, Thymi, Marrubij, Calaminthæ ana M. ij.

Sabinæ M. j.

Fol. Lauri P. iij.

Flor. Rorismarini, Sambuci ana P. ij.

Cc

Rad.

Rad. Cyperi ꝑ. ij.

Granorum iuniperi contuf ꝑ. j. ꝑ.

Omnia incifa, facculoq; condita, coquantur ex aqua fluuiali, quâta ad infefum requiritur. Andernacus.

Alius ad eadem.

ꝑ. Artemifiæ, Saluiæ, Betoniciæ, Calaminthæ, Origani, Pulegij, Chamæmeli, Meliloti, Hyperici, Abrotani ana M. ꝑ.

Rad. Iridis, Petroseliniana ꝑ. j.

Coquantur pro infefu. Fuchfius.

Alius ad menftrua prouocanda.

ꝑ. Nepitæ, Artemifiæ, Thymi Saluiæ ana M. j.

Fol. Lauri, Filicis ana M. ij.

Florum Sambuci ꝑ. j.

Rad. Valeriani, Apij, Petroseliniana, Fœniculi ana ꝑ. ij.

Ex his in aqua decoctis fiat infefus, quo manè & uelperi ante cibum utendum eft. Andernacus.

Alius ad menftrua indurata, tumoresq; & dolores naturalium.

ꝑ. Fœnjgræci, Sem. Lini, Pulegij, Artemifiæ, Cucumeris fylueft. Rad. Liliorum alb. Fol. Dendromalachæ ana q. f.

Decoquantur omnia in aqua, fiatq; infefus, uel balneum fimplex dulcis aque emolliens & humectans. Antea uerò quàm utaris, aluus subduci, leuariq; uefica debet. nam his oppletis, & uterum qui medius inter illa confiftit, prementibus, mēftrua nimia anguftia cohibentur, tardaturq;. Andernacus.

DE INSESSIONIBVS DISCVTIENTIBVS.

Infefus ad uteri inflammationes.

ꝑ. Rutæ, Pulegij, Nepitæ, Marrubij, Thymi, Artemifiæ, Althææ, &c. ana q. f. Decoquantur ad infefum. Post huius ufum, uterus oleo laurino, uel nardino, uel anethino inungatur. Andernacus.

Infefus ad renes inflammatos.

ꝑ. Maluæ, Althææ ana M. iij.

Sem. Lini, Fœnjgræci ana ꝑ. ij.

Decoquantur in aqua. Hæc pofttea uafi ligneo altitudinis pedalis immittantur ad infefum. Andernacus.

DE INSESSIONIBVS FRANGENTIBVS calculum.

Infefus ad calculofos.

ꝑ. Fragmentorū Raparū, Fragment. Pallinacæ, Siferis, Chamomillæ, Flor. Verbafci, Betoniciæ, Prunellæ, Aquilegij, Rutæ murariæ, Artemifiæ ana M. j.

Coquan-

A Coquantur in aqua pluuiali, quantum ad infessum satis est. Andernacus.

Infessus ad calculum.

℞. Saxifragæ, Oenantes, Helxines, Maluæ, Altheæ ana M.ij.

Cicerum rub. ʒ.ij.

Sem. Petroselin, Lini, Fœniculi ana ʒ.ʒ.

Coquantur in aqua iustæ quantitatis ad tertias pro infessione. Fuchsius.

Alius ad calculum.

℞. Maluæ, Altheæ, Chamomillæ, Meliloti, Parietariæ, Scolopédrij ana M.ij.

Rad. Maluæ ʒ.ʒ.

Rad. Fœniculi ʒ.iiij.

Sem. Lini ʒ.iiij.

Fœnigræci ʒ.ij.

Rubeæ tinctorum ʒ.ʒ.

Incisa omnia, sacculoq; lineo indita, ad infessum coquantur. Andernacus.

Alius ad calculum.

℞. Rad. Altheæ ʒ.iiij.

Fol. Altheæ, Maluæ, Parietariæ ana M.ij.

Rad. Nardi M.ʒ.

B Origani, Calamenthi, Betonicæ, Abrotani, Artemisiæ, Rorismarini, Petrofelini ana P.ij.

Sem. Lini, Fœnigræci, Anisi, Fœniculi ana ʒ.ij.

Furfuris crassi P.iiij.

Sacculo indita ex aqua communi coquantur, quanta ad infessum sufficere poterit. Andernacus.

DE INSESSIONIBVS DOLOREM

mitigantibus.

Infessus ad dolores colicos mitigandos, curandosq;.

℞. Altheæ, Rutæ, Maioranæ, Artemisiæ ana M.ij.

Fol. Lauri ʒ.ij.ʒ.

Seminis Apij, Anisi, Cumini ana ʒ.ij.

In aqua decoquantur, quanta folium dimidium repleat. Andernacus.

Infessus ad colicum & nephriticum dolorem.

℞. Origani, Calaminthæ, Anethi, Chamomillæ, Sinonis, Lauri ana M.iiij.

Fœnigræci, Sem. Carui, Cumini, Anisi, Fœniculi ana ʒ.ij.


Baccarum Lauri ʒ.ʒ.

Quod si uarij sine affectus, eorūq; causæ diuersæ, plura medicaméta instituto idonea adijcere licebit: ut si emollitione opus sit, folia maluæ, altheæ, parietariæ, ac uiolarum addes. Sin autem incisio quædam, aut meatuum apertio

Cc 2 requirz

requiratur, radices asparagi, rusci, apij, adiungentur. Ad uesicā calculosam A
eisdem utendum, ita tamen ut ruta addatur. Andernacus.

DE BALNEIS CAP. XVI.



DE BALNEIS EXCALFACIENTIBVS.

Balneum ad intemperiem frigidam.

℞. Pulegij, Origani, Hyssopi, Thymi, Satureiæ ana M. j.

Saluæ, Fol. Lauri, Rorismarini, Chamæpityos, Pyrethri ana M. β.

Hæc uel omnia, uel plura ex eis, in aqua fontana, uel uino mixta coquantur,
quanta ad balneum satis sunt. Andernacus.

DE

A DE BALNEIS REFRIGERANTIBVS.

Balneum ad intemperiem calidam.

℞. Florum Violarum, Buglossæ ana P. iij.
Flor. Nymphæ P. ij.

In aqua coquantur, quanta pro balneo sufficit. Rondeletius.

Aliud.

℞. Succu Solatri, Cucurbitæ, Melonum ana ℥. iij.
Misce aquæ balnei, quanta pro balneo satis esse potest. Rondeletius.

Balneum pro hecticis.

In febribus hecticis conueniunt balnea ex aqua tepida, humectantia: que ut magis humectent, addimus ℥. j. olei uiolati, aut butyrum recens in prædicta aqua dissoluimus, quod humiditatem aeream partibus externis infundit. Rondeletius.

Aliud pro hecticis.

℞. Radicum Bismaluz ℥. ij.
M. l. u. x. Branchæ ursinæ, Buglossæ cum rad. ana M. iij.
Flor. Violarum, Buglossæ, Borriginis ana P. iij.
Rosarum rub. P. ij.

B Humectantibus balneis admisceantur decocta pedum ueruecis, & intestinum: quamuis illa ad remolliendum potius usurpètur. Rondeletius.

DE BALNEIS ASTRINGENTIBVS.

Balneum ad iuuandum conceptum.

℞. Rad. Valerianæ ℥. j. β.
Rad. Cyperi, Galangæ, Rad. Enulæ ana ℥. ij.
Fol. Lentisci, Artemisiæ, Calamenti, Origani, Lauendulæ, Maioranæ, Fol. Lauri ana M. iij.
Summitatum Lentisci, Myrthi, Cupressi ana M. ij.
Sem. Ameos, Lentisci, Fœniculi ana ℥. j. β.
Cort. Mal. granat. ℥. ij.
Aluminis ℥. iij.
Ros. rub. Stœchados, Flor. Sampsuci ana P. iij.
Coquantur omnia in sufficienti aquæ quantitate, addendo uini rubri stiptici modicum: & utatur balneo. Rondeletius.

Balneum ad inflammationem, cum fluxus adest.

℞. Plantaginis, Polygonij, Fol. Rubi ana M. iij.
Malicorij ℥. ij.

Coquantur in aqua, quantum ad balneum satis esse putas. Andernacus.

DE BALNEIS EMOLLIENTIBVS.

A

Balneum emolliens.

R. Maluæ cum radicibus, Branchæ ursinæ, Violariæ ana M.iiij.

Mercurialis, Parietariæ, Betæ ana M.ij.

Sem. Lini ʒ. j.

Flor. Chamomillæ P. ij.

Fiat decoctio pro balneo, in quo æger bis quotidie natet ad horâ unam. Hoc balneum ualet etiam in affectibus cutis crustosis, squamosis, siccis & squallidis. Rondeletius.

Balneum ad inflammationem & duritiem membrorum.

R. Maluæ domesticæ, syluestris, Meliloti ana M.ij.

Seminis Lini ʒ. iiij.

Fœnigræci ʒ. ij.

Ex his in aqua coctis balneum paratur. Andernacus.

DE BALNEIS APERIENTIBVS.

Balneum menstrua prouocans.

R. Radicum Ireos lb. ʒ.

Galangæ crassæ, Rad. Rubiæ maior. ana ʒ. ij.

Rad. Altheæ, Ciclamini ana ʒ. iii.

Artemisiæ, Nepotæ, Matricariæ, Origani, Mercurialis ana M.iiij.

Pulegi, Psilij, Maioranæ, Fol. Lauri ana M.ij.

Sem. Petroselinij, Seseleos, Ameos, Cinnamomi ana ʒ. j. ʒ.

Sem. Lini, Fœnigræci ana ʒ. iiij.

Flor. Sampfuci, Anthos, Stœchados, Cicerum rub. Sabinæ ana P. iiij.

Coquantur omnia in duabus partibus aquæ, & una uini albi: deinde sedeat in balneo, frequenter admouendo uentri inferiori plantas in prædicto balneo decoctas. Rondeletius.

DE BALNEIS ABSTERGENTIBVS CVTEM.

Balneum primum ad cutis affectus: hoc est, crustas & squamas duras emolliens, & detergens.

R. Maluæ cum rad. Branchæ ursinæ, Violariæ ana M.iiij.

Mercurialis, Parietariæ, Betæ ana M.ij.

Sem. Lini ʒ. j.

Chamomillæ P. ij.

Decoquantur pro balneo, in quo bis quotidie sedeat ad horam unam. Rondeletius.

Balneum secundum, cutis affectus detergens & exiccans.

R. Rad. Brioniæ, Lapatij acuti, Cucumeris syluest. Ari, Serpentiariæ ana lb. j.

Rad.

- A** Rad. Asphodeli, uel Gentianæ, uel Squillæ lb. β.
 Saponariæ, Parietariæ, Absinthij, Scabiosæ, Fumariæ, Borruginis ana M. j.
 Lupinorum, Fabarum ana ʒ. β.
 Flor. Centaurij min. P. iij.
 Rosarum P. ij.

Fiat decoctio pro balneo: de qua decoctione adde plus uel minus, pro morbi natura, uel corporis habitu & uiribus, & diutius utatur. Rondeletius.

Balneum tertium cutim detergens, ac leuiter astringens seu corroborans.

- ʒ. Fol. Myrthi, uel Fol. Lentisci, uel Plantaginis, Tapfi barbati, Pilosellæ,
 Hippuris, Polygoni ana M. ij.
 Rosarum P. iij.
 Rad. Iridis, Bistortæ, Pentaphylli ana ʒ. ij.

Fiat decoctio: in qua dissolue

Salis communis lb. iij.

Aluminis ʒ. iij.

Misce, & fiat balneum tepidum, & spongijs nouis detergatur diligenter. Exlixuio etiam fieri possunt, modo non sit nimis acere. Hoc autem balneo non utendum, nisi prius materia per præcedentia balnea fuerit insensibiliter resoluta, uel euacuata. Rondeletius.

B

Balneum ad maiores cutis affectus.

- ʒ. Rad. Lapathi acuti lb. ij.
 Rad. Enulæ lb. β.
 Fumariæ, Lupinorum, Borruginis, Buglossæ, Parietariæ, Betæ, Saponariæ ana M. iij.
 Sem. Cucurbitæ, Cucumeris, Melonis, Citrulli ana ʒ. ij.
 Acetosæ, Lapathi acuti, Lentiginis aquaticæ ana M. ij.
 Misce simul, & pro balneo decoquantur: in quo potes addere farinæ fabarū lb. ij. Sedeat in hoc balneo æger.

Aliud ad idem.

- ʒ. Rad. Brioniæ, Cucumeris syluest. ana lb. β.
 Rad. Asphodeli ʒ. iij.
 Rad. Lapathi acuti, Enulæ ana lb. β.
 Lupinorum, Fumariæ ana M. iij.
 Sem. Raphani ʒ. j.
 Sem. Melonum, Citrulli, Cucurbitæ, Cucumeris ana ʒ. j. β.
 Lumbricorum per media dissectorum n. iij.
 Fol. Senæ ʒ. iij.
 Flor. Borruginis, Violarum, Buglossæ ana P. iij.

Reponantur

Reponantur omnia pro balneo: in quo dissolue farina lupinorum, & cice. A ris rub. ana ℥. β. fiat balneum, ut dictum est. Rondeletius.

Aliud ad præduram præumidamq, scabiem.

℞. Rad. Brionæ, Cucumeris sylvestr. ana ℥. iij.

Rad. Althææ, Liliorum alb. Lapatu acuti ana ℥. iij.

Rad. Serpentariæ, Hastulæ regiæ ana ℥. ij.

Maluæ, Bismaluæ Branchæ ursinæ ana M. iij.

Lupinorum, Fumariæ, Lapatu acuti, Saponariæ, Acetosæ, Endiuæ, Cichorij ana M. j.

Sem. Lini, Fœnigræci ana ℥. j.

Sem. Raphani ℥. j.

Sem. Cucurbitæ, Melonum, Citrulli, Cucumeris ana ℥. ij.

Flor. Chamomillæ, Meliloti ana P. ij.

Flor. Borriginis, Buglossæ, Nymphææ, Hordei integri, Cicerum rubrum ana P. ij.

Misce simul, & decoquantur in sufficienti aquæ quantitate pro balneo: quo præsidio utimur ad discutiendam scabiem crustosam & contumacem, & emollienda tubercula elephaticorum, quibus tota cutis scater. Post hoc balneum, utendum erit tertio balneo, superius descripto in cutis affectibus. Rondeletius. B

Aliud, abstergens, purgans, rarefaciens, digerens, pro leprosis.

℞. Brionæ, Cucumeris asinini, Serpentariæ, Enulæ ana ℥. β. cum radicibus.

Lapatu acuti, Acetosæ, Borriginis, Buglossæ, Saponariæ ana M. iij. cum radicibus.

Fumariæ, Lupinorum, Endiuæ, Cichorij, Plantaginis ana M. iij.

Lupinorum, Cort. fabarum, Hordei integri ana P. ij.

Rosarum rub. Flor. Nenupharis, Trium flor. cordial. Tamarisci ana P. iij.

Flor. Chamomillæ, Flor. Meliloti ana P. ij.

Fiat decoctio in aqua fontana & pluuiali pro balneo, quod ingrediatur mané uentriculo uacuo. Bis aut ter in secunda uice sumat tabellam unam Diama. frig. superbibendo ℥. ij. aquæ borraginis. Item à prædio ingrediatur lóge à cibo. Continuis tribus diebus peragat id ipsum. Rondeletius.

DE BALNEIS DOLOREM MITIGANTIB.

Balneum ad dolorem colicum.

℞. Rad. Althææ ℥. ij.

Mercurialis, Parietariæ, Violaræ, Branchæ ursinæ ana M. j.

Origani, Calamenthi, Pulegij, Rutæ ana M. iij.

Anisi, Fœniculi, Petroselini ana ℥. β.

Flor.

- A** Flor. Anthos, Samplici, Stœchados, Meliloti ana P. iij.
Cort. Citri sicci ʒ. ij.
Lauendulæ, Fol. Lauri ana M. iij.

Decoquantur omnia in duabus partibus aquæ, & una uini. Quòd si uini maluatici copia suppetit, illius modicum permisceri poterit. Rondeletius.

Balneum ad dolorem nephriticum.

- ℞. Rad. Liliorum alb. Bisfaluæ ana M. iij.
Parietariæ, Saxifragiæ, Petroselini, Fœniculi marini, Fœnigræci ana M. ij.
Sem. Lini, Fœnigræci ana lb. β.
Milij solis ʒ. ij.
Fol. Syfimbrij, Violaræ, Borraginis, Buglossæ ana P. iij.

Quibus addere potes,

- Rad. Raphani ʒ. iij.
Fol. Senecionis M. ij.
Flor. Chamomillæ, Sambuci ana P. ij. β.

Decoquantur omnia in sufficienti aquæ quantitate: deinde permisceatur uini albi lb. iij. olei liliorum, & butyri ana lb. iij. paretur balneum, in quo sedeat æger, tantisper dum uehementibus doloribus torquetur. Quo uti post alias euacuationes est saluberrimum: & eo ipso tempore, quo æger in balneo

- B** residet, potiones calculum frangentes exhiberi possunt. Rondeletius.

Balneum ad lassitudinem.

- ℞. Hyssopi, Origani, Pulegij, Thymi, Satureiæ ana M. j.
Saluiæ, Fol. Lauri, Rorismarini, Chamæpityos, Pyrethri ana M. β.
Coquantur in aqua fontana, quanta ad balneum satis est. Andernacus.

Dd D B L O.

DE LOTIONIBUS CAP. XVII. A

Partiū quarumdam sunt ablutio- nes, quæ balnei ni- cem gerunt, uide- turq; balnea parti- cularia. Unde lo- tiones.	Trunci: uide- licet.	Capitis: ut	Lotio ad sordes auferendas.
			Lotio ad ulcera.
	Artuum: sci- licet.	Axillarum: ut	Lotio ad pediculos.
			Lotio ad tingendos capillos.
			Lotio ad alopeciam.
			Lixiuum ad cerebrum memoriāq;
			Aliud in frigido affectu.
			Aliud.
			Lixiuum ad distillationem sistendam.
			Lotio ad axillas.
		Manuum: ut	Lotio ad manus.
		Pedum: ut	Lotio ad somnum ciendū in febris.
			Lotio pedum polychristos.
			Lotio ad podagram, &c.

DE LOTIONIBVS CAPITIS.

Lotio ad sordes capitis auferendas.

Caput ad sordes auferendas lixiuio, ex cineribus sarmentorum facto laua-
tur, corpore recrementis uacuo, & manè ante cibum: sic tamen, ut statim ca-
put abstergatur linteis calidis, & exiccetur: capilli si adsint, extricentur: non
autem expectandum, donec caput, capilliq; per se exiccetur. Andernacus.

Lotio ad ulcera.

In capitis ulceribus lixiuijs desiccantibus utimur: ut abrotani, betonicæ,
&c. Rondeletius.

Lotio ad pediculos.

In pediculari morbo, amaris, ut lupinis, nitro, & fellibus, staphide agria, &
ad uermes occidendos, & furfures detergendos, & pilos tingendos. In furfa-
ribus, detergentibus: ut melle, succis herbarum amararum, aut herbis: ipsis
decoctis, ut cicla, parietaria, saponaria. Rondeletius.

Lotio ad tingendos capillos.

Capillis tingendis palea auenæ utimur, cortice & ligno berberis, floribus
genitæ, & hyperici. Rondeletius.

Lotio ad alopeciam.

Ad alopeciam fit ex alcionio potentissimum lixiuium, quod siccat & di-
gerit potenter, & morbum curat. Rondeletius.

Lixiuum ad cerebrum memoriāq; iuuandam.

ꝛ Chamomillæ, Saluiæ, Origani, Betonicæ ana M. j.

Submittan-

A Submittantur cineri in fundū, & lixiuium superfundatur, cum aqua pluuiiali: & pridie quā caput lauetur, madefcat in eo facculus lineus ex Rosarum rubr. Maioranæ, Lauendulæ, Rorismarini, Spicæ, Betonice ana P. j. modicè incisorum.

Agarici ꝑ. ij.

Inter lauandum sapo odorus in pomi figuram (pomatum uocant) addatur. Andernacus.

Aliud lixiuium ad frigidos affectus.

℞. Saluæ, Rorismarini, Organi, Calaminthæ ana M. j.

Fol. Lauri M. ꝑ.

Florum Stæchados, Heliochrysi ana P. j.

Ex iure decocti caput irrigetur, laueturq; Andernacus.

Aliud ad memoriam.

℞. Maioranæ, Rorismarini, Melissæ ana M. j. ꝑ.

Fol. Lauri M. j.

Flor. Chamomillæ, Flor. Stæchados, Pseudonardi, seu Lauēdulæ ana P. ij.

Coquantur in lixiuio, sacculo condita. horum iure caput, manè ante cibum, corpore purgato, lauetur: mox siccet, contegaturq; Andernacus.

Aliud ad distillationem sistendam.

B ℞. Maioranæ, Betonice, Melissæ ana P. j.

Flor. Chamomillæ, Stæchados, Anthos, Heliochrysi ana P. iij.

Nigellæ ꝑ. ij.

Coquantur in lixiuio ex buxi cinere, & hoc caput rursus lauetur.

DE LOTIONIBVS AXILLARVM.

Lotio ad axillas.

Axillæ abluuntur lixiuio parato ex astringentibus, ut oleastro, lētisco: additis quibusdam odoratis constringentibus, ut rosis. Rondeletius.

DE LOTIONIBVS MANVVM.

Lotio ad manus.

Manus abluuntur aqua & sapone odorato, uel aqua & medulla panis, uel aqua & surfure: additis quibusdam odoratis, ut aqua rosarum, uel naphæ, uel spicæ, uel oleo spicæ. Diutius uerò manus abluuntur aqua, cui aqua rosata moschata fuerit permixta.

DE PEDVM LOTIONIBVS.

Lotio ad somnum ciendum in febribus.

℞. Maluæ recentis, Lactucæ, Fol. Cucumeris, Cucurbitarum, Violarie ana M. j.

Dd 2 Flor.

Flor. Nenupharis, Violarum ana P. j. A
 Fiat decoctio, qua abluantur pedes, cum ibit dormitam: nec tergatur, aut panno humido inuoluantur. Rondeletius.

Lotio pedum polychristos.

℞. Chamomillæ, Rosarum rub. Betonicæ, Origani, Saluie, Rutæ, Asari ana M. j.


Condita sacculo coquantur in lauacro pedum. ubi uerò iam satis inferbuerint, sextarius nitri, & salis P. j. addatur. Vtitor in septimana semel uel bis, mane aut uespero ante cibum, uel etiam ante somnum, in usum adhibito. Capiti, pedibus, sanguini, & omnibus neruis salubris: multos morbos alioqui futuros arceat. Andernacus.

Lotio ad podagram.

In multis usitata podagricis ualde profuit. Lixiuum ex fagi cineribus paratur, & ter aut quater colatur: deinde tantum uini admiscetur: aluminis ℥. ij. adduntur: omnia in fictili uitreato coniuncta calefiunt ad ignem, sed ita, ut non efferuescant. Deinde transfunduntur in uas, in quo pedes consistere poterunt: hi autem tam altè lauacro insistent, ut aqua supra talos excedat. Extrahit humidam pituitæ materiam in articulis hærentem: quam deinde linteo puro absterges. Tam calidum autem erit lauacrum, quàm pedes ferre possint: mane quæ & uespero ante cibum adhiberi debet. Quinetiam cum malum hoc accessionem minatur, & post ipsam utile esse potest, id quæ in septimana quater aut quinque: ne deterreat te, si pedes tumidos, rubentes quæ fieri conspicias. Andernacus. B

DE OLEIS

A DE OLEIS CAP XVIII



	Astringunt: ut Oleum	{ De absinthio, De mentha. Lentiscinum, Mastichinum. Myrtinum, Myrtillorū, Oenanthinum, &c.	A
	Emolliunt: ut	{ Oleum Lini. Oleum Nārcissinum. Styracis, &c.	
	Laxant: ut Oleum	{ Amygdal. dul. Oliuarum, Iasininum. Sesaminum, &c.	
	Rarefaciunt: ut Oleum	_____ { Anethinum: Chamæmelinum, &c.	
	Digerunt: ut Oleum	{ Amygdal. amararum. Nucum, Oliuarum antiquarum. Rutaceum, &c.	
A. Olea alte- ranta quali- tate secunda, ant	Detergunt: ut Oleum	{ De myrrha, De tartaro. De frumento. Ounorum, Sambucinum. Balaninum, Ricinum. Raphaninum, &c.	B
	Glutinant: ut Oleum	{ Myrrhæ. Balsaminæ, &c.	
	Somnum inducunt: ut Oleum	{ Mandragoræ. Malorum aureorum. De papauere. Nenupharinum. Hyosciaminum, &c.	
	Calculum frangunt: ut	Oleum scorpionum, &c.	
	Coitum iuuant: ut	Oleum Formicarum, &c.	
	Dolores sedant: ut Oleum	_____ { Cheyrinum. Chamæmelinum. Anethinum. Liliorum alborum. Laurinum. Hyperici. Moschelinum. Popolinum. Vulpinum. Ex granis ebuli, &c.	B. Olea

A.

Herbis.

Floribus: ut Oleum Spicæ.

Oleum è baccis iuniperi.

Fructibus: ut

Oleum è baccis lauri.

Oleum è baccis hederæ.

Oleum è nucleis pineis, Oleum è cepæ.

Oleum ex nucibus cupressi.

Seminibus: ut

Oleum { Anisi, Fœniculi,

Cumini, Petrofelini.

Ex granis ebuli, &c.

Lignis: ut

Oleum ex ligno

{ Guaiaco, Iuniperi.

Fraxini.

Hederæ, &c.

Corticibus: ut

Oleum

{ Cinnamomi.

Ex cort. mali aurantij.

Ex cort. nucum, &c.

Aromatibus: ut

Oleum

{ Caryophyllorum, Macis.

Nucis Moschata,

Maceris, Piperis, &c.

Resinis: ut

Oleum

{ Masticis, Thuris.

Myrrhæ, Succini.

Caphuræ, Belzoinum.

Ammoniæ, Labani.

Terebinthinæ, &c.

Metallicis:

ut Oleum

{ Auri, Argenti, Perlarum,

Coralliorum, Salis, Sulphuris.

Vitrioli, Tartari, Stibij.

Cupri, Aeris, Stanni.

Plumbi, Ferri, Hydrargyri.

Lithargyri, Auripigmenti, Talci.

Calcinum, De lateribus, Crystallorum.

Animalibus, & eorum-

dem paribus: ut

Oleum

{ Ex sanguine { Humano.

Cervino.

Ex ossibus humanis.

Ex maxillis equorum,

Ex cornibus cervinis.

Ex calitaria humana.

Ex stercore humano.

Taxi, Castorei, Ex melle.

Scorpionum, Cerae, &c.

Compositis: ut Balsama, &c.

B.

B.
Olea præpa-
rata modo
subtili, sunt
olea destil-
lata, ex re-
bus velSimpli-
cibus: si
licet

490 DE OLEIS CRASSO MODO PARATIS.
DE OLEIS CALFACIENTIBVS VENTRICVLVM. A

Oleum menthae.

℞. Menthae crispae ℥.iiij.

Olei omphacini ℔.j.

Macera & infola per dies octo: mentham exemptam bene exprime, atq; aliã recentem impone, ut supra: atq; ita tertium fac: cola, & serua. Nonnulli in tertia infusione mentham relinquunt. * Ventriculum refrigeratum & imbecillum calefacit: firmat nauſeam, uomitumq; reprimit, appetentiam excitat, coctionemq; iuuat. Innominatus.

Oleum absinthinum.

℞. Comarum absinthij ℥.iiij.

Olei omphacini ℔.j.

Insolato in uase uitreo, absinthiumq; permutato ter, ueluti de mentha, in oleo menthae dictum est. * Calfacit ac roborat ea quae sunt refrigerata, potissimum uero uentriculum: excitat appetentiam, obstructions aufert, lumbricosq; enecat. Innominatus.

Oleum mastichinum.

℞. Olei rosati omphacini ℔.j.

Mastiches ℥.iiij.

Vini odoriferi ℥.iiij.

Omnia in uase uitreo imposita coquantur in duplici uase ad uini consumptionem. * Cerebrum, neruos, iuncturas, uentriculum, hepar corroborat, tumores duros lenit, dolores sedat. Mesues.

Oleum nardinum simplex.

℞. Nardi Indicae ℥.iiij.

Vini, Aquae ana ℥.ij.β.

Olei loti ℔.j.β.

Minutim incisam macera, & coquantur in duplici uase, donec uinum & aqua, per uaporem resoluantur: coletur deinde oleum, & reponatur. * Calfacit, tenuat, digerit, modice adstringit: proinde affectus omnes frigidos & flatulentos cerebri, uentriculi, hepatis, lienis, renum, uesicae, uteri, magnopere iuuat: narib. iniectum, caput purgat, corporis colore & odore comedat. Mesues.

Oleum nardinum compositum.

℞. Nardi Indicae ℥.iiij.

Maioranae ℥.ij.

Ligni aloes, Enulae, Folij Indi, Calami aromatici, Fol. Lauri, Cyperi, Schœnanthi, Cardamomi ana ℥.j.β.

Contundantur omnia leuiter: & illis adfunde
Vini, Aquae ana quantum sufficit.

Olei

A Olei loti lb. vj.

Macerentur horis duodecim: deinde coquantur in duplici uase, secundum artem. * Idem quod præcedens potest. Mesues.

DE OLEIS EXCALFACIENTIBVS HEPAR.

Oleum amygdalarum amararum.

℞. Amygdalarum amararum, liccarum, non tamen rancidarum: contundantur minutissimè: postea in sartagine aliquantulum torrefacias, affuso aquæ rosacæ modico: postea prælo exprime. * Aperit oppilationes, & discutit uentositates & uapores: sed potissimum medetur surditati, sibilo, & dolori aurium: lenit duritiè neruorū, & delet maculas faciei. Innominatus.

HEPAR quoq; excalfaciunt, oleum absinthinum, nardinum, & mastichinum: de quibus uide suprâ.

DE OLEIS EXCALFACIENTIBVS LIENEM.

Oleum de capparibus.

℞. Cort. radic. Capparum ʒ. j.

Cort. Tamarisci, Folior. Tamarisci, Sem. Agni casti, Ceterach, siue Asplenij, Cyperi ana ʒ. ij.

Olei oliuarum lb. j.

Aceti albi fortis, Vini albi ana ʒ. ij.

B Trita leuiter coquantur in duplici uase, usq; ad uini consumptionem & acetum. * Ad duritiem, obstructionem, & dolorem splenis utile est, & omnem eius ægritudinem. Innominatus.

Oleum de beben.

Oleum de Ben, seu Balaninum, sit extuso, affusoque, affusa rosacea aqua fructu isto. * Repurgat maculas, uaros, lentigines, cicatricum nigritias, fucos: aluum soluit, sed uentriculo aduersatur: dolores aurium emendat. Item si sonant aures, uel strepitum aut sibilum ædunt, cum adipe infusum auxiliatur. Innominatus.

Oleum liliorum simplex.

℞. Flor. Liliorum alborum, abiecto quod croceum est, ʒ. iiij.

Olei ueteris lb. j.

Fit ut oleum menthæ: ter lilia renouanda sunt. * Calefacit, resoluit, ob id à frigore dolores thoracis, uentriculi, coli, uteri, renum, uesicæ sedat, lenit & coquit. Innominatus.

Oleum liliorum compositum.

℞. Foliorum Liliorum alborum ʒ. ix.

Masticis, Calami aromatici, Carpobalsami ana ʒ. j.

Caryophyllorum, Cinnamomi ana ʒ. β.

Croci ʒ. iiij.

Ee Omnia

402 DE OLEIS CRASSO MODO PARATIS.

Omnia, præter liliorum folia, aqua sufficiente uiginti quatuor horis macerentur, deinde paululum coquantur, & additis lilijs, oleiq; ueteris lb. ij. aliquantulum bulliant: tunc omnia iniecta in uas uitreum in sola dies quadraginta: post colatum & bene obstructum reponatur. Innominatus.

LIENEM quoq; excalfacit oleum Spicæ, siue nardinum.

DE OLEIS EXCALFACIENTIBVS.
uterum.

Oleum irinum.

℞. Rad. Ireos lb. j.

Florum eiusdem lb. ij.

Macerentur in decoctione aliarum radicum ireos quantum sufficit.

Olei ueteris lb. ij.

In uase duplici coque, exprime, radicesq; nouas, & flores immitte, coquantur denuò, & tertium: colatum seruato, & obturato. * Terget, tenuat, coquit, resoluit potenter: ob id à frigido dolores aurium, hepatis, splenis, uteri, articularum sedat, phlegmonas coquendo suppurat, materias thoracis & pulmonis coquit: strumas dissipat, & alios tumores duros: spasmus emendat, & narium foetorem. Mesues.

Oleum irinum aliud.

℞. Olei ueteris lb. xiiij.

Aquæ lb. iij. §. ij.

Rad. Iridis lb. iij. §. iij.

Flor. Liliorum alborum §. xv.

Rad. Cyperi recent. §. vj.

Rad. Helenij §. iij.

Rad. Buglossæ §. ij.

Cinnamomi, Nardi Indicæ, Afæ odoratæ ana §. j.

Contundantur radices, & aliz species, & macerentur in oleo & aqua diebus quinque ad solem, uel loco calido: postea in duplici uase coquito, donec aqua consumpta fuerit. Refrigerare finito, colato, exprimito, & reponito. * Vsurpatur ad diuturnum catarrhum, naribus illitum. Ozenas & putredines narium aufert, tinnitum aurium cum aceto & ruta ex amygdalis amarum commixtum, & auribus iniectum tollit, asthmaticis gargarismo adhibito opitulatur: hæmorrhoides ueteres inunctum, siue colo iniectum educit. Nicolaus.

Oleum anethinum.

℞. Fol. & flor. Anethi contus. §. iij.

Olei ueteris lb. j.

Macera ad solem, uel in loco calido aliquo, diebus quindecim: deinde in duplici

A plici uase coquito: & abiecto anetho, recens iniicito, & iterum quindecim diebus macerato: postea simili modo coquito & exprimito, & tertio recens anethum iniice: macera, coque, & cola. * Sedat dolores, aperit poros, & resoluit uapores & apostemata, tumores & durities: mitigat dolores & rigores febrium, prouocat somnum & sudorem. Innominatus.

Oleum cheyrinum.

Oleum Cheyrinum fit ex leucoijs luteis, hoc est ex Cheyris citrinis, & oleo ueteri claro, ut oleum Anethinum. * Dolores neruorum, aliarumq; partium corporis mitigat, eaque quæ in thorace, renibus, uesica & utero sunt, discutit.

Oleum crocinum.

℞. Croci ʒ. j.
Myrrhæ puræ ʒ. β.
Cardamomi ʒ. ix.
Calami aromatici ʒ. viij.

Infundantur medicinae in aceto diebus quinque, præter cardamomum. Die sexto proijciatur super ea cardamomum. Et dimittatur die una. Deinde fundatur super ea olei lb. j. β. & coquatur igne lento usq; ad aceti consumptionem. Et sunt, qui loco aceti uinum ponunt. * Confert doloribus neruorum, & confortat eos, & lenit duritiem eorum: confert spasma, & dolori matricis: coloremq; efficit bonum. Mesues.

Oleum de castoreo.

℞. Castorei, Styracis calamitæ, Galbani, Euphorbij, Castiæ, Croci, Opopanax, Carpobalsami, Spicæ nardi Indicæ, Costi, Cyperi ana ʒ. ij.
Schœnanthi, Piperis longi, nigri, Sabinæ, Pyrethri ana ʒ. ij. β.
Olei lb. iiij.
Vini lb. ij.

Galbanum & opopanax in uini parte seorsim dissolues: deinde reliqua omnia contusa cum oleo, & reliqua uini parte coques ad uini consumptionem in duplici uase: postea cola, & gummi dissoluta oleo adfundes, & iterum coques in duplici uase, ad consumptionem uini, & sæpius miscens reponet. * Optimum est ad frigidos affectus partium omnium, præsertim neruosarum: medetur paralyfi, spasma, tetano: & sedat acerrimos rigores & frigora febrium, si spina dorsi liniatur. Iacobus de Manlijs.

DE OLEIS EXCALFACIENTIBVS
articulos.*Oleum sulphuris.*

℞. Sulphuris flauis, Terebinthinæ ana ʒ. iiij.

℞ 2 Olei

Olei rosacei ℥.j.

A

Vini boni ℥.iij.

Coquantur igne lento, usq; ad vini consumptionem. * Extenuat & attrahit admodum: hydrargyron corpore demersum foras elicit, statim à balneis illitum: scabiem, lepras, & cutis sceditates sanat: morbo uenereo commodè adhibetur: fistulis, & malignis oris ulceribus, aliarumq; partium uitij primo aut secundo contactu prodest. Brassauolus.

Aliud ad podagram.

℞. Sulphuris uiui ℥.ij.

Vitellorum ouorum n. xxv.

Terantur simul, & ponantur in patella ferrea, & lento igne coquantur: & quando incipit ardere, inclina patellam ferream ad alteram partem, & quod liquidius est, effluet. Euonymus.

Aliud oleum sulphuris.

Accipe lixiuium forte clauellatum, aut etiam ex calce extincta cōfectum, ita ut ouū ei innatet. In hoc lixiuio decoquatur sulphur tandiu, quoad pinguedo in superficie lixiuij apparuerit, & tæces fundum petierint: tum despumando quasi pinguedo auferatur. Euonymus.

Oleum rutaceum.

B

℞. Rutæ recentis, incisæ & contusæ ℥.iij.

Olei ueteris clari ℥.j.

Macera ad solem, aut in loco calido aliquo diebus quindecim, deinde in duplici uase coquito, & abiecta ruta recentem iniicito, & iterum quindecim diebus macerato, postea simili modo coquito, & exprimito, & tertio recentem rutam iniice, macera, coque, & cola. * Est calidum aperitiuum, resolutiuum, & mitigatiuum dolorum: calfacit renes, uescicam, matricem: & sedat dolores eorum, & maximè colicam, si uenter ungatur, & fiat ex eo solo clyster: præterea opitulatur neruis, confert spasmus, & expellit frigidos humores. Innominatus.

Oleum nucum.

Ex nucibus uetustis oleum prælo exprimitur, ut ex amygdalis. * Flatus crassos dissipat, tumores discutit, neruis attritis uel punctis, præsertim cum calce lota confert, scabiem emarginat. Mesues.

Oleum de nuce Indica.

Oleum ex nuce Indica, dolori neruorū confert, thoracem & pulmonē lenit, & inde claram uocem facit, impingat etiam, & sperma auget. Mesues.

Oleum nucis moschatae.

℞. Nucum moschatarum ℥.j.

Contun-

A Contunde crassè, easq; ita contusas illiga arctè panno lineo, eumq; in uase uitreato appende: quod demittatur seu demergatur in ahenum feruentis aquæ, unde percalefiat aroma: deinde prælo subiectum fortiter exprime, nam hoc pacto copiosius emanat oleum. * Extrinsicus lentis aut pisæ instar ori uentriculi inunctum, mirificè ipsum corroborat. Colonenses.

DE OLEIS EXCALFACIENTIBVS
neruos.

Oleum costinum.

℞. Costi ʒ.ij.

Cassæ ʒ.j.

Summitatum Sampsuchi ʒ.viij.

Vini quantum sufficit.

Olei oliuarum lb.iiij.

Trita macerentur biduo: deinde coquantur in duplici uase, ad consumptionem uini. * Calfacit, obstructa aperit, neruosum genus roborat, ut neruos, musculos, tédones, ligaméta, uentriculû: præter hæc, hepar & capillos: canitiem ob id moratur, & corporis colorem ac odorem commendat. Mesues.

Oleum de piperibus.

℞. Piperis longi, nigri, albi ana ʒ.iiij.

B Myrobalanorum Chebulorum, Belliricorû, Emblicorû, Indorû ana ʒ.v.

Radicum Apij, Fœniculi ana ʒ.iiij.β.

Sagapeni, Opopanacis, Hyosciami albi ana ʒ.ij.β.

Turbith ʒ. xij.

Zingiberis ʒ.iiij.

Caulis fol. recentium, Thymi uiridis, Rutæ uiridis ana M.j.

Coquantur secundum artem in aquæ quantitate sufficienti ad tertias. Colaturæ adde olei de Cherua lb.ij. & iterum coque ad consumptionem. * Iuuat morbos neruorum frigidus, ut paralytim, spasmus, spasmus cynicum, tremorem, epilepsiam: ad hæc ischiadem, & cæteras arthritidis differentias, & uteri, coli, renum, uesicæ affectus frigidus, quia calefacit, tenuat, terget: ob id obstructiones aperit, calculum frangit. Mesues.

Oleum de euphorbio.

℞. Euphorbij ʒ.β.

Olei Cheyrini ʒ.v.

Vini odoriferi ʒ.v.

Coque secundum artem, usque ad consumptionem uini. * Iuuat maximè frigidus cerebri & neruorum affectus, cephalalgiam, hemicraniam, lethargum, naribus immisum: articulorum quoq; & hepatis, & splenis dolores, illitum iuuat. Mesues.

Ec 3

Oleum

Oleum lumbricorum.

A

℞. Lumbricorum terrestrium ℥b.β.

Probè lauentur in uino: deinde immittantur in

Olei rosati omphacini ℥b.ij.

Vini ℥.ij.

Coquantur in duplici uase ad uini consumptionem: colatum repone. * Neruos infrigidatos confortat, & utile est doloribus iuncturarum.

Oleum sampsuchinum.

℞. Foliorum Sampsuchi, id est Maioranæ M.iiij.

Serpilli M.ij.

Folior. Myrti M.j.

Abrotani, Sifymbrij, seu Menthæ aquaticæ ana M.β.

Castæ ℥.ij.

Olei omphacini quantum sufficit.

Concidito, & condito omnia, & impone in uitreum uas, & insola diebus octo: postea exprime, & alias species infunde: coque rursus, & tertium idem facito: deinde colatum repone. * Lassitudini utile est, & morbis cerebri & neruorum frigidis prodest: ob id spinæ in balneo inunctum, paralyfin iuuat, & spasmus cynicum, uulgò torturam oris, naribus iniectum: ut auribus immissum, à statu tinnitum dissipat, menses ciet, morsui scorpionis prodest. B

Oleum ligustrinum, siue de alcanna, siue cyrinum.

℞. Florum Ligustri ℥.iiij.

Olei ueteris ℥.x.

Macera, & insola per octo dies. Flores ligustri exemptos bene exprime, atq; alios impone, ut suprâ: atq; ita tertium fac: cola, & serua. * Partes neruosas roborat: capillos à canicie uindicat. Mesues.

DE OLEIS REFRIGERANTIBVS CAPVT.

Oleum de papauere.

℞. Capitū Papaueris, Fol. Papaueris, Flor. Papaueris ana partes æquales.

Olei quantum sufficit.

Insola in uase uitreo per octiduū: deinde cola, & noua rursus immitte: idem tertio facito: postremò colatum repone. * Intèperiem calidam sanat, & inde ortum dolorem: somnum quoq; conciliat. Mesues.

Aliter.

E' semine utriusq; papaueris, tam albi quàm nigri, exprimitur oleum eodem modo quo ex Amygdalis, Balano Myrepsica & Cherua. * Impinguat, asperam arteriam lenit, febrium ardorem mitigat, & insomnium. Mesues.

Oleum mandragoræ.

℞. Olei communis ℥b.ij.

Succi

- A. Succum pomorum Mandragoræ ꝑ. iij.
 Succum Hyoscyami albi ꝑ. ij.
 Succum Papaueris nigri ꝑ. iij.
 Succum Violarum, Cicutæ ana ꝑ. j.
 Opii, Styracis calamitæ ana ꝑ. β.

Succi cum oleo decem diebus ad solem macerentur, deinde coquantur in duplici uase ad succorum consumptionem: cola, & opium cum styrace dissolutum cum pauculo oleo probè misceto, & reponere. * Ad nimios capitis dolores ualet, & phreniticis, malè dormientibus, fronti illitum, & naribus iniectum, uehementer opitulatur: pulsibus brachiorum & plantis pedum illitum, quocumq; modo uigilijs fatigatum, celerrimè obdormiscere facit. Nicolaus.

Oleum mandragoræ, aliter.

- ℞. Olei ꝑ. v.
 Succum malorum Mandragoræ ꝑ. viij.
 Succum capitum Papaueris ꝑ. vj.
 Succum Hyoscyami albi ꝑ. iij.
 Succum Violarum, Cicutæ ana ꝑ. ij.
 Opii, Styracis ana ꝑ. j.

Eodem modo, quo præcedens, conficitur. Nicolaus Alexandrinus.

- B. DE OLEIS REFRIGERANTIBVS COR ROBORANTIBVSq; uentriculum.

Oleum cytoniorum.

Fit ex carnis cytoniorum præmaturorum cum cortice:

- Succi Cytoniorum ana ꝑ. vj.
 Olei oliuarum immaturarum ꝑ. iij.

Omnia in uas uitreum obturatum immittito, & diebus quindecim in solato: deinde horis quatuor coquito in duplici uase. Cola, & exprime: in expressione caro & succus mutetur: rursus in soletur, coquatur, & exprimatur, ut diximus: tertium sic facito: postremò colatum reconde, ne perspiret. * Refrigerat, adstringit: ob id uentrem totum inferiorem, & neruos laxiores cogendo roborat, sudores immodicos sistit. Mesues.

Oleum myrtinum.

- ℞. Foliorum Myrti ꝑ. iij.

Olei Omphacini ꝑ. j.

Macera ad solem, aut in loco aliquo calido diebus octo, deinde in duplici uase coquito, & abiectis folijs, recentia iniicito, & iterum diebus octo macerato, postea simili modo coquito, & exprimito, & tertio recentia myrti folia iniice, macera, coque, & cola. * Cerebrum, neruos, cor, & uentriculum roborat. Actuarius.

Oleum.

Oleum myrtinum, aliter.

A

℞. Succī foliorum Myrti ℥.j.
 Olei communis ℥.ij.
 Coquantur in duplici uase ad succi consumptionem: & adde
 Ladani ℥.j.
 Misce, & repone. * Idem quod præcedens potest. Mesues.

Oleum myrtillorum.

Oleum Myrtillorū fit ex myrtillis, hoc est, baccis ueræ myrti, & oleo Omphacino, eodem modo, quo myrtinum. * Refrigerat & adstringit, ideoque cæliacis affectibus subuenit: sanat igne ambusta: pustulas erumpentes illitu emendat: attritos hyeme concitatos, & intertrigines illitum corrigit: scdis rimas, condylomata, laxatos artus perfanat, & sudores coërcet.

Oleum lentiscinum.

℞. Racemosas lētisci baccas, à putaminibus cunctis expurgatas, quot uoles: permittito aliquot diebus simul flaccescere: deinde magnum in ahenum collocato, affusa aqua: & igni tandiu feruere sinito, donec baccæ dehiscant: demum eas extrahito, & faccis includito, præloq; subijcito, expressumq; oleum asseruato. * Oculorum aciem acuit, caliginesq; delet, cibis cōmixtum. Scabiem iumentorum, canumq; sanat: utilissimum pelsis, acopis, & leprarum medicamentis: sudores cohibet: dysentericos iuuat. Matthiolus.

B

Oleum omphacinum.

Oleum Omphacinum ex immaturis oliuis exprimitur. Præstat recēs, odoratum. * Stomacho utile est: gingiuas contrahit, dentes firmat, si in ore contineatur: sudores cohibet. Dioscorides.

Oleum rosaceum uulgare.

℞. Olei communis ℥.iiij. Rosarum rubrarum purgatarum ℥.xvj.
 Macera, & insola per dies octo. Rosas exemptas bene exprime, atq; alias impone, ut suprâ: atq; ita tertium fac. Cola, & serua. Nonnulli in tertia infusione rosas relinquunt. * Refrigerat & adstringit, inflammationibus præsidio est, æstuantem uentriculum restinguit: erosiones intestinorum clysteribus inditum, & dolores dentium, si eo colluantur, sanat.

Oleum rosatum completum.

℞. Olei ex oleis maturis, aqua fontana multoties loti, quantū uoles: deinde immitte folia rosarum rubrarum apertarum repurgata, quantum satis est, in uitreum uas: obturetur uas, ac per dies septem insola: coque tribus horis in uase duplici. Expressis folijs, & abiectis, noua immitte: insola iterū, coque in balneo, & exprime, ut prius: tertio noua immitte rosarū folia, quib. adde aquę infusionis rosarū (eo modo cōfectę, ut in syrupo rosato dictū est) quartâ partē: misce, insola dies quadraginta, in uase uitreo obturato: post excola, exprime,

A exprime, & addito rosarum succo, iterum diu insola. Alij partem infusionis sumunt & succi rosarum partem alteram, & eo, quo supra dictum est, modo conficiunt. * Roborat, resoluit cominodè, lenit & sedat. Mesues.

Oleum rosatum, aliter.

℞. Rosarum exemptis unguibus ℥. iij.

Olei Omphacini ℥. vj.

Immitte in uas uitreum obturatum, ne expiret: dies quadraginta insolato. Alij non insolant, sed puteo imponunt, suspensum proximè aquam dies quadraginta. * Inflammationes extinguit, roborat, cogit, densat, fluxiones sistit, & materialium per corpus fluxum cohibet. Paulus.

Oleum rosatum omphacinum.

℞. Olei oliuarum immaturarum loti lb. j.

Rosarum rubrarum purgatarum ℥. iij.

Tritis rosis, & oleo impositis, fac ut dictum est, ter rosas permutando. * Eiusdem cum superiori facultatis.

DE OLEIS REFRIGERANTIBVS PECTVS.

Oleum uiolaceum.

Oleum Violaceum paratur uere, ex floribus uiolarum, & oleo Omphacino, quemadmodum Rosaceum, & Rutaceum. * Refrigerat, incandescentibus inflammationum feruoribus utile est.

B *Oleum nenupharis albi.*

℞. Flor. Nymphææ alb. ℥. iij.

Olei Omphacini lb. j.

Macerentur in sole diebus decem: deinde exprime, & novos flores immitte: tertio idè facito. * Vires habet Violati: refrigerat tamen magis quàm Violatum, minus quàm Papauerinum: hypnoticis, & intemperiem partium, ut renum, calidam sanantibus utiliter miscetur, & Veneris tentiginem prohibet, genitali inunctum: somnum etiam conciliat.

Oleum nenupharis citrini.

Hoc oleum fit ex luteis, siue citrinis Nymphææ, hoc est Nenupharis floribus, & oleo Omphacino, ut præcedès. * Ad eadè ferè, ad quæ præcedès ualet.

DE OLEIS REFRIGERANTIBVS HEPAR.

Hepar refrigerant oleum Citoniorum, Myrtinum, Myrtillorum, Lentiscinum, Omphacinum, Rosaceum, &c. de quibus uide supra suo loco.

DE OLEIS REFRIGERANTIBVS VTERVM.

Oleum cucurbitarum.

Oleum hoc ex semine cucurbitæ fit excorticato, quemadmodum oleum Sesaminum. * Phlegmonis, uiscerum, & ab his febribus ardentibus confert: urinæ ardorem ualde mitigat. Mesues.

ff VTE.

410 DE OLEIS CRASSO MODO PARATIS.

UTRUM quoq; refrigerant, oleum Citoniorum, Nymphaeæ, Lentiscium, Myrtillorum, &c. de quibus uide supra suo loco. A

DE OLEIS SICCANTIBVS.

Oleum ricinum, siue de cherua.

Oleum hoc fit ex pingui quodâ femine, quod Arabes Cherua, Græci Crotona, Latini Ricinum uocant. fit autem eodem modo quo oleum Amygdalarum. * Prodest pforis, ulceribus capitis erumpentibus, sedis inflammationibus, uuluis, quæ occlusæ conuersæq; strangulant, cicatricibus fœdis, auriû doloribus: potu aluû ciet, quæ aquis grauatur: lumbricos eiicit. Dioscorides.

SICCANT etiam oleum Nardinum, oleum Nucum, &c. de quibus uide supra suo loco.

DE OLEIS HVMECTANTIBVS.

Oleum oliuarum recens.

Oleum oliuarum ex maturis oliuis exprimitur. * Humectat, & moderatè calefacit. Dioscorides & Galenus.

Oleum amygdalarum dulcium.

Æ Amygdalarum dulcium siccarum, non tamé rancidarum, quantum uoles: contundantur minutissimè: postea in sartagine aliquantulum torrefacias, affuso aquæ rosacæ modico: postea prælo exprime. * Lenit asperitates pectoris, gutturis, & pulmonis, duritiem & siccitatem iuncturarum: est suaue in cibis, & confert hæcticis & phthificis: impinguat, auget sperma, sedatutissim, & ardorem urinæ, uescicæ, & uulua excoriatæ, cum fistula iniectum, B

Oleum sesaminum.

Oleum Sesaminum extrahitur ut Amygdalinum, nisi quòd prius semen excorticandum sic est. Id semen ab excrementis purgatum, aqua parum salsa irrigetur, manibus fricetur: iterum irrigetur, donec madefiat: siccetur, modicè assetur, sacco aspero multum diuq; confricando excorticetur, corticibus expurgetur, molatur in farinâ, oleum exprimatur, ut ex amygdalis. Ex eodem semine non excorticato, sed assato & molito in farinam, oleum quoque extrahitur, ut prius. * Impinguat, semen auget, asperam arteriam lenit, & uocem ob id claram reddit: multorum præterea oleorum aliorum est materia. Mesues.

De oleo melonum & cucumeris.

Hoc oleum ex femine exprimitur, ut Sesaminum, &c. * Refrigerat atque humectat. Mesues.

HVMECTANT quoq; oleum Violaceum, Cucurbitarû, &c. de quibus uide supra suo loco.

DE

A DE OLEIS ASTRINGENTIBVS.

Oleum ananthinum.

Oenanthe è labrusca, optimè oleus postquam emarcuit, deiecta in Omphacinum oleum mouetur, uoluiturq; : & cum biduo manserit, exprimitur, & reconditur. * Astringit, proximum rosaceo effectum præbens: sed aluum non resoluit, aut mollit. Probatissimum est, quod odore Oenanthen reddit. Dioscorides.

ASTRINGUNT quoque oleum Absinthinum, Menthæ, Lentiscinum, Mastichinum, Myrtinum, Myrtillorum, &c. de quibus uide supra suo loco.

DE OLEIS EMOLLIENTIBVS.

Oleum lini.

Oleum lini fit, ut oleum Sefami: sed lini semen non excorticatur. Paratur hodie à candelarijs & olearijs molitoribus, non à pharmacopolis.

* Spasmo, duritiei neruorum & iuncturarum, hæmorrhoidibus, sedis, phlegmonis & rimis confert, ac dolori pulsatorio. Mesues.

Oleum narcissinum.

B Oleum Narcissinum fit primo uere ex recentibus floribus narcissi, ut Rosaceum, uel oleum Menthæ. * Valet ad emolliendas uulvæ duritias, præclusionesq; : sed capitis dolores facit. Dioscorides.

Oleum ex styrace.

℞. Styracis ꝑ. iij.

Olei communis ℥. j.

Vini quantum sufficit.

Coque in duplici uase ad uini consumptionem. * Calfacit: ob id confert dolentibus à frigore renibus, uesicæ, utero, neruis, musculis, tendonibus, iuncturis.

DE OLEIS LAXANTIBVS.

Oleum iasminum.

Oleum Iasminum, quod Arabes uocant Ieseminum, & oleum de Zambach, fit ex floribus Iasminis siue Ieseminis siue Zambachi, & oleo ueteri claro, ut oleum Rosaceum, uel Menthæ. * Opitulatur corporibus, quæ calfactionem laxationemq; desiderant.

LAXANT quoq; oleum Amygdalarum dulcium, Oliuarum, Sefaminū, &c. de quibus uide supra suo loco.

DE OLEIS RAREFACIENTIBVS.

Oleum chamæmelinum.

℞. Florum Chamæmeli, demptis folijs albis ꝑ. iij.

Olei oliuarum ℥. ij. β.

Ff 2 Siccentur

412 DE OLEIS CRASSO MODO PARATIS.

Siccantur flores in umbra horis uiginti quatuor, deinde immitte cum oleo **A** in uas uitreum angusti oris, bene obturatum, & quadraginta dies insolato. * Initio colici, arthritici, & aliorum dolorum, præstantissimum est: parum enim repellit, & modicè digerit. Aperit poros, resoluit uapores, sistit fluentes humores, corrigit malas qualitates, confert neruis, & membris ner uosis. Paulus.

RAREFACIT quoq; oleū Anethinum, &c. de quo uide suprà suo loco.

DE OLEIS DIGERENTIBVS.

Digerunt oleum Amygdalarum amararum, Nucam, Oliuarū antiquum, Rutaceum, &c. de quibus uide suprà suo loco.

DE OLEIS DETERGENTIBVS.

Oleum de mirrha.

℞. Oua per decoctionem indurata n. x. & scindantur per medium, & uitel lum extrahe: & eius loco impone myrrham, quantum est medietas uitelli, aut minus. Tum rursus duas partes oui coniunge, & pone in uase uitreato, & reconde in cella uinaria, & ibidem permitte per dies quindecim, aut plus: & exhibit liquor, quem serua in uase uitreo, pro inunctione. * Virtutes habet Balsami: nam conseruat & tuetur à putrefactione omnia ea, quæ ei imponun **B** tur. similiter faciei inunctum, pulcherrimam conseruat, & faciem iuuenilem conciliat, uulnera citissimè consolidat, &c. Euaonymus.

Oleum tartari.

℞. Tartari puri ℥. iij. Pone in ollam, & ure in fornace cum lateribus aut tegulis, aut fistilibus, uel perse, donec omnino excandescat tartarum. Postea impone in sacculum laneo panno factum, & suspende in cellario: tum destillabit ex eo clarus quidam liquor, quem reponc. * Valet ad faciem detergendam, & erugandam.

Oleum frumenti.

Frumento inter laminas ferreas modicè candentes presso, oleum excipitur: uel triticum cortice detractum, in uase duplici destillatur. * Cutem impetigine & asperitate infectam sanat. Mesues.

Oleum ouorum.

℞. Oua recentia n. c. Coquito, donec penitus indurentur. Postea uitellos eorum exime, & cominutos assa in sartagine, donec ruffescant, & pinguedinem quandam remittant: deinde ossam feruentem inde in sacculum pilis contextum, & exprime, quodq; expressum fuerit oleum, reponc. * Experientia plurima probatum est, cutim expurgare, impetiginem, serpiginem, & alia cutis uitia per sanare, capillos regnere, & ulcera maligna & fistulosa curare.

Oleum

A

Oleum sambucinum.

℞: Olei ueteris lb. j.
 Florum sambuci ꝑ. iiii.
 Fit ut oleum Rosatum, ter flores innouando. * Lenit, abstergit, & mūdificat cutim, medetur icteritiæ, & maximè hepati infirmo, obstructo: & plurimum confert doloribus iuncturarum.

Oleum raphaninum.

Oleum Raphaninū, è raphani semine fieri solet, cæterorū more. * Phthiriales mala ualetudine contractas tollit: scabritias cutis in facie emendat. Dioscorides.

DETERGVNT quoq; oleum Balauium, siue oleum de Been, Ricinū, &c. de quibus uide supra suo loco.

DE OLEIS GLVTINANTIBVS.

Oleum balsaminae.

Fructus Balsaminae, exempto semine, insolantur diu in oleo Omphacino, aut macerantur eodem oleo in balneo calentis aquæ, aut equino calente fimo: fitq; inde oleum. * Oleum hoc est præstantissimum ad arcendas uulnerum, mamillarumq; inflammationes, doloresq; mulcendos. Valet idem ad exulceratos, inflammatosq; uteros siphone iniectum. Dolorib. hæmorrhoidum mirè auxiliatur: in quem usum macerantur fructus, oleo amygdalino dulci, aut è semine lini expresso, addita ad unam quamq; olei libram, liquidæ uernicis uncia. Medetur hoc ambustis tam igne, quàm aqua. Punctis, fauciatq; neruis utiliter illinitur: quin & uulnerum cicatrices tum attenuat, tum etiam prorsus delet. Matthiolus.

GLVTINAT etiam oleum Myrrhæ: de quo uide supra suo loco.

DE OLEIS SOMNV M INDVCENTIB.

Oleum malorum aureorum.

℞: Mala aurea, quæ Italis *Pomi d'oro* uocantur, quantum uoles: macera, & insola in oleo Omphacino per dies quadraginta. * Somnū inducit, dolores omnes mitigat apprimè, modicè refrigerat, & digerit: ulcera antiqua, scabiè & impetiginem persanat. Zuinggerus.

Oleum hyosciami.

Hoc oleum exprimitur ex Hyosciami semine, eodè modo, quo ex papauere. * Febrium ardores mitigat, & insomnium.

SOMNV M etiam INDVCENT, oleum Mandragoræ, de Papauere, Nenupharis: de quibus uide supra suo loco.

DE OLEIS FRANGENTIBVS CALCVLVM.

Oleum scorpionum simplex.

℞: Scorpiones n. xxx.

Ff 3 Olei

Olei Amygdal. amararum lb. ij.

Macerentur in uase uitreo stricti orificij, probè obstructo, & insolentur per dies xxx. caniculares, uel aliàs tota æstate calidissimis diebus: postea colatù ad usus reponè. * Lapidem renum & uesicæ frangit & expellit, lumbis, publi, perinæo illitum, aut per meatum urinarium iniectum. Mesues.

Oleum scorpionum compositum.

℞. Aristolochiæ rotundæ, Gentianæ, Cyperi, Cort. rad. Capparis ana ℥. j.

Olei Amygdal. amar lb. j. β.

Macerentur in oleo cōtusa radices ad solem feruidum diebus uiginti, in uase uitreo probè obturato: deinde coquantur aliquantulum in duplici uase, iniectis ad ultimum scorpionibus uiuis n. xx. Iterum serenis diebus xxx. insolentur: postremò excolatum oleum reponatur. * Hoc efficacius est priore: præterea mirandarum est uiriù contra uenena omnia & pestilentia. Mesues.

DE OLEIS IUVANTIBVS COITVM.

Oleum formicarum.

℞. Formicarum alatarum quantum uoles.

Olei quantum sufficit.

Macerentur æstate ad solem diebus xl. postea excolatum oleù reponè. * Vallet ad confortandum coitum. Nicolaus.

DE OLEIS SEDANTIBVS DOLOREM.

Oleum laurinum.

Oleum Laurinum apud nos non facile fieri potest: quoniam uerò in magna copia affertur ex Italia & aliunde, ideo facile emitur à materialistis. * Calidum est, & aperitiuum: mitigat colicam, & frigidos dolores uentris, stomachi, capitis, hepatis, splenis, renum, matricis, neruorum, iuncturarum: deniq; omnibus ægritudinibus frigidis confert.

Oleum hyperici.

℞. Summitatum Hyperici ℥. iij.

Macerentur in uino odorifero diebus tribus & noctibus: bulliant deinde in uase duplici, obturato orificio uasis: postea exprime, & recetis hyperici summitatum bene tritarum par pondus inijce, & macera dies tres ac noctes. Postea adde

Terebinthinæ ℥. iij.

Olei ueteris ℥. vj.

Crocij ℥. j.

Coquantur in duplici uase usque ad uini consumptionem: cola, & reponè. * Calidum est, & siccum, & tenuium partium: uulnera incisorum neruorum consolidat, & combustionem ignis: sedat dolores femoris & uesicæ, & prouocat urinam.

Oleum

A. *Oleum hyperici magistrale.*

℞. Olei ueteris ℔.iiij.

Vini albi potentis ℔.j.

Florum Hyperici cum semine recentium M.iiij.

Tere, & macera in uase nitreo, obturato eius orificio, duos dies: coque in duplici uase, & forti ter exprime: in colaturam iniice alios flores, ut dictum est, & tertio idem facito: deinde colato, & ad singulas colaturæ libras adde

Terebinthinae ℥.vj.

Olei Absinthij ℥.iiij.

Dictamni, Gentianæ, Cardui benedicti, Tormentillæ, Carlinæ, Calami aromatici ana ℥.ij.

Lumbricorum in uino pluries lotorum ℥.ij.

Terantur omnia, & insolentur, triginta aut quadraginta diebus: & bene obturatum reponas. * Ad eadem utile: superiori tamen efficacius est. Medici Florentini.

Oleum moschellinum.

℞. Olei puri ℔.viij.

Aquæ ℔.iiij.

B. Folij, Nardi Indicæ, Costi, Masticis ana ℥.iiij.

Styracis calamitæ, Croci, Myrrhæ, Cinnamomi, Cassiæ ana ℥.j. β.

Carpobalsami, Caryophyllorum, Bdellij ana ℥.j.

Moschi ℥.vj.

Nuces moschatas n.iiij.

Folium, myrrhâ, cassiam, carpobalsamum, & bdellium tere, & per biduum in aqua & oleo macera: postea coque supra lentum ignem in duplici uase, usque ad consumptionem aquæ: deinde cola, & reliqua in tenuissimum puluerem redacta insperge, præter moschum: iterum macera, & coque parumper: ultimo moschum addito: probe omnia misceto & repones, & interdum uas agitato. * Est optimum ad omnem frigiditatem corporis, potissimum uentriculi, & ad dolorem lateris foris inunctum. stranguria & colico uexatis, & ad omne neruorum uitium illitum optime facit. miscetur epithematibus, & emplastris, quæ ad stomachi & renum affectiones affiscuntur. Nicolaus Alexandrinus.

Oleum populinum.

℞. Olei ℔.viij. ℥.ij.

Vini ℔.iiij.

Gemmarum populi arboris recentium ℔.iiij.

Gemmarum populi diutissime terantur, & macerentur in uino & oleo diebus septem: post coquantur in duplici uase usque ad consumptionem uini: deinde exprimitur oleum, & reponatur. * Expediit ad capitis dolorem, arthriticis, nephriticis, &

416 DE OLEIS CRASSO MODO PARATIS.

cis, & podagricis, & ubicunq; dolor fit. Nicolaus.

Oleum vulpinum.

℞. Vulpem integram, exemptis interaneis.
Aquæ fontanæ, marinæ ana quantum sufficit.
Olei ueteris clari ℥. iiij.
Salis ℥. iiij.

Coquantur, & inter coquendum adde
Anethi, Thymi ana ℥. j.

Coquantur autē, donec ab ofsibus recedat caro, & aqua cōsumatur: deinde excoletur oleum, & reponatur. * Ad podagras, reliquasq; arthritidis species, ac dorsi, renumq; dolorem est efficacissimum. Mesues.

Oleum ex semine ebuli.

Semen suis folliculis & sordibus probè repurgatum, in mortario pastè instar contunditur, deinde in caldarium iustè magnitudinis ponitur, tantumq; aquæ fluuiialis superfunditur, quantum ad facilem ebullitionem satis fuerit. Postea igne luculento coquitur tandiu, donec super aquam bona quantitas spumæ apparuerit: quæ cochleari colligitur, & uasi uitreo oblongo, quales sunt calices uitrei, basin angustā habentes, inditur, relinquiturq; in loco tepido per triduum aut quatrimum, dum resideat, & oleum à spuma paulatim separetur. Quòd si intra dies tres aut quatuor non fiat, signum est, semen nō satis coctum fuisse. Tunc itaque rursus in uas conueniens ponetur, & aqua fluuiialis affundetur, ac denuò per quartam horæ partem mediocriter ebullire sinetur: atque sic percocta, rursus ab aqua cochleari remoueri reponique debet, ut dictum est. donec oleum à spuma separatum ad fundum uasis subsideat uiride, pellucidum, & pingue. Notandum uerò est, semen colligendum esse permaturum, & intra annum postquam collectam illud est, oleum parere conuenit. Nam uetustate plurimum uirium amittit. * Præstantissimum balsamum est, ad dolores arthriticos. Incertus.

DE OLEIS PURGANTIBVS.

Oleum cnicinum.

Cnicinum oleum fit ex semine carthami purgato, & tuso. * Aqua intercute laborantibus, uiscerum obstructionibus, uentriculi & coli cruciatibus flatuositate genitis, efficax est. Suspiriosis mirificè prodest, & uocem clarificat. Epotum pituitam tum uomitionib. elicit, tum per inferna ducit. Mesues.

Oleum thymele.

℞. Fol. Thymeleę, Succi Thymeleę ana ℥. iiij.
Vini albi ℥. iiij.

Amygdalarum amararum ℥. j.

Macerentur per horas uiginti quatuor: deinde coquantur usq; ad cōsumptionem ui-

A nem uini & succi: colatum reponatur. * Hydropi confert, ac ulceribus malignis: cutis fœditate in terget: sudores elicit: urinam retentam prouocat. Rondeletius.

Mesues loco uini aquam, & loco olei amygdal. amararum, ponit oleum Sefaminum, & lac, &c.

DE OLEIS HERBARVM ET FLORVM.

HERBÆ uel flores earum inciduntur, contundunturq;: deinde induntur uitro, miscenturq;: postea si sicca ualde sunt, aqua fontana perfunduntur: sin humidæ & aquosæ fuerint, per se uase occluso, in sole, alioue loco calido macerantur, quoad in superficie oleum appareat, quod in uerso uitro, & cera perforata relictis fœcibus seiungitur. Hoc deinde cum aqua effluente simul, ampullæ imponitur, & ex feruelcente euocatur rursus. Aliàs herbæ & flores ita macerati ex balneo pariter destillantur: postea oleum separatur. * Eadem, quas herbæ unde fiunt, uires obtinent, sed multò efficaciores. Ander.

Oleum spicæ.

Oleum Spicæ ex maiori Lauendula fit, quæ Spica uocatur, in uino prius macerata, deinde per alembicum destillata. * Renibus inunctum gonorrhœam sanat: lumbricos expellit, guttæ duæ ex uino sumptæ. In summa, facultatibus præditum est. Euonymus.

B DE OLEIS EX FRUCTIBVS.

Oleum è baccis iuniperi.

℞. Baccarum Iuniperi modium plenum: contundatur minutissimè: ijsq; affundatur aqua pura, ea quantitate, ut optimè cooperiantur: postea in uesica cuprea, ut uinum sublimatum per aquam frigidam destillantur: postremò oleū ab aqua separetur, serueturq;. * Valet ad multa: ad tormina, ad gonorrhœam, ad coli dolores ex catarrho. Hoc oleum balsamo comparatur. guttarum trium aut quatuor instar assumptum, resolutionem neruorum, morbū attonitū, & alios cerebri affectus præcauet: corpus ab omni ueneno & pestilenti ære tuetur: stomachum debilitatum ex frigore restituit: uomitiones cohibet: uiscerum abscessibus medetur: renes purgat: calculos frangit: urinam promouet: colicos & uterinos dolores compescit: difficultati intestinorum, sanguinisq; reiectioni, & pectoris, pulmonumq; uitijs conducit: morbo arquato, & aquæ inter cutem prodest: uermes necat. In summa, omnibus membris læsis, ui sua penetrandi medetur, foris inunctum: conuulsis, tremore & conuulsione infestatis subuenit: scabiem, ulcera inueterata, malignaq;, nec non condylomata curat: dolores lumborum, coxarum, podagræ & colicæ, umbilico illitum, sedat: fissuras manuum sanat. Euonymus & Anderna.

Oleum è baccis lauri.

Oleum è baccis lauri, eodem modo quo oleum ex baccis iuniperi, destillatur.

Gg

latur. * Valet contra colicam & iliacam, & sciaticam passionem. A

Oleum è baccis hederæ.

Oleum è baccis hederæ, eodem modo quo oleum è baccis iuniperi, destillatur. Vel etiam per descensum sic:

℞. Ligna sicca hederæ, Granorum hederæ, Gummi hederæ ana q. f. Frustatim decisa, ponantur in uas terreum perforatum in fundo, duobus uel tribus locis, & tunc supponatur alia olla, & ponatur in terra, & ligetur fundus superioris cum orificio inferioris: bene sigillabis cum argilla, uel pasta: & ita disponantur, ut olla superior tota sit super terram, cooperto orificio: & fiat ignis circumquaq; & destillabit oleum nigrum in uas inferius. * Frigidis articulorum morbis singulariter prodest: menstrua prouocat, calculos expellit, & ulcera expurgat, sanatq;. Rogerius.

Oleum è nucleis pineis.

Oleum è nucleis pineis per descensum, ut oleum è baccis hederæ destillatur. * Valet ad erugandam mulierum cutem. Manardus.

Oleum è cepa.

Accipiatur cepa alba in medio euacua: cuius uacuitas theriaca impleatur, & foramine obturato, circumdata panno lineo madente, per horæ dimidium cineribus calidis obruta, alembico destilletur, & liquoris stillatitij detur patienti ʒ. ij. * Sudorem euocat in peste. Fumanellus. B

Oleum è nucibus cupressi.

Nuces primùm in puluerem rediguntur: deinde ex aqua betonica, uel aqua uitis distillantur: postea oleum, quod inde manauit, in balneo Mariæ corripitur, & ab aqua separatur. * Hoc ceruici, uel capitis uertici inungitur ad catarrhos retinendos, quos spinam uersus singulari quadâ ui retrahit. quare etiam antius oculis applicari non debet, ut quod illos, attrahendis humoribus, offendat. Andernacus.

DE OLEIS EX SEMINIBVS.

Oleum anisi.

℞. Anisi ʒ. j. uel ʒ.

Aquæ fontanæ ʒ. x. uel xx.

Contundatur anisum minutissimè, & maceretur in aqua per horas aliquot: deinde in uesica creta primò igne lèto, deinde fortiori destilletur per aquam frigidam: postremò oleum ab aqua separetur. * Ad uertiginem, angustiam pectoris, capitis defluxu natam, præfocationem, uomitionem, cruditatè stomachi ex flatibus, aquam inter cutem, aliosq; affectus, qui ex frigore & uentis proueniunt: præcipuè omnibus membris exanguibus & neruosis opitulatur, ut stomacho, intestinis, uesicæ, utero: cuius fluorem album exiccat, & omnes in totum actiones, quæ de aniso dicuntur, obit: oris, halitusq; fetorè emendat.

A emendat. Vfus eius est, si aliquot guttarum instar ex uino, uel iuscūlo manè assumatur, uel quando necessitas postulârit: quinetiam tabellis ad pectoris uitia rectè additur. Andernacus ex Euonymo.

Oleum fœniculi.

℞ Fœniculi contusi ℥.ij.

Aquæ fontanæ ℥.xx.

Misce, macera, & in uesica, balneo aereo sicco destilla per aquam frigidam: deinde oleum ab aqua separatim reponc. Fit etiam à quibusdam hoc oleum ex semine sicco extractum, sine ulla alia additione, perquam odoratū & suauē: colore autē est album, quod primò destillat. * Capiti conducit, præcipuè autē oculis, renibus, uesicæ: pectoris angustia, & difficultati spirandi succurrit: stomachum iuuat: flatus dissipat: calculos arenosos cōminuit: urinam & menstrua promouet. Fieri ex eo tabellæ possunt, ad eosdem usus, aut per se quocunque tempore, manè & uesperi aliquot guttæ sumi possunt. Euonym.

Oleum cumini.

Cumini oleum eodem modo, quo anisi oleum conficitur. * Vtile est uulneribus ad lienem pertinentibus, inflationibus corporis ex frigiditate, quæ aliquando causa existit, cur urina retineatur: tussi medetur: anhelationi conducit: colicis doloribus subuenit: urinæ stillicidium impedit. Ad hunc usum

B gutta una aut altera, in aqua filicis sumi potest, aut etiam in tabellis. Euony.

Oleum petroselinii.

℞ Sem. Petroselini ℥.ij.

Aquæ fontanæ ℥.xx.

Semina contunde, macera, atque in uesica, balneo aereo sicco, uel arena destilla. * Obstructiones aperit: menstrua & urinam mouet.

Oleum ex granis ebuli.

Oleum ex granis ebuli quomodo fiat, uide suprâ. * Podagricos dolores mirum in modum lenit, curatq̃.

DE OLEIS EX LIGNIS.

Oleum guaiaci.

℞ Ligni guaiaci quantum sufficit.

Incide in frusta, & imple ollam, uel dolium magnum uitreatum intus, cuius orificium sit arctum: & fac foueam in terra, & præpara parietes eius cum terra figuli: deinde pone ollam uitreatam in fundo ex directo foueæ, habentem orificium magnum, & cooperiatur lamina ferrea subtiliter perforata: deinde præpara ista duo uasa cum terra figuli, ne ex utriusque orificijs respiret: deinde cooperi terra, & adde ignem per tres horas, uel amplius: finaliter resudabit oleum de ligno guaiaco. * Ad ulcera & dolores ex morbo Gallico ortos ualet. Euonymus.

Oleum ex lignis iuniperi.

Oleum è lignis Iuniperi eodem modo fit, quo oleum è lignis Guaiaci. * Frigiditatis causas remouet uel reprimat, & typum quartanę. Sed magis singularare & speciale, facta in unctioe ab umbilico usq; ad muliebria, est. renes & matricem confortare, & eius humiditatem exiccare, & ad conceptionem præparare. Rogerius.

Oleum è lignis fraxini.

Oleum è lignis Fraxini eodem modo fit, quo oleum è ligno Guaiaco. * Vfus eius est in arthetica frigida: excoriationes cicatrizat, morpheã albã propriè soluit, & ipsam denigrat. Curat præterea paralyticos: lenicis cõfert, nõ solum in unctum, sed etiam ebibitum. Rogerius & Manardus.

Oleum è lignis hederæ.

Oleum è lignis Hederæ quõ fiat, dictum est supra, ubi docuimus oleum extrahere è baccis hederæ. * Contra artheticam frigidam ualet. Rogerius.

DE OLEIS EX CORTICIBVS.

Oleum cinnamomi.

℞. Cinnamomi electi quantum sufficit. Contunde crasse: macera in aqua rosacea, uel citoniorum, uel uino albo, per horas uiginti quatuor: deinde in uapore aquæ calentis, uel in balneo, uel in uesica per aquam frigidam distilla. * Oleum cinnamomi, in uniuersum balsamo naturali respondet, intus putrefactionem arcet, extrinsecus omnia recentia uulnera siue ulcera consolidat. Huius guttæ singulæ uel duæ, per se ori inditæ in animi parturientis deliquijs presentissimè sunt remedium, sicut etiam in accelerando partu, & senio debilibus resciciendis. Stomachi concoctionem iuuat, bonumq; succum generat. * Ceterum è cinnamomo parum olei distillatione extrahitur. quare eius loco, ut plurimum utimur aqua eiusdè, quæ primo loco extillauerit. Euony.

Oleum cinnamomi, aliter.

℞. Vini maluatici optimi mens. iij. & bis distillato. Postea rursus tertia uice distillato, ut tamen una tantum mensura in cucurbita relinquatur. Rursus distilletur alia uice, ut in cucurbita minus remaneat. Tum rursus alia uice distilletur, ut mensura una tantum supersit: sicq; habebis uinum optimè rectificatum, quod seruandū. Quo facto, accipias de cinnamomo quantum uidebitur: concidas minutim, & in cucurbitam ponas unã cum uino rectificato, ut excedat cinnamomum duobus digitis. Cucurbita cæco alembico diligenter claudatur, & in balneo Mariæ tribus diebus, lento igne ponatur. Peracto hoc termino, effunde uinum, cauendo ne quid facum unã effluat: & uinum seorsim serua. Tum aliud uinum rectificatum affundito, & ut prius pergit. His peractis, utramque aquam uitæ, in cucurbita commisce, & cum capitello claudatur diligenter, & in balneo lentissimè distillatio inchoetur, ut ad

A ut ad nouem tactus, guttæ distillent: idq; cōtinuabis, quoad uinum ascenderit: tum in fundo alembici habebis oleum, quod serua. Euonymus ex schedis manu scriptis.

Oleum ex corticibus mali aurantij.

Cortices malorum aurantium prius ex humore aliquo macerantur: deinde uitreis organis, uel in uesica per aquam frigidam distillantur, ut oleum cinnamomi: deinum oleum aqua separetur, conserueturq;. * Est albicās & odoratum ualde Euonymus.

Oleum ex corticibus nucum.

R. Cortices nucum aridas: contunde in mortario, pone in retortam bene perlutata, illam impone igni non nimium magno, & extrahes oleum & aquam è corticibus. Deinde separabis oleum ab aqua per balneū Mariæ. Postremò ter aut quater purgabis oleum, in arena distillando in uitro paruo. * Hoc ferè melius est oleo uitrioli, maximè in peste & ueneno. Euonymus.

DE OLEIS EX AROMATIBVS.

Oleum caryophyllorum.

B Oleum Caryophyllorum paratur, ut oleum de baccis Iuniperi. Multò citius & facilius oleum habebitur, si cum aquis distillatio fiat, ut pluuiali, uel lacustri, aut alijs mollioribus. * Calidū est & siccū, tertio gradu: confert stomacho, hepati, cordi, diarrhœæ à causa frigida, & stomachi morbis omnib. frigidis. Spiritus melancholicos dissipant, & clarificant crassos illi. Omnes uirtutes habet balsami. Extrinsecus uulnera recentia sanat: uulnerum sanguinem fluentem & aquam sistit. Intrinsecus partes naturales confortat, sanguinem melancholicum purgat, confortat cor & caput: præsertim conuenit uertigini, & debilitati uisus, si manè tres uel quatuor guttæ à ieiunis in cochleari cum offa aut uino sumantur: item colicæ & uteri passionibus, eodem modo sumptum. Tabellæ ex eo paratæ, maneq; & serò comestæ, capiti conferunt robur, & catarrhos sistunt. Euonymus.

Oleum macis.

R. Macis quantum sufficit. Contunde, macera in aqua fontana quanta sufficit: deinde in cucurbita uitrea uel uesica ærea per aquam frigidam (ut uinum sublimatum) destilla: & ita cum aqua ascendet oleum, quod postea separabis. * Calidæ est facultatis: ideoq; commodus eius usus est in colica à causa frigida, & à catarrho à capite descendente: confortat cor, uentriculū, & matricem. In tremoribus cordis ex timore, aut ex uesicæ obstructione, aut matrice maximum auxilium præstat: ualet in stranguria, & quicunq; à frigiditate ortum habuerint, morbis. Possunt eius tres uel quatuor guttæ per os sumi, in cochleari ferreo cum offa, aut in primo haustu uini. Euonymus.

Gg 3 *Oleum*

Oleum nucis moschatae.

Oleum nucis moschatae eodem modo fit, ut oleum macis. * Ventriculū frigidū calefaciendo roborat, superfluosq; eius humores cōsumit, & inflationē tumorēq; prohibet: status discutit: colicos dolores sedat: oris halitū cōmendat: uesciq; affectib. succurrit, triū aut quatuor guttarū instar ex primo cochleari iusculi, aut uino Cretico assumptum. Andernacus.

Oleum nucis moschatae, aliter.

℞. Tertiā uel quartā partē aquę uitę distillatę, & nuces moschatas minutim conscinde: imponantur bocię omnia, ita ut per tres digitos aquę uitę, nucis moschatae partes cooperiantur: relinquatur in infusioe horis uiginti quatuor, & aqua uitę colorē flauū acquirat, quā in aliud uitrū effunde: tūc aliam aquā uitę de nouo affunde, ut prius, idq; repetito toties, quoad colorē nō inficiat aquā uitę. Quo facto, aquā uitę sic coloratā omnē, in bociā, in balneo Marię secundū artē distilla, ut ascēdat aqua uitę, & oleū nucis moschatae remaneat in priore bociā in fundo: & sic habebis oleū nucis moschatae paratū. Eodem penitus modo, potest ex omnibus aromatibus oleum distillari. Euoonymus ex quodam incerto.

Oleum nucis moschatae, aliter.

℞. Nuces muscatas quot uoles, pulueriza, & affunde duas mēsuras aquę simplicis: pone in cucurbita uitrea, luto sapientię optimē perlutata, ut solēt ij cucurbitas perlutare, qui aquā fortē parant: postea capitello imposito, eodē luto perluta, similiter & recipientē (tātūm in iunctura) ne spiritus euanescat. Tum ita ad ignē pone, & primō fac ignē lentū, secūdō maiore, tertio fortē, eo modo, quo solēt aquā fortē distillare: & habebis oleum optimū, supernatās aquę in recipiēte, quod collige: & est magnę uirtutis. Euonymus.

Oleum maceris.

℞. Maceris quantū uidebitur, pilsetur grosso modo, & maceretur in aqua rosacea tādiu, quoad facultates maceris penitus aqua extraxerit. Tū accipe amygdalas decorticatas cultro: incide leniter, easq; in prædictā aquā impone, ut odorē & saporē maceris imbibāt, tū exiccentur seorsim: quibus exiccatis rursus in eandē aquā ponātur, denuoq; exiccētur: idq; est quater reiterandum. Tum demū oleū exprimendū: quod ubi expressum fuerit, in sole rectificetur. Et hoc quoq; modo multa alia olea non incōmodē fieri possunt, ut ex moscho, ambra, belzoino, storace, cinnamomo, caryophyllis. Euonymus ex libro manuscripto.

Oleum piperis.

Oleū Piperis eodem modo fit quo oleū Macis, & Caryophyllerū. * Omnibus facultatibus, quibus & ipsum piper, præditū est: nisi quod ignea illa uis, quā linguę imprimit piper, in oleo eiusmodi nō sentitur. Est enim oleū piperis nihil aliud, quā elementū aereum, separatū à reliquis elementis, quem admodum

A admodum etiã in oleo uitrioli & sulphuris distillato, idẽ probauimus. Eodẽ planẽ modo oleum piperinũ, à suo igne est separatũ, & maioribus facultatibus ipso pipere conitat: penetrandi facultatẽ habet eximiã. In colicis, & partibus multa tenaci pituita & lenta repletis, dantur duæ uel tres eius guttẽ cũ iusculo, ad incidendã eã, & dissipandã. Exhibui (inquit quidã) in tertiana febre, post purgationẽ, & uenæ sectionẽ, dando huius olei guttas tres cũ scrupulo uno minã, duabus horis ante paroxysmũ, frigus & tremorẽ, ipsamq; etiã febrẽ prohibuit inuadere, si nõ prima uice, at saltẽ secunda. Euonymus.

DE OLEIS EX RESINIS ET GUMMIS.

Oleum mastichis.

Mastiche primũ in uino coquitur: deinde reponitur, maceraturq; ex eodẽ per dies aliquot: postea ampullã erectã, luto diligenter õblitã inditur, oleumq; & aqua per operculũ ex nudo igne proliciuntur. Hæc denuõ cucurbitã uitreã imponuntur, & in balneo maris distillãtur, dum aqua ab oleo seiangatur: hoc deinde per cineres calidos à crassiore materia separatur, idẽq; effluit tenue, flauũ & subtile: tandẽ quod crassius existit, à facibus suis in arena euocatur, & in solis calore corrigitur. * Nobile est oleum propter uim penetrandi, qua omnia mẽbra reficit: stomachũ corroborat, eiusq; cõcoctio
B nõ iuuat: uiscerũ inflãmationibus cõuenit: abscessus lenit: dolores sedat: oẽs deniq; nervos confirmat. Andernacus.

Oleum mastichis, aliter.

Oleum è mastiche fit per descẽsum, in retorta, ita ut ignis suprã infraq; sit, & habebis oleũ mastichis, quod postea rectificetur. Augustã Vindelicorum quidã distillat, accipiendõ masticen integrã & solã in retorta lutata, usq; ad partẽ eminentẽ extra fornacẽ, quẽ quatuor uentilia habet, & superius tegatur, lento igne distilletur. * Balsamũ est mirificum ad uulnera. Euonymus.

Oleum thuris.

℞. Thuris in puluerem redacti ℥. ß.
Ampullã orificio magno præditã indatur: deinde uitrum calicis modo formatum, quali in potu quotidiano uti consueuimus, imponatur, ut in medio ampullã consistat, idẽq; aqua calida impleatur: postea operculum in uertice perforatũ applicetur: cuius foramini infundibulum coaptetur, & oleũ commissuris õblitis euocetur. Inter distillandum uerõ aqua calida per illud in uitrum, quod dixi, guttatim stilletur: ita tamen, ne hoc repleto, illa effluat. atq; sic cum aquẽ uapore oleum simul ascẽdit suauissimum, & odoriferum, odore thuris, quod alioquin sine hoc uapore pessimẽ olet. Andernacus. ex Euonymo.

Oleum myrrhæ.

℞. Mirrhæ electæ, & non adulteratæ ʒ. vj.

Aquæ

Aquæ vitæ sine phlegmate ꝑ. xij.
 Hæc duo in bociâ uitrea coniunge, quæ in fimo equino calido, dieb. sex quiescat. Postea distilla in balneo, usquequò aqua tota ascenderit, tum in fundo bociæ uidebis oleum myrrhæ: quod per pannum lineum est colandû, sicq; seruandum. * Virtutes habet balsami: nã conseruat & tuetur à putrefactiõne omnia ea, quæ ei imponuntur. similiter faciei inunctum, pulcherrimã conseruat, & faciem iuuenilem cõciliat: uulnera citissimè consolidat, & omnes alios morbos internos curat, exhibendo per os ꝑ. ij. ad aurium surditatè, & c. Ad faciei splendorè & colorè conseruandû sic est procedendû. Fiat decoctû urticæ in aqua cõmuni, & dum ebullit, uapor in faciem recipiatur, ut sudet: postea exiccetur optimè: & postea statim unge faciem oleo myrrhæ. Et hic modus est seruandus in inûgèdis manibus, pectore, & alijs partib. Fiorauãtus.

Oleum succini.

Succinum modicè conteritur, & ampullæ incuruatæ (retortam uocant) luto probè obductæ imponitur, silicibus paruulis interim commixtis: hæc deinde in fornace locatur deorsum uergens, & oleum igne mediocri extracto elicitur. hoc postea aceto calido perfunditur, & ex cineribus calidis, uel arena per retortulam rursus euocatur. Alij panis cibarij crustam uesicæ primûm indunt: deinde succino iniecto acetû affundunt: postea ex igne distillant, & à facibus seiungunt. Alij succinû in puluerè redactû ex uino stillatio macerât in cineribus calidis, mox extillât: tum rursus fundunt: idq; tandiu repetunt, donec in fundo oleum appareat. Alij, licet nunc per descensum, nunc his, nũc alijs instrumētis eliciant: tu tamè si diligentè ignis curã habueris, iuxta illû què antea recitauimus modû, oleû odore, sapore, & colore præstantissimum parare potueris, quod ipsum succinum longè uiribus superat. * Capitis affectibus, neruorû resolutioni, morbo attonito, & comitiali occurrit, guttæ unius instar manè ex aqua betonica, lauendulæ, uel tilie porui sumptû: ab omni ueneno, & aere pestilenti præseruat, naribus inunctû, uel medicamentis in id idoneis cõmixtum. singulare est remediû in renû & uesicæ morbis discutiendis, calculis educèdis, urinarijsq; meatib. referãdis, ex uino maluatico, aqua petroselinî, uel simili humore exhibitû: colico morbo medetur: uteri strãgulatui prodest, naturalibus illitû: sætum euocat, partûq; facilè reddit, si gutta eius ex aqua uerbenæ parturiētî propinetur: oēs corporis facultates imbecilles reficit, roboratq;: humores cõsumit, & cerebrû confirmat, aperitq;: unde oleû hoc, medicinis ad capitis defluxiones feliciter, sicut & alijs corporis partibus inscriptis, miscetur. Andernacus.

Oleum caphuræ.

Caphura in aqua ualida dissoluitur, & oleû quod supernatat, seiungitur: hoc uitro imponitur, uinoq; stillatio perfusum in balneo digeritur: tandem igne distillatur. Alij oua ad duritiè usq; percoquunt, & uitellis exemptis, caphuram

A phuram non adulteratam includunt, reconduntq;, & in cella uinaria suspendunt filo, ut oleum in uas subiectum defluat. * Datur ex humore idoneo ad febres ardentes, continuas, pestilentesq;, & laterum inflammationes: extrinsecus expurgandis curandisq; ulceribus malignis cum oleo caryophyllorū, aut baccarum iuniperi utiliter adhibetur. Andernacus.

Oleum belzoinum.

℞. Aquæ uitæ, Belzoini pulverizati ana partes æquales. Ponantur in retortam latam, & unâ cum suo capitello in iunctura clausam, distillentur in cineribus lento igne, quoad extracta fuerit aqua: quæ referuanda est ad suos usus. Postea fortificetur ignis paulatim, ubi oleum apparuerit, magis magisq;, usquequò totum oleum extraxeris. Tandem in fine sequetur gummi quoddam, instar mannæ: quod ualet ad faciendam aquam odoriferam, unâ cum aqua puteali, aut rosarum. Fallopius.

Aliter.

℞. Belzoini ℥. j. Pulueriza subtiliter: pone in alembicum ad distillandum: tunc affunde pulueri, aquæ rosarum ℥. ij. obtura diligenter alembicum, & lento igne subtus accenso primò, quoad aqua cœperit distillare, deinde augmentetur paulatim, usquedum oleum conspexeris. Quo apparente, mutetur recipiens, & fortiori igne elice oleum, quod in sole rectificandum. Eodem penitus modo distillatur oleum styracis calamitæ, & liquidæ. Euonymus.

Oleum ammoniaci.

℞. Gummi Ammoniaci quantum sufficit. Dissolue ex uino stillatitio, uel ex aceto: deinde lapillis iniectis per cineres aut arenam distilla: postea corrige. * Valet ad tophos podagricos discutiedos. Sic etiam paratur ex Colophonia, uel pice. Andernacus.

Oleum ladani.

℞. Ladani pulverizati quantum sufficit. Pone in uas cupreum instagnatum: cui admisce aquæ ros. ℥. j. uel ℥. β. pro quantitate ladani, & olei amygdalarum dulcium medietatem. Postea capitello eiusdem materiæ cooperi uas, & claude iuncturam: & sic in fornace ebulliat aliquandiu: id quod tuo relinquendum iudicio est. prout enim multa fuerit materia, ita etiam diutius erit coquendum. Antequam auferas materiam, refrigerare permittito, ac tandem serua. Quo autem melius conferuetur, adde aliquid aluminis usti, aut ambræ. Fallopius.

Oleum terebinthine.

Oleum Terebinthine per cineres ex ampulla erecta, non alta nimis, uel ex incuruata potius optimè distillatur, addita arena lota, ne ebulliat. Alij terebinthinę

Hh

rebinthinę

rebinthinę libras tres, salis manipulum, & uini stillatitij modicum prius ma-
cerant: deinde distillant. * Frigidis neruorum affectibus, ac omnibus æ-
gritudinibus frigidis ac flatuosis conuenit: in asthma, & anhelitus difficul-
tate mirificum est: si duę drachmę singulo mane sumantur. Est & in empye-
mate proficuū, & in omni praua thoracis affectione ex pituita, colicis etiam
doloribus & omnibus flatuosis conuenit, cicatrices decorat, & corrigit. Pen-
na illitum naribus ualet ad scabiem, & rimas earum: cerebrum hoc modo
calescit, & pituitam absq; sternutamentis detrahit: sanat & rimas uberum
in mulieribus. Ad memoriam, surditatem & spasmus principatum obtinet.
Ut uulnera citissimē consolidentur, recipe oleum terebinthinę, & calefa-
ctum iuxta ignem, commisce ei uiridis æris partem æqualem, & serua usui.
Andernacus & Euonymus.

Oleum terebinthinę, aliter.

℞. Terebinthinę clarę, quātum uidebitur: & pro qualibet libra accipe ci-
neris è ligno duro ꝑ. iij. & in retorta fornaci accōmoda. A principio fiat ignis
lentus, ad humiditatis distillationē: postea augeatur ignis ad olei distillatio-
nem. * Vulnere simplicia intra horas uiginti quatuor sanat. Valet neruis
contractis à frigiditate, accipiendo ꝑ. j. cum uino: urinam mouet, & omnes
dissoluit corporis neruositates. Punctiones lateris curat: mirabiliter febr-
ibus pestilentibus confert eodem pondere, per os accipiendo: & unguendo
stomachi orificium, digestionem promouet. Follopius.

DE OLEIS EX METALLICIS.

Oleum auri.

Aurum per acetum in succum soluitur, separaturq;: deinde maceratur in
succo chelidonij, & aqua uitę præparata: postea per balneum extillatur,
dum in fundo oleum crassum resideat. * Huius grana decem ex aqua uitę
dantur. Andernacus ex Paracelso.

Aliter.

Aurum per regale cemētum ex plūbo in calcē redigitur: deinde purgatur:
postea horis uiginti quatuor in aqua uitę digeritur: atq; tunc oleum proue-
nit, præstantissimum Chymię magisterium. Paracelsus.

Oleum auri egregium.

Folia auri macerata in succo limonum (an & aceto, præsertim distillato)
& a quo humore distillatione detracto (quid si margaritę & corallia ad-
dantur) remanet in fundo quasi butyrum. Id uino mistum, aureum colo-
rem ei conciliat, & acetosum facit. * Mirificē putredini resistit. Purgat etiam
multos, & sudorem mouet: prodest leprosis, & qui inunctionibus Mercu-
rialibus ab istis hominibus, qui imperitia pecuniam lucrantur, sunt perdi-
ti. Gesnerus.

Aur. 1000.

A

Aurum potabile.

Aurum in folia redactum cum aceti spiritu distillatur, separaturq; & ex aqua uitæ præparata, per mensem digeritur, dum succus appareat. * Huius scrupulus ex spiritu, uel humore alterius rei propinatur. Andernacus.

Idem, aliter.

Auri per regale cementum siue stibium purgati lamellæ, ex uiridi salis liquo- re in puluere resoluuntur: is deinde aqua pluuiali stillatitia tâdiu ablu- tur, donec nulla amplius falsedo subesse percipiatur. Aut si celerius idem ex- pedire cupias, auri lamine cum plumbo in lamellas redacto obteguntur, & per horas uiginti quatuor cementatur, ut uocant, leuigaturq; dum calx auri subtilissima fiat. Postea tatum spiritus uini super elotû puluere, uel calcẽ re- purgatâ funditur, quantû sex digitos trãsueros superemineat: ac iũcturis ua- sis probẽ oblitis, maceratur in aqua tẽperatẽ calida, siue balneo Mariæ, die- bus uiginti, aut triginta. Tum liquor citrinus, relicto in fundo uasis puluere candido, effunditur, & spiritus uini ex ampulla uitrea per operculum à flauo auri liquore, modicẽ ex balneo separatur. Postremò idem liquor auri extra- ctus, ad summum usq; gradû eleuari, hoc est, quinquies per ampullam incur- natam urgeri debet: atque tunc quinta auri essentia absolutẽ parata dicitur, summum Chymicorum mysterium. Andernacus ex Paracello.

B

Oleum seu liquor argenti.

℞. Salis nitri ℥.ij.

Terræ luteæ ℥.iij.

Miscentur, distillanturq; ut oleum salis uiride, igne primûm modico, deinde paulatim ad aucto, donec spiritus pro manare desierint. Huius liquoris ʒ. vj. super argenti purissimi, in lamellas redacti uncias duas funditur, & uitro oc- cluso in cinerem modicẽ calidum, uel solem ponuntur, dum illæ exoluantur: postea quod solutum est, fecibus relictis, in aliud uas percolando, effundi- tur, & cum aqua pluuiali stillatitia abluatur tandiu, quoad nulla amplius sa- lis acrimonia percipiatur: hinc spiritu uini diluitur, rursusq; seiungitur & exiccatur. Tandem aqua uitæ correctâ perfunditur, & uasculo bene obtu- rato, in loco calido per dies quatuordecim digeritur, paraturq; liquor ex ra- tione, qua ex auro. Aliàs argentum ad calcem reducitur: deinde ex aqua uitæ in uiscosum succum redigitur: postea is balneo per mensem digeritur, usq; dum liquor uiridi uasculus exurgat. * Singulare remedium in morbis ex cerebri inflammatione ortis, neruorum conuulsione, morbo attonito, ma- nia, insania: nec non lienis, iecoris, menstruorumq; uitijis, ex obstructio- nibus natis. Andernacus.

Oleum argenti, aliter.

℞. Argenti calcinati, quantum uolueris: pone in acetû distillatum, & in-

Hh 2 tra

tra aliquot dies soluetur, & fiet cœruleum, tum lentè in balneo Mariæ euapo. A
ret acetum, & fiet oleum pulcherrimum. Euonymus.

Oleum perlarum.

Margaritæ primùm in puluerem rediguntur, & nitro oris angusti indun-
tur, perfunduntur aceto distillato optimo, ita ut hoc ad duos digitos super-
mineat: deinde in cineres calidos ponuntur, donec soluantur: postea quod solu-
tū est, in balneo extillatur ad siccitatē usq;, & super calcem hanc unionum a-
qua pluuiialis stillatitia funditur, rursusq; distillatur, dum omnis humor e-
manarit: tunc iterum affunditur recens aqua stillatitia, rursusq; detrahitur
ut antea: atque is labor ter, quater uel repetitur, quoad nihil aceti subesse per-
cipiatur. Tandem puluis, siue calx unionum, aut in loco humido supra mar-
mor dissoluitur, aut ex spiritu uini maceratur, distillaturq;, dum in liquorem
olei instar redigatur. * Huius grana sena ex humore aliquo ad resolutionem
neruorum, conuulsionem, marcorem senilem, & phrenitidem dantur: cor-
pus sanum conseruat: læsum pristinæ sanitati restituit: lac muliebre emen-
dat, augetq; naturalium partium uitia, & semen corrigit: abscessibus, ulceris-
busq; exedentibus, cancro, & hæmorrhoidibus medetur. Andernacus.

Oleum coralliorum.

Corallia eodem modo, quo margaritæ in liquorem rediguntur. Alij uel u-
niones uel corallia minutim cõtusa in aqua ardēti, siue uiridi salis liquore sol- B.
uunt prius in calcem: deinde hanc abluunt stillando, donec nulla amplius sal-
sedo percipiatur: postea puluerē uini spiritu excipiunt, & per balneum sexies
aut septies refundēdo abstrahunt. Alij corallia in calcē subigunt: hanc resoluunt,
& ex uini spiritu nouies extillare sinunt, dum salis instar dissoluatur: quicquid
aut in fundo remanet, id recēti uini spiritu perfundunt, & priore modo euo-
cant, usq; dum tinctura coralliorū perueniat: quā ipsi animam appellāt, sum-
mum medicę facultatis mysterium. * Omnes interiorum partium affectus
radicitus euellit, & corpus cœlesti quadam ui in temperatum habitum abso-
lutāq; & exquisitā cōmoderationem restituitur. Sic igitur quinta coralliorū
essentia quolibet morbū comitalē à pueris, & etate prouectiorib. in quinq;
septimanis prorsus subtrahit. Sic etiā omne alui profluuiū à quacunq; causa
ortum, tam in pueris, q̄ in adultis cohibet, etiā si morbus ad extremum perue-
nerit. Ita sanguinē à quacunq; parte manātem coërcet, quouis modo adhibi-
ta. Sic deniq; fluores uterinos quoscūq; sistit, & ad probā naturæ tēperatio-
nem reducit, ne quid mali recidiui in reliquis corporis partibus unquam,
quemadmodum ex alijs medicamētis omnibus, consequatur. Ad hæc idem
oculis superimpositū, eorum dolores sedat: defluxiones mirificè cōpescit, &
pustulas discutit. Intra corpus sumptum eadem propemodum, sed non tam
efficaciter præstat, ut tinctura. hæc enim decem guttarum instar ex liquore
aliquo.

A aliquo idoneo exhibita, mirabilia tam in uiris quàm fœminis, iunioribus & adultis efficit. Andernacus.

Oleum salis.

℞. Salis communis ℥. iij. Salis nitri purgati ℥. xij.
 Simul miscentur optimè, & ampullæ collo longiore præditæ, argillaq; probè oblitæ induntur: deinde hæc in fornace ad latus locatur, & uase, quod liquore excipiat, satis amplo appposito, cômmissurisq; diligētissimè conglutinat, ignis per initia exiguus extruitur, donec quod aquosum inest, stillare, & spiritus colorati apparere cœperint: postea calore uehementissimo, repleto nimirum fornace carbonibus, in modum aquæ ualidæ, quod reliquum est expellitur. Tandem uasis refrigeratis, omnis eximitur liquor: qui infusus cucurbitæ uitreæ, ex calidis cineribus distillatur, dum phlegma ab oleo siue spiritibus separetur. Hoc uitro reconditur ad usum. * Foris cum oleo terebinthinæ cæræ, chamæmelino, uerbascino, & similibus cômixtum, dolores podagricos egregiè sedat, tophosq; discutit. Per os guttatim datur, sicut etiã illud præcipuè, quod purpurei citrini uel coloris per aquam roridam, ad soluendum aurum, morbosq; infinitos curandos paratur. Trium guttarum instar ex aqua uitæ singulis septimanis assumptum, hominem renouat: aquam inter cutem cõsumit, morbum comitialè discutit, febres abigit, arquatū sanat, mēbra cõuulsa si eo perfricentur, restituit, dolores podagricos mitigat, abscessibus medetur, ramices curat. Andernacus.

B.

Oleum sulphuris.

Vitreum uas tintinnabuli non absimile, illitum figulari luto, à terra unius cubiti mensura, æneo uel ferreo filo suspēdes, sub quo metretam uitream maioris circumferentiæ, in cuius medio inuersus fuerit cyathus, statues. Porro cyathi fundus ferream bracteam digitorum quatuor latitudinis ex igne cadentem sustineat, ex qua sulphur accedat. Hoc dum cõburitur, recētius superaddatur. Inde fiet, ut ex fumo ascendente suspensum uas breui temporis interuallo guttatim in inferiorē paropsidem distillet oleum: quod diligēter collectum, uitrea cõseruabis ampulla. * Valet præcipuè ad fistulas, & ad curanda oris ulcera, quæ gangrænas appellant: in quibus curandis maximè excellit, &c. Matthiolus.

Oleum sulphuris, aliter.

Ad partem unam sulphuris triti, addunt partem alteram silicium, in puluere itidem redactorum. Hanc mixturam in retorta ad leuissimum ignem apponunt, & oleum optimum eliciunt. * Vsurpatur in morbis frigidis, quorum causa sunt humores uel frigidi, uel putrefacti, aut in quibus flatuum est copia: ut in febribus putridis, tertianis, quotidianis, quartanis, in peste, in uulneribus, in ulceribus maximè cauis & sinuosis, in affectibus plerisque cerebri, oris, denticulorum, uentriculi, hepatis, lienis, matricis, uelicæ, intestinorum & articularum, ijs uidelicet, qui ex humoris abundantia, aut putrefactione proueniunt. Datur autem pauxillum huius olei, cum

Hh 3 destilla-

destillatio liquore, uel decocto herbe cōueniētis, pro cuiusq; partis & affe- **A**
ctus qualitate. Mensuræ modus hic est. Gallinæ pēna in oleū intingitur, atq;
inde mox extrahitur, & quod adhæret pinguedinis seu olei pēnæ, id in liquo-
re, seu decocto diluitur, & datur bibendū egroto. In febre quidē quotidiana,
in uino decoctionis rorisinarini aut menthæ paulo ante accessiōē. In tertia-
na, cū decocto cētaurij in uino. In quartana, cū aqua buglosi. In peste, cū ui-
no decoctionis raphani, cui admixtū sit parū theriacæ & mithritati. In ulceri-
bus & pustulis oris, penna aut gossipiū oleo madēs loco ulcerato admouetur
leuiter: ita cōtactu olei aliquoties repetito, persanatur malum. Epilepticis in
decocto betonicæ & pæoniæ propinatur. Tussitibus, cū semine urticæ & hyl-
sopo coctis in uino. In anorexia, quæ redūdantia phlegmatis existit, cū aqua
absinthij. In dolore uētriculi & coli ex flatu, cum aqua chamomillæ. In hepa-
tis frigiditate & hydrope, cū aqua iridis, chelidonix, & melle. In obstructio-
nibus & dolore lienis, cū aqua tamaricis. In morbo Gallico, cū aqua fumiter-
ræ & florum genistæ. Cōtra uermes, in aqua graminis aut absinthij. In dolore
matricis, cū uino decoctionis betonicæ, & matricariæ. In urinæ suppressio-
ne, cum uino decoctionis allij. Ad podagrā frigidam, cū aqua chamæpityos.
Atq; in his omnibus idem utēdi modus est: is uidelicet, qui suprā est exposi-
tus, de penna oleo imbuenda, & mox diluēda in idoneo liquore. In uulneri-
bus autem & ulceribus, locus affectus oleo linendus est cum penna leuiter. **B**
Dens cum dolet, eodem leuiter attingendus. Sed si pariter omnes doleant,
decoctum menthæ calidum, cui immixta sit olei guttula una atq; altera, ore
continendum est. Euonymus.

Oleum sulphuris, aliter.

Oleum Sulphuris facillē quidem & citō cum uitrea campana paratur, sed
melior modus & perfectior hic est. Puluerizetur sulphur subtiliter, & de pu-
mice tantundem pistetur: quæ duo misceantur simul, & ponantur in retortā,
cui adiunctū sit satis amplum & magnū recipiens: & bidui spacio, leuissimo
igne, oleum sulphuris distillabis, quod Italis dicitur, *Oleum de grata, uero De re-
gestro*. Additur aut pumex, ne sulphur ascendat, ac etiā citius uapores sursum
mittat. * Eadē penē facultates assignātur ei, quas modō suprā recēsuimus:
nisi quōd in paucissimis hęc diuersitatē notauimus. Valet ad uulnera acci-
piendo puluere ex folijs quercus, pimpinellæ, agrimonix, cōsolidæ maioris,
hyperici: quibus omnibus bene contusis, decoquantur in uino: & colaturæ
admisceatur pauxillū huius olei, aut saltem quantum satis sit pro malitia &
magnitudine plagæ. Cum hoc decocto lauatur uulnus recens, aut inuete-
ratum ulcus, & subito curatur. In morbo Gallico post sufficientem purgatio-
nem, ualet oleum eodem modo, quo suprā. Atque hęc quidem, & alia suprā
scripta, quæ huc referenda, perhibentur experta à Medico Imperatoris Bo-
noniæ, & ab alio Romæ. Gesnerus à quodam Romano.

Oleum

A

Oleum sulphuris, aliter.

℞. Sulphuris calcinati ℥.ij.
 Infundatur in aceto, quod quatuor uel sex digitis supernatet acetū in cucurbita: hinc in fimo equino sepeliatur quatuor hebdomadis: post distilletur in igne forti, tūc ascendit spiritus sulphuris cū aceto: quod iterum sepeliatur in fimo equino per duos aut tres dies: post in uase lato, nō stricti orificij euaporetur acetum: tunc manebit spiritus & oleū sulphuris in fundo. Idem oleum iterum sepeliatur in fimo ad octo dies, post distilletur per alembicum, & tūc ultimò in sine abscondatur per mensem unum: & sic purificabitur oleum sulphuris. * Est magnæ uirtutis. Exhibeantur guttæ tres ad summum. Idem fimus equi semper est renouandus. Euonymus.

Oleum sulphuris, aliter.

℞. Sulphuris triti ℥.ij.
 Fæcularum uini in puluerem contusarum ℥.j.
 Calcis uiuæ & contusæ ℥.viij.
 Miscentur simul, & in ampulla incuruata urgentur. Andernacus.

Aliter.

℞. Sulphuris ℥.j.β.
 Salis Ammoniacy ℥.iiij.
 Calcis uiuæ ℥.j.

B

Miscentur, & aqua in qua salis modicum solutum sit, perfunduntur, oleumq; ex retorta distillatur: quod à phlegmate seiunctum, uitreo probè recõditur. Efficacissimum quoque oleum ex sulphure prouenit, quando totius essentia per acetum stillatitium, & fæcularum uini in calcem redactarum saleem, ita extrahitur, ut postea balsami instar ex operculo distillet: * quod non solum externis corporis uitijs, uerumetiam ad interna potu assumptum saluberrimum existit. Andernacus.

Oleum uitrioli.

℞. Vitrioli ℥.xij.
 Vasi uitreo luto obducto induntur, & ex igne phlegma extillatur: deinde illud eximitur, contunditurq; & phlegmate rursus perfunditur, idemq; euocatur ut antea, usq; dum nihil amplius emanet, & spiritus profiliat: postea ab igne remouetur, & calx rubicunda, in puluerè redacta, uel per se sola, uel laterum frustulis adiectis, ampullæ incuruatae, siue erectæ potius imponitur, & uase amplo, qd' excipit adaptato, commissurisq; diligentissimè luto obseratis, nocta dieq; luculentissimo igne urgendo oleū distillat. Vbi omnia refrixerint, totus liquor eximitur, infunditurq; ampullæ uitreae, & ex arena calida primū aqua insipida, deinde acida acrisq; quam oleum appellant, separatur, purgaturq; à sedimēto. Hoc oleū si sæpius phlegmate p̄fatum distilletur, dulce red-
 ditur.

ditur. * Valet ad apoplexiã, paralyfim, epilepsia, febres ardentes, pestilentesq;: A
item ad sitim, stomachũ bile æstuantẽ, morbos uterinos, aliosq; innumeros,
ex humore idoneo guttarum instar potionis assumptũ. quineriã medicamen-
tis tũ purgãtib; tum corroborãtib; immutantibusq; uel illorum actionẽ
prouedarũ, uel saporis comendãdi gratia rectẽ admiscetur. Andern. & alij.

Oleum tartari.

℞. Tartari albi, in puluerem redacti lb. iij.
Ampullæ incuruatæ, uel etiã erectæ, argillaq; obductæ indũtur: hæc in forna-
cem locatur, & uase quod excipit amplo apposito, iuncturæ luto occludũtur
diligẽter (facilẽ enim expirare solet:) postea igne per initia exiguo, tandem
auctiore urgetur, donec nulli amplius spiritus appareant. tũ refrigeratis ua-
sis liquor eximitur, infunditurq; ampullæ uitreæ erectæ, & in balneo calẽte
corrigitur, separaturq; aqua ab oleo. Idem ex cineribus uel arena iterũ euo-
catur à sedimento crasso, & oleũ aurei coloris prouenit. * Ad curanda ulce-
ra, præsertim ex lue Venerea orta, efficacissimum est: cui mumia siue oleum
fæcularum dulce annumerari debet. hæc enim ulcera manantia ita curat, ut
ipforum malitia nocere amplius non possit. Ex uino hausta calculos renum
& uesicæ conterit, expellitq;: urinam mouet: ulcera purgat. Andernacus.

Oleum stibij.

Antimoniũ in tenuissimũ puluerem redactum, ac cucurbitæ uitreæ impo- B
sitũ, aceto uini acerrimo & distillato maceratur super leui ignis calore, tan-
tis per, donec rubro colore acetũ inficiatur. Coloratum in aliud uitrum trans-
funditur, nouũq; fæcibus superaffunditur, donec rursus rubam colorẽ con-
cipiat. Istæ aut transfusiones & additiones noui aceti super fæces, toties sunt
repetẽdæ, donec nullam amplius rubedinem pulueres ex se emittãt. Acetum
uerò collectũ leui igne distillari debet, donec rubedo paulatim condensari
incipiens, alëbicum petere uideatur. Tunc refrigeranda sunt uasa, ac liquor
rubeus, quadraginta diebus sũmo calido macerari debet, donec perfectã olei
formam acquirat. * Illud sacchari instar, dulce affirmãt, omnesq; uulnerum
dolores sedare, ac perfectẽ sanare dicitur: ac plures admirandas facultates
in ulceribus contumacibus ac cancerosis præstare. Quidam ad Gesnerum.

Oleum, seu potius essentia stibij.

Stibium in puluerẽ cõtusum, per dies decẽ leuigatur igne, donec primũ
flos albus, mox luteus appareat: qui tandem è rubro in purpureum colorem
trãsit. Huius ℥. ij. in uini spiritu, quãtum uiginti digitos superet, diebus duo-
decim, uase diligẽter occluso macerãtur: postea separãtur p balneũ: atq; tunc
essentia stibij, in taurãdis renouãdisq; uiribus dicata, fundo uasis substerni-
tur. * Huius grana quatuor ex aqua melissæ, chelidonij, aut uino generosissi-
mo dãtur: febres curat: aquã inter cutẽ discutit: morbis uterinis, arquato, co-
mitiali.

A mitiali, & similibus medetur: morbum Gallicum, omniaque hinc orta vitia, mirabiliter sanat: humores per aluum educit, superfluos per cutis habitum expellit. Andernacus.

Oleum Antimonij, aliter.

Oleum Antimonij ex aqua rorida, vel cum sulphure & sale fossitio paratur. * Huius grana tria ex uino uel liquore sæcularum uini & chalcantri potui sumpta, aquam subter cutem intra dies paucos curant: grana duo ex theriacæ drachmis duabus deuorata pesti, morbisque uenenatis medentur: trium guttarum instar, uel amplius, ex aqua uitæ sumptum, cõuulsioni, morbo attonito, alijsque cerebri affectibus succurrit: dolores podagricos, colicosque sedat: febres discutit: uescicæ ulceratę opitulatur: ulcera maligna, cancerum, fistulas, phagedæna, herpete, omniaque cutis uitia mirabiliter sanat. Andernacus.

Aliter.

B Expulueris stibij, salis fossitij, utriusque libris tribus: hæc super igne in fictili uruntur semper agitando, usque dum uirescant: deinde tritis aceti stillatitij optimi additur, quantum ad uniendum satis est: postea macerantur, & per ampullam incuruatam igne acerrimo oleum rubrum extillatur, quod a phlegmate ex balneo separatur. Vel stibij in puluerem detriti libra, cum salis communis torrefacti æquali portione conteritur, inditurque: retortæ luto obductæ, & ex igne uehementissimo oleum euocatur: quod licet externis corporis uitijs magis conueniat: non pauci tamen per os etiam exhibere, non dubitant. Andernacus.

Oleum cupri.

R. Aeris adusti lb. ij. Subtilissimè teratur, & ponatur in uitream cucurbitam optimè lutatam, & aceto imbibatur fortissimo: fac distillare per horas uiginti quatuor, & habebis oleum fortissimum coloris rubri & uiridis. Gallus quidam empiricus.

Oleum æris.

Oleum æris conficitur, quando illud in chalcathum redigitur, resoluitur, & ex terra, colcothar uocant, oleum rubicundum paratur. * Ad cancerum, phagedæna, gangrænâ, fistulas, & reliqua ulcera maligna ualet. Andernacus.

Oleum stanni.

Oleum ex stanno trium guttarum instar ex uino potum, aluum sine difficultate mouet, humoresque educit: oculis membrana obductis per penam illitum opitulatur: morbum Gallicum, ex eoque orta uitia: item uulnera curatu difficilia, ulceraque maligna sanat. Quinetiam stannum per ignem in calcem reductum læuigatumque, singularem efficaciam in arquato, ascite, & uermibus curandis obtinet, ad hunc modum præscriptum.

R. Stanni præparati ʒ. j.

℞. Sem.

Sem. Colocynthidis, Plantaginis ana ʒ. vi. A
 In puluerem rediguntur, miscenturq̄. huius uncia datur ad lumbricos enecandos, expellendosq̄e. In ascite stanni læuigati ʒ. β. sanguinis draconis ʒ. ij. liquoris tapfi ʒ. j. miscentur, danturq̄e ʒ. β. pondere. Stanni in calcem redacti ʒ. v. aliptæ moschatæ ʒ. j. bdellij ʒ. ij. simul subiguntur, arquatoq̄e infestatis exhibentur à scrupulo ad sesquiscrupulum usque. Andernacus.

Oleum stanni, aliter.

Stannum in calcem siue cinerem redigitur, perfunditurq̄e aqua ualida, & dum lapilli crystallini profoliant, in ampulla sinitur: deinde humor omnis per arenam modicè extillatur: postea acetum distillatum affunditur, & in balneo macerantur omnia, donec soluantur, horisque decem aut duodecim coquantur, & ubi refrixerint, quod clarum est, eximitur, destillaturq̄: materiæ exiccatae aliud acetum admiscetur, coquiturq̄e ut antea, donec omnis eliquescat: atque tunc acetum stillare sinitur: idq̄e iteratur, usquedum illa olei modo in fundo subsistat: quod dum adhuc calet, eximi debet, ne mellis instar fiat spissum. * Singulari quadam facultate ulcera & uulnera recentia adhuc, intra horas uiginti quatuor sanare dicitur. Andernacus.

Oleum plumbi. B

Plumbum in calcem uel cinerem aduritur, & super hunc aceti optimi stil latij, quantum satis est, funditur, maceraturq̄; per biduum in cineribus calidis: deinde hoc relictis facibus effunditur, & recens admiscetur, siniturq̄, & eximitur ut antea: idq̄e toties repetitur, donec omnis dolcedo extracta fuerit: postea acetum quod collectum est, ampullæ inditur, & ex balneo distillatur, usquedum in fundo materia, siue sal plumbi album remaneat, quod in oleum tandem deducitur. * Vulnera & ulcera quæuis etiam deplorata intra dies paucos carne implet, sanatq̄: oleo terebinthinæ permixtum, ac membris conuulsis, resolutisq̄; inunctum, breui ea restituit: tumorem ex calida intemperie natum ex oleo chamomelino & oliuarum discutit: inflammationes quouis modo ortas, & ambusta restinguit, si pannus cæruleus eo imbutus superdetur. Sunt qui hoc oleum granorū trium aut quatuor pondere in colicis, alijsq̄; intestinorum doloribus, ex humore aliquo potui propinare soleant. Andernacus.

Oleum ferri.

ʒ. Limaturæ ferri quantum uis. Imbibe urina, postea calcina toties in fornace reuerberationis, donec impalpabilis reddatur, colorisque sanguineus: tunc pone in cucurbitam uitream optimè lutatam: imbibas quoque urina, & fac distillare more aquæ fortis per horas uiginti quatuor, semper ignem augendo: & habebis oleum spissum rubicundissimum. * Experientia illius olei:

A olei: rubificentur laminæ cuiusvis metalli, si extinguantur in isto oleo, statim accipient auri colorem. Gallus quidam empiricus.

Oleum ferri, aliter.

Ferrum uel Chalybs in resinam siue oleum rubicundissimum per aquam aluminis redigitur: uel si chalybs per acetum stillatitium læuigetur in puluerem, croco similem: atque hinc sal armeniacus octies aut nouies eleuetur: postea in oleum resoluatur, idemque aqua stillatitia diligenter lauetur, dum dulcescat. * Hoc oleum etsi maiorem in Chymia, quam in Medicina usum habeat, feliciter tamen in alui profluijs etiam trium aut quinque guttarum instar cum oleo nucis moschatæ scrupulo dimidio ex uino rubro potui datur. Andernacus.

Oleum hydrargyri.

B Oleum Hydrargyri fit, dum Hydrargyrum ex calce sæcularum uini exiccatarum purgatur: deinde per chalcantum, salem nitri, & alumen in altum eleuatur: postea à uini spiritu correcto digeritur, donec in mucosam pinguedinem transeat: hinc liquor abstrahitur, & in arena igne fortissimo urgetur, quoad humor lactis instar extillet: hic iterum affunditur, & oleum albissimum suauissimumque, omnis erodentis facultatis expers prouenit. * Omnium metallorum olea præstantissima superat. auri balsamo uiribus responder: ulcera & uulnera quæuis purgat, implet & percurat: per os assumptum uesticæ, faucium, aliarumque partium abditarum exulcerationes persanat: adhæc uis sua penetratoria renum morbos per sudores, urinamque discutit. Andernacus ex Paracelso.

Oleum lithargyri.

B. Lithargyri puluerizati q. l. Dissolue per decoctionem in aceto forti, pluribus uicibus, successiue: deinde euapora acetum ad ignem, & remanet oleum nigrum in fundo, quod dissoluatur cum aqua calida per agitationem cum baculo paruo & mundo: tunc distilla per linguam laneam, & remanet oleum in fundo, quod ab aqua separatum, est singulare. * Mirabile est in delendis maculis, pannis faciei, & subtiliat cicatricem, & rubedinem eorum delet. Gesnerus ex libro manuscripto.

Oleum auripigmenti.

Auripigmentum cum duplo salis nitri pondere conteritur: deinde carbonibus sub dio accensis, catinus imponitur, finiturque dum excandescat: huic postea Chymicus asidens, auripigmentum immittit: quod lento igne liquefcere sinit, donec non amplius ebulliat: mox rursus tantum inijcit, idemque ut prius exurere permittit. hoc tamdiu agit, usque dum satis iniectum fuerit:

fuerit: atque tunc consumpto iam sale nitri, igne uehementiore per ho- A
 ras quatuor aut quinque urget, quoad auripigmentum in fundo butyri
 instar liquefactum resideat, refrigeratumque acrio nitore inalbescat. post
 conteritur, imponiturque marmori, & in loco humidior ad liquorem resolu-
 tur: qui tandem singulari artificio ex ampulla distillatur. * Hoc cum mel-
 le illitum crassitiem extenuat: terebinthina exceptum elephantiasim abig-
 git: ani ulceribus, & ijs quæ cicatricem ægrè ducunt, prodest: purgat, extra-
 hit, siccatur, suppurationes discutit: adipi aut oleo commixtum, concoquen-
 di emolliendi que uim obtinet: crustas urendo excitat: quæ excrescunt, res-
 primit: pilos euellit: resina exceptum, alopecias explet: phtiriasi mede-
 tur: narium, orisque ulceribus, & pustularum eruptioni cum rosaceo con-
 ducit: ulcera serpentina & maligna ad cicatricem perducit: carnosas partium
 excrescentias absumit: oculorum cicatrices emendat, & lachrymas ciet: cal-
 los, sordidaque ulcera purgat: inueterata, & manantia, quæ cicatricem
 non admittunt, nec non fungis similia, sanat: luxuriantem carnem consu-
 mit: caua explet: contra graueolentia narium ulcera auxiliatur. In summa
 fistulis, carbunculis, gangrænis, nervis præcis, ramicibus humore con-
 tractis, carcinomati & fluxionibus subuenit, siue unguentis, siue linimen-
 tis & oleis misceatur, uel ulcerum labra bis terue eo circumlinantur. quod si
 ulcus id ipsum fluere incipiat, & crusta obducatur: hæc unguento ex buty- B
 ro maiali (quod calidum super aquam fabarum, & decoctum lupinorum si-
 gilli que Salomonis effusum sit) peruncta resoluitur. Quinetiam ad ulcera
 & uulnera hunc in modum uti licet: Olei auripigmenti, olei myrrhæ, tere-
 binthinæ singulorum ʒ. ij. ad ulcera quæuis purganda, & carne implenda
 miscentur, applicanturque. Sic olei arsenici, hydrargyri, utriusque ʒ. ij. β.
 olei ex uitellis ʒ. j. terebinthinæ lotæ ʒ. ij. lythargyri acetosi ʒ. β. subigun-
 tur. & cancro, fistulis, ulceribusque narium expedite curandis bis quoti-
 die adhibentur. uel olei auripigmenti ʒ. iij. olei uitellorum ʒ. x. terebinthi-
 næ distillatæ ʒ. j. miscentur, imponunturque ulceribus. Andernacus.

Oleum talci.

Talci libra catillo imponitur, & in igne luculento horis quatuor excan-
 descere sinitur: deinde ubi refrixerit, fornaci, in quo panis iam coctus est,
 immittitur, & refrigerare modice permittitur: postea eximitur, humecta-
 turque oleo oliuarum, & fictili inditur, atque per descensum oleum extil-
 latur. * Valet ad ulcera putrida sordidaque curanda, eorumque tumores
 discutendos, & dolores leniendos. Andernacus.

Oleum calcinum.

Calx integra oleo communi restinguatur, alembico uitreo distille-
 tur, &

A tur, & manabit oleum. * Ad ossa corrupta ualet. Syluius.

Idem aliter.

Calcis uiuæ frustum integrum infundatur in oleo communi, donec calx in puluerem reducatur: tum destilletur in alembico uitreo, & emanabit oleū calcinum. Leonardus de Prædapia.

Oleum de lateribus.

R: Laterem aut tegulam ruffam antiquissimam, ex ruffo luto ductam: eam confringe in frusta mediocria, & in prunis urito, donec tota excanduerint: deinde è prunis exempta fragmēta restinguito in oleo claro ueteri, & dimitto quousque se oleo impleuerint: postea oleo exempta in tenuissimum puluerem contundito, atque in retortam aut cucurbitam uitream indito, & secundum artem luto chymistico iuncturas uitrorum claudito, & subtus accessis prunis oleum elicito, & elicatum reponito. * Conuenit omnibus morbis frigidis. Est enim calidum penetratiuum, resolutiuum: mollit dura, & discutit tumida: opitulatur, qui patiuntur epilepsiam, uertiginem, obliuionem, paralytim, spasmus, dolorem dorsi, genuum, podagram, uel alios iuncturarum & neruorum morbos: medetur spleni, uesicæ, & renibus. Mesues.

Oleum crystallorum.

B Crystalli subtilissimè conteruntur, & uel æquali nitri, uel duplo sulphuris pondere commixti in calcem aduruntur: hæc deinde ex aqua pluuiali stillatitia lauatur aliquoties: rursusq; siccatur: postea spiritu uini perfunditur, maceraturq;: tum extillatur rursus, & quod in fundo remanet, iterum calcinatur lauatur, destillaturq;: toties, donec in uino eliquescat niuis instar. tandem incoquendo sal prouenit, quod in loco humido resoluitur in liquorē. * Huius drachma dimidia potui assumpta, singulare est remedium ad renum & uesicæ calculos atterendos, comminuendos, expellendosq;, & urinam promouendam. Atq; ad hunc modum oleum ex omnibus gemmis paratur. Ex Sarda quidem & hæmatite ad sanguinis profluvia: ex Saphyro, ad insaniam, pestilentiam, carbunculum, cordis palpitationem: ex granatis autem, ad tremorem eius, sputumq; sanguinis. Andernacus.

DE OLEIS EX ANIMALIBVS, ET eorundem partibus.

Oleum ex sanguine humano, & ceruino.

Sanguis hominis sani & iuuenuli, uel cerui iam capti dum adhuc calet, ampullæ incuruatæ inditur, & igne ex cineribus urgetur, quoad omnis extillarit aqua: deinde ampulla refrigerare finitur, lutoq; obducta, in arenam locatur, & alio uase quod excipit appposito, ignis augetur, donec oleum emanare desierit. hoc postea in aqua calida corrigitur macerando, separandoque. Sal quod inter distillandum lateribus uasis adhærescit, cum oleo abluitur, &

Ii 3 uitro

uitro conditur. Alij sanguinem pellicano, quod appellant, infundunt, & in A balneo digerunt. dum tertia pars uasis adimpleatur: deinde ex eodem balneo aquam à subiecta materia abstrahunt: postea sedimentum ex ampulla incuruata distillant nouies. * Oleum sanguinis humani, ad comitiale morbum, aliosq; infinitos humani corporis affectus abigendos efficax. Oleum uerò sanguinis ceruini, singulare in podagra discutienda est remedium. Anderna.

Oleum ex ossibus humanis.

Ex ossibus magnis mortuorum hominum, concidantur frustatim: sine ut excandescant in igne: ignita pone in cassula aut olla, in qua sit oleum comune antiquissimum, & ea extingue: & quamprimùm inieceris frustum in ollam olei, mox illicò operculo claude, ut uidimus in oleo philosophorum. Hæc ossa aliquot horis imbibita contunde per se (absque illo oleo quod superfuit in olla) & pone in cornutam, & destilla ut oleum philosophorum: serua, ac utere. * Res magna est ad omnes dolores iuncturarum. Euonymus.

Oleum ex maxillis equorum.

Maxillæ equorum in puluerem rediguntur: is aqua modica humectatur, & igne luculento urgetur eousq; donec oleum crassum & fætidum effluat. Hoc aqua calida perfunditur, & ex cinere aliquoties extillatur: * peculiare in doloribus podagricis sedandis remedium. Andernacus.

Oleum ex cornubus ceruinis.

Cornua in mense Augusto collecta, lima in scobes rediguntur, coquanturq; ex aqua, quod satis est: deinde per balneum aqua detrahatur: postea illi eximuntur, laterumq; frustulis adiectis, ampullæ incuruatae induntur, & ex arena oleum clarissimum euocatur, quod singulari artificio colligitur. Andernacus.

Oleum ex caluaria humana.

Caluaria in puluerem contunditur: is uino stillatitio, uel aqua betonica irrigatur paululum: deinde uasi fictili uitreato imponitur, quemadmodum supra de lignis distillandis diximus: & per descensum super aquam pæoniae, quæ subiecto uasi infunditur, oleum extillatur. hoc postea in fimo digeritur, corrigiturq; & per cineres calidos rursus euocatur, dum clarum fiat. * Peculiare ad morbum comitiale auxilium. Andernacus.

Oleum ex stercore humano.

R. Stercoris puerorum, uel hominis rubei, q. s. Distilla bis in alembico uitreo, & oleum emanabit: quod reponere. * Curat cancerum, & mortificat fistulam: confert alopecie, &c. Euonymus.

Oleum ex taxo.

R. Taxum, cui corium detrahe, abscissoq; capite & pedibus, & reiectis interioribus, in ollam inferius perforatâ pone: quam alteri ollæ impones. Ollam

A lam inferiorem in terram abscondas, & altera imposita olla, utramque optimè claude in commissura, ne quid transpiret: idque facies etiam parte superiore ollæ superioris. Quo factò, ignis fiat ex carbonibus circumcirca, ita ut pinguedo omnis ex superiori olla in inferiorem distillet: ubi totum distillarit, quod coniecturare licet: * ad membra contracta ex nervorum retractione valet. Gesnerus è libro Germanico.

Oleum castorei.

Castoreum in aceto dissolvitur, aut ex vino stillatio maceratur, & igne lento oleum extillatur. hoc postea ex aceto corrigitur. Inter distillandum interdum materia operculo adhærescere solet, caphuræ instar: hæc carbones eadente admoto, liquatur. * Egregium est oleum ad membra resoluta, & ea quæ alimentum non sentiunt: venerem excitat: colicos dolores sedat: uteri strangulatum discutit: partes naturales roborat. Andernacus ex Euonymo.

Oleum mellis.

Mel cum fauis vasi fictili imponitur, & in fimo equi calido maceratur, dùm cera à melle separata supernat: qua ablata, melli silices minutissimi permiscuntur, & ampullæ induuntur, distillaturque primùm aqua acerrima, deinde oleum. * Singulare est ad podagricos sedandos, vulnèraque curanda, remedium. Andernacus.

B *Oleum scorpionum.*

℞. Olei antiqui quantum sufficit.

Pone in eo de scorpionibus, mense Julio collectis, quot habere poteris. quibus adiunge

Diptamni albi, Absinthij, Betonicæ, Verbenæ, Rorismarini ana quantum sufficit.

Stent omnia per plures dies simul in infusione: postea in alembico distilla, & distillatum serua. Gesnerus.

Oleum ceræ.

Ceræ novæ odoratæ, in sartagine liquatæ, permiscetur arenæ à pulueribus repurgatæ quod satis est: ubi refrixerit, ampullæ erectæ imponitur, & igne primùm lento, postea auctiore urgetur, dum nihil effluat. * Præstantissimū est oleum ad dolores præsertim podagricos sedandos, vulnèra ulceraque curanda. Ex gummi Elemi, eodem modo quo ex cera oleum preciosissimum elicitor. Similiter etiam ex pinguetudinibus animalium olea parantur. Andernacus ex Euonymo.

DE BALSAMIS.

Balsamum artificiale.

℞. Terebinthinæ finissimæ lb. j.

Olei laurini ℥. iiij.

Galban

Galbani ꝑ.iiij.
 Gummi Arabici ꝑ.iiij.
 Thuris, Myrrhæ, Gummi hederæ, Igni aloës ana ꝑ. iiij.
 Galangæ, Caryophyllorum, Consolidæ minoris, Nucis moschatæ, Cinna-
 momi, Zedoariæ, Zingiberis, Dictamni albi ana ꝑ. j.
 Moschi, Ambræ ana ꝑ. j.

Contundantur omnia simul, & retortæ imponantur. quibus adde
 Aquæ uitæ optimæ lb. vj.

In aqua uitæ madefiat pannus, qui accensus imponatur retortæ, ut aqua ar-
 deat, commiscendo materiam, sicq; relinquatur omnia in infusione nouem
 diebus, ac tandem in cineribus fiat distillatio: ita distillabit aqua candida, u-
 nâ cum oleo, semper procedendo cum igne lento, donec colorem olei mu-
 tatum animaduertis ad nigredinem quâdam. Quo uiso mutetur recipiēs,
 & aducto igne distillatio perficiatur. Finita distillatione, aqua ab oleo sepa-
 rada, & singula seorsim seruanda: id quod etiam de prima aqua est intelligē-
 dum. Aqua prima candida, uocatur aqua balsami: & oleum primum separa-
 tum, dicitur oleum balsami. Secunda aqua nigricās, uocatur mater balsami:
 liquor uerò separatus ab aqua nigra, est id quod balsamum artificiosum uo-
 cant: quod ceu preciosissimum, est diligenter custodiendum. * Prima aqua
 clarificat oculos, & uisum conseruat. Facies lota ea aqua, reddit eam pulchrâ,
 & conseruat iuuentutem, calculos renum rumpit, urinam propter carnosita-
 tem impeditam, mouet: omnis generis uulnera partium qualiumcunque sa-
 nat mirabiliter, si ea lauentur, & plumaceoli in eadem madefiant, & imponā-
 tur. Hæticis, catarrhosis, tussientibus subuenit: dolorem ischiaticum aufert
 subito fomentata. Altera aqua, mater balsami dicta, scabiem sanat facillimè:
 idem facit in tinea, lepra, & omnibus ulceribus, modò sine corrosione sint.
 Oleum balsami infinitis morbis succurrit, imprimis capitis uulnerib. cum
 ossium læsione, & membranarum, idoneum est. Mirabiliter pleuriticis pro-
 deest, si cum aqua bibatur ꝑ. j. pro uice. Balsamum uerò ipsum, miraculum est
 huius mundi. Dolorem iliorum, pondere duarum drachmarum sumptum,
 subito leuat: tussi, catarrho, capitis refrigerationi & stomachi, uulnerib. capi-
 tis, semel in die peruncto toto capite, prodest: penetrat enim facilè etiam ad
 partes longius remotas. Tumores corporis omnes dissoluit. Quartanam cu-
 rat, unctiōe totius corporis, ita ut nulla pars intacta relinquatur. Infirmi-
 tes omnes tum calidas, tum frigiditas, proprietate quadam occulta, sanat.
 Fiorauantus.

Balsamum artificiale aliud.

℞. Resinæ Terebinthinæ, Abiegnæ ana lb. j.
 Thuris albi, Laudani ana ꝑ. vj.
 Nardi Indicæ ꝑ. ij.

Rad.

- A** Rad. Valerianæ, Iridis, Acori, Afari, Cyperi ana ʒ. j.
 Masticis, Galangæ, Caryophyllorum, Casiæ odoratæ, Zedoariæ ana ʒ. vj.
 Nucis moschatæ ʒ. iij.
 Macis ʒ. j.
 Agallochi ʒ. ij.
 Lacrymæ oleæ Aethiopicæ ʒ. vj.
 Aloes hepaticæ, Myrrhæ ana ʒ. j. β.
 Castorei ʒ. x.
 Ossium cariotarum, Styracis calamitæ, Laferis odorati ana ʒ. j.
 Lacrymæ sang. draconis ʒ. j. β.
 Florum Lauendulæ ʒ. iij.
 Olei glandis unguentariæ ʒ. vj.

Arida in puluerem teruntur, liquoribusq; miscentur, & diligentissimè uirginis commensurati distillantur. Primùm aqua clarissima effluit, admodum subtilis, quæ igni admota, admirabili quodam modo flagrat, atq; balsami aqua uocatur: mox oleum coloris aurei emanat, quod balsamũ appellant: deinde profluit, ruffo colore præditum. * Aqua quæ prius extillauit, hausta, uentriculi imbecillitatem mirificè iuuat. nam tum pituitam, tum flatus ualenter consumit: quia uerò acerrima existit, sola per se dari nequit, nisi ex uino,

- B** aut iusculo aliquo. Liqueor qui secūdò distillauit, cæteris præfertur: neruorũ uulneribus, articularum cruciatibus, conuulsis, resolutis, comitialibusq; mirabili modo succurrit. Oleum postremò hæc omnia similiter præstat, sed imbecillius. Andernacus.

Balsamum artificiale aliud.

℞. Terebinthinæ ℥. xij. cum aqua ardente rectificata: & excipiatur illud oleum, quod per balneum ascendit, clarissimum, tenuissimum, & leuissimũ.

℞. huius olei ℥. j. ʒ. iij.

Florum Borriginis, Rosarum, Buglossæ, Stœchados, Spicæ, Rorismarini, Lauendulæ, Chamomillæ ana P. j.

Sem. Anisi, Basiliconis, Pæoniæ ana ʒ. β.

Rad. Angelicæ, Enulæ, Phu, Ireos, Acori ueri, Dictamni, Glycyrrhizæ, Pæoniæ, Spicæ Ind. ana ʒ. j. Corticis Citri, Arantiorum ana ʒ. j.

Saluiæ, Maioranæ, Lauendulæ, Rorismarini, Hyssopi, Menthæ, Betonicæ, Fol. Lauri ana P. j.

Hæc omnia contundantur, & incidantur secundum artem: projiciantur in bociam uitream perlutatam, aut bociam cupream, unâ cum distillato iam terebinthinæ oleo: hisq; omnibus affunde aquam anisi, aut caryophyllorum, aut postremam illam in cinnamomi distillatione, ita ut repleatur quasi bociam. Deinde huic capitellum impone, & iuncturam luto obline. Tum exiccato igne fiat distillatio eo modo, quo anisum, aut aqua cinnamomi, transeunte ca-

Kk nali per

nali per aquam, distillatur. Quo facto, hoc est, ubi aqua ascenderit, auferantur **A** tur fæces herbarum, florum, & radicum: & denuò in bociam immittatur styracis liquidæ \mathfrak{z} . iij. eiq; affunde, quicquid proxima distillatione extraxeris: & rursus distilletur ut prius. Quòd si aqua prioris distillationis, in quantitate fuerit imminuta, plus erit affundendum. Vbi iam secùdò ita distillatio fuerit peracta, bocia rursus mundetur, & imponantur

Styracis calamitæ, Myrrhæ ana \mathfrak{z} . \mathfrak{ij} .

Masticis, Thuris, Assæ dulcis ana \mathfrak{z} . \mathfrak{j} . β .

Quibus pulverizatis, & impositis, affundatur iam distillatum oleù & aqua. Si non sufficiant, adde aquam, ut suprâ, donec satis uidebitur, & fiat distillatio, ut suprâ de herbis dictum. Quo facto, auferatur quæ in bociæ fundo fuerint, & sequentia in locum reponantur. Notandum tamen hoc obiter, quòd nonnulli styracem liquidam simul cum gummis iam dictis commiscent, ut peculiari distillatione non sit opus. Sunt autem hæ species:

\mathfrak{R} . Zingiberis, Zedoariæ, Galangæ ana \mathfrak{z} . \mathfrak{ij} .

Rhabarbari \mathfrak{z} . β .

Gentianæ, Cubebarum ana \mathfrak{z} . \mathfrak{j} . β .

Croci \mathfrak{z} . β .

Cinnamomi \mathfrak{z} . \mathfrak{j} .

Nucis moschatæ, Macis, Caryophyllorum ana \mathfrak{z} . \mathfrak{vj} .

Calami odorati \mathfrak{z} . β .

Puluerizentur, & cucurbitæ imponantur, unâ cum oleo & aqua postremæ separationis, & distillentur ut prima uice. Quo sic peracto, separa oleum ab aqua, & serua oleum balsami in uitro. * Vim habet confortandi omnes neruos & exangues partes, quales sunt stomachus, intestina, uesica, uterus. Peculiariter stranguriæ admodum confert, & calculosis, si de eo octo uel decem guttæ, in aqua filicis, aut uino bibantur. Omnes internas oppilationes aperit, sanitatem præsentem tuetur in statu, qualibet septimana bis, manè aliquot guttæ in brodio sumptæ. Iohannes Mag.

Balsamum magistrale.

\mathfrak{R} . Terebinthinæ \mathfrak{lb} . \mathfrak{j} .

Olei ueteris \mathfrak{z} . \mathfrak{vj} .

Olei laurini \mathfrak{z} . \mathfrak{iiij} .

Cinnamomi, Spicæ nardi \mathfrak{z} . \mathfrak{ij} .

Tegularum recentium bene coctarum \mathfrak{z} . \mathfrak{viiij} .

Tritis triturandis, per alembicum distilla. * Vrinam mouet, lapidem frangit, uermes enecat, aurium tinnitui à flatu crasso, paralyti, spasmo cynico, ischiadi, gonagræ, podagræ, & cæterarum iuncturarum doloribus prodest, potum aut inunctum: sed parua eius portio, aquæ affectui aptæ mista bibatur. Medici Florentini.

Oleum

A

Oleum balsami.

℞. Myrrhæ, Aloes, Spicæ nardi, Sanguinis draconis, Thuris, Mumia, Opopanacis, Carpobalsami, Bdellij, Ammoniacy, Sarcocollæ, Croci, Masticis, Gummi Arabici, Styracis liquidæ ana ʒ. ij.

Ladani, Castorei ana ʒ. ʒ. β.

Moschi ʒ. β.

Terebinthinæ ad pondus omnium Tritis conterendis, miscentur omnia, & alembico distillantur secundum artem. * Eadem potest, quæ præscripta, & efficacius. Petrus Aponensis.

Aliud simile.

℞. Rad. Angelicæ, Chamæleonis albi, Valerianæ, Chelidonij, Enulæ, Cichorij ana ʒ. j. β.

Herb. Chelidonij, Melissæ, Adianti, Chamædryos, Maioranæ, Verbenæ, Rorismarini, Saluæ, Chamæpityos, Menthæ, Hyssopi, Stæchados, Fol. Lauri ana P. j.

Flor. Verbasci, Hyperici, Centaurij min. Violarum lutearum, Betonicæ, Chamomillæ, Nardi Celticæ, Flor. Rosarum ana P. j.

Sem. Anisi, Ocymi, Card. benedicti, Pæoniæ ana ʒ. j.

Baccarum iuniperi, Cort. Citri ana ʒ. β.

B Omnia inciduntur, & mixta induntur ampullæ, maceraturq; ex olei & resina abiegna libra una, uncijs quatuor: aquæ cinnamomi stillatitiæ libris quatuor: deinde distillantur ut oleum & semine anisi. postea

℞. Styracis liquidæ ʒ. iiij.

Styracis calamitæ, Myrrhæ ana ʒ. ij.

Thuris, Masticis, Laseris ana ʒ. j. β.

Hæc liquore superiore stillatitio perfunduntur, urgenturq; ex ampulla. Tū

℞. Rhabarbari ʒ. j.

Gentianæ ʒ. iiij.

Zedoariæ, Galangæ ana ʒ. ij.

Cinnamomi ʒ. j.

Nucis Moschatæ, Caryophyllorum ana ʒ. ʒ. j.

Cubebarum ʒ. iiij.

Croci ʒ. β.

Hæc conteruntur, imponunturq; ampullæ mundatæ, & oleo distillato permixta, iterum per operculum euocantur, tandem separata aqua, oleum recoditur uasi. * Dantur guttæ sex uel octo, ex iure. manè aut uesperis: in colicis, n ephriticisq; doloribus cochlearis dimidij instar ex uino generoso, uel olei amygdalarum amararum uel dulcium recentis uncijs tribus, interdū uomitum mouet: qui si, admoto ouo collo sub mento, impediatur, aluum aliquoties ducit: uertigine, neruorum resolutione infestatis cochlear ex aquæ uitæ

Kk 2

femuncia,

femuncia, cum guttis aliquot liquoris chalcāthini exhibetur utiliter. humo- **A**
res namq; resoluit, & per narium meatus expellit: membrum autem resolu-
tum balsamo perfricatur: hinc si cutis exulceretur, adipe taxi eam inungere
prodest. In renum & uesicæ calculo guttæ octo aut decem ex aqua raphani
propinantur, dum æger in seſſu fouetur. *Andernacus.*

Balsamum Romæ factum.

℞. Terebinthinæ ʒ. β.

Olibani ʒ. vj.

Aloes succo Citrini, Masticis, Galangæ, Cinnamomi, Croci, Nucis mos-
chatae, Caryophyllorum, Cubearum ana ʒ. j.

Gummi hederæ ʒ. ij.

Puluerizentur, & misceantur cum terebinthina, exponantur in alembico vi-
treo: & addantur

Caphuræ, Ambrę griseę ana ʒ. ij.

& destillentur lento igne. Prima aqua est alba & clara, & uinum balsami: se-
cunda crocea, & uocatur oleum: tertia magis crocea, & est balsamum uerum.
Euonymus.

Balsamum aliud.

℞. Terebinthinæ lb. j.

Mellis puri lb. β.

Aquæ uitæ lb. ij.

Ligni aloes triti, Santalorum omnium ana ʒ. iij.

Olibani, Gummi hederæ, Osis de corde cerui, Zedoariæ, Piperis longi
ana ʒ. iij.

Gummi Arabici ʒ. j.

Nucis moschatae, Galangæ, Cubearum, Cinnamomi, Carui, Masticis, Ca-
ryophyllorum, Spicæ nardi, Croci, Zingiberis ana ʒ. iij. ʒ. j.

Moschi fini, pondus denarij.

Destillentur, ut lento igne elicias primam aquam, quæ clara est, ut aqua fon-
tis: secunda erit ignita, ut carbo: & tum auge ignem, & tertia elicetur nigra.

* Reuiuiscere & iuuenescere facit. *Euonymus.*

Balsamum aliud.

℞. Terebinthinę abiegnę ʒ. xvij.

Cerę optimę ʒ. xij.

Cinerum uitis ʒ. vj.

Ponantur singula in retortam lutatam, distillentur in cineribus, donec nihil
amplius sequatur. Vbi distillatio fuerit finita, uidebis cerâ circa retortę col-
lum: & hoc ipsum signum est finitæ distillationis. Quod si distillarit, seruetur
in uitro diligentissimè clauso. * Iuuentutem conseruat, si quis bis in mense
hoc

A hoc oleo fuerit inunctus: omnia imposita à corruptione aut putredine custo-
dit. Vulnèra qualiacūq; ter quaterq; eo illita sanat. Cui urina fuerit retenta,
drachmæ duę datę per os, urinā puocat: & simili modo datur cōtra uermes,
puncturas lateris, tussim, catarrhū, febres pestilētes, & similia. Fiorauantus.

Balsamum aliud.

℞. Terebinthinæ ʒ.iiij.

Thuris ʒ.β.

Ligni aloes ʒ.ij.

Masticis, Caryophyllorum, Galangæ, Cinnamomi, Zedoariæ, Nucis mo-
schatę, Cubebarum ana ʒ.ij.

Gummi Elemi ʒ. j.β.

Misce, & distilla secundum artem. * Leporam curat intrā & extrā sumptū: &
multos alios morbos incurabiles, ut cancrū & fistulas, &c. Euonymus à quo-
dam empirico.

Balsamum aliud.

℞. Terebinthinæ ℥.ij.

Myrrhæ, Castorei, Masticis ana ʒ.iiij.

Olibani, Aloes succo citrini ana ʒ.iiij.

Rad. Consolidæ minor. ʒ. j.

B Tormentillæ, Gummi hederæ, Nucis Indicæ, Zedoariæ ana ʒ.β.

Cubebarum ʒ. j.

Macerentur ad ignem lentum per biduum: deinde distillantur. * Vulnèra
curat, cum linteo impositum, febres, uentriculum infra costas tumentem,
asthmaticos, phthysicos, tumores. Contusiones sedat, spasmus & paralyfim
ex frigore, moribundos data gutta recreat. Euonymus à quodam Anglo.

Balsamum aliud.

℞. Galbani ℥. j.

Gummi hederæ ʒ.iiij.

Minutim conterantur, & misceantur terendo simul, & mittantur in bociam
uitreatam, cum suo alembico, & distillantur in balneo Mariæ: hoc distillatū
commisce cum

Olei Laurini ʒ. j.

Terebinthinæ ℥. j.

Distillantur, & aqua ab oleo separetur. * Mirabilissimæ uirtutis est in tre-
moribus, paralyfi. Vfus est, ut collocetur patiens paralyfim, contractionem,
spasimū, & tremorē, resupinus, & infunde de hoc oleo calido tēperatē in fun-
do umbilici sui: & uidebis mirabilissimā operationē, potius diuinā quàm na-
turalem: & confert ualde paralyfi post colicam. Euonymus.

Balsamum aliud.

℞. Ligni aloes ʒ. j.

Kk 3 Opopana-

Opopanacis, Resinæ pineæ, Bdellij, Galbani, Myrrhæ, Masticis, Sarcocol
læ ana \mathfrak{z} . β .

Olei benedicti \mathfrak{z} .j. β .

Ladani \mathfrak{z} .j.

Carpobalsami, Xylobalsami, Opobalsami ana \mathfrak{z} . β .

Olibani, Daphnelæi, Sanguinis drac. Castorei, Spicæ nardi, Galangæ, Cu-
bebarum, Maceris, Cinnamomi, Cardamomi, Melicetorum, Corticum Ci-
tri ana \mathfrak{z} . β .

Olei terebinthinæ ad pondus omnium.

Olei ueteris \mathfrak{lb} .j. β .

Pistentur gummi subtiliter: deinde superfunde tatum uini adusti, ut alia ob-
ruat, aut obtogat: postea ponatur in balneo Mariæ per triduum ad digerendū:
post reliqua adde. puluerizanda puluerizentur: & addito oleo terebin-
thinæ, & oleo communi, iterū digerantur in balneo, uel in fino equino per
dies quatuordecim: demū distillentur in cineribus igne lento, secundū artē.
* Preciosissimum est ad paralytim, & alia permulta. Leonellus.

Balsamum ad morbos diuersos.

\mathfrak{z} . Vini albi optimi mens. ij. β .

Lactis recentis \mathfrak{z} . iij.

Mellis \mathfrak{z} . viij.

Rad. Gentianæ \mathfrak{z} . viij.

Astrantiæ \mathfrak{z} . iij.

Angelicæ \mathfrak{z} . ij.

Baccarum Lauri \mathfrak{z} . j. β .

Rutzæ, Iuniperi, Ros. rubrarum ana M. j.

Enulæ campanæ \mathfrak{z} . j.

Caryophyllorum, Cort. Citri, Calami aromatici, Cinnamomi, Anisi, Fœni-
culi, Masticis, Belzoini ana \mathfrak{z} . β .

Concisa & contrita macerentur in phiala uel phialis uitreis, lutatis, per dies
7. uel 8. loco calido. Deinde distillentur cum alembico lutato: cucurbitæ
pars tertia aut amplius uacua sit. Distillentur in cinerib. cribratis lento igne:
demū augeatur ignis. Puto tamē in alio uase, seorsim & primò uinū & lac si-
mul distillanda. Ex hac distillatione tres quoq; liquores colliguntur. * Va-
let contra uenena, pestem, calculum, quartanam, quotidianam, ad sudorem
mouendum, &c. ad asthma, & uiscerum obstructions, ad omnes phlegmati-
cos, ad epilepsiam quoque, & præseruandum ab apoplexia. Pro conficien-
da theriaca non incommodè substitui potest. Gesnerus.

Balsamum aliud.

\mathfrak{z} . Thuris, Masticis ana \mathfrak{z} ij.

Ligni

- A** Ligni aloes ꝑ. j.
 Caryophyllorum, Galangæ, Cinnamomi, Zedoariæ, Nucis moschatae ana ꝑ. vj.
 Cubebarum, Myrrhæ, Aloes, Ladani, Sarcocollæ, Castorei ana ꝑ. ß.
 Baccarum Lauri, Nucleorum Pini ana ꝑ. j.
 Gummi Elemi, Opopanacis, Belzoini ana ꝑ. ij.
 Succu Iuæ, Herbæ paralyfis ana ꝑ. iij.
 Terebinthinæ ad pondus omnium.
 Exhibit primò aqua, secundò oleosum quid, tertio quasi mel. Hollerius.

Balsamum mumie.

Pars humani corporis incisa, ex oliuarũ oleo per mensem digeri finitur: deinde ampullæ incuruatæ imponitur, separaturq;: postea huius liquoris libra j.

Theriacæ optimæ ꝑ. vj.

Moschi ꝑ. j.

miscentur, maceranturq; diebus triginta: atque tunc theriaca è mumia præstantissima provenit. * Huius uncia ex oleo amygdalarum feliciter datur ijs, qui uenenum hauserunt, aut peste correpti sunt, sicut in lecto sudant:

- B** laterum inflammationibus, abscessibus, carbunculo, & similibus medetur: ad uenena præcauendâ, manè drachmæ unius pondere sumitur. Andernacus ex Paracello.

Balsamum Christi.

ꝙ. Olei oliuarum lb. j.

Vini nigerrimi pontici lb. iij.

Distilla: deinde adde

Hypericonis ꝑ. vj.

Liquoris de mumia ꝑ. iij.

Iterum distilla ad mensem, & serua. * Valet articulorum uulneribus. Paracellus.

Balsamum ad uulnera.

ꝙ. Galbani, Ammoniâci, Masticis, Myrrhæ, Gummi Elemi, Bdellij ana ꝑ. ß.

Terebinthinæ ꝑ. j. ß. uel ꝑ. ij.

Olei oliuarum lb. ij.

Viridis æris ꝑ. ij. ß.

Puluerizentur omnia, & imbibantur in aceto fortissimo per sex uel octo dies: post distillantur per alembicum, prima die per balneum Mariæ, post per arenam: & si uis fortius habere, & melioris saporis, tum adde subscripta, & fiat eo modo, quo supra.

ꝙ. Stora.

℞. Storacis calamitæ, Gummi hederæ, Spicæ nardi, Carabæ, Colophonie, A
Tragacanthæ, Serapini, Opopanacis ana ʒ.β.

Euphorbij ʒ.β.

Viridis æris ʒ. iij.

Terebinthinæ lb. j.

* Curat omnia uulnera antiqua in causa frigida & calida. Valet etiam contra ariditatem membrorum, & contractionē, si hoc fuerint inuncta. Euonymus.

Aliud.

℞. Galbani ʒ.β.

Gummi hederæ ʒ. v.

Terito, & alembico distillato, & cum lb. j. sebesten cōmista denuō distillato.

* Expertum est ad neruorum mollificationem, seu paralyfin, & ipsorum contractionem, spasmumq̄, morbum comitalem, uel epilepsiam, tremorem, omnemq̄; morbum frigidum: memoriam etiam auget, atq; intellectum, si occupat, ceruixq; somni tempore, eius momento liniatur. Fumanellus.

Balsamum, seu oleum benedictum.

℞. Olei abietis lb. j.

Albuminis ouorum ad duritiem coctorum lb. j.

Resinæ pini ʒ. vj.

Gummi Elemi ʒ. ij.

Ponantur omnia simul in retorta perlutata, & fiat in sineribus distillatio, B
quæ horis triginta sex perficitur. * In uulneribus contusis, maximè capitis, ualet. Fallopius.

Aliud.

℞. Terebinthinæ claræ lb. j.β.

Ceræ flauæ lb. j.

Nucis moschatæ, Caryophyllorum ana ʒ. j.

Cineris communis ʒ. vj.

Ponantur simul in retortam lutatam, & fiat lento igne distillatio. Post distillationem ponatur in boccia cum capitello & recipiente: eiq; impone de lateribus tortis ʒ. iij. & rursus distilla: & habebis oleum coloris rubini. * Mirabile est in uulneribus neruorum: curat omnes catarrhos frigidos: prodest tussientibus, pectori inunctum, &c. Fallopius.

Aliud.

℞. Galbani lb.β.

Gummi hederæ ʒ. iij.

Terantur & misceantur simul, & in uase distillationis ponantur: & aquam & oleum, quæ inde distillauerint, collige, & misce ea cum

Olei Laurini ʒ. j.

Terebinthinæ lb. j.

& iterum

A & iterum distilla oleum, & aquam: deinde separa oleum ab aqua, & serua.
* Confert paralyticis, resolutis, surditati, memoriæ, &c. Arnoldus Villanou.

Aliud.

℞. Terebinthinæ claræ lb. ʒ.
Olei lini lb. j.
Resinæ pini ʒ. vj.
Thuris, Myrrhæ, Aloës, Masticis, Sarcocollæ ana ʒ. ij.
Macis, Croci, Ligni aloës ana ʒ. ij.

Ponantur hæc omnia in retortam, distillentur primò lentissimo igne, & exhibit aqua clara: paulo post uerò sequetur oleum rubicundum: tum augmenta ignem semper magis inagisq; intendendo, ad finem distillationis. Quo factò, separa oleum ab aqua, & utrumq; seorsim serua. Aqua succedente tempore rubescit, & oleum acquirit rubini colorem. * Oleum ualet uulneribus, præcipuè uerò partium neruofarum, ofsium, uenarum: citò enim & sine dolore consolidat. Fallopius.

Aliud.

℞. Terebinthinæ lb. j.
Thuris, Masticis, Myrrhæ, Sarcocollæ ana ʒ. j.
Aquæ uitæ ʒ. viij.


B Ponantur omnia in retortam lutatam, & distillentur in cineribus: & oleum ab aqua separa. * Curat & consolidat breuissimo tēpore sine dolore omnia uulnera, præsertim capitis, claudendo eo uulnus, & in superficie imponendo, &c. Idem Fallopius.

DE PVLVERIBVS CAP. XX

PVLVRES Arabibus Suffus dicuntur. Quòd si puluis ex uarijs aromaticis rebus (quas Species peculiariter uocât) constet, Tragea dicitur, siue illa sit crassius, siue tenuius trita. Differunt Species & Pulueres, sicut compositum & simplex. Sunt enim species, pulueres compositorum medicaminum mixti, sed nondum humida aliqua materia uniti. Cæterùm *Vide signum 22*


LI

Puluerum



A

A. Pulveres qui extrinsecus applicantur, ex naribus commiscetur medicamentis simplicibus: atque vel alterantibus qualitate



452 DE PVLVERIB. INTRINSECVS SVMEND.

DE PVLVERIBVS CALFACIENTI
bus & siccantibus caput.

A

℞. Cranei ℥.iiii.
Cineris cuculi, hirundinis ana ℥.ij.
Cineris priapi tauri, uel Castorei ℥.β.
Galangæ ℥.β.
Sacchari, quantum satis est.
Misce, & fiat puluis. * Detur manè sorbendo parum uini albi diluti aqua be-
tonicæ uel gallitrici. Rondeletius.

DE PVLVERIBVS CALFACIEN-
tibus cor.

Puluis contra pestem.

℞. Rad. Tormentillæ, Dictamni, Tunicis, Scabiosæ, Rad. Buglos. ana ℥.β.
Sem. Citri, Acetosæ ana ℥.β.
Coriandri præparati ℥.ij.
Rosarum rubrarum ℥.j.
Sem. Portulacæ ℥.ij.
Rasuræ Eboris ℥.ij.
Coralli albi, rubri ana ℥.j.β.
Terræ sigillatæ ℥.β.
Boli Armeni ℥.ij.
Misce, & fiat puluis.

B

Puluis bezoarticus.

℞. Boli Armeni ℥.ij.
Rosarum rubrarum ℥.j.
Seminis Acetosæ, Citri mundati, Cornu cerui usti, Sem. Rutæ, Doronici
Romani, Carabæ, Sem. Cardui benedicti ana ℥.iiij.
Coralli utriusq;, Ligni aloës, Serici crudi, Omnium Santalorum, Marga-
ritarum perforat. Osis cordis cernui ana ℥.j.
Spec. diamarg. frigid. Tormentillæ, Dictamni, Tunicis, Scabiosæ, Corian-
dri, Terræ sigillatæ ana ℥.ij.
Caphuræ ℥.ij. Ambre ℥.ij.
Crocii G. xv. Moschi ℥.iiij.
Fiat puluis. Mesues.

DE PVLVERIBVS CALFACIENTIBVS COR.

Puluis electuarij de bolo.

℞. Santalorum omnium, Galangæ, Ligni aloës, Cinnamomi, Coralli ru-
bri, Rosarum rubrarum, Sem. Melonum ana ℥.β.

Radiciis

- A** Radicis Tunicis, Tormentillę ana ʒ. iij.
 Rafurę Eboris, Cornu cerui ana ʒ. ʒ.
 Nucis moschatę n. j.
 Maceris, Cubebarum ana ʒ. j.
 Anisi, Marathri, Zingiberis ana ʒ. xv.
 Sem. Acetofę, Citri, Iuniperi, Coti, Caryophyllorum ana ʒ. ʒ.
 Boli Armeni ʒ. ij.
 Fiat puluis. * Dosis ad pestem Boli Armeni ʒ. ij. cum aqua rosarum ʒ. ij.
 Vini ʒ. ʒ.

DE PVLVERIBVS CALFACIENTIBVS
 stomachum.

Tragema ad stomachum frigidum corroborandum.

- R.** Coriandri præparati, uno operculo obducti, Anisi, Fęniculi, Carui,
 Maceris ana ʒ. ij. ʒ.
 Cinnamomi ʒ. j. ʒ.
 Zingiberis albi ʒ. j.
 Caryophyllorum ʒ. ij.
 Nucis moschatę ʒ. j.
B Omnia crassiore modo incidantur, misceanturq; : unde uulgò puluis grossus dicitur. Andernacus.

Aliud.

- R.** Sem. Anisi, Ameos ana ʒ. ij.
 Coriandri præparati, & simplici operculo obducti ʒ. j.
 Cort. Citri præparati ʒ. iij.
 Cinnamomi, Maceris, Iunci odorati ana ʒ. ij.
 Incidantur omnia, misceanturq; : & cochleare unum ex eis à cibo sumatur. Andernacus.

Aliud.

- R.** Sem. Anisi, Fęniculi, Coriandri ana saccharo obductorum ʒ. ij.
 Seminis Carui confecti ʒ. j.
 Glycyrrhizę purgatę ʒ. ij. ʒ.
 Zingiberis, Calami aromatici ana ʒ. iij.
 Galangę, Nucis moschatę ana ʒ. j. ʒ.
 Caryophyllorum ʒ. j.
 Omnia, exceptis seminibus, crassiore incidantur modo, misceanturq; .
 Andernacus.

Puluis seu species imperiales.

- R.** Cinnamomi electi, Zingiberis ana ʒ. ij.

LI 3

Macis,

454 DE PVLVERIB. INTRINSECVS SVMEND.

Macis, Galangæ, Nucis moschatæ, Cardamomi, Granorum paradisi, Pi- A
peris longi ana ʒ. j.

Calami aromatici ʒ. j.

Cubebæ, Caryophyllorum incisorum ana ʒ. ʒ.

Fiat puluis.

Puluis ad iuuandam concoctionem.

℞. Anisi conditi ʒ. ij.

Galangæ, Cinnamomi ana ʒ. iij.

Piperis longi ʒ. ʒ.

Cort. Citri sicci ʒ. j.

Sacchari solidi ad pondus omnium.

Fiat puluis, qui sumi possit interdum ante, interdum post cibum, frequen-
tius tamen antè, quàm post. Rondeletius.

Tragea grossa pro stomacho, incisa.

℞. Calami aromatici, Glycyrrhizæ, Gentianæ ana ʒ. iij.

Rad. Tormentillæ, Zedoariæ, Granorum paradisi, Galangæ ana ʒ. j.

Zingiberis, Nucis moschatæ, Piperis longi ana ʒ. ʒ.

Cinnamomi, Caryophyllorum ana ʒ. vj.

Sem. Anisi, Fœniculi, Carui, Coriandri præparati ana ʒ. j.

Incisis incidendis fiat puluis, & misce. Medici Colonientes.

Puluis aduersus flatus, magistralis.

℞. Coriandri præparati, Anisi purgati ana ʒ. ij.

Cinnamomi ʒ. ij.

Caryophyllorum ʒ. j.

Macis ʒ. ʒ.

Sacchari optimi ʒ. iij.

Misce, & fiat puluis tenuissimus. Medici Florentini.

Alius ad idem, magistralis.

℞. Cinnamomi electi ʒ. j.

Zingiberis ʒ. ʒ.

✓ Cymini, Piperis, Galangæ, Caryophyllorum ana ʒ. ij.

Sacchari optimi lb. j.

Fiat puluis tenuissimus. Medici Florentini.

Alius similis magistralis.

℞. Cinnamomi ʒ. j. ʒ.

Zingiberis ʒ. j.

Macis ʒ. ʒ.

Nucis moschatæ G. viij.

Sacchari albi ʒ. ij.

Fiat

¶ Fiat puluis tenuissimus. Florentini.

Puluis aromatum.

℞. Anisi aur. xij.

Sem. Fœniculi aur. iiij.

Glycyrrhizæ, Zingiberis ana aur. iiij.

Caryophyll. Macis, Cinnamomi electi, Galâgæ, Gallæ moschatæ ana aur. ij.

Ligni aloës, Cort. Citri ana aur. j. β.

Moschi boni ʒ. j. quartam.

Sacchari albi ad pondus omnium.

Sacchari candefacti, dimidium pondus omnium.

* Ventriculum roborat, coctionem iuuat, flatus dissoluit, halitus gratiam commendat. Dantur aur. ij. cum uino bono. Mesues.

DE PVLVERIBVS EXCALFACIENTI
bus hepar.

Tragema ad hydropem & cachexiam.

℞. Intestinorum gallinæ, cum interna uentriculi tunica, à carne separata,
& uino albo abluta ℥. j.

Vrantur in furno: deinde uino albo, & aqua absinthij extinguantur: pro qua-
libet uncia ponatur.

℞ Galangæ, Cinnamomi ana ʒ. j.

Sacchari ros. tab. ʒ. ij.

Misce, & fiat puluis. * Datur manè ante pastum, ut uentriculum exiccet.
Rondeletius.

DE PVLVERIBVS REFRIGERANTI
bus uentriculum.

Tragema stomachum refrigerans & corroborans.

℞. Spec. Triandali, Diatrag. frig. ana ʒ. j.

Rosarum rubr. sicc. Coriandri præparati, Coral. rub. ana ʒ. j.

Sem. Portulacæ ʒ. β.

Sacchari ros. tab. ʒ. iiij.

Misce, & fiat puluis subtilissimus.

DE PVLVERIBVS REFRIGERAN
tibus hepar.

Tragema hepar refrigerans, corroborans &c.

℞. Spec. Diarrhod. Abb. Tria santali ana ʒ. j. β.

Sem. Endiuæ, Cichorij ana ʒ. j.

Sem. Melonum, Citrulli, Cucurbitæ ana ʒ. j. β.

Rosar. rubrarum ʒ. β.

Santalorum

456 DE PVLVERIB. INTRINSECVS SVMEND.

Santalorum omnium ana ʒ. j.
Sacchari albisimi ʒ. v.
Misce, & fiat tragema. Fuchsius.

A

DE PVLVERIBVS ASTRINGENTIBVS.

Puluis ad constringendum os superius uentriculi.

℞. Coriandri præparati ʒ. ij.
Coralli rub. usti & loti ʒ. β.
Anisi ʒ. ij.
Ros. rubr. Cort. Citri sicci, Carnium Cytoniorum, uel Sorborum, uel Pi-
rorum agrestium, exiccatorum, uel pul. Diacitoniten ana ʒ. j.
Sacchari ros. tab. quantum sufficit.
Misce, & fiat puluis. * Valet in affectibus cerebri per consensum uentriculi,
& in uomitu facto à nimia relaxatione uentriculi. Rondeletius.

Tragema ad uomitum & uentris fluxum.

℞. Carnis Cytoniorum exiccatorum ʒ. j.
Coralli rubri ʒ. β.
Cort. Citri sicci, Sem. Vuarum, uel Flor. Lambruscæ ana ʒ. ij.
Cinnamomi crassi ʒ. j. β.
Ros. rubr. P. j.
Sacchari ros. tab. quantum sufficit.

B

Misce, & fiat tragema. * Ad fluxum uentris sumitur per dimidiam horam
ante pastum. Ad uomitum uero post cibum: neq; superbibi debet quicquam,
neq; in cibo liquido sumendus est puluis. Rondeletius.

DE PVLVERIBVS MENSES MOVENTIBVS.

Puluis ad mensium prouocationem.

℞. Myrrhæ, Cinnamomi ana ʒ. j.
Sabinæ ʒ. β.
Sem. Apij, Petroselini, Spicæ nardi, Squinanthi, Afari ana ʒ. j.
Misce, & fiat puluis. * Capiat ʒ. j. cum succo eryngij. Rondeletius.

DE PVLVERIBVS MOVENTIBVS VRINAM.

Puluis urinas mouens.

℞. Gummi prunorum, Carabæ, Cineris cancrorum ana ʒ. j.
Seminis Apij, Petroselini, Alkekengi ana ʒ. β.
Cinnamomi, Squinanthi, Afari ana ʒ. ij.
Misce, & fiat puluis tenuissimus. * Sumatur manè cochlear unum superbi-
bendo cyathum uini albi, uel ex aquis prouocantibus urinas: quales sunt a
qua graminis & asparagi. Rondeletius.

DE PVL-

A DE PVLVERIBVS CONSOLIDANTIBVS.

Tragma ad pulmones exulceratos.

℞. Cineris cancrorum, Priapi tauri, in aqua ros. lotorum ana ʒ. ij.
 Boli Armeni, Terræ sigillatæ, Gûmi Tragacanthi, Gûmi Arabici ana ʒ. j.
 Sem. Papaueris albi, Quat. sem. frig. maior. incisorum ana ʒ. j.
 Glycyrrhizæ ras. ʒ. ij.
 Sacchari ros. tab. ad pondus omnium.

Penidiarum ʒ. j.

Misce, & fiat puluis. * Capiat cū lacte asinæ, aut capræ, aut uaccæ. Rô deletius.
puluis contra casum.

℞. Mumizæ, Scabiosæ, Pilosellæ, Hyperici ana ʒ. ʒ.

Costi dulcis, amari, Nucis moschatæ ana ʒ. j. ʒ.

Terræ sigillatæ, Boli Armeni ana ʒ. iij.

Rubizæ tinctorum, Rhapontici, Sem. Nigellæ ana ʒ. vj.

Rhabarbari, Spermatis certi ana ʒ. ij.

Trochiscorum de agarico, cum sale gemmæ præparatorum, Cymini præparati ana ʒ. j.

Fiat omnium puluis. Ioannes de Thenis.

B DE PVLVERIBVS SEDANTIBVS DOLOREM.

Puluis sedans dolorem ad suppositoria.

℞. Cymini, Rutæ, Castorij, Opij ana ʒ. j.

Misce, & fiat puluis, qui melle excipiat. Florentini.

DE PVLVERIBVS PURGANTIBVS BILEM.

Puluis rhabarbari.

℞. Rhabarbari electi ʒ. ij.

Spicæ Indicæ, Masticis ana G. vj.

Sacchari ʒ. ij.

Misceantur, fiatq; puluis. * Bilem flauam purgat. Fuchsius.

Puluis alius, leniter purgans.

℞. Pulueris Violarum purpurearum ʒ. j.

Ex iure pisorum rubrorum modicè coctorum, tutò ad aluum adstrictâ exhibitur pueris, grauidis & imbecillis. Andernacus.

Alius.

℞. Senæ mundatæ, Violarum purpurearum ana ʒ. ʒ.

Glycyrrhizæ rasæ, Zingiberis ana ʒ. j.

Tartari ʒ. ʒ.

Singula in puluerè redigâtur misceanturq;, & ex iusculo sumâtur. Aterna.

Alius.

℞. Rhabarbari, Diagridij ana ʒ. iij.

Mm Zingiberis

458 DE PVLVERIBVS INTRINS. SVMENDIS.

℞. Zingiberis ʒ.β.

Sacchari electi ʒ.ʒ.

Fiat puluis. Ex hoc quoq; tenues placentulæ seu pastilli cõfici possunt, addendo tritici pollinem & aquam rosarum. Fumanellus.

DE PVLVERIBVS PVRGANTI-
bus pituitam.

Puluis è turbitih magistralis.

℞. Turbitih boni ʒ.ʒ.

Zingiberis albi ʒ.ij.

Hermodactylorum ʒ.β.

Sacchari albi ʒ.β.

Fiat puluis. * Pituitam purgat. Florentini.

Alius.

℞. Zingiberis albi, Masticis, Turbitih electi ana ʒ.ʒ.

Sacchari ʒ. xxx.

Trita misceantur. * Purgat humores phlegmaticos: datur pueris, mulieribus, senibus, & humidis, delicatis, & ociosis. Auicenna.

DE PVLVERIBVS PVRGANTIBVS BL-
lem atram.

Puluis senæ preparata.

℞. Fol. Senæ ʒ.ʒ.β.

Zingiberis, Macis ana ʒ.ij.

Cinnamomi, Tartari ana ʒ.ʒ.β.

Terantur tenuissimè. * Purgat caput mirabiliter. Montagnanus.

DE PVLVERIBVS PVRGANTI-
bus aquam.

Puluis ad hydropem.

℞. Pulueris foliorum Soldanellæ ʒ.ʒ.β.

Senæ ʒ.ij.

Turpeti, uel Rhabarbari ʒ.ʒ.

Sacchari ʒ.ʒ.

Misce, & fiat puluis. Erastus.

Alius eiusdem, pro mulieribus.

℞. Turpeti ʒ.ʒ.

Rhabarbari ʒ.β.

Soldanellæ ʒ.ij.

Zingiberis, Sacchari ana ʒ.ʒ.

Fiat puluis.

DE

A DE PVLVERIBVS PURGANTIBVS
humores mixtos.*Puluis laxatiuus magistralis.*

℞ Turbith ʒ. j.

Zingiberis, Cinnamomi, Masticis, Galangæ, Cardamomi, Caryophyllo-
rum, Anisi, Hermodactylorum, Scammonij præparati ana ʒ. β.

Fol. Senæ ʒ. ij.

Sacchari albi ʒ. iiij.

Terantur omnia, & commisceantur.

Alius.

℞ Senæ ʒ. ix.

Diagridij ʒ. j. β.

Salis Indi ʒ. β.

Fæcum uini ʒ. iiij.

Maceris ʒ. iiij.

Cinnamomi ʒ. j. β.

Misce, & fiat puluis. * Humores melancholicos & adustos purgat, nec non
B pituitam & flauam bilem. Trincauellus.*Puluis passauant.*

℞ Flor. Borriginis, Violarum ana ʒ. ij.

Zingiberis, Spicæ nardi ana ʒ. j.

Glycyrrhizæ, Anisi ana ʒ. ij.

Diagridij ʒ. iiij.

Rhabarbari electi ʒ. vj.

Turbith gummosi ʒ. j.

Senæ ʒ. ij.

Misce, & fiat puluis. Colonienses.

Laudanum mercuriale.

Hydrargyrum ex lixiuio coquitur, purgaturq; cum sale, aceto, & aqua, usq;
dum crystalli instar pelluceat: deinde cum chalcanti in calcem redacti, &
salis nitri pari pondere miscetur, excipitur aceto stillatitio fortissimo, & pi-
stillo ligneo diligenter subigitur: mox uasi inditur, & in altum euehitur, ut
ars docet: postea eodem modo per alumen in calcem reductum, & sale
nitri eleuatur: atque tunc euacuationis magisterium maximum prouenit.
Hoc tandem detritum uino optimè distillato perfunditur, digeriturque uase
diligenter obserato: hinc uinum extillatur, donec in fundo olei albissi-
mi instar remaneat: deinde exiccatur, teriturque, & supra marmor

Mm 2 in loco

460 DE PVLVERIBVS INTRINS. SVMENDIS.

in loco liquido liquefcere finitur: postremò exiccatum uitro conditur in u. A
 fum: atque sic metallorum Theriaca præstantissima absoluta est: cuius gra-
 num unicum ex Mithridatio uel Theriaca optima, uel præclaro uino exhibe-
 tur. Andernacus.

Hydrargyrum metallorum.

Liquor hydrargyri exiccatur: deinde cum chalcantio in humorem reda-
 ctum imbuitur: eaq; ratione, qua sæcularum uini exiccatarum spiritus solet,
 abstrahitur tandiu, dum corallij instar rubescat. * Datur grani pondere ex
 Theriaca uel Mithridatio: idq; pro ægri ac morbi ratione. Andernacus ex
 Paracelso.

DE PVLVERIBVS PVRGANTI-
 bus fæces.

Puluis contra lumbricos.

℞. Comarum Centaurij min. Lupinorum ana ℥.β.
 Absinthij Baccarum Lauri, Gentianæ ana ℥. iij.
 Aristolochiæ rotundæ, Pyrethri, Polypodij, Petroselinij Macedonici, Ze-
 doarij, Myrrhæ ana ℥. ij.
 Abrotani ℥. j. B
 Sem. Athanasæ ℥. iij.
 Flor. Persicorum ℥. ij. β.
 Coriandri præparati ℥. j. β.
 Senæ Alexandr. Sem. Santonici ana ℥. ij. 3. ij.
 Aloes, Sem. Portulacæ, Rad. Dictamni albi ana ℥. ij.
 Misce, & fiat puluis. Colonienses.

Alius.

℞ Sem. contra lumbricos ℥. j.
 Lupinorum ℥. β.
 Absinthij 3. ij.
 Cornu cerui usti 3. j. β.
 Misce, & fiat puluis.

Puluis ad suppositoria communia, magistralis.

℞. Aloes, Cymini, Salis gemmæ, Rutæ ana 3. j.
 Terantur, & fiat glans cum mellis q. f. Med. Florentini.

Alius acutior.

℞ Aloes, Hellebori nigri, Centaurij, Cymini, Rutæ ana 3. ij.
 Fiat puluis, ut suprâ. Medici Florentini.

Alius

A

Alius adhuc acutior.

℞. Hellebori albi, Granorum Colocynthidos ana ʒ. j. β.
 Esulæ præparatæ, Hermodactylorum ana ʒ. j.
 Spec. Hieræ S. Galeni ʒ. ij.
 Misceantur puluerizata. Cordus.

DE PVLVERIBVS EXTRINSECVS AP-
 plicandis temperatis.

Puluis capitalis temperatus.

℞. Rosarum, Santali albi, Labruscæ, Betonicæ, Stœchadis, Rad. Pœoniæ,
 Saluiæ, Maioranæ, Caryophyllorum, Sandaracæ ana ʒ. j.
 Terantur tenuissimè. Medici Florentini.

Puluis cordialis temperatus.

℞. Rosarum rub. Corallij rubri, Corticum Citri, Ofsis de corde cerui, Se-
 rici grano tinctorum infecti ana ʒ. j.
 Santali albi, rubri, Citrini ana ʒ. β.
 Croci, Caryophyllorum, Cinnamomi, Ligni aloës ana ʒ. j.
 Ambræ ʒ. β.
 Caphuræ ʒ. ij.

B Terantur ut suprà. Medici Florentini.

DE PVLVERIBVS CALFACIENTIBVS
 caput, magistralis.

℞. Stœchadis, Nucis moschatæ, Betonicæ, Rad. Betonicæ, Seseleos, Maio-
 ranæ, Ligni aloes, Caryophyllorum ana ʒ. j.
 Moschi, Ambræ ana ʒ. ij.
 Fiat puluis.

Puluis ad calefaciendum caput, alius.

℞. Nucis moschatæ, Macis, Galangæ ana ʒ. ij.
 Granorum tinctorum, Cinnamomi ana ʒ. j.
 Flor. Stœchadis, Rosarum, Flor. Rorifmarini, Chamomillæ ana ʒ. j. β.
 Cort. Citri ʒ. j.
 Schœnanthi, Spicæ Celticæ ana ʒ. β.
 Fiat puluis tenuissimus: quo utêdum in declinatione lethargi, aut in somno
 profundo, maximè si addatur castoreum uel costus. Rondeletius.

DE PVLVERIBVS CALFACIENTIBVS COR.

Puluis pro epithemate cordis calidus.

℞. Santali albi, rubri, citrini ana ʒ. ij.
 Beë albi, rubri, Serici grano tinctorio infecti, Ofsis de corde cerui ana ʒ. j.
 Mm 3 Croci,

462 DE PVLVERIB. EXTRIN. APPLICANDIS.

Croci, Cinnamomi, Caryophyllorum, Ligni aloes ana ʒ. β. |
Ambræ, Moschi ana ʒ. j.
Fiat puluis. Florentini.

A

Puluis aduersus pestem, magistralis.

ʒ. Dictamni Cretenfis, Corallij albi, Tormentillæ, Boli, Gentianę ana ʒ. j.
Terræ Lemnię ʒ. β.
Fiat puluis tenuissimus.

DE PVLVERIBVS EXCALFACIENTIBVS
uentriculum.

Puluis ad uentriculum calfaciendum.

ʒ. Galangę, Cyperi, Caryophyllorum ana ʒ. ij.
Absinthij, Menthe ana ʒ. β.
Misce, & fiat puluis. Rondeletius.

Puluis ad calfaciendum & constringendum uentriculum.

ʒ. Absinthij, Cyperi, Masticis, Macis ana ʒ. β.
Coralli rubri, Balauftiorum, Sumach, Myrtillorum ana ʒ. ij.
Piperis longi, Cinnamomi, Sanguinis draconis ana ʒ. ij.
Fiat puluis tenuissimus, quo sinapisetur uenter, & stomachus, prius facta inductione, cum oleo mastichino, aut lentiscino, aut citoniorum, & pauco aceto, uel uino. Rondeletius.

B

Puluis ad flatus discutiendos uentriculi.

ʒ. Galangæ maior. & minoris, Cinnamomi, Spicę nardi, Squinanthiana ʒ. ij.
Cymini, Carui, Apij, Petroselinii in aceto macerati ana ʒ. ij.
Sem. Rutę ʒ. j.
Misce, & fiat puluis, quo inspergatur uenter melle perunctus & pauco uino. Rondeletius.

DE PVLVERIBVS EXCALFACIENTIB. HEPAR.

Puluis pro epithemate hepatis excalfaciens.

ʒ. Rosarum, Santali albi, rubri, Absinthij, Schœnanthi, Spodij, Nardi Indicę, Cinnamomi ana ʒ. β.
Moschi ʒ. j.
Misce, & fiat puluis tenuissimus. Florentini.

DE PVLVERIB. REFRIGERANTIB. CAPVT.

Puluis ad phrenitidem.

ʒ. Coriandri ʒ. ij.
Flor. Nymphę ʒ. ij.
Violarum, Rosarum ana ʒ. ij.

Sem.

A Sem. Lactucæ, Papaueris ana ʒ. j.
 Coralli rubri ʒ. j. β.
 Santali rubri ʒ. ij.
 Fiat puluis tenuissimus, quo sinapizetur pars capitis anterior, Rondeletius.

Alius.

℞. Flor. Violarum, Nymphææ ana ʒ. j.
 Rosarum ʒ. β.
 Flor. Chamomillæ ʒ. ij.
 Cap. Papaueris, uel Corticum Mandragoræ ʒ. j.
 Sem. Papaueris albi ʒ. ij.
 Sem. Anisi, Anethi, Granorum tinctorum ana ʒ. j.
 Fiat puluis. Rondeletius.

DE PVLVERIBVS REFRIGERANTIB. COR.

Puluis pro epithemate cordis refrigerans.

℞. Santali albi, rubri, citrini ana ʒ. β.
 Bcē albi, rubri, Serici grano tinctorio infecti, Osis de corde cerui ana ʒ. j.
 Sericum minutim incidatur, reliqua per se terantur: misce, conferua in pi-
 xide uitrea Florentini Medici.

Alius, temperatus potius.

B ℞. Santali rubri ʒ. j.
 Cort. mali Citri, Santali albi, Rosarum, Coralli albi, Coralli rubri, Carabæ,
 Spodij ana ʒ. β.
 Flor. Borriginis, Doronici, Osis de corde cerui, Croci ana ʒ. j.
 Spec. Lætitiæ, Diagemmæ, Diamarg. frig. ana ʒ. iij.
 Caphuræ ʒ. j.

In puluerem redactæ species commisceantur. Colonienfes Medici.

Alius ad pestem.

℞. Santali citrini, Terræ Lemniæ, Rad. Tormentillæ, Sacchari albi ana ʒ. ij.
 Santali rubri, Dictamni Cretensis, Cornu ceruini usti, Margaritarum, Ro-
 sarum rubrarum, Boli, Aristolochiæ rot. Pimpinellæ, Myrrhæ, Zedoariæ a-
 na ʒ. j.

Caphuræ, Sem. Citri, Croci, Hyacynthi ana ʒ. β.
 Misce, & fiat puluis tenuissimus. Florentini.

DE PVLVERIBVS REFRIGERAN-

tibus hepar.

Puluis pro epithemate hepatis refrigerans.

℞. Santali albi, rubri citrini ana ʒ. β.
 Rosarum, Coralli, Spodij ana ʒ. j.
 Caphuræ ʒ. j.

Terantur,

464 DE PVLVERIB. EXTRIN. APPLICANDIS.

Terantur, ut suprâ. Florentini.

A

DE PVLVERIBVS ASTRINGENTIBVS.

Puluis constringens.

℞. Aloes, Mannæ thuris, Corticis Pini, Terræ Lemniæ, Boli Armeni, Lapidis Hæmatidis, Hypocistidis, Croci, Gallæ omphacitidis ana ʒ. j.
Fiat puluis. Galenus.

Puluis emplasticus & sanguinem sistens.

℞. Resinæ frictæ, Pollinis farinæ triticeæ, Crypti ana ʒ. iij.
Misce, & fiat puluis. Galenus.

Crocus Martis.

Limata scobes ferri, aqua calida ab omni spurcitia expurgatur, siccaturq̄, & aquæ regali imposita, soluitur: deinde acetum ualens additur: postea hinc inde circumagitata eximitur, soli q̄: exponitur, exiccaturq̄: post hæc rude ferrea reuerberata patellæ imponitur, additurq̄: aquæ plantaginis: & hæc in arena euaporare sinitur. Idem rursus fieri cum alijs aquis, ut rosarum, solani, & similibus licet. * Ad immodicum & intempestiuum, longumq̄: menstruorum fluorem ualet, dysenteriam, omneq̄: aliud fluxionum genus, scrupuli unius uel plurium pondere, cum rosarum conditi drachma una, uel duplici. Datur etiam lienosis, ex aqua tamarisci, & enulæ campanæ. Cicatricem ulceribus inducit, &c. Andernacus.

Alius ad omnem hæmorrhagiam.

℞. Thuris ʒ. j.

Aloes ʒ. β.

Fiat puluis, qui cum oui albumine subactus ad mellis crassitiem, pilis mollifimis leporis excipietur. Galenus.

DE PVLVERIBVS ABSTERGENTIBVS
dentibus dentes.*Puluis ad dentifricia.*

℞. Cornu ceruini usti, Pumicis, Tutij præparatæ, Cinnamomi, Sideritidis tostæ ana ʒ. j.

Moschi G. vj.

Misce, & fiat puluis. Florentini.

Alius.

℞. Salis communis ʒ. iij.

Panis hordeacei ʒ. j.

Cornu ceruini, uel Dentium equi, uel Elephantis ʒ. ij.

Extinguantur uino & aqua rosarum, fiat puluis crassiusculus. Huic addi possunt caryophylli, cinnamomum, & moschum. Rondeletius.

DE

A DE PVLVERIBVS ABSTERGENTIBVS cutem.

Puluis contra scabiem communis.

℞. Sulphuris flauis, Cymini, Baccarum Lauri, Staphidis agricæ ana ʒ. j.
Fiat puluis, qui oleo rosato excipiat. Florentini.

Alius efficacior.

℞. Lithargyri, Hellebori nigri ana ʒ. i.
Sulphuris, Nitri, Maioranæ ana ʒ. ij.
Trita in puluerem excipiantur, ut supra. Nicolaus.

Puluis cephalicus.

℞. Iridis ʒ. iij.
Aristolochiæ rotundæ, Pollinis thuris ana ʒ. ij.
Corticis rad. panacis ʒ. β.
Fiat puluis. Galenus ex Lucio.

Alius.

℞. Iridis, Aristolochiæ rotundæ, Erui, Pollinis thuris ana ʒ. j.
Reducantur in pollinem tenuem. Nonnulli addunt rad. panacis, & cadmiâ
lotam. Galenus.

Alius.

B ℞. Farinæ Erui, uel Orobi ʒ. viij.
Iridis ʒ. x.
Thuris clari, Aristolochiæ rotundæ, Squamæ æris ana ʒ. v.
Terantur ut supra. Xenocrates.

Alius.

℞. Corticis Piceæ, Squamæ æris, Pumicis combusti ana ʒ. vi.
Thuris, Iridis, Aristolochiæ rotundæ, Resinæ pini frictæ ana ʒ. β.
Aloes, Myrrhæ ana ʒ. ij.
Conterantur in puluerem, ut supra. * Aufert squamas ofsium. Tryphon.

DE PVLVERIBVS INCARNANTIBVS.

Puluis incarnans, & sanguinem restringens.

℞. Aloes, Myrrhæ ana ʒ. j.
Sarcocollæ ʒ. j. β.
Thuris, Pollinis farinæ ana ʒ. ij.
Sanguinis draconis, Terræ Lemniæ ana ʒ. ij. β.
Tutæ, Lithargyri, Tragacanthæ ana ʒ. j.
Fiat puluis tenuis. Ioannes de Vigo.

Nn

DE PVL-

466 DE PVLVERIBVS EXTRIN. APPLICANDIS.
DE PVLVERIBVS CICATRICEM INDVCENTIB. A

Puluis ad cicatricem inducendum.

℞. Corticis Thuris, Myrrhæ, Lithargyri, Cort. Mali granati ana partes
æquales.

Fiat puluis tenuissimus, & inspergatur modicè. Rondeletius.

DE PVLVERIBVS CARNEM
aufcresentibus.

Puluis causticus.

℞. Chalcitidis ꝑ. c.

Chalcanthi ꝑ. l.

Misyos torrefacti, Æris usti ꝑ. xxv.

Æris usti ꝑ. xij. β.

Fiat puluis. Galenus.

Alius.

℞. Chartæ cõbustæ, Plumbi usti, Æris usti, Arsenici, Squamæ ferri ana ꝑ. j.

Sulphuris uiui ꝑ. β.

Fiat puluis Galenus.

Præcipitatum.

℞. Salis nitri lb. j. β.

Vitrioli Romani, Aluminis ana lb. j.

Ex his per alembicum distillatis (quò fortius autem, eò melius) sumes lb. j.

Argentii uiui lb. j.

In uas uitreum pone cum capello bene lutato. sic etiam recipiēs lutabis, ne
euapōret: & distillabis eousque, donec uas rubescat: aquam sepones, & fra-
cto uase argentum: quod superest, ustum erit, quod Chymistæ præcipitatum
uocant. hoc tenuissimè terito in marmore, & cum aqua distillata quam sepo-
sueras, rursus uasi uitreo imposito, atq; distilla donec aqua distillata sit: tum
contracto uase, argentum quod superest, denuò teres in tabula marmorea,
& ipsum in æneo uase repones: supposito que igne ualido, cum æneo baculo
milce, & agita per horæ ac dimidiæ spacium: hoc enim pacto puluis melior
efficitur, & ritè factus ipsum minium coloris elegancia superat. Ioannes
de Vigo.

Mercurius præcipitatus.

℞. Aquæ fortis lb. j.

Mercurij crudi ꝑ. iij.

Dissoluantur in aqua: postea in arena euaporet aqua, aut distillatione separa-
fortiter, ut rubescat & exieccetur: teratur deinde in porphyrio, & affunde ei a-
quam uitæ distillatam quinquies, uel septies: accende etiam, & sine ut consu-
matur. Postea rectificetur aqua rosacea optimè permiscendo: ac tandem per
filtrum

A filtrum aquam rosaceam separa, & relinque ut exiccetur. Tum rursus de aqua uitæ, ut prius affande, & accède ut exiccetur: idq; tertia vice repetatur: & habebis quod uoles. * Si corpus fuerit robustissimum, da G. x. si mediocre, da G. viij. si debile, G. iij. si puerile, fac tu consideratione bonam. Sed aduerte, quod miscere eum debes cum theriaca: postea dabis infirmo uenenate, & hydropico, & pestilenti, uel alia infirmitate deteto. Et plus, si sanus annuatim, uel triennio, ut opus fuerit, hoc precipitato utetur, cum prudenti humorum digestionem, hoc est, præparatione purgationis. Euenonymus.

Aurum precipitatum.

Hydrargyri per acetum & salem purgati uncia duæ: auri Orientalis optimi in lamellas tenuissimas redacti drachma, in catina triangulari calido ad mixturam subiguntur. hæc in aquam frigidam funditur, & si quid ex hydrargyro reliquum fuerit, illud per corium exprimitur, ipsaq; ex sale & aceto lauitur, donec nullæ appareant fordes: cura interim adhibita, ne hydrargyri quantitas imminuatur. quod si accidat, augeri debet ea ita, ut ad auri drachmam, illius drachmæ septem uel octo remaneant: deinde ampullæ luto obductæ induntur, affundunturq; aquæ ualide uncia duæ: & operculo superimposito, eadem rursus euocatur per arenam calidam. omnibus refrigeratis, aqua prolecta iterum infunditur, distillaturq; ut antea: idq; repetitur quinquies: **B** atque tunc puluis rubicundus prouenit, quem aurum uitæ, & aurum precipitatum uulgò nuncupant. Postea idem in catillum ponitur, cooperiturq; & inter carbones candentes sinitur, dum excandescat: mox idem eximitur, & ubi refrixerit, aqua rosarum humectatur, rursusq; exiccatur. * Iunioribus denarij dimidij, adultis uerò integri pondere datur: pesti medetur: morbum Gallicum curat: elephantiasim, aquam intercutem, aliosq; morbos difficiles abigit: uiscerum obstructions reserat: ijs qui uenenum hauserunt, opitulatur: ulceribus malignis curandis tum intrò sumitur, tum extrinsecus unguentis & emplastris quæ purgant, feliciter ad fordida cauernosaq; non autem serpentina curanda admiscetur. Andernacus.

DE PVLVERIBVS MITIGANTIBUS
dolo rem.

Puluis ad capitis dolorem ex frigore.

℞. Coriandri, Rosarum ana ʒ. β.

Nucis moschatæ, Macis, Caryophyllorum, Santalorum omnium, Granorum tinctorum ana ʒ. ij.

Fiat puluis tenuissimus: quo utendum in statu doloris capitis, & cum caput corroborare uolumus. Rondeletius.

Alius.

℞. Coriandri ʒ. ij.

Nn 2 Flor.

468 DE PVLVERIB. EXTRIN. APPLICANDIS.

Flor. Nympeæ ʒ. iij.

A

Flor. Violarum, Rojarum ana ʒ. ij.

Sem. Lactuce, Papaueris ana ʒ. j.

Coralli rubri ʒ. j. β.

Santali rubri ʒ. ij.

Fiat puluis tenuissimus: quo sinapifetur pars anterior capitis. Rondeletius.

PVLVIS AD CAPITIS DOLOREM
à uaporibus.

R. Flor. Nympeæ ʒ. β.

Coralli rubri, Balauftiorum, Fol. Sumach ana ʒ. iij.

Santali rubri, Corticum Citri ana ʒ. j.

Fiat puluis tenuissimus. Rondeletius.

Alius.

R. Cyperi ʒ. β.

Flor. Anthos ʒ. j.

Cort. Citri sicci, Granorum tinctorum, Santali rubri, albi ana ʒ. ij.

Misce & fiat puluis tenuissimus. Rondeletius.

Alius.

R. Granij hominis lb. j.

B

Cornu cerui ʒ. iij.

Coralli rubri, Caryophyllorum, Macis, Cinnamomi, Costi ana ʒ. iij.

Cyperi, Squinanthi, Stœchados, Spicæ nardi ana ʒ. iij.

Vrantur omnia simul in furno uasi crudo imposita, id est, fictili crudo nouo: fiatq; puluis. Rondeletius.

Puluis ad dolorem lateris.


Ad lateris dolorem parantur pulueres ex priapo tauri, cum defluxio cessauit. Nam sic digerit humorem. Idem potest rasura dentis apri, sumpta ex uino, & aqua cardui benedicti. Dabitur autem posteaquam confluit humor. Materiam enim exiccando, curat inflammationem. Rondeletius.

DE

DE ELECTVARIIS CAP. XXI

B

Electuaria sunt, que
 Græcis antidota, & vul-
 go cōfectiones appellātur.
 Sic autē dicuntur, vel quod
 ex electis cōstent aroma-
 tis, vel quod præ ceteris me-
 dicamentis, tā in bona uale-
 tudine asseruanda, quā in
 mala abigenda, eligantur.
 Sunt autē electuaria, medi-
 camina melle aut syrupo
 sacchari excepta: atq; vel



Minus usitata, siue non Officialia. Vide in seq. signum D.

A. Ele-

Nn 3

	Caput:—	Diacodion,	A
A. Electuaria frige- facien- tia	Pe- ctus	{	Diapapauer.
			Diatragacanthum frigidum.
			Diapenidion sine speciebus calidis.
			Electuarium resumptium, &c.
	Cor	{	Diarrhodon Abbatis sine spec. calidis.
			Triafantalum.
Diamargariton frigidum, &c.			
Stomachum	{	Diarrhodon Abbat. sine spec. calidis.	
		Electuarium de sorbis.	
		Triafantalum, &c.	
Hepar	{	Diarrhodon Abbatis.	
		Triafantalum, &c.	
Lienem	{	Diatrion fantalon.	
		Diarrhod. Abbatis sine spec. cal.	
Matricem	{	Diarrhod. Abbatis.	
		Diatrion fantalon, &c.	
Juncturas	{	Triafantalum.	
			Diarrhodon Abbatis, &c.

B. Electuaria alterantia qualitate secunda & ter- tia, aut	Astringunt: ut	{	Diacodion.
			Micleta.
			Tryphea minor, &c.
	Calculus frangunt: ut	{	Electuarium Reginae.
			Electuarium Iustinum.
			Electuarium de cineribus.
Lithontribon, &c.			
Venerem stimulant: ut	{	Diasatyrium.	
		Diacorum.	
		Triphera Saracenicæ, &c.	
Venena fugant: ut	{	Diarceuthidon.	
		Athanasia, &c.	

C. Ele-

A

Leuio-
ra (Leni-
tina:) ut

- Flores Cassia.
- Cassia extracta sine fol. senae.
- Cassia extracta cum fol. senae.
- Cassia extracta pro clysteribus.
- Diacassia.
- Diacassia magistralis, Cassia communis.
- Diacatholicum, Diaprunum simplex.
- Diaprunum comp. non laxatiuum.
- Elect. lenitiuum.
- Elect. de sebeste.
- Elect. lenitiuum de manna, &c.
- Diamanna, Tryphera Perfica.

C.
Electuaria
purgantia

B

Fortiora
(Solutina.)
Atque haec
purgant uel
humores

- Bilem flauā: ut
 - Electuarium de succo rosarum.
 - Electuarium rosatum Mesuae.
 - Elect. de psillio.
 - Diaprunum laxatiuum, &c.
- Pitui-
sam: ut
 - Benedicta laxatiua.
 - Diaphenicum.
 - Elect. Indum.
 - Elect. Elefscoph.
 - Diaturbith maius.
 - Diaturbith minus.
 - Hiera picra S.
 - Hiera picra cum agarico.
 - Hiera picra composita.
 - Hiera Pachij.
 - Hiera Hermetis.
 - Hiera diacolocynthidos.
 - Hiera Archigenis.
- Melancho-
liam: ut
 - Diafena — { Gentilis.
 - Confectio Hamech. { Nicolai.
 - Diapolypodion.
 - Hieralogodium.
- Mix-
tos: ut
 - Catharticum Imperiale.
 - Diacarthamum.
 - Diaturbith cum rhabbaro.
 - Hiera Ruffi.
 - Hiera Abbatis.

D. Ele-

			Electuarium ad morbos capitis frigidos. A		
		Caput: <i>ut</i>	{ Aliud, &c.		
		Cor: <i>ut</i>	{ Electuarium pro corde & palpitatione. Elect. pro palpitatione à flatibus. Elect. pro palpit. ab aqua, &c.		
	Cale- faciunt	Ventriculum: <i>ut</i>	{ Elect. pro refrigerato uentriculo. Elect. ad uentriculū corroboratiōē.		
		Hepar: <i>ut</i>	{ Elect. ad icterum. Elect. ad aquam intercutem, &c.		
	Pri- ma, Sic	Splenem: <i>ut</i>	{ Elect. pro splene. Aliud, &c.		
		Ventriculum: <i>ut</i>	{ Elect. ad uentriculū refrigerandū. Elect. ad humect. uentriculum.		
	Refrige- rants	Hepar: <i>ut</i>	Elect. ad calefactum hepar.		
D. Electuaria minus usita, seu non Officinalia alterant aut qualitate		Astringunt: <i>ut</i>	{ Elect. pro uentriculo laxato. Elect. pro lienteria. Elect. pro dysenteria, &c. B		
		Vrinas mouent: <i>ut</i>	Elect. ad urinas & menses, &c.		
		Menses mouent: <i>ut</i>	Elect. ad menses mouendos.		
		Calculum frangunt: <i>ut</i>	Elect. ad calculum, &c.		
		Venerē	Augent: <i>ut</i>	{ Elect. ad uenerem. Aliud. Elect. pro ijs quib. semē est acre, &c.	
			Minuunt: <i>ut</i>	Elect. ad seminis profluuium, & Venerem minuendam, &c.	
		Secunda et tertia, Sic a- lia	Dolorem mitigant: <i>ut</i>	{ Elect. ad dolorem colicum. Elect. pro dolore nephritico. Elect. pro dolore uesicæ. Elect. pro dolore in fluxu uentris. Elect. ad uteri dolores, &c.	
				Pur- gant	Aquam: <i>ut</i> Electuarium Gordonij.
					Pituitam, uel potius humores mixtos: <i>ut</i> — Elect. uenerem soluens.

A DE ELECTVARIIS CALEFACIENTIBUS caput.

Confectio anacardina.

℞. Piperis nigri, longi, Myrobal. Chebulorum, Emblicorum, Belliricorum, Indorum, Castorei ana ʒ. ij.
Costi, Anachardij, Sacchari Tabarzeth, Meláthij, Baccarú Lauri ana ʒ. vj.
Cyperi ʒ. ʒ.

Anacardi per se terantur, & alijs tritis admisceantur: deinde omnia conficiantur cum Butyri recentis non saliti, Mellis despumati ana ʒ. v. ʒ. * Est confectio sapientum, & eorum qui desiderant scire: acuit enim intellectum, subtilizat sensum, memoriam recuperat, & confert dolori stomachi & uentris à frigiditate facto, & clarificat sanguinē, colorē bonum facit. Conseruatur ad annos duos, in uase fictili uitrato. Datur post sex mēses ad ʒ. ij. cum aqua fœniculi & apij: quo sumpto uitabis laborē, irā, coitū, ebrietatē. Mesues.

Confectio anacardina alia.

℞. Aloës ʒ. j. ʒ.
Iridis, Casiæ ana ʒ. vij.
Zingiberis, Anacardij, Carpobalsami ana ʒ. iij. ʒ.
Folij, Spicæ nardi, Myrobal. Citrinorum, Chebulorum, Indorum, Belliricorum, Emblicorum, Mei, Epithimi ana ʒ. iij. ʒ. j.
Caryophyllorum, Squinanthi, Rhei Pontici, Malticis ana ʒ. ij.
Cort. rad. Fœniculi lotorum lb. j.
Aceti optimi lb. ij.

Contusa & macerata in prædicto aceto dies septem coquantur, & colentur. Colaturæ bene expressæ, adde Mellis despumati lb. ij.
Fiat electuarium, ut artis est. Conseruatur per annos duos. * Valet ad uertiginem, obliuionem. Rheuma capitis desiccatur: uisum acuit, &c. Datur ʒ. j. uel ʒ. ij. cum aqua mulsa. Nicolaus.

Diambra.

℞. Cinnamomi, Doronici, Caryophyllorum, Macis, Nucis moschatæ, Folij, Galangæ ana ʒ. ij.
Spicæ Indicæ, Cardamomi maioris, minoris ana ʒ. j.
Zingiberis ʒ. j. ʒ.
Ligni aloës, Santali citrini, Piperis longi ana ʒ. ij.
Ambræ ʒ. j.
Moschi ʒ. ʒ. Excipiantur
Syrupi rosati, Aquæ rosacæ, Sacchari albi ana q. s.
Conseruatur in uase fictili uitrato, ad annos duos. Dantur ʒ. iij. uel iij. Cerebrum

O o

474 DE ELECTVARIIS OFFICINALIBVS.

* Cerebrum, cor, uentriculum, ac uentrem reliquum inferiorem calefacit & A
 roborat, exhilarat, coctionem inuat, affectibus uterinis, & omnibus alijs fri-
 gidis prodest, senibus ob id ac mulieribus salubre. Mesues.

Diamoschum dulce.

R. Croci, Doronici, Zedoariae, Ligni aloës, Macis ana ʒ. ij.
 Margaritarum albarum, Serici crudi usti, Charabę, Coralli rub. ana ʒ. ij. ʒ.
 Basilici citrati, Gallę moschatae ana ʒ. ij. ʒ.
 Been albi, rubri, Folij, Spicę nardi, Caryophyllorum ana ʒ. j.
 Zingiberis, Cubebarum, Piperis longi ana ʒ. j. ʒ.
 Moschi ʒ. ij. Excipe cum
 Mellis crudi ʒ. j. ʒ. vj.

Coque: fiat electuarium, in uase uitreo conseruandum. Datur à ʒ. j. ad ʒ. ij.

* Ad frigidos cerebri affectus sine febre, melancholiam, & illi comatam tri-
 stitiam sine causa manifesta, uertiginem, epilepsiam, resolutionem, oris tor-
 turam, cordis palpitationem, pulmonis affectus, & spirandi difficultatem
 conducit. Mesues.

Diamoschum amarum.

R. Croci, Doronici, Zedoariae, Ligni aloës, Macis ana ʒ. ij.
 Margaritarum albarum, Setę crudę tostę, Charabę, Coralli rubri, Gallę
 moschatae, Ocimi citrati ana ʒ. ij. ʒ. B
 Been albi, rubri, Folij, Spicę Indicę, Caryophyllorum ana ʒ. j.
 Zingiberis, Cubebarum, Piperis longi ana ʒ. j. ʒ.
 Moschi ʒ. ij.
 Absinthij, Rosarum ana ʒ. iij.
 Aloës lotę ʒ. iij. Castorei, Ligustici ana ʒ. j.
 Cinnamomi ʒ. ij. ʒ.

Excipiuntur mellis quantitate sufficienti. * Hęc confectio præcedenti effi-
 caciior est, & præterea uētriculi humores etiã putres potētī^o absumit. Mesues.

Diacorum.

R. Rad. Secacul, Acori ueri, id est, calami aromatici, Pinearum ana ʒ. j. ʒ.
 Radices Secacul mundatę & incisę coquãtur in aqua clara, donec aqua con-
 sumatur: postea optimē pistentur, & in minutissimas partes conterantur, do-
 nec pulsi similes fiant. Deinde affunde eis, Mellis odorati & optimē despu-
 mati ʒ. x. coquantur lento igne, donec tota aqua, quam radices Secacul im-
 biberūt, in uaporem resoluta sit, diligēter agitando, ne ad uasis fundum adu-
 rantur radices. cum autem iustę spissitudinis consistentiam acquisuerit, ab
 igne deponito, & adde radices Acori tenuissimē tritas, & pineas minutissi-
 mē incisas, cum sequenti puluere optimē mixtas.

R. Piperis ʒ. j.

Piperis.

- A Piperis longi, Caryophyllorum, Zingiberis Rosarum, Macis, ana ʒ.β.
 Nucis moschatæ, Galangæ, Cardamomi ana ʒ. iij.
 Omnia simul cum melle & radicibus Secacul misceto, & unito, diligenter agitando, ne grumi aliqui relinquuntur. * Confert mirum in modum egritudinibus neruorū, acuit omnes sensus & ingeniū, sedat dolores capitis, est peculiare remediū frigidarū egritudinum, senum, & maximè catarrhi. Mesues.

Diacastorium.

- ℞. Castorij, Myrobal. Citrinorum ana ʒ. iij. Aloës ʒ. j. β.
 Folij, Anthimonij, Pyrethri, Glycyrrhizę, Tragacanthæ, Calami aromatici, Nitri, Galbani, Spicæ Indicæ, Schœnanthi, Opopanacis, Calsiæ lignæ, Leucopiperis, Macropiperis, Melanopiperis, Xilobalsami, Carpobalsami, Colocynthidis, Sagapœni, Rheupontici, Styracis calamitę, Zingiberis, Cinnamomi ana ʒ. j. G. ij.
 Asæ foetidę, Myrrhæ, Euphorbij ana ʒ. j. G. xvij.
 Staphisagrię, Dauci, Fœniculi, Petroselinij, Apij, Sileris mōtani, Baccarum Lauri, Petrolei, Seminij Sinoni, Styracis calamitę rubeę, Sâguinis draconis, Cardamomi, Thuris, Agarici, Masticeis, Salis Hammoniici, Zedoariæ, Anisi ana ʒ. j. G. ij.
 B Thymbre, Hyssoji, Pulegij, Chamedryos, Origani, Balsamitę, Ocimi, Radic. Branche ursinę, Dictamni Cretęsis, Sem. Rutę, Aristolochię longę, rotūde, Mabatematico, Azari, Saluię min. Rosarū, Bdellij ana G. xvij.
 Epithymi, Polypodij quercini, Opobalsami (loco eius oleum Caryophyllorum) ana G. xiiij.
 Alypiados, Rad. Capparorum ana G. xj.
 Peucedani, Absinthij ana G. vij.
 Anacardij, Sabinæ, Gentianæ, Cort. rad. Mandragoræ ana G. xj.
 Ireos G. iij. Mellis despumati triplum.
 Fiat electuarium, in uase uitrato seruandum. Datur in modum auellanæ in passionibus capitis. * Confert cephalalgicis, epilepticis, uertiginosis, hemicranicis, paralyfi omnium membrorum, & omnibus frigidis ægritudinibus, tempore frigido nocentibus confert. Nicolaus.

Electuarium diapœonias.

- ℞. Rad. Pœoniæ ʒ. j.
 Macis, Spicæ Indicę, Croci, Coralli rubri, Margaritarum non perforat. Masticeis ana ʒ. β. Myrtillorum uerorum ʒ. j. β.
 Cinnamomi, Nucis moschatæ, Caryophyllorum, Folij (loco eius calsiæ lignę uerę) Zingiberis, Piperis lōgi, Cardamomi, Gran. parad. ana ʒ. ij.
 Glycyrrhizę ʒ. v. Moschi, Ambræ ana G. vj.
 Anacardij ʒ. j. β. Sacchari albissimi quantum sufficit.

O o 2

Fiat

476 DE ELECTVARIIS OFFICINALIBVS.

Fiat confectio in tabulis, in æstate. In hyeme uerò adde speciebus triplum A mellis despumati, & conficiatur electuarium. * Confert epilepsiæ.

Pleres archonticon.

℞. Cinnamomi, Caryophyllorum, Ligni aloës, Galangæ, Spicæ Indicæ, Nucis moschatæ, Zingiberis, Spodij, Schœnanthi, Cyperi, Rosarum, Violarum ana ʒ. j. G. xv.

Folij, Glycyrrhizæ, Masticis, Styracis, Maioranæ, Menthe aquaticæ, id est, Sylibrij balsamines, Cardamomi, Piperis longi, albi, Seminis Basilici, Baccarum Myrti, Cort. Citri ana ʒ. ij. G. v.

Margaritarum, Been albi, rubri, Coralli rubri, Serici usti ana ʒ. j. G. ij. β.

Moschi G. vij. β.

Caphuræ G. v.

Syrupi rosati, Sacchari albi ana ʒ. viij.

Fiat electuarium. Seruatur in uase fictili uitrato per annos duos. * Tristibus, melancholicis, imbecillo uentriculo, deliquio animi à corde nato succurrit: eos qui ex diutino morbo extenuati & imbecilles sunt, corroborat: memoriam amissam recuperat, sensus acuit, comitialibus & asthmaticis prodest, omnemq; cerebri debilitatem aufert. Nicolaus.

Theriaca diatefferon.

℞. Gétianæ, Baccarū Lauri, Myrrhæ, Aristolochiæ rotundæ ana ʒ. ij. Mellis despumati ℥. ij. B

Misce, & serua ut suprâ. Datur ab aureo dimidio ad aureum unum. * Ad affectus frigidos, tum cerebri, ut epilepsiam, paralytim, spasmus Cynicum: tum uentriculi, ut inflationem, & ab ea dolorem, tardam coctionem: tum denique hepatis, ut hydropem, cachexiam, obstructionem. Præterea morsus scorpionis, & potioni ueneni confert. Mesues.

DE ELECTVARIIS CALFACIENTIBUS pectus.

Diaireos simplex, magistralis.

℞. Ireos ʒ. β.

Sacchari candi, Spec. Diatingaranthi frig. ana ʒ. ij.

Sacchari albissimi quantum sufficit.

Fiat confectio.

Diaireos Salomonis.

℞. Ireos ʒ. j.

Pulegij, Hyssopi, Glycyrrhizæ ana ʒ. vj.

Tragacanthæ, Amygdal. amararum, Pinearum, Cinnamomi, Zingiberis, Piperis, ana ʒ. iij.

Caricarum, Passularum enucleatarum, Carnium Dactylorum ana ʒ. iij. β. Styracis.

A. *Styracis calamitæ rubæ* ℥.ij.℥.j.
Mellis quantum sufficit.

Fiat electuarium. Conferuatur per annum. * Tussiculosis, difficulter spirantibus auxiliatur, abscessæ uocis iacturam refarcit, quæ refrigeratione contracta sit. Nicolaus.

Diapenidion.

℞. *Penidiarum* ℥.ij.℥.β.

Pinearum, *Amygdal. dulcium*, *amararum*, *Papaueris albi* ana ℥.iij.℥.j.

Cinnamomi, *Caryophyllorum*, *Zingiberis*, *Succi Glycyrrhizæ*, *Tragacanthæ*, *Gummi Arabici*, *Amyli candidissimi*, *Sem. enucleati Cucurbitæ*, *Citrulli*, *Cucumeris*, *Melonis* ana ℥.j.β.

Caphuræ G. vij.

Syrupi uiolati quantum sufficit.

Fiat electuarium, in uase fictili uitrato conferuandum per annum. * Valet aduersus omnem thoracis noxam, tussim à frigore contractam, uocis iacturam: tabidis deniq; & purulenta excreantibus succurrit. Nicolaus.

Diatragacanthum calidum.

℞. *Gummi tragacanthæ*, *Hyssopi* ana ℥.iij.

Pineorum nucleorum, *Amygdal. ambarū purgatarū*, *Sem. Lini* ana ℥.vj.

B. *Sem. Fœnogræci*, *Cinnamomi* ana ℥.β.

Glycyrrhizæ rasæ, *Succi Glycyrrhizæ*, *Zingiberis* ana ℥.ij.

Sacchari quantum sufficit.

Fiat electuarium per annum conferuandum. * Valet tussientibus ex frigido phlegmate, & non ualentibus eijcere, asthmaticis, empycis anhelosis, suppuriosis, peripneumonicis, phthisicis, & ad omnem coarctationem pectoris: stomachum confortat, digestionem procurat. Nicolaus.

Diabyssopum.

℞. *Hyssopi*, *Ireos*, *Thymi*, *Melanopiperis* ana ℥.xxx.

Pulegij, *Thymbrae*, (eius loco sume *Satureiam*) *Rutæ*, *Cyamini* ana ℥.xx.

Carnium Dactylorum, *Tragacanthæ*, *Glycyrrhizæ*, *Caricarū pinguium*, *Passularum enuclearum*, *Fœniculi* ana ℥.x.

Zingiberis, *Anisi*, *Carui*, *Sem. Ligustici*, *Mellis* uel *sacchari* q. f.

Fiat electuarium, in uase fictili uitrato conferuandum. * Hoc accommodatum est ad capitis querelam ex frigido: uuam exiccat, arterias purgat, tussim compefcit, omnes frigiditates pectoris & stomachi emendat, digestionem procurat, pleuriticis & empycis mirabiliter opitulatur. Nicolaus.

Diaprasium.

℞. *Prasij* ℥.v.β.

Tragacanthæ, *Pinearum mundatarum*, *Amygdalarum dulcium*, *Pistaciorum*,

rum, Carnium Daſtylorum, Caricarum pinguium, Paſſolarum enu. A
cleatarum ana ʒ. iij. ʒ.

Cinnamomi, Caryophyl. Nucis Moſchatę, Macis, Ligni aloęs, Galäge, Spi
cę Indię Zingiberis, Zedoarię, Glycyrrhię, Rhapontici, Anacardij,
Storacis calaminthę, Galbani, Terebinthiņ, Maſtiches, Myrrhę, Ireos,
Ariſtoloch. rotūde, Cort. rad. Capparis, Gętianię, Melanopiperis, Aniſi,
Fęniculi, Anethi, Apij, Petroſelini Macedonici, Saxifragię ana ʒ. ij.

Hermodaſtylorum, Origani, Peucedani, Schęnanthi, Cardamomi, Leu
copiperis, Carui, Liguſtici, Vincentoxici ana ʒ. j. ʒ. G. ij. ʒ.

Balaſamitę, id eſt, menthę aquaticę, Pulegij, Diſtamni Cretici, Coſti, Pyre
thri, Satureię, Baſiliconis, Pęonię, Macropiperis, id eſt, piperis longi,
Amomi, Orobi, id eſt, erui ana ʒ. j. G. ij. & tertiam partem alterius.

Xilobalaſami, id eſt, ligni Balaſami, Caſię fiſtulę, Corallij, Raſurę Eboris,
Carpobalaſ. id eſt, ſemin. Balaſami, Dauci ana ʒ. ʒ. (Daucus Creticus eligędu.)

Moſchi, Ambre, Oſis cordis ceruini ana G. xiiij.

Mellis deſpumati quod ſufficit.

Fiat electuarium. Seruatur in uafe fictili uitrato, ad annos duos. * Sanat ea
pitis uertigines, oculorum caligines abſtergit, palatum & arterias purgat,
diſtillationem uoę aſtringit, dentium dolorem mitigat, aſthmaticis & ſpirio
ſis peculiariter opitulatur: peętoris & pulmonis cauſas facile amputat, ſto
machi & hepatis dolorem & debilitates ſedat, ſpleneticorum & pleuretico
rum anguſtias paragorizat, omnium interaneorū uitijis prodeſt, inflationes
& torſiones ab eis aufert. Nephriticos, calculoſos, ſtrangurioſos & colicos
purgat, & dolorem releuat: ſępius autem ſumptū, colorem pallidum emen
dat, menſes deducit, & in ordinę debitum redigit. Typos quotidianarios &
quartanarios reprimat. Qui autem hoc electuario uſus fuerit, à multis con
ſeruabitur morbis. Nicolaus.

Diacalaminthon.

ʒ. Calaminthę montanę, Calaminthę campeſtris, Seſelios, Petroſelini
Macedonici ana ʒ. vi. Zingiberis ʒ. iij.

Apij, id eſt, ſeminis Apij, Comarum Thymi ana ʒ. ij.

Liguſtici ʒ. vj.

Piperis, id eſt, piperis nigri ʒ. xij.

Mellis quantum ſufficit.

Fiat electuarium. Seruatur per annum. * Auxiliatur ijs quos cibi ſtupidum
urget, appetentiam reuocans: ægrę quoq; ſpirantibus, uentriculo refrige
rationem ſentienti, & flatibus diſtento conſert. Meſues.

Diacalaminthon aliud.

ʒ. Calaminthę, Pulegij, Petroſelini, Seſelios ana ʒ. j.

Apij

- A** Apij, Cacuminum Thymi ana ʒ. ij.
 Libyſtici ſeminis ʒ. viij.
 Piperis ʒ. xxiiij.
 Mellis quantum ſufficit.
 Fiat electuarium. * Crassa & lenta attenuat & diſcutit, urinas mouet, ac muliebres menſes. Galenus.

Diatthamaron.

- ℞. Anthophyllorum, Zingiberis ana ʒ. v. ʒ. j. G. xvj.
 Cinnamomi, Carnium Daſtylorum, Caryophyllorū ana ʒ. iiij. ʒ. j. G. xvj.
 Galangæ, Spicæ Indicæ, Zedoariæ, Coſti, Pyrethri, Corallij albi, rubei, Rheupontici, (accipiatur rhabarbarum ſic uocatum) Saliuncæ, Tragacanthæ, Anacardij, Oſium daſtylorum, Carpobalsami, Aniſi, Baccharum Iuniperi, Leucopiperis, Macropiperis ana ʒ. j. ʒ. ij. G. viij.
 Limaturæ auri puri, argenti meri, Oſium de corde cerui ana ʒ. ij. ʒ. β.
 Raſuræ Eboris, Moſchi ana ʒ. j. G. vij.
 Ambræ ʒ. j.
 Mellis quantum ſufficit.
 Fiat electuarium. Datur ʒ. iiij. manè uel ueſperi cum uino. * Efficaciter prodeſt difficulter ſpirantibus, arteriacis, tuſſientibus, tabidis, & omni thoracis & ſtomachi offenſæ; aque ſubter cutem fuſæ, renum doloribus: uoluptatem parit, corporaq; ſaginat. Nicolaus.

DE ELECTVARIIS CALEFACTANTIBUS COR.

Aromaticum roſatum Gabrielis.

- ℞. Roſarum rubearum ʒ. xv.
 Glycyrrhiſæ raſæ ʒ. viij.
 Ligni aloës, Santali Machoziri ana ʒ. iiij.
 Cinnamomi electi ʒ. v.
 Macis, Caryophyllorum ana ʒ. ij. ʒ. β.
 Gummi Arabici, Tragacanthæ ana ʒ. ij. ʒ. ij.
 Nucis moſchatæ, Cardamomi minoris, Galangæ ana ʒ. j.
 Spicæ Indicæ, Ambræ grifeæ ana ʒ. ij.
 Moſchi ʒ. j.
 Trita & in puluerem redacta permifcentur cum
 Syrupi roſati, Syrupi è cort. Citri, Sacchari albi ana ʒ. ix.
 Coque, fiat electuarium iuſte conſiſtentia. Seruatur per annū, & ultra in uaſe ſiftili uitrato. * Cerebrum, cor, uentriculum & omnia nutritioni ſamulatia membra roborat, appetentiam excitat, cōcoctionem iuuat, uifcerum excrementoſam

mentofam humiditatem abfumit, ac ex morbo cōualefcenribus auxiliatur. **A**

Aromaticum caryophyllatum.

R. Caryophyllorum ʒ. vii.

Macis, Zedoarię, Galāgę, Santali Machoziri, Trochifcorum diarrhodon, Cinnamomi, Ligni aloes, Spicę Indicę, Piperis longi, Cardamomi maioris ana ʒ. j.

Rofarum ʒ. iiij.

Glycyrrhizę rafę, Gallę Moschatę uerę ana ʒ. ii.

Folij, (fumatur eius loco castia lignea uera, aut duplex pondus Cinnamomi) Cubearum ana ʒ. ij. G. v.

Ambre ʒ. j. Moschi ʒ. ʒ.

His tenuiffimę tritis, & cum

Syrupi de citro, Sacchari albi ana quantum fufficit, permiftis, fiat electuarium. * Cor, uentriculum, & reliqua nutritionis membra roborat, naufeam & uomitum reprimit, flatus diffipat, putredinem humorum in uentriculo arcet. Mefues.

Dianthon.

R. Florum Rorifmarini ʒ. j.

Violarum, Rofarum, Glycyrrhizę ana ʒ. vj.

Caryophyllorum, Spicę Indicę, Nucis Moschatę, Galangę, Cinnamomi, Zingiberis, Zedoarię, Macis, Ligni aloes, Cardamomi, Anifi, Anethi (uidelicet feminis) ana ʒ. iiij. Mellis quantum fufficit. **B**

Fiat electuarium. * Prodest præter rationem tribulatis, cardiacis: animi lætitiã auget. Eos roborat, qui à longo morbo debiles adhuc sese recolligunt: uentriculum perpulchrę emendat. Nicolaus.

Diaxyloaloes.

R. Ligni aloes crudi, Rofarum ana ʒ. j.

Caryophyllorum, Spicę Indicę, Macis, Nucis moschatę, Gallę moschatę, Mel. Cubearum, Cardamomi maioris, minoris, Masticis, Cinnamomi, Cyperi, Schœnanthi, Zedoarię, Been albi, rubri ana ʒ. ʒ.

Folij, aut Macis, siue Spicę nardi, Setę crudę, Margaritarum, Corallij rubei, Carabę, Foliorum Citri, Cort. Citrei mali, Ocimi Caryophyllati, Sifymbrij, Menthę ficcę, Sampfuci, id est, Maioranę, Piperis longi, Zingiberis ana ʒ. iiij.

Moschi boni ʒ. j. Ambre ʒ. j. ʒ.

Mellis Emblicorum, Miue aromatizatę ana q. f.

Fiat electuarium. Dosis à ʒ. j. usque ad ʒ. iiij. * Prodest malis uentriculi, cordis, & iecinoris frigidis, animę defectiõni, concoctiõniq̄ue. Oris fœtorem abigit, læticiãq̄ parit. Mefues.

Diamar-

A

Diamargaritum calidum.

℞ Margaritarum non perforatarum, Pyrethri ana ʒ. j.
 Zingiberis, Mastiches ana ʒ. iiij.
 Zedoariæ, Doronici, Seminis Apij, Radicis Thapsiæ, Cardamomi, Nucis
 moschatae, Macis ana ʒ. ij.
 Been rubei, Piperis, Macropiperis ana ʒ. iiij.
 Cinnamomi ʒ. v.
 Sacchari quantum sufficit.

Fiat electuarium. Seruatur annis duobus uel tribus. * Valet mulieribus:
 rectificat enim dispositionem matricis, & uentriculorum earum. Auicenna.

Electuarium de gemmis.

℞ Margaritarum albarum ʒ. iiij.
 Saphyri, Hyacinthi, Sardæ, Granatorum, Smaragdi ana ʒ. j. β.
 Zedoariæ, Doronici, Corticū Citrei mali, Macis, Seminis Ocimi ana ʒ. ij.
 Coralliorum rubeorum, Charabæ, Limaturæ Eboris ana ʒ. j. ʒ. ij.
 Behen alb. & rub. Caryophyllorum, Zingiberis, Piperis longi, Spicæ Indi
 cæ, Folij, Croci, Heyl, id est, Cardamomi ana ʒ. j.
 Trochisci diarrhodon, Ligni aloes ana ʒ. v.
 Cinnamomi, Galangæ, Zurumbet ana ʒ. j. β.

B

Foliorum auri & argenti ana aur. β.
 Moschi boni ʒ. β.
 Ambre ʒ. ij.

Confice cum melle Emblicorum, & colato melle rosato ana quantum sufficit.
 Datur ab aureo semisse ad aureum unum, cum aqua buglossæ. * Malis cor-
 dis, uentriculi, cerebri, iecinoris, & uteri frigidis auxiliatur. Item palpitationi
 cordis, defectiōni animæ, ac concoctiōni: tristitiam deniq; citra causam ortā
 amouet. Mesues.

Electuarium letificans.

℞ Florū Ocymi caryophyllati, Croci, Zedoariæ, Ligni aloes, Caryophyl-
 lorum, Corticū Citrei mali, Galangæ, Macis, Nucis moschatae, Storacis Ca-
 lamithæ ana ʒ. ij. β.

Anisi, Rasuræ Eboris, Thymi, Epithymi ana ʒ. j.
 Camphoræ, Moschi, Ambre, Margaritarum perforatarū, Olsium de cor-
 de cerui ana ʒ. β.

Auri foliati meri, id est, purissimi, *seingolo*, Argenti foliati meri ana ʒ. j.
 Sacchari albissimi quantum sufficit.

Fiat confectio solida. Si uerò uolueris facere in forma liquida, siue opiatae,
 tunc adde

Succi Cydoniorum, Pomorum odoratorum dulciū, Borriginis, Vini ue-
 teris optimi, ana partes æquales, in tanta mensura, quanta despumando &
 Pp decoquendo

decoquendo saccharo satis fuerit. Nulla enim aqua saccharum dissolui aut A decoqui ad spissitudinem debet in hac confectione. * Læticiam, colorisq; bonitatem efficit, concoctionem iuuat, & canitiem arceat. Galenus.

Electuarium lætificans.

℞. Seminis Melissæ, Corticum Citrei mali, Caryophyllorum, Gallæ moschatæ Mesuæ, Mastiches, Croci, Cinnamomi, Nucis Moschatæ, Cardamomi maioris, Ne remisc. pro quò potest semen pæoniæ accipi, Been albi, rubei, Zedoariæ, Doronici, Seminis Ocimi garyophyllati ana ʒ.β. ʒ.j. G.iiij.

Sacchari albisissimi quantum sufficit.

Fiat confectio in tabulis. Si uerò uolueris forma electuarij, ea syrupo sequenti excipies, qui

℞. Myrobal. Chebularum n.xx. Myrobal. Emblicarum n.xxx.

Trita, & in lb. iij. aquæ communis, ad duarum tertiarum consumptionem, cocta percolabis. Colaturæ addes

Mellis despumati lb. ij.

Coque, fiat syrupus, quo prædicta excipies, & fiet electuarium. * Ad affectus cordis, uentriculi, iecoris, quas partes etiam roborat, admodum cõfert: palpitationem cordis emendat, ualenter exhilarat, & coctionem iuuat, coloremq; uiuidum efficit. Rhasis.

Electuarium lætificans, aliud.

℞. Rosarum, Ligni aloes ana ʒ. v.

Macis, Nucis moschatæ, Gallæ moschatæ, Cardamomi utriusq; ana ʒ. ij.

Cinnamomi, Croci ana ʒ. ij. Cyperi ʒ. v.

Caryophyllorum, Mastiches, Spicæ nardi, Afari ana ʒ. iij.

Melle emblicarum excipe.

Moschi G. xv. aromatiza.

Datur a ʒ. j. ad ʒ. iij. Ad eadem ad quæ præcedens ualet. Mesues.

Confectio liberantis.

℞. Radicum Tormentillæ, Seminis Acetosæ, Endiuæ, Coriandri præparati, Citrei mali ana ʒ. j. β.

Santalorum omnium, Dictamni albi ana ʒ. j.

Boli armeni præparati, Terræ sigillatæ (loco eius, bolus leuaticus, id est, Orientalis sumatur) ana ʒ. iij.

Margaritarū, Corallij albi, rubei, Carabæ, Rasuræ Eboris, Spodij, id est, Eboris vili, de quo in sine: Ofsium de corde cerui, Been albi, rubei, Doronici, Cardamomi, Cinnamomi, Macis, Ligni aloes, Casiæ lignæ, aut succedaneæ eius, Croci, Zedoariæ ana ʒ. β.

Smaragdi (loco eius, hyacinthi aut granati) Hyacinthi, Granati, Serici crudi torrefacti & incisi ana ʒ. j.

Penidij, Sacchari candi ana ʒ. ij.

Florum

- A** Florum Nenupharis, Buglossæ, Rosarum ana ʒ.ij.
 Caphuræ G.vij.
 Moschi, Ambræ ana G.ijij.
 Sacchari albi quantum sufficit.
 Fiat electuarium. * Contra pestem plurimum ualet: tutatur corpus ne læ-
 datur à pestifero aere, & præseruat humores à corruptione.

Confectio cordialis.

- ʒ. Margaritarum, Spodij, (id est Eboris usti) Granatorum uerorū, Cin-
 namomi, Tormentillæ, Boli Armeni ana ʒ.ijij.
 Santalorum omnium, Rasuræ Eboris, Vnicornu ana ʒ.ij.
 Hyacinthorum, Saphyri, Coralli albi, rubri, Charabæ albi, Valerianæ ue-
 ræ, Dictamni, Zedoariæ Ligni aloes ana ʒ.ij.
 Terre sigillatæ ʒ.ij. ʒ.ij.
 Serici crudi, torrefacti modicè ʒ.ij.
 Osis de corde cerui ʒ.ij.β.
 Been albi, rubri ana ʒ.ij. Fol. auri n.v.
 Moschi, Ambræ ana G.x.
 Sacchari albi quantum sufficit.
 Fiat electuarium. * Præseruat cor in peste.

B COR quoq; CALFACIUNT, roborantq; Diambra, Diamoschum dul-
 ce & amarum, Pririfarcoticum, &c. de quibus uide supra suo loco.

DE ELECTVARIIS EXCALFACIENTI-
 bus uentriculum.*Diagalanga.*

- ʒ. Galangæ, Ligni aloes ana ʒ. vij.
 Caryophyllorum, Macis, Ligustici ana ʒ.ij.
 Zingiberis, Macropiperis, Leucopiperis, Calami aromatici, Cinnamomi
 ana ʒ.ij.β.
 Calaminthæ siccæ, Menthæ siccæ, Cardamomi maioris, Spicæ Indicæ, Semi-
 nis Apij, Fœniculi, Anisi, Carui ana ʒ.ij.
 Mellis despumati quantum sufficit.
 Fiat electuarium. * Valet aduersus crassiores flatus, acidos ructus, prauaq;
 concoctionē: itē actiones uentriculi & iecoris à frigiditate impeditas robu-
 stiores reddit, easdemq; emendat. Melues.

Dianisum.

- ʒ. Sem. Anisi ʒ.ij.β.
 Glycyrrhizæ rasæ, Masticis ana ʒ.ij.
 Sem. Carui, Fœniculi, Macis, Galangæ, Zingiberis, Cinnamomi ana ʒ.v.
 Piperis nigri, albi, longi, Casie Pyrethri, Calaminthæ ana ʒ.ij.
 Cardamomi maioris ana ʒ.ij.β.

Pp 2 Caryo-

Caryophyllorum, Cubearum, Croci, Spicę Indicę ana ʒ. j. β. A

Sacchari albi ʒ. v.

Mellis despumati quantum sufficit.

Fiat electuarium. * Intemperiem frigidam uentriculi à pituita cruda, uel etiam flatibus sanat, & tussim diurnam à frigida causa genitam Mesues.

Diacuminum.

℞. Cymini pridie in aceto macerati, deinde siccati ʒ. x.

Zingiberis, Cinnamomi ana ʒ. β.

Caryophyllorum, Ligni aloes, Macis ana ʒ. ij. β.

Galangę, Piperis longi, Cardamomi ana ʒ. ij.

Mofchi ʒ. β.

Mellis despumati quantum sufficit.

Fiat electuarium forma conuenienti. Conseruatur annis duobus. * Ventriculum & uiscera reliqua calefacit: concoctionem iuuat: flatus in dictis uisceribus natos dissipat. Mesues.

Diacyminum aliud.

℞. Cymini in aceto preparati ʒ. viij. ʒ. j.

Cinnamomi, Caryophyllorum, Zingiberis, Piperis nigri ana ʒ. ij. G. v.

Galangę, Thymbraę, Calaminthes, Ammi, Ligustici ana ʒ. j. G. xvij. B

Piperis longi ʒ. j.

Spicę nardi, id est, Indicę, Cardamomi, Nucis moschatę ana ʒ. ij. β.

Omnibus tritis, & in puluerem redactis, mellisq; despumati q. s. exceptis, fit electuarium. Seruatur ad annos duos in uase fictili nitrato. Fit etiam forma solida cum saccharo, hoc est, ad singulas specierum dimidias uncias, libram sacchari commiscendo. * Confert frigiditati thoracis, stomachi, inflatis, colicis, febre quartana laborantibus, & uentriculi coctionem iuuat. Nicolaus.

Diacinnamomum.

℞. Cinnamomi ʒ. xv.

Calsię, Cimini, Rad. Enulę ana ʒ. β.

Galangę ʒ. vij.

Caryophyllorum, Piperis longi, Cardamomi maioris, minoris, Zingiberis, Macis, Nucis moschatę, Ligni aloes ana ʒ. iij.

Croci ʒ. j.

Sacchari ʒ. v.

Mofchi ʒ. ij.

Excepta mellis despumati lb. ij. ʒ. viij.

Coque, fiat electuarium. * Concoctionem iuuat, etiam pituitę putredinem prohibet, distributionem alimenti in corpus promouet. Mesues.

Diazin-

A

Diazingiber.

℞. Zingiberis, Galangæ, Caryophyllorum, Cinnamomi, Nucis moschatæ, Granorum paradisi, Piperis longi, Macis, Cardamomi, Spicæ Indicæ, Rhabbarbari, Rosarum rubrarum ana ℥. xv.

Pinearum mundatarum ℥. β.

Pistaciorum ℥. ♥.

Anisi, Fœniculi, Glycyrrhizæ rasæ, Croci ana ℥. β.

Sacchari albi quantum sufficit.

Fiat electuarium. Conseruatur per annum. * Stomachum confortat, digestiuam uirtutem adiuuat, uitio pectoris ex frigiditate ualet, renes confortat, libidinem potenter incitat. Nicolaus.

Diaspoliticum.

℞. Cumini in aceto macerati & usti, Piperis longi, Comarum rutæ ana ℥. j. Nitri ℥. β.

Terantur crassius, & cum mellis despumati, quod satis est, fiat electuarium in bona forma. * Aluum deijcit, cibos qui in uentre corrupti sunt, educendo: ijs q̄ conuenit, quibus uenter frigidus est, aut ad frigus propensior: siquidem pituitam extenuat, & spiritum flatulentum expellit. Galenus.

Diatrion pipereon.

B

℞. Piperis nigri, albi, longi ana ℥. l.

Anisi, Thymi, Zingiberis ana ℥. j.

Mellis quantum satis est.

Fiat electuarium. Recipit etiam uniuscuiusq; generis piperum ℥. iij. * Vetriculi refrigerationibus, acido ructui, quartanis, resolutis, iecinorosis, & inflammationibus auxiliatur. Galenus.

Aliud.

℞. Trium piperum ana ℥. v.

Zingiberis, Thymi, Anisi ana ℥. ij.

Spicæ nardi, Ammi, Amomi, Cinnamomi ana ℥. j.

Cassia, Sem. Apij, Seseleos, Afari, Rad. Enulæ ana ℥. β.

Mellis quantum sufficit. Fiat electuariū. * Hoc magis fluxionibus, que à capite ad thoracem descendunt, conuenit. Mesues.

Electuarium ex citro.

℞. Corticum Citri aur. xx.

Caryophyllorum, Ligni aloes, Cinnamomi, Macis, Galangæ ana ℥. ij.

Cardamomi, Zingiberis ana ℥. j.

Mofchi ℥. v.

Mellis quantum sufficit.

Fiat electuarium. Datur ad ℥. v. * Cor & uenterulum roborat, coctionem iuuat,

Pp 3

iuuat, oris halitum commendat, flatūs crassos dissipat. Mesues.

A

Electuarium de baccis lauri.

℞. Fol. Rutæ, Sem. Ammi, Cymini, Nigellæ, Ligustici, Carui, Dauci, Origanii, Amygdal. amararum, Piperis nigri, longi: Menthaltri, Baccarum Lauri, Castorij ana ʒ. ij.

Sagapeni ʒ. β.

Opopanacis ʒ. iij.

Mellis lb. j. ʒ. iij.

Tritis diligenter quæ triturlanda sunt, fiat electuarium: deinde addantur lachrymæ in uino dissolutæ. * Valet ad colicam & iliacam passionem, & doloribus intestinorum ex causa frigida, uel flatuosa. Rhasis.

Rosat nouella.

℞. Rosarum, Sacchari Glycyrrhizæ ana ʒ. j. ʒ. ʒ. ij. ʒ. β.

Cinnamomi ʒ. ij. ʒ. ij. G. ij.

Caryophyllorum, Nardi, id est, spicæ Indicæ, Zingiberis, Galangæ, Nucis moschatae, Zedoarie, Storacis calamithæ, Cardamomi, Sem. Apij ana ʒ. j. G.

Sacchari albisimi quantum sufficit.

Fiat electuarium. Seruatur per annum. * Confert apprimè calori & siccitati stomachi, cordis, hepatis & pulmonis: sitim compescit & uomitum: abscindit debilitatem stomachi, astringit laxa: cordiacis subuenit, sudorem diaphragmaticum reprimat, ex chronica infirmitate debiles recreat. Nicolaus.

B

DE ELECTVARIIS EXCALFACIENTIBVS

hepar.

Dialacca.

℞. Laccæ lotæ, Rhabarbari ana ʒ. iij.

Spicæ nardi, id est, Indicæ, Masticis, Sem. Apij, Succu Absinthij, Succu Eupatorij, Ammi, Sabinæ, Amygd. amararum, Costi, Myrrhæ, Rubiæ, Fœniculi, Anisi, Asari, Aristolochiæ rotundæ, Gentianæ, Croci, Cinnamomi, Hyssopi, Calsiæ, Schœnanthi, Bdellij ana ʒ. j. β.

Piperis, Zingiberis ana ʒ. j.

Myrrham & bdellium in uino infunde, cætera tenuissimè tere, & melle despumato quantum satis est, excipe: fiat electuarium. * Ventriculum & hepar roborat, hepatis obstructions aperit: eius scirrhum dissoluit, & ex his nascentem cachexiam & hydropem sanat, urinas mouet, lapidemq; renu & uesciæ fragit. Mesues.

Diacurcuma.

℞. Tracacanthæ ʒ. j.

Croci, Asari, Sem Petroselini, Apij, Dauci, Anisi ana ʒ. iij.

Rhabarbari optimi, Mei, Spicæ nardi, id est, Indicæ ana ʒ. vj.

Costi,

A Costi, Myrrhæ, Casiæ, Schœnanthi, Carpobalsami, Rabiæ tinctorum, Succi Absinthij, Succi Eupatorij, Olei Balsami ana ʒ. ij.
 Calami aromatici, Cinnamomi ana ʒ. j. β.
 Scordij, Ceterach, id est Aspleni, Succi Glycyrrhizę ana ʒ. ij. β.
 Trita, & mellis despumati quantum sufficit, excepta, fiat electuarium. * Vētriculo, iecoris, lienis morbos frigidos, ob idq; diuturnos sanat: & hinc orta symptomata, ut hydropem, cachexiam, colorem corporis fœdum, humorū in uentriculo corruptelam, renum & vesicę uitia frigida, urinamq; euocat. Mesues.

Diacurcuma minor.

ʒ. Spicæ nardi, Myrrhæ, Casiæ, Croci, Schœnanthi, Costi, Cinnamomi ana ʒ. j.
 Mellis despumati quantum sufficit.
 Fiat electuarium. * Idem pollet quod superior, sed imbecillius. Mesues.

Cyphoides.

ʒ. Pulpæ passarum pinguium ʒ. iij.
 Croci, Calami aromatici, Bdellij ana ʒ. ij. β.
 Casiæ, Cinnamomi ana ʒ. j. β.
 Spicæ nardi ʒ. iij.
B Schœnanthi ʒ. ij. β.
 Myrrhę ʒ. iij.
 Rad. Aspalathi ʒ. ij.
 Terebinthinæ ʒ. iij.
 Mellis, Vini ana quantum sufficit.
 Coque, fiat electuarium, ut artis est. * Ad hepaticos, & thōracis affectiones utilis est. Andromachus.

Diacostum.

ʒ. Costi cãdidi aromatici amari, Casiæ lignę uerę, Cinnamomi ana ʒ. v.
 Sem. Apij, Anisi, Schœnanthi, Rhabarbari ana ʒ. iij.
 Afari ʒ. iij.
 Croci, Aristolochiæ rotundæ, Myrrhæ ana ʒ. ij.
 Sacchari uel mellis quantum sufficit.
 Fiat electuarium. Seruatur per annum. * Valet ad dolorem uiscerum, & opilationem in eis, & ad principium hydropis. Mesues.

Confectio Rauedseni.

ʒ. Rhabarbari, Succi Eupatorij, Succi absynthij ana ʒ. v.
 Myrrhæ, Croci ana ʒ. j.
 Spicę nardi, Afari, Casiæ, Scœnanthi, Fumarię, Sem. Anisi, Apij, Amygdal. amar. ana ʒ. β.
 Mellis

Mellis despumati quantum sufficit.
 Fiat electuarium. * Obstructiones potenter aperit, & inde natos affectus, icterum, febres putridas etiam inueteratas, formæ corruptionem sanat. Mesues. A

HEPAR quoque EXCALFACIUNT, Diacinnamomū, Diacalamentum: de quibus uide supra suo loco.

DE ELECTVARIIS EXCALFACIENTI-
 bus splenem.

Diacapparitis.

℞. Capparitis ꝑ. iiij.
 Scillæ, Afari, Centaureæ, Pyrethri, Piperis nigri, Thymi, Apij, Seminis Gith, Agrimonix radice ana ꝑ. j.
 Mellis quantum sufficit.

Fiat electuarium. * Ad vitia splenis ualet. Gilbertus de Anglia.

SPLENEM quoque EXCALFACIUNT, Diacostum, Diacalamentū, &c. de quibus uide supra suo loco.

DE ELECTVARIIS EXCALFACIEN-
 tibus matricem.

Electuarium ducis.

℞. Anisi ꝑ. ij. G. xv.
 Glycyrrhizæ, Mastice ana ꝑ. ij. G. v.
 Chamædryos, Cinnamomi, Zingiberis, Galangæ, Fœniculi, Carui ana ꝑ. j. G. xv.

Xylocassix, Calaminthæ, Dauci, Pyrethri, Piperis albi, Piperis longi, Cyperi, id est, rotundi, Schœnanthi, Ireos, Amomi, Folij, Afari ana ꝑ. j.

Spicæ nardi, id est, Indicæ, Croci, Gummi Arabici, Tragacanthæ, Sem. Anethi, Calami aromatici, Cubebarum, Caryophyllorum, Carpobalsami, Cardamomi, Ligustici, Seminis Olusatris, Baccarum Iuniperi, Seseleos, Pentaphylli, id est, rad. eius, Sem. Asparagi, Sem. Citri, Acori, Ammios, Rhabbari, Nucis moschata, Ligni aloes, Basilici caryophyllati, Milij folis, Sem. Saxifragiæ, Nucleorum sem. Citrulli, Nucleor. sem. Cucumeris, Nucleor. sem. Melonis, Nucleor. sem. Cucurbitæ, Sem. Scariole, Petroselinum Macedonici, Been albi, rubri, Storacis calamitæ ana ꝑ. β. G. v.

Penidiorum ꝑ. iiij. ꝑ. ij. β.

Sacchari, uel mellis despumati quantum sufficit.

Fiat electuarium. Conseruatur per annos tres. * Valet ad indigestionem & uentositatem stomachi & intestinorum, & ilei dolorē & lapidis. Nicolaus.

Electuarium ex asa.

℞. Liquoris Cyrenaiici, Piperis, Myrrhæ, Fol. Rutæ ana ꝑ. β.

Mellis

A Mellis despumati quantum sufficit.

Fiat electuarium. Datur à 3.j. ad aureum unum, in febre cum oxymellite per horam ante accessionem, contra uenenum cū uino calido. * Ad febres antiquas, & circuitu repetentes, ut quartanas, quotidianas, somnum grauē, tremorem, uenenosos morsus. Mesues.

MATRICEM quoq; EXCALFACIUNT, Diambra, Diacalamenthū, Electuarium de gemmis, &c. de quibus uide suprā suo loco.

DE ELECTVARIIS REFRIGERANTIB. CAPVT.

Diacodion.

℞. Caputum papaueris flaccidorum n. x.

Aquæ cœlestis sextarium j.

Coquantur ad tertias: id est, tandiu, usquequò tertia pars aquæ superfit. Colaturæ expressæ adde,

Sapæ optimæ ad tertias coctæ 3. iij.

Mellis optimi 3. j.

Coquantur ad perfectionem: deinde addantur,

Acaciæ liquidæ, Hypocisthidis, Croci, Myrrhæ, Balauftiorum ana 3. j.

Ramich 3. iij.

Fiat electuarium: conseruatur per annos tres. * Confert eis quibus ex capite ad pectus & ad pulmonem subtiles catarrhi defluunt, & sunt causa tussis.

B

Mesues.

Diacodion aliud.

℞. Caputum papaueris, neq; perquam uiridium, neq; etiam ariditate exutorum n. xiiij.

Rosarum 3. j. β.

Croci, Acaciæ, Glycyrrhizæ ana 3. j.

Boli Armeni 3. β.

Cinnamomi, Hali, Hypocisthidis, Balauftiarum ana 3. j.

Myrti, Dauci ana 3. j.

Coralli cãdidi, rubri, Rhus culinarij, Sãguinis draconis, Flo. Altheę ana 3. j.

Sem. Portulacæ 3. j. β.

Capita papaueris in cœlesti imbri sufficienti duos dies macerato: postridie ad tertias coquito, & decoctum expressum ad iustam consistentiam coquito cum Mellis optimi ℥ ij. Postremo deposito ab igne uase, species subtilissimè tritas adijcito, & bene unito. * Auxilio est cœliacis, dysentericis, leuitati intestinorum, alui profluuio, cum aqua cœlesti, in qua spodiū inferbuerit, aut succinum torrefactum, uel cum stillatitio rosarum liquore. Actuarius.

DE ELECTVARIIS REFRIGERANTIB. PECTVS.

Diapapauer.

℞. Succu Liquiritiæ, Tragacanthi, Gummi Arabici ana 3. x.

Qq

Sem.

Sem. Papaueris albi, Penidiorum ana ʒ. xx. A
 Amygdal. dulc. mundat. ʒ. x.
 Amyli, Sem. Citoniorum, Portulacæ ana ʒ. v.
 Sem. Melonis, Cucurbitæ, Cucumeris, Lactucæ, Maltæ ana ʒ. viij.
 Fac puluerem, confice cum syrupo uiolarum uel sapa. * Mirabiliter prodest
 hæcticis, phthificis, nimium uielantibus. Nicolaus.

Diatragacanthum frigidum.

ʒ. Tragacanthæ albissimæ ʒ. ij.
 Gummi Arabici ʒ. j. ʒ. ij.
 Amyli, Glycyrrhizæ, Sem. Cucurbitæ mundat. Cucumeris, Citrulli, Melonis ana ʒ. ij.
 Caphuræ ʒ. β.
 Penidiorum ʒ. iij.
 Sacchari albi quantum sufficit.

Fiat electuarium. conseruatur per annum. * Medetur omnib. pulmonum & thoracis uitijs aridis, maximè tabidis, macie cōfectis: inflammatione lateris laborantib. omnibusq; tussibus calidis & siccis, exasperationi lingue & faucium, deuoratum tamdiu ægrotans in ore contineat, quoad liquefactū perfectè exugatur. Nicolaus.

Diapenidion sine speciebus calidis.

ʒ. Penidiorum ʒ. ij. ʒ. β.
 Pinearum, Amygdal. dulc. Papaueris albi ana ʒ. iij. ʒ. j.
 Succu Glycyrrhizæ, Tragacanthæ, Gummi Arabici, Amyli, Sem. Cucurbitæ, Citrulli, Cucumeris, Melonis ana ʒ. j. β.
 Caphuræ G. vij.
 Sacchari albi quantum sufficit.

Fiat electuarium. * Valet aduersus omnem thoracis noxam, tussim, uocis iacturam: tabidis deniq; & purulenta excreantibus succurrit. Nicolaus.

Electuarium resumptiuum.

ʒ. Rosarum, Glycyrrhizæ, Sacchari ana ʒ. ij. G. v.
 Gummi Arabici, Tragacanthæ ana ʒ. ij. ʒ. ij.
 Santali albi, rubri ana ʒ. j. ʒ. j.
 Papaueris albi, Succu Glycyrrhizæ, Amyli, Sem. Portulacæ, Lactucæ, Scabiolæ ana ʒ. iij.
 Caryophyllorum, Spodij, Cinnamomi ana ʒ. j.
 Zedoariæ, Zingiberis, Styrcis calamitæ ana ʒ. ij.
 Croci G. v.
 Penidiorum ʒ. β.

Sem.

- A** Sem. Cucurbitæ mundat. Citrulli, Cucumeris, Melonis ana ʒ. ij.
 Sem. Citoniorum ʒ. ij.
 Amygdal. dulcium, Pineorum nucleorum, Berberis, Sem. Maluæ, Coti si-
 ue Bombacis, Violarum, Sebesten ana ʒ. ij.
 Syrupi uiolati quantum sufficit.
 Fiat electuarium * Restaurat humiditatem radicalem, lenit, humectat, nu-
 trit, & confortat, aperit poros, obsistit cholerae, sedat febrem, tussim, & sitim,
 restituit integras vires, & pristinam sanitatem extenuatis, consumptis & he-
 cticis. Nicolaus.

DE ELECTVARIIS REFRIGERANTI-
bus cor.*Diarrhodon Abbatis.*

- ℞. Santali albi, rubri ana ʒ. ij. β.
 Tragacanthæ, Gummi Arabici, Spodij ana ʒ. ij.
 Afari, Masticis, Spicæ nardi, Cardamomi, Succu Glycyrrhizæ, Croci, Sem,
Cucurbitæ, Citrulli, Cucumeris, Melonis, Papaueris albi ana ʒ. j.
 Margaritarum, Osis de corde cerui ana ʒ. β.
 Sacchari candi, Rosarum rubrarum ana ʒ. j. ʒ. iij.
B Caphuræ G. xv. Alij G. vij.
 Moschi G. iij. β.
 Syrupi, rosati, Sacchari albi ana quantum sufficit.
 Fiat electuarium. Conseruatur per annum. * Valet aduersus uentriculi ca-
 lorem, iecoris, lienis, pulmonumq̄, contra uiscerum dolores, & omnem to-
 tius corporis noxam à calore proficiscentem.

Diatrion santalon.

- ℞. Santali albi, rubri, citrini, Rosarum, Sacchari candi ana ʒ. iij.
 Rhabarbari, Spodij, Succu Glycyrrhizæ, Sem. Portulacæ ana ʒ. vj. β.
 Gummi Arabici, Tragacanthi, Sem. Melonis, Cucumeris, Citrulli, Cucur-
 bitæ, Scariolæ ana ʒ. j. β.
 Caphuræ ʒ. j.
 Sacchari quantum sufficit.
 Fiat electuarium. * Aduersus hepatis & uentriculi calorem utilis est: præ-
 terea mirum in modum tabidis & regio morbo correptis prodest. Nicolaus.

Diamargariton frigidum.

- ℞. Sem. Citrulli, Cucurbitæ, Melonū, Cucumeris, Portulacæ, Papaueris al-
 bi, Santali moschatellini, citrini, Ligni aloes, Zingiberis, Rosarum rubrarū,
 Flor. Nymphaeæ, Borriginis, Baccarum Myrti ana ʒ. j.
 Coralli albi, rubri ana ʒ. β.
 Margaritarum ʒ. iij.

Qq 2 Sacchari

Sacchari quantum satis est.
 Fiat electuarium. Seruatur annis duobus. * Omnem uirium imbecillitatē
 firmat, syncopen iuuat, asthmaticos, tabidos, tussientes, longo morbo exte-
 nuatos, & imbecillitate languentes recreat, & ad pristinum recuperandum
 robur conducit. Nicolaus. A

DE ELECTVARIIS REFRIGERAN-
 tibus stomachum.

Electuarium de sorbis.

℞ Carnis sorborum propemodum maturorum coctorum in aqua, cui ro-
 sæ prius incoctæ fuerint, & cortices granatorum ℥. iij.

Mellis aut sacchari ℥. ij. β.

Coque ad crassitudinem, & reconde uase. Da ʒ. j. * Ventriculū roborat, im-
 modicam purgationem sistit. Mesues.

STOMACHVM quoq; REFRIGERANT, Diarrhodon Abbatis, Dia-
 trion santalon, &c. de quibus uide supra suo loco.

DE ELECTVARIIS REFRIGERANTI-
 bus hepar.

HEPAR refrigerant, Diarrhodon Abbatis, Diatrion Santalō, &c. de qui-
 bus uide supra. B

DE ELECTVARIIS REFRIGERANTI-
 bus splenem.

SPLENEM refrigerant, Diarrhodon Abbatis, Diatrion santalon, &c.
 de quibus supra.

DE ELECTVARIIS REFRIGERAN-
 tibus matricem.

MATRICEM refrigerant, Diatrion santalon, Diarrhodon Abbatis, &c.
 de quibus supra.

DE ELECTVARIIS REFRIGERAN-
 tibus iuncturas.

IUNCTURAS refrigerant, Diarrhodon Abbatis, Diatrion santalon:
 de quibus uide supra suo loco.

DE ELECTVARIIS ASTRINGENTIBVS.

Michlera.

℞ Myrobal. Citriorum, Chebulorum, Indorum, tostorum ana ʒ. ij. β.

Myrobal. Bellirorum, Emblicorum, tostorum ana ʒ. ij.

Sem. Nalturtij ʒ. ij. β.

Sem.

- A** Sem. Cymini, Anisi, Fœniculi, Ammios, Carui ana ʒ. j. β.
 Omnia cruda terantur, & macerentur in aceto uini modico horis uiginti-
 quatuor, exiccantur cum insperfo aceto, postea torreantur supra prunas. to-
 stis addantur,
 Spodij, Balauftiorū, Pulpę Sumachij, Masticis, Gūmi Arab. ana ʒ. j. G. xv.
 Omnia cū oleo rosato fricentur & commisceantur cum syrupi myrtini triplo.
 * Propriè ualet ad hæmorrhoides, & ad uentris torsionem, & rugitum lien-
 teriæ, & dysentericæ: & optima est omni solutioni uentris. Nicolaus.

Tryphera minor.

- ℞. Myrobal. Chebulorum, Bellinorum, Indorum, Emblicorum, Nucis
 moschata ana ʒ. v.
 Nasturtij, Asari, Origani Persici, Piperis, Olibani, Ammios, Zingiberis,
 Fructus Tamarisci satiuæ, Nardi Indicæ, Schœnanthi, Cyperi ana ʒ. iij.
 Scoriz ferri, quinq; diebus in aceto macerata, & deinde tostæ ʒ. xx.
 Myrobalani cum butyro recenti non salito assentur modicum, reliqua oleo
 amygdalino dulci inuoluantur: deinde addantur
 Moschi ʒ. j.
 Mellis despumati triplex pondus.

- B** Oportet autem diligenter attendere, ne myrobalani comburantur, cum in
 butyro assantur. * Valet ad corruptionem, ad abundantiam menstruorum
 & hæmorrhoidarum, & ad corruptionem formę, & debilitatem stomachi, &
 destruit humorem crudum, & clarificat colorem, & confortat uesicam, & ab-
 scindit fluxum uentris. Fœnon.

ASTRINGIT etiam Diacodion.

DE ELECTVARIIS CALCVLVM FRANGENTIBVS.

Electuarium Regina, magistrale & usuale.

- ℞. Sem. Saxifragiæ, Milij folis, Succij Liquiritiæ ana ʒ. β.
 Sem. Carui, Anisi, Fœniculi, Apij, Petroselini, Genistæ, Petroselini Mace-
 donici, Dauci, Brusci, Asparagi, Leuistici, Cumini, Iuniperi, Rutæ, Sileris
 montani, Baccarū Lauri, Rad. Acori ueri, Pulegij, Rad. Pentaphylli ana ʒ. ij.
 Spicæ Indicæ, Squinanthi, Peucedani, Valerianæ, Carabæ, Lapidis Lyn-
 cis ana ʒ. j. β.
 Galangæ, Zingiberis, Turbith ana ʒ. ij.
 Senæ Alexandr. ʒ. j.
 Sanguinis hirci præparati ʒ. β.
 Sacchari uel mellis quantum sufficit.
 Fiat electuarium. Medici Colonienses.

Electuarium Iustinum.

- ℞. Cinnamomi, Folij, Costi, Spicæ nardi Indicæ, Cassiæ lignæ, Aristolo-
 chiz

494 DE ELECTVARIIS OFFICINALIBVS.

chiæ longæ, rotundæ, Enulæ campanæ, Hyssopi, Pulegij, Artemisiæ, Pentaphylli, id est, rad. eius, Leucopiperis, Orobi ueri, Petroselini, Leuistici, Olusatrij, id est, Petroselini Macedonici, Sem. Vrticæ, Milij solis, Sem. Saxifragiæ, Baccarum Iuniperi, Sem. Asparagi, Sileris montani, Sem. Apij, Anethi, Rutæ, Citrei mali, Fœniculi, Anisi, Baccarum Lauri ana ʒ. j. β.

Sacchari albisimi quantum sufficit.

Fiat electuarium. Conseruatur per annos duos. * Valet ad dolorem renū, calculos frangit, & arenam expellit, & stranguriam dissoluit. Nicolaus.

Electuarium de cineribus.

ʒ. Cinerum Vitri, Scorpionum, Rad. Brassicæ, Leporis, Putaminum ouorum, (è quibus pullus exemptus sit) Lapidis Spongiæ, Sanguinis hirci præparati, Lapidis Iudaici, Gummi Iuglandis, Acori ana ʒ. j.

Petroselini, Dauci, Pulegij, Gummi Arabici, Sem. Altheæ, Piperis nigri ana ʒ. j. β.

Mellis quantum sufficit.

Fiat electuarium. Auicenna.

Lithontribon.

ʒ. Spicæ nardi, id est, Indicæ, Zingiberis, Xylobalsami, Acori, id est, calamii aromatici, Cinnamomi, Peucedani, id est, rad. eius, Meu, (loco eius accipe Sefeli Cretici radicē, id est, *Beervurtz*.) Melanopiperis, Macropiperis, Leucopiperis, Saxifragiæ ana ʒ. ij. β.

Opo balsami, (loco eius sumatur oleum de granis iuniperi) Caryophyllorum, Costi, Rheupontici, Glycyrrhizæ, Cyperi, Tragacanthæ, Sem. Olusatrij, Chamædryos, Sem. Apij, Ammios, Sem. Asparagi, Ocyimi, Vrticæ, Citrei mali ana ʒ. j. G. xv.

Folij, Croci, Schœnathi, Cassiæ lignæ, Bdellij, Masticis, Ireos, Amomi, Ligustici, Milij solis, Petroselini Macedonici, Seseleos, Sinoni, Cardamomi, Anethi, Euphorbij, Lapidis Lyncis, Olei Nardini, Olei Moschellini ana ʒ. j.

Sacchari albisimi quantum sufficit.

Fiat electuarium, in uase fictili uitreato conseruandum. * Præclarum ad indigestionem stomachi ex frigiditate: iliorum lumborumq; dolorem compescit, lapides in renibus & uesica potenter confringit, & inde mirabiliter expellit: stranguriam & dysuriam euestigiò soluit. Nicolaus.

DE ELECTVARIIS VENEREM STIMVLANTIBVS.

Diasatyrium.

ʒ. Testiculorū Satyrj recētium densorū, Rad. Pastinacæ satiuę recentū, Rad. Secacul, id est, *Gruzelmoer*, Nucis Indicæ, Pinearū, Pistaciorū ana ʒ. xij. Caryophyllorum, Zingiberis, Anisi, Sem. Erucę Fraxini ana ʒ. v. Cinnamomi, Caudarum Scincorum, Sem. Bulbi ana ʒ. ij. β.

Moschi

A Moschi G. vij.

Mellis despumati optimi lb. iij.

Fiat electuarium in fictili uase uitreato conseruandum per annum unum.

* Pollet contra uesicę & renum imbecillitatem: ijs etiam auxilio est, qui urinam reddere nequeunt: uenerem stimulat, eamq; certa de causa cessantem, haud segniter restituit. Nicolaus.

Diasatyrium aliud.

Rad. Secacul albi & mundi & elixati in decocto Cicerum, quorū prima aqua, in qua decoquebantur, sit effusa, lb. j.

Testiculorum uulpis ℥. viij.

Rad. Raphani ℥. iij.

Rad. Laph plani ℥. ij.

Terantur hæ tres radices posteriores, & infundantur super eas lactis bubuli aut ouilli tantum, ut lac duos digitos emineat, adijciendo

Olei Sefamini, Butyri recentis non saliti ana ℥. iij.

Coquantur cum facilitate usque ad consumptionem lactis, & donec omnino remollitæ sint radices, & habeant iustam spissitudinem instar pultis crassioris. nam si aqueum quod in lacte & radicibus est, non consumatur, situm contrahit hoc medicamentum. Postea adfunde omnibus hisce radicibus.

B Mellis despumati optimi lb. vi.

Succi cepearum recentium lb. j. β.

Coque omnia simul ad perfectam decoctionem: deinde ab igne depone, & insperge subsequentium specierum minutissimum puluerem,

Caudarum Scinci cum renibus & fumine ℥. j.

Seminis Erucæ ℥. iij.

Zingiberis, Been albi, rubri, Sem. Fraxini, Sem. Nasturtij, Cinnamomi, Piperis longi, Sem. Bauciæ, Sem. Napi, Pulpæ sem. Asparagi, maximè recentis ana ℥. iij.

Confice cum eis: ultimo uerò adijciantur subsequencia:

Pinearum mundatarum lb. j. β.

Pistaciorum ℥. x.

Confice, & misce omnia optimè, & aromatiza cum

Moschi boni ℥. j. * Valet ad erectionem uirgæ: multiplicat sperma, & desiderium coeundi. Mesues.

Tryphera Sarracenicæ.

Myrobalan. Chebolorum, Indorum, Belliricorum, Emblicorum, Citrinorum ana ℥. v.

Cinnamomi, Leucopiperis, Macropiperis, Melanopiperis, Secacul, id est, Siferis, Folij, Spicæ nardi, Cardamomi maioris, minoris, Calsiæ lignæ, Seitaragi Indi, id est, Lepidij, Cyperi, Apij, Lingue acris, Caryophyllorum, Been albi,

albi, rubri, Zingiberis ana ʒ. ij.

Nucis moschatæ, Macis, Sefami excorticati ana ʒ. iij.

Amygdalarum dulcium, amararum ana ʒ. v.

Ligni aloes, Masticis, Rhabarbari, Sem. Fœniculi ana ʒ. ij.

Ocymi caryophyllatæ, Menthæ siccæ, Origani Persici ana ʒ. j. β.

Fricentur myrobalani tritæ cum butyro uaccino recenti & non salito, aliæ uerò species cum oleo amygdalino dulci: & confice cum mellis despumati optimi triplo: & serua in uase fictili uitreato ad annos duos. Datur à ʒ. j. β. usque ad ʒ. iij. Addunt aliqui Turbith ʒ. v. Moschi ʒ. j. G. xv. * Concoctionem uentriculi & hepatis suo calore iuuat: ob id status dissipat, humores in uentriculo & alijs uisceribus putres absomit: oris & corporis odorem & colorem commendat, lassitudinem tollit, sanitatem præsentem tuetur, & morborum generationem prohibet, uenerem auget, hæmorrhoides sanat. Mesues.

DE ELECTVARIIS CONTRA VENENA.

Diarceuthidon Damocratis.

℞. Baccarum Iuniperi ʒ. β.

Terræ Lemniæ ʒ. ij.

Trita excipiantur

Olei dulcis quantitate sufficienti.

Alij butyrum recens loco olei sumunt. * Accipientem tutum à uenenis red dit. nam si uenenum non subsit, quieta manet: sin adsit, nauseam concitat, & euomere cogit, ita ut uenenum quoque cum antidoto reijciatur. Galenus.

Athanasia Mithridatis.

℞. Piperis albi G. xl.

Costi, Mei, Acori, Agarici, Scordij, Dauci, Petroselini ana ʒ. iij.

Croci, Myrrhæ ana ʒ. viij.

Cinnamomi, Cassiæ Schœnanthi ana ʒ. xij.

Mellis quantum sufficit.

Compone, ut artis est. * Facit ad uenena, & omnium uenenatorum morsus, quibusq; cibus in uentriculo acescit, sanguinemq; reijciunt: antiquas infu per tusses, hepatis, lienis, uesicæ & uteri morbos sanat. Galenus.

DE ELECTVARIIS OFFICINALI-

bus lenitiuis.

Flores cassia.

℞. Cannas seu siliquas Cassiæ ponderosas, & quæ non resonant conculsæ: aperi eas, & contentam in eis pulpam seu medullâ cum laminis & seminibus suis diligenter euacua: & exempta proijce super inuersum & angustû cribrû, setis equinis contextû. Cribrû deinde pone supra bulliētis aquæ uaporē, & auerso cochlearis cōuexo medullâ cassiæ hinc & inde ducito, ut per cribrum paulatim

A paulatim excernatur: & si quid excretum est, aut penetraverit, confestim subinde auferto, ne plus quam necesse est, de uapore imbibat: idque tandiu facito, donec quantum uoles, collegeris. Porro cum necessitas requirit, semper recentes exprime calsiæ flores: repositæ enim acescunt. Si quis calsiæ flores siue pulpam magis solutiuiam reddere uolet, in bullientem aquam projiciat folia Persici, aut flores Persici, & Prunellorum syluestrium, aut omnia hæc simul: horum enim uapor & distillata aqua soluit aluum. * Mundificat sanguinem, & compescit omnem acuitatem, & sedat sitim, & propriè cum succo Endiuia, aut Taraxaconis, in quibus aduenerit depuratio secundum artem. Et ipsa quidem mundificat stomachum, & educit choleram & phlegma, & operatur illud sine nocumento & excessu: caret enim mordicatione. Et ipsa quidem lenit pectus & guttur, & resoluit apostemata acuta in eis. Et confert calefactioni renum, sumpta cum diureticis in infusione glycyrrhizæ, & prohibet generationem lapidis in eis, & confert febribus calidis. Datur ab ʒ. j. usque ʒ. j. β. uel ʒ. x. mane uel ante cœnâ, sed paulo ante pastum. Mesues & Cordus.

Cassia extracta sine folijs senæ.

℞. Prunorum n. xij.
Violarum M. j.
Hordei mundi, Anisi, Polypodij, Sem. Carthami ana ʒ. v.
B Capill. Veneris, Thymi, Epithymi ana M. β.
Passularum ʒ. β.
Sem. Fœniculi ʒ. ij.
Sem. Portulacæ, Maluæ ana ʒ. iij.
Glycyrrhizæ ʒ. β.
Fiat horum decoctio in sufficiens quantitate aquæ, coletur: in colatura dissolue,
Pulpæ Calsiæ lb. ij.
Pulpæ Tamarindorum ʒ. j.
Cinnamomi ʒ. iij.
Sacchari optimi lb. j.
Coquantur ad perfectionem, secundum artem.

Cassia extracta cum folijs senæ.

℞. Confectionis Calsiæ extractæ sine Senæ lb. ij.
Pulueris foliorum Senæ ʒ. ij.
Misce secundum artem. * Facile soluit, lenit asperitatem intestinorum, remouet stipticitatem, & uentris onus subducit, & morbis cholericis & melancholicis auxilia præbet.

Diacassia, sub nomine cassiæ condita.

℞. Pulpæ Calsiæ lb. j.
Pulpæ Tamarind. Manæ electæ, Penidiorum, Sacchari uiolati, cadi ana ʒ. j. β.
Rr Syrupi

498 DE ELECT. OFFICINAL. LENITIVIS.

Syrupi uiolati ℥. iij. A
 Hæc omnia dissolue in decocto sequenti:
 ℞. Prunorum, Violarum, Glycyrrhizę, Sem. communium enucleatorum,
 Polypodij ana ℥. j.
 Foliorum Senę ℥. β. Anisi, Fœniculi ana ℥. j.

Coquantur in aqua ad tertię partis consumptionem: & colaturę bene expressę addantur supradicta, ac in electuarij formam reducantur. * Confert ijs qui dura sunt aluo: hæc enim leniter & citra molestiam subducit, ac flavam educit bilem, ac febres inde natas mitigat. Thoracis, pulmonis, & asperę arterię phlegmonas resolvit, &c. Nicolaus.

Diacassia magistralis.

℞. Iuiubarum, Prunorum, Capillor. Veneris, Tamarindorum, Sebesten,
 Violarum ana M. j.
 Coquantur in aqua, secundum artem; & in colatura dissolue,
 Pulpę Cassię ℔. x.
 Sacchari albi ℔. v.
 Coquatur ad perfectam consistentiam.

Cassia communis.

℞. Violarię, Malug, Mercurialis, Betę, Parietarię ana M. j. B
 Fiat horum uiridium decoctio in
 Aquę communis ℔. x.
 Bulliant ad dimidij consumptionem: hac colatura bene expressę extrahitur cassia, & ad singulas libras pulpę adduntur
 Mellis despumati ℥. vj.
 Coquitur in formam electuarij. * Aluum leniter & citra molestiam omnem subducit, estq; pro delicatis ac mollioribus.

Diacatholicon.

℞. Pulpę Cassię, Pulpę Tamarindorum, Senę mundatę ana ℥. ij.
 Rhabarbari, Polypodij, Violarum, Anisi ana ℥. j.
 Glycyrrh. rasę, Penidiorũ, Sacchari cãdi, Quatuor sem. frig. maior. ana ℥. ij.
 Conterenda conterantur, & sume
 Polypodij recentis ℥. iij.
 Sem. Fœniculi ℥. ij.
 Aquę communis ℔. ix.
 Coque ad dimidij consumptionem, & cola. colaturę addę,
 Sacchari albi ℔. ij.
 Coquantur ad syrupi consistentiam: & superscriptis additis, fiat electuarium. * Omnes corporis humores purgat. Confert acutis & peracutis morbis. emollit enim, alterat, roburq; addit. locinerosis, lienosis, podagricis, arthriticis,

A thriticis, tertianis, quartanis, & quotidianis doloribus capitis succurrit. Datur ab ℥.β. ad ℥.j. Nicolaus.

Diaprunum simplex.

℞. Prunorum magnorum acetosorum & uinosorum quātitatem quā uolueris, & exēptis nucleis in fictili uitreato magno coquito: deinde per cribrum fetaceum exprimito: expressam pulpā iterum lento igne ad perfectam & iustam spissitudinem coquito, & sine saccharo reponito. * Medulla prunorum uinosorum, calorem & sitim in febribus mitigat, & melius est ut conseruetur sine saccharo, cerasorum modo inspissata. Porrò si medullam prunorum laxatiuam requiris, ex dulcibus prunis, aut prunis Ungaricis magnis exiccatis conficito. * Calorem & sitim in febribus mitigat.

Diaprunum compositum, non laxatiuum.

℞. Pruna electa n. c.

Coquantur perfectè in aqua sufficiente, deinde cribro raro transmittantur: & referuata pulpa decoctioni affunde

Violarum ℥.β.

Balliant sufficienter, & colentur: colaturæ addantur

Sacchari ℥. ij.

Pulpæ supradictæ ℥. j.

B Pulpæ Calsiæ, Tamarindorum ana ℥. j.

Coquantur lento igne, & addantur subsequentes species, tenuissimè tritæ, semper commouendo:

Santali albi, rubri, Spodij, Rhabbarbari electi, Cinnamomi ana ℥. iij.

Rosarum rubrarum, Violarum, Sem. Portulacæ, Sem. Scariolæ, Berberis,

Succi Glycyrrhizæ, Tragacanthæ ana ℥. ij.

Sem. Cucurbitæ, Cucumeris, Melonum ana ℥. j.

Contundantur ut supra. * Facit ad acutas, arduas, omnesq; alias febres, nempe tertianas continuas, heclicas, marasmodos, lityrias, & in summa, ad omnem febrilem affectum. Datur ad modum castaneæ, omni hora diei. Nicolaus.

Electuarium lenitiuum.

℞. Passularum enucleatarum ℥. ij.

Capil. Vener. Violarum, Hordei mundi ana M. j.

Iuiubarum, Sebesten ana n. xx.

Glycyrrhizæ ℥.β.

Prunorum, Tamarindorum ana ℥. vj.

Senæ, Polypodij ana ℥. ij.

Mercurialis M. j.β.

Decoquatur secundum artem in sufficiente aqua, cola: & in colatura dissolue,

Rr 2

Pulpæ

500 DE ELECT. OFFICINAL. LENITIVIS.

Pulpę Calsię, Tamarindorum, Prunorum, Sacchari optimi, Sacchari uiolati ana ʒ. vj.

Pulueris fenę ʒ. iij. ʒ. iij. ʒ.

Confice secundum artem. * Vfus eius est in febris humoralibus, & pleuresi: lenit enim & mollit intestina, & delet eorum stipticitatem: facillè soluit sine molestia & læsione choleram phlegmaticam & melancholicam. Rhasis.

Electuarium lenitiuum, magistrale.

ʒ. Myrobal. flauorum, Chebulorum, Indorum ana ʒ. iij.

Myrobal. Belliricorum, Emblicorum ana ʒ. j. ʒ.

Sacchari optimi ʒ. ʒ.

Terantur triduum in uase lapideo, singulis diebus bis uel ter aquam fontanam inspergendo: deinde siccata terantur in puluerē tenuē, cuius sumes ʒ. j.

Turbith boni ʒ. iij.

Zingiberis ʒ. j. ʒ.

Cinnamomi, Anisi, Santali rubri ana ʒ. j.

Scammonij preparati ʒ. j. ʒ.

Sacchari quantum sufficit.

Fiat electuarium. Florentini.

Electuarium lenitiuum de manna.

ʒ. Capillorum Veneris, Scolopendriæ, id est, Cetherach, Epaticæ, id est, B: Lichenis ana ʒ. iij.

Sem. Cucurbitæ, Citrulli, Melonis, Cucumeris, Violarum ana ʒ. j.

Prunorum Damascenorum n. xx.

Coquantur in aqua ad dimidias, deinde percolentur cum expressione: in colato dissoluatur.

Mannæ opt. purę, Conseruæ Violarū, Pulpę Calsię recēs extractę ana ʒ. j.

Sacchari albissimi lb. iij.

Coquantur ad mellis consistentiam: postremò species sequentes injiciantur:

Nucleorum sem. Melonis, item Cucumeris, Cucurbitę, Citrulli, Flor. Violarum, Nenupharis, Sem. Lactucæ, Scariolę, Portulacę, Rhabarbari ele-

cti, Foliorum Senæ ana ʒ. j.

His accuratè subactis conficiatur electuarium. * Vtile est ad purgandum sanguinem, ad choleram reprimendam & melancholiam: ualet etiam ad hepatis calefactum: & corpus uniuersum perpurgat. Nicolaus Alexand.

Electuarium de sebeste.

ʒ. Sebesten sine nucleis, Prunorum siccorum enucleatorum, Tamarindorum ana ʒ. v.

Aquę Violarum lb. j.

Aquę Ireos, Aquę Angurię ana ʒ. vj.

Succi

- A** Succı Mercurialis depurati ℥.iiij.
 Penidiorum ℥.viiij.
 Diapruni simplicis ℔.j.β.
 Nucleorum sem. Cucurbitæ, Cucumeris, Melonis, Citrulli ana ℥.ij.
 Diagridij ℥.iiij.
 Caro siue pulpa Sebesten, Prunorum & Tamarindorum minutissimè teratur, & cum aquis extrahatur. Semina uerò minutissimè incidantur, & reliquis misceantur, & fiat secundum artem electuarium. * Confert febribus cholericis interpollatis, & continuis puris, & sedat acuitatem februm, sitim & uigilias, & etiam amaritudinem remouendo: & educit materias acutas à uijs uirnalibus, & uesica. Bartholomeus Montagnana.

Diamanna.

- ℞. Mannæ electæ ℔.j.
 Scammonij præparati ℥.j.
 Succı Rosarum rubrarum ℔.j.
 Dissoluatur in succo manna, & coquatur sufficièter lento igne: deinde adde Mastice puluerizatæ ℥.iiij.
 Fiat electuarium. * Bilem flauam educit sine molestia, ob id omnibus morbis biliosis salubre. Mesues ex Galeno.

B. *Tryphera Persica.*

- ℞. Succı Solatri, aut Solani, Endiuicę uerę, Apij, Lupulor. depurat. ana ℔.j.
 Projiciantur desuper:
 Violarum ℥.iiij.
 Foliculorum Senæ ℥.ij.
 Agarici ℥.j.
 Prunorum Damascenorum n. xv.
 Cuscutæ ℥.β.
 Myrobal. Citrinor. Chebulor. Indorū, fricatorū in oleo amygd. dul. ana ℥.ij.
 Spicæ Indicæ ℥.iiij.
 Bulliant molliuscule igne, donec supersunt ℔.ij. Et iniiciantur:
 Epithymi ℥.xl.
 Bulliant leuiter, deinde ab igne deponantur & percolentur, atq; dissoluantur in una parte istius percolati,
 Tamarindorum recentium ℥.iiij.
 Mannæ electæ ℥.j.β.
 Pulpæ Calsiæ ℥.iiij.
 Sacchari uiolati ℔.j.
 Percolétur & mudentur à granis & fordib. atq; in aliâ aquę partē projiciantur,
 Sacchari albisimi ℔.iiij. Aceti uini ℔.j.
 ℞. 3. Coquantur.

502 DE ELECT. OFFICINAL. LENITIVIS.

Coquantur leuiusculo igne: deinde proijciatur super illud quod dissolutum **A**
est in succis, & aggregentur simul in unū, atq; coquatur, donec mellis crassitiē obtineat: postremò in puluerem redactę, sequētes species inspergantur:

Rhabarbari optimi ℥. ij.

Myrobal. Citrinorum ℥. j. β.

Myrobal. Chebulorum, Indorum ana ℥. j.

Myrobal. Belliricorum, Emblicorum ana ℥. β.

Sem. Fumiterre, Trochiscorū diarrhodon, Macis, Masticis, Cubebarum,

Spodij, aut Eboris usti, Santali citrini ana ℥. ij. β.

Nucleorum sem. Cucurbitę, Citrulli, Cucumeris, Melonis ana ℥. j. β.

Anisi ℥. β. Spicę Indicę ℥. ij.

Inuoluantur in oleo uiolato, & reponantur in uase uitreo. Datur ad ℥. j. cum
aqua frigida & succo intybi, uel solani. * Confert febribus acutis, & inflam-
mationibus stomachi & hepatis, ictericis calidis, deopilatione incolumita-
tem acquirit, uisum à fumis cholericis deperditum reparat: sitim mitigat,
morbos aduersionis fieri prohibet. Mesues.

DE ELECTVARIIS OFFICINALIBVS SOLVTIVIS:
acprimū de purgantibus bilem.

Electuarium de succo rosarum.

℞. Succu Rosarum rubr. Sacchari albi ana lb. j. ℥. iiii. **B**

Scammonij præparati ℥. ij. β.

Santali rubri, albi, citrini ana ℥. vj.

Spodij ℥. iij.

Caphurę ℥. j.

Coquatur saccharum cum succo rosarum, deinde reliqua trita adijciantur,
& fiat electuarium. Seruatur per annos duos. * Expellit flauam bilem citra
molestiam: ad morbos articularum ex biliosis & calidis humoribus natos,
ad febresq; tertianas confert. Nicolaus.

Electuarium rosatum Mesue.

℞. Succu Rosarum rubrarum lb. iiii.

Sacchari optimi lb. j. β.

Mannę electę, & recentis ℥. vj.

Scammonij præparati ℥. j. β.

Coque igne lento ad mellis crassitudinem: tunc adde subsequētia bene tri-
ta, & per cribrum transmissa:

Trochiscorum de spodio ℥. j.

Gallę moschatę, Croci ana ℥. ij.

Trochiscorum de berberis ℥. β.

Confice secundum artem. Hoc electuario utimur in catapotijs conficiendis
aggrega-

Aggregatiuis, & de hermodactylis. Dosis est ʒ. v. * Cholagogum est clemēs, ob id salubre biliosis affectibus, arthritidi calidæ, cephalalgia calidæ, uertigini, oculorum dolori, ictero. Mesues.

Electuarium de psyllio.

℞. Succu Buglosi siue Borriginis domesticæ & syluestris, Succu Endiuicæ, Apij ana ℔. ij. Succu Fumaricæ ʒ. iiij.

Clarificentur, & in his infunde,

Cuscutæ, Anisi, Senæ ana ʒ. β.

Capill. Veneris M. j.

Afari ʒ. β.

Nardi Indicæ ʒ. ij.

Macerentur uiginti quatuor horas: deinde semel feruefiant, & adde,

Violarum recentium ʒ. iiij.

Epithymi ʒ. ij.

Rursus feruefiant, colentur: colaturæ addantur,

Psyllij, id est, seminis ʒ. iiij.

Macerentur uiginti quatuor horas, identidem agitando, post exprime totam muccaginem: in cuius ℔. iiij. coque igne lento,

Sacchari optimi ℔. ij. β.

Scammonij præparati ʒ. iiij. β.

℞. Coctis omnibus adde subsequencia subtilissimè trita:

Trochiscorum diarrhodon, Trochiscorum de spodio, Rhabarbari ana ʒ. j.

Trochiscorum de berberis ʒ. β.

Fiat electuarium. * Flauam bilem euocat: ob id febribus ardentibus, acutis, curatu difficilibus auxiliatur, dolori capitis, & uertigini à bilis uapore nascenti, ictero & intemperiei calidæ hepatis. Datur à ʒ. iiij. usque ad aureos iiij. Mesues.

Diaprunum solutiuum.

℞. Diapruni non laxatiui ℔. j.

Diagridij ʒ. j.

Misce & repone. Nicolaus.

DE ELECTVARIIS PURGANTIBVS PITVITAM.

Benedicta laxatiua.

℞. Turbith electi, Sacchari ana ʒ. x.

Diagridij, Esulæ, Hermodactylosum, Rosarum ana ʒ. v.

Caryophyllorum, Spicæ Indicæ, Zingiberis, Croci, Saxifragiæ, Macropiperis, Amomi, aut calami aromat. Cardamomi minoris, Sem. Apij, Salis gemmei, Galange, Macis, Carui, Fœniculi, Sem. Asparagi, Sem. Rusci, Milij solis ana ʒ. j. Mellis despumati ℔. j. ʒ. vj. ʒ. iiij.

Fiat.

Fiat electuariū. Seruatur annis tribus. * Humores pituitosos, potissimū ad articulos decumbentes, elicit. A renibus quoq; & uesica purgat. Nicolaus.

Diaphanicon.

℞. Dactylorum mundatorum ʒ. c.

Penidiorum ʒ. l.

Amygdal. purgatarum ʒ. xxx.

Turbith electi ʒ. xxxv.

Scammonij ʒ. xij.

Zingiberis, Piperis longi, Foliorum Rutæ, Cinnamomi, Ligni aloës, Macis, Anisi, Fœniculi, Dauci, Galangæ ana ʒ. ij. β.

Dactyli per triduum in aceto, & totidem noctes macerantur, deinde in mortario contunduntur cum amygdalis & penidijs. Reliqua tenuissimè teruntur, & in electuariū reducuntur cum Mellis despumati ℥. vj.

* Febribus cōpositis & diuturnis auxiliatur: bilē enim flauā & pituitā ducit. Colicis cruciatibus mirificè cōfert, itē doloribus uētriculi, & id genus alijs uitijs, ex crudis humoribus ortis. Datur ab aureis iij. ad vij. Mesues.

Diaphanicon in forma solida.

℞. Dactylorum infusorum in aceto tribus diebus ac noctibus n. vj.

Sem. Leuistici ʒ. ij.

Pineorum nucleorum, Amygdal. dulc. ana ʒ. xv.

Turbith ʒ. xij.

Diagridij ʒ. xj.

Sacchari candi ʒ. ij.

Piperis longi, Zingiberis, Fol. Rutæ, Cinnamomi, Macis, Fœniculi, Anisi, Dauci, Galangæ, Ligni aloës ana ʒ. j.

Sacchari ℥. j.

Fiat confectio in rotulis, secundum artem. Ista confectio solida plerisq; medicis est usui.

Electuariū Indum maius.

℞. Cinnamomi, Caryophyllorum, Spicæ nardi Indicæ, Rosarum rubrar.

Cassia, Macis, Cyperi ana ʒ. β.

Santali citrini ʒ. ij. β.

Ligni aloes, Nucis moschatæ ana ʒ. ij.

Turbith electi ʒ. l.

Sacchari optimi, Penidiorum ana ʒ. xx.

Galangæ, Cardamomi maioris, minoris. Asari, Masticis ana ʒ. j. β.

Scammonij præparati ʒ. j. β.

Omnia tenuissimè cōterantur, & manibus oleo amygdalar. dulcium recens extracto, bene inunctis, fricentur, & fiat electuariū cū syrupo subsequēti, qui

℞. Succo

A ℞. Succij Apij, Fœniculi, Cydoniorum, Granatorum ana ʒ. vj.

Mellis despumati lb. iij. β.

Coquantur in formam syrapi. * Purgat uentrem totum inferiorem, atq; adeo iuncturas pituita etiam putri, flatusq; dissipat: & affectibus inde natis, dolori colico & nephritico, & uentriculi, & aliorum uiscerum, utile est. Datur ad aureos iij. Mesues.

Electuarium Indum minus.

℞. Turbith electi, Sacchari ana ʒ. vj.

Macis, Caryophyllorum, Piperis, Zingiberis, Cinnamomi, Nucis moschatæ, Cardamomi ana ʒ. vij.

Scammonij præparati ʒ. j. β.

Mellis despumati lb. iij.

* Ad eadem efficax est. Datur ad aureos iij. Mesues.

Electuarium Elefoph.

℞. Scammonij præparati, Turbith ana ʒ. vj.

Caryophyllorum, Cinnamomi, Zingiberis, Myrobal. Emblicorum, Nucis moschatæ, Polypodij ana ʒ. ij. β.

Sacchari optimi ʒ. vj.

Mellis despumati lb. j. ʒ. iij.

B Coquantur, fiat electuarium. * Bilem flauam & pituitam elicit, flatus quoque toto corpore expellit, doloribus articularum, laterisq; prodest, item colicis cruciatibus; humores ad renes & uesicâ decumbentes expurgat. Datur usq; ad ʒ. iij. Mesues.

Diaturbith maius.

℞. Turbith albi & gummosi ʒ. x.

Zingiberis ʒ. v.

Masticis ʒ. iij.

Sacchari albi ʒ. ij. β.

Mellis quantum sufficit.

Fiat electuariû. * Pituitâ, præsertim eâ quæ est in uentriculo, elicit. Zezar.

Diaturbith minus.

℞. Turbith optimi ʒ. j.

Diagridij, Zingiberis ana ʒ. iij.

Cinnamomi, Caryophyllorum ana ʒ. ij.

Galangæ, Piperis longi, Macis ana ʒ. j.

Mellis ʒ. viij. ʒ. v.

Fiat electuarium. * Ducit humores phlegmaticos, & purgat & calefacit.

Hiera picra S.

℞. Cinnamomi, Xylobalsami, Rad. Afari, Nardi spicæ, Mastiches Chiæ ana ʒ. vj.

S s

Croci

Crocī ʒ. v.

Aloes electæ ʒ. xc.

Omnibus tritis, & in puluerem redactis, deinde mellis quantitate sufficienti exceptis fit electuarium. * Prestantissimum medicamentum est ad uitiosos succos, qui in uentriculi tunicis hærent. Vtiliter quoque exhibetur ijs, qui suffulorum imagines, & alia symptomata ex stomachi uitio patiuntur: & præterea ijs, qui aluo sunt astricta, & mulieribus, quæ non probè purgantur. Galenus.

Hiera composita.

℞ Colocynthidis ʒ. viij.

Scillæ assatæ, Agarici, Ammoniaci, Scammonij, Cort. rad. Hellebori nigri, Stæchadis, Hyperici, Putegij, Gentianæ, Spicæ nardi, Schœnânthi ana ʒ. xvj.

Polij montani, Epithymi, Polypodij, Bdellij, Aloes, Chamædryos, Euphorbij, Marrubij, Casiæ ana ʒ. viij.

Myrrhæ, Sagapeni, Croci, Aristoloch. rotundæ, Trium piperum, Cinnamomi, Opopanacis, Castorij, Petroseliniana ʒ. iij.

Omnia tenuissimè contrita excipe melle ad specierum pondus. * Medicamentum est efficacissimum ad omnes morbos contumaces, & tutissimum. Galenus.

Hiera picra composita alia.

℞ Cinnamomi, Spicæ Indicæ, Croci, Schœnânthi, Afari, Xylocassie, Xylobalsami, Carpobalsami, Violarum, Absinthij, Epithymi, Agarici, Rosarum, Turbith Colocynthidis Masticis ana ʒ. ij.

Aloes non lotæ ʒ. x. ʒ. ij.

Mellis despumati ʒ. viij.

Fiat electuarium, in uase fictili uitreato seruandum per annos duos. * Facit ad diuersas capitis & aurium & oculorum distemperantias: stomachum quoque optimè purgat, affectiones hepatis emendat, splenis duritiæ & densitatem emollit & extenuat: renibus & uesicæ prodest, & matricis distemperantiam emendat. Nicolaus.

Hiera picra cum agarico.

℞ Specierum hieræ simplicis sine aloë, Agarici trochiscati ana ʒ. ʒ.

Aloes non lotæ ʒ. j.

Mellis despumati ʒ. vj.

Fiat electuarium.

Hiera pachy.

℞ Stæchados, Marrubij, Chamædryos, Agarici, Colocynthidos ana denarios x.

Opopanacis, Sagapeni, Petroseliniana, Mali terræ, Piperis albi ana denar. v.
Cinnamomi

- A** Cinnamomi, Spicę nardi, Myrrhę, Folij, Croci ana denarios iiij.
Mellis despumati triplum, id est, denarios cclxxxv. qui faciunt lb. iij. ʒ. iiij.
denarios v.

Arida omnia in tenuissimum puluerem tundito: liquores uerò opopanacę, sagapenum, electa & pura in mortario tundito: deinde in feruenti mortario cum melle despumato, feruenti adhuc unito, ac reliquis misceto, cum omnino leuigata fuerint. Cum uerò mel ad dissoluendos hos liquores accipies, de supra scripta quantitate sumito, nihil addendo. * Cõpositio hęc sanat morbo comitiali correptos, furiosos, scotomaticos, cephalalgicos: facit ad depravatam in utramlibet partem. Ad tetanum, & cynicũ spasmũ, præcipuè uerò ad pectoris & lateris dolores prodest, ex qualibet causa factos, siue latente & occulta, siue manifesta. Præterea neruorum tensionibus mirificè conuenit: prodest & ad articulare morbum, ad spinam, & lumborum dolorem: duritias in mammis mulierum cum dolore consistentes, ex toto interdum sanat. Ad stomachicos euidenter cõuenit. Remediat enim eos, quibus frequenter inaccessit cibus, aut assiduè nauseant, aut saliuã abudant: præcipuè uerò melancholicis bene facit, &c. Nicolaus.

Hiera Archigenis.

- B** ʒ. Colocynthidos ʒ. j.
Chamædryos, Agarici, Marrubij, Stœchadis ana ʒ. x.
Opopanacis, Sagapeni ana ʒ. j.
Petroselini, Aristolochiæ rot. Piperis albi ana ʒ. v.
Cinnamomi, Spicę nardi Indicę, Myrrhæ, Polij môtani, Croci ana ʒ. iiij.
Mellis despumati ad pondus specierum.

Fiat electuariũ. * Confert affectib. melancholicis, & ex pituita crassa natis, ut uertigini, epilepsiæ, spasmo, difficultati spirandi, psoræ, lepræ, & cæteris tuberculis à crassa materia nascentibus, aut seroso excremento, item intestinis, uentriculo, utero, à flatu dolentibus, aut prædictis humoribus. Aërius.

Hiera Archigenis alia.

- ʒ. Pulpæ Colocynthidos ʒ. ij.
Prasij, Stœchados, Hellebori nigri, Chamædryos, Scammonij, Leucopiperis, Macropiperis ana ʒ. ij.
Scillæ assatæ, Euphorbij, Aloes, Croci, Gentianæ, Petroselini, Hammoniaci, Opopanacis ana ʒ. j.
Polij, Cinnamomi, Sagapeni, Myrrhæ, Spicę nardi, Schœnanthi, Calaminthæ mont. Aristoloch. rotundæ ana ʒ. ij.
Melle sufficienti excipiantur omnia, Epithymi decocto, & Vuarũ passarum mundatarum. * Ad eadem confert. Datur ad aureos iiij. Mesues.

Hiera Hermetis cum dracunculo.

- ʒ. Aloes ʒ. ij.

Trochiscorum Alchandel aur. viij. A
 Turbith, Agarici, Dracunculi utriusque sicci, Iridis, Sagapeni, Myrobal.
 Chebulorum, Citrinorum, Indorum ana ʒ. j. β.
 Zingiberis, Cinnamomi, Masticis, Bdellij, Hellebori nigri, Euphorbij, A-
 fari, Calsiæ lignæ, Salis Indi, Castorij, Croci, Apij, Ligustici, Cocci gnidij,
 Stœchados ana ʒ. j.
 Scillæ assatæ ʒ. ij. β.
 Scammonij ʒ. ij.
 Vini odoriferi quantum sufficit.
 Succu Cucumeris agrestis quantum sufficit.
 Mellis, Olei, quantum sufficit.

Curiosè omnia terantur, gummi & succi uino odoro dissoluantur, pulueres
 succo cucumeris agrestis comprehendantur. Siccentur iterū eodem succo
 & pauco melle, oleo excipiantur, & siccentur: postremò melle despumato o-
 mnia comprehendantur. Datur post menses sex à ʒ. j. ad ʒ. ij. * Hiera Her-
 metis cum dracunculo maximarum & certissimarum est uirium ad cephalal-
 giam, hemicraniam, uertiginem, paralytim, epilepsiam, tremorem, spasnum
 cynicum, dolorem colicum, nephriticum, uterinum, arthriticum. Vacuat e-
 nim humores tam tenues, quàm crassos & lentos, à capite, uentriculo, neruis,
 iuncturis, & reliquis partibus. Mesues.

Hiera diacolocynthidos.

ʒ. Stœchados, Agarici, Chamædryos ana ʒ. x.
 Colocynthidos ʒ. xx.
 Sagapeni, Opopanacis ana ʒ. viij.
 Petroselinij, Aristolochiæ rotund. Piperis albi ana ʒ. v.
 Calsiæ ʒ. vij.
 Cinnamomi, Croci, Spicæ nardi, Myrrhæ, Polij ana ʒ. iiij.
 Vini, Mellis despumati ana quantum sufficit.
 Myrrham uino infunde: cætera tere, & melle despumato excipe. * Caput,
 uentriculum, & corpus reliquum purgat humore crasso & lento, & atra bile:
 ob id mania, melancholia, epilepsia, paralyti, spasmu cynico, uertigini con-
 fert ac ulceribus malignis, fistulosis, cancro, elephantia: flatus quoque discutit:
 uentriculum roborat, concoctionem firmat. Mesues. B.

DE ELECTVARIIS PURGANTIBVS
 bilem atram.

Diasena.

ʒ. Senæ ʒ. iiij.
 Auellanas tostas n. l.
 Serici usti ʒ. ij.

Lapidis

- A** Lapidis Armeni loti ʒ. j.
 Lapidis Lazuli, lauati ʒ. iij.
 Sacchari ʒ. vj.
 Cinnamomi, Caryophyllorum, Galangæ, Piperis nigri, Spicæ nardi Indi-
 cæ, Folij, Sem. Ocyimi, Cardamomi, Croci, Zingiberis, Zedoarię, Flor. Rorif-
 marini, Piperis longi ana ʒ. ij.
 Mellis despumati lb. ij.
 Fiat electuarium. Seruatur ad annos duos. * Succurrit melancholicis, ma-
 nia uexatis, quartana laborantibus, tristitia affectis, lienosis, elephanticis, &
 omnibus uitijs ex atra bile procreatis. Nicolaus.

Diasena, alia.

- ℞. Foliorum Senæ ʒ. iij.
 Auellanarum n.l.
 Serici uiti ʒ. ij.
 Lapidis Armeni ʒ. j.
 Sacchari ʒ. v.
 Mellis despumati ʒ. vj.

Fiat electuarium secundum artem. Gentilis de Fulgino.

Confectio Hamech maior.

- B** ℞. Myrobal. Citrinorum ʒ. iij.
 Myrobal. Chebulorum, Indorum, Rhabarbari electi ana ʒ. ij.
 Agarici, Colocynthidis, Polypodij ana ʒ. xvij.
 Absinthij, Thymi, Senę ana ʒ. vj.
 Violarum ʒ. j. β.
 Epithymi ʒ. ij.
 Sem. Anisi, Sem. Fœniculi, Rosarum rubrarum ana ʒ. vj.
 Succu Fumarię lb. j.
 Prunorum n.xl.
 Passularum enucleatarum ʒ. vj.
 Maceretur omnia in sero lactis caprini sufficiente, in uase uitrato angusti o-
 ris, per dies quinque. Postea ferueant una aut altera ebullitione, colentur. co-
 laturę bene expressę adde,
 Pulpę cassię ʒ. iij.
 Pulpę Tamarindorum ʒ. v.
 Mannę ʒ. iij.
 Frica manu, cola, & adde,
 Sacchari albi lb. j. β.
 Scammonij præparati ʒ. j. β.
 Coque ad mellis consistentiam, & adde,
 Myrobal. Citrinorum, Chebulorum, Indorum, Belliricorum, Emblicorū,
 Ss 3 Rhabarbari,

310 DE ELECTVARIIS OFFICIN. SOLVTIVIS.

Rhabbari, Sem. Fumariæ ana ʒ. β.

Spicæ Indicæ, Anisi ana ʒ. ij.

Confice electuarium. * Morbis omnibus ex flaua bile, & pituita falsa natis, nempe impetigini, scabiei, elephantia, & cancro succurrit. In summa, omni fœditati cutis à biliosis & adultis humoribus procreatæ conuenit. Datur à ʒ. ij. ad aur. ij. Mefues.

Confectio Hamech minor.

℞. Myrobal. Indorum, Chebulorum, Epithymi ana ʒ. l.

Fumi terræ, Absinthij ana ʒ. xx.

Thymi, Calamenthæ, Polypodij, Agarici, Glycyrrhizæ, Buglossæ ana ʒ. x.

Stœchados Arabicæ, Chamædryos, Chamæpityos, Bedeguaris, Anisi ana ʒ. v.

Prunorum, Iuiubarum, Sebesten ana n. lxx.

Passularum enucleatarum lb. j.

Decoquantur in aqua sufficienti usque ad tertias: colentur, & colaturæ ad-
dantur,

Sapē lb. ij.

Mellis despumati lb. j.

Scammonij præparati ʒ. ij.

Coquantur lento igne usque ad mellis spissitudinem. * Purgat melancho-
liam, & uetos humores alios: ob id cōfert mania, melancholia, uertigini, ob-
liuioni, & uitijs cutis: qualia sunt psora, id est, scabies, morphea, cancer, ele-
phantia, impetigo. Mefues.

Diapolypodion magistrale.

℞. Polypodij mundati lb. ij.

Mellis despumati lb. vj.

Aceti scillitici lb. j. ʒ. ij.

Zingiberis ʒ. vj.

Fiat electuarium. Medici Florentini.

Hieralogodium.

℞. Colocynthidis ʒ. xx.

Scillæ assatæ, Agarici, Ammoniacy, Scammonij, Cort. rad. Hellebori nigri,
Hyperici ana ʒ. j.

Epithymi, Polypodij, Bdellij, Aloes, Chamædryos, Marrubij, Casiæ a-
na ʒ. j.

Myrrhæ, Piperis albi, nigri, Cinnamomi, Croci, Opopanacis, Sagapeni,
Castorij, Petroselinij, Aristolochiæ ana ʒ. β.

Mellis despumati, ad pondus omnium. * Ad lateris dolorem, epilepsia,
maniam, melacholiam morbum, scotoma, cephalgiam, suspiria, subitam præ-
focationem,

A focationem, incubum, tetanum, spasmus cynicum, cōtufum corpus ex iētū, lapfu, tremorem, paralyfim, arthritidas, dolores fpinæ, mammaram duritias, cancosq; earum, ftomachi imbecillitatem, ructum acidum, inflationem, tormina, naufeam, colicum dolorem, menses fuppreffos. Aëtius.

Hieralogodium aliud.

℞. Pulpæ Colocynthidos, Polypodij ana ʒ.ʒ.
Euphorbij, Polij montani, Sem. Thymelææ ana ʒ.ʒ. G. vj.
Absinthij, Myrrhæ ana ʒ.ʒ. G. xij.
Centaurij, Agarici, Ammoniaci, Folij, Nardi Indicæ, Scillæ, Scammonij præparati ana ʒ.ʒ.
Aloes, Comarum Thymi, Cafia, Chamædryos, Bdellij, Marrubij ana ʒ.ʒ. G. xiiij.
Cinnamomi, Opopanacis, Caftorij, Aristolochiæ, Trium piperum, Croci, Sagapeni, Petroselinij ana ʒ.ʒ.
Hellebori nigri, albi ana G. vj.
Mellis defpumati lb. j. ʒ.ʒ.

Confice ut decet. Seruatur per annos duos. * Exterminat mala diuturna ex melancholia facta, epilepfiam, uertiginem, conuulfiones, hemicraniam, elephantiam, impetigines, lethargum: prodeft fpumantibus, & linguam mordētibus, his qui lethalia uenena fumpferūt, iecinorofis, pleuriticis, ifchiadicis, & lumborum dolore infeftatis: uitiofos humores educit, & mulierum menftrua. Nicolaus.

DE ELECTVARIIS PURGANTIBVS

humores mixtos.

Catharticum imperiale.

℞. Scammonij præparati, Sacchari ana ʒ.ʒ.
Cinnamomi, Spicæ nardi, Rad. Saxifragiæ, Polypodij, Zingiberis ana ʒ.ʒ.
Spicæ nardi Cælticæ, Piperis longi, albi, Cardamomi, Amomi, Caryophylorum ana ʒ.ʒ.

Terantur omnia tenuiffimè, & fiat electuarium, cum

Mellis defpumati quantum fufficit.

* Bilem utramq; & pituitam fine moleftia educit, caput optimè purgat, & oris fpiritum commendat. Nicolaus.

Diacarthamum.

℞. Spec. Diatragacanthi frigidi ʒ.ʒ.

Pulpæ Cydoniorum ʒ.ʒ.

Pulpæ Carthami ʒ.ʒ.

Zingiberis ʒ.ʒ.

Scammonij præparati ʒ.ʒ.

Turbith

512 DE ELECTVARIIS OFFICINAL. SOLVTIVIS.

Turbith ʒ. vj. A
 Mannæ ʒ. ij.
 Mellis rosati col. Sacchari candi ana ʒ. j.
 Hermodactylorum ʒ. β.
 Sacchari albi ʒ. x. β.
 Fiat electuarium liquidum. * Flauæ bili & pituitæ educendæ mirificè con-
 ducit. Arnoldus de Villa noua.

Diaturbith cum rhabarbaro.

℞. Turbith, Hermodactylorum ana ʒ. j.
 Rhabarbari ʒ. x.
 Scammonij præparati ʒ. β.
 Santali albi, Rubri, Violarum, Zingiberis ana ʒ. j. β.
 Masticis, Anisi, Cinnamomi, Croci ana ʒ. β.
 Sacchari albi ℥. j. ʒ. iij.
 Fiat electuarium, in forma competenti. * Flauam bilem & pituitam educit,
 atque aqua inter cutem laborantibus mirificè confert. Montagnana.

Hiera Ruffi.

℞. Aloes ʒ. j.
 Hellebori albi, nigri ana ʒ. β. B
 Diagridij, Colocynthidis inter. ana ʒ. iij.
 Nitri, Euphorbij, Polypodij, Salis Ammoniaci ana ʒ. ʒ. G. xv.
 Piperis, Chamædryos, Croci, Agarici, Masticis, Epithymi ana ʒ. j. β.
 Calsiæ lignæ, Xylobalsami, Opopanacis, Gith ana ʒ. ʒ.
 Myrrhæ G. xv.
 Mellis quantum sufficit.

Fiat electuarium. Seruatur per annum. Datur ad modum castaneæ. * Datur
 propriè scabiosis phlegmate salso, elephantiosis, serpigiosis: curat utramq;
 morpheam cum tepida: destruit antiquam cephalicam, & hemicranicam, &
 monopogiam dolorem capitis uel stomachi: epilepticis, catalepticis, & ijs,
 qui ex famo stomachi extenebrescunt, ita ut subitanæ timorem uideant,
 uel uentositate stomachi tinnitum aurium patiuntur, ut in furias uertantur,
 deponitur cacochymia stomachi: hepatis & splenis, elephanticis, & podagri
 cis confert auxilium: & menstrua educit. Nicolaus.

Hiera Abbatis.

℞. Agarici, Colocynthidis, Turbith, Epithymi, Cuscutæ ana ʒ. ʒ. G. v.
 Schœnanthi, Carpobalsami, Xyloaloes, Xylocalsiæ, Croci, Afari, Cinna-
 momi, Masticis, Rosarum, Violarum, Absinthij, Rhapôtici, Folij, Lapidis La-
 zuli ana ʒ. ij.
 Diagridij ʒ. j. β.
 Aloes hepaticæ ʒ. iij. β.

Mellis

A Mellis quantum sufficit.

Fiat electuarium, in uase fictili uitreato seruandum per annos duos. * Phlegma & melancholiam purgat, & ad guttam, quæ fit de frigido & sicco humore, unde membra uideantur contracta, ualet paralyticis. Nicolaus.

DE ELECTVARIIS MINVS VSVALIBVS: AC
primùm de electuarijs calfacientibus caput.

Electuarium ad morbos capitis frigidos.

℞. Conseruæ Capill. Veneris ʒ. j.

Conseruæ Anthos, Zingiberis conditi ana ʒ. iij.

Cineris hirund. ʒ. β.

Coralli rubri uisti ʒ. j.

Piperis tenuiss. puluerizati ʒ. j. β.

Cum syrupo de stœchade fiat electuarium. Rondeletius.

Aliud.

℞. Summitatum Rorismarini, Cinnamomi, Macis, Nucis moschatae, Caryophyllorum ana ʒ. β.

Hirundinum, Castorij, Priapi tauri ana ʒ. j.

B Simul colligata, in olla perforata imposta in furno urantur, donec in cineres redigantur: qui postea lauantur, si timeatur odor ustionis. Et ex cineribus istis cum pauco saccharo & syrupo de stœchade fiat electuarium. * Valet ad paralysem, cõuulsionem, plenitudinem, & oculorum rheumatismos, & aliarum partium, ad articularum dolores à morbo Gallico, & alios affectus, in quibus multam exiccandum est. Rondeletius.

DE ELECTVARIIS CALFACIENTIB. COR.

Electuarium pro corde & palpitatione.

℞. Confectionis Alchermes ʒ. β.

Conseruæ rad. Buglossæ ʒ. j.

Conseruæ flor. Anthos ʒ. β.

Spec. Diamarg. frigidi ʒ. j.

Cum syrupo de pomis redolentibus fiat electuarium: quo sumpto, superbibant parum uini, diluti aqua borraginis uel buglossæ. Rondeletius.

Electuarium pro palpitatione à flatibus.

℞. Spec. aromat. ros. ʒ. j.

Spec. Diarrhod. Abb. Confect. Alchermes ana ʒ. j.

Corticis citri saccharo conditi ʒ. j.

Conseruæ Buglossæ, Anthos ana ʒ. iij.

Cum syrupo cõseruationis Citri fiat electuarium. Capiat ante & post pasto, superbibendo parum uini, eum aqua menthæ & absinthij diluti. Rondelet.

T t *Electuarium*

Electuarium pro palpitatione ab aqua. A

℞. Electuarij prædicti ʒ. ij.
 Coralli rubri usti & loti, Aquæ Melissæ ana ʒ. ij.
 Rasuræ Eboris ʒ. j.
 Pul. Margaritarum ʒ. β.
 Cum syrupo conseruationis cort. Citri fiat electuarium. Capiat serò & manè. Rondeletius.

DE ELECTVARIIS CALFACIENTIBVS

bus uentriculum.

Electuarium pro refrigerato uentriculo.

℞. Spec. Aromat. ros. ʒ. j.
 Spec. Diagalangæ, Spec. Diarrhod. Abb. uel Rosatæ nouellæ ana ʒ. iij.
 Sacchari parū in.
 Cum syrupo conseruat. cort. citri fiat electuarium. Sumatur ad quantitatem auellanæ, superbibendo parum uini diluti aqua absinthij, uel menthæ. Rondeletius.

Aliud.

℞. Zingiberis conditi cum saccharo ʒ. j.
 Spec. Aromat. ros. ʒ. ij.
 Spec. Diarrhod. Abb. ʒ. iij.
 Cum syrupo de mentha fiat electuarium. Capiat, ut antea dictum est. Rondeletius. B

Electuarium ad uentriculi corroboracionem.

℞. Cort. Citri cum saccharo conditi, loti in uino ʒ. ij.
 Spec. Aromat. ros. ʒ. j.
 Anisi ʒ. iij.
 Fœniculi ʒ. ij.
 Sem. Rutæ, Viticis ana ʒ. j.
 Cum syrupo de mentha fiat electuarium. Rondeletius.

Aliud.

℞. Menthæ siccæ ʒ. ij.
 Sem. Viticis ʒ. iij.
 Anisi, Fœniculi ana ʒ. ij.
 Sem. Rutæ ʒ. j.
 Cort. Citri sicci, Coralli rubri, usti & loti in aqua rutæ ana ʒ. ij.
 Cū syrupo de mētha fiat electuariū. Sumatur ad quantitatem fabæ ante pastū.

Electuarium corroborans & constringens uentriculum.

℞. Conseruæ Enulæ campanæ, Conseruæ Anthos ana ʒ. iij.
 Pul. Iridis Venetæ ʒ. iij.

Viticis,

- A Viticis, Rutæ ana ʒ.ij.
 Rad. Bistortæ, Sem. Vuarum ana ʒ.ij.
 Rad. Cypri ʒ.β.
 Cum syrupo de mentha fiat electuarium. Rondeletius.

DE ELECTVARIIS CALFACIENTI-
 bus hepar.

Electuarium ad icterum.

- ʒ. Conseruæ Capill. Veneris, Conser. rad. Apij ana ʒ.ij. β.
 Conseruæ flor. Cichorij, uel Conseruæ flor. Calendulæ ʒ.ij.
 Spec. Triasandali ʒ.ij.
 Spec. Diarrhod. Abb. ʒ.ij.
 Quatuor sem. frig. maiorum minutim incisorum ana ʒ.ij.
 Cum syrupo endiuicæ fiat electuarium. Capiat, ut supra, superbibendo aquæ
 graminis, uel cichorij ʒ.ij. Rondeletius.

Electuarium ad aquam inter cutem.

- ʒ. Conseruæ flor. Cichorij, Conseruæ Capill. Vener. ana ʒ.ij.
 Spec. Diarrhod. Abb. Aromat. ros. ana ʒ.ij.
 Spec. Triasandali ʒ.ij.
 B Hepatis lupi ʒ.ij.
 Cineris intestinorum lupi ʒ.ij.
 Cum syrupo & eupatorio fiat electuarium. Capiat ad quantitatem auellanæ,
 & superbibantur aquæ absinthij ʒ.ij. Rondeletius.

Aliud.

- ʒ. Conseruæ Anthos, Conseruæ rad. Apij ana ʒ.ij.
 Spec. Aromat. ros. ʒ.ij.
 Spec. diarrhod. Abb. ʒ.ij.
 Trochiscorum de eupatorio ʒ.β.
 Cum syrupo de Bizantijs, uel de mentha, uel de eupatorio, fiat electuarium.
 De hoc capiat, superbibendo uinum dilutum cum aqua absinthij. Rondelet.

DE ELECTVARIIS CALFACIEN-
 tibus splenem.

Electuarium pro splene.

- ʒ. Conseruæ rad. Apij ʒ.ij.
 Conseruæ Ceterach, Capill. Ven. ana ʒ.β.
 Spec. Diarrhod. Abb. Trochisc. de Cappar. ana ʒ.ij.
 Cum syrupo acetoso fiat electuarium, de quo capiat, superbibendo aquæ fer-
 niculi, uel ferratæ, uel asparagi, ʒ.ij. Rondel.

Aliud.

℞. Conseruæ Ceterach ʒ.ij.
 Trochiscorum de Cappar. ʒ.ij.
 Spec. Diarrhod. Abb. Diagalangæ ana ʒ.ʒ.β.
 Limaturæ chalybis, maceratæ in aceto, & tenuissimè tritæ ʒ.iiij.
 Sem. Portulacæ ʒ.ij.
 Cum syrupo acetoso simp. fiat electuarium. Sumatur quotidie ad quantitatem auellanæ, superbibendo parum aquæ portulacæ, tamarisci, uel syrupi acetosi simplicis. Rondeletius.

DE ELECTVARIIS REFRIGERANTIBUS uentriculum.

Electuarium ad uentriculum refrigerandum.

℞. Conseruæ Rosarum, Nenupharis ana ʒ.ʒ.β.
 Spec. Diamarg. frig. Triasandali ana ʒ.ij.
 Spec. Diarrhod. Abb. ʒ.β. Coralli rubri ʒ.ʒ.β.
 Cum syrupo uiolato fiat electuarium. Rondeletius.
Electuarium ad humectationem uentriculi, totiusq. corporis.
 ℞. Conseruæ rad. Buglossæ, Borraginis, Violarum, Satyrionis ana ʒ.ij.
 Pinearum, infus. in lacte, Quatuor sem. frigidorum maior. mundatorum, Sem. Bombacis ana ʒ.ʒ.
 Carnis test. præparatarum ʒ.ij.
 Anisi ʒ.ij.
 Cinnamomi ʒ.ij.

Cum syrupo de buglossa, uel borragine fiat electuarium. Rondeletius.

DE ELECTVARIIS REFRIGERANTIBUS hepar.

Electuarium ad calefactum hepar, cum obstructione.

℞. Conseruæ flor. Cichorij, Conseruæ Capill. Ven. ana ʒ.ʒ.β.
 Conseruæ Violarum ʒ.iiij.
 Spec. Diatragacanthi frig. Spec. Triasandali ana ʒ.ʒ.
 Quatuor sem. frig. minutim incisorum ana ʒ.ij.
 Cum syrupo endiuicæ fiat electuarium. Idem.

DE ELECTVARIIS ASTRINGENTIBVS.

Electuarium pro uentriculo laxato.

℞. Myrobal. conditorum n.ij. uel Carnium Cytoniorum, Cort. Citri conditi, Zingiberis conditi ana ʒ.ij.
 Spec. Aromat. rosati ʒ.ij.
 Rasuræ Eboris, Coralli rubri usti, loti in aqua menthæ ana ʒ.ij.
 Cineris intestinorum gallinæ, item lupi ana ʒ.iiij.

Cum

A Cum paucis syrupo conferuæ corticum citri fiat electuarium. Idem.

Electuarium pro lienteria.

℞. Myrobal. Emblicorum n. j. uel Carnis Cytoniorum ʒ. j.

Corticum Citri conditi ʒ. j.

Pulueris Diacitonites ʒ. ij.

Spec. Diarrhod. Abb. Rosatæ nouellæ ana ʒ. j.

Coralli rubri usti ʒ. j. β.

Conferuæ Acori colatæ, & transmissæ per cribrum ʒ. vj.

Cum miua Cytoniorum fiat electuarium. Capiat ante cibum. Idem.

Electuarium pro dysenteria.

℞. Carnis Cytoniorum conditæ ʒ. j.

Conferuæ Ros. antiquæ ʒ. j. β.

Coralli rubri, Boli Armeni ana ʒ. ij.

Spec. Diamarg. frig. ʒ. j.

Cum miua Cytoniorum fiat electuarium. Capiat manè. Idem.

DE ELECTVARIIS VRINAS ET MEN-
ses mouentibus.

Electuarium ad urinas & menses mouendos.

B ℞. Conferuæ Eryngij, Conferuæ rad. Paltinacæ agrestis ana ʒ. j.

Trochiscorum de myrrha ʒ. ij.

Cinnamomi ʒ. ij.

Cum syrupo de arthemisia fiat electuariū. Sumatur manè, deinde superbi-
bēdo cyathū uini Hippocratis, uel decoctionis pulegij, aut calaminthæ. Idē.

Electuarium ad menses mouendos.

℞. Succu Eryngij, Sabine, Pulegij, depuratorum ana ʒ. iij.

Cinnamomi, Afari, Myrrhæ, Croci ana ʒ. j.

Sem. Nigellæ ʒ. β.

Misceantur, & fiat electuarium. Ad dulcorandum adde parum syrapi de ar-
themisia. Idem.

DE ELECTVARIIS FRANGENTI-
bus calculum.

Electuarium ad calculum.

℞. Succu Portulacæ, Fœniculi marini ana ʒ. β.

Sem. Palyuri ʒ. j.

Afari, Ocræ ana ʒ. iij.

Cinnamomi, Selseli ana ʒ. j.

Cum syrupo de Bizantijs, uel de quinq; rad. fiat electuarium. Paratur etiā ex
Lithontribone, lapide Iudaico, additis succis uel syrupis cōuenientibus. Idē.

Tt 3 DE

DE ELECTVARIIS MINVS VSVALIBVS.

DE ELECTVARIIS VENEREM STI-
mulantibus.*Electuarium ad uenerem.*

℞. Conferuæ rad. Eryngij, Zingiberis conditi ana ʒ. j.
 Testiculorum gallor. decoctorum in lacte ʒ. β.
 Pinearum mundatarum, & in lacte maceratarum ʒ. j.
 Amygd. dulcium, Auellanarum maceratarum in melle per diem, ana ʒ. β.
 Sem. Bulbi ʒ. j.

Cum syrupo conferuæ cort. Citri fiat electuarium, de qua sumatur ante pa-
 stum. Idem.

Aliud.

℞. Conferuæ Satyrionis ʒ. ij.
 Cort. Citri conditi ʒ. β.
 Auellanarum in melle maceratarum n. x.
 Pinearum, Pistaciorum, in butyro breuiter frixorum ana ʒ. j.
 Carnis testudinis decoctæ cum eruca ʒ. ij.
 Cinnamomi ʒ. β.

Cum syrupo conseruationis eryngij fiat electuarium. Sumat ad quãtitem
 nucis. Idem.

Electuarium pro yjs, quibus semen est acre.

℞. Pinearum conditarum cum saccharo ʒ. ij.
 Rad. Pastinacæ agrestis ʒ. j.
 Caulium, Lactucæ, Carnium Cucurbitæ conditæ cum saccharo ana ʒ. j. β.
 Carnis testudinis coctæ cum oryza ʒ. iij.

Cum syrupo conseruationis satyrionis fiat electuariũ. Sumat ad nucis quã-
 titatem tribus horis ante pastum. Rondeletius.

DE ELECTVARIIS VENEREM
minuentibus.*Electuarium ad seminis profluuium, & uenerem minuendam.*

℞. Conferuæ Nymphææ ʒ. ij.
 Caulium Lactucæ ana ʒ. j.
 Coralli rubri, Cristalli ana ʒ. iij.
 Caphuræ ʒ. β.
 Sem. Agni casti ʒ. β.

Cum syrupo myrtillorum fiat electuarium. Idem.

DE ELECTVARIIS DOLOREM MITIGANTIB.

Electuarium ad dolorem colicum.

℞. Opij ʒ. ij.

Castorij,

A Castorij, Euphorbij, Styracis, Myrrhæ, Piperis longi, nigri ana ʒ. j.
Sem. Apij, Petroselinij, Cumini, Cinnamomi ana ʒ. ij.
Cum melle despumato fiat electuarium. Idem.

Aliud.

℞. Galangæ, uel Aromat. rosati, uel Diambrae uel Diamoschi ʒ. β.
Opj dissoluti in uino maluatico, uel aqua uitæ ʒ. j.
Crocij, Castorij ana ʒ. j.
Cum syrupo de stœchade fiat electuarium, uel opiata. De qua sumatur ʒ. j. cū
uino & aqua hysopi. Idem.

Electuarium pro dolore nephritico.

℞. Glycyrrhizæ, Rosarū, Myrrhæ, Styracis, Afari, Spicę Celticæ, Schœnan
thi, Sem. Paliuri, Halicacabi, Bismaluzæ ana ʒ. j.

Sem. Apij, Petroselinij, Rubiæ maioris ana ʒ. β.

Opj ʒ. ij. Crocij ʒ. j.

Cum syrupo capillorum Veneris, & pauca terebinthina. lota in aqua grami-
nis, uino albo fiat electuarium, uel opiata. Capiat à ʒ. j. ad ʒ. j. Post uomitum,
uel detergentia medicamenta dentur. Rondeletius.

Electuarium ad dolorem uesicæ cum ulcere.

B ℞. Succij Glycyrrhizæ ʒ. β.
Myrrhæ, Styracis, Thuris, Masticis ana ʒ. j.
Gummi Tragacanthæ, Arabici ana ʒ. ij.
Cort. Mandragoræ ʒ. ij.
Sem. Papaueris, Alchecangi, Endiuicæ, Bismaluzæ ana ʒ. ij.
Cum syrupo iuiubarum fiat opiata. Sumatur ʒ. j. longè à pasto, superbibedo
decoctionis hordei mundati parum. Rondeletius.

Aliud.

℞. Succij Glycyrrhizæ, Styracis, Tragacanthæ, Gummi Arabici, Amyli
ana ʒ. iij.

Boli Armeni ʒ. ij. Opj ʒ. j. β.

Cum syrupo iuiubarum fiat opiata. Capiat ut suprâ. Idem.

Electuarium pro dolore in fluxu uentris.

℞. Acaciæ, Hypocistidis, Carnis Cytoniorum, Sumach, Gallarū ana ʒ. j.

Coralli rubri usti, & loti in aqua ros. ʒ. j. β. Opj ʒ. j.

Cinnamomi crassi, Cyperi ana ʒ. β.

Cum syrupo de rosis ficcis fiat electuarium. Addi potest ʒ. j. β. boli Armeni,
uel terræ sigillatæ. Idem.

Electuarium ad uteri dolores.

℞. Castorij, Myrrhæ, Crocij, Styracis ana ʒ. ij.

Rad. Ireos, Spicę nardi, Folij, Malabatri, Afari ana ʒ. j. Opj

520 DE ELECTVARIIS MINVS VSVALIBVS. .

Opij ʒ.ʒ.β.
Cum syrupo de arthemisia fiat electuarium, uel opiata. Capiat ʒ.ʒ. superbi-
bendo parum uini albi, diluti aqua ex floribus citri. Idem. A

Aliud.

℞. Spec. Diamoschi, Diambrae ana ʒ.ʒ.
Castorij ʒ.ʒ.
Opij ʒ.β.
Cum syrupo de arthemisia fiat opiata. Sumatur ʒ.ʒ. ut supra. Rondeletius.

Aliud ad dolores cum ulcere.

℞. Bdellij, Myrrhae ana ʒ.ʒ.
Cort. Thuris, Sarcocollae, Mastice ana ʒ.ʒ.β.
Amyli, Styracis ana ʒ.ʒ.
Sem. Papaueris albi, Endiuiae, Plantaginis ana ʒ.ʒ.β.
Cum syrupo iuiubino fiat electuarium. Quod si dolor non sedetur, augeatur
quantitas opij ad ʒ.ʒ.ʒ. Idem Rondeletius.

DE ELECTVARIIS AQVAM

purgantibus.

℞. Succu Cucumeris asinini, Succu rad. Cucu. asinini, Laureolae, Ireos pur-
purei, Absinthij, Eupatorij ana ʒ.ʒ.ʒ.

Resideat: quae supernatat aqua, abijciatur. Crafsiori uero parti insperge: B

Rhabbarbari, Agarici ana ʒ.β.
Spice nardi, Sem. Endiuiae, Sem. Scariolae, Sem. Portulacae, Mastice, Lap-
pae, Tragacanthae, Salis gemmae ana ʒ.ʒ.
Mellis colati ʒ.β.

In uase uitreo reposita agitentur in sole, ut fiat ueluti electuarium. Datur ʒ.ʒ.
per interualla hydropicis. Gordonius.

DE ELECTVARIIS PURGANTIBVS HVMO-
res pituitosos & mixtos.

Electuarium soluens uentrem.

℞. Acororum ʒ.ʒ.β.
Turpeti electi ʒ.β.
Carthami, Hermodactylorum ana ʒ.ʒ.ʒ.
Stoachadis, Zingiberis, Asari, Origani, Anthos, Nucis moschatae, Caryo-
phyllorum, Herbe paralysis ana ʒ.ʒ.
Sem. Apij, Anisi, Ligustici ana ʒ.ʒ.ʒ.
Mellis despumati ʒ.ʒ.β.
Fiat electuarium. Datur ʒ.β.

Quod si uehementius optes, addito diagridij ʒ.β. Fumanellus.

Aliud

A

Aliud.

℞. Calsiæ fistularis ℥. ij.
 Mannæ electæ ℥. j. β.
 Sacchari uiolacei ℥. j.
 Succı rosarum ℥. β.

Misce. Datur per horam ante cibum ab ℥. β. ad ℥. j. Fumanellus.

DE OPIATIS CAP. XXII

Athanasia maior.

℞. Croci, Myrrhæ, Opij, Castorij, Sem. Iusquiami, Costi, Cordumemi, Seminis Papaueris nigri, Spicæ nardi, Eupatorij, Hepatis lupi, Cornu dextri capræ uel cerui ana partes æquales.

Terenda terantur, & alia in uino liquefiant. Excipe omnia melle despumato, & post sex menses utere cum uino dulci & grato, aut cum sapa, & succo intybi & apij. Seruatur annis tribus. Serapio.

Athanasia alia.

℞. Cinnamomi, Calsiæ ana ℥. iij. G. v.

B Croci, Schœnanthi, Styracis calamithæ, Phu, Sefeli, Hyoscyami, Betonice, Apij, Dauçi, Anisi, Opij ana ℥. j. β. G. iij.

Nardi Indicæ, Folij, Castorij, Myrrhæ, Lapidis hæmatitis, Carabæ, Sanguinis draconis, Coralli rubri, Costi, Boli Armeni, Mummie, Consolidæ maioris, Terræ sigillatæ, Acori, Afari, Cort. Mandragoræ, Polij montani, Pulegij, Baccarum Lauri, Mei, Piperis albi, lögi, Petroselini ana ℥. β. Mellis quantum sufficit.

Confice, ut artis est, & serua in uase fictili uitreato ad annos tres. * Dysenteria laborantibus & cœliacis confert, atq; ad fluxum muliebrem utilis est. Facit ad profluuium sanguinis narium, & eos qui cibum non retinent in uentriculo. Sanguinis præterea à quacunque causa natis reiectionibus auxiliatur. Nicolaus.

Philonis Thracensis antidotus, similis ei quam Mesues describit.

℞. Croci ℥. v.
 Pyrethri, Euphorbij, Nardi Indicæ ana ℥. j.
 Piperis albi, Sem. Hyoscyami ana ℥. xx.
 Opij ℥. x.

Mellis quantum sufficit.

Confice secundum artem. * Expertissima ad sedandos uehementes & lethales partium dolores, uentriculi, coli, hypochondriorum, hepatis, lienis, renum, uteri, excitatos à crassis humoribus, aut flatu crasso, aut amborū cau-

V u fa in.

sa in temperie frigida: ualet etiam ad suffocationis periculum, singultum ue-
hementem, & urinæ difficultatem. Galenus.

Philonium Romanum.

℞. Piperis albi, Sem. Hyoscyami ana ʒ. v.

Opij ʒ. ʒ. β.

Calsiæ ʒ. j. β.

Sem. Apij ʒ. j.

Sem. Petroselinii, Sem. Fœniculi, Dauci ana ʒ. ij. G. v.

Croci ʒ. β.

Nardi Indicæ, Pyrethri, Zedoariæ ana G. xv.

Cinnamomi, Euphorbij, Costi ana ʒ. j.

Mellis despumati quantum sufficit.

Confice ut artis est. * Idem quod præcedens potest. Nicolaus.

Philonium Persicum.

℞. Piperis albi, Hyoscyami ana ʒ. xx.

Opij, Terræ Lemniæ ana ʒ. x.

Lapidis hæmatitis, Croci ana ʒ. v.

Castorij, Nardi Indicæ, Euphorbij, Pyrethri, Margaritarum, Carabæ, Do-
ronici, Zedoariæ, Trochisc. Ramich ana ʒ. j.

Caphuræ ʒ. j.

Mellis quantum sufficit.

Confice. * Ad sanguinem undecunq; manantem confert: quapropter men-
ses immodicè erumpentes, hæmorrhoidas, & cruentas excretiones per in-
ferna, itemq; sanguinis sputum cõpescit, ac fœtum in utero retinet. Mesues.

Paulina.

℞. Cinnamomi, Costi, Galbani, Castorij, Opij, Piperis nigri, longi, Sty-
racis ana ʒ. j.

Mellis quantum sufficit.

Tunduntur quæ tundenda sunt, & cribrantur per angustissimum cribrum:
galbanū in melle dissoluitur, & factū electuarium in consistenti forma repo-
nitur in pyxidem uitream, aut argenteam. * Facit hæmoptoicis, tussientibus,
phthificis, peripneumonicis, ad cõuulsa, rupta, stomachi subuersionē, bilem
uomentes, ac fecernentes, cœliacos, dysentericos, ad affectiones circa uesi-
cā, suffocationes uteri, febres per circuitū repetētes, hora una ante exacerba-
tionem exhibitā: facit in malum habitum delapsis, cibum non sentiētibus, ac
pharmaca lethalia & plagas uenenum iaculantium bestiarum. Galenus.

Tryphera magna.

℞. Opij ʒ. ij.

Cinnamomi, Caryophyllorum, Galangæ, Nardi Indicæ, Zedoariæ, Zin-
giberis,

A giberis, Costi, Styracis calamitę, Calami aromatici, Calaminthę, Iridis, Peucedani, Acori, Cort. Mandragorę, Nardi Celticę, Rosarum rubrarum, Piperis, Anisi, Apij, Petroselini, Fęniculi, Dauci, Hyofeyami, Cymini, Sem. Ocymi ana ʒ. j.

Mellis despumati quantum sufficit.

Confice ut artis est, & serua ad annos tres. * Auxiliatur delori stomachi ex frigiditate: sumpta namq; statim sudorem prouocat, phreniticis, mulieribus ex uteri dolore in somnibus, rheumaticis, peripneumoniacis, & qui excrementa cum sanguine excernunt, utilissima est. Nicolaus.

Requies.

ʒ. Rosarum rubrarum, Violarum ana ʒ. iij.

Opij, Hyofeyami, Papaueris albi, nigri, Corticis Mandragorę, Seminis Scariolę, Lactucę, Portulacę, Pyllij, Nucis moschataę, Cinnamomi, Sacchari ana ʒ. j. *ʒ.*

Santali albi, rubri, citrini, Spodij, Tragacanthę ana ʒ. ij. G.v.

Mellis despumati quantum sufficit.

Confice secundum artem. Durat ad decennium. * Ad febres continuas & ardentis, omnemq; febrilem affectum, ad febres denique acutas confert. Est autem utilis temporibus & pulsibus manuum inuncta, ac cordis dolo-

B rem mitigat, somnumq; conciliat. Nicolaus.

Sotera.

ʒ. Nardi Indicę, Castorij ana ʒ. xxxix.

Myrrhę ʒ. xxvij.

Croci ʒ. xxxvij.

Opij, Schęnanthi ana ʒ. xxxvj.

Petroselini ʒ. xlv.

Anisi ʒ. ix.

Apij ʒ. viij.

Calicę ʒ. xij.

Piperis longi, Amomi, Sefeli ana ʒ. xij.

Sisonis ʒ. vi.

Styracis, Hedycroi, Costi, Afari ana ʒ. xvij.

Mellis quantum sufficit.

Fiat opiata. Seruatur ad decennium. Paulus.

Musa Enea, siue Zazenea.

ʒ. Castorij, Myrrhę, Opij, Piperis nigri, longi, Galbani, Costi, Cinnamomi, Phu, Mei, Dauci, Afari, Croci ana ʒ. ʒ.

Mellis Hispanici despumati triplum.

V u 2 Misce.

Misce. Seruatur ad annos decem. * Valet ad omnes passiones frigidas & A
uentositates crassas, & dolorem dētium, & corrosionem eorum, & ad frigus
stomachi, & tarditatem digestionis, & colicam, & difficultatem urinæ, & ad
frigus & phlegma, & ad mucositatem urinæ. Mesues.

Diaolibanum.

℞. Castorei, Opii, Hyoscyami albi ana ʒ. iiii.
Cassia lignea ʒ. ij. ʒ. ij.
Folij, Croci, Thuris masculi ana ʒ. ij.
Rheupontici, Amomi ana ʒ. j. ʒ. ij.
Myrrhæ ʒ. j. β.
Spicæ Indicæ, Pyrethri, Euphorbij, Leucopiperis ana ʒ. ij. β.
Pæoniæ, Storacis calamitæ, Macropiperis ana ʒ. j.
Mellis despumati triplex pondus.

Fiat opiata. Seruatur ad annos tres. * Vtile est ad diuersas passiones capi-
tis, hemicranicum dolorem placat, & supercilij lacrymas potenter stringit,
fauces rheumatizatas & arterias lenit, hæmoptoicis & tussientibus mede-
tur, uomitum compescit, dolorem stomachi & nauseam aufert, peripneumo-
nicis, pleuriticis, empycis sine dubio subuenit, gonorrhœam & satyriasm e-
mendat, & menstrualem sanguinem sistit. Nicolaus.

Aurea Alexandrina.

℞. Asari, Carpobalsami, Sem. Hyoscyami albi ana ʒ. ij. β.
Caryophyllorum, Opii Thebaici, Myrrhæ, Cyperi rotundi ana ʒ. ij.
Opobalsami, Cinnamomi, Euphorbij, Folij, Zedoariæ, Zingiberis, Costi
ueri, Corallij, Cassiæ lignæ, Tragacanthæ, Thuris masc. Meu, Styracis
calamitæ, Spicæ Celticæ, Cardamomi minoris, Sefelios, Semin. Napi,
Sem. Saxifragiæ, Anethi, Anisi ana ʒ. j.
Ligni aloës, Rhabbarbari, Alienti moschate, Castorei, Spicæ Indicæ, Galan-
gæ, Opopanacis, Anacardij, Masticis, Sulphuris uiui, Rad. Pæoniæ, E-
ryngij, Rosarum, Thymi, Acerei ueri, id est, calami aromat. Pulegij, Ari-
stolochiæ longæ, Gentianæ, Cort. rad. Mandragoræ, Chamædryos, Phu,
Baccarum Lauri, Ammeos, Dauci Cretici, Macropiperis, Leucopipe-
ris, Xylobalsami, Carui, Amomi, Petroselinii, Seminis Ligustici, Rutæ,
Sinomi ana ʒ. β.
Auri sinceri, Argenti meri, Ambarum margaritarum, Blaccæ Bizantiæ,
Ossium de corde cerui ana ʒ. j. G. xiiij.
Limaturæ Eboris, Calami aromatici, Pyrethri ana G. viij.
Mellis despumati triplum.

Fiat opiata. Seruatur annis quinque. * Contra defluxiones capitis, frigore
conceptras, efficax est: oculorum lacrymas exiccat, dentium dolores lenit,
aduersus.

A aduersus capitis cruciatum summopere prodest, illitum fronti, comitiales, insanos, uertiginosos, & in uniuersum omnem capitis noxam mulcet, tabidis, tussiculosis, humorem à thorace reijcientibus, cardiacis, sanguinem excreantibus præsentis est auxilio, ischiaticis, coli & renum cruciatibus. Aduersus iliorum noxam, difficultatem urinæ, & eiusdem stillicidium ualet, calculos comminuit, omni uentris malo liberat, quotidianis & tertianis febribus circa accessiõis initiũ, subferuefacto stæchadis iusculo medetur. Nicolaus.

Theriaca Andromachi senioris.

Rz. Trochiscorum scillicitorum ʒ. xlvij.
Trochiscorum theriacorum, Hedycroi, Piperis longi, Opij ana ʒ. xxiiij.
Rosarum rub. purgatarũ, Iridis, Succu Glycyrrhizæ, Sem. Napi syluestris, Scordij, Opobalsami, Cinnamomi, Agarici ana ʒ. xij.
Myrrhæ, Costi, Croci, Castæ, Nardi Indicæ, Schœnanthi, Thuris electi, Piperis nigri, Dictamni Cretici, Comarum Marrubij, Rhapontici, Stæchadis, Petroselinii, Calaminthæ montanæ, Terebinthinæ, Zingiberis, Rad. Quinquefolij ana ʒ. vj.
Polij montani, Chamæpityos, Styracis, Meu, Amomi, Nardi Celticæ, Terræ Lemniæ, Phu, Chamædryos, Folij, Chalcitidis tostæ, Gentianæ, Anisi, Succu Hypocistidis, Carpobalsami, Gummi splendidi, Sem. Fœniculi, Cardamomi, Sefeli, Acaciæ, Thlaspi, Hyperici, Ammi, Sagapeni ana ʒ. iiij.
B Castorij, Aristolochiæ tenuis, Dauci, Bituminis Iudaici, Opopanacis, Centaurij minoris, Galbani ana ʒ. ij.
Mellis despumati lb. x.
Vini optimi odorati quantum satis est.

Galenus ætate plus aromatum admiscebant ad singulas libras mellis, & medicamentum solidius erat, quàm nunc fit. Iam enim sumunt mellis lb. xx. Conficitur autem hoc modo secundum Galenum.

Herbæ, flores, fructus, semina, radices, cortices, trochisci, terra Lemnia, chalcitis, & bitumen diligentissimè conteruntur pistillo ferreo in mortario æneo, & cribro subtilissimo cribrantur, semine thlaspi, napi syluestris, & croco exceptis, quæ per se teruntur, uinoq; rigantur, ne mortario interiori inhæreant, & ut commodius terantur. Gummi, succi, & castorium per se teruntur, adfuso uino, ut etiam commodius teri possint. In ipso compositionis tempore, omnium que rerum mixtura, primùm liquefit terebinthina in duplici uase cum mellis pauxillo, deinde etiam opopanax, galbanum, sagapenum, bene antea per se trita, adfuso pauculo melle, ut facilius digitis explanentur, commisceanturq; atque uniantur. Postea coquantur in ipso duplici uase cum terebinthina, donec ad iustam consistentiam radaeta sint. his

V u 3 admiscetur.

admiscetur pars aliqua cōtritorum, tum etiam in uino dissolutorum, donec A
mellis consistentiam consequantur: deinde in mortarium uasq̃ magnitudi-
nis effunduntur in hunc modum. Primū, pars aliqua eorum quæ uino dis-
soluta sunt, & ad eam formam redacta: deinde mellis nonnihil cocti per se,
& despumati: postremò pars aliqua eorum quæ in puluerem redacta fue-
rant: adhuc nonnihil eorum quæ liquefacta in duplici uase, eaq̃ tepida: hæc
omnia probè agitentur rudicula, & sic consequenter de residuo faciendum,
donec omnia probè unita sint: & hæc quidem ad solem, ut facilius fiat, con-
tinuò agitando, & tundendo pila ferrea, inuncta opobalsamo, ut facilius a-
gitari possint: & cōmiscetur etiam opobalsamum reliquis: alioqui faci-
le adhereret pistillo medicamentum, & difficilior fieret agitatio. Hęc con-
tinuè per quatuor aut quinque dies agitata sunt: & rursus elapsis sex aut
septem diebus, iteranda agitatio per duos menses: deinde reponitur me-
dicamentum uasculis plumbeis, aut terreis bene coctis & uitratis: & serua-
tur per annos triginta.

Chalcitis quæ in hoc medicamen uenit, sic præparanda est. Illius bona
quantitas in olla cruda, succensis carbonibus coquitur: eaq̃ liquefacta ubi
bullas emiserit, partem supernam in marmor effundes, atque illic sine in
umbra, donec frigeat. Hinc postea solummodo capies quod supernè spu-
meum fuerit, quodq̃ cinerei est coloris, aut præsij, non quod flauum est: B
theriacam enim colore flauo, non nigro inficeret. Hic autem animaduerten-
dum est, omnes theriacæ compositiones, quæ apud Galenum uarijs locis re-
periuntur, & diuersorum authorum, recipere in super

Acori ʒ. iij.

Piperis albi ʒ. vj.

* Exitialibus uenenis, & ferarum uirus eiaculantium ictibus aduersatur.
Inueteratis capitis doloribus, uertigini, aurium grauitati, comitialibus, at-
tonitis, apoplecticis uel resolutis, oculorum hebetudini, uoci amissæ, asth-
maticis, recenti & uetustæ tussi, sanguinem reiicientibus, egrè excreanti-
bus, & non nisi recta ceruice spirantibus, uentriculi imbecillitatibus ac in-
flationibus colicis, cruciatibus, ileosis, cholericis, cœliacis, regio morbo cor-
reptis opitulatur: induratum lienem liquefacit, calculos in renibus com-
minuit, urinæ difficultati, & uesicæ exulcerationibus medetur. Febrium
horroribus & rigoribus, hydropicis, elephantia laborantibus sæpe præsen-
ti est auxilio. Menstrua cit, fœtum mortuum excutit, articularum dolori-
bus adiumento est. Non autem corpus modò, sed & animi morbos per-
fanat. Melancholicis itaque, lymphaticis, aque pauoribus, & id genus alijs
malis iugiter data succurrit. Ceterum in pestifera lue uix aliud præsen-
tius, magisq̃ idoneum præsidium hac ipsa inueni-
ri potest. Galenus.

Mithridatium

A.

Mithridatium Andromachi.

ꝑ. Glycyrrhizæ ʒ. viij. ʒ. β.
 Opij ʒ. iij. ʒ. j.
 Folij, Nardi Celticæ, Sem. Fœniculi, Gentianæ, Meu, Rosarum siccarum,
 Cardamomi ana ʒ. iij.
 Castorij, Thuris, Myrrhæ, Succu Hypocistidis ana ʒ. vj.
 Polij, Costi, Sefeli, Casiæ ana ʒ. v. ʒ. j.
 Nardi Indicæ, Scordij, Cyphi, Schœnanthi, Opopanacis, Terebinthi-
 næ ana ʒ. vj. ʒ. j.
 Acori, Phu, Hyperici, Acaciæ, Gummi, Carpobalsami, Sagapeni ana ʒ. ij.
 Croci, Cinnamomi, Zingiberis ana ʒ. vij. ʒ. j.
 Styracis ʒ. v. ʒ. ij.
 Dauci ʒ. vj. ʒ. β.
 Petroselini ʒ. iij. β.
 Piperis longi ʒ. iij. β.
 Anisi ʒ. iij.
 Thlaspi, Opobalsami ana ʒ. vj. ʒ. ij.
 Galbani ʒ. vij.
 Scinci ʒ. ij. ʒ. j.

B.

Vini optimi, Mellis despumati ana quantum satis est.
 Componere in modum theriacæ. Seruatur per annos decem. * Ad eadem ad
 quæ theriaca ualet, & ad pleraque perniciofa medicamenta & uenena est
 efficacior: in uiperæ autem morsu curatione, theriaca inferior. Priuatim
 uerò facit ad diuturnas uentriculi & thoracis fluxiones, & ad omnes inue-
 teratas in profundo corporis exulcerationes & abscessus. Tabidis, uen-
 trisq̄ue inflationibus medetur, appetentiam emendat & restituit, ac bonum
 corpori colorem conciliat. Calculos conterit, ac urinæ difficultatem sanat,
 acuit uisum eorum, qui illo crebrius utuntur. Mortuum foetum eijcit, & ad
 muliebria omnis generis mala frigida, atque ijs quæ non concipiunt, con-
 ducit. Item melancholiam non finit consistere. Omne denique capitis ma-
 lum, ex frigiditate ortum, dolores aurium, lachrymantes oculos, dentium
 cruciatus, oris, palatij, auriumq̄ue omnia uitia, emplastri forma imposita,
 sanat. Galenus.

Mithridatium Democratis.

ꝑ. Myrrhæ, Croci, Agarici, Zingiberis, Cinnamomi, Nardi Indicæ, Thu-
 ris electi, Thlaspi ana ʒ. x.
 Sefeli, Opobalsami, Schœnanthi, Stœchadis, Terebinthinæ, Galba-
 ni, Costi, Piperis longi, Castorij, Hypocistidis, Styracis, Opopana-
 cis, Folij ana ʒ. viij.

Casiæ:

Cassie, Polij montani, Piperis albi, Scordij, Sem. Dauci, Carpobalsami, Cy. A
 phi, Bdellij ana ʒ. viij.
 Nardi Celticę, Gummi, Petroselini, Opij, Cardamomi, Sem. Fœniculi,
 Gentianę, Rosarum, Dictamni Cretici ana ʒ. v.
 Anisi, Ari, Acori, Phu, Sagapeni ana ʒ. iiij.
 Meu, Acacie, Scinchi, Sem. Hyperici ana ʒ. ij. β.
 Vini, Mellis despumati ana quantum sufficit.
 Confice secundum artem. Damocrates.

Ambrosia Archibij.

℞. Anisi, Sem. Apij ana ʒ. iiij.
 Myrrhæ, Opopanacis ana ʒ. j.
 Cinnamomi, Sem. Loti amari, Cassie, Spicæ Indicę ana ʒ. ij.
 Croci ʒ. ij. β.
 Piperis ʒ. β.
 Opij ʒ. iiij.
 Mellis despumati quantum satis est.

Confice secundum artem. * Ad omnes internas affectiones utilis est pota:
 ad intestinorum tormina quidem ex uini myrtini, & aquæ quarta hemina
 parte: ad hepar autem ex aquę mulsæ hemina dimidia. Item ad uigilias, oph-
 thalmiam, & lateris morbum ex aqua mulsæ: ad stomachi demum uitia, ex
 uini granatorum cyathis duobus, & aquę totidem, Galenus. B

Esdre antidotus.

℞. Amomi ʒ. xij.
 Squinanthi ʒ. ix.
 Pyrethri ʒ. viij.
 Croci ʒ. xxxvj.
 Cinnamomi ʒ. viij.
 Myrrhæ troglodyticę ʒ. xij.
 Styracis calamithæ ʒ. xvij.
 Petroselini, Sem. Dauci ʒ. iiij.
 Tragacanthę ʒ. viij.
 Succi Hypocistidis ʒ. ix.
 Ireos, Abrotani ana ʒ. xv.
 Sem. Fœniculi ʒ. viij.
 Bdellij ʒ. ix.
 Thuris ʒ. j.
 Sulphuris uiui ʒ. viij.
 Sem. Hyoscyami albi ʒ. xxvij.
 Cassie lignę ʒ. ix.

Sem. Pa-

- A** Sem. Papaueris ꝯ. xxx.
 Spicæ nardi ꝯ. xy.
 Sem. Rutæ, Ocymi ꝯ. j.
 Rhois culinarij ꝯ. lv.
 Sem. Anethi ꝯ. vj.
 Afari ꝯ. j.
 Cardamomi ꝯ. vj.
 Opij ꝯ. xxvij.
 Euphorbij ꝯ. vj.
 Piperis nigri ꝯ. xxx.
 Rosarum siccarum ꝯ. ix.
 Phylli ꝯ. xij.
 Opobalsami ꝯ. xxiiij.
 Ventri mergi ꝯ. vj.
 Laccæ, Lycij Indici, Caryophyllorum ꝯ. xij.
 Stercoris reperti in aluo mergi ꝯ. vj.
 Florum Nerij ꝯ. iiij. β.
 Rhabarbari ꝯ. xij.
 Mei Athamantici ꝯ. vj.
- B** Terræ Cimoliæ ꝯ. xij.
 Succu Arthemisiæ ꝯ. xx.
 Fol. Cichoreæ ꝯ. ix.
 Spicæ Celticæ ꝯ. xij.
 Castorei ꝯ. j.
 Costi, Gentianæ ꝯ. xij.
 Confect. Hædychroi ꝯ. ix.
 Anisi ꝯ. vj. Sifonis ꝯ. xvij.
 Thymiamatis Hammoniaci, Fol. Citri ꝯ. xij.
 Vini ueteris odorati quātum satis fuerit succis & liquoribus resoluendis.
 Mellis despumati optimi ℥. v. aut ℥. vi.
- Arida omnia minutissimè contundito. Opium uerò & myrrhá, hypocistidè, bdelliū, lyciū, hāmoniacū in uino dissoluito: tragacanthá deinde seorsim per se affuso uino dissoluito. Deinde omnia simul misceto, addendo etiā despumatū arthemisię succū. In uniuersum hęc cōfectionē eodē modo cōficis, quo theriacā, & eodē modo dimittēda est ut efferuescat, nō omnino repleto uase. Per septē annos melior iudicatur. * Mirificè cōtra lethalia uenena prodest: aliosq; usus multos habet, quos apud Aetiū lib. 13. cap. 101. Paulū lib. 7. cap. 11. Actuarium in lib. De compos. medicamentorum reperies. Aetius.

Esdra, aliter.

℞. Mameræ ꝯ. j.

X x

Amomi

Amomi ʒ. ʒ.
 Squinanthi ʒ. β.
 Pyrethri ʒ. viij.
 Croci ʒ. j.
 Myrrhæ ʒ. iij.
 Styracis ʒ. β. ʒ. ʒ.
 Petroselini ʒ. iij.
 Tragacanthæ ʒ. j.
 Succu Hypocistidis ʒ. iij.
 Ireos ʒ. β. ʒ. ʒ.
 Sem. Fœniculi ʒ. j.
 Folij ʒ. iij.
 Rhabarbari, Rosarum siccarū, Glycyrrhizæ, Flor. syluestris Punicæ, Cin-
 namomi ana ʒ. iij.
 Nardi Celticæ ʒ. j.
 Mellis despumati lb. vi. ʒ. ix. ʒ. vij.
 Myrrham & hypocistidē in uino dissolue modico, tragacanthū uerò per se
 etiam dissolue, & confice secundum artem. Actuarius.
 Mameræ loco, sume Doronicum Romanum. Cordus.

Adrianum.

ʒ. Opij Thebaici ʒ. iij.
 Calsiæ lignæ, Hyoscyami ana ʒ. ʒ. ʒ. β.
 Euphorbij, Leucopiperis ana ʒ. ʒ. G. vj.
 Seseleos, Sem. Apij ana ʒ. j. ʒ. β. G. ʒ.
 Folij, Origani, Tragacanthæ ana ʒ. j.
 Opopalsami, Petroselini, Macis, Styracis cal. Zingiberis, Xylobalsami, Cy-
 peri, Carpobalsami Macedon. ana ʒ. j. minus G. vj.
 Sem. Marathri ʒ. ʒ. G. viij. Calami aromat. ʒ. ʒ. G. ʒ.
 Cinnamomi, Croci, Costi, Rheupontici, Pyrethri, Acori, Dauci Creti-
 ci, Anisi ana ʒ. β. G. vj.
 Castorij ʒ. β.
 Serapini, Myrrhæ, Rosarum, Cardamomi, Amomi, Rutæ agrestis, Sem.
 Ameos ana ʒ. j. G. iij.
 Calsiæ fistulæ ʒ. j. Mellis quantum sufficit.

Fiat opiata, in uase fictili uitrato seruandum, annis septem. * Valet propriè
 ad omne uitium capitis ex frigiditate, & ad grauedinem oculorum, & obscu-
 ritatem, contra hemicraniam datur, cum uino calido, ubi cocta sit saluia cū
 sero, in modum auellanæ: datur etiam quartanarijs cum decocto gentianæ,
 uel origani ante horam accessionis. Cum uino data, in quo saxifragia sit de-
 cocta, uel milium solis, lapidem frangit. Nicolaus.

A DE CONSERVIS CAP. XXII

Cal- facien- tes.	Caput: Conserua	{ Anthos, flor. Acori. Betonica, Euphrasia. Flor. Stoechados, Flor. Salvia. Flor. Lauendula, Maiorana. Paeonia, Primula ueris, &c.	
	Pectus: Conserua	{ Hyssopi. Melissa. Capill. Veneris.	
	Cor: Conserua	{ Flor. Borraginis. Flor. Buglossa. Flor. Anthos, Arantij. Lychnidis, id est, flor. Caryophyllorum, Melissa.	
	Ventriculum: Conserua	{ Abfinthij. Enula. Mentha, &c.	
	Hepar: Conserua	{ Abfinthij. Fumiterræ. Flor. Sambuci, &c.	
	Splenem: Conserua	{ Asplenij. Fumiterræ.	
	Vterum: Conserua	{ Maiorana. Melissa. Anthos, &c.	
	Iuncturas: Conserua	{ Florum Stoechados. Florum Anthos, &c.	
	Refrigerā- tes	Caput: Conserua	{ Flor. Nymphae seu Nenupharis. Rosarum. Violarum, &c.
		Pectus: Conserua	{ Acetosa. Rosarum. Violarum, &c.
Cor: Conserua		{ Rosarum. Violarum, &c.	
Ventriculum: Conserua		{ Rosarum, Violarum, &c. Florum Cichorij.	
Hepar: Conserua		{ Rosarum. Violarum, &c.	
Splenem: Conserua		{ Rosarum. Violarum, &c.	
Renes: Conserua		{ Rosarum, &c.	
Vterum: Conserua		{ Rosarum. Violarum, &c.	
Iuncturas: Conserua		{ Rosarum, Violarum.	

Conseruae
sunt flores,
uel herbae e-
xactissimi
concise, uel
tusa, & sac-
charo mix-
ta: & uel

Conserua flor. Anthos.

℞. Flor. Anthos recent. ℥. β.
Sacchari albisimi ℥. j. β.

Terantur simul in mortario marmoreo, pistillo ligneo: fiatq; conserua in uase uitreo uel uitrato fictili, uel lapideo denso aliquandiu ad solem: deinde ad annum uel biennium seruanda. * Valet ad confortandum cerebrum humidum, & neruosa membra, & ad melancholiam & ad phlegma.

Conserua Acori.

℞. Radicum Acori ueri ℥. j.

Bulliant in aqua usquedum cocta fuerint, postea pistentur, & passentur per sedatium, deinde ponantur supra ignem, addendo

Sacchari ℥. iij.

Fiat conserua in modum opiatæ. Insoletur, & seruetur per annum. * Valet ægritudinibus cerebri & neruorū: ualet in affectibus phlegmaticis. Mesues.

Conserua Betonicæ.

℞. Betonicæ recentis & teneræ ℥. j.

Sacchari ℥. iij.

Folia in mortario lapideo terantur minutissimè: saccharum uerò coquendū est, cum aquæ betonicæ ℥. ij. ultra syrupi consistentiam: deinde simul miscantur aliquandiu supra prunas, fiatq; conserua, quæ per annū in uase uitreato conseruanda. * Caput & uentriculum confortat, uenena ex corpore pel-
lit. Florentini Medici. B

Conserua Euphrasia.

℞. Mense Iulio uel Iunio, Euphrasiæ unā cum floribus ℥. β.

Sacchari ℥. j. β.

Contundantur simul in mortario lapideo minutissimè, deinde ponantur in uase uitreato aliquandiu ad solem quotidie agitando: postea seruetur ad annum uel biennium. * Cerebrū confortat, siccaturq; uiuum acuit ac clarificat.

Conserua florum Stæchados.

Cōserua Stæchados eodē modo, quo cōserua anthos, uel beton. paratur.

Conserua florum Saluiæ.

℞. Florum Saluiæ recent. ℥. β.

Sacchari ℥. j. β.

Pistentur simul in mortario marmoreo minutissimè: deinde ponantur in uase fictili uitrato ad solem aliquandiu, quotidie agitando: postea seruetur ad annum. * Ad omnia cerebri uitia ex frigida causa, ualet: uentriculum corroborat: obstructions aperit: uentriculi superfluos & noxios humores absunit.

Conserua

A

Conserua florum Lauendulae.

Conserua florum Lauendulae uel spicae, fit floribus recentibus contritis cum saccharo, eodem quo conserua florum anthos modo: insolatur, & conseruatur per annum. * Cerebrum, uentriculum, hepar, splenem & uterum excalfacit: ad suffocationes uteri, ad splenem induratum, & apoplexiam prodest.

Conserua Maioranae.

Conserua Maioranae paratur, ut conserua anthos, uel betonicae. Insolatur, & conseruatur per annum. * Valet ad omnes frigidos & humidos cerebri, capitis & uentriculi affectus: iccinoris obstructions referat: uitales spiritus fortificat, &c.

Conserua Paeoniae.

℞. In uere florum Paeoniae recent. lb. β. Sacchari lb. j. Pistentur simul in mortario lapideo optimè: deinde ponantur ad solem in uase uitreato per menses tres, quotidie agitando spatula lignea: postea conserua feruetur ad annum. * Ad epilepsiam & uertiginem ualet: mēstrua prouocat: renum & uesicae calculos expellit: terrores nocturnos sedat, &c.

Conserua Primulae ueris.

B Conserua Primulae ueris, tempore ueris conficitur eodem modo, quo conserua paeoniae. * Capiti & cerebro frigido conducit: hominem ab apoplexia tutum reddit, &c.

DE CONSERUIS CALFACIENTIB. PECTVS.

Conserua Hyssopi.

Conserua Hyssopi mense Iulio uel Augusto ex floribus hyssopi & duplo sacchari conficitur, eodem quo conserua florum anthos modo. Insolatur, & ad annum conseruatur. * Pectori & pulmone prodest: tussim curat: humores frigidos & crassos in pectore attenuat, & consumit: cerebrum & uentriculum confortat.

Conserua Melissae.

Conserua Melissa conficitur ut conserua ex floribus roris marini. * Cerebrum, cor, pectus, uentriculum roborat: melancholicis & tristibus confortat: memoriam confirmat: menstrua pellit: uteri dolores, & suffocationes tollit.

Conserua Capill. Veneris.

℞. Capillorum Veneris lb. j.

Sacchari albi lb. iij.

Contundantur in uase lapideo, fiatque conserua, ad solem primò, deinde ad annum conseruanda. * Valet pleuresi, & affectibus pectoris & pulmonis: in affectibus etiam melancholicis, & cholerae rubrae maximè prodest.

Xx 3

DE CON=

DE CONSERVIS CALFACIENTIB. COR. A

Conserua florum Borraginis.

℞. Florum Borraginis recentium, à capitello, cui inseruntur, purgatorum ℥. iiii.

Sacchari albi ℥. xij.

Contundantur simul bene in uase lapideo, pistillo ligneo: fiatq; conserua: insoletur, & in uase uitreato seruetur ad annum. Dosis est ad ℥. j. * Datur in tre more cordis, & in syncope: gaudium enim generat, & confert melancholiz.

Conserua Buglossæ.

℞. Florum Buglossæ ℥. j.

Sacchari ℥. iij.

Terantur in uase lapideo, cum pistillo ligneo, fiatq; cōserua in modum opiatæ: insoletur, & seruetur per annum. * Confortat cor, maniacis & melancholicis confert, etiam syncopi, & cordis tremorem aufert: ualet etiam cholera.

Conserua flor. Auranti.

℞. Florum mal. Aurantium recent. Sacchari albi ana ℥. j.

Contundantur ut suprâ, fiatq; conserua.

Conserua florum Persici.

℞. Florum Persici recent. ℥. j.

Sacchari ℥. ij.

Contunde in uase lapideo: infola, & serua per annum. * Lumbricos necat atque expellit.

Conserua florum Caryophyllorum, id est, Lychnidis coronar.

℞. Florum Lychnidis, qui ab odoris imitatione caryophylli uocatur, ℥. ℞.

Sacchari albi ℥. j. ℞.

Fiat conserua ad modum opiatæ. * Cerebrum, caput & cor confortat: contra uenena ualet, atque aerem pestiferum: atq; partum faciliat, &c.

COR quoq; CALEFACIUNT & roborant, Cōserua Anthos, Melissæ: de quibus suprâ.

DE CONSERVIS CALFACIENTIBVS

uentriculum.

Conserua Absinthij.

℞. Thymi Venetiani ℥. ij.

Vini albi optimi ℥. j. ℞.

Coque thymum ad ℥. xij. uini: deinde exprimito, & adde

Sacchari albi ℥. j.

Coque ad formam syrupi crassioris. deinde cum infrigidatum fuerit, adde Absinthij

- A Absinthij uiridis, optimè incisi ac subtilissimè in mortario lapideo con-
tusi ꝑ. xviii.
Misce, ac reponatur.

Conserua Enule.

- ℞. Radicis Enulæ campanæ lb. ij.
Bulliat in aqua, usquedum cocta fuerit: postea pistetur, & passetur per seta-
ceum: deinde ponatur supra ignem, addendo
Sacchari lb. vj.
Fiat conserua in forma opiata. * Valet ad confortandum stomachum, &
membra nutritionis, & ad phlegma.

Conserua Mentha.

- ℞. Menthæ crispæ lb. β.
Sacchari albi lb. j. β.
Contunde, insola, & serua per annum. * Ventriculum calefacit ac robo-
rat: uomitum compescit.

DE CONSERVIS CALFACIENTIB. HEPAR.

Conserua Fumiterræ.

- ℞. Florum Fumiterræ lb. β.
Sacchari albi lb. j. β.
B Contunde simul in mortario lapideo, & fac conseruam ad modum opiatae:
insola, & serua per annum in uale lapideo denso, uel uitreo. * Scabie infe-
ctis confert: sanguinem mundificat: sudorem mouet: ac regium morbum
perfanat.

Conserua florum Sambuci.

- ℞. Flor. Sambuci recent. lb. j.
Sacchari albi lb. ij. uel iij.
Pista in mortario lapideo simul: insola, & conserua. Durat annum. * Hydro-
pisis confert.

HEPAR etiam CALFACIT Conserua Absinthij: de qua supra.

DE CONSERVIS CALFA-
cientibus splenem.

- ℞. Asplenij seu Ceterach lb. β.
Sacchari lb. j. β.
Fiat conserua ad modum opiatae. * Ad eadem, ad quæ herba ipsa ualet.

DE CONSERVIS EXCAL-
facientibus uterum.

UTERUM excalfaciunt ac roborant, Conserua Maioranæ, Melissæ, An-
thos, &c. de quibus uide supra suo loco.

DE

DE CONSERVIS.

DE CONSERVIS EXCALFACIEN-
tibus iuncturas. A

IVNCTVRAS excalfaciunt roborantq̄; Conserua flor. Anthos, florum
Stœchadis: de quibus uide suprâ.

DE CONSERVIS REFRIGERAN-
tibus caput.*Conserua florum Nenupharis.*

℞. Florum Nymphææ luteorum, recentium ℥. β.

Sacchari albi ℥. j.

Tere in uase lapideo, ac in formam opiatæ confice: insola, & in uase fictili ui-
treato conserua ad annum. * Febricitantibus, hecticis & pleuriticis cōfert:
cerebrum refrigerat, somnumq̄; inducit.

Conserua Rosarum.

℞. Rosarum rub. recent. exunguatarum ℥. j.

Sacchari albi ℥. j. uel iij.

Teruntur in mortario lapideo, reponuntur uase uitreo, aut uitrato, pergane
na operculato, mensibus tribus insolantur, in die sæpe agitantur, soli auferū-
tur, seruantur ad biennium uel triennium. Sunt qui rolas omnino imperfe-
ctas condiunt, ut ualentius adstringant. Datur ad ℥. j. β. * Ventriculum & B
cor, & uiscera reliqua firmat, ipsorumq̄; intemperiem humidam emendat.
Mesues.

Conserua Violarum.

℞. Violarum purpurearum recentium cauda & uiridi ceu caliculo purga-
tarum ℥. j.

Sacchari albi ℥. j. uel secundum Mesue ℥. iij.

Contundantur simul in uase lapideo, fiatq̄; conserua. Annum durat. Datur
ad ℥. j. * Bilis incendium, sitimq̄; extinguit, aluum subducit. Syluius.

DE CONSERVIS REFRIGERAN-
tibus pectus.

PECTVS refrigerat Conserua Violarum: de qua suprâ.

DE ELECTVARIIS REFRIGERANTI-
bus cor.*Conserua Acetosa.*

℞. Acetosæ ℥. β.

Sacchari ℥. j. β.

Tere in mortario lapideo: deinde insola, & serua per annum. * Va-
let cholericis.

COR

A COR etiam REFRIGERANT, Conferua Rosarum, Violarum, &c. de quibus supra.

DE CONSERVIS REFRIGERANTIBUS uentriculum.

VENTRICVLVM refrigerant, Conferua Rosarum, Violarum, &c. de quibus supra.

DE CONSERVIS REFRIGERANTIBUS hepar.

Conserua florum Cichorij.

℞. Florum Cichorij recent. ℔. j.

Sacchari albi ℔. iij.

Terantur in uase lapideo optimè, deinde in uase uitrato ponantur ad solem per aliquot hebdomadas, & seruetur conferua ad annum. * Valet melancholicis & cholericis.

HEPAR quoque REFRIGERANT, Conferua Rosarum, Violarum: de quibus supra.

DE CONSERVIS REFRIGERANTIBVS Splenem.

B SPLENEM refrigerant, Conferua Rosarum, Violarum, Cichorij, &c. de quibus supra.

DE CONSERVIS REFRIGERANTIBUS renes.

RENES refrigerant Conferua Rosarum, Nymphaeæ, &c. de quibus uide supra.

DE CONSERVIS REFRIGERANTIBUS uterum.

UTERVM refrigerant, Conferua Rosarum, Violarum, Nymphaeæ, &c. de quibus supra.

DE CONSERVIS REFRIGERANTIBUS iuncturas.

IUNCTVRAS refrigerant, Conferua Rosarum, Violarum, &c. de quibus supra.

Yy DE ECLE-

DE ECLEGMATIS SIVE

A

LOCH. CAP. XXIIII

*Eclegma, quod Arabib.
Loch, Latine Linctus dici-
tur, thoracicum & pulmo-
nicum est brasidum, ex me-
dicamentis fere dulcibus &
detergentibus, ac etiam qui-
tinosis, interdum amaris &
acris, parvis coctis, quam
vlechnario liquido, vel soli-
do conveniat. Florum alia.*

- Adstringentia {
 - Loch de papauere.
 - Loch de ppyllio.
 - Loch de tusilagine simp.
 - Loch de tusilagine comp.
 - Loch de pino.
 - Loch sanum & expertum.
 - Loch Antipatri.
 - Loch de prasio.
- Usualia seu offi-
cinalia {
 - Abstergentia {
 - Loch de eruo.
 - Loch de pulmone nulpis.
 - Loch de scilla.
 - Loch ad asthma.
 - Loch de caulibus.
 - Loch de carchamo.
 - Loch ex allijs.
 - Consolidantia {
 - Loch de pulmone nulpis.
 - Loch ad spurum sanguinis.
 - Loch ad inflammationē la-
terum & pulmonis inci-
ipientem.
- Minus usualia {
 - Astringentia {
 - Loch ad defluxionē tenuē.
 - Loch ad acres & erodentes
destillationes.
 - Abstergentia {
 - Loch abstergēs & cōcoquēs.
 - Loch ad humores pituito-
sos.
 - Loch ad frigidās destilla-
tiones.
 - Loch ad pus retentum.
 - Loch ad ulcus pulmōis, etc.

B

DE ECLE-

A DE ECLEGMATIS ASTRINGENTIBVS.

Loch de papauere.

℞. Papaueris albi ʒ. xxv.
 Amygdalarum dulcium depellatarum, Nucleorum pinearum nucum, Gū
 mi Arabici, Tragacanthi, Succī Glycyrrhizæ ana ʒ. x.
 Amyli, Sem. Porrulacæ, Lactucæ, Cytoniorum ana ʒ. iiij.
 Croci ʒ. j.
 Penidiorum alborum ʒ. iiij.
 Omnia contundantur, & fiat loch secundum artem cum syrūpi papaueris
 ℔. iiij. Seruatur in uase figulino uitrato per annū. Datur lambendo ad ʒ. iiij.
 hora una post prandium: uel ad somnum hora una, à cœna: uel omni tempo
 re ad affectus sequentes. * Iuuat tussim & gutturis asperitatem à catarrho
 calido, tenui (quem spūtum liquidum indicat:) eum enim coquit, & crassat.
 Confert etiam febribus ardentibus, dolenti thoraci, pleuritidi. Mesues.

Loch de psyllio.

℞. Mucaginis psyllij secundum artem extractæ ʒ. ʒ.
 Sacchari clarificati ℔. j.
 Coquatur saccharum sufficienter, donec candidum fiat: deinde admisceatur
 mucilago, & tandiu agitantur, donec probè unita sint, & albescant. Seruatur
 B in uase uitreato ad annum. * Tenuēs & acres humores in pectus defluent
 es inspissat, mitigatq; & excretioni preparat. Fit in hunc modum loch de se
 mine lini, & alia huiusmodi eclegmata, quæ mucilagines recipiunt.

Loch de psyllio, alind.

℞. Psyllij, Granorum Cytoniorum ana ʒ. v.
 Sem. Papaueris albi ʒ. x.
 Sebesten n. l.
 Iuiubarum n. xxx.
 Glycyrrhizæ ʒ. viij.
 Passularum exacinarum ʒ. xv.
 Calsiæ fistulæ mundatæ ʒ. j.
 Decoque in ℔. viij. aquæ, donec impinguentur. deinde cola, & projice
 super ea
 Rob ℔. ʒ.
 Sacchari Saliemēni, Syrūpi uiolati, Penidiarum ana ʒ. vj.
 Farinæ fabarum ʒ. iiij.
 Tragacanthi, Gummi Arabici ana aur. iiij.
 Coquantur usquedum transeant in consistentiam mellis. deinde
 ℞. Sem. Cucurbitæ, Melonis, Cucumeris, Citrulli ana aur. ʒ.
 Sem. Papaueris albi aur. iiij.
 Sem. Anisi, Fœniculi ana aur. ʒ.

Yy 2

Confice

Confice, & conserua in uase uitreo ad biennium. Mesues.

A

DE ECLEGMATIS ABSTERGENTIBVS.

Loch de tusilagine simplex.

℞. Rad. Tusilaginis ℥. j.

Coquantur in aqua, donec dissolutæ sint, contunduntur & colantur: deinde additis.

Mellis ℥. ij.

coquitur in iustam consistentiam: & seruat per annum. Eodem modo fit loch de althea, baucia, & similia.

Loch de tusilagine comp. Magistrale.

℞. Rad. Tusilaginis ℥. vj.

Coquantur in aqua: deinde cōtusis, & dissolutis in ipsa decoctione, addūt Sacchari ℥. j. β.

Igni deponuntur, & agitantur, donec in cōmodam formam redigātur: adde:

Nucleorum pinearum denudatorum ℥. j. β.

Passularum purgatarum ℥. ij.

Contusis in mortario lapideo, & permistis, adde:

Croci, Caryophyllorum ana ℥. β.

Succi Glycyrrhizæ ℥. iij. β.

Cinnamomi, Macis ana ℥. j.

Redigantur in puluerem tenuem: misce, & serua annum.

B

Loch de pino.

℞. Nucleorum pinearum mundatorum ℥. xxx.

Amygdalarum, Auellanarum assatarum, Tragacanthi, Gummi Arabici, Succi Glycyrrhizæ, Amyli, Capill. Veneris, Iridis ana ℥. β.

Carnis dactylorum ℥. xxxv.

Amygdal. amararum ℥. iij.

Mellis passularum, id est, sapæ, Butyri recentis, Sacchari optimi ana ℥. iij.

Mellis optimi ℥. ij. ℥. ij.

Fiat loch, quod annum seruat. Sumatur uelut lambendo ℥. j. * Tussi diuurnæ, difficultati spiritus, & asthmatis succurrit, humores in thorace crassos incidit & extenuat. Mesues.

Loch sanum & expertum.

℞. Cinnamomi, Hyssopi, Glycyrrhizæ ana ℥. β.

Iuiubas, Sebelsten ana n. xxx.

Vuarum passerum, Ficuum pinguium, Dactylorum pinguium ana ℥. j.

Fœnigræci ℥. v.

Capill. Veneris M. j.

Anisi, Fœniculi, Iridis, Calamenthæ, Sem. Lini ana ℥. β.

Coquantur

A. Coquantur in lb. iij. aquæ ad dimidij consumptionem. Colaturæ bene expressæ adde

Penidiarum albarum lb. ij.

Coquantur ad perfectionem: postea insperge subsequentiâ minutissimè trita,

Nucleorum pinearum mundatorum, Amygdal. mundat. ana ʒ. v.

Succi Glycyrrhizæ, Tragacanthi, Gummi Arabici, Amyli candidi ana ʒ. β.

Iridis ʒ. ij.

Agitentur omnia simul in lebe, donec albescant. Serua in uase uitrato annum uel biennium. Datur lambendo à ʒ. vi ad ʒ. x. * Tussi uocisq; asperitati à frigiditate natæ auxilio est. Crassos in thorace & pulmone humores extenuat. Mesues.

Loch Antipatri.

℞. Nucleorum pinearum mundatorum ʒ. xij.

Seminis Lini alsii ʒ. ix.

Tragacanthi, Iridis ana ʒ. xij.

Carnis dactylorum ʒ. xvij.

Amygdalarum dulcium ʒ. xvj.

Dissoluatur tragacantha in aqua uiolarum, & reliquis contusis, cum melle q. fiat loch secundum artem. Durat annum. * Earundem ferè uirium cum

B. superiori.

Loch de prasio.

℞. Comarum Marrubij, Iridis, Hyssopi, Pulegij, Glycyrrhizæ, Sem. Apij ana ʒ. iij.

Ficum passiarum pinguium, Nucleorum pinearum mundat. ana ʒ. vj. Macerata in aqua sufficiente per noctem, decoquantur: & percolatis addatur mellis pars media. Coquantur ad perfectionem. Annum durat. * Tabescensibus maximè conuenit. Paulus.

Loch de eruo.

℞. Amygdal. amararum ʒ. β.

Farinæ Orobi, Hyssopi ana ʒ. j.

Iridis ʒ. ij.

Nucleorum pinearum mundat. ʒ. j.

Mellis quantum satis est.

Fiat loch. Conseruatur annum. Paulus.

Loch de pulmone uulpis.

℞. Pulmonis uulpini præparati, Succi Glycyrrhizæ, Sem. Fœniculi, Capillorum Veneris ana ʒ. j.

Mellis ʒ. xvj.

Fiat loch. Seruatur bienniū. * Abstergit & consolidat ulcera pectoris & pulmonis: & præferendum est alijs remedijs in phthisi. Mesues.

γ γ 3 Loch

Loch de scilla.

A

℞. Succi Scillæ, diebus canicularibus excepti ℥.j.
Mellis ℥.j.β.

Coque, fiat loch, ad annum uel biennium seruandum. * Crassos & lentos humores, quiq; in thorace difficulter coquantur, incidit & extenuat: ideoq; asthmaticis, & difficilè spirantibus auxiliatur, thoracisq; dolorem leuat, Galenus.

Loch aliud.

Ipsum Scillæ corpus, è qua succus extractus, libram unam terito, cum melis ℥.j.β.

Coque, fiat loch. * Hoc facultate posterius est præcedenti.

Loch de scilla compositum, seu ad asthma.

℞. Scillæ in pane assatæ ʒ.iiij.
Marrubij, Hyssopi ana ʒ. j.
Iridis ʒ. ij.
Myrrhæ, Croci ana ʒ. β.
Mellis quantum sufficit.

Fiat loch. Seruatur ad biennium. * Ad asthma & diurnam tussim ualeat: humorem enim crassum extenuat. Mesues.

Loch de caulibus.

B

℞. Succi Caulium ℥. v.

Lento igne coque, auferendo spumam eius, usquedū redeat ad libras duas. Deinde decoquatur cum rob, id est, sapæ uini & mellis ana ℥. j. usquedum ingrossentur. agitetur itaq; diligenter pistillo, fiatq; loch ad annum seruandum. Mesues.

Aliqui pro rob accipiunt saccharum rubrum.

Loch de Carthamo.

℞. Medullæ sem. Carthami ʒ. vj.
Amygdal. mundatarum ʒ. ʒ.
Nucleorum pinearum mundatorum ʒ. j.
Mellis cocti, Succi Scillæ ana quantum sufficit.

Fiat loch ad perfectionem. Mesues.

Loch de caulibus, aliud.

℞. Succi Caulium rubeorum ℥. j.
Croci ʒ. ij.
Sacchari, Mellis ana ℥. β.

Misce simul ut decet, & fiat loch. Gordonius.

Loch ex allijs.

℞. Alliorum purgatorum ℥. β.

Ia

A In cicerum & hyssopi iure decoquetur: deinde tundetur: medulla exprimitur, incerneturq;, & cum mellis & butyri recentis singulis libris, igne lento ad eclegmatis spissitudinem percoquetur. * Valet ad thoracis intemperie frigidam, materiq;, pituitosæ defluxionem, tussim humidam, & diurnam: pectoris excretionem iuuat.

DE ECLEGMATIS MINVS VSVALIBVS: AC

primùm de adstringentibus.

Loch ad sputum sanguinis.

℞. Conseruæ Symphtii, Rosarum antiquæ ana ʒ.β.

Gelatinæ Cytoniorum conditorum saccharo ʒ.ij.

Trochiscorum de terra sigillata, uel de Carabæ ʒ.ij.

Cum syrupo myrtillorum fiat ad modum loch. Rondeletius.

Aliud.

℞. Gelatinæ Cytoniorum, uel succi eorundem ʒ.ij.

Amyli, Tragacanthæ ana ʒ. iij.

Terræ sigillatæ, Sanguinis draconis ana ʒ. ij. Carabæ ʒ. j.

Lapidis hæmatites ʒ. β.

Incorporentur simul, fiat loch. Rondeletius.

Aliud cum albumine oui.

B ℞. Sanguinis draconis ʒ. ij. Amyli, Tragacanthæ ana ʒ. j.

Sem. Portulacæ, Papaueris, Vuarum ana ʒ. j.

Terræ sigillatæ, uel Boli Armeni, Rosarum rubrarum ana ʒ. β.

Fiat puluis tenuissimus: q; albumine oui crudo fortiter agitato, ut sit tenuiū partium, excipiat, sumaturq;, eclegmatis loco: cui saporis gratia saccharū ros. tabulatum addatur. Idem.

Aliud ex succis recentibus.

℞. Succis Bursæ pastoris, Herbe sanguinariæ, Plâtiginis, depuratorū ana ʒ. ij.

Amyli, Sanguinis draconis ana ʒ. iij.

Coralli rubri, Tragacanthæ ana ʒ. iij.

Sacchari ros. tabulati quantum sufficit.

Misce, & fiat loch. Idem.

Loch ad incipientem inflammationem laterum & pulmonis.

℞. Spec. Diatragacanthi frig. ʒ. iij.

Sacchari candi, Penidiarum ana ʒ. j.

Syrupi iuiubarū quantum sufficit.

Fiat loch. Capiat lambendo In progressu aut, nimisq; tenui materia, additur diairis simplex, & pro syrupo iuiubarum uiolatus ponitur. Rondeletius.

Loch ad inflammationem declinantem.

℞. Spec. Diairis simplicis ʒ. ij.

Spec.

544 DE ECLEGMATIS MINVS VSVALIBVS.

Spec. Diatrag. frigidi ʒ. j. A
 Sacchari candi ʒ. ij.
 Syrupi Capill. Veneris, Syrupi de Glycyrrhiza ana ʒ. j.
 Misce. Idem.

Loch ad defluxionem tenuem incrassandam & sistendam.

℞. Pulpæ iuiubarum ʒ. β.
 Amyli ʒ. ij.
 Tragacanthæ, Gummi Arabici ana ʒ. j.
 Cum syrupo de papauere fiat loch. Sumatur lambendo. Rondeletius.

Loch ad acres & erodentes destillationes.

℞. Spec. Diatrag. frig. ʒ. β.
 Boli Armeni in aqua rosacea loti ʒ. ij.
 Trochiscorum de terra sigillata ʒ. ij.
 Cum syrupo de papauere fiat loch. Andernacus.

DE ECLEGMATIS ABSTERGENTIBVS.

Loch abstergens & concoquens.

℞. Pulpæ passularum ʒ. j.
 Mucilaginis ficuum extractæ cum decoctione hordei ʒ. β.
 Enulæ campanæ siccæ ʒ. j.
 Spec. Diaireos simp. ʒ. j.
 Cum syrupo de glycyrrhiza fiat loch. Rondeletius. B

Aliud.

℞. Amygdal. dulcium ʒ. j. β.
 Pinearum infusarum in aqua decoctionis hordei & glycyrrhizæ ʒ. j. β.
 Pulpæ passularum ʒ. β.
 Sem. Maluæ, Bombacis ana ʒ. ij.
 Sem. Anisi ʒ. j.
 Succu Glycyrrhizæ ʒ. ij.
 Cum syrupo de prafsio, uel glycyrrhizæ fiat loch. Idem.

Aliud fortius.

℞. Scillæ in pasta inuolutæ, & in furno assæ ʒ. β.
 Fortiter contundatur. cui adde,
 Succu Glycyrrhizæ ʒ. ij.
 Conseruæ Enulæ campanæ ʒ. β.
 Sapæ, Oxymellitis simpl. ana ʒ. ij.
 Auellanarum ʒ. β.
 Quatuor sem. frig. incisorum ana ʒ. iij.
 Pinearum, Amygdal. dulc. ana ʒ. j.
 Pistentur simul, & fiat loch. Idem.

Aliud

A

Aliud.

℞. Marrubij, Hyssopi, Capill. Veneris, Calaminthæ ana M. j.
 Passularum, Ficum, Dactylorum ana n. xxx.
 Anisi ʒ. ij.
 Glycyrrhizæ rasæ ʒ. iij.
 Quatuor sem. frig. ana ʒ. ij.

Fiat decoctio in aqua hordei ad quart. j. cui adde,

Pinearum ʒ. iij.
 Tragacanthæ, Gummi Arabici ana ʒ. j.
 Pulpæ Passularum, Dactylorum, Ficum ana ʒ. β.
 Cum pauca quantitate sapæ fiat loch. Rondeletius.

Loch ad humorem pituitosum.

℞. Spec. Diaireos Salom. Diaireos simpl. ana ʒ. ij.
 Enulæ campanæ ʒ. j. β.
 Oxymellis scillitici quantum sufficit.
 Omnia commisceantur, ac ex rudicula glycyrrhizæ lingenda deglutiendaq;
 paulatim dentur. Andernacus.

Loch ad frigidas distillationes.

Ex butyro, saccharo, & pauca terebinthina paratur: quo in catarrho à ma-
 B teria frigida, & pectoris constrictione dilatanda, utimur. Fundit enim, expe-
 ctorat, & detergit. Rondeletius.

Loch ad pus retentum.

℞. Syrupi Rosati laxat. ʒ. ij.
 Succu Glycyrrhizæ ʒ. j.
 Farinæ hordei ʒ. β.
 Tragacanthæ, uel Gummi Arabici ʒ. j.
 Fiat loch. Sumatur manè tantum. Serò autem utatur constringentibus.
 Rondeletius.


Loch ad ulcera pulmonis.

℞. Conferuæ Symphiti, Conferuæ Ros. antiquæ ana ʒ. j.
 Tragacanthę torrefactę, Gummi Arabici leuiter torrefactę, Cin. Cancro-
 rum fluuiat. lotorum ana ʒ. ij.
 Coralli rubri, Boli Armeni, Terrę sigillatę ana ʒ. j.
 Sem. Papaueris albi, Plantaginis ana ʒ. j. β.
 Cum syrupo de rosis siccis fiat loch. Idem.

Zz

DE CON-

DE CONDITIS CAP. XXV. A



DE CON-

A DE CONDITIS CALFACIENTIBVS
& corroborantibus cor.

Nux moschata Indica condita.

Nuces moschatæ Indicæ recentes conditæ ad nos Lusitanorum navigationib. ex India cõuehũtur, nostris iuglãdibus ampliorib. persimiles, cortice uiridi, carnoso, & alio lignoso, inter quos est macis, & sub lignoso ipsa nux moschata. * Valet ad cordis & uentriculi robur, & intẽperiẽ frigidã. Syluius.

Aurantia condita.

Cortices Arantiorum aqua frigida aliquoties mutata macerẽtur ad deponendum amarorem plus minus, pro intentione usurpare uolẽtis: & deinde modicẽ resiccati condiantur syrupo simplici, uel mellis, uel sacchari, coniunctim uel diuisim, ad iustam crassitiem. Quidam à prædictis corticibus accuratẽ auferunt album illud quod sub flauo subest, ueluti fungosum intermedium, usque ad succum siue chylum ipsius fractus: alij contra relinquunt, & pariter condiunt. * Ventriculum & cor roborant. Colonientes.

Citria condita.

Cortices Citrorum tam magnorũ, quàm uola manus capere potest, carne purgati, lixiuio claro mergãtur dies nouem, mutato ad diem quintum: post merge aqua clara, donec amaritudine deposita dulcescant: tunc uase mundo, aqua fontis plurima coquantur, donec tenerescant: aquosa deinde substantia ab his expressa in uase lapideo mergantur uigintiquatuor horas iulepo sufficienti ex saccharo albo, & aqua tripla constante: post coquantur igni lento, ad penidiorum consistentiam. Extracti ex iulepo cortices, uase uitreo reponantur, superfuso singulis uicissim uelut incrustandis iulepo rosato ad mediocrem, seu sacchari candefacti crassitiem cocto. Sunt qui ambra & moscho aromatizant. Datur post mensem. * Stomachum & cor confortant, coctionem iuuant, oris halitum commendant. Eodem etiam modo cõdiuntur cortices Aranciorum & Limonum. Mesues.

Myrobalani Chebule condita.

Myrobalani Chebulę accipiendę sunt quodlibet humidę & recentes, si harum est potestas, uel saltẽ arte & industria idonea humectatę, quæ stylo passim compunctę coquantur ex aqua igni lento, donec tenerescant. His in asferem immisis, aqua exprimat. Deinde biduo hydromelite uel syrupo sacchari mergantur. Deinde igni lento clementer coquantur, uase uitreo recondantur, ac melle cui incoctæ fuerint, mergantur. Hodie ex Ægypto conditę in Italiam adferuntur. Dantur post sex menses. Dosis est una de mane stomacho ieiuno. * Stomachũ, cor & uentriculũ firmãt, appetentiã inuitãt, coctionẽ promouẽt, rationalẽ animę partẽ uegetam reddũt & sensificã: quapropter uisum quoq; clariorẽ, & usu crebro iuuetutem diu tuentur. Mesues.

Conditum de pomis.

A

Poma odora nulla putredine uitiata, depellata, intus purgata, in frusta idonea secta coque in iulepo multum aquoso: postridie in iulepo alio propemodum perfectè cocto percoque, aromatiza moscho, uase uitreo repone, eo iulepo cui incocta sunt, superdato. * Cor firmant, syncopen & cordis palpitationem sedant. Mesues.

DE CONDITIS CALFACIENTIBVS.

uentriculum.

Zingiber conditum.

℞. Zingiberis recētis, si haberi potest, sin minus, saltē arte humectati part. j. Coquitur cum mellis partibus tribus, & sacchari parte una. Humectandum aut zingiber albū, purum, recens, aqua affusa primū, deinde arena humida obrutum, quarto quoq; die renouata, aqua sæpe superfusa, donec tumefiat, & humectetur: idq; uel in dolio, aut alio uase magno fiat, uel in fossa quadam subterranea magna, & loco humido. Alij zingiber aridum acerrimo lixiuio probè macerant, ut molle euadat: quod ubi factum est, perfundunt pura aqua frigida subinde mutata, donec omnis acrimonia & lentor lixiuij auferatur. Postea, ut suprā dictum est, procedunt. Viride conditum ex Arabia & Troglodytica in Ægyptum, & inde ad nos affertur. * Temperiem uentriculi frigidam & humidam sanat, & ab ea tardam & deprauatam coctionem, quæ cibos in acidam cruditatem corrumpat. Viscerum lubricitatem corrigi, flatu dissipat, alimenti in hepar & corpus reliquum distributionem celerat. Mesues & Colonienfes.

Calamus aromaticus conditus.

Calamus aromaticus seu Acorus uerus, ut zingiber conditur. Nostrum quoque acorum officinæ conditum habent, sed inutilem omnino censemus. * Acorus conditus, cerebri & neruorum affectibus frigidis confert. Mesues.

Cytonia condita.

℞. Cytonia ampla, nulla putredine uitiata, depellata, intus purgata, in frusta idonea secta: coque in iulepo multum aquoso: postridie in iulepo alio propemodum perfectè cocto percoque: aromatiza moscho, uase uitreo repone, eo iulepo, cui incocta sunt, superdato. * Fluorem alui, uomitumq; sistunt, uentriculum roborant: ob id & coctionem iuuant. Mesues.

Diacitonium simplex.

℞. Carnium Citoniorum uapore aquæ dulcis coctorum, & ad spissitudinem coctorum ℥. viij.

Sacchari albissimi despumati, & ad spissitudinem iustam cocti ℥. viij. Coquantur ad solidam cōsistentiam, & extendatur in tabulā feruens massa, refrige-

A refrigeratâ in partes incidatur. Quidam octo libris carniû Citoniorum, addunt sex libras Sacchari clarificati. Poteris etiam ita facere:

℞. Citoniorum excorticatorum, & ab interioribus mundatorum ℥. viij.
Sacchari clarificati ℥. iiij.

Coque deinde citonia super uaporem aquæ dulcis: deinde unâ cum saccharo ad iustam spissitudinem coque. Durat annum. * Peculiare remedium est fluxus, uel uomitus, quoniâ stipticat, & corroborat mēbra collapsa, debilia: confortat stomachum, uirtutem retentiuam & digestiuam: & summo opere excitat gustum. Sed ad fluxum datur ante cibum, & ad uomitum compescendum post cibum. Nicolaus.

Pira condita.

Pira cōdita, cor, & uētriculum roborât. Condiuntur ut Citonia. Mesues.

Iuglandes conditæ.

Iuglâdes nondû maturæ macerâtur nouem diebus, uel circiter, in aqua pura mutata quotidie: deinde coquuntur: coctæ ferramēto tenui perfodiuntur trāuersum secundum tres dimēssiones, & leuiter resiccâtur: deinde foramina Cinnamomo, Caryophyllis, & Zingibere, in festucas longas concisis expleantur: post hæc affuso syrupo adseruentur. Cauēdam etiam atq; etiam, ne syrupus nimis calidus sit: alioqui enim cōtrahentur, & corij instar, lēti & tenaces euadunt. Quòd si syrupus aquosior post aliquot dies euadit, & periculum ne corrumpantur fructus, esse suspicaris, effundatur, & ad iustam spissitudinem recoquatur, ac iterum affundatur. Colonienses.

DE CONDITIS EXCALFACIENTIBVS RENES.

Eryngium conditum.

Radices Eryngij albæ, amplæ, teneræ, à cortice cineritio & ligno interno purgatæ, in frusta pollicaris magnitudinis sectæ, uno caryophyllo humectato & particula zingiberis humectati, fartæ intus, unde lignosa portio exēta est, coquantur in æquali pondere sacchari, & duplo melle, uel melle solo, sed triplo: coctis addatur aromatum pondus iustum. Datur ab ʒ. j. ad ʒ. ij. * Renes calefacit, Venerem excitat, flatus tamen uentriculi dissipat. Mesues.

EODEM etiam modo radices Secacul condiuntur.

DE CONDITIS REFRIGERANTIBVS

uentriculum.

Myrobalani emblicæ conditæ.

Myrobalani Emblicæ aqua affusa soli exponendæ donec tenerescât, & humectentur: tunc expressæ, hydromelite biduo macerantur: post igni lento coquantur: coctæ ubi parum refrixerunt, mellis albi quarta parte, uel sac-

Zz 3

chari,

chari, adiecta reconduntur. Sunt qui aromatibus condiant, cinnamomo, ^Axyloaloe, cardamomo, croco, moscho, galla, & similibus. Datur una semel tota diebus aliquot. * Ventriculum roborant, eius substantiam & facultatem contrahendo, & intemperiem humidam corrigendo. Mesues.

Conditum ex persicis.

Persica condiuntur ut Cytonia. * Ventriculum calidum & cor firmant, sitim sedant, oris fœtorem emendant. Mesues.

Conditum ex prunis.

℞. Carnium prunorum nigrorum, oblongorum, mediolorum, subdulcium, elixatorum in aqua cui portulaca incocta fuit, ℥. ij.

Sacchari albi ℥. j.

Aquæ uiolarum ℥. ij.

Coque igni lento, ad crassitudinem: reconde uitreo uase. Da ab aureis iiii. ad sex aureos. * Ventriculi ardorem, & inde natam sitim extinguit, febres mitigat, aluum soluit. Mesues.

Conditum ex sorbis.

℞. Carnis sorborum propemodum maturorum, coctorum in aqua, cui rosæ primùm incoctæ fuerint, & cortices granatorum ℥. iiii.

Mellis aut sacchari ℥. ij. ℞.

Coque ad crassitudinem & reconde uase. Datur ℥. j. * Ventriculum roborat, immodicam purgationem sistit. Mesues.

Cerasa condita.

Cerasa acida recentia, antequam ad perfectam maturitatem peruenerunt, auellantur, & saccharo ad iustam spissitudinem cocto atque clarificato perfundantur, reponanturq; Colonienses.

Mespila condita.

Mespila matura colliguntur, atq; saccharo ad syrapi consistentiam cocto, condiuntur, & in uase uitreato reponuntur.

Radices cichorij condite.

Radices Cichorij recentes & uirides, primùm terra & cortice exteriori atque matrice purgatæ, deinde in partes sectæ, priusquam condiuntur, coquantur, donec mediocriter mollescant: ita tamen, ut non obscurus remaneat amaror. Coctæ leuiter resiccantur in aëre, à se mutuò seiunctæ: deinde saccharo ad iustam spissitudinem cocto condiantur, & reponantur. Colonienses.

DE CONDITIS TEMPERATIS.

Conditum ad omnes uires roborandas.

℞. Conseruæ Anthos, Rosarum, Cirsij, Buglossæ, Adianti, Cichorij ana ℥. ij.

Cort.

- A** Cort. Citri conditi, Nucis Indicæ conditæ ana ʒ. j. β.
 Spec. Plirifarcoticon, Diamofchi, Diarrhod. Abb. Triafandali ana ʒ. β.
 Fol. auri n. vj.
 Sacchari albissimi quantum sufficit.
 Fiat conditum auro coopertum. Andernacus.

Aliud.

- ℞. Spec. Plirifarcoticon, Conferuæ Adianti, Spec. Diamofchi, Diarrhod. Abb. Triafantali ana ʒ. β.
 Conferuæ Rosarum, Cichorij ana ʒ. ij.
 Sacchari albissimi, in aqua rosarum dissoluti quantum sufficit.
 Fiat conditum, instar electuarij solidi. Idem.

DE CONDITIS EXCALFACIENTIBVS.

Diacitonium compositum.

- ℞. Carnium Citoniorū comminutarum, & coctura inspissatarum ℔. iij.
 Mellis despumati ℔. iij.
 Coquatur simul ad iustā cōsistentiā, & postquā ab igne deposueris, antequā refrigerentur, insperge subsequētes species, in tenuissimū puluerē cōtritas:
 Cinnamomi ʒ. j. β.
 Zingiberis ʒ. j.

- B** Piperis, Galangæ ana ʒ. β.
 Caryophyllorum, Nucis moschatæ ana ʒ. iij.
 Spicæ nardi, Ligni aloës, Macis, Cardamomi ana ʒ. ij.
 Zedoariæ ʒ. j.

* Excalfacit, resoluit ventositates, remouet fœtorem corporis, restituit pristinum colorem, & magis restaurat. Nicolaus.

Diacitonium è succo citoniorum.

- ℞. Succu Citoniorum despumati ℔. xij.
 Mellis optimi despumati, Sacchari albissimi clarificati ana ℔. ij.
 Coquatur simul ad iustā spissitudinē: deinde ab igne remotis, & adhuc tepētibus, insperge subsequētiū pulueres minutissimè tritos, & p. cribrū excussos:
 ℞. Cinnamomi, Nucis moschatæ ana ʒ. iij.
 Caryophyllorum, Zingiberis, Galangæ ana ʒ. ij.
 Nardi Celticæ, Piperis nigri, Ligni aloës, Macis, Zedoariæ, Cubearum, Cardamomi ana ʒ. j.
 Confice secundum artem.

Diacitonium aliud.

- ℞. Carnis Citoniorum, Mellis, Aceti albi ana ℔. iij.
 Piperis, Zingiberis ana ʒ. iij.
 Petroselinij Macedonici ʒ. j.

* Appe-

552 DE CONDITIS COMPOS. CALEFACIEN.

* Appetentiam languentem excitat, coctionem ciborum iuuat, iecur & uentrem totum roborat: uentriculi dispositiones probe omnes, exceptis quæ ab æstu uehementi fiunt, modicè iuuat. Galenus.

Aliud.

℞. Succo Cotoneorum, Mellis Attici ana sextarios Rom. ij.
Aceti sextarium β.
Zingiberis ℥. iij.
Piperis ℥. ij.

At in calido uentriculo aufer piper & zingiber. Galenus.

Aliud.

℞. Succo Cotoneorum, Mellis despumati ana ℔. iij.
Aceti ℔. ij.
Piperis longi, Zingiberis, Cinnamomi ana ℥. j.
Caryophyllorum, Ligni aloës ana ℥. β.
Molchi ℥. iij.

Succum, mel, acetum igne lento coque, continenter despumando ad mellis crassitudinem: tunc insperge cætera. * Appetentiam languentem excitat, uentriculum & hepar roborat, coctionem iuuat, & retentionem, eam restringendo. Mesues.

Aliud.

℞. Carnis Cotoneorum in uino coctorum, Mellis despumati ana ℔. iij. B
Cinnamomi, Caryophyllorum, Cardamomi, Galangæ ana ℥. j.
Cinnamomi crassi ℥. iij.
Zingiberis, Piperis longi, Macis ana ℥. iij.

Carnem & mel igne lento percoque: tunc adde reliqua. * Firmat uentriculum, coctionem iuuat, uomitum biliosum & pituitosum sistit, colorem corporis floridum efficit. Mesues.

Conditum ad frigidum humorem.

℞. Trochiscorum de Capparibus, Condito Citri ana ℥. β.
Spec. Diagemmæ ℥. ij.
Sem. Anisi, Cumini, Fœniculi ana ℥. ij.
Sacchari quantum sufficit.

Fiat cōditum, quod bracteis auri cōtegatur: deturq̄: cochleare. Andernacus.

DE CONDITIS COMPOSITIS RE-
frigerantibus.

Conditum ad humorem calidum.

℞. Conseruæ Buglosi, Rosarum, Nymphææ ana ℥. ij. β.
Spec. Diamarg. frig. Pul. Coralli rubri ana ℥. ij.
Pul. frag. lapidum preciosorum ana ℥. j.

Sem. Oxa

A Sem. Oxalidis, Portulacæ, Cichorij ana ʒ. j.

Fol. auri n. iij.

Sacchari albi quantum satis est.

Mixta redigantur in conditum, quod auellanæ magnitudinis instar exhibetur. Andernacus.

Conditum ad inflammationem pulmonis.

℞. Conseruæ uiolarum ʒ. β.

Conseruæ Buglossæ ʒ. γ.

Spec. Diatrag. frigid. ʒ. j.

Spec. Diamargarit. frig. ʒ. β.

Sacchari candi, Sacchari albissimi ana quantum sufficit.

Fiat conditum. * Refrigerat, confortat, & humectat. Rondeletius.

Conditum refrigerans & constringens stomachum imbecillum.

℞. Conseruæ Rosarum ʒ. j.

Spec. Diamarg. frig. ʒ. j.

Coralli rubri ʒ. β.

Sacchari quantum sufficit. Fiat conditum. Rondeletius.

Aliud à pastu conueniens.

B ℞. Myrobal. Emblicorum, in aqua ros. ablutarum n. x.

Cort. Citri, Conseruæ Rosarum antiquæ, Carnium cotoneorum ana ʒ. β.

Coralli rubri, Margaritarum ana ʒ. ij.

Spec. Diarrhod. Diacitoniten sine spec. calidis ana ʒ. β.

Sacchari rosati tab. quantum sufficit.

Fiat conditum, de quo capiat post pastum. Ad spiritus foetorem additur aromaticum ros. & parum moschi, & diamoschi uel ambrae, &c. Rondeletius.

Conditum ad calorem iecoris.

℞. Conseruæ Cichorij, Violarum, Nymphaeæ, Buglossi ana ʒ. ij. β.

Conseruæ Ros. ʒ. j. β.

Spec. Diamarg. frig. Triasantalorum ana ʒ. β.

Fol. auri n. viij.

Sacchari albissimi quantum sufficit.

Misceantur, fiatq; conditum. Detur cochleare unum. Andernacus.

Aliud ad idem.

℞. Spec. Triasantali ʒ. ij.

Spec. Diamarg. frig. Spec. Diarrhod. Abb. ana ʒ. ij.

Conseruæ Cichorij, Violarum ana ʒ. j. β.

Sacchari albissimi, ex aqua intybi, uel cichorij dissoluti, quantum satis est, nempe ad ʒ. iij. β.

Fingantur hinc tessellæ, quæ drachmas duas aut tres pendeant. Idem.

AA DE

Conditum purgans.

℞. Succu Citoniorum ℥.iiij.
Mellis albi ℥.ij.

Coque continenter despumando, donec manus non inficiat, quæ forma est
mixturæ simplicis usitatæ: deinde inijce sequentia:

Scammonij in malo Citonio correcti ℥.j.β.

Caryophyllorum, Zingiberis, Masticis, Piperis longi, Cinnamomi, Nacis
moschatae ana ℥.iiij.

Misce simul omnia. * Colico dolori & alijs partium nutritoriarum mor-
bis salubre est. Datur ab aureo uno ad aureos tres. Aut.

℞. Scammonij ℥.v.

Turbith ℥.xiij.

* Cholagogum erit, simul & phlegmagogum. Aut abiecto scammonio, misce
Turbith ℥.xxv.

Carthami ℥.v.

* Phlegmagogum solum erit. Aut si bilem atram uacuare uelis, horum loco
℞. Helleborum nigrum, uel huius loco Epithymum. Quidam cum saccha-
ro coquunt: alij cum carnibus tantum: alij cum ambobus. Mesues.

DE EXTRACTIS CAP. XXVI. B



DE EXTRA

A DE EXTRACTIS SIMPLICIBVS ALTERANTIBVS.

Extractum Melissæ.

Melissa minutim inciditur, inditurq; ampullæ uitreæ, & uino stillatio, quod duos digitos supermineat, perfunditur: deinde illa cæco operculo occlusa, maceratur in balneo, uel in sole, uel iuxta fornacem diebus aliquot: postea eximitur, & sub prælo ualidè exprimitur, sæcibusq; reiectis, recens herba in idem uinum ponitur, maceratur, exprimiturq; , ut prius: isq; labor terquaterq; repetitur, prout extractum efficax desiderauerimus. Tandem uinū illud in balneo ex ampulla extillatur, dum extracti spissitudo in fundo mellis instar appareat, uel spiritu uini euocato, aquosum effluat. Andernacus.

Extractum Chelidoni.

Chelidoni herba recens adhuc cum floribus & radicibus simul, pultis instar contunditur, inditurq; ampullæ, & in fimo equino per mensem maceratur. deinde in balneo humor ad sæcum siccitatem usq; extillatur: postea hæconterantur in puluerem, & humore paulo antè prolecto, perfunditur, rursusq; diebus triginta in fimo maceratur, ut prius: tunc ex cineribus calidis destillatur, separaturq; aqua ab oleo: quod Chemicus ueram chelidoni essentiam appellant. Ex sæcibus in cinerem reductis cum aqua sal elicitur. Andernacus ex Paracelso.

B *Extractum Cardui benedicti.*

Extractum Cardui benedicti conficitur, ut melissæ. * Præstantissimū est remedium præseruatiuum ad pestem. Crato.

Extractum Iuniperi.

Baccæ iuniperorum recentes, maturæq; , in Septembri mense collectæ, modij instar, in mortario conteruntur, dū nulla earū integra supersit: deinde lebeti, qui quatuor aut quinque urnas cōtinet, induntur, coquanturq; , donec omnē uim exuisse uideantur: postea ab igne remouētur, & q̄ ualidissimè sub prælo per lineos dēfosq; sacculos diligēter & exactè exprimuntur: mox succus expressus iterū per lineū sacculū colatur, quò purior euadat, & materia terrestris, si que adhuc inest, ab eo separetur: tandē igni rursus superimponitur, incoquiturq; , donec ad spissitudinē perueniat, & purpureus quasi appareat. Illud autē aduertendū est, ne dū coquitur, aut effluat, aut adustionē respiciat. Duplici igitur quidā lebetē utūtur, ut cū succus ferè incoctus fuerit, cōmutari possint, qui tamen coctionem diligenter obseruarint, ij unico perficere poterunt: nimirū ut paulatim succum in lebetem infundant, neq; singulis uicibus supra modum impleant: ne dū ille inflatur, præsertim in secūda ebullitione, quando ferè percoctus est, totus in ignem destuat. quare diligentia adhibenda est, & cochleari culinario continuè subigi, commoueri que debet. In prima quidem ebullitione à fundo usque agitandus, ne aduratur: aliàs ingratus fiet, & adustionem referet. Præstat etiam ut ad iustam

556 DE EXTRACTIS SIMPLICIB. ALTERANTIB.

crassitiem percoquatur. temporis namque processu per se magis ac magis extenuatur, graviorque euadit, quò purior seruatur. nisi enim mundus retineatur, perdurare nequit. * Præcellentissimum est extractum in curandis præcauedisq; morbis. Datur adultioribus, cochlearis instar manè & uespere: iunioribus, minore pondere. Benefacit præcipuè calculosis, arenosis, colicis, uteri strangulati, menstruis suppressis, uarijs defluxionibus, angustie pectoris, tussi, cruditati stomachi, pestilentie, syncopæ, uertigini, oculorum doloribus, phrenitidi, surditati, oris fœtori, aquæ subter cutem, morbo comitiali, abscessibus internis, & membrorum tremori auxiliatur: stomachumq; & caput corroborat: iecori cõuenit: prodest menstruis superfluis: præseruat ab omni morbo superuenienti: uisum incoluè seruat: contra omne uenenum, & ærem pestilentem singulariter efficax est, ut non immeritò Germanorum Theriaca dici queat. In autumno, hyeme & uere securè usurpari potest, idq; pro superuenientis morbi ratione semel aut bis in septimana, præseruationis gratia. Per æstatem, cum calor urget, utendum eo nõ est, nisi necessitas postulet. Ad duodecim annos seruari potest, si ritè sit confectus. Andernacus ex Euonymo.

Extractum Symphyti.

Extractum Symphyti eodem quo sequens ex Satyrj radicibus, modo paratur. * Ad ramices curandos efficacissimum est. Idem.

Extractum Satyrj.

Radices Satyrj repurgatæ contunduntur, & cum æquali medullæ panis portione probè subiguntur, maceranturq; in calido fimo, donec in cremorè rubicundum redigantur: deinde sub prælo ualidè exprimuntur, & fæcibus relictis, alius panis admiscetur, ponunturq; in fimum, & exprimuntur, ut antea: idq; tandiu reiteratur, quousq; omnia in liquorem lenti succi instar redacta fuerint. hic postea ampullæ inditur, & in calore fimi aut aquæ finitur per dies aliquot: tandem distillatur, separaturq; aqua ab oleo, siue succo. què sanguinem satyrj appellant. is proprio, uel melissæ sale imbuitur, & ex uino, siue aquis stillatitijs datur. * Vterum confirmat, & ad concipiendum aptiorè reddit: omnes facultates corroborat. Idem.

DE EXTRACTIS SIMPLICIBVS PURGANTIB.

Extractum Rhabarbari.

R. Rhabarbari quantum satis est.

Cui affunde spiritum uini, atque sic relinque, quousq; plus satis coloretur: tum effunde, cola, & spiritum paulatim in balneo separa: eundemq; rursus rhabarbaro priori affundito, & aliquandiu in infusione relinquito in loco calido, quousque colorem acquirat, tum cola, & rursus in balneo separa

A separa per distillationem: id autem tantisper est repetendum, quoad spiritus à rhabarbaro non coleretur amplius. Id tum exprime fortiter, & per filtrum destilla: habet enim nescio quid tenacitatis aut lentoris à rhabarbaro, quæ in extractione est inutilis, & simul multæ utiles partes fluunt, quæ non sunt negligendæ: ideoq; ad hunc modum destillare oportet per filtrum.

Per rostrum seu nasum alembici, filo trahe filtrum, digiti unius latitudine, quoad præ nasi angustia, filtrum amplius non sequatur, cauendo tamen, ne nimia uolentia disiliat uitrum: quo factò, impone spiritum filtrandum in alembicum obstruendum charta humectata. Spiritum per filtrum destillatum extractioni, quæ prius erat separata, rursus in uitro affunde (multum enim uitro adheret, ideoq; in primum uitrum, cui spiritus erat infusus, omnes spiritus rhabarbari percolandi sunt, & ad separationem infundendi) non curando, quòd extractio una iam prius in uitro reperiatur. omnes enim extractiones necessariò coniungendæ sunt, & ad extremum aquæ destillatæ permiscendæ, & rursus separandæ, quoad aqua limpida extrahatur. Euonymus.

Extractum Rhabarbari aliter.

B Rhabarbari electi fragmentorum libram minutim incide, & crassiusculè tere: & affunde succi depurati borraginis & buglosi, utriusque libras duas: relinque per horas uiginti quatuor. Postea coque ad létum ignem, donec extet & emineat rhabarbarum. Exprime deinde fortiter, & expressam decoctionem per laneum colatorium trans mitte & exprime, ut substantia in colatorio maneat. Colaturam coque ad mellis consistentiam, adiecta sacchari optimi uncia. Quidam in balneo Mariæ ad spissitudinem coquunt, ne aduratur: quod præstat, que madmodum & in duplici uase. * Purgando da deglutendum cum gutta olei cinnamomi & anisi mixtum, & azymo inuolutum, faciendum in doli periculum à scrupulo usque ad duos. Suauissimè lubricat uentrem, etiam in infantibus. Quidam, quoniam rhabarbarum per se non ualde purgat, acuunt totam extractionem cum modico diagyridij optimi: quod nihil obest. Euonymus.

Extractum Rhabarbari, aliter.

R Rhabarbari electi ʒ. iij.
Pulueriza, & infunde in aquas appropriatas: stet infusum per diem & noctem, deinde fortiter exprime. Illam expressionem adiecto saccharo candi, quantum uidebitur, leuiter in arena exhalando, exicca ad crassitiam electuarij. Euonymus.

Idem, aliter.

Rhabarbarum eodem modo infundi posset, quo ellebori nigri radices, ut infra dicitur: sed in aqua cinnamomi, & cum syrupo rosato solutio fieri debet succus de rhabarbaro. Medicus quidam ad Gesnerum.

Extractum Agarici.

A

Agaricum rectius maceratur & decoquitur, quàm ex uini spiritu, alioue humore extrahatur. Si tamen omnino eius succum ad hunc modum parare cupias, id quoq; per aquam anisi, cui oleum ipsius ademptum sit, præstare poteris. * Ad capitis affectus, præsertim defluxiones eius efficax. Andernacus ex Euonymo.

Extractum Aloes.

Aloe in puluerem redacta ex humore idoneo maceratur in loco calido tãdiu, donec is coloretur: deinde hic relictis fœcibus eximitur, & recens iterũ affunditur: idq; tantisper reiteratur, quoad nullum amplius colorem extrahere uidebitur: postea omnis humor congregatur, per filtrum, ut uocant, colatur, & succus in fundo remanebit: qui syrupo rosarum solutorio, aut simili, ad iustam spissitudinem coqui debet. Andernacus.

Extractum Hellebori nigri.

Cortices radices hellebori nigri, medulla exempta, infundantur in aqua anisi, de qua sit oleum separatũ, & stet in infusione per horas uigintiquatuor, uel quandiu libuerit: deinde bulliant simul, quouſq; extent radices, ad aqua scilicet ferè consumptionem: coletur postea cum forti expressione. Vltimò decoquatur expressum cum syrupo rosato solutiuo ad sufficientem spissitudinem: reponatur in uasculo terreo uitreato: & utere. Dosis est ʒ. j. uel ʒ. j. ʒ. B

* Purgat sine molestia humorem melancholicum. Medicus quidam Cæsareus ad Gesnerum.

Extractum ex semine Cnici, & alijs.

℞. Medullæ sem. Cnici ʒ. iiij.

Turpeti albi, Fol. Senæ Alex. ana ʒ. j. ʒ.

Diagyrdij ʒ. v.

Rhabarbari electi ʒ. j.

Agarici trochiscati ʒ. vj.

Mannæ granatæ ʒ. ij. ʒ.

Myrobal. Chebulorum ʒ. iiij.

Rad. Polypodij ʒ. ij.

Zingiberis albi ʒ. ʒ.

Minutim incidantur, uel crassius conterantur, & in uini spiritum, ex quo pulueris confectionis Diambrae ʒ. j. per dies octo macerata fuerit, ponantur, sinanturq; stare in loco calidiore, diebus quatuordecim: deinde sacco indatur, & sub prælo ualde exprimantur: postea id quod expressum est, ampullæ infundatur, & operculo impositum, uinum extillatur, donec ad mellis spissitudinem peruenerit. * Drachma dimidia iunioribus, adultis integra, ex iure, uel liquore peculiari, cum syrupo rosacei aut uiolacei solutorij semũcia diluitur,

A diluitur, potuique datur. Andernacus.

Extractum solutorium compositum.

℞. Colocynthis ʒ. vj.
 Agarici optimi, Diagrydij, Hellebori nigri ana ʒ. iiij.
 Aloes electæ ʒ. j.
 Elect. Diarrhod. Abb. ʒ. β.

Puluis electuarij ex aqua cinnamomi, uel spiritu uini diebus aliquot maceratur: deinde relictis fæcibus illa super medicameta purgantia incisa funditur, & in loco calido per dies octo, aut plures macerantur: postea exprimuntur, & humor abstrahitur per balneum, donec in crassitudinem formandis catapotijs idoneam peruenerit. * Datur ʒ. β. uel etiam G. v. tantum. Medicamentum est catholicum, quasi dicas generale. Andernacus.

Extractum solutiuum minus efficax.

℞. Colocynthis ʒ. vj. ʒ. ij.
 Agarici ʒ. β.
 Rhabarbari ʒ. ij.
 Cinnamomi ʒ. iiij.
 Afari, Nardi, Ros. rubrarum, Masttici, Xyloaloes ana ʒ. j.
 Styraçis liquidæ ʒ. iiij.

B Vini Maluatici mens. j.

Fiat infusio, & extractio. Magenbuch.

Aliud.

℞. Pulpæ Colocynthis ʒ. vj. ʒ. ij.
 Turpethi albi & gummosi ʒ. x.
 Stæchadis Arabicæ ʒ. β.
 Diagrydij ʒ. iiij. uel ʒ. vj.
 Agarici optimi ʒ. β.
 Rhabarbari electi ʒ. iiij.
 Cinnamomi ʒ. v.
 Rad. Afari, Spicæ nardi, Ros. rubrarum, Masttici, Ligni aloes ana ʒ. iiij.
 Aloes hepaticæ ʒ. j. ʒ. ij.
 Styraçis liquidæ ʒ. ij. G. iiij.

Incisis & contusis, infundantur in uino sublimato: rectificetur, & fiat secundum artem extractum. Magenbuch.

Aliud purgans, Norimbergæ in usu.

℞. Colocynthis ʒ. xij.
 Veratri nigri, Senæ Alexandr. ana ʒ. β.
 Agarici optimi ʒ. j.
 Rhabarbari electi ʒ. j.

Diagrydij

Diagrydij ʒ. xiiij.

Cinnamomi ʒ. ij. ʒ. ij.

Turbith Stœchados Arab. ana ʒ. ij. ʒ.

Ros. rubrarum, Ligni aloes, Masticis, Ligni paradisi, Myrrhæ, Afari, Spicæ nardi, Storacis liquidæ ana ʒ. v.

Fiat infusio uel putrefactio per aliquot dies, nempe 10. 12. uel 14. cum essentia uini calida: & succus deinde expressus uniatur cū aloes præparatæ ʒ. iij. Idē.

Extractum purgans omnes humores.

℞. Spec. Diambæ ʒ. ʒ.

Spiritus uini ℔. ij. ʒ.

Aquæ cinnamomi distil. ℔. j.

Macerantur per dies aliquot uase probè oblito, ne quid expiret: quotidie uero uas uitreum agitari debet, quoad liquor rubescat: deinde super hæc quæ sequuntur, funditur, relictis fæcibus in fundo uasis:

℞. Colocynthidis ʒ. vj.

Turpeti albi ʒ. vij.

Agarici optimi ʒ. iij.

Veratri nigri ʒ. iij.

Eupatorij Mesuæ, siue Graciolæ, Foliorum Senæ ana ʒ. v. ʒ.

Diagrydij ʒ. v.

Rhabarbari electi ʒ. vij.

Omnia incisa macerantur in humore supradicto diebus quatuordecim: deinde in sacculo lineo injiciuntur, exprimunturq; sub prælo stanneo. Liquor excolatus effususq; in ampullam imponitur balneo, & extillatur, donec id quod in fundo subest, syrupi acquirat spissitudinem: tunc in hoc aloes præparatæ, rursusq; in puluerem redactæ ʒ. x. resoluentur, & agitando uniuntur, quoad crassamentum mellis instar appareat. * Datur ʒ. j. uel ʒ. ʒ. ex iure, alioue diluto: uel in catapotia per se, aut medicamentis purgantibus admixtis, redigitur, exhibeturq; ad deuorandum in aurora, aut longissimè à cœna, ita ut somnus subsequatur. Andernacus.

Aliud ualenter purgans.

℞. Vini spiritus ℔. ij.

Aquæ Cinnamomi ℔. j.

Spec. Diambæ ʒ. j.

Spec. Aromat. caryophyll. ʒ. ʒ.

Hæc per dies quatuordecim in aqua temperatè calida macerantur: deinde liquor fæcibus relictis, effunditur super hæc quæ sequuntur:

Diagrydij ʒ. ʒ.

Rhabarbari electi ʒ. j.

Trochisc. Diacolocynthidos ʒ. iij.

Agarici

- A Agarici trochiscati ʒ. vj.
 Turpeti ex uino cotoneorum macerati ʒ. β.
 Veratri nigri, cum sapa, dauco, & cinnamomo præparati ʒ. vj.
 Fol. Senæ Alexand. ʒ. j. β.
 Sem. Citri albi ʒ. j.
 Cort. Citri ʒ. β.
 Enulæ campanæ ʒ. j.
 Rad. Cichorij ʒ. vj.
 Scolopendrij ueri, Flor. Stœchados, Masticis, Myrrhæ, Rosarū rubr. Sem.
 Fœniculi, Sem. Anisi ana ʒ. j. β.
 Singula contunduntur, maceranturq; ut dictum est, postea sub prælo exprimuntur, & ampullæ imposita, destillatur, donec crassitudinem mellis acquirant: postremo aloes ʒ. xij. dissolutis, repurgatisq; ex uino stillatitio, ununtur in modum extracti: quod oleo cinnamomi, aut caryophyllorum imbuitur, ac uitreo uase conditur. Andernacus.

Extractum ex helleboro, & alijs.

- R. Succu Buglosi, Borruginis ana lb. ij.
 Depurentur, colenturq; ut purificentur. adde his,
 Rad. Fœniculi, Cichorij, Asparagi, Petroseliniana ʒ. iij.
 B Sebesten, Iuiubarum ana ʒ. ij.
 Sem. frig. minorum ana ʒ. β.
 Decoquantur in aquæ lb. xvj. ad tertias. colaturæ adde succos præscriptos, bulliant ad ignem parum: permisce postea,
 Rad. Hellebori nigri lb. iij.
 Coque donec radices emineant. fiat tandem colatura omnium, & decoquantur lento igne ad mellis spissitudinem. Hieronymus Herold.

Extractum aloes.

Aloe in puluerem redacta ex humore idoneo maceratur in loco calido tandem, donec is coloretur: deinde hic relictis fœcibus eximitur, & recens iterum affunditur: idq; tantisper reiteratur, quoad nullum amplius colorem extrahere uidebitur: postea omnis humor congregatur, per filtrum colatur, & succus in fundo remanebit: qui syrupo ros. lax. ad iustam spissitudinem coqui debet. Andernacus.

BB


DE LL

562
DE LINIMENTIS

CAP. XXVII.

A

Linimenta sūt
ex oleo, adipe, se-
no, butyro, liquefa-
ctis, uel alijs, que
olei spissitudinem
habent, ut styrace
liquida, &c. At
que hæc alterant
aut qualitate



DE LINIMENTIS TEMPERATIS.

Linimentum ad pectus.

℞ Olei amygdal. dulc. ℥. iij.
Butyri recentis ℥. ij.

Axungia

A Axungia gallinae, uel anatis ℥. j.

Misce, & fiat linimentum. Rondeletius.

DE LINIMENTIS CALIDIS.

Linimentum ad thoracis affectum frigidum.

℞. Olei amygdal. amararum, Olei Liliorum, uel Irini, uel Olei Cheirini ana ℥. ij.

Butyri rancidi, loti ℥. j.

Axungia gallinae, anatis ana ℥. β.

Mucilaginis sem. Lini, Mucilaginis Foenigræci, extractæ cum aqua hordei & pauco uino albo ana ℥. β.

Croci parum.

Misce, & fiat linimentum, quo pectus & latera illinantur. Rondeletius.

DE LINIMENTIS FRIGIDIS.

Linimentum ad thoracis affectum calidum.

℞. Olei Amygdal. dulc. Violarum ana ℥. ij.

Butyri loti, in aqua hordei mundati ℥. j.

Misce, & fiat linimentum, quo inungatur pectus. Rondeletius.

Linimentum refrigerans ad erysipelas & inflammationem.

B ℞. Mucilaginis sem. Pyllij, extractæ cum aqua semperuiui, & pauco aceto ℥. iij.

Succi Plantaginis, uel Solani ℥. j.

Olei Nymphaeæ, uel de papauere, uel Hyoscyami ℥. iij.

Coquantur succi usque ad consumptionem: deinde adde Pomatæ ℥. β.

Misce, & fiat linimentum, quo illinatur pars feruens. Rondeletius.

DE LINIMENTIS HUMIDIS.

Linimentum humectans.

℞. Olei Violarum ℥. iij.

Olei de sem. Cucurbitæ ℥. j.

Lactis mulieris recentis, uel Butyri recentis ana ℥. j. β.

Misce, & fiat linimentum, quo pars humectanda illinatur, tribus horis post pastum, præcedente fotu tepidè. Rondeletius.

Linimentum exiccans.

℞. Olei Irini, Costini ana ℥. ij.

Pinguedinis gallinae antiquæ, salitæ, Butyri saliti rancidi ana ℥. j.

Vini ueteris & generosi parū, uel Aquæ uitæ parum.

Misce, & fiat linimentum. Idem.

Linimentum emolliens duritiem hepatis.

℞. Olei Amygdal. dulc. Olei Absinthij ana ℥. j. β.

Butyri recentis ℥. ij.

BB 2

Pinguedinis

Pinguedinis gallinæ ꝑ. j.
 Masticis ꝑ. ij.
 Misce, & fiat linimentum.

A

DE LINIMENTIS DOLOREM SEDANTIB.

Linimentum ad dolorem pleuriticum.

℞. Olei Irini, Chamæmelini, Adipis capi ana ꝑ. β.
 Butyri recentis non saliti ꝑ. β.
 Ceræ lotæ parum.
 Misce, & fiat linimentum. Andernacus.

Linimentum ad capitis dolorem ex insolatu.

℞. Olei Chamæmelini recenter præparati ꝑ. ij.
 Temporibus & fronti illinantur. Andernacus.

Linimentum ad uetustum capitis dolorem.

℞. Olei Chamæmelini recenter præparati ꝑ. ij.
 Olei Rosarum ꝑ. β. Misce. Vel
 ℞. Olei Rosacei ꝑ. ij.
 Olei Chamæmelini ꝑ. β.
 Misce, & fiat linimentum. Andernacus.

Aliud.

B

℞. Olei Rosacei ꝑ. j.
 Aceti ꝑ. ij.
 Ceræ lotæ ex aqua frigida quantum satis est.
 Misce, & fiat linimentum. Andernacus.

Aliud ad capitis dolorem ex calore iecoris.

Oleo rosaceo, aut melino, aut hydrelæo, aut cerato, frons & tempora illinantur. Idem.

Aliud ad dolorem capitis ex frigore.

Oleum rutaceum, aut laurinum, aut irinum, aut nardinum, aut ea quæ ex pipere & euphorbio constant, fronti imponantur. Andernacus.

Linimentum ad mamillarum dolores, lacte turgentium, & inflammationes.

℞. Vitellorum ouorum n. ij.
 Pompholygis præparatæ ꝑ. ij.
 Olei Rosacei ꝑ. iij.
 Ceræ nouæ parum.
 Misce, & fiat linimentum. Idem.

Aliud mitius, usu crebro probatum.


℞. Olei Lini ꝑ. iij.

Ceræ

A Cere noue ʒj.
 Liquefiant, & linteis intincta mammis obducantur. *Andernacus.*
Linimentum ad dolorem ex inflammatione iecoris, ani, & aurium.
 ꝛ. Olei Violarum ʒ. iiii.
 Cremoris radices Althee, Cremoris psylli, expressi cum lacte mulieris,
 uel iure pulli, uel aque hordei purgati ana ʒj.
 Butyri recentis, uel Axungie porcine, uel Medulle porcine recentis, aut
 Medulle uituline ʒ. β.
 Misce, & fiat linimentum, quo partes affecte calide illinantur. *Rondeletius.*

DE VNGVENTIS
 CAPVT XXVIII.

B



BB 3

	Astringunt: <i>ne</i> — Vnguentum Comitissæ defensionum Magistrale, &c.	A
	Emolliunt — { Vnguentum Dialthæa. Vnguentum resumptiuum. Vnguentum tetrpharmacum. Vnguentum de artanita minus. Vnguentum ex bryonia.	
	Abstergūt — { Vnguentum apostolicum. Vnguentum album, De minio. Vnguentum basilicum. Vnguentum Aegyptiacum. Vnguentum niride. Vnguentum citrinum. Vnguentum rubeum. Pforicum, Vnguentum de lythar. Trypharmacum, pro scabie. Vnguentum de thutia.	
A. Vnguenta alio. <i>aita</i> qua litate <i>secun-</i> <i>da, vel</i>	Carnem generant — { Vnguentum cerascos. Vnguentum diapompholyg. Vnguentum aureum. Vnguentum apostolicum. Vnguentum mirificum, &c.	B
	Glutinant, & cicatricem ducunt — { Vnguentum potabile. Vnguentum aureum. Vnguentum citrinum. Vnguentum deficcac. rubrum, &c.	
	Carnem auferūt — { Vnguentum Aegyptiacum. Vnguentum apostolicum. Pforicum. Vnguentum ex canthar.	
	Extrahunt: — Vnguentum fuscum, &c.	
	Dolorem sedant — { Vnguentum ad oculos. Vnguentum pectorale.	
	Somnum conciliant — { Vnguentum populeon. Vnguentum somniferum.	
	Ambusta extinguūt — { Vnguentum ad ambusta. Vnguentum ex calce.	C.Vn-

A.

- Pectus: { Vnguentum ad pectoris angustiam, & maturationem.
- ut { Vnguentum ad sanguinis eruptionem.
- { Vnguentum ad phthysim, &c.
- Stomachum: ut { Vnguentum ad uentriculū exalfaciendū.
- { Vnguentum ad iuuandam concoctionē.
- { Vnguentū ad lienteriam calefaciens.
- { Vnguent. ad stomachi resolutionē, &c.
- Hepar: { Vnguentum ad calefaciendum hepar.
- ut { Vnguentum iecoris facultatem sanguificam roborans.
- { Vnguent. ad scirrhus iecoris.
- Calefaciunt { Splenem: ut { Vnguentum ad scirrhu splenis.
- { Vnguent. ad tumorem lienis, &c.
- { Renes: { Vnguentum ad mouendas urinas.
- { ut { Vnguentum ad urinae retentionem aliud, &c.

B.

- Alterant qualitate { Prima. Sic { Vnguentum ad menstrua prouocanda.
- { Vnguentum ad facilitandum partum.
- { Vce- { Vnguentum ad ciecctionem secundae.
- { riū: ut { Vnguentum ad retentionem foetus.
- { Vnguentum ad superpurgationem menstruorum, &c.
- { Frigefaciunt { Stomachum: ut { Vnguentum ad uentriculum refrigerandum.
- { Hepar: ut { Vnguent. ad refrigerandū hepar, &c.
- { Secunda. Vide in seq. signum C.
- { Purgant: ut { Vnguentum uentrem laxans.
- { Vnguentum ad uermes.
- { Vnguentum uentrem subducens, &c.

B. Vnguēta minus usualia, seu non officinalia, uel

C. Vnguen-

DE VNGVENTIS.

- A**
- Astringūt: *ut* { Vnguentum ad inflammationem oculorum.
Vnguentum ad sanguinis impetum sistendum è naribus,
pul. thorace, renibus, &c.
Vnguentum sanguinem cohibens aliud.
- Emolliunt: *ut* Vnguentum ad humorem concretum & scirrhosum.
- Digerunt: *ut* { Vnguentum ad inflammationem oculorum digerendam.
Vnguentum ad parotidas.
Vnguentum ad anginam, &c.
- Abstergūt: *ut* { Vnguentum ad deterfionem suffusionis.
Vnguentum ad scabritiem, scabiem, &c.
Vnguentum ad pforam.
Vnguentum ad herpes.
Vnguentum ad scabiem.
Vnguentum ad prurimum, &c.
- B**
- C. Vnguenta alterantia qualitate secunda aut
- Carnem generant: *ut* { Vnguentum ad ulcera narium.
Vnguentum sarcoticum, &c.
- Consolidant: *ut* { Vnguentum ad pthifim.
Vnguentum glutinans, &c.
- Cicatricem inducunt: *ut* Vnguentum epuloticum.
- Erodunt: *ut* Vnguentum ad polypos exedendos.
- Dolorem sedant: *ut* { Vnguentum ad dolorem capitis ex calore.
Vnguentum ad dolorem capitis ex calore in declinatione.
Vnguentum ad dolorem capitis ex frigore.
Vnguentum ad dolorem colicum.
Vnguentum ad dolores capitis & articulos.
- D E**

A DE VNGVENTIS EXCALFACIENTIBVS.

Vnguentum Arogon.

℞. Rorismarini, Maioranæ, Radicis Ari, Serpilli, Rutæ, Radic. Cucumer.
afinini ana ʒ. iij. β.

Fol. Lauri, Saluiæ, Sabinæ ana ʒ. iij.

Pulicarię maioris, minor. ana ʒ. iij.

Rad. Bryoniæ ʒ. iij.

Laureolæ ʒ. ix.

Fol. Cucum. afinini, Nepetæ ana ʒ. vj.

Masticis, Olibani ana ʒ. vij.

Pyrethri, Euphorbij, Zingiberis, Piperis ana ʒ. j.

Adipis ursini, Olei Laurini ana ʒ. iij.

Olei Moschelini ʒ. β.

Petrolei clari ʒ. j.

Butyri ʒ. iij. aut quantum sufficit.

Herbæ & radices Maio mense collectæ in oleo macerentur diebus septem,
deinde coquantur, & colentur. Colato oleo adijce reliqua, atque adde

Ceræ lb. j. ʒ. iij.

Durat annum. * Prodest malis corporis frigidis, conuulsionibus, resolutio-
B nibus partium: item dolori colico, renum, articulorumq̄i. Nicolaus.

Vnguentum Martiatum.

℞. Ceræ lb. ij.

Olei lb. viij. uel quantum satis est.

Rorismarini, Folior. Lauri ana ʒ. viij.

Rutæ ʒ. vij. Fol. Tamarisci ʒ. vj.

Maioranæ, Sabinæ, Balsamitæ, Saluiæ, Ocimi, Polij, Calaminthæ, Arthe-
misiæ, Enulæ, Betonicæ, Brancæ ursinæ, Spargulæ, Herbæ uenti, Pim-
pinellæ, Agrimonie, Absinthij, Herbæ paralysis, Herbæ sanctæ Mariæ,
Cimarum Sambuci, Herbæ Crassulæ, Millefolij, Semperuię, Chamæ-
dryos, Centauræ, Centumneruiæ, Fragulæ, Tetrabit, Quinquefo-
lij ana ʒ. iij. β.

Rad. Althææ, Cymini, Myrthæ ana ʒ. iij.

Fœnigræci ʒ. j. Butyri ʒ. j. ʒ. ij.

Vrticę, Violarum, Papaueris nigri, Menthe Saracenicæ, crispæ, Lapathio-
li, Polytrichi, Carduncelli, Matris sylvæ, Maturellæ, Herbę Moschatæ,
Alleluię, Lingue ceruinæ, Crispulæ, Camphoratæ, Styracis calamitæ,
Medullę ceruinæ ana ʒ. β.

Adipis ursini, gallinacei, Mastiches, Thuris ana ʒ. j.

Olei Nardini ʒ. ij.

cc

Herbæ

Herbę omnes in Maio mense colligantur, & incisę macerentur in uino odorifero per dies septem: octauo deinde die coquantur, donec ferę consumatur uinum: postea cola: & colaturę expressę adde oleū, & coque donec consumatur uinum: mox adde ceram, & reliqua secundum artem. Seruatur annos tres. * Aduersus frigida corporis mala, resolutionem coxendicum, nephritim, conuulsionem, & id genus alia ualet: tumores reprimat, durities emollit, liuoremq; cutis emendat. Nicolaus.

Vnguentum Martiatum magnum.

℞. Cereę albę ℥. ix.

Olei sextarios vj.

Rorismarini, Fol. Lauri ana ℥. ij. β.

Amaraci, Esbrij, Sabine, Balsamitę, Ocimi, Saluię, Polij, Calaminthes, Artemisię, Enulę, Betonicę, Brancę ursinę, Herbę uenti, Pimpinellę, Agrimonię, Absinthij, Herbę paralysis, Herbę sanctę Marię, Cimarum Sambuci, Herbę Crassulę, Semperuię, Millefolij, Chamędryos, Cętaureę, Centūneruię, Fragulę, Quinq; fol. Herbę Tetrahit ana ℥. j. β.

Rad. Altheę, Cymini, Myrthę ana ℥. j.

Fęnigręci ℥. β.

Butyri ℥. v.

Vrticę, Violarum, Papaueris rubei, Menthę Saracenicę, Menthę crispę, Lapathioli, Polytrichi, Carduncelli, Matris sylvę, Marathri, Herbę Moschataę, Alleluiaę, Lingüę ceruinę, Crispulę, Camphorataę, Styracis, Medullę ceruinę, Adipis ursini, gallinacę ana ℥. iij.

Thuris ℥. ij.

Olei Nardini ℥. j.

Fiat unguentum secundum artem. * Ad frigiditatem & dolorem capitis, pectoris & stomachi, ad sciron hepatis & splenis, ad ilij dolorę, ad paralyticos, arthriticos, nephriticos, podagricos, ischiaticos, & ad oēs dolores, ad tumores, duricię, spasnum, & febriętes, ad ignem uel solem inunctum. Nicolaus.

Vnguentum Martiatum paruum.

℞. Fol. Lauri ℥. iij.

Rutę ℥. ij. β.

Maioranę ℥. ij.

Rorismarini ℥. j. β.

Myrti ℥. j.

Balsamitę, Seminis Ocimi ana ℥. vj.

Butyri ℥. v.

Styracis, Medullę ceruinę, Adipis ursini, Adipis gallinacę ana ℥. iij.

Malticis ℥. iij.

Thuris.

A Thuris ℥. ij. β.

Olei Nardini ℥. j.

Olei communis lb. vj.

Cerę lb. iiij.

Confice ut artis est. * Ad podagram frigidam siue calidam, paralyticos, arthriticos, nephriticos, ischiaticos, & ad omnia uitia, & dolores neruorum ualet. Nicolaus.

Vnguentum Martiatum aliud.

℞. Masticis, Cerę, Styracis ana ℥. iiij.

Oesyphi ℥. vj.

Terebinthinę ℥. j.

Confice ut artis est. * Ad articulorum morbos, & corporis languores ac resolutiones. Paulus.

Vnguentum Philagrios.

℞. Cerę ℥. iiij.

Oesyphi, Succu Rutę agrestis ana ℥. ij.

Euphorbij, Piperis, Ammoniaci, Croci, Thuris, Castorei, Terebinthinę,

Opopanacis ana ℥. ij.

Styracis, Myrrhę ana ℥. ij. β.

B Fiat unguentum secundum artem. * Spasimum & paralyfim iuuat. Mesides.

Vnguentum stomachicum, magistrale.

℞. Olei Absinthij, Mastichini, Nardini ana ℥. j.

Rosarum rubrarum, Coralli rubri, Caryophyllorum, Cinnamomi, Ligni

aloës, Masticis, Menthę, Schœnanthi ana ℥. j.

Cerę quantum sufficit.

Fiat unguentum secundum artem. * Ventriculum & hepar roborat, horum doloré à frigido lenit, appetentiã excitat, coctioné iuuat. Medici Florentini.

Vnguentum Dialthęa, simplex.

℞. Rad. Althęę lb. ij.

Sem. Lini, Fœnigręci ana lb. j.

Olei lb. iiij.

Cerę lb. j.

Terebinthinę ℥. ij.

Resinę ℥. vj.

Radices sectę, & cum seminibus contusę macerentur tribus diebus in aquę lb. viij. deinde feruescant, & mucilaginis inde expressę lb. ij. sume, & coque cum alijs rebus, donec aquosum illud in mucilagine consumptum fuerit: & fac unguentum. Durat annos tres. * Emolliendi uim habet, calefacit & humectat. Nicolaus.

572. DE VNGVENTIS VSVALIBVS.

Vnguentum dialthea compositum.

A

℞. Rad. Altheæ lb. ʒ.
 Sem. Lini, Fœnigræci ana lb. j.
 Pulpe scillæ ʒ. vj.
 Olei lb. iiij.
 Cera lb. j.
 Terebinthinę ʒ. ij.
 Resinæ, Picis græcæ ana ʒ. vj.
 Fiat unguentū, ut superi^o: deinde addes gūmi subsequētia dissoluta in aceto:
 Galbani, Gummi hederę ana ʒ. ij.
 Miscantur probè, & reponantur. * Valet propriè ad dolorem pectoris ex
 frigiditate & pleurisi, & super pectus inunctū sanat omnia loca infrigidata:
 calefacit, mollificat, & humectat. Nicolaus.

Vnguentum ex bdellio.

℞. Bdellij ʒ. vj.
 Euphorbij Sagapeni ana ʒ. iiij.
 Castorij ʒ. iiij.
 Cera ʒ. xv.
 Olei lasmini, uel Keirini ʒ. x.
 Bdellium & sagapenum dissoluantur aqua rutæ agrestis: cætera cum aqua
 calida upiantur, & fiat unguentum. * Epilepsiam, paralytim, spasmus, cæ-
 teros neruorum affectus frigidos ac scirrhosos iuuat. Mesues. B

Vnguentum Bernardinum.

℞. Granorum paradisi, Caryophyllorum, Zingiberis albi ana ʒ. ij.
 Sulphuris uiui ʒ. vj.
 Axungię porcine lb. j.
 Moschi ʒ. β.
 Olei Spicæ ʒ. ij.
 Terantur omnia subtiliter arida, ac commisce diligenter, fiatq; unguentum.

DE VNGVENTIS REFRIGERANTIBVS.

Vnguentum rosatum.

℞. Axungię porcine lb. j.
 Lauatur nouies aqua calente, & toties frigida: deinde addito
 Rosarum rubr. recentium lb. j.
 Probè terantur, & marcescant cum ea dies septem: coque igne lento, cola:
 rursus tantundem rosarum recentium cum ea tere, ut supra: idem fac tertio:
 quarto autem præter rosas affunde,
 Succi Rosar. rubr. ʒ. vj.
 Olei Amygdalar. dulc. ʒ. v.

Coque.

A Coque igne lento ad succi consumptionem: cola, & repone. Alij addunt O-
prij ʒ. j. * Phlegmonas, erysipelata, herpetas sedat, cephalalgiam calidam, &
uentriculi ac hepatis intemperiem calidam mitigat. Mesues.

Vnguentum uiolatum.

Fit ut Rosatum, sed ex uiolis nigris. * Idem quod rosatum pollet: præter-
ea pleuritidi & thoracis inflammationi prodest.

Vnguentum refrigerans, Galeni.

℞. Cerae albæ ʒ. j.

Olei Rosati Omphacini ʒ. iiij.

Aquæ fontis frigidissimæ quantum sufficit ad multum diuq; lauandum &
subigendū ceratum: quod tandem ex aceto albo, pauco, claro, similiter subi-
gendum est, addaturq; etiam aliquid aquæ rosacæ ad odoris gratiam acqui-
rendam. Si qui fortè diutius asseruare debent, meminerint, ut subinde rela-
uent posca bene acida, ne rancefcat. Mesues.

Vnguentum populeon.

℞. Oculorum populi arboris recētium, mense Martio collectorum ʒ. j. β.

Axungie porcinae præparatæ ʒ. iiij.

Oculi populi contundantur, & macerentur cum axungia, donec sequentes
herbæ colligi queant. deinde,

B Fol. Papaueris agrestis, Fol. Mandragoræ, Fol. Hyoscyami, Solani, Vermi-
cularis aut Crassulæ, Lactucæ, Semperuiui, Bardanæ, Portulacæ, Vio-
lariæ, Umbilici Veneris ana ʒ. iiij.

Summitatum pruni tenerarum ʒ. iiij.

Herbæ contundantur, & misceantur axungia & oculis populi: adde

Vini optimi quantum satis est.

Coquantur ad vini consumptionem: deinde cola, exprime, & fiat unguentū.

* Contra nimiū calorē ualet, & tēporibus illitū somnum cōciliat. Nicolaus.

Vnguentum caphuratum album.

℞. Olei Rosati ʒ. j.

Cerae albæ ʒ. iiij.

Cerussæ ʒ. xij.

Albi ouorum n. vj.

Caphuræ dissolutæ cum aqua ros. ex arte ʒ. ij.

Fiat unguentum secundum artem.

Vnguentum caphuratum rubrum.

℞. Olei Rosati ʒ. j. β.

Lithargyrij ʒ. ij.

Minij ʒ. iiij.

Cerussæ ʒ. j. β.

Thutię, Caphurę ana ʒ. iij.

Cerę ʒ. ij. in æstate: sed in hyeme, ʒ. j.

Fiat unguentum in pila plumbea cum pistillo plumbeo.

A

DE VNGVENTIS ASTRINGENTIBVS.

Vnguentum Comitissę.

ʒ. Cortic. med. Glandium, Castanearum, Quercus arboris, Baccarum Myrti, Caude equinę, Gallarum, Cort. Fabarum, Acinorum Vuarum, Calycum Gladium, Sorborum immaturorum siccorum, Mespilorum acerborum siccorum, Folior. Capparis, Folior. Prunioli fyluestr. Rad. Chelidonij ana M. j.

Contundantur aliquantulum, & coquantur in decocti plantaginis quatum sufficit, ad dimidij consumptione: cola, & in dicta colatura laua subsequetia:

Olei Myrtini, Mastichini ana lb. j. ʒ.

Cerę nouę ʒ. viij. ʒ.

Liqua & laua, ut dictum est: postea insperge sequentium rerum tenuissimum puluerem:

Cort. med. Glandium, Castanearum, Quercus arboris ana ʒ. j.

Gallarum, Hypocistidis ana ʒ. j.

Cineris ossium cruris bubuli ʒ. ʒ.

Baccarum Myrti, Acini Vuarum ana ʒ. ʒ.

Trochiscorum de Charabe ʒ. ij.

B

Misce, fiat unguentum bonę consistentię. * Inceptum abortum prohibet, hęmorrhoidas sistit, ac laxatos renes conciliat. Varignana.

Defensiuum, magistrale.

ʒ. Boli Armeni, Sanguinis draconis, Terre sigillatę ana ʒ. j.

Olei Rosati ʒ. vj.

Cerę ʒ. j. ʒ.

Aceti ʒ. iij.

Coquantur simul oleum, cera, & acetum, donec acetum consumptum fuerit: deinde sublatur ab igne ubi refrigerari cęperit, adde reliqua in tenuissimum puluerem trita. Florentini.

DE VNGVENTIS EMOLLIENTIBVS.

Vnguentum resumptiuum, uulgare.

ʒ. Axungię porci recentis sine sale ʒ. iij.

Axungię Gallinacę, Anseris, Anatis ana ʒ. ij.

Oesypi humidę ʒ. ʒ.

Olei Violati, Chamęmeli, Anethini ana ʒ. j.

Butyri recentis lb. j.

Cera

- A Cerę albę \mathfrak{z} .vj.
Mucilaginis Tragacanthę, Mucilag. femin. Cotoneorum, Lini, Bismalę,
Gummi Arab. ana \mathfrak{z} . β .
Misce, & fiat unguentum.

Unguentum tetrapharmacum.

\mathfrak{z} . Picis nigre, Resinę, Cerę, Adipis uaccini ana quantum sufficit.
Fiat unguentum. * Calfacit, humectat, dolorem sedat, & pus mouet. Mace-
donicum ex iisdem constat: sed insuper additur thuris una pars. Galenus.

Unguentum de artanite minus.

\mathfrak{z} . Succu Artanite, siue succu Cyclaminis, Succu glutinosi ex rad. filicis ex-
tracti, Succu Ebuli ana \mathfrak{z} .ix.
Succu summitatum Tamaricis \mathfrak{z} .ij.
Oesypi humidę \mathfrak{z} .v.
Olei Irini \mathfrak{z} .ij.
Bdellij, Ammoniacy ana \mathfrak{z} .j. β .
Aceti, quantum satis est ad ammoniacum dissoluendum.
Cerę Citrinę \mathfrak{z} .vj.
Cort. rad. Capparis \mathfrak{z} .j. β .
Spicę \mathfrak{z} .iij.

- B Confice secundum artem unguentum. * Splenis humores etiam scirrhosos
dissoluit, & strumas. Mesues.

Unguentum ex bryonia.

\mathfrak{z} . Olei communis \mathfrak{z} .iij.
Medullę crurum bouis \mathfrak{z} .j.
Butyri recentis \mathfrak{z} . β .
Succu Bryonię, Succu Cyclaminis ana \mathfrak{z} .j.
At quia hęc cyclamen recens in copia non habemus, oportebit radices sic-
cas cyclaminis accipere, & diligenter coquere in sufficienti aqua, in qua ta-
men antea dies aliquot sint maceratę: sicq; succum fortiter exprimere, atq;
iterum si libet coquere ad mellis spissitudinem (presertim quando diutius
asseruare studium est) eo ferę modo, quo paratur succus glycyrrhizę. Bul-
liant simul ad lentum ignem, usque ferę ad consumptionem succi, & cole-
tur. Colaturę adde
Pulueris Asplenij, Cortic. Capparorum, Cortic. Tamarisci, Semin. Agni-
casti ana \mathfrak{z} .iij.
Misce, & fiat unguentum. Ferrarienses.

DE VNGVENTIS ABSTERGENTIBVS.

Unguentum Apostolicum.

\mathfrak{z} . Cerę albę, Terebinthinę, Resinę, Ammoniacy ana \mathfrak{z} .xiiij.

Aristo-

Aristolochiæ longæ, Thuris, Bdellij ana ʒ. vj.

Myrrhæ, Galbani ana ʒ. iij.

Lithargyri ʒ. viij.

Opopanacis, Aeruginis ana ʒ. ij.

Olei communis ℥. ij. hyeme uerò ℥. iij.

Gummi in aceto albo soluta coque cum oleo, cera, resina, terebinthina & lithargyro ad aceti consumptionem: deinde reliqua adde tenuissimè trita. * Efficax est contra uulnera & ulcera difficilia, & fistulas, consumit carnem mortuam, & consumptam restaurat, durâ mollit, & plagas sanat. Auicenna,

Vnguentum album, unguentum De cerusa dictum.

℞. Lithargyri ʒ. j.

Cerussæ ʒ. v.

Ceræ albæ ʒ. viij.

Olei Rosati ʒ. ij.

Albuminis ouorum n. j.

Cera liquata in oleo rosato, lento igni, inijce cerussam & lithargyrum probè contrita: misce, & postremò adde albumen oui. Alij addunt caphuræ momentum, & caphuratum uocant. * Pollet aduersus ulcera, scabiem, & adustionem. Auicenna.

Vnguentum album, aliter.

℞. Cerussæ, Lithargyri ana ʒ. vj.

Plumbi usti, Scoriæ argenti ana ʒ. β.

Masticis, Thuris ana ʒ. ij. β.

Olei Rosati, Aceti albi ana quantum sufficit.

Tritis omnibus in mortario, affunde paulatim nunc oleum, nunc acetum, semper mouendo, donec pinguescant, uelut nutrita. Mesues.

Idem, aliter.

℞. Olei communis ℥. ij.

Cerussæ subtilis ℥. j.

Ceræ albæ ʒ. vj.

Et quidam addunt caphuræ ʒ. ij.

Fiat unguentum secundum artem. Rhafis.

Idem, aliter.

℞. Cerussæ in aqua rosarum lotæ ʒ. xvij.

Lithargyriij albi loti ʒ. j. β.

Olei Rosati ℥. ij. ʒ. iij.

Ceræ albissimæ ʒ. vj. aut circiter.

Confice secundum artem.

Vnguentum

A

Unguentum de minio.

℞. Minij læuissimè triti ʒ.ij.

Olei Rosati, Myrtini ana ʒ.ij.

Coquantur lento igne cum Cera albæ ʒ.β. Florentini.

Aliud de minio Caphuratum.

℞. Minij triti ʒ.iiij.

Lithargyri ʒ.ij.

Cerussæ ʒ.j.β.

Thutiæ, Caphuræ ana ʒ.iiij.

Olei Rosati lb.j.β.

Cera albæ ʒ.ij.

Liquatam ceram cum oleo lento igne, misce in mortario plumbeo cum reliquis rebus tenuissimè tritis. * Valent ad ulcera mala & antiqua. Idem.

Unguentum Basilicon minus.

℞. Cera flauæ, Resinæ pinguis, Picis græcæ ana lb.j.

Olei communis quantum sufficit.

Fiat unguentum lento igne. Alij terebinthinam addunt: alij uerò terebinthinam, picis loco ponunt. * Idem pollet quod Basilicon maius, sed imbecillius: recentibus tamen capitis & neruofarum partium uulneribus & ulceribus aptius erit. Mesues.

Unguentum Basilicum maius: Galeni enneapharmacum est.

℞. Cera albæ, Resinæ pini, Sepi uaccini, Picis græcæ, Picis nigræ, Terebinthinæ, Thuris, Myrrhæ ana ʒ.j.

Olei communis quantum sufficit.

Fiat unguentum. Mesues.

Aliter.

℞. Cera ʒ.vj.

Picis græcæ ʒ.iiij.

Reliquorum ana ʒ.j.β.

Olei quantum sufficit.

* Ulcera phlegmõe carètia, præsertim partiū neruofarū, terget, carne implet.

Unguentum Aegyptiacum.

℞. Æruginis ʒ.v.

Mellis ʒ.xiiij.

Aceti albi ʒ.vj.

Coque igne, & tātisper moue, donec fiat rubrum. Alij sumunt eius medicamenti ʒ.vj.

Calcanthi usti ʒ.ij.

Olei Rosati ʒ.iiij.

DD Cera

Ceræ quantum sufficit.
Fiat unguentum. * Confert ad uulnera antiqua, fistulasq; terget: carnis ex-
crescentiæ medetur, uehementerq; exiccat. Mesues.

Aliud.

℞. Aquæ Plantaginis, Vini Malorum granatorum, Mellis ana ʒ. ij.
Aluminis rupis, Aeruginis ana ʒ. x.
Coque, & moue, donec fiat rubrum. Ioannes de Vigo.

Aliud.

℞. Mellis lb. j.
Aceti optimi ʒ. vj.
Aeruginis ʒ. j.
Aluminis rupis ʒ. v.
Coque, & moue, donec rubrum fiat. Guido.

Vnguentum uiride, Andromachi.

℞. Resinæ pini lb. j.
Ceræ lb. j. β.
Olei communis ʒ. viij.
Aeruginis æris ʒ. iij.
Resinam & ceram in oleo liquabis: deinde æruginem tenuissimè tritam ad-
dito. * Recentia uulnera, & quæcunq; non magna sunt, sanat. Galenus.

Vnguentum mundificatiuum, magistrale.

℞. Mellis Rosati colati ʒ. j. β.
Terebinthinæ claræ ʒ. iij.
Succi Api, Succi Prasilij ana ʒ. β.
Succi Absinthij ʒ. j.
Simul coquantur: deinde addantur.
Farinæ Hordei, Fabarum ana ʒ. vj.
Farinæ Lupinorum, Orobi ana ʒ. iij.
Sarcocollæ, Myrrhæ ana ʒ. j. β.
Reduc in puluerem, & fac unguentum.

Vnguentum citrinum.

℞. Boracis ʒ. ij.
Caphuræ ʒ. j.
Coralli albi ʒ. β.
Gypsi ʒ. j.
Vmbilici marini, Tragacanthæ albissimæ, Amyli, Crystalli, Enthelij, Dea-
talij, Thuris albissimi, Nitri ana ʒ. iij.
Marmoris albi ʒ. ij.
Cersæ serpentariæ ʒ. j.

Cerussa

A Cerussæ ʒ. vj.

Axungia porcina recentis non salita, sed præparata & munda lb. j. β.

Sepi caprini præparati ʒ. j. β.

Adipis gallinacei præparati ʒ. j.

Axungiam porcina[m] atq[ue] adipem gallinaceum liqua simul, & impone tepi-
dis adhuc corticum citrei mali satis magnam quantitatem, & macerentur
per mensem unum. Postea eximito cortices, & eliquati porcini adipis, reci-
pe, ut dictum est, lb. j. β. Adipis gallinacei ʒ. j. & adde sepum caprinum: dein-
de addantur reliqua tenuissimè trita: ultimò uerò insperge Caphuram subti-
lissimè tritam. Notandum est in hoc unguento, non concordare exempla-
ria in ponderum characteribus. Nam quidam pro ʒ. ponunt ʒ. & e contra.

* Faciei maculas emendat, scabiem in quacunq[ue] corporis parte extiterit, ci-
catrices extenuat, ruborem oculorum aufert, & ea quæ aspera sunt leuigat.
Nicolaus.

Unguentum rubeum, caphuratum.

℞. Olei Rosati lb. β.

Lithargyri ʒ. ij.

Minij ʒ. iij.

Cerussæ ʒ. j. β.

B Thutia, Caphuræ ana ʒ. iij.

Ceræ ʒ. ij. in æstate: sed in hyeme ʒ. j.

Fiat unguentum in pila plumbea cum pistillo plumbeo.

Unguentum psoricum Alexandri.

℞. Cerussæ, Lithargyri psorici, Aloes, Croci, Cadmiæ argenteæ, Argenti
uiui extincti ana part. æquales.

Olei Oleandri, Aceti ana quantum sufficit.

Fiat unguentum. * Psoram sanat, impetiginem à pituita salsa, cutis asperita-
tem, & alia cutis uitia terget. Mesues.

Unguentum psoricum aliud.

℞. Lithargyri albi, Calcanthi ana part. j.

Æruginis partem dimidiam.

Aceti acerrimi quantum sufficit.

Terantur die uno in sole æstiuo, paulatim affundendo acetum. Deinde in
uase uitreo probè obstructo, condantur sub fimo diebus quadraginta. * Ad
fistulas, caneros, scabiem siccam, leprâ, carnis putridæ incrementû. Mesues.

Unguentum psoricum, siue enulatum.

℞. Rad Enulæ campanæ coctæ cum aceto, & pistatæ lb. j.

Axungia porci, Olei communis ana ʒ. iij.

Ceræ nouæ ʒ. j.

DD 2 Argenti

Argenti uiui extincti, Terebinthine lotę ana ʒ.ij.
Salis communis puluerizati ʒ.ʒ.
Incorporentur ut decet.

A

Vnguentum de Lithargyro.

ʒ. Lithargyri ʒ. ij.

Ceruffę ʒ.ʒ.

Aceti ʒ. j.

Olei Rosati quantum sufficit.

Fiat unguētum lento igne : potest etiam fieri crudum in mortario plumbeo.
* Ulcera & excoriationes à calore solis, frictiore calceo, itinere, equitatio-
ne, frictione, & coitu sanant.

Tripharmacum crudum.

ʒ. Lithargyri, Aceti fortis ana ʒ. iij.

Olei communis ʒ. vj.

Lithargyrus tenuissimè tritus mouetur continuò paulatim affusis oleo ui-
cissim & aceto. * Prodest scabiei, & cutis ulceribus, ut superius. Mesues.

Vnguentum pro scabie.

ʒ. Styracis liquide, Terebinthinę lotę, Butyri loti ana ʒ. ij.

Succi Limonum ʒ. j.ʒ.

Hellebori nigri pul. ʒ. j.

Salis ʒ. ij.

Misce, fiat unguentum in mortario plumbeo.

B

Vnguentum ad scabiem, aliud.

ʒ. Axungię porci ʒ. v.

Olei Laurini, Argenti uiui extincti, Cerę mundę, Masticis, Thuris albi
ana ʒ. ij.

Salis ʒ. viij.

Succi Plantaginis, Fumiterre quantum sufficit.

Ceram, oleum laurinum, & axungiam pone ad ignem cum succis, & bulli-
ant, donec simul liquefiant : deinde adde salem, olibanum & masticen, &
bulliant omnia simul usque ad consumptionem succi : postea deponantur
ab igne, & addatur argentum uiuum extinctum, ut supra, & utere. Potens
est. Sed caue, ne ob argentum uiuum attingat propè membra principalia,
addeque mastichen. Syl. hoc unguentum sine argento uiuo paratum com-
mendat.

Aliud pro pueris.

ʒ. Terebinthine bene lotę ʒ. iij.

Butyri loti ʒ. ij.

Salis

- A Salis ʒ. j.
 Succum Limonum, Vitellos ouorum ana n. iij.
 Olei Rosati ʒ. j.
 Misce, & fiat unguentum.
Vnguentum de thutia seu diapompholygos, magistrale.
 ℞. Olei Rosati, Omphacini ana ʒ. vj.
 Olei Myrtini, Vnguenti populei ana ʒ. ij.
 Fol. Plantaginis, Solani ana M. ij.
 Herbas minutim incisas cū oleis miscebis, & diebus octo marcescere fines:
 deinde coctas aliquantulum colabis, & colaturæ addes Ceræ albæ ʒ. iiij. β.
 Coquantur igne lento, donec cera liquata sit, semper agitādo: aufer ab igne,
 & adde
 Lithargyri ʒ. vj.
 Pompholygis siue Thutiæ præparatæ, Cerussæ tritæ ana ʒ. ij.
 Plumbi usti ʒ. vj.
 Caphuræ ʒ. j.
 Omnia in pilam plumbeam iniecta horis duabus continuis agitentur, deinde
 in uase uitrato reponantur.
Vnguentum Diapompholygos, aliud.
 B ℞. Olei Rosati, Ceræ albæ ana ʒ. vj.
 Succum Solani ʒ. j.
 Cerussæ lotæ ʒ. ij.
 Plumbi usti & loti, Thutiæ præparatæ ana ʒ. j.
 Thuris ʒ. β.
 Ceram liqua cum oleo, lento igne, & in pilam plumbeam iniice, additis quæ
 terenda sunt, in tenuissimum puluerem reductis: moue continuo, & paulatim
 succum supradictum instillato, perpetuo mouens sex horis continuis.
 * Vtilia sunt ad exiccanda erysipelata, vulnera sordida purganda, & sananda
 tibiæ ulcerum aliorum locorum concaua uel dissipata replent, refrigerant,
 & cicatrizant. Nicolaus.

DE VNGVENTIS CARNEM GENERANTIB.

Vnguentum ceraseos magnum.

- ℞. Hammoniæ ʒ. j.
 Bdellij, Thuris masculi, Aristolochiæ, Sarcocollæ ana ʒ. v.
 Myrrhæ, Galbani ana ʒ. β.
 Lithargyri ʒ. xv.
 Aloes, Opopanacis ana ʒ. ij. β.
 Æroginis ʒ. iij.
 Resinæ ʒ. xiiij.

DD 3 Ceræ

Ceræ albæ ℥. ij.

Olei quantum sufficit.

Lithargyrum tere, & cum oleo coque, donec liquefiat. Tūc depone ab igne, & dum modicè refrixerit, misce hammoniacum & bdelliū aceto soluta: redde igni, coque ad iustam crassitiem, tuncq; reliqua permisce. * Ulcera maligna, putrida, fistulosa, forde & carne mortua purgat, carne implet, glutinat, & cicatrice tegit. Mesues.

Vnguentum ceraseos paruum.

℞. Aristolochiæ, Ireos, Sanguinis draconis, Hammoniæ, Sarcocollæ ana ℥. ℞.

Lithargyri læuigati ℥. v.

Olei ℥. j.

Coque lithargyrum cum oleo, donec liquefiat: tunc cætera, ut in priore, misce. * Ulcera tam uetera, quàm noua terget, carne implet, glutinat, cicatrice claudit. Mesues.

Vnguentum aureum.

℞. Ceræ citrinæ ℥. vj.

Olei boni ℥. ij.

Terebinthinæ ℥. ij.

Resinæ, Colophoniæ ana ℥. j. ℞.

Thuris, Masticis ana ℥. j.

Croci ℥. j.

Confice secundum artem. Durat annos tres. * Vulnere certò & salubriter glutinat.

Vnguentum mirabile.

℞. Myrrhæ, Aloes, Sarcocollæ ana ℥. j.

Mellis despumati ℥. vj.

Vini albi boni quantum sufficit.

Coque igne lento ad spissitudinem. * Ulcera putrida & fistulas purgat, carne implet glutinat, cicatrice tegit, putredinem arcet. Et si ulceri caro supercreuerit, adde unguenti chalciteos ℥. ℞. Mesues.

Aliud.

℞. Myrrhæ, Aloes ana ℥. ix.

Vini albi quantum sufficit.

His tritis tenuissimè uinum paulatim affunde, semper miscèdo, usq; ad mellis crassitudinem: utere. Addunt nōnulli chalciteos ℥. j. ℞. alij olei myrtini & uini portionem paucam uicissim miscent. Mesues.

Vnguentum è caprifolio, magistrale.

℞. Caprifolij M. iij.

Caprifolium

A Caprifolium minutim incisum, & in uino optimo maceratum die uno, coques ad tertias, cola: & colaturæ adde,

Olei rosati lb. vi.

Resinæ pinguis, Terebinthinæ, Cerae flauæ ana lb. j.

Fiat unguentum, ut artis est.

Unguentum de caprifolio, aliud.

℞ Terebinthinæ, Resinæ pini, Cerae nouæ ana ℥. iij.

Olei Rosati ℥. viij.

Masticis, Thuris ana ℥. j.

Gummi Elemi ℥. ij.

Caprifolij, Betonicæ ana ℥. iij.

Vini optimi lb. x.

Caprifolium & betonicam tenuissimè terito, & macera uino horis uiginti-
quatuor: deinde reliqua adde, præter gummi, thus, & masticen. Coquantur
luculento igni, donec uini pars dimidia consumpta sit, imò donec uirescere
incipiat: cola, & concresecere finito: deinde, effuso uino, rursus coquatur, do-
nec quicquid remanserit uini, absumptum sit: iterum cola, & reliqua adde in
puluerem tenuem redacta, & coque lento igne, donec calefiant semper agi-
tando: aufer postmodum ab igne & frigido loco repone, donec refrigerit per-
petuo mouens. * Ad capitis uulnera præstantissimum est. Carpus.

Unguentum capitale.

℞ Gummi Elemi ℥. iij.

Hammoniæ ℥. ij.

Terebinthinæ, Resinæ pini ana ℥. iij. β.

Cerae quantum sufficit.

Fiat unguentum, gummi dissolutis secundum artem. Percoquitur etiam am-
plius, ut cerati formam sumat. Conciliator.

DE VNGVENTIS GLVTINANTIBVS ET CICA-
tricem inducentibus.

Unguentum potabile.

℞ Butyri recentis sine sale lb. iij.

Rubiæ tinctorum, Castorei, Spermatis Ceti, Tormentillæ ana ℥. j.

Bulliant simul in uino odorifero ad uini consumptionem, ac fiat unguentum
secundum artem. * Datur ad consolidandum casum ex alto.

Unguentum desiccatiuum rubrum.

℞ Lapidis Calaminaris, Terræ sigillatæ ana ℥. iij.

Lithargyri auri, Cerussæ ana ℥. ij.

Caphuræ ℥. j.

Cerae ℥. v.

Olei

Olei Rosati, Violati ana ʒ. vj.
Fiat unguentum secundum artem.

A

DE VNGVENTIS ERODENTIBVS.

Vnguentum ex Cantharidibus.

ʒ. Cantharidum recentium ʒ. x.
Axungia porci ʒ. v. ʒ.
Tere simul, dies septē marcescant: post coque, cola, serua uitreo uase. * Cau-
sticum, phænigmon, & uescias excitat, ulcerat: alphos, panos, lentigines, cu-
tis maculas delet. Mefues.

CARNEM quoq; auferunt, unguentum Ægyptiacum, unguentum Apo-
stolicum, Pforicum, &c. de quibus uide suprā.

DE VNGVENTIS EXTRAHERENTIBVS.

Vnguentum fuscum.

ʒ. Olei lb. j. ʒ.
Cera noua ʒ. iij.
Picis græcæ, nigræ ana ʒ. ij.
Masticis, Galbani, Thuris ana ʒ. j.
Sagapeni ʒ. ij.
Terebinthina ʒ. j.
Fiat unguentum. * Sanandi uim habet, & extrahendi. Nicolaus.

B

Aliud.

ʒ. Olei communis, Sepi hircini ana lb. j.
Picis nigræ lb. ʒ.
Picis græcæ ʒ. iij.
Masticis, Thuris, Galbani, Hammoniæ, Opopanacis, Sagapeni, Ce-
ræ ana ʒ. ʒ.
Oleum, sepum, & picem liquabis: deinde gummi dissoluta secundum artē
adicies: deinde reliqua tenuissimè trita, semper agitando, donec percoquā-
tur. His ab igne sublatis, adde
Terebinthina ʒ. ij.
Probè misceantur, & reponantur.

DE VNGVENTIS COLOREM SEDANTIB.

Vnguentum ad oculos magistrale.

ʒ. Carnis pinguis exiccata, Vini maluatici ana ʒ. iij.
Thutia preparata ʒ. j.
Cera albæ quantum sufficit.
Caro cum maluatico coquatur usque ad uini maluatici consumptionem:
deinde

A deinde cola, & cera liquata, adde postremò Thutiam: probè commisceto, & reponere. Medici Florentini.

Aliud magistrale.

℞. Butyri recentis ʒ. iiii.

Ceræ albæ ʒ. j.

Liqua, & laua sæpius aqua rosacea, & prunorum, & adde

Thutiæ præparatæ ʒ. ʒ.

Caphuræ ʒ. ʒ. Fiat unguentum. Iidem.

Vnguentum pectorale.

℞. Mucilaginis seminis Psyllij, Tragacanthæ, Gummi Arabici, Sem. Lini, Fœnigræci, Adipis gallinæ, Medullæ uituli, Butyri recentis, loti cum aqua uiolarum ana ʒ. j. ʒ.

Olei Violati, Olei Amygdalarum dulcium ana ʒ. j.

Ceræ albæ quantum sufficit.

Fiat unguentum. * Mitigat dolores pectoris, & tussim: digerit, maturat, faciliat sputum, & resoluit pleuresim.

DE VNGVENTIS SOMNIFERIS.

Vnguentum somniferum, magistrale.

B ℞. Olei Papauerini, Nymphææ ana ʒ. ʒ.

Opij, Casiæ, Croci ana ʒ. j.

Misce cum pauca cera. Medici Florentini.

DE VNGVENTIS AD AMBVSTA.

Vnguentum ad ambusta, magistrale.

℞. Olei Rosati ʒ. viij.

Olei ex ouis ʒ. ʒ.

Nitri albi puluerizati ʒ. ʒ.

Ceræ albæ ʒ. j. ʒ.

Corticis med. Sambuci M. j.

Fiat unguentum lento igne secundum artem. Medici Florentini.

Aliud ad idem.

℞. Hederæ foliorum, Baccarum hederæ ana part. æquales.

Contunde, & succum exprime. Ex huius autem succi ʒ. j.

Olei communis ʒ. j.

Ceræ quantum sufficit: fiat unguentum. Iidem.

Vnguentum ex calce.

℞. Calcis extinctæ ʒ. iij.

Olei ʒ. j.

Ceræ ʒ. iij.

Calx singulis diebus eluitur, & subsidere permittitur: aqua diebus decem

EE spongia

spongia exprimitur: deinde calx aqua rosacea lauari debet, & sicari, postea **A**
finetur. Vbi cera ex oleo liquefacta, ab igne q̄; sublata fuerit, & iam concrese
re incipit, eadem tenuissimè trita admiscetur, reponiturq̄;. * Ad ambusta
ualde efficax est.

DE VNGVENTIS PVRGANTIBVS.

Vnguentum Agrippæ regis.

℞. Rad. Bryoniæ lb. ij.
Rad. Cucumeris asinini lb. j.
Scillæ lb. β.
Ireos ℥. iij.
Rad. Filicis, Rad. Ebuli, Tribulorum aquaticorum ana ℥. ij.
Ceræ albissimæ ℥. xv.
Olei albissimi lb. iij.

Radices omnes istæ recentes incisæ & contusæ macerentur in oleo per dies
octo, deinde coquantur, postea exprimantur, & in colato oleo & expresso,
resoluatur cera, & fiat unguentum secundum artem. Seruatur ad annos tres.
* Hydropicis, omnibus corporis cedematis succurrit. Neruorum mala sanat,
urinam mouet, extrinsecus illitum uentrem subducit, doloriq̄; renum uti-
le. Nicolaus.

Vnguentum de Artanita maius.

℞. Succu Cyclaminis lb. iij.
Succu Cucumeris agrellis lb. j.
Olei Irini lb. ij.
Butyri lb. j.
Pulpæ Colocynthidis ℥. iij.
Polypodij ℥. vj.
Euphorbij ℥. β.

Contundenda terantur, & macerentur succis & oleis dies octo in uase uitreo:
post semel feruefac in duplici uase, cola. Colaturæ adde,

Sagapeni ℥. vij. β.
Myrrhæ ℥. iij.

Dissoluantur hæc aceto, & coquantur in prædicta colatura ad succorum cō-
sumptionem: deinde adde,

Ceræ ℥. v.
Fellis uaccini ℥. vij. β.

Feruefcatur simul, donec cera liquefcatur: tunc insperge paulatim subsequentiū
medicamentorum:

Scammonij, Aloes, Colocynthidis, Mezerei, Turbith ana ℥. vij. β.
Salis gemmæ ℥. iij. β.
Euphorbij, Piperis longi, Zingiberis, Chamæmeli ana ℥. iij.

Misce.

A Misce, & fiat unguentum * Illitum stomacho, uomitu purgat: hypogastrio autem inunctum, aluum deicit: ob id hydropicos mirè iuuat, seorsum excrementum largè uacuando: uermes quoq; necat & educit. Adhibetur non potentibus sumere medicamentum purgans. Mesues.

Vnguentum ad uermes, magistrale.

℞. Succi Absinthij, Abrotani, Centaurij minor. Rad. Aristol. rotūdæ, Persicariæ, Fol. Persicæ, Fol. Lupini: præterea Ebuli, Balauftij ana ʒ. j.

Succi Porri ʒ. ij.

Succi Nasturtij aquatici lb. j.

Olei Absinthij lb. j. β.

Ceræ quantum sufficit.

Fiat unguentum secundum artem. Medici Florentini.

Vnguentum contra uermes.

℞. Olei amygdal. amar. ʒ. j.

Succi fol. Persici, Matricariæ ana ʒ. β.

Rosarum, Farinæ Lupinorum, Cornu cerui usti ana ʒ. j.

Aloes succo Citrini ʒ. ij.

Quidam addunt fellis taurini ʒ. ij. Modicum aceti, & ceræ quantum sufficit.

B

DE VNGVENTIS CALFACIENTIBUS pectus.

Vnguentum ad pectoris angustiam & maturationem.

℞. Olei amygdal. dulc. Butyri recentis ana ʒ. iiij.

Axungia gallinæ ʒ. ij.

Iridis, Croci ana ʒ. j.

Ceræ nouæ quantum sufficit.

Fiat unguentum, quo ungtur pectus. Quòd si frigidior sit materia, addimus oleum anechi, amygdal. amararum, liliorum, rad. enulæ campanæ, hyssopi, mucilag. fœnigræci, sem. lini, dialtheam, cespum, & sulphuri si affectus sit in musculis, terebinthinam abietinam, & lariceam in laterum doloribus, quæ ad modum & picem summa cum utilitate. * Concoquant, digerunt, dolorem soluant. Rondeletius.

Vnguentum ad sanguinis eruptionem.

℞. Olei Myrtillorum, uel Rosarum ʒ. ij.

Olei Mastichini, uel Lentiscini ʒ. j.

Sanguinis draconis, Cort. thuris ana ʒ. j.

Boli Armeni, Coralli ana ʒ. ij.

Ceræ albæ quantum sufficit.

Fiat unguentum. * Sanguinem compescit. Rondeletius.

EE . 2

Vnguentum

Vnguentum ad phthisim.

A

℞. Olei Rosati, Lentiscini, uel Mastichini ana ʒ. iij.
 Sarcocollæ nutritæ in uino albo, uel lacte coctæ ʒ. j.
 Thuris, Masticis, Myrrhæ ana ʒ. j.
 Cineris cancrorum ʒ. β.
 Farinæ hordei tostæ ʒ. j.
 Terebinthinæ abietis, Mellis ana ʒ. ij.
 Misce, & fiat unguentum. Rondeletius.

DE VNGVENTIS CALFACIENTI-
bus stomachum.*Vnguentum ad uentriculum calefaciendum, & constringendum.*

℞. Olei Mastichini, Citoniorum ana ʒ. iij.
 Ladani, Hypocistidis, Acaciæ ana ʒ. β.
 Caryophyllorum, Nucis moschatæ ana ʒ. ij.
 Myrobal. Citrinorum ʒ. iij.
 Ceræ quantum sufficit. Fiat unguentum. Rondeletius.

Vnguentum ad iuuandam concoctionem.

℞. Olei Mastichini, Olei Menthæ ana ʒ. ij.
 Spicæ nardi Indicæ, Nucis moschatæ, Caryophyllorum ana ʒ. β.
 Ros. rubrarum ʒ. ij. Cerę parum. Misce, & fiat unguentum, quo un-
 gatur regio uentriculi duabus uel tribus horis ante pastum, addēdo tempore inun-
 ctionis, parum uini albi, uel clareti. * Moderatè calefacit & astringit, calo-
 rem conseruat, & concoctionem iuuat. Rondeletius.

B

Vnguentum ad lienteriam frigidam.

℞. Olei Mastichini, Olei de absinthio ana ʒ. j.
 Cyperi, Caryophyllorū, Nucis moschatæ, Vini maluatici, Limaturę cort.
 thuris ana ʒ. j.
 Ceræ albæ quantum sufficit. Fiat unguentum. Idem.

Vnguentum ad stomachi resolutionem.

℞. Olei de absinthio, Nardini ana ʒ. ij.
 Galangæ, Caryophyllorum, Masticis, Cyperi ana ʒ. ij.
 Santali albi, Coralli usti, Cort. Citri, Cinnamomi crassi ana ʒ. β.
 Aceti parum. Ceræ quantum sufficit. Fiat unguentum. Idem.

DE VNGVENTIS EXCALFACIENTI-
bus hepar.*Vnguentum ad calefaciendum hepar.*

℞. Olei Nardini, Olei de absinthio ana ʒ. iij.
 Spicę nardi Indicæ, Schœnanthi, Afari ana ʒ. j.

Antispodij

- A** Antispodij facti ex myrtho, uel ex corall. rubris, uel ex cornu cerui ʒ. ij.
 Florum Anthos ʒ. ʒ.
 Sem. Apij, Petroselini ana ʒ. j.
 Ceræ citrinæ quantum sufficit.
 Vini maluatici, quātum poterit bibere, uel id addatur tempore inunctionis.
 * Calfacit, roborat, exiccat, & aliorum penetrationem iuuat. Rondeletius.

Aliud.

℞. Olei de absinthio ʒ. iij.
 Santalorū omniū, Coralli rubri usti, & loti in aqua absinthij & cichorij a-
 Sem. Endiuizæ, Scariolæ ana ʒ. ʒ. (na ʒ. j.)
 Sem. Apij, Petroielini, Anisi ana ʒ. j.
 Ceræ quantum sufficit. Fiat unguentum. Tempore uini adde uini mal-
 uatici parum. Idem.

Vnguentum iecoris facultatem sanguificam roborans.

- ℞. Olei hepatis Gelei ʒ. iij.
 Spicæ nardi Indicæ, Schœnanthi, Azari ana ʒ. ʒ.
 Masticis, Bdellij, Myrrhæ, Styracis ana ʒ. iij.
 Si scirrhus addit, dissoluantur in oleo: quibus adde terebinthinæ abietis ʒ. j.
 ceræ citrinæ nunquam calfactæ, ut extrahitur ex aluearijs, quantum sufficit.
B Fiat unguentum. Tempore inunctionis adde uini maluatici parum. Idem.

Aliud ad scirrhos iecoris.

℞. Hepatis lupi terrestris n. j.
 Coquatur in oleo amygdalarum dulcium. cui adde
 Rad. Iridis ʒ. j.
 Colentur, & in colatura dissolue,
 Propoleos ʒ. iij.
 Styracis, Bdellij, Myrrhæ, Ammoniacy ana ʒ. iij.
 Spicæ Celticæ, Schœnanthi ana ʒ. j.
 Fiat unguentum, quo inungatur hepar induratum. Tempore inunctionis
 adde uini albi parum. Rondeletius.

DE VNGVENTIS EXCALFACIENTIBUS splenem.

Vnguentum ad scirrhum splenis.

℞. Ammoniacy, Bdellij, Opopanacy, diss. in aceto ana ʒ. ij.
 Rad. Liliorum, uel Bisinaluæ decoct. in axungia porci, uel oleo amygd.
 dulcium, uel amararum ʒ. ij.
 Styracis, Myrrhæ, Iridis ana ʒ. ii.
 Mucilaginis sem. Fœnigræci extractæ in uino albo ʒ. ij.
 Terebinthinæ, Propoleos ana ʒ. iij.

EE 3 Semis

590 DE VNGVENTIS MINVS VSVALIBVS.

Seminis Viticis, Apij, Petroselini ana ʒ.ij.
 Misce, & fiat unguentum: quod non nisi post fotum adhibeatur. Idem. A

Aliud, quando exactè obduruit lien.

℞ Rad. Mandragorę quart. j. diuisę in partes decoquantur in oleo seminis lini, uel sesamini, uel amygdalarum, addito pauco aceto cõtundantur, & per cribrum passentur. quibus adde,

Opopanax in aceto scillitico dissoluti ʒ.ij.

Styracis, Myrrhę, Bdellij, Sem. Alchechengi ana ʒ.β.

Propoleos, uel cerę nouę, Terebinthinę ana quantum sufficit

Croci ʒ.ij.

Spicę Celticę, Schœnanthi, Azari, uel Viticis ana ʒ. j.

Misce, & fiat unguentum, quo inungatur splen. Rondeletius.

Vnguentum ad tumorem lienis ob flatus.

℞ Olei Nardini, Olei de ablinthio ana ʒ.β.

Sem. Agni casti, Portulacę, Capparorum, uel Fraxini ana ʒ. ij.

Sem. Apij, Petroselini, Cumini in aceto macerati ana ʒ. j.

Coralli rubri usti, Scorizę ferri ana ʒ. j.β.

Cerę quantum sufficit.

Fiat unguentum: cui adde tempore inunctionis, aceti quantum sufficit. un-
 gatur regio splenis. Idem. B

DE VNGVENTIS EXCALFACIENTI-
 bus renes & uesicam.

Vnguentum ad mouendas urinas.

℞ Succirad. Raphani. Cressonum, siue Sisymbrij aquatici ana ʒ.ij.

Succi Apij, Petroselini ana ʒ. j.

Olei Scorpionum ʒ. iij.

Olei Spicę ʒ.β.

Terebinthinę, Cerę ana quantum sufficit.

Azari, Sem. Apij, Petroselini ana ʒ. ij.

Misce, & fiat unguentum, quo inungatur regio renum, uesicę & perinæ.
 Idem.

Vnguentum ad urinzę retentionem, aliud.

℞ Axungizę cuniculi ʒ. j.

Succi Fœniculi recentis ʒ. j.β.

Azari, Spicę Celticę, Scœnanthi ana ʒ. j.

Olei Scorpionum, Nucum ana ʒ. ij.

Cerę Terebinthinę ana quantum sufficit.

Fiat unguentum. Idem.

DE

ANTIDOTARIUM LIB. II.
DE VNGVENTIS EXCALFACIENTIBVS

59x

A

uterum.

Vnguentum ad menstrua prouocanda.

℞. Olei amygdal. amararum, Liliorum ana ʒ. j.

Olei Cheirini, uel Irini ʒ. ij.

Spicæ Celticæ, Schœnanthi, Azari ana ʒ. iij.

Sem. Apij, Petroselini ana ʒ. iij.

Terebinthinæ, Axungia anseris ueteris ana ʒ. ij.

Ceræ nouæ quantum sufficit.

Fiat unguentum, quo inungatur regio pubis, renum & inguinum, addendo uini maluatici parum. Adduntur & succi herbarum calidarum, & tenuium partium, ut apij, succus pedis columbini, arthemisæ, pulegij, & similium, &c. Rondeletius.

Vnguentum ad facilitandum partum.

℞. Olei amygd. dulcium, Butyri recentis ana ʒ. ij.

Axungia porci, Axungia gallinæ ana ʒ. iij.

Aristolochiæ rotundæ, Aristol. longæ ana ʒ. iij.

Cinnamomi tenuioris ʒ. j.

Azari, Styracis, Myrrhæ ana ʒ. j.

Ceræ nouæ quantum sufficit.

B: Fiat unguentum, quo inungatur regio pubis, inguinum & renum, post usum fomenti ex maluis & aristolochia. Idem unguentum conuenit ad secundæ eiectionem, & fortiora adduntur, ut agaricus, colocynthis. Iuuat enim expulsionem cuiuslibet rei, irritando facultatem expultricem. Idem.

DE VNGVENTIS REFRIGERANTIBVS VTERVM.

Vnguentum ad retentionem fetus.

℞. Olei Omphacini, uel Citoniorum, uel Myrthi ʒ. iij.

Rad. Bistortæ ʒ. j.

Boli Armeni, Coralli rub. ana ʒ. β.

Balauftiorum ʒ. iij.

Ceræ rubræ quantum sufficit.

Fiat unguentum, addendo aceti quantum satis est. Vngatur regio uentris & renum frequenter.

Vnguentum ad superpurgationem menstruorum.

℞. Olei Nenupharis ʒ. j.

Olei Citoniorum ʒ. iij.

Boli Armeni, Acaciæ, Sanguinalis ana ʒ. iij.

Balauftiorum, Spongiæ, Bedeguaris, Aluminis ana ʒ. j.

Ceræ, Aceti ana quantum sufficit.

Misce, & fiat unguentum. Efficacius fit cum succo portulacæ. Rondeletius.

Aliud.

Aliud.

A

℞. Ofsium ſepiæ ʒ.β.
 Coralli uſti, Sanguinalis, Thutiæ ana ʒ.ij.
 Aluminis ʒ. i.
 Olei Citoniorum, Myrthini ana ʒ. ij.
 Succī Plantag. uel Burſę paſtoris, uel Polygōni, uel Hernialis ʒ. iij.
 Aceti parum.

Miſce, & fiat unguentum, diu agitando. Qui ceram uelit, addat albam.
 Rondeletius.

DE VNGVENTIS REFRIGERANTI-
bus ſtomachum.*Vnguentum ad uentriculum refrigerandum.*

℞. Olei Roſati, uel Omphacini ana ʒ. iij.
 Coralli rubri, Coriandri, Santali albi, Flor. Labruſcæ, Cort. Citri ana ʒ. j.
 Cerę albę quantum ſufficit.

Fiat unguentum, quo inungatur os uentriculi, addito pauco aceto, tempore inunctionis. Idem.

Aliud ad refrigerandum & humectandum uentriculum.

℞. Olei Violati ʒ. ij.
 Olei Nenupharis, Amygdal. dulc. ana ʒ. j.
 Cerę citrinę quantum ſufficit. Fiat unguentum. Idem.

B

Vnguentum ad lienteriam.

℞. Olei Myrthini, Citoniorum ana ʒ. ij.
 Coralli rubri, Boli Armeni, Aloes, Rad. Biſtorę, Gallarum ana ʒ. ij.
 Acacię, Hypociftidis, Ladani ana ʒ. j.
 Cerę albę quantum ſufficit.

Fiat unguentum. Idem.

Aliud.

℞. Olei Roſ. Omphacini, Citoniorum ana ʒ. ij.
 Gallarum, Cort. Mali granati, Balauſtiorum, Myrtilorum, Spongię Bede
 guaris, Biſtorę ana ʒ. ij.
 Boli Armeni ʒ. β.
 Acacię ʒ. j.
 Cerę quantum ſufficit. Aceti parum

Fiat unguentum. Idem.

DE VNGVENTIS REFRIGERANTIBVS HEPAR

Vnguentum refrigerans hepar.

℞. Vnguenti Roſati ʒ. iij.
 Olei Violati ʒ. ij.

Santali

A Santali albi ʒ. j. Cerussæ ʒ. ij.
Aceti parum. Misce, & fiat unguentum. Idem.

Aliud.

℞. Olei Myrtillorum, uel Cotoneorum, uel Rosati Omphacini ʒ. iij.
Sem. Portulacæ, Endiuicæ, Scariolæ ana ʒ. j.
Coralli rubri, Boli Armeni ana ʒ. ij.
Myrtillorum Balauſtiorum, Spicæ nardi Indicæ, Santali rubri ana ʒ. β.
Antispodij ʒ. ij.
Ceræ albæ quantum sufficit.

Misce, & fiat unguentum secundum artem. Rondeletius.

DE VNGVENTIS ASTRINGENTIBVS.

Vnguentum ad inflammationem oculorum cum defluxione.

℞. Vnguenti Rosati, loti in aqua peculi ros. ʒ. j.
Thutiæ præparatæ, Acaciæ ana ʒ. j.

Incorporentur: fiat unguentum, quo inungantur palpebræ. Idem.

Aliud, minus astringens.

℞. Pulpæ Pomorum decoctorum in lacte, uel cum aqua rosarum ʒ. ij.
Contundantur diligenter: deinde adde aquæ peculi ros. & myrthi ana ʒ. β.

B. Macilaginis sem. Psyllij, Thutiæ præparatæ ana ʒ. β.

Incorporentur simul, & fiat unguentum, quo inungantur palpebræ. Rondelet.

Vnguentum ad sanguinis impetum sistendum è naribus, pulmone, thorace, renibus, &c.

℞. Gallarum, Cort. inter. Castaneæ, uel Cort. Mali granati, uel Balauſtiorum ana ʒ. β.

Boli Armeni ʒ. j.

Sanguinis draconis ʒ. iij.

Cum albumine oui excipiantur: fiat unguentum. Idem.

Aliud.

℞. Olei Myrtillorum, uel Olei Rosati ʒ. iij.

Succi Bursæ pastoris, uel Polygoni ʒ. ij.

Gallarum, Balauſtiorum, Rad. Bistortæ ana ʒ. β.

Ceræ albæ quantum sufficit. Aceti parum.

Fiat unguentum. Hæc unguenta non sunt ponenda supra os uenæ fluentis, sed paulo infra, supra regionem per quam uenæ ad illud permeant, & potissimum in ea parte, in qua magis ad extra se prodit: ueluti si sanguis influit in caput, unguenta in lateribus colli, in quibus uenæ & arteriæ positæ sunt, apponenda erunt, & circa emunctoria, quando in aliquod membrum descendit, ut in principio arthritidis, misso sanguine, & non existente uenosa materia, aut

FF

ria, aut

DE VNGVENTIS MINVS VSVALIBVS.

ria, aut in magna quantitate. Si sanguis è pulmone fluat, utile erit imponi **A**
unguentum supra renes, & totam spinam. Si è uulnere fluat, supra emuncto-
ria illius partis, & in circuito partis læsæ. Sin per sedem, supra renes, Si per
uesicam, circa perinæum, uel arteriam, unde fluit sanguis. Idem.

Vnguentum sanguinem cohibens, aliud.

℞. Olei Myrtillorum, uel rosarum ʒ. ij.
Olei Maltichini, uel Lentiscini ʒ. j.
Sanguinis draconis, Cort. Thuris ana ʒ. j.
Boli Armeni, Corallorum ana ʒ. ij.
Ceræ albæ quantum sufficit.

Fiat unguentum, quo inungatur pars affecta. * Sanguinem compescit, è tho-
race fluentem, & ulcus, quod sæpe fit, curat. Rondeletius.

DE VNGVENTIS EMOLLIENTIBVS.

Vnguentum ad humorem concretum & scirrhosum.

℞. Opopanacis, Styracis, Bdellij ana ʒ. β.
Dissoluatur in oleo amygdal. dulcium, & irino, quantū sufficit. quibus addē
Mucilaginis fœnigræci, & ficuum, extractę cum uino albo ana ʒ. ij.
Rad. Iridis Venet. puluerizatę ʒ. β.
Rad. Gladioli eodem modo exiccata & puluerizatę ʒ. j.
Propoleos uerę ʒ. iij. **B**

Misce, & fiat unguentum. Rondeletius.

Aliud.

℞. Nucis cupressi n. x.
Ficuum paria vj.
Rad. Cannę ʒ. β.

Fiat decoctio in oxymellite: facta expressione addē.

Salis communis, Cineris spongię, Cineris calchitidis ana ʒ. iij.
Misceantur, & fiat unguentum, quo inungantur partes durę. Idem.

DE VNGVENTIS DIGERENTIBVS.

Vnguentum ad inflammationem oculorum digerendam.

℞. Mucilaginis sem. Fœnigr. loti in aqua fœniculi, & in eadē extractę ʒ. β.
Sarcocollę nutritę cum lacte ʒ. iij.
Aloës, Myrrhę, Croci ana ʒ. β.

Misce, & fiat unguentum, applicetur palpebris. * Digerit, & detergit. Idem.

Vnguentum ad parotidas.

℞. Olei Chamæmeli, uel Liliorum, uel Amygdalarum ʒ. iij.
Butyri recentis, uel Axungię porci ʒ. j. β.
Pinguëdinis gallinę ʒ. j.

Farinę:

- A** Farinæ sem. Fœnigræci ʒ.β.
 Flor. Chamomillæ, Meliloti ana ʒ.ʒ.
 Ceræ nouæ quantum sufficit.
 Misce, & fiat unguentū. * Parotidas & strumas factas discutit, & emollit. Idē.

Vnguentum ad anginam.

- ℞. Dialthææ, Oesypi ana quart. j.
 Nidi hirundinum ʒ. iij.
 Rad. Iridis ʒ.β.
 Cum oleo irino uel liliorum, fiat unguentum, quo inungatur ceruix. Idem.

Aliud.

- ℞. Vnguenti resumptiui ʒ. ʒ.
 Butyri recentis, Axungie porci ana ʒ. j.
 Stercoris Hirund. uel Columbarum ʒ. j.β.
 Olei Irini, Liliorum, uel Chamomille ana quantum sufficit.
 Misce, & fiat unguentum, quo inungatur pars affecta. Idem Rondeletius.

DE VNGVENTIS ABSTERGENTIBVS.

Vnguentum ad detersionem suffusionis.

- B** ℞. Fellis uaccae ʒ. j.
 Fellis uulturis, uel milui, uel galli ʒ.β.
 Mellis Ros. colati ʒ. ij.
 Osis sepiæ ʒ. j.
 Stercoris lacerti ʒ.β.
 Fiat unguentum, quod seruetur in uase æneo. Idem.

Aliud.

- ℞. Omphacij inspissati, uel coctione, uel solis exiccatione ʒ. j.
 Amurcæ præparatæ ʒ. j.
 Sacchari candi ʒ. ʒ.
 Mucilag. sem. fœnigræci ʒ. iij.
 Thutiæ præparatæ ʒ. j.β.
 Misce, & fiat unguentum, quo inungantur palpebræ. Rondeletius.

Vnguentum ad genarum scabritiem, scabiem & ulcera.

- ℞. Omphacij, Acacie ana ʒ. j.
 Thutiæ præparatæ ʒ. ij.
 Cerussæ lotæ, Antimonij ana ʒ. j.
 Vnguenti rosati ʒ. β.
 Misce, & fiat unguentum. Idem.

Aliud ad lachrymarum fluxum.

- ℞. Cort. Thuris, Masticeis, Sarcocollæ ana ʒ. ij.

596 DE VNGVENTIS MINVS VSVALIBVS.

Tragacanthę, Gummi Arabici, torrefactorum ana ʒ. j. A
Thutię preparatę, Antimonij ana ʒ. ʒ.
Sanguinis draconis, Acacię, Amurcę inspissatę ana ʒ. ij.
Misce, & fiat unguentũ, quo inũgantur cãthi oculorũ, & totę palpebrę. Idem.

Unguentum ad psoram.

R. Olei Iuniperini ʒ. ij.
Olei Nucum ʒ. j.
Tartari albi ʒ. ʒ.
Vitrioli, Salis communis, Sulphuris ana ʒ. iij.
Terebinthine lotę cum succo limonum ʒ. ij.
Lithargyri ʒ. j. ʒ. Cerę parum.
Misce, & fiat unguentum. Si morbus fuerit contumax, adde
Argenti uiui ʒ. ij.
Sublimati æris ʒ. ij.
Applicetur post balnei usum. Idem.

Aliud.

R. Olei Iuniperini ʒ. iij.
Lithargyri auri ʒ. iij.
Olei Lucernarum, Olei Nucum ana ʒ. ij.
Tartari albi ʒ. j. ʒ.
Vitrioli, Salis communis ana ʒ. iij.
Succi Plantaginis, Limonum ana ʒ. iij.
Aceti scillitici ʒ. j.
Misce, & fiat unguentum. Idem. B

Unguentum ad herpes.

R. Succi Plantaginis, Succi summitatum Vitis, uel Labruscę ana ʒ. ij.
Succi Polygoni ʒ. iij. Lithargyri ʒ. j.
Thutię preparatę, Antimonij ana ʒ. ʒ.
Aloes citrinę ʒ. iij. Cerę parum.
Misce, & fiat unguentum, addito pauco oleo myrthino, uel rosato omphaci-
no. Si uerõ herpes exedat carnem, utile erit omphacium addere. Idem.

Unguentum ad scabiem.

R. Lithargyri, Cerussę lotę ana ʒ. j.
Myrrhę, Styracis liquidę ana ʒ. ij.
Salis communis ʒ. ij.
Sulphuris uiui ʒ. iij.
Argenti uiui extincti in succo limonum ʒ. j.
Olei Rosati quantum sufficit. Cerę parum.
Misce, & fiat unguentum, quo inungatur uola manuum, & postea fricetur
totum.

A. totum corpus manibus iunctis. Rondeletius.

Unguentum ad pruritum.

℞. Rad. Lapathi acuti, Enulæ campanæ ana ʒ. j.
Decoquantur in aceto, & contusa per cribrum passentur. quibus adde:

Olei Irini ʒ. iiij.

Salis communis ʒ. j.

Myrrhæ ʒ. ij.

Lithargyri ʒ. j. β.

Ceræ parum.

Fiat unguentum. Idem.

Aliud eiusdem.

℞. Unguenti Diapompholygos ʒ. ij.

Olei Hyosciami ʒ. β.

Fiat unguentum, quo inungatur locus pruriens. Post horum usum, utile est corpus balneo, uel lauacro detergente frequenter abluere: quia quæ in cute remanent, pruritus excitant. Prima lotio sit lixiuio, altera ex decoctione farum, rosæ & hordei, &c.

DE VNGVENTIS CARNEM GE-

nerantibus.

B.

Unguentum ad ulcera narium.

℞. Aloës lotæ cum aqua plantaginis ʒ. iiij.

Myrrhæ electæ ʒ. ij.

Rad. Iridis, Sarcocollæ ana ʒ. j.

Cerussæ, Antimonij, Thutiæ, Minij ana ʒ. β.

Olei Hyperici, Rosarum ana ʒ. ij.

Mellis Ros. colati ʒ. j.

Succi mali granati, Succi Philosellæ, uel lingue passerinæ ana ʒ. ij.

Coquantur succi cum oleis, deinde mel: postremò puluerizata diligenter inspergantur, & ad unguenti formam reducantur. Si diuiti pareretur, adde

Molchi ʒ. β.

Musci arborum, uel Beniouini, uel Cyperi, uel Rosarum ʒ. j. Rôdeletius.

Unguentum sarcoticum.

℞. Thuris, Masticis ana ʒ. β.

Colophonæ ʒ. ij.

Olei Rosari, Mellis quantum sufficit.

Fiat unguentum. Idem.

Aliud eiusdem.

℞. Aristolochiæ rotundæ, Iridis, Cort. Thuris ana ʒ. iiij.

FF 31

Masticis

598 DE VNGVENTIS MINVS VSVALIBVS.

Masticis, Myrrhæ, Aloës, Cadmiæ ana ʒ. ij. A
 Mellis parum. Fiat unguentum.

Aliud, eiusdem.

℞. Folior. Consolidæ, Pilosellæ, Betonicæ, Hyperici, Caudæ equinæ, Verbenæ ana M. j.

Decoquantur in uino, & contundantur: deinde adde

Mellis, Terebinthinæ ana ʒ. iiij.

Thuris, Masticis ana ʒ. iiij.

Sanguinis draconis, Myrthi ana ʒ. iiij. Fiat unguentum.

Aliud, eiusdem.

Succi rad. Iridis ʒ. ij.

Vini parum.

Mellis ʒ. iiij.

Cadmiæ uel Lithargyri ʒ. β.

Aloës, Myrrhæ ana ʒ. iiij. Fiat unguentum.

Aliud, eiusdem.

℞. Succi rad. Narcissi ʒ. ij.

Succi Verbenæ, Hyperici, Caudæ equinæ ana ʒ. j.

Olei antiquissimi ʒ. ij. Colophonis ʒ. j.

Gummi Elemi, Myrrhæ, Sanguinis draconis, Masticis, Aloës ana ʒ. iiij. B

Coquantur succi cum oleo & pauco melle ad inspissandum: quibus admisce pulueres reliquorum. * Efficacissimum est, replet ulcera concaua carne, & recentia subito consolidat.

DE VNGVENTIS CONSOLIDANTIBVS.

Unguentum ad phtisim.

℞. Olei Rosati, Lentiscini, uel Mastichini ana ʒ. iiij.

Sarcocollæ nutritæ in uino albo, uel lacte coctæ ʒ. j.

Thuris, Masticis, Myrrhæ ana ʒ. j.

Cineris cancerorum ʒ. β.

Farinæ hordei torrefacti ʒ. j.

Terebinthinæ abietis, Mellis ana ʒ. ij.

Misce, & fiat unguentum. Idem.

Aliud, eiusdem.

℞. Cinerum cort. Cucurbitarum ʒ. j. Boli Armeni ʒ. β.

Excipiantur butyro, & cremore hordei, fiatq; unguentum. Applicetur post expectorationem.

DE VNGVENTIS GLVTINANTIBVS.

Unguentum glutinans.

℞. Pulueris constrictiui ʒ. ij.

Incorpo-

A. Incorporentur cum albumine oui agitato, uel cum icthiocolle dissoluta cum uino altringente, uel succo citoniorum, uel plantaginis. Idem prestabit, si incorporetur cum mucilage gummi tragacanthæ uel Arabici. Quo autem melius id fiat, commodius fuerit pilos leporis addere, uel papos floris salicis, uel arundinis, uel senecionis. Puluis autem talis fit constrictius:

℞. Boli Armeni, Sanguinis draconis, Sarcocollæ, Masticis, Aloës, Gallarum, Balauftiorum, Blattæ Bizantiæ ana ʒ. β. Fol. Syderitis ʒ. j.

Fiat puluis, qui cribretur: deinde pilorum leporum integrorum ʒ. ij. uel tantundem lanuginis florum salicis. Rondeletius.

Aliud, eiusdem.

℞. Olei antiquissimi lb. j.
Succi Narcissi, Succi Syderitis ana ʒ. iij.
Florum Hyperici ʒ. iij.
Gummi Elemi ʒ. v.
Masticis, Sanguinis draconis, Aloës ana ʒ. ij.
Blattæ Bizantiæ ʒ. β.

Coquatur diu oleum per se, deinde succi addantur, demum hyperici flores ponantur in uase uitreo obturato, & soli exponantur per dies decem: undecima die addantur pulueres, & agitentur. Prius autem & colari debent, & flores auferri: rursus soli exponantur per uiginti dies: deinde serua ad usum.

B* Ulcera cutis & neruorum curat, si retineantur coniuncti, & quiescant, donec coiuerint.

DE VNGVENTIS CICATRICEM DVCENTIBVS.

Vnguentum epuloticum.

℞. Aloës, Sarcocollæ, Myrrhæ, Iridis ana ʒ. ij.
Lithargyri, Cerussæ ana ʒ. iij.
Cort. Mali granati, uel Balauftiorum ʒ. β.

Cum melle crudo fiat unguentum. Rondeletius.

Aliud, eiusdem.

℞. Lithargyri, Aluminis, Floris æris usti & loti, Plumbi usti ana ʒ. iij.
Balauftiorum, Boli Armeni, uel Cinerum ostreorum ana ʒ. ij.
Olei myrthini ʒ. iij.
Vini parum. Fiat unguentum.

Aliud, eiusdem.

℞. Aristolochiæ ustæ & lotæ, Nücis Cupressi, Balauftiorum ustorum, Ostreorum ustorum ana ʒ. ij.
Aluminis, Floris æris usti & loti, Calchitidis ana ʒ. iij.
Mellis, Vini altringentis ana quantum sufficit.

Misce, & fiat unguentum.

DE VN.

600 DE VNGVENTIS MINVS VSVALIBVS.
DE VNGVENTIS CARNEM AV-
ferentibus.

A

Vnguentum ad polypos exedendos.

R. Squamæ æris, Aeruginis æris ana ʒ.ij.
Omphacij ʒ.iiij.
Incorporentur simul, & fiat unguentum, quo illinantur tantum partes affe-
ctæ. Rondeletius.

Aliud, eiusdem.

R. Sandaracæ, uel Auripigmenti, Calcithidis præparatæ ana ʒ.ij.
Mellis quantum sufficit.
Misce, & fiat unguentum. Vel si fortius uelis, adde omphacium: si mitius, ad-
dito multo melle, uel succo mali granati, uel plantaginis. * Vtile est ad oze-
nas curandas in principio.

DE VNGVENTIS DOLOREM SE-
dantibus.

Vnguentum ad dolorem capitis ex calore.

R. Olei Rosati, Omphacini ana ʒ.iiij.
Coriandri, Ros. rubrarum, Myrtillorum, Coralli ana ʒ.j.
Ceræ albæ quantum sufficit. Aceti parum.
Fiat unguentum, quo inungatur pars anterior capitis. Idem.

B

Aliud.

R. Succum summitatum uitis, Succum Plantaginis, Solatri ana ʒ.j.
Olei Ros. Omphacini, uel Olei Citoniorum, uel Olei Nenupharis ʒ.iiij.
Decoquantur usque ad consumptionem succorum. quibus adde,
Ceræ albæ quantum sufficit.
Sem. Berberis, Coriandri, Endiuie ana ʒ.j.
Myrtillorum ʒ.ij. Aceti parum.
Misce, & fiat unguentum. Idem.

Vnguentum ad dolorem capitis ex calore in declinatione.

R. Olei Anethini, Chamomillæ ana ʒ.iiij.
Flor. Chamomillæ, Meliloti, Sambuci, Anthos, Stæchados ana ʒ.ʒ.
Nucis moschatæ, Macis ana ʒ.j.
Ceræ nouæ quantum sufficit.
Fiat unguentum, addito uino pauco uel aceto ad penetrationem. Idem.

Vnguentum ad dolorem capitis ex frigore.

R. Olei Nucum, Irini ana ʒ.ij.
Olei Rutacei ʒ.j.
Nucis moschatæ, Caryophyllor, Macis, Piperis, Pyrethri, Castorei ana ʒ.j.
Ceræ

A Cere Citrine quantum sufficit.

Aque uite parum.

Fiat unguentum, quo inungatur pars affecta. Idem.

Unguentum ad dolorem colicum.

℞ Olei Nardini, Rutacei ana ʒ.ij.

Sem. Apij, Petroseliniana ʒ.iiij.

Flor. Chamomille, Melilotiana ʒ.ij.

Piperis, Galange ana ʒ.ij.

Cere quantum sufficit.

Fiat unguentum. Tempore inunctionis adde uini albi generosi, uel uini maluatici parum. Vogatur mane, reiectis recrementis, uel post clysterem. Rõdeletius.

Aliud fortius.

℞ Olei Anethini, Rutacei ana ʒ.iiij.

Olei de spica ʒ.ij.

Sem. Rutæ, Camini, Baccarum Lauri, Sem. Apij Petroseliniana ʒ.ij.

Spicæ nardi Indicæ, Galangæ ana ʒ.ij.

Cere quantum sufficit.

Fiat unguentum, quo inungatur uentris pars media. Adde tempore inunctionis etiam parum uini generosi. Idem.

B *Unguentum ad dolores capitis & articulos in morbo Gallico.*

℞ Axungie porci non salitæ lb. i.

Butyri recentis, Axungie Gallinæ, Axungie Anatis ana ʒ.iiij.

Olei Irini, Laurini ana ʒ.iiij.

Euphorbi, ʒ.ij.

Terebinthinæ lotæ in aqua uite ʒ.iiij.

Argenti utui extincti in axungia porci ʒ.v.

Cere nouæ parum.

Lithargyri ʒ.ij.

Misce, & fiat unguentum.

DE VNGVENTIS PURGANTIBVS.

Unguentum uentrem laxans.

℞ Olei Liliorum, Amygdal. Butyri rancidi ana ʒ.ij.

Agarici, Azari puluerizati ana ʒ.ij.

Cere nouæ quantum sufficit.

Fiat unguentum, quo inungatur os uentriculi. *Vomitum prouocat, & aluum laxat. Rondelctius.

Aliud ad uomitum prouocandum.

℞ Facis olei Liliorum, Olei communis antiqui, & fetidi ana ʒ.ij.

Dialtheæ ʒ.ij.

GG Ammoniacci

602 DE VNGVENTIS MINVS VSVALIBVS.

Ammoniacy dissoluti in oleo ℥.ij.
Succi Cucumeris agrestis uel Raphani agrestis, uel Cyclaminis ℥.j.
Cerae parum.

Fiat unguentum, quo inungatur os uentriculi. Idem.

Vnguentum uentrem laxans, aliud.

℞. Succi Sambuci, Succi Mercurialis ana ℥.ij.
Mellis communis, Farinae Orobi, uel Lupinorum ana ℥.ij.
Misce, & fiat unguentum. Idem.

Aliud.

℞. Terebinthinæ, Aloes ana ℥.j.
Fellis taurini quantum sufficit. Fiat unguentum. Fumanellus.

Aliud ad idem.

℞. Succi Cyclaminis ℥.vj.
Succi Cucumeris syl. Mercurialis uel Ebuli ℥.ij.
Farinae Lupinorum, Vini maluatici ana quantum sufficit.
Fiat unguentum. * Valet etiam ad tumores lienis. Rondeletius.

Aliud laxans.

℞. Olei Cicini uel Sesamini, uel Irini ℥.ij.
Ciclae Cucumeris syluestris, Ebuli ana ℥.ij.
Coquantur leuiter: cum liquefacta cera applicentur. Idem.

Aliud.

℞. Elaterij sicci, Cataputiæ, Colocynthidis, Succi Tithymali ana ℥.vj.
Succi Cucumeris agrestis recent. ℥.β.
Hellebori nigri, Terebinthinæ ana ℥.β.
Sem. Laureolæ ℥.ij.
Succi Arthanitæ ℥.vj.
Scammonij ℥.ij.

Omnia trita ex melle commixta ad usum seruentur. Fumanellus.

Aliud potens.

℞. Aloes, Fellis taurini ana P.j.
Pul. Arthanitæ part. ij.
Cum oleo Violaceo, aut Liliaceo, & cera mixtis, fiat unguentum. Fumanellus.

Aliud.

℞. Olei Cheirini, uel Irini ℥.ij.
Succi Aristolochiæ, uel Cucumer. agrestis uel Ebuli ℥.ij.
Ammoniacy, Bdelli, Opopanacis dissoluti in prædictis oleis ana ℥.β.
Terebinthinæ, Butyri saliti ana ℥.ij.
Cerae nouæ quantum sufficit.
Fiat unguentum. * Attenuat, laxat, & emollit. Rondeletius.

Vnguentum

A

Unguentum uentrem laxans, aliud.

℞. Succj Mercurialis, Cyclaminis, Cucumeris agrestis ana ℥.ij.
 Ellebori albi, nigri, Colocynthidis ana ℥.β.
 Diagridij ℥.β.
 Fellis tauri ℥.ij.
 Farinæ lupinorum ℥.β.
 Mellis parum.


Fiat unguentum, quo inungantur partes umbilici & inguina, post fotum ex relaxantibus & emollientibus. Idem potest etiam aquas purgare, maxime si ex succo brasiicæ marinæ, uel thymeleg, uel chameleæ fiat. Rondeletius.

DE EMPLASTRIS

CAPVT XXIX.

- | | | | | | | | |
|--|--|---|--------------|---------------------------|---|---|---|
| <p>B</p> <p>Emplastra sunt, que tenaciter corporis partibus & membris adherent. ex terris & glutinosi sunt uel</p> | <p>Vsua lia, &c. Vide in sequentibus signis A.</p> | <p>Minus usua lia</p> | Astringentia | } | Emp. ad flux. uentris. | | |
| | | | | | Emp. ad foetum retinendum. | | |
| | | | | | Emp. inflammationem reprimens, &c. | | |
| | | | | | Emollientia: ut | } | Emp. commune ad durities & dolores iecoris, &c. |
| | | | | | | } | Emp. ex mucis. |
| | | | | | | } | Emplastrum emolliens, &c. |
| | | | | | Concoquentia: ut Emplast. ad materiam concoquendam, &c. | | |
| | | | | | Discutientia: ut Emplast. discutiens, &c. | | |
| | | | | | Abstergentia: ut | } | Emplast. ex salice. |
| | | | | | | } | Emplast. abstergens, purgansq; &c. |
| | | Consolidantia: ut Emplast. ad uulnera insignia, &c. | | | | | |
| | | Extrahentia: ut | } | Emplast. de betonica. | | | |
| | | | } | Emplast. ex fermento, &c. | | | |
| | | Erodentia: ut Emplast. cutem aperiens, &c. | | | | | |

GG 2 Empla-



A

DE EMPLASTRIS CALIDIS.

Emplastrum stomachicum.

℞. Ligni aloes, Absinthij, Malticis, Cyperi, Costi, Zingiberis, Gummi Arabici ana ʒ. β.

Calami aromatici, Thuris, Aloes ana ʒ. iij.

Caryophyllorum, Maceris, Nucis moschatæ, Iunci odorati florum, Nardi ana ʒ. j. β.

Omnia miua cotoneorum excipiantur, & extendantur super pânium, & suffumigetur super ligno aloes, & superponatur. * Stomachum & hepar confortat, & calefacit. Mesues.

Emplastrum polyarchion.

℞. Ceræ, Terebinthinæ, Bdellij, Ammoniacy, Cardamomi, Cyperiana ʒ. j.

Amomi, Nardi, Croci, Myrrhæ, Thuris, Cinnamomi ana ʒ. xv.

Olei Cyperini ʒ. xvj.

Vini odorati quantum sufficit.

Fiat emplastrum. * Lienosis & hepaticis affectibus auxiliatur. Galen.

DE EMPLASTRIS FRIGIDIS.

Hydreleon.

B

℞. Lithargyri argenti ʒ. j.

Aquæ limpidæ, Olei puri ana ʒ. ij.

Lithargyrus læuissimè terendus est, & reliqua diligenter mouenda in mortario lapideo: deinde coquenda lento igne, ex lignis acapnis, aut carbonibus bene accensis. Ad solem conficiendum est medicamentum, die serena, ut albescat: pereunte igne, alij carbones imponendi sunt, sed bene accensi: coquitur autem semper agitando, donec cerati crassitiem adipiscatur. Potest autè in unguenti formam redigi, si minus coquatur. Fit etiam ex libris tribus olei & aquæ: etiam ex lithargyri ʒ. iij. olei tantundem, & aquæ ʒ. j. tunc enim candidius fit, citiusq; coquitur. * Refrigeratoriam habet vim mediocrem, cuius auxilio exulceratis partibus ne quid influat, impedit, & quod iam influxit, ad partes circumiacentes retundit, hinc pruritus delquamata & parua ulcera persanat. Galenus.

DE EMPLASTRIS ASTRINGENTIBVS.

Emplastrum ex gallia.

℞. Galliæ moschatæ, Iunci odorati ana ʒ. j. β.

Ramich Rhus, Prunorum syluestrium, Hypocistidis, Ladani, Gallarû integrarum, Calami aromatici, Rosarum, Santalorum alborum, Santalorum rubrorum, Malticis, Ligni aloes, Caryophyllorum, Nardi, Thuris, Myrrhæ, Costi,

GG 3

Costi, Cyperi, Absinthij ana ʒ.ij.

Palmularum siccarum n.xij.

Panis bis cocti ʒ.iiij.

Succi Myrthi, Succi Lauri, Aquæ rosarum, Vini austeri ana ʒ.j. β.

Miux Citoniorum cum spec. ʒ.iiij. uel ʒ.iiij.

Gummi Arabici assati ʒ.vij.

Omnia probè terūtur: deinde panis & palmulæ vigintiquatuor horis ex succis macerantur: læuigata miua excipiuntur, gummisq; additis coquuntur igne lento, ad mellis spissitudinem. his in mortario puluis superior admiscetur, donec tota massa fiat uiscosa. Cum uti uoles, panno illitum, suffitu ligni aloes imbuito. * Totum uentrem inferiorem roborat astringendo, calefaciendoq;: eoq; lienterias, diarrhœas, dysenteriasq; ex frigore contractas iuuat. Mefues.

Emplastrum de crusta panis.

℞. Masticis, Menthæ, Spodij, Coralli rubri, Santali albi, rubri ana ʒ.j.

Crustæ panis tostæ, & maceratæ per horam mediam ʒ.ij.

Olei Mastichini, Citoniorum ana ʒ.j.

Farinæ hordei quantum sufficit.

Fiat emplastrum. * Valet in uomitu puerorum, & his qui cibum retinere non possunt. Montagnana.

Emplastrum Diaphænicum, calidum.

℞. Cera ʒ.ij.

Olei Rosati, Nardini ana ʒ.iiij.

Simul liquentur: deinde

Dactyli sicci n. xl.

Panis bis cocti ʒ.v.

Macerentur in uino odoro biduum: post

Carnis Citoniorum in uino coctorum ʒ.j.

Permultum teres cum dactylis & pane bis cocto: deinde misce cum cerato superiori ex cera, oleo rosato & nardino, & adde subsequencia in mortario bene contusa:

Masticis, Thuris, Absinthij ana ʒ.ij. β.

Ligni aloes, Macis, Myrrhæ, Aloes lotæ, Spicæ nardi Indicæ, Acaciæ, Gallicæ moschatæ, Ramich, Calami aromatici ana ʒ.j.

Ladani ʒ.ij.

Misce, fiat emplastrum. * Ventriculum & hepar firmat: ob id lienteriam & dysenteriam hepaticam adiuuat. Mefues.

Emplastrum Diaphænicum frigidum.

℞. Dactylorum maturitati proximorum, in uino austero coctorum ʒ. v.

Panis

A

B

- A** Panis bis cocti ℥. j.
 Carnis Citoniorum in uino austero coctorum ℥. j. β.
 Styracis calamitæ, Masticis, Ladani, Acaciæ, Omphacij, Flor. Labruscæ,
 Ros. rubrarum, Santali citrini, Ramich, Myrrhæ, Ligni aloes ana ℥. β.
 Ceræ ℥. iiij.
 Olei Rosati ℥. xv.
 Vini austeri quantum sufficit.
 Fiat emplastrum. * Ventrem totum inferiorem, ne aliarum partium recre-
 menta suscipiat, roborat, coctionem iuuat: ob hæc uomitum, choleram mor-
 bum, lienteriam, dysenteriam hepaticam iuuat. Mesues.

Emplastrum pro matrice.

- ℞. Rad. Bistortæ lb. j.
 Ligni aloes, Santali citrini, Nucis moschatæ, Berberis, Antheræ, Cinnamo-
 mi ana ℥. j.
 Caryophyllorum, Schœnanthi, Flor. Chamæmeli ana ℥. β.
 Thuris, Masticis, Aliptæ moschatæ, Galliæ moschatæ, Styracis calamitæ,
 Styracis rubræ ana ℥. iiij.
 Moschi fini ℥. β.
 Ceræ lb. j. β.
B Terebinthinæ lb. β.
 Ladani lb. iiij.
 Picis naualis lb. iiij.
 Fiat emplastrum secundum artem. * Vteri imbecillitati succurrit: eius pro-
 cidentiam reprimat: muliebribus uitijs ex nimia humorum mollitudine subue-
 nit, fluxusque immoderatos sistit.

DE EMPLASTRIS EMOLLIENTIBVS.

Emplastrum Diachylon, simplex.

- ℞. Mucilaginis Fœnigræci, Sem. Lini, Rad. Althææ ana ℥. j.
 Lithargyri ℥. j. β.
 Olei antiqui clari ℥. iiij.
 Lithargyrium tenuissimè teratur, & cum oleo subigatur & misceatur: post i-
 gne lento coque, spatula semper agitâdo, donec probè mista sint. Exime igni,
 paulatim frigescat: postea mucilagines affunde, permisce, & recoque igne ad
 iustam crassitiem. * Scirrhus hepatis, lienis, uentriculi, & aliarum partiū,
 ipsas chæceradas & durities reliquas emollit, & iuuat. Mesues.

Emplastrum Diachylon compositum.

- ℞. Mucilaginis radic. Althææ, Semin. Lini, Med. cort. Vlmi, Fœnigræci ana
 ℥. iiij.
 Olei Chamæmelini, Liliorum, Anethini ana ℥. j.

Hammoniæ,

Hammoniæ, Galbani, Opopanacis, Sagapeni ana ʒ.β.

Ceræ nouæ ʒ. xx.

Croci ʒ. ij.

Terebinthinæ ʒ. ij.

Gummi resoluantur in uino optimo, & conficiantur secundum artem. * Maturat apostemata, & mollit durities: partim resoluit & partim digerit, abstergitq; saniem ruptorum apostematum, & sanat phlegmones.

Emplastrum Diachylon magnum filij Zachariæ.

℞. Lithargyri mundi, tenuissime triti, & per cribrum excuspi ʒ. xij.

Olei Irini, Chamæmelini, Anethini ana ʒ. viij.

Mucilag. sem. Lini, Fœnigræci, Ficum pinguium, Passularum, Succu Ireos, Succu Scillæ, Oesyphi, Glutinis Alchanach, liue Ictiocollæ ana ʒ. xij.

Terebinthinæ ʒ. iij.

Resinæ pini, Ceræ citrinæ ana ʒ. ij.

Fiat emplastrum secundum artem. * Resoluit & maturat omnes durities & inflammationes.

Emplastrum Diachylon paruum.

℞. Lithargyri ʒ. vj.

Olei ueteris clari ℥. j.

Mucilag. Pſyllij ʒ. iij.

Mucilag. Hyosciami ʒ. j. β.

Mucilag. sem. Lini, Rad. Maluæ ana ʒ. ij.

Fiat emplastrum secundum artem. * Tumores calidos digerit & maturat. Mesues.

Emplastrum de meliloto.

℞. Meliloti ʒ. vj.

Flor. Chamæmeli, Fœnigræci, Baccarum Lauri, Rad. Althææ, Coimarum Absinthij ana ʒ. ij.

Sem. Absinthij, Cardamomi, Iridis, Cyperi, Spicæ nardi, Casiæ, Sem. Ammi ana ʒ. j. β.

Fol. Persici ʒ. iij.

Hammoniæ ʒ. x.

Styracis, Bdellij ana ʒ. v.

Terebinthinæ ʒ. j. β.

Ficus pinguis n. xij.

Sepi hircini, Resinæ picis ana ʒ. ij. β.

Ceræ ʒ. vj.

Olei Sampsuchini, Nardini ana ℥. j.

Confice, sic: Fit decoctio

Meliloti, Fœnigræci, Chamæmeli ana quantum sufficit.

Coquantur

A Coquantur ad medias: deinde in colaturam immixtis tritrandis subtilissime pulverizatis, rursus coquantur additis oleis, terebinthina, & similibus, gummisq; in aceto dissolutis: postremo adduntur radices & ficus simul cocti & bene contusi. Misce, & fiat emplastrum. * Mollit duritiem omnem uentriculi, hepatis, lienis, uiscerum, & reliquorum. Dolorem item uehementer sedat, hypochondriaq; tena sanat. Mesues.

Diamelilotum Andromachi.

℞. Nardi Gallicę, Cyperi, Iridis, Myrrhę ana ʒ. viij.

Croci ʒ. β.

Meliloti ʒ. xxv.

Hammoniacy, Terebinthinę ana ʒ. l.

Cerę ʒ. c.

Olei Cyprini ʒ. vj.

Aceti quantum sufficit.

fiat emplastrum. * Eadem quę præcedens potest. Galenus.

Emplastrum ceroneum.

℞. Picis naualis bene colatę, Cerę ana ʒ. j. ʒ. iij.

Serapini ʒ. ij.

Hammoniacy, Terebinthinę, Colophonię, Croci ana ʒ. j. ʒ. iij.

B Aloes, Thuris, Myrrhę ana ʒ. j.

Opopanacy, Styracis calamitę, Galbani, Masticis, Aluminis, Fœnigręci ana ʒ. iij.

Styracis liquidę, Bdellij ana ʒ. iij.

Lithargyrij ʒ. β.

Confice sic. Serapinum, galbanum, opopanax, hammoniacy, gummi aliquidum tusa cum uino temperentur: deinde ad medię partis uini consumptionem bulliant: & uase stanneo posito super ignem, cū inceperit bullire, pix naualis bene colata addatur, & cum spatula bene agitetur, donec liqueat: liquefacta pice, addatur cera & ea liquefacta ponatur colophonia: tum styrax cum pistillo calido trita frustatim imponatur: postea mastiche & olibanum, deinde myrrha cum bdellio: & interuallo facto ponatur terebinthina, & consequenter alumen & lithargyrium, ad ultimum fœnigręcum. Et cum decoctum fuerit, fundatur supra aquam tepidã, & ab aqua extracto, manibus exprimatur, donec tota aqua inde exeat: deinde puluis aloes super marmor inunctum cum oleo laurino malaxetur: postremum croco pulverato, & inunctis manibus cum eodem oleo laurino magdaleones informetur. Durat quinquennium. Emplastrum hoc à cera dictum est. * Valet præcipue ad omnem dolorem spatularum & pectoris ex frigiditate: frigidus humores soluit: splenem remollit: ualet ad hydropem ex causa frigida hepatis: de eadem causa matricis frigiditati superpositam multum reficit. Nicolaus.

HH *Emplastrum*

Emplastrum oxycroceum.

A

℞ Croci, Picis, Colophonix, Cera ana ʒ.iiij.

Terebinthinæ, Galbani, Hammoniacy, Myrrhæ, Thuris, Mastycis ana ʒ. j. ʒ. iij.

Galbanum & hammoniacum in aceti sufficienti quantitate dissoluantur: coque dum dissoluta sint: cola, & rursum coque, donec acetum in uaporem euauerit: tunc adde picem, ceram, terebinthinâ liquata, deinde mastiches, thuris, myrrhæ puluerem tenuissimum, continenter miscendo donec percocta sint ad cerati crassitiem. Infunde in aquam frigidâ, exime, preme, & in tabula marmorea oleo laurino inuncta extende: postremò crocum in tenuissimum puluerem redactum admisce, & fiat emplastrum. * Prodest ossibus fractis, item partibus, quæ dolore aliquo affliguntur, duritiem deniq; omnem emolliat & discutit. Nicolaus.

Emplastrum apostolicum.

℞ Lithargyrii ʒ. vj. Cera fuluæ, Colophonix ana ʒ. iij.

Propoleos, Visci quercini ana ʒ. j.

Hammoniacy, Lapidis calaminaris ana ʒ. vj.

Mastycis, Thuris ana ʒ. β.

Mumiæ, Terebinthinæ, Bdellij, Galbani, Myrrhæ, Aeris usti, Squamæ æris, Viridis æris, Sarcocollæ, Dictamni Cretici, Aristolochiæ rotundæ, Opopanacy ana ʒ. iij.

Olei ueteris lb. j.

Vini clari quantum galbano, hammoniaco & opopanaco dissoluendis satis fuerit. Confice secundum artem & diligenter emplastrum. * Valet ad dolores ceruicis potissimum & renum: sagittas & furculos corpori infixos extrahit. Nicolaus.

Emplastrum apostolicum, aliud.

℞ Lithargyrii ʒ. xvij.

Cera rubæ, Colophonix ana ʒ. vj.

Propoleos, Visci quercini ana ʒ. iij.

Hammoniacy, Lapidis calaminaris, Thuris ana ʒ. iij.

Masticis, Mumiæ ana ʒ. j. β.

Terebinthinæ, Galbani, Bdellij, Myrrhæ, Aeris usti, Sarcocollæ, Squamæ æris, Opopanacy, Dictamni Cretici, Aristolochiæ, Aeris uiridis ana ʒ. j.

Olei ueteris quantum sufficit, uel ʒ. vj.

* Ad omnia uulnera recentia siue antiqua, & ad neruos præcisos, uel musculos, ad puncturas uel morsum terrestrium animalium uel maritimorum peculiariter congruit, educit ab eis humores & putredines intimè immerlas, & concauitates earum pura carne replet: repletisq; cicatricem absq; detrimento.

A mento inducit: fagittas, calamos, & similia altius membris infixas, sine dolore extrahit. Nicolaus.

Emplastrum ex allijs.

℞. Ceræ lb. ij.
Picis græcæ, Medullæ ceruini ana ℥. vj.
Nitri albi ℥. viij.
Olei lb. iiij.
Allia num. xx.

Allia mundata coque oleo, & his colatis adde ceram, postremò nitrum bene pulueratum: fiat emplastrum. * Vim attractoriam habet: facit ad omnem duritiem, abscessus, furunculos, strumas, inguinum tumores, fistulas, impetigines humidas, ac mammas induratas. Aetius.

Emplastrum Gratia Dei.

℞. Terebinthinæ lb. β.
Resinæ lb. j.
Ceræ albæ ℥. iiij.
Masticis ℥. j.
Verbenæ, Betonicæ, Pimpinellæ ana M. j.

B Fiat decoctio herbarum in uino albo generoso ad cõsumptionem tertie partis. Colaturæ dissolue ceram, resinam, masticem. Bulliant, donec incorporentur, & agitentur. Tunc ab igne deponantur, & terebinthina injiciatur, agitando cum spatula, & fiat emplastrum. Nicolaus.

DE EMPLASTRIS ABSTERGENTIBVS.

Emplastrum de tribus farinis.

℞. Farinæ Fabarum, Orobi, Hordei ana lb. j.
Lixiuij quantum sufficit. Coque lento igne, & adde Oxymellis simplicis quantum sufficit. Fiat emplastrum. Auicenna.

Emplastrum de quinque farinis.

℞. Farinæ Fabarum, Orobi, Ciceris, Lupinorû, Hordei ana part. equales.
Lixiuij, Oxymellis simplicis ana quantum sufficit.
Misce, & fiat emplastrum. Auicenna.

Barbarum paruum.

℞. Picis nigre, Ceræ, Resinæ pini, Picis Græcæ, Bituminis ana lb. j.
Lithargyri ℥. x.
Cerussæ, Aeruginis ana ℥. v.
Opopanacis ℥. iiij. Olei ℥. ix.

Terenda contendantur in mortario cum aceto forti: reliqua liquentur: misce, coque, quousq; non amplius manus inquinet. Si uoles sedando dolori aptius reddere, adde

HH 2 Succis

Succi Hyofciam, Opij ana ʒ. β.

* Ad recētia uulnera, finus, canum, hominumq; morsus, condylomata, inflāmata ad articularum uitia in principio, & podagram ualet. Galenus.

Barbarum magnum.

℞. Picis lb. viij.

Ceræ lb. vj ʒ. viij.

Resinæ pini lb. v. ʒ. iiij.

Bituminis lb. iiij.

Olei lb. j. ʒ. vj.

Lithargyri, Cerussæ, Æruginis ana ʒ. iiij.

Thuris ʒ. vj.

Aluminis liquidi ʒ. j. β.

Aluminis scissilis ʒ. iiij.

Opopanacis, Squamæ æris, Galbani ana ʒ. xij.

Aloes, Opij, Myrrhæ ana ʒ. β.

Succi Mandragoræ ʒ. vj.

Terebinthinæ lb. ij.

Aceti lb. v.

Confice, ut in paruo dictum est. * Eiusdem cum superiori efficaciz. Hoc autem ad maxima uulnera adhibetur, ut præcedens ad minima. Galenus.

Isis.

℞. Ceræ ʒ. c.

Terebinthinæ ʒ. cc.

Squamæ æris, Æruginis, Aristolochiæ, Thuris, Salis hammoniæ, Hammoniæ Æris ulsi ana ʒ. viij.

Aluminis ulsi ʒ. vj.

Myrrhæ, Aloes, Galbani ana ʒ. xij.

Olei ueteris ʒ. x.

Coque ut supra; deinde subige manib. aceto forti lotis: fiant magdaliæ, quas in aceto repones diebus decem. Alij addunt radicis dracontij ʒ. viij. * Capiti accommodatum est, ad chironia ulcera & curatu difficilia: est item cruentis idoneum. Galenus.

Emplastrum album, siue è cerussa.

℞. Cerussæ lb. j. β.

Olei Rosati lb. ij.

Ceræ candidæ ʒ. iiij.

Ceræ in oleo liquata, adde cerussam tenuissimè læuigatam, & semper agitando coquantur, donec nigrescant. * Sanat ambusta, erysipelata, scabiem siccam, & ulcera calida.

Emplastrum

A

Emplastrum de ianua.

℞. Succī Betonicæ, Plantaginis, Apij ana ℥.j.
Ceræ, Picis, Resinæ, Terebinthinæ ana ℥.β.

Fiat emplastrum. Mesues.

Emplastrum uiride.

℞. Ceræ nouæ, Resinæ, Terebinthinæ ana ℥.iiij.
Olibani, Masticeis, Viridis æris ana ℥.iiij.

Confice secundum artem.

Emplastrum diuinum.

℞. Galbani ℥.j. ℥.ij.
Hammoniā ℥.iiij. ℥.iiij.
Opopanacis ℥.j.
Lithargyri ℥.j. β.
Ceræ nouæ ℥.v. ij.
Olei olinarum ℥.j. β.
Olibani ℥.j. ℥.j.
Myrrhæ ℥.j. ℥.ij.
Viridis æris ℥.j.

B

Bdellij ℥.ij.
Aristolochiæ ℥.j.
Masticis ℥.j.
Magnētis ℥.iiij.

Misce omnia sicut decet, & fiat emplastrum. Nicolaus.

Emplastrum Basilicum magnum.

℞. Cere albæ, Resinæ pineæ, Seui uaccini, Picis naualis, Terebinthinæ,
Olibani, Myrrhæ ana ℥.j.
Olei quantum sufficit.

Fiat emplastrum. * Vlcera phlegmone carentia, præsertim partium neruo
farum, terget, & carne implet.*Diadictamnū.*

℞. Olei ueteris ℥.ij. β.
Lithargyri ℥.j. ℥.β.
Æruginis ℥.j.
Squamæ æris ℥.v.
Colophonix ℥.v. ℥.ij.
Pollinis thuris ℥.j. β.
Hammoniā ℥.ij.
Æris usti ℥.j.
Diphrygis, Gentianæ ana ℥.v.

HH 3

Propolcos,

Propoleos, Aloes ana ʒ. j.

Galbani ʒ. j. β.

Aristolochiæ rotundæ, Dictamni Cretenfis ana ʒ. j. ʒ. ij.

Ceræ ʒ. xxv.

Confice in hunc modum. Lithargyrum cum oleo mixtum coques tatisper, donec probè coierint, continenter agitando, additis ærugine & squama æris, ferueat aliquantulum: exine igni, & dum adhuc bullit, immitte resinâ & hammoniacum in aceto dissoluta, & eousq; mouebis, donec deserbuerit, tum ceram & æs ustum immitte. Rursus coquatur igni, & cum non inficiet manus, exime igni, & adde reliqua tenuissimè trita: probè moueto, & confice magdalias. * Facit ad recentia uulnera, neruorum præcisiones, uetera ulcera, & cicatricem ægrè ducetia, abscessus, strumas, furunculos, duritias: tela educit, aculeos, ossa ex capite: & ad cuiuslibet uirulenti ictus efficax est. Galenus.

DE EMPLASTRIS CONSOLIDANTIBVS
& glutinantibus.

Emplastrum triapharmacum.

℞. Lithargyri subtilissimè triti, Aceti uini ana ℥. j.

Olei ueteris ℥. ij.

Fiat secundum artem emplastrum. * Facit nasci carnem in uulneribus, & B consolidat ea. Mesues.

Emplastrum contra ramicem, siue rupturam.

℞. Picis naualis, Aloes ana ʒ. iij.

Lithargyri, Ceræ rubræ, Colophonæ, Galbani, Ammoniaci ana ʒ. ij.

Visci quercini ʒ. vj.

Gypsi, Aristolochiæ longæ, rotundæ, Myrrhæ, Thuris ana ʒ. vj.

Terebinthinæ ʒ. ij.

Vermium terrestrium ʒ. iij.

Gallarum ʒ. iij.

Consolidæ utriusq; Boli Armeni ana ʒ. β.

Sanguinis draconis ℥. j.

Confice sic. Primò ponatur uiscus quercinus: & dimittatur diu bullire in aqua decoctionis pellis arietinæ, sicut remouetur ab ariete, quæ debet decoqui per diem & noctem. Postea deponatur ab igne, & ponantur terebinthina, lithargyrium, & colophonia: postea mastix, thus, uermes, myrrha & galbanus, & ammoniacus: paulo post consolidata maior & minor, gypsus, & bolus armenus. Postea super igne ponatur, & ponatur sanguis draconis (alij Sanguis humanus,) cõsequenter aristolochia longa & rotunda, & ad ultimũ aloë, & temper agitari debet sine intermissione fortiter cũ spatula. Signum decoctionis est, quãdo digitis nõ adhæret. Postea ponantur super marmor unctum oleo uiolato,

A. uolato, & manibus malaxentur: postea teratur iterum in mortario assidue per duos uel tres dies: deinde usui reserua.

Aliud, ex pelle arietina dictum.

℞. Lithargyri, Lapidis hæmatitis, Sanguinis draconis, Boli Armeni, Opii, Mastice, Hammoniæ, Mumie, Galbani, Thuris, Costi, Lumbricorū ana ʒ.β.
Picis nigre, Picis Græcæ, Ceræ albæ, rubræ ana ʒ. j.
Rad. Consolidæ maioris, minoris ana ʒ. iiij.
Rosarum rubrarum, Myrrhæ, Aloes ana ʒ. xvij.
Succi Hypocistidis ʒ. vj.
Gallarum immaturarum, Balaustiorum, Aristolochiæ rotundæ ana ʒ. vj.
Visci quercini, Terebinthinæ ana ʒ. ij.
Sanguinis hominis rufi ʒ. ix.

Fit autem in hunc modum. Pellem arietinā integrā cū omnibus pilis coques in aqua, donec ferè omnino dissoluta sit in lentorē quendam: quem colabis. Huius colaturę sume ʒ. j. immitte in uas nouum, in quo uiscus liquabis igni lento, rudicula semper agitando: iniice deinde lumbricos, postea cerā, terebinthinam, & mastice: his liquatis, adde gummi aceto dissoluta: & coque ad cerati crassitiem: postremò iniice, quę terenda sunt, probè trita: probè misce to, & cōfice magdalias. * Magne est efficacit̃ in rupturis. Arnoldus.

B. *Aliud ad rupturam.*

℞. Cerę nouę ʒ. j.
Resinę, Colophonię, Olei ouorum, Picis naualis ana ʒ. iiij.
Terebinthinę ʒ. ij.
Rad. Nenupharis, Flor. Nenupharis ana ʒ. j.
Rad. Consolidę maioris ʒ. ij.
Nucum Cypressi ʒ. j.
Gallarum ʒ. ij.
Boli Armeni ʒ. j.
Cort. Thuris ʒ. j.
Aloes ʒ. ij.
Lapidis hæmatitis ʒ. j.
Lithargyri utriusq; ana ʒ. β.
Mastice, Myrrhę, Mumie ana ʒ. β.
Carabę, Balaustiorū, Vermiu terrestriū cōbustorū, Rosarū rubr. ana ʒ. β.
Galbani, Ammoniæ ana ʒ. vj.

Dissolue gummi cū aceto, & fiat emplastrū. Preparandi aut̃ modus & ordo ita habet: Habeas ad manū tres patellas, unā maximā, & reliquas duas minores. In maxima patella super ignē mediocrē colliqua simul cerā frustulatim cōfissam aut fractā, pariter & resinā & colophoniam. Deinde in secūda patella, liqua picē, quā exinde colatā adde p̃dictis, ad patellā nēpe maximā. In ter-

tia ue-

tia uerò patella dissolue cum aceto galbanum & ammoniacum, & super igne **A**
admodum ualde lentum eliqua, ne uel minimam supercalfactionem aut adu-
sionem sentiant, & cola. Deinde & hæc quoque supradictis simul omnibus
affunde, uidelicet, quando illa quæ sunt in patella maxima, quodammodo
refruxerint, diligenter spatula circumagendo, & affunde simulac terebinthi-
nam & oleum ex uitellis ouorum: & illicò post reliqua omnia in tenuissimū
puluerem læuigata, cautissimè & diligentissimè continuo spatha agitando,
donec emplastri formam acquirat. Postremò totum illud simul aggregatum
proijce super marmor, manibusq; oleo uel aqua infectis & humectatis ma-
laxando fac magdaleones teretes, &c. Et si uis, esto tibi hic modus ceu nor-
ma formandi emplastra consimilia, ut oxycroceum, diachylon, emplastrum
gryseum, &c. Vnum tamen adhuc notandum est, galbanum, quòd illius ter-
tiam partem amplius accipere debes, quàm pondus prescriptum habet, pro-
pter sordes, quæ ei plerūq; insunt, quæ in colatura retrò manere debēt, nec ta-
men debeat quicquā ponderi prescripto. uerbi gratia: In hac recepta habes
galbani ʒ. vj. tu modò recipe drachmas nouem. Similiter & ammoniaci pau-
lo plus q̄ pro prescripto pondere accipies, prout plus minusue impurū fue-
rit. **R.** igitur hoc loco, ammoniaci ʒ. vij. aut circiter. Ex dispensario Coloniense.

Emplastrum Diachalciteos, Palmeum unguentum dictum. **B**

R. Axungia porci ueteris, à membranis per liquationem & colationem
purgata ʒ. ij.

Olei ueteris, Lithargyri triti & creti ana ʒ. iij.

Chalcitidis uste ʒ. iij.

Coque igni, & moue rudicula, ex ramo palmæ recentissimo confecta: cum
ferè excoctū erit, adde tenerorū palmæ ramorū minutim incisorum, & nodu-
lo ligatorū M. iij. Coque ad cerati crassitiē. Vfus eius est liquati cum uarijs
rebus, pro Medici instituto. * Ad uulnera cruenta, tumores pestilentes, &
exituras, ulsa, rupta, contusa, & inde nata ecchymomata. Galenus.

Oxyleum.

R. Lithargyri argenti ʒ. j.

Olei ueteris, Aceti optimi ana ʒ. ij.

Lithargyros læuissimè terendus est, & reliqua diligenter mouenda in mor-
tario lapideo. deinde coquenda lento igne, donec cerati crassitiem adipisca-
tur. Componitur etiam ex olei & aceti ʒ. ij. β. uel ex singulorum ʒ. ij. tūc
enim nigrius est, & ualentius. * Exiccat, fistulas quæ nondū callū durū ha-
bent, curat: uulnera cruenta glutinat. Galenus.

Oeneleum.

R. Lithargyri argenti ʒ. j.

Olei clari, Vini albi optimi ana ʒ. ij.

Coque

A Coque, & confice, ut supra. * Exiccat, proinde in rheumaticis dispositionibus utile est, & cruenta vulnera sanat. Galenus.

DE EMPLASTRIS CICATRICEM
inducentibus.

Emplastrum griseum de lapide calaminari.

℞. Lapidis Calaminaris præparatæ ʒ. j.

Lithargyri ʒ. ʒ.

Cerussæ ʒ. β.

Thutiæ ʒ. j.

Terebinthinæ ʒ. vj.

Ceræ albæ ʒ. j. β.

Seui ceruini ʒ. ʒ.

Thuris electi ʒ. v.

Masticis ʒ. iij.

Myrrhæ ʒ. ʒ.

Caphuræ ʒ. j. β.

Confice secundum artem. * Desiccet, replet, & cicatrizat ulcera.

Emplastrum Diacadmia.

B ℞. Cadmiæ præparatæ, Chalcitidis ustæ ana ʒ. xvj.

Ceræ ʒ. lxxx.

Colophonie ʒ. lxiiij.

Olei Myrtini lb. j.

Cadmia & chalcitis bene tritæ cum tanto uino subigetur, donec mellis crassitiam adeptæ sint: deinde cera & colophonia in oleo liquatis, coque aliquantulum: exime igni, & ubi refrixerint, adde reliqua. * Efficax est ad cicatricem ducendam in ulceribus. Galenus.

DE EMPLASTRIS DOLOREM SEDANTIBVS.

Emplastrum de baccis lauri.

℞. Thuris, Masticis, Myrrhæ ana ʒ. j.

Baccarum Lauri ʒ. ʒ.

Cyperis, Costi ana ʒ. β.

Mellis despumati quantum sufficit.

Fiat emplastrum. * Ventriculi, intestinorum, hepatis, renum, uesicæ, uteri, & partium aliarum dolor à flatibus aut intemperie frigida ortus placat. Mesues.

Emplastrum Maciatum, Pauli.

℞. Masticis, Ceræ, Styrcis ana ʒ. iij. Oesypi ʒ. vj.

Terebinthinæ ʒ. j. Fiat emplastrum.

* Ad articulorum morbos, & corporis languores, & resolutiones.

618 DE EMPLASTRIS MINVS VSVALIBVS.

DOLOREM quoq; sedant, emplastrum de Meliloto, emplastrum Cero. A
neum, emplastrum Oxycroceum, &c. de quibus uide supra suo loco.

DE EMPLASTRIS ASTRINGENTIBVS.

Emplastrum ad fluxum uentris.

℞. Cort. Mali granati, Gallarum, Balauftiorum. Aluminis ana ʒ. ʒ. ʒ.
Acaciæ, Sanguinis draconis, Myrtillorum, Cort. myrobal. Chebul. Sem.
Vuarum ana ʒ. ij.

Fiat puluis, qui excipiatur miua citoniorum, & mucilage gummi tragacan-
thæ extractæ cum aceto: fiat emplastrum. Rondeletius.

Aliud, eiusdem.

℞. Succu Citoniorum, Pyrorum agrestium, Aceti ana ʒ. iij.
Panis ʒ. ʒ.

Coquantur diligenter, & contundantur, & passentur. deinde adde,
Masticis, Sang. draconis, Boli Armeni ana ʒ. ʒ.
Farinæ Lentium, Farinæ Hordei ana ʒ. j.
Mucilagin. Tragacanthæ ʒ. j. ʒ.

Misce, coquantur leuiter, fiat emplastrum, quod applicetur supra uentrem.

Emplastrum ad fœtum retinendum.

℞. Olei Citoniorum, Olei Myrtini, ablutorum cum aqua plantag. & pe- B
culi ros. uel cum decoct. rad. bistortæ ʒ. iij.

Ceræ rubræ ʒ. iij.

Sanguinis draconis, Boli Armeni, Acaciæ, Hypocistidis ana ʒ. ʒ.

Rad. Bistortæ, Gallarum, Balauftiorum, Coralli rubri, Masticis ana ʒ. ij.

Cerussæ ʒ. j.

Terebinthinæ lotæ in succo bursæ pastoris ʒ. iij.

Fiat emplastrum, decoquendo in oleo cerussam, postea addendo terebinthi-
nâ & alia in fine. * Fœtû, sanguinis fluxû ex utero aut renib. retinet. Rôdelet.

Emplastrum inflammationem reprimens.

℞. Rad. Cyperi ʒ. j.

Chalcitidis ʒ. ʒ.

Boli Armeni, Terre sigillatę ana ʒ. ij.

Cerussæ ʒ. iij. Resinæ piceæ, Picis ana ʒ. j.

Ceræ albissimę ʒ. iij.

Fiat emplastrum. Andernacus.

DE EMPLASTRIS EMOLLIENTIBVS.

Emplastrum commune ad durities & dolores iecoris, splenis, &c.

℞. Lichargyri auri tenuissimè triti ʒ. iij.

Nutriantur.

A Nutriantur oleo chamomillæ in mortario, deinde coquantur semper mo-
uendo, donec inspissentur. deinde adde,

Ammoniacy, Bdellij, dissol. in uino, liquefactorum & colatorum ana ʒ.β.

Ceræ ʒ. v.

Terebinthinę ʒ. iiii.

Iridis ʒ. j.

Malaxentur manibus inunctis oleo liliorum. * Valet ad durities hepatis,
splenis, tumorum in articulis, uel alijs partibus. Rondeletius.

Aliud, eiusdem.

℞. Fol. Chamæpityos M. j.

Rad. Maluæ, Rad. Cucumeris agrestis ana ʒ. iij.

Incidentur, & macerentur in olei antiqui duabus partibus, & una uini, deco-
quantur: & in colatura decoquantur,

Lithargyri ʒ. iiii.

ad consumptionem uini. deinde dissolue,

Picis, Colophonix, Pinguedinis porci ana ʒ. vj.

Galbani, Ammoniacy, Opopanacy, dissol. in oleo amygdal. ana ʒ. j.

Iridis, Myrrhę, Styrcis, Propoleos, Masticis, Cerę ana ʒ. ij.

Fiat emplastrum. malaxetur cum lacte mulieris.

Aliud.

B ℞. Iuris decocti rad. Liliorum, item rad. Altheę ana lb. β.

Olei Laurini, Chamemelini ana ʒ. iij.

Coquantur usq; ad consumptionem iurium: deinde adde,

Galbani, Ammoniacy, Suffiminis, Bdellij, ex aceto dilutorum ana ʒ. β.

His iterum coctis, dum nihil humidum superfit, admisceto,

Propoleos, Cerussę ana ʒ. v.

Vino generoso omnia subacta in unum cogantur. Ex Andernaco.

DE EMPLASTRIS CONCOQUENTIBVS.

*Emplastrum ad materiam concoquendam, &
pus mouendum.*

℞. Rad. Altheę, Lapatij ana ʒ. iij.

Foenigræci, Sem. Lini ana ʒ. β.

Caricarum albarum n. xx.

Vuarum passarum ʒ. ij.

Contusa concoquantur ad cremorem. Huius colatę librę addito,

Olei Liliorum lb. β.

Coquito iterũ, donec omnis humor absumptus fuerit: postremò admisceto,

Adipis suilli, Adipis uitulini purgati ana ʒ. iiii.

Rad. Iridis tritici, Farinę tritici, Resinę, Colophonix ana ʒ. ii.

II 2 Ceræ

620 DE EMPLASTRIS MINVS VSVALIBVS.

Ceræ quantum sufficit. Fiat emplastrum. Andernacus.

A

DE EMPLASTRIS DISCVTIENTIBVS.

Emplastrum discutiens.

℞. Absinthij, Papaueris corniculati ana M. j.

Rad. Altheæ, Maluæ, Narcissi ana M. β.

Sem. Fœnigræci, Erui, contuforum ana P. j.

Fiat decoctio: de qua

℞. ℥. j.

Olei Anethini, Hyperici ana ℥. ij.

Adipis suilli ueteris, Adipis gallinacei ana ℥. j.

Coquantur usq; ad humoris consumptionem: deinde adde,

Salis usti ℥. ij.

Coralli ℥. j.

Sem. Anisi, Cymini ana ℥. ij.

Farinę Lolij, Hordei ana ℥. j.

Croci ℥. ij.

Ceræ quantum sufficit. Misce, & fiat emplastrum. Andernacus.

DE EMPLASTRIS ABSTERGENTIBVS.

Emplastrum ex salice.

B

℞. Misys, Aluminis rotundi, Chalcitidis, Melantherij, Æruginis, Aluminis scissilis, Gallarum acerbarum ana ℥. vj.

Cerussæ, Ceræ, Resinę frictę, Picis naualis, Bituminis, Olei Omphacini, Fol. Salicis tenerorum ana ℥. ij.

Folia in aceto forti coquuntur, deinde siccata in tenuissimum puluerem rediguntur, alia liquantur coquanturq; donec satis est: postea refrigerantur, addunturq; pulueres. * Vlcera curatu difficilia, erysipelata, & alios plurimos affectus sine adustione, & fistulas curat.

Emplastrum abstergens, purgansq;.

℞. Succij Solani, Marrubij, Plantaginis, Olei Rosati ana ℥. β.

Coquantur omnia usq; ad consumptionem succorum: deinde adde,

Cinerum testaceorum, Stercoris caprilli usti, Calcis lotæ ana ℥. iij.

Æruginis lotę, Auripigmenti puluerizati, Aloës ana ℥. j.

Terebinthinæ ℥. ij.

Cerę uiridis quantum sufficit.

Misce, & fiat emplastrum. Andernacus.

DE EMPLASTRIS CONSOLIDANTIBVS.

Emplastrum ad uulnera insigne.

℞. Picis Græcę, seu Colophonię, Sulphuris, Thuris albi ana ℥. β.

Ex albu.

A Ex albuminibus ouorum fiat emplastrum. Labris uulnerum unitis, & sanguine absterfo, corio inductum applicetur, fasciaq; obligetur. Andernacus.

DE EMPLASTRIS EXTRAHERENTIBVS.

Emplastrum de betonica.

℞. Betonicę uiridis, Pimpinellę, Agrimonij, Saluię, Pulegij, Millefolij, Consolidę maioris, Gallitrichi ana ℥.vj.

Thuris, Masticis ana ℥.iiij.

Ireos, Aristolochię rotundę ana ℥.vj.

Cerę albę, Terebinthinę ana ℥. viij.

Gummi oleę Ethiopicę ℥.ij.

Resinę pini ℥.vj.

Olei Abietini, Vini albi ana quantum sufficit.

Herbę in pilo probę contusę, diebus octo ex uino albo macerantur, pluries agitantur, coquanturq;. Vino expresso, colatoq;, & lento igne cocto, dum tertia pars consumpta fuerit, oleum abietinum additur, deinde cera liquata, mox resina, & gummi, postea terebinthina. his iam paululum refrigeratis, reliqua trita, incretaq; adduntur, & manibus afsiduę subiguntur, dum totus humor exhalet: postremò lac caprinum ad formados globulos admiscetur: **B** medicamentum iterum manibus subigitur continuę. * Ad caluarię fracturas uniuendas, ossaq; carne contegenda, squamas ossium detrahendas, & ad ea quę in alto latent, foras euocanda efficax est: carnes amissas, durasq; restituit: ualde abstergit, digerit, & siccatur. Idem.

Emplastrum ex fermento.

℞. Mellis, fermenti ana ℔.j.

Visci quercini ℥.β.

Ammoniacci ex aqua sęnigręci, aut lacte Mori arboris ℥.iiij.

Fęcis olei ueteris quantum sufficit.

Fingatur emplastrum. * Ossa fractę caluarię, cerebri membranis etiam altius infixa, & spinas, furculosq; extrahit. Idem.

DE EMPLASTRIS ERODENTIBVS.

Emplastrum aperiens cutim.

℞. Rad. Bryonię, Hermodactylorum ana ℥.j.

Fęcis combustę, Stercoris columbę ana ℥.i.β.

Arsenici, Eruginis, Adipis Ranarum uiridium, Olei ueteris ana ℥.β.

Propoleos, Terebinthinę ana quantum sufficit.

Fiat emplastrum. Idem.

DE CATAPLASMATIS

CAPVT XXX.

Cataplasma est, quod e
plantis uiridibus contusis,
uel iisdem ad mollitudi-
nem usq; in aqua decoctis,
additis oleis, adipibus &
farinis: interdum sine o-
leis & adipibus paran-
tur. Horum autem alia

- Astringunt: ut {
Cataplasma ad uentris fluxum.
Cataplasma ad iecur inflammatum.
Cataplasma ad lienis inflammationem.
Cataplasma ad incipientem inflammationem.
Cataplasma ad sanguinis eruptionem e narib.
- Emolliunt: ut {
Cataplasma ad induratos tumores lienis
& iecoris.
Cataplasma emolliens & discutiens.
- Abstergunt: ut — Cataplasma detergens.
- Concoquunt: ut {
Cataplasma concoquens.
Cataplasma ad maturandos tumores.
Cataplasma suppuratorium.
Cataplasma concoquens & maturans, &c.
- Discutiunt: ut {
Cataplasma discutiens.
Cataplasma ad hydropem.
Cataplasma ad anginam.
Cataplasma ad auferentem inflammationem. B
Cataplasma ad inflammationem in statu.
Cataplasma ad inflammat. in declinatione.
Cataplasma ad parotidas ex frigore, &c.
- Attrahunt: ut — Cataplasma attractorium.
- Dolorem mitigant: ut {
Cataplasma ad dolores, & inflammatio-
nes partium externarum.
Cataplasma ad dolores articularum ex
materia calida.
Catapl. in dolore colico & nephritico.
Cataplasma ad dolorem oculorum.
Cataplasma ad dolorem uentriculi.
Cataplasma ad dolorem podagricum.
Cataplasma mitigatorium ad paroti-
das per initia.
Cataplasma ad inflammationem.
Cataplasma stupefaciens.
Cataplasma ad oculos refrigerans, &c.

DE CATAPLASMATIS ASTRINGENTIBVS.

Cataplasma ad uentris fluxum.

℞. Micæ panis tosti, & in aceto macerati ʒ. vj. Contundantur: cui adde,
Caryophyl-

A Caryophyllorum, Macis, Masticeis, Galangæ, Granorum Myrthi, Acinorum Vuarum, Balauftiorum ana \mathfrak{z} . β .

Olei Absinthij, Menthæ ana \mathfrak{z} . η .

Fiat cataplasma: applicetur supra uentrem. Rondeletius.

Aliud.

\mathfrak{z} . Prunorum syluestrium, Prunellorum ana \mathfrak{h} . β .

Decoquantur in aceto, per cribrum mittantur: & in colatura decoque-

Micæ panis fordidi \mathfrak{h} . j .

Fol. Absinthij puluerizati, Masticeis, Coralli ana \mathfrak{z} . j .

Santalorum omnium, Cort. Mali granati ana \mathfrak{z} . β .

Olei Rosati, Olei Citoniorum ana \mathfrak{z} . iiij .

Misceantur, & fiat cataplasma: quod applicetur supra uentrem serò cum ibit: dormitum. Idem.

Cataplasma ad iecur inflammatum.

\mathfrak{z} . Mali cotonei \mathfrak{z} . η .

Farinæ Hordeacæ, Farinæ Fœnigræci ana P. η .

In aqua decoquantur ad cataplasmatum formam. Andernacus.

Aliud.

\mathfrak{z} . Palmularum pinguium cōtularum \mathfrak{z} . j .

B Glaucij \mathfrak{z} . iiij ,

Croci \mathfrak{z} . j .

Farinæ Hordei P. j .

Coquantur modicè in aqua, fiatq; cataplasma. Idem.

Cataplasma ad lienis inflammationem.

\mathfrak{z} . Farinæ Hordei \mathfrak{z} . iiij .

Rosarum rubrarum P. ij .

Chamomillæ, Absinthij, Meliloti ana \mathfrak{z} . β .

Olei Rosati, Nardini ana quantum sufficit.

Misce, & fiat cataplasma. Si magnus fuerit calor, addè succum portulacæ, & foliorum salicis. Idem.

Cataplasma ad incipientem inflammationem.

\mathfrak{z} . Parietaræ, Atriplicis, Lactucæ, Cucurbitæ, Maluæ ana M. β .

Semperuuii P. j . Cort. Mali punici \mathfrak{z} . β .

Glaucij \mathfrak{z} . iiij . Farinæ Ho. dei \mathfrak{z} . η .

Decoquantur in aqua, quæ digitorum duorū instar illa superet, donec molliuscula fiat crassities: deinde linamento inducta, mēbro imponantur. Idem.

Cataplasma ad sanguinis eruptionem è naribus.

\mathfrak{z} . Boli Armeni, Sanguinis draconis ana \mathfrak{z} . ij .

Albuminis ouorum, Succu Plantaginis ana quantum sufficit.

Misceantur.

Misceantur, frontiꝝ & sincipiti applicentur: nec non testiculis, si masculus **A**
 fuerit: mammis autem, si fœminę sanguis per nares erumpat. Andernacus.

DE CATAPLASMATIS EMOLLIENTIBVS.

Cataplasma ad induratos tumores lienis & iecoris.

℞. Thymi, Pulegij, puluerizat. ana ʒ. j.

Fermenti ʒ. ij.

Aceti quantum sufficit.

Misce, & fiat cataplasma. Idem.

Cataplasma emolliens & discutiens.

℞. Maluę, Altheę cum rad. ana M. ij.

Flor. Chamomillę, Flor. Meliloti ana P. j.

Pulegij, Origani, Satureię ana M. j.

Coquantur in aqua, donec mollescant: deinde confusa in formam cata-
 plasmatis redigantur. Idem.

Aliud.

℞. Fol. Maluę, Altheę, Violarum ana M. j.

Rad. Altheę, item Liliorum alborum, Iridis ana ʒ. β.

Flor. Chamomillę, Flor. Meliloti, Comarum Aneti ana P. j.

Cumini ʒ. j.

Baccarum Lauri ʒ. ij.

Croci ʒ. j.

Adipis anatis, anseris, Medullę crurum uituli, Butyri recentis, Olei Irini,

Liliorum ana ʒ. β. uel quantum sufficit.

Fiat cataplasma. Andernacus.

DE CATAPLASMATIS ABSTERGENTIBVS.

Cataplasma detergens.

℞. Parietarię M. j.

Flor. Chamomillę, item Meliloti, Sambuci ana P. ij.

Fiat decoctio: in decoctione incorpora,

Farinę Fabarum, Farinę Hordei, uel Furfuris macri ana ℥. β.

Olei Chamomillę, Olei Amygdal. amararum ana ʒ. ij.

Pinguedinis gallinę ʒ. j.

Fiat cataplasma, permiscendo fecem decoctionis. Rondeletius.

DE CATAPLASMATIS CONCOQVENTIBVS.

Cataplasma concoquens.

℞. Rad. Bismaluę ℥. β.

Rad. Maluę M. j.

Panis candidi ℥. j.

Fiat de-

A Fiat decoctio: contundantur, & per cribrum transmittantur, fiatq; cataplasma. Rondeletius.

Aliud.

℞. Farinæ Triticæ ℥. j.
Sapæ ℥. iij.

Fiat decoctio: cui adde, Vitell. ouorum n. iij. Fiat cataplasma. Idem.

Cataplasma ad maturandos tumores inguinum, &c.

℞. Medullæ panis ℥. j.
Vuarum passarum sine acinis ℥. j.
Butyri recentis, Axungiæ ana ℥. vj.
Fermenti ℥. v.
Lactis uaccini ℥. ij.
Crocī ℥. j.

Fiat cataplasma, quo bis quotidie utendum. Andernacus.

Cataplasma suppuratorium.

℞. Farinæ Fabarum, Farinæ Triticæ ana ℥. j.
Farinæ sem. Lini, Farinæ Fœnigræci ana ℥. vj.
Ficum contusarum ℥. j. β.
Axungiæ ueteris ℥. ij.

B Crocī ℥. j.

Vitell. ouorum n. ij.

Fiat cataplasma. Andernacus.

Cataplasma concoquens & maturans.

℞. Radicum Althææ uel Maluæ ℥. β.
Foliorum Maluæ M. j.
Panis candidi ℥. j.

Fiat cataplasma. Rondeletius.

DE CATAPLASMATIS DISCVTIENTIB.

Cataplasma discutiens.

℞. Parietarizæ M. j.
Florum Chamomillæ, Meliloti, Sambuci ana P. ij.
Farinæ Fabarum, Hordei ana ℥. β.
Olei Chamomillæ, Amygd. amararum ana ℥. ij.
Adipis gallinæ ℥. j. Fiat cataplasma.

Cataplasma ad hydropem.

℞. Stercoris bouini ℥. j.
Stercoris caprini ℥. iij.
Anisi, Fœniculi, Carui ana ℥. β.
Fiat cataplasma. Rondeletius.

KK *Aliud.*

Aliud.

A

℞. Sulphuris vivi ℥.ij.
 Cumini ℥.j.
 Sem. Apij, Petroselini ana ℥.β.
 Cum excrementis cochlearum fiat cataplasma. Rondelētius.

Cataplasma ad anginam.

℞. Stercoris Hirundinum, uel Gallinarum, uel Canis ℥.iiij.
 Farinæ Fabarum ℥.ij.
 Olei Liliorum Chamomillæ ana ℥.iiij.
 Butyri recentis ℥.ij.
 Fiat cataplasma. Idem.

Aliud.

℞. Unguenti Dialthææ, uel
 Oesyphi ℥.iiij.
 Stercoris Hirundinum, uel Gallinarum ℥.vj.
 Misce, & fiat cataplasma. Rondelētius.

Cataplasma ad augetentem inflammationem.

℞. Rosarum rubrarum P.ij.
 Chamomillæ, Meliloti ana ℥.β.
 Semperuiui, Cucurbitæ, Lactucæ, Parietarix ana M.j.
 Cort. Mali punici, Rhus ana ℥.β.
 Farinæ Hordei P.ij.
 Ex aqua decoquantur omnia ad cataplasmatum spissitudinē. Andernacus.

Cataplasma ad inflammationem in statu.

℞. Lopathij, Parietarix, Chamæmeli, Meliloti ana M.β.
 Rosarum P.j.
 Palmularum n.x.
 Farinæ Hordei P.ij.
 Contusa decoquantur in aqua ad spissitudinem cataplasmatum. Idem.

Cataplasma ad inflammationem in declinatione.

℞. Althææ, Maluæ ana M.j.
 Flor. Chamomillæ, item Meliloti, Rosarum ana P.j.
 Rad. Liliorum alb. item Althææ ana ℥.j.
 Sem. Lini, Fœnigræci ana ℥.β.
 Ficus pingues n.x.
 Farfurum farinæ triticeæ P.ij.
 Contusa decoquantur in aqua ad crassitiem: deinde addito,
 Olei Chamæmelini, Adipis suilli ana ℥.j.β. Andernacus.

Cataplasma

A

Cataplasma ad parotidas ex frigore.

℞. Farinæ Foenigræci ʒ. iij.

Farinæ sem. Lini, Farinæ Erui ana ʒ. j. β.

Decoquantur ex uino tenui & calido, ad mediocrem spissitudinem: deinde addantur,

Olei Nardini, modicum: & Olei Cyprini parum, si hyems est. Idem.

Aliud.

℞. Stercoris caprilli ʒ. ij.

Decoquantur ex uino: mox adijciatur oleum ex lilio, & mel cum modica farina seminis lini. Idem.

DE CATAPLASMATIS ATTRAHENTIBVS.

Cataplasma attractorium.

℞. Flor. Chamomillæ P. j. β.

Farinæ sem. Lini, Farinæ Foenigræci ana ʒ. ij.

Rad. Iridis puluerizata ʒ. iij.

Stercoris columbini ʒ. j. β.

Adipis gallinæ ʒ. ij.

Olei Liliorum, Chamæmeli ana ʒ. j. β.

Fiat cataplasma. Idem.

B

DE CATAPLASMATIS DOLOREM

mitigantibus.

Cataplasma ad dolores & inflammationes partium externarum.

℞. Rad. Althææ ʒ. iij.

Maluæ cum rad. Violaria, Branchæ ursinæ ana M. j.

Flor. Chamomillæ, Flor. Violarum pulueriz. Furfuris ana P. j.

Fiat decoctio in brodio pingui, ut ueruecis: uel adde,

Axungia porci ʒ. β.

Contundantur omnia, & per cribrum transmittantur, & fiat cataplasma. Rondeletius.

Cataplasma ad dolores articulorum ex materia calida.

℞. Medullæ panis mediæ ʒ. j.

Decoquatur in lacte bubulo, è quo non sit extractū butyrū, q. s. Fiat cataplasma. Ad magnā sedationē doloris, oleū uiolatū ponendū: ad maiorē, oleum hyosciami: ad maximū, oleū mandragoræ, addendo modicum croci. Idem.

Aliud ex herbis.

℞. Solani, Violarum ana M. j. Flor. Hyosciami M. ij.

Flor. Violarum, Chamæmeli ana P. j.

Fiat decoctio in lacte, uel aqua. His cū axungia porci cōfusa & cribrata, croci ʒ. j. addito, fiat cataplasma. Rondeletius.

KK 2 Cata-

Cataplasma in dolore colico & nephritico.

A

℞. Stercoris bubuli ℥.ij.
 Vini, Mellis ana parum
 Fiat cataplasma. Rondeletius.

Aliud fortius.

℞. Stercoris Bouis ℥.j.
 Stercoris Capræ ℥.iij.
 Sem. Anisi, item Fœniculi, Carui ana ℥.β.
 Mellis parum. Misce, & fiat cataplasma. Idem.

Cataplasma ad dolorem oculorum.

℞. Pomorum acidorum n. iij.
 Decoquantur in aqua peculi rosarum, amotis seminibus & cortice, & duro
 quod inest: contundantur, & facto cataplasmate applicetur frigidè supra pal-
 pebras. Rondeletius.

Aliud eiusdem.

℞. Panis syncomisti ℥.β.
 Temperetur in lacte, & parum coquatur, fiatq; cataplasma.

Aliud.

℞. Portulacæ M.ij.
 Contusa diligenter apponantur supra partem affectam. Eodem modo fieri
 possunt ex plantagine & solano. Idem. B

Cataplasma ad dolorem uentriculi.

℞. Rosarum rubrarum P.ij.
 Carnis Cotoneorum, Palmularum ana ℥.β.
 Absinthij Ponti, lunci rotundi sicci, Oenanthæ ana M.β.
 Ex uino rubro incoquantur: deinde addantur,
 Polentæ ℥.ij.
 Rursus coquantur: postea adde,
 Masticis ℥.ij.
 Olei Melini ℥.ij.
 Fiat cataplasma. Andernacus.

Cataplasma ad dolorem podagricum.

℞. Farinæ Hordei P.ij.
 uel Calsiæ fistularis ℥.ij.
 Diluito oleo costino, uel succo, aquaue solani, aut plantaginis. Andernacus.

Aliud prestantissimum, eiusdem.

℞. Micæ panis secalini ℥.iij.
 Macerato in lacte bubulo, & modicè coquito: deinde addito,
 Vitellorum ouorum n.ij.

Croc

A Croci ℥.j. Fiat cataplasma.

Cataplasma mitigatorium ad parotidas per initia.

℞. Farinæ Frumenti, uel Farinæ Hordei, uel Farinæ sem. Lini P. ʒ.
Ex multa redigantur in cataplasma. Andernacus.

Aliud eiusdem.

℞. Althææ, Chamæmeli ana M. j.

Decoquito, & iuri, farinam hordeaceam instar P. ij. misceto.

Aliud eiusdem.

℞. Cremoris Lini, item Fœnigræci ana ʒ. ij.

Vitell. ouorum n. ij.

Butyri recentis ʒ. j. β.

Olei communis loti in aqua calente ʒ. ij.

Mixta omnia membro dolenti admouentur statim.

Cataplasma ad inflammationem.

℞. Succu Semperuiui ℥. j.

Vini crassi acerbi ℥. β.

Farinæ Hordei ʒ. iij.

Corticis Mali granati, Sumach ana ʒ. β.

B Misce, & fiat cataplasma. Rondeletius.

Cataplasma stupefaciens.

Ad sensum stupefaciendum ex pomis mandragoræ decoctis in lacte, uel
folijs hyosciami eodem modo coctis fiat cataplasma, addendo parum croci.
Rondeletius.

Cataplasma ad oculos refrigerans.

℞. Succu Semperuiui ℥. j.

Vini crassi acerbi ℥. β.


Farinæ Hordei ʒ. iij.

Corticis Mali punici, Rhus ana ʒ. β.

Fiat cataplasma. Idem.

DE CERATIS CAP. XXXI. A

Ceratum à cera nomen
habet, & ex speciebus pau-
lo crassioribus & oleis cõ-
ponitur, & cum cera aut
resina terebinthina, aut u-
trisque simul in solidiorem
consistentiam coit. Horum
autem alia alterant qua-
litate



DE CERATIS CALIDIS. B

Ceratum stomachale, Galeni.

℞. Rosarum rubrarum, Masticis ana ʒ. xx.
Foliorum Absinthij siccorum ʒ. xv.
Spicæ nardi Indicæ ʒ. x.
Cera ʒ. iij.
Olei Rosati lb. j. β.
Aquæ rosarum q. s. ad lauandum.
Vini ueteris austeri, Succu Citoniorum ana q. s. ad lauandum.
Aceti parum.

Omnia tenuissimè terantur: cera & oleum igne lento liquentur, & aqua rosarum diu lauètur: liquentur iterum, & lauentur uino, succo & aceto: pòst misce reliqua, & fiat ceratum. * Ventriculum & hepar roborat: horum dolorem à frigido lenit, appetentiam excitat, coctionem iuuat. Mefues.

Ceratum Andromachi.

℞. Styracis ʒ. β.
Masticis ʒ. j. β.
Folij, Spicæ nardi Indicæ ana ʒ. iij. β.
Euphorbij ʒ. iij.

Cinnamo-

A Cinnamomi ʒ. vj.

Ceræ albæ ʒ. xx.

Olei Balanini ʒ. viij.

Olei Balsami ʒ. xv.

Fiat ceratum. * Ventriculū frigidum roborat, ne excrementa aliarum partium tam promptè recipiat: affectus neruorum & iuncturarum frigidos, ut duritiem, dolores, tumores, quos dissoluit, si digeri sunt habiles: aut coquit, aut suppurat, si maturari possunt. Mesues.

Ceratum de euphorbio.

℞. Olei Cinnamomi, uel olei antiqui ℔. j.

Ceræ flauæ ʒ. ij.

Euphorbij recentis ʒ. j.

Fiat ceratum. * Pro parte conuulsa mirabile est. Mesues.

DE CERATIS FRIGIDIS.

Ceratum infrigidans, Galeni.

℞. Ceræ albæ ʒ. ij.

Olei Rosati Omphacini ʒ. iij.

B Conquassentur simul cum modico albi & clari aceti. Oleum uerò omphacinum antequam rosas recipiat, sæpius est lauandum cum aqua fontis gelidissima: deinde confice secundum artem. * Refrigerat febres ardentes, calorem hepatis, & sedat dolores capitis, circum tempora, super hepar, & per spinam dorsi linitum. Mesues.

Ceratum santalinum.

℞. Rosarū ʒ. xij.

Santali rubri ʒ. x.

Santali albi, Citrini ana ʒ. vj.

Boli Armeni ʒ. vij.

Spodij ʒ. ℞.

Caphuræ ʒ. ij.

Ceræ albæ ʒ. xxx.

Olei Rosati ℔. j.

Confice secundum artem.

* Phlegmonas & intemperaturas omnes calidas uentriculi, hepatis, & partium aliarum potentissimè extinguit. Mesues.

Ceratum à cerussa.

℞. Cerussæ ℔. j. ℞.

Olei Rosati ℔. ij.

Ceræ candidæ ʒ. iij.

Cera in oleo liquata, adde cerussam tenuissimè læuigatam, & semper agitando co-

do coquantur donec nigrescant. * Sanat ambusta, erysipelata, scabiem sic. A
cam, & ulcera calida.

DE CERATIS EMOLLIENTIBVS.

Ceratum diapente.

℞. Ceræ flauæ ℥. iij.
Styracis liquidi ℥. iij.
Terebinthinæ ℥. j.

Muccaginis ichthyocollæ, uel Gūmi Hederę, Olei Irini ana quātū sufficit.
Misce, & fiat ceratum secundum artem. * Spasmm & neruorum iunctu-
rarum q; tumores duros & nodosos lenit. Mesues.

Ceratum Alexandri.

℞. Comarum Absinthij, Thuris ana ℥. x.
Hammoniacy, Styracis, Calamitæ ana ℥. xij.
Spicæ nardi ℥. iij.
Ceræ ℥. iij.

Olei Chamæmelini quantum sufficit.

Hammoniacum & thus uino horis 24. macerentur: oleum & cera liquetur
igne: reliqua trita & creta inspergantur. * Ventriculum & uentrem reli-
quum inferiorem roborat, ab hisq; duritiem dissipat. Mesues.

Alterum eiusdem.

℞. Castorij, Euphorbij Piperis longi, nigri, ana ℥. j.
Hammoniacy, Opopanacy, Galliæ ana ℥. j. β.
Medullæ cruris cerui, item cruris uaccæ ana ℥. ij.
Terebinthinæ ℥. vj.
Styracis liquidi ℥. j.
Adipis Gallinæ, item Anatis, Anseris, Porci ana ℥. j. β.
Ceræ ℥. j.

Olei ueteris, item Nardini, Irini, Laurini, Chamæmelini, Leucoij lutei,
Naphthici ana ℥. viij.

Olei Balsami ℥. iij.

Vini ueteris q. s. ad macerandum.

Oesyphi ℥. iij.

* Valenter scirrhus dissipat articulorum, & neruorum omnium, dolores &
affectus diuturnos à frigido natos, & contractiones, & paralyfin, & torturâ.

Ceratum è styrace, magistrale.

℞. Styracis liquidi ℥. iij.
Ceræ flauæ ℥. ij.
Thuris, Myrrhæ ana ℥. j.

Fiat ceratū secundū artem. * Neruorū iuncturarum q; tumores duros lenit.

Ceratum

A

Ceratum Gratia Dei.

℞. Galbani, Opopanacis, Æruginis, Thuris, Aristolochiæ longæ, Masti-
ches, Myrrhæ ana ʒ. j.

Hammoniæ ʒ. j. ʒ. ʒ.

Ceræ ʒ. viij.

Lithargyri, Olei communis ana ʒ. xvij.

Bdellij ʒ. ij.

Lapidis Calaminaris, Lapidis Hæmatitis ana ʒ. j.

Olei Absinthij ʒ. iij.

Terebinthinæ ʒ. vj.

Fiat ceratum. * Mollit, terget, glutinat.

Ceratum Oxycroceum.

℞. Croci, Picis nigræ, Picis Græcæ, Ceræ ana ʒ. iij.

Terebinthinæ, Galbani, Hammoniæ, Myrrhæ, Thuris, Mastiches ana
ʒ. j. ʒ. iij.

Galbanum & hammoniacum in aceti sufficienti quantitate dissoluantur: co-
que dum dissoluta sint: cola, & rursum coque, donec acetum in uaporem eua-
nerit: tunc adde picem, ceram, terebinthinam liquata: deinde mastiches,
thuris, myrrhæ puluerem tenuissimum, continenter miscendo donec perco-
cta sint ad cerati crassitiem. Infunde in aquam frigidam, exime, preme, & in
tabula marmorea oleo laurino inuncta extende: postremò crocū in tenuissi-
mum puluerem redactum admisce: fiat ceratum. * Prodest ossibus fractis,
item partibus, quæ dolore aliquo affliguntur: duritiem deniq; omnem emol-
lit & discutit. Nicolaus.

B

Ceratum asypatum Galeni.

℞. Ceræ flauæ ʒ. iij.

Olei Chamæmelini, Irini ana ʒ. vj.

Masticis ʒ. j.

Spicæ nardi ʒ. ij. ʒ.

Croci ʒ. j. ʒ.

Terebinthinæ ʒ. j.

Resinæ ʒ. ʒ.

Oesyphi ʒ. lxxx.

* Emollit & digerit tumores duros hepatis, splenis, uteri, neruorū, iunctu-
rarum, & aliarum partium: estq; anodinum. Mesues.

Ceratum asypi Philagrii.

℞. Croci ʒ. v.

Bdellij, Masticis, Hammoniæ, Aloes, Styracis liquidi ana ʒ. vij.

Ceræ flauæ ʒ. j. ʒ.

LL Olei

Olei Nardini quantum sufficit.
 Bdellium, hammoniacum, aloe dissoluantur in aqua, in qua foenum graecum
 & chamamelum sunt macerata: cum alijs misceantur in unguentum. Post
 Philagrium addiderunt;

Succi Squillæ ʒ. iij.

Sepi vitulini ʒ. xv.

Thuris ʒ. j.

Ceræ quartaria iij.

* Ad eadem potens. Mesues.

Ceratum œsypatum Pauli.

ʒ. Hammoniæ ʒ. x.

Bdellij ʒ. v.

Styracis liquidi, uel Myrrhæ stactis ʒ. β.

Croci ʒ. j. β.

Aloes, Mastiches, Thuris ana ʒ. ij. β.

Ceræ ʒ. ʒ.

Sepi, Medullæ uituli ana ʒ. ij.

Œsypi ʒ. xl.

Olei Irini quantum sufficit.

Confice secundum artem. * Idem pollet. Mesues.

DE CERATIS CONSOLIDANTIBVS

& glutinantibus.

Ceratum ex pelle arietina.

ʒ. Lithargyri, Lapidis Hematidis, Sanguinis draconis, Boli Armeni, Opij,
 Mastiches, Hammoniæ, Mumiæ, Galbani, Thuris, Costi, Lumbricorum
 ana ʒ. β.

Picis nigræ, Græcæ, Ceræ albæ, rubræ ana ʒ. j.

Rad. Consolidæ maioris, Minoris ana ʒ. iij.

Rosarum rubrarum, Myrrhæ, Aloes ana ʒ. xvij.

Succi Hypocistidis, Gallarum immaturarum, Balauftiorum, Aristolochiæ
 rotundæ ana ʒ. vj.

Visci quercini, Terebinthinæ ana ʒ. ij.

Sanguinis hominis rufi ʒ. ix.

Fit autem in hunc modum. Pellem arietinam integram cum omnibus pilis
 coques in aqua, donec ferè omnino dissoluta sit in lentorem quèdam: quem
 colabis. Huius colaturæ sume ʒ. j. immitte in vas nouū, in quo uiscus liqua-
 bis igni lento, rudicula semper agitando: iniice deinde lumbricos, postea ce-
 ram, terebinthinam, & mastichen: his liquatis adde gūmmi aceto dissoluta,
 & coque ad cerati crassitiem: postremò iniice quæ terenda sunt probè trita:
 probè

A probè misceto, & confice magdalias. * Magnæ est efficaciz in rupturis. Arnoldus de Villa noua.

Ceratum è betonica.

℞. Terebinthinæ, Resinæ pini, Cerae flauæ ana ℥. iij.

Betonicæ pulueratæ ℥. j.

Masticis, Thuris ana ℥. β.

Mumiæ ℥. iij.

Misce, fiat malagma. * Ad capitis uulnera utile est. Carpenfis.

Ceratum capitale.

℞. Terebinthinæ, in uino maluatico sapius lotæ, Resinæ pini, Cerae albæ ana ℥. iij.

Mumiæ ℥. j. β.

Terebinthina, resina, & cera liquatis, adde mumiã leuissimè tritam: coque igni, semper mouendo: deinde iniice in uas argenteum, aliud' ue tersum, in quo habeas aceti rosati è uino maluatico ℔. iij. Maceretur horis uiginti-quatuor: deinde manu exprime, donec acetum sit excolatũ: repone uase uitreo. Carpenfis.

Ceratum uiride Machæronis.

℞. Olei Rosati Omphacini ℥. vj.

B Aristolochiæ, Galbani, Opopanacis, Hammoniæ, Æruginis, Myrrhæ, Iris ana ℥. j.

Terebinthinæ ℥. vj. β.

Cerae tantundem. Fiat ceratum. * Ad omnia recentia uulnera: conglutinat, & phlegmonem arceat, ubi contusio fuerit: rabiosi canis morsum curat: item ad aurium, naturaliumque & narium ulcera facit: in ofsibus denudatis carnem producit. Galenus.

DE DROPACIBVS

CAP. XXXII.

Dropax Latinis Picatio, à pice uocata est, qua mēbra externa omnia, extenuata, resoluta, frigida & humida oblini solent.

Dropax simplex.

℞. Picis quantum sufficit.

Olei communis, uel Terebinthinæ parum.

Liquentur simul, & fiat dropax. * In extenuatis commodissimum est. Cal facit & humectat, sanguinemque ad partes membrorum emaciatas attrahit, reficitque. Quinetiam ijs, qui cibum solent reuomere, & cruditatem experiri: itē cæliacis, & alijs alimentum non sentientibus conuenit.

LL 2 Dropax

Dropax compositus.

℞. Picis, Ceræ, Colophonæ ana ʒ. iij.

Nitri ʒ. j. β.

Bituminis ʒ. j.

Sulphuris uiui ʒ. iij.

Piperis, Euphorbij, Adarcæ ana ʒ. ij.

Cantharidum ʒ. β.

Olei Cyprini ʒ. j.

Fiat dropax. * Diuturnis uitijs conuenit, & ante sinapismum corpus præparat: post illum autem morbi reliquias discutit. Aëtius.

DE SINAPISMIS

CAP. XXXIII.

Sinapismus nihil aliud est, quàm cataplasma, aut emplastrum ex sinapi confectum: qualia sunt rubificantia, &c.

Sinapismus Aëtij.

Ficus pingues in aqua tepida pridie macerentur: in sequenti die ualenter expressæ, læuigetur curiosus: deinde acre sinapi priuatim teratur, interque terendum paululum ex diluto illarum affundatur, quo commodius hoc teri possit, sic tamen, ut non aquosum fiat. postea utraq; seorsim in massas redigatur, & inter se commisceantur, prout usus requiret. Nam si ualentem sinapismum inducere uoluerimus, duas partes sinapis cum una ficu temperabimus: sin imbecillem, unam ficu cum duabus sinapis miscEBimus: si mediocrem, æquales utriusque portiones commitemus. In delicato & tenero corpore, externoq; affectu, panis uice caricarum sinapi admisceri potest, aut id prius in aceto macerari. nam hoc illius efficaciam imminuit.

* Omnibus diuturnis affectibus prodest, ut comitali, uertigini, cephalæ, hemicranæ, arthritidi, coxæq; dolori, & alijs, qui ex frigidiore materia proueniunt.

Sinapismus alius.

℞. Olei Costini ʒ. j.

Olei è Castorio, Olei Euphorbij ana ʒ. j. β.

Sinapis ʒ. ij.

Castorei ʒ. j.

Euphorbi ʒ. j.

Sagapeni ʒ. j. β.

Aceti ʒ. j. β.

Cum cera quantum satis est ad emplastri consistentiam. Fuchsius.

DE CE

A DE CERIS TINGENDIS
SEV COLORANDIS. CAP. XXXIIII.

Cera alba quomodo fiat.

℞. Cerae quantum satis est.

Aquæ claræ part. ij.

Misceantur duo hæc, & calefiat aqua ad ignem clarum, usquequò cera sit liquefacta: deinde paululum permittatur quiescere, donec tota cera natet super faciem aquæ: deinde accipe uas aliquod uitreatum, cuius pars exterior sit lenis, in adfacid in aqua frigida: deinde infundatur ferè medietas eius in cera liquefacta, & extrahe cum cera, quæ sibi adhæret, & permitte ceram illâ infrigidare: deinde separa eam à uase, & tantum hoc facias, quoad tota cera ab aqua fuerit extracta: deinde dictam ceram taliter formatam, soli exponas, & rori in mense Maij, & illam sæpe uoluas, & tandiu permittatur, donec fiat alba, ut cerussa. Sunt qui ceram dealbant tribus diebus, seruando prædictum modum. Verum id faciunt Iulio mense, quando sol est in maiori calore. Et quia cera facilè à solis calore liquefcit, aqua munda frigida bis in die aspergenda est. Theſaurus Aromatariorum.

Modus alius dealbandi ceram.

B ℞. Cerae quantum uolueris. Aquæ claræ part. ij.

Bulliant simul, & coquantur, donec nigrescat aqua. Et tunc proijce aquâ illâ, & pone aliam, & ita sæpe fiat, donec fiat alba: deinde collige ceram, & reserua. Theſaurus Aromat.

Cera flaua quomodo fiat.

℞. Cerae flauæ lb. j.

Terebinthine puræ ℥. iij.

Liquentur simul supra carbones. Quidam addūt puluerem curcumæ. quod non opus est, si cera cruda per sese elegans sumatur. Colonienſes.

Cera rubra quomodo tingenda.

℞. Cerae puræ lb. j.

Terebinthine puræ ℥. iij. in æstate: in hyeme uerò ℥. iij.

Cinnabaris super lapidem pictorum bene triti, Olei communis ana ℥. j. Liqueſiant cera & terebinthina, ad ignē: deinde remoueantur, & post aliquam infrigidationem, addatur oleum & cinnabaris simul trita, beneq; simul misceantur, & in formulas sculptas fundatur. Quidam minium ponunt, quod tamen non ita eleganter tingit, sed minore quantitate: alij utrunque. Theſaurus Aromat.

Cera uiridis quomodo fiat.

℞. Cerae nouæ lb. j.

LL 3

Viridis

Viridis æris triti ℥.j.
 Olei oliuarum ℥.j.
 Terebinthinæ ℥.iiij.

Liquefiat cera & terebinthina, & post aliqualem in frigidationem, addatur uiride æris, & oleum, & bene misceantur: deinde fundatur in formulas sculptas, & madida spongia humectatas. Sed prius spuma auferatur candente carbone, uel cerea candela ardente admota: ita enim absuntur spuma. Cauendum autem, ne uel carbo in ceram incidat, uel cinere cera inficiatur. Thefaurus Aromat.


Cera nigra quomodo facienda.

℞. Ceræ nouæ lb. j.
 Terebinthinæ ℥.iiij.

Terræ nigre trite. Olei communis ana ℥.j.

Liquefiat cera & terebinthina, & post aliqualem in frigidationem addantur terra nigra, & oleum, & fiat ut supra. Thefaurus Aromat.

DE SALIBVS CAP. XXXV.



DE

A DE SALIBVS PURGANTIBVS PER TVSSIM.

Sal hypericonis.

Hypericonis plantam siccam in cinerem redige super foco: cinerem proijce in aquam feruentem, & decoquantur, & partes terrestres ad fundū descēdunt. Postea aqua in cucurbita in balneo Mariæ consumatur, & remanebit in fundo eius sal: quem exicca bene. * In pleuritide probatissimū est. Datur patienti in uino calido, quantum dimidio cortice nucis auellanæ contineri potest. Euonymus.

Sal polypodij.

℞. Polypodij quantum sufficit.
Extrahatur eorum aqua per balneum Mariæ: fæces reliquæ in fundo calcinantur in furno reuerberationis: cum aqua propria fiat filtratio calcis sæpissimè: aqua filtrata ponatur in pelui ad solem, uel cinerem calidum, ut aquo fitas exhalet, & sal remaneat. * Pleuritidi prodest. Idem.

DE SALIBVS PURGANTIBVS PER VRINAM.

Sal chamomille.

℞. Chamomillæ quantum satis est.
Exure in foco ab omni sorde scopis mundato (aliqui prius insolant, alij in umbra desiccant.) Modus ustionis est, quousq; ambusta in quodam uelut pane cohæreat: sed si ultra progrediaris urendo usque ad incinerationē, maiorem salis mensuram consequeris. Postea in fictili plumbato aquā huic pani uel cineri clarā, limpida mōq; superfunde, & igni, ut aliquot horis effervefeat, ad moue: demum effunde in aliud uas, ubi resideat, fæcibus relictis: tandem transige per pannum lineum, & quod transactū erit, igni redde lento paucorū carbonū, quo exhalet aqua, sal in fundo subsideat. * Difficultati urinæ prodest, si pugillus unus ex uino calido exhibeatur. Leo Suauius.

Sal absinthij.

℞. Absinthij recentis quantum sufficit.
Tere, distilla aquam per alembicum, calcina fæces uase clauso igne medio-cri, quousq; in cinerem siccū uertantur. Sitq; ignis cautio, ne materia priuatur propria & radicali humiditate, quæ non posset amplius nisi uitrificatoriā dare fusionem. Redde aquam suæ terræ, inhuma in simo uel balneo aliquot dies, effunde cautè, ne fæces turbetur, deinde filtra, postremò euapora filtrationem. * Omnibus ferè morbis exhibetur utiliter, præsertim in peste. Aquam intercutem educit: urinam mouet: uentriculum corroborat. Idem.

Sal gentianæ.

Sal gentianæ eodem modo, quo absinthij, fit. * Febribus omnibus conducit: uiscerum obstructions aperit, expurgat: urinam & menses mouet.

Sal.

Sal graciolæ.

℞. Graciolæ quantum sufficit.

Exure in foco, uel in fictili obturato, longo & ualidissimo igni, donec in cinerem albiſſimū redigatur. Poſtea in aqua pluuiæ uel ſtillatitiæ fac efferueſcat in uaſe uitreo, locato in fictili cinerum pleno, & efferueſcat uſque ad conſumptionem quartæ partis aquæ. Deinde ſubſidat aliquo tempore, effundatur in uas aliud uitreum amplum, in quod immittas linguas ſetri noui puriſſi, per quas aſcendet aqua clara ſalfa, deſcendetq; in alia uafa recipiendi. Vbi ceſſauerit filtratio, euapora illam igne ſuaui in uaſe uitreo, & ſal reſtabit in fundo clarum ſincerumq;. * Hydropi medetur. Idem.

Sal ononidis.

Sal ononidis eodem modo fit quo graciolæ ſal, uel abſinthij, uel chamomillæ. * Calculos comminuit, expellit, urinæq; difficultati ſuccurrit.

Sal geniſtæ.

Sal geniſtæ fit, ut chamomillæ uel abſinthij. * Calculos frangit, expellit, & urinam mouet.

Sal ſtipitum fabarum.

Sal ſtipitum fabarum conficitur, ut chamomillæ. * Vrinæ difficultati ſuccurrit: calculos frangit, expellitq;.

Sal è baccis & ligno iuniperi.

℞. Virgulta iuniperi arida, unâ cum ſuis baccis, in magna quantitate, & in cinerem combure exactiſſimè. Cum hoc cinere fiat lixiuim cum aqua mediocriter calida: aut poteſt in uaſe ligneo cinis cum aqua relinqui, ut ſubſideat, ac poſtea aqua ſeorſim effundi, & cinis cum aqua turbida ſeparari. His aqua alia affundenda, idq; aliquoties, quoad nullus ſapor lixiui in aquam deponatur, ac poſtea aqua decoctione conſumenda, ad exiccationem materiæ, & eiufdem albedinem. Odone refert boracem & urinam: acris eſt, & penetrans, Geſnerus.

DE SALIBVS PURGANTIBVS

per uterum.

Sal arthemifæ.

Sal arthemifæ fit, ut chamomillæ. * Candidus & purus eſt, nec non, ut ſeuum, pinguis: menſes mouet. Euonymus.

Sal meliffæ.

Sal meliffæ paratur eodem modo, quo abſinthij ſal. * Menſes mouet: uterum expurgat: ſuffocationi uteri ſuccurrit.

Sal chelidonij.

℞. Radices chelidonij mūdadas à terra ſine ablutione quātū uolueris, tere diligenter

A diligenter in pila marmorea: pone in uase circulationis per diem naturalem, de super infunde aquam ardentem: postea sine per noctem in balneo Mariæ stare: demū mane extrahere sine ulla expressione. Postea fac ut separetur (exuperet) aqua ardens destillando, ut moris est, & colligatur. Et cum tota aqua ardens per balneum Mariæ fuerit resoluta, in fundo uasis remanebit puluis citrinus: quo utere: pro qualibet dosi ℥.j. cum uino albo, loco & tēpore necessario. * Menses euocat. Euonymus.

DE SALIBVS PURGANTIBVS PER SVDOREM.

Sal ligni guaiaci.

Sal ligni guaiaci fit ut hypericonis, uel chamomillæ, uel graciolæ. * Luem ueneream curat.

DE SALIBVS DOLOREM SEDANTIBVS.

Sal sanguinis humani.

Sanguinem in fictili, operculo suo clauso, exure longo & ualido igne, donec in cinerem redigatur. Postea cinis in aqua pluuia efferuescat, fiatq; sal: ut in graciolæ sale antea dictum est. * Vesicæ, articulorumq; morbis, ut chira-græ, gonagræ, & podagræ medetur.

Sal sanguinis ceruini & hircini eodem modo fit, ad eademq; ualet.

DE SALIBVS ERODENTIBVS.

Sal alkali.

B Fiat fossa, cui transuersim imponantur ligna, quibus supponatur aceruum herbæ Kali, & accenso igne, fiat, ut in foueam stillet liquor ex herba: qui liquor tandem concreuit, & fit sal alkali, coloris partim nigri, partim cineritij, ualde acris & salus, ut etiam corrodat. Ioannes Bauhinus.

DE ANTIMONII PRAEPARATIONE CAP. XXXVI.

Vitrum Antimony.

℞. Antimonij crudi lb. ij. uel iij.

Contere super lapide minutissimè: contritum immitte in fictile latum, non obductum uitro, atq; admoue ad ignem lentum, ut ita mundificetur, ac agitetur continuè cum spatula ferrea, uel cochleari ferreo, donec incipiat ueluti conglobari: tum remoueat, & rursus super lapide, ut antè, cōminuatur, iterumq; igni admoueat: fiatq; hoc per tot uices, donec puluis cineris subalbidi formam adipiscatur, puto decies, uel duodecies, uel amplius. Postea immittatur in crucibulo, quali utuntur aurifabri (ego aliquando ℥.j. salis ammoniaci addidi) & cooperiatur, inq; copiosum ignem immittatur, atq; obruatur ita, ut carbones trium digitorum altitudine excedant ipsum crucibulum: ita liquabitur, & coquetur sufficienter inter dimidiæ horæ spacium:

MM

postea

642 DE PILVLIS SEV CATAPOTIIS.

postea eximatur, & in pelui aurichalcea tenuiter diffundatur, & refrigeretur: ^A
 & habebis vitrum antimonij, quod hyacinthi instar pellucet. Datur à granis
 tribus usq; ad nouē uel decem, cum equali mensura gummi tragacanthæ, &
 sacchari sufficere quātitate, in forma uel tabularum, uel electuarij, uel pulue
 ris, &c. * Tertianā febrī à stomacho laborātib. pdest, nec nō colicis. Euonym.

SULPHVR SVBLIMATVM, SEV
 FLORES SVLPVRIS. CAP. XXXVII.

Sulphur à fordibus probè repurgatum, chalcanto in calcem redacto, &
 sale torrefacto commiscetur, inditurq; uasi, & ex arena calida urgetur,
 dum flores appareant citrini: qui per se, uel in oleum reducti & exhibi-
 ti, plurimorum morborum medicina existunt. * Colicam, & membrorum
 resolutionem peculiari quadam facultate sanant. Andernacus.

DE PILVLIS, SEV CATA-
 POTIIS. CAP. XXXVIII.

Catapotia medi-
 camenta sunt, quæ
 deolutiōdo sumun-
 tur. Latini à par-
 ue pile similitudi-
 ne, pilule dicuntur.
 Porro pilularū alia

- Astringunt: ut — { Pilulæ ex bdellio.
 Pilulæ ad defluxiones tenues.
 Pilulæ ad fluore & raucitatē arteriæ.
 Pilulæ hypoglottides astringentiæ. ^B
- Aperiunt: ut — { Pilulæ ad iecoris obstructiones.
 Pilulæ ad lienem obstructum, &c.
- Abstergunt: ut — Pilulæ ad renum, & uesicæ ulcera.
- Alterāt, hoc est,
 Vrinæ & men-
 strua mouent: ut — { Pilulæ ad urinas & menstrua prouo-
 canda.
 Pilulæ ad urinam.
 Pilulæ ad matricem.
- Calculum comminuant: ut — Pilulæ ad calculos.
- Dolorem mitigant: ut — { Pilulæ ad dolorem nephriticum.
 Pilulæ colicæ.
 Pilulæ opiatæ.
 Pilulæ ex opio.
 Pilulæ ex cynoglossa.
 Pilulæ ex plantagine.
 Pilulæ ex styrace.
 Pilulæ harmoniæ.
 Pilulæ scribonij, &c.
- Purgant. Vide in sequentibus signum. ^A

A

- Capite: ut {
 - Pilula aurea.
 - Pilula Arabica, &c.
- Bile ex {
 - Hepate: ut {
 - Pilula ad bilem.
 - Pilula ad febres.
 - Pilula ex rhabarbaro.
 - Pilula Sabellia.
 - Pilula de eupatorio, &c.

- Capite: ut {
 - Pilula cochia.
 - Pilula hierę cum agarico, Antonij.
 - Pilula ex colocynthide.
 - Pilula Alhandal.
 - Pilula ex sex rebus.
 - Pilula ex octo rebus, &c.

- Pectore: ut {
 - Pilula hierę cum agarico.
 - Pilula ex agarico.
 - Pilula bechica, &c.

B

- Simpli-
ces: vide-
licet {
 - Pitui-
tam ex {
 - Stomacho: ut {
 - Pilula alephangina.
 - Pilula ante cibum.
 - Pilula mastichina.
 - Pilula stomachica.
 - Pilula ex turbith.
 - Pilula communes.
 - Pilula contra pestem, &c.

- Iuncturis: ut {
 - Pilula de hermodactylis.
 - Pilula arthritica.
 - Pilula foetida.
 - Pilula ex sagapeno.
 - Pilula ex opopanace.
 - Pilula de sarco colla.
 - Pilula benedicta, &c.

A.
Pilula
purgatet
humores

- Melancholiam ex
hepate & splene: ut {
 - Pilula ex fumaria.
 - Pilula Indæ.
 - Pilula de lapide lazuli.
 - Pilula de lapide Armeno, &c.

- Serum: ut {
 - Pilula de Mezæreo.
 - Pilula de euphorbio, &c.

Mixtos. Vide in sequentibus sub signo B.

MM 2

Pilu-

		<ul style="list-style-type: none"> Pilulæ sine quibus. Pilulæ lucis maiores. Pilulæ lucis minores. Pilulæ cochix, &c. 	A	
B. Pilulæ pur- gates humo- res mixtos, &c.	Capite: ut			
	Stomacho: ut	<ul style="list-style-type: none"> Pilulæ de hiera simplici, Gal. Pilulæ assaeret. Pilulæ ex turbith. Pilulæ de aloë & mastice. Pilulæ imperiales. Pilulæ pestilenciales. Pilulæ aureæ ex turbith, &c. 		
	Hepate: ut	<ul style="list-style-type: none"> Pilulæ de tribus. Pilulæ ex halicacabo, &c. 		
	Toto: ut	—	Pilulæ aggregatiuæ, &c.	

DE PILVLIS ASTRINGENTIBVS.

Pilulæ ex bdellio.

℞. Bdellij ʒ. j. β.

Myrobal. Chebularum, Indarum, Belliricarum, Emblicarum, Cõcharum, uenerearum uistarum, Charabæ ana ʒ. ij. β.

Ammi ʒ. iij.

Succi porri quantum sufficit.

Excipiantur. Annum durant. * Ad fluxum hæmorrhoidum & ulcerum in eis, & ad menses immodicos. Mesues.

Pilule ad defluxiones tenues, in articulos & ulcera pulmonum.

℞. Tragacanthi, Gummi Arabici ana ʒ. j.

Amyli ʒ. β.

Thuris, Styracis ana ʒ. j.

Myrrhæ, Succi Glycyrrhizæ ana ʒ. ij.

Opij ʒ. j.

Sapa excipiantur, formenturq; catapotia decem, quæ drachmam pendeant.

Ex his duo uel tria longissimè à cibo dormituris exhibentur. Rondeletius.

Pilule ad fluorem & raucitatem arteriæ.

℞. Glycyrrhizæ purgatæ & lotæ ʒ. β.

Tragacanthæ ʒ. iij. Croci ʒ. j.

Gummi Arabici, Resinæ terebinthinæ ana ʒ. ij.

Pulpæ uuarum passarum, acinis exemptis ʒ. β.

Gummi & tragacanthum in uino Cretico, uno die & nocte macerentur: post-
tridie in mortario mûdo pila cõtundantur, inde glycyrrhiza & crocus con-
trita.

A trita adijciantur: postremò terebinthina & pulpa uuarum addatur, fiantq; pilulæ ad fabæ magnitudinem, & dentur sub lingua tenédæ, donec in liquorem resoluantur. Andernacus.

Pilula hypoglottides astrictorie.

℞. Acaciæ ʒ.β.

Hypocistidis, Boli Armeni, Terræ sigillatæ ana ʒ. j.

Rosarum, Spongiæ, Spinę albę radice, Rad. Bistortę ana ʒ. ij.

Amyli ʒ. iij.

Ex syrupo rosarum siccarum, aut myrtorum formentur pilulæ. Idem.

Alia, eiusdem.

℞. Tragacanthi, Gummi Arabici ana ʒ. ij.

Acaciæ, Balauſtij ana ʒ. j.

Cinnamomi crasi ʒ.β.

Balauſtium contundatur: siccatum mortario teratur. Cætera postridie ex aqua macerentur: deinde omnia ex syrupo rosarum siccarum redigantur in pilulas fabę magnitudinis: quę sub lingua tenendę exhibentur.

Alia ad fluxionem tenuem, eiusdem.

℞. Boli Armeni, Terræ sigillatę, Sem. Papaueris ana ʒ. j.

Tragacanthi, Gummi Arabici, Amyli ana ʒ. ij.

B Ex syrupo Ziziphorum fingantur orbiculi, qui noctu in ore contineantur.

Alia ad pituitam educendam & inspissandam.

℞. Pilularum Penidiorum, Sacchari candi ana ʒ.β.

Tragacanthi, Gummi Arabici ana ʒ. j.

Amyli ʒ.β.

Succi Glycyrrhizę ʒ. j.

Ex syrupo Ziziphorum formentur pilulæ. Idem.

Alia ad tussim, asperitatem arterie, raucitatem, & materiae educationem ex pectore.

℞. Glycyrrhizę mundę contusęq; ʒ. j.

Vuarum passarum, acinis exemptis ʒ. ij.

Hordei integri P. j.

Decoquantur in lb. aquę ad tertias. Colato iuri addito,

Tragacanthi ʒ.β. Penidiorum ʒ. iij. Sacchari candi ʒ. j.

Modico amylo fingantur hypoglottides, quę sub lingua tenentur. Idem.

DE PILVLIS APERIENTIBVS.

Pilule ad iecoris obstructionem.

℞. Trochiscorum de absinthio ʒ. j.

Succi Apij, uel Syrupi Bizantini quantum sufficit.

MM. 3

Formen-

646 DE PILVLIS ALTERANTIBVS.

Formentur pilulæ paræ n. x. pro ʒ. j. Dentur manè superbibendo parum A
uini albi modicè diluti ʒ. iij. aquæ graminis asparagi, endiuæ, capillorum
Veneris. Rondeletius.

Pilule ad lienem obstructum.

℞. Trochiscorum de Cappar. uel Trochiscorum de Myrrha ʒ. j.
Cum syrupo acetoso uel oxymelle formentur pilulæ x. pro drachma, & plu-
res si fieri possint: quas capiat cum syrupo acetoso ex cochleari, deinde bi-
bat aquas graminis & portulacæ ana ʒ. ij. cum duabus uncis syrups acetosi
simplicis, uel oxymelite. Rondeletius.

Pilule ad hepar, alia.

℞. Succu Absinthij depurati & exiccati ʒ. j.
Spicæ Indicæ, Squinanthi ana ʒ. β.
Sem. Apij, Petroselini ana ʒ. j.
Puluerizétur subtilissimè, & cū pauco syrupo endiuæ fiat pilulæ paræ. Idè.

Pilule ad splenem fortiores.

℞. Myrrhæ, Afari, Aristolochiæ utriusque, Seminis Capparorum, uel flo-
rum, ana ʒ. j.
Spicæ Indicæ, Squinanthi ana ʒ. β.
Sem. Apij, Petroselini, Agni casti ana ʒ. β.
Cum syrupo acetoso, aut oxymelle fiant pilulæ paræ. Idem. B

DE PILVLIS ABSTERGENTIBVS.

Pilule ad renum & vesicæ ulcera.

℞. Tragacanthi leuiter aspi, Gummi Arabici parum usti, Coralli rubri,
Sanguinis draconis, Boli Armeni ana ʒ. β.
Masticis, Lapidis Iudaici ana ʒ. j.
Sem. Melonum, Sem. Alchekengi ana ʒ. ij.
Sem. Bismaluz ʒ. j.

Cum succo caudæ equinæ, uel narcissi formentur pilulæ. Quòd si ulcus ma-
gnum inferat dolorem, ob caliditatem, semen papaueris addimus. Sin dolo-
ris uehementia suadeat, opij paucam quantitatem castigati addimus. Idem.

DE PILVLIS MOVENTIBVS VRINAM
& menstrua.

Pilule ad urinas & menstrua mouenda.

℞. Succu Absinthij siccati ʒ. ij.
Spicæ nardi, Iunci odorati ana ʒ. β.
Sem. Apij, Petroselini ana ʒ. j.
Throchiscorum ex rhabarbaro ʒ. j.
Cum syrupo endiuæ formentur pilulæ paræ. Idem.

Pilule

A. *Pilule ad urinam.*

℞. Carabę ʒ. j.
 Gummi prunorum, uel ceraforum ʒ. j.
 Afari, Seleni ana ʒ. j.
 Sem. Apij, Petroselini, Spicę Celticę ana ʒ. ʒ.
 Cū succo apij, uel brasiçę marinę fiant pilulę, quę sumantur uentriculo purgato, & oxymelite superbibito, cum aqua graminis, asparagi & apij. Idem.

Pilule ad matricem.

℞. Doronici, Zedoarię, Nucis moschatę, Castorij ana ʒ. j.
 Sem. Apij, Sem. Anethi, Margaritarum ana ʒ. iij.
 Hyoscyami ʒ. iij.
 Eiant pilulę cum aqua arthemisię quantum sufficit. Auicenna.

DE PILVLIS CALCVLVM COMM
minuentibus.*Pilule ad renum & uesicę calculum.*

℞. Pilularum ad urinam, proximę præscriptarum ʒ. ʒ.
 Ocre, Sem. Paliuri ana ʒ. j.
 Cineris scorpionum ʒ. j.
 B. Cum oxymelite uel succo limonum fiant pilulę, superbibendo aquam graminis, asparagi, uel saxifragiæ. Rondeletius.

DE PILVLIS DOLOREM MITIGANTIBVS.

Pilule ad dolorem calculi mitigandum.

℞. Opij ʒ. j.
 Styracis, Croci, Myrrhę, Castorij ana ʒ. ʒ.
 Cū uino maluatico formetur pilulę, & cū pistello calido, in mortario calido diu pmisceatur. His deinde addatur pilularū, postremò præscriptarū, ʒ. j. Idem.

Pilule colicę.

℞. Cnici, Anisi, Castorij ana ʒ. j.
 Petroselini, Piperis longi, rotundi ana ʒ. j. ʒ.
 Opij, Iunci odorati, Myrrhę, Nardi ana ʒ. ij.
 Ex melle parentur catapotia. Ex his scrupuli instar sumetur manę uel à cœna. Andernacus.

Alie.

℞. Myrrhę Troglodytidis ʒ. ij.
 Alterci ʒ. j.
 Opij ʒ. ʒ.
 Cynoglossiæ herbę corticis ʒ. ij.
 Cortex prius in sole exiccetur: deinde in puluere tenuem redigatur, alijs quibus admisceatur.

648 DE PILVLIS ALTERANTIBVS.

admisceatur. Omnibus sic mixtis, ex aqua rosacea fingantur ciceris magni. A tudine catapotia: dentur quinq; aut septem dormituris. Idem.

Pilule opiate.

℞. Opij Thebaici minutim incisi ʒ.ij.
Mumiæ G.iiij.

Succi rad. Alterci, dum adhuc est succolenta, collectæ purgatæq; ʒ.β.
Hæc simul mixta recondantur uitro, maceranturq; ad solem, uel in loco ca- lido per dies quatuordecim. Postea

Spec. Diambæ ʒ.ij.β.

cum uini ardentis quinquies correcti libra uase optimè conditur, & in loco calido, siue in sole stare per dies octo uel decem finitur, ita ut singulis diebus ter quaterq; agitetur. Huius uini rubicundissimi per inclinationem à confe- ctione separati, modicum super opium, ut antea docui, præparatum, fundi- tur, & in pulticu' am redigitur, idq; per triduum iterum in sole alio' ue loco calido, uale diligèter clauso digeritur: atq; hic labor ter reiterari debet. Tan- dem medicamentum exiccare finito, donec indurescat. hoc in puluerem su- per lapidem conterito, uino quod dixi, subinde adiecto, dum pultis crassi- tudo sit: cui adde,

Coralli rubri, Succini flauī, ana præparati ʒ. j.

Vnicornu G. iiij.

Moschi optimi, uel olei ex moscho, uel ex ambra G. iiij.

Croci Orientalis ʒ. j.

Probè subiguntur, iungunturq; & formantur pilulæ minutissimæ, quorum singulæ pendeant G. iiij. uel iiij. Ex his unicum noctu dormituro, unicum manè datur ex uino decumbenti in lecto. * Medicamentum est ad omnes febres abigendas efficacissimum, si Paracelso fides adhibenda est: dolores omnes, præsertim capitis sedat: humorumq; defluxiones in partes inferio- res prohibet: somnum accersit: tussi medetur: pectoris, pulmonumq; uitij auxiliatur: sanguinis reiectionem coërcet: uesicæ cruciatus mitigat. An- dernacus ex Paracelso.

Pilule ex opio, magistrales.

℞. Opij, Croci, Calsiæ ana ʒ.β.

Vini albi quantum sufficit.

Misce. * Faciunt ad tussim, & tenues fluxiones inspissant. Medici Florétini.

Pilule de cynoglossa.

℞. Cynoglossæ, Opij, Sem. Hyoscyami ana ʒ.β.

Myrrhæ ʒ. vj. Thuris ʒ. v.

Caryophyllorum, Cinnamomi, Styracis calamitæ ana ʒ. ij.

Aquæ rosacæ quantum sufficit.

Fingatur

A Fingatur massa. Seruatur annos duos uel tres. * Magnam uim obtinent in tenuibus sistendis distillationibus, ac doloribus mitigandis. Datur à ʒ. j. ad ʒ. j. Nicolaus.

Pilula de arnoglossa seu plantagine, magistrales.

℞. Myrrhæ, Thuris, Succi Glycyrrhizæ ana ʒ. j.
Succi Plantaginis quantum sufficit.

Fiat massa. * Sistant tenues distillationes, ac eandem ferè cum superioribus facultatem obtinent.

Pilula de styrace.

℞. Styracis liquidæ, Thuris, Myrrhæ, Succi Glycyrrhizæ, Opii ana ʒ. j.
Fiat massa. Durat annos duos uel plures Dosis eadem cum superioribus.
* Ad eadem efficaces, ad quæ sequentes. Mesues.

Pilula styracis, alia.

℞. Styracis ʒ. ix.
Opii, Myrrhæ ana ʒ. ʒ.
Sapæ quantum sufficit.

Fiat massa. Seruatur per annos duos uel tres. Datur à ʒ. j. usq; ad ʒ. j. * Faciunt ad tussim recentem, & hæmoptoicos, dolorem leuant, ac somnum inducunt. Galenus.

Alia eiusdem.

B ℞. Myrrhæ, Piperis, Opii, Styracis, Castorij, Galbani ana ʒ. ij.
Sapæ quantum sufficit.

Fiat massa. Seruatur ad annos tres. Dosis eadem cum superioribus. * Faciunt ad distillationem, dolorem capitis, ægrè spirantes, peripneumonicos, ad uesicæ & uteri affectiones.

Pilula harmonia.

℞. Styracis, Castorij, Piperis, Cardamomi ana ʒ. iij.
Opii, Myrrhæ, Sem. Hyoscyami ana ʒ. ʒ.
Sapæ quantum sufficit.

Fiat massa. Seruatur in charta pura, ceræ liquatæ intincta, ad annos tres.
* Ad distillationes & inexuperabilem defluxum utiles sunt. Galenus.

Pilula Scribonij.

℞. Sagapeni, Myrrhæ ana ʒ. ij.
Opii, Cardamomi, Castorij ana ʒ. ʒ.
Piperis albi ʒ. j.
Sapæ quantum sufficit.

Fiat massa. Exiccetur, & papyro, ceræ liquatæ intincto, seruetur ad annos tres. Dosis à ʒ. j. ad ʒ. j. * Phthisicis, sanguinem reiectantibus, suppuratis educunt pelliculas, & repurgant sufficienter: uerùm immorari pharmaco oportet. Galenus.

NN DE

550 DE PILVL. PVRGANT. HVMOR SIMPL.
DE PILVLIS PVRGANTIBVS BILEM FLA- A
uam ex capite.

Pilule aureæ.

℞. Aloes, Scammonij præparati ana ʒ. v.

Rosarum rubrarum, Sem. Apij ana ʒ. ij. β.

Sem. Fœniculi, Anisi ana ʒ. j. β.

Malticis, Croci, Pulpæ Colocynthis ana ʒ. j.

Trita crassius excipiantur tragacátha macerata in aqua fœniculi, & fiat massa: quæ siccáda, & in uesica uel charta, ceræ liquefactæ intincta, asseruáda per annum. Dosis à ʒ. j. ad ʒ. j. uel ʒ. iiij. * Caput expurgant, aciem oculorum exacuunt, flatus uentriculi & intestinorum dissoluant, ac citra molestiam aluum deijciunt. Nicolaus.

Pilule Arabica.

℞. Aloes optimæ ʒ. iiij.

Radice Bryoniæ, Myrobal. Citrinarū, Chebularum, Indarum, Belliricazum, Emblicarum, Malticis, Diagridij, Afari, Rosarum ana ʒ. j.

Castorij ʒ. iiij.

Croci ʒ. j.

Succi Fœniculi quantum sufficit.

Fiat massa. Seruatur siccata in papyro, ceræ liquatæ intincto ad annum. Dosis ut præcedentium. * Valent ad capitis dolorem, uertiginem, hemicraniamq;: laticiam generant, mentisq; uigorem conseruant, uisum acuunt, auditumque amissum reparant, ac stomachum à uitiosis humoribus purgant. Nicolaus.

DE PILVLIS PVRGANTIBVS BILEM
ex hepate.

Pilule ad bilem in febribus.

℞. Rhabbarbari electi ʒ. β.

Cinnamomi, Spicæ ana G. vj.

Tamarindorum ʒ. j.

Succi Apij ʒ. β.

Temperetur rhabbarbarum cum spica & cinnamomo in succo rosarum, & cū eodem succo, aut syrupo ros. lax. fiant pilulæ. His etiam diagridij G. ij. pro ʒ. j. addi possunt. Post assumptionem harum pilularum imperandum, ut æger bibat uiolati ʒ. j. uel ij. cum pauca quantitate aquæ borraginis. Rondeletius.

Alia.

℞. Rhabbarbari ʒ. j.

Aloes, Malticis ana ʒ. β.

Diagridij G. vj.

Spicæ

A Spicæ nardi, Nucis moschatæ ana G. iij.
Cum syrupo ros. lax. fiant pilulæ. Andernacus.

Pilule ex rhabarbaro.

℞. Rhabarbari electi ʒ. iij.
Succi Glycyrrhizæ, Succi Absinthij, Mastiches ana ʒ. j.
Myrobal. Citrinarum ʒ. ij. β.
Sem. Apij, Sem. Fœniculi ana ʒ. β.
Trochiscorum diarrhod. ʒ. iij. β.
Spec. Hieræ simp. ʒ. x.
Aque Fœniculi quantum sufficit.

Fiat massa. Siccata, in vesica uel papyro, ceræ liquefactæ intincto, seruatur per annum. Datur à ʒ. j. usque ad ʒ. ij. * In febribus diuturnis, iecinoris obstructionibus, & aquæ inter cutem inijs conferunt. Mesues.

Pilule sabellæ.

℞. Spicæ Indicæ ʒ. v.
Spicæ Romanæ ʒ. ij.
Rhabarbari, Agarici, Epithymi ana ʒ. iij.
Costi, Masticis, Chamædryos, Amomi ana ʒ. iij.
Crocij, Myrrhæ, Cinnamomi, Caryophyllorum, Schœnanthi ana ʒ. j.
B Aloes ʒ. x.

Cum uino antiquo fiat massa: quæ siccata, in charta ceræ liquatæ intincta, seruatur ad annum. Datur ad ʒ. ij. cum uino. * Obstructiones uentriculi, hepatis, lienis sanant, & hydropem materiamq; uacuant. Mesues.

Pilule de eupatorio.

℞. Myrobalanorum Citrinarum, Succi Eupatorij Mesue, Succi Absinthij ana ʒ. iij.
Rhabarbari ʒ. iij. β.
Masticis ʒ. j.
Crocij ʒ. β.
Aloes bonæ ʒ. v.
Succi endiuizæ quantum sufficit.

Fiat massa, ut supra seruanda. * Mirificè profunt in febribus intermittentibus biliosis, morbo regio, iecinorisq; obstructionibus. Mesues.

DE PILVLIS PURGANTIBVS PITVITAM
ex capite.

Pilule cochis.

℞. Spec. Hieræ simp. ʒ. x.
Pulpæ Colocynthidis ʒ. iij. ʒ. j.

NN 2 Scammo-

Scammonij præparati ʒ.ij.β.
 Turbith, Stœchadis ana ʒ.v.
 Vini albi quantum sufficit.
 Fiat massa. Siccetur & conseruetur in charta, ceræ liquatę intincta, per annũ.
 Datur à ʒ.j.usq; ad ʒ.j. Rhafis.

Pilule hieræ cum agarico.

ʒ. Cinnamomi, Nardi Indicæ, Croci, Schoenanthi, Afari, Masticis, Casiæ,
 Xylobalsami, Carpobalsami, Violarum, Epithymi, Colocynthidis ana ʒ.j.
 Agarici, Turbith ana ʒ.ij.
 Rhabbarbari, Scammonij præparati ana ʒ.β.
 Cum uino albo & theriaca confice, & serua ut suprâ. Dosis à ʒ.j. ad ʒ.j.
 * Opem ferunt uitij capitis, neruorumq;, & stomachi cruditatibus. Antonius de Scarparia.

Pilule ex colocynthide.

ʒ. Colocynthidis, Succi Absinthij ana ʒ.β.
 Aloes, Scammonij præparati ana ʒ.j.
 Rhabbarbari electi ʒ.iiij.
 Trita omnia succo excipiantur. * Pituitam à cerebro & alijs neruosis uacuant: ob id conferunt dolori capitis ex frigido. Galenus.

Pilule ex colocynthide, Mesuæ.

ʒ. Pulpę Colocynthidis ʒ.vj.
 Myrobal. Indarũ, Citriñarũ, Sagapeni, Bdellij mollis, Sarcocollæ ana ʒ.v.
 Aloes ʒ.vij.
 Nigellę, Cymini, Origani Perfici, Nasturtij albi, Salis gemmei, Absinthij ana ʒ.j.

Succi Porri quantum sufficit.
 Fiat massa. Siccetur & seruetur ut suprâ, per annum. * Valent ad affectus pituitosos & melancholicos, ut alphas curata difficiles, & iuncturarum dolores.

Pilule Alhandal.

ʒ. Trochiscorum Alhandal ʒ.xij.
 Spec. Hieræ simplicis ʒ.vij.
 Masticis ʒ.ij.
 Salis gemmei ʒ.j.β.
 Ladani ʒ.j.
 Ladanum & mastiche inuncta oleo nucum tundantur pistillo calido in mortario æneo: deinde reliqua trita addantur, & fiat massa, in charta, ceræ liquatę intincta, seruanda per annum, uel per dimidium. * Ad cephalęam, & he micraniam difficilem, & affectus neruorum, & iuncturarum. Mesues.

Pilule

A.

Pilula ex sex rebus.

℞. Aloes, Scammonij, Colocynthidis, Agarici, Bdellij, Gummi Arabici, Rhabarbari ana ʒ.β.

Tere, & fiat massa. Seruatur ut præcedens. Dosis à ʒ. j. ad ʒ. j. * Pituitam à cerebro & alijs neruosis euacuant. Galenus.

Pilula de octo rebus, siue optomera.

℞. Aloes, Scammonij præparati ana ʒ. ij.

Pulpe Colocynthidis, Epithymi, Agarici, Mastiches, Dauçi, Myrobal. Chelularum, Absinthij ana ʒ. j.

Succi Solani quantum sufficit.

Fiat massa. Probe exiccetur, deinde ad usum in papyro, ceræ liquatæ intincto, seruetur usq; ad annum. Dosis ut præced. * Purgant humores crassos à capite, uisum acuunt, & suffusionem arcent. Nicolaus.

DE PILVLIS PURGANTIBVS PITUITAM EXPECTORE.

Pilula hieræ cum agarico.

℞. Spec. Hieræ simp. Gal. Agarici trochiscati ana ʒ. β.

Aloes ʒ. j.

B Mellis colati quantum sufficit.

Fiat massa, quæ ut præcedens seruanda. Datur à ʒ. j. usq; ad ʒ. ij. * Auxiliantur stomachicis, asthmaticis, & alijs stomachi & thoracis uitijs, à crassis & pituitosis humoribus natis.

Pilula ex agarico.

℞. Agarici ʒ. iij.

Masticis, Iridis, Marrubij ana ʒ. j.

Turbith ʒ. v.

Spec. Hieræ picræ ʒ. β.

Myrrhæ ʒ. j.

Colocynthidis, Sarcocollæ ana ʒ. ij.

Agaricum lima in puluerem redigitur: reliqua contunduntur, fiuntq; pilulæ cum sapæ sufficienti quantitate. Colocynthidis loco satius erit trochiscos alhandal sumere. Seruatur ad annum dimidium, uel integrum. Dosis à ʒ. β. ad ʒ. j. β. * Auxiliantur asthmaticis, & alijs thoracis uitijs à crassis & pituitosis humoribus natis. Mesues.

Pilula bechica.

℞. Succi Glycyrrhizæ, Sacchari albi ana ʒ. x.

Amyli, Tragacanthæ, Amygdal. dulcium ana ʒ. j. β.

Mucaginis sem. Cydoniorum quantum sufficit.

Tere, fiant pilulæ. * Ad tussim ueterem & siccam, gutturisq; & faucium asperitatem

654 DE PILVLIS PURGANTIB. HVMO. SIMPLI.

asperitatem pollent. Mesues.

Pilula bechica, Rhafis.

℞. Amyli, Tragacanthę, Amygdal. purgatarum, Fabarum decorticatarum, Sem. Papaueris, Capitem Papaueris, Gummi Arabici, Boli Armeni ana ʒ. ʒ. Mucaginis Pſyllij quantum ſufficit. Fiant pilulę.

Pilula bechica albe, magiſtrales.

℞. Sacchari candi, Amyli ana ʒ. vj.

Penidiorum ʒ. iij.

Tragacanthę ʒ. ij.

Tragacantha diſſoluatur in aqua rofacea per diem, & fiant pilulę.

Pilula bechica emplaſtica.

℞. Gummi, Tragacanthę ana ʒ. ʒ.

Succi Glycyrrhizę ʒ. j.

Sapę quantum ſufficit. Fiant pilulę. Galenus.

Pilula bechica cum terebinthina.

℞. Piperis, Caſię, Cinnamomi ana ʒ. ij.

Galbani, Terebinthinę ana ʒ. j.

Mellis deſpumati quantum ſufficit. Fiant pilulę. Galenus.

Pilula bechica.

℞. Pinearum nucleorum, Amygdal. amararum ana ʒ. j. ʒ.

Glycyrrhizę ʒ. vj.

Succi Glycyrrhizę ʒ. iij.

Cum aqua roſa. fiat maſſa. * Aduerſus tuſſim ueterem pollent, & gutturis ac faucium aſperitatem.

DE PILVLIS PURGANTIBVS PITVLTAM
tam ex ſtomacho.

Pilula alephangina.

℞. Cinnamomi, Cubearum, Ligni aloes, Calami aromatici, Macis, Nucis moſchatę, Cardamomi, Caryophyllorum, Afari, Maſticis Schęnanthi, Nardi Indię, Carpobalaſami, ana ʒ. j.

Abſinthij, Roſarum rub. ana ʒ. v.

Terantur craſſius, & in libris duodecim aque communis per diem macerata, coquantur ad dimidij conſumptionem, deinde fricentur & colentur: & in colaturę lb. ʒ. iniſce,

Aloes ſępius lotę ſecundum artem, & in puluerem redactę lb. j.

Inſolabis donec ſiccantur, ſępius agitando: & addes,

Myrrhę, Maſticis ana ʒ. v.

Croci ʒ. iij.

Tere

A Tere curiosè: prædicti decocti reliquū ipsi affunde, agita in sole, donec siccetur, & in iustam crassitiem reducatur, ut fieri possint pilulæ secundum artem. Seruantur ad annum dimidium, uel integrum. Dosis à ʒ. j. usq; ad ʒ. ij. Confici debent hæc pilulæ mense Iunio uel Iulio. * Ventriculū, cerebrū, & sensoria humoribus crassis, putribus, pituitosis purgant, & inde natū dolorem dissipant, uentriculū roborant, & concoctionem eius iuant. Mesues.

Pilule Galeni, similes alephanginis.

℞. Cinnamomi, Calami aromatici, Calsiæ, Xylobalsami, Schœnanthi, Datylorum ana ʒ. j.

Trita omnia macerentur in aquæ pluuiæ sufficienti quantitate, in olla noua, deinde excoquantur ad medias. Cola, & colaturæ impone aloes sepius lotæ in aqua pluuiæ, & puluerizatæ lb. j. Permiscantur, & insolentur per dies caniculæ, donec exiccata sint. deinde addita,

Croci, Myrrhæ, Mastice ana ʒ. j.

misce, & fiant pilulæ. * Idem præstant, quod præcedentes.

Pilule ante cibum.

℞. Ligni aloes, Caryophyllorum, Macis, Nucis moschatae, Zedoariae, Zingiberis, Spicæ, Galangæ, Croci, Amomi, Calami aromatici, Xylobalsami, seu pro eo, acori ueri, Carpobalsami, seu pro eo, granorum paradisi, Cardamomi, Cubebarum, Absinthij, Menthæ rubæ, Sem. Apij, item Fœniculi, Anisi, Petroselini, Sileris montani, Leuistici: Mastice ana ʒ. j.

Rhabarbari ad pondus omnium, id est ʒ. iij.

Aloes ʒ. vj.

Misce, & fiat massa cum oleo nucis moschatae per expressionem facto: uel eū uino optimo: sed præstabit cum oleo fieri, ut dictum est. Medici Colonienſes.

Alie ante cibum.

℞. Ligni aloes, Caryophyllorum, Folij, Xylobalsami, Sem. Balsami, Calsiæ lignæ, Maceris, Nucis moschatae, Cinnamomi, Cubebarum, Croci, Sileris montani, Radicis nardi, Mastice ana ʒ. ij.

Rhabarbari, Aloes succocitrinæ ana ʒ. iij. β.

Vino odorato excipiuntur. * Concoquendi vires firmant, humores quæ biliosos leniter purgant. Dantur à ʒ. j. usque ad ʒ. ij. Andernacus.

Pilule mastichinæ.

℞. Mastice ʒ. β.

Agarici optimi ʒ. iij.

Aloes ʒ. x.

Agaricum elimatum aut erasum maceratur in oxymelite, fiatq; massa. Seruatur ad annum. Dosis ad ʒ. ij. * Ventriculū, cerebrū, uiscera reliqua, oculos, uterum, putribus humorib. purgant & roborant. Conciliator.

Pilula.

Pilule stomachicæ.

A

℞. Myrobalanorum Citrinarum, Aloes, Turbith ana ʒ. x.

Rosarum, Spicæ Indicæ, Masticis ana ʒ. ij. β.

Anisi ʒ. j. β.

Salis Indi, uel Salis gemmei, Croci ana ʒ. j.

Cum succo absinthij formetur massa. Seruatur ad annum dimidium uel integrum. Dosis ad ʒ. ij. * Biliofos & pituitosos uacuant humores, eos potissimum, qui caput & uentriculum obsident. Mesues.

Pilule stomachicæ aliæ.

℞. Myrobal. Citrinarum, Indarum, Chebularum ana ʒ. iij.

Rosarum, Masticis ana ʒ. ij.

Cardamomi, Ligni aloes, Santali citrini, Cubearum, Caryophyllorum, Schœnanthi, Nucis moschatæ ana ʒ. ij.

Rhabarbari ʒ. β.

Turbith ʒ. vij.

Aloes ad pondus omnium.

Fiat massa. Seruatur ad annum. Dosis à ʒ. j. usque ad ʒ. ij. * Cerebrum & uentriculum corruptis humoribus purgant, uentriculum roborant, coctionem iuuant, appetentiam excitant. Alkindus.

Pilule stomachicæ aliæ.

B

℞. Hieræ picræ ʒ. vij.

Myrobal. Chebularum, Citrinarum, Indarum ana ʒ. iij.

Agarici ʒ. ij.

Turbith boni ʒ. x.

Epithymi Cretensis, Anisi ana ʒ. ij.

Salis Indi ʒ. ij.

Absinthij, Scammonij ana ʒ. iij.

Penidiorum ʒ. iij.

Succi Cichorij quantum sufficit.

Fiat massa. * Pituita & bile flaua uentriculû, hepar, caput, sensoria, iuncturas purgant. Dantur ʒ. ij. Mesues.

Pilule stomachicæ aliæ.

℞. Hieræ picræ ʒ. x.

Trium Myrobalanorum, Absinthij ana ʒ. ij.

Masticis, Anisi, Myrob. Belliricarum, Emblicarum, Agarici ana ʒ. iij. β.

Zingiberis ʒ. ij.

Caryophyllorum, Salis gemmei, Schœnanthi ana ʒ. j.

Turbith ʒ. xij.

Succi Absinthij quantum sufficit.

Fiat

A Fiat massa. Dosis à ʒ. j. usque ad ʒ. ij. uel iij. * Cerebrum & uentriculum cor-
ruptis humoribus purgant, uentriculum roborant, coctionem iuuant, appe-
tentiam excitant. Mesues.

Pilule ex turbith, Stomachica dictæ.

℞. Turbith gummosi ʒ. x.
Masticis ʒ. β.
Rosarum rubrarum ʒ. iij.
Aloes ʒ. ij. ʒ. j.
Succi Absinthij quantum sufficit.

Fiat massa. Seruatur per annum dimidium, uel integrum. Datur à ʒ. j. usque
ad ʒ. ij. uel ʒ. iij. * Materiam pituitosam, putrem, & aquosam ex uentriculo
& cerebro uacuant. Mesues.

Pilule ex turbith.

℞. Turbith, Myrobal. Citrinarum, Aloes ana ʒ. x.
Masticis, Rosarum, Spicæ ana ʒ. ij. β.
Anisi ʒ. j. β.
Crocij ʒ. j.
Salis Indi ʒ. ij.

* Idem ut sequentes promittant. Mesues.

B *Pilule aurea ex turbith.*

℞. Aloes ʒ. xij.
Masticis, Rosarum rubrarum ana ʒ. vij.
Myrobal. flauarum ʒ. x.
Crocij ʒ. β.
Turbith gummosi ʒ. xvj. Puluerentur, & cū Succi Absinthij q. s. fiat mas-
sa. * Pituitam & bilem sine molestia purgant: hepar & uentriculum robo-
rant, coctionem iuuant. Mesues.

Pilule communes, Pestilentiales dictæ.

℞. Aloes ʒ. j.
Myrrhæ, Crocij ana ʒ. β.
Vini albi q. s. Fiat massa.
* Mirificè aduersus pestiferæ luis contagia populatim grassantia pollut.
Humores etiam uentriculo immerfos educunt. Ruffus.

Pilule contra pestem, magistræles.

℞. Myrrhæ, Crocij, Boli Armeni, Coralli rubri, Charabæ ana ʒ. j.
Myrobal. Chebularum ʒ. ij.
Aloes ʒ. vij.
Vini albi quantum sufficit. Fiat massa.

DE PILVLIS PURGANTIBVS PITVL-

tam ex iuncturis.

A

Pilule de hermodactylis.

℞. Hermodactylorum, Myrobal. Citrinarum, Aloes, Turbith, Colocynthidis, Bdellij, Sagapeni ana ʒ. vj.

Castorij, Sarcocollæ, Euphorbij, Opopanacis, Semin. Rutæ, Sem. Apij ana ʒ. iij.

Croci ʒ. j. β.

Succi Brassicæ quantum sufficit.

Fiat massa. Seruatur ad annos duos. Dosis à ʒ. j. usque ad ʒ. ij. * Valent ad podagram, & dolores frigidos aliarum iuncturarum. Mesues.

Pilule arthritice.

℞. Hermodactylorum, Turbith, Agarici ana ʒ. β.

Cassie lignæ, Spicæ Indicæ, Charyophyllorum, Xylobalsami, Carpobalsami, Zingiberis, Masticis, Fœniculi, Anisi, Saxifragiæ, Sem. Asparagi, Sem. Rusci, Rosarum, Milij folis, Salis gemmei ana ʒ. β.

Aloes optimæ, ad pondus omnium.

Succi Fœniculi quantum sufficit.

Fiat massa. Siccetur, & seruetur in charta, ceræ liquatæ intincta, ad annū. Dosis à ʒ. j. usque ad ʒ. ij. * Valent ad podagram, aliosq; articularum dolores. Nicolaus.

B

Pilule fetide maiores.

℞. Sagapeni, Ammoniaci, Opopanacis, Bdellij, Colocynthidis, Harmel, Aloes, Epithymi ana ʒ. v.

Hermodactylorum, Esulæ ana ʒ. ij.

Scammonij præparati ʒ. iij.

Turbith ʒ. β.

Cinnamomi, Nardi Indicæ, Croci, Costi ana ʒ. j.

Zingiberis ʒ. j. β.

Euphorbij ʒ. ij.

Dissoluantur lachrymæ in succo porri, & fiat massa. Siccetur, & seruetur in charta, ceræ liquatæ intincta, per annum. Dosis à ʒ. ij. ad ʒ. j. * Vacuant puitam crassam, crudam: ob id conferunt affectibus inde natis, arthritidi, podagra, gonagræ, dolori spinæ, & aliarum iuncturarum, uentriculi, colico, alphis, elephantia, alijsq; cutis uitij. Mesues.

Pilule fetide minores.

℞. Sagapeni, Ammoniaci, Opopanacis, Bdellij, Myrrhæ ana ʒ. v.

Turbith ʒ. x.

Colocynthidis ʒ. vj.

Fiant:

A Fiant ut priores. * Idem pollent. Mesues.

Pilula ex sagapeno.

℞. Sagapeni, Ammoniacy, Bdellij, Opopanacy, Aloes, Castorij, Rutę agre
stis ana ʒ. iij.

Colocynthidis ʒ. iij.

Salis gemmę ʒ. j.

Succi Porri quantum sufficit.

Fiat massa. Siccetur, serueturq; in papyro, cerę liquatę intincto, per annos
duos. Dosis à ʒ. iij. ad ʒ. j. * Pituitam lentam purgant: ob id iuuant paraly
sim, spasmus, dolorem iuncturarum, dorsi, podagramq; frigidam. Mesues.

Pilula ex opopanace.

℞. Opopanacy, Hermodactylorum, Sagapeni, Bdellij, Ammoniacy, Colo
cynthidis ana ʒ. v.

Croci, Castorij, Myrrhę, Zingiberis, Piperis nigri, longi, Casig, Myrobala
norum Citrinarũ, Indarum, Belliricarum, Emblicarum ana ʒ. j.

Scammonij preparati ʒ. ij.

Turbith ʒ. β.

Aloes ʒ. j. β.

B Succi Brassicę quantum sufficit.

Fiat massa: siccetur, & seruetur in charta, cerę liquatę intincta, loco siccio
re, per annum. Dosis ʒ. ij. usque ad ʒ. j. * Ad paraly sim, spasmus cynicum,
gonagram, podagram, & aliorum articulorum dolores, morbosq; partium
neruolarum frigidos, utiles sunt. Mesues.

Pilula de sarcocolla.

℞. Sarcocollę ʒ. iij.

Turbith ʒ. β.

Colocynthidis, Zingiberis ana ʒ. j. β.

Salis gemmę ʒ. j.

Aquę rosarum quantum sufficit.

Fiat massa, quę ut p̄cedens seruanda. Dosis ʒ. j. * Pituitam uacuant: ob
id pituitosis affectibus commodant. Mesues.

Pilula benedicta.

℞. Spec. Benedictę laxatiuę ʒ. vj.

Mellis rosati quantum sufficit.

Fiat massa. Seruatur papyro mundo, cerę liquatę intincto, per annum. Do
sis à ʒ. j. ad ʒ. ij.

* Humores pituitosos, potissimũ ad articulos decumbentes eliciũt, à re
nibus quoque & uesciã purgant. Nicolaus.

660 DE PILVLIS PURGANT. HVMOR. SIMPL.
DE PILVLIS PURGANTIBVS MELAN- A
choliã ex hepate & splene.

Pilule ex fumaris.

℞. Myrobal. flauarum, Chebularum, Indarum ana ʒ. v.
Aloes ʒ. vij.
Scammonij præparati ʒ. v.
Succi Fumaris quantum sufficit.

Omnia in puluerem redacta comprehende succo, & sicari finito: rursus tri-
ta succo excipiantur, siccentur: & sic tertium, & in pilulas formentur. Durat
annum. * Soluunt humores acres, biliosos, pituitam falsam, & alios adu-
stos, à quibus pruritus & scabies. Auicenna.

Pilule Inde.

℞. Myrobal. Indarum, Hellebori nigri, Polypodij ana ʒ. v.
Epithymi, Stoechadis ana ʒ. vj.
Agarici, Lapidis lazuli loti, Colocynthidis, Salis Indi ana ʒ. β.
Succi Eupatorij, Nardi Indicæ ana ʒ. ij.
Zingiberis ʒ. j.
Spec. Hieræ simp. ʒ. j. β.
Succi Apij quantum sufficit.

Fiat massa: quæ leuiter siccata, seruetur in charta munda, ceræ liquatæ intin- B
cta, per annum. Datur à ʒ. ij. ad ʒ. j. * Valent ad affectus melancholicos,
cancrum non ulceratum elephantiam, albos nigros, curatu difficiles, melã
choliã morbum, & inde ortum timorem & incertorem, quartanam, icterum
splenicum, & splenis dolorem. Mesues.

Pilule de lapide lazuli.

℞. Lapidis lazuli loti ʒ. v.
Epithymi, Polypodij ana ʒ. j.
Caryophyllorum, Anisi ana ʒ. β.
Scammonij præparati, Hellebori nigri, Salis Indi ana ʒ. ij. β.
Agarici electi ʒ. j.
Spec. Hieræ simp. ʒ. xv.
Succi Endiuicæ quantum sufficit.

Fiat massa: leuiter siccata seruetur in papyro munda, ceræ liquatæ intincto.
Dosis à ʒ. ij. ad ʒ. j. * Valent ad affectus melancholicos, & bile usta natos.
Mesues.

Pilule de lapide armeno.

℞. Lapidis Armeni loti, Spec. Hieræ simp. ana ʒ. v.
Polypodij, Epithymi ana ʒ. j.
Scammonij præparati ʒ. ij.

Caryophyl-

- A Caryophyllorum ʒ.ij.
 Salis Indi ʒ.ʒ.β.
 Succī Solani quantum sufficit.
 Fiat massa: siccetur leuiter, & in charta munda, papyro ceræ liquatæ intincta, seruetur per annum. Dosis à ʒ.ij. ad ʒ.ʒ. * Melancholiam & bilem uisā multiplicem utramque clementer uacuant: ob id morbis inde natis conferunt. Mesues.

DE PILVLIS PURGANTIBVS HVMO-
 res serofos.

Pilula de mez.ereo.

- ℞. Foliorum Thymelææ aceto infusorum & exicatorum ʒ.v.
 Myrobal. flauarum ʒ.β.
 Myrobal. Chebularum ʒ.iiij.
 Mannæ quantum sufficit.
 Tamarindorum aqua cichorij solut. q. f. ad formandum. * Serofum excrementum ualenter purgant, seu aquas: ob id hydropem iuuant. Dantur à ʒ.ʒ. ad ʒ.iiij. Mesues.

Pilula de euphorbio.

- B ℞. Euphorbij, Colocynthidis, Agarici, Bdellij, Sagapeni ana ʒ.ij.
 Aloes ʒ.v.
 Succī Porri quantum sufficit.
 Fiat massa. Siccetur leuiter, & in charta munda ceræ liquatæ intincta, seruetur per annum. Datur à ʒ.ʒ. ad ʒ.iiij. * Ad emittendam hydropicorum flauā aquam, & materiam tumoris discutiendam ualent, opem quoque afferunt lumborum doloribus, & podagræ humida causa concitata. Mesues.

DE PILVLIS PURGANTIBVS HVMORES
 mixtos à capite.

Pilula sine quibus.

- ℞. Aloes lotæ ʒ. xiiij.
 Miobal. flauarū, Chebularū, Indarum, Belliricarū, Emblicarū, Rhabarbari, Mastiches, Absinthij, Rosarum, Violarū, Senæ, Agarici, Cuscuthæ ana ʒ.ʒ.
 Scammonij præparati ʒ. vj.β.
 Macerato scammonio in succi fœniculi q. f. infusionem panno lineo colligatam fortiter exprime manibus oleo uiolato inunctis, & cum expressione fiat massa: siccetur leniter, & papyro munda ceræ liquatæ intincto, seruetur per annum. Dosis à ʒ.ij. ad ʒ.ʒ. * Mirificè pituitam, bilem, & humorem melancholicum purgant, & ad suffusiones, oculorumque claritatem conducunt, uisum conseruantes: aurium dolorem sanant, & iliofis conferunt. Nicolaus,

662 DE PILVL. PURGANT. HVMOR. MIXTOS.

Pilule lucis minores.

A

℞. Xylobalsami, Carpobalsami ana ʒ. j.

Rad. Chelidoniae ʒ. v.

Rosarum, Violarum, Absinthij, Euphrasiae ana ʒ. iij.

Senae, Epithymi, Myrobal. flauarū, Chebularū, Indarū, Belliicarū, Emblicarum, Agarici, Colocynthidis, Schœnanthi, Lycij, Lapidis lazuli ana ʒ. ij. β.

Aloes lotae ʒ. vj.

Succi Fœniculi, aut Chelidoniae quantum sufficit.

Fiat massa. Seruatur in charta munda, ceræ liquatae intincta, per annum.

* Excrementa capitis pituitosa educunt, uisumq; roborant: atram tamen bilem magis uacuant. Mesues.

Pilule lucis maiores.

℞. Rosarum, Violarum, Absinthij, Colocynthidis, Turbith, Cubebarū, Calami aromatici, Nucis moschatae, Spicae Indicae, Epithymi, Carpobalsami, Xylobalsami, Sefelios, Sem. Rutae, Schœnanthi, Mastiches, Azari, Caryophyllorū, Cinnamomi, Anisi, Fœniculi, Apij, Caliae lignae, Croci, Macis ana ʒ. ij.

Myrobal. Citrinarum, Chebularū, Indarū, Belliicarū, Emblicarū, Rhabarbari ana ʒ. β.

Agarici, Senae ana ʒ. v.

Euphrasiae ʒ. vj.

Aloes succocitrinae ʒ. xj. ʒ. ij.

Succi Fœniculi quantum sufficit.

B

Fiat massa: leuiter siccetur, & in papyro, ceræ liquatae intincto seruetur per annum. Datur à ʒ. ij. ad ʒ. j. * Excrementa capitis pituitosa educunt, uisumq; roborant Mesues.

DE PILVLIS PURGANTIBVS HVMORES

mixtos à stomacho.

Pilule hierae simplicis.

℞. Aloes ʒ. l.

Cinnamomi, Xylobalsami, Azari, Spicae Indicae, Croci, Mastiches ana ʒ. iij.

Mellis rosati quantum sufficit.

Fiat massa. Seruatur per annum in charta munda, ceræ liquatae intincta. Dosis ad ʒ. ij. * Aduersus uitia uentriculi ex humoribus biliosis & pituitosis nata profunt. Galenus.

Pilule de hiera composita.

℞. Cinnamomi, Spicae Indicae, Croci, Schœnanthi, Azari, Xylocassiae, Xylobalsami, Carpobalsami, Violarum, Absinthij, Epithymi, Agarici, Rosarū, Turbith, Colocynthidis, Mastiches ana ʒ. ij.

Aloes ʒ. x. ʒ. ij.

Aque Endiuiae quantum sufficit.

Fiat

A Fiat massa, in papyro mundo ceræ liquatæ intincto, seruanda per annum. Dosis ut supra. * Opem ferunt uitijis capitis, neruorumq; ab humoribus pituitosis procreatis.

Pilula Assaieret.

℞. Spec. Hieræ picræ Gal. ʒ. ij.
Mastiches, Myrobal. Citrinarum ana ʒ. j.
Aloes ʒ. β.

Succi Maioranę quantum sufficit.

Fiat massa, in charta munda, cerę liquatę intincta, seruanda per annum. Dosis ad ʒ. ij. * Bilem flauam & pituitam uacuant. Auicenna.

Pilula ex turbith.

℞. Turbith gummosi ʒ. x.

Mastiches ʒ. β.

Ros. rubrarum ʒ. iiij.

Aloes ʒ. ij. ʒ. j.

Succi absinthij quantum sufficit.

Fiat massa. * Materiam pituitosam, putrem & aquosam ex uentriculo & cerebro uacuant. Mesues.

Pilula ex turbith alie.

B ℞. Turbith, Myrobal. Citrinarum, Aloes ana ʒ. x.

Mastiches, Rosarum, Spicæ ana ʒ. ij. β.

Anisi ʒ. j. β.

Croci ʒ. j.

Salis Indi ʒ. ij.

Idem quod sequentes promittunt.

Pilula ex turbith aurea.

℞. Turbith optimi ʒ. xvj.

Aloes ʒ. j. β.

Mastiches, Rosarum ana ʒ. vij.

Myrobal. flauarum ʒ. x.

Croci ʒ. iiij.

Succi Absinthij quantum sufficit.

Fiat massa, in charta munda, ceræ liquatę intincta seruanda per annum.

* Bilem & pituitam citra molestiam purgant, hepar & uentriculum roborât, coctionem iuuant. Mesues.

Pilula de aloë & mastiche.

℞. Aloes ʒ. j.

Mastiches ʒ. β.

Caryophyllorum, Rosarum rubrarum ana ʒ. j.

Croci,

664 DE PILVL. PURGANT. HUMOR. MIXTOS.

Croci, Diagridij ana ʒ.ij. A
 Succu Absinthij, uel
 Succu Fœniculi quantum sufficit.
 Fiat massa. * Respiciunt uirtutem naturalem, purgant incolumiter stomachum à phlegmate & à cholera. Nicolaus.

Pilula de aloë lota.

℞. Aloes lotæ cum succo rosarum rubrarum ʒ. j.
 Agarici trochiscati ʒ. iij.
 Mastiches ʒ. ij.
 Spec. Diamoschi dulcis ʒ. β.
 Vini maluatij quantum sufficit.
 Fiat massa, in papyro mundo, ceræ liquatæ intincto, seruanda per annum.
 * Ventriculum, cerebrum, uiscera reliqua, oculos, uterum, putridis humoribus purgant, & roborant.

Pilula imperiales, magistrales.

℞. Cinnamomi, Amomi, Anisi, Mastiches, Cardamomi minoris, Zingiberis, Zeduaræ, Maceris, Nucis moschatæ, Caryophyllorum, Croci, Cubebarum, Ligni aloes, Turbith, Mannæ, Agarici, Fol. Senæ, Myrobal. Citrinarum, Chebularum, Indarû, Belliricarû, Emblicarû, Rhabarbari ad pòdus omniû. B
 Aloes quantum totum æquat.
 Syrupi ros. lax. quantum sufficit.
 Fiat massa. * Modicum soluunt, & plurimum confortant stomachû, & omnia intestina frigida: muniunt uirtutes naturales, remouent frigiditatem, clarificant sanguinem & spiritum.

DE PILVLIS PURGANTIBVS HUMORIS MIXTOS AB HEPATE.

Pilula de tribus.

℞. Rhabarbari, Agarici, Aloes lotæ ana ʒ. ij. β.
 Syrupi ros. lax. quantum sufficit.
 Fiat massa, in charta munda, ceræ liquatæ intincta, seruanda per annum.

Pilula ex halicacabo.

℞. Absinthij, Succu Absinthij, Succu Eupatorij, Aloes, Myrobal. flauarum, Mastiches, Croci, Rhabarbari, Cancami loti, Alari, Anisi, Casiæ lignæ, Sem. Fumariz ana ʒ. ij.
 Hieræ picæ ʒ. iij.
 Aquæ Solani quantum sufficit.
 Fiat massa. * Ad febres diuturnas ex humoribus uarijs ortas, obstructionem hepatis soluunt, & inde ortum dolorem, & incipientem hydropè: dantur à ʒ. j. ad aur. j. β. Mesues.

DE PILV.

A DE PILVLIS PURGANTIBVS HVMO-

res mixtos à toto.

Pilule aggregatiue.


℞. Myrobal:flauarum, Rhabarbari ana ʒ.β.
 Succu Eupatorij, Succu Absinthij ana ʒ. iij.
 Scammonij præparati ʒ. vj.
 Myrobal. Chebularum, Indarū, Agarici, Colocynthidis, Polypod. ana ʒ. ij.
 Turbith, Aloës ana ʒ. vj.
 Mastiches, Rosarum rubr. Salis gēme, Epithymi, Anisi, Zingiberis ana ʒ. j.
 Crafsiusculè omnia conterantur, & cum electuarij ros. Mesuæ quantum suf-
 ficit. Fiat massa, in charta munda, cerę liquatę intincta, seruanda per annum.
 Dosis ad ʒ. j. * Valent ad diurnas febres, & uitia capitis, uentriculi, & ie-
 cinoris. Humores item biliosos, & pituitosos educunt. Mesues.


DE CONFECTIIONIBVS A

ROMATICIS SOLIDIS, TABVLIS ET

rotulis. CAP. XXXIX.

B





DE TABVLIS CALFACIENTIBVS CAPVT.

Orbiculi diambrae.

℞. Spec. Diambrae ʒ. vj.

Sacchari albi in aqua fœniculi uel maioranæ dissoluti ℥. j.

Saccharum ad exactam perfectionem coquitur: deinde ab igne remotum, ligneo pistillo agitatur, & species iniiciuntur, ac probè miscentur: postea per plicam lebetis in tabulam farina uel puluere aliquo, ut cinnamomi, stratum, spatula assidue saccharum pari & æquali quantitate extrahatur: quod decidens placentulæ modo in orbem concresecit. Si quid uerò remanet in lebetè, durefcit iterum, sed pauca aqua affusa liquefcit: deinde extrahatur ut prius. Rotulæ concretæ digitis singillatim auferantur, & farina superficiei inferiori adhærente penicillo aut panno absterfa, in cribrum conijciantur, & ulterius in calido loco exiccantur: in ligneis arculis ex tilia aut simili materia inodora condantur. Postea in sicco & calido loco reponantur. * Cerebrum, cor, & stomachum confortat.

Orbiculi diamoschi.

℞. Diamoschi ʒ. vj.

Sacchari albi in aqua fœniculi dissoluti ℥. j.

Fiant orbiculi, ut antea dictum. * Malis cerebri frigidis, uertiginis, comitialibus, & difficulter spirantibus succurrit.

Confectio fœniculi orbiculata.

℞. Sacchari albissimi in aqua ros. dissoluti ℥. ʒ.

Saccharum

A Saccharum ad perfectionem exactam coquitur: deinde ab igne remotum, diu pistillo agitur, addanturq;

Olei foeniculi ℥. j. uel ℥. β.

Probè miscentur: deinde per plicam lebetis in tabulam farina stratam spatula assidue saccharum pari & æquali quantitate extrahitur. Rotulæ concretæ digitis auferantur, exiccantur, in ligneis arculis condantur, & sicco loco reponantur. * Capitis affectibus conferunt, uisum acuunt, pectoris angustiae & difficultati spirandi succurrunt.

DE TABVLIS CALFACIENTIBVS PECTVS.

Tabula diaireos.

℞. Spec. Diaireos S. ℥. β.

Sacchari albi in aqua capill. Ven. uel foeniculi dissoluti ℔. β.

Saccharum ad perfectionem coquitur, agitur, deinde species miscetur: postea saccharum fluidum adhuc in tabulam æqualiter sitam, effunditur, superficiesq; eius acie cultri perstringitur: postquam saccharum induruit, tota massa tollitur, & in suas portiones pro modo linearum frangitur: demum tabulæ in arculis ligneis, sicco loco reponuntur. * Tussiculosis, difficulter spirantibus auxiliantur, &c.

Orbiculi seu trochisci bechij.

B ℞. Sacchari albissimi ℔. j.

Sacchari candi optimi, Sacchari penidij ana ℥. iiij.

Ireos ℥. j. ℥. vj.

Amyli ℥. ij. β.

Mucilaginis Tragacanthæ cum aqua rosacea factæ quantum sufficit.

Formentur trochisci parui, & signentur. * Auxiliantur tussiculosis & difficulter spirantibus.

DE TABVLIS EXCALFACIENTIBVS

uentriculum.

Tabula aromati rosati.

℞. Specierum aromat. ros. ℥. β.

Sacchari albi in aqua ros. dissoluti ℔. β.

Fiant tabulæ, ut supra dictum est. * Ventriculo imbecillo, alijsq; nutritioni deseruientibus instrumentis succurrant.

Tabula diacymini.

℞. Spec. Diacymini ℥. β. uel ℥. vj.

Sacchari albi in aqua foeniculi dissoluti ℔. β.

Fiant tabulæ, eo modo quo dictum est. * Noxam uentriculi corrigunt: tussiculosis, difficultati spirandi, inflationibus sunt adiuvento.

Tabula dianisi.

A

℞. Spec. Dianisi ʒ.β. uel ʒ. vj.
 Sacchari albi in aqua anisi uel sceniculi dissoluti lb.β.
 Fiant tabulæ secundum artem. * Crassis flatibus in uentriculo natis, eiusdemq; perfrictioni succurrunt.

Confectio anisi tabulata.

℞. Sacchari albissimi in aqua ros. dissoluti lb.β.
 Coquitur ad perfectionem, deinde ab igne remouetur, pistillo diu agitur, additurq; Olei Anisi ʒ. j. uel ʒ.β.
 Miscentur: deinde per plicam lebetis in tabulam farina stratam spatula asiduè saccharum pari & æquali quantitate extrahitur. Rotulæ concretæ siccantur, & in ligneis arculis, siccò loco reponuntur. * Ad cruditatem stomachi ex flatibus, uomitionem, aquam inter cutem, fluorè uteri albū ualēt, &c.

Confectio caryophyllorum orbiculata.

℞. Sacchari albi, in aqua ros. dissoluti lb.β.
 Olei Caryophyllorum ʒ. j.
 Fiant orbiculi modo, quo iam dictū est. * Ventriculo, iecori & cordi p̄sunt.

DE TABVLIS EXCALFACIENTIBUS

hepar.

Tabula diacurcumæ.

B

℞. Spec. Diacinnamomi ʒ.β.
 Sacchari albi, in aqua eupatorij dissoluti lb.β.
 Fiant tabulæ, modo supra dicto. * Hepatis & lienis ægritudines eradicant, hydropem curant.

Tabula dialaccæ.

℞. Spec. Dialaccæ ʒ.β. uel ʒ. vj.
 Sacchari albi, in aqua eupatorij dissoluti lb.β.
 Fiant tabulæ secundum artem. * Iecinoris & lienis obstructions, inflations, & renum duritias sanant: aquæ inter cutem causas omnes discutunt, menses mouent, &c.

DE TABVLIS CALFACIENTIBVS

matricem.

Tabula de gemmis.

℞. Spec. Diagemmæ ʒ.β. uel ʒ. vj.
 Sacchari albi, in aqua arthemisiæ dissoluti lb.β.
 Fiant tabulæ secundum artem. * Malis cordis, uentriculi, cerebri, iecinoris, & uteri frigidis, auxiliantur.

DE TA-

A. DE TABVLIS REFRIGERANTIBVS PECTVS.

Tabule diatragacanthi frigidi.

℞. Spec. Diatragacanthi frigidi ʒ. β. uel ʒ. vj.

Sacchari albi, in aqua uiolarum dissoluti lb. β.

Fiant tabulæ secundum artem. * Omnibus pulmonum & thoracis uitijs aridis, maximè tabidis, macie confectis, medentur: inflammatione lateris laborantibus, omnibusq; tussibus calidis & siccis, &c.

Tabule diapenidij, sine speciebus calidis.

℞. Spec. Diapenidij, sine speciebus calidis ʒ. β. uel ʒ. vj.

Sacchari albi, in aqua uiolarum dissoluti lb. β.

Fiant tabulæ secundum artem. * Valent aduersus omnem thoracis noxam, tussim à calore contractam, uocis iacturam: tabidis deniq; & purulenta excreantibus succurrunt.

DE TABVLIS REFRIGERANTIBVS COR.

Tabule diamargaritonis frigidi.

℞. Spec. Diamarg. frig. ʒ. β.

Sacchari albi in aqua ros. dissoluti lb. β.

Fiant tabulæ secundum artem. * Omnem uirium imbecillitatem firmant, cor confortant, &c.

Manus Christi Perlata.

℞. Sacchari clarificati lb. j.

Aquæ rosarum lb. β.

Margaritarum minutissimè tritarum ʒ. β.

Saccharum & aqua rosacea coquantur simul, dum aqua euanescat, & saccharum iustam crassitiem consequatur: in fine margaritæ adduntur, atq; super marmor, uel tabulam farina stratam, infunditur, & rotulæ formantur. * Medentur deiectis uiribus, ardentibus febribus, & imaginationes falsas abolēt.

DE TABVLIS REFRIGERANTIBVS HEPAR.

Tabule diarrhodon.

℞. Spec. Diarrhodon Abbatis sine spec. calidis ʒ. β. uel ʒ. vj.

Sacchari albi, in aqua endiuizæ dissoluti lb. β.

Fiant tabulæ secundum artem. * Valent aduersus uentriculi calorem, icteris, lienis, pulmonumq; contra uiscerum dolores, & omnem totius corporis noxam à calore proficiscentem.

Tabule triafantali.

℞. Spec. Triafantali ʒ. β. uel ʒ. vj.

Sacchari albi, in aqua cichorij dissoluti lb. β.

PP 3

Fiant

670 DE CONFECT. SOLIDIS VSVALIBVS.

Fiant tabulæ secundum artem. * Pollent aduersus iecoris & uentriculi calore, mirum in modum: tabidis & regio morbo correptis profunt.

DE TABVLIS PURGANTIBVS BILEM.

Tabulæ ex elect. de succo rosarum.

℞. Spec. Electuarij de succo rosarum ʒ. vj.

Sacchari albi, in aqua endiuæ dissoluti ℥. β. uel ʒ. iij.

Fiant tabulæ quadratæ ponderis drachmarum quatuor. Datur ʒ. β. * Flauam bilem purgant citra molestiam.

DE TABVLIS PURGANTIBVS PITUITAM.

Tabulæ diaturbith.

℞. Spec. Diaturbith maioris ʒ. vj.

Sacchari albi in aqua ros. dissoluti ℥. β. uel ʒ. iij.

Fiant tabulæ secundum artem. Datur ʒ. β. * Humores phlegmaticos purgant.

Tabulæ diaphæniconis.

℞. Spec. Diaphæniconis ʒ. vj.

Sacchari albi, in aqua ros. dissoluti ʒ. iij.

Fiant tabulæ secundum artem. Datur ʒ. β. * Febribus compositis & diuturnis auxiliantur: bilem enim flauam & pituitam ducunt. Colicis cruciatibus mirificè conferunt.

DE TABVLIS CALFACIENTIBVS
stomachum.

Tabulæ confortantes & exiccantes stomachum.

℞. Spec. Aromat. ros. ʒ. ij.

Spec. Diarrhod. Abb. ʒ. j.

Sacchari albi, dissoluti in aqua menthæ ʒ. iij.

Fiant tabulæ secundum artem ponderis ʒ. ij. Rondeletius.

Tabulæ sulphurate, Vu.

℞. Florum Sulphuris ʒ. iij.

Sacchari albi in aqua ros. dissoluti ʒ. iij.

Olei Fœniculi G. xv. Moschi G. iij.

Fiant tabulæ secundum artem. * Paralyti atq; colicæ passioni conferunt.

Tabulæ aliæ confortantes uentriculum.

℞. Spec. Imperialium ʒ. β.

Pinearum electarum, & subtiliter incisarum ʒ. ij.

Spec. Aromat. ros. ʒ. j. β.

Sacchari in aqua rosarum dissoluti ʒ. viij.

Olei Cinnamomi G. iij. Moschi G. ij.

Fiat confectio in morsulis secundum artem. Ioannes Crato.

Morselli

A.

Morselli confortantes.

℞. Pinearum præparatarum ʒ. iij.

Amygdal dulcium ʒ. ij. β.

Cinnamomi electi ʒ. v.

Cariophyllorum ʒ. β.

Macis ʒ. j.

Phisticorum uiridium ʒ. j. β.

Zingiberis albi, incisi ʒ. ij.

Margaritarum præparatarum ʒ. β.

Foliorum auri n. iij.

Sacchari albi, in aqua ros. dissoluti ʒ. vij.

Fiant morselli quadrati secundum artem. Langius.

Confectio pinicata confortans.

℞. Pinearum præparatarum ʒ. j. β.

Phisticorum uiridium ʒ. vij. β.

Foliorum auri n. xv.

Margaritarum præparatarum ʒ. j. β.

Sacchari in aqua rosarum dissoluti ʒ. xij.

Fiant tabulæ quadratæ secundum artem. Langius.

Tabula confortantes, alie.

B.

℞. Sacchari albissimi, in aqua rosarum dissoluti ʒ. iij.

Olei Caryophyllorum G. iij.

Coralli rubri præparati ʒ. j.

Moschi G. ij.

Fiat cōfectio in orbiculis secundum artem. Ioan. Crato, Medicus Cæsareus.

DE TABVLIS REFRIGERANTIBVS
stomachum.*Tabule orificium stomachi claudentes, & corroborantes.*

℞. Coriandri præparati ʒ. j.

Cinnamomi electi ʒ. ij.

Coralli præparati ʒ. j.

Santali albi, Mastiches ana ʒ. j.

Sacchari albi, in aqua rosarum dissoluti ʒ. x.

Conseruæ rosarum ʒ. β.

Fiat cōfectio in morsulis secundum artem. Crato.

DE TABVLIS REFRIGERANTIBVS HEPAR.

Tabule ad hepatis refrigerationem.

℞. Conseruæ flor. Cichorij, flor. Nenupharis ana ʒ. j.

Spec. Triasantali, Diatrag. frig. ana ʒ. ij.

Sacchari.

672 DE CONFECT. SOLID. MINVS VSVAL.

Sacchari albi, in aqua endiuæ dissoluti ℥. iiij.
Fiant tabulæ secundum artem. Rondeletius.

A

DE TABVLIS PVRGANTIBVS BILEM.

Orbiculi ex rhabarbaro.

℞. Sacchari albi, in aqua cinnamomi dissoluti, & ad pfectionē cocti ℥. iiij.
Extracti rhabarbari, in succi rosarum drachmis duabus dissoluti ℥. j.
Rhabarbari subtiliter puluerizati, atq; in aqua cinnamomi humectati ℥. ij.
Fiant tabulæ secundum artem. Ioannes Crato.

Tabule ad purgandam bilem alia.

℞. Mannæ electæ ℥. iiij.
Succi Rosarum rubrarum ℥. ij.
Conseruæ Buglosi, Conseruæ Cyrsij ana ℥. ij.
Diagridij ℥. vj.
Sacchari albi quantum satis est ad placentulam formandam: quæ diuidetur in tabellas singulas ℥. β. pendentes. Andernacus.

Tabule ad bilem alia.

℞. Santali citrini, albi, rubri, Galliæ moschatae, Trochiscorum oxyacanthæ ana ℥. iiij.
Mannæ ℥. iiij.
Succi Rosarum rubr. ℥. j. β.
Conseruæ Cichorij, Conseruæ Borriginis ana ℥. ij.
Diagridij ℥. j.
Sacchari albi quantum sufficit.

B

Fiant tabellæ secundum artem, drachmas duas aut tres pendentes, pro robustioribus: pro imbecillioribus ℥. j. dari potest. Andernacus.

Alia.

℞. Spec. Diamoschi ℥. j.
Spec. Diarrhod. Abb. Calami aromat. ana ℥. j.
Rhabarbari electi ℥. j.
Diagridij ℥. ij. β.
Sacchari in aqua ros. dissoluti ℥. iiij. uel ℥. iiij.
Fiant tabulæ. Datur ℥. β. A' quodam Italo.

DE TABVLIS PVRGANTIBVS PITVITAM.

Tabule diacnicu.

℞. Diatragacanthi frigidi ℥. β.
Carnis Cotoneorum ℥. j.
Zingiberis albi ℥. ij.
Medullæ seminis Cnici ℥. iiij.

Diagridij

- A** Diagridij ʒ. iij.
 Turpeti albi ʒ. vj.
 Mannæ, Mellis rosati colati ana ʒ. j.
 Sacchari optimi ʒ. x.
 Parentur tabellæ, pendentes ʒ. ʒ. singulæ. Andernacus.
Tabula Stibiata, Vn.
 ꝛ. Stibij seu Antimonij præparati ʒ. ij.
 Gummi Tragacanthi ʒ. j.
 Sacchari albi, in aqua ros. diffoluti ʒ. iij.
 Olei Anisi ʒ. xv.
 Fiant tabulæ secundum artem, pendentes ʒ. j. singulæ pro robustioribus:
 imbecillioribus uerò ʒ. ʒ. uel ʒ. ij. exhibere soleo. * Purgant per uomitum
 & aluum ualenter.

DE TABVLIS PURGANTIBVS

melancholiam.

- ꝛ. Succi Cotoneorum, Mellis opt. despumati ana lb. j. ʒ.
 Caryophyllorum, Zingiberis, Cinnamomi ana ʒ. j.
 Conferuæ Buglosi, Cyrsij, Violarum ana ʒ. ij.
B Epithymi, Fol. Senæ ana ʒ. ʒ.
 Veratri nigri ʒ. vj.
 Ex saccharo fingantur tabellæ paruæ, drachmas duas pendentes. Ander-
 nacus.

TABVLÆ PURGANTES HVMO-

res mixtos.


- ꝛ. Spec. electuarij Diacnicu ʒ. ʒ.
 Spec. elect. Diaturpeti cum rhabarbaro ʒ. vj.
 Sacchari ʒ. iij. ʒ.
 Redigantur in placentulas, drachmas tres pendentes. Andernacus.

qq

DE TRO-

DE TROCHISCIS

CAPVT XL.



Trochisci, Latini Pastilli, sunt uel rotundi, uel quadrati, cum quadam depressione, ad similitudinem grossi lupini. Eorum alij

Alte-

A

- Altringunt {
 - Trochisci de terra sigillata,
 - Trochisci de charabe,
 - Trochisci de berberis,
 - Trochisci de spodio,
 - Trochisci ad fluxum,
 - Trochisci de corallo, &c.

Emolliunt: *ut* — Trochisci de cappare, &c.

B

A.
Alterates qualia.
te secunda, aut

- Aperiunt: *ut* {
 - Trochisci hepatici,
 - Trochisci ex amygd. amaris,
 - Trochisci de absynthio,
 - Trochisci de rosis,
 - Trochisci de lacca,
 - Trochisci de alkekengi,
 - Trochisci de eupatorio,
 - Trochisci aliptæ moschatæ,
 - Trochisci de myrrha,
 - Trochisci de rhabarbaro,
 - Trochisci anisi, &c.

Abstergant: *ut* — Trochisci cyphi.

- Venena fugant: *ut* {
 - Pastilli ad aerem pestilentem,
 - Pastilli in frigido pestilentia tempore,

- Dolorem sedant: *ut* {
 - Trochisci diarrhodon Mel,
 - Trochisci diaspermaton,
 - Trochisci de caphura, &c.

DE TROCHISCIS ALTERANTIBVS.
DE TROCHISCIS CALIDIS.

A

Trochisci ligni aloës.

℞. Ligni aloës, Rosarum rub. ana ʒ.ij.
Mastiches, Cinnamomi, Caryophyllorum, Nardi Indicæ, Macis, Nucis
moschatæ, Cubearum, Cardamomi minoris, maioris, Pastinacæ, Galliæ,
Corticis Citri ana ʒ.ij.β.

Moschi, Ambræ ana ʒ.β.
Mellis passulati quantum sufficit.

Formentur trochisci. Siccentur in umbra, & seruentur in charta, ceræ liqua-
tæ intincta. Durant annum unum. * Ventriculorum, cor, hepar imbecilla ro-
borant: ob id ualent ad oris fetorem, pullum cordis, & syncopen, & hydro-
pen. Mesues.

Trochisci de croco.

℞. Croci ʒ.ij.
Rosarum rubrarum, Ammi, Myrrhæ ana ʒ.ij.β.
Ligni aloës ʒ.ij.
Aquæ rosacæ quantum sufficit.

Fiant trochisci. Nicolaus.

Crocomagma Damocratis.

B

℞. Croci ʒ.c.
Myrrhæ Rosarum rub. ana ʒ.l.
Amyli, Gummi Arabici ana ʒ. xxx.
Vini quantum sufficit. Fiant trochisci. Galenus.

Pastillus calefaciens, ad uitia uentris ex frigore.

℞. Absinthij, Sem. Apij, Anisi, Cinnamomi, Casiæ odoratæ ana ʒ.ij.
Myrrhæ, Spicæ Indiæ, Castorei ana ʒ.ij.
Piperis longi, Lachrymæ papaueris, Croci ana ʒ.ij.
Succi Fœniculi quantum sufficit.

Fiant trochisci. Andernacus.

DE TROCHISCIS FRIGIDIS.

Trochisci de spodio.

℞. Rosarum rubrarum ʒ.ij.β.
Spodij ʒ. x. Sem. Acetosæ ʒ. vj.
Sem. Portulacæ, Coriandri preparati, Sumach ana ʒ.ij.β.
Amyli usti, Balauftiorum Berberis ana ʒ.ij.

Gummi Arabici assati ʒ.ij.β. Agrestæ quantum sufficit.
Fiant trochisci. Seruantur in annum. * In febribus biliosis cum alui fluo-
re efficaces sunt: inflammationem uentriculi & hepatis, & sitim continuam
sedant. Mesues.

Trochisci

A *Trochisci santalorum.*
 ℞. Trium Santalorum ana ʒ. viij.
 Spodij, Sem. Cucumeris, Cucurbitæ, Citrulli, Portulacæ, Boli Armeni ana ʒ. iij.
 Rosarum ʒ. vj. Aquæ Portulacæ quantum sufficit.
 Formentur trochisci. Seruantur in annum. * Ad febrem ardentem, uentri-
 culi & hepatis intemperiem calidam, & sitim dantur lacte acido, aut ompha-
 cio, aut succo acido citri, aut succo ribes. Mesues.
Trochisci santalorum alij.
 ℞. Santalorum citrinorum ʒ. ij.
 Gummi Arabici, Sem. Citrulli ana ʒ. j.
 Sem. Lactucæ, Sem. Portulacæ, Tragacanthi, Succu Glycyrrhizæ ana ʒ. ʒ.
 Fac trochiscos: utere, ut prius. Mesues.

Trochisci de caphura.
 ℞. Fol. Ros. rub. ʒ. ʒ.
 Spodij ʒ. ʒ.
 Santali citrini ʒ. ʒ. ʒ.
 Croci ʒ. j.
 Glycyrrhizæ ʒ. ij.
B Sem. Citrulli, Melonis, Cucumeris, Cucurbitæ: Tragacanthæ, Gummi A-
 rabici, Nardi Indicæ ana ʒ. j.
 Ligni aloes, Cardamomi maioris, Amyli, Caphuræ ana ʒ. ij.
 Sacchari albi, Mannæ ana ʒ. iij.
 Mucilaginis sem. Psyllij, cum aqua ros. extractæ q. f.
 Formentur trochisci. Durant annum. * Ad febres ardentes, bilis & sangui-
 nis feruorem, uentriculi & hepatis intemperiem calidam, & ab his sitim in-
 expletam, icterum quoq; ac phthisim & hecticam conferunt. Mesues.

DE TROCHISCIS ASTRINGENTIBVS.

Trochisci de terra sigillata.
 ℞. Sanguinis draconis, Gummi Arabici assati, Trochiscorum Ramich, Ro-
 sarum rubrarum, Spodij, Sem. Rosarum, Amyli assati, Acaciæ, Lapidis hæma-
 titis, Hypocistidis, Balaustiorum, Boli Armeni, Terræ sigillatæ, Coralli rubri,
 Charabæ ana ʒ. ij.
 Margaritarum, Tragacanthæ, Sem. Papaueris nigri ana ʒ. j. ʒ.
 Sem. Portulacæ, Cornu cerui usti, Thuris, Gallarum, Croci ana ʒ. ij.
 Aquæ plantag. quantum sufficit.
 Qui uolet cum opio, addat Opij ʒ. ij.
 Formentur trochisci. Seruantur in charta, ceræ liquatæ intincta, ad annos
 duos. * Sunt admodum efficaces ad sputum sanguinis cum aqua planta-
 ginis

QQ 3

ginis poti: ad fluorem uerò sanguinis è naribus. fronti illiti: ad menses immo- A
dicos, utero iniecti, uel pubi illiti: ad mictum sanguinis, in uescam iniecti: &
ad alias hæmorrhagias, parti sanguine fluenti impositi. Mesues.

Trochisci de charabe.

℞. Charabæ ʒ. ix.

Cornu cerui usti, Gummi Arabici assati, Coralli rubri usti, Tragacanthæ,
Acaciæ, Hypocistidis, Balauſtiorum, Mastiches, Laccæ, Papaueris nigri assa-
ti ana ʒ. iij.

Thuris, Croci, Opij ana ʒ. ij. G. xv.

Mucilaginis Pſyllij quantum sufficit.

Formentur trochisci. Seruantur in charta, ceræ liquatæ intincta. Durant an-
nos duos. * Vtiles sunt ad constringendum sanguinem undecunq; fluen-
tem, menstrua, sputum, fluxum sanguineum, & hæmorrhoidalem: & consoli-
dant ulcera pectoris & pulmonis. Mesues.

Trochisci de berberis.

℞. Berberis ʒ. ij.

Spodij, Ligni aloes, Seminis Acetosæ, Mastiches, Galliæ moschatæ, Nara-
di Indicæ ana ʒ. j.

Gummi Arabici ʒ. iij.

Rosarum rubrarum ʒ. v.

Aquæ rosarum quantum sufficit.

Formentur trochisci. Siccantur in umbra. Seruantur in papyro mundo, ceræ
liquatæ intincto, per annum. * Valent ad intemperiem calidam, fluorem
alui, & hepatis dolorem. Mesues.

Trochisci ad fluxum.

℞. Balauſtiorum, Cort. gladium, aceto maceratorum & tostorum, Rhois,
Baccarum Myrti, Hypocistidos ana ʒ. ij.

Cymini Carmani, Gallarum aceto maceratarum & tostorum, Capitū Gra-
natorū, Fructus Tamaricis, Macis, Xyloaloes, Galliæ aromatica, Mastiches,
Spicæ Indicæ ana ʒ. j.

Sem. Oxalidis, Gūmi, Boli Armeni, Sem. Vuæ, Passerū tostorum ana ʒ. j. β.

Sem. Coriandri, aceto macerati & tosti ʒ. ij.

Vini Pontici quantum sufficit.

Formentur trochisci ponderis ʒ. j. quorum unus datur cum syrupo cydonio-
rum, uel aliquo succo stiptico. Mesues.

Trochisci alij ad idem cum exulceratione intestinorum.

℞. Spodij ʒ. vij.

Semin. Rosarum, Balauſtij, Rosarum, Acaciæ, Sanguinis draconis a-
na ʒ. ij. β.

Sem.

- A Sem. Acetosæ ʒ. j. β.
 Oxycanthæ, Carnis Rhu, Semin. Plantaginis, Sem. Portulaci affati ana
 ʒ. j. G. x.
 Gummi affati ʒ. j.
 Fiant trochisci ponderis ʒ. β. * Dantur cum decocto hordæi excorticati.
 Mesues.

Trochisci de corallo.

- ℞. Coralli rubri, Cinnamomi, Myrrhæ, Amomi, Se. Papaueris albi ana ʒ. β.
 Schœnanthi, Croci ana ʒ. j.
 Calami aromatici, Xylobalsami, Casiæ, Folij, Mastiches, Phu, Polij mon-
 tani, Afari, Pedis columbini ana ʒ. j.
 Vini quantum sufficit.
 Formentur trochisci. * Sanguinolenta excreantibus, dysentericis, cœlia-
 cis, cibum fastidientibus mirè subueniunt. Nicolaus.

Diacorallu Galeni.

- ℞. Coralli rubri, Terræ Samiæ ana ʒ. j.
 Balauftiorum, Amyli, Terræ Lemniæ ana ʒ. β.
 Sem. Hyosciami, Opij, Hypocistidis ana ʒ. j.
 Succij Plantaginis quantum sufficit.
 B Formentur trochisci. Siccantur in umbra, & seruantur in charta munda, ceræ
 liquatæ intincta ad annos duos. * Ad eadem efficax, Galenus.

DE TROCHISCIS EMOL-

lientibus.

Trochisci de capparibus.

- ℞. Cort. rad. Capparidis, Sem. Agni ana ʒ. vj.
 Sem. Nigellæ, Calamenthi, Succij Eupatorij, Acori, Amygdal. amar. Folio-
 rum Rutæ, Aristolochiæ rotundæ, Sem. Nasturtij, Ammoniaci ana ʒ. j.
 Cyperi, Ceterach ana ʒ. j.
 Ammoniacum dissoluito, & reliqua triturato: deinde fiant trochisci. Seruan-
 tur in annum, in charta munda, ceræ liquatæ intincta. * Ad splenis duritiæ
 & flatu eius dissipandos ualent. Mesues.

DE TROCHISCIS APE-

rientibus.

Trochisci hepatici, Asclepiadis.

- ℞. Anisi, Sem. Apij, Afari, Amygdalarum, Ablinthij ana ʒ. β.
 Aquæ pluuiæ quantum sufficit.
 Formetur trochisci. * Hepaticos iuuât: habent enim uim hepar expurgandi
 per

per urinas: dantur cum uino, febrientibus cum aqua. Galenus.

A

Pastilli ex amygdalis amaris.

℞. Anisi, Apij, Afari, Comarum Absinthij, Amygdal. amararum ana ʒ.ij.
Aquæ quantum sufficit.

Formentur pastilli. * Idem præstant. Dantur febri carentibus ex mulso, febrientibus cum hydromelite. Paulus.

Trochisci de absinthio.

℞. Rosarum, Absinthij, Anisi ana ʒ.ij.

Rhabarbari, Succi Eupatorij, Afari, Sem. Apij, Amygd. amararum, Nardi Indicæ, Mastiches, Folij ana ʒ.ij.

Succi Endiuicæ quantum sufficit.

Formentur trochisci, in charta munda, ceræ liquatæ intincta, seruandi per annum. * Obstructiones uentriculi & hepatis, & ab his dolorem & febres antiquas tollunt, dictas partes, reliquasq; nutritorias roborant, ac appetentiam excitant. Mesues.

Trochisci de rosis, Rhasis.

℞. Rosarum rubrarum ʒ.β.

Ligni aloes ʒ.ij.

Mastiches ʒ.β.

Absinthij, Cinnamomi, Nardi Indicæ, Casia, Schœnanthi ana ʒ.ij.

B

Vini antiqui, & decoctionis quinque radicum q. f.

Formentur trochisci. Durant annum unum. * Sunt efficaces ad multos affectus, præsertim ad uentriculi dolorem, malam coctionem, febres antiquas, hydropem incipientem, & illos maximè, quibus forma corrumpitur. Mesues.

Trochisci de lacca.

℞. Lacca, Succi Glycyrrhizæ, Succi Eupatorij, Absinthij, Berberis, Rhabarbari, Aristolochiæ longæ, Costi, Afari, Amygd. amararum, Rubiæ, Semin. Apij, Sem. Anisi, Schœnanthi ana ʒ.ij.

Vini quantum sufficit.

Formentur trochisci. Siccantur in umbra, & reponuntur in charta munda, ceræ liquatæ intincta. Durant annum unum. * Valent ad obstructiones hepatis & lienis, & inde natas febres uarias antiquas, & ascitem per urinas mouent. Mesues.

Trochisci de alkekengi.

℞. Fructus Alkekengi ʒ.ij.

Sem. Citrulli, Cucumeris, Cucurbitæ ana ʒ.ij.β.

Boli Armenici, Gummi Arabici, Thuris, Sanguinis draconis, Sem. Papiueris albi, Amygdal. amararum, Succu Glycyrrhizæ, Tragacathæ, Amyli, Pincarum

A Pinearum mundat. ana ʒ. vj.

Sem. Apij, Carabæ, Terræ sigillatæ, Hyosciami, Opij ana ʒ. ij.

Iulepi uiolati quantum sufficit.

Formentur trochisci. Durant annos duos. * Valent ad renum & uesicę ulcera, & natam inde dysuriam. Mesues.

Trochisci de eupatorio.

℞. Mannæ electæ, Succij Eupatorij ana ʒ. j.

Rosarum rub. ʒ. β.

Nardi Indicæ ʒ. iij.

Spodij ʒ. iij. β.

Rhabarbari electi, Afari, Anisi ana ʒ. ij.

Succij Eupatorij quantum sufficit.

Fiant trochisci. * Obstructionem & tumorem præter naturam hepatis & lienis sanant, ac inde natas febres antiquas, & harum rigorem, icterum, ac incipientem hydropem. Mesues.

Trochisci aliptæ moschatæ.

℞. Ladani ʒ. iij.

Styracis ʒ. j. β.

Styracis rubræ ʒ. j.

B Ligni aloes ʒ. ij.

Ambre ʒ. j.

Camphoræ ʒ. j. β.

Moschi ʒ. β.

Aquæ ros. quantum sufficit.

Formentur trochisci secundum artem. * Valent pueris laborantibus asthmate, & ijs qui angusto sunt thorace, nec lac hauustum retinent, præstatq. uisum optimi & odoriferi suffitus.

Trochisci de myrrha.

℞. Myrrhæ ʒ. iij.

Lupinorum ʒ. v.

Foliorum Rutæ, Mentastri, Pulegij, Cumini, Rubiæ, Asæ fœtidæ, Sagapeni, Opopanacis ana ʒ. ij.

Dissoluentur gummi in aceto, formanturq. trochisci cum succo absinthij. Siccantur in umbra, & in charta munda, ceræ liquatæ intincta, seruantur annum. * Prouocant menstrua, & sedant dolores, qui ex retentis menstruis proueniunt. Rhafis.

Trochisci de aniso.

℞. Anisi, Succij Eupatorij ana ʒ. ij.

Sem. Anethi, Nardi Indicæ, Mastiches, Folij, Fol. Absinthij, Afari, Apij,
RR Amygdalarum

Amygdalarum amararum ana ʒ.β.

Aloes ʒ.ʒ.

Syrupi Absinthij quantum sufficit.

Formantur trochisci Sic cantur in umbra. Reponuntur in charta munda, cere liquatę intincta: & seruantur annum unum. * Obstructiones hepatis, & alios eius morbos, & inde natas febres antiquas sanant. Mesues.

Trochisci ex aniso alijs, ex decem simplicibus.

℞. Anisi, Succu Eupatorij ana ʒ.β.

Mastiches, Spicę Indicę, Apij, Absinthij Rom. Afari, Folij ana ʒ.ʒ.

Amygdalarum amararum ʒ.ʒ.β.

Aloes bonę ʒ.ʒ.

Decocti Absinthij quantum sufficit.

Formetur trochisci. * Hepatis uitia, & inde natas febres antiquas, & quartanas, & formam corrumpentes sanare sunt à ueteribus probati. Mesues.

DE TROCHISCIS ABSTERGENTIBVS.

Trochisci Cyphi.

℞. Pulpę passularum, Terebinthinę coctę ana ʒ.iiij.

Myrrhę, Schœnanthi ana ʒ.ʒ.β.

Galami aromatici ʒ. ix.

Cinnamomi ʒ.β.

Vnguis odorati, Nardi Indicę, Castię, Cyperi, Baccarũ Iuniperi ana ʒ.iiij.

Aspalathi ʒ.ʒ.β.

Croci ʒ.ʒ.

Mellis quantum sufficit.

Vini medicum.

Formantur trochisci. * Valent ad pulmonum, iecoris, aliarumq; internarum partium exulcerationes. Damocrates.

DE TROCHISCIS VENENA EV- gantibus.

Pastilli ad pestilentem aerem in æstate.

℞. Rosarum rubrarum, Florum Violarum, Flor. Nymphę ana ʒ.ʒ.

Corticis Citri, Sem. Citri ana ʒ.β.

Coriandri, Santali rubri, Spec. Diarrhodon ana ʒ.ʒ.

Boli Armeni ʒ.ʒ.

Mucilaginis Tragacanthę cum aqua ros. extractę q. s.

Formantur pastilli. Andernacus.

Pastilli in frigido pestilentie tempore idonei.

℞. Spec. Aromat. ros. item Diamarg. calidi ana ʒ.ʒ.

Boli

- A Boli Armeni ʒ. j. β.
Mucilaginis Tragacanthæ, cum aqua rosarum extractæ q. f.
Formentur pastilli. Andernacus.

DE TROCHISCIS DOLOREM
sedantibus.

Trochisci diarrhodon Mesue.

- ℞. Rosarum rubrarum ʒ. ix.
Ligni aloes, Nardi Indicæ ana ʒ. iij.
Glycyrrhizæ ʒ. iij. β.
Spodij ʒ. j. β.
Mastiches ʒ. ij.
Crocī ʒ. ij. β.
Vini albi quantum sufficit.
Fiant trochisci. * Efficacissimi ad febres pituitosas, antiquatas, alijs im-
plexas, ventriculi dolorem leniendum, & humores ipsi adhærentes de-
tergendos.

Trochisci diaspermaton.

- B ℞. Sem. Apij, Ammi ana ʒ. j.
Anisi, Fœniculi ana ʒ. β.
Opij, Casiæ ana ʒ. ij.
Aquæ pluviæ quantum sufficit.
Formentur trochisci. Durant annos duos. * Dantur ex passo, aut aqua: se-
dant dolorem, ad omnes internos affectus, & pleuritidas utiles sunt, & san-
guinem reieciantibus. Galenus.

DE TROCHISCIS PURGAN-
tibus bilem.

Trochisci de rhabarbaro.

- ℞. Rhabarbari boni ʒ. x.
Succi Eupatorij, Amygdal. amararum ana ʒ. β.
Rosarum, Nardi Indicæ, Anisi, Rubiæ, Semin. Apij, Absinthij, Asari a-
na ʒ. j.
Aquæ Cuscuthæ quantum sufficit.
Fiant trochisci, ponderis drachmæ unius cum dimidia. Siccantur in um-
bra, & seruantur in charta munda, ceræ liquatæ intincta, per annum. * Va-
lent ad hepatis obstructionem, dolorem, tumores præter naturam, affectus
inueteratos eiusdem. Mesues.

Pastillus purgans bilem.

A

℞. Mastiches, Nucis pineæ, Vuarum passarum, detractis acinis ana G. v.
 Cumini G. viij.
 Diagridij ʒ. j.
 Mellis quantum sufficit.

Formentur pastilli, qui una uice assumi possunt. Andernacus.

DE TROCHISCIS PITVITAM
 purgantibus.

Trochisci de agarico.

℞. Agarici ʒ. iij.
 Salis gemmæ ʒ. β.
 Zingiberis ʒ. iij.
 Oxytelitis quantum sufficit.

Agaricum lima confringendum, & formandi trochisci. * Purgant ex cerebro & capite phlegma crassum cum cholera mixtum: & præcipuè educunt ex pectore crassos humores, putridos & uiscosos. Mesues.

Agaricus trochiscatus.

℞. Agarici electi ʒ. iij.

Vini, in quo maceratum sit zingiber, quantum sufficit.

B

Agaricum limandum est, & formandi trochisci. Additur insuper gummi, aut tragacantha: & potest iniici in omnes compositiones, in quas agaricum ingreditur: uires enim habet agarici, & tutius agit, minoreque uentriculi noxa. Mesues.

Trochisci Albandul.

℞. Pulpæ Colocynthidis ʒ. x.

Minutim incisa fricentur cum Olei Rosati ʒ. j.

Tragacanthi, Gummi Arabici, Bdellij ana ʒ. vj.

Macerentur quadriduum in aqua rosacea, his colatis & expressis, partem unam cum colocynthide permiscebis. & fiat massa, quæ siccata in sole, rursus teretur, atque addetur altera pars colaturæ, & formabuntur trochisci: qui iniici possunt in omnes compositiones, quæ colocynthidem recipiunt, & ipsa colocynthide salubriores sunt. Mesues.

Trochisci Hamech.

℞. Violarum humidi & siccæ mediarum aur. xij.

Turbith gummosi aur. vj.

Succi Glycyrrhizæ aur. iij.

Mannæ ʒ. iij. * Sedant inflammationem, uentrem leniunt, thoracem purgant. Dantur aur. ij. cum saccharo, aut pulpæ calsiæ fistulæ. Mesues.

DE TRO-

ANTIDOTARIUM LIB. II
DE TROCHISCIS PURGANTIBVS

685

A

humores mixtos.

Trochisci de uiolis, magistrales.

℞. Violarum nigrarum ʒ. vj.

Turbith ʒ. iij.

Succi Glycyrrhizę, Mannę, Diagridij ana ʒ. ij.

Formentur trochisci. * Aquas, pituitam crassam & bilem purgant, flatuq; dissipant.

DE TROCHISCIS, COMPOSITIONES ALIORUM medicamentorum ingredientibus.

Trochisci de uipera.

℞. Viperas n. xx.

Sumendę sunt autem, non quę quouis tempore captę sunt, sed a medio potissimum Aprile, in finem usq; Maij, aut paulo tardius, locisq; procul a mare disitis. Eligendę sunt feminae, quęq; colore subflauo sint, non pręgnantes: quę caput latius habeant, & depressum: collu longius, graciliusq; quam mares: uentre uastiores: cauda minore, quę non inuoluta est, sed potius con torta & distensa: in cessu quieti proximo, quę tamen postremas partes in incessu magis moueant: aspectu ferino & inuerecundo, oculis subrubentibus, & recens capitę. Capita primu & caudas amputabis, quatuor digitorum longitudine utriq; his amputatis, considerandum est, si motum quendam in ipsis residuum conspicias, sanguinemq; multum fundent: nā hæ ceu præstantissimę sumendę sunt. deinde pelle detracta, interanea cum adipe abijci enda erunt: reliquum corpus in ollam nouam bene coctam immittendum, & coquendum in aqua fontana, additis anethi comis, & sub finem pauillo salis, (ignis autem esto e carbonibus accensis, aut sarmentis uitium) donec carnes a spinis separentur. Cum coctę fuerint, ollam ab igne depones, & carnes diligenter a spinis exemptas, per se contundes, nulla iusculi addita parte: & addito puluere panis biscocti maximè puri, quantum pastillis formandis sufficiat, quę erit secundum Galenum tertia aut quarta pars, admisceto. Formabis in pastillos ponderis duarum drachmarum, & siccabis in superiori adium parte, in cella ad meridię conuersa, a puluere diligenter munda. Sępe autem conuertendi sunt, per quindecim dies, aut eo amplius, donec probè exiccati fuerint: deinde in pyxidem uitream, aut figulinam uitratam bene obturatam reponendi. Annum unum integri perseuerant: quam longè melius sit, haud multo post quàm ipsos confeceris, theriacam conficere. Qui autem diutius conseruare uolet, subinde abstergendi sunt a puluisculo quodam, qui illis obnasci consueuit: qui si diutius inhæreat, pastillos perforabit. Hoc itaq; modo conseruari possunt integri ad tertium annum. Galenus.

RR 3 Tro-

Trochisci de scilla.

A

Scillam initio Iulij collectam, mediæ magnitudinis, plenam, candidâ, cortice primo detracto, & parte duriore cui radicula adhærent, abiecta, farina subacta inuolues, & eousq; in clibano coques, donec farina probè siccata sit: & ea perforata, stylo ligneo tentabis, num scilla undiq; tenera sit. Ea exempta, partem interiorem diligenter teres: cui admiscebis farinæ erui tenuissimè cribratę uncias octo ad singulas libras, & formabis in trochiscos ponderis duarum drachmarum, & siccabis in superiore parte ædium, in cella probè mundata, meridiem spectante, sæpius obuertendo, donec probè siccati sint, deinde repones: ut suprâ dictum est de pastillis uiperinis. Galenus.

Trochisci ramich.

℞. Succi Acetosæ ʒ. xvj.

Rosarum ʒ. j.

Baccarum Myrti ʒ. ij.

Boli pauxillum. Colentur, & colaturæ adiunge,

Gallarum tritarum ʒ. iiij.

Coque aliquantulum. Cola: & adde insuper subsequencia bene triturrata:

Rosarum ʒ. j.

Santali Citrini ʒ. x.

Gummi Arabici ʒ. j. ℞.

Sumach, Spodijana ʒ. j.

Omphacij seu agrestæ ʒ. vij.

Baccarum Myrti tritarum ʒ. iiij.

Ligni aloes, Caryophyllorum, Macis, Nucis moschatæ ana ʒ. iiij.

Misce omnia, & siccantur in scutella figulina, & tere minutim, & fiant trochisci cum ʒ. j. β. de caphura & aqua rosacea q. s. Succi acetosæ loco sumi potest uinum è codonijs acerbis: sunt qui aromatizent Gran. xvij. moschi. Siccantur in umbra, & reponuntur in charta munda, ceræliquatæ intincta. Durant in annum. * Ventriculum, cor, hepar imbellica firmant, & lubrica uiscera ac intestina, cholera morbum sistunt, acrimoniam obtundunt, animum reddunt tranquillum, omnem hæmorrhagiam cohibent, os quam naribus, sanguine cohibent: os quam naribus sanguine fluentibus stando impelluntur, alijs medicamentis miscentur. Mesues.

Trochisci hedicroi, Andromachi.

℞. Mari, Afari, Maioranæ, Aspalathi ana ʒ. ij.

Schænanthi, Calami odorati, Phu, Xylobalsami, Opobalsami, Cinnamon, Costi ana ʒ. iiij.

Myrrhæ, Folij, Nardi Indicæ, Croci, Casiæ ana ʒ. vj.

Amomi ʒ. xij.

Mastiches

A. Mastiches ʒ. j.

Vini quantum sufficit.

Fiant trochisci, inunctis prius manibus opobalsamo: deinde siccantur, & in charta ceræ liquatæ intincta seruantur in annum. Ex Galeno.

Trochisci galliæ moschate.

℞. Ligni aloes ʒ. v.

Ambræ ʒ. iij.

Moschi ʒ. j.

Mucilaginis Tragacanthæ, cum aqua ros. extractæ q. s.

Fiant trochisci parui. * Cerebrum, corq; roborant: oris, atq; ad eò corporis totius odorem commendant: compositionibus alijs miscentur. Mesues.

Trochisci diarrhodon, Nicolai.

℞. Rosarum recentium ʒ. β.

Spodij ʒ. ij.

Santali rubri ʒ. j. β. G. vij.

Santali albi ʒ. j. G. xij.

Crocij ʒ. ij. G. vij.

Caphuræ G. xij.

B. Fiunt in hunc modum. Rosas recentes in mortario contundes lapideo, sine intermissione, & reliqua in puluerè redacta addes, ac cum aqua rosacea q. s. formabis: sub finem caphurâ addito, sicca in umbra, & serua. * Hæc compositio administratur in magnis compositionibus Nicolai.

Trochisci diani.

℞. Violarum albarum uiridium ʒ. v.

Amyli ʒ. iij.

Papaueris albi ʒ. ij. ʒ. j.

Sem. Plantag. ʒ. j.

Rhabarbari ʒ. j.

Opobalsami ʒ. j.

Aquæ Ros. quantum sufficit.

Formentur trochisci. Non præparantur, nisi quando ingrediuntur compositiones magnas. Nicolaus.

DE TROCHISCIS EXTRINSECVS

applicandis.

Pastillus Andronius.

℞. Florum Mali punici ʒ. x.

Gallæ omphacitidis ʒ. viij.

Myrrhæ, Aristolochiæ ana ʒ. β.

Calcanthi, Aluminis scissilis, Missij ana ʒ. ij.

Sapæ quantum sufficit.

Formentur

688 DE TROCHISCIS EXTRINSE. APPLICAN.

Formentur trochisci. * Faciunt ad recentia uulnera & uetera: curant fistulas, aures suppurantes, ossa corrupta: reprimunt omnem carnis excrescentiam: ualent ad phagedænas & condylomata. Andromachus. A

Trochisci de minio.

℞. Medullæ panis non cocti, bene fermentati ℥. ʒ.
Sublimati electi ʒ. j.
Minij ʒ. ʒ.
Aquæ Ros. quantum sufficit.

Formentur trochisci, qui in clibano tepente resiccati seruentur. * Omnes carnis prauas excrescentias liquat, sordida ulcera expurgat, callosa emollit, ac fistulas mirabiliter sanat. Ioannes de Vigo.

Pastilli Polyida.

℞. Florum Mali punici ʒ. xij.
Aluminis scissilis ʒ. iiij.
Thuris, Myrrhæ ana ʒ. ʒ.
Calcanthi ʒ. ij.
Fellis taurini ʒ. vj.
Aloes ʒ. viij.

Vini austeri quantum sufficit.

Formentur pastilli. * Ad nomas, & eadē ferē, quę Andronij. Andromachus. B

Trochisci Muse.

℞. Aluminis scissilis, Aloes, Myrrhæ, Calcanthi ana ʒ. vj.
Crocī, Crocomagmatis ana ʒ. iiij.
Florum Malorum granatorum domesticorum ʒ. iiij.
Vini odorati, Mellis ana quantum sufficit.

Formentur pastilli. * Pastillus multiplicis usus, pus educens, & relaxans.


DE COL-

A

DE COLLYRIIS, SIVE
SIEF. CAPVT XLI.

B

Collyria sunt medica-
menta oculis dicata, ho-
rum arida, Sief à Barba-
ris dicta, trochiscorum for-
ma parantur. Porro col-
lyriorum alia



DE COLLYRIIS ABSTERGENTIBVS.

Trypherum Galeni.

R. Cadmiæ lotæ ʒ. xvj. Cerussæ ʒ. viij.
Amyli, Gummi, Tragacanthæ ana ʒ. ʒ.
Opj ʒ. ij. Aquæ pluuiæ quantum sufficit.

68

Fiat

690 DE COLLYRIIS ABSTERGENTIBVS.

Fiat collyrium. * Ad epiphoras, & affectiones oculorum. Vide sequens. A*Aliud, Galeni.*

℞. Cادميæ lotæ ʒ. xvj.
 Amyli, Thuris ana ʒ. viij.
 Ceruffæ ʒ. xlviij.
 Opij ʒ. vj.
 Gummi ʒ. xvj.

Aque pluię quantum sufficit.

Fiat collyrium. Siccatur, & seruatur per annos duos, in charta, cerę liquatę intincta. * Ad inuisiones oculorum, pustulas, chemoseis, maximę in his, qui nullam mordacitatem perferre possunt.

Collyrium, seu Sief de thure.

℞. Cادميę, Pompholigis, Thuris ana ʒ. x.
 Ceruffæ ʒ. xl.
 Opij, Gummi ana ʒ. vj.
 Aquę pluię quantum sufficit.

Fiat collyrium. Siccatur & seruatur. * Ad fluxiones oculorū & chemoseis.

Aliud, Mesue.

℞. Thuris ʒ. x.
 Ammoniacy, Sarcocollę ana ʒ. v.
 Croci ʒ. ij.

Mucilaginis fœnigręci quantum sufficit.

Fiat collyrium. Siccatur & seruatur annos duos. * Ulcera oculorum ducit ad maturitatem. B*Collyrium nardinum.*

℞. Cادميę, Croci, Gummi ana ʒ. xij.
 Aëris usti ʒ. v.
 Stibij, id est, Antimonij, Acacię ana ʒ. x.
 Nardi Indicę ʒ. ʒ.
 Opij Myrrhę ana ʒ. v.
 Vini quantum sufficit.

Fiat collyrium. Durat in annos duos. * Ad doloris uexationes, fluxum tenuem & multum, pustulas & aspretudines oculorum.

Dia annu.

℞. Cادميæ, Lap. Hęmatitis, Aluminis scissilis ana ʒ. x.
 Aëris usti ʒ. viij. ʒ.
 Chalcitidis ʒ. viij.
 Sem. papaueris ʒ. v.

Maceretur semen papaueris in aqua pluię quantum sufficit. Exprimatur, & reliquis

A & reliquis tritis fiat collyrium, cum uini austeri quantum sufficit. * Ad claritatem & cicatrices oculorum.

Diabematites.

℞. Aris usti & loti ℥. xxiiij.

Lapidis Hæmatitis ℥. j.

Croci, Opij ana ℥. iiij.

Gummi ℥. xij.

Aceti quantum sufficit.

Fiat collyrium. * Aspersionibus commodum: facit ad ueteres affectiones, ad fiscofa, & ad omnem extuberantiam oculorum.

Diamyrtha.

℞. Cadmiæ lotæ ℥. xxviii.

Lapidis Hæmatitis usti & loti ℥. xxv.

Spodij ℥. xxiiij.

Myrrhæ ℥. vj.

Croci ℥. β.

Opij ℥. j.

Piperis albi G. n. xxx.

Gummi ℥. vj.

Vini quantum sufficit.

B Fiat collyrium. * Accommodatum est ad ueteres affectiones oculorum: facit & ad rhœadas & ægylopas.

Sief e cornu ceruino.

℞. Cornu cerui usti & loti, Thuris, Plumbi usti & loti ana ℥. β.

Squamæ aris lotæ ℥. ij.

Opij ℥. j.

Gummi ℥. β.

Aque pluuiæ quantum sufficit.

Fiat collyrium. Siccatur, & seruetur ad annos duos. * Facit ad ulcera & pustulas oculorum: cicatrices exterit.

Aliud.

℞. Plumbi usti & loti, Cornu cerui usti & loti ana ℥. xvj.

Thuris, Acaciæ, Spodij ana ℥. viij.

Amyli ℥. β.

Opij, Squamæ aris ana ℥. ij.

Croci ℥. viij.

Myrrhæ ℥. iiij.

Tragacanthæ ℥. j.

Gummi, Sem. Hyofeyami ana ℥. viij.

Mucilaginis sem. Hyofcyami quantum sufficit.
Fiat collyrium. * Ad eadem efficax.

A

Libianum.

℞. Cadmiæ ustæ & lotæ, Cerussæ lotæ, Stibij usti & loti ana ʒ. xvj.
Plumbi usti & loti ʒ. j.
Amyli ʒ. xij.
Pompholigis Myrrhæ, Terræ Samiæ, Tragacanthæ, Opij ana ʒ. j.
Albuminis oui quantum sufficit.

Fiat collyrium. * Ad pustulas, inustiones, rupturas, concauitates, oculos purulentos, chemoseis, staphylomata, & ad circummolestantem dolorem facit, & cicatrices exterit.

Alind.

℞. Pompholigis ʒ. j.
Cadiæ ustæ & lotæ ʒ. xvj.
Stibij usti & loti ʒ. xij.
Cerussæ lotæ ʒ. xvj.
Amyli ʒ. xij.
Terre Samiæ, Plumbi usti ana ʒ. viij.
Myrrhæ, Opij, Tragacanthæ ana ʒ. ij.

Aquæ pluuiæ quantum sufficit.
Fiat collyrium. * Eiusdem cum priore facultatis.

B

Sies de plumbo, Mesua.

℞. Plumbi usti, Antimonij, Thutiæ lotæ, Æris usti, Gummi Arabici, Tragacanthæ ana ʒ. j.
Opij ʒ. β.

Aquæ pluuiæ quantum sufficit.
Fiat collyrium. * Replet & consolidat uulnera oculorum. Mesues.

DE COLLYRIIS EXCRESCENTIAS

auferentibus.

Viride Anthai.

℞. Cadmiæ ʒ. vj.
Myrrhæ ʒ. iiij.
Crocij ʒ. vj.
Opij ʒ. iiij.
Plumbi usti & loti ʒ. j.
Squamæ æris, Nardi Indicæ, Acaciæ ana ʒ. vj.
Gummi ʒ. xxiiij.
Aquæ pluuiæ quantum sufficit.

Fiat.

A Fiat collyrium. * Ad doloris molestias, pustulas, inustiones, prolapsus, confusiones oculorum.

Aliud viride.

℞. Cadmiæ ustæ, & uino odorato extinctæ ʒ. j.

Croci, Antimonij usti, & in lacte extincti ana ʒ. iiij.

Amyli ʒ. j. Gummi ʒ. ij.

Succi anagallidis fœminæ quantum sufficit.

Fiat collyrium. * Ad idem ualet.

Aliud viride, Mesuæ.

℞. Æruginis æris ʒ. iiij.

Calcanthi usti ʒ. vj.

Auripigmenti rubri, Spumę Nitri, Spumę maris ana ʒ. j.

Ammoniaci ʒ. j. β.

Salis Hammoniæ ʒ. β.

Ammoniacum macerato in aqua rutæ, & fac collyrium. * Eiusdem facultatis est ferè cum Sief rubro sequenti.

Sief rubrum, Mesuæ.

℞. Sem. Canabis ʒ. iiij.

Æris usti, Myrrhæ ana ʒ. ij.

Croci ʒ. j.

B. Æruginis æris, Salis Hammoniæ ana ʒ. β.

Piperis nigri ʒ. β.

Aquæ pluuiæ quantum sufficit.

Fiat Sief. * Vtile est oculorum scabritiei, pruriginis, suffusionibus & ungui.

Aliud, Galeni.

℞. Cadmiæ ʒ. xl.

Chalcitidis ustæ, Piperis albi, Gummi ana ʒ. xx.

Aquæ quantum sufficit.

Fiant pastilli. * Ad lippitudinem, sycosin, & carnis excrescentias.

DE COLLYRIIS DOLOREM MITIGANTIBVS.

Sief album, Mesuæ.

℞. Sarcocollæ, in lacte asinino maceratæ ʒ. v.

Amyli ʒ. β.

Tragacanthæ ʒ. iiij.

Opij ʒ. j.

Thuris ʒ. j. β.

○ Cerussæ lotæ ʒ. x.

Aquæ pluuiæ quantum sufficit.

Fiat sief. * Confert ophthalmicę cum est in augmento, & dolorem sedat.

Aliud simile, eiusdem.

℞. Gummi Arabici, Tragacanthę, Amyli ana ʒ.β.

Cerussę lotę ʒ. vj.

Opij ʒ. j.

Cum ovi albumine fiat sief. * Hoc utimur initio uehementis doloris à cau-
sa calida.*Cygnus Galeni.*

℞. Cadmię ʒ. xvj.

Cerussę lotę ʒ. j.

Amyli, Tragacanthę, Acacię, Opij, ana ʒ. ij.

Gummi ʒ. xij.

Aquę pluuię quantum sufficit.

Fiat collyrium. * Ad maximos dolores & affectiones oculorum.

Diarrhodon Nilei, ex Galeno.

℞. Rosarum ʒ.β.

Croci ʒ. ij.

Gummi ʒ. iij.

Opij, Nardi Indicę ana ʒ. j.

Aquę pluuię quantum sufficit.

Fiat collyrium. * Ad doloris molestias, fluxum uberem ac tenuem, pustu-
las, prolapsus oculorum.*Sief de rosis aliud, Mesue.*

℞. Fol. Rosę ʒ. xv.

Croci, Gummi Arabici ana ʒ. j.

Nardi Indicę, Opij ana ʒ. ij.

Aquę pluuię quantum sufficit.

Fiat sief. * Eadem, quę præcedens potest.

Sief luteum, Mesue.

℞. Cadmię lotę, ustę, & in lacte muliebri maceratę ʒ. x.

Cerussę lotę ʒ. i.

Squamę ferri ʒ.β.

Opij ʒ. ij.


Tragacanthę, Gummi Arabici ana ʒ.β.

Aquę pluuię quantum sufficit.

Fiat sief. * Confert doloribus oculorum uehementioribus à causa calida.

DE APO.

A DE APOPHLEGMATISMIS
CAPVT XLII.



Apophlegmatismus ad dolores dentium ex materie influxu.

R. Mastiches ʒ. j.

Piperis, Pyrethri ana ʒ. j. β.

Mellis quantum sufficit.

Fiant pastilli, instar lupinorum. Manè ante cibum in ore per horam circiter dimidiam contineantur. Andernacus.

B *Apophlegmatismus ad dolorem capitis ex bile.*

R. Masticis contritæ ʒ. β.

Mellis quantum sufficit.

Fiant pastilli instar lupinorum. Vnus ad horæ dimidium in ore contineatur, mandaturq; & nouissimè expuatur. Andernacus.

Alius ualentior ad frigidum & humidum capitis affectum.

R. Piperis albi, Pyrethri, Zingiberis ana ʒ. ij.

Mellis quantum sufficit.

Fingantur pastilli mansiles. Vtere, ut prædictis. Idem.

Apophlegmatismus ad distillationem capitis.

R. Mastiches ʒ. j.

Corticis Capparis ʒ. ij.

Pyrethri ʒ. iij.

Piperis nigri ʒ. j. β.

Vuarum passarum ʒ. β.

Mixta, pannoque lineo raro inuoluta, ad horæ dimidium ante cibum man-
dantur. Idem.

Apophlegmatismus ad morbum comitiale.

R. Pyrethri, Mastiches ana ʒ. j.

Ceræ quantum sufficit.

Fiant

Fiant pastilli auellanæ magnitudinis, manducanturque ad horæ dimidium, A
ita ut pituita semper expuatur. Idem.

DE CONFECTIS

CAPVT XLIII.

		<ul style="list-style-type: none"> Coriandri. Anisi. Fœniculi. Anethi. Cumini. Ami. Amomi. Cardamomi. Eruçæ. Sinapi. Cucumeris. Cucurbitæ. Melonis. Papaueris albi. Xantonici, &c. 	
	Seminum: ut Confectum		
Confecta uocantur materia, saccharo siccò obduta. Sunt aut uel	Fructuum: ut Confectum	<ul style="list-style-type: none"> Amygdalarum. Auellanarum. Pinearum. Phisticorum. Nucleorum persicorum. Ceraforum, &c. 	B
	Gorticum: ut Confectum	<ul style="list-style-type: none"> Citri. Arantij. Cucurbitæ, &c. 	
	Aromatum: ut Confectum	<ul style="list-style-type: none"> Cinnamomi. Caryophyllorum. Zingiberis. Molchatum, &c. 	
	Saccharata: ut	<ul style="list-style-type: none"> Saccharum penidij. Fructus, uel animalia ex saccharo uaria, &c. 	

Confectum coriandri.

℞. Coriandri à sordibus, pulueribus, festucis, lapillis & pediculis vibrando, uentitádo & seligêdo repurgati, & ab omni humiditate exiccati ℥.ij. Ponuntur in æneum uas pensile duabus ansis suspensum, & super carbones hinc

A hinc inde, antrorsum, retrorsum, dextrorsum, sinistrorsum agitantur: nunc in orbem uoluntur, nunc instar auenæ in uannis mouentur, donec calefiant. Calefactis infundatur parum sacchari, ad debitam, & quodam modo perfectam consistentiam, id est, propemodum ut ad morsulos & orbiculos cocti, cochleari ferreo, non procul ab extremitate uno foramine perforato, & continuo agitatur, donec siccetur saccharum: deinde aliud affunditur, ut prius: idq; tantisper fit, dum iustam acquirat magnitudinē. Superficies in plerisq; læuis est, nisi singulari artificio asperior, seu (ut uulgò loquuntur) crispa sit, uidelicet ex alto saccharum fundendo. Si materia conglobatur, uel saccharo confertim infuso, uel negligenter moto, manu affricata dissoluuntur nodi. In fine confecturæ exactè siccetur: deinde in locum calidum & siccum cribro imposita reponatur. * Orificium uentriculi superius claudit, & corroborat à cibo sumptum. Medici Colonienfes.

Confectum anisi.

℞ Sem. Anisorum optimè mundatorum ℥.ij.
Induntur in uas æneum pensile, ut supra, & super ea infunditur saccharum leuis coctionis in principio, & bene manibus ducuntur per uas æneum, usquequò ferè sint cooperta, beneq; exiccantur ad omnem manum sacchari: & hoc continuatur usque in finem, si solidos seu læues anisos facere uelis. Si uerò asperos aut crispas, postquam cooperta erunt, affunde saccharum cum cochleari ferreo, ab alto, & sit fortis cocturæ: deinde uas hinc inde agitetur, ut in coriandris est dictum. Anisi quanto paruiores, tanto pulchriores: & quanto duriores, tanto laudabiliores. Duri enim fiunt, & non solidum anisi, sed & cætera alia confecta, si bene siccantur ad omnem sacchari affusionem. * Vrinam mouet, digerit, flatusq; uentris discutit, oris halitum commendat. Thesaurus Aromatariorum.

Confectum feniculi, &c.

Semen feniculi, anethi, cumini, ami, amomi, cardamomi, erucae, sinapi, cucumeris, cucurbitæ, melonis, papaueris albi, xantonici, &c. eodem modo saccharo obducuntur, ut coriandri & anisi.

Confectum amygdalarum dulcium.

Amygdalæ bene cum pane aspero fricantur, atq; in uase æneo pensili, super carbones, hinc inde agitata, siccantur, & ab omni immunditia mundantur: demum saccharum fortis coctionis cochleari ferreo perforato super eas infunditur, uas huc & illuc ducendo incessanter: & tantisper hoc fiat, dum bene tegantur: & quanto magis agitatio uasis continuatur, tanto solidiores redduntur. Sunt qui cum cortice conficiunt amygdalas: & hoc modo confectæ, longiori tempore durant, nec rancescunt. Sunt qui à superiori cortice mundant. Quidam illas diuidunt in partes duas, & crispas faciunt. Thesaurus Aromatariorum.

II Confectum

Confectum auellanarum.

℞. Auellanarum quantum uolueris: & fac ut in amygdalis dictum est, uel crispas uel læues faciendo. Antequam autem conficiantur auellanæ, bene in uase æneo pensili, hinc inde agitari debent, & calefieri, quoad subtilis cortex eis adhærens remoueatur. Thesaurus Aromatariorum.

Confectum pinearum.

℞. Pinearum bene mundatarum, quantum uolueris. Super eas infunde saccharum cum cochleari ferreo perforato, bonæ cocturæ, à principio usque ad finem: & agita bene uas hinc inde, prout in coriandris asperis dictum est supra. Si uerò solidos seu læues facere uoles, facias ut supra de amygdalis dictum est, & de projectione sacchari, & uasis agitatione. Hoc confectum parum durat, eo quia rancescunt pineæ: & antequam conficiantur, animaduertendum est, ne rancidæ sint. Cognoscuntur autem, quia sunt nigrae, & mali saporis: quare purgandæ sunt cum furfure. Quidam in prima sacchari exhibitione ponunt albumen oui, bene agitatum, cum saccharo non multum calido, ne albumen coqueretur: & hoc faciunt eò, quia cum difficultate saccharum eis adhæret propter oleaginitatem, quæ in eis est. & hic modus non uituperatur. Thesaurus Aromatariorum.

E O D E M etiã modo phislici, persicorũ & cerasorũ nuclei conficiuntur.

Piniocatum.

℞. Sacchari albi, in aqua rosarum dissoluti, clarificati ℥. j. Agitetur optimè cum baculo, ab igne remoto: & cum coctum fuerit ad perfectionem, addantur pinearum mundatarum ℥. iij. misceantur, & permittantur infrigidari ad formã confectionis solidæ. Thesaurus Aromatariorum.

Confectum citri.

℞. Corticũ citri, minutim in frustã longiuscula incisorũ, quantum uolueris. Ponuntur in uase æneo pensili super carbones, superinfundendo saccharũ coctum, cum cochleari ferreo perforato, atque uas hinc inde agitando, quousque satis crassi reddantur. Ad hunc etiam modum Arancij cortices & cucurbitæ conficiuntur. Thesaurus Aromatariorum.

Confectum cinnamomi.

℞. Cinnamomum à superiori cortice excorticatum, quantum uolueris. Per parua fila inciditur, & in uase æneo pensili super carbones ponitur, superinfundendo saccharum cum cochleari ferreo, paruo foramine forato. Et in principio, uidelicet per tres uices, saccharum sit læuis coctionis, postmodum usque in finem fortis, uas hinc inde bene agitando, ut in coriandris dictum est: & tantisper hoc continuetur, quousque satis crassi reddantur. Quidam post primam sacchari projectionem, aspergunt zingiber puluerizatum, ut fiant fortiores, acrioresque. Thesaurus Aromatariorum.

Conse-

Confectum caryophyllorum.

℞. Caryophyllorum quantum uolueris.

Exicca, beneque munda ab omni spurcitia: deinde superinfunde saccharum cum ferreo cochleari perforato, satis fortis cocturæ. Et si illos asperos facere uoles, facias ut de coriandris crispis dictum est, & de agitatione uasis, & sacchari projectione. Ad confecta bene crispa facienda, foramen cochlearis paruum esse debet, & saccharum æqualiter & uniformiter superinfundi: & quanto altius saccharum proicitur, tanto melius: nec permittendæ sunt guttæ super eas cadere: illæ enim opus tuum destruent.

Confectum zingiberis.

Confectum zingiberis eodem modo fit, ut cinnamomi.

Confectum moschatum, seu moschardini.

℞. Cinnamomi interioris, & electi, & bene puluerizati ℥. ij.

Musci optimi, cum paucissima aqua rosarum dissoluti ℥. β.

Misce duo hæc in uase æneo pensili super carbones, superinfundendo saccharum bene coctum, beneque: & incessanter manibus saccharum ducatur, & bene exiccetur: & toties hoc fiat, quod ad grositudinem seminis papaueris ueniant, & in fine dando per duas uices saccharum læuis coctionis, ut rotundi fiant. Muscardini non nisi cum difficultate corpus accipiunt: sed sagax aromatiarius & sollicitus, in miscendo manibus saccharum, & species, citò eos format. post uerò duas uel tres uices seu manus sacchari cribellandi sunt: a qua cribratione exeunt muschardini, grositudinis puntæ acus, & puluis reseruetur, & alij qui iam corpus sumplerunt, expleantur. *Thesaurus Aromat.*

Morsellata alba.

℞. Sacchari clarificati, & coctionis non perfectæ ℔. j.

Agitetur optimè cum baculo, & post longam eius ductionem, addantur,

Zingiberis minutim incisi ℥. ij.

Deinde saccharum perfectè coquatur, & in morsellis incidatur.

Saccharum Penidij.

Accipitur saccharum albu bonu (potest & ex uiliori parari:) coquitur leuiori flama ad extremam spissitudinem, que ita cognoscitur: Quando portiuncula aliqua digitis extremis duob. distracta in tenuissima quasi fila abit, que percussa digito, tanquam uitru dissiliunt. Inde effundatur super marmor butyro, oleo amygdalino, aut oliuaru leuiter inunctu, & manibus uel inunctis, uel amyli polline aspersis, ne adhæreat comprehensum, ex alto paulatim comprimendo, & fricando hinc inde demittitur aliquoties: tandem ubi paulu refrixit, ferramento unco parieti infixu obuoluitur, idque tatisper, dum bene lectu & candidu efficiatur. Quo aut diutius trahitur, eo candidius redditur. Tandem attractu famulis distribuitur, ut distrahedo torquedoque formetur modo consueto. Formatu reponatur loco calido. Alij mel addendu esse scribunt: quod usu non receptu. *Colonienses.*

Ad faciendum fructus & animalia omnia ex saccharo.

℞. Sacchari albi quātum uolueris: & pulueriza: deinde post subtilem puluerizationem impastetur cum albuminibus ouorum qualitate sufficēti intantum, quōd formam pasta habeat: deinde ungantur formæ cum oleo amygdalarum dulcium, & de dicta pasta formæ impleantur, postea simul comprimantur: & sic erunt animalia uel fructus facti: & sic omnia fieri possunt: deinde ponantur in stupa ad siccandum, deinde colore inficiantur. Thesaurus Aromatariorum.

Panis Marficus.

℞. Amygdalarum dulcium mundatarum, & subtiliter contusarum ℥.β.
Sacchari optimi puluerizati ℥.β.
Aquæ rosarum quantum sufficit.
Formetur marzapanis, pane azimo substrato. Coquatur in clibano, uel uase cupreo, ad id apto.

DE COLORANDO SACCHARO, IN concinnandis confectis.

Ad saccharum rubro colore tingendum.

℞. Prasilij triti, uel Santali rubri, uel Radicis Rubiæ, uel Granorum tinctorum ℥.j.

Aluminis Rochæ ℥.β. Aquæ ℥.vj.
Infundantur duo hæc in petia ligata in dicta aqua per dies sex, deinde calefiant ad ignem leuiter: & cum ea aqua saccharum coquatur. Vel confectis iā absolutis, sensim in aheno calentibus aspergitur. Thesaurus Aromatariorū.

Ad saccharum uiridi colore tingendum.

℞. Succu Caulium, uel Succu Anethi, uel Succu Solani, uel Succu Rutæ q. s. Hoc confecta iam absoluta, atq; adhuc in aheno calētia aspergūtur: uel saccharum unā cum succo coquitur, &c. Thesaurus Aromatariorum.

Ad saccharum colore flauo tingendum.

Confecta iam absoluta, atq; adhuc in aheno calida diluto, rhabarbari uel croci asperguntur.

Ad saccharum colore cæruleo tingendum.

℞. Succu baccarū Sambuci, uel Florū frumenti, in aceto uel uino dilutorū q. s. quo confecta adhuc calētia asperguntur.


Ad saccharum colore purpureo tingendum.

℞. Succu florum Ireos q. s. & cum eo saccharum coque.

Ad saccharum colore nigro tingendum.

℞. Succu Iuglandum, uel Gallarū, uel Myrobalanorū in aceto dilutorū q. s. quo aspergatur saccharum. Quōd si uoles uaricolora reddere confecta, inuicem modò hunc, modò illum colorem asperge. Colonienfes.

DE GLANDIBVS ET SUPPOSITORIIS CAP. XLIIII.



DE GLANDIBVS LENIBVS.

B Glandes lenes ex farina hordei, aut tritici, aut siliginis, ex aqua in massam reducta, & modico sale condita: aut ex sapone albo, aut ex pinguedine suilla salsa: aut ex betæ uel brassicæ, uel mercurialis caule, siue radicib. oleo inunctis, & modico sale respersis.

Glans lenis.

℞ Farinæ hordei uel tritici, Aquæ coctæ, Salis parum ana q. s.
Fiant glandes, annularis digiti instar longæ, & siccentur. Tempore usus, in oleo intinguntur, atq; in aluum induntur. Andernacus.

Glans ex radice betæ.

℞ Radicem Betæ, uel Mercurialis.
Fingatur indicis, aut annularis, aut minimi digiti modo longa & crassa, oleoq; intincta, & sale aspersa inferius indatur.

Glans lenis alia.

℞ Saponis albi ʒ. β. uel si adultior est, ʒ. j.
Glans indicis aut digiti modo longa crassaq; aut tenuior fiat. Idem.

Alia.

℞ Carnis suillæ, pinguis, salsæ & concisæ q. s.
Glandem minimi digiti instar longâ parabis, & subter aluum adhibebis. Idem.

Aliud suppositorium lene.

℞ Mellis probè cocti ʒ. β. uel ʒ. j.
Glans instar indicis digiti longa crassaq; conficiatur. Idem.

DE GLANDIBVS ET SVPPOSITORIIIS.
DE GLANDIBVS ET GLOBV-
lis lenioribus.

A

℞. Ficuum n.j.

Inuertatur, & in glandis formam redigatur, indaturq̄.

Globulus excrementa ducens, lenis.

℞. Mellis concreti, uel Massæ ex farina tritici, uel hordei ex aqua coa-
ctæ ʒ. ij.

Salis communis ʒ. j.

Redigantur in globulum crassitie digitalis, aut pollicaris, qui ad solem aut
fornacem sicceatur. Vbi usus necessitas adfuerit, oleo uel butyro intingatur,
ac in aluum sic penitissimè demittatur. Andernacus.

Nodulus lenis.

℞. Vitellorum ouorum n.j.

Salis communis ʒ. j.

Probè permiscetur, linteoloq̄: excepta, ligentur filo, cuius appēdix aliqua
relinquatur, ut trahi possit: oleo intingatur, & indatur. Idem.

DE GLANDIBVS MEDIOCRIBVS.

Glans mediocris.

℞. Mellis concreti ʒ. β. uel ʒ. j.

Salis communis, uel fossitij ʒ. β.

Misce, & formetur glans.

Suppositorium aliud mediocre.

℞. Mellis concreti ʒ. β. uel ʒ. j.

Salis communis ʒ. β.

Spec. Hieræ picræ, uel Aloes, uel Agarici ʒ. j.

Misce, & fiat glans.

DE SVPPOSITORIIIS ACRI BV S.

Glans acris.

℞. Mellis ad spissitudinem cocti ʒ. β.

Veratri, Scammonij, Salis ana in puluerem reductorum ʒ. j.

Misce, & fingatur suppositorium.

Alia.

℞. Mellis concreti ʒ. β.

Colocynthidis, uel Succu Cyclamini, uel Scammonij, uel Grani cni-
dij G. v.

In glandem indicis instar longam digesta, oleoq̄: seu butyro inuncta.
Andernacus.

Alia.

A

Alia.

℞. Mellis cocti & concreti ʒ.ij.

Pul. Euphorbij ʒ.β.

Pul. Colocynthidis G.iiij.

Pul. Ellebori albi G.ij.

Salis communis ʒ.j.

Misceantur singula, & digerantur in glandes. Tempore necessitatis oleo uel butyro intinguntur & induntur. Fuchsius.

DE GLANDIBVS ET GLOBVLIS

flatus discutientibus.

Suppositorium ad flatus.

℞. Mellis cocti ac concreti ʒ.j. β.

Sem. Anisi, Cumini, Fœniculi ana ʒ.j.

Sem. Carei ʒ.ij.

Colocynthidis ʒ.j.

Salis uulgaris ʒ.j.

Tundenda tundantur, cribroque secernantur, misceantur, digeranturque in glandes. Idem.

Glandes ad flatus.

B

℞. Mellis ad spissitudinem cocti ʒ. β.

Sem. Rutæ, item Anisi, Cumini, Colocynthidis, Salis fossitij ana ʒ.β.

Glans medij aut indicis instar magna, butyro recenti illita in aluum datur. Andernacus.

Globulus flatus discutiens.

℞. Mellis ad spissitudinem cocti, uel Massæ hordeaceæ ʒ.j.

Sem. Rutæ, Cymini, Fœniculi ana ʒ.β.

Salis communis ʒ.j. β. uel Colocynthidis, & Salis communis ana ʒ.β.

In globulos pollicares redigito, & butyro illitos recenti, inferioribus penitissimè indito. Idem.

DE GLANDIBVS DOLOREM

mitigantibus.

Glans dolorem sedans.

℞. Opij ʒ.j.

Crocii, Castorei ana ʒ.β.

Tusa & cribrata cū melle cocto, aut cera & oleo nymphæ in unum cocant, formenturque glandes, quibus filum appensum est.

DE PES-

704
 DE PESSIS CA XLV

A

Pessus est lana concepta,
 & ad digiti formam rotun-
 da, in qua medicamenta
 excipiuntur, ac genitalibus
 mulierum induntur. Ho-
 rum alij

Alteerant, hoc est

- Astringunt: ut Pessus ad menstrua sistenda.
- Aperiunt: ut Pessus menstrua prouocans.
- Abstergunt & consolidant: ut Pessus uteri ulce-
ra siccans.
- Emolliunt, &c. ut Pessus emolliens.
- Dolorem sedant: ut Pessus ad uteri præcipita-
tionem.
- Purgant: ut Pessus pituitam educens.

DE PESSIS ASTRINGENTIBVS.

Pessus menses sistens.

℞. Stercoris porci ʒ. j.
 Sanguinis draconis ʒ. j.
 Boli Armeni ʒ. ij.
 Succu Pastoris, uel Succu Plantaginis quantum sufficit.
 Fiat pessarium, ad formam suppositorij, quod filo obligatum noctu subijcia-
 tur. Rondeletius.

Alius.

℞. Cornu cerui usti ʒ. ij.
 Thuris ʒ. j. β. Gallarum ʒ. ij.
 Balaustiorum, Rosarum rub. ana ʒ. j. β.
 Gummi, Acaciae, Hypocistidis ana ʒ. ij.
 Boli Armeni ʒ. β.
 Trita in pollinem leuissimum succo plantaginis excipiantur, & linteolis de-
 ligata fingantur pessi, qui in mulieris pudendum inferantur. Fuchsius.

DE PESSIS APERIENTIBVS.

Pessus menstrua mouens.

℞. Myrrhae, Sem. Nigellae ana ʒ. iij.
 Saluae ʒ. ij.
 Castorei ʒ. β.
 Cum succo mercurialis, uel pauca terebinthina, uel melle fiat pessarium. Aut
 puluis ponatur in sacculo, confecto ex panno raro, addito pauco bombace:
 fiat ad crassitudinem digiti maioris, indaturq;. Rondeletius.

Alius.

A

Alius.

℞. Artemisiæ, Abrotani, Dictamni ana ʒ. ij.

Rad. Acori, Rad. Rub. tinct. ana ʒ. j. β.

Nigellæ ʒ. ij.

Baccarum Lauri ʒ. β.

Rutæ ʒ. ij.

Sabinæ ʒ. j.

Castorei ʒ. β.

Myrrhæ, Stactis ana ʒ. j.

Sagapeni ʒ. j. β.

Tusis & cribratis ijs quæ opus est, mellis quantum satis est, ut in coalitū cras-
sorem & unitatem coeant, adijciatur, & ubi opus est, fingantur pessæ: qui in
uulvam indantur. Fuchsius.

DE PESSIS ABSTERGENTIBVS ET
consolidantibus.*Pessus ulcera siccans.*

Pessarium paratur, quod unguento è pompholyge imbutū indatur uulvæ:
uel aliud unguento rosaceo imbutum naturalibus subijciatur: uel medullæ
ceruinæ, adipis anserini ana ʒ. β. ouorum duorum coctorum lutea, terebin-
thinæ ʒ. j. croci ʒ. j. subigantur, uulvæq; inferantur. Andernacus.

B

DE PESSIS EMOLLIENTIBVS.

Pessus emolliens.

℞. Butyri recentis sine sale ʒ. iij.

Medullæ ceruinæ, Adipis Anseris, item Gallinæ ana ʒ. j. β.

Masticis, Meliloti ana ʒ. j.

Seminis Lini, Fœnigræci ana ʒ. j. β.

Ouorum lutea n. iij.

Olei Rosacei, Irini ana ʒ. β.

Ceræ quantum satis est ad iustam crassitudinem induendam.

Deinde lana duplicata in hoc medicamentum intincta, utero subijciatur.
Fuchsius.

DE PESSIS DOLOREM SEDANTIBVS.

Pessus dolorem mitigans, ex calido.

Pessus paratur, cui opij paululum misceatur, quod calorem nimium obtū-
dat. Verum tunc pessus non longiore tempore, quàm dimidiæ horæ spacio
retineri debet, ne pars nervosa membranosaq; à frigido noxam concipiat.
Andernacus.

Pessus ad uteri præcipitationem.

℞. Beniouini, Styracis, Caryophyllorum ana ʒ. j.

VV

Galliæ

Galliæ moschatæ ʒ. ʒ.

Mofchi G. vj.

Fiat puluis, exceptus bombace: imponatur in uterum. Rondeletius.

A

DE PESSIS PURGANTIBVS.

Pessus pituitam educens.

℞. Spec. Benedictæ lax. ʒ. iij.

Agarici trochiscati ʒ. ij.

Terebinthinæ parum. Succu Mercurialis quantum sufficit.

Formetur pessarium, ad formam suppositorij: quod filo obligatum, noctu subijciatur. Rondeletius.

DE SACCVLIS CAP. XLVI.

Sacculi sunt fo- rmenta arida. Ho- rum alij conferunt	Capiti: ut	Pileolus ad dolorem capitis.	B.
		Alius.	
		Pileolus ad dolorem capitis ex mixto humore.	
	Cordi.	Pileolus ad destillationem, roborans, & materiam exci- cans.	B.
		Pileolus ad frigidam destillationem, astringens.	
		Pileolus ad calidam destillationem, astringens, &c.	
		Sacculus ad uentriculum imbecillem, doloremque, cale- faciens, &c.	
	Ventri: ut	Sacculus ad dolorem ex pituita.	B.
		Sacculus ad lateris dolores, &c.	

DE SACCVLIS CONFIDENTIBVS CAPITL

Pileolus ad dolorem capitis.

℞. Galangæ, Calami odorati, Cyperi ana ʒ. iij.

Nucis moschatæ Caryophyllorum ana ʒ. ij.

Betonicæ, Maioranæ ana ʒ. j.

Florum Anthos, Florum Stœchados ana ʒ. ʒ.

Fiat puluis, qui bombace exceptus, panno rubro raro intersuatur, & fiat cu-
cuffa. Rondeletius.

Pileolus

A

Pileolus ad dolorem capitis alius.

℞. Maioranæ, Betonicæ, Melissæ, Rorismarini, Stœchados ana P. j.
 Rosarum rubrarum, Corticum Citri, Granorum alkermes ana ʒ. iij.
 Macis, Piperis longi, Cubearum, Caryophyllorum ana ʒ. β.
 Hæc in puluerem redacta, panno serico rubro & raro, ad formam pileoli cō-
 cinnato insuantur: uel ut uulgares dicunt, syndone duplici cū modico gossy-
 pio interfuto condantur. Andernacus.

Sacculus capitalis alius.

℞. Florum Rorismarini, Florum Lauendulæ ana M. j. β.
 Florum Chamomillæ, Florum Betonicæ, Rosarum rub. ana M. j. β.
 Saluiæ, Maioranæ, Serpylli, Meliloti ana M. β.
 Foliorum Senæ ʒ. ij.
 Stœchados ʒ. iij.
 Caryophyllorum, Nucis moschatæ, Maceris ana ʒ. ij.
 Contusa in sericum demittantur, formeturq; sacculus tirix formam expri-
 mens. Fuchsius.

Pileolus alius ad dolorem ex mixto humore.

℞. Rosarum rubrarum, Violarum, Flor. Meliloti, item Chamomillæ, Stœ-
 chados, Rorismarini ana P. β.
 B Melissæ, Betonicæ, Maioranæ, Pulegij ana M. β.
 Cocci infectorij ʒ. ij.
 Omnia diligenter trita pileolo ex panno serico rubro & raro insuantur: qui
 die noctuq; ad menses aliquot gestetur. Andernacus.

Pileolus ad destillationem roborans, & materiam exiccans.

℞. Rosarum rubrarum P. ij.
 Melissæ, Betonicæ, Maioranæ, Origani ana M. β.
 Nucis moschatæ, Caryophyllorum, Gummi Iuniperi, Baccarum Capref-
 si ana ʒ. j.
 Cocci infectorij, Maceris ana ʒ. j. β.
 Thuris Mastiches ana ʒ. ij.

Hæc in tenuissimum puluerem redacta, panno serico rubro & raro, ad pileo-
 li formam adaptato insuantur. Idem.

Sacculus ad idem, paratu facilis.

℞. Salis torridi ʒ. j. β.
 Milij torrefacti ʒ. iij.
 Indita duobus sacculis ex lineo panno raro admoueatantur sincipiti calidi, al-
 ter post alterum. Idem.

Alius ex meris astringentibus, ad frigidam destillationem.

℞. Salis communis torridi ʒ. j.

Nigellæ, Maioranæ ana M. i.

Corticum Citri, Thuris ana ʒ. i.

Gummi Iuniperi ʒ. β.

Trita sacculis ex lino condantur, qui alternatim capiti manè ante cibum ad horam unam applicentur. Idem.

Alius ad calidam destillationem, ex astringentibus.

℞. Milij torrefacti P. ij.

Myrtorum, Baccarum cupressi ana ʒ. β.

Rosarum rubrarum P. β.

In puluerem redacta sacculo indantur, & capiti adhibeantur. Idem.

Sacculus refrigerans & repellens, pro fronte.

℞. Coriandri ʒ. β.

Sem. Lactucæ ʒ. iij.

Sem. Papaueris ʒ. ij.

Flor. Violarum, Flor. Nenupharis ana ʒ. j.

Rosarum rubrarum ʒ. β.

Misce fiat puluis, ex quo impleatur sacculus, latus quinq; digitos, longus pedem unum, pro fronte. Rondeletius.

DE SACCVLIS CONFERENTIB. CORDI.

Sacculus ad cordis affectus frigidos.

℞. Florum Anthos Florum Stæchados ana ʒ. ij.

Summitatum Ocimi, Cort. Citri sicci, Macis, Caryophyllorum ana ʒ. iij.

Spec. Diamarg. calidi, uel Diagemmæ, uel Diathamaron ʒ. ij.

Fiant sacculi forma rotunda: consuantur. Imponi autem debet bombax ad retinendum puluerem, & pannus qui integit, debet esse delicatissimus. Irroretur uino & aqua melissæ, & calidus applicetur cordi. Rondeletius.

Alius ad idem.

℞. Flor. Buglosi, item Borriginis, Rosarum, Melissæ ana M. j.

Cinnamomi electi, Caryophyllorum, Maceris ana ʒ. β.

Ligni aloes ʒ. j.

Cort. Mali citri, Spec. Diambæ ana ʒ. j.

Osis cordis ceruini ʒ. β.

Croci ʒ. j.

Contritis omnibus fiat è serico sacculus, cordi admoendus. Fuchsus.

DE SACCVLIS CONFERENTIB.

bus uentri.

Sacculus ad imbecillitatem & dolores uentriculi.

℞. Comarum Absinthij sicci, Menthæ ana ʒ. ij.

Cort. Citri sicci ʒ. j.

Galangæ,

A Galangæ, Cyperi, Caryophyllorum ana ʒ.β.
Rosarum rub. ʒ. ij.
Fiat puluis: ex quo facculus, qui à scuti figura, Scutū appellatur. Rōdeletius.

Alius ad idem.

℞. Comarum Absinthij ficci, Menthæ siccæ, Sifimbrij ana M.β.
Coriandri præparati ʒ. iij.
Caryophyllorum, Cinnamomi electi ana ʒ. ij.
Ladani ʒ. j.β.
Coralli rubri ʒ. iij.
Maceris ʒ. j.
Cocci infectorij ʒ.β.

Omnia minutim tusa, tritaq; facculo ex panno serico purpureo insuantur, figura scuti stomachici: qui acu interpunctus, uetriculo applicetur. Andernac.

Alius.

℞. Florum Chamomillæ, item Meliloti, Anethi ana M.β.
Sem. Lini, item Fœnigræci, Althææ ana ʒ. ij.
Origani, Abrotani, Menthæ siccæ, Calaminthæ, Rutæ ana M. j.
Contusa in linteolum demittantur, fiatq; facculus. Fuchsius.

Sacculus ad colicam.

℞. Milij torridi P. iij.
B Salis P. iij.
Foliorum Lauri P. ij.
Contusa in facculo uentri admouentur. Andernacus.

Alius.

℞. Cumini P. iij.
Salis P. iij.
Contusa & trita, uentri calida applicentur, prius aqua ardente irrorata.

Sacculus ad dolores lateris.

℞. Furfuris macri P. j.
Sem. Anisi, item Fœniculi, Carui ana ʒ. ij.
Florum Chamomillæ, Meliloti, Sambuci, Anthos ana P. j.
Trita & contusa ponantur in facculis duobus confutis, & supra laminam ferream uino extinctam calfactis, parti dolenti applicentur. Rondeletius.

Dentifricium ad candorem dentibus conciliandum.

℞. Rorismarini, Menthæ, Pulegij ana ʒ.β.
Rad. Iridis, Iunci odorati ana ʒ. j.
Nardi, Piperis ana ʒ.β.
Pumicis, Salis tosti, Cornu ceruini ana ʒ. ij.
Excipiantur tragacantho in aqua rosarum macerato, & fiant ueluti penicillo.

VV 3 la. Ex

la. Ex lentisco bacilli concinentur, dentibus expurgandis & roborandis a. A
pti. Andernacus.

Aliud.

℞. Coralli rubri ʒ. j.
Terræ Maioricæ ʒ. β.
Osis Sepiæ, Pumicis ana ʒ. ij.
Caryophyllorum, Cinnamomi, Mastiches ana ʒ. j.
Vnionum electorum ʒ. j.
Sanguinis draconis ʒ. ij.
Moschi G. j.

In puluerem redacta, ex tragacantho aqua rosacea macerato, in massam redi-
gantur: unde fingentur dentifricia, seu penicilla. Idem.

Aliud.

℞. Cornu ceruini, Dentium equi ana ʒ. ij.
Concharum marinarum, Salis communis, Nucis Cupressi ana ʒ. j.
Vrantur simul in clibano, & fiat puluis, mucilagine gummi tragacathæ exci-
piendus. Rondeletius.

Aliud in puluere.

℞. Myrrhæ, Mastiches, Thuris ana ʒ. β.
Cornu cerui usti & loti, Coralli rubri, Rosarum, Santali moscatellini, Ca- B
ryophyllorum ana ʒ. ij.
Osis Sepiæ, Aluminis Rochæ usti ana ʒ. ij.
Pumicis ʒ. j. β.
Salis communis usti ʒ. j.

Fiat puluis. Vtatur cum radice maluæ præparata. Rondeletius.

Alius insignis dealbans.

℞. Summitatum Myrti, Summitatum Lentisci, Oleastri, Saluiæ, Rorifina-
Coralli rubri Eboris, Dentium equorum ana ʒ. β. (rini ana M. j.
Salis communis P. j.

In uase fictili simul urantur, donec dealbentur: deinde in puluerem redigan-
tur, adijcianturq̄,

Caryophyllorum, Rosarum, Cinnamomi crassi ana ʒ. iij.
Mixtis dentes confricentur. Vel ex cremore tragacanthi formentur penicil-
la oblonga. Andernacus.

DE ODORAMENTIS

CAPVT XLVIII.

ODORAMENTA sunt omnia medicamenta, quæ citra ignis accessio-
nem suo odore cerebrum alterare, aut grauem odorem, aut pestilentem au-
ram depellere possunt.

Sacculus

Sacculus odoratus.

A

℞. Cubeborum ʒ.β.
 Caryophyllorum ʒ.ij.
 Nigellæ tostæ ʒ.β.
 Maceris ʒ.ij.

Contusa & trita diligenter serico ad odorandum. Fuchifus.

Puluis uiolarum.

℞. Iridis Florentinæ lb.β.
 Rosarum ʒ. iiij.
 Cyperi ʒ.β.
 Maioranæ, Caryophyllorum ana ʒ. j.
 Santali albi odoriferi, Beniouiini ana ʒ. iiij.
 Styracis calamitæ ʒ. j.

Trita serico induntur ad odorandum.

Puluis uiolarum Syluæ.

℞. Rad. Iridis Florentinæ lb. iiij.
 Maioranæ siccæ quart. j.
 Calami aromatici ʒ. iiij.
 Rosarum, Violarum ana ʒ. v.
 Caryophyllorum ʒ. j.β. Moschi ʒ. j.

B Trita serico inponantur.

Pomum Ambræ.

℞. Styracis calamitæ ʒ. j.
 Caryophyllorum ʒ. ij.
 Beniouiini ʒ.β.
 Ambræ ʒ.β.
 Moschi G. xv.
 Pulueris Violarum prædicti quantum sufficit.
 Aquæ rosarum q. s. ad cogendum.

Idem aliter.

℞. Styracis calamitæ ʒ. j.β.
 Beniouiini ʒ. ij.
 Ladani ʒ.β.
 Caryophyllorum, Santali albi ana ʒ. iiij.
 Rosarum, Maioranæ ana ʒ. ij.β.
 Moschi, Ambræ ana ʒ. j.

Formetur pomum cum infusione gummi tragacanthæ in aqua rosarum.

Aliud.

℞. Pulueris Violarum ʒ. j.β.
 Rosarum, Maioranæ, Styracis calamitæ, Ladani ana ʒ. j.

Caryo-

℞. Caryophyllorum ʒ.ij.

Benzoini, Nucis moschatæ ana ʒ. j.

Ambra ʒ.β.

Massa fiat ex aqua rosarum, in qua maduerit tragacanthum & gummi Arabicum. hæc momento olei, uel cinnamomi, uel caryophyllorum, uel nucis moschatæ imbuatur. Andernacus.

Aliud.

℞. Styracis ʒ. iij.

Caryophyllorum, Cinnamomi ana. ʒ. ij.

Maceris, Nucis moschatæ ana ʒ. j.

Ligni aloes ʒ.β.

Moschi, Ambra ana G. iij.

Mastiches ʒ. j.β.

Trita & cribrata, liquore stillatitio maioranæ, & stacte quod satis est, excipiantur, finganturq; orbiculi odorati. Fuchsius.

Pomum Ambrae ad aërem pestilentem.

℞. Ladani, Styracis calamitæ ana ʒ. j.

Caryophyllorum ʒ.β.

Caphuræ, Nardi, Nucis moschatæ ana G. vij.

Omnia in puluerem tenuem confusa, commixtaq; ex aqua rosarum, in qua B tragacanthum & gummi Arabicum maduerit, redigantur in orbiculos. Andernacus.

Pomum odore aluum soluens.

℞. Scammonij, Aloes, Myrrhæ ana ʒ. j.

Efulæ, Colocythidis ana ʒ. j.β.

Trita & cribrata cum coriandrorum succo, duo cōfice poma, inuicemq; manibus tractentur, ex una in aliâ permutâdo, ut calefiant, & aërem immutent. Fumanellus.

Aliud contra pestem.

℞. Florum Nymphæ, item Buglossæ, Violarum, Rosarum ana ʒ. j.

Cort. Mali Citri ʒ. j.β.

Maceris ʒ.β.

Santalorum omnium ana ʒ. j.β.

Papaueris candidi ʒ. j.

Caphuræ ʒ.β.

Ladani ʒ. ij.

Ambra G. iij.

Trita excipiantur liquore stillatitio lactucæ & stactei: fiantq; orbiculi odorati. Fuchsius.

Unguentum odoratum.

℞. Moschi, Ambra, Zibetti ana G. iij.

Olei

A Olei amygdalarum dulcium quantum sufficit. Fiat linimentum.

Aliud.

R. Olei nucis moschatæ expressi ʒ.ʒ.


Zibeti optimi ʒ.ʒ. Moschi electi G.ʒ.

Olei Spicæ, Olei Lavendulæ ana gutt. ij. uel iij.

Fiat unguentum, quo nares, frons, aliæq; nobiliores partes illinatur. *Andern.*

DE SUFFIMENTIS

CAPUT XLIX.



XX

DE SVE.

DE SVFFIMENTIS.
DE SVFFIMENTIS CONFEREN- A
tibus capiti.

Suffimentum ad catharros sistendos, & siccandos.

℞. Coriandri, Rosarum, Gummi hederæ torrefactæ ana ʒ. j.
Nigellæ torrefactæ in aceto ʒ. j. β.
Mastiches, Thuris, Cort. Thuris ana ʒ. iij.
Gummi Iuniperi ʒ. ij.

Fiat pulvis non admodum tenuis, quo supra carbones imposito suffumigetur capitis operimenta. Potest etiam excipi mucilagine gummi tragacanthæ, & fieri formæ lupinares. Rondeletius.

Aliud ad idem, ex gummi.

℞. Thuris, Mastiches, Ladani, Styracis calamitæ ana ʒ. β.
Ex his mixtis linteū asperum suffiatur, deinde caput eo manè fricetur. Melius aut hoc suffimen cremore tragacanthi, uel gummi Arabici macerati in aqua rosacea ad formam lupinorum concremari potest. Andernacus.

Suffimentum odoratum ad caput.

℞. Trochiscorum galliæ moschatæ ʒ. j.
Saluiæ, Maioranæ, Rorismarini ana ʒ. j. β.
Maceris ʒ. j.
Caryophyllorum, Cinnamomi ana ʒ. j.
Foliorum Lauri ʒ. β.
Ligni aloës ʒ. j.
Moschi G. iij.

Terantur singula, & commixtis omnibus fiat pulvis, qui exigente usu carbonibus uiuis inspergatur. Fuchsius.

Aliud.

℞. Thuris, Cinnamomi, Caryophyllorum ana ʒ. j. β.
Cort. Mali Citri ʒ. j.
Maceris, Ligni aloës ana ʒ. ij.
Myrrhæ, Mastiches ana ʒ. j.
Trochiscorum galliæ moschatæ ʒ. ij.
Ladani ʒ. ij. β.

Trita excipiantur stacte, & informentur pastilli pro suffimento. Fuchsius.

DE SVFFIMENTIS CONFEREN-
tibus cordi.

Suffimentum ad animæ defectionem.

℞. Thuris, Mastiches ana ʒ. j.
Cort. Citri sicci ʒ. β.

Agallochi

A Agallochi, Styracis calamitæ, Calamenthæ, Caryophyllorum ana ʒ. iij.
Ex his in puluerem redactis, fiat suffitus ante accelsionem febrium, in quibus anima deficit. Andernacus.

Aliud ad animales & vitales vires corroborandas.

℞. Rosarum rubrarum, Florum Stæchados, Rorismarini ana ʒ. j.

Thuris ʒ. ij.

Caryophyllorum, Macis, Xyloaloes ana ʒ. j. β.

Detrita in puluerem, inbecillis & deficientibus iniiciantur. Idem.

DE SUFFIMENTIS CONFERENTIBUS PULMONI.

Suffimentum ad ulcera pulmonis.

℞. Gummi hederæ torrefacti, Coriandri, Rosarum rubrarum, Santalorum, Mastiches, Thuris, Myrrhæ, Cort. Thuris ana ʒ. iij.

Belzoini, Styracis, Ladani puri, Hypocistidis ana ʒ. ij.

Auripigmenti rubri ʒ. j.

Excipiantur terebinthina, & fiant formulæ lupinares, quibus fumigentur & experimenta capitis. * Efficax est ad ulcera narium, aurium, pulmonis & uteri. Rondeletius.

B *Suffimentum ad ulcera pulmonis cum inflammatione.*

℞. Coriandri præparati, Rosarum rubrarum ana ʒ. j.

Ladani puri, Hypocistidis ana ʒ. iij.

Santali rubri, albi, Blattæ Bizantiæ ana ʒ. ij.

Capitum Papaueris, Corticum Mandragoræ ana ʒ. ij.

Styracis, Belzoini ana ʒ. j.

Auripigmenti rubri ʒ. β.

Cum mucilagine gummi tragacanthæ & Arabici, infusorum in aqua rosarum quâtum sufficit. Addito salicis carbone, fiat formulæ: utatur, ut prius. Rödel.

Suffimentum ad tussim.

℞. Thuris, Mastiches ana ʒ. iij.

Santalorum omnium ana ʒ. j.

Styracis calamitæ, Ladani, Rosarum rubrarum ana ʒ. ij.

His tritis, experimenta capitis manè & uesperis suffiantur. Andernacus.

Suffimentum ad tussim ueterem.

℞. Rad. & fol. Vngulæ caballinæ ʒ. j. Fol. Marrubij ʒ. β.

Styracis, Myrrhæ, Bdellij ana ʒ. iij.

Capitum Papaueris, Sem. Hyoscyami ana ʒ. j.

Excipiatur terebinthina, pice & butyro simul liquatis: fiat formulæ, quibus fumigetur opercula capitis. Excipiatur etiâ fumus per nares & os. Rödel.

DE SVFFIMENTIS CONFEREN-
tibus utero.

A

Suffimentum ad suffocationem uteri.

Suffitus ad uteri suffocationē fiunt ex fœtidis, ut galbano, asa fœtida, blatta, castoreo, aut fragmentis plumarum, uel etiā ex simplicibus separatim: ut si castoreū tantūm, uel asa fœtida calfacta naribus apponantur. Rondeletius.

Suffimentum ad menses mouendos.

℞. Myrrhæ, Styracis, Bdellij ana ʒ. β.
Iridis, Afari, Cumini ana ʒ. iij. Opopanacis ʒ. ij.
Pulegij utriusq; sic. ana ʒ. j.

Excipiantur terebinthina & butyro: fiat fumigium, quo fumigentur per embotum, tempore quo erupturi sunt menses. * Calfacit, relaxat. Rondeletius.

*Suffimentum ad calefaciendum & siccandum uterum,
post mensium purgationem.*

℞. Aiptæ moschatæ, uel Galliæ moschatæ ʒ. β.
Belzoini, Calami aromatici ana ʒ. ij.

Cum mucilagine gummi tragacanthæ fiant formulæ, recipiant fumum per infundibulum. Rondeletius.

Suffimentum ad conceptionem promouendam.

℞. Ladani, Mastiches, Galliæ moschatæ, Caryophyllorum, Macis, Calami, Galangæ, ana ʒ. iij.
Cyperi, Rosarum ana ʒ. j. β.
Hypocistidis, Castorei ana ʒ. ij.

Cum mucilagine gummi tragacanthæ fiant formulæ, quibus utatur ut prioribus, post mensium purgationem ante concubitum. Rondeletius.

Suffimentum ad procidentiam uteri.

℞. Bituminis, Lapidis Gagatis ana ʒ. ij. Vfnæ ʒ. ij.
Castorei, Cyperi, Rad. Bistortæ, Cupularū gladium, Balauustiorū ana ʒ. iij.

Excipiantur cera: fiant formulæ, quibus suffumigentur per embotum.

DE SVFFIMENTIS CONFERTI-
bus iuncturis.*Suffitus ad dolorem iuncturarum.*

℞. Fol. Absinthij, Anthos, Stæchados, Chamomillæ ana ʒ. ij.
Myrrhæ, Styracis, Belzoini ana ʒ. iij.

Excipiantur terebinthina: fiant formulæ. His suffiatur lana, uel bōbax: deinde parti applicetur. Rondeletius.

Suffimentum ad tumores induratos.

℞. Marchasitæ ʒ. ij. Propoleos ʒ. iij.

Bdellij,

A Bdellij, Myrrhæ, Styracis, Iridis ana ʒ.β.
Cum terebinthina fiant formulæ, quibus suffumigetur durities neruorum.
Rondeletius.

Suffimentum ad prouocandum sudorem in morbo Gallico.

℞. Cinnabaris ʒ.ij. Styracis, Belzoini ana ʒ.j.
Myrrhæ, Corticis Pini ana ʒ.β.

Ex terebinthina fingantur orbiculi. Ægri hoc suffiantur, loco calido, sic ut per initia caput extra illum habeant, ne offendantur, aut suffocentur: quod multis ob incuriam accidere solet. Rondeletius.

Aliud.

℞. Santalorum omnium ana ʒ.j.
Nucis moschatæ, Mastiches, Iunci odorati, Caryophyllorum, Caphuræ,
Succini, Afari ana ʒ.β. Cort. Mali arantij ʒ.j.
Conterantur, misceanturq̄s, & cum guttis aliquot terebinthinæ fiant pastilli,
quo egroti suffiantur. Andernacus.

DE SUFFIMENTIS ODORATIS.

Trochisci profumo. S. V.

℞. Ligni aloës, Ladani ana ʒ.j.
Belzoini ʒ.ij. Styracis calamitæ ʒ.β.
B Sacchari candi ʒ.ij. Moschi G.ij.
Misce cum aqua rosacea, & ex pasta subacta fac trochiscos: qui tempore usus
magis redolebunt, si irrorando aspergas eis pauxillum aque rosaceæ.

Trochisci galliæ moschatæ.

℞. Xyloaloës crudæ, bonæ electæ, part. v.
Ambraë partes iij. Moschi boni part. j.
Glutinis tragacathi in aqua ros. soluti, quantum sufficit ad ea cõprehédenda.
Fiant trochisci, figura folij myrtei: sigillètur: uase uitreo reponatur. Mesues.


Suffitus, qui ex formulis auiculas referentibus excitatur.

℞. Suffiminis, officinæ uocant thymiamatis lb.β.
Styracis liquidæ ʒ.j.
Styracis calamitæ ʒ.j.β.
Ladani ʒ.β.
Carbonum Silicis, Tragacanthæ ana ʒ.ij.
Puluis carbonum & tragacanthum in aqua rosarum triduum macerentur,
deinde etiam in massam redigantur: ex qua finguntur formulæ
auicularum. Andernacus.

FINIS LIBRI II.

XX 3 ANTIDO.

A



DE AQVIS ORNANTIBVS

CAPVT I.

DE AQVIS ODORATIS.

Aqua odorata ad corpus & uestimenta.

℞. Aquæ Rosarum, item Nansq, Myrti, Moschatæ ana ℥.j.

Pulueris Ireos Orient. ʒ.ij. Zibetti ʒ.ij.

Misceantur, & coquatur in uase uitreo usq; ad tertie partis consumptionem: deinde in uase uitreo optimè obturato seruetur. Isabella Cortese.

Aqua:

726 DE AQVIS ORNANTIBVS CAPILLOS.

Aqua odorata alia.

A

℞. Aquæ rosarum quantum iufficit.

Moschi ʒ. j.

Zibetti, Ambrę ana parum.

Ponantur in uase uitreo ad ignem, donec calefiant: deinde obturetur & seruetur ad usum. Marinellus.

Alia eiusdem.

℞. Aquę Rosarum ℥. iiij.

Belzoini, Styracis, Caryophyllorum, Caphurę, Ligni aloës ana ʒ. j.

Moschi, Zibetti ana ʒ. j.

Misceantur, in uase uitreo obturato coquantur per horas quatuor in balneo Marię: deinde frigidum colatur: ac in alio uase uitreo bene obturato ponatur ad solem per dies quinq; addendo moschi ʒ. xv.

Aqua moschata, eiusdem.

℞. Aquę rosarum opt. ℥. ij.

Moschi optimi ʒ. j. β.

Misceantur, & destillentur in balneo Marię, igne perquam lento: deinde seruetur in uase optimè obturato.

Alia.

℞. Aquę Rosarum ℥. xij.

Aquę Lauendulę, Caryophyllorum, Cinnamomi electi ana ʒ. j.

Macis, Cardamomi, Moschi, Ambrę ana ʒ. β.

Cort. Mali citri, Santali citrini, Ireos ana ʒ. β.

Belzoini, Styracis calamitę ana ʒ. j.

Mixta omnia, atq; in phialam posita, in balneo Marię per quindecim dies ponantur, deinde ad solem per dies alios quindecim: & erit optima. Alexius.

Alia, eiusdem.

℞. Aquæ Rosarum ℥. iiij.

Aquę Lauendulę ʒ. vj.

Aquę flor. Iasmini ℥. iiij.

Moschi ʒ. j.

Misceantur, deinde cum per dies decem in uase optimè reclusa fuerint, distillentur in balneo Marię, seruenturq; ad usum.

DE AQVIS MACIEM INDVCENTIBVS.

Aqua corpus macilentum reddens.

℞. Caryophyllatę, Zingiberis, Rorismarini ana part. j.

Puluerizentur, & in uino optimo per dies octo macerentur in uase uitreo, deinde distillentur. Utatur quotidie poc. j. ante prandium. Marinellus.

DE A.

A DE AQVIS CAPILLOS LONGOS REDDENTIB.

Aqua capillos longos reddens.

℞. Lardi quantum satis est.

Radendo quàm minutissimè conscindes, deinde in pila marmorea contundes, ut pastam subactam referat. Hac in alembico destillata, liquorem album colliges, quo pilos inunges. Alexius.

Alia, capillos elongans.

℞. Mellis optimi colati ℥. iij.

Vitellorum ouorum n. xl.

Misceantur, & destillentur: qua capilli inungantur. Marinellus.

Alia eiusdem.

℞. Capillorum Veneris recent. contuforum M. j.

Mellis optimi quantum sufficit.

Misceantur ad formam pastæ, & destillentur.

DE AQVIS CAPILLOS TINGENTIBVS.

Aqua capillos denigrans.

℞. Gummi Arabici ℥. iij.

Myrobal Chebularum, Emblicarum ana ℥. β.

B Omnia trita, igne q̄: suavi destillata, foli exponantur horis duabus, & capite cum lixiuio loto, & exiccato, capilli denuò uino & sale madentes, cum aqua abluantur destillata, cutim tamen non attingente. Fumanellus.

Alia eiusdem.

℞. Gummi Arabici ℥. iij.

Ebulorum, Rosarum ana ℥. β.

Trita igne lento destillentur, caput q̄: prius aqua lotum, & non exactè siccatum, lauetur cum aqua destillata.

Alia denigrans.

℞. Alcannæ tritæ, Ofsium dactylorum puluerizatorum ana part. j.

Aquæ in qua cort. fabarum & gallæ fuerint incoctæ, quantum sufficit.

Misce. Marinellus.

Alia eiusdem.

℞. Nucum Cupressi quantum sufficit.

Vini rubri, Aceti rubri ana part. j.

Coquantur simul, & decoctione hæc capilli lauentur.

Alia eiusdem.

℞. Spumæ argenti quantum sufficit.

Aceti, uel Succu Citri, uel Limonij q. s.

Coquantur simul per horam dimidiam: quo capilli lauentur.

YY

Alia.

Alia.

℞. Limaturæ ferri quantum sufficit.
 Ponatur in aceto fortissimo per dies decem; deinde capilli inungantur. Isabella Cortese.

Alia capillos nigros reddens.

℞. Scorix ferri, Limaturæ plumbi ana q. s.
 Coque in aceto ad consumptionem medietatis. Cola, & unge. Bayrus.

Alia eiusdem.

℞. Rad. Capparorum quantum sufficit.
 Coque in lacte asinæ usq; ad tertiam partem, & unge, dimittendo per noctem.

Alia denigrans.

℞. Mellis ℥. ij.
 Gummi Arabici ℥. ij.
 Ebulorum, Rosarum ana ℥. β.
 Trita lento igne destillentur, & caput prius cum lixiuio & sale lotum, cum prædicta abluatur aqua. Fumanellus.

Alia eiusdem.

℞. Salis gemmæ, Squamæ æris, Alcannæ ana part. j.
 Omnia trita alembico destillato.

Alia eiusdem.

℞. Salis gemmæ ℥. j.
 Vitrioli Romani ℥. β.
 Salis nitri ℥. iij.
 Rad. Chelidoni; viridium ℥. ij.
 Contusis & tritis alembico aquam eximito: quod primò exit, abijcito: quod secundò, capillos colorat, prius lotos, & feruenti sole siccatos.

Aqua, qua capilli flavescent.

℞. Mellis optimi ℥. ij.
 Gummi Arabici ℥. ij.
 Suavi destillato igne, aqua quæ primò exit, faciè dealbat: quæ secundò & tertio, flauos reddit capillos. Fumanellus.

Alia capillos flauos reddens.

℞. Buxi rasi, Stæchadis, Citri, Glycyrrhizæ tritæ, Rad. Vngulæ caballinæ, Capillorum Veneris ana q. s.
 Croci parum.
 Coquantur omnia simul usq; ad consumptionem tertie partis. Cola, & unge. Marinellus.

Aqua capillos rubros reddens.

℞. Aquæ Raphani quantum sufficit.

Alcannæ

A Alcannæ quantum sufficit.
Misce, & capillos unge. Idem.

Aqua capillos colore afficiens croceo.

℞ Agrimonie ℥. j. Testiculorum equi exiccatorum n. j.
In aqua fontis coque, & destilla, utereq; capite prius loto. Fumanellus.

Alia eiusdem, ad idem.

℞ Aceti ℔. ij. Salis nitri ℔. β. Destillentur.

Aqua de albans capillos.

℞ Centaurij maioris ℥. iiij.

Aluminis fæcis ℥. viij.

Aluminis rochæ, Gummi Arabici ana ℥. ij.

Saponis albi mundi, Lachrymæ ex tragacantha ana ℥. iiij.

Aquæ ℥. vj.

Coquantur ad dimidias, & colentur: caputq; hac lotum colatura, ad solemq;
siccatum, denuò abluatur lixiuio. Fumanellus.

DE AQVIS CAPILLOS ARGENTIBVS.

Aqua faciens renascere pilos.

℞ Carnium limaciarum, Vesparum, Apum, Sanguisugarum, Salis adusti
ana part. æquales.

B Pone in uase uitreato, habere in fundo parua foramina, sicut cribrum: & po-
ne sub eo aliud uas uitreatum, quod colligat humiditatem, quæ paulatim per
multas dies manabit. Colligatur, & loca depilata ex ea fricentur. Bayrus.

DE AQVIS CAPILLOS PROHIBENTIBVS.

Aqua capillos renasci prohibens.

℞ Sanguinis ranarum, Terræ sigillatæ, Sumach, Rosarum ana tritorum
quantum sufficit.

Aceti, Succu Semperuiui ana q. l.

Macerentur per horas uiginti quatuor, deinde destillentur: qua sæpius loca
depilata lauentur. Marinellus.

Alia eiusdem, ad idem.

℞ Cornu Vaccæ, Aluminis Rochæ, Papaueris nigri ana tritorum q. l.

Sanguinis uaccini recentis ℔. ij.

Macerentur, & destillentur. Utatur omni fero.

Aqua capillos crescere non permittens.

Tithymalli decoctū cū aceto, calce uiua, & maluis cōmixtū, Fumanellus

Aqua prohibens ortum pilorum.

℞ Sem. Hyoscyami triti ℔. β.

In loco humido reponito, & post tēpus additis ℥. ij. fol. fabæ inuersæ, quæ tele-
phiū est, destillato, & pilis euulsis partē glabrā sæpius balneato. Fumanellus.

724 DE AQVIS ORNANTIBVS OCVLVS.
DE AQVIS OCVLORVM VITIA TOLLENTIB. A

Aqua ad ocolorum lachrymas.

℞. Fragarum maturarum quantum sufficit.
Maceretur in fimo equino ꝑ dies quindecim, deinde destilletur. Marinellus.

Alia eiusdem, ad idem.

℞. Florum Spinæ albæ, Flor. Salicis, uel Comarum fol. Salicis ana q. f.
Destillentur in uase uitreo. ad idē etiam ualet aqua euphragiæ destillata.

Aqua ad rubedinem ocolorum.

℞. Chelidoniæ, Verbenacæ, Rutæ, Fœniculi succorum ana ℥. iij.
Comarum fol. Rosarum quantum sufficit.
Sacchari candi ℥. iij.
Thutiæ optimæ ℥. iij.
Sanguinis draconis ℥. iij.
Trita destillentur. Marinellus.

Aqua uisum conseruans.

℞. Myrhæ ℥. j.
Aloes ℥. ij.
Crocī ℥. j.
Thuris, Zingiberis, Sarcocollæ, Caphuræ tritæ ana parum.
In aqua imposta ad usum seruetur. Fumanellus. B

Alia.

℞. Fœniculi, Verbenacæ, Euphragiæ Endiuicæ, Betonicæ, Rosarum rub.
Capill. Veneris ana M. iij.
Contusa ꝑ diem in uino macerentur albo, & destillentur. Fumanellus.

Alia eiusdem, ad idem.

℞. Fœniculi, Chelidoniij, Saluiæ, Rorismarini, Verbenacæ, Rutæ ana part.
æquales.
Alembico destillentur.

Aqua ad ocolorum dolores.

℞. Aquæ Rosacæ, item Euphragiæ, Chelidoniij ana ℥. j.
Thutiæ præparatæ ℥. j.
Misce. Valet ad idem aqua uitis incisæ. Idem.

Aqua uisum instaurans.

℞. Fœniculi, Chelidoniij, Verbenacæ, Rutæ, Fol. Enulæ ana M. j.
Virgæ pastoris, Millefolij ana M. j.
Caphuræ ℥. ℞.
Alembico destillentur. Idem.

Aqua ad ocolorum lachrymas exiccandas.

℞. Thutiæ præparatæ ℥. j.

Lapidis

- A Lapidis hæmatitis ꝑ.β.
Sanguinis draconis, Acaciæ, Antimonij ana ꝑ. j.
Caphuræ ꝑ. ꝑ.
Terræ sigillatæ ꝑ. j.
Thuris, Masticis, Piperis albi ana ꝑ. β.
Aquæ Fœniculi, Euphragiæ ana ꝑ. j.
Aquæ Violarum Rosarum ana ꝑ. ꝑ.
Vini antiqui ꝑ. iij.

Coquito omnia in duplici uase ad consumptionem medietatis, & percolato. Fumanellus.

Aqua ad rubedinem oculorum.

℞. Succu Vuz immaturæ ꝑ. ꝑ.

Aloes ꝑ. j. β.

In panno lineo ligatæ, infusæq; in dicto succo somni tempore oculi madefiant. Idem.

Aqua ad oculorum tenebrositatem.

℞. Thutiæ præparatæ ꝑ. iij.

Omphacij ꝑ. β. uel v.

- B Soli diebus quindecim exponito, & addita aquæ rosacæ ꝑ. β. denuò per dies 15. alios sub sole iaceat, & per dies quinque cum aqua euphragiæ. post hæc thutiam terito, & cum panno xylino, tenui, cribrato in sole æstuanti, usuique seruat. Idem.

Alia ad suffusionem, eiusdem.

Marchesitæ frustra ignito, & in oleo communi antiquo pellucido extincta, tritaq; destillato, & denuò cum fæce sua terito, destillatoq;.

Alia eiusdem, ad idem.

℞. Asæ ꝑ. j.

Mellis albi puri ꝑ. β.

Aquæ Fœniculi, Aquæ Rutæ ana ꝑ. xij.

Aquæ Maioranæ ꝑ. β.

Alembico destillantur.

Aqua ad palpebrarum tumores & lachrymas oculorum.

℞. Agrimoniz, Verbenacæ, Fœniculi, Rosarum, Chelidonij ana q. s.

Omnia incisa, uiniq; albi momento conspersa destillato. Fumanellus.

DE AQUIS DENTES DEALBANTIBVS.

Aqua dentes dealbans.

℞. Salis Arabici, Salis gemmæ ana ꝑ. β.

Aluminis Zuccharini ꝑ. iij.

Trita destillantur, qua fricentur dentes cū panno rubro scarlato. Marinellus.

YY 3 Alia

Alia eiusdem.

A

℞. Aluminis Rochæ lb. j.
Salis nitri lb. j.
Aceti parum.

Trita dissoluentur cum aceto, & destillentur. Pro qualibet ℥. j. huius aquæ, adde succi limonum ℥. iij. & fricentur dentes.

Aqua dentes albos reddens.

℞. Aluminis rubri ℥. vj.
Salis communis ℥. iij.
Mastichis ℥. j.
Myrrhæ ℥. ℞.
Caryo phyllorum ℥. vj.

Misce, fiat destillatio, qua fricentur dentes. Rondeletius.

Aqua ad dealbandos dentes.

℞. Salis purgati & contusi lb. j.
Aluminis glacialis ℥. j.

Destillentur alembico. Huius aquæ ℥. j. misce cum uncia plantaginis, & intincta lana xylyna dentes perfrica. Alexius.

Alia preciosissima, eiusdem.

B

℞. Primæ aquæ mellis destillatæ, quæ alba est, lb. j.
Salis albi ℥. j.
Aluminis lb. ℞.
Salis nitri ℥. j.
Aquæ ex folijs lentisci lb. ℞.
Masticis ℥. ij.
Aceti albi, Vini albi ana ℥. ij.

Destillentur omnia in balneo Mariæ. Qua si quis uti uolet, abluat prius dentes: deinde cum panno aliquo siccata fuerint, fricentur, uel cum lentisci stylo intincto, uel cum panno lineo madefacto, paruo.

Aqua dealbans dentes.

℞. Vini albi ℥. vj.
Comarum Myrti, item Lentisci, Sorbarum, Cupressi ana ℥. iij.

Balauftij, Cort. rad. nucum, Pyrethri, Sanguinis draconis, Ofsium dactylorū ustorum, Rosarum rubrarū nondum apertarum, Cinnamomi ana ℥. j. Contusa destillentur lento igne, donec omnis exierit aqua. Huius aquæ ℥. ij. misce cum ℥. j. cornu cerui usti, & ℥. j. sanguinis draconis, & pone ad solē per dies quatuor, & frica dentes. Isabella Cortese.

Aqua dentes confirmans.

℞. Nucum moschatarum n. iij.

Radicum

A Radicum Gingiberis n. ij.

Masticis parum.

Pyrethri, Maioranæ, Hyssopi, Menthæ, Rorismarini, Saluicæ, Salis ana ʒ. β.

Excipiantur omnia, & uino misceantur odoro, bulliantq; donec pars tertia consumpta fuerit, & colo transfundantur, & frequenter percolato, utitor calido. Fumanellus.

Decoctum ad dentes firmandos, gingiuas purgandas & cōsolidandas.

℞. Aquæ Lentisci, Rorismarini, Aceti distillati, ana poculum dimidium.

Myrrhæ, Masticis, Boli Armeni, Sâguinis draconis, Aluminis usti ana ʒ. j.

Cinnamomi electi ʒ. β.

Aquæ pluuiialis pocula tria.

Misceantur omnia, coquantur igne admodum lento per quartam horæ partem, addendo mellis despumati lb. β. Belzoini parum: & fiat decoctum, quo sæpius lauentur dentes ante & post cibū, tenendo, in ore aliquādiu. Alexius.

DE AQVIS FACIEM ILLUSTRANTIBVS.

Aqua faciem detergens & illustrans.

℞. Medullæ panis hordei lb. ij.

Lactis caprini lb. iij.

B Vini albi lb. β.

Quatuor sem. frig. maiorum, contusorum ana ʒ. ij.

Thuris, Masticis, Myrrhæ ana ʒ. j.

Fabarum recentium lb. ij. uel Florum fabarum P. iij. uel Fabarum siccarū.

& Cicerum rubrorum ana lb. ij.

Oryzæ lb. β.

Florum Nenupharis, Violarum, Rosarum albarum ana P. ij.

Vitellorum ouorum cum albuminibus n. x.

Destillentur in balneo Mariæ. Si addatur ante destillationem terebinthina, melior erit fucus, & diutius faciem seruabit. Rondeletius.

Alia eiusdem.

℞. Decocti Pulli, uel Decocti Caponis, uel Decocti Gallinæ lb. iij.

Succi Limonum lb. j.

Aceti albi lb. β.

Florum Fabarum, Nenupharis ana P. iij.

Caphuræ, Album. ouorum ana ʒ. ij.

Misceantur, & destillentur per alembicum. Loco decocti pulli, uel gallinæ, lacte capræ albæ uti licet.

Alia eiusdem.

℞. Farfuris ex meliori frumento cribrati, Aceti fortissimi ana q. s.

Misce,

Misce, & fiat pasta: cui adde miscendo,
Album. ouorum n. xij. Destilla.

A

Aqua ad splendorem & formam faciei.

Aqua de albuminibus ouorum recentium per spongiam facta, cum equali mensura succi limonū, destilletur, ut rosacea. Huic aquæ postea addes lixiuij communis ℥. ij. uel circa: & limonem integrum contusum immittes: post octo dies exprimes ab eo succum, & miscebis cum aqua. Facies prius abluta aqua pura, & absterfa, hac aqua destillata lauetur. Alexius.

Aqua formam faciei concilians.

℞. Rorismarini, Tartari albi, Vini albi ana quantum sufficit.
Misceantur, & destillentur per alembicum. Alexius.

Aqua faciem pulcherrimam reddens.

℞. Columbarum pullos n. ij.
Carnis uitulinæ lb. ij.
Sem. Cataputorum, à corticibus mundatorum ℥. iiij.
Pinearum, Amygdal. dulcium, amararum, Rad. Liliorum alborum, cœruleorum, Fabarum contusarum & mundatarum, Fellis bubuli, Rad. Serpētariæ, Fraxinellæ ana q. f.

Limonum unum purgatum, & incisum
Medullæ panis albi, in lacte madefactæ, Gūmi ammoniaci, in aceto liquefacti, Florum Ligustri ana q. f.

B

Misceantur & destillentur lento igne, ponendo aliquantulum moschi & belzoini circa principium colli uasis recipientis: & seruetur in uase probè obstructo. Alexius.

Aqua faciem illustrans.

℞. Pinearum uiridium, mundatarum incisarum q. f.
Ponantur in lacte per dies tres, quotidie addendo nouum lac: deinde cū sequentibus rebus destillantur.

℞. Vitri contriti ℥. iiij.

Coralli rubri ℥. iiij.

Sacchari candi ℥. iiij.

Aluminis ℥. j.

Misce, & fiat puluis. Deinde

℞. Argenti uiui cum salina mortificati ℥. j. β.

Oua recentia, unà cum corticibus, rupta & concussa n. xij.

Terebinthinæ nouies lotæ ℥. iiij.

Cochleas marinas candidas, quas uendunt suffitores ℥. ij.

Cochleas terrestres n. l.

Contundantur singula, & misceantur: deinde pars aliqua ponatur in cucurbitam

bitam

A bitam uitream, deinde pars aliqua pulueris, post pars terebinthinæ, demum pars cochlearum, aliud super aliud ponendo, donec cucurbita sit plena. Postremò addito,

Vini albi mensuram j.

Distilla igne lento, & serua ad usum. Alexius.

Aqua melonum ad faciem illustrandam.

℞. Melones albos, à corticibus mundatos, quot opus erit: eosq; in frusta, unius digiti crassitudine secato: deinde aluminis saccharini ℥. iij.

Aluminis usti ℥. j.

Argenti uiui extincti ℥. j.

Cochlearum marinarum alb. ℥. ij.

Terebinthinæ lotæ ℥. j.

Ouorum recentium, & cum corticibus contusorum n. xij.

Limoniorum alb. in frusta incisorum, quantum uolueris.

Sacchari ℥. iij.

Lactis caprini, Vini albi ana mens. j.

Hæc omnia ponantur in cucurbitam uitream, aliud super aliud, ut dictū est: deinde destillètur igne lento, donec aqua omnis exierit, demum seruetur in uase uitreo, ad usum. Alexius.

A *Aqua cucurbitæ perfecta, eiusdem.*

℞. Cucurbitas à corticibus mundatas, & in partes rotundas incisas, quot uolueris.

Aluminis Saccharini ℥. vj.

Aluminis scissilis ℥. j.

Myrrhæ ℥. j.

Terebinthinæ lotæ ℥. β.

Oua recentia & contusa n. iij.

Limonia incisa n. vj.

Cochlearum, quantum uolueris. Vini albi mens. j.

In puluerem redigenda redigantur, & misceantur, facièdo ordinem primū ex saccharo, deinde ex pulueribus, tertium ex cochleis. demum ex uino, limonijs & ouis: atq; sic igne lento destillentur, donec omnis aqua extracta fuerit: postea seruetur in uase aliquo uitreo per dies octo aut quindecim.

Aqua ad faciem commendandam.

℞. Pedum uituli n. ij.

Aquæ fluuiialis ℥. xvij.

Coque ad consumptionem medietatis. Deinde adde,

Oryzæ ℥. j.

Medullæ panis in lacte mollitæ n. j.

ZZ Butyri

Butyri recentis ℥.ij.

Albuminum ouorum cum cort. n. x.

Misceantur omnia, & coquantur, deinde destillentur, quousq; omnis aqua exierit. cui denique adde,

Caphuræ, Aluminis zuccharini ana parum.

& erit optima. Alexius.

A

Alia eiusdem.

℞. Chryfocollæ, seu Boracis ℥. ij.

Aluminis rupei, scissilis, squamosi ana ℥. j.

Caphuræ ℥. ij.

Redigantur in puluerem singula, deinde misceantur, ponanturq; in phialam uitream, quam aqua fontana repletam diligenter obturabis. His factis ponatur ad ignem per horas duas, deinde auferatur: & cum refrixerit, ponatur in aliam phialam, addendo duo alba ouorū recentium, bene cum omphacio agitata: misceatur, sintq; in sole p̄ dies uiginti: & habebis aquā p̄fectissimā.

Aqua ad decorandam faciem.

℞. Oua in partes dissecta, Cort. Aranciorum, Rad. Melonum ana q. f.

Cum bocia ampla, rostrum habente longum, studioso ac potenti igne per alembicum destillato. Fumanellus.

Alia.

B

℞. Florum Fabarum M. vj.

Aquæ Limonum ℥. j.

Rad. Lilij ℥. viij.

Farinæ Fabarum ℥. j.

Gummi Arabici, Tragacanthæ ana ℥. j.

Destilla, & utere. Fumanellus.

Aqua faciem decorans, alia.

℞. Fœniculi, Rutæ, Verbēnacæ, Euphragiæ, Endiuic, Betonicæ Sileris mōtani, Rosarum rubrarum, Capillorum Veneris ana M. vj.

In uino albo per diem & noctē infusa alembico destillentur. Fumanellus.

Alia.

℞. Fabarum albarum à corticibus mundatarum, quantum uolueris.

Macerentur in uino albo per dies nouem: deinde contundantur, & p̄dicto uino addantur. quibus adiunge,

Oryzæ in lacte caprino coctæ quantum sufficit.

Albuminum ouorum quantum sufficit.

Misce omnia, & destilla. Isabella Cortesa.

Alia.

℞. Hordei immaturi recentis quantum sufficit.

Lactis

- A** Lactis caprini, Album. ouorum ana q. s.
Misce, & destilla. *Isabella Cortese.*

Alia eiusdem.

℞. Limoniorum, Fabarum siccarum, & in uino maceratarum, Mellis, Lactis caprini, Album. ouorum ana quantum sufficit.
Misce, & destilla.

Aqua ad faciem decorandam.

℞. Lactis uaccini, mense Maij ℥. ij.
Aranciorum n. iij.
Limonum n. v.

Incidantur minutim: deinde adde,
Aluminis, Sacchari ana ℥. j.
Misce omnia, & destilla. *Rondeletius.*

Alia eiusdem ad splendorem.

℞. Micæ panis albi ℥. ij.
Florum Fabarum ℥. j.
Florum Rosarū, item Nymphet, Liliorū ana ℥. iij.
Lactis Capræ ℥. vj.
Iridis Venetorum ℥. j.

- B** Destilla in balneo Mariæ.

Alia eiusdem.

℞. Terebinthinæ, Masticis albissimæ, Thutiæ præparatæ, Caphuræ, Aluminis ana ℥. iij.

Infunde in aceto forti per dies tres. Postea destilla per alembicum.

Aqua faciem decorans.

℞. Serpentariæ recentis ℥. j.
Rutæ M. j.
Hederæ terrestres M. ij.
Boracis ℥. j.
Styracis calamitæ ℥. β.
Ligni aloes ℥. ij.
Meschi ℥. β.
Vnguenti ℥. iij.
Caphuræ ℥. vj.
Carnis Caponis ℥. ij.
Cort. Limonum, Cort. Aranciorum ana ℥. j.
Destilla. *Rondeletius.*

Aqua ad decorandam faciem.

℞. Caphuræ ℥. iij.

ZZ 2 Aluminis

Aluminis rubri, Boracis ana ʒ. vj.

Mofchi ʒ. ij.

Terantur omnia: adde,

Tartari ʒ. j. β.

Aquæ rosarum lb. ij.

commiscendo semper cum spatula. Postea destilla per filtrum, & in ampulla bene clausa seruetur, & manè facie bene terfa, cum panno guttam unâ aquæ fumat, deinde faciem bene fricet. Rondeletius.

DE AQVIS TINGENTIBVS ET
dealbantibus faciem.

Aqua faciem dealbans, & oculos.

℞. Rutæ campestris, Fœniculi, Verbenacæ, Rad. Betonicæ, Fol. Rosarum, Capill. Veneris ana part. æquales.

Maceretur per noctē in uino albo odoro, & alembico destillatur. Fumanell.

Alia eiusdem.

℞. Ari quantum sufficit.

Partes crassiores tundito, & cum rosarum aqua, ad solem ter, quatēue siccatō, & rosacea imposita utitor.

Alia faciem dealbans.

℞. Albuminis oui, Boracis petrosi, Salis, Aluminis Rochæ ana ʒ. j.

Quodlibet per se tritum, albumini ouorum commixtum destillato, utitorq̃.

Fumanellus.

Alia eiusdem ad idem.

℞. Aluminis Rochæ tritæ ʒ. iij.

Albuminis ouorum quantum sufficit.

Misce, & destilla.

Aqua faciem dealbans.

℞. Florum Nenupharis, item Spinæ albæ, Sambuci, Fabarum, Violarum: Capillorum Veneris ana partes æquales.

Misce, & destilla. Fumanellus.

Alia eiusdem.

℞. Lithargyri contriti lb. β.

In aceti albi ʒ. iij. coquito, & panno cribratam, in uitreo uase seruato: deinde adde,

Caphuræ, Aluminis, Iameni, Boracis, Olei Tartari ana part. æquales.

Aquæ rosarum quantum sufficit. Misce, & destilla.

Alia experta, eiusdem.

℞. Terebinthinæ destillatæ lb. ij.

Thuris

A Thuris ꝑ. iij.

Masticis ꝑ. ꝑ.

Dracunculi ꝑ. ꝑ.

Omnia trita, & cum aqua terebinthinæ mixta, iterum destillato: deinde,

℞. Axungia suillæ, recentis, liquatæ ℥. j.

Caryophyllorum ꝑ. ij.

Nucis moschatae n. iij.

Auri ꝑ. j.

Argenti ꝑ. ij.

Omnia tenuissimè trita alembico destillato.

Alia faciem dealbans & mundans.

℞. Florum Fabarum M. x.

Aluminis Rochæ ℥. j. ꝑ.

Aluminis Zuccharini ꝑ. v.

Aluminis Scaiolæ ꝑ. iij. ꝑ.

Salis Nitri ꝑ. iij.

Aluminis Fæcis ꝑ. vi.

Argenti uiui extincti ꝑ. iij.

Destillentur igne lêto, & quū quid stillare incipit, igne augeto. Fumanellus.

Alia eiusdem.

B ℞. Aluminis Iameni, Boracis, Aluminis Rochæ ana tritorum ꝑ. iij.

Album. quorum quantum sufficit. Destilla.

Alia eiusdem, ad idem.

℞. Argenti electi, Argenti uiui ana ꝑ. j.

Super porphyreum terantur lapidem, additoq; argenti sublimati modico, in loco collocentur humido: & quod liquatum est, alembico destilletur.

Alia ad faciei nitorem.

℞. Radicum Lilij, item Ari, Dracunculi ana ℥. ꝑ.

Aquæ flor. Fabarum ℥. j. ꝑ.

Aquæ Rosaceæ ꝑ. viij.

Destilla: adijce moschi cariij, cinnamomi ana ꝑ. ij. facie bis die abluito, Alex.

Aqua faciem dealbans.

℞. Sulphuris uiui ꝑ. j.

Thuris albi ꝑ. ij.

Caphuræ ꝑ. j.

Aquæ rosarum ℥. j.

Trita misceantur, & soli per dies quindecim exponantur, & de ea lauetur facies in sero: manè uerò abluatur cum decoctione surfuris & rosarum. Alexius, & Bayrus.

ZZ 3 Aqua

Aqua cutem reddens albam, solisq̄, adustionem auferens.

A

℞. Aquæ pluuiæ, Omphacij ana menf. ℥.

Coquantur simul usq; ad consumptionem medietatis: deinde inter bulliendum, addito,

Succi Limoniorum tantum, quantum bulliando antea euauit.

Demum cum cocta satis fuerint, auferantur ab igne, addaturq;

Albuminum ouorum n. iij.

Postquam deferbuerint, seruetur ad usum. Rondeletius.

Alia ad dealbando faciei maculas, & cicatrices.

℞. Aquæ uitæ quartò destillatæ, part. iij.

Summitatum flor. Anthos part. ij.

Macerentur simul per diem & noctem in vase bene cooperto, deinde destillentur. Rondeletius.

Aqua cuiusdam mulieris nobilis.

℞. Sublimati ℥. j.

Caphuræ ℥. j.

Puluerizentur optimè, infundantur in succo limonum, & aqua rosarum, nenupharis, cucurbitæ, & florum fabarum ana ℥. ℥. Insolentur per dies quindecim, & usui seruetur. Rondeletius.

Fucus Ducis Mediolanensis.

B

℞. Lactis caprini ℥. iij.

Medullæ panis albissimæ n. ij.

Temperentur simul per horas sex: deinde adde,

Limonum à cort. extremo mundatorum n. xij.

Albuminum ouorum n. xij.

Calcis, Corticum ouorum, Porcellanarum ana ℥. ℥.

Caphuræ, Aluminis, Coralli rubri ana ℥. ij.

Boracis ℥. j.

Cerussæ ℥. iij.

Misceantur, & cum diligentia destillentur. Rondeletius.

Aqua eiusdem, ad idem.

℞. Florum Fabarum, Florum Nenupharis ana ℥. j.

Medullæ panis alb. Farinæ Oryzæ, Farinæ Ireos, Cucumeris agrestis ana ℥. vi.

Mellis ℥. j.

Vini albi, Aquæ fontis ana ℥. iij.

Temperentur simul, & fiat destillatio in balneo Mariæ. Adde,

Seminis Cucurbitæ mund. ℥. iij.

Thuris, Myrrhæ ana ℥. j.

Aqua seruetur usui.

Alia

A *Alia ad dealbandas cicatrices.*

℞. Rad. Ireos, Rad. Cucumeris agrestis ana ℥. iij.
 Rad. Altheæ, Rad. Liliorum ana ℥. ij.
 Racemorum maturorum ℥. β.
 Rad. Diſtamni ℥. iij.
 Herbæ Fabarum, Herbæ Parietariæ ana M. j.
 Flor. Nenupharis, Flor. Maluarum ana P. j.
 Panis hordei ℥. j.
 Macerentur in uino albo, uel fero caprino, & fiat deſtillatio. Adde,
 Raphani ℥. β.
 Quatuor ſem. frig. maior. ana ℥. j.
 Vrinæ puellæ ℥. β.
 Infolentur, & ſeruentur uſui. Rondeletius.

Aqua faciem dealbans.

℞. Succu Limoniorum ℥. j.
 Porcellanarum ℥. v.
 Macerentur, donec diſſoluantur. deinde adde,
 Limoniorum inciforum n. xij.
 Albuminum ouorum n. x.
B Caphuræ ℥. j. β.
 Boracis ℥. j. β.
 Aquæ pinearum ℥. β.
 Miſce, & deſtilla. Marinellus.

Alia eiufdem, ad idem.

℞. Spumæ argenti ℥. β.
 Aceti albi ℥. iij.
 Coquantur ſimul uſq; ad conſumptionem tertiæ partis, & deſtilla: deinde
 aquæ deſtillatæ adde,
 Caphuræ ℥. β.
 Aluminis Scaiolæ, Olei Tartari, Aluminis Zuccharini ana ℥. j.
 Relinquantur ſic, donec diſſoluantur: poſtea coletur, & uſui ſeruetur aqua.

Aqua ad faciem rubram.

℞. Ariſtolochiæ rotundæ, Been albi & rubri ana ℥. β.
 Rad. Ireos ℥. v.
 Rad. Liliorum ℥. vj.
 Cicerum rubrorum, Lupinorum combuſtorum ana P. β.
 Nucis moſchatæ, Cinnamomi ana ℥. β.
 Amygdal. amar. contuſ. ℥. ij.
 Olei Tartari ℥. iij.

Aquæ

736 DE AQVIS ORNANTIBVS FACIEM.

Aquæ pluuiialis lb.ij.
Sanguinis leporini quantum sufficit.
Trita destilla. Rondeletius.

A

Aqua faciem de albans.

℞. Rosarum albarū, Flor. Nymphæ, itē Sambuci, Liliorū alborū ana lb. j.
Aquæ Fabarum lb. β.
Medullæ panis quantum sufficit.
Albuminum ouorum n. xij.
Thuris ℥. ij.
Cerussæ tritæ lb. j.
Misce, & destilla. Marinellus.

Alia eiusdem.

℞. Lactis caprini, Farinæ frumenti ana quantum sufficit.
Misce ad formam panis, & in clibano coquatur. Huius panis accipe medul-
lam, in lacte caprino maceratam:

Album. ouorum n. xij.
Destillentur. Aquæ destillatæ adde,
Calcis ℥. j.
Caphuræ ℥. ij.
Aluminis Zuccharini, Coralli albi ana ℥. ij.
Trita misceantur, & denuò destillentur. Marinellus.

B

Alia eiusdem.

℞. Tartari albi, Vini albi, Flor. Rorismarini ana q. f.
Misce, & destilla.

Alia ualde, eiusdem.

℞. Ouorum recentium n. vj.
Vini maluatici lb. β.
Columbarum iuuenum n. j.
Casei recentis non saliti n. j.
Malorum aranciorum n. viij.
Olei Tartari ℥. iij.
Cerussæ ℥. j.
Contundenda contundantur, misceantur, & destillentur.

Alia eiusdem.

℞. Limaciarum n. xxx.
Lactis caprini lb. ij.
Axungie porci ℥. iij.
Caphuræ ℥. j.
Caphura per se trituretur, deinde omnia simul contundantur, & destil-
lentur.

Alia

A

Alia, eiusdem.

℞. Medullæ panis albi, in lacte capræ uel asinæ infusæ q. s. Destilla.

Alia, eiusdem.

℞. Myrrhæ ℥. ij.

Thuris ℥. β.

Masticis ℥. β.

Zingiberis albi ℥. iij.

Cinnamomi electi ℥. ij.

Argenti sublimati ℥. ij.

Caphuræ ℥. j.

Album. ouorum ℥. j.

Trita ponantur in uentre gallinæ, addendo

Lactis caprini uel asinæ ℥. iij. Distilla.

Aqua de albens faciem, & maculas tollens.

℞. Boracis ℥. j.

Caphuræ ℥. β.

Aluminis Roche ℥. iij.

Gummi Arabici ℥. β.

Tragacanthæ ℥. β.

B

Sarcocollæ ℥. ij.

Asæ dulcis ℥. ij.

Cerussæ ℥. iij.

Tritis adde,

Aquæ Serpētariæ, item flor. Liliorū, flor. Genistæ, flor. Nimpheæ ana ℥. β.

Misce, & distilla. Marinellus.

Alia ad idem.

℞. Columbarum iuuenum n. iij.

Butyri recentis, uel Pinguedinis lactis ℥. iij.

Oorum recent. albuminum n. xij.

Radici Sigilli Salomonis ℥. xij.

Boracis ℥. ij.

Flor. Cristalli ℥. iij.

Caphuræ ℥. β.

Aluminis Scaiolæ ℥. β.

Aluminis Zuccharini ℥. β.

Aque Cucurbitæ ℥. xij.

Aque Omphacij ℥. iij.

Terenda in puluerem redigantur, deinde misceantur, & distillantur.

Marinellus.

A A a

Alia

Alia eiusdem optima.

A

℞. Aceti albi ℥.ij.
 Aquæ Rosarum ℥.j.
 Aquæ ex cort. Arantij ℥.vj.
 Aquæ ex flor. Arantij ℥.vj.
 Marrubij M.j.
 Mellis ℥.β.
 Moschi G.ijj.
 Caryophyllorum ℥.iiij.
 Aluminis Zuccharini ℥.ij.
 Masticis ℥.j.
 Trita distillentur.

Alia eiusdem, ad idem.

℞. Limoniorum n.iiij.
 Sacchari candi ℥.β.
 Succu Agrestæ ℥.j. ℥.iiij.
 Lactis Asinæ ℥.β.
 Albumin. ouorum recent. n.vijj.
 Medullæ panis albi ℥.iiij.
 Caphuræ ℥.j.β.
 Florum Fabarum ℥.ij.
 Misce, & distilla.

B

Alia eiusdem.

℞. Succu Cannæ uiridis ℥.ij.
 Succu Gentianæ ℥.ij.
 Succu Semperuiui ℥.ij.
 Succu Limoniorum ℥.ij.
 Lactis Asinæ ℥.vj.
 Aquæ florum Fabarum ℥.ij.
 Coralli albi ℥.iiij.
 Porcellanarum in succo limonum dissolutarum ℥.j.
 Boracis ℥.β.
 Trita distillentur. Marinellus.

DE AQVIS RVBIFICANTIBVS
faciem.*Aqua rubificans faciem.*

Ad rubificandam faciem utitor prasilio raso, & aqua rosacea dissoluto, aë
 modica caphura. Fumanellus.

Aqua

A

Aqua faciem coloratam reddens.

Sumito pullos columbinos albos. hos diebus quindecim nucibus pineis
pascito: deinde eos aperito: capita, pedes, intestinaq; abijcito: deinde,

℞. Panem dimidium.

Aluminis Zuccharini quantum sufficit.

Foliorum Auri n. 500.

Foliorum Argenti n. 300.

Medullas panis candidissimi, in lacte amygdal. dulcium mollitas n. iiii.

Medullæ uituli, aut bubuli, aut axungia porcinae ℥. j.

Misceantur omnia, & distillentur. Alexius.

Rubrica ad faciem.

℞. Santali rubri contriti, Aceti fortis bis distillati ana quantum sufficit.

Misceantur, & coquantur igne lento, addendo parum aluminis: & habebis
rubricam perfectissimam. Alexius.

Aqua concilians faciei roseum colorem.

℞. Pintam aquæ uitæ optimæ.

Prasilij ℥. j.

Caryophyllorum n. x.

Granorum Paradisi n. x.

B

Cubeborum n. v.

Omnia trita cribrataq; cum aqua uitæ, per parum feruefacies in uase diligen-
ter opculato, ne quid ullo modo expiret. Deinde refrigeratū distilla. Euony.

Aqua rubra ad faciem.

℞. Albuminum ouorum ad duritiem coctorum n. xxv.

Lactis ficuum poculum j.

Misce, & distilla. Huic aquæ adde, pro qualibet mensura,

Aluminis scissilis ℥. ij.

Cocci tinctorij ℥. β.

Cocci, quo sericum tingi solet, ℥. ij.

Misceantur, & ponantur in phialam uitream, bene clausam, in fimo uel in a-
qua calida, non feruente, per dies octo: deinde eximantur, coleturq;, & ex-
primantur optimè. Quibus factis, addatur rursus tantundē aluminis, ut prius,
cocciq;: & similiter in fimo, uel aqua calida, per dies octo ponatur: & rursus
ut prius coletur. Quod cum ter factum fuerit, adde gūmi Arabici ℥. β. si a-
qua fuerit mensura una: & relinquatur per dies octo in loco calido, ut an-
tea: deinde coletur, & seruetur. Alexius.

Alia faciliior, ac precij minoris.

℞. Glutinis piscium, in uino albo, per quinq; aut sex dies liquefacti ℥. ij.

Ligni Prasilij incisi quantum sufficit. Aquæ fontanæ quantum sufficit.

AAA 2

Miscans

740 DE AQVIS ORNANTIBVS FACIEM.

Misceantur, & coquantur igne admodum lento, donec satis esse uideatur. **A**
deinde addatur,

Aluminis triti \mathfrak{z} .j.

Gummi Arabici \mathfrak{z} .ij.

Misceantur: deinde ablata aqua ab igne, seruetur in aliquo uase optimè ob-
turato. Alexius.

Alia faciem rubram faciens.

\mathfrak{z} . Rad. Sigilli Salomonis \mathfrak{z} .x.

Rad. Ciclamini \mathfrak{z} .v.

Rad. Serpentariæ seu Ari \mathfrak{z} .j.

Lardi mundi \mathfrak{z} .j.β.

Limonum incisorum n.v.

Medullæ panis albi, in lacte macerati, quantum sufficit.

Sublimati, Aluminis Scaiolæ ana \mathfrak{z} .ij.

Aluminis Rochæ \mathfrak{z} .j.β.

Porcellanarum in succo limonum dissolutarum \mathfrak{z} .j.

Misce, & distilla. Marinellus.

Aqua faciem rubram reddens.

\mathfrak{z} . Rad. Serpentariæ maior. mundatarum & contusarum quantum sufficit.

Aquæ fontanæ quantum sufficit.

Misceantur, & coquantur usq; ad consumptionem quartæ partis: deinde ab
igne auferatur, & seruetur in uase cooperto, qua facies lauetur. Marinellus. **B**

FACIEM quoq; rubram reddunt, aqua ex rad. Serpentariæ, ex rad. Bryo-
niæ, ex rad. Ciclamini distillata. Idem.

Aqua faciem colorans.

\mathfrak{z} . Rad. Dracunculi seu Serpentariæ lb.β.

Rad. Liliorum alborum lb.β.

Lardi recentis lb.β.

Aquæ stor. Fabarum \mathfrak{z} .iiij.

Aquæ Rosarum \mathfrak{z} .viij.

Moschi \mathfrak{z} .j.

Cinnamomi \mathfrak{z} .j.

Trita distillentur. Marinellus.

Alia eiusdem.

\mathfrak{z} . Boracis \mathfrak{z} .j.

Sublimati \mathfrak{z} .ij.

Caphuræ \mathfrak{z} .β.

Salis Gemmæ \mathfrak{z} .j.

Salis Alkali \mathfrak{z} .ij.

Aluminis

- A** Aluminis Rochæ ꝑ. ij.
 Aluminis Scaiolæ ꝑ. ij.
 Aluminis Plumæ ꝑ. β.
 Aluminis Zuccharini ꝑ. β.
 Aquæ Rosarum quantum sufficit.
 Coquatur in uase uitreo, usq: ad dimidiæ partis consumptionē: & seruetur.

Alia faciem coloratam reddens.

- ℞. Aquæ uitæ ꝑ. ij.
 Aquæ florum Fabarum, Aquæ Rosar. ana ꝑ. iiij.
 Aquæ flor. Nymphææ ꝑ. vj.
 Tragacanthæ tritæ ꝑ. j.
 Misce, & ponantur ad solem per sex uel octo dies: deinde cola, & serua. Hæc facies prius lota, lauetur. Marinellus.

Alia eiusdem.

- ℞. Lactis caprini mens. ij.
 Panis albi calidi n. j.
 Rad. Dracunculi seu Serpentariæ, Rad. Sigilli Salomonis ana lb. ꝑ.
 Caput Veruecis incisum, unum.
 Boracis ꝑ. β.
B Aluminis Scaiolæ ꝑ. β.
 Succi Limonum ꝑ. j.
 Porcellanarum in succo prædicto dissolutarum ꝑ. j.
 Cerussæ ꝑ. j.
 Lithargyri, Sublimati ana ꝑ. β.

Terenda in puluerem redigantur, incidenda incidantur minutim: deinde misceantur, & distillentur.

Alia eiusdem.

- ℞. Cerussæ ꝑ. ij.
 Sublimati ꝑ. j.
 Aluminis Plumæ ꝑ. β.
 Aluminis Scaiolæ ꝑ. β.
 Boracis ꝑ. ij.
 Caphuræ ꝑ. j.
 Sacchari candi ꝑ. ij.
 Aluminis Rochæ ꝑ. j.
 Trita ponantur in panno lineo ligato. adde deinde,
 Columbam albam iuuenem, mundatam, & in frusta minuta incisam.
 Hæc simul coquantur in lacte capræ uel asinæ, donec caro ab ossibus separatur. Postea omnia alembico distillentur.

742 DE AQVIS ORNANTIBVS FACIEM.

Alia eiusdem.

A

℞. Limaciarum, Salis Gemmæ, Succi Limonum ana quantum sufficit.
Incisa & trita misceantur bene, & in balneo Mariæ distillentur.

Alia eiusdem.

℞. Limonum incisorum n. xij.
Succi Brionie, Vini albi ana quantum sufficit.
Albuminum ouorum n. iij. Misce, & distilla.

DE AQVIS FACIEM DENIGRANTIBVS.

Aqua faciem denigrans.

Iuglandis calloso herbidoq; putamine illo, quod guliocam dicunt, & gal-
lis, Chymistarum organis clarissima eliciatur aqua: qua si facies uel manus
maduerint, nigrescunt paulatim, ut Æthiopsis uideantur. Quod si abijcere,
& pristinae albedini restituere uis, acetum, limonis succum, & colophoniam
extillabis: talisq; lotura nigrum illud abijcit & propulsat. Io. Baptista Porta.

DE AQVIS FACIEM IUVENILEM
reddentibus.*Aqua faciem iuuenilem reddens.*

B

℞. Sulphuris uiui ʒ. j.
Olibani albi ʒ. ij.
Myrrhæ ʒ. ij.
Ambræ ʒ. vj.

Trita misceantur, addendo,
Aquæ Rosarum lb. j.

Destillentur, & seruetur aqua in uase obturato: qua si quis uti uolet, uesperi
cum itur cubitum, hac lauet faciem, deinde manè aqua fontana lauet faciem:
& erit uenustissima. Alexius.

Alia eiusdem ad idem.

℞. Pedes uituli duos.
Aquæ fluuiialis lb. xvij.
Coque simul usq; ad consumptionem medietatis. Deinde adde,
Orizæ lb. j.
Medullę panis, in lacte mollitę n. j.
Butyri recentis lb. ij.
Album. ouorum cum cort. n. x.

Misceantur omnia, & coquantur: deinde distillentur, quousque omnis aqua
exierit: cui deniq; adde,

Caphurę, Aluminis Zuccharini ana parum. & erit optima.

Alia

A

Alia eiusdem ad idem.

℞. Aquæ vitæ ℥.ij.
 Aquæ ex flor. Fabarum, Aquæ Rosarum ana ℥.iiij.
 Aquæ Nymphææ ℥.vj.
 Mistis omnibus adijce tragacanthæ albissimæ ℥.j. Per sex dies insolatâ hanc
 aquam colabis linteo puro. Vfus eius est manè, ita ut non abstergatur.

DE AQUIS FACIEI MACVLAS
 tollentibus.

Aqua ad uerrucas, & alia tubercula faciei.

℞. Salis Ammoniaci, Vitrioli Romani, Viridis æris ana ℥.ij.
 Aluminis rubri ℥.j.
 Calcis uiuæ ℥.℞.
 Distillentur in alembico uitreo. Reijciatur primus liquor: secundus effica-
 cior erit, & seruetur usui. Rondeletius.

Alia ad rugas faciei.

℞. Decoctionis Brioniæ, Decoctionis Ficum ana partes æquales.
 Abluatur facies. Rondeletius.

Ad impetigines faciei.

B ℞. Aquæ Lapathi acuti ℥.iiij.
 Boracis ℥.iiij.
 Salis communis ℥.j.
 Aceti Scillitici ℥.j. Misce. Rondeletius.

Aqua ad prohibendas impetigines.

℞. Aceti albi optimi ℥.iiij.
 Succu Lapathi acuti, Succu Limonum ana ℥.iiij.
 Lithargyri auri ℔.j.
 Decoquantur leuiter, deinde distillentur, & ad usum seruetur. Rondeletius.

Aqua ad dealbandas faciei maculas.

℞. Aquæ vitæ optim. part. iij. Florum Anthos part. ij.
 Macerentur simul per diem & noctem: deinde distillentur. Rondeletius.

Aqua ad tollendum omnes molestias in facie.

Florem farinæ frumenti subigito cum sextario lactis caprini: inde panem
 in furno leniter coquito, & extrahito antequam nimium coctus sit. Huius
 panis medullam per minuta frusta diuisam aut friatam, & in alio recenti la-
 cte caprino infusam per sex horas relinquito. Admiscabis aquam in duo-
 decim albuminibus ouorum cum spongia factam: calcis de putaminibus
 ouorum ℥.j. caphuræ aluminis saccharini, coralli albi ana ℥.ij. Omnia trita
 cum liquidis incorporentur, & in alembico uitreo distillentur. Alexius.

Aquæ

744 DE AQVIS ORNANTIBVS FACIEM.

Aqua ad rugas faciei.

A

℞. Malum granatum n. j.

Ab interioribus munda & euacua: infunde serum lactis cum uino ana quantum sufficit, & coque donec uinum euauerit: & utere. Marinellus.

Aqua ad maculas faciei.

℞. Aquæ Rosarum, Succu Limonum ana ʒ. viij.

Sublimati ʒ. ij.

Albuminum ouorum n. iij.

Misce omnia diligenter: deinde pone ad solem per dies octo, & serua ad usum. Isabella Cortese.

Alia eiusdem.

℞. Lactis asinæ lb. iij.

Vini albi lb. j.

Medullæ panis recentis n. ij.

Ouorum cum corticibus n. xij.

Sacchari candidi ʒ. iij. Contusa distilla.

DE POTIONIBVS ORNANTIBVS CORPVS CAP. II.

B

Potio impinguans corpus.

℞. Farinæ Cicerum, item Fabarum, Hordei, Oryzæ ana part. j.

Farinæ Lentium part. β.

Farinæ Papaueris albi part. β.

Farinæ Frumenti part. j.

Farinæ Sefami part. j.

Sacchari duplum.

Coquantur in sufficienti quantitate lactis ouini: de quo sumat quotidie stomacho ieiuno poculū unum, superdormiēdo per horā dimidiā. Marinellus.

Alia eiusdem.

℞. Lactis lb. j.

Aquæ fontanæ lb. j.

Coquantur simul usq; ad consumptionem aquæ: deinde adde,

Sacchari Penidij ʒ. j.

Butyri recentis ʒ. j.

Olei amygd. dul. recent. ʒ. β.

Coquantur iterum bullitione una: & sumatur stomacho ieiuno, aliquandiu superdormiēdo.

Potio

A

Potio maciem inducens.

℞. Aristolochiæ rotundæ ʒ. j.
 Centaurij minoris ʒ. j.
 Gentianæ ʒ. iij.
 Polij, Petroseliniana ʒ. iij.

Trita sumantur cum uino albo, stomacho ieiuno. Marinellus.

DE BALNEIS MVNDANTI- BVS CORPVS CAPVT III.

Balneum mundans.

℞. Parietariæ, Maluæ cum rad. Acanthi, Violaria ana M. j.
 Hordei integri P. ij.
 Violarum, Chamomillæ ana P. iij.

Fiat decoctio in aqua pluuiæ, & in ea paretur balneum, quo ieiuno uentriculo lauetur. Deinde ubi sudauerit corpus in lecto, diligenter detergendū est. Rondeletius.

Balneum corporis sordes abstergens, ipsumq; uenustum reddens.

℞. Saluiæ, Flor. Lauendulæ, Flor. Rosarum ana M. ij.
 Salis parum.

B Coquantur in aqua, uel lixiuio, q. s. fiatq; lauacrum non nimis calidū, in quo totum corpus ante cibum horis duabus lauetur. Marinellus.

Aliud eiusdem, ad sordes.

℞. Aquæ Rosarum, Aceri, Salis ana quantum sufficit.
 Fiat decoctio cum aqua fontana: de qua
 ℞. Pocula duo.
 Furfuris quantum sufficit.

Misce, quo fricetur totū corpus: deinde mulier se abluat aqua calida, uel balneum aquæ dulcis ingrediatur.

Balneum ad cutis uitia pro biliosis.

℞. Hordei mundati P. iij.
 Althææ, Maluæ, Violaria ana M. iij.
 Betæ, Parietariæ, Buglossæ, Borriginis ana M. j.
 Sem. Cucurbitæ, item Citrulli, Melonum, Cucumeris, Lini, Fœnigræcia ana ʒ. ij.

Violarum, Rosarum, Flor. Nenupharis, Flor. Liliorum ana P. ij.
 Fiat decoctio in decoctione pedum & capitis arietis, & paretur balneū tepidum. Rondeletius.

Balneum ad cutis uitia, ualentius.

℞. Rad. Liliorum, item Serpentariæ, Brionia ana ʒ. j.

BBb

Borra

746 DE LIXIUIS ORNANTIBVS CAPILLOS.

Borraginis, Buglossæ, Eumariæ, Saponariæ ana M. ij. A
 Parietariæ, Adianti, Maluæ, Violaria ana M. j.
 Hordei integri, Fabarum excort. Orizæ ana ʒ. iij.
 Flor. Meliloti, item Chamomillæ, Anthos, Maluæ, Violarum ana P. ij.
 Rad. Ireos, Nitri ana quantum sufficit.
 Fiat decoctio pro balneo. Rondeletius.

Balneum odoriferum pro nobilioribus feminis.

ʒ. Rosarum, Cort. Mali citri, Flor. Mali citri, itē Mali arantij, Iasmini, Lau-
 ri: Rorismarini, Lauendulæ, Menthæ, Pulegij, Aquæ fontanæ ana q. f.
 Coquantur simul leuiter, pareturq; lauacrum, cui adde,
 Olei Spicæ G. vj.
 Moschi G. v.
 Ambræ G. iij.
 Asæ dulcis ʒ. j.

Ingrediatur femina horis duabus ante cibum. Marinellus.

DE LOTIONIBVS SEV LI-
 XIUIS ORNANTIBVS CAPILLOS CAP. IIII.

DE LIXIUIS CAPILLOS TINGENTIB. FLAVOS. B.

Lixiuum capillos pulchriores reddens.

Si uelis capillos pulchriores reddere, & redolentes, caput lixiuio, à Gale-
 no stillaritio nuncupato, abluito: cōfecto utiq; ex pauco nitis crematæ cine-
 re, nodorū palæ hordei, & glycyrrhizæ, mali terræ, seu cyclamini, dumq; ca-
 put pectitur, capillis caryophyllorū puluerē superaspargito, rosarum, nucis
 moschatae, cardamomi & galangæ cum rosacea, pectine etiā in eisdē madesa-
 cto. Redduntur & pulchri, glandium fagi decocto sæpius loti. Fumanellus.

Aliud flauos reddens capillos.

ʒ. Rubiæ tinctorum, Stæchadis citrinæ, Polytrichij, Absinthij, Lupino-
 rum ana q. f.
 Ponantur in aqua, uel lixiuio, in uase uitreo per nouē dies, mouēdo singulo
 die bis: & infundatur spongia in ea, cū qua lauētur capilli: & post exiccatio-
 nem lauentur cum aqua calidā & sapone. Bayrus.

Lixiuum capillos aureo colore tingens.

ʒ. Palarū Hordei, Cort. Glycyrrhizæ, Rasuræ Buxi, Fol. Buxi, Croci, Cu-
 mini ana q. f.

Lixiuij ē sarmentitio cinere quantum sufficit.
 Coquantur omnia bene, & fiat lixiuium: quo si sæpius capilli lauentur, ma-
 ximē flauescunt, auriq; colorem imitabuntur. Alexius.

Lixiuum

A

Lixiuum capillos flauos reddens.

℞. Lixiuij sarmentorum, q. s. ad lauandum semel capillos.
 Flor. Tapfi barbati, Flor. Stœchados, Rad. Chelidonię ana P. j.
 Coquantur simul. Ex hac decoctione caput prius lotum lixiuio cõmuni, &
 siccatur rursus lauetur, & sensim siccetur linteis calidis. Italicę mulieres bul-
 liunt in lixiuio communi flores stœchados contusos, & rasuram sandali citri-
 ni. Rondeletius.

Aliud ad idem.

℞. Buxi rasi, Stœchadis, Cort. Mali citri, Glycyrrhizę tritę, Rad. Vngulę
 caballinę, Capillorum Veneris ana q. s. Croci parum.
 Coquantur in aqua usq; ad consumptionem tertię partis, coletur: quo caput
 lauetur, & pecten inungatur. Marinellus.

Aliud eiusdem.

℞. Palarum Hordei quantum sufficit.
 Flor. Myrti ʒ. iij.
 Buxi rasi, Croci, Cumini, Alcannę ana ʒ. iij.
 Coquantur in lixiuio sarmentorum: quo caput lauetur.

Aliud eiusdem.

B

℞. Lupinorum ʒ. j. β.
 Myrrhę ʒ. j.
 Staphidis agrię, Tartari albi ana ʒ. β.
 Coquantur in lixiuio: quo capilli tingantur.

Aliud ad idem.

℞. Staminis Auenę, Rad. Chelidonię, Agrimonię, Rasurę Buxi, Cinerum
 Vitium, Cinerum Auenę ana q. s.
 Cum aqua calida fiat lixiuium: quo caput lauetur. Trotula.

Lixiuum capillos colore afficiens croceo.

Lixiuium, in quo modicum rhabarbari dissolutum fuerit, capillos croceo
 tingit colore. Fumanellus.

Aliud capillos flauos reddens.

Fuluos reddunt capillos, lupini crudi, cum aqua & nitro illiti. Galenus.

Aliud ad idem.

℞. Lupinorum tritorum ʒ. x.
 Myrrhę ʒ. v.
 Sal Nitri ʒ. iij.
 Tartari albi usti ʒ. iij.
 Lixiuij sarmentorum uitium q. l.
 Misce, & fiat lixiuium: quo capilli ad solem lauentur cum spongia uel pecti-
 ne. Marinellus.

BBb 2 Aliud

748 DE LIXIVIIS ORNANTIBVS CAPILLOS.

Aliud ad idem.

℞. Cort. Berberorum ʒ.β.

Rad. Glycyrrhizæ ʒ.ij.β.

Ceterach, Polypodij ana M.j.

Fiat decoctio in aqua uel lixiuio: coletur Ad ℥b.j. adde,

Mellis communis ʒ.j.

Aque Serpentariæ. Aquæ Ari ana ʒ.β.

Misce: & cum spongia uel pectine capillos tinge, ad solem. Rondeletius.

Aliud eiusdem ad idem.

℞. Tartari calcinæi ʒ. j.

Rad. Alcannæ ʒ.ij.

Rad. Raphani ʒ. iij.

Pistentur optimè, & bulliant: fricentur capilli, cum ibit cubitum. Manè autè lauetur lixiuio sarmentorum.

Aliud ad flauos crines reddendos.

℞. Lixiuij de cinere hederæ, ligni decorticati. Lauetur sæpe caput, & euenient flauis Rondeletius.

Lixiuium ad reddendos pilos ruffos & crissos.

Bononiæ lauantur in lixiuio sarmentorum, in quo sunt rasuræ buxi, & corticis citri maceratæ. In Italia quoq; aiunt radicem gentianæ idem præstare. B Rondeletius.

Lixiuium capillos flauos, lucidos & longos reddēs, memoriāq; iuuans.

℞. Lixiuij communis tantum, quantum decies eo caput lauari possit.

Cort. Arantiorum dulcium n.vj.

Cort. Mali citri, quantum uoles.

Flor. Chamomillæ, Foliorum Lauri ana M.j.

Capill. Veneris M.j.

Agrimonie M.β.

Palarum hordei incisarum M. iij.

Lupinorum aridorum M.j.

Fœnigræci M.ij.

Tartari usti ℥b.β.

Flor. Spartij M.v.

Misceantur, ponanturq; in uas aliquod magnum, & seruetur ad usum. Quū hoc uti uoles, sumito parum ex uase, atque in alio uase calefacito: addeq;ue, si lubet, aliquantulum myrrhæ, & cinnamomi: & sic erit optimum, Alexius.

Lotio capillorum.

℞. Aluminis sæcum ʒ. viij.

Centaurie ℥b. j.

Gummi Arabici ʒ. iij.

Amyli

- A** Amyli ℥. iij.
Saponis albi ℥. j.
Aquæ fluuiialis ℔. j.

Misceantur, & coquantur usque ad consumptionem quartæ partis. Postquæ caput lixiuio fuerit lotum, hac aqua cum spongia ad solem tinguntur. Marinellus.

Lixiuum capillos flauos reddens.

- ℞. Flor. Verbasci M. j.
Fœnigræci ℥. ij.
Cineris Vitium M. j.
Cineris ligni Hederæ M. j.
Aquæ pluuiæ ℔. x.
Coquantur simul usq; ad dimidiæ partis cõsumptionem: coletur, addaturq;
Smegmatis albisimi ℔. iij.
Crocij ℥. ij.
Misceantur, & ponantur ad solem, per mensem unum. quo tingantur capilli ad solem cum spongia uel pectine, &c. Marinellus.

Aliud ad idem.

- ℞. Lixiuij, ex cineribus ligni hederæ facti q. f.
Flor. Tapfi barbati, Flor. Perforatæ, Fœnigræci ana q. f.
Coquantur, & fiat lixiuium, quo capilli lauentur. Marinellus.

Aliud eiusdem.

- ℞. Lixiuij sarmentorum uitium, Flor. Verbasci, Flor. Stœchados, Rafuræ ligni Rusci, Rad. Chelidonæ ana quantum sufficit.
Coquantur: quo capilli lauentur.

Lixiuum capillos aureos reddens.

Stipites & radices caulium puluerizentur, & cum eis admisceatur rasura buxi uel eboris puluerizata: & ex istis pulueribus fiat lixiuium, quod facit capillos aureos. Trotula.

Aliud ad idem.

- ℞. Lixiuij ex cineribus uitium q. f.
Crocij, Saponis albi ana quantum sufficit. Misce. Marinellus.

Aliud eiusdem.

- ℞. Lixiuij sarment. uitium, Pulegij ana q. f.
Misce, & coquantur: quo capilli lauentur.

Aliud ad idem.

- ℞. Lixiuij ex cineribus caulium facti quantum sufficit.
Agrimonæ, Rad. Salicis ana q. f.
Aloës parum.

BBb 3

Coquantur

750 DE LIXIVIIS ORNANTIBVS CAPILLOS.

Coquantur simul: deinde adde,

Croci, Rhabarbari triti ana parum.

Misce, & fiat lixiuium, quo caput uesperis lauetur, pannoq; linteo calido inuoluatur: & manè flauis conspiciuntur. Marinellus.

A

DE LIXIVIIS TINGENTIBVS CAPILLOS NIGROS.

Lixiuum capillos denigrans.

℞. Succo cort. Nucis iuglandis ℥. iij.

Lithargyri triti ℥. j.

Omnibus cum lixiuio mixtis, capillos abluo. Fumanellus.

Lixiuum capillos nigro colore tingens.

℞. Corticum Ficus, Gallarum, Elates, Rubi, Cupressi ana q. f.

Misceantur, & fiat lixiuuium, quo capilli lauentur. lo. Bap. Porta.

Aliud ad idem.

℞. Foliorum Ficus, Fol. Vitis nigræ, Fol. Mori ana ℥. j.

Aquæ pluuiæ quantum sufficit.

Macerentur per diem unum, deinde coquantur: quo capilli lauentur. Marinellus.

Lixiuum capillos nigros reddens.

B

℞. Lixiuij communis quantum sufficit.

Foliorum Betæ M. j.

Saluiæ M. iij. uel iij.

Myrrhæ, Foliorum Lauri, Cort. Nucum uiridium ana q. f.

Misceantur, & coquantur, quo lauetur caput: deinde in fine abluatur facies & collum lixiuio simplici. Alexius.

Aliud ad idem.

℞. Baccarum Myrti, Sumach, Saluiæ, Nucum cupressi, Myrobal. Citrinarum, Chebularum, Lixiuij communis ana q. f.

Coquantur omnia simul usque ad consumptionem tertiæ partis, fiatq; lixiuuium, quo caput lauetur. Marinellus.

Aliud.

℞. Myrobal. Indarum, Gallarum, Nucum cupressi, Balauftiorum, Baccarum Myrti ana ℥. j.

Aluminis Rochæ ℥. β.

Salis Gemmæ ℥. j.

Trita coquantur in aqua, qua capilli lauentur. Marinellus.

Lixiuum capillos denigrans.

℞. Lixiuij communis quantum sufficit.

Lithargyri

A Lithargyri auri lb. j.

Coquantur aliquandiu simul: deinde ab igne remoueantur, addaturq̄;

Olei Tartari ℥. β.

Misce, & capillos inunge. Isabella Cortese.

Aliud.

℞ Lixiuij communis part. ij.

Cineris Cerri, Sal Nitri ana part. j.

Misce, quo capilli lauentur. Isabella Cortese.

Aliud capillos & barbam nigro colore tingens.

℞ Argenti spumæ, Aeris combusti ana part. j.

Lixiuij fortissimi part. iiij.

Coquatur leuibus prunis, dumq̄ in bullas erumpit, lauabis, & reficcatos ca-
lida perlues aqua. Io. Baptista Porta.

Aliud.

Accipiatur aqua capitelli, in qua ponatur acus quatuor ferreæ, donec eli-
quentur, & auripigmentum tritum: & cum penna abluatur pecten cum di-
cta aqua, & pectantur capilli ad ignem, uel solem: ita tamen, ut cutis non tan-
gatur. Fumanellus.

DE LIXIUIIS TINGENTIBVS CA

B. pillos rubros.

Lixiuium capillos rubros reddens.

℞ Lupinorum tritorum ℥. x.

Myrrhæ ℥. β.

Florum Salicis ℥. iiij.

Tartari usti ℥. iiij.

Trita ponantur in lixiuio, coquanturq̄; usque ad spissitudinem: quo tingan-
tur capilli. Marinellus.

Aliud.

℞ Sumach ℥. ij.

Gallarum ℥. iiij.

Rubiæ ℥. ij.

Capill. Veneris ℥. j.

Absinthij ℥. j.

Lupinorum excortic. M. ij.

Aquæ lb. x.

Macerentur per aliquot dies: quo capilli lauentur. Marinellus.

DE LIXIUIIS TINGENTIB. CAPILLOS ALBOS.

Lotio.

℞ Centaurij maioris ℥. iiij.

Alumina

752 DE LIXIVIIS ORNANTIBVS CAPILLOS.

Aluminis Fæcis ℥. viij.

Aluminis Rochæ, Gummi Arabici ana ℥. ij.

Saponis albi mundi, Lachrymæ ex Tragacantha ana ℥. iiij.

Aquæ claræ ℥. vj.

Coquantur ad dimidias, & colentur: caputq; hac lotum colatura, ad solemq; siccatum, denuò abluatur lixiuio. Fumanellus.

Aliud.

℞. Cineris uitis ℔. j.

Aquæ ℔. vj. Confice lixiuio. Fumanellus.

DE LIXIVIIS PROLONGANTIBVS
capillos.

Lotio capillos longos reddens.

℞. Agrimonix, Cort. Vlmi, Verbenacæ, Aquæ pluuiæ ana quantum sufficit. Misceantur, & coquantur usq; ad consumptionem tertie partis: quo singulis septimanis semel lauentur capilli. Marinellus.

Alia ad idem.

℞. Corticum Salicis, Absinthij, Abrotani, Rosarum siccarum, Aquæ ana quantum sufficit.

Misceantur, & macerentur per integrum diem Veneris. die sabbati coquantur usque ad tertie partis consumptionem, & capilli lauentur. Marinellus.

Alia eiusdem, ad idem.

℞. Seri lactis caprini quantum sufficit.

Cineris Cannæ, Sem. Lini ana q. s.

Coquantur simul: coletur & fiat lotio, qua lauentur capilli.

Alia.

℞. Capillorum Veneris, Myrobal. Emblicorum, Acetose ana q. s.

Coquantur in aqua: colaturæ adde myrrhæ q. s. fiatq; lotio, qua lauentur capilli. Marinellus.

DE LIXIVIIS AVGENTIB. CAPILLOS.

Lixiuio capillos augens.

℞. Agrimonix, Cort. Vlmi, Rad. Salicis, Abrotani, Altheæ, Pilularum Populi albæ, Cinerum stipitum caulium, Aquæ ana q. s. Fiat lixiuio, quo capilli lauentur. Fumanellus.

Aliud eiusdem.

℞. Branchæ ursinæ, Lixiuio communis ana q. s.

Coquantur: quo capilli lauentur.

Aliud ad capillos spissandos.

℞. Agrimonix, Corticum Vlmi, Rad. Verbenæ, Rad. Salicis, Abrotani, Sem.

A

B

A Sem. Lini usti, Radicum Cannæ ana quantum sufficit.
Misceantur omnia, & coquantur in lacte caprino uel aqua: & capilli lauentur. Alexius.

Lotio pilos augens.

℞. Polytrichi ꝑ. iij.
Ladani, Myrti, Cucurbitæ ustæ ana ꝑ. j.
Aquæ lb. x.

Trita macereatur per dies uiginti, singulis diebus miscendo: deinde coquantur usque ad tertiæ partis consumptionem, fiatq; lixiuium, quo caput lauentur. Marinellus.

Alia eiusdem.

℞. Vini albi quantum sufficit.
Cineris Capill. Veneris ustorum, satis bonam quantitatem.
Coquantur simul, quo capilli lauentur.

DE LIXIUIIS PROHIBENTIBUS
capillos.*Lotio capillos crescere non permittens.*

Tithymalli decoctum, cum aceto, calce uiua, & maluis commixtum. Fumanellus.

DE LIXIUIIS CAPILLOS CRISPOS
reddentibus.*Lotio capillos crispes reddens.*

Radices Althææ, in aqua decoctæ percolentur, premanturq;: & decocto addantur,

Seminis Lini, Sem. Psyllij ana q. s.
& ex eorum colatura, post exactam commixtionem & compressionem, capilli abluantur. Fumanellus.

Alia eiusdem.

℞. Farinæ Foenigræci, Hyosciami, Lithargyri auri ana part. æquales.
Ponantur in lixiuio, quo capilli abluantur.

Alia ad idem.

℞. Rad. Filicis, Fol. Betæ.
Coquantur simul usque ad consumptionem tertiæ partis: auferatur ab igne, addaturque,

Gummi Arabici quantum sufficit.
Misce, & fiat lotio, qua capilli lauentur: qui resiccati oleo myrtino tingantur. Marinellus.

DE OLEIS ORNANTIBVS. A
FACIEM CAP. V.

DE OLEIS FACIEM ILLUSTRANTIBVS.

Oleum faciem exornans, pustulasq; nigras delens.

Sumito tartarum ex uino albo in frustra redactum, panno lineo, aceto potenti madente inuolurum, aut folijs caulium, stuppaq; sub cineribus calidis detentum, donec in exactum puluerem redigi ualeat: quem in fictili uase, ac decliui, diebus quatuor, quinque soli expones, & oleo quod stillabit, faciem aqua calida & sapone lotam, deinde aqua ex furfurib; & exiccata linies. Fumanellus.

Aliud Venetis meretricibus consuetum.

℞. Tartari usti ℥. β.

Puluerizetur, & reficca, ut fit de sale. Tunc accipe sal illud, & pone intra albumina ouorum decocta. Rondeletius.

Oleum faciem illustrans & dealbans.

℞. Vitellorum ouorum, ad duritiem coctorum n. xij.

Olei lentissimi poculum dimidium. Terebinthinæ lotæ duplum. Misceantur, & coquantur aliquan diu simul: deinde sub prælo exprimatur. Oleum, quo facies inungatur uesperi. Marinellus.

Oleum ad faciei ruborem diluendum.

℞. Nucleorum persicorum ℥. iiij.

Sem. Cucurbitarum ℥. ij.

Contundantur, & fiat oleū, quo inungatur facies, mane & uesperi. Alexius.

DE OLEIS FACIEM TINGENTIBVS.

Oleum faciem colorans.

℞. Olei communis, Florum Rorismarini ana part. j.

Misceantur, ponanturq; in phialam uitream sub sino equino per tres septimanas, uel per mensem: deinde coletur: ad solem per aliquot dies ponatur, & utere. Marinellus.

DE OLEIS RUGAS FACIEI

tollentibus.

Oleum de sesamo, & decoctio granorum eius, rugas distendunt, & molliunt, & solidant. Oleum etiam de glande est optimum. Bayrus.

Oleum ad faciei rugas.

Oleum tartari faciei rugas tollit: item oleum amygdalarum amararum: & oleum liliorum. Marinellus.

DE O.

A DE OLEIS FACIEI MACULAS
delentibus.*Oleum cicatrices delens.*

Oleum dactylorum delendis uestigijs cicatricum conducit. Rondelet.

Oleum ad faciei pustulas.

Nuces iuglandes contere, & decoque, donec ex ipsis oleum aquæ supernat: quo & utere. Fumanellus.

Oleum ad faciei maculas.

℞. Florum Rorismarini quantum sufficit.

In uitreo uase recondito sub fimo, à pluuia tuto, diebus triginta seruetur: quodq; liquatum erit, soli diebus nouem exponatur, puluere polypodij cōmixto, quantum tribus digitis capi potest: de quo singulo die per mēsem sumatur. Fumanellus.

Oleum ad impetiginem faciei.

℞. Lacertam uiridem uiuam, coque in uino & oleo usque ad consumptionem uini: deinde cola, & utere. Bayrus.

OLEVM Mezerei, oleum Fraxini, oleum Ouorum, omnes maculas, lentigines faciei tollunt. Marinellus.

B DE OLEIS CONSERVANTIBVS ET
augentibus capillos.*Oleum capillos conseruans, augensq;.*

Colocynthidem, abiectis quæ intus sunt, oleo laurino impleto, additisq; hyoscyami semine, & auripigmento, capillos illinito Fumanellus.

Oleum capillos augens.

℞. Sem. Bismalæ quantum sufficit.

Coquantur in oleo communi, quo capilli inungantur. Marinellus.

Aliud ad idem.

Augeat quoq; capillos oleum ex lumbricis terrestribus. Fumanellus.

Aliud ad idem.

℞. Omphacij ℥. vj.

Olei Lentiscini ℥. ij.

Olei Myrtini, Olei Ladani ana ℥. j.

Capillorum Veneris ℥. iij.

Coquantur usque ad consumptionem omphacij, & oleo inungantur capilli. Marinellus.

Aliud ad idem.

℞. Colocynthidem ab interioribus mundatam: in cuius cauitate impone olei lentiscini, quantum capere potest, croci parum: coquantur simul, usque

CCC 2 ad ter-

ad tertiæ partis consumptionem: & utere Marinellus.

A

DE OLEIS CAPILLOS TINGENTIBVS.

Oleum capillos denigrans.

Capillos denigrat oleum ex lacertis uiridibus confectum. Fumanellus.

Aliud ad idem.

℞. Alcannæ, Vitrioli, Olei communis ana q. s.
Ponantur ad ignem, donec bullire incipiat, deinde seruetur pro capillis in-
gendis. Marinellus.

Aliud eiusdem ad idem.

℞. Succu ex cort. salicis, Olei communis, uel Olei de costo ana quantum
sufficit.

Misce, & inunge capillos.

Oleum capillos denigrans.

℞. Nucum uiridium n. c.

Olei communis sextarium j.

Aluminis liquidi ℥b. iij.

Hæc simul in uas nouum testaceum præmadefactū in dito, id ipsumq; quàm
diligentissimè oblitum in loco neque humecto nimium, neque calido repo-
nito, & per menses tres sub terra situm finito, deinde auferto, oleoq; utitor. B
Galenus.

Alia ad idem.

℞. Succu Papaueris rubri, Succu Nucum uiridium, Olei Myrtini, Olei de
Costo ana part. j.

Coquantur aliquandiu, & oleo capilli inungantur. Marinellus.

Aliud eiusdem ad idem.

℞. Myrobal. Emblicarum ʒ. j.

Acaciæ ʒ. x.

Gallarum, Capitulum Glandiū, Baccarū Myrti, Sumach ana ʒ. x.

Olei Omphacini, Olei Amygdal. dul. ana ʒ. x.

Ladani ʒ. iij.

Aceti parum.

Misce, & coque usque ad aceti consumptionem: serua, & utere. Marinellus.

Aliud ad idem.

Si colocynthis, extractis seminibus impleatur oleo (alij laurino) & semi-
ne hyosciami nigri integro, & dimittatur sic per diem & noctem in loco cali-
do, & ex oleo inungantur capilli, denigrat eos, tardando canitiem. Bayrus.

Oleum capillos flauos reddens.

℞. Myrrhæ electæ, Radic. maioris Rubiæ, Radic. Chelidonij ana partes
æquales.

Omnia

A Omnia trita in oleo coquantur, in quo prius bullierint buxi scobes, ramentate & crocus. Hoc autem capilli inungantur, loti sæpius lixiuio, è spiritibus fabarum confecto, atq; hordei. Fumanellus.

Oleum capillos flauos, longos, splendidos ut aurum reddens.

℞. Olei Sefamini mens. j.
Florum Spartij incis. ℥. iij.
Sem. Liliorum alborum ℥. j.
Curcumæ ʒ. ij.
Crocij ʒ. β.

Cinnamomi, Belzoini, Moschi, Zibetti ana parum.

Misceantur omnia, & ponantur in phialam aliquam uitream ad solem, per æstatem integram. Hoc oleo pecten inungendum est: mox capilli ad solem pectendi, aut caput pexum calfacto uelo tegendum, ita ut ne uelo caput prematur, sed leniter tegatur. Alexius.

Oleum tingens capillos rubros.

℞. Tartari usti, Olei Malticis, Resinæ Pini ana q. s.
Misce: & unge hoc oleo capillos. Marinellus.

DE OLEIS CAPILLOS LONGOS REDDENTIB.

Oleum capillos elongans.

B ℞. Lacertas uirides tres.
Olei Myrtini quantum sufficit.

Coquatur simul, donec dissoluatur caro, & inungatur pectē, &c. Marinellus.

Alia eiusdem, ad idem.

℞. Myrobal. Emblicarum quantum sufficit.
Macerentur in oleo sesamino, donec intumescant: deinde coquantur simul per quartam horæ partem.

Oleum præseruans itinerantes à frigore.

Unguntur extremitates ex oleo de euphorbio calido, fricatis prius extremitatibus: & oleo de pyrethro, & oleo de piperibus. Bayrus.

DE VNGVENTIS CAPILLOS

DE FLVOS CONSERVANTIBVS. CAP. VI.

Vnguentum capillos conseruans, augensq;.

℞. Ladani in uino austero macerati, & triti q. s.
Olei Myrtini quantum sufficit.
Misce, & fiat unguentum, quo pilos ante balneum subline. Crito.

Aliud eiusdem.

℞. Ladani part. ij. Adianti part. j.
Olei Myrtini, Vini ana quantum sufficit. Fiat unguentum.

CCC 3

Aliud

Aliud ad idem.

A

℞. Baccarum Myrti, Ladani ana ℥. iij.
 Cum decocto acaciæ ad spissitudinem coque: deinde adde,
 Olei Nardini, uel Myrtini q. s.
 Fiat unguentum. Galenus ex Critone.

Aliud capillos conseruans, ipsosq; subnigros reddens.

℞. Baccarum Myrti sextarium j.
 Sem. Apij sextarium j.
 Sem. Betæ sextarium j.
 Virgultorum Myrti sextar. j.
 Adianti sextar. ℞.
 Ladani sextar. ℞.
 Vini nigri sextar. vj.
 Coquito usquequò penitus dissoluatur: atq; ubi tertia pars superfuerit, addito olei myrtini sextar. iij. rursusq; coquito ad spissitudinem. Crito.

Vnguentum capillos conseruans.

℞. Passi Cretici sextar. j.
 Ladani ℥. j.
 Corticis Nucum pinearum usti, sextantem.
 Polytrichi usti ℥. j.
 Adipis ursini ℔. j.
 Succi Betæ cyathos iij.
 Ladanum & passum, donec cogantur in unam compagem, coquito: deinde reliqua inijcito, & sublata in uas plumbeum seruato. Galenus ex Critone.

B

Aliud defluos conseruans, eiusdem.

℞. Seminis Apij sextantem.
 Callitrichi, sextantem.
 Thuris, sextantem.
 Nuces iuglandes n. xv.
 Ladani sextantem.
 Cort. Nucis pineæ ℔. j.
 Omnia in nouam ollam coniecta, & cū argilla probè obturata, in balnei fornace assato: deinde extracta terito, & adde,
 Adipis ursini ℔. j.
 Subigito, & in pyxi de ilicea aut cyprina reponito. Vsu uerò expetente, quantum satis uidebitur ex pharmaco accipito, ac quocūq; uelis odorato unguine conquassato, ex eoq; caput bis in die illinito.

Vnguentum ad capillos defluentes.

℞. Brassicæ aridæ quantum sufficit.

Tere,

A Tere, atq; cum aqua in formam unguenti redige, & impone. Cleopatra.

Aliud.

Ladanum in uino austero rigatum terito, & oleo myrteo ac uino uicissim affuso ad mellis spissitudinem redigito, ex eoq; ante & post balneum caput illinito. Galenus.

Aliud ad idem.

℞ Omphacij, uel Vini immaturi ℥. j. β.

Ladani ℥. j.

Cort. Pinearum uft. ℥. ij.

Adianti ufti ℥. ii. j.

Adipis ursini uel anatis ℥. iii. j.

Succi Solati ℥. β.

Vinū & ladanū simul coquatur, deinde reliqua addatur, & seruetur. Marinell.

Aliud eiusdem, ad idem.

℞ Ladani, Adianti, Olei Myrtini ana ℥. j. Rutæ ℥. ij.

Vini ueteris quantum sufficit.

Misceantur & contendantur: deinde addatur.

Pinguedinis ursinæ quantum sufficit. & fiat unguentum.

Vnguentum Archigenis ad capillos defluos.

B ℞ Ladani, Absinthij ana part. æquales.

Baccarum Iuniperi n. x.

Olei quantum sufficit.

Misce, contunde, atq; in unguenti formam redige. Galenus.

Aliud Archigenis, ad idem.

℞ Adianti nigri, Myrti nigre ana part. æquales. Gallarum duplum.

Cū oleo lentiscino uel myrtino ad mellis crassitudinē redige, & utere. Gale.

Aliud eiusdem, ad idem.

℞ Thuris, Myfi, Gallarum, Adianti ana part. æquales.

Cū uino ad mellis spissitudinē in sole terendo redige. Aut molliter cocta donec nigrescat, deindeq; cū oleo lentiscino uel myrteo mista in usum adhibe.

Vnguentum ad capillos defluos.

℞ Absinthij, Cort. Pinearum, Fol. Myrti, Adianti ana q. s.

In cinerem comburantur: quibus adde,

Ladani triti, Myrtæ ana part. æquales.

Olei ex sem. Raphani, Vini ueteris ana quantum sufficit. Fiat unguentum. Marinellus.

Aliud eiusdem.

℞ Ladani in uino macerati & triti, Olei Myrtini ana part. j.

Misce, & fiat unguentum.

Aliud

760 DE VNGVENTIS ORNANTIB. CAPILLOS.

Aliud eiusdem, ad idem.

A

℞. Acaciæ ʒ. iij.

Ladani ʒ. ii.

Olei Myrtini ʒ. β. Vini ʒ. β. Misce, & fiat unguentum.

Aliud eiusdem, ad idem.

℞. Gallarum, Myrabol. Indarum, Fol. Myrti ana part. æquales.

Coquantur in uino, colétur, colatura iterum ad spissitudinem coquatur: deinde addatur,

Ladani, Masticis ana ʒ. j.

Olei Omphacini ℥. j.

Aquæ ℥. j. Iterum coquantur ad crassitiem.

Aliud.

℞. Ladani ʒ. iij.

Gallarum ʒ. j.

Myrrhæ, Masticis, Thuris ana ʒ. j.

Cardui syluestris ʒ. ij.

Dissoluantur omnia in oleo rosato: & utere. Marinellus.

Aliud eiusdem, ad idem.

℞. Succo fol. Myrti, Succo Oliuarum syluestrium ana ʒ. ij.

Rosarum siccarum ʒ. β.

Abinthij Romani ʒ. ij.

Aceti ℥. β.

Coquantur simul usque ad dimidij consumptionem: colétur, addanturq̄,

Ladani ʒ. ij.

Quibus omnibus bene contusis, adde,

Olei Myrtini, Omphacij ana q. f. ad mellis crassitudinem.

Adianti triti ʒ. iij.

Galliæ moschatæ ʒ. j. uel ʒ. ij. Fiat unguentum.

Aliud.

℞. Baccarum Myrti, Cort. Arundinum ust. ana ʒ. β.

Cort. Pinearum ust. ʒ. β.

Fol. Myrti, Abinthij ana ʒ. ij.

Trita misceantur cum oleo myrtino ad unguenti formam. Marinellus.

Aliud ad idem.

℞. Capill. Veneris ustorum, Fol. Myrti ustorum, Cort. Pini ust. ana q. f. seu part. æquales.

Thuris tantundem

Ladani tantundem.

Trita misceantur cum oleo ex sem. raphani, & uino, ad formam unguenti.

Marinellus.

DE

ANTIDOTARII LIB. III.
DE VNGVENTIS CAPILLOS
restituentibus.

761

A

Vnguentum capillos generans, Cleopatrae.

Arundinum tenellarum radices ubi contuderis, succum exprimito, muscasq; ubi siccaueris, in pulcicula misceto: simulq; ursinum adipem, atque oleum cedrinum, ubi in unum triueris, atq; unà miscueris, ad illinendum exhibeto. Quo uerò odorem obtundas, uinum aut passum affundito. Galenus.

Aliud capillos generans, Cleopatrae.

Lini semen siccum, unà cum lini stipula exurito, tritumq; cum oleo sesamino illinito. Galenus.

Aliud ad idem.

Apes crematas, cum melleq; cōmixtas, capillis superponito. Fumanellus.

Aliud ad pilorum regenerationem.

℞. Olei Iuniperini, Olei Nucum ana ʒ.ij.

Mellis albi, Succu Lapathi ana ʒ.β.

Sem. Apij triti, Afari triti ana ʒ.ij.

Incorporentur simul, & un gatur locus. Rondeletius.

Vnguentum ad pilorum generationem.

B Alcyonium, quod asperius est, ustum, ac cum oleo tritum ac læuigatum, loco illinito. Sit autem oleum maximè ex lucernis acceptum. Galenus.

Aliud ad idem.

Erinaceorum marinorum testas exustas, & adipe ursino subactas locis præfrictis impone. Crito.

Aliud eiusdem.

Arundinis radices uistas adipe ursino excipe, atque impone.

Aliud Orestini, ad alopecias inueteratas.

℞. Muscerdæ ʒ.ij.

Thuris ʒ.ij.

Aceto acerrimo dissoluta præfrictis locis illine. Galenus.

Aliud eiusdem.

℞. Erinaceorum marinorum, unà cum testis exustorum ʒ.ij.

Gallarum immaturarum ʒ.ij.

Amygdalarum amararum ustrarum ʒ.ij.

Muscerdæ ʒ.ij.

Aceto dissoluta, & probè trita imponito.

Aliud pilos generans, Orestini.

℞. Pilorum Ursi ustorum, Adianti usti, Rad. Arundinis ustrarum, Fol. Fisci ustorum, Panniculi Cilicij usti ana partes æquales.

DDd

Adipe

Adipe urfino & cedria excipe. Galenus.

A

Aliud Orthonis Siculi, ad idem.

℞. Cineris Ranarum minimarum, in olla ustarum, part. j.
Muscerdæ, Veratri albi, Rad. Arūdinis ustarū, Piperis albi ana equal. port.
Aceto excipe, & ad præfrictum, ac prærafum locum utere. Galenus.

Aliud ad idem.

℞. Cineris unguularum caprarum ustarum, Succu Thapsiæ, Alcyonij, Muscerdæ, Spumæ Nitri, Myrrhæ, Piperis albi, Zingiberis ana part. æqual.
Probè tritis felle caprino excipe. Galenus.

Aliud ad idem.

℞. Succu fol. Salicis, Succu fol. Myrti ana ʒ. β.
Ladani ʒ. j.
Olei Myrtini, quantum ad conficiendum unguentum satis est.
Misce, & utere. Marinellus.

Aliud eiusdem, ad idem.

℞. Apum ustarum, Adianti usti, Olei Rosati ana quantum sufficit.
Fiat unguentum.

Vnguentum pilos elephantorum ubiq. renascere faciens.

℞. Cineris Talpæ, item Vesparum, Gallinarum ana ʒ. ij.
Ladani ʒ. j. β. Olei Irini ʒ. ij.
Ceræ modicum. Fiat linimentum. Rondeletius.

B

Vnguentum pilos generans:

℞. Corticum Arundinis ʒ. β.
Spumæ Nitri ʒ. β.
Piceliquida exceptis utere. Cæterum locum assiduè radere, & cum linteolo cōfricare oportet: sic enim ̄. celerrimè pilos producet. Galen. ex Cleopatra.

Aliud.

℞. Murium domesticorum ustorum part. j.
Panniculi ampelini (aliàs linei) usti part. j.
Cort. Arundinis part. j.
Hęc omnia arida læuigentur, & sufficienti melle admisto ad crassitudinem mellis redigantur, indeque adeps & medulla liquefacta addantur, & in æream pyxidem reponatur: & ex eo alopecia, donec capillos producat, defricetur. Galenus.

Aliud ad idem.

℞. Papaueris rubri, Fol. Myrti, Capill. Veneris, Lauendulæ, Cyperi, Semi. Apij, Myrobal. Emblicarum, Nucum cypressi ana ʒ. j.
Aquæ lb. ij.

Coquantur

A Coquatur omnia usq; ad cōsumptionē duarū librarū: colezur: colaturę adde,
Olei Myrtini ℥.j.

Iterum coctis ad consumptionem aquę, adde

Cort. Pinearum, Ladani ana ℥.j.

Misce, & fiat unguentum. Marinellus.

Aliud ad idem.

Erinacei terrestris caput aut corium ustum, tritum, ac melle subactum il-
linito. Galenus.

Aliud eiusdem.

Hippocampum marinum, & nitri parum coëxure, adipeque anserino ad-
misto, loco nitro preparato illine.

Aliud eiusdem.

℞. Calami Cyprij quantum sufficit.

Folia in olla exurito, deinde resina pinus cineris plurimum excipito, & præ-
scarificatę alopecię imponito, ac obligato.

Aliud Sorani, ad idem.

℞. Adipis Vrsini, Cineris fol. Arūdinis ust. Squamę Stomomatis ana par. j.
Aceti, Olei ueteris ana q. s. Fiat unguentum. Galenus.

Aliud eiusdem.

B ℞. Cineris Arundinis usti, Pilorum Vrsi, Adianti, Adipis Vrsini, Picis li-
quidę, Pilorum Caprarum ust. Cedrię ana part. æqual.

Liquida cum aridis committe: quę præfrictis adhibe.

Vnguentum ad alopeciam.

℞. Fol. Arundinis Gręcę ustorum ℥.β.

Muscerdę ℥.ij. Erinaceorum ustorum ℥.j.

Cum aceto trita illine. Galenus.

Vnguentum ad caluitiem.

℞. Adipis Taurinę insolatę ℥.j.

Adarces ℥.j.

Succi Thapsiæ ℥.j.β.

Myrrhæ ℥.j.

Polytrichi ℥.β.

Callitrichi ℥.β.

Membri Asinini ℥.j.

Splenis Asini ℥.j.

Ladani ℥.j.

Ladanum in uino pauxillo macerato, adipem uerò aquę uapore liquefaci-
to: asini mēbrum assatum, donec insumatur, radito: splenē uerò cum callitri-
cho & polytricho in noua olla torrefacito: cōtusisq; quę contundi possunt,

DD d 2 ac cri.

764 DE VNGVENTIS ORNANTIB. CAPIL.

ac cribratis, omnia gleucino, aut sabino excipito, & ante balneum utitor, ca. A
 pite prius pectinato. Galenus.

Vnguentum ad barbam generandam, expertum.

℞. Olei amygdal. dulcium, Myrrhæ ana ʒ. j.
 Cort. rad. Arundinum ustarum, Capil. Vener. ust. Polytrichi usti ana ʒ. ii.
 Capitem Muscarū ustarū, Apum cōtritarum in suis uacuitatibus ana ʒ. β.
 Ladani ʒ. ij. Mellis ʒ. j.
 Puluerizentur: cum modico ceræ fiat linimentum. Rondeletius.

Aliud ad idem.

℞. Cineris Talpæ, in clibano exiccætæ ʒ. ij.
 Cineris Apum ʒ. j. β.
 Cineris Auellanarum ustarum ʒ. j. β.
 Stercoris Muris ʒ. ij.
 Ladani ʒ. j. β.
 Mellis optimi ʒ. j.
 Olei Nardini, Ceræ ana quantum sufficit.
 Fiat linimentū. Oportet manē faciem sequenti die, hac decoctione abluere:
 ℞. Polytrichi, Abrotani maris, Roris marini, Fol. Myrti, Cort. rad. Arundi-
 nis, Flo. Chamomille, Ros. rubrarum, Fol. Rumicis ana M. j.
 Ligni guaiaci ʒ. β.
 Fiat decoctio: utatur, ut dixi. Rondeletius. B

Aliud ad idem.

℞. Fœnigræci sextarios iij.
 Seminis Lini sextarios ij.
 Ladani bessēm.
 Succu Acaciæ sexuncem.
 Folij Malabatri sexuncem.
 Gallas n. xx.
 Onychis aromatici sextantem.
 Calami Syriaci sextantem & ʒ. β.
 Bdellij sextantem.
 Myrti ustæ sextarium j.
 Musci, quem alij bryon aromaticum uocant, quadrantem.
 Iridis astragalitidis, alij Illyricæ, sextantem.
 Singula per se contundito, ac per cribrum arctius excutito, & deinceps mi-
 sceto. Galenus.

Vnguentum capillos generans.

℞. Cineris Cicadārum ustarum, Cineris Apum ustarum, Olei myrtini, uel
 Axungie ana quantum sufficit. Misce, & fiat unguētum. Marinellus.
 DE VN.

ANTIDOTARII LIB. III
DE VNGVENTIS CAPILLOS
prohibentibus.

765

A

Vnguentum capillos crescere non permittens.

Tithymalli decoctum cum aceto, calce uiua, & maluis cōmixtū. Fumanel.

Aliud ad idem.

℞. Gummi Hederę, Ouorū Formicar. Auripigmenti, Colophonię ana ʒ. j.
Hirudinum siue sanguifugarum ustarum ʒ. β.

Trita misceantur cum ranarum sanguine, fiatq; unguentum. Marinellus.

Aliud ad idem.

℞. Sang. Vespertil. Succi Hederę, Succi Raphani, Succi Caprini ana q. s.
Misce, & fiat unguentum. Marinellus.

Aliud eiusdem, ad idem.

℞. Pinguedinis Ranarum, item Talpę, Vespertilionis, Gummi hederę q. s.
Fiat unguentum.

Aliud ad idem.

℞. Opij, Iusquiami ana quantum sufficit.

Trita cum aceto in unguenti formam redigantur, quo pili quotidie inun-
gantur: & continuò frons depilata uidebitur. Marinellus.

Aliud eiusdem, ad idem.

B

℞. Castorei quantum sufficit.

Mellis despumati quantum sufficit pro unguento.

Aliud ad idem.

℞. Erinaceum integrum.

Coquatur in oleo, donec caro ab ossibus separetur: cola, & prædicto oleo
misce oua formicarum, & inunge. Marinellus.

Aliud eiusdem, ad idem.

℞. Seminis Cicutę quantum sufficit.

Trita cum sanguine uespertilionis ad formam unguenti redigantur.

Aliud ad idem.

℞. Gummi Hederę ʒ. j.

Auripigmenti, Colophonię, Seminis Cicutę ana ʒ. β.

Castorei ʒ. ij. Opij ʒ. j. Hyoscyami ʒ. j. β.

Succi Cicutę, Sanguinis Vespertilionis ana quantum sufficit.

Fiat unguentum, quo loca depilata inungantur. Marinellus.

Aliud ad idem.

℞. Sanguinis Vespertilionis, Sanguinis humani, Cassię recentis ana par-
tes æquales.

Ouorū Formicar. Sem. Iusquiami. Sem. Papaueris nigri ana part. æqual.

DD d 3 Pulueris

Puluerizanda puluerizentur, atq; cum cæteris misceantur. Marinellus. A

Aliud ad idem.

℞. Terræ Cimoliæ, Cerussæ ana part. j.

Aluminis Rochæ part. β.

Succi Hyoscyami quantum sufficit. Fiat unguentum. Marinellus.

Aliud ad idem.

℞. Tartari albi triti, Mellis despumati ana quantum sufficit.

Misce, & inunge. Marinellus.

Aliud ad idem.

℞. Gummi vitis albę, Gummi hederę, Bryoniæ.

Trita misceantur cum oleo, in formam unguenti. Marinellus.

Aliud eiusdem, ad idem.

℞. Oorum Formicarum, Sanguinis Ranarum, Rubiginis ferri.
Cum saliuā misceantur.

Aliud eiusdem ad idem.

℞. Fellis Erinacei, Fellis Mergi, Testarum marinarum ustarum, tritarum,
Sanguinis Vespertilionis ana q. l. Fiat unguentum.

Aliud ad idem.

℞. Cineris Hirundinum ustarum, Lactis Tithymalli ana q. l.
Fiat unguentum. Marinellus. B

Aliud ad idem.

℞. Gummi Arabici, Tragacanthę, Æris usti, Viridis æris, Arsenici, Piperis
longi, albi, nigri, Lapidis hæmatitis, Amyli, Rubiæ tinctorum, Squamę
æris usti ana ʒ. ij.

Sang. draconis ʒ. j. β. Acaciæ ʒ. j. β.

Thuris, Spicę, Lycij ana ʒ. j.

Gallarum ustarum ʒ. j.

Sarcocollę ʒ. β.

Ammoniaci in aqua uitę dissoluti ʒ. β.

Trita cum succo citri uel limonum fiat unguentum. Marinellus.

Aliud ad idem.

℞. Hyoscyami, Sang. draconis, Gummi Arabici, Thuris albi ana ʒ. vj.

Aquę Solatri quantum sufficit.

Trita cum cama misceantur ad formam unguenti. Marinellus.

Aliud ad idem.

℞. Dactylorum ustorum ʒ. iij.

Spicę ʒ. ij.

Trita misceatur cum melle & stercore talpę, ad formam unguenti. Marinell.

Aliud

A

Aliud eiusdem, ad idem.

℞. Rubiginis ferri, Testarum marinarum ustrarum ana q. s.
Cum salua hominis ieiuni misceatur.

Vt pili cadant, & non renascantur.

℞. Auripigmenti, Ouorum Formicarum, Gummi Arabici ana ʒ. β.
Gummi Hederæ ʒ. ij.

Cum sanguine uespertilionis, uel succo hyoscyami fiat unguentum. Appli-
cetur, prius abrasis capillis. Rondeletius.

DE VNGVENTIS CÁPILLOS

aufferentibus.

Psilothrum.

℞. Auripigmenti auricoloris ʒ. vij. aut ʒ. x.

Calcis uiuæ ʒ. vij. uel x.

Amyli sextantem.

Terræ Selinusæ ʒ. j.

Omnia trita, & per angustissimum cribrum excussa reponito. Vfus uerò tem-
pore ex pharmaco quod sufficit acceptum, aqua conuassato: deinde illini-
re iubeto, ac animaduertere ne exurat. Galenus ex Critone.

Aliud, euestigiò leuem reddens, Critonis.

B

℞. Calcis uiuæ part. ij.

Auripigmenti part. j.

Hæc in mortarium plumbeum cõiecta, aqua aut p̄isanæ succo affuso terito:
atq; ubi nigra reddentur, calefacta illini maximè in balneo iubeto. Galenus.

Aliud Paridis saltatoris.

℞. Sandaracæ ʒ. j.

Calcis uiuæ sextarium j.

Trita cum aqua diligenter coquito, atque ubi ebullire cœperint, ablati u-
titor. Galenus.

Aliud.

℞. Amyli ʒ. j. Calcis uiuæ, Auripigmenti ana ʒ. j.

Contusa & cribrata repono, utereq; ut dictum est. Galenus.

Psilothrum Heraclide Tarentini, euestigiò pilos tollens, Critonis.

℞. Calcis uiuæ sextar. j. Cimoliæ, Pumicis usti ana sext. j.

Auripigmenti part. iiij.

Trita ac læuigata reponito. Vfus tempore aqua dilutis, ut dictum est. Galenus.

Aliud pilos auferens, & cutim tenuans.

℞. Succu fol. Cucumeris agrestis, Lactis Amygdalar. Calcis uiuæ, Auripig-
menti,

menti, Galbani in uino macerati, & percolati ana quantum sufficit. A
Inuicem coctis adde:

Olei Rosati, Masticis ana quantum sufficit.

Thuris, Vernicis, Rosarum, Caryophyllorum, Cumini, Nucis moschatæ,
Cinnamomi ana parum. Misce, & fiat unguentum. Fumanellus.

Aliud eiusdem.

℞. Cineris Cerri part. ij.

Auripigmenti part. j.

Coquantur in aqua fluminis.

Aliud eiusdem.

℞. Saponis nigri ℥. j.

Tartari ℥. j. β.

Auripigmenti ℥. vj.

Succi Cyperi ℥. xv.

Calcis uiuæ ℥. β.

Capitelli ℥. j.

Calx ponatur in capitulo, & colata cæteris commisceatur.

Aliud.

℞. Gummi Hederæ ℥. ij.

Auripigmenti, Ouorum formicarum, Gummi Arabici ana ℥. iij.

In pollinem redacta, potenti aceto commisceantur. Fumanellus. B

Vnguentum pilos remouens.

℞. Auripigmenti ℥. iij.

Calcis uiuæ ℥. j.

Lixiuij fortis quantum sufficit.

Coquantur donec pluma immissa depiletur. Alexius.

Aliud depilans faciem.

℞. Colophonix ℥. iij.

Masticis ℥. j.

Ammoniacci puri ℥. j.

Dissolue in uase terreo, bene mundo, & colabis supra aquam frigidam: collige, & malaxa simul, & soluat parum de eo super ignem, & tepidum applicetur, superdimittenda per horas duas, deinde remoueat. Alexius.

Pfilothrum.

℞. Pulueris Nactux ℥. j.

Cumini, Sanguinis Vespertilionis ana ℥. iij.

Moschi ℥. j.

Fiat linimentum. Summopere præstandū est, ut pars cui debet applicari unguentum, primò lauetur lixiuio cinerū sarmetorum. Quòd si post admotum medi-

A medicamentum pruritus relinquatur in parte, ungetur unguento albo Rhafis, aut decocto seminis hyoscyami, aut seminis caulium. Rondeletius.

Aliud.

℞. Sanguinis Testudinis, item Ranarum, Vespertilionis: Oorum Formicarum, Auripigmenti rubri, Gummi Hederæ ana q. f.
Misce cum aceto, & unge discretè, ne excoriat. Bayrus.

Aliud eiusdem.

℞. Auripigmenti, Succu Hyoscyami ana part. æquales.
Misce, & inunge.

Vnguentum auferens pilos ex quacungq; corporis parte.

℞. Albuminum ouorum contusorum n. iij.

Calcis uiuæ ʒ. viij.

Auripigmenti ʒ. j.

Lixiuij quantum sufficit.

Fiat unguentum, quo adhibita penna aliqua inungantur partes pilosæ. Quæ autem per horæ quadrantem inunctæ fuerint, eluatur unguentum calida aqua. Alexius.

Aliud.

B ℞. Oorum Formicarum, Succu Hyoscyami, item Cicuti, sem. Pſyllij: Sanguinis Vespertilionis, Sanguinis Testudinis ana q. f.
Misce, & inunge. Alij aurea bractea ignita locum impuberibus percurrunt, ut ne uestigium remaneat, nec amplius lanuginosum appareat. Ioan. Baptista Porta.

DE VNGVENTIS CAPILLOS TINGENTIBUS flauos.

Vnguentum capillos flauos reddens.

Flauos reddunt capillos lupini crudi, cū aqua & nitro illiti. Galenus.

Vnguentum faciens capillos aureos.

℞. Medianum corticè Sambuci, Flores Genistæ, Croci, Vitellorum ouorum ana q. f.

Coquatur in aqua, & qd̄ supernatauerit, colligatur, & inde capilli inungantur.

Aliud ad idem.

℞. Tartari albi usti, Olei Balanini ana q. f.

Fiat unguentum, quo capilli ad solem iniungantur pestendo. Marinellus.

Aliud eiusdem, ad idem.

℞. Myrrhæ ʒ. j.

Salis albi ʒ. ʒ.

Trita cum oleo balanino misceantur, ad formam unguenti.

Aliud capillos flauos reddens.

℞. Flor. Verbasci M. j.

E E e

Fœnigræ.

770 DE VNGVENTIS ORNANTIB. CAPILLOS.

Foenigræci ℥.ij.

Cineris Vitium M.j.

Cineris ligni Hederae M.j.

Aquæ ℥.x.

Coquatur omnia simul usq; ad cōsumptionē dimidiæ partis. colaturæ adde,
Saponis albissimi ℥.ij.

Croci ℥.ij.

Relinquantur sic ad solem, per mensem unum, miscendo singulis diebus
cum baculo. Hoc unguento capilli ad solem inungantur. Marinellus.

Linimentum ad clarificandos & candidos reddendos capillos.

℞. Stercoris Hirundinum, Rad. Enulæ camp. Sem. Raphani, Sulphuris,
Flor. Capparidis, Thuris ana ℥.β.

Omnia simul incorporentur cum paribus partibus fellis bouis albi. fricetur
capilli prius loti lixiuio sarmentorum, & siccati. Et dum capilli erunt sua spon-
te siccati, à lotionē in frictiōne rursus lauentur in dicto lixiuio, & siccentur
paulatim panno calido. Rondeletius.

DE VNGVENTIS CAPILLOS NIGROS
tingentibus.

Vnguentum capillos denigrans, Archigenis.

℞. Spumæ Argenti, Cimoliz, Aluminis liquidi ana part. æquales.

Prælotis & siccatis capillis, in noctem illinito, & betæ folijs supernè obliga-
to. Galenus.

Aliud eiusdem.

℞. Terræ Selinusæ, Argenti spumæ, Calcis ana part. æquales.

Cum aqua ad mellis crassitudinem redige, & ubi liquido lixiuio prælaueris,
capillis vicissim inunge, similiterq; betæ folijs impositis obligato. Manè ue-
rò excussos capillos applanato.

Aliud, barbam denigrans.

Suber aridum & plumbum ustum cum betæ crudæ succo mellis spissitu-
dine illita: finito usq; ad prandium, deinde abluito. Galenus.

Aliud:

℞. Gallarum, Thuris, Nigellæ ana ℥.ij.

Trita ponantur in malo cotoneo excauato: claudatur, & in panis pasta inuo-
lutum coquatur in clibano, donec comburatur: pulverizetur, cinisq; cum o-
leo misceatur. Marinellus.

Aliud eiusdem.

℞. Gallarum cum oleo communi ustarum ℥.ij.

Aluminis Rochæ ℥.ij. Salis Gemmæ ℥.j.

Cum oleo castino fiat unguentum.

Linimen-

A

Linimentum capillos canos nigros reddens℞. Myrobalanorum nigrorum, Emblicorum, Gallarum ana P. x.
Ladani P. xx.

Fol. Myrti, Baccarum Myrti ana P. xxx.

Puluerizata & cribrata infundantur in tribus libris olei per tres dies: deinde coquantur, donec inspissentur, & cū eis liniantur radices capillorū. Bayrus.

Aliud eiusdem.

℞. Scorizæ ferri, Limaturæ plumbi ana q. f.

Coque in aceto usq; ad consumptionem medietatis: cola, & unge. Inunctio cum plumbo combusto confecto cum succo betæ ad mellis, consistentiam, unguendo nigriticat barbam. Bayrus.

DE VNGVENTIS CAPILLOS TINGENTIBUS
albos.*Vnguentum dealbans capillos.*℞. Stercoris Hirundinis, Fellis Tauri ana q. f.
Misce, & fiat unguentum.*Aliud eiusdem.*B ℞. Enulæ, Cort. rad. Raphani, Aluminis, Glutinis ana part. j.
Misce, & unge.*Aliud.*℞. Stercoris Hirundinis, Sem. Raphani, Sulphuris, Cort. rad. Capparorū,
Fellis uaccini, Aceti optimi ana q. f.
Fiat unguentum. Marinellus.DE VNGVENTIS TINGENTIBUS
capillos rubros.*Vnguentum capillos rubros tingens.*℞. Tartari usti, triti, Olei Cucumeris sylvestris ana q. f.
Fiat linimentum, quo capilli inungantur. Marinellus.DE VNGVENTIS CAPILLOS REDDENTI-
bus crispas.*Vnguentum capillos crispas reddens.*℞. Cornu arietum quantum sufficit.
Incidito, & cum oleo terito, capillosq; inungito. Fumanellus.*Aliud ad capillos crispandos.*

Radix ebuli teratur cum oleo, & inde caput unguatur, & cum folijs eiusdem superligetur caput. Alexius.

E E e 2 *Aliud*

772 DE VNGVENTIS ORNANTIB. CAPILLOS.

Aliud ad idem.

℞. Succī Betæ, Succī Myrti, Olei communis ana q. f.
Misce, & unge. Marinellus.

Aliud ad idem.

℞. Nucleorum Pini ustorum & tritorum, Olei Myrtini ana q. f.
Misce, & fiat unguentum. Idem.

Aliud ad idem.

℞. Spumæ Salis, quæ bulliēdo colligitur, Myrrhæ tritæ ana q. f.
Misce, & fiat unguentum. Marinellus.

Aliud ad idem.

℞. Myrrhæ, Gummi Arabici, Olei Fœnigræci, Olei Hyoscyami ana q. f.
Misce, & fiat unguentum, quo capilli inungantur. Marinellus.

DE VNGVENTIS, SUPERCILIORVM VL
tia tollentibus.

Vnguentum ad casum superciliarum.

℞. Plumbi limati, Pinguedinis Anatis ana q. f.
Misce, & fiat unguentum. Marinellus.

Aliud eiusdem, ad idem.

℞. Auellanarum tostarum & tritarū, Pinguedinis Capræ, uel Vrsi ana q. f. B
Misce, & fiat unguentum.

Aliud eiusdem, ad idem.

℞. Sem. Iusquiami nigri ʒ. ij. Polytrichi ʒ. j.
Vnguenti Irini cochlearia iij.

Trita cum unguento misceantur ad formam unguenti.

Vnguentum supercilia renascere faciens.

℞. Sem. Hyoscyami vlti q. f.
Cum aqua fiat unguentum. Marinellus.

Aliud eiusdem, ad idem.

℞. Apum ustarum & tritarum q. f.
Cum oleo q. f. Fiat linimentum, quo supercilia inungantur.

Vnguentum ad superciliarum pediculos.

℞. Vitell. ouorum, ad duritiem coctorum n. j. Aloes parum.
Misce, & inunge. Marinellus.

Aliud eiusdem, ad idem.

℞. Argenti uiui, cum salua extincti, Staphidis agricæ ana ʒ. ʒ.
Butyri quantum sufficit. Fiat unguentum.

Aliud ad idem.

℞. Pomorum coctorum & emundatorum n. j.

Argenti

A Argenti uiui saliuā mortificati q. f.
Misce bene, & inunge. Marinellus.

Aliud eiusdem, ad idem.

℞. Staphidis agrīæ ʒ. j.
Olei Absinthini ʒ. ij.
Cerae quantum sufficit. Fiat linimentum.

Aliud ad idem.

℞. Aluminis saccharini, Aloes, Staphidis agrīæ, Aceti scillitici ana q. f.
Fiat unguentum. Marinellus.

DE VNGVENTIS, PALPEBRARVM OCULO-
rumque liuorem tollentibus.

℞. Fabarum excort. tritarum q. f.
Mellis quantum sufficit.
Misce, & fiat unguentum. Marinellus.

Aliud ad idem.

℞. Vitell. ouorum, ad duritiem coctorum q. f.
Mellis quantum sufficit.
Contundantur simul ad formam unguenti, quo partes liuidæ inunguntur.
Marinellus.

B

Aliud eiusdem, ad idem.

℞. Cerussæ, Cumini, Fabarum ana q. f.
Trita cum succo coriandri fiat unguentum.

Vnguentum ad casum pilorum in palpebris.

℞. Stibij usti, & in lacte mulieris extincti ʒ. xij.

Aloes ʒ. ij.

Myrrhæ, Spicæ nardi ana ʒ. ij.

Hordei usti ʒ. β.

Trita cum aqua quantum sufficit, misceantur. Marinellus.

Aliud ad pilos defluos in palpebris.

℞. Medallæ pedis dextri bubuli, Fuliginis ana q. f.

Misce. Marinellus.

Ad casum superciliorum & barbae.

℞. Iusquiami ʒ. ij.

Stercoris Muris ʒ. j.

Polytrichi ʒ. ij.

Olei Irini quantum sufficit.

Tere, & misce cum oleo, & præfomentando unge. Bayrus.

Vnguentum ad oculorum lachrymas.

℞. Myrrhæ, Cumini, Thuris, Masticeis, Ammoniaci, Boli Armeni ana ʒ. β.

EEc 3 Croci

774 DE VNGVENTIS ORNANTIBVS OCVLOS.

Croci ʒ. ij.

Trita omnia cum albuminibus ouorum misceantur, & supra frontem & tempora ponantur. Marinellus. A

Aliud eiusdem, ad idem.

℞. Thuris, Masticis, Gummi Arabici, Tragacanthæ, Boli Armeni, Thutiæ, Sanguinis draconis ana ʒ. β.

Trita cum oui albumine misceantur, & fronti, temporibusq; applicetur.

DE VNGVENTIS OCVLORVM LACHRYMAS SISTENTIBVS.

℞. Chelidoniæ, Rutæ, Verbenacæ, Cort. rad. Fœniculi ana M. j.

Contusa cum axungia porcina ueteri fiat pasta, quæ coquatur in uino albo, usque ferè ad uini consumptionem: colaturæ expressæ adde,

Ceræ albæ nouæ ʒ. iij.

Aloes ʒ. iij.

Viridis æris ʒ. j.

Croci ʒ. j.

Thuris ʒ. iij.

Masticis ʒ. iij.

Caphuræ ʒ. j.

Fiat unguentum, quo oculi inungantur. Marinellus. B

Aliud eiusdem, ad idem.

℞. Aloes, Sarcocollæ, Thuris ana q. s.

Trita cum succo fœniculi misceantur.

Vnguentum ad oculorum lachrymas.

℞. Thutiæ præparatæ ʒ. j.

Sarcocollæ, Myrrhæ, Thuris ana ʒ. j.

Styracis calamitæ, Ambræ ana ʒ. j.

Rosarum siccarum, Sumach, Sanguinis draconis ana ʒ. vj.

Trita cum mucilagine tragacanthæ & gummi Arabici fiat unguentum: de quo parum in oculos ponatur. Marinellus.

Vnguentum ad oculorum rubedinem.

℞. Cumini triti quantum sufficit.

Cum cera misceatur, & super oculos somni tempore ponatur. Idem.

Aliud eiusdem, ad idem.

℞. Tragacanthæ, Gummi Arabici, Rosarum tritarum, Amyli, Cerussæ ana ʒ. ij.

Opij ʒ. j.

Trita cum lacte mulieris misceantur.

DE VN

A. DE VNGVENTIS CVTIS CAPITIS
uitia curantibus.*Vnguentum ad achoras, Apollonij.*

℞. Cerussæ ʒ. vj.
Spumæ Argenti ʒ. β.
Sulphuris ʒ. vj.
Olei Rosacei, uel Myrtini, Ceræ ana q. f.
Fiat unguentum. Galenus.

Aliud Critonis.

℞. Spumæ Argenti ʒ. l.
Fol. Rutæ tenerorum ʒ. xxv.
Aceti, Olei Rosati, uel Myrtini ana q. f.
Misce, & cum penna illinito. Galenus.

Aliud eiusdem, ad idem.

℞. Cerussæ ustæ ʒ. c.
Rutæ, Mannæ thuris ana ʒ. c.
Corticis Pinus ʒ. l. Olei Myrtini sextarios ʒ.
Aceti tantundem. Misce. Galenus.

Aliud eiusdem.

A. ℞. Recrementi Plumbi, Pampinorum Vitis, Thuris, Myrrhæ, Spumæ Nitri ana ʒ. l.
Olei Myrtini, Aceti ana q. f. Misce. Galenus.

Vnguentum ad achoras, Cleopatræ reginæ.

℞. Cerussæ frictæ ʒ. ij.
Thuris ʒ. ʒ.
Sulphuris ʒ. j.
Trita ex oleo illinito. Galenus.

Aliud ad achoras & surfures, eiusdem.

℞. Nitri, Atramenti sutorij ana ʒ. j.
Olei quantum sufficit. Trita cum oleo misceantur.

Aliud ad achoras, Cleopatræ.

℞. Sulphuris uiui ʒ. vj.
Thuris masculi ʒ. j.
Aluminis scissi, Sraphidis syluestris, Erucæ, Spumæ Nitri ana ʒ. j.
Atramenti sutorij ʒ. j.
Rutæ ramulos iij.
Olei Laurini, uel Myrtini, Aceti ana q. f. Fiat unguentum. Galenus.

Aliud Sorani.

℞. Sulphuris uiui, Spumæ Argenti, Cerussæ ana part. æquales.

Croc

776 DE VNGVEN. ORNANTIB. CVTIM CAPITIS.

Croci part. dimidiam. Trita cum passo Cretico illinito.

A

Aliud eiusdem.

℞. Spumæ Argenti ʒ. xx.

Calcis uiuæ ʒ. xx.

Aceti, uel Olei heminam j.

Trita misce. Galenus.

Aliud eiusdem.

℞. Chalcitidis ʒ. ij.

Sandaracæ ʒ. β.

Spumæ Argenti ʒ. j.

Olei Myrtini, Aceti ana q. f.

Misce, & fiat unguentum.

Aliud ad achoras & tineam.

℞. Succi Betæ, Succi Chelidonij ana ʒ. ij.

Axungia porci ʒ. ij.

Ellebori albi ʒ. j. ʒ. ij.

Misce, & fiat unguentum. Fumanellus.

Aliud ad tineam & scabiem.

℞. Ellebori albi, nigri, Sulphuris uiui, Auripigmenti, Lithargyri, Calcis uiuæ, Vitrioli, Aluminis, Gallarum, Fuliginis, Cineris Cleuelati ana ʒ. β.

Argenti uiui extincti, Viridis æris ana ʒ. ij.

Succi Fumiterræ, Olei ana q. f.

Fiat unguentum. Fumanellus.

Vnguentum ad tineam.

℞. Fœnigræci lb. j.

Sanguinis draconis triti ʒ. j.

Pumicis lb. j.

Terebinthinæ ʒ. v.

Mellis ʒ. j.

Vitell. ouorum n. iiii.

Olei Rosati ʒ. ij.

Misce, fiat unguentum: quo. capite prius abrafo, & cum infantium urina ab-
luto, ac spongia deterfo, & oleo de semine lini peruncto, utatur. Fumanellus.

Aliud ad idem.

℞. Chelidonij part. iij. Pinguedinis suillæ tantundem. Ellebori albi part. j.
Misce. Fumanellus.

Vnguentum ad crustas puerorum in capite.

℞. Myrrhæ, Radicis Iridis, Hellebori nigri, Olei ouorum ana q. f.

Trita

A Trita misceantur in formam unguenti. Similiter oleum de frumeto ualet.
Bayrus.

Vnguentum ad furfures capitis.

℞. Farinæ Ciceris, Farinæ Foenigræci, Baurach, Furfuris, Myrtillorum, Si-
naris ana ʒ. xv.

Olei communis quantum sufficit.

Aceti, Aquæ ana parum.

Fiat unguentum, quo caput derafum & ablutum ungitur. Fumanellus.

Aliud ad furfures.

℞. Spumæ Nitri, Atramenti sutorij ana part. æquales.

Vini quantum sufficit.

Misce: atque ter aut quater in mense affricato. Galenus.

Aliud eiusdem.

℞. Fæcis Vini, Pumicis, Nitri, Lupinorum ana part. j. Misce.

Aliud.

℞. Terræ Cimolię, Fellis Bubuli, uel Suilli, Aceti ana q. s. Misce. Galenus.

Vnguentum ad pediculos.

℞. Staphidis syluestris part. ij.

Sandarachæ, Nitri ana part. j.

Olei, Aceti ana q. s.

Misce, & fiat unguentum. Galenus.

Aliud eiusdem.

℞. Veratri albi, Staphidis syluestris, Nitri ana part. æquales.

Olei quantum sufficit. Misce, & in balneo adhibe.

Vnguentum ad pediculos & lendes.

℞. Staphidis syluestris, Argenti uiui cum saliuâ extincti ana ʒ. iij.

Olei communis ʒ. iij.

Ceræ ʒ. j.

Fiat unguentum, quo ungitur loco saponis, quando caput lauatur. Bayrus:

Aliud eiusdem.

℞. Sandarachæ, Nitri ana ʒ. j.

Staphisagriæ ʒ. ij.

Olei, Aceti ana quantum sufficit.

Fiat unguentum.

Aliud.

℞. Olei Laurini, Olei ex sem. Raphani ana ʒ. ij.

Piperis, Croci ana quantum sufficit. Misce. Marinellus.

Vnguentum ad faciei maculas rubentes.

℞. Rad. Lapathi ʒ. ij.

FFf

Adipis

778 DE VNGVENTIS ORNANTIBVS FACIEM.

Adipis suilli ꝑ.ij.

Ceræ albæ ꝑ.ij.

A

Liquatis adde,

Argenti uiui extincti, Caphuræ ana parum.

Succi Absinthij, Mellis ana q. s. Fiat unguentum. Fumanellus.

Aliud ad faciei ruborem.

℞. Sulphuris uiui, Auripigmenti, Saponis Saracenicici ana ꝑ.β.

Fuliginis ꝑ.ij. Misce. Idem.

Aliud eiusdem, ad idem.

℞. Succi Arantiorum n. vij.

Succi Solatri, Aquæ Nenupharis, Aquæ Limacum ana ꝑ.ij.

Ceræ albæ ꝑ.β.

Pinguedinis Gallinæ, item Arietis ana ꝑ.ij. β.

Rad. Vesicariæ uiridium ꝑ.ij. Fiat unguentum.

Vnguentum ad rugas & lentigines faciei.

Caprinum, fel cū lupinorum farina commisceto, & uesperi faciem confricato. Fumanellus.

Aliud ad idem.

℞. Coralliorum alborum ꝑ. β.

Salis Gemmæ, Cerussæ, Caphuræ ana ꝑ.ij.

Ceræ albæ ꝑ.ij.

Aquæ Rosaceæ ꝑ.ij.

Pinguedinis Gallinæ lotæ ꝑ.ij.

Terenda terito, simulq; ad usum commisceto. Fumanellus.

Aliud ad lentigines.

℞. Ceræ albæ lb. j.

Olei Violati ꝑ. j.

Argenti uiui ꝑ. β.

Masticis ꝑ. j. β.

Lithargyri ꝑ. j.

Caphuræ parum.

Fiat linimentum. Fumanellus.

Aliud ad pannum faciei.

℞. Farinæ Lupinorum, item Eubarum, Cicerum alb. Orobani ana ꝑ.ij.

Farinæ Hordei, Farinæ Lentium ana ꝑ.ij.

Sem. Raphani, Tragacanthæ, Amyli ana ꝑ.β.

Sem. Melonis excort. ꝑ. iij.

Croci ꝑ. β.

Trita conficiantur cum lacte mulieris, & uesperi liniatur ex eo facies: manè uerò lauetur cum aqua cort. melonum & uiolarum. Bayrus.

Vnguentum

A *Vnguentum omnia uestigia, omnes tuberositates & maculas faciei auferens.*

℞. Rad. Cucumeris asinini, Been albi, Bryoniæ, Lupinorum ana ʒ. j.
 Cerussæ, Lithargyri, Tartari ana ʒ. j.
 Rad. Cannæ, Serapini, Stercoris columbini ana ʒ. ij.
 Olei Sesamini ʒ. iij.
 Olei Iuniperini, Olei de frumento ana ʒ. ij. ℞.
 Succu Arantiorum ʒ. iij.

Puluerizatis puluerizandis, & subtilissimè cribratis, omnia simul lento igne usque ad succi consumptionem bulliant: deinde remoue ab igne semper cū spatula agitando, donec in frigidentur: tunc adde album unius oui recentis conuassatum & colatum, caphuræ tritæ ʒ. j. deinde semper miscendo: deinde lauetur in ℥. j. aquæ expressiōnis cannarum, quando sunt teneræ, decies in ea aqua lauando & agitando cum spatula: & est singulare. Bayrus.

Ad pannos & cossos faciei.

℞. Pinguēdinis Gallinæ, Betonicæ ana q. l.
 Misceantur, & contundantur simul. Marinellus.

Vnguentum ad dealbandas cicatrices.

℞. Olei Tartari, Sem. Psyllij ana ʒ. j.
B Infundantur in mucilagine, in oleo rosato dissoluta ʒ. j. boracis, uel salis gē. mæ. Rondeletius.

Vnguentum crassitiem faciei auferens.

℞. Butyri recentis, Terebinthinæ ana ʒ. j.
 Rad. Liliorum decoctorum in folijs betæ sub cineribus ʒ. iij.
 Calcis uiuæ quinquies lotæ in aqua rosarum, uel succo citranguli ʒ. j.
 Axungię porci recentis liquefactæ in aqua rosarum ʒ. j.
 Misce, & fiat unguentum. Rondeletius.

Aliud pro delicatis.

℞. Rad. Liliorum sub cineribus decoctorum ℥. j.
 Contundantur in mortario: cui adde,
 Sacchari candi ʒ. iij.
 Fiat unguentum: quod applicetur supra faciem. Rondeletius.

Vnguentum ad uaros in facie.

℞. Mellis Attici ʒ. xij.
 Aceti acerrimi ʒ. xij.
 Misceto diligenter, & uaros illinito, digito affricando. Crito.

Aliud eiusdem.

℞. Spumæ Argenti ʒ. iij.
 Terebinthinæ purę, ad fabæ Aegyptiæ magnitudinem. Olei parum.
 Fff 2 Misce,

780 DE VNGVENTIS ORNANTIBVS FACIEM.

Misce, atq; ubi prius faciem deterferis, paulum digito excipe, deinde ambabus manibus terendo uaros obline. A

Aliud ad idem.

℞. Aluminis scissi & probè læuigati, Terebinthinæ ana q. f. Misce. Crito.

Aliud eiusdem, ad idem.

℞. Costi Indici tusi & cribrati, Fellis Caprini ana q. f.

Fiat unguentum, quo uaros circa uesperam illine. Manè uerò ubi surrexeris, lacte faciem proluere iube.

Vnguentum ad impetigines faciei.

℞. Aceti Scillitici ʒ. ij.

Aloes ʒ. iij.

Succi Lapathi acuti, Olei Tartari ana ʒ. iij.

Fiat linimentum. Rondeletius.

Aliud ad idem.

℞. Aquæ Lapathi acuti destillatæ ʒ. iij.

Boracis ʒ. iij.

Salis communis ʒ. j.

Aceti Scillitici ʒ. j.

Misce, fiat unguentum. Rondeletius.

Aliud eiusdem, ad idem.

B

℞. Rad. Lapathi ʒ. iij.

Decoquantur sub cineribus, postea cum aceto scillitico fiat linimentum. Si non curetur, adde argenti uini ʒ. β. uel sublimati ʒ. j. Abluatur sæpe facies aqua myrtillorum, uel peculi pedum ros. Postea etiam adde parū albuminis, ut cutis melius resistat.

Aliud ad idem.

℞. Tartari ʒ. ʒ.

Puluerizetur, & cum albumine ouorum applicetur, uel aluminis usti ʒ. iij. quod eodem modo adhibetur. Rondeletius.

Vnguentum ad uaros callosos.

℞. Saponis Gallici ʒ. β.

Ammoniaci thymiamatis ʒ. j.

Thuris ʒ. j.

Aqua dissoluito, & cerati spissitudinem facito, eoq; illinito, & post horæ interstitium tepida abluere iubeto. Galenus ex Critone.

Aliud ad idem.

℞. Nitri rubri, Hyssopi, Pulegij, Salis fossilis ana part. æquales.

Tundito & cribrato, exceptisq; cerato rosaceo utitor.

Galenus ex Critone.

Aliud

A

Aliud eiusdem, ad idem.

℞. Sem. Ocymi, Nitri rubri, Pulegij uiridis, Aluminis scissi, Costi Indici ana part. æquales.
Tufa & cribrata cum adipe anserino seu gallinaceo q. s. misce, ad unguenti formam.

Aliud ad idem.

℞. Salis assati, Pulegij, Hyssopi, Ammoniacy, Rhois ana part. æquales.
Olei Rosati quantum sufficit. Fiat unguentum. Galenus ex Critone.

Vnguentum ad impetigines faciei.

℞. Aloes ꝑ. ij. dissolut. in aceto scillitico, in modum linimenti. Liniantur ferò partes affectæ. Rondeletius.

Aliud ad idem.

℞. Rad. Bryoniæ q. s. Cum sale subacta in aceto acerrimo, admota impetigines sanat. Rondeletius.

Aliud ad impetigines, expertum.

℞. Oxylapathi part. ij.

Gentianæ part. j.

Coquantur in aqua, deinde exprimatur: expressa cum axungia vituli mixta rursus decoquantur lento igne, usq; ad unguenti consistentiã. Rondeletius.

Vnguentum ad solis ustionem, labiorum scissuras, & maculas faciei.

℞. Limacum cum putaminibus n. xx.

Conterantur cum testa: adde, Cerussæ ad pondus limacum.

Ceræ nouæ ꝑ. iij. Cornu cerui ꝑ. j.

Fiat linimentum: postea abluat faciem. Rondeletius.

Vnguentum ad uerrucas in facie.

℞. Rad. Afari, Tempera in aqua ros. biduum: pistta, & illine. Rondeletius.

Aliud ad uerrucas.

℞. Rad. Chelidoniæ quantum sufficit.

Cum axungia trita, & admota, uerrucas absumit & tollit. Rondeletius.

Ad ruborem faciei.

℞. Sulphuris ꝑ. j.

Cerussæ lotæ ꝑ. ij.

Succi Limonum ꝑ. iij.

Applica uespero cum decoctione furfuris. Rondeletius.

Vnguentum ad ruborem faciei à fumis & uaporibus.

℞. Olei Tartari. Olei Rosarum ana ꝑ. iij.

Succi Oxylapathi, Lauri, Serpentariæ, succorum ana ꝑ. iij.

Cerussæ ꝑ. j. ß.

FFF 3

Lithar-

Lithargyri auri ʒ. ij. A
 Argenti uiui extincti ʒ. j. β.
 Rad. Asphod. ustorum sub cineribus ʒ. ij.
 Fiat linimentum in mortario plumbeo Rondeletius.

Aliud ad ruborem.

℞. Vnguenti Citrini ℥. β.
 Lithargyri ʒ. iij.
 Cerussæ lotæ ʒ. ij.
 Bombacis, Aluminis, ustorum ʒ. j. β.
 Tartari calcinati ʒ. j. β.
 Succī rad. Enulæ, Succī Oxylapathi, item Ciclamini, Limonum ana ʒ. ʒ.
 Caphuræ ʒ. iij.
 Olei Ros. ℥. j. β. Misce. Rondeletius.

Aliud ad ruborem faciei.

℞. Succī Fumiterræ, item Plantaginis, Acetosæ ana ʒ. iij.
 Olei Rosati ʒ. j.
 Gummi Tragacanthi, Gummi Arabici ana ʒ. β.
 Sanguinis draconis ʒ. ij.
 Cere nouæ quantum sufficit.
 Fiat unguentum, quo inungatur in introitu lecti. Die uerò crastina abluet faciem decoctione fabarum. Rondeletius. B

Aliud ad ruborem faciei.

℞. Lithargyri in aceto bis uel ter infusi ʒ. j. nutriatur ex aceto albo, & semine cucurbitæ, & agitetur, donec redigatur in formam unguenti. Adde caphuræ dissolutæ in aqua ros. ʒ. β. ungetur facies, & manè fabarum decocto abluatur. Rondeletius.

Linimentum pro uirgine, cui facies erat defœdada scabie.

℞. Lithargyri auri ʒ. j. β.
 Cerussæ lotæ in aqua plantaginis, & caudæ equinæ ʒ. ij.
 Olei Ros. ʒ. iij.
 Coquatur oleum, & cum cera alba fiat linimentum. Rondeletius.

Vnguentum ad ruborem faciei, & tubercula.

℞. Olei Rosati, Olei Tartari ana ʒ. iij.
 Succī Oxalidis ʒ. iij.
 Cerussæ lotæ ʒ. j. β.
 Lithargyri auri ʒ. ij.
 Argenti uiui extincti ʒ. j. β.
 Rad. Asphod. usti sub cineribus. Fiat linimentum in mortario plumbeo. Rondeletius.

Aliud

A

Aliud ad tubercula faciei elephantiorum.

℞. Spec. unguenti Citrini, Lithargyri auri ana ℥.iiij.
 Cerussæ lotæ ℥.ij.
 Boracis, Aluminis ustorum, Tartari calcinati ana ℥.j.β.
 Succī rad. Elenij, Succī Oxylapathi, item Ciclamini, Limonum ana ℥.v.
 Olei Rosati ℥.j.
 Argenti uiui, salua extincti ℥.iiij.

Fiat unguentum. Rondeletius.

Vnguentum ad tubercula faciei lepræ.

℞. Cineris rad. Aristolochiæ & Serpētariæ, decorticatæ, per dies nouem,
 in aqua fontis lotæ. Tunc tota per cribrum transmissa, quantum uoles, parti-
 culam cum aqua plantaginis uel portulacæ dissolue, ac faciem illine. Idem.

Vnguentum ad nodos sub cute apparentes, tanquam auellana.

℞. Rad. Croci. Pistetur cum lacte mulieris, & exhibeatur. Rondeletius.

Vnguentum ad solis uisionem.

℞. Succī Plantaginis, Succī Solani ana ℥.j.β.
 Lithargyri auri, item argenti ana ℥.j.
 Plumbi usti ℥.β.

B

Thuriæ præparatæ ℥.vj.

Caphuræ ℥.β.

Olei Rosati, Cere ana q. l.

Fiat unguentum. Rondeletius.

Vnguentum ad impetiginem.

℞. Misys peregrini, Thuris, Myrrhæ Aluminis scisci ana ℥.j.
 Aloes, Sulphuris uiui ana ℥.β.

Excipe passo, ut strigmentitiam spissitudinem accipiant: & bis aut ter in die
 præfrictis, illine. Galenus.

Aliud.

℞. Misys ℥.β.

Acaciæ ℥.ij.

Squamæ æris ℥.β.

Sulphuris uiui ℥.vj.

Chalcitidis ℥.j.

Gummi ℥.j.

Aceti quantum sufficit.

In quo ubi gummi dissolueris, reliquaque admiscueris, amurcam inijce.
 Galenus.

Aliud ad idem.

℞. Sulphuris uiui, Thuris, Myrrhæ, Atramēti sutorij, Misys crudi ana ℥.ij.
 Gummi

784 DE VNGVENTIS FACIEM ORNANTIBVS

Gummi ʒ.β.

Aceti, Olei Cedrini ana q. s. Misce. Galenus.

Aliud ad idem, Diodori.

℞. Lachrymæ oleæ Aethiopicæ ʒ. xx.

Gummi ʒ. xl.

Atramenti sutorij ʒ. xvj.

Sulphuris uiui ʒ. x.

Thuris ʒ. x.

Aeruginis, Acaciæ, Myrrhæ amineæ ana ʒ. x.

Aceti quantum sufficit.

Vbi dissoluta fuerint singula, ac læuissima reddita, excipe amurca condensata. Galenus.

Vnguentum ad lichenas inueteratos.

℞. Atramenti sutorij, Fœnigræci molliti, Cardamomi ana ʒ. ij.

Melanthij ʒ. j.β.

Fol. Caprifici ʒ. j.β.

Aceti acerrimi quantum sufficit.

Læuigata ad mellis spissitudinem reducito. Galenus.

Vnguentum ad ignis combustionem.

℞. Olei Rosati, Aquæ Rosarum, Albuminum ouorum ana q. s.

Misce: & per quatuor dies admoue loco adusto, quinto die admoue sequens emplastrum:

℞. Olei Nucum, Ceræ nouæ ana ʒ. j.

Liquefiant simul. Rondeletius.

Vnguentum ad combusta aqua & igne.

℞. Mediani cort. Sambuci ʒ. vj.

Olei Rosati ʒ. j.β.

Masticis, Thuris ana ʒ. β.

Ceræ albæ ʒ. ij.

Bulliant in lb. iij. aquæ ad consumptionem medietatis, donec expumatur, & refrigeretur: quod supernatat, idoneū est adustioni admouere. Rondeletius.

Aliud ad adustionem.

℞. Succi Solani, Succi Plantaginis ana ʒ. ij.

Cort. med. Sambuci ʒ. j.

Olei ʒ. j.

Coque in duplici uase ad consumptionem succorum: adde,

Cerussæ lotæ in aqua ros. Lithargyri auri ana ʒ. j.β.

Thutiæ præparatæ ʒ. iij.

Corticis Thuris ʒ. ij.

Axungie

- A** Axungia porci recentis, & loti in aqua ros. ʒ. x.
 Ceræ albæ quantum sufficit.
 Fiat linimentū. In fine adde albumina ouorū n. ij. Caphurę ʒ. β. Rondeletius.
Vnguentum ad partes igne affectas.
 ℞. Calcis nouæ in aqua rosarum lotæ lb. iij.
 Succī Rosarum, Succī Plantaginis ana lb. ij.
 Misce: fiat unguentum. Auicenna.
Vnguentum ad ambusta.
 ℞. Olei Rosarum ʒ. ij.
 Olei ex sem. Cucurbitæ expressi ʒ. j. β.
 Ceræ albæ quantum sufficit. Fiat unguentum. Rondeletius.
Vnguentum ad leniendam faciem post adustionem.
 ℞. Vnguēti Pomatæ ʒ. iij.
 Olei Rosati ʒ. iij.
 Vnguēti Rosati ʒ. ij.
 Fiat linimentum. Rondeletius.
Aliud eiusdem, ad idem.
 ℞. Vnguēti Pomatæ ʒ. iij.
 Olei Rosati ʒ. iij.
- B** Vnguēti citrini ʒ. β. Fiat linimentum.
Aliud ad ustionem ignis & aque.
 Lardum antiquum, & ferro ignito superpone: deinde excipe guttulas ar-
 dentes, cadentes in aquam frigidam, & pinguedinem quæ supernatat, exci-
 pito, & cū aqua ros. subito, & parti combustæ apponito. Rondeletius.
Aliud ad combustionem aque.
 ℞. Cerussæ lotæ in aqua rosarum ʒ. j.
 Calcis lotæ in aqua ros. ʒ. iij.
 Spec. unguēti Citrini ʒ. β.
 Mucilag. sem. Cidoniorum, & Pyrorum, extractis cū aqua rosarum ʒ. iij.
 Ducantur omnia in mortario, donec acquirant linimēti formā. Rōdeletius.
Vnguentum ad delenda uestigia morbillorum in pueris.
 ℞. Olei Liliorum lb. j.
 Pinguedinis ʒ. iij.
 Olei Rosati ʒ. j.
 Lauentur diu cum aqua rosarum & liliorum. Deinde
 ℞. Album. ouorum n. iij.
 In testis suis parentur, & ad ignem parum coagulentur: misce in mortario cū
 supradictis:
 Amygdal. dulc. decort. Amygdal. amararum ana ʒ. j.

GGg

Deinde

786 DE VNGVENTIS ORNANTIBVS FACIEM.

Deinde incorporentur, & pistentur cum supradictis. Adde, A
 Rad. Arundinis ʒ. ij. β.
 Sarcocollæ, Sem. Melonum mund. Lithargyri auri, Sacchari, Medullę,
 Anisi, Crete ana ʒ. j.
 Omnia misce in mortario, donec formam linimenti habeant. Rondeletius.

DE VNGVENTIS AD SCABIEM.

Vnguentum ad scabiem.

℞. Sulphuris uiui lb. β.
 Salis tantundem.
 Axungię porcine lb. ij.
 Olei Laurini lb. β. Misce. Fumanellus.

Aliud potentius, ad scabiem & pituitam salsam.

℞. Lithargyri, Auripigmenti, Argenti uiui, Tartari, Masticis, Olibani, Sulphuris uiui ana ʒ. β.
 Axungię porcine ʒ. vj.
 Olei Laurini ʒ. ij. Aceti parum.
 Misce, & fiat unguentum. Fumanellus.

Aliud omni carens nocumento.

℞. Terebinthine in aqua rosarum lotę ʒ. iij. B
 Olei Rosati ʒ. iij.
 Succi mal. Aranciorum quantum sufficit.
 Vitellorum ouorum n. iij. Misce, & fiat unguentum. Idem.

Aliud.

℞. Butyri recentis ʒ. vj.
 Aluminis Iameni, Salis communis ana ʒ. ij.
 Succi Lapathi acuti, Succi Fumarię ana ʒ. β.
 Vitellorum ouorum n. iij.
 Pulueris Ireos ʒ. iij.
 Styracis liquidę ʒ. vj. Misce. Fumanellus.

Aliud ad omnem scabiem expertum, impetiginem & serpiginem.

℞. Lithargyri, Aluminis, Argenti uiui ana ʒ. β.
 Rosarum, Cerussę, Sabinę, Sepię, Cadmię ʒ. j.
 Cineris Lentisfei, Calaminthę ana ʒ. β.
 Cum succo menthe excepta ad tertias oleo incoquantur rosaceo, addita cera. Fumanellus.

Aliud ad scabiem puerorum.

℞. Terebinthine lotę ʒ. j.
 Vitellorum ouorum n. j.
 Olei Lini ʒ. β. Misce. Fumanellus.

Aliud.

A

Aliud.

℞. Butyri loti ℥.ij.
Terebinthinæ lotæ ℥.iiij. Salis ℥.j.
Vitell. ouorum ℥.j.
Rosacei ℥.j. Misce. Fumanellus.

Aliud.

℞. Butyri recent. in aqua fumiterræ loti, Terebinthinę lotę, Salis communis ana ℥.iiij.

Vitellorum ouorum n.ij.
Succi Arancij q.l. Misce. Fumanellus.

DE VNGVENTIS FACIEM ILLUSTRANTIBVS.

Vnguentum ad reddendam faciem splendidam.

℞. Olei Tartari ℥.iiij. Sem. Psyllij ℥.j.
Infundantur in mucilagine: misce in oleo ros. dissolutæ ℥.j.
Boracis, Salis gemmæ ana ℥.j. Fiat linimentum. Rondeletius.

Fucus ad faciem.

℞. Vnguenti Citrini recenter parati ℥.iiij.
Amygdal. dulc. optimè contularum ℥.j.
Farinæ fabarum ℥.j.

B

℞. Ovis Sepiæ, Cornu Cerui, Farinæ Hordei ana ℥.ij.
Omnia incorporentur cum melle. Rondeletius.

Fucus alius.

℞. Ranas sine testa. Ponantur in uase uitreo, & aspergatur pul. salis gemmæ & aqua limonum. cooperiantur, & tandiu in sole ponantur, donec fiant quasi unguentū. De quo facies illinatur: postea lauetur aqua florū fabarū. Rondeletius.

Alius, eiusdem.

℞. Vnguenti Citrini ℥.iiij. Pomatę ℥.ij.
Misce: unguatur facies serò & manè. Abluatur aqua florum fabarum.

Linimentum in modum lactis uirginalis ad ornatum faciei.

℞. Lithargyrij auri ℥.ij.
Bulliant in exiguo uase plumbeo, cū ℥.vj. aceti albi distillati, per totum mouendo semper cū baculo. Passetur per pannū lineum, seruetur aqua. In hanc rem tandem accipito

Salis, uel Olei Tartari ℥.j.
Et dissoluatur in ampulla cū ℥.iiij. aque liliorū: & pone aquarū supradictarū ana guttas tres aut quatuor in manu, & conuertantur in lac uirginale. Fricetur facies, & siccetur. Rondeletius.

Vnguentum ad faciem illustrandam.

℞. Olei Medullę cerui ℥.ij.

GGg 2 Olei

788 DE VNGVENTIS ORNANTIBVS MANVS.

Olei medullæ castrati ʒ.ij.

Olei sem. Cucurbitæ ʒ.j.

Pinguedinis caprinæ ʒ.β.

Terebinthinæ lotæ ʒ.β.

Ceræ nouæ ʒ.iiij.

Liquefiant ad ignem: deinde adde,

Masticis, Borracis usti ana ʒ.ij.

Misce, fiat unguentum, quo uesp̄ri facies ungetur: manē aqua furfuris abluatur. Marinellus.

A

DE VNGVENTIS MANVS DEALBANTIBVS.

Unguentum dealbans manus.

℞. Lardi saliti, tusti, & in lixiuio per tres dies macerati (mutando bis quotidie lixiuuium) q. f.

Ceræ albæ parum.

Rad. Liliorum alborum, sub cineribus costarum & contusarum n. ij.

Liquefiant ad ignem: deinde per cribrum angustum passetur in aquam frigidam, lauetur bene, aquam quinquies uel sexies renouando: postea seruetur in uase uitreo ad usum. Marinellus.

Aliud ad idem.

℞. Pinguedinis uel seui caprini, mundati, atque in aqua rosacea per duos dies macerati, & optimè loti q. f.

Contundatur in mortario, continuo cū aqua rosacea lauando: deinde adde,

Ceræ albæ, Moschi, Zibetti ana q. f.

Liquefiant simul, & in aqua rosacea, uel alia odorata fundatur: deinde seruetur ad usum. Marinellus.

Unguentum manus dealbans & uenustans.

℞. Olei Amygdalarum amararum, in aqua rosarum uel uiolarum optimè loti q. f.

Ceræ albæ quantum sufficit.

Misce ad ignem, & fiat unguentum. Marinellus.

Aliud ad idem.

℞. Sem. Melonum mundat. Sem. Cucurbitarum mundat. Pinearum mundatarum, Sem. Persicorum non excort. Farinæ Hordei ana part. j.

Contundantur omnia optimè: deinde ℥. j. mellis misceantur ad formā unguenti, quo manus uesp̄ri inungantur, manē abluantur. Marinellus.

Aliud ad idem.

℞. Olei Amygdal. dulcium, optimè loti, Ceræ albæ ana q. f.

Caphuræ ʒ. j.

Misce, & fiat unguentum. Marinellus.

Aliud.

A

Aliud.

℞. Rad. Ireos albi ʒ. j.

Rad. Liliorum ʒ. iij.

Sacchari albi ʒ. j.

Contundantur omnia optimè, & misceantur simul ad formam pastæ, qua manus fricentur, deinde aqua abluantur. Marinellus.

Aliud.℞. Olei Tartari, Olei Amygd. dulc. Cerae albæ ana q. s.
Liquefactis ad ignem adde, Myrrhæ contritæ ʒ. ij.

Masticis tusi ʒ. j.

Misceantur, & infundantur in aquam rosarum, lauetur optimè: postea adde,
Moschi, Ambræ Caphuræ ana parum.

Fiat unguentum. Marinellus.

Aliud ad idem.℞. Sem. Cucurbitarum mundat. Sem. Melonum excort. Pinearum mundatarum,
Sem. Persicorum ana ʒ. vj.

Furfuris Hordei quantum sufficit.

Trita cum melle optimo misceantur. Marinellus.

Aliud ad idem.

B

℞. Pinearum mundat. & contusarum lb. j.

Sinapis ʒ. j.

Ficuum ʒ. iij.

Caphuræ ʒ. ʒ.

Contundantur omnia optimè, misceantur: fiat q̄: pasta, qua manus fricentur.
Marinellus.*Unguentum manus pulchras reddens.*℞. Olei communis loti, Butyri recentis loti, Pinguedinis caprinæ lotæ ana
part. j.Macerentur simul in aqua rosarum per 24. horas, deinde liquefiant ad ignē,
addendo,

Cerae albæ quantum sufficit.

Moschi parum. Fiat unguentum. Marinellus.

Aliud, manus candidas reddens.

℞. Micæ panis ʒ. iij. aut iij.

Orizæ, Cicerum rubrorum ana ʒ. iij. uel iij.

Saponis mollis ʒ. j. β.

Mellis despumati q. s. Fiat pasta. Rondeletius.

Aliud ad idem.

℞. Succu Peponis quantum sufficit.

GGg 3

Amygdal.

Amygdal. amararum, in sero lactis infusarum q. f.

Ficum in eodem sero infusarum n. 100.

Sinapis ʒ. ij.

Rad. Iridis ʒ. j.

Fellis bouis ʒ. iij.

Incorporentur, & fiat pasta. Rondeletius.

Aliud, ad dealbandas manus.

℞. Decoctionis super prunas ʒ. iij. in lb. aquæ, & bene cooperiatur uas terreum plumbeatum, coquatur ad dimidium: deinde adde,

Succi Limonum ʒ. vj.

Mellis ʒ. ij.

Olei Amygdal. amararum ʒ. ij.

Misce, & fiat unguentum. Rondeletius.

Vnguentum ad manus tumidas ex frigore.

℞. Oesipi, Adipis Anseris, item Anatis ʒ. ij.

Mucilag. sem. Cidoniorum ʒ. j.

Amyli ʒ. vj.

Terebinthinæ ʒ. j. β.

Olei Rosati, Olei Vitell. ouorum ana ʒ. ij.

Ceræ Citrinæ parum. Fiat linimentum. Rondeletius.

Aliud ad abluendas manus.

℞. Pinearum mundatarum, Pul. Sinapis ana ʒ. iij.

Mellis optimi lb. β.

Misce, & fiat pasta. Rondeletius.

Aliud ad tumorem manuum ex frigore.

℞. Sem. Lini, Fœnigræci, Sem. Althææ ana ʒ. β.

Extractæ mucilaginis cum aqua liliorum.

Vnguenti supra scripti, Mucilaginis ana ʒ. j.

Olei Anethi, Olei Amygd. dulc. ana ʒ. β.

Fiat linimentum pro manibus cum lana sordida. Rondeletius.

Vnguentum ad scissuras manuum.

℞. Vnguenti ex Lithargyro, Vnguenti Cerussæ ana ʒ. j.

Misce, & fiat unguentum. Fumanellus.

Aliud, ad idem.

℞. Axungiæ arietinæ, Amyli, Lithargyri, Olei ana q. f.

Fiat unguentum. Fumanellus.

Aliud.

℞. Lithargyri argenti, Myrrhæ, Zingiberis ana part. æquales.

Mellis, Ceræ, Olei ana q. f.

Fiat

A Fiat unguentum. Fumanellus.

Unguentum ad manuum scissuras & frigus.

℞. Olei communis ℥.iiij.

Thuris albi, Ceræ mundæ ana ℥.j.

Succi fol. Sambuci ℥.iiij.

Vini albi odorati ℥.iiij.

In uino, oleo & sambuci succo coquatur pomum unū, & pōst addantur thus & cera, & colentur. Fumanellus.

Aliud, ad idem.

Radice lapathi acuti cum axungia suilla, linito. Fumanellus.

Unguentum ad manuum scissuras.

℞. Masticis, Olei Rosati, Ceræ albæ ana q. s.

Fiat unguentum. Marinellus.

Aliud, ad idem.

℞. Furfuris in cinerem usti, Pilorum caudę equi ustorum ana part. j.

Mellis q. s.

Fiat unguentum. Marinellus.

Aliud, ad idem.

B ℞. Thutiæ, Cerussæ, Lithargyri ana ℥.β.

Arsenici sublimati ℥.iiij.

Minij, Aluminis ana ℥.β.

Aquæ Rosarum, Plantag. Portulacę ana q. s.

Albuminum ouorum n. j. Fiat mixtura. Fumanellus.

Aliud.

℞. Tragacanthæ ℥.j.

Farinæ Amyli ℥.β.

Succi Plantaginis ℥.ij.

Cum syrupo rosato fiat mixtura. Fumanellus.

Unguentum ad unguis scabrosos, leprosoꝝ.

℞. Pinguedinis Arietis, Colophoniæ ana ℥.ij. Misce. Fumanellus.

Ceratum ad idem.

℞. Terebinthine, Cymini ana ℥.j. Misce.

Aliud ad panaricium.

℞. Olei Mastichini, Omphacini ana ℥.ij.

Cinnamomi ℥.j.

Cerussæ lotæ, Plumbi usti ana ℥.β.

Thutiæ præparatæ ℥.vj.

Ceræ albæ, Resinę lotæ cum uino ana ℥.j.

Misce. Fumanellus.

Unguentum

Vnguentum ad unguium contusionem.

A

℞. Ceræ nouæ, Cumini, Costi ana q. f.
Trita cum cera misceantur. Marinellus.

Aliud, ad idem.

℞. Pinguedinis Anatis, Pinguedinis Vrsi, Euphorbij triti ana q. f.
Fiat unguentum. Fumanellus.

Vnguentum ad unguium scissuras & erosiones.

℞. Diachilonis, Olei Amygdalarum, Olei de Been, Masticis, Vuarum paf-
farum ana q. f.

Fiat emplastrum. Marinellus.

Aliud, ad idem.

℞. Seminis Lini, Mellis ana q. f.
Misce ad formam emplatri. Marinellus.

Ad unguis leprosos.

℞. Picis, Ceræ ana q. f.
Liquefiant simul, & fiat tanquam unguentum. Idem.

Aliud, ad idem.

℞. Seui caprini, Sandarachæ tritæ ana q. f. Misce. Marinellus.

Ad unguis excorticatos.

B

℞. Salis, Farinæ Hordei, Costi triti ana part. j.
Mellis q. f. Misce. Marinellus.

Vnguentum post casum unguium.

℞. Seminis Lini ʒ. j.
Cardamomi ʒ. iij.
Mellis quantum sufficit.

Misce, & fiat tanquam emplastrum. Marinellus.

Vnguentum faciens cadere unguis.

℞. Vnguenti Rosati, Cantharidum ana q. f. Misce. Marinellus.

Aliud, ad idem.

℞. Visci quercini, Arsenici ana q. f. Misce. Marinellus.

Vnguentum ad verrucas manuum.

℞. Radicis vitis, Stercoris ouini, item caprini ana part. j.
Lactis Ficum, uel Lactis Tithymali q. f.
Fiat unguentum. Fumanellus.

Aliud, ad idem.

℞. Fæcis Olei, Aluminis Zuccharini ana ʒ. j.
Viridis æris ʒ. ij.
Picis naualis ʒ. β.

Tritis

A Tritis omnibus utitor. Fumanellus.

Vnguentum ad uerrucas manuum.

℞. Æruginis æris, Auripigmenti, Dactylorum, Calcis uiuæ, Spumæ maris, Tartari, Vitrioli, Stercoris columbini, Farinæ Siliginis, Farinæ Nigellæ ana part. æquales.

Fellis taurini quantum sufficit.

Fiat unguetum quod superponatur, uerrucis prius scarificatis. Fumanellus.

Aliud ad idem.

Cortex salicis ambustus, mixtusq; aceto, & superpositus. Item canis ster-
cus cum cera. Fumanellus.

DE VNGVENTIS PECTVS ORNANTIBVS.

Vnguentum mamillas paruas conseruans.

℞. Aluminis Rochæ triti quantum sufficit.

Olei Rosati quantum sufficit.

Misce, & inunge mamillas. Marinellus.

Aliud ad idem.

℞. Boli Armeni puluerizati, Gallarum uiridium tritarum ana part. j.

Mellis q. f.

B Fiat unguentum. Idem.

Aliud ad idem.

℞. Cerussæ, Marmoris albi ana part. j.

Olei Myrtini quantum sufficit.

Trita cum oleo myrtino misceantur. Marinellus.

Vt mamille decrescant, minores ne reddantur.

Cicutæ succus caphura mixtus, illitusq; minores illas efficit. Item Thus album cum Veneris umbilico, acriq; aceto mamillas crescere non finit. Fumanellus.

Vnguentum prohibens mamillas augeri.

℞. Terræ tinctorum quantum sufficit.

Coque cum melle, fac cataplasma spissum & crassum, & appone manè usque ad uesperas: deinde superpone spongiam in aqua frigida infusam, quousque cataplasma auferatur. Et si uis efficacius, misce cum eo gallarum immatura-
rum 3. x. facit enim mamillas rectas & tenfas. Bayrus.

Vnguentum mamillas molles & relaxatas indurans.

℞. Argillæ, Albuminis oui, Gallarum immaturarum, Masticis, Thuris ana quantum sufficit.

Tusa omnia calido aceto immisceantur, & illinantur mammæ: & integra nocte

HHh

nocte

794 DE VNGVENTIS ORNANTIB. PECTVS.

nocte commorari oportet, & finito illic esse: si parum fuerit efficax, opus in-
uocato. Io. Baptista Porta. A

*Aliud eiusdem, ad prohibendum incrementum
mamillarum.*

Contundatur cicuta, eiusq; magmata cum aceto, uirginū uberibus im-
natur, & sic coërcet ut crescere non patiatur: præcipuè hoc in uirginitate:
quanquam solito lac deneget tempore.

Linimentum ubera flaccida rugisq; deformata expolians.

℞. Amurcæ quantum sufficit.
Gummi Arabici, Tragacanthæ, Masticis ana parum.
Caphuræ perparum. Misc. Alexius.

Vnguentum mamillas minores & duriores reddens.

℞. Menthæ uiridis, Rosarum siccarum, Pyrorum syluestrium, Mespilo-
rum, Sorborum, Prunorum syluestrium, Acaciæ, Balauftiorum, Mali-
corij, Nucum Pinearum immaturarum, Plantaginis, Florum Chame-
leonis ana part. æquales.

Contusa coquantur in aceto: deinde adde,
Farinæ Fabarum quantum sufficit.
Fiat emplastrum. Marinellus.

Aliud ad idem.

℞. Cotoneorum, Prunorum immat. ana q. f. B
Optimè contusis adde,
Boli Armeni, Sem. Plantaginis, Anisi, Fœniculi, Cumini ana parum.
Succi Plantaginis, Aceti ana q. f.
Misc. Marinellus.

Vnguentum ad mamillas pendentes.

℞. Farinæ Fabarum, Thuris, Masticis, Succi Semperuiuæ, Aceti calidi, Al-
buminis oui ana q. f.
Misc. Marinellus.

Aliud ad idem.

℞. Ficum siccarum, Passularum, Cumini, Aceti ana q. f.
Coquantur & contundantur, ad formam emplastri. Idem.

Aliud ad idem.

℞. Gallarum, Masticis, Thuris, Album. ouorum, Aceti calidi ana q. f.
Misc. Idem efficit furfur cum aceto coctum, & supra mamillas positum.
Marinellus.

Vnguentum ad papillarum scissuras.

℞. Olei Rosacei ʒ. j.

Cort.

A Cort. med. Sambuci ꝑ. j.

Ceræ q. f. Misce. Fumanellus.

Aliud ad dolorem ex scissuris.

℞. Olei uiolacei, uel Olei Amyg. dulc. Thuris albi, Ceræ ana ꝑ. ij.

Misce. Fumanellus.

Aliud ad scissuras.

℞. Pinguedinis Taxi ꝑ. β.

Vnguenti Marciaton, item Agrippæ, Althææ, Anodini ana ꝑ. j.

Olei Nardini ꝑ. j. β.

Misce. Fumanellus.

Aliud ad idem.

℞. Rosacei ꝑ. ij.

Ceræ nouæ ꝑ. β.

Lithargyri, Thuris ana ꝑ. j.

Misce. Idem.

Aliud ad idem.

℞. Tragacanthæ ꝑ. j.

Farinæ Amyli ꝑ. ij.

Succi Plantaginis ꝑ. iij.

B Misce, & linito. Fumanellus.

DE VNGVENTIS ORNANTIBVS

uentrem & pedes.

Vnguentum uentris, rugas à partu abstergens.

℞. Cornu ceruini combusti, Lapidis Amianthi, Salis Ammoniacy, Myrrhæ, Thuris, Mastice ana quantum sufficit.

Trita cum melle misceantur. Io. Baptista Porta.

Aliud ad idem.

℞. Seui arietis nouies in aqua frigida loti ꝑ. j.

Albuminum ouorum n. ij.

Butyri parum.

Contundantur omnia optimè: deinde addantur,

Mastice, Olibani ana ꝑ. ij.

Misce, & fiat unguentum, quo uenter inungatur. Marinellus.

Aliud eiusdem, ad idem.

℞. Cæpæ marinæ ustæ, Cornu ceruini usti, Aluminis Plumæ, Salis Ammoniacy, Myrrhæ, Olibani, Mastice, Nigellæ, Farinæ hordei ana partes æquales.

Trita cum melle misceantur.

HHh 2 Vnguen.

796 DE SMEGMATIS ORNANTIBVS.

Unguentum ad callos pedum.

℞. Farinæ Nigellæ, Farinæ Frumenti ueteris, Cera ana q. f.
Misce, & fiat ceratum, quod supra callos ponatur. Marinellus.

Aliud, ad idem.

℞. Apomelitis, Ammoniacy ana ℥. j.
Bdellij, Sagapeni ana ℥. ij.
Terebinthinæ ℥. iij.
Olei Irini ℥. ij.

Misce, & fiat unguentum. Fumanellus.

Aliud, ad idem.

℞. Cineris cort. Salicis, Aceti ana q. f.
Misce, quo calli inungantur. Marinellus.

Aliud, ad idem.

℞. Fol. Rutæ uiridium, Passularum ana quantum sufficit.
Contundantur simul, & fiat emplastrum. Marinellus.

Aliud, ad idem.

℞. Galbani, Cera ana quantum sufficit.
Misce. Marinellus.

DE SMEGMATIS ORNAN= B

TIBVS CAP. VII.

Smegma album odoratum.

℞. Smegmatis Veneti, antiqui, rasi, atq; per sex dies ad solem positi, q. f.
Contundatur probè cum aquæ rosarum optimæ ℥. j. deinde cum igne lento resolutum fuerit, addatur:

Ireos triti ℥. iij.
Amyli ℥. vj.
Santali albi ℥. ij.
Styracis liquidæ ℥. j.
Olei Spicæ ℥. j.

Misceantur optimè: deinde cum refrixerit, formentur pilæ. Alexius.

Smegma moschatum Damascenum.

℞. Smegmatis optimi, rasi. ℥. j.
Cinnamomi electi, Nucis moschatæ, Styracis calamithæ ana ℥. j.
Ligni aloës ℥. ij.
Belzoini ℥. ij.
Caryophyllorum ℥. j.

Conterantur omnia in puluerem tenuissimum, addendo,

Pulueris

A Pulveris Cyprici ꝑ.j.

Moschi, Zibetti ana parum.

Mergantur in aqua rosarum: postea cum ad solem dies quadraginta fuerint relicta, fiant pilę, quę seruantę sunt in uasis ligneis cum bombyce. Alexius.

Smegma album, odoratum Damascenum.

℞. Smegmatis communis antiqui, rasi, quantum sufficit.

Siccetur bene per dies octo, aut decem: deinde contundatur, & cribretur, fiatq; puluis: cui adde ℥.x.

Ireos ꝑ.iiij.

Santali albi ꝑ.iiij.

Mahaleb ꝑ.ij.

Farinę Amyli ꝑ.j.

Redigantur in puluerem omnia, misceantur cum prædictis x. libris, & ponantur in mortario, unā cum ꝑ.j. Styracis liquidę, & pauco oleo spicę: contundantur bene omnia simul: demum cum farina amyli formentur pilę, seu globi: siccentur in umbra, & seruentur. Alexius.

Aliud optimum, eiusdem.

℞. Moschi in aqua rosarum dissoluti G.vj.

Zibetti G.iiij.

B Misceantur cum supra dicto smegmate. Verum moschum in aqua rosarum calidum esse oportet.

Aliud, manus dealbans.

℞. Amygdalarum amararum, mundatarum, & contusarum ℥.j.

Saponis Saraceni, ad oui magnitudinem.

Sinapis cochlearium j.

Trita omnia misceantur bene. Marinellus.

DE PVLVERIBVS ORNAN-

TIBVS DENTES CAP. VIII.

Puluis dentes dealbans.

℞. Coralliorum rubrorum, Ofsium Dactylorū, Punicis, Ofsium Sepiæ, Salis alsi ana q.f.

Misce, & fiat puluis. Bayrus.

Alius gingiuas etiam roborans, & dentes confirmans.

℞. Coralliorum rubrorum, Margaritarum, Sanguinis draconis, Boli Armeni, Thuris, Cort. Cancrorum ana part.j.

Misce, & fiat puluis. Fumanellus.

Dentifricium optimum.

℞. Hyssopi, Origani, Menthæ ana ꝑ.ij.

HHh 3 Aluminis

798 DE PVLVERIB. ORNANTIB. DENTES.

Aluminis scissilis, Cornu cerui, Salis communis ana ʒ. j. A
Excipiantur, & urantur in olla donec in prunas reducantur. adde,
Piperis, Pumicis, Pyrethri, Masticis ana ʒ. ʒ.
Myrrhe, Cinnamomi ana ʒ. j.
Fiat puluis subtilissimus. Rondeletius.

Puluis dentes dealbans.

ʒ. Ossium Sepiæ, Marmoris albi, usti ana ʒ. j.
Caryophyllorum, Cinnamomi, Pyrethri ana ʒ. iij.
Spongiæ, Pumicis, Salis ana ʒ. j.
Misce, & fiat puluis subtilissimus, quo fricentur dentes. Marinellus.

Alius ad idem.

ʒ. Zingiberis, Cinnamomi, Caryophyllorum ana ʒ. ʒ.
Pumicis ʒ. ʒ.
Ligni aloës, Nucis moschatæ, Macis ana ʒ. ʒ.
Piperis, Pyrethri, Sinapis, Staphisagriæ ana ʒ. iij.
Spongiæ, Marmoris albi ana ʒ. ʒ.
Ossium Dactylorum ustorum, Hellebori albi ana ʒ. iij.
Panis hordei usti cum sale & melle ʒ. ʒ.
Tegularum rubrarum, Cornu ceruini usti, Aluminis Plumæ, Ossium Oli-
uarum ustorum, Ossium Myrobal. ustorum ana ʒ. iij. B
Misce, & fiat puluis subtilissimus. Marinellus.

DE PVLVERIBVS ORNANTI-
bus manus.

Puluis manus reddens albas.

ʒ. Farinæ Fabarum, Lupinorum ana ʒ. vj.
Farinæ Amyli ʒ. vj.
Oryzæ, Fabarum minutarum, Ireos ana ʒ. vj.
Misce, & fiat puluis, quo lauentur manus cum aqua. Marinellus.

Alius ad idem.

ʒ. Pinearum mundat. contuf. ana ʒ. ij.
Sinapis lb. j.
Amygdal. mundat. contuf. ana ʒ. ij.
Fiat puluis, qui ad solem siccetur, quo fricentur manus cum succo limo-
num, deinde cum aqua. Marinellus.

Alius ad idem.

R. Sem. Eruçæ ʒ. vj.
Ireos ʒ. j.
Cumini ʒ. j.

Aluminis

Aluminis Fecis ℥.β.
Sacchari candi ℥.j.
Tragacanthę ℥.j.
Caphurę ℥.j.
Pinearum mundat. Amygdalarum mundat. ana ℥.iij.
Medullę panis albi ℥.β.
Saponis antiqui rasi ℥.ij.
Trita omnia misceantur: fiatq; puluis ad manus lauandas. Marinellus.

IO. IACOBI VVECKERI BASILIENSIS,
& Reip. Colmariensis Physici, Antidotarij
Specialis Lib. III. & ultimi
FINIS.

HVMANO

HVMANO LECTORI S.

OMNE tulit punctum, qui miscuit utile dulci: inquit poëta. Quamobrem nos quoq; ad tuam utilitatem, Lector humanis. omnia accommodare studuimus: eamq; ob causam Antidotario nostro geminum Indicem adiunximus. Medicamentorum unum, tam Simplicium quàm Compositorum: eo modo, quo singula in Pharmacopœorum officinis nominari, & à Medicis usurpari consueuerunt. Alterum deinde Curatiuum seu Practicum. Quia enim Cōpositiones in Antidotarium nostrum collectæ, aliæ alijs atque alijs cùm morbis, tum corporis humani partibus inseruiunt, eiusq; rei ratione etiam distributæ sunt: modus quoq; aliquis fuit adijciendus, quo ijs commodissimè uteris. Idipsum autem altero hoc Curatiuo Indice præstitimus. Nā si uel de morbo aliquo, aut corporis humani membro affecto, quæstio incidat: magnum remediorum numerum instituto nostro inseruientium, subministrabit: ut noster hic Liber iam non solùm Antidotarij, sed etiam magnæ alicuius Præceos munere fungatur.

Vale, & frueri.

INDEX

INDEX COMPOSITORVM
ET SIMPLICIVM, QVORVM IN HOC
Libro mentio fit.

A Budiacæ in Baioaria thermæ	8. b	agarici historia & uires	200. a
acacia	220. b	agnus castus	71. b
acetum scylliticum	327	agni casti flos	125. b
acetum rosaceum	343	agninus pulmo	246. a
acetorum parandorum modi	343	agrestia quid? & eius syrupus	292. b
acetosa	89. b	agrimonia consideratio	59. b
acetosa semen	163. b	aiugæ historia & uires	65. a
achantiæ radix	176. a	alabaster lapis	26. b
acinorum nuclei	168. a	alabastrites lapis uerus & fucatus	35. b
aconiti historia & uires	111. b.	aleyonij genera & uires	40. a
acori descriptio & uirtus	178. a	alismatici consideratio & uires	108. b
asphodeli historia & uires	190. b	allium cum uino contra uenena	10. b.
adamanti gemma consideratio & uires	31. b	eius uires	83. genera.
adiuti historia et genera	55. b.	allij uires	180. a
adiantibi aqua	265. b	alkakengi semen	163
adipes qui ad usus medicos conseruandi	251. a	alkali sal	18. b
adrianum	530	aloes historia & uires	221. b
aris usus in medicina quotuplex	3.	aloes lignum	202. a
eiusdem & ratio emendandi, uarij q; illius		aloes extractum	558. & 561
effectus	4. a	alphation trifolium	82. b
aris flos ut fiat & usurpetur	15. a	altheæ historia & uires	57. a
aris squamma	16. a	altheæ radix	176. a
aris usti uis & præparatio	15. b	aluminis uires	18. genera.
æruginis scoletia due species, utq; conficiantur	16. a. & inde,	aluminosorum balnearum uires	6. b
æruginis conficiendæ ratio	16. a.	amaracus	77. b
& usus.	ibid.	ambra odorifera	40. b.
æruginis urendæ ratio	17. b	eius alia confectio	
æruginum omnium communes uires	17. a	ambra Citrina	42.
ætitites lapis	37. b	eius delectus, usus, & generatio.	ibid.
agaricum trochiscatus	684	ambrosia Archibij	528
agarici extractum	558	amerina salix	71. b
		amethysti lapidis historia & uis	32. b
		amiantus lapis	38. a
		amygdalarum delectus & uires	158. a
		ammi semen	159. b
		ammi	72. a
		ammoniacum	230. b
			ammos

IN ANTIDOT. SPEC.

ammoniacus lapis	18.b		cochlearum	271.b
amonum	71.b		fortis	285.b. & inde.
amomi flos, & eius succedaneum	123.b		ad hydropem	283.a
amomi semen	159.b	Aqua	ad phthysin	283.b
ampelitis terra	12.a		somnum concilians	276.b
amuleta ex lapidibus	32.a		tartari	278
amygdalarum oleum	217.a		theriacalis	274.b. 278. 279
amygdalarum gummi	233.a		mulse preparationes binæ	299
amygdalarum dulcium confectum	697		uite uarijs modis preparatio	271.
amylum	218.b	Aqua	& inde.	
anacardiorum historia & uires	141.a		usus quotuplex 5. eiusdem des	
anagallis	105.a		lectus.	ibid. & 6
anatum adeps	251.b		contra pestem	276. 277
androseni consideratio & uires	65.b		capillos augetes & prohibetes	723
anemones historia & uis	127		capillos tingentes	721
aneibi semen	158.b		capillos longos reddentes	721
aneibi historia & uires	65.a		caponum distillate	270. & 271
angelicæ eiusq; radicis historia	196.a		dentes dealbantes	285. 725.b
angelicæ consideratio & uires	63.b		faciem abstergentes	727. & inde.
animalium partes quæ ad quos usus medicos			faciem iuuenilem efficientes	742
seruandæ	246. & inde.	Aqua	faciei maculas tollentes	743
anisi semen	159.b		faciem tingentes & dealbantes	732
anoris radices	196.b		faciem rubificantes	738. & inde.
anserum adeps	251.a.b		faciem denigrantes	742
anseris sterces	256.a		oculos pulebros reddentes	714
antemidis historia & uires	59.a		odoratæ	719. & inde.
antibera semen	168.a		macilentum corpus efficientes	720
antimonij consideratio	22.a		uite uariæ	271. 272. 273. 274. 275.
antimonij uitri preparatio	641.b			276.b. 279. 280
anthos florum aqua	265.a		ad usum	284. & 285
apiastrum	66.b		aquarum distillatarum uariæ differentia &	
apis morsus	241.a		usus typo compressæ	260. & inde. ea-
apij enarratio & uires	63.b		rum parandarum ratio.	ibid.
apij semen	158.b		aquarum distillatarum ex compositis medica-	
apij radix	176.b. 180.a		mentis uariæ descriptiones	270. & inde.
apophlegmatismorum uariæ differentia, exem-			aquatilia	235.a
pla & usus	695		Arabicus lapis	36.b
aparine	110.b		Arabicum gummi	232.b
apri sterces	257.a		arenæ litoris uires	34.b
aqua auri	280.b		argenti spumæ epotæ usnenum & medicinæ	
aqua cauterialis	285.a			26.b
				argenti

I N D E X.

argenti scobs atq; limatura	22.b	auellanarum confectum	698
argenti spuma	22.b	auellanarum nucum oleum	217.b
argenti oleum	427	aurantia condita	547
argenti uiui epoti symptomata & medicina	26.b	auripigmenti facienda ratio & uires	20
argenti uiui consideratio & uires	22.b. eius	auripigmenti epoti effectus & remediū	26.b
epoti remediū	23.a	aurum potabile	427
aristolochie genera, & uires earum	185.a	auri olea.	ibidem.
aristolochie aqua	267.b	aurum precipitatum	467
armenius bolus multiplex, utiq; pro peste pares- tur	9.b	auri praestantia, foedina, & uarij usus	14
Armenius lapis	38.b	auri scobs remedio est argento uiuo epoto	23.a
arnabo arbor	193.b	aurifera flumina.	ibid.
aromaticarum confectioinum uariae differen- siae & usus	665. & 666. lege Tabulas.	aurea Alexandrina	524
aromaticum caryophyllatum	480	Auuia thermae ad Rotemburgum	8.b
aromaticum rosatum tabulatum	667	B	
aromaticum rosatum Gabrielis	479.b	Baccharis	72.b
aron, eiusq; radix	71.b. & 178.b	Badenicae thermae apud Heluctios & in Marchionatu	7.b
arthemisia aqua	268.b	balanus myrepsica	139.b
arthemisia historia & usus	64.a	balaninum oleum	217.a
asarum	70.b	balaustiorum flores	127.b
asari aqua	269.b	balnea corpus mundantia & abstergentia	745
asari eiusq; radiceis descriptio & uires	178.a	balnei preparatio & usus	4.b
asclepius	11.a	balneorum naturalium differentiae & uires	6.
asyl lapidis uires	31.b	& inde.	
Asinae { lac	251.b	balsamum Christi	447
tecur	246.b	balsamum mumiæ.	ibid.
stercus	256.a	balsami artificiales conficiendi rationes aliquot	
ungulae	251.a	440. & inde.	
aspalathi lignum	201.b	barba pastoris	98.a
asparagi historia & uires	56. semen 165.b.	bedelly historia & uires	226.b
radix	188.a	bedeguar radix	186.b
aspleni descriptio & uires	62.a	ben	139.b
asopadix	42	been quid sit, & quas uires habeat	186.b
assa dulcis & foetida	220.a.b	belzoarticus lapis, & eius uires	32
athanasia	70.a	belzoni gummi	231.b
athanasia maior & minor	521	benedicta laxatiua	503
athanasia Mibridatis	496	berberis	148.b
atractylis historia & uires	56	berberorum semen	168.a
atriplex	85.b	bete historia & uires	58.a
		bete radix	176.a
		betonicae consideratio & uires	64.a
		11i 2	betonicae

IN ANTIDOT. SPEC.

betonica aqua stillatitia	264	calamus odoratus	187.a
bezoartica aquae preparatio	273.a	calcis faciendae ratio, & eius uires	3.a
bismaluae consideratio	57.a	calcis epotae effectus & remedia	26.b
bituminis historia	42.b. 43.a	calendulae aqua	267.a
bituminosae thermae quas uires habent	6.b	camphora historia & uires	232.a
blatta bizantia	41.a	canceri fluuiatiles	45.b
blitum	88	cancrorum fluuiatilium uis in medicina	237.a
bolus Armenius quid, & ut possit parari pro peste	9.b	candelarum pro nocturno lumine delectus	1
borraginis aqua	269.a	caninum stercus	256.a
borraginis flos	123.a	canis rabidi iecur	246.b
borraginis historia & uires	57.b	cantharides 237.b earum uenenum & antidotus	238.a
borax 19.a natiuus	21.a	caput iuuantes sacculi	706
brancae ursinae, eiusq; radice uis	176.a	capillus Veneris	55.b
brassica marina	93.a	caponis distillandi rationes aliquot & inde.	270.
brassicae consideratio, usus, & uarij modi parandi	58.b	capparis	139.b
brassicae flos obaesum efficit.	ibid. 58.b	capparis cortex	207.b
brunellae aqua	266.a	capparum radices	176.b
bryoniae radix	183.b	caprae iecur	246.b
bubula medulla	249.a	caprinum lac	252.b
bubulinum seuum	251.b	caprinum seuum	251.b
bubulum stercus	256.b	caprinum stercus	256.a
buccinum, eiusq; historia	44.b	carabe	42.a
buglossium uerum & uulgare	57	carbonum in medicina delectus	1
buglossiae aqua 269.a. flos 123. 176.a	radix	carbunculi lapidis historia & uis	30.b
bulbus esculentus	191.b	cardamomi semen	160.a
buprestium uis uenenata & antidotus	239.a	cardui benedicti aqua	265.b
buphtalmi flos	123	cardui benedicti extractum	555
bursae pastoriae semen	168.a	carpobalsami historia & uires	141.a
butyrium	253.a	carui semen	160.a
buxus	202.b	cartamum	73.b
		cartami semen purgatorium	171.b
		caryophyllata	73.a
		caryophyllatae radix	187.b
		caryophylli flores	124.a
		caryophyllorum indicorum historia & uires	140.b
		caryophyllorum confectum	699
		castia condita 497. communis	498
		castia extracta sine & cum folijs senae	497
		castiae	
C Admiae historia	25.b		
caerae delectus & usus	253.b		
caerarum tingendarum rationes	637		
caeterab herba	62.a		
calamus aromaticus conditus	548		
calaminta	75.a		
calamintibae aqua	265.a		

I N D E X.

castiæ historia & uis purgatoria	150.a	ceratorum differentia & usus uarij	630
castiæ flores	496	cerui adeps	252.a
castorium	247.a	ceruini cordis os	248.b
castiæ historia	59.b	ceruinum cornu	248.a
cataplasmatum differentia & usus uarij	622	cerui genitale	247.b
catapotia. lege Pillulus.		ceruina medulla	249.a
catapotia de esula	117.b	cerussæ conficiendæ ratio, & eius uires	24.b.
catapotia semen purgans	171.b	& 25.a	
catharticum imperiale	511	cerussæ epotæ uis uenenata, & eius remedium	
catinum alumen	18.a	27.a	
cauteriorum effectus	2.a	cestri descriptio & nomen	64.a
cedria pix	231.a	ceti sperma	40.b
cedronella	66.b	chalcitidis natura & uires	20.a
Cellensium thermarum uires	8.a	chamarum historia & appellatio	45.a
centaurium maius & minus	74.a.b	chamæpitis historia & uires	65.a
centaurij flos	129.b	chameleæ uis purgans	116.b
centaurij magni radix	194.b	chamedris	73.b
centaurij minoris aqua	267.b	chamomillæ aqua stillatitia	264.b
ceparum natura & usus	180.b	chamomeli descriptio, generatio & uires	59.a
cerasti flores purgantes	151.b	chamomeli flos	123.a
cerasa condita	550	chelidonium maius	74
cerasa dulcia	147.b	chelidoniij extractum	555.a
cerasorum aqua stillatitia	264.a	chelidonia radix	191.b
cerasorum gummi	233.b	cherefolij aqua	267.a
Andromachi	630	chædrilla	88.b
Alexandri	632	chrysanthemi consideratio	109.a
de betonica	635	chrysochollæ consideratio	21.a
capitale.	ibid.	cicadæ	237.b
è cerussa	631	ciceris uires	166.a
diapente	632	cichorij flores 127.b. semen 163.b. ra-	
ex euphorbio	631	dices 182.b. eadem radices conditæ	550
gratia Dei	633	cicutæ historia & uires in.b. eius remedia.	
Ceratium { in frigidans Galeni	631	ibidem.	
{ æspatum Galeni 633. Philas		ciconiæ stercus	256.a
{ grij. ibid. Pauli	634.	cidonia condita	548
{ oxycroceum	633	cimicum uires	235.b
{ ex pelle arietina	634.	cimoliæ terra usus	11.b
{ saltalinum	631	cinabaris	15.a
{ stomachale Galeni	630	cinæ radix	195.b
{ è styrace	632	cinæ radicis decoctio	336
{ uiride Machæronis	635	cinnamomum	206.b

IN ANTIDOT. SPEC.

cinamomi confectum	698		aurantij florum	534.a
cinamomi aqua quomodo paratur	266.b		betonicæ	532
cineris uires & diuersitas	2.b.3.a		borraginis	534
cistus	102.b		buglossæ	534.a
citharus.	ibid.		capillorum Veneris	533
citrageo	66.b		caryophyllorum	534.b
citri confectum	698		florum cichorij	537
citria mala	142.a		enula	535
citrulli semen	167.b		euphragiæ	532
claretum laxatiuum	329		florum laudule	533
clareti uini confectio	321.322.326	Conserua	hyssopi.	ibid.
clysteru uariæ differentie typis expressæ	348.		maioranæ.	ibid.
eorum parandorum rationes uarijs affectibus accommodæ.	ibid. & inde.		melissæ.	ibid.
enicus	73.b		menthæ	535
enici semen purgans	171.b		uenupharis	536.a
enici seminis extractum purgans	558		pæoniæ	533
coccum	165.a		primule ueris	533
cochlearum aqua stillatitia	271.b		rosarum	536.a
cochleariu natura & usus in medicina	236.a		florum sambuci	535
colocyntidis historia & uires	152		saluicæ	532
colophonia quomodo fiat	233.a		florum stæcados	532
columbarum sterces	256.a		uolarum	536.b
			conseruarum differentie & usus typo expressus	531
			conseruarum parandarum ratio	532. et inde.
			consolida maioris radix	193. & 266.b
			conyzæ consideratio, genera & uires	75.a
			cotonea mala	142.b
			cotoneorum aqua	263.a
			corally historia & uires	41.a. oleum.
			ibidem.	
			cordiales saeculi	708
			coriandri semen	157.a
			coriandri semen uenenosum	170.a
			coriandri confectum	696
			cornus	148.b
			corrago	57.b
			corticum uariæ species & uires	205. & inde.
			costi descriptio & uires	181.a
			croci floz. & eius uis	123.b
			crocodili terrestriis sterces	257
			crocomaga	
de cornu ceruino duplex	691			
luteum	694			
nardinum	690			
de plumbo	692			
rubrum multiplex	693			
de thure duplex	690			
uiride multiplex	692. & 693			
collyria alba	693. & 694			
collyrioru differentie et usus uarij	689. et inde.			
conditorum uariæ differentie & usus	546.			
eorum parandorum ratio.	ibid. & inde.			
confectio anacardina	473. cordialis 483.			
liberalis	482. raudeseni 487			
confectorum differentie & usus uarij	696.			
eorundemq; parandorum ratio singillatim expressa.	ibid. & inde.			
conserua ab synthij	534.b. acetose 536.b.			
acori	532. anibos 532. afflenij 535.			

I N D E X.

crocomagma Damocratis	676	diacorallum trochiscatum	679
cristalli generatio & effectus	34.a	diacostum	487
cucumis	143.a	diacuminum duplex	484
cucumeris semen	167.b	diacucurma 486. idem minus	487
cucumeris sylvestris historia & uires	152	diacucurma tabulatum	668
cucumeris sylvestris radix purgatoria	200	diadictamnium	613
cucumeris sylvestris cortex	208.a	diagalanga	483
cucurbita 143.a. eius semen 167.a. aqua	263.b	diagingiber	485
cupressi genera, uires & usus	101.b	diabamatites	691
cupressi nux	138.b	diabyssopium	477
cupressi lignum	204.b	diaireos simplex & Salomonis	476.b
circumæ radix	188.a	diaireos tabulatum	667
ciscuta consideratio & uires 59. b. semen	164.a. aqua	dialacca	486
269.b	269.b	diamanna	501
cyclaminus 103. eius consideratio & uires. ib.	190.a	diamargariton frigidum 491. calidum	481.
cyperi historia & uires	682	frigidum tabulatum	669
cyphi	487	diambra	666. & 473
cyphoides		diamellotum Andromachi	609
D		diamoron	313
Dactylorum historia & uires	137.a	diamoscum dulce & amarum	474
daphnoidis descriptio & uires	116.a	diamoschi tabulatum	666
dauci semen	160.b	diamyrtha	691
decoctorum uariæ differentie 332. & inde.		dianisum	483
decoctorum parandorum ratio uarijs corporis	332. & inde.	dianisi tabulatum duplex	668
partibus accommodata. ibid. & inde.		diantbon	480
dentifricia	464	diaena	690
dentifriciorum uariæ species	709.b	dialibanum	524
diacalamintum	478	diapapauer	489.b
diacapparis	488	diapenidion 477. sine speciebus calidis	
diacassia 497. eius aliæ compositiones	498	490. etiam tabulatum	669
diacastorium	475	diaprasium	477
diacatholicon	498	diaphœnicon 504. aliud. ibidem.	
diaceuthidon Damocratis	496	diaphœnicum tabulatum	670
diachilon simplex 607. magnum & paruum	608	diapolipodion magistrale	510
diacidonia uaria	551	diaprunum simplex & compositum non laxatum	498
diacidonium simplex	548	diaprunum solutium	503
diacinamomum	484	diarrhodon abbatís 491. tabulatum	669
diacodion duplex	489	diarrhodon collyrium	694
diacorum	474.b	diastatyrum 494. idem aliter	495
		diatena	508
		diastolis	

CONTINDE X

emplastrum ex salice	620.	de tribus &		
quinque farinis	611			
emplastrum triapharmacum	614			
endiuiæ aqua distillata	262.b			
enulæ aqua	268.b			
epithemata pro capite	376.	pro corde	377.	
pro pectore	379.	pro stomacho.	ibid.	
pro hepate & arterijs manuum	381			
epithymi descriptio & uires	115.a			
epithymi flos	125.b			
equisetum	98.b			
equi stercus	256.a			
Eretriadensis terra facultas	11.a			
ericæ flos	124.a			
erinacci iecur	246.b			
errhinorum uariæ differentia uarijs usibus accommodata	367.	& inde		
erui semen	158.b			
erucæ consideratio	108.b			
erucæ aqua	268.a			
erucæ semen	159.a			
erucarum uis uenenata & antidotus	238.b			
eryngium conditum	549			
eryngij historia & uis	193.a			
erysimon	110.a			
erythrodani radix	183.b			
Esaræ antidotus	528.	eadem aliter	529	
esulæ cortex	208.a			
esulæ radix purgatoria, eiusq; dosis	200.b			
esulæ historia & uires	116.b.	eiusdē præparatio.		
ratio. ibid. catapotia ex ea.	ibidem.			
eubuli radix purgatoria	200.b			
eubuli uires	102			
eubuli aqua	270.a			
eupatorij aqua	267.b			
eupatorij genera, & eorum descriptiones & facultates	59.b			
euphorbium	231.b			
euphrasiæ aqua	265.b			
extracta uariarum rerum simplicium	555.			
compositarum	559			
				F
				F abarum uires & usus
				164.b
				fabarum flores
				130.b
				farfara & farfarellæ herbæ cōsideratio
				63.a
				fellis usq; usus & ratio conseruandi
				257
				ferri usus & temperies
				14.b
				ferrearum thermarum uis
				7.a
				fiuum historia, genera & uires
				136
				filix mas
				99.a
				filicis radix purgatoria
				198.b
				filigendule radix
				194.b
				flores calefacientes primo gradu
				123. secus
				do. ibid. tertio
				125
				florum uariæ differentia typo expressæ
				120.
				& 321
				flumina aurifera
				14.a
				fœniculus
				76.a
				fœniculi aqua
				265.a
				fœniculi confectum
				697
				fœniculi semen
				160.b. & 157.a
				fœniculi radice uires
				179.a
				fœnigræci semen
				157
				folia plantarum uarijs typis explicata
				46.
				& inde.
				(& inde.
				fomenta uaria uarijs usibus accommodata
				371.
				fomenta refrigerantia
				371. astringentia.
				ibid. aperientia
				372. discutientia. ibid.
				emollientia
				373. dolorem sedantia. ibid.
				formicorum oleum
				236.b
				fornacæ testa
				12.b. fornacum terra. ibid.
				fuliginis colligendæ ratio & eius uires
				2.a
				fumus terræ eiusq; descriptio
				85
				fumariæ uis purgatoria, utiq; paratur
				114.b
				fumariæ aqua
				261
				fraga
				149.a
				fragarica
				189.b
				fragariæ historia & uires
				106.a
				fragarum aqua
				264.a
				fraxini cortex
				207.a
				fraxini semen
				169.a
				fructuum uariæ differentia & effectus typis
				expressæ

kkk

IN ANTIDOT. SPEC.

expressi	133. & inde.	graminis radix	194. b
G Agates lapis	35. b	granatorum lapidum historia & uires	31. a
galactites lapis	36. b	gratia Dei emplastrum	611
galanga descriptio & uires	179. b	gratiola descriptio & uires	115
galbanum	227. a	guaiaci decoctio	335. & inde
galla historia & uis	143. b	guaiaci ligni historia & uires	203. cora
galerita	237. b	tex	206
galli ad colicam decoctio	338	gummi uariae differentiae & usus	225. et inde.
gallinaceus adeps	251. b	gypsi confectio & uires	26. b
gallinarum stercus	256. b	gypsi epoti effectus & remedia	27. a
gallorum delectus	237. b		
gallorum testes	247. a	H	
galliopsis	110. b	Aematitis lapidis historia & uires	32. b
gargarismatum differentiae	362	halicacabum	149. b
		halicacabi semen	163. b
		hederarum diuersitas & uires	65. b
		hedinius adeps	251. b
		helenium	76. b
		helenij descriptio, eiusq; radicis uires	179. b
		helichrysi consideratio	109
		Helueticae thermæ	7. b
		hemionitidis consideratio	62. a
		hepaticæ aquæ frigidae	263. b. calida 267
		herbæ calfacientes ordine primo	55. & inde.
		secundo ordine calfacientes	63. a. & inde.
		tertio 70. & inde. quarto ordine calfa-	
		cientes	83. & inde.
		herbæ frigidae in primo ordine	85. a. in se-
		cundo 88. & inde. in tertio	93. & inde.
		in quarto	95. & inde.
		herbæ humidae in primo ordine	96. in se-
		cundo.	ibid. & inde.
		herba peti & eius aqua	266. a
		herbæ exsiccentes ordine primo	97. & inde.
		secundo 98. a. in tertio 99. in quarto	101
		herbæ uenenosæ	111. b
		hermodactyli radix purgatoria	201. a
		hiera abbatii	512
		hiere picrae uariae cõpositiones	505. & inde.
		hiera Rufi	512
		hieracium magnum	102. b
		hieralogodion duplex	510. & 511
		Hippocras	
Gargarismata			
	consolidantia	365	
	pro dentibus.	ibid.	
	detergentia	364	
	pro morbo gallico	365	
	pro fetore oris	365. b	
	ad oris inflammatione	363	
	ad tussis inflammatione	362	
Gebersueilenses thermæ	8. b		
genista flores purgant	132. a		
genista semen purgatorium	171. b		
gentia aqua	268. a		
gentiane inuentio, historia & uires	189. a		
geodis lapidis uires	35. a		
Geppingenses thermæ	8. a		
gingiber conditum	548		
gingiberis confectum	699		
gingiberis historia & uires	187. b		
gith	78. a		
glandes suppositoria lenes	701. & 702. me-		
diocres & acres. ibid.	discutientes 703.		
dolorem sedantes.	ibidem.		
glastium satiuum	106. a		
glutinantia emplastra	614. & inde.		
glycyrrhiza	176. b		
glycyrrhizæ succus	218. b		
graminis aqua	264. a		

Hippocraticum uinum laxatiuum	331	intybus	89.a
hircina medulla	249.a	iridis historia & uires	185.b
hircinum iecur	246.b	ireos florum aqua	266.a
hircinus sanguis 249.a. eius preparatio. ib.		irionis descriptio & uires	110.a
hirundinum usus in medicina	237.a	isalis	106.a
hominis cranium	248.b	iua arthretica	65.a
humanum lac 252.b. stercus	256	Iudaicus lapis	37.a
hominis pinguedo	251.a	iuglandum cortices	207.b
hordei decocta aqua	333	iuglandes nuces	139.a
hordei uires & usus	163.a	iulapium hepaticum 312. rosarum, uiolarum,	
hormini historia & uires	108.a	oxalidis, pectorale.	ibid.
humidi flores in primo gradu 128. in secundo		iuiubarum uires & historia	138.a
do.	ibidem.	iuniperus	76.a
hyacinthus	89.b	iuniperi bacca 140.b. lignum 203.b. ex	
hyacinthi flores	127	tractum 555. eius usus.	556
hyacinthi radix	196.b	iusquiami semen	164.a
hyacinthorum lapidum historia & uires	29.a	K	
hydrargyrum mercuriale	459	Kermes	165.a
hyoscyamum uenenum, & qui ei aduersetur		L	
remedium	112.a	Lac amygdalarum	313
hyoscyami consideratio & uires	95.a	Lactis cuiusq; animalis uirtus	252.b
hyoscyami flores	128.a	eius serum	253.a
hyoscyami oleum	218.a	lacca	226.a
hyperici natura semen augens	108.b	laconici preparatio	4.b
hyperici historia & uires	63.b	lactuca	88.b
hypocistis	221	lactuce aqua	262.a
hyssopus	77.a	lactuce semen	166.b
hyssopi aqua	265.b	Lacuna distillatio caponis	270
I		ladanum	219.b
Iasmini flos	128.b	lanaria herba	84.b
iaspidum historia, diuersitas & uires	36.a	lapides primo gradu frigidi	29
ibiscus	57.a	lapides emollientes 35. obstupefacientes. ibi	
ignis usus in medicina & eius delectus	1	dem, & inde. frigidi & astringentes 34.	
infusiones uariæ	342	abstergentes, glutinantes, cicatricem inducen	
infusio uiolarum	305	tes 36. calculum frangentes, foetum retinentes,	
infusio lactis feri	343	menses mouentes 37. amuleti et purgantes 38	
infusiones purgantes bilem 343. pituitam		lapidum uariæ differentia & effectus	27. 28
344. melancholiam 346. astringen		lathyrus semen purgans	171.b
tes 384. emollientes & aperientes 385.		lauendula in nardorum genere est: & eius ui	
discuientes & calculum frangentes 386.		res	61.b
dolores mitigantes	387	lauendule florum uis	124.b
		kkk 2	
			laurus

I N D E X.

mandragoræ consideratio & uires	93.b	metallorum diuersitas & uarij effectus	152
mandragoræ descriptio & uires	182.b	& temperamentum.	ibid.
mandragoræ radicis cortex	207.b	metallorum ignitorum ad cauteria delectus	2
manna iherus	233.a	milium	163.b
manne historia & uires	222.b	millefolium	99.b
manus Christi perlata	669	millepedæ	236.a
marchasita	34.b	misæ	20.a
margaritarum historia 41.b. usus.	ibid.	misy delectus & uires	21.b
marina brassica	98.a	mithridatium Andromachi 527.	eius alie
marina medicamenta	39	quorundam compositiones.	ibid.
maris spuma	40.a	mituli	44.b
marrubium & eius uires	67.a	miua cidoniorū 292.	eadem aromatica 293
marrubij aqua	265.b	moly	101.a
mastiche	228.a	molybdene uires & consideratio	23.b
matrisalua	108.a	morochius lapis	36.b
meconium	221.a	mosellata alba	699
medullæ ad medicinam aptæ	249	mosus gallinæ	105.a
mei radix	195.a	moscus	259.a
melanthium	78.b	moscatum confectum	699
melanteriæ historia & uires	22.a	mumia Arabum	43.a
melicæ terræ uires	12.a	murium stercus	257.a
meliloti historia & uires	60.a	Musa Enea confectio	523
meliloti flos	123.a	muscioli	44
mellis historia & uires	253.b	myexis lapis	38.a
mellis rosati binæ compositiones	300	myrobalani conditæ	547.b. & 549.b
melissa	66.b	myrobalanorum historia & uires	151.a. &
melissæ extractum	555	152.a. & 153	
melissæ aqua	266.a	myricæ radix	184.a
melissæ flores	125.a	myricophyllum	99.b
melissophylli historia & uires	66.b	myrrhæ historia & uires	227.a
Melitenis terra contra uenena	10.b	myrrhis	67
melites lapis	36.b	myrtus	86.b
melonum aqua	264.a	myrtus syluestris	188.b
melonis semen	167.b	myrti baccæ	149.a
memphytes lapis	35.b	myrtillorum succus & syrupus	293
menta 78.a eiusdem aqua	267.a	myxorum historia & uis	157.b
mercurialis descriptio & uis purgatoria	113.b	N	
Mercurius præcipitatus 466. sublimatus	23.a	N Arcapthum lignum	203.b
mespilus	148.a	nardi descriptio & uires	61.a
mespila condita	550	napi semen	161.a
metalla uenenata	26.b	naphtha bituminis species	42. & 43
		K K k 3	nastura

IN ANTIDOT. SPEC.

nasturtium sativum	84.a		anethinum	402
nasturtij aqua	267.b		anisi	418
nasturtij semen	162.a		argenti	427
naxie cotis limatura	34.b		auri	426
nectar	317.322		auripigmenti	435
nenuphar	97.a		e baccis iuniperi 417. e baccis lauri. ib. e baccis hederæ	418
nepeta calamintha species	75.a		balsami	443
nicht grauu 26.a. uneyß	25.b		balsamitæ	413
nil album 25.b. gryseum	26.a		de beben	401
nigella	78.a		belzoinum	425
nigellæ semen 160.b. eius totius descriptio & uires.	ibidem.		ceræ	439
nitri sal. & eius differentia	19.a		calcinum	436
Norimbergensium extractum solutivum	359.b		capillos argentia 755. tingentia 656. longos reddentia 757	
nux moschata condita	547		caphura	424
nux pinea & eius uis	137.a		de capparibus	401
nuces iuglandes	549		castorei	439
nuces cupressi 138. iuglandes 139. scate	140		de castoreo	405
nucum iuglandium aqua	263.b		chamomelinum	411.b
nucum oleum	217.b	Oleum	cheyrinum	403
nympha	97.a		cinamomi	420
nymphae aqua	262.a		coralliorum	428
nymphae florum descriptio & uires	127.b		ex corticibus aurantiorum	421
			e cornu cerui	438
○ Cimi historia & usus	67.b		castinum	405
ocimi semen	159.a		crocinum	403
odorata aquæ	719		crystalorum	437
odorata smegmata	797. & inde.		cucurbitarum	409.b
odorata suffumigia	717		cumini	419
odoramentorum uaria exempla 710. & inde.			cupri	433
œnante	78.b		cydoniorum	407
œnantæ flores	125.b		ex eubuli granis	419
œnantes radix	183.b		ex semine eubuli	416
œnuleum	616		de euphorbio	405
æspus	259.b		faciæ exornãtia uaria 754 et inde.	
			ferri	434. & 435
{ absynthij	400.a		feniculi	419
{ eris	433		formicarum	414
Oleum { ammoniaci	425		frumenti	412.b
{ amygdalarum amararum	401		guaiaci	419
{ amygdalarum dulcium	410		garyophyla	

I N D E X

garyophyllorum	421		omphacinum	408
hydrargiri	435		ex ossibus humanis 438. & caluas	
hyoscyami	413		via humana, & e stercore bus	
hyperici 414. idē magistrale	415		mano.	ibid.
iasminum	411.b		ouorum	412.b
irinum	402		de papanere	406
ladani	425		perlarum	418
de lateribus	437		petrosclini	419
laurinum	414		de piperibus	405
lentiscinum	408		piperis	422
e lignis fraxini	420		plumbi	414
e lignis hederæ	420		populinum	415
e lignis iuniperi	420		raphaninum	415
ligustrinum	406		ricinum de cherua	410
liliorū simplex & cōpositum	401		rosaceū uulgare et cōpletū	408.b
lini	411		rutaceum	404
litbargyri	435		salis	429
lumbricorum	406	Oleum	sambucinum	413
macis	421		simpliciter	406
malorum aureorum	413		scorpionum 439. simplex	413.
maceris	422		compositum	414.
maisticis	423		sesaminum	410.b
maisticinum	400.b		spica	417
mellis	439		sulphuris 403.b. 429. & inde.	
melonum & cucumeris	410.b		eius alie compositiones	404.a
mentæ	400.a		stanni	433. & 434
moschelinum	415		stibij	432. & 433
myrrhæ	423		succini	424
myrtinū 407. 408. myrtillorū. ib.			e strace	411
narcissinum	411		talcī	436
nardinū simpl. & cōpositū	400.b		tartari	412.b. & 432
nenupharis albi & citrini	409.b		e taxo	438
e nucibus pineis 418. e nucibus			therebintinæ	425
cupressi.	ibid.		uiolaceum	409.b
nucum 404. de nucē moscata &			thuris 423. uitrioli	431
Indica.	ibid.		uulpinum	416
nucis moscatæ	422		ex uarijs simplicibus 217. & inde.	
onanthinum	411	olibanum		218.b
ad ornatus & fucus uaria	754.	oliuæ		148.a
& inde.		omphacini preparatio & usus		214.a
oliuarum 216.b. recens	410	onyx lapis		35.b
				opium

IN ANTIDOT. SPEC.

opium	221.b	pastil. lege Trochiscos	
opiatæ confectiones	521. & inde.	paulina	522
ophioscorodon	83.b	pentaphyllon	99.b
ophites lapis	36.b	pentaphylli aqua & radix	184
opopanax	224.b	pepli descriptio & uires	116.a
opopanax uis purgatoria	234.b	periclimenon 79.a. eius uis	125
orbiculi : lege Tabulas & Trochiscos.		peristereon	82.b
origanum	78.b	persicæ arboris uis purgatoria	113.b
origani aqua	367.b	persica condita	550
ornamentorum uariæ differentia	718	persicorum florum purgatoria uis	131.b. et 149
orobi semen	158.b	pepus menses mouentes & sistentes	704.
oriza.	ibid.	abstergentes, emollientes & anodynæ	705.
os de corde cerui	248.b	purgantes	706
ostracites lapis	37.b	petroleum bituminis species	42
ostrutium	195.a	petroselinum	79.b
osyridis consideratio & uires	61.a	petroselini semen	161.b
ouillum lac	253.a	petroselini radix	180.a
ouillum stercus	256.b	peucedanum & eius radix	177.a
ouorum alimentum & usus	254.a	peucedani consideratio & usus	68.a
oxalis	89.b	pharicum uenenum & eius antidotus	112.b
oxalidis aqua	262.b	pharmacitis terra	12.a
oxylapatium	85.b	philonium 521.b. eius alia cõpositiones	522
oxyleon	616	phrygius lapis	34.b
oxymel simplex & compositum	300. Scyls	piciorum fuligo	2.a
liticum	307	picis arida fuligo	2.b
oxyfacchara simplex	291. composita	pillularum uariæ differentia & usus	642.
oxytriphylon trifolium	82.b. & 100.b	& inde.	
P		Arabicæ	650
Panicum	170.a	abstergentes	646
papauer corniculatum uenenum	112.b	ex agarico	653
papaueris aqua	262.b	aggregatiua	665
papaueris genera & uires	96.a	alephanginae duplices	654. et 655
papaueris oleum	218.a	albandal	652
papaueris semina	164.a	Pilule	
paralysis herbae flos	128.b	de aloë & mastice	663. de aloë
pardi adeps	252.a	lota	664
parietaria	88.a	aperientes obstructiones	645
parietaria aqua	268.b	de arnoglossõ	649
parthenij consideratio & usus	70.a	arthretica	658.
passeris cerebrum	246.a	astringentes uarios fluxus & cathar	
pastilli Polyidæ	688	ros	644. & inde.
		aureæ	650
			Pilule

I N D E X.

bechicæ 653. alia uariæ compositio		pilulæ de tribus	664
tiones harum	654	pimpinellæ historia, genera, & usus	67.b
ex bdellio	644	pimpinellæ & eius radices uires	177.a
benedictæ	659	pimpinellæ aqua	268.b
ante cibum	655	pinæ nux	137.a
cochicæ	651	pinearum confectum	698
de colocynthide duplices	652	pinocatum.	ibid.
de cynoglossa	648	pini resina	229.b
de eupatorio	651	piperis historia & uires	141.b
de euphorbio	661	Piperinæ theriacæ apud Curiam	7.a
fætida maiores & minores	658	pira condita	549
de sumaria	660	pistacia	140.a
harmonia	649	pissasphaltii historia 43.a. effectus.	ibid.
ex balicacabo	664	pituyse descriptio & uis	119
de hermodactylis	658	pix, eiusq; uariæ differentia & uires	228.b.
hieræ simplices & compositæ	662	eius fuligo	2.b
de hiera cum agarico 652. alia		plantaginis descriptio, genera & uires	90.a
653.b		plantaginis aqua	264.a
hypoglottides astrictoria	645	plantaginis radix	197.a
imperiales	664	pleres archonticon	476
Indæ	660	plumbaginis consideratio & uires	23.b
de lapide Armeno.	ibid.	Plumbariensium theriacarum uis	7.b
de lapide lazuli.	ibid.	plumbi lotura & eius usus	23.b. & 24.a
lucis maiores & minores	662	plumbi mortarij uis	23.a
masticinæ	655	plumbi natura & usus.	ibid.
de mezereo	661	plumbi recrementum quomodo paretur	24.b
opiatæ & magistrales	648	plumbi urendi ratio.	ibid.a
ex opopanace	659	pæoniæ flos	123, 128
pestilenciales	657. & inde.	pæoniæ radices collectio & uires	185.a
ex rhabarbaro	651	pæoniæ semen 169. medetur uterinis.	ibid.
sabellia.	ibid.	polypodij radix	199.b
ex sagapeno	659	pnigitiis terræ uires	12.a
de sarcocolla.	ibid.	pollium montanum	100.b
Scribonij	649	polygonatum	192
de sex & octo rebus	653	polygoni historia & uires	90.b
sine quibus	661	polytrichon	55.b
stomacho conuenientes uariæ 654.		poma condita	548
& inde.		pompolygis genera & uires	25.b
de styrace triplices	649	porrum eiusq; uires	181.b
ex turbid uariæ	663	porrum capitatum	84.b
ex turbeto uariæ	657	portulacæ consideratio & uires	93.a
		L L l	portulacæ

IN ANTIDOT. SPEC.

portulacæ aqua	262.a	pumex ustus & non ustus	35.a	
portulacæ semen	167.b	punici mali flos	127.b	
potio impinguans corpus 744.	macilentum	purpurarum captura	44.a	
efficiens	745	purpurem color e purpuris animalibus	44	
præbij historia	67.a	pyrethrum, eiusq; usus	182.a	
primulæ ueris aqua	265.a	pyrites lapis & eius uires 33.a.	eius ustio. ib.	
propolis	254.a	pyrorum genera & uires	142.b	
prunellæ flos	128.b	ptysanæ præparatio	333	
pruna condita	550			
pruna dulcia purgantiæ	151.a	Q Verus facultates	103.a	
prunorum differentiæ	143.a	quinq;folium	99.b	
psyllion	91.a			
psyllium semen uenenosum	170.a	R Adicula	84.b	
psyllij uis purgatoria	171.b	radicum uariæ differentiæ & usus typis		
pulegium	79.b	explicati	173. & inde.	
pulegij aqua	269.a	rana	237.a	
Puluis	bizoarticus	452	rapæ semina	169.b
	contra casum	457	raphanus	180.a
	cerebrum siccans	452.a	raphani aqua	268.b
	contra lumbricos	460	rapi uires	177.b
	contra pestem	452	rapontici historia & uires	188.a
Pulueres	electuarij de bolo	452	reagal	20
	cutim abstergentes	465.a	reppis uinum	319
	dentes adornantes	798	requies Nicolai	523
	flatus discutientes	454	resinæ pini	229.b
	hepatici & cachexiæ conuenientes	455	rhabarbari differentiæ & uires	198.a
	incarnantes	465.a	rhabarbari extractum ut componatur uariarationes	556. & inde.
	purgantes bilem 457. pituitam		rhus obsoniorum	91.b
	458. hydropicos & reliquos humores, ibid. & inde.		ribes	148.a
	pulueres forinfecus corpori applicandi ad uarios effectus 461. et inde. capiti et cordi. ib. 462. et 463. hepatis 462. et 463. constringentes 464. abstergentes		ricini semen purgatorium	172.a
	464. & 465. sanguinem sistentes	465	rob de berberis 313. de nucibus & de ribes. ibidem.	
	stomachum confortantes 453. 454		rosarum descriptio & uires 126. a.	aqua
	stomachici	455	263.a. uis purgatoria	131.b
	puluerum uariæ differentiæ 450. & 451		rosata nouella	486
			rosmarini coronarij consideratio	68.b
			rosmarini flores	125.a
		rubi consideratio & uires	109.b	
		rubini lapidis consideratio & uires	30.b	
		rubrica sinopsis 10. b. fabrilis	11.a	
			risicus.	

I N D E X.

<i>ruscus</i>	188.b	<i>sanguines qui in medicina usum habeant</i>	249.a
<i>rutæ historia & uires</i>	80.a	<i>sanicula</i>	106.b
<i>rutæ semen</i>	166.b	<i>santalum</i>	204.b
<i>rutæ sylvestris</i>	101.a	<i>santi semen</i>	169.a
S		<i>santonici semen.</i>	ibid.a
<i>Sabina</i>	81.a	<i>sapæ præparatio</i>	214.b
<i>Sabinæ aqua</i>	269.a	<i>sapphirorum lapidum consideratio & facillitas</i>	29.a
<i>sacchari historia & uires.</i>	218.b	<i>sarcocolla</i>	233.b
<i>saccharum penidiatum</i>	699	<i>sarcocollæ uis purgans</i>	234.b
<i>sacchari coloribus uarijs insificendi ratio</i>	700.	<i>sardæ gemmæ historia & uires</i>	31.b
<i>ex saccharo formandi uarias figuras ratio. ibidem.</i>		<i>sarmentorum cinis</i>	31.a
<i>sacculi capitales</i>	706	<i>satyry distinctio & uires</i>	183
<i>sacculi cordiales</i>	708	<i>satyry extractum</i>	556
<i>sacculi pro uentriculo.</i>	ibidem.	<i>saurbrunen</i>	8.a
<i>sacculorum uariæ differentie</i>	706	<i>saxifragiæ aqua</i>	268.a
<i>sagapenti uis purgatoria & dosis</i>	234.a	<i>saxifragæ semen</i>	166.a
<i>falis flos 18.b. 40.b. fucatus. ibidem.</i>		<i>saxifragæ radix</i>	189.b
<i>falis genera & uires</i>	18.b. & 19.a	<i>scabiosæ consideratio</i>	69.a
<i>fales purgantes tuſſim 639. uterum 640. b. mouentes sudorem 641. erodentes. ibid.</i>		<i>scabiosæ aqua</i>	265.b
<i>falium differentie & usus uarij 639. eorum præparaciones. ibid. & inde.</i>		<i>scaiolæ alumen</i>	18.a
<i>falsæ parillæ radix</i>	196.a	<i>scammonij historia & uires</i>	222.b
<i>falsorum balneorum uires</i>	6.b	<i>schistos lapis</i>	34.a
<i>falamandriæ uis uenenata & eius antidotus</i>	239.a	<i>scincorum uis in medicina</i>	236.b
<i>faliuæ enarratio</i>	69.a	<i>scincorum renes</i>	247.b
<i>faliuæ aqua</i>	264.b	<i>sclarea</i>	108.a
<i>fambuci descriptio & uis</i>	116.b	<i>scolopendriæ historia & uires</i>	62
<i>fambuci aqua</i>	270.a	<i>scolopendriæ aqua</i>	269.b
<i>fambuci cortex medius</i>	207.a. & 208	<i>scordium</i>	69.b
<i>fambuci flores</i>	129.b	<i>scorpiones</i>	236.a
<i>fambuci radix</i>	201.a	<i>scylla historia & uires</i>	177.b
<i>famia terra uis & præparatio</i>	11.b	<i>sebesten purgatoria uis</i>	131
<i>fanius lapis</i>	34.b	<i>sebestenorum prunorum descriptio & uis</i>	137.b
<i>famsuchus</i>	77.b	<i>secacul</i>	194
<i>ſandaracha</i>	233.b	<i>ſedi historia & uires</i>	94.b
<i>ſandaracha genera & uires</i>	20.b. & 21.a	<i>ſelenites lapis</i>	38.a
<i>ſandaracha epota remedia</i>	26.b	<i>ſenarijus lapis</i>	26.b
<i>ſanzuis draconis</i>	220.b	<i>ſemen generantia</i>	108.a
		<i>ſemen argentia ſemina</i>	169.a
		<i>ſemen augentes radices</i>	194.a
		LLI 2	ſeminum

IN ANTIDOT. SPEC.

seminum uariae differentiae & uires typis expo- positae	154. & inde.	spicae nardi radix	194
semperuiuum	94.b	spicae nardi historia & uires	61.a
semperuiui aqua	263.b	spinae albae radix	186.b
senecta serpentis	259.b	spondij genera & consideratio	26.a
senae historia & uires	114. dosis. ibid.	spongiae	46
sepiarum ossa	46	spongiarum differentiae & uires	235.a
serapini uis purgatoria eiusq; dosis	234.a	spongiarum lapides	37.a
seri lactis infusio purgans	343	squinanthum & eius uis	124.a
sericum eiusq; uires	254.b	staphidis agricae semen	161.b
serpyllum	81.a	stercora uaria ad usus medicos utilia & inde.	255.a
serpylli aqua	267.a	stibij consideratio & uires	27.a
serulae campae consideratio	60.a	stocchadis historia & uires	69.a
sesannium oleum	217.b	stocchadis apices	123.b
sesami semen	164.a	stomachici sacculi	708
sescleos semen	161.b	stratiotes	99.b
seselios Brasiliensis uires & consideratio	107.b	strigmenta	258.b
sicci flores in primo gradu 128. in secundo & tertio.	ibidem.	strubium	84.b
sieff: lege Collyria	689	styrax	230.a
sileris montani semen	161.b	succi qui conferuntur & quomodo parentur, & usus singulorum	210. & inde.
sinapi semen	162.b	succini historia	47.a
sinapismorum exempla	636	sudor	258.b
sifymbrium	81.b	sudores mouentes radices	195.b
smaragdi facultas	29.b	succorum uariae differentiae & uires	209
smegmata odorata	797	suffimenta pro articulis	716
smilax uenenum & eius antidotus	112.b	suffimenta capiti conferentia	714
smyris lapis	33.b	suffimenta conferentia cordi.	ibid.
smyrnium	105.b	suffimenta pro pulmonibus	715
sodomeus sal	18.b	suffimenta pro utero	716
solanum eiusq; genera & uires	91.b	suffumigia odorata	717
solani aqua	262.b	suffumigiorum uariae differentiae & usus	713
solani semen	163.b	suillus adeps	251.a
soldanella	98.a	suillus pubno	246.a
somnum conciliantia olea	413	sulphuris differentiae & facultates	19.b
sonchi radix	190.a	sulphuris sublimatio	642
sorba	148.b	sulphureum oleum	19.b
sorba condita	550	sulphurearum thermarum uis	6.b
sory 20.a. eius genera & uires	21.b	suppositoria: lege Glandes.	
sotera	523	sympbiti enarratio & uires	62.a
spica Celtica eiusq; radix	193.b	sympbiti extractum	556
		sympbiti	

I N D E X

herdexurus lapis	38.b	preſi 314. & inde eorum conficiendo	
uerticis ofſiculum	248.b	rum ratio.	ibid.
ueſpis morſus	241.a	uinorum uaria differentia & earum uires &	
abſynthite purgans	330	uſus	214.b
abſynthite	319	uiola purpurea	96.b
alkekengi	324	uiolarum aqua	262.a
aniſi	324.a	uiolae hiſtoria & uires	126.b
betonicae	315	uiolarum uis purgans	132.a
borraginis 316. bugloſi	317	uiperinae carnes	236.b
ceraſorum	319	uirga paſtoris	98.b
e chamelea	330	uiride collyrium 692. eius aliae praeparatio	
enulatum	318	nes	693
eubulatum	330	uiſci lignum	204.a
euphragiae	315	uitex	71.b
faeniculi	316	uiticis ſemen	162.a
guaiacum	326. & 331	uitis albae radix	183.b
Hippocraticum 317.a. 318.b. 319.b.		uitrioli hiſtoria & uires	20.a
& 320		uitulina medulla	249.a
Hippocraticum laxatiuum	331.	uitulinus adeps	251.b
aliud	317. 318. & 319.b	unguentorum differentia & uſus, typis ex-	
Vinum		preſi	565. & inde.
hyſſopi	317	unguentorum parandorum rationes	569.
myrtites	325	& inde.	
onanthinum	325		
palmcum	325		
paſſulatum	318		
ex piris	325		
ex prunis ſylueſtribus	326		
ex punicis	325		
roſaceum.	ibid.		
roſmarini	315		
ſaccharatum	317		
ſaluia	316. & 324	Unguentum	
ſcamonites	329	Aegyptiacum 577. aliter	
ſcilliticum	327	idem	578
ſtecbadis	316	Agrippae regis	586
e thymclea	330	album uarijs modis	576
e ueratro nigro	329	apoſtolicum	575
zedoariae	327	arrogon	569
tamaricis	324	de artanita	575
uini clareti confeſtio uarijs modis	321	de artanita maior	586
uinorum uaria differentia & uſus typo ex		aureum	582
		baſilicon maior & minor	
		577	
		ex bellio	572
		Bernardinum.	ibid.
		ex bryonia	575
		ex cantharidibus	584
		caphuratum album & nis	
		grum	573
		capitale	583
		e caprifolio	



IN ANTIDOT. SPEC. INDEX.

	de caprifolio	582. & 583		ad fucos uarios usurpanda	757.
	ceraseos magnum	581. para		ad impetigines faciei	781
	uum	582. citrinum	578.	pro manibus dealbandis	782.
	comitissæ	574		& inde.	
	defensiuum magistrale	574.b		ornantia uentrem & pedes	796
	dialibea simplex	571. coma		pectus ornantia	796. & inde.
	positum	572	Vnguenta	scabiem curantia	786
	dia pompholygos duplex	581		pro scabie	580
	fuscum	584.		ad superciliorum uitia	772. ad
	de lythargyro	580		palpebrarum luorem	773.
	martiatum	569. idem aliter		lachrymas sistentia	774. ad
	maius & minus	570		barbæ casum	773
	de minio duplex	577		pro uerrucis & labiorum scisa	
	mudificatiuum magistrale	578.a		suris	781
Vnguentum	mirabile duplex	582	unicornu		248.a
	ad oculos magistrale	584.b	urina hominis		258.a
	Palmcum	616	urtica 83.a. fetida		110.b
	philagrios	571	urtica aqua 268.a. semen		159.a
	populeon	573	ursinus adeps 252.a. pulno		246.a
	potabile	583	uua passæ purgantes		151.b
	psoricum triplex	579	uuarum passarum historia & uires		137.b
	refrigerans Galeni	573	uuarum recentium uis		139.a
	resumptiuum	574.b	Vuuldbadenicæ thermæ		7.b
	rosatum	572	Vuisbadenses thermæ		8.b
	rubeum capburatum	579	uulpis pulno		246.b
	desiccatiuum rubrum	583.b	uulpinus adeps		252.a
	tetrabarmacum	575	uulturinum stercus		256.a
	uiolatum	573			
	uiride Andromachi	578			
	ad capillos conseruatiua	757. re-			
	stituentia	761. probibentia			
	765. auferentia	767			
	tingentia capillos flauos	769.			
	nigros	770. albos			
	771. rubros & crispas.	ibid.			
Vnguenta	pro combustionibus	784	X	Xilaloes	202.a
	ad cutis uitia in capite	775.		Xilocastia & xilocinamomum	204.a
	& inde.			Z	
	faciem illustrantia	787		Z Ambuci flos	128.b
	ad faciei uitia emendanda	779.		zarzæ parillæ decoctio	336
	& inde.			zaxenca coëctio	523
				zedoariae historia & uires	177.b.
				169.a. uinum ut conficiatur	327
				zibettum	259.b
				zuccharinum alumen	18.a
				zurumbet	193.b
				ziziphayum delectus & uis	138.a

FINIS.

INDEX

INDEX CVRATIVVS

A		ani proci ^d entia competens infestio	384																																
Abstergentia	balnea	390	<table style="border: none;"> <tr><td style="padding-right: 5px;">balnea</td><td style="padding-left: 5px;">392</td></tr> <tr><td style="padding-right: 5px;">clysteres</td><td style="padding-left: 5px;">355</td></tr> <tr><td style="padding-right: 5px;">collyria</td><td style="padding-left: 5px;">693</td></tr> <tr><td style="padding-right: 5px;">cortices</td><td style="padding-left: 5px;">207.a</td></tr> <tr><td style="padding-right: 5px;">emplastra</td><td style="padding-left: 5px;">617. & 627</td></tr> <tr><td style="padding-right: 5px;">errhina</td><td style="padding-left: 5px;">368</td></tr> <tr><td style="padding-right: 5px;">flores</td><td style="padding-left: 5px;">131.b</td></tr> <tr><td style="padding-right: 5px;">fructus</td><td style="padding-left: 5px;">150</td></tr> <tr><td style="padding-right: 5px;">linimenta</td><td style="padding-left: 5px;">164</td></tr> <tr><td style="padding-right: 5px;">pulueres</td><td style="padding-left: 5px;">457. & 467</td></tr> <tr><td style="padding-right: 5px;">pilule</td><td style="padding-left: 5px;">647</td></tr> <tr><td style="padding-right: 5px;">olea</td><td style="padding-left: 5px;">414</td></tr> <tr><td style="padding-right: 5px;">radices</td><td style="padding-left: 5px;">196.b</td></tr> <tr><td style="padding-right: 5px;">semina</td><td style="padding-left: 5px;">170.a</td></tr> <tr><td style="padding-right: 5px;">trochisci</td><td style="padding-left: 5px;">683</td></tr> <tr><td style="padding-right: 5px;">unguenta</td><td style="padding-left: 5px;">584. & 600</td></tr> </table>	balnea	392	clysteres	355	collyria	693	cortices	207.a	emplastra	617. & 627	errhina	368	flores	131.b	fructus	150	linimenta	164	pulueres	457. & 467	pilule	647	olea	414	radices	196.b	semina	170.a	trochisci	683	unguenta	584. & 600
	balnea	392																																	
	clysteres	355																																	
	collyria	693																																	
	cortices	207.a																																	
	emplastra	617. & 627																																	
	errhina	368																																	
	flores	131.b																																	
	fructus	150																																	
	linimenta	164																																	
pulueres	457. & 467																																		
pilule	647																																		
olea	414																																		
radices	196.b																																		
semina	170.a																																		
trochisci	683																																		
unguenta	584. & 600																																		
cataplasmata	624																																		
eclegmata	540. inde. & 544																																		
emplastra	611																																		
flores	130.b																																		
lapides	36																																		
res marinæ	44																																		
radices	191.a																																		
semina	168.b																																		
trochisci	682																																		
unguenta	195																																		
achor. s. curantia	775. & inde.																																		
astringentia	101. & inde.																																		
Astringentia	clysteres	351	<table style="border: none;"> <tr><td style="padding-right: 5px;">aperientia</td><td style="padding-left: 5px;">103</td></tr> <tr><td style="padding-right: 5px;">aperientes cortices</td><td style="padding-left: 5px;">207.a</td></tr> <tr><td style="padding-right: 5px;">aperientes radices</td><td style="padding-left: 5px;">191.b</td></tr> <tr><td style="padding-right: 5px;">apophlegmatismus ex succo betæ</td><td style="padding-left: 5px;">58.a</td></tr> <tr><td style="padding-right: 5px;">aranei muris percussio & remedium</td><td style="padding-left: 5px;">243.a</td></tr> <tr><td style="padding-right: 5px;">arteriarum ad manus epithemata</td><td style="padding-left: 5px;">381</td></tr> <tr><td style="padding-right: 5px;">iuuantes pilule</td><td style="padding-left: 5px;">658</td></tr> <tr><td style="padding-right: 5px;">calfacientia olea</td><td style="padding-left: 5px;">403. & inde.</td></tr> <tr><td style="padding-right: 5px;">calfacientes radices</td><td style="padding-left: 5px;">190.a</td></tr> <tr><td style="padding-right: 5px;">calfacientia semina</td><td style="padding-left: 5px;">166.b.</td></tr> <tr><td style="padding-right: 5px;">refrigerantia</td><td style="padding-left: 5px;">168</td></tr> <tr><td style="padding-right: 5px;">dolentes iuuantia unguenta</td><td style="padding-left: 5px;">600</td></tr> <tr><td style="padding-right: 5px;">iuuantia suffimenta</td><td style="padding-left: 5px;">716</td></tr> <tr><td style="padding-right: 5px;">refrigerantia electuaria</td><td style="padding-left: 5px;">492</td></tr> </table>	aperientia	103	aperientes cortices	207.a	aperientes radices	191.b	apophlegmatismus ex succo betæ	58.a	aranei muris percussio & remedium	243.a	arteriarum ad manus epithemata	381	iuuantes pilule	658	calfacientia olea	403. & inde.	calfacientes radices	190.a	calfacientia semina	166.b.	refrigerantia	168	dolentes iuuantia unguenta	600	iuuantia suffimenta	716	refrigerantia electuaria	492				
	aperientia	103																																	
	aperientes cortices	207.a																																	
	aperientes radices	191.b																																	
	apophlegmatismus ex succo betæ	58.a																																	
	aranei muris percussio & remedium	243.a																																	
	arteriarum ad manus epithemata	381																																	
	iuuantes pilule	658																																	
	calfacientia olea	403. & inde.																																	
	calfacientes radices	190.a																																	
	calfacientia semina	166.b.																																	
	refrigerantia	168																																	
	dolentes iuuantia unguenta	600																																	
	iuuantia suffimenta	716																																	
	refrigerantia electuaria	492																																	
eclegmata	539. & 543																																		
electuaria	492.b																																		
emplastra	605. 618																																		
errhina	369																																		
flores	130.b																																		
fructus	149.a																																		
marina	26																																		
metalla	25																																		
olea	411																																		
pilule	644																																		
pulueres	456																																		
radices	190.a																																		
resinæ	231.a																																		
trochisci	677																																		
uina	325																																		
unguenta	593. & 574																																		
alterantia extracta	555																																		
ambustis competentia unguenta	585																																		
ambustis medentes flores	131.b																																		
ambusibuenæ serpentis morsus & remedium	244.a																																		
anasarca competens syrupus	311.a																																		
angina conuenientia cataplasmata	626																																		
anginam iuuans unguentum	595.a																																		
		asciti conueniens syrupus	310																																
		aspidis morsus eiusq; remedium	245.b																																
		asthmati conueniens unum	318																																
		atrabentia cataplasmata	627																																
		B																																	
		Alnea artificialia refrigerantia	388.																																
		calfacientia	389. astringentia. ibid.																																
		MMM	emollientia																																

IN ANTIDOT. SPEC.

	emollientia, aperientia, & alstergentia				
	390. dolorem mitigantia	392			
	Basilisci morsus	245.b			
	bilem concoquentes aquae in uarijs corporis partibus	262. & inde			
	bilem respicientes clysteres	350			
	bilem preparantes syrups in capite	288. in thorace 289. in stomacho 291. in corde 293. in hepate	294		
	bilem alterans syrupus	308. purgans	309		
Bilem	{	purgans decoctio	337. praeparans	340.b	
		purgans clyster		358	
		purgantia electuaria		502	
		purgans errhinon		367	
		purgantes flores		131.b	Calfacient.
		purgantes liquores		221.b	
		purgantes fructus		150.a	
		ducentes pulueres		457	
		purgantes pilulae		650	
		purgantes radice.		198	
		purgantia semina		171.b	
		purgantes tabulae		670. & 672	
		purgans uinum		329	
	C				
	Acciliae serpentis morsus & remedia				
	244.a				
Calculosis	{	conueniens clyster		354	
		conuenientia electuaria		493	
		competentia electuaria		517	
		competens fomentum		372. & 374	
	conuenientes in fessis	386. 387			
	competentia uina		324		
	calculum comminuentes lapides		37		
	calculos frangentia olea		413		
	calculos frangentes resinae		233.b		
	calculum frangentia semina		169.b		
	calfacientes aquae ipsum caput	264. thora-			
	racem	265.b. cor 266. stomachum			
	267. hepar		ibid.		
	cerata			638	
	condita			558	
	electuaria			473	
	emplastra			605	
	flores ipsum caput	128. pectus			
	129. alias partes corporis	singillatim.		ibid.	
	flores primo gradu	123. secundo			
	do. ibid. tertio			125	
	linimenta			563	
	liquores primo ordine	218.b.			
	secundo	219.b. tertio 220.a			
	marina	40. refrigerantia		41	
	metalla ordine secundo	14. ordine			
	tertio	13. in quarto		20.	
	lapides			32	
	olea ipsum uentriculum			400.	
	hepar & lienē			401. uterus	
				402. articulos	403. nervos
				405	
	radices primo ordine			176.a.	
	secundo. ib. b. tertio			178.a.	
	quarto	180. calfacientes uarias			
	corporis partes singillatim			185. & inde.	
	semina diuersas corporis partes	singillatim		165. & inde.	
	trochisci			676	
	uina uarijs partibus accommodata			315. & inde.	
	unguenta			569	
	calidi cortices			206. & 207.b	
	calidi fructus in primo ordine	138.a. in secundo			
	do 139. in tertio	140. in quarto		141	
	calida gummi primo ordine			226.b. secundo	
	do 227.a. tertio	230.b. quarto		231.b	
	calidae herbae in gradu tertio			70. & inde. in	
	gradu quarto			83. & inde	
	calida semina in primo gradu	157. in secundo			
	158. in quarto			162.a	
	caput calefacientia electuaria			473. & inde. caput	

I N D E X.

caput calefacientes radices	185.a	capillos tingentia unguenta flauos 769. nigros	
caput calefacientia semina	165	770. albos 771. rubros et crispas, ibid.	
iuuantes conferuæ calidæ	532. &	capitales tabulæ & confectiones calidæ	666
inde. frigidæ	536	canis rabidi morsui remedium	45.b
calefacientia ex floribus	128. et inde.	carnem auferentia unguenta	600
pectus	129	carnem generantes pulueres	465. et 466. tol.
calefacientia uina	315	lentes.	ibidem.
iuuantes clysteres	349	carnis generantia unguenta	597. inde. et 581
iuuans decoctum	334	caustica unguenta	584
iuuantia linimenta calida et frigida	564	cauterialis aqua	285
Caput { refrigerantes aque	262.b	cenobri morsus & remedium	245.a
refrigerantia electuaria	489	cerastis morsus & remedium	245.a
refrigerantes flores	130.a	cerebri epibemata	376
refrigerantia olea	446. cor 407	cicatricem induentia	106
purgantes pilule	661	cicatricem induentia emplastra	617
respicientes pulueres calidi	452	cicatricem induentes lapides	36
respicientes pulueres	461. et 465.b	cicatricem induentia unguenta	583. 599.
respicientes syrapi calidi	295.b.	& inde.	
frigidi	288	colicis competentia balnea	392
respicientes syrapi frigidi	288.b.	colicorum cataplasmata conuenientia	628
& inde.		colicis competens decoctio	338
dolorem sedantes pulueres	468	colicis competens fomentum	374
dolori competentia errbina	368.b	colicis conueniens infusio	345
dolori competens unguentum	601	colicis competentia unguenta	601
Capitis { dolori conuenientia unguenta	600	colicorum dolores sedantes pilule	647.
lotiones uariæ uarijs usibus destina		& inde.	
nata	394	combustis conuenientia unguenta	784
uita curantia unguenta	775. & inde.	conceptum adiutans balneum	389
capiti conferentia suffimentia	714	confectio hamech maior 509. minor 510.	
augentes & tollentes aque	721	concoquentia cataplasmata	624. & inde
augentia olea	755	de. 619	
exornantia unguenta	757. et inde.	cerata	634
restitutiuia 761. & inde. probi		clysteres	351
betia 765. auferentia 767		Consolidant. { emplastra	619. & 614
Capillos { flauos tingentia lixiua	746	gargarisma	365
longos efficiens aqua	721	pulueres	457
longos desosq; efficiens lixiua	752	unguenta	598
nigros tingentia lixiua	750	cor iuuantes conferuæ calidæ	534. frigida
tingentes aqua	721	536	
tingentia olea	756	cor calefacientes flores	129.b
		cor calefacientes radices	186.b

IN ANTIDOT. SPEC.

Cor	{	calesfacientia semina	165. b.	refrige-	dryini morsus & remedium	244. a	
		rancia		167. a	dysentericorum clysteres	357. & inde.	
		refrigerantes aquæ	263. a.	calfacie	dysenterie competens clyster	353	
		entes		266	dysenterie competens electuarium	517	
		refrigerantes flores	130. a.	humectan			
		tes & siccantes.	ibid.		E		
		roborantia condita calida	547	Laterium	223. b		
		respicientes pulueres foris applicandi	461. & 463	emollientia	104		
		cordi conferentia suffimenta	714	Emollient.	{	balnea	390
		decoctum	335. & 340			cerata	632
		electuaria calida	479			cataplasmata	624
		electuaria frigida	491			clysteres	350
Cordial.	{	epithemata	377			emplastra	607. 618
		pulueres calidi	452			flores	131. a
		syrupi frigidi	293.			lapides	35
		calidi	298			marina	42. & 43
		corpus mundantia & nitidum reddentia bal-				olea	411
		nea	745			radices	192. a
		cutim mundificantia balnea	745. & inde.	resinae	233. a		
		cutim mundificantes pulueres	465	semina	168. b		
		cutis uitij competentia balnea	390. & 391	trochisci	679		
		cutim aperientia emplastra	621	unguenta	594		
		D		epilepsie conueniens aqua stillatitia	272. a		
		Entes dealbantes aquæ	725. b	epilepticis conueniens uinum	329		
		dentes exornantes pulueres	798	epithematum uariorum ad uarios usus accom-			
		dentibus conueniens aqua	285	modatorum	376. & inde.		
		dentibus conuenientia gargarismata	365	ephemeri uenenum & antidotus	197. b		
		detergentia errhina	367	erodentia emplastra	621. b		
		detergentia gargarismata	364	erodens errhinon	367		
		detergentia olea	412. a	erodentia collyria	692		
		digerentia olea	412. a	erodentes sales	641		
		digerentia unguenta	594	erodentia unguenta	584. & 600		
		discutientia	104. & 167. & inde.	extenuantia 104. flores 131. a. fructus			
		Discutiēt.	{	cataplasmata	625	149. b. radices	191. b
				emplastra	620	extrahentia	105
				flores	130. b	extrahētia emplastra 621. a. unguenta	584
				fructus	149. a	extractorum differentie & compositiones	
				radices	190. b	554. & inde.	
		semina	168. b	F			
		dolorem mitigantia 111. a. lege Anodyna.		Faciei maculas tollentes aquæ	743		
				faciem abstergentes aquæ	727. & inde.		
				faciem illustrantia olea	754		
				faciem			

I N D E X

faciem mundificantia unguenta	779				
faciem illustrantia unguenta	787				
faciem tingentes dealbantesq; aqua	732				
faciem rubificantia aqua	738. & inde.				
tingentia	754.	erugantia maculis.			
ibid.	& 755				
faciem denigrantes aqua	742				
faciem iuuenilem efficientes aqua.	ibid.				
febris competens balneum	389				
febris conuenientia epithemata	377				
febris competens fomentum	371				
Elatius	<ul style="list-style-type: none"> pellens decoctum 335 discutientes flores 131.b discutientes fructus 149.b discutientes radices 193 discutientia semina 169.a discutientia tragemata 454 				
		fluxui alui competentia cataplasmata	623.		
		lege etiam Lienterian.			
		foetum retinentia emplastra	618		
		foetum retinentes lapides	37		
foetus retinentia unguenta	591				
Erigefacien.	<ul style="list-style-type: none"> aqua distillate 262.a.inde. carata 630 clysteres 350 condita 552 electuaria 489. & inde. flores primo gradu 125. se- cundo 127. tertio. ibid. b. in quarto 128 herbae in primo gradu 85.b. & inde. in secundo 88. et inde. in tertio 93. in quarto 95.b linimenta 563 liquores ordine primo 220. b. tertio & quarto 221 metalla in primo ordine 22. in secundo. ibid. lapides in primo 29. in se- cundo 30. in quarto 31. 34. 				
		olea ipsam caput 406. cor 407. pectus 409. hepar & uterum. ibid.			
		radices ordine primo 182.b.			
		secundo & tertio. ibid.			
		semina primo gradu 163. secun- do. ibid. b. tertio 164.a			
		trochisci 676			
		unguenta 569			
		fungorum sumptorum remedium	197.b		
		furjures capitis curantia unguenta	777		
		G			
		Gallico morbo conueniens gargarisma	365		
		Gallico morbo conuenientia suffumigia	717		
		Gallico morbo competentia unguenta	601		
		Ghutinan.	<ul style="list-style-type: none"> clysteres 353 flores 131.a fructus 149.b lapides 36 olea 413 radices 192.a semina 169.a simplicia 106 unguenta 583. & 598.b 		
				H	
Haemorrhoi morsus & remedium	244.a				
haemorrhoidibus competens infessio	384				
hepar iuuans linimentum	563.b. & 564.b				
hepatis inflammationi competentia cataplas- mata	623				
hepatis obstructioni competentes pilulae	641				
& inde.					
Hepatic.	<ul style="list-style-type: none"> condita 553 electuaria calida 486. & 515 electuaria frigida 516. & 492 epithemata 381 flores calidi 129.b flores frigidi 130.a olea 401 olea frigida 409 pilulae purgantes 650. & 664 				
		M M m 3			
		pulueres			

I N D E X.

	preparantes syrupe	309	oculorum uitia tollentia unguenta	773
	purgantia	508.b. & 310	oculos iuuans unguentum	584.b
	purgantia decocta	338. praes	oculos iuuans unguentum astringens	593. a
Melan-	parantia	341.a	liud digerens	594
choli-	purgantes pilulae	660	ophthalmiae fomentum	373
	prouocantes fructus	152.a	oris fetori competens gargarisma	365.b
	purgantes radices	199	oris inflammationi dicata gargarismata	363.b
	purgantes tabulae	673		
	purgans uinum	329	P	
memoriae conueniens aqua distillata		272.b	Alpebrarum liuore tollentia unguenta	772
memoriam iuuans uinum		316	pannos faciei curantia unguenta	779
	mouentia	108	parotidis iuuans unguentum	594
	mouentia electuaria	517.a	parotidibus conuenientia cataplasmata	627
	mouentes & sistentes flores	131.a	partus adiuuans unguentum	591
	mouentes fructus	149.b. sisten-	pectus refrigerantes flores 130.a. humectan-	
	tes	150.a	tes & siccantes.	ibidem.
	mouentes lapides	37.b	pectus refrigerantia olea	409.a
	mouentes pilulae	646	pectus ornantia unguenta	796. & inde.
Menses	mouentes pulueres	456	pectoris epithemata	379
	mouentes radices	194. sistentes 195	pectorale decoctum 334. alia eiusdem generis.	
	prouocans balneum	390	ibid. & inde.	
	prouocans infusio	385	pectorale decoctum	339
	prouocans fomentum	372	pectoralia unguenta calida	587
	prouocantia semina	169.a. sisten-	pectorales tabulae calidae	667
	tia.	ibid.	pedes exornantia unguenta	796. & inde.
	prouocans syrupus	312	pedum lotio	395. 396
	prouocantia unguenta	591.a. & b	pediculos tollens capitis lotio	394
	sistentia	109.b	pediculos tollentia unguenta	777
morbilorum uestigijs competentia remedia		785	pesti conuenientes aquae	276. & 277
N			pesti resistentes pulueres	452. & 453
Natricis morsus & remedium		245.a	pestilenciales pilulae uariae	657. & inde.
nephriticis competens balneum		393	pestilenciales trochisci duplices	682
nephriticis competentes clysteres		356. & 357	phalangiorum morsus & remedia	241.b
nephriticis competentia fomenta		372. & 374	phthisi conueniens aqua	283
neruos calfacientia olea		405	phthisi conueniens unguentum	598.b
nutrientes clysteres		349	pingue corpus reddens potio	744
O			pituitam preparantes syrupe in capite	295.
Obstupescientes lapides		35	in thorace 296. in corde 298. in sto-	
oculorum doloribus cataplasmata conue-			macho 299. in hepate 301. in utero	
nientia		628. & 626	302	
oculorum uitia emendant aquae		724	pituitam coequentes aquae stillatitia in uarijs	
			corporis partibus	264. & inde.
			N M M 4	pituitam

I N D E X.

venes iuuantia condita calida 549. lege Cal- culosos.	349.	splenem calfac. semina 166. a. refrigeran- tia	167. b
rubetæ uis uenenata & antidotus	239. b	spleni competentia electuaria 488.	uinum
rupturæ conuenientia emplastra 614. & inde.	634	32.4	
rupturis competens ceratum	634	splenem calfacientes radices	189. a
S		splenem iuuantes conseruæ calidæ	535. fri-
Sanguinem purgantia decocta	337	gida	537
sanguinem refrigerantes aquæ	262. a	splenem refrigerantia electuaria	492
sanguinis eruptioni cõpetens unguentum	587.	splenitica electuaria calida	315
alia ad eundem ex alijs partibus fluentem	593	splenetici flores frigidi	130. a
sanguinis fluxui ex naribus competens catao plasma	623	splenetici flores calidi	129. b
sanguines refrigerans & sistens iuleb.	312	splenetica pilule	646
sanguinem sistens errhinon	369	splenetica unguenta calida	589
sanguinem sistentes pulueres 465. b. & inde.	390. 391. & inde.	sputum sanguinis iuuantia loch	543
scabiosis commoda balnea	390. 391. & inde.	stomacho competentia fomenta	371
scabiei conueniens infusio 346. b. alia ad idem	347	stomachum calfacientes radices 187. a. seo mina 165. b. refrigerantia 167. con-	537
scabiei competentia unguenta 596. & 597	786	seruæ 534. b. frigida	662
scabiem curantia unguenta	786	stomachum purgantes pilule	263. b. calfa-
scabiem iuuantia unguenta	580	cientes 267. electuaria	492
scyrros hepatis & lineis curantia unguenta 589. b	589. b	stomachum roborantia condita calida 548. frigida	549. b
scirrhis affectibus conuenientia cataplas- mata	624	cerata 630. & inde.	
scolopendra morsus & remedium	242. a	electuaria calida	514
scorpionis morsus & remedium	242. a	electuaria frigida	516
semen augentes fructus	149. b	emplastrum	605
serosos humores purgantes pil.	661	epithemata	379
seca semina primo ordine 164. b. secundo 165. tertio.	ibid.	flores calidi	129. b
siccantia olea	410	Stomachic. { pulueres calidi	453
siccantes herbæ in primo ordine 97. in sec- cundo 98. in tertio 99. in quarto 101	184	pilule 654. & inde.	
siccantes radices ordine primo 183. secundo & tertio	184	syrupi frigidi 291. a. cali-	
siccantia metalla ordine secundo 14. tertio 15. quarto	20	di 299	
somnum concilians aqua	276	tabulæ calidæ 667. & 670.	
somnifera unguenta	585	frigida 671	
		unguenta calida 588. fri-	
		gida	592
		strumas discutientia	110. b
		strumas discutientes radices	197. a
		strumas tollentia semina	170. a
		sudorifera decocta	335. & inde.
		M M m 5	sudori-

IN ANTIDOT. SPEC.

sudoriferi sales	641	uenenis resistentia uina	326
sudorifera uina	326	Venerem adiuuantia electuaria 494. alia	
suffimienta pro morbo gallico	717	quadam	169.108. & 194
suffusioni competens unguentum	595	Venerem adiuuantia olea	414
superciliorum uitia tollentia unguenta	772	Venerem augentia & minuentia remedia	518
suppurantia	105.a	uentrem exornantia unguenta	796. & inde.
suppurantes flores 131.a. radices	192.a	uentriculum iuuantia : lege Stomachum.	
suppurantia semina	168.b	uentriculi dolorem iuuantia cataplasmata	628.
		flores	130
T Aratulae morsus & eius remedium	245.b	uentriculo competentia olea	400
temperati fructus 136.a gummi	226.	uentriculo conuenientes pulueres	462
herbae 55. metalla	14.a	uentriculo conuenientia uina	319.320
teneismi competens clyster	352.b	ueratri copiose sumpti antidotus	198
		uermes necantia unguenta	587
calfacientes radices	185.a	uermes necantes clysteres	354. & 355
calfacientia semina 165.b. res	167.a	uerucas tollentia unguenta	792. & inde.
frigerantia	317		& 781
calfaciens uinum	538.539.	uesicae morbis conuenientia electuaria	519
iuuantia eclegmata	et inde.	uesicae conuenientia unguenta	590
Thoracem iuuantia linimenta calida &		uesicam refrigerantia	130.a
frigida 563. lege etiam		uesicam calfacientes flores	129.b
Pectus.		uiperæ morsus & remedium	243.b
refrigerantes aquae	263.a.	uiribus reficiendis conuenientes aquae ut paren	
calfacientes	265.a	tur	270.a
refspicientes syrupi frigidi	289	uires reficientes aquae	270. & inde.
b. calidi	296	uires reficientia condita	551.b
tineam curantia unguenta	776	uires restaurantia suffimienta	714. lege
tonfillis inflammati conuenientia gargarismata		Cordialia.	
362.b		uisum adiuuans aqua	284. & 285
tussim iuuantes pilulae	645. & 639	unguium scabritiem tollentia unguenta	791.
tympaniti competens syrupus	311.b	& inde.	
		uomitum sistentes pulueres	456
V Ene nose radices	197.a	urin. is mouentia electuaria	517
uene nosa semina	170.a	urinam prouocantes clysteres	353.b. & inde.
uenenis resistentia	110.a	urinam mouentes fructus	149.b
	496	urinam mouentes pulueres	456
	131.b	urinam promouentes pilulae	646. & inde.
Venenis electuaria	450	uterum iuuantes conseruae calidae 535. frigida	
reflēt. fructus	196	dae	537
radices	169	uteri scyrrho competens medicamentum	358
semina	682	uterum calfacientes flores	129.b
trochisci		uterum	

I N D E X.

<i>uterum calfacientia olea</i>	402	<i>uterina unguenta calida</i>	591
<i>uterum calfacientes radices</i>	190.a	<i>uterini sales purgantes</i>	640.b
<i>uterum calfacientia semina</i>	166.b	<i>uterina suffimenta</i>	716
<i>uterinae iniectiones</i>	360. & 361	<i>uterini fyrupi calidi</i>	302
<i>uterinae aqua frigida</i> 264.a,	calida 268	<i>uterinae tabulae calidae</i>	668
<i>uterinum emplastrum</i>	607	<i>uulneribus competentia emplastra</i>	626.b
<i>uterina olea frigida</i>	409		

F I N I S.


B A S I L E A E,


EX OFFICINA EPISCOPIANA, PER
Eusebium Episcopium, & Nicolai Fr. hæredes. An-
no Salutis humanæ M. D. LXXIIII.
Mense Augusto.



EPI SCOP.







570-

