

PHARMACOPŌEIAE
MEDICO-CHYMICÆ,

LIBER IV.

Seu

PHYTOLOGIA.



PHYTOLOGIA est
pars Pharmacologiæ,
quæ agit de plantis,

Classes Phytologiæ
sunt 4. Prima enodat al-
terantia primaria, quæ sunt, plante,
harumque membra. Secunda, enucleat
alterantia secundaria, ut sunt; Succis,
Oleis, Resinis, Gummi-resinis, Gummata.
Tercia exhibet purgantia primaria.
Quarta describit purgantia secundaria:
utraque eodem modo cum prioribus
accepta.

N. Damus autem rerum quarum-
cunque 1. species vsualiores ab aliis di-
stinctas. 2. nomina seu titulos, quibus
Authores celebriores & famosiores eas
rubricant, i. e. titulos tenus inscribunt. 3.
Tempus ac locum natalem. 4. delectum.
5. Officinalia Natiua, i. e. quid de rebus
singulis crudè officinale sit. 6. Vires. 7.
Preparata vsualiora, &c.

Rubricas seu titulos vnâcum aucto-
rum nominibus addimus, non modo ut eo
facilius res quaesita occurrat, atque are-
liquis suis speciebus distinguatur, sed &
innotescat, quoniam authores & quam
illorum scripta ad vltiorè rei cognitio-

nem consuli, adiri queant. Sunt autem
Authores præcipui, eorumque scripta:

Amati Lusitani Enarrationes in li-
bros 5. Dioscoridis.

Andræ Cæsalpini de plantis lib. 26.
Augustanorum Pharmacopœia seu
Dispensatorium.

Bartholomæi Cartichteri herbarium
Germanicum in 8.

Caroli Clusij 1. historia rariorum
plantarum. 2. libri 10. Exoticorum. 3.
Corollaria in Dodoneum Gallica à se
reddidit, ut & in Garziam, Monardem
& Acostram.

Caspari Bauhini Pinax theatri be-
tanici. 2. Nota in Matthiolum.

Castoris Durantis herbarium in
linguam Germanicam à Clariss. Petro
Vffenbachio huius reipubl. Francofur-
tana olim Medico celeberrimo transla-
tum.

Christophori Acostræ historia aro-
maticæ & medicamentorum in Ori-
entali India nascentium, qui est liber 9.
Exoticorum Clusij.

Eurici Cordi Botanologicum.
Garziam ab Horto historia aroma-
tum & simplicium aliquot medicamen-
torum

torum apud Indos nascentium, qui liber est 7. Exoticorum Clusij

Hieronymi Tragi herbarium seu libri 3. de stirpium vsitatis nomenclaturis, &c.

Iac. Theodori Tabernamontani historia plantarum germanica libris 3. edita.

Ioachimi Camerarij 1. Hortus. 2. Epitome Matthioli, 3. Matthiolus German. quem nouis iconibus auxit.

Ioh. Baptistæ Portæ 1. Phytognomica. 2. Villa.

Ioh. Fragosi historia aromatum, fructuum & simplicium aliquot ex utraque India delatorum.

Iohan. Gerardi historia plantarum Anglica.

Ioh. Manardi libri 20. Epistolarum Medicinalium.

Leonhardi Fuschij historia stirpium. 2. Eiusdem icones in 8. 3. Eiusdem de compositionibus medicamentorum.

Matthæi Lobelij historia plantarum seu observationes & aduersaria à Lobelo

& Pena edita.

Nicolai Monardis simplicium Medicamentorum ex nouo orbe delatorum, historia: qui liber est 10. Exoticorum Clusij.

Ottonis Brunfelsii historia libris 3 comprehensa.

Pedacij Dioscoridis libri 6. de materia medica.

Petri Andreae Matthioli 1. Commentaria in Dioscoridem. 2. Eiusdem Epitome in 4.

Petti Bellonij observationes libris 3. expressæ, cum notis Clusij, cuius Exoticis subiunctæ sunt.

Prosperi Alpini de plantis Aegyptiis liber.

Remberti Dodonæi historia stirpium pemptades 6. seu libri 30.

Valerij Cordi annotationes in Dioscoridem. 2. historia stirpium. 3. Dispensatorium.

Et hi sunt Botanographi, quorum hac in parte fit mentio, omnis auctoribus pharmacopoëticis.

CLASS. I.

De Alterantibus primariis, quæ sunt Plantæ, harumque membra,
i. e. Radices, Folia, Semina, Cortices, &c.

I. Abies

Abies { alba, ἰλατὴν hæc præfertur.
rubra, αἶτος Picea.

Alba inscribitur Abies, Brunf. Trag. Matth. Cord. in D. Lob. Cast. Tab. Lon. Ger. Dod. (cui potius Picea.) Abies alba & femina, C. B. 2. Germ. Thannenbaum, vveiß. Thannenbaum.

Rubra insignitur, Picea Brunf.

Matth. Cord. in D. Leon. Lob. Cast. Tab. Germ. Abies 1. & rubra, Trag. Abies, Dod. Picea maior prima seu abies rubra, C. B. Germ. roth Thannenbaum, Fichte, Fichtenbaum.

N. Adeo conformes inter se sunt, ut nonnullis confundantur. differunt tamen, 1. quod folia Piceæ sint nigriora, latiora, molliora, lauiora, minus pungentia, ramos circumquaque vestientia, 2. quod Cortex

Cortex Picea sit nigrior, tenacior: abietis albicantior, fragilior. 3. quod Picea rami ad terram flectantur, secus ac abietis. & c. Matth.

Virent perpetua fronde nisi quod mense Maio foliis pristinis decidantibus, nova subinde renascantur. Montibus gaudet saxosis.

OFFICINALIA NAT.

Cortex (sed raro) Coni & resina.

N. Innaescitur & viscum abieti alba, quod Pliny & Theophrasti Stelin reputat Clusius

Vires, Cortex exiccat, adstringit. Ususque est praecipui externi in ulceribus & ambustis.

Coni (strobili Thanappfel.) exiceant & adstr. Usus itidem sunt imprimis externi inflammatione Epatis & aliarum partium (Epithema) in verrucis (cuius signaturam referunt) & clavis pedum abigendis (lorione.)

Resina ab abiete duplex colligi potest, liquida & sicca. Liquida (lacryma, oleum abiegnum) colligitur ex tuberculis (ceu ex Vomica) abietum nouellarum sed pauca: Haec Officinis Terebinthinae Venetae titulo venit (de qua class. 4.) sed perperam, siquidem illa (abiegnata) acrior ac calidior sit. Sicca ex Abiete & Picea colligitur: Haec uti Thus figuram ementitur, ita & usum eius amulatur.

PREPARATA.

Oleum still. Fit ex ligno per descensum igne leni, sic extillat clarum.

N. Rari est usus. Poterit tamen adhiberi in odontalgia, aliisque affectibus loco Terebinthina.

II. Abrotanum.

Abrotanum, abrotanum, abrotanum. Germ. Stabwurtz, Girtwurtz, Gertwurtz, Gartenheil.

Est } mas, quod vulgariter nomen abrotani retinet, & huius loci est faemina, Cupressus seu cyparissus hortulana, Vide s.l.

Loco gaudet temperato, praecipue dum adhuc in aetate adolescente constitutum est, coliturque in hortis.

OFFICIN. NAT.

Ex Abrotani maris variis generibus solum officinale est angustifolium maius: Huius extant in officinis fol. & gemma seu summitates collectae Augusto: huic succedit minus seu abrotanum humile,

Maius insignitur Abrotanum mas, Brunf. Dod. Matth. Lob. Cast. Tabern. malculum maius, Cam. primum, Trag. vulgare mas, Fuchf. Abr. mas angustifolium maius, Cast. Babinio.

Minus C. B. 6. Abrotanum 3. Trag. odoratum humile dense fruticosum, Lob. humile Tab.

Vires. Calf. sicca incidit, aperit, substringit, extergit, valide discutit, resistit putredine ac veneno, morsibus venenatorum animalium medetur, vermex necat, urinam mouet, impetus hystericos discutit, regium morbum soluit. Extrinsicus usus eius famosus est in ossibus excandis, roborandisque, & quia pilorum signaturam summitates eius amulantur, ad alopeciam tollendam maximopere commendatur.

PREPARATA.

1. ▽ stillat. Ex foliis ac summitatibus.

KKk 3 2. Vnum

2. *Vinum*: Veteribus in usu fuit creberrimo, modo non item.

3. *Conserua*: Ex summitatibus & flor. paratur vt conserua. absinthij.

4. *Oleum*: Infusum summitantium in O° communi.

5. *Oleum stillatitium*: Ex summitatibus ficcis.

III. *Absinthium,*

Absinthium. Absinthium. Arab. Absinthium, Afenesij, Sefurem, Alhanlais, Barus, Buleigi. Germ. Vermuth.

Est { *Vulgare rusticum nostrate* { *maius. C. Bauhin. N. 1. humilium montanum. C. B.*

Ponticum. Vide loco sequenti.

Maius insignitur, Absinthium ponticum seu Romanum officinarum C. B. 1. Absinthium Mati. Cord. in Dios. Lon. vulgare Trug. Fuchf. Lob. Cast. Tab. commune Cam.

Humilium: Abs. ponticum montanum. C. B. 2. Abs. montanum Cam. in Matth. seu Romanum Tab. tenuifolium ponticum Galeno.

N. Vulgare maius, illud est quod passim nascitur. Montanum in certis tantummodo locis prouenit, estque humilium communi. Et hoc si haberi possit eligere monet Tabernam.

Florent Iulio & Augusto.

OFFICIN. NAT.

Rustici Absinthij Folia ac Summitates.

Vires. Stomachicum inprimis est, hinc hepaticum spleneticum: calf. 1. (ad 2.) sic 5. aper. atten. astringit. amarum est: hinc vermes necat, bilem edu-

cit, crapulam discuit, sudorem ciet, febribus (praecipue tertianis) conuenit.

N. Capiti quia vapores crassos exhibet, pigritiam ac somnum inferre solet, minus tamen si prius per ∇ calidam trahatur leuiterq; exprimat. Extrins. arcet Vigiliis (temporibus ac plantis pedum impositum) conforat ventriculum, auditum acuit (suffitus aure susceptus.) &c.

PRÆPARATA.

1. ∇ still. Ex summit. & fol. recentibus.

2. *Spiritus*. Destillatur ex summit. siccis ∇ affusa fermentatis.

NB. Potest ad fermentandum \ominus aut simile quid addi. *Senn. in insit.*

3. *Succus expressus ac inspissatus*. Fit ex summitatibus siccis in ∇ coctis.

4. *Vinum absinthites.*

5. *Extractum liquidum seu Tinctura* Cum ∇ facta.

N. Eiusdem efficacia Tincturam facili negotio assequi poteris, si summitatibus aquam vitæ affuderis, parum accenderis atque hinc expresseris.

6. *Conserua*. Ex summitatibus paratur. *la.*

7. *Syrupus compositus*. Vide Dispens. August & Noriberg.

8. *Trochisci de Absinthio* Vide Disp. A. & N.

9. *Oleum infusum* Ex omphacio, & summit. absinth. cum Rosis. Vide D. Noriberg.

N. Augustam addunt quoque succum absinthij.

10. *Oleum stillatitium*. Cum aqua ac spiritu descendit.

11. *Sal fixum*. Ex incinerata planta *la.* elicetur.

32. *Sal.*

12. *Sal. volatile.* Ex succo l.a. confici potest, quod raro in usu.

N. Sunt cui absinthium hoc vulgare, veterum absinthium ponticum esse velint, adeoque & Romanum dicit.

13. *Trochisci de Absinthio.* V. Disp. IV. *Absinthium ponticum.*

Absinthium ponticum Officinarum. C.B.4.5. Absinthium ponticum & tenuifolium, incanum, nobile, Abrotanum minus & 1. *Trag.* Abr. femina. *Fuchf.* Lon. Abr. album. *Card.* Absynt. ponticum. *Matth.* *Fuchf.* (in iconibus.) *Tab.* Abs. tenuifolium. *Dod.* Germ. *VVelsch* *VVermuth*, *Garten VVermuth*, *Romisch VVermuth*.

Vires. Epaticum est pra vulgari. *Calf.* in princ. gr. 1. sicc. in princ. 3. minus amarum est, astringit, valideque incid. exterg. disc. putredini resistit, educit bilem per urinam; proin conuenit in omnibus affectibus Epatis, vesicae, bilis, ventriculi: tormina ventris & uteri sedat: minus commodè autem in mucilaginosi affectibus pulmonum, imprimis ob astrictiorem adhibetur. Extrinsecus discutit tormina ventris, ideoque & qua partum subsequuntur: infantum vomitum compescit. &c.

N. Huic affinia sunt, quae & in locum eius substitui cum commodo possunt, absinthium ponticum repens, ut & absinthium Nabathaeum seu tenuifolium Austruacum. C.B.4. & 5.

PREPARATA.

Preparata eius raro pro usu extant, parari tamen possunt non secus ac ex absinthio vulgari. ∇ *Stillat.* *Spiritus.* *Succus.* *Vinum.* *Extractum.* *Conserua.* *Syrupus.* *Oleum infusum* & *destillatum.*

V. *Acacia vera.*

Acacia Dioscoridi frutex lignosus

ac spinosus est, ex cuius femine maturo, eiusdem nominis succus exprimitur nigricans: ex immaturo; tubescens seu subfuluus. Et hic est vera veterum acacia, quae Theriacam ingreditur, recipiendaque est, ubi acaciae simplicitate mentio fit. Ex omnibus praestantissima perhibetur luteorubea odoris grati.

Vires. *Refrig.* *sicc.* *crassarum partium est, incrassat, astringit.*

N. 1. *Succus hic cum rarus sit, substituitur ut plurimum Acacia Germanica.*

N. 2. *Dat & aliam Acacia speciem arbuscula, quae G. Arabicum profert, sed minus vsitatam.*

VI. *Acacia Germanica.*

Αγγουκουρανδα *Prunus sylvestris*, *Brunf.* *Matth.* *Fuchf.* *Dod.* *Cord.* in *D.* *Lon.* *Lob.* *Cast.* *Tab.* C. B. 1. alias *Acantha*, *Arab.* *Schamuth.* *Schak.* *Halepi.* *Germ.* *Schlehdorn.*

N. *Prunus sylvestris* transplantatione diligentique cultura euadit hortensis, fructusque fert gradiores, quos Germani vocant *grosse Sarten schlehe.*

Floret primo vere: fructum fert matutum autumno.

OFFICIN. NAT.

Flores pruni sylvestr. raro *Folia*, rarissime *corticis radicum.*

Vires. *Folia.* *fructus,* *corticis* *refrig.* *exiccant.* *gr. 3.* *astring.* *incrassant.* *Vsus* praecipuus est in profluuiis alui, *Vteri.* *Extrinsecus* in gargarism. *balneis* *uterinis.*

Flores. *Resoluunt,* *Renum sabulum* *educunt,* *compressiones cardiacas leniunt,* *pleuriticam radicem resoluunt,* *alium laxant.*

N. *Accrescit nonnunquam muscus.* *qui specificè hernus conferre dicitur.*

P R A E P A R.

1. *Conferu.* Flor.
2. ∇ *stillatis.* Ex floribus elicita. M
N. *Alij cum vino distillant.*
3. *Syrupus:* fit ex multiplici florum
infusione, vt rosarum.
Vires. *Purgat leniter, prodest in plu-
ressi: tussi sicca, renes expurgat, &c.*
4. *Succus seu Rob prunor. syl-
uestrium solidius.* Ex fructibus exprimitur, inspissatur, inquetaleolas forma-
tus asservatur pro acaciae veterae substitu-
tione.
5. *Vinum.* Ex fructibus maturis exic-
catis. Nim. confusi hi rediguntur in glo-
bulos ac in furno exiccantur. Hinc in-
funduntur.
6. *Fructus conditi.* Fiunt cum mellis,
P. ij. & Vini p. j. l. a.

VII. *Acetosa.*

$\text{O}\xi\alpha\lambda\iota\varsigma\ \lambda\acute{\alpha}\tau\alpha\delta\iota\tau\epsilon$, Acetosa, German.
Sauvurampffer.

Est A- cetosa	{	Maior	{	hortensis rotundifo- lia.	{	plana & hac inter- dum folia habet cri- spa.
				syluestris seu pra- tensis		
		Minor ar- uenfis	{	Lanceolata ar- uenfis.	{	Non Lanceolata minima.

Ex his Officinis maior syluestris,
C. B. 1. in usu est, de qua vox acetosa
simpliciter intelligatur. Huic tamen
nisi praefere volueris, substituere non
citra rationem poteris, hortensem ro-
tundifoliam.

Maior syluestris insignitur Acetosa

pratensis, C. B. 1. Lapathum 4. *Diofc.*
Acetosa, *Len. maior, Cast.* Oxalis *Trag.*
Matth. Fuchf. Doa. Lob. Tab. Rumicis
4. genus, *Cord. in Diofc.*

Hortensis rotundifolia, C. B. 8. in-
signitur Oxalis rotundifolia, *Dod.* ro-
tunda, *Tab. fatiua Franca rotundifolia*
repens, *Lob.* Acetosa rotundifolia re-
pens, *Cam.* Acetosa rotundis foliis, *Cam.*

OFFICIN. NAT.

Exhibent vsui pharmaceutico *Folia;*
Radices & Semen.

N. *Radices asservantur excorticata*
Florent Majo, surgefc. semine Iunio
& Iudio.

Vires. *Cardica inprimis est & Epa-
tica; frigef. & sicc. 2. aperit, resistit putre-
dini, appetitum excitat, choleram repri-
mit, strim sedat, unde in febribus simpli-
cibus ac pestilentibus vstratissima est,*
*praecipue autem vsu interno; hinc & ex-
terno adhibita.*

P R A E P A R A T A.

1. *Conferu. folior.*
2. ∇ *destill.* Ex foliis.
3. *Succus.* Ex fol. rec. exprimitur, cla-
rificatur ac coagulatur.
4. *Syrupus.* Ex succo & sacchar. Au-
gust. $\frac{1}{2}$ Norib. $\frac{1}{2}$.
5. *Conferu.* Ex fol. rec. & sacch. $\frac{1}{2}$ aut.

VIII. *Acetosella.*

Trifolium acetosum, *Matth. Dod.*
Cast. Brunf. Oxys, Fuchf. Cord. Cam. Tab.
Oxytriphylon, Trag. Liniula, Alleluja,
Lon. Trifolium acetosum vulgare,
C. B. 1. *Buchampffer, Sauvurklee, Gu-
ckgugskee.*

Horibus

Estque { floribus albis.
 { floribus luteis.
 Floret Aprili ac princip. Maij. Locis
 gaudet nemorosis & arenosis.

mensum, Lienis ac Epatis, in dolore co-
 lico.

OFFICIN. NAT.

PRÆPARATA.

Folia acetosellæ albæ.
 Vires. Cardiacæ & Epaticæ est sin-
 gularis, acetosa vires nisi superans sal-
 tem emulans, adeoque actum febrilem
 mitigat, sitim sedat, &c.

1. ∇. Ex radice macerata.
2. Acorus conditus vulgaris. Vide
 Augustan.
3. Confecta radix.
4. Ol. stillat. cum ∇ ascendit.
5. Elect. diacorum. Vide August.
6. Extract. rad. Coque in Vino ex-
 prime & inspissa.

N. Acetosella Lonic. est acetosa ar-
 uensis lanceolata.

Vires. Plurimum valet in dolore co-
 lico. Dos. ℥j.

PRÆPARATA.

X. Acorus adulterinus.

1. Conseru. Folior.
2. ∇ stillat. Ex foliis.
3. Syrup. Ex succ. & sacchar. ℥. aut ℥j.
4. Conserua. Ex foliis.

Acorus adulterinus, C. B. 2. Aco-
 rus falsa, Cord. in Diosc. Acorum adul-
 teri. Frag. falsum, Matth. Gladiolus
 luteis liliis, Eric. Cordi, luteus, Fuchf.
 (icon.) Lon. Acor. Officinatum, Fuchf.
 Acorus palustris, Lob. Iris palustris
 lutea, Tab. Pseudoiris, Dod. Grem. gelb
 Schruvertel.

Acorus verus, siue calamus arom.
 Officinatum. C. B. 1. Acorus perperam
 Calamus arom. Officinatum. Mo-
 nard. Trag. Matth. Cord. Lob. Aco-
 rum, Lon. Cam. Tab. Ger. Acorum le-
 gitimum, Clus. hist. Germ. Calmus,
 Ackervurs.

Officinis raro inferuit vsu, coque in
 solâ radice effodienda sc. Septemb.

N. Acorus officin. dicitur vulgo cala-
 mus aromaticus, cum tamen cal. arom.
 proprie sic dictus herba sit ab hac di-
 uersa. Vide infra.

Vires. Exiccac, parum calefacit, at-
 tenuat, astringit, roborat, resoluit, vi pe-
 culiari ad neruosi generis & cerebri af-
 fectus commendatur, ut & ad dysente-
 riam, aliosque fluxus alui ac vteri sisten-
 dos. Extrinsicus ad dysenteriam præca-
 uendam, more nostratum, de collo suspen-
 di solet.

Colitur in hortis, soloque gaudet
 palustri.

OFFICIN. NAT.

PRÆPAR.

Radix, rarè Folia.
 Eligenda radix albicans sapore
 amara ac acris.

Nonnunquam inde paratum ex-
 tat Electuarium Stomachicum. Vide
 lib. 2.

Vires. Stomachicus est, calfac. &
 sic. in princ. 3. partium tenuium est
 atten. aper. vsus præcipuus in obstruct.

LLI XI. Adiantum.

XI. *Adiantum.*

Adiantum, Math. Dod, Capillus
Q vulgo Adiantum foliis cordi C.
B. 1. Adiantum nigrum, Cordi. Adiant.
nigr. verum, Tab. Ad album Plinij,
magnum, Trag. Lugdunense, Cam. Ger.
man. Fravvenhaar. Venushaar.

N. Adianti vox pluribus plantis im-
posita inuenitur. 1. Planta iam data 2.
Adianto aureo, polytricho. 3. Ruta mu-
riaria 4. Trichomani: ac prioribus hoc
loco, de posterioribus alibi

Aduehitur ex Gallia Narbonensi:
Floret æstate.

OFFICIN. NAT.

Herba seu folia.

Vires. Caliditate & frigiditate tem-
peratum est, exiccat, attenuat, aperit,
extergit, pulmonum renunque vitis
medetur, Epatis & Lienis obstructions
reserat, urinam & menses ciet.

N. Sunt qui Trichomani easdem vi-
res ascribunt, adeoque substitui posse au-
tumant: Aly. Rutam murariam.

P R A P.

1. *Aqua Ex fol.*
2. *Syrupus simpl. Ex decoct & sac-*
char. 5. August.
3. *Compos. Vide August. & Norib.*

XII. *Adiantum aureum.*

Polytrichū { *maius. Hoc minus vsuale.*
aureum { *medium. Hoc vsuale.*
{ *minus. Nec hoc officina-*
{ *nas subit.*

Dicitur Polytrichum aureum, me-
dium, C. B. 2. nobile vel primum, Trag.
aureum Apuleij vel 2. Lonic, Muscus
capillaris, Dod. Adiant. aureum mi-
nus, Tab. Germ. gulden Vaidershon.

OFFICIN.

Integra herba seu caulis cum foliis
muscolis & floribus.

Vires. De viribus apud auctores ni-
hil fere inuenitur. Carrichterus tamen-
ad morbos incantatione introductos com-
mendat, cuius rei gratia apud muliercu-
las celeberrima est.

Extrinsicus ob signaturam comm en-
datur ad capillos generandos

XIII. *Agallochum.*

Ξυλαλὸν Lignum aloes, Lon. Tab.
Agallochus seu Xylaloes, Cord. in D.
Lob. Cast. Tanrum, Cord. h. C. B. 2. Pa-
radis, oder. Aloës-holtz.

OFFICIN. NAT.

Lignum cuius frusta raro magna
ad nos aduehuntur, vt plurimum enia
in fragmenis nobis transmittitur,
quæ optima censetur nigropurpurea,
venis cinerij coloris interfecta, amara,
ponderosa, liquorem, si prunis. can-
dentine ferro imponantur, exudan-
tiã, suauem ac acidulum fumum, si
incendantur, præbentia, bullulasque
simul post se relinquuntia, haud ita
facile dispartentes: His adde haud po-
stremum bonitatis signum, si aqua su-
pernatatint.

Vires. Calfac. & sic. 2. confortati-
uum est omnium, viscerum ac præcipue
cerebri, Cordis ac Vteri; spiritus vita-
les ac animales recreat: hinc medetur
Lypothymia, amaritudine sua umbria
cor necat. Externè creber eius vsus est
in cucuphis & Epithematibus cordia-
tibus;

P R A P A R.

1. *Extractum. Fieri potest ad nor-*
mam aliorum Extractorum siue Gum-
mosum solum id expetatur siue simul
viscosum;

viscosum: De quo vide lib. 2. c. 57.

Angelus Sala. ꝛ. Fragmentor. elector. pulueratorum (instillari potest inter puluerisandum ▽ Rosar. ne quid auolet) ꝛj. digerit ac extrahit cum Vi rectificatissimi ꝛvi. vase clauso MB 3. digerendo. Decantato dein liquori affundit ▽ Rosar. ꝛj. abstrahit lentissimo calore V. Restantem Essentiam Resinosam lauat & exiccet, pro libitu coquit ad consistentiam, vt exinde trochisci formari possint.

Dosis gr. iiij. ad x.

Residua feces aptæ sunt quæ admisceantur candelis pro fumo.

Quercetanus. Extractum hoc seu gummi parat cum ▽ stillar. Hyperici aut Centaurij atque pro peculiari remedio habet in lumbricis ac putredinibus arcendis.

2. Species Diaxylaloes. Vide Disp.

3. Trochisci Diaxylaloes. V. Disp.

XIV. Ageratum

Alypator. Matth. Cam. Tab. Cast. Eupatorium Mefua, Trag. Matth. Lon. mentha corymbifera minor, Cord. hisf. Costus minor hortensis, herba Iulia, Balsamita minor. Dod. Ageratum foliis serratis, C. B. 1. Arab. Gafet. Leber-Balsam, kleiner Costen-Balsam.

Colitur hortis, floret Iunio.

OFFICIN. NAT.

Planta cum foliis & floribus.

Vires. Calf. & siccat. gr. 2. substantia tenuis, saporis aromatici, attenuat, extergit, putredini resistit, Epatica est, laxat aluum quam blandissime. Extrin. secus ciet urinam, vterumque emollit (suffitu.)

PRÆPAR.

2. Syr. de Eupatorio Mefua. Vide Disp.

Pil. de Eupatorio. Vide Disp.

3. Trochis. de Eupator. Vide Disp.

XV. Agnus castus.

Salix Amerina Diosc. Matth. Vitex. Trag. Dod. Cord. in L. Lon. Cam. Agnus castus, Cast. Eleagnon. Theophrasti, Lob Vitex foliis angustioribus cannabis modo dispositis, C. B. 1. Keuschzamb.

OFFICIN. NAT.

Semen.

Vires. Calf. & siccat. insigniter disc. menses ciet, appetitus venereos cohibet, semen imminuit.

PRÆPAR.

Trochisci. Vide Dispens.

XVI. Agrimonia seu Agrimonium.

Agrimonia, Brucef. Dod. Lob. Cam. Eupatorium, Matth. Fuchf. Cord. Cast. Tab. Vulgare, Trag. Eupatorium Græcorum, Lob. Cam. (Arabum enim Eupatorium vel Ageratum est, vel Eupatorium Cannabin.) Eupatorium veterum seu Agrimonia, C. B. 4. German. Agermenig, Odermenih, Adermenig, Bruchvouriz, leberkletten.

Floret fere æstate integra, crescit iuxta sepes,

OFFICIN. NAT.

Folia & Summitates.

Vires. Epatica nobilissima in primis est, hinc splenetica vulnerariaque: calf. & sic, 2. substantia est tenuis, aperit, deteg. subastr. corroborat Epac. eiusque fluxus coerces, adcoque usu creberrimo

LLL 2. venis

venit in morbis ab Epatis imbecillitate subortis, ut sunt Hydrops, cachexia, &c. extrinsecus adhibetur sapissime in balneis & lotionibus.

PRÆPAR.

1. ∇ stillat. Ex fol. & flor. velex integra planta circa finem Iunij collecta.

2. Succ. Ex fol. & flor.

2. Syrup Ex succo.

4. Θ ex cinere integræ plantæ.

XVII. Alchimilla.

Alchimilla, Trag. Dod. Lob. Tab. Ger. Vulgaris, Clus. hist. Cam. Pesleonis, Brunf. Fuchf. Leon. Brancha Leonis, Planta Leonis. (Dioscor. Psiadium.) Stellaria, Matth. Cast. German. Sinavu, gülden Genserich, Lavvenfuss, unser Frauvon Mantel.

Crescit loco vdo ac humido ac præcipue in pascuis, vnde & in hortos transplantari solet. Floret Majo & Iunio.

OFFICIN. NAT.

Folia.

Vires. Vulneraria est è nobilissimis non postrema, calid. & frigid. temperata, consolid. astring. exterget. sanguinem incrassat, proin vtilis fluxui mensum, &c. Vsuque adhibetur interno in potionibus vulnerariis, tum & externo.

PRÆPAR.

∇ . Fit ex integra planta, collecta mense Iunio cum floribus.

XVIII. Alkekengi.

Αλικακισος, Halicacabum, Cast. vulgare, Fuchf. Hal. vesicarium, Cam. Hal. seu vesicaria, Cord. Hal. Solanum halicacabum, Trag. Matth. Lob. So-

lan. vesicarium, Dod. Alkekengi, Lon. Saxifraga rubra & 4 Brunf. Solan. vesicarium 2. Bauhi. i. Iudenkirsch. Boborellen

Crescit in vineis inter vites, locisque opacis, floret Iunio, fructus fert ante autumnum.

OFFICIN. NAT.

Bacca quæ colore ac figura cerasa rubra præsentant, colligenda, circiter finem Augusti.

Vires. Refrig. & sicc. 2. Nephritica diuretica ac lithonriptica insignes sunt. Vsus præcipui in calculo renum & vesicae, in ictero (bacca & folia) in sanguine coagulato.

PRÆPAR.

1. ∇ stillat. Ex baccis.

2. Tinctura. Ex baccis cum ∇ propria.

3. Trochisci de Alkekengi. Vide Dispensat.

Alkermes vide Chermes.

XIX. Allium.

Σκίρδος. Dioscoridi, Arab. Chaum. Allium, Brunf. Trag. Matth. Cord. in Diosc. Lon. Lob. Cast. hortense, Fuchf. vulgare Cam. sativum, Dod. C. B. I. Knoblauch.

OFFICIN. NAT.

Radix.

Vires. Calf. & sicc. 4. incid. aperit. discut. alexipharmacum est Vsus præcipuus internus & externus in collica flatulenta, lubricis, peste (cum +) tussi, calculo. Extrinsecus in scabie, urina obstructione, apoplexia vterina (umbilico inungitur succus) tussi (inungitur plantis pedum cum axungia porcina).

N. Dulcius sapit si plantetur (existente sub Horizonte, eodemque tempore

re rursus effodiatur.

PRÆPARAT.

Electuar. de allio. Vid. l. 2.

Aloes lignum. vide Agallochum.

XX. *Alfina.*

Alfines varia à Botanicis exhibentur genera, è quibus potissimum vsualis est Alfina media, C.B. II. Alfina, Matth. Lob. Cast. Alf. maior, Fuchs. media, Tabern. Ger. minor, Cord. hist. Morfus Gallinæ. 1. Trag. German. Hünnerdarm. Hunerbiss. Vogelkyant.

Crescit in omnibus hortis & vineis. Prouenit hyeme floretque ad mediam vsque ætatem.

OFFICIN. NAT.

Folia, vel integra herba, sed raro.

Vires. Refrig & humect. 2. eisdem vires obtinet quas parietaria, præterquam quod non astringat: insigniter nutrire creditur, unde atrophiam, phibisique laborantibus esca salutaris æstimatur.

XXI. *Althæa.*

Althæa Dioscoridis & Plinij, C.B. 1. Althæa, Brunf. Trag. Matth. Fuchs. Dod. Cord. Vulgaris, Cam. Blus. hist. Malua palustris, Lon. Lob. Ibiscus Cast. Tab. Maluaniscus, Bisinalua, Ger. Germ. Erbschouurtz.

N. Quatuor faciunt althæa genera: althæam simpliciter sic dictam, althæam aborescentem, althæam palustrem, & althæam Theophrasti seu Abutilon Aui-cinna. Ex his primum officinis in usu est.

Crescit locis humidis, floret Iulio & August.

OFFICIN. NAT.

Folia, Radix, (collecta vere vel Autumno) Semen.

Vires. Herba calida est sicca (aliis humid.) gr. 1. (Radix calfac. in princ. 2.) emollit, laxat, discut. dolores lenit, tumores maturat, acrimoniam mitigat & corrigit. Vfus præcipuus in affectibus vesicæ, pectoris, v.g. pleuritide, &c. Vide Maluam, cum qua in qualitatibus omnibus conuenit: Externis creberrimus eius vsus est in cataplasm. clysteribus, &c.

PRÆPAR.

1. ∇ . Ex foliis & floribus.

Mucilago. Ex radice extrahitur cocta cum aqua.

N. 1. Vtiliter hac adhiberi poterit pro trochiscis sublingualibus incorporandis.

N. 2. Ex mucilagine hac insigne Extractum cum ∇ parari poterit, in lenienda faucium asperitate utilissimum.

3. Syrupus Althææ. Fernel. V.D.

4. Unguentum Dialthææ simpl. Ex solis emollientibus. Vide Disp.

5. Unguentum Dialthææ Compos. Ex emollientibus & discutientibus. Galbano scil. & S. hederæ. Vide iridem Dispensatoria.

XXII. *Amaranthus.*

Amaranthus, Matth. Am paruus, Cam. purpureus, Fuchs. Dod. Lon. Cord. in D. angustifolius simplici spicata pannicula, Lob. Amar. vulgaris, Tab. Amal. simplici pannicula, C.B. 4. Cir-cæa, Trag. aliis, Flos amoris, German. Flor-Amor, Tausentschæn, Sammet-blum.

Floret Augusto, colitur in hortis.

OFFICIN. NAT.

Flores.

Vires. Refrig. & sicc. modicè astring. Hinc vsus in fluxionibus cunctis.

LLI 3 E.g.

E.g. exputione sanguinis, diarrhæa, dysenteria, fluxu uterino, &c.

N. Sunt qui propinant ad lactis generationem iuuandam.

X XIII. Ammi verum.

Ami, Ami, Amm. Amcos, mios Ammeos, cuminum Æthiopicum. Ammi, Brunf. Trag. Cord. in D. Lon. commune seu vulgare, Dod. Cam. Ger. vulgatus, Lob. Ammiocelinum, Tab. Germ. Ammey.

Adfertur Alexandria Ægypti Venetias & in Germaniam.

OFFICIN. NAT.

Semen. Eligendum hoc est purum.

Vires. Calf. & sic. g. 3. tenuium partium est, incidit, aperit, disc. Hinc conuenit in dolore colico & uterino, in mensibus & urinâ obstructis, in inflatione ventriculi, vsusque præcipue interni est, hinc & externi.

X XIV. Amomum.

Amomum veterum quodnam sit, adhuc sub iudice lis est. Sunt enim qui Rosam Hierochontis esse velint, vt Cordus; alij aliud quid esse contendunt. Clusius tres eo nomine describit herbas, quas tamen cum Dioscoridis amomo minimè respondere confiteretur.

Officina duplex semen sub Amomi nomine monstrant, quorum alterum maius nigrum rotundumque est iustar granor. piperis rotundi vel cubebatum, gustu minime acre, quod videtur veterum esse sison, sinon, &c. Alterum minus semen & pallidum, vtrumque rarè in vsum venit, locoque amomi veterum recipitur Acorus.

X XV. Amygdala, seu Amygdala.

Amygdalæ fructus sunt, amygdali arboris, ique vel dulces vel amari. De Amydalo videatur, Brunf. Trag. Dod. Cord. in D. Lon. Lob. Cam. Tab. Matth. Germ. Mandeln.

OFFICIN. NAT.

Vtriusque nuclei amygdala vel amygdalæ dicti.

Vires. Dulces nutritiua sunt temperatè calida & humida, humorum acrimoniam lenientes, & hinc dolorem & Vigilias ab acrimonia oriundas, demulcentes, adhibenturque præcipue in Emulsionibus.

Amara sunt calida & sicca. 2. atten. aper. exterg. diuretica sunt, obstructioni iecoris, lienis, mesenterij, uterique conferunt. Extrinsecus lentigines tollunt, si masticata illinantur, capitis dolori subueniunt (in frontalibus.)

PRÆPARAT.

Confect. amygd. dulc.

amarar.

Ol. expressum amygd. dulc.

amarar.

Vires. Oleum dulce lenit, maturat, anodynum est, vsusque præcipui in colico ac nephritico dolore mitigando (propinatum dosi ℥j. vel ij. cum manna, vel & clysmati infusum) infantulis recens natis creberrimo ad tormina Ventris compescenda cum saccharo penidiato exhibetur ad ℥ij. quin etiam ad mitiganda tormina puerperarum vsus eius creberrimus est. Olei amari vires ex superioribus colligenda sunt.

N. Vfus interno recens expressum adhibendum est, non rancidum: Expri-mitur autem tum sine igne, i.e. non cal-faciendo

faciendo ad ignem vel cum igne.

XXVI. Anacardium.

Anacardinum, Matth. Cord. h. Lon. Cast. Trag. Tab. Ger. Arab. Balado. Anacardum, Elephanton, Lausz.

Fructus est arboris exoticæ, colore ac figura cor representans, præcipuè fissicatus sit.

Crescit in India Orientali.

OFFICIN. NAT.

Fractus (sed raro.

Vires. Calf. & siccat (non 4. nec 3. gradu) ut nonnulli volunt, sed remissius, Cephalicus est, memoriam ac sensus acuens ac confortans.

PRÆPARATA.

1. Elect. seu Confectio Anacardina. Vide Dispens.

2. Mel anacardinum. Ex fructurecenti in ∇ cocto supernatat. Vide Dispensat.

3. Oleum vel ex fructibus exprimitur vel in corticis coctione supernatat, sed rarissimum hoc est.

XXVII. Anagallis.

Anag. { Aquatica. Vide infra.
 { Terrestis { Mas flore phœniceo, C.B. 2.
 { Fœmina fl. cæruleo, C.B. 2. } ha officin. & huius loci.
 { Lutea inuistrata.

Mas insignitur Anagallis, Cord. in D. Brunf. Trag. Matt. Fuchf. Dod. Lon. Cast. Ger. Anag. phœnicea mas, Lob. Tab. Cam. mas, Chuf. hist.

Fœmina dicitur Anagallis fœmina, Brunf. Trag. Matth. Fuchf. Dod. Lon. Cast. Ger. Anag. cærulea, Tabern. Cam.

Dicuntur. Gauchheil, Colmarkkraut, Vogelkyant.

Crescunt in vineis, hortis ac aruis; lutea tamen non nisi in sylvestribus ac umbrosis locis prouenit.

Floret Majo & hinc per tota æstatem.

OFFICIN. NAT.

Folia cum floribus, sed raro.

Vires. utraque calf. & sic. amara est, exterg. & subastr. Unde & pro vulneraria habetur, morsus canis rabidi subuenire à nonnullis commendatur: adhibeturque usu interno & externo.

PRÆPARATA.

1. ∇ . Ex integra planta.

2. Succus. Raro extat, cum tamen maximè commendetur in Errhinis.

XXVIII Anagallis aquatica.

Anag. { folio subrotundo { maior, C. B. 1. } Ha vsuales & præcipuè
 { minor, C. B. 2. } minor.
 { Latifolia { maior.
 { Angustifolia { minor.

Dicuntur Beccabunga, Berola, Sium aquaticum, Lauer. Germ. Bæltibungen, VVasserbungea. Crescunt in riuulis. Florent Majo & iunio.

OFFI

OFFICIN. NAT.

Folia vel integra planta.

Vires. Calfac. moderate humectat.

Vfus precip. in scorbuto, urinam, calculum renum & vesica insigniter expellit, menses ciet, foetum mortuum eiicit, Extrinsecus opitulatur phlegmonis & Erypelat; maculas facies abstergit (cum sulfure.) Vulneribus medetur (cum ☉ & tela aranearum impos.)

PRÆPARATA.

1. ▽ Ex planta integra vel succo eius expresso.

2. Succus. Expressus & inspissatus: rui raro extat.

XXXIX Anethum

Aneth. *anethon*; Dill, Dillenkraut.

Aneth. Hortense, hoc vsuale. Syluestre.

Infigitur Anethum, Brunf. Trag. Matth. Fuchf. Dod. Cord. in D. Lob. Cast. Tab. Cam. Ger.

Crescit loco arenoso & aprico. Flor. Iun. Iul. Aug.

OFFICIN. NAT.

Folia, Flores & Semen.

Vires. Calfac. in princ. 3. sicc. in princ. 2 (radix calf. 3. sicc. 2. complete) diger. disc. maturat, lenit dolores, auget lac, conciliat somnum; venereos appetitus minuit, singultui vomituique medetur: Et hac omnia praestat vsu interno & externo. Inprimis tamen extrinsecus Clysteribus anodynis immiscetur, capitisque cataplasmatibus anodynis & somniferis (summitates cum oleo oliuarum cocta.)

PRÆPARATA.

1. ▽. Ex integra planta. (rari vsus est.)

2. Oleum insolutum. Ex foli. & flor.

3. Ol. stillati. Fit ex semine.

XXX. Angelica.

Hortensis seu fatiua, Costus niger. C. B. 1.

Syluestris { Major. C. D. 2.
Minor montana. C. B. 5.
Ex his in vsu est prima; Nec contemnenda tamen & secunda.

Prima dicitur Angelica, Brunf. Lob. Cast. Tab. Angelica major, Dod. Angelica fatiua, Trag. Matth. Dod. Lon. Ger. Ang odorata, Cam. Smyrniuum, Cord. in D.

Secunda, describitur syluestris maior, C. B. 2. Angelica sylv. Trag. Matth. Fuchf. Dod. Lob. Cam. Ger. Germ. Angelick Zwirtz, Geilgen Beistwurtz.

Crescit fatiua locis cultis, humidis ac pinguibus; Syluestris maior humidiora amat prata: Minor locis montanis opacis & nemorosis gaudet.

Floret Iulio.

OFFICIN. NAT.

Radix colligenda initio veris

Vires. Bezoardica & cordialis nobilissima est, Calf. 3. (sylv. maj. 2.) sicc. 2. aper. atten. sudorifica & vulneraria est: menses mouet, foetum expellit, suffocationi uteri maxime conducit, malignis morbis, venenis, ipsique pesti medetur: Venena omnis generis per sudorem pellit, adeoque vsu interno precipue, tum & externe adhiberi apta est. V. g. ad arcendam pestem (in amuleto, in sublingualibus) ad morsum canis rabidi (in cataplasma, & c.)

Dosis ʒj.

PRÆPAR.

1. ▽. Ex integra planta.

2. Succus. Ex radic. recent.

N. Potest & ex siccis radic. mediante coctione elici.

3. Extract. Fit cum ▽.

Dosis

Dosis à ℥ss. ad ℥ss.

N. *Quercetanus* extrahit. cum Spir. Juniperi. hydromelite Vinoso, &c. Vide pharmacop. rest.

4. *Condita radix*. l.a.

5. *Oleum stillat.* Ascendit cum ∇.

6. *Balsamus*. l.a. cum oleo nucistæ preparato fit.

7. ∅. Ex incinerata vel integra planta vel ∅ in destillatione remanente.

N. His adiungi potest rad. preparata, quam dicunt, i.e. in aceto macerata. Verum enim vero, quis dubitat, infusione hac magnam virium partem, menstruo communicari, adeoque radici decedere.

XXXI. *Anisum.*

Ἄνισον, ἄνισον, Anis.

Gaudet loco optimo & stercorato; feritur mense Martio, floret Julio, semen maturefcit Autumno.

OFFICIN. NAT.

Semen, raro Herba.

Vires. Calf. sic. 3. recens mirius est, atten. discut. diureticum est, lac auget, pulmonicum ac stomachicum imprimis audit: Hinc vsus precipui, in inflatione ventriculi, tussi, &c. Infantibus ℥j. exhibitum blande per inferiora ac superiora sabieram ventriculi intestinorumque iicit.

PREPARATA.

1. *Confectio*. Ex semine fit.

2. *Confectio Anisi laxativi simplex*. Fit scammonij cum saccharo mixtione, vel maceratione anisi in ∇, in qua scammonium fuerit dissolutum.

N. Alij in infusione ∅j anisum conficiendum macerant.

3. *Confect. anis. laxat. composit.* Vide August.

4. ∇. *destill.* Ex herb. & semine.

5. ∇ *vita Anisata*. Ex semine cum Vino destillatur. Vide lib. 2. de spiritibus.

Fieri itidem potest spiritus, si remanentia ex destillatione aqua residua cum facibus cereuisitæ fermentetur vel simili.

6. ∅∅ *stillat.* cum ∇ ascendit.

N. 1. Ex aniso stillat aqua lactea qua calori solis exposita copiosius oleum, ad superficiem mittit.

N. 2. Anisum diumacerare oportet. Sic dat ℥j. olei ℥ss.

N. 3. Anisi destillatio lento igne peragenda est, quia nimirum volatilior illa pars facilis est ascensu.

7. *Sal.* Ex incinerata planta vel remanentia destillationis.

8. *Species Dianisi.* Vide Disp.

XXXII. *Anserino.*

Argentaria, Argentina, Dod. Potentilla, Brunf. Matth. Lon. Agrimonia syluest. Anserina, Trag. Tab. German. Grensich, Genferich, Grünling, Silberkraut.

N. Est sine sapore & odore.

Crescit passim herbosis locis. pratis, iuxta sepes & vias. Floret appetente aestate, quo tempore & colligi apta est.

OFFICINALI NATIVA.

Folia vel integra planta.

Vires. Refrig. moderate, sic. forius, astring. constipat. Hinc sanguinis expuitioni medetur, diarrheam ac reliqua; aluitum & vteri fluxus, compescit; hamoptois & hemorrhoidis subuenit; renum calculum insigniter atterit: vulneribus insuper a modum conducit. Externe

MMm

famosa

famosa est in doloribus dentium mitigan-
dis, puredine gingivarum arcenda, aſtu
febrili ſopiendo, quem potenter compeſcit
ſi cum ſale & aceto contuſa plantis pe-
dum ſupponatur vel & carpiſ applicetur.

P R A P A R.

1. ▽. Ex planta integra.
2. ▽. Ex floribus.
3. Conſerua. Ex floribus.

XXXIII. Anthora.

Anthora, Matth. Lon. Caſt. Cam.
Anthora, Lob. Dod. Tab. Ger. vulgaris,
Cluſ. hiſt. Aconitum ſalutiferum ſeu
Anthora C. B. 17. Napellus Moysiſ,
Auicennæ, aliis Antithora (quod
Thoraæ pharmacum ſit,) Heilgiff,
Gifftheil.

N. Sunt qui radicem Contrayeuam
faciunt Germanicam: alij Zedoariam
Arabum, Auicenna ſcil. & Serapionis.
Vide Tabern. Herbar. lib. 1. qui poſterius
mordicus aſſerere nititur.

Creſcit in Alpiſ Heluelicis, in
Sabaudia, &c.

OFFICIN. NAT.

Radix.

Vires. Saporis amari eſt, caſſac. &
ſicc. cardiaca eſt: attent. aperit. abſterg.
Vſus præcipui in morbis acilibus vene-
natis, peſti ſpſice aduerſatur & pecu-
liariter Radici Thora.

Dofiſ à ʒʒ. ad ʒj.

N. Educit iuſuper mucilaginem Tar-
taream ac aquas per aluum.

XXXIV. Antirrhinum.

Antirrhinum, Matth. Dod. Lob. Tab. Antirrhinum
maius alterum folio longiore. C. B. 2.
Germ. Orant, Dorant, Brackenthaupt,

Kalbsnaſen, Hundſkopff.

Creſcit lociſ ſabuloſiſ. Floret Ma-
io, Iunio.

OFFICIN. NAT.

Herba integra, i.e. folia cum flori-
bus ac gemmiſ ramuſculorum, quæ
repræſentant caput vituli.

Vires. Rari uſuſ eſt in Medicina, nec
adhibetur niſi à mulierculiſ contra ſpe-
ctra, incantationeſ, veneficia, &c. idque
tam præſeruandi quàm curandi inten-
tione utrique ſatiſfacit appenſione, fu-
migatione, ſuppoſitione, appoſitione, bal-
neatione. Vide Carrichter. in Herbario.

XXXV. Apium.

Apium, } Macedonicum. Vide Petro-
ſelinum Macedonicum.
Veterum ſeu hortenſe. Vide
Petroſelinum officinarum.
Paluſtre, Apium officinarum:
de quo hic.
Montanum. Vide Petroſeli-
um montanum.

Dicitur Apium, Fuſch. Lon. Paluda-
pium Lab. Eleoſelinum, Dod. 1 ob.
Apium, vulgare. Tiag Braunes Peterlein,
VWaſſerpeterlein, VWaſſermorelien,
VWaſſereppich, VWaſſermarck

Creſcit inter Beccabungam: floret
Iulio.

OFFICIN. NAT.

Radix & Semen.

Vires. Caleſ. & ſicc. ferè gr. 3. incid.
aperit, unde & inter 5 radiceſ aperien-
teſ recenſetur. Vſuſ præcipuiſ internuſ
□ & menſeſ mouet, calculum pellit, re-
gium morbum ſoluit. Semen efficaciuſ
eſt quam radix, au numeraturque ſemi-
nibuſ calidiſ minoribuſ. Vtraque præci-
puè internè uſurpantur.

PRÆPARAT.

▽. Ex caule, fol. & floribus Iunio collectis.

XXXVI. *Aquilegia.*

Aquileia, Ageley, Ageleyen.

N. *Diversa reperiuntur species florum colore vel plenitudine distincte: Officinaria simplex illa flore ceruleo, C. B. 2. vel 8. intelligitur.*

Dicitur *Aquilegia*: *Trag. Fusc. Lon. Dod. Cam. Aquileia, Matth. Lob. Cast. Tab.*

Crescit fata in hortis ac fundo pingui nonnunquam in locis sylvestribus incultis. Floret Iunio & Iulio.

OFFICIN. NAT.

Semen, tum Flores & Herba.

Vires. *Calf. moder. sicc. 1. aperit Epar & Lienem, ac in primis meatum biliarium, unde regio medetur morbo; Ciet urinam & menses, vulnera consolidat, ventris tormina sedat. NB. Semen in expellendis morbillis ac variolis usus mulierculis est creberrimi. Extrinsecus frequens eius usus est ad putredinem gingivarum scorbuticam emendandam, Ulceraque oris fauciumque solidanda.*

PRÆPAR.

1. ▽ *stillat.* Fit ex fol. flor. ac radice. Augusto collectis
2. *Conserua.* Ex floribus quæ rari usus est.
3. *Acetum.* Ex infusione florum.

XXXVII. *Aristolochia.*

Aristolochia, Osterlucey, Hollewurtz.

Est { *Longa, lange Hollewurtz.*
Rotunda, (à radice rotunda,) runde Hollewurtz.
Clematit.
Pistolachia.

Ex his officinales sunt longa & rotunda. Verum de (rotunda) notandum, quod officinis fumaria bulbosa illius loco vfualis sit, quam vide suo loco.

Indigitatur *Aristolochia longa*, *Dod. Cord. in D. Lob. Clus. hist. Aristolochia longa vera, Cam. C. B. 3.*

Rotunda vocatur *Aristolochia rotunda*, *Trag. Lon. Cam. Arist. rotunda, Matth. Dod. Cord. in D. Lob. Cast. 1. Aristolochia rotunda, flore ex purpura nigro, C. B. 1.*

Utraque colitur in hortis: floretque potissimum Maio & Iunio.

OFFICIN. NAT.

Rotunda Radix sola. Longa Radix & Folia.

Vires. *Utraque Cephalica, Epatica & Pulmonica in primis est: calf. & sicc. 2. completè; atten. aperit. Hinc prodest ad ꝓeam mucilaginem resoluendam expectorandamque; ad menses ciendos, tumores internos rumpendos, venena discutienda. Insuper longæ infusio ad scabiem exiccandam vel vulgo hic usitatissima est. Extrinsecus adhibetur usu creberrimo ad exiccanda & mundificanda vulnera.*

Rotunda tenuiorum est partium quam Longa adeoque efficacior & in primis mensibus ac secundinis ciendis celeberrima: Calf. & sicc. 3. aper. attenuat.

PRÆPAR.

△ Ex integra *Aristol.* longa, i. c. foliis ac radice.

XXXVIII. *Armoracia.*

Raphanus sylvestris. Sinapi agreste; Trag. Rapisstrum albo fl. cruce foliis, Lob. album, Tab. Rapisstrum fl. albo seu siliqua articulata, C. B. 2.

MMm 2 Hey

Heydenreich. Wildmeerrettich.

N. Sunt qui Lampfanam Dioscoridis putant.

Crescit in locis multis iuxta riuulos ac in vallibus.

OFFICIN. NAT.

Radix sola.

Vires. Calfac. & sicc. mucilaginem tartaream incidit, attenuat, resoluit, viscera aperit, diuretica, lithonriptica & antiscorbutica est.

N. Lac imminuere dicitur.

XXXIX. Arnica.

Chrysanthemum latifol. nardus. Chalta 2. vel plantago alpina, Lob. Chalta alpina vel Damasonium, Tab. Alyfina Diosc. Matth. aliis Lagea Lupi. Germ. Mutterwurtz, Wölverley Saxonibus.

Crescit in montibus ac pratis, floresque per totam ferè ætatem.

OFFICIN. NAT.

Planta cum floribus.

Vires. Calf. & sicc. partium tenuium; sudorifica est, & diuretica, nonnunquam & vomitoria. Proin Holsatos rusticos contra grumosum ac coagulatum sanguinem vel & contra febrem in cereuisia coxisse ac cum successu propinasse, obseruauit.

XL. Artemisia.

Ἀρtemisia Diosc. Artemisia vulgaris maior, C.B. 1. Artemis. maior. Trag. Matth. Cord. in D. Cam. Artemis. vulgaris, Clus. h. Artem. Latifolia, Fuchf. Lon. Dod. Artem. mater herbar. Lob. Ger. Artem vulgaris & Artemisia altera polycronos dicta, Diosc. Artemisia rubra & alba, Tab. aliis olus re-

gium, herba regia. Germ. Beyfuss, S. Iohannis Gurzel.

N. 1. Variat colore tum caulibus tum floribus: vna caule & flore rubro purpurascente, seu subpurpurascente; altera ex viridi albicante, vel subpallente spadiceone. Hinc dua figura Tab.

N. 2. Viraque etsi interdum inueniatur maior, interdum minor attamen viribus conueniunt.

OFFICIN. NAT.

Summitates cum femine incluso: quin & tota herba, eaque tum rubra, tum alba.

Vires. Vterina est, calf. 1. sicc. 2. aperit, discutit; menses, fatum, secundinas pellit, sordes abstergit, adeoque vsus creberrimi est mulierculis, que eam adhibent interne & externe, adeo vt vix balnea seu lotiones parent, in quibus artemisia non contineatur.

N. Rubra efficacior habetur alba, proin & communior.

PRÆPARATA.

1. Ex summitatibus & foliis.

2. Ol. stillat. rarò extat.

3. Syrup. Compos. Vide Dispens. Augult. & Norib.

4. Sal. Ex planta incinerata.

N. Sunt qui carbonem sacro Ioh. Baptistæ die sub radice fossam, ad Epilepsiam comment. Exhibent autem tum in puluere, tum suspendunt de collo.

XLI. Arum.

Ἄρον, Pfaffenpint, Teutsche Ingber.

Est vel

{	foliis macu-	}	vtrumque sine	
	latis			discrimine of-
	non macu-			
latis				

Prius dicitur Arum maculatum, maculis candidis vel nigris, C.B. 2. Ari 3. genus,

genus, *Trag.* Arum nigricantibus liris lignatum, *Dod.* Arum, *Mathemaius* foliis aliis maculis notatis, *Cast.* Arum offic. *Lob.* A. maculatum, *Tab.*

Posterius vocatur Arum vulgare non maculatum, *C.B.* 3. Arum, *Brunf.* Arigenus, *Trag.* Arum, *Fuchf.* Cord. *Lon.* Tab. vulgare. *am. majus, Ger.*

Crescit locis pinguibus & campes-tribus. Folia erumpunt mense Mar-
tio, flores Junio.

OFFICIN. NAT.

Radix, quæ recens rari vsus est ob acrimoniam summam, exiccata autem crebrioris, Colligenda radix est cum germinare Arum incipit mense scil. Martio.

Vires. *Calfac. & sicc.* 3. *Galeno gr. j.* (quod de Aro nostrati quippe quod acrimonia maxima & exulcerante sole piperino præditum, intelligi nequit,) *Em* præcipue prima regionis, tum quoque pe-
toris & pulmonum peculiariter incidit, resolut ac discutit. Proin vsus eius cre-
ber est in cachexia, asthmate, &c. her-
nias curat, cetera utinam, obstructions vi-
scerum resoluat.

PRÆP.

1. Radix preparata. Præparatur vul-
go maceratione in \times atque exicca-
tione.

2. Fecula. Fit l.a. Vide lib. 2. Vide
Disp. August.

3. Pulvis Stomachicus Quercet. Cu-
ius basis est radix Vini præparata. Vi-
de lib. 2.

XLII. Asparagus.

Asparagus & *Asparagus*. *Spargen,*
Sparfchen.

Triplicis generis est, hortensis sa-
tiua. 2. syluestris, 3. palustris. Ex his
prior officinis in vtu est. Cui substi-
tui in defectu potest secunda, utpote
quæ à prima non nisi sola cultura dif-
fert.

Dicitur Asparagus, *Brunfels.* *Trag.*
Matth. *Fuchf.* Cord. *hist.* *Lon.* Aspara-
gus altilis, *Fuchf.* Tab. Domestica, *Bel-*
lon. Asparagus *Diosc.* Asp. sativus, *Cast.*
Ger. Alper. hortensis, *Dod.* *Cam.* Asp.
domesticus, *Lob.* Asparagus sativa,
C.B. 1.

OFFICIN. NAT.

Radix & Semen.

Vires. Radix est diuretica, lithontri-
ptica & ex aperitiuis 5 illis famosis non
postrema. *Calfac. & sicc.* moderate, dis-
cutit. Epar. Lienem præcipue & Renes
infartu liberat, ideoque in decoctis eo re-
sistentibus frequentissima est. Externe
adhibetur (in gargaris) pro lenienda
odontalgia & laxitate gingivarum.

Semen, eadem Vires obtinet, sed vsus
est rarioris.

PRÆP.

▽. Fit ex integra planta cum bac-
cis rubris Septembri mense collecta,
quæ supra recenti herba rectificari
potest, sed rari est vsus.

XLIII. Atriplex.

Melte, Milte, Molte, Scheiszmilte.

Est { 1. Hortensis fol. } rubris.
 ac caule } viridi albescentibus. *Hæc præstantior reliquis est, licet*
 nec reliquæ contemnenda fuerint.
 2. Sylu est is. } viridi nigris.
 3. Maritima.

Alba nominatur *Atriplex* *faciua* *Trag.* *Attr. faciua alba, Lob. Atriplex, Matth. Hortensis, Fuchf. Cast. Atriplex faciua viridis, Cord. in D. A. alba viridis, Lon. Atriplex hortensis alba seu pallide virens, C. B. 1.*

Rubra dicitur *atriplex* *rufo folio, Cord. in D. Atriplex hortensis, Dod. hortensis rub. Lon. Atriplex. faciua, Lob. Attr. rub. Tab. subfaciua alba. Ger. Attr. purpurea grandis, Cam. Atriplex. hortensis rubra, C. B. 2.*

Locis gaudet arenosis, crescitque sylvestris passim iuxta vias. Florent Junio, Julio, & Augusto.

OFFICIN. NAT.

Folia sylvestris præcipue: hinc hortensis pallide virentis. Semen rarioris usus est.

Vires. Refrigerant 1. humect. 2. leniunt dolorem: Hortensis insuper culinæ ac alimentosa est, sylvestris autem in soluenda aluo celebris.

Usus officinalis præcipue externus est, in clysteribus ac Epithematibus paregoricis, v. g. antipodagricis, tum quoque in lotionibus pedum somni causa paratis.

XLIV. Avena.

Ῥῆζῆμα vel Ῥῆζῆμα, Avena *Brunf. Matth. Fuchf. Dod. Lon. Cast. Lob. Avena sativa & prima Trag. Avena vesca, Lob. Ger. Avena vulgaris seu alba, C. B. 1. frumentum, Cord. in D. Germ. Habern.*

Avenæ semen culinare potius est

quam officinale, nihilominus tamen non exul prorsus est, sed adhibetur tum crudum, tum quoque in facinam redactum. Crudum sacculo inditur, qui ventri optimè calfactus imponitur ad dolores colicos & vterinos leniendos, Farina avenacea cum butyro in pultem cocta, conducibilis est in scabie capitis exiccanda, &c.

XLV. Malus Aurantia.

Malus *Nerantia, Pomeranckenhau. Viret per integrum annum. Videatur pomum Aurantium, Trag. Aurantia mala, Matth. Lon. Cast. Tab. Cam. Aureum malum, Clus. hist. Arangia, Cord. in D. Arantia, Lob. Malus anarantia, Dod. Arantia major, C. B. 1.*

OFFICIN. NAT.

1. Poma quæ simpliciter arantia, aurantia vel mala aurea, poma nerantia & anarantia, poma arangia dicuntur: suntque tum acida, tum dulcia, tum vinosa, seu media.

2. Cortices.

Vires. Poma acida & vinosa præferuntur reliquis, easdemque virtutes habere putantur, quas Citria mala, imbecillius tamen: Cortices calidiores sunt ususque vulgaris in torminibus ventris colicisque (à statu subortis) inque dysuria corrigenda. Quinimo & febrisugi comperti sunt subsequente sudore.

Dosis ῢj ad ῡj.

PRÆPARATA.

1. ῞. Ex floribus. Dicitur peculiariorio

giore nomine Nampba, Laufam vel Angelica.

Vires. Promouet sudorem, adhibeturque in odoriferis.

2. ▽. E corticibus.

3. Succus expressus. Ex pomis acidis; qui tamen rari vsus est.

4. Sympus. Ex succo acido & saccharo. rari itidem est vsus

5. Condit. cortices. Ex corticibus recentibus (purgatis, amaroreque aliquantulum liberatis) & saccharo.

6. Conseru. Ex floribus. Apportatur ad nos ex Gallia, Hispania, Italia.

7. Electuar. seu Gelatina arantior.

Ex corticibus exterioribus recent. l.a. amarore suo exutis) coctis vel & contusis & cum maluatico saccharoque mixtis.

8. Oleum stillatit. E corticibus.

9. Balsamus. Ex oleo: vt alij Balsami.

10. Vnguentum arantior. ꝑ. Pomum arantium acid. facto foramine, exprime succum, cum quo misce tantillum Theriacæ, croci & aceti, inde iterum pomo ac coque sub cineribus: tandem exprime.

Vires. Fugat lumbricos infantum umbilico impositum, compefcit æstum cardiacæ, iunctum, somnum blande conciliat temporibus illitum.

XLVI. Auricula muris.

Pilosella, pilosella lutea, Maüszahrlein, gelb Maüszahrlein, Nagerkyant.

Est { Repens maior { hirsuta.
 { Erecta. { non hirsuta.
 { Montana, hispida seu hispidula, vide suo loco.
Præfertur autem reliquis pilosella

maior repens hirsuta, C. B. 1. Auricula muris Brunf. Cord. in Diosc. Auricula muris minor, Trag. Lon. Pilosella, Matth. Lob. Cast. Tab. Pilosella maior, Fuchf. Dod. Pilosella repens, Ger. Pilosella maior repens hirsuta, C. B. 1.

OFFICIN. NAT.

Integra planta seu folia.

Vires. Calfac. & sicc. 2. astring. absferg. constip. sternutatoria est & vulneraria (intus & extus adhibita) dysenteriam, alui uterique fluxus sistit, bilem æstuantem sedat & incrassat, hernias (infantum præcipue) curat. Extrinsecus medetur ulceribus oris (in collutionibus) hæmorrhagiam narium sedat (pulis nari inditus.)

PRÆPAR.

▽. Destillatur in MB ex integra planta collecta sine Maij vel circiter.

B.

XLVII. Balsamus Myrsifica.

Bάλαμος μυρσίκα Dioscoridi. Balan. myrsifica, Cord. in hist. Tab. Cer. Bell. Glans vnguentaria, Matth. Cord. in D. Lob. C. B. Granum Ben, Lon. Ben paruum, Monard. Arab. Habel Ben. Fructus est arboris myricæ similis, magnitudine auellanae nucis, intus nucleum continens pinguem & oleosum, veluti amygdala.

Vires. Nucleus calf. 3. sicc. 2. terget. purgat supra ac infra, educitque bilem, ac pituitam. Curat scabiem impetiginisque sanat.

N. Mesues Ben duplex facit, magnum sc. vt auellana, quod Monardes auellanas purgatices esse vult: & paruum ciceris magnitudine, ex quo oleum Itali consiciunt.

PRÆPAR.

Oleum ex nucleis exprimitur & ad nos

nos transfertur, titulo olei Balanini vel de Been. Vide August.

Vires. Emollit, discutit, neuriticum est, scabritiem, lentigenes aliaque cutis vitia sanat, qualicumque tinnitui aurium subuenit (inditum auri.)

N. Oleum hoc quis rancescere nescit, commiscetur rebus fragrantibus. E.g. moscho, zibetta, coriisque illinitur ad fragrantiam impertiendam. Alij tamen eius loco adhibent oleum express. è nucleis cerasorum, in quo solutum Beniouinum. Heurn. in meth. prax.

X LVIII. Balsamum.

Balsami planta frutex seu arbuscula est, tres cubitos ad summum alta, folia aliens rutæ foliis similia.

Dicitur Balsamum Syriacum rutæ folio, C. B. 1. Balsamum Lehtisci folio Ægyptiacum, Bellon. obs. Carpobalsamum veterum flauum. Carpobalsamum & Cassamum verum, Cord. Germ. Balsambaum.

Nascitur sponte in Arabia felici, vnde olim in Iudæam, & hodiè in Ægyptum translata, loco quodam occluso (Cayro vicino) quem Mateream vocant, collitur.

OFFICIN. NAT.

Fructus (Carpobalsamum.) Ramusculi (Xylobalsamum.) Liqueor Balsameus (Opobalsamum,) de quo vide Balsamum, class. 2.

Fructus eligatur recens, plenus, ponderosus, gustu mordax: Ramusculi probatur recentes, tenues odorati.

N. 1. Carpobalsamum atque Xylobalsamum quia non nisi in compositionibus quibusdam veterum adhibentur, prostant raro atque non nisi vetustate obsoleta, vnde loco Carpobalsami Cubebas adhi-

bere receptum est, loco Xylobalsami Lentiscum recentem: Xylobalsamum autem nostrate, quod Mechà Arabia felicitis asportatur, esse idem cum veterum probat Petrus Bellonius in suis observation. lib. 2. cap. 29.

N. 2. Est & arbor quadam malo punica maior, sponte in noua Hispania nascens, ex qua elicitor Balsamum Indicum seu Peruvianum. Vide infra cl. 2.

N. 3. Sunt & Arbores in Tolu Provincia inter Carthaginem & nomen Dei sita, pumilis pinis similes, ex quibus elicitor Balsamum de Tolu. Monardes. Vid. infra cl. 2.

X LIX. Bardana.

Kletten { Maior, huius loci.
Minor, loci sequentis.

Dicitur Bardana siue Lappa maior, Dod. Brunf. Trag. Personata. Lon. Lob. Personata maior, Matth. Cass. Personaria, Fuchs. Arcium, Cord. in D. Lappa maior, Arcium, Diosc. C. B. 1. Germ. groß Kletten.

Crescit passim iuxta vias, & in Cæmeteriis. Floret Iunio & Iulio.

OFFICIN. NAT.

Radices, raro Folia, rarius Semen.

Vires. Siccat, est pulmonica (NB.) diuretica, diaphoretica, extergens, subastringens. Hinc conuenit in asthmate, calculo, expuitione sanguinis, in vulneribus in veteratis; tumore lienis, aliarumque partium, in arthriticis morbis, (quibus peculiari proprietate conferre statuitur.

Semen insigne censetur Lithonripticum.

Extrinsecus imponuntur folia vulneribus inueteratis, articulis luxatis, am- bustis, &c.

L. Bardana

L. *Bardana minor.*

expurgat pulmones, menses mouet, ideoque usurpari potest vſu interno & externo, ſed rarius adhiberum deprehenditur.

Ed, Diosc. 907, dcm, Galen, Xanthium, Fuchf. Matth. Dod. Cord. in D. & biſt. Lon. Caſt. Tab. Xanth. ſeu Strumaria, Lob. Bardana minor, Ger. Lappa minor, C. B. 6. Germ. klein Kletten, Betlerſluſſe.

Gaudet ſolo læto & pingui iuxta mœnia & ſcrobis arefactas. Viget Iulio & Auguſto.

OFFICIN. NAT.

Radix, Fructus (lappulæ) & herba. Vires. Calf. & ſicc. dig. guſtu eſt amaro & ſubacri. Vſus præcip. (ſecund. Matthiol. (in minera lepre educenda (cum Rhab. exhib. radix) in lipothymia. Extrinſec. in ſtruma & tumoribus diſcutiendis (epithem.) in capillis luteo colore tingendis. Herba cancerorum ardori efficaciſt eſt extingendo.

L I. *Basilicum.*

Βασιλ. βασιλικόν. Baſilicum ſiue Ocimum. Brunf. Baſilica minor & Baccharis Germanica, Trag. Ocimum medium, Matth. Caſt. Cam. Ocimum mediocre, Fuchf. Ocimum ſeu baſilicum medium vulgariuſ, Lob. Ocimum magnum, Tab. Ger. Ocimum vulgariuſ, C. B. 6. Germ. Baſilien.

Creſcit in hortis. Floret Iunio & Iulio.

OFFICIN. NAT.

Folia ac Semen.

Vires. Calf. 2. humect. diger. reſolu.

L III. *Bellis.*

Primula veris, Marienblümlein, Gansblümlein, Matſieben, Zeitloſen.

NNn

Eft

PRÆPAR.

V. Ex integra fit planta collecta Iunio.

L II. *Behen album, Behen rubrum.*

Binas officinæ noſtrates radices monaſtrant nomine Behen: vnam Behen rubrum appellant, alteram album. De vtraque controuertitur cuius ſunt ſpeciei. Arabibus (vt Serapioni) ſunt Behen radices, paſtinacæ radicibus ſimiles. Hinc ſcribit Haly Abbas, Behen & Paſtinacæ ſylueſtris radices nullum inter ſe diſcrimen habere. E modernis Behen album aliqui Polimonij ſiue Lychnidis ſylueſtris ſpeciem eſſe autumant, quam Tabern. vocat herbam articularem: Behen rubrum alij Limonij maritimi, alij valerianæ rubræ, alij Biſtortæ ſpeciem eſſe autumant: aliqui vero Garzia & monente & reprehendente, zerumbeth eſſe ſtatuunt. Hinc eſt, quod aliqui in deſcriptionibus Arabum ſubſtituunt Eryngium, alij Tormentillam, alij paſtinacam ſylueſtrem, alij Angelicam, alij denique Caryophilatam. Actuarius & Myreptus Behen hermodactylos eſſe volunt, forſan auellanas purgratices, de quibus vide ſupra: Balanus Myrſica.

Est vel } sylvestris { Major, *Trag. Matth. Fuchs. Dod. Cast. Cam. Ger. Lob. Tab.*
 } Media, *Matth. Lob. Tab. Clus. Dod. minor Cast.*
 } hortenſis { Minor, *Matth. Fuchs. Tab. Ger. Lob. C. B. 7.*
 } simplex.
 } prolifera.

Esti ſingulæ officinales eſſe non nequeant, præualeat tamen ſylveſtris, eaque minor.

Sylveſtr. creſcit paſſim in pratis & paſcuis: Hortenſis colitur in hortiſ. Floreret per integram æſtatem præcipuè verò verno tempore.

OFFICIN. NAT.

Integra Herba cum floribus, ſed raro.

Vires. *Vulnervaria eſt calfac. & ſicc. moderatè, partium eſt tenuium: mulierculis noſtris uſitatum eſt, herbam cum floribus infantibus ad aluum laxandam exhibere.*

N. Bellis maior & minor 5. 6. 6. Aprilis manè ante ortum Solis collecta valide emolliunt attenuantque: eadem collecta menſe Junio, ſecundo die à plenilunio ſub crepuſculo noctis, plurimum valent ad hæmorrhæam ſiſtendam.

PRÆPARAT.

▽. Fit ex integra planta florente, menſe Majo collecta.

Ben, vide Balanus Myreſica.

L IV. Berberis.

Berberis, *Brunf. Lon. Lob. Caſt. Com.*

L V. Beta.

Βέτα, *Dioſc. Germ. Mangolt. Ræmiſch Kohl.*

Beta } alba
 } rubra { vulgaris
 } radice rapæ, rapum rubrum.

Hæ ſunt officinales, præferturque rubra.

Alba

Spina acida, *Brunf. Dod. Oxyacantha, Trag. Oxyacantha Galeni, Cord. in D. Tab. Creſpinus, Matth. Oxyacanthus Galeni, Cam. Berberic dumetorum, C. B. 1. Germ. Saurrauch, Verſich, Saurdorn, Reliffelbeern.*

Gaudet locis incultis, dumetis, &c.

OFFICIN. NAT.

Fructus (nomine Berberis collectis Autumnò.

Vires. Refrigerant & humectant 2. partium, tenuium, astringunt, appetitum excitant, roborant ventriculum ac Epar. Proin uſus ſunt frequenſſimi in morbis ubi refrigeratione & aſtrictione opus, quales Diarrhæa, Dyſenteria, &c.

PRÆPARAT.

1. Condus junctus.
 2. Succus liquidus. Ex recentibus baccis expreſſus.
 3. Syrupus de ſucco berberum.
 4. Rotula. Ex ſucco & ſaccharo.
- N. Fit ſolâ miſturâ ſine coctione, *Vid. lib. 2.*
5. Trochiſci. *Vid. Diſpenſ.*
 6. Rob. de berberibus compoſ. *Vide Diſpenſ.*

Alba dicitur Beta, *Brunf. Tab. Ger.*
Candida, *Trag. Fuchf. Cord. in D. Dod.*
Beta alba, *Matth. Lob. Lon. Cast. Cam.*
Beta alba vel pallefcens, quæ Ciela
officin. C. B. 2.

Rubra vocatur. Beta rubra. *Brunf.*
Trag. Lon. Dod. B. nigra, Matth. Fuchf.
& rubra, *Cast. rubra vulgarior, Lob.*

OFFICIN. NAT.

Radices, Folia & Semina.

Vires. *Calf. & sicc. in princip. gr. 3.*
laxat aluum, ob nitrositatem, errhinum
est. Usus eius internus potissimus culi-
naris est, in acetariis, &c. Externus in
errhinis.

PRÆPARATA.

Succus. Ex tota herba & præcipue
ex radice.

LVI. *Betonica.*

1. *Betonica, alba vel primula veris.*
Hæc inusitata.

2. *Betonica vel Vetonica corona-*
ria. Vide Cariophyllus hortensis.

3. *Betonica officinarum, De qua hic,*
Dicitur *Betonica, Brunfels. Trag.*
Matth. Fuchf. Purpurea Fuchf. Dod.
Lob. Lon. Cast. Tab. Ger. Betonica vul-
garis, Clus. hist. Vetonica, Cord. in D.
Betonica purpurea, C. B. 1. Germ. Beto-
nien, braun Betonien.

Crescit in hortis ac pratis, locisque
umbrosis: Floret Junio & Julio.

OFFICIN. NAT.

Folia (Maio legenda) & Flores

Vires. *Calfac & sicc. 2. acris est &*
amara: discutit. atten. aper. extergit,
inprimis Cephalica est Epatica, Sple-
netica, Thoracica, Vterina, nec non &
vulneraria, & demum diuretica: hinc
usu interno & externo eruberrimo ve-
nit, maxime in morbis capitis.

PRÆPARATA.

1. *∇. Fit ex fol. antequam florescit,*
vel ex flor. in MB.

2. *Conserua Ex floribus.*

3. *Syr. simplex. Ex succo & saccha-*
ro 1.

4. *Compositus. Vid. in Dispensat.*
August.

5. *Exempl. ex Betonic. Vid. August.*

6. *⊖ Ex incinerata planta.*

LVII. *Betula seu Betulla.*

Betula, Trag. Monard. Dod. Lon.
Lob. Cast. Cam. Tab. Ger. Germ. Birch-
baum.

Crescit in syluis, locis gaudens as-
peris. Iulos prodit Martio, quibus
Aprili folia succedunt.

OFFICIN. NAT.

Folia, Cortex, Fungus, sed raro.

Vires. *Folia calf. sicc. resoluunt, at-*
ten. absterg. aperiunt, amara sunt. Se-
rum proliciunt. Hinc usus non minim. in
hydrope, scabie, & sim. intus & extus
adhibita.

Cortex item quia bituminosus, cal-
fac, & emollit. Adhibeturque in suffi-
tibus aeri corrigendo dicatis.

Fungus vi pollet adstrictoria; unde
ramenta eius hamorroidibus inspersa
ad miraculum fluxum cohibent.

PRÆPARATA.

1. *Succus.* Ex perforato caudice verno
tempore prolectus.

Vires. *Commendatur ad comminuen-*
dos calculos Renum & Vesicæ, macu-
lasque cutis abstergendas.

2. *∇ still. è succo.*

LVIII. Bistorta.

Nattervortz, Est C.B. } Maior radice } minus intorta }
 } } magis intorta } ha sine discrimine officinales.
 } Alpina } Maxima } minus officinales.
 } } Media }
 } } Minima }

1. Dicitur Bistorta, Cord. in D. Matth. Dod. Cast. Bistorta foemina, Brunf. Bistorta Britannica, Lob. Serpentaria foemina & colubrina, Fuchf. Colubrina, Lon. Colubrina & Dracunculus Maior, Brunf. Bistorta maior radice minus intorta C.B. 1.

2. Colubrina & Dracunculus minor, Brunf. Trag. Serpentaria mas seu Bistorta, Fuchf. Bistorta, Con. minor. Tab. latifolia. Ger.

OFFICIN. NAT.

Radix & interdum Fungus.

Vires. Refrig. sic. ad gr. 3. astringit valde. est austeriuscula, alexipharmaca, sudorifera. Vfus precipui in vomitu compefcendo, in abortu precauendo, &c. Extern. in catarrhis exiccandis, fluxu vteri sanguineque vulnere sistendo.

Fungus sanguinem in vulneribus ac hamorrhagia narium mire sistit.

P R A E P A R.

∇. Ex herba.

LIX. Bombax.

Arbuscula est exotica ferens fructus instar nucis crinitae, in qua semen latitat lanugine mollissima inuolutum.

Dicitur Bombax officinat. Cortus seu Cotto & bombax Serapioni, Xylon seu Gossypium, Matth. Xylon, Fuchf. Lon. Gossypium, Dod. Lob. Cast.

Cam. Tab. Gossypium frutescens semine albo, C.B. 1. Germ. Baumvollarbaum.

Copiam eius plurimam producit Syria ac Cyprus.

OFFICIN. NAT.

Semen & Lanugo quae Gossypium officinarum, Baumvollar.

Vires. Lanugo calfacit & siccatur: semen pulmonarium est, tussientibus & asthmaticis maxime proficuum, auget semen.

N. Vfus rari seminis, tum lanuginis rarus est modernis.

LX. Borrago.

Borrigo Brunf. Trag. Fuchf. (icon.) Dod. Lon. Cam. Buglossum Matth. Fuchf. Cast. Buglossum verum, Cord. in D. Buglossum latifolium, Lob. vulgare, Clus. Buglossa urbana, Clus. hist. Borrigo floribus albis, Tab. hortensis, Ger. Buglossum latifolium, Borrigo, C.B. 1. Borretsch.

Crescit ut plurimum in hortis, tum quoque locis incultis, officinalisque est sine discrimine siue caruleos ferat flores, siue albos, quae hinc aequae vulgaris, ac prior.

Floret mense Iunio, Iulio, Augusto, usque in Septemb.

OFFICIN. NAT.

Radix, Folia, Flores, (qui inter 4. cordiales

cordiales famofos, recenſentur.

N. Radix afferuatur excorticata.

Vires. Cordialis eſt & præcipuis, calf. & humect. 1. atram & aduſtam bilem corrigi, ſpiritus vitales ac animales fuligine atra biliaria inquinatos mundificat, vnde & omnibus affectibus ex atra bile oriundis conuenit, v.g. hypochondiacris.

PRÆPARATA.

1. ▽. duplex, 1. ex toto. 2. ex floribus.

2. Conſeru. Ex floribus.

3. Syrup. Ex infuſione triplici florum & ſacch Diſp. Auguſt.

N. Alij ꝛ. ſucci ex ſol. expreſſ. ꝛ. viij. flor. recent ꝛ. i. vel ꝛ. iij. cum ſacch. ꝛ. iij. coquant in ſyrupum.

4. Succus inſpiſſatus ſiue eſſentia. Vide l. 2. de ſuccis.

Varia Braſſicæ ſunt genera, quæ his claſſibus comprehendi poſſunt.

- Satiua { capitata.
- { non capitata.
- { criſpa.
- { Apiana, i.e. apij flore.
- Sylueſtris.
- Manna, i.e. Scldanella.

Ex his magis medicamentofa eſt, teſte Matthiolo, non capitata minutis caulibus, tenerioribus foliis, læuis, tenera, C. B. 1. Braſſica alba vel viridis; huic ſuccedit non capitata rubra.

Dicitur Braſſica, Brunſelf. Læuis, Matth. Caſt. Braſſica candida, Geſ. hortenf. lata alba, Lon. Braſſica vulgaris latiua, Lob. Dod. Ger. Braſſica prima, Tab. Braſſicæ ſatiuæ maioris ſpecies altera, Trag.

OFFICIN. NAT.

LXI. Branca Vriſina.

Σπονδύλιον, σπονδύλιον. Spondylium vulgare hirtutum, C. B. 1. Spondylium, Lob. Matth. Lon. Caſt. Tab. Vulgare, Dod. 8. Branca vriſina, Brunſ. Trag. Cord. in D. Acanthus vulgaris ſeu Germanica, Fuchſ. Barenklavv, Barvvurtz.

Creſcit paſſim in locis humidioribus: ſoret Maio.

OFFICIN. NAT.

Folia ſola.

Vires. Eſt 5. herbis emollientibus calf. & ſicc. aperit. Vnus potiffimum exteruus eſt in clyſteribus aliisque paregoricis, quaruncunque formularum, & ut plurimum in cataplaſmatis.

Folia Ius foliorum, Semen.

Vires, Folia calf. & ſicc. citra acrimoniam, vulneraria ſunt, ebrietatem arcant, astringunt & laxant, adeoque qualitatis mixta: Nimir. ut aiunt Salernitani.

Ius caulis ſoluit, cuius ſubſtantia ſtringit.

Extrinſecus uſitatum eſt ruficis. Vulneribus folia imponere ut consolidentur quinimo & pleuriticis doloribus impoſita, eos mitigant.

Semen eadem pollet qualitate cum foliis.

PRÆPARATA.

Loch. de caule. Vide Diſpenſ.

LXII. Braſſica.

Καυλίον, Caulis, Καλ. Καλκραντ.

NNa ; LXIII. Bu

LXIII. Buglossa.

Εὐγλωσσόν, Buglossum C. B.	Satiuum	Latifolium	Vulgatum. Vide Borrage. Peregrinum. Hisp. inusit.
		Angustifolium	
	Syluestre	Maius nigrum	Inusitata.
		Minus 1. 2. 3.	

Dicitur Buglossa, *Brunf.* Bugl. Italica, *Trag. Lon.* Bugl. longifolia. *Cord. bist.* Buglossum vulgare, *Matth. Cast. Tab.* Ger. Kuglossum angustifolium, *Lob.* Bugloss. Italicum, Hispanicum grande, *Cam.* Cirsium Italicum, *Fuchf. Cord. in D.* Echium Italicum Spinosum, *Fuchf. ico.* Anchusa, Alcibiadion. *Dod. Germ. Ochsenzung.*

Crescit nobis in locis campestribus & aruis, floret Majo & Iunio.

OFFICIN. NAT.
Flores, Radices & Folia.

N. Radix asseruatur excorticata.
Vires. Eadem obtinet quas Borrage.

PÆPAR.

Eadem quæ Borriginis.
N. Succus buglossa mucilaginosus, adeoque difficilis est expressu: capropter si nihilominus eundem desideraris, colloca in loco humido per noctem, hinc exprime.

LXIV. Bursa pastoris.

Pera Pastoris, *Teschelkraut, Hirtentäsch, Hirtenseckel, Seckelkraut.*

C. B. est	foliis sinuatis	Maior, C. B. 2.	maior ac minor, &c.
		Media, C. B. 3.	
	foliis integris, loculis oblongis	Minima, C. B. 4.	

Ex his vltatior est maior, cui succedunt media & minor.

Maior dicitur Bursa pastoris maior, *Brunf. Trag.* Bursa pastoris. *Matth. Cord. in D. Lon. Lob. Cast.* (herba cancri,) *Ger.* Pastoria bursa, *Fuchf. Dod.* maior, *Tab.* Bursa pastoris maior folio sinuato, C. B. 2.

Media describitur Bursa past. minor, *Tab.* minima, *Ger.* C. B. 2.

Minor est Pastoria bursa minor, *Dod.* minima, *Lob.*

Crescit B. past. passim in locis incultis. Floret Aprili.

OFFICIN. NAT.

Folia.

Vires. *Refrig. & sicc. adstringit & constipat.* hinc valet in hemorrhagia narium, exputione sanguinis, diarrhea, dysenteria, mictione cruenta, fluxu nimio mulierum. Externe vulneribus solidandis à pelbeis adhiberi solet, nec sine successu: vti & hemorrhagiis narium (sub alis & in nucha.) Quinimo adhibetur sepius in cataplasmatibus febrifugis qua carpis imponuntur.

PÆPAR.

∇. Ex foliis.

LXV. Bu

LXV. Buxus seu Buxum.

Πύξος, Buchs-
baum, } Arborefcens, Huius loci.
Fruticofa.
Foliis rotundioribus, Chamepyxos, Trag. Tab. Hac videntur ad
areolas hortorian.

Infigitur Buxus, Brunf. Matth. Dod. Fuch. Lon. Cast. Cam. Tab. Buxus vulgaris, Trag. Buxus arborefcens, C. B. 1.

Viret perpetuo, Aprili tamen germina nouella profert: locis gaudet alperis, faxofis.

Vires. Rari vfu est in Medicina: sunt tamen qui oleum ex ligno deſtillant, ſummè narcoticum: idque non ſolum ſummopere commendant in Epilepfia, odontalgia (ſi deniſcolpium ipſi intin- ſtum in radicem dentis dolentis immit- tatur (dentibusque corroſis, verminatione, &c. ſed & pro oleo Ligni Heraclei Ru- landino venditant. Videatur Quercet. Terrad. p. 214. 215. 216. vbi buxum li- gnum efficaciffimum ſulphure narcotico ſcatere docet.

1. aromat. cap. 23. & anotationes Cluſij in eundem.

Inſcribitur κάλαμος ſimpliciter & κάλαμος αρωματικός Hippocr. & Galen. καλ' αρωματικό, Dioſc. Oribaf. Aegin. Aëtio. Calamus Alexandrinus, Celfo. Calam. aromaticus, Cord. in D. Fuchf. Garz. Lob. Acoſt. Calamus aromaticus Indicus, C. B. 1. inter arundines odora- tas. Germ. vvolrichend Calmus.

N. Rara planta eſt officinis noſtrati- bus & non niſi foliis ſolummodo arun- dinaceis (uſque raris) nota.

Subſtituunt itaque Acorum ſeu Ca- lamum Aromaticum officin.

Vires. Calfac. ſicc. 2. acris eſt. Vſuſque præcipui in Vteri affectibus & neruorum doloribus. Garzias ab Horto.

LXVII. Calamintha.

Καλαμίνθη, } Incana, ocymi foliis.
Pulegij odore ſeu Nepeta.
C. B. } Vulgaris, vel officinarum
Hæc vſualis.
Magno flore.
Exiguo flore.
Arueaſis verticillata.

Dicitur Calamintha, Matth. Fuchf. vulgaris, Cam. Cal. montana, Dod. Caſt. Calam. montana vulg. Lob. Tab. Ne- peta montana, Cord. 10 D. Mentha ſa- tiua rubra, Ger. Calamintha vulgaris, vel officinarum Germaniæ, C. B. 3. alijs calamentum, Germ. Ackermüntz, Ca- lament.

Floret

Extractum Ligni. Vid. l. 2.
Vires. Inſigne eſt ſudoriferum & ſpe- cificum ad Epilepfias, vermes, putre- dines.

Dofis: Exigua pilula Quercetan. in Pharmac. Reſt. cap. 26.

C.

LXVI. Calamus Aromati- cus Indus.

Calamus Aromaticus officinarum. Vide Acorus.

Calamus Aromaticus Indus, eſt plan- ta Indica & diuerſa ab Acoro. Super quo legi poteſt Garzias ab hortis, lib.

472 PHARMACOP. MED. CHYM. LIB. IV.

Floret Iunio & Iulio, crescit in aruis.

OFFICIN. NAT.

Folia.

Vires *Calsac. sicca*. & aperit, attenuat, discutit, extergit partium tenuium est, stomachica ac uterina in primis, hinc & pectoralis atque Epatica: menses ciet, fetum eiicit, urinam mouet, tussi medetur, Epar reserat.

PRÆPAR.

1. ∇. Ex planta integra Iunio vel Iulio collecta.
2. Sal. Ex cinere.
3. Syrup. compos. de calamintha. Vid. Dispens. August.
4. Spec. Diacalaminth. Vid. Disp.

LXVIII. *Calcatrippa.*

Videatur *consolida Regalis*, *Matthiol. Cast. Cam. Tab. Ger. Consolida Regia. Lob. Flos Regius, Dod. Delphinium, Claus. Germ. Ritter spron.*

Varia extant genera, quoad colores, florum multipliciter, modum nascendi differentia, adeoque alia est flore simplici, alia pleno, quedam hortensis, alia aruensis, Hortensis colitur in hortis, aruensis passim in aruis reperitur, præstantiorque habetur hortensis. Floret Majo, Iunio.

N. Sunt qui *calcatrippam* pro *Delphico Dioscoridis* reputant, alij *Cuminum sylvestre Dioscoridis* esse volunt. Sufficit nobis scire vires & usum.

OFFICIN. NAT.

Herba & Flores.

Vires. Omnes *calcatrippa* species siccant, calore & frigore temperate sunt, substringunt, vulnera consolidant, partum faciunt intrinsecus & extrinsecus adhibite.

PRÆPAR.

1. ∇. *stillat.* Ex herba cum floribus collecta initio Iunij.

Vires. Commendatur ad oculorum rubedinem & ophthalmias. Præsertim quæ e carulei coloris floribus prolecta est.

2. *Conserua.* Ex floribus.

Vires. Commendatur ad tormina ventris infantum, ut & ad ardorem stomachi.

LXIX. *Caltha.*

Calendula, Chrysanthemum, Ringelblum.

Est præcipue { *vulgaris. Hac officinalis.*
palustris. Hac officinis ignota.

Indigitatur. *Calendula, Brunf. Trag. Dod. Cam. Caltha fatiua, Tab. Caltha, Matth. Fuchs. Lon. Cast. Chrysanthemum, Lob. Calendula simplici flore, Ger. Caltha vulgaris, C. B. I.*

Crescit in hortis, florere incipit Majo. floretque per integram æstatem.

OFFICINALIA NATIVA.

Flores.

Vires. Flores *Cardiaci* censentur, hinc *Epatici calsi.* & sicca. 2. (præcipue si sicci sint) aper. discut. substring. menses ciet, partum promouent (fimus subditus parturienti,) sudores mouent, alexipharmacum censentur, ictero medentur.

PRÆPAR.

1. ∇. Ex fol. & flor. cum incipit florescere.

2. *Acerum.*

3. *Conserua.* Ex floribus.

LXX. *Cannabis.*

Est { *fatiua* { *fœminina* } *Ha vsuales*
sylvestris. { *masculina* } *promiscue.*

Dicitur

Dicitur *Kayachis*, Diosc. Cannabis, Brunf. Matth. Dod. Lon. Lob. Cast. Cam. Tab. Ger. major, Trag. sativa, Fuchs. Cord. in D.C.B. 1. vulgo, Canapus, German. Hanff, zahmer Hanff. Colitur in agris: Floret Julio.

OFFICIN. NAT.

Semen, raro Herba.

Vires. Semen calf. (aliis refrig.) siccatque, semen genitale imminuit (usu continuo) tussi opitulatur. Ictero subuenit: at caput vaporibus replet.

Herba refrigerat & siccat, ambustis conuenit, aurium dolores (ab obstructione natos) sanat (succus instillatus.)

LXXI. Capparis.

Frutex est exoticus, ex quo flores antequam è gemmis erumpant decerpuntur, conditque ad nos transportantur.

Nominatur Capparis. Frag. Matthiol. Cord. in D. Lon. Cast. Cappar. 2. Tab. Capparis spinosa, Bellonij. Capparis retuso folio, Lob. Capp. rotundiore folio, Ger. Capparis spinosa fructu minore, folio rotundo, C. B. 1. Germ. Cappern.

OFFICIN. NAT.

Cortex radices in primis.

Vires. Calf. & sic. est splenicus, acris, amarus, austeriusculus, ideoque incidens, aperiens, extergens, subastringens. Prodest in affectibus Arthriticis, hypochondriacis, & simil.


PREPAR.

Conditi flores.

1. Conduntur + affundendo.

2. Sal. aspergendo.

N. Nocere d'eduntur stomacho imbecilliori, Epatis è contra & Lien conserunt, obstructiones eorum referando.

1.  Compos. Vide Disp.
2. Trochisc. ac Cappar. Vide Disp.
3. Extract. è corticibus Rad. Fit secundum Quercetan. cum ∇ flor. Genistæ vel simili P.R. cap. 26.

LXXII. Caprifolium.

Περικλυμένιον, Matrifylua, Volucrum maius, Lilium inter spinas, VValdovinde, Speckgilg. Geisblatt. Zaun-
gilg.

est $\left\{ \begin{array}{l} \text{non perfo-} \\ \text{liatum} \\ \text{perfoliatu} \end{array} \right\}$ utramque promiscue officinale est.

1. Non perfoliatum vocatur Caprifolium, Brunf. Lon. Germanicum. Dod. Periclymenum, Trag. Fuchs. Cord. in D. Cam. Periclymenum non perfoliatum septentrionale, Lob. Periclymenum vulgare septentrionalium, Clus. hist. Periclymenum non perfoliatum Germanicum, C. B. 1.

2. Perfoliatum dicitur Periclymenum, Matth. Cast. Periclymenum perfoliatum, Lob. Tab. Ger. Periclymenum vulgare alterum, Clus. hist. Periclymenum perfoliatum, C. B. 2.

Crescit in dumetis, fruticibusque instar conuoluuli adhærescit. Floret. Maio ac iunio.

OFFICIN. NAT.

Flores.

Vires. Calf. & sic. diureticum validum ac splenicum est. Vsuu princip. in asthmate & tussi. Externe extergit ulcera sordida, sanat impetigines, aliasque cutis maculas abstergit.

PREPAR.

∇ . Stillat. Ex floribus.

Vires. Confortat. nervosum genu, auxiliatur asthmatis, tussi, palpatione cordis: faciliat ac accelerat partum, oris

 siccitatem

siccitatem emendat (in gargarismis.)
Succus ex foliis raro extat, insignis ta-
men efficacia est in vulneribus capitis
ac cranij curandis.

LXXIII. Cardamomum & gya-
na Paradyfi.

Cardamo-
mum
C. B. { 1. Granum Paradyfi.
2. Maius officinarum.
3. Medium.
4. Minus in officinis sim-
pliciter Cardamomum
dicitur.
5. Minimum.

Ex his officinis vsualiora sunt Gra-
na Paradyfi, quæ officinis Cardamo-
mi maioris nomine veniunt: tum car-
damomum simpliciter ita dictum,
quod officinarum Cardamomum mi-
nus audit.

Grana Paradyfi inscribuntur Car-
damomum maius, *Matth. Lon. Cast.*
Gran. Parad. Cord. in D. Milleguet-
ta, *Lob. Malaguetta, Garz. Cardam.*
Arabum maius, *Tab. Germ. Para-*
disz. kerner.

Cardamomum simpliciter dictum
videatur, Cardamom. minus, *Matth.*
Lon. Tab. Cord. in D. & hist. minus
vulgare, *Lob. Clus. in Garz. Germ. Car-*
damemlein.

N. De Cardamomo veterum dispu-
tatur, utrum sub generalibus his 5. con-
tineatur. Sunt qui Cardamomum maius,
veterum Cardamomum esse contendunt:
alii contradicunt, obijcientes amaritu-
dinem ac odorem grauem, quibus vete-
rum Cardamomum celebre fuit, nostrum
non item.

Eligitur utrumque quod est fragenti
contumax, plenum, oclusum & caput odore
rentans, gustu acre & subamarum.

Afferitur utrumque in Europam
Alexandriam Aegypti, ac etiam ex In-
dia Orientalis Prouinciis *Malauar.*
Iaua, & simil.

OFFICIN. NAT.

Fructus uterque Cardamomum scil. &
grana Paradyfi.

Vires. Utrumque calfac. & sic. (ma-
ius gr. 2. minus 3.) partes principes ve-
creat, attenuat, status discutit, coctionem
inuat, proin conductibilis eorum vsus est
in affectibus capitis, ventriculi & in pri-
mis vteri.

PRÆPAR.

1. Ol. Cardamomi.
2. Confectio.

LXXIV. Cardiaca.

Cardiaca, *Matth. Lob. Lon. Cast.*
Tab. Ger. Fuchs, Melissa sylv. Trag. Mar-
rubium, mas, Brunf. Marrubium Car-
diaca dictum, forte primum Theo-
phraستي, C. B. 1. Germ. Heri gespan.

Crescit iuxta sepes & vias, locisque
gaudet frigidis: floret Iulio.

OFFICIN. NAT.

Folia.

Vires. Calf. 2. sic. 3. attenuat, discen-
tit, peculiariter medetur distensionem hy-
pochondriorum & cardia infantum
(quam affectum cardiacum seu cardial-
giam appellant, ciet vrinam & menses,
pectus apertita detergit, difficulter pa-
rientibus opitulatur.

PRÆPARATA.

1. ∇. Ex herba quæ præcipue in
vsu est.
2. ∇. Oguentum Cardiacum. Videl. 2.

LXXV. Carduus Benedictus.

Dicitur Carduus Benedictus.
Brunf.

Brunf. Trag. (cui & *Acanthus Germanicus*.) *Matth. Lob. Cast. Tab. Cam. Ger. Attractylis hirsutior, Fuchf. Acanthium, Cord. in D. Lon.* Cuius sylv. alter *Theophrasti, Cord. in D. Cam. Cnicus supinus, Cord. hist.* *Carduus benedictus & attractylis altera species, Dod. Cnicus sylvestris hirsutior, siue Carduus benedictus, C. B. (4. Cnici.) Ger. Cardobenedicten, gesegnete Distel.*

Crescit in hortis, floret Iunio & Julio.

N. 1. Tempus sationi aptius est & crescente.

N. 2. *Carduus benedictus* si sub initium Iunii collectus fuerit, vulnerata recentia mirabiliter curat, si in alio tempore, nunquam id prestabit.

OFFICIN. NAT.

Folia & Semen.

Vires. *Herba Cardiaca, alexipharmaca, ac sudorifica est ex usitatissimis, calf. & sicc. 2. atten. aperit, disc. veneno ac putredini resistit, febres etiam inueteratas & quartanas curat. Laudatur à nonnullis peculiariter in Cephalaa clauo dicta, ut & in surditate. Extrinsicus rarioris est usus, adhibetur tamen nonnunquam ad gangranam arcendam (in Epithem. vel cataplas.)*

Semin. vires easdem obtinet, sed usu non aequo crebro adhibetur, commendatur imprimis ad Epar obstructum.

PRÆPAR.

1. Pulvis. Datur ad ℥j.
2. ∇ Ex herb. integr.
3. Spir. Ex herb. fermentata.
4. Succus. Ex herba expressus.
5. ⊖. Ex Cinere.
6. ♂♂ Stillaris.
7. Conseru. Ex foliis seu summit.
8. Syrup. Ex succo.

9. *Extract. Ex foliis c. ☒.*

LXXVI. *Carduus Mariae.*

Carduus Mariae, Trag. Fuchf. ico. Lon. Cast. Ger. Vulgaris, Cam. Carduus Lacteus, Matth. Spina alba hortensis Fuchf. Carduus albus & Chamæleon, Brunf. Carduus Marianus, Cord. in D. Tab. Carduus Leucographus, Dod. Carduus albus maculis notatus vulgaris, C. B. 1. Silybum, Lob. Germ Mariendistel, Frävwendistel, Bechedistel.

OFFICIN. NAT.

Semen inprimis, hinc Folia & nonnunquam Radix.

Vires. *Pectoralis inprimis Carduus Mariae consetur. Calf. & sicc. 2. substring. incidit, aperit: in caseris amulatur barduum benedictum. Usus præcipue in pluritudine, Ictero ac hydroppe*

Dosis seminis ad ℥j.

N. Semen in emulsionibus crebri est usus.

PRÆPARATA.

Δ. Ex herba tenella.

LXXVII. *Carlina.*

Χαυαλίω λευκός, Apri radix, seu Eberwurz, Brunf. Carduus panis seu pacis, Ericio Cord. Chamæleon albus, Matth. Cord. in D. Cast. Carlina herbarior. Lob. Chamæleon albus Diosc. Lob. ico. Clus. hist. Carlina humilis (vel altera,) Dod. Carlina sessili flore, Cam. Carlina acaulos magno flore, C. B. 1. aliis Carolina, cardopatium. Germ. vveisz, Eberwurz.

Crescit in locis montosis, v. g. in Alpibus Heluetiæ & alibi.

OFFICIN. NAT.

Radix collecta tempore verno.

000 2

Vires.

Vires. *Calfac. & succ. 3. e stalexipharmaca, sudorifera, diuretica, emmenagoga, sineas ventris necat.*

LXXVIII. Carum.

Käps, rāps, rapin, Caros, Brunf. Trag. Careum, Fuchf. Carum, Cord. in D. Matth. Lob. Dod. Cast. Tab. Ger. Carui, Lon. Cuminum pratense, Carui officinarum, C. B. 1. Germ. Weiskümmel, Feldkümmel, Mattkümmel.

OFFICIN. NAT.

Semen.

Vires. *Calfac. & succ. 3. discut. atten. Stomachicum est ac dingericum, lactis abundantiam prabet. Hinc usus eius insignis in colica, vertigine, &c. cum interne, tum externè applicatum.*

PRÆPARATA.

1. Confectum Semen.
2. Condita Radix, sed raro.
3. ∇ . Stillat. Ex planta integr.
4. Ol. Ex semine siccola. destillatum.

LXXIX. Cariophyllus hortensis.

**videatur Cariophyllus, Lob. Tab. Ger. Cast. Matth. Cam. Lon. Caryophylla, Trag. Veronica, Dod. Betonica altilis coronaria, Tunica Fuchf. Nagelblümlein, Grasblümlein.*

Hortensis, colitur in hortis varior. color. & discrepantis plenitudinis.

Sylvestris, qui rari usus.

Florescit Iunio arque in multam ætatem.

OFFICIN. NAT.

Flores potissimum rubri.

Vires. *Moderare calf. & succ. Cepha-*

lici sunt ac cordiales. Usus precip. in vertigine, Apoplexia, Epilepsia, aliisque capitis & ueruorum affectibus. In syncope ac palpitatione cordis: fugant lumbricos, allenant partum: Extrinsecus adhibentur in vulneribus capitis: extrahunt ossa crani fissã, lenium Cephalalgiam & odontalgiam.

PRÆPAR.

1. Succus inspissatus, essentia dictus.
2. Flor. rubr. (cum primum gemmæ explicari incipiunt (resectisque albidis illis partibus conuassa irrorando, exprime, clarifica ac coagula lentissime.

N. Calore nimio perdit vires, nimia agitatione cum spatula amittit calorem, Dosis à ʒß. ad ʒß.

2. Conserua ex floribus.
3. ∇ Stillat. ex flor. cum herba lenissimo \mathcal{M} calore.

N. Ophthalmica insignis est, &c.

4. Syrupus. Ex infusione florum.
5. \mathcal{I} . Ex infusione florum. Vide lib. 2.

LXXX. Cariophylli Aromatici.

Charunfel Arabibus. Caryophylli, Matth. Tab. Cariophyllus, Cord. hi. ff. Cast. Calafur Arabibus & plerisque Indis Cariophylli. Lob. Cariophyllus florens & Caryophylli veri Ger. Caryophyllus aromaticus fructu oblongo, C. B. 1. Antophylli dicuntur reliqui maiores, Lon. Lob. Tab. Ger. Caryophylli maturi seu maiores, Cord. hist. Caryophylli mares, Auicenna.

Fructus seu si mauius flos est aromaticus exoticus, Solis radiis induratus & nigrefactus.

Dupli

Duplicis fortis prostant: Nimirum
1. Caryophylli dicti, qui discussi sunt
antequam maturerunt, vnde & mi-
nores esse solent. Germ. *Nelcken*.

2. Anthophylli, *Mutternelcken*,
qui maturitatem assecuti sunt: vnde &
maiores existunt.

Delectus: Eligendi sunt suave fra-
grantes, oleosam quandam humidi-
tatem premendo exhibentes.

Vires. *Cardiacum*, *Cephalicum* ac
Stomachicum insigne exhibent, *calf.* &
sicc. 3. *discut.* Hinc profant in *Lypo-
thymia*, *Odontalgia*, *cruditate ventriculi*,
vertigine; arcet quoque morbos mali-
gnos, *uterinos*, & c.

PRÆPAR.

1. *Confect. Ficta.*

2. *∇.* } vt ex aromatibus reli-

3. *Oleum* } quis eliciuntur, vide l. 2.

vel l. 4. in *Cinamomo*.

N. 1. *Caryophylli multum olei fun-
dunt.*

Vires. *Oleum hoc denti cauo inditum*
odontalgiam mirifice lenit.

4. *Extractum.* Fit ex caryophyllis
cum aq. stillat. & *∇* l. a.

5. *⊖.* Ex remanentiis incineratis
elixiuatur

5. *Balsamus.* Fit l. a. ex ol. *Nucistæ*
depurato ac ol. caryophyll. tingitur-
que puluere caryophyllor.

6. *Species diacaryophyllor.* Vide *Di-
spensator.*

LXXXI. *Caryophyllata.*

Caryophyllata, *Brunf. Trag. Lon.*
Matth. Cast. Tab. Ger. Vulgaris, Lob.
Cam. Clus. hist. *Caryophyllata hor-
tensis, Fuchs.* *Herba benedicta, Brun-
fels.* 4. *Caryophyllata vulgaris, C. B. 1.*
alias. Sanamunda. Herba beuedicta.

German. *Benediktswurz, Benedikt-
krant.*

Crescit locis incultis pinguibus
iuxta sepes.

OFFICIN. NAT.

Radix collecta mense Martio, quæ
odori fragrantis est (23. Marti) cir-
citer, raro *Folia.*

Vires. *Calfac. & sicc. 2. substring.*
robor. discut. cephalica ac cardiaca
est. *Vsus* præcipit interne in *catarrhis*
exiccandis, *sanguine coagulato resol-
vendo.*

LXXXII. *Castanea.*

Κάστανος, Castanea, Brunf. Trag.
*Fuchs. Dod. Lac. Lon. Lob. Tab. Ger. Ca-
staneæ minores, Matth. Castaneæ syl-
vestres. Cord. in D. Cast. Cathanea syl-
uestris, quæ peculiariter castanea, C.*
B. 1. Germ. Kastanen.

Castaneæ etsi omnium glandium
sint præstantissimæ, teste *Galen.* attra-
mentum præter *membranam rubram cor-
tici ac carni intercedentem*, nihil offi-
cinis exhibent.

Vires. *Membrana sistit valenter im-
modicos alui fluores & sanguinis reie-
ctiones (in vino austero sumpta.) Quin*
*etiam cum pari pondere ramentor. ebo-
ris, alba feminar. profluuiâ cohibet.*

Dosis *ʒij.* *Matthiol.*

LXXXIII. *Centaurium minus.*

{ *Minus. De quo hic.*
Centaur. { *Maius Est Rhaponticum*
 { *vulgare. Vide suo loco.*

Dicitur *Centaurium. Trag. Matth.*
Fuchs. Dod. Lac. Lon. Lob. Cam. Cast.
Tab. Centaureum paruum, Lob. Ger.
Centaurea Brunf. Cas. minor, Brunf.

000 ; Centau

Centaurium minus, C.B. 1. alias febrifuga, fel. terræ Germ. Tausentgüldenkaus. Erdgall.

Nascitur solo arido & pratis fabulosis: Floret Iulio & Augusto.

OFFICINA NAT.

Planta foliis ac floribus, referta vel summitates solæ.

Vires. Spleneticum est & Epaticum. Calf. & siccatur, amarum est citra mordacitatem, unde & leniter astringens, extergens, aperiens vulnerarium: biliosos & pituitosos humores quam lenissime per alium educit, serum per poros discutit. Hinc utile in febribus (unde & nomen habet.) Ictero, menstruis suppressis, Scorbuto, Arthritide, lumbricis, & specificè in morsucanis rabidi.

N. Tanta astimationis est, ut vix vinum medicatum seu absynthites vulgus paret, eius partem non constituat.

PRÆPAR.

1. ▽. Ex integra planta.
2. Extract. i. e. succus inspissatus ex herbis ac floribus conquassatis atque cum aqua maceratis.

Dosis ad ℥j.

3. ⊖ Ex Cinere.

LXXXIV. Cēpa, Cēpe.

Κομμύρον, Arab. Bassal. Cēpe, Trag. Fuchf. Matth. Cord. in D. Cast. Capitata. Matth. Cēpa rotunda, Dod. Cēpa fatiua, Matth. Cēpa alba & rubra, Lon. Tab. Cēpa vulgaris, C.B. 1. Germ. Zuvibel, Zuiffel.

Cēparum et si variæ dentur species, differentes pro diuerso colore florum & radicum, tum pro diuersa radicum, figura, rotunda, oblonga, sessili, &c. attamen conueniunt facultatibus, adeoque promiscue vsur-

pantur, acriores tamen sunt oblonge.

Coluntur in hortis, soloque gaudent optimo: Florent Iunio & Iulio.

OFFICINALIA NATIVA.

Radix sola.

Vires. Calf. & siccatur ad gr. 14. aper. incidunt, abstergunt, partium sunt crassarum, adeoque flatulenta. Vsus præcipui in tartaro pulmonum incidendo & expellendo (cum melle cocta & esitata) in vrina & menstruis ciendis, in lumbricis fugandis (ex infusione.) Extrinsecus maturant & rumpunt apostemata (cocta & imposita (etiã maligna in peste (impleta Theriaca vel Mitridatio & cocta.) Vrinam proritant (rosta in axungia & imposita. N. idem facit membranula cuiuslibet carnea particula intercedens, glandi scilicet imposita.) Pernioni conferunt (cum adipe cocta & imposita) menses & hæmorrhoides proliciunt (subdita) ambustis medentur (cruda cum sale subacta ac statim imposita.)

N. Sunt qui contagioso aere in conclauibus suspendunt, vsque contagium colligi, adeoque conclauē purgatum iri autumant.

LXXXV. Cērasa.

Cerasorum varia producuntur genera, tam secundum colorem, quam secundum saporem differentia. Veruntamen in vsu pharmaceuticum duo potissimum acceruntur, subacida rubra scil. (Amarenæ) & dulcia nigra.

Cerasa apud omnes ferè auctores nomen suum retinent & dicuntur cerasa. Germ. Kirschen.

OFFICINA NAT.

Cerasa vtriusque generis siccata, Nuclei & Gummi.

Vires.

Vires. *Acida refrigerant, seccant, astring.* Cer ac Stomachum roborant. Hinc utilia in febrili siti ac astu mitigando, &c. Fernel. decoctum cerasorum in hypochondriaco affectu summe commendat. Dulcia temperata sunt ad humiditatem inclinantis, cephalica, unde & in morbis capitis Apoplexia, Epilepsia, Paralysis, &c. peculiariter proficua censentur.

Nuclei calculum comminuunt, adhibenturque contusi in frontalibus, unguentone refrigeranti commixti, ad dolores febriles capitis demulcendos faciunt.

Gummi celebratur vi lithontripica.

PRÆPAR.

1. *Condita.* Condiuntur acida cum saccharo. Vide supra.

2. *Succus siue Rob.* Ex acidulis fit, expressione scil. & inspissatione.

3. *Syrup.* Ex succo acidor. & saccharo.

4. *∇. stillat.* Ex dulcibus nigricantibus.

5. Ex dulcibus nigris fermentatis Dicitur & QE. Vide de Spirit.

6. *∇. Diuretica.* Ex nucleis utrorumque. Vide l. 2.

7. *Tinctura ac Extractum.* Ex nigris fit cum *∇* vel *∇* propria l.a. *Querc. Phar. Rest.*

8. *Diama- renatum* { *simplex.* R. pulp. ceras. vinos. (per cribrum) lb. iij
sacch. lb. ij.
compos. fit ex simplicibus ac aromatibus.

9. *Oleum.* Ex nucleis exprimi potest, sed minus vsuale.

LXXXVI. *Cerefolium.*

Κασιόφυλλον. *Chærefolium, Brunf.*

Dod. fatium, Trag. Cerefolium, Matth. Cast. vulgare, Ger. Con. Lob. Cam. Tab. Gingidium, Fuchf. Chærophyllum fatium, C.B. 1. aliàs Cerifolium. Germ. Kerbel.

Est { *fatium. Hoc officinale, & iam nominatum.*

{ *sylvestre. Hoc minus vsuale.*

Crescit in hortis, floret Majo.

OFFICIN. NAT.

Folia & Semen.

Vires. *Calfac. & sicc. discitit, est partium tenuium, diureticum, emmenagogon ac lithontripicum, sanguinem coagulatum resoluit, somnum suauiter inducit. Extrinsecus vsus insignis est in dolore colico, in vrina retenta (imposit. in cataplas.)*

PRÆPARAT.

1. *∇ stillat.* Ex integra planta.

2. *⊖.* Ex cinere.

LXXXVII. *Chamedris.*

Trixago, Triflago, Quercula Calamandrina, Gamanderlein, Klein Bathengel.

Species dantur variae, ex quibus officinalis præ reliquis chamædryis minor repens, C.B. 3. Chamæpytis, *Brunf. chamædryis, Cord. hist. Tab. chamædryis vera, Trag. Cord. in D. vera mas, Fuchf. cham. vulgaris mas, Lon. chamædryis major, Lob. ico. minor Ger. chamædr. minor repens, Dod. chamædr. major vel 2. Clus.*

Colitur in hortis, solo gaudens aspero, floret Iunio ac Iulio.

OFFICIN. NAT.

Folia ac Flores.

Vires. *Calfac. & sicc. ad gr. 2. Est splenetica ac Epatica, saporis amari, incid. atten. aperit, potenter vrinam ac sudorem*

dorem mouet. Hinc confert in febribus, Scorbuto, sanguine coagulato, Hydrope incipiente, mensibus obstructis ac inprimis in arthritide. Extrinsecus in ulceribus serpentibus, in dolore hamorrhoidum, in scabie ac pruritu, in catarrhis exiccandis.

P R A E P A R.

1. ▽. Ex integra planta, foliis scil. & floribus.

2. Conserua. Ex floribus.

N. Est & chamadrys fruticescens, quam Teucrium vocant, hac iisdem pollet viribus. Et praeter hanc est chamadrys vulgaris, iuxta sepes nascens, qua vera substitui potest.

L X X V I I I. Chamapitys.

Aiuga, Abiga, Arthetica, Arthritica, iua arthetica, *Schlaffkrautlein, ie lauger ie lieber, pidigrin, Arab.*

Ex generibus variis chamapytios officinalis praereliquis est lutea vulgaris, C. B. 3.

Quae dicitur chamapitys 3. *Trag. Fuchs. 2. Lon. chamapitys 1. Matth. Dod. Cord. hist. vera. Cord. in D. chamapitys maior, Tab. mas, Ger. Aiuga siue chamapitys mas Dioscoridis, Lob. Aiuga, Cast. Aiuga luteo flore, Clus. histor.*

Crescit in agris fabulosis, floret Iulio & Augusto, praecipue autem in hortis colitur.

O F F I C I N. N A T.

Folia cum floribus seu herba tota. Vires. Nervosum genus roborat, calf. 2. sicc. 3. incid. aper. diuretica est, & emmenagoga, confert in arthriticis doloribus.

P R A E P A R.

1. ▽. Ex herba integra.

2. Pilula de iua arthritica.

L X X X I X. Chamomilla.

Χαμαίμανθος, Ἰθέρμανθ, Leucanthemum Dioscor. camomilla, chamomilla, Chamillen.

Est { vulgaris. *Hac usitatissima.*
Romana seu nobilis odorata.
Hac itidem vsualis.
foetida. *Hac minus officinalis.*
Inodorata. *Itidem minus vsualis.*

Vulgaris insignitur chamomilla 3. & vulgaris, *Trag. Lon. chamamelum (parthenij 3. species,) Brunfels. Cast. Tab. Ger. chamamelum Leucanthemum, Fuchs. chamam. sylv. Dod. aruense, Cam. Anthemis, Cord. in D. Matth. Anthemis vulgarior, siue chamamilla, Lob. chamamelum vulgare, Leucanthemum Dioscoridis, C. B. 1.*

Romana dicitur Parthenium & nobililis chamomilla, *Trag. Lon. Leucanthemum odoratum, Dod. Anthemis seu Leucanthemis odorata, Lob. chamam. odorat. Cam. Romanum, Tab. Ger. chamamel. nobile seu odoratum, C. B. 2.*

Vulgaris nascitur passim, in aruis aliisque locis arenosis. Romana colitur in viridariis. Foetida inuenitur itidem passim.

O F F I C I N A L I A N A T I V A.

Flores seu tota herba, tam vulgaris, quam Romana.

Vires. *Calf. & sicc. 1. diger. laxat. mollit, mitigat dolorem, menses & urinam ciet. Eus propter vsus insignis est in dolore colico & hinc pedissequa paresi. Extrinsecus vsuatissimus eius vsus est in paregoricis, emollientibus, maturantibus, cataplasmatibus, clysteribus, &c.)*

P R A E P A R A T A.

1. ▽. Ex vulgari.

2. ▽. Ex Romana.

3. ▽. carminatiua seu de camomilla composita. Vid. l. 2.

4. Ol. stillat. Ex vulgari.

N. Destil.

N. Destillant alij cum Terebinthina, unde oleum caruleum.

5. Ol. Stillar. Ex Roman.

6. Ol. infus. Ex vulgari seu cum floribus ac oleo cummuni.

7. ☉ ex cinere.

8. Syl. de succo camomillæ.

X C. *Chelidonium maius.*

Χελιδόνιον μέγα. Celidonia, Brunf. *Chelidonium maius*, Trag. Matth. Fuchf. Cord. hist. Dod. Lob. Cast. Tab. Ger. vulgare, C. B. 1. aliàs, Hirundinaria, Germ. *Schvvalbenwurtz*, *Schellwurtz*, *Goldwurtz*.

Crescit passim iuxta sepes, adhærescitque muris: Floret primo statim vere & per multam ætatem.

OFFICIN. NAT.

Folia c. floribus, Radix.

Vires. Calfac. & sicc. 3. valide absterg. atten. saporis est acris & amari, bilem per aluum & urinam educit, visum acuit. Hinc conducit in Ictero, obstructione Lienis & Epatis, Vreterum. Radix alexipharmaca statuitur. Extrinsecus oculorum imbecillitati, ulceribus, caterisque affectibus medetur, (Cuius rei gratia sunt, qui succum luteum ex rupto caule manantem, oculis induunt.)

N. Sunt qui ad Icterum sanandum plantis pedum supponunt.

PRÆPARATA.

1. Succus inspissatus

☽. Ex herba cum floribus.

3. ☉. Ex cinere.

X C I. *Chelidonium minus.*

Χελιδόνιον μικρόν. Ficaria & serophularia minor vel 2. Brunf. *Chelidonium*

minus, Trag. Matth. Fuchf. Dod. Cord. in D. Lon. Lob. (ast. Tab. Ger. *Chelidonia rotundifolia minor*, C. B. 2. Arabib memiten, Feigwurtzenwurtz, klein Schellkraut, Schorbütskraut.

Crescit locis humidis & palustribus. Floret Martio.

OFFICIN. NAT.

Radix & Folia.

Vires. Refrig. & humect. spleneticum est. Vsus præcipui, in Ictero, Scorbuto, hamorrhoidum fluore. Extrinsecus specificè mariscas seu ficos ani curat, dentiumque purèdini maximopere subuenit.

PRÆPARATA.

☽. Stillar. Ex herba tota.

X C II. *Chermes.*

Kermes, coccum infectorium, Matth. coccus infectoria, Cord. in D. Cast. Tab. Granum & coccus baphica Dioscor. granum tinctorium, Lon. aliàs Scarlatum. Fructus est famosissimi fructeis, qui inscribitur Ilex in quo coccus baphica, Bellon. Ilex coccigera, Clus. hist. Ger. minor coccigera, Dod. Ilex coccifera, Cam. Ilex acculeata cocciglandifera, C. B. 4. Germ. *Scharlachbeer*, *Rermeakærner*.

Nascitur in Creta, teste Bellon. l. 1. obs. c. 17. vti & multis Hispaniæ locis, in Narbonensi etiam Gallia & Provincia, &c.

Delect. Eligenda sunt grana rubicundo-nigra, integra, vermiculum in feco continentia.

Vires. Cardiaca sunt grana calf. & sicc. adstring. vapores terros discutunt, spiritus vitales reficiunt, parturientibus subueniunt, vulneratis nervis medentur, morbillos erumpere faciunt.

PPP PRÆPAR.

P R A P A R.

1. *Confectio Alkermes*. Vide Disp.

Fit cum & sine moscho illa viris, hæc mulieribus conuenientior est.

2. *Extractum seu Essentia*. Fit è fructibus contusis cum ∇ vel ∇ Rosar. quæ acidula reddita sit guttulis aliquot. spir. \odot aut \triangle ris. *Quercetan.*N. *Scarlatu* pannus, granis hisce,

(quibus tinctus est) admodum celebris est, adhibeturque non modo ad morbillos proliciendos. (Patientes in eum inuoluendo,) sed & ad eor roborandum (Epithemata eo suscepta cordis regioni imponendo,) ut & ad bubones venereos curandos (pannum iis imponendo.) Quis & filo sericeo huius coloris, ad arcendum Erysipelas, locum affectum circumligare vulgo vsuatiissimum est.

X C I I I. *Cheyri, Keyri, Leucojum.*

Classes Leucojorum, C. }
 B. sunt 4. exhibetque. }
 1. Incanum (folio incano) hortense,
 2. Incanum maritimum,
 3. Luteum folio hirsuto,
 4. Luteum folio viridi,

singula sunt diuersorum generum.

Ex his placet officinis luteum vulgare, C. B. 5. inter Leucoja folio viridi, quod est Leucojum. *Bruss. Cord. in D. Leucojorum aureum, Matth. Leucojum Luteum, Fuchs. ico, Dod. Lob. Cast. Cam. Leuc. satium luteum, Clus. Keyri vel Cheyri, Lon. Viola lutea, Trag. Fuchs. Ger. Viola petrea lutea, Tab. German. gelbe Biolen, Nagelveilien.*

Crescit nobis in hortis, raroque sponte prouenit: Floret Aprili, Majo & ultra.

O F F I C I N. N A T.

Floras, seu herba cum floribus, & raro Semen.

Vires. Cordiales sunt, calf. & sicc. 2. attenuant, discut. partium sunt renium, extergent, cordiales ac nervini sunt, dolores mitigant, menses cient, secundinam prouocant.

P R A P A R.

1. *Conserua*. Ex floribus.
2. ∇ . Ex floribus vel integra planta.
3. *Ol.* Ex infusis floribus in oleo ueteri.

X C I V. *China.*

Chinza radix, China radix, *Fragos. C. B. I. Cina* alias China, *Matth. China, Garz. Acost. Chinna* seu Cinna, *Cæsalp. Bochenwurzel.*

Est } Orientalis. Ex regione Sinarum, China dicta.
 } Occidentalis. Ex Hispania noua & Peru.

Præfertur Orientalis quæ exterius est colore rubente aut subnigro, interius candicante aut subrubente: & hæc, quò nigrior eò melior. Occidentalis colore est interius magis ruffo.

Vires. Calfac. leniter siccac. 2. substringit, est diaphoretica, diuretica, discutiens, aperiens, Epatica. Hinc conuenit in cachexia, hydrope, paralyfi, arthritide, cephalaa, ictero, lue venerea, tumoribus scirrhis & œdematosi.

P R A P A R.

Extract. cum ∇ , quod tamen rari vsus: adhibetur crebrius in decoctis, sufficitque \mathfrak{z} j. vel \mathfrak{z} ij. pro \mathfrak{ss} ix. ∇ a.

N. *Vesca*

N. Vesalius de China librum conscripsit integrum.

XCV. Cicer.

Erbsen, Kücher, Ziser Erbsen.

Satiuum { album.
rubrum.
nigrum.
Syluestre.

Ex his aridetur officinis rubrum satiuum, cui tamen & album substitui potest.

Videatur Cicer, Brunf. Matth. (cui & Domesticum, Cord. in D. Cast. Tab. Ciceris altera species, Trag. cicer nigrum, Fuchf. seu arietinum, Cord. hist. cicer arietinum, Dod. cicer satiuum, Ger. Arietinum, Lob.

Vires. Calf. & sic. 1. emoll. absterg. discut. diuretica sunt ac lenientia, proin conducibile est eorum decoctum nephriticis. Extrinsecus adhibetur farina in cataplasmatibus, &c.

XCVI. Cichorium & Cichorea.

Kropfen, Zepes, folsequium, intybus, Ambubeia, Cicorea, Cichoren, VVegwart, Sonnenwendel, Sonnenkraut.

Satiuum. Syluestre flore { caeruleum vel albo.
luteo.

Ex his vstratum satiuum, tum syluestre caeruleum vel album.

Crescit iuxta vias, floret Iunio.

Satiuum dicitur Cichorium domesticum, Matth. Cast. Cichorium satiuum caeruleum, Lob. Cichorium latioris folij, Dod. Cichor. latifolium satiuum, Lon. seris satiuum, Lob. Cichorium satiuum & album sat. Tab. Ger. Cichorium satiuum, C. B. 1. Syluestre

dicitur folsequium, Brunf. Cichorea, Trag. Syluestris, Matth. Seris syluest. Lob. Seris picris, Lob. ico, Cichorium syluestre, Dod. Cast. agreste, Lon. Intybum agreste, Cord. Syluestre, Fuchf. Cord. hist. Cichorium, Tab. Hieracium latifolium. Ger. ico. Cichorium syluest. siue officinar. C. B. 2. Seris $\pi\iota\pi\iota\varsigma$ Dioscoridis.

OFFICIN. NAT.

Flores, Folia (syluestris potissimum) Radix (satiui.)

Vires. Epaticum est nobilissimum frig. & sic. 2. (aliis calidum videtur ob amorem) aperit, diureticum est, attenuat, extergit. Vfus praecipue in Epatis obstructione & febris.

N. Collectum in sua exaltatione (die festo Natiuitat. Mariae,) hamorrhagias sistere creditur.

PRÆPAR.

1. Conserua. Ex floribus.
2. Condit. Radix cum saccharo.
3. Syrup. simpl. Ex succo & sacchar.
4. compos. (Cordi.) Vide Dispens. Norib.
5. de cichor. cum Rhab. Florent. Vide Disp.
6. ∇ . Ex foliis & floribus.
7. ∇ ophthalmica. R. Flores caeruleos (collectos \odot in principio Ω collocato,) q. v. inde vitro officij angusti, obrura optime & massæ panis circumuolutum committe Clibano, vt pinsatur cum pane: hinc exprime ac destilla in MB.

Vires. Conuenit omnibus affectibus oculor. albugini, nubecula, vngui, suffusioni, caligini, &c. Inungitur palpebræ mane & vespere. Harum. in Pract. Poppus in Herbar.

8. ☉. Ex planta incinerata. Attenuat, discutit, febrifugum est.

XCVII. Cicuta.

Köthen, Wüterich, Schierling.

Ex Generibus cicutarum infertur in Officinas, cicuta major, C. B. 1. quæ Cicuta, Trag. Matth. Fuchs. Dod. Lob. Lon. Cast. Tab. Ger. Cicuta major, Cord. hist. Cam. Vera Gesn. hist. Cicutaria vulgaris, Clus. hist.

Nascitur passim in pratis, locis incultis & umbrosis: Floret Iunio & Julio.

OFFICIN. NAT.

Folia & Radix, sed raro.

Vires. Quamvis summe frigida censeatur, atque inter venenata referatur à Dioscoride; Nihilominus tamen frequens eius usus modernis est in tumore ac inflammatione lienis, succus Emplastro splenico incoctus extrinsecus adhibetur: hinc in inflammationibus aliis, quinimo adhibetur quoque nonnunquam in collyriis.

Sunt qui radicem fodere monent tempore ☿ ♄ & ☉.

PRÆPAR.

Emplastr. de Cicuta splenetic. Vide lib. 2.

XCVIII. Cinamomum.

Cortices sunt arboris cuiusdam exotice, eiusdem nominis. German. Zimmetrinde, Canel.

N. De Cassia & Cinamomo officinar. quod & Canella dicitur, controuerse occurrunt opiniones. Sunt enim qui inter se confundunt & pro vno & eodem vtrumque habent Cortice, solisque nominibus differre, non re ipsa: alij ex sola loci

varietate ea distinguunt, non ex diuersa specie arboris: alij ex vna eademque arbore vtrumque desumi volunt, cuius corticem exteriorem & crassiorem appellant cassiam ligneam seu odoratum; interiorem & tenuiorem Cinamomum. Alij diuersæ speciei arborum cortices faciunt, inter quos tamen maxima similitudo intercedat, adeo ut Cassia arbor in Cinamomi arborem transflectari facile queat: Hec opinio Galeni. Recentiores prima ut plurimum subscribunt opinioni, Cinamomumque officinarum vulgo canellam dictum, legitimam antiquorum cassiam ducunt. Et in compositionibus Græcorum Xylocassiam, i. e. cassiam ligneam seu odoratam postulantibus, canellam nostram esse adhibendam. Si qua tamen distinguere libet, crassiorem cassiam appellare licet, tenuiorem Cinamomum, differentia suborta à differente loco natali arborum.

Videantur supra hac re Garzias ab H. lib. 1. arom. hist. cap. 15. Ioh. Manard. lib. 8. Epist. 1. Matthiol. in Dioscor. Caspar Bauhinus Theatr. Botan. lib. 11. f. 3. & sim.

Frequentes sunt hæ arbores in Zeilan, Cinamomumque præbent præstantissimum, ignobilius è contra Cinam. præbent arbores in Prouincia Malauar. & Iaba seu Iaua.

N. Roseum sine ex cinereo vinosum colorem contrahit Cinamomum, ex solis calore, cui cortex detractus exponitur: non probe idem paratus, candicans sine cinerei coloris fit, nimis vero ardoribus solis combustus niger.

Delectus. Probatum subrubum odoris fragrantissimi, saporis subastringentis & acris.

Vires. Calf. & siccat, aperit, discutit, menses & partum accelerat, omnia vis-

cera spiritusque singulos recreat, concolliones iuuat. Hinc vsus eius frequentissimus est in virium imbecillitate, lypothimia, capitis, ventriculi & uteri affectibus frigidioribus.

P R A E P A R.

1. Confect. Cinamom.
 2. ∇. Cinamon. Fit l.c. vt ex aliis aromatis. Vide l.2. vel vt in destillatione olei.
 3. Tinctura seu Extract. cum V f. laro.
 4. Elixir. Cinam. Fit ex Tinctura cinamomi, additis & croci & santali citrini Tincturis.
 5. ^{oo} Elicitur vna cum ∇ beneficio destillationis, l. 2. lb. j. dat ℥ij. vel ℥iib.
- Nota de menstruo: Alij adhibent solum vinum; alij vinum cum ∇ mistum: quibus quoque ☐ aut ⊖ commune insuper admiscant.
6. Sal. Ex fecibus incineratis elixiuatur
 7. Balsamus. Ex ol. Cinam. ol. Nucif. depurato. Tingitur bolo Orientali vel puluere Cinamomi.
 8. Syrup. Vide Dispens. Norib.
 9. Magisterium. Extrahitur cum V opt. ac praecipitatur cum ∇ font. vel cum ∇ Cinam. primum stillant, retinetque colorem Cinamomi.
 10. Spec. Diacinam. Vide Dispens.

X C I X. Citrus.

Malus Citria, Medica, Assytia. Arbor est exotica per totum annum vicens, fructumque tenellum cum maturescere simul ferens.

Videatur Citrum, Brunf. Citria, Trag. Citrus. Tab. Cord. hist. Malus Medica, Math. Cord. hist. Dod. Lob. Malus ci-

tria, Gesn. hort. Lon. Cast. Clus. hist. Cam. Citria & mala Medica, Bellon. Malus Medica, C. B. 1. Citronbaum.

Dicitur Medica & Assytia quia apud Medos & Assyrios & imprimis apud Persas frequens est. Hinc in Italiam translata fuit, postea & in Hispania in vsum deuenit, vt nemora & campos occupat hodie. Colitur & apud nos in hortis.

O F F I C I N. N A T.

Fructus seu Poma Citrea, (citrea) Cortices & Semen raro Flores. Fructus variant magnitudine: quaedam sunt maiora instar melo-peponum: alia minora & vulgaria: alia Limonum magnitudine. Sic alia praelonga sunt, alia rotundiora: in officinis vsitatoria sunt minora, vt pore quae carnosiora, tum quoque maiora.

Vires. Citrium malum (cum cortice ac carne) alexipharmacum putatur cui insibet veneni, resistit putredini morbisque malignis, lumbricos fugat, diaphoreticum est. Cortex calf. 1. sicc. 2. (aliis calef. & sicc. 3.)

Caro: seu pulpa refig. & humect. & hinc succus expressus.

Semen: calf. & sicc. attenuat, digerit, abstergit, lumbricos fugat.

P R A E P A R.

1. Condit. 1. Poma maxima condiuntur nondum satis matura, cum cortice ac carne incisa, nucleis exemptis: dicuntur nostratibus Citronat.

N. Eodem modo condiuntur & minora, integra vel in taleolas dissecta.

2. Cortices. Condiuntur post mitigationem amaroris, cum saccharo.

3. Flores cond.

2. Conseru. 1. ex floribus.

2. Ex medulla, remotis sc. corticibus ac femine succo que expresso.

P P p 3 3. Con

3. Confect. cortic.

N. Maiores cortices conditi dicuntur.

Citrinat. confect.

4. ▽. Ex corticibus.

5. O° itidem cum ▽ ex corticibus extillar.

N. Potest & exprimi oleum ex semine; sed minus id usitatum.

6. Succus. Ex carne exprimitur & referuatur pro vsu, diciturque nonnullis Vinum citri, præcipue si cum tantillo sacchari sit fermentatus.

7. Syr. acetositis citri. Ex succo & saccharo.

Syr. citri simpl. Ex cortic. Vide Disp. Compos. Vide Disp.

8. Morsuli citri. } Vide suis
Citri laxatiu. } locis

9. Balsamus Ex ol. stillat. & ol. Muschato.

10. Electuarium de Citro solutiuum.

C. Citrullus.

Cochlearia Zaffelky aut, } folio subrotundo, cochlearia Batavica, quæ
vsualis.

Vocatur Cochlearia, Dod. Cam. Ep. Matth. Tab. Cochlearia Batava, Lob. Cochlearia fol subrotundo, C. B. 1.

Crescit apud nos in hortis loca amans palustria rigua & umbrosa: floret April. Maio. Videlicet anno secundo à satione.

OFFICIN. NAT.

Folia, quæ recentiora abhibere præstat, quam siccata, quippe Sal volatile quo potissimum efficacia sunt arefendo euanescent.

Vires. Calf. & sic. 2. ad 3. aper. est splenetica, ac diaphoretica, fixos ac crudos humores spirituales ac volatiles redens, purridimique resistens. Hinc utilis

Citrullus, Anguria, Angurien. Species Cucumeris est, fructu rotundo, quo reliquas cucumeris species quoad magnitudinem exuperat.

Dicitur Citrullus, Trag. Lon. Tab. officinar. Lob. Ger. Anguria, Matth. Dod. Cast. Cam. Cucumer vel cucumis citrullus, Fuchf. Anguria citrullus dicta, C. B. 1.

N. Variat Corticis colore, qui aliis viridis seu herbaceus, aliis candidus maculis aspersus: Caro aliis rubens & dulcis, aliis candida: Semina colore nigro, rubro, fuluo.

OFFICIN. NAT.

Officinis tantum Semen in vsu est, idque adhibetur vel cum, vel sine cortice.

Vires. Est ex 4 sem. frig. maj. Refrig. itaque & hum. ad gr. 2. est Diureticum, aperiens, acrimoniam obtundens. Inseruit præcipue Renibus ac vesica abstergendis, bilis ac sanguinis aestui compefcendo.

folio sinuato Britannica, Lob. hæc nobis inusitata. in hypochondriacis morbisque Tartareis primæ regionis, ac præcipue in Scorbuto, in cuius medicatione celeberrima audit, adhibeturque intus & extus in gargarismis, (ad putredinem ginginarum) balneis, ad artuum resolutionem.

PRÆPARATA.

1. Conseru. Ex fol.
2. ▽ stillat Ex fol. recent.
3. Syrup. Ex succo & saccharo.
4. O° volatile. Ex succo.
5. Spiritus è foliis fermentatis.
6. Succus expressus.

N. Recens maxima est efficacia ad arcendum oris ac ginginarum putredinem, etiam post morbillos. Inspissatus loco

loco Extracti assumi poterit.

CII. Lignum Colubrinum.

Lignum serpentarium, Clematidis Indica, C. B. 2. Ligni colubri alterum genus Garzia, Trag. & Clus. Lignum colubriaum, Tab. Germ. Sriesholz.

Aduchitur ex Insula Zeilan. Eligendum amarum, non cariosum, graue.

Vires. Calidum est ac siccum (vt amaror arguit) abstergit morsibus serpentum, aliisque venenis medetur: bilem ac mucilaginem per aluum (nonnunquam etiam per vomitum educit) unde vsus precip. est in febribus intermitentibus, tertiana ac quartana: Lumbricos necat ac fugat. Extrinsicus maculas cutis abstergit.

PRÆPARATA.

Extractum, cum Centaurei vel simili factum.

Dosis ad ℥j.

CIII. Contrayerua.

Contrayerua, radix yerua, radix contrayerua, radix bezoartica, alexipharmaca, radix contra venena, rad. venenis aduersans. Monar. Siffrovuri.

Ex radix Iridis vel Cyperiradicibus non absimilis, quæ annis abhinc aliquot ex Prouincia Peruana. Charcas apportari cepit.

N. Bauhinus facit speciem Cyperi, vocatque Cyperum longum, odorum Peruanum.

Eligatur densa non cariosa, quæ aromaticum quiddam sapiat, cum acrimonia coniunctum.

Vires. Calida est 2. alexipharmaca & sudorifera, præstantissimumque remedium aduersus omne venenum, cum

in scunq; sui generis (excepto) vomitione id reiiciens, aut per sudores euacuans. Sed & amatoria pocula ex pulnere hausto, educi ferunt. Ventris etiam animalia pellit. Quin & in peste felix eius vsus compertus est, vt & morbillis nigris.

Dosis ℥j.

CIV. Consolida.

1. Consolida seu conf. maior. Vid. Symphytum.
2. Consolida media. Hac huius loci.
3. Consolida minor. Vide bellis horrensis.
4. Consolida Regalis. Vide Calca-trippa.
5. Consolida aurea & sarracenicæ. Vide Virga aurea, Süldengünfel.

Est } flore cæruleo. Hac vsualior.

Est } flore purpureo. Hac rari vsus.

Dicitur Consolida media. Brunf. Matth. Fuchf. Tab. Cast. Consolida media prima, Tab. prunella cærulea, Trag. Bugula, Dod. Clus. hist. Ger. Begula & prunella quibusdam, Lob. Symphytum medium, Lon. Consolida media pratensis cærulea seu N. 1. C. B.

Crescit in locis campestribus: floret Majo.

OFFICIN. NAT.

Herba.

Vires. Vtraque vulneraria est, tam intrinsecus quam extrinsecus adhibita: confert & ictero, Epatis obstructioni, vrina retentioni, herniis, &c. Breuibus: vt ea cum Prunella & figura ferè conueniunt, ita & viribus.

CV. Corallina.

Ἐπίου θαλάσσιου. Dioscor. Muscus maritimus,

rinus, *Matth. Cord. in D. Cast. Tab. Corallina*, *Lob. Lon.* Muscus maritimus seu corallina officinarum. *C. B. Germ. Meermoos, Corallenmoos.*

Inhaeret scopulis & piscium testis corallisque, eo sane modo, quo muscus arboribus innascitur, optimaque est, quæ à corallis detrahitur.

Eligatur colore cum sicca est, sub-rubeicente, salso sapore, odore concharum marinarum simili.

Vires. *Refrig. & sicca. astringit. in-crassat, ut lumbricos necandi & expel-lendi celeberrima est, intus & extus ahibita.*

Dosis ad ℥j.

PRÆPAR.

Magisterium: fit cum lixiuio forti. *Vid. l. 2.*

Dosis ℥j.

CVI. Coriandrum.

Κόριαννον ἢ κορίαννον, Dioscor. Coriandrum, Germ. Soriander.

est { 1. Maius. Hoc usuale solum.
2. Minus testiculatum } inusi-
C. B. { 3. Sylvestre. } tata.

Insignitur Coriandrum, *Brunf. Trag. Euchf. Matth. Cord. hist. Lon. Lob. Cast. Cam. Tab. Ger.*

Colitur nobis in hortis, solo gaudens pingui: floret Julio.

OFFICIN. NAT.

Semin granosum, quod primum halitum grauem halat, resiccatum autem suauem acquirit odorem.

Vires. *Stomachicum. exprimis est, calf. & sicca ad gr. 3. astring.* Hinc celeberrimum in laxitate stomachi, si post cibum assumatur, claudit enim ventriculum,

exhalationesque suppressit, quo minus caput grauent, vultusque producant.

PRÆPARATA.

1. *Præparatum.* Præparatur sem. Coriand. maceratione per noctem in + dein exiccatur.

N. Præparatio hæc fit ob castigationem qualitatis noxia (crudioris & excrementitia) quam tamen & arescentia amittit.

2. *Confectio.* Ex semine præparato.

3. ∇ stillat. *Rari* vsus est.

4. ∞ cum Δ ascendit.

CVII. Cornus.

Cornus, Germ. Cornerbaum.

Est { Mas { hortensis, satiuæ. *Hæc vsu-
alis
sylvæstris.*
fœmina, *Lon. syluest.*

Indigitatur Cornus, *Brunf. Trag. Matth. Lon. Dod. Lob. Cornus mas, Tab. Cornus satiuæ & mas Cord. in D. Cornus vulgaris mas, Clus. hist. Cornus hortensis mas. C. B. 1.*

Flotere incipit initio veris: colitur in hortis.

OFFICIN. NAT.

Fruktus, rarissime Folia.

Vires. *Viraque refrigerat, exiccet, astringunt, conspant.* Hinc conueniunt præcipue in diarrhæa & dysenteria. Exhibentur fructus exiccati & puluerisati ad ℥j.

PRÆPAR.

1. *Condit. succus, cum saccharo, l. a.*

2. *Rod. de Cornis.* Vide *Disp. August.* Ex succi pulpæ, p. ij & sacch. p. i.

CVIII. *Corylus & Auellana.*

<p><i>Corylus</i> <i>Hasel-</i> <i>staud</i></p>	<p>{ Nostras { Peregrina</p>	<p>{ fatiua { syluestr. fructu est minore, albidiore & rotundiore quam natiua. Humilis</p>	<p>{ fructu albo minore. <i>Corylus vulgaris.</i> fructu majore } rotundo maximo. oblongo rubente.</p>		
				<p>{ fructu purgatrice Monard. fructu osculi trifidi, &c.</p>	<p>} Nostratibus non sunt vsuales.</p>

Ex his officinis in vsum veniunt no-
strates coryli, quæ describuntur ab au-
thoribus vel coryli vel auellanae titulo,
&c. Præfertur autem fructus oblongus
tubens in compositionibus.

Solo gaudet arenoso & opaco.

OFFICIN. NAT.

Lignum, Fructus & Viscum.

*Vires. Lignum per se raro officinale
est, nec asservatur, nisi pro parandis
inde spiritu ac oleo. Adhibetur autem
corylus syluestris.*

N. 1. *Serpens virgâ corylina percussus,
torpescit; unde coniectare licet, facultate
anti serpentina corylum abundare.*

N. 2. *Faciunt ex eiusdem coryli sylue-
stris bifido furculo virgulam quâ metalla
seruantur.*

*Fructus (auellanae καρυόσπυρα) exhi-
bent vsui medico, nucleum, putamen &
membranulas.*

*Nuclei teste Gal. 1. 7. simpl. med. plus
habent essentiaë terrestris ac frigidaë,
quam iuglandes. Venenis resistunt ve-
nenosorumque animalium ictibus,
(cum ruta & ficibus imposti) ex mulso
hausti veteri tussi medentur, vrinæ ar-
dorem mitigant.*

*Putamen crudum in puluerem con-
tutum astringit, obstruit ac proin silit
diarrhæam, albaque foeminarum pro-
fluvia. Quercetanus specificum anti-*

*pleuriticum inde facit, cum corall. rub.
& mandibul. lucij.*

*Membranula nucleum ambientes
eiusdem cum putamine sunt faculta-
tis, eidemque præferenda. Eliguntur
rubei coloris.*

PRÆPAR.

*Ex ligno. 1. Spiritus fit per Retor-
tam igne nudo ex sarmentis exiccatis.
2. Oleum fit itidem per
Retortam vel per descensum.*

*Vires. Vim habet utrumque calfa-
cientem, incidentem, anodynam, antiepi-
lepticam ac præcipue odontalgicam.*

*N. Sunt qui oleum hoc oleum ligni
Heraclei, Rulando dictum autumant,
nec sine causa quidem. Etenim non mo-
do viribus isdem celebre est, quas Ru-
landus oleo suo Heracleino adscribit, sed
& nominis rationem habet. Corylus
enim, quia primum ex Heraclea Ponti
in Graciam translata fuit, heracleotica
sive pontica dicta est, adeoque & nucis
heracleotica.*

PRÆPAR.

*Ex auellanis. Oleum expressum.
Vires. Arteriarum dolores inunctum
inuat.*

*N. Ingrediuntur etiam nonnullas
compositiones alexipharmacas, ubi præ-
ferenda fatiua rubescentes, & præcipue
oblonga, ut dictum supra.*

CIX. Costus.

Kic & Cost-
 wurz.

{ verus { falsus	{ dulcis { amarus	hic officinalis,
		Costus, Matth. & Lon. i.e. Panax costinum, pseudocostus.
{ falsus	{ amarus	Costus Hortensis minor. Gesn. i.e. Ageratum.
		Costus Horror. Lob. i.e. Mentha.

N. Officina in dulcem & amarum dividunt, quam divisionem non diverse speciei, sed diverse aetatis Clusius non sine causa statuit. Nimirum recentiores herba dulciores, cum vetustate tandem amarescunt.

Costus verus officinis nostratibus visitatus, est cortex extrinsecus cinereus, intrinsecus candidans, C. B. 6. & 7.

Eligatur costus recens, densus, odoratus, lubamarus, non cariosus.

Costus amarus dicitur, Helenij Comagenij radix, Cord. in D. Costus comagerius, adulterinus officinar. Lob. costus officinar. amarus, Lon. Cast. Tab. costus amarus officinarum seu Helenium comagenium Dioscoridis, C. B. 6.

Costus dulcis dicitur, Costus dulcis officin. Lon. sed adulterinus, Tab. costi pharmacopolarum species major, Cam. in Matth. costus dulcis, Cast. costus dulcis officinar. centauro magno cognatus, C. B. 7.

Vires. Stomachicus, Epaticus, Nierimus ac Nephreticus est calfac. sic. 3. at-ten. aper. disc. Hinc convenit in colica, obstructis mensibus & urina, hydrope, paralyti.

P R A E P A R.

1. ρ costinum Mesuae. Vide Disp. (excost. p. ij. cass. lig. p. i. maior. p. viij. cum vino ac oleo sesamino.)

N. Febrilem rigorem spina innunctum mitigat.

2. Pilula marocostina. Vide l. 2.
 3. El. caryocostinum. V. D. N.

CX. Crocus.

Krocus, Planta est bulbosa, florem primo autumnio ferens purpureum, cuius flammae stamina (instar antherae) officinarum crocus est. Germanicè Saffran.

Ex croci generibus plurimis officinal. est crocus sativus, C. B. 1. Huius differentiam officinae faciunt à natali loco, vnde Crocus Viennensis, i.e. qui ex Viennensi agro ad nos transportatur, vbi optimus hodie nascitur. Orientalis qui ex locis orientalibus ac praecipue ex Sicilia transmittitur, in cuius monte (caryco nomine) omnium praestantissimus provenire censetur. Vulgoque dicitur Crocus de Aquila. Germ. Zinnmar, Saffran.

Videatur Crocus, Braus. Trag. Fuchs. Dod. Cord. Lon. Tab. Crocum, Matth. Cast. hortense, Cam.

Eliguntur crocus flexilis, tritu difficilis, albicantibus nonnunquam filamentis permixtus. Reprobatur è contra saturato nimis colore rubro, odore fugaci, utpote qui vel cnici floribus, vel carnis bubulae salitae villis adulteratus.

N. Adulteratio croci adeo impostoribus communis est, ut Emporiis nonnullis visum sit, certos deputasse inspectores, quorum

quorum iudicio ut bonus crocus venalis pronuntiatur: ita adulteratus Neptuno, Vulcanone, non citra venditoris ignominiam consecratur. Cuius rei exemplum hic Francofurti aliquot abhinc retro annis observare licuit.

Vires. Cordialis est ac pulmonicus (ut quoque anima pulmonum audiat) vicerinus, & hinc ceteris visceribus familiaris; calf. 2. sicc. 1. aper. dig. emoll. anodynu est, somnum conciliat, mentes ac fatum pellit. Vfus eius frequens in syncope, Apoplexia gutta 1. ac 2. in illura aspergitur lingua (in hysteriis affectibus, in ictero in peste aliisque venenosis morbis, in asthmae (cum ol. amygd. dulc.

Dosis ad ℞j.

Extrinsecus collyriis, & sim. adhibetur.

NB. Vfus eius immodicus (scilicet ad ℞ij. vel iij.) lethalis censetur.

P R A E P A R.

1. Species diacurcuma. Vide Disp.

2. Tinctura seu essentia croci. ℞. Croci Orient. q. v. extrahe cum V opt. abstrahe. lentiss. Δ ad consistentiam debitam. Begun.

N. 1. Alij extrahunt cum vis cordialibus, e.g. rosarum, jisque guttula una ac altera spir. Θ i vel Θ is roboratis: alius fit extractio cum V vitis vel sero lactis.

N. 2. Spiritus vini abstractus croci facultate est impragnatus, idcirco cum successu in usum Medicum venire poterit.

N. 3. Alij collocant crocum cum syndone in alembicum, destillantque V ex cucurbita tantisper, donec coloram ex croco susceperit. Tinctum V iterum destillant ad remanentiam. Tinctura in fundo. Tent. Zel.

3. Extractum.

4. Oleum croci Mesna, (compol.)

5. Ol. stillat. paratur ut olea reliqua ex floribus, sed rarissimum est, ob nimios scilicet sumptus, quos requirit. Nimirum ex croci ℞j. vix ℞j. elici poterit.

N. 1. Alij ℞. croc. or. ℞. β. Terebint. ℞. β. V. opt. q. s. destillant, sapinsque a fecibus cohobant. Alij ℞. croci opt. ℞. β. terunt grosse ac admiscunt ℞. i. Θ is, an. ℞. β. circiter, cum albumine oui F. pulmentum, cui superfundunt Vm. fontan. calidam (vel Vm mellis) digeruntque dies (3. 4.) Hinc destillant per X ex cinere. Medull. destill.

N. 2. Habet potestatem prosternendi appetitum.

6. Trochisc. de croco. Vid. Disp.

7. Elect. de ovo dictum. Gulden Ey. Vid. Disp.

8. Empl. oxycroceum. Vid. Disp.

C X I. Cubebe.

Κουβέβα, Cubebe, Quabebe, Cubebe vulgares. Germ. Cubeben.

Fructus sunt aromatici exigui, forma & magnitudine piper rotundum referentes, nisi quod ferè paulum sint minores. Aduchuntur ex Iava, Ind. or. Insula, vbi decoquuntur antequam vendantur, ne apud exteros plantentur. Præstant maiores, recentes, ponderosa.

Dicuntur Cubebe, Garz. Acost. Fragos. Cord. hist. Cast. Tab. Matth. (qui eas nec Arabum cubebas, nec Galeni carpesium demonstrat.) Cubeb. vulgares, C. B. officinarum. Lob. carpesium Græcorum, Lon.

N. Quid sint cubebe, ambigitur: alij ex genere piperis & nigro piperi congeneres

neres esse, Theophrastoque piper rotundum dici volunt: alij viticis fructum (at facultates sunt diversa) existimant: Sylvaricus, Rusci fructum: alij carpesium Galent statuunt. At Casalpinus, Amomi legitimi fructum pronunciat. Est autem fructus racemosus arboris cuiusdam malo vulgari similis, foliis vero piperis, sed angustioribus.

Vires. Calfac. 2. completè sicc. 3. compl. atten. disc. viscera omnia roborant atque inprimis caput, adeoque plurimis inseruiunt compositionibus.

PRÆPARAT.

1. Confect. c. saccharo.
2. Ol. Cubebar. still.
- N. Rari usus est.
3. Spec. Diacubeb.

CXII. Cucumis.

Cucumis (σίκω) in genere notat omnes fructus horarios, adeoque sub eo comprehenduntur

}	Cucumis officinarum qui vel	Satiuus, h. loci.
	Pepones,	Sylvestris Asininus.
	Melones.	Vide in class.
	Anguiaz, &c.	4. Elaterium.

Dicitur cucumis satiuus, Brunfels. Math. Fuchs. Lon. Cast. cucumis, Trag. Tab. cucumis vulgaris, Dod. Ger. cucumber satiuum, Cord. in D. cucumis satiuus & esculentus, Lob. cucumis satiuus vulgaris, C. B. 1. German. Suchmern.

Suntque cucumeres vitides, albi, longi, recurui, læues, asperi.

OFFICIN. NAT.

Solum Semen, cui & ipsi Fructus addi possunt: hi enim etsi sint culinares; attamen cibum præbent medicamentosum.

Vires. Semen (seu nuclei) ex numero est famosior. 4. sens. frig. maj. refriger. (præcipue si aridum sit, aliàs) in sine grad. 1. absterg. aperit, urinam ducit, ususque creberrimi est in emulsionibus antiplenriticis, antiphreniticis, & siml.

Ipsa cucumerum substantia refrigerat & humectat. Excrementum est succi, adeoque non nisi robustioribus ventriculis edenda, idque non sine corrigentibus condimentis v.g. pipere, & sim.

PRÆPARATA.

Condit. fructu. cum ☉.

CXIII. Cucurbita.

}	latina Kürbs. Huius loci.
	sylvestris. Vide Colocynth.
	class. 3.

Nomen cucurbitæ omnibus familiare est Botanographis.

N. Cucurbita sativa etsi variant magnitudine, colore, figura; conveniunt tamen natura & viribus.

OFFICIN. NAT.

Solum Semen & nonnunquam Folia.

N. Semen recensetur in numero seminum 4. frig. maj. venitque in usum cum vel sine cortice.

Vires. Cucurbita convenit viribus cum cucumere tam in qualitatibus carnis quam in seminis facultatibus. Folia recentia puerperarum mammis adhibita, monente Matthiolo, lac immittunt.

Δ. stillat. Ex fructu immaturo.

Vires. Fert opem omnibus inflammationibus externis, oculorum, aurium, podagricis, &c. Intrinsicis quoque mirabiliter astum corporis mitigat.

N. Succus

N. Succus expressus idem facit.

CXIV. Cuminum.

Cuminum { *facium; quod hic.*
pratense: quod carum.
Kümmel, Cuminum facium, Brunf.
Trag. Matth. Cord. hist. Lob. Cast. Cu-
mini sylu. i. genus, Diosc. Cyminum,
Cord. in D. Tab. facium, Cam. Cumi-
num semine longiore, C. B. i. aliis cu-
minum domesticum, Romanum.
Germ. Kümmel, Kümmel, Römisch,
Kümmel, Pfeffer Kümmel, Krankkümmel,
Gartenkümmel.

OFFICIN. NAT.

Solum Semin.

Vires. Calfac. & sicc. atten. diger. resoluit, status discnt. vile in Colica, Tympanit. vertigine.

PRÆPAR.

1. ▽. Ex sem. l. a.
2. Ol. stillat. Ex sem. l. a. cum ▽ elicitur.
3. Spec. Diacumin.

CXV. Cupressus arbor.

Mas.
Fœmina.

Arbor est procera conifera, foliis pinum æmulans, iisque semper viridibus.

Provenit copiose in Insula Creta, Insignitur Cyparissus, Cast. Cupressus, altera siue sylvest, Ger. Cupressus, Matth. Dod. Cord. in D. Lon. Lob. Cam. Tab. C. B. i. Germ. Cypressbaum.

OFFICIN. NAT.

Lignum, Fructus & raro Folia.
 Vires. Lignum, refrigerat, siccat, astringit.
 Fructus & Folia calfaciunt parum,

exiccant ad gr. 3. astringuntque valide, proin vsus sunt precip. in hæmoptysi, diarrhæa, dysenteria. Commendantur item in miltione involuntaria ut & in herniis curandis intus & extus, adhibita.

N. Fructus siue conos, nuce vel pilulas Cypressi officina. nominant: aliis Gabula dicuntur.

CXVI. Cupressus herba.

Chamæcyparissus, Trag. Fuchf. Cord. Lon. Santolina altera, Dod. Abrotanum fœmina, Brunf. Matth. Lob. Cast. Clus. hist. Tab. Germ. Cam. Cupressus herba, Cord. in D. Santonicum minus, Cord. hist. Polium. Theophrast. Dioscor. Absinthium marinum, Tab. Abrotanum fœmina foliis cretibus, C. B. i. Germ. Gartencypress.

Colitur in hortis nostratibus.

OFFICIN. NAT.

Herba seu folia, sed raro.

Vires. Convenit qualitatibus cum abrotano, vsusque precipui est in obstruct. Epatis Renum & Preterea: curat Icterum, lumbricos fugat. Extrinsecus subuenit morbis uteri, &c.

CXVII. Curcuma.

Cyperus Indicus, Diosc. & Curcuma officinar. Cord. hist. Clus. coroll. Lon. Lob. Tab. Curcuma longa & rotunda, Cord. hist. Cyperus altera, radice lutea, Cast. Terra merita, Ruel. Lob. Cyperi genus ex India, Matth. Fuchf. C. B. i.

Est radix officinalis exotica, non tantum croceo colore apparens, sed & eodem colore alia tingens. Germ. Gilbvoortz, Geelsuchtvourtz.

Duplex communiter est, aliquan-

do longa, aliquando radice rotunda: Hac multò acrior priori existit, atque cum zinzibere sæpe affertur.

Vires. *Dicata est vesica biliaria, Stomacho & Epate, hinc & Lieni ac Vtero. Calf. & sicc. 2. amara est: absterg. atten. aper. dig. disc. menses mouet. Vfus in litero, Hydrope, cachexia.*

PRÆPAR.

Species Diacurcuma.

N. *Rectius spec. diacrocu nominantur, quippe curcumam non admittunt.*

CXVIII. *Cuscuta.*

Est { Major, colore scil. albo vel rubro:
Hæc huius loci.
Minor. Vid. Epithem. in purgantibus.

CXIX. *Cyanos.*

Baptifecula, Blaptifecula, flos frumenti, Kornblum, bavv Kornblum.

Cyanos { Sylvestris { Montanus.
Segetum: Hic officinal.
Repens { Latifol,
Angustifol.
Hortensis.

Dicitur Cyanus, Lon. Cyan. flos, Dod. Cyanus major, Matth. Cast. Cam. Cyanus sylu. Fuchf. Cyanus vulgaris, Lob. Ger. Cyanus ceruleus, Tab. Baptifecula, Trag. Lychnis agria & flos frumenti, Brunf. Cyanus segetum. C. B. 2.

Crescit passim inter segetes: Floret Majo.

OFFICIN. NAT.

Flores.

Vires. *Friges. & sicc. 2. astring. utilis in oculor. inflammationibus, rubedine, lippitudine, doloribus, in hydrope (propinant.)*

Dicitur Androsaces vulgo cuscuta, Trag. Matth. Lon. Cast. Clus. Ger. cal-sytha, Lob. Tab. callutha, Fuchf. Dod. major, C. B. 3. Germ. Filtzkrant

Floret Iunio, Iulio, Augusto: adnascitur passim herbis & fruticibus potissimum vrticæ, lino, lupulo.

OFFICIN. NAT.

Folia seu herba tota villosa cum floribus, præcipuè lino adnata.

Vires. *Splenetica inprimis est, hinc epatica, Calfac. 1. sicc. 2. abstergit. substringit, aperit melancholicum humorem corrigit, utilis in scabie, ictero nigro, obstructionibus, epatis ac lienis.*

PRÆPAR.

Δ stillat. Ex tota planta.

PRÆPAR.

▽. stillat. ex flor.

CXX. *Cyclamen.*

Vocatur Cyclaminus, Matthiol. Cord. in D. Lon. Tab. Cyclaminus major, Cast. cyclam. rotundus, Fuchf. cyclaminus orbicularis rotundifolius, Dod. Cyclamen officinar. orbiculato folio, panis porcinus & Arthanita, Lob. Cyclaminus flore odorato, Clus. hist. Cyclaminus vulgaris & cyclam. prior, Matth. & Lob. Lugd. cyclam. æstius vulgaris, Cam. Cyclamen

men orbiculato fol. Ger. Cyclaminus minor & Umbilicus terræ, Trag. Cyclamen orbiculato folio infernè purpurascente, C.B.1. Germ. Erdapffel, Savbrodt.

PRÆPARATA.

Radix colligenda autumnò, Vires. Calfac. & sicc. 3. potenter incidit, aper. absterg. Errhinum est. vsus præcip. in obstructis mensibus, in pellendo sætu mortuo, in fætero, in calculo expellendo, strumis ac tuberculis discutien- dis. Interne cauto opus habet, magisque externò vsui præstat.

PRÆPARATA.

Succus. Hinc cum raro nostratibus in præceptu sit, eius locum subit decoctum. Unguentum de Arthanita maius. V.D. minus. V.D.

CXXI. Cynoglossum.

Κυνόγλωσσον, Cynoglossa, lingua canina, Hundszung.

Diversorum est generum è quibus magis officinale, quod indigitatur cynoglossa maior, Cord. in D. cynoglossum vulgare, Matth. Lob. Cast. Clus. hist. cynoglossum, Dod. Tab. Ger. officinarum, Lon. cynoglossum maius vulgare. C. B. 2.

Crescit passim locis aridis ponè muros. Floret Iulio.

OFFICIN. NAT.

Flores, Folia ac Radix, sed raro. Vires. Refrig. & sicc. 2. incrass. lenit, obstruit. vsus in sistendo fluxu alui, in gonorrhæa, ac catarrhis incrassandis: Verùm quia in numero herbarum est, qua marcosis virulentis suspecta sunt, rarissimè à præctis adhibetur.

PRÆPAR.

1. Pilul. de Cynoglossa. Vide Disp.

N. Somnum conciliant, narcotica sunt. 2. Unguentum, Vide Disp.

CXXII. Cynosbatus.

Κυνόβατος, κυνόροδο: Rosa sylvest. arvensis, canina, rubus caninus, v. wilde Rosen, Feld Rosen, Heckrosen, Heide-rosen, Hainhecke.

Varia comprehendit genera. Est enim rosa sylvestris, vulgaris, flore odorato incarnato, flore maiore & rubente, &c. Verùm in officinas non nisi rosa sylvestris, flore odorato incarnato infertur.

Insignitur Cynosbatus, Diosc. Lon. cynosbatus procerior & cynorhodos, Cord. in D. sentis canis & cynosbatus, Brunf. Rosæ sylvest. 1. genus, Trag. Rosa sylu. Matth. Dod. Tab. odora, Ger. Rosa sylvest. vulgaris, Cam. epit. Rosa canina odorata & sylvest. Lob. Rosa canina, Cam. Rosa sylvestris vulgaris flore odorato incarnato, C. B. 1.

N. Matthiolus cynosbaton & cynorhodon inter se differre statuit. Verùm non male faciunt qui pro vno & eadem fuitice habent.

Crescit in dumetis, floret Maio.

OFFICIN. NAT.

Flores, fructus, Spongia, & interdum Radix.

Vires. Flores comeniunt in qualitatibus cum rosis sativis, sed maiorem vim astringendi habent. proinde in profluvio uteri rubro & albo summa sunt astimationis.

Fructus, (Hagenbutten,) ut Lithon- triptica maximopere commendantur, in qua tamen excellunt exempti arilli.

Spongia, (Bedeguar, Seklaffkuntz, Seklaffapfel, itiaem calculosos effi- cacissime

cacissime inuare dicuntur & imprimis qui inibi continentur lapilli ac vermiculi, quorum hi quoque ad lumbricos fugandos commendantur. Potest propinari spongia puluerisata vel aliter preparata.

Radix. Spicula ex corpore extrahit (imposita.)

P R A E P A R.

1. Fructus Cynob. conditi.

Condiuntur abrasa lanugine & exemptis prius atillis.

2. Rob. Cynobati. Fit leg. c.

3. Spiritus s. v. spongiarum, quæ fit: Glomi mense Majo vel Iunio collecti inciduntur, remotisque vermiculis aut aliis insectis. inibi reperibilibus, digeruntur cum ∇ & fermento ut putrescant, dein elicitur ∇ seu spiritus per vesicam.

4. Spiritus alcalisatus. Ex capite mortuo (in destillatione præcedenti residuo) ulterius incinerato, elicitur Θ idque purificatum cum Spiritu coniunge & aliquandiu macera. Tandem cum argilla misce & propelle per Retortam ∇ nudo ut nempe totum Θ simul transeat. Postea rectificata si opus sit. Hartm. in pract.

Vires. Spiritus huius guttula aliquot (ad 20.) in liquore conueniente exhibitæ, calculum insensibiliter expellunt.

CXXIII. Cyperus.

Κύπερος, wilder Galgan.

CXXIV. Cydonia malus.

Μυρτα κυδωνία, Cotonea malus, Quittenbaum.

{ Longus.

{ Rotundus.

Rotundus potissimi quidem vsus est, tamen iudicio virorum etiam eruditorum parum vel nihil longum superat; suntque partus diuersi eiusdem radicis.

Crescit sponte in regionibus calidis, Italia, Syria, Alexandria, & simil. Nostratibus colitur quandoque in hortis, gaudetque solo humido, sed minus efficax est peregrino.

Dicitur Cyperus, Diosc. Alpin. Cyperus rotundus Orient. maj. vel Babyloicus. Ranvvolf, Cyperus major Syriacus, Cim. in Matth. Cyperus rotundus orientali major, C. B. I.

O F F I C I N. N A T.

Sola Radix quæ eligenda grauis, densa, fractu contumax, plena, aspera, odoris cum quadam acrimonia iucundi.

Vires. Viraque Stomachica est ac veterina calfac. & sicc. 2. aper. Vsus præcipuus in urina ac mensibus cœnendis, cruditate ventriculi consumenda, hydrope inchoato præseruando, colica ac vertigine discutienda, ulceribus vesica solidandis: masticata emendat oris fetorem. Coctæ in oleo contusa & imposita renibus ac pectini urinam proritat.

Varias quidem ingreditur compositiones, sed alieno titulo insignitas.

Mala Cotonea } hortensis } Mala minora, quæ præferuntur.
 } ferens } Mala majora vulgo pyra seu struthia.
 } sylvestris } Mala media, i.e. notha, quæ proueniunt ex cotoneis,
 quæ struthiis insita fuere vel contra.

Videatur malus Cotonea, Brunf. Trag. Matth. Fuchs. Cast. Malus cydonia, Lon. Tab. Cam. Cotoneus, Cord. hist. Cotonea & Cydonea mala, Lob. Mala rotunda minora, nonnullis χρυσόμυλα ab extriore cutis colore, Dod. Mala cotonea minora, C.B. 1.

OFFICIN. NAT.

Mala ipsa exiccata. Semen seu grana. Vires. Mala cotonea stomachica sunt refrig. 1. sicc. 2. astringunt, nutriunt. Vsu præc. in vomitu, alui fluxu, singultu, laxitate Stomachi.

N. Ante cibum sumpta aluum constipare creduntur, è contra à pastu, laxare.

Semen: Refrig. & hum. mucilagine sua lenit, acrimoniam obscurat. Vsu præc. ad linguæ ariditatem leniendam (gargarism.) ad dolorem hamorrhoidum sedandum (in clysteribus) ad ophthalmiam sanandam (mucilago cum Aq. rosarum facta & imposta) ad scissuras mammarum solidandas, ambustaque curanda, &c.

PRÆPAR.

1. Condit. Condiuntur Cydonia (sive integra, sive in frusta concisa) separato cortice semineque exempto: aromatizanturque cinamomo, caryophyllisque infixis.

2. Vinum. Est succus liquidus, cui admixtum est tantillum sacchari.

3. Rob. Cydonior. Est succus inspissatus ad mellis consistentiam, dicitur aliàs syrupus Imperatoris.

4. Diacydonium. Ex succo acido & sacch. 1. Vide Disp.

6. Marmelata. Est citonior. dul-

cium decoctio (per manicam Hippocratis) filtrata, cum saccharo inspissata & in scarulas vt congelescant effusa.

7. Mena Cydonior. simplex. Syrupus & ex succ. dulciior. p. xij. vini p. v. & sacch. p. iij.

8. Mena Cydonior. aromatizata. Syrupus est ex succ. acidior. p. ij. vini p. v. mellis p. iij. & Cinam. v. Disp.

9. Diacydonites vel Diacydonium simplex. Ex carne Cydonior. scilicetque sacch. ana. v. d.

10. Diacydonites vel Diacydonium compositum. Diuersæ descriptionis extat. v. Disp. A. & N.

11. Diacydonites Laxatinum. Vid. Disp. Aug.

12. Essentia seu spiritus. Ex succo dulci fermentato: raro in usu est.

12. Ol. per infusionem. Ex cydoneis non excorticatis succo Cydon. & omphacino. v. d.

D.

CXXXV. Daucus.

Δαυκος Daucus; Daucum, & Daucium, Mohrenkümmel.

N. Dauci nomine planta bina officinis veniunt. Daucus scilicet Creticus, de quo hic; & Daucus vulg. seu officinarum. Vide Pastinaca sylvestris.

Dicitur Daucus 1. Matth. Daucus Cretensis verus, Diosc. Lob Ger. Dauc. Creticus Cast. Tab. Dauc. foliis sceniculi tenuissimus C.B. 1.

Nascitur sponte in Insula Creta, RRr ynde

vnde nomen quoque habet, tum quoque in Italia: Semen solum nostratibus officinale est.

Vires. Vterinum in primis est, & diureticum Calf. & sicc. 2. aperit, incidit,

flatus discutit. Vfus precip. in mensibus obstructis, suffocatione & dolore matricis, in colica flatulenta, in singultu, dysuria, tussi chronica.

N. Ingreditur Compositione Theriaca.

CXXVI Dictamnus Creticus.

Dictamni officinales sunt } Dictamnus Creticus, Eretischer Diptam: De quo hic.
 } Dictamnus vulgaris seu albus officinar. Vide Fraxinell.

Dicitur Dictamnus, Brunf. Dictamnium. Matth. Lob. Cast. Dictamnium Creticum. Matth. verum, Dod. Dictamnus verus, Cord. in D. Dictamnus Creticus, Trag. icon. Cam. Dictamnus Creticus, C. B. 1.

Nascitur in Creta foliis crassioribus & villosioribus, in hortis Italia maioribus, miuusque incanis.

OFFICIN. NAT.

Folia.

Vires. Vterina in primis est herba, ac alexipharmaca. Calf. & sicc. atten. absterg. aper. Vfus prac. in obstructis mensibus, in partu accelerando (intrinsecus & extrinsecus) in Ictibus venenatis, in speculis extrahendis.

CXXVII. Diplacus.

Est { Satiuus.
 { Syluest. { Maior. Hic vsualior.
 { Minor. Et hic adhiberi potest.

Videatur Διπλᾶκος; Fuchf. Dod. Tab. Ger. Labrum Veneris, Matth. Cord. in D. Carduus Veneris, Carduus fullo-nū, Lob. Trag. Disp. sylu. aut Virga pastoris, C. B. 3. & 4. Germā. Rartendistei

Crescit locis asperis arenosis: Floret Iunio & Iulio.

OFFICIN. NAT.

Radix sed rarissime: hinc Vermiculi

in echinis reperti.
 Vires. Radix teste Matthiolo sicc. abstergit. Vfus. precip. in Rhagadibus ani solidandis (decocta cum Vino.) commendatur in verrucis abigendis.

Vermiculi (vel radix) de collo suspensi quartanam arcere creduntur: eosdē cū oleo rosac. vel simili contusos paronichiā sanare, author est Matthiolus.

CXXVIII. Doronicum.

Aconicum pardalianches Theophrasti, Matth. Tab. Doronicum Austriacum alterum. Clus. Cam. Doronicum 2. longifolium, Tab. minus, Ger. Doronicum radice repente; Eidem. Doronicum radice dulci, C. B. 1. German. Gemsewurtz, Schvwindelkaut.

Crescit in Austria, Stryia, Heluetia, &c.

OFFICIN. NAT.

Radix.

Vires. Accedit ad calfac. & sicc. gr. 3. discut. alexipharmaca est. Vfus precipuus in Vertigine, Vteri inflatione, palpitatione cordis, venenosi morbis ac morsibus (nimirum signaturam Scorpionis habet.

N. Sunt qui aconitum pardalianches esse volunt, adeoque noxium (vt Matth.) Cui tamen moderni minimè subscribunt.

CXXIX.

E.

PRÆPAR.

CXXIX. Ebenus.

Lignum exoticum est in medicina nullius usus, præter quàm quod Paracelsus oleum, ac sal eius maxime commendet. Ol. stillat. collaudat in doloribus arthriticis, Podagra, Paralyti, morbis venereis & pustulis (extrinsecus scilicet loco affecto inunctum) Sal celebrat vi purgandi (forte facultatem purgatricem stimulandi) in podagricis, paralyticis, item virtute mundificandi vulnera. Vide Paracels. de Xylo Hebeno. German. Ebenheltz.

CXXX. Ebulus.

Καυαυδάν Dioscoridis. h.e. Sambucus humilis. Ebulus, Trag. Matth. Fuchs. Lob. Cast. Tab. Ebulus seu humilis sambucus, Dod. Ebuli & Sambuci alterum genus, Lon. Sambucus humilis seu Ebulus, C. B. 5. Germ. Niderholder, Attich.

OFFICIN. NAT.

Flores, Folia Cortex interior, Semen & Bacca.

Vires. Flores calfac. & secc. discut. emol. resol. sudores mouent vt sambuci flores.

Eadem vi pollent folia & imprimis ad podagicos dolores sopiendos, tumoresque aquosos discutendos, adeoque & hernia aquosa conueniunt.

Cortex interior maxime radice (præterquam quod aquosos & serosos humores totius corporis per alium educit.) calf. & secc. discutit, emollit. Usus præcip. (vt florum) in inflammationibus, Erysipelate, & sim.

1. ∇ stillat. Ex floribus.

2. Spiritus. Ex floribus fermentatis.

3. Rob. Ebulin. seu pulpa baccar.

Vires. Aquas blande detrahit, sudoresque mouet.

4. Tinctura seu Essentia granorum Ebuli. Fit & vsurpatur eodem modo, quo tinctura Sambuci.

Vires. Tinctura hac specificum est remedium contra hydropem, cachexiam, uteri strangulatam, cuius paroxysmum sudore mediante fugat.

De Cortice & semine, vide in purgantibus

CXXXI. Endiuia.

Σίσις, Intybus satiuua, Endiuia.

Maiores latifolia, que intelligitur simpliciter sic dicta.

Est Minor angustifolia (dicitur scariola,) que priori substitui potest.

Prior dicitur Intybus siue Endiuia, Trag. Intybus maior, Matth. Intybum satiuuum latifolium, Fuchs. Lob. Intybum satiuuum, Cord. in D. Dod. Ger. Intybus satiuua maior, Cast. Seris (siue Endiuia alba,) Lob. Endiuia hortensis, Cam. Intybus maior satiuua siue cichorium domesticum, Tab. Scariola Arabum interpretibus Seris domestica latifolia Dioscor. Intybus satiuua latifolia siue Endiuia vulgaris, C. B. 1.

Colitur in hortis, solo gaudens optimo. Floret Iulio & Augusto.

OFFICIN. NAT.

Folia, Semen, rarissime Radix.

Vires. Epatica est nobilissima, & frig. & sic. 2. absterg. aperit. diuretica est. Usus frequentissimi in febribus biliosis.

PRÆPAR.

1. ∇ stillat. Ex integra planta.

RRr 2 2. Succus.

2. Succus. Ex foliis.
3. Syrup. de Endiu. simpl. ex succo & saccharo.
4. De Endiu. compos. Vid. D.
5. Syr. Byzantinus. V. D.
6. Diaser. Andernac. V. D.
7. ☉. Ex planta incinerata.

CXXVII. Epatica Nobilis.

Epatica alba, Trifolium nobile, Epatica, Brunf. aurea, Brunf. Tab. Trifolium magnum seu aureum, Trag. Trif. aureum. Dod. Lon. aureum magnum, Cast. Trinitas, Matth. Cord. h. Cast. Hepaticum trifolium, Lob. Cam. Ger. Hepatica trifolia, Clus. hist. Trifolium Epaticum flore simplici, C. B. 1. German. Hertz oder leberbliumlein, gülden leberkraut, edel leberkraut.

Florere incipit veris initio, colitur in hortis.

OFFICIN. NAT.

Folia ac Flores.

Vires. Calf. & sic. moderate (al. refr.) sub abstring. sanguinem mundificat, Epatis ac Lienis obstructiones reserat, urinas ciet. Renes & vesicam abstergit, Herniam curat.

PRÆPARATA.

☿. Ex planta integra.

CXXVIII. Epatica stellata.

Hepatica stellaria, Tab. Matrifylua, Trag. Cord. in D. Lon. Asperula, Lob. Ger. Asperula odorata. Dod. Cast. Clus. hist. Aperine sylu. quædam, Cord. Asperula seu Rubedo montana odora, C. B. 1. Caprifolium aliis. German. Steinleberkraut, Hertz freyv. Waldmeister. Gaudet solo nemoroso; Floret April. Maio.

OFFICIN. NAT.

Herba cum floribus.

Vires. Calfac. & sic. seu temperata potius est, Epatis ac cordi familiaris. Vsus precip. in obstructo Epate ac metu biliario & hinc in liero, in Epate calidore refrigerando. Extrinsicus in temperie calida Epatis (cataplas.) in tumoribus calidis. Quin & pedibus alligata parturientium partum accelerare dicitur.

N. Plantula est nostraribus familiarissima, quippe vix quidam è Francofurtensibus erit, cuius porum Maio mense non subornet, saporem conciliando gratissimum.

CXXXIV. Equisetum.

☿. Herba Equinalis, Cauda Equina, Roszschvantz, Pferdeschvantz, Schafftentzev.

Varij est generis. Est enim Equisetum palustre varium, est syluaticum, est pratense, est denique aruense. Et hæc etsi viribus conueniant, attamen vsuale est pratense.

Dicitur Hippuris altera, Trag. Equisetum alterum, Matth. Equisetum, Fuchsico. Cord. in hist. Hippuris maior prima, Lon. Hippuris fontalis & Equisetum 2. Diosc. Lob. Hippuris minor, Lob. Equisetum palustre maius, Tab. palustre, Ger. Equisetum pratense longissimis setis, C. B. 8.

OFFICIN. NAT.

Caules cum foliis suis

Vires. Vulnerarium est frig. sic. 2. inspissat, astring. Vsus precip. in hamorrhagiis sistendis, in exulceratione & vulneratione Renum Vesica, interaneorum tenuium, &c.

PRÆPAR.

PRÆPARATA.

Stilat.

CXXXV. Eruca.

Arab. Legit, Rauchen.

Palustris, crescit iuxta rivulos. Sylvestris, crescit in locis arenosis, floret Iunio, Julio, &c. Hortensis, Legit, vveisser Senff.

Ex his infertur in officinas potissimum hortensis latifolia, C. B. 1. quâ tamen acrior est sylvestris.

Dicitur Eruca, Brunf. Matth. Cord. in D. Cast. Eruca siue Rucula marina maior & Sinapi 8. Trag. Eruca sylvestris, Fuchf. ico. Lon. Sinapis alterum genus, Fuchf. Erucula maior, Cord. h. Eruca fatiua, Mart. Lob. Dod. Eruca maior, Cam. Eruca latifolia alba fatiua Dioscor. C. B. 1.

OFFICIN. NAT.

Semen. Vires, Calfac. sicc. intense. (3) vsus precipuus in Venere stimulanda, apoplexia praeservanda. Extrins. (imposita radix) extrahit officula fissa, pituitam e cerebro prolicet (in apophlegmatism.)

CXXXVI. Eryngium.

Iringus, Aster Atticus, Centumcapita, Inguinalis, Mannstreu, Rendendistel, Brackendistel.

Gaudet locis herbosis, arenosis, floret Iulio.

Ex Eryngiorum generibus officinale est Eryngium primum, Trag. Lon. Eryngium montanum siue campestre, Matth. Cast. Eryngium, Fuchf. Cord. in D. Tab. Eryngium mediterraneum, Ger. Eryngium campestre, Dod. Cast. Vulgare, Clus. hist. Eryngium campestre mediterraneum, Lob. Eryng. vulgare, C. B. 1.

OFFICIN. NAT.

Radix colligenda Sole existente in Cancro. Vires. Epatica, nephritica & alexipharmaca est, temperate calida, mediocriter sicca, aper. discut. Vfus prac. in obstructis mensibus, vrina, Epate, Vesica biliaria, Liene, & t. & hinc in ictero, ut & (teste Galeno) in Colica.

PRÆPAR.

Conditaradix.

CXXXVII. Erysimon.

Variorum est generum e quibus vsualius est Erysimon, x. Tab. Erysimon vulgare, C. B. 1. Irio, Matth. Cord. in D. Lon. Verbena femina & Sinapi 7. Trag. Vveg senff, Hederich.

Crescit iuxta vias: Floret Iulio, Augusto.

OFFICIN. NAT.

Semen ac Herba. Vires, Calfac. & sicc. 3. attenuat, aperit, expectorat, Vfus pracip. in mucilagine contumaci pulmonum atque tussi chronica. Extrinsec. in Cancro non exulcerato, tumoribusque venitentibus mammillarum.

PRÆPARATA.

Syr. de Erysimo Lobelij. Vid. l. 2.

CXXXVIII. Eupatorium.

Eupatorium { Veterum seu græcorum. Vide Agrimonia.
 { Mesuæ. Vide Ageratum.
 { Cannabinum: Describitur hoc loco.

Dicitur Eupatorium Cannabinum,
 C. B. 1. Herba S. Königundis, Trag. 1.
 Tab. Eupator. aquaticum, Gesn. Salvia,
 Brunf. Eupatorium vulgare, Matth.
 Dod. Cast. Eupatorium adulterinum,
 Fuchf. Eupatorium Auicennæ creditum,
 Luc. Lon. Cam. Cannabina
 aquatica mas, Lob. German. Waf-
 ferdoft, Königkraut, Hirtzgiintzel,
 Albkraut.

N. Plerique hanc herbam Eupato-
 rium Auicenna censent. Bauhinus verò
 Agrimoniam pro Eupatorio & Gracor.
 & Auicenna habendam esse monet.

Crescit locis vliginosis: Floret Iulio
 & Augusto.

OFFICIN. NAT.

Flores & Folia, sed raro.

Vires. Calfac. & sic. saporis est ama-
 rinusculi, atten. aper. subadstr. Epatica
 est vulneraria. Vfus præcip. in cache-
 xia, catarrhis & tussi, mensibus verentis.
 Extrinsecus è nobilissimis est vulnera-
 riis (vt & intrinsecus) mensuraciet bal-
 neatione, &c.

PRÆPAR.

1. ▽. Ex foliis & floribus.

2. Trochisci de Eupar. A.

CXXXIX. Euphrasia.

Euphrasia, Euphrasia, Euphrasia, Au-
 gentrost.

Eligitur Euphrasia vulgaris seu of-
 ficinatū, C. B. 1. Euphrasia alba, Brunf.
 Euphrasia, Matth. Cast. Euphrasia & Eu-
 phrasia, Fuchf. Dod. Lob. Tab. Ger. Vulga-
 ris, Lon. Euphrasia Argentinensium
 vel 2. & 6. Trag. Ophthalmica siue
 Ocularia, Cord.

Crescit locis apricis, sabulosis Floret
 Iunio, Iulio, Augusto.

OFFICIN. NAT.

Herba cum floribus.

Vires. Ophthalmica est & Cephalica,
 calf. & sic. 2. adstring. disc. saporis
 subacris: Vfus præcip. in oculor. suffusioni-
 bus, caligine, memoria debilitata.

PRÆPARAT.

1. Conserua. Ex tota herba cum flo-
 ribus.

2. ▽ Ex integra herba Iulio col-
 lecta.

3. Vinum nonnullis vsitatum est: fit
 infusione summitatum pro potu ordi-
 nario.

F.

CXL. Faba.

Faba est { Vulgaris { sativa { major } de quibus hic.
 { Sylvestris. { minor }
 { Phaeolus. Faseln, VVelsche Bonen.
 { Lupinus. Feigbönen.

Videatur

Videatur *Faba*, Brunf. Tab. Math. Fuchf. Cord. in D. Lon. Cast. Cam. Faba vulgaris, Trag. Fuchf. Cord. hist. Boona siue phaselus major, Dod. Faba maior recentiorum, Lob. hortensis, Ger. C. B. 1. Germ. Bonen, gemeine Bonen.

N. 1. Sunt qui inter fabas & Boonas distinguunt, fabisque nos carere volunt, boonis è contra frui. Verum enim vero etsi constet, fabas nostratas à veterum descriptione nonnihil differre: attamen verisimile videtur, differentiam hanc, à diverso loco natali potius dependere, quam ex diversa plantarum specie, adeoque secundum Botanicum huius seculi sagacissimum & peritissimum, C. B. fabas magnitudine figura coloreque differre, & quo maiores, eò magis in longitudinem eas esse depressas, quo minores, eò rotundiores. Vt sit, sufficit nobis, quod viribus conveniant.

N. 2. Fabarum usus prohibitus est à Pythagora, quia flores lituris suis nigris signaturam referant lugubrem, & animas mortuorum, que in eis habitent: ab aliis interdicitur, quia existiment sensus isdem hebetari, insomnia turbulenta excitari.

N. 3. Est & faba Indica purgatrix, cuius historiam si quis velit ipsemet legere poterit 1. apud Clus. lib. 2. exot. c. 30. 2. in annot. ad Monard. 3. apud Tabernam. Nimirum quia nostratibus in usu non est, describere supersedeo.

OFFICIN. NAT.

Farina fabar. sativar. & precipue maiorum.

Vires. Emplastica est, refriger. & sicca. 1. in crass. exterg. utilis intra corpus in diarrhaa, lienteria, &c. Extra, in maculis è sole contractis, aliisque cutis foribus extergendis (si illa fricentur) in saggillatis discutendis.

PRÆPAR.

1. Ex floribus.

Vires. Diuretica est, maximique usus in maculis faciet extergendis, eaque fucanda.

2. Ex stramine incinerato.

Vires. Summum diureticum est, usitatissimumque in hydrope, calculo & urina retenta.

CXLI. Fabaria.

Tolios, Crassula. Crassula major, faba inuersa, Knabenkraut, Wundkraut, Donnerkraut. Donnerbonen.

Vsuale est Telephium vulgare. C. B. 1. quæ est Fabaria, Matth. Telephium, Matth. Lob. Tab. Cast. Cam. Telephium album, Fuchf. acetabulum alterum, Cord. in D. album, Fuchf. sco. Faba inuersa, Lob. Telephium alterum siue crassula, Dod. vulgare siue secundum, Clus. hist. Crassula seu faba inuersa, Ger. Cotyledon, alterum Dioscoridis, Col. Scrophularia media vel 3. Brunf.

Floret Iulio ac Augusto: Crescit circa muros, locisque saxosis.

OFFICIN. NAT.

Folia tantum.

Vires. Matthiol. refriger. & hum. (Dodonæo refriger. & sicca.) vulneraria est, astring. mundificat, precipuique usus est in consolidanda intestinorum erosione per dysenteriam introducta, in curanda hernia, in maculis cutis detergendis, in ambustis medendis.

PRÆPARATA.

Ex fol. & floribus.

Farfara, vide Tussilago.

CXLII. Ficus.

Picus, Brunfels. Trag. Matth. Dod.

Dod. Cord. hist. Bellon, Lon. Lob. Cast. Tab. Ger. Ficus fatiua, Fuchf. communis C.B. 1. Germ. Feigenbaum.

OFFICINA NAT.

Fruktus, (vna.)

N. Primitia fructus dicuntur grossa ficus, sicca in furno aut sole exiccata, carica, aliis passa.

Vires. Carica calf. 2. (recentis moderatius :) utraque humect. pulmonaria. sunt. & bechica, arenulis Renum & vesica medentur, venenis resistunt: prapropius usus sunt in variolis & morbillis ad cutem pellendis, maturant, molliunt, attrahunt, unde & bubonibus pestilentialibus (innuente Scriptura) conferunt, mulierculis nostraribus, appropinquante partu, ficuum rostar. esus ad partum facilitandum est familiarissimus. Quin & familiare est super ficus V accendere, brodiumque ad tussim sedandam propinare.

CXLIII. Filipendula.

Φιλιππύδα, Filipendula' oenanthe, faxifraga rubra, rohier, Steinbrech.

N. Dicitur Oenanthe veterum, quia viribus aliquantum conueniunt.

Vsualis est filipendula vulgaris, C.B. 7. Filipendula, Trag. Dod. Matth. Cord. hist. Lon. Cast. Tab. (cui & faxifraga rubra,) Ger. Oenanthe, Fuchf. Cord. in D. Lob.

Nascitur solo herboso. Floret Iunio & Iulio.

OFFICINALIA NATIVA.

Folia & Radix.

Vires. Calf. & sic. 3. attenuat, abstergit, subastring. discus. diuretica est: Vsus praprop. est in tartarea mucilagine pulmonum, Renum vesicae ac articulorum, in colica flatulenta, in albo mulierum profluuiio. Extrinsecus in tumore hamor-

rroidum. Dosis ʒj.

CXLIV. Filix.

Πρίπις, Πρίπις, Fahrn, Fahrnkraut, Waldfahrn.

*(Mas non ramosa (plurium) utraque } pedicillorum.) } promi-
Fœmina ramosa (vnius) } scud v-
pedicelli) } ualis.*

Mas dicitur Filix, Brunf. vulgatis, Trag. mas, Matth. Fuchf. Dod. Lon. Lob. Cost. Tab. Ger. fœmina, Gesn. Casalp. Filix non ramosa dentata, C.B. 3.

Fœmina inscribitur, Filix sylu Brunf. Filicis majoris genus, Trag. Fil. fœmina, Matth. Fuchf. Dod. Lob. Cast. Tab. Ger. Thylypteris, Filix fœmina, Cord. in D. Filix mas major siue fœmina credita vulgo, Clus. Filix ramosa major pinnulis obtusis non dentatis, C.B. 1.

Nascitur locis opacis nemorum: vixit tota ætate, nocte D. Iohanni facta senen profert: noui qui dicto tempore id collegerunt, verum, qua vtilitate, ignoro.

OFFICINA NAT.

Radix inprimis Filicis fœminæ.

Vires. Splenetica est, calfac. & sic. amara est, subastring. aperit. Vsus praprop. in obstructionibus viscerum & inprimis Lienis & Vteri. Extrinsecus commendatur ad ambusta (extracta mucilago.)

N, Granidia in sensa censetur.

CXLV. Fœniculum.

Μέλας, Fœniculum, Brunf. Trag. Fuchf. Cord. in D. Tab. Vulgare Ger. fœniculū nostrum vulgare, quibusdam Hippomarathrum putatum, C.B. 1. Germ. Fenchel.

Crescit locis cultis, aridis; Floret Iulio, Augusto.

OFFICIN. NAT.

Herba seu Summitates. Radix (quæ vna ex radicibus 5. aperientibus famosis.) Semen.

Vires. Folia calf. 2. sicc. 1. aper. resola. discut. diuretica. carminatiua & bechica sunt, ventriculum roborant, lac augment, visum confortant, asperam arteriam leniunt.

Radix & semen calfac. 3. adeoque insuper vsus creberrimi in humorum & flatuum discussione, & ad peripheriam expulsionem.

N. Semen adhibetur sapissime ad corrigenda purgantia, vt & ad flatus discutendos.

PRÆPAR.

1. Confectum Semen.

2. ▽. Ex integra planta incisa.

3. ▽. Ex semine.

N. Ophthalmica est inter vsitatissimas.

4. ☉. stillar. Ex semine.

5. ☉. Ex planta incinerata.

CXLVI. Fœnum græcum.

Fœnogræcum, Fenugreck, Bocksborn.

Est { Satiuum: Hoc vsuale.
Syluest. minus vsitatum.

Dicitur fœnum græcum, Trag. Matth. Lob. Lon. Dod. Cast. Cam. Fœnogræcum, Fuchf. Cord. in D. fœnum græcum satiuum, C. B. 1.

OFFICIN. NAT.

Semin solum ex satiuo scilicet desumptum.

Vires. Calfac. 2. sicc. 1. emollit, digerit, maturat, discutit, paregoricum est, vsusque adeo famosi, vt cataplasma dictarum intectionum Chirurgis vix vsitatum sit, quin fœnugracum vel huius

mucilaginem contineat, Crebrique vsus est in clysteribus emolliētibus, mucilaginosa quippe sua substantia obrundit acrimoniam, intestinaque erosa oblinis. insuper conducit eius mucilago ad oculorum siccillationes discutendas (imposita) Vide Hartm. præct.

PRÆPARATA.

Mucilago. Extrahitur beneficio coctinis in ▽.

CXLVII. Fragaria.

Κόμπος, Fragaria, Brunf. Trag. Matth. Fuchf. Dod. Lon. Lob. Cast. Ger. Fragaria vulgaris, C. B. 1. Fragula, Cord. hist. Fragula & Trifolium fragiferum, Tab. Srabeerkrant.

Crescit locis opacis: Floret Martio & Aprili.

OFFICIN. NAT.

Folia seu herba & Fructus in præparatis.

Vires. Herba refrig. & sicc. moderate, subastring. diuretica est, vsusque crebri in iltero, vt & in gargarismis & balneis, in cataplasmatibus, &c.

Fructus. (fraga.) Refriger. & humect. Splenetica sūt ac nephritica, Venenis resistunt, quia autem facile putrescunt, non adeo commode comeduntur.

PRÆPAR.

1. ▽. Ex integra planta florida: Abstergit lentigines & maculas.

2. ▽. Ex fructibus.

N. Sitim & æstum febrilem extinguit, urinam ciet.

3. Syrup. Ex succo fragor.

4. Spirit. Ex succo fermentato, qui tamen vsus rarioris.

5. Tinctur. E baccis cum ▽ propria.

CXLVIII. Fraxinus.

Eschbaum, } Excelsior. Hac officinalis
 Eschern, } Humilior. Minus usualis
 Dicitur Fraxinus, Brunfels. Trag.
 Matth. Dod. Lon. Lob. Tab. Cast. Fraxi-
 nus excelsior, C. B. 1.

Floret Aprili & Maio: Semen fert
 Autumno. Crescit in sylvis opacis.

OFFICIN. NAT.

Folia. Cortex, Lignum, Semen.

Vires. Folia siccat validè, curantque
 ietus serpentum, sed vsus sunt varioris.

Cortex & Lignum, sicant iidem,
 attenu: Splenis duritiem specificè emol-
 liunt, diuretica sunt ac lithonriptica,
 eaque non è postremis.

N. Sunt qui lignum die Ioannis Ba-
 ptista casum, vulneribus ac contusioni-
 bus solo affricatu mederi credunt, ce-
 dunt autem id alij ante solis ortum, alij
 ipso meridiano temporis puncto.

Semen (foliis adherens) calfac. &
 sic. validè, conducit Epaticis, Pleuriti-
 cis, Calculosis.

N. Colligendum hoc est autumnali
 tempore.

PRÆPARATA.

1. Extrakt. Ex corticibus per ∇ ap-
 propriatam, liquore aliquo acido acua-
 tam, vbi excellit ∇ ex tenellis fraxini
 foliis destillata, Quercetan. in P. R.

2. \odot ex ligno: Fit destillando modo
 communi.

3. \ominus Ex cinere corticum.

N. Sal ex ligno incinerato, vulneribus
 intus & extus cum felici successu vsur-
 patum vidi.

CXLIX. Fraxinella.

Dictamnus albus (propter radicem
 albam) siue fraxinella, C. B. 5. Polymo-

nium, Tab. Dictamnus putatus, Brunf.
 Dictamnus vulgaris, Trag. Cam. Offi-
 cin. Lon. Dictamnus album, nonnulli
 pumila fraxinus, Matthiol. Cast. Tra-
 gium primum, Dioscor. Lob. Dictamnus
 nostra, Cord. in D. Fraxinella, Cord.
 hist. Dod. Clus. Ger. German. vveisser
 gemeiner Diptam, Escherwurcz.

Crescit in rupibus: Floret Iunio.

OFFICIN. NAT.

Radix verno tempore colligenda.

Vires. Est cordialis, alexipharmaca,
 uterina, cephalica, amara, calfac. & sic-
 cat, aperit, vermes necat: Vtus præcipui
 in morbis malignis, in Epilepsia, aliisque
 affectibus capitis, in obstructione vteri,
 &c. Extrahere quoque dicitur spicula
 cuti infixæ.

CL. Fumaria.

Kamot, Fumaria officinarum &
 Diosc. C. B. 1. Fumus tetrae, Brunfels.
 Cam. Fumaria, Trag. Matth. Fuchs.
 Cord. in D. Dod. Lon. 2. Flore albo, Tab.
 Capnos, Lob. Fumaria maior, Cast. Fu-
 maria purpurea & alba, Ger. Germ.
 Daubenkropff, Daubenkerbel, Fd-
 rauch, vvilde Rauten.

Crescit passim in hortis, vineis, &c.
 Floret Maio & Iunio.

OFFICIN. NAT.

Herba cum floribus.

Vires. Splenetica est ac Epatica: at-
 tenuat, serosos, biliosos ac adustos humo-
 res sensim expurgat, viscera reserat, re-
 serata roborat, sanguinem purificat.
 Hinc vsus præcipui, in scorbuto, aliisque
 morbis mesenterij & Lienis, in Jctero,
 in scabie omnis generis, & sim.

PRÆPAR.

1. ∇ Ex herba cum floribus.

2. Oleum stillat. quod rarum.

3. Succus

3. Succus inspissatus. Dosis ad ℥j.
 4. Conseru. summit.
 5. Syr. simpl. Ex succo.
 Compos. Vide Disp.
 6. Pilul. de fumaria. Purgant, bilem,
 serososque humores.
 Dosis ℥j. ad ℥ij.
 7. ☉ fumaria. Ex herba incinerata.

C L I. Fumaria bulbosa.

Fumar. bulb. { radice caua 1. Hæc vsualior.
 { radice non caua { maior 2. Hæc surrogari priori potest.
 { minor 3.

1. Dicitur, Aristolochia rotunda,
 Brunf. Arist. rot. vulgaris, Trag. Fuchf.
 (cui & Pistolochia.) Cam. Fumaria
 altera, Matth. Cass. Capnos Chelido-
 nia, Lon. Radix caua maior, Dod. Clus.
 hist. Fum. Caua herbariorum, Lob.
 Germ. Erdkrant, falsch Holzwurtz.

2. Fum. bulb. radice non caua dicitur
 Aristolochia rotunda vulgaris ra-
 dice solida, Trag.

Crescunt in dumetis, locis frigidis
 & opacis, vt & in vineis, Florent
 Aprili.

OFFICIN. NAT.

Radix: rato Herba cum floribus.
 Vires. Calf. 2. sicc. 3. absterg. suba-
 string. aperit. Epatica est, Vterina, Ale-
 xipharmaca, sudorifera, diuretica, &
 vulneraria. Vtus precip. in ciendis men-
 sibus, lochus: fetum mortuum expellit,
 Ictero medetur, sanguinem mundificat,
 adeoque & scabiei succurrit. Extrinse-
 cus commendatur quam maxime ad
 vulnera etiam: ueterata & fistulosa,
 utpote que mundificat & consolidat;
 ad scabiem, ad dolores podagricos (a fri-
 gidis humoribus) ad sanguinem coagu-
 latum in contusionibus, ad putredinem
 oris.

G.

C L I I. Galanga.

Maiores radice crassiore, ru-
 bra minus odorata, &c.
 Galgan. Minor radice tenuiori, no-
 C. B. { dosa intus & extra. rube-
 { scente, sapore acri instar
 { piperis odore suani.

N. Hæc priori præfertur.

Dicitur Galanga Minor, Matthiol.
 Cord. h. Fuchf. Lob. Lon. Tab. Acost. Ger.
 Galanga minor officinar, C. B. 2. Ga-
 langa Indica, Amat.

Maiores vocatur, Galanga maior,
 Matth. Cord. hist. Lon. Fuchf. Lob. Ce-
 salp. Tab. Gal. crassa, Amat. Iridis ge-
 nus, Clus. in Acost.

N. Galanga (γαλάνγα) quibusdam
 Acori, nonnullis Iridis species videtur,
 minor à recentioribus Grecis Cyperus
 Babylonica nominatur. Arab. Galingia.

OFFICIN. NAT.

Radix, quæ eligenda saturato ru-
 bra, ponderosa, bene odorata, saporis
 acris.

Vires. Stomachica est, Cephalica at
 Vterina: calf. & sicc. 3. saporis acris, in-
 cidit, aperit. Vtus in cruditate ac infla-
 tione ventriculi, vertigine, uteri obstru-
 ctione aliisque totus corporis affectibus
 à frigiditate ac flatulentia oriundis.
 Extrinsecus commendatur ad roboran-
 dum caput (v. Errhinis.)

P R A P A R.

Spec. Diagalang. Vid. Disp.

CLIII. Galega.

Galega, ruta capraria, *Math. Cast.*
Cam. Ruta capraria, Tab. Galega, Lob.
Dod. Lon. Ger. vulgaris, Clus. Galega
vulgaris, C.B.1. Germ. Ganskraut, Fle-
ckenkraut.

N. Quidam Onobrychin, alij Glau-
 cum, nonnulli Polemonium, alij Polyga-
 lam veterum esse iudicant: verum his
 omnibus Dioscoridis descriptiones con-
 tradicunt.

Colitur apud nos in hortis: Floret
 æstate.

OFFICIN. NAT.

Herba collecta Iunio & Iulio.

Vires. Celeberrimum est Alexiphar-
 macum ac sudoriferum, venenum, inpr-
 misque pestilentielle insigniter disenti-
 ens. Vfus eius præcipuus est in petechiis
 expellendis, aliisque morbis pestilentiali-
 bus, ipsaque peste curanda. In morbillis.
 In Epilepsia infantum) exhibetur succi
 cochlear. 1.) in vitibus serpentum, in
 Lumbricis, (quos etiam extrinsecus ap-
 plicata fugat.)

N. Herba hec secus ac alia citra sa-
 pore est, & insuper qualitatibus primis
 temperata.

PRÆPAR.

1. ▽. Ex integra planta Iulio col-
 lecta.

2. Conseru. summit. seu flor.

CLIV. Gallium.

Γάλλιον, Γάλλιον, Γαλαττιον, Γαλέριον, Germ.
 Megerkraut, Waldstroh, vnser Frauen-
 ven Bettstroh, Wegstroh, lebkraut.

N. Nomen habet, quod coagulis vice
 γάλα. i. e. lac coagulet.

{ Luteum flor. luteo } vulgare.
 { Album flore albo } palustre.
 { } palustre.
 { } minus.

Ex his præfertur primum, C. B. seu
 Gallium luteum, quod Dioscoridis
 Gallium putatur.

Dicitur Gallium, *Fuchf. Dod. Lon.*
 Gallium luteum primum, *Tab. Gallij*
 primum genus, *Trag. Gallium, Matt.*
Cast. Luteum, Cord. in D. Lob. Cam.
Ger. Gallium luteum. C.B.1.

Crescit passim locis aridis & are-
 nosis iuxta vias &c. Floret Maio, & hinc
 tota æstate.

OFFICIN. NAT.

Herba cum floribus.

Vires. Calf. & sic moderate. Vfus
 eius potissimum externus est in hemor-
 rhagia narium sedanda (pulsis infla-
 tis) in scabie simplici & maligna, adeo-
 que in cancro mammarum, &c.

N. Rari vsus est apud practicos, so-
 lumque asseruatur pro compositionibus,
 quas ingreditur: ut unguentum Mar-
 tianum, &c.

CLV. Genista.

Genista, *Genst, Genster, Pfrimmen-*
kraut.

Vfus est è Genistis non spino-
 sis, C.B.1. Genista angulosa & scoparia,
 spartium, *Lob. Genista, Bru. f. Trag.*
Fuchf. Dod. Cord. in D. Cam. Tab. Ger.
 Genista angulosa, *Cord. hist. Genista*
 minor seu non aculeata, *Lon. Genista*
 scoparia vulgi. *Lob.*

Solo gaudet arenoso & aprico.
 Floret integra æstate.

OFFICIN. NAT.

Flores & Semen.

N. Flos communiter luteus, rarius
 albus

albus est.

Vires. Splenetica & nephritica conser-
tur, hinc & epatica, calf. & sicc. 2. aper.
atten. absterg. calculum pellit, aquosor
humores educit, tam per vomitum, quam
per aluum & urinas. Hinc vsu eius
insignis in obstructione Epatis & Lie-
nis, Mesenterij, adeoque in Hydrope, ca-
tarribus, arthriticis affectibus.

N. Semen extrinsecus applicatum
scrophulas consumere dicitur.

PRÆPAR.

1. ∇. Ex floribus & foliis.
2. Conseru. Ex floribus.
3. ☉. Ex incinerata herba.
4. Conditiflores.

Condiuntur autem flores (seu po-
tius gemmæ (collecti mense Aprili, an-
tequam aperti fuerint, cum aceto &
sale, adhibenturque loco capparum,
vnde & nostratibus cippares. Germ. di-
cuntur, Teutsch. Zapern.

N. Citra vomitum assumi poterunt.

CLVI. Gentiana.

Gentiana (à Gentio inuentore sic
dicta,) Entz an.

Gentiana	{	alpina	{	maior.	Gentia-
				minor.	
		pratensis.	{		
		palustris.			

Vsualis est ex his alpina maior lu-
tea, C. B. 1. de qua notandum, quod re-
periat quaque floribus flauis, imò
& albis, punctis carentibus.

Dicitur Gentiana, Brunf. Matth.
Fuchf. Dod. j Cord. in D. Lon. Cast. Gen-
tiana maior, Matth. Lob. flore luteo,
Cam. Gentiana veterum, Clus. hist.
Gentiana: 1. species, Trag.

OFFICIN. NAT.

Radix collecta mense Augusto ac
Septembri.

Vires. Calf. 3. sicc. 2. Alexipharmaca
est, aperit, attenuat. Vius praprii in pe-
ste, alijsq; venenatis affectib⁹, in obstru-
ctione Epatis, Lienis, &c. Et hinc in
hydrope, in suffocatione Vteri, in im-
becillitate ventriculi, lumbricis, in fe-
bribus, in morsu canis rabidi &c. Ex-
trinsecus adhibetur creberrime in vul-
neribus ac fomiculis mundificandis, re-
nouandis, &c. in morsu canis rabidi ar-
cendo (cum Theriaca imposta.)

PRÆPAR.

1. Succus inspissatus.

N. Creberrimi vsus est in febribus
intermittentibus, in quibus ante paro-
xysmum à ʒB. ad ʒj. vel ʒiij. exhibe-
tur, felici cum successu.

2. Extractum cum S. V. factum.

CLVII. Geranium.

Geranij multa recensentur gene-
ra, officinis nostris maxima ex parte
inuitata. Vsiatius tamen præ cæter-
is est, quod Geranium Robertianum
dicitur, aliàs Gratia Dei, Ruprecht-
kraut, Nickerkraut, Gottes Gnad, Roslan-
fferant, (quia Erysipelati mederi dici-
tur.)

Dicitur Geranium 3. Brunf. Matth.
Fuchf. Lon. Geranium Robertianum,
Lob. Dod. Cam. Tab. Gratia Dei vel ge-
ranium quibusdam, Trag. Herba Rut-
perti & Geranium 2. Diosc. Geranium
Robertianum primum C. B. 5. videlicet
inter species Geranij folio cicuta vel
inyrthidis.

Gaudet locis opacis ac desertis. Flo-
ret potissimum Aprili & Maio.

OFFICIN. NAT.

Folia.

SSf 3

Vires.

Vires. *Temperatum est in cal. & frig. moderate siccatur, substringit, extergit, sanguinem in corpore coagulatum resoluit, vulneribus conuenit, sanguinem scilicet cohibendo, vulneraque mundificando. Vfus externus (omnium generum Gerani), vulgaris est in cataplasmatibus, plantis pedum cum sale & aceto applicandis, ad febrilem aestum compescendum, adhibetur etiam ad mammarum fistulas, lactisque discussionem (Robertianum impositum.)*

PRÆPAR.

∇. stillat. Ex integra herba in fine April. collecta.

CLVIII. Glyzirrhiza.

Liquiritia, *Brunf. dulcis radix, Trag. Glyzirrhiza, Fuchs. Cord. in D. Cam. Glyzirrhiza altera, Matth. vulgaris, Dod. Cam. Epit. Glyzirrhiza filiquosa, C. B. 2. Germ. Sützholtz.*

Crescit locis syluestribus & sabulosis. Floret Iulio.

OFFICIN. NAT.

Radix ex Episcopatu Bambergensi, ubi in copia crescit, ad nos transmissa, quæ sole exiccata biennium integra manet.

Vires. *Calidit. & frigid. temperata est (sen moderate calefacit) in reliquis ad humiditatem inclinatur, pulmonica ac nephritica est, acrimoniam mitigans, expectorationem promouens, asperitatem leniens, aluum infantum leniter molliens. Vfus præcipuus, in tussi, raucedine, vesicae erosionem, urina acrimonia.*

PRÆPAR.

1. Succus inspissatus.

2. Syr. Compusinus. Vide Disp.

CLIX. Semen

Gramen absolute sic dictum. Of-

ficinis graminis speciem denotat, quam Dioscorides *ἄρον* uel *ἄρον*, uocat, estque Gramen caninum seu aruense, C. B. 1. Gramen, *Dod. Cord. in D. Cast. Gramen canarium medicatum, Lob. Gramen caninum, Tab. Ger. Germ. Keh oder Queckengrasz.*

Passim spontè prouenit, felicius autem in terra arida & arenosa.

OFFICIN. NAT.

Potissimum Radices (collectæ mense Maio vel Septembri) raro Caulis cum foliis, rarius Semen.

Vires. *Radix cuiuscunque graminis resfrig. & sicc. aper. substring. substantia est tenuis ac penetratiua.*

Herba seu folia intra siccitatē & humiditatem moderata sunt, frigida gr. 1. Vfus præcipuus in obstructionibus Epatis, Lienis, Vtererum, in expuritione sanguinis (ubi succus ex integra planta ualet) in lumbricis necandis. Extrinsicus in dolore capitis leniendo (seligunt gramen septem nodorum) in oculorum inflammationibus ac defluxionibus. (Has sedare dicitur gramen trium nodorum, de rescente Luna enulsum ac collo circumligatum, in auribus purulentis, in odontalgia, in tumoribus podagricis discutendis.)

∆ stillat. Ex radice Maio mense collecta.

N. Diarrheam sedat infantum si abdomen eâ lauetur.

Est & graminis species, Gramen mannae dictū, inter gramina dactilodea, C. B. 8. Cuius semen in cibum venit nomine Mannæ in German. ex Silesiæ ac Poloniæ confinibus transportatum, feminemilij foliis non absimile. De hoc vulgi opinio, quod ex ære decidat, unde & Mannæ nomen impositum est.

CLX.

CLX. Granata.

Mal⁹ Domestica, quæ pomifera est. puni Sylvestris, quæ flores solum ca fert.

Videatur Malus punica, Trag. Math. Dod. Cord. Lon. Cam. Mala punica, Cord. in D. Bellon. Malum punicum, Lob. Cast. Malus granata, Tab. Malus punica, C. B. Germ. Granaten.

Vtraque arbor, quamvis exotica sit, nostratibus tamen in hortis colitur.

OFFICIN. NAT.

1. Poma, eaque vel dulcia vel acida, vel acidodulcia, i. e. vinosi saporis. 2. Flores collecti ex Granata Sylvestri (Balustia dicuntur) tum quoque interdum ex domestica (appellantur Cytini.) 3. Cortex pomorum (malicorium, psidium.) 4. Nuclei.

Vites. Poma, in genere consentur boni succi, ventriculo conuentia, sed pauci nutrimenti. Dulcia adhibentur in tussi chronica.

N. Quia ventriculo inflationes causantur, in febribus minus commode adhibentur.

Acida, frigida sunt ac astringentia, stomachica. Vsu præcipui in febribus biliosis, in Conorrhœa, in pica gravidar. compescenda, vrisque putredine corrigenda, & sim.

Vinosa, (acidodulcia, Granata muza) media sunt natura, inter dulcia ac acida, ad frigiditatem tamen aliquatenus accedunt. Cardiaca sunt ac Cephalica. Vsu præcipui in Syncope ac vertigine, & c.

Flores, tam Balustia, quam Cytini eiusdem sunt natura, terrestris scil. valide astringentis, inspissantis, refrigerantis, siccantis, vnde & balustior. creberrimus usus esse solet in omni generis fluxionibus. E.g. Diarrhœa. Dysenteria,

uteri fluore, & sim. in sanguine vulnerrum cohibendo, in gingivarum laxitate emendanda, in Hernia curanda, & c.

Cortex, (malicorium, psidium) eiusdem cum floribus consentur natura, præcipue usus est in sedando fluxu hæmorrhoidum narium, uteri, & c.

Nuclei refrigerant itidè, astringuntque, imprimis qui ex pomis acidis collecti.

PRÆPARAT.

1. Succus liquidus. Ex pomis expressus, fermentatus & depuratus, qui nomine vini granatorum venit.

N. 1. Præstat Vinum ex pomis acidodulcibus.

N. 2. Ante preparationem huius vini, extremam cutem granis detrabere solent.

N. 3. Ad conseruationem, nonnihil seminis Coriandri puluerisati in Vino eodem suspendunt.

2. Sympus. Ex succo granator. dulc. ac sacchar. Vid. Dispens.

3. Ex succ. granat. acidor. & sacchar. Vid. Dispens.

Grana Paradyfi.

Paris & Kerner, vide Cardamomum.

CLXI. Guaiacum.

Lignum Indicum, Lign. Sanctum, Guacan, Guaiscan, Palus sanctus, Frant & senholtz, Heili & Holtz. Arbor est exotica, procera quæ ex India Occidentali ad nos transportatur.

magna matrice. Guaiaci 1. genus, Monard. & Matthiol. Estque thiol. Guaiacum propemodum sine matrice, quod priori præstantius. Guaiaci 2. genus, Monard. & Matthiolo.

N. 1.

N. 1. Sunt qui prius Guaiacum appellant, posterius legnum sanctum: Verum quia apud Auctores Synonyma sunt, præstat matrice, uti dictum ea distinguere.

N. 2. Posterius diuiditur à nonnullis in plura genera, que tamen non re seu essentia, sed solo colore differre vult Matthiolus, idque pro diuersitate maturitatis, quo enim maturius, eò ipsi nigrius est, & quantò minus adoleuerit, tantò magis ipsi albicat.

OFFICIN. NAT.

Lignum, Cortex, & Gummi, sed raro.)

Eligendum est Lignum recens ponderosum, succulentum (quod Carboni impositum fumigat.) Posterius præstat, quod colores ruffum, spadicum, flauum, liuidumque simul mixtos habet.

Vires. Lignum calf. & sic. sudorem ac urinam largiter promouet, adeoque sanguinem mundificat, purredini resistit. Vfus præcipui in Arthritide, Hydrope. Catarrhis, aliisque morbis à phlegmate tartareave mucilage aut flatibus oriundis: peculiariter ac specificè curat luem Gallicam.

Cortex. Minus calidus est quam Lignum.

Gummi (Refina. Gummi hoc mecū communicauit Vir rerum nouarū curiosus Adrianus Sonnemann, Materialista huius Ciuitatis, Affinisque mihi dilectus, idque cū felici successu aliquoties in curanda L. G. fuisse adhibitum affirmavit. Saporè est acti, colore ac figurâ Laccam rerè representante, pelucidam, friabile.

PRÆPARATA.

1. Decoctum. ℞. Guaiac. in cisi ℥ij. Aq. fontan. ℥xij. post infusionem 24. horarum coque ad ℥vij. plus minusve; co-

letur pro sudorifero, reliquum coquantur cum ∇ tantundem pro potu ordinario.

N. Possunt & addit Liquiritia, pasfule, sem. anisi, &c.

2. Extractum viscosum & gummosum. Videl. 2.

3. ^o Rectificatum. Fit destillatione. Videl. 2.

Vires. Exhiberi commode poterit intrinsecus in lue Venerea, aliisque morbis diaphoresi opus habentibus.

Dosis gr. iij. v.

N. Sunt qui oleum hoc pro oleo heracleino Rulandi habent, eiusque vires admodum depradicant in Epilepsia, expellendo fœtu viuo ac mortuo, in dolore dentium mitigando. Vide Brendel. in Chymia.

4. Spiritus. Est liquor acidulus, vna cum oleo in destillatione collectus ac rectificatus. Vid. l. 2. de Spiritibus.

N. Spiritus hic acidus præter medicinales virtutes descriptas, vim habet perlas, corallia, &c. soluendi. Intus exhiberi poterit à ʒʒ. ad ʒj.

5. Θ . Ex cinere elixiuuatur, sed paucum.

H.

CLXII. Hedera terrestris.

$\chi\alpha\mu\alpha\iota\kappa\omega\varsigma$ Θ , hedera humilis vulgaris, corona terræ, Gundeireb, Grundreb, Grundmann, Erdephevv, nostratibus Donnerreb.

Est ξ vulgaris. Hæc vsualis.
 ξ montana. Inuisitata.

Nuncupatur, Hedera terrestris, Brunf. Matth. Dod. Tab. Ger. Elatine, Brunf. 4. Chamæcissos, Trag. Euchf. Cam. Chamæclema, Cord. hist. Corona terræ, Lob. Hedera terrestris vulgaris, C. B. 1.

Crescit

Crescit passim circa sepēs: floret Aprilij potissimum.

OFFICIN. NAT.

Herba cum floribus.

Vires. Saporis est amari & acris calf. & sicc. vulneraria est, aperit, abstergit. Vfus creberrimi in tartaro, tam pulmonum, quam renum, aliarumque partium, incidendo, resoluendo, adeoque confert obstructionibus inde natis & ictero: conducit erosionibus & ulceribus viscerum abstergendis, consolidandis, &c. Extrinsecus adhibetur creberrimè ad calculum renum resoluendum (in balneo) ad dolores colicos resoluendos (in clysteribus.)

PRÆPARATA.

1. ∇ stillat. Ex herba Maio collecta.
2. Conserua. Ex floribus summ.
- N. Conseruam compositam habent August.
3. Syrup. simpl. Ex succ.
4. Compos. Vide Disp.
5. Succus. Succum propinatum plurimos à morte liberasse refert Hollerius.

CLXIII. Hedera arborea.

Κισσός, κισσός, Hedera, Brunf. Trag. Cord. in D. Dod. Hedera arborea, Matth. Nigra, Fuchf. Lon. Hedera cymbofa communis, Lob. Tab. Ger. Hedera maior, Cast. Hedera arborea, C. B. 1. Germ. Epheuu, Fppich.

Arborea, Hac vsualis & iam nominata.
Est } Maior sterilis.
 } Minor.

Adhæret muris, arboribus, aliisque rebus in altum exurgentibus. Viret per totum annum: Floret autumnò, baccas fert hyeme.

OFFICIN. NAT.

Folia, Bacca, Lachryma seu Gummi.

Vires. Herba calf. & sicc. (Galeno est mixta natura, calfac. scil. & frigida) subastringit. Internus eius vsus, quia capiti nervosoque generi aduersatur, rarus est. Externus crebrior in achoribus excandis & sanandis, in fomiculis ab inflammatione tutandis (imponitur quotidie folium) in Ocanis curandis, in aurium purulentarum dolore sedando (mifectur succus cum ol. e.g. liliaceo.

Bacca: Purgant per superiora & inferiora, unde & contra febres à vulgo exhiberi solent.

Gummi seu lachryma ex trunco hederæ maioris vulnerato & interdum sponte exit, colore ex flauo rubescens, odore graue, sapore acre. Psyllothrum à maioribus habetur infigne ac causticum lentefque interimere dicitur.

N. Nostratibus in vsu non est, quippe gummi hederæ officinarum nec figura nec viribus descripto gummi conuenit. Purpureo nigricans est (adeoque Mumie non ab simile) fragile nec saporis acris, sed velut adusti, lignosis segmentis ac sordibus plerunque scatens.

PRÆPAR.

Ol. stillat. Ex baccis cum ∇ fermentatis per Vesicam.

N. Alij lignum, baccas ac gummi simul per Retortam destillando, oleum parant.

CLIV. Helenium.

N. Dicitur Helenium, quod è lachrymis Helena natum dicatur.

Έλενιον, Elenion, Trag. Heleniū, Brunf. Matth. Dod. Cord. an D. Lob. Cast. Cam. Tab. Ger. Epula, Lon. Emula Campana, Brunf. Cam. Helenium vulgare, C. B. 1. Alantwurcz.

TTI

N. Crescit

N. Crescit plerunque locis humidis:
Floret Julio.

OFFICIN. NAT.

Radix, quæ collecta antequam in
stolones abierit, in taleolas recatur, in-
que umbra exiccatur.

Vires. Nonnullis calfac. & sicc. 2.
(Fernelio calf. 3. sicc. 1.) abstergit, discu-
tit, aperit, pulmonica est, stomachica,
alexipharmaca, sudorifera, &c. Usus
precipui, in tartaro pulmonum Renum-
que attenuando ac educendo, & hinc in
tussi, asthmate, in cruditatibus ventri-
culi emendandis, ureteribus reseruandis,
in peste contagiosisque morbis arcendis,
in scabie, &c.

PRÆPAR.

1. Radix condita.
2. ∇. Ex radice destill.
3. Conserva Radicis.
4. Extract. Ex Rad.
5. Vnum Epulatum. Ex radice &
musto.

CLXV. Herniaria.

Dicitur Herniaria, Dod. Cam. Tab.
Ger. Herniaria multigrana serpillifo-
lia, Lob. Herba Turca, Lob. Polygoni
genus, Herniaria appellata, Clus. hist.
Millegrana, Cord. hist. Herba cancri
minor, Cord. Polygonum minus, Cast.
Matth. Empetrum, Trag. Lon. Poly-
gonum minus seu millegrana maior,
C. B. 11. (videl. inter Polygoni mino-
res species) Germ, Harnkraut. Tan-
senckærner.

Crescit locis aridis ac arenosis, non-
nunquam tamen & circa ripas: Floret
Iunio, Julio.

OFFICIN. NAT.

Herba seu planta integra.

Vires. Réfrig. & sicc. Usus precipui
est in Hernia curanda, urina cienda,

renum ac vesica calculo atterendo, ven-
triculi ac aliarum partium mucilagines
incidenda, educenda, bile ac aqua expel-
lenda, adeoque in fœtero curando.

PRÆPAR.

∇. stillat. Ex herba.

CLXVI. Hispidula.

Æluropus, pes Cati pilosella mon-
tana, hispida, C. B. 5. Ratzensfuß. Est
species pilosellæ, (aliis Gnaphalij (par-
ta admodum, totaque fere tométofa, ma-
ximè verò stoculi, quos profert ruben-
tes, interdum albos. Videatur Renodans.

Nascitur in collibus ac locis siccis
& apricis: Floret Maio, Iunio.

OFFICIN. NAT.

Tota Herba cum floribus.

Vires. Easdem vires obtinet, quas re-
liqua pilosella genera, vide auriculâ mu-
ris: peculiari tamen proprietate pulmo-
num exulcerationi conferre statuitur,
& sanguinis exspuitioni.

PRÆPAR.

1. ∇. Ex integra planta cum flo-
ribus.
2. Syrupus simpl. Vide Renodum.
3. Compositus de pede Cati.
Vide l. 2.

N. Nostratibus Syrupus hic compo-
situs vulgarissimus est.

CLXVII. Hordeum.

Gerste { hyemale. Hoc præstantius.
est { æstivum.

Videatur Hordeum, Brunf. Matth.
Lob. Dod. Lon. Cast. Ger. hordeum ma-
ius, Trag. Hordeum polysticum, Fuchs.
Tab. Hordeum secundum hyemale,
Cord. in D, Hordeum polystichum hy-
bernum, C. B. 1.

OFFICIN.

OFFICIN. NAT.

Semen & Farina.

Vires. Refrig. & sicc. i. absterg. aperit, dig. emol. est diureticum, nutritivum.

N. Crudum ventriculo aliquatenus inimicum est, quippe sterculentum: tamen coctione corrigitur.

PRÆPARATA.

1. ▽. Hordei grammis. Fit mense Maio, colligiturque mane gramen rose adhuc madidum.

N. Insignis est efficacia in aestu domando, extrinsecus in Cephalalgia mitiganda, oculorum defluxionibus calidis emendandis, &c.

2. Decoctum hordei, seu ▽ decoctionis hordei, Gerstenvasser.

N. Ad decoctum hordei sumitur hordeum non excorticatum si intentio sit abstergere, exsiccare: Excorticatum si animus sit digerere, sitimque extinguere, &c. Formula decoctionum vstitutissima, mulieribusque notissima sunt.

CLXVIII. Horminum.

Sclarea { hortense odoriferum.

Schar- { sylvestre.

Ex his officinale, quod Gallitricum, Cam. Ger. Gallitricum sativum, Trag. Sclarea, Matth. Cast. Cam. Tab. scarlea, Lob. Horminum sylv. 1. Clus. hist. Orminum sativum, Fuchf. Cord. in D. Oruala Dod. Cast. Horminum sclarea dictum, C. B. 3.

Floret Junio, Julio, solo gaudet opimo.

OFFICIN. NAT.

Folia, cum floribus, sed raro.

Vires. Calf. & sicc. abstergit, attenuat: Vtus rari, nisi quosdam in vino cum floribus sambuci & viuis suspendi solent.

CLXIX. Hyoscyamus.

Iusquiamus, Faba. suilla, Herba canicularis, Dens caballinus, Bilfenkraut, Bilfen, Dollkraut, Schlasskraut, Sarrubo, Rindswurzt, Ziegeunerkraut.

est { vulgaris vel niger, C. B. 1.
albus { maior, C. B. 2.
minor.

Ex his eligere monet Fernelius floribus albis, semineque albo, reliquis neglectis.

Insignitur Hyoscyamus albus, Matth. Dod, Lob. Lon. Cast. Cam. Ger. Tab. Hyosc. candidus, Trag. Apollinaris 3. Cord. in D. Hyoscyamus albus maior vel 3. Dioscoridis, C. B. 2.

Crescit incultus: Floret Junio & Julio.

OFFICIN. NAT.

Radix, Semen, Folia.

Vires. Refrig. 3. sicc. 1. emollit mire, somnum inducit, stupefacit, acrimoniam mitigat, rationem perturbat. Unde interius eius vsus rarissimus est: exhibetur tamen ad hamoptysin curandum. Externus aliquatenus crebrior, scil. in tumoribus calidis, in podagra, in odontalgia (suscepitur fumus seminis per infundibulum.)

N. 1. Trallianus amuletum antipodagricum ex radice facit: colligit eandem existente in ☉ & ☌ ante ☉ lris occasum, radicem non attingendo, sed esse cuiuscunque animantis mortui effodiendo, peculiariaque insuper adinvationis verba superaddit, qua cum superstitione videantur, adscribere superse- deo. Videatur Trallian. l. 11. in fine.

N. 2. Antidota Hyoscyami sunt: lac caprinum, & muls. semen cucurbitae sem. Urtica, Sinapi, Raphanus, Cæpa, allium cum vino assumpta.

TT: 2 PRÆPAR.

PRÆPAR.

1. ▽. Ex fol. floribus ac semine immaturo destill.

2. ☉ expressum. Ex semine albo recente, sicco, calida ▽ a asperlo, in solato tritoque.

N. Alij macerant Hyoscyamum cum semine suo immaturo in Omphacino: Hinc exprimunt & coquant.

3. Extractum seu succus Hyoscyami. Ex radice mense Septembris vel Martio cum germinibus tenellis exprimitur succus, depuratur ac digeritur, ut rubicundo colore tingatur.

N. Ingreditur Laudanum opiatum, Quercet.

CLXX Hypericum.

Ymeor. Hypericum, Brunf. Matth. Fuchf. Lon. Dod. Lob. Cast. Cam. Tab. Ger. Herba perforata & Hypericum, Trag. Alcyron, Cord. in D. Androsemū minus, Gesn. Hyper. vulgare. C. B. 1. alijs fuga Dæmonum, Iohann. Kraut.

Crescit passim in dumetis, alijsque locis incultis: Floret Iulio.

Folia ac Flores.

Vires. Calf. & sic. est partium renium, diureticum ac vulnerarium. Vfus præcipui in vulneribus mundificandis, consolidandis (intus & extus) in sanguine coagulato resoluendo, in calculo renum atterendo, in Lumbricis fugandis (scil. si tempore exaltationis collecta fuerit, alias hac facultate destituitur.) Extrinsecus in contusionibus (præcipue nervorum) in tremore, in partu alluando.

N. Paracelsus refert inter herbas veneficia ac spectra arcentes, colligereque iubet sub instuemia ☉, ♀ ac ♀ris (nullo modo sub ☾) tempore aurora, atque varium vus vsum docet, loco amuletis

adhibet, pileo includit, noctu puluinarum supponit, sepius naribus admolet, sternit per domum, de parietibus suspendit, &c.

PRÆPARATA.

1. ▽ stillat. Ex fol. ac flor. in siue Iunij collectis.

2. Oleum. Ex infusione florum in oleo communi.

N. Alij summitates cum flor. ad maturitatem seminis ferè accedentes macerant cum vino, exprimunt atque cum Theriabinthina & oleo coquant. Vide Disp. August.

3. ☉ Ex planta, integra incinerata, 4. Tinctura. Hanc habent Tentzel. in Exeg. Sala de Essentiis V. 1. 2.

N. Dos. gr. vj. ad ʒss.

CLXXI. Hyssopus.

Ymeor. Hyssopum, Isop, Ispen.

Est { Hortensis. Hac officinarum. Syluestris.

Vocatur Hyssopus, Brunf. Tag. Cord. in D. Lon. Tab. Cam. Hyssopus hortensis, Fuchf. Hyss. vulgaris. Dod. Clus. hist. sativa, Cord. hist. Hyssopus Arabum, Lob. Ger. Hyssopus officinar. cærulea siue spicata, C. B. 1.

Crescit in hortis: Floret Iulio & Augusto.

OFFICIN. NAT.

Folia cum floribus collecta Aug.

Vires. Calf. & sic. 3. partium tenuium est, artem. aperit, absterg. Vfus præcipuus in affectibus pulmonum tartareis, tussi, asthmate, Extrinsecus adhibetur crebro ad sigillationes oculorum, ad uterum mundificandum, auriumque tinnitus tollendos (per irrorium sufficiens susceptus) ad oris absterisionem (in gargarismis)

N. Sunt qui Absynthio in corroboratione

tione ventriculi preferunt.

PRÆPAR.

1. ▽ stillat. Ex herba & floribus in NB.
2. Ol. stillat.
3. Conseru. Ex floribus.
4. Spec. Diabyssofi. Nic. Vid. D.
5. Syrup. simplex. Ex succo.
6. Compos. Vid. Disp.

I.

CLXXII. Iacea.

Herba Trinitatis, *Brunf. Fuchs. Lon.* fatiua, *Trag.* iacea siue flos Trinitatis, *Matth.* iacea maior siue viola tricolor, *Cast. Dod. Clus. Ger.* Viola flammea, *Coloria, Lob.* Viola Trinitatis 1. *Tab.* Viola tricolor hortensis, *C. B. 5.* inter violas martias. *Germ. Freysamkrant, Dreyfaltighenblum, Slebenfarbenblum, Vnnüt Zesorge, ie langer ie lieber.*

Floret Aprili, Maio ac toto ferè æstate: Crescit locis arenosis.

Colitur in hortis, crescit & in agris. Illa licet præferatur: attamen non licet non recipere & syluestrem.

OFFICIN. NAT.

Herba integra cum floribus

Vires. *Calf. & sic. ad gr. vsque 3.* (aliis remissius) subamara ac acris est: hinc abstergit, penetrat, incidit, discutit, vulneraria est ac sudorifica. *Vsus præcip. in astu (maxime infantum) domando, in scabie ac pruritu, in mucilagine viscosa pulmonum: in uteri obstructione. Extrinsecus videm in pruritu, in abstergendis vulneribus, in mucilagine pulmonum incideada, in uteri obstructione. (baln.)*

PRÆPAR.

1. ▽. Ex integra herba.

CLXXIII. Iasminum.

Lo. Cur. Iosincum, Ieseminum, Gelseminum, Arab. Zambach, Iesemin. *Iasme, Brilael: Reben.*

Vsuale est, Iasminum vulgatus flore albo, *C. B. 1.* quod est Iasminum, *Dod. (cui & Apiaxia,) Cord. in D.* album, *Tab. Ger.* Gelseminum vel Iasminum, *Matth. Cast. Cam. Alpin.*

Gaudet locis calidis ac apricis. Nostratibus colitur in hortis: Floret fere integram æstatem.

OFFICIN. NAT.

Soli Flores, sed raro. Nimirum nostratibus non nisi Oleum in usu est, quod fit ex reiterata infusione vel coctione florum in oleo veteri. (N. Aliis in oleo amygd. dulc.)

Vires. *Eisdem ferè vires obtinet, quas chamamelinū. Dig. calf. emoll. aper. Vsus præcipuus internus ad uterum calfaciendum & laxandum, eius scirrhum sanandum, ad partum facilitandum, ad tussim anhelitusque difficultatem, ad plurim, dolores stomachi, intestinorum, uteri, (oleum Iasmino amygd.) Externus in catarrhis frigidis, in membris ac articulis resolutis, in dolore pleuritico, colico ac uterino (in clysmate vel unguentis.)*

N Sunt inter mulieres, qua oleo Iasmino amygdalino capillos peccunt, ut eò felicius crescant. Verum caueant ab eo biliosa, utpote qua facile capitis dolorem illo sibi conciliare possunt.

CLXXIV. Imperatoria.

Ostrutium, *Lon.* Ostrutium, Astrutium, Astrentium, Astrantia, *Brunf. Dod. Clus. hist. Magistrantia, Cam. Struthium, Cord. hist. Laserpitium Germanicum*

nicum, *Fuchf.* Smyrnion hortense,
Trag. Imperatoria, *Matth. Lob. Cast.*
Tab. Ger. Imperatoria maior, *C. B. I.*
Meisterwurtz, Mneistrantz, Ostvitz.

Floret Augusto, colitur in hortis.

OFFICIN. NAT.

Sola radix.

Vires. Saporis est acernimi: calf. & sicc. 3. alexipharmaca ac sudorifica est, atten. aperit. *Vsus* pracip. in venenaris morbis ac icibus, in pulmonum U o. resoluendo, expectorando; in faetore anhelitus corrigendo, in capitis affectibus phlegmaticis, paralyti, Apoplexia, &c. in cruditate ventriculi, & colico dolore, in febril quartana. *Extrinsec.* in Odontalgia (gargaris.) in catarrhis exiccandis (suffitu) in tumoribus ac arthraide frigida. In scabie capitis exiccanda (lotione) in serpigine in veterata sananda cum adipe suillo illita in globulis sagittisue corpori extrahendis (imposita.)

PRÆPARAT.

∇stillat. Ex herba florecente collectâ Julio.

CLXXXV. Iris Nostras.

Ips. *Beyelwurtz, Himmelschvverrel, blavv Gilgen.*

Iris in officinis usitata est

Nostras: Hac huius loci. Peregrina Illyrica scil. & Florentina. *Vid. infra.*

E variis Iridis nostratis speciebus infertur solum in officinas Iris vulgaris Germanica seu sylvestris, (latifolia,) *C. B. 1.* Quæ inscribitur, Iris, *Brunf.* Sylvestris, *Matth. Cord. h. Cast. Tab.* sylvest. *r. Lob. sylu. maior, Matth. Epit.* Iris Germanica, *Fuchf. carulea, Dod. Gladiolus caruleus maior, Trag.* Iris latifolia maior vulgaris, *Clus. hist.*

Floret tempore verno, Aprili scil. & Maio.

OFFICIN. NAT.

Radix, colligenda vere antequam germinare ceperit.

Vires. *Calf. sicc. 3.* valde hydragoga est, ac orrhina. *Vsus* pracip. in hydropicor. aqua educenda. *Extrinsecus* in impetiginibus, aliisque corporis maculis detergendis.

N. Ventriculo reliquisque visceribus infensa est, proin corrigitur stomachicis.

PRÆPAR.

1. Succus. Exprimitur ex radice, depuratur (digestione) adhibeturque recens prohydragogo.

Dosi ʒj . ad ʒiij .

N. *ʒns* pissatur nonnunquam, reserueturque pro Errhinis.

2. Fecula. Fit ex succo la.

N. Non eque purgat ac ipsamet radix.

Oleum infusum, Vide Disp.

CLXXXVI. Iris Illyrica ac Florentina.

Præualet Illyrica, sequitur Florentina; vtriusque itidem sola radix in usu est. *Germ. Violwurtz.*

Vires. *Calf. & sicc. 2.* incid. atten. expectorat. diger. absterg. emollit. *Vsus* pracip. in mucilagine seu F ro pulmonum, tussi, asthmate, obstructione mensum, torminibus ventris infantum, *Extrinsecus* abstergit cutis maculas & lentiginos (cum Elleboro & melle mixta) oris faetore emēdat: creberrimus *vsus* modernis est in pulueribus, qui capillis insperguntur. *Vulgus* vocat pulueres de Cypro.

PRÆPARATA.

1. Extractum.

2. Spec. Diareos simpl. *V. D.*

3. Salomon. *V. D.*

CLXXXVII.

CLXXVII. *Iuglans.*

E *Iuglandum* generibus vsuatio-
 est, quæ dicitur *nux Regia*, *Brunfels*,
Cordan D. *Nux iuglans*, *Trag. Math.*
Lon. Dod. Lob. Cast. Tab. Cam. *Iuglans*,
Fuchf. *Nux iuglans seu regia vulgaris.*
C. B. 1. Nuszbaum, VVelsehe Nusz.

Iuli & folia erumpunt Martio:
Nuces maturescunt autumno.

OFFICIN. NAT.

Nuces, *Putamina nucum externa*,
 eaque *viridia*, *Cortex internus ipsius*
arboris, *Cortex interior nucleum ambi-*
ens, *Iuli* ante oculos apparentes &
 decedentes.

Vires. Nuces recentes calf. 1. sicc. 2.
sicca sunt facultatis calidioris ac siccioris.
Comesta difficilis sunt digestionis,
pauci nutrimenti, ventriculo infensa,
bilem augent, cephalalgiam excitant,
pulmonum affectus ac precipue tussim
exasperant. Dicuntur tamen à peste
preservare.

Putamina externa Viridia, vi vomitum
leuiter mouendi prædita sunt.

Cortex interior, de arbore decerptus,
dum adhuc succulentus est, siccatuque
ciet vomitum sat valide.

Dosis à ʒʒ. ad ʒj.

Cortex nucleum ambiens inuat colic-
os (potus.)

Iuli iridem vomitum excitant, sed le-
nius. Vsus præcipuus in colico, nephriti-
cogue dolore; sicut sunt diarrhæa, exhibit.

PRÆPAR.

1. *Nuces condita.* 2. *Nuces virides*
 circa Festum *Ioannis* collectas, perfo-
 ra aliquoties, vt penetrabilia *putamina*
 sint, ac macera (7. vel 10. in ∇ frigi-
 da, ∇ quotidie semel ac iterum per-
 mutando, vt aliquo modo dulcescant.
 Hinc coque l. Δ vt mollescere inci-

piant. Postea sicca & confige *Cinam.*
Garyophil. &c. atque cum saccharo vel
 melle coque ad consistentiam. *Videl.*
 2. *Confortant stomachum, iuantque*
digestionem, vnde & bellariorum loco
apponi solent. Specificæ eas ciete men-
ses, testis est Matthiolus.

2. ∇ *Vomitória ex nucibus.* *Vide*
l. 2. c. 38.

N. Alij destillant ∇ m ex nucibus
immaturis contusis, alij ex folis putami-
nibus viridibus.

3. *Succus* mense *Februar.* è radici-
 bus perforatis destillans.

Vires. Podagricos dolores ad mira-
culum lenire dicitur, illius.

4. *Rob. nucum: Diacaryon.* *Fit ex cor-*
ticum viridium succo & mellis.

Vires. Destillationi tenuium catar-
rhorum confert. Vide Disp.

5. *Oleum.* *Fit expressione ex nucleis*
maturis.

Vires. Flatus potenter dissipat, adeo-
que in colico dolore multum fert auxilij.

Dosis ʒj. iij. ad iij. &c.

Extrinsecus tumores discutit, con-
tractos nervos emollit, scabiem antiquam
sanat.

6. *Electuarium.* *Vid. l. 1.*

N. Varia Electuarij nucum inue-
niuntur descriptiones, qua tamen Basin
minime à nucibus participiant, vnde nec
huius loci sunt.

CLXXVIII. *Iuiuba.*

Zizipha. *Iuiuba* maiores oblongæ,
C. B. 1. Iuiuba, Trag. Cord. hist. Lō. Tab.
Iuiuba Arabum, Lob. Zizipha, Mart.
Cast. Ziziphus, Dod. Clus. hist. Zizi-
phus rubra, Cam. Brustbeerlein. Fru-
ctus sunt arboris Ziziphi, magnitu-
dine Oliuas, sapore passulas maiores
 emulantes,

amulantes, vnicum referentes lapideum nucleum.

Asportantur ex Italia.

Vires. Moderatè calf. & humect.

Vsus præcip. in pulmonum asperitate, tussis, pluritudine, urina acris, feruescentia sanguinis, erosione rerum ac vesica.

PRÆPAR.

Syr. de iniubis. Vid. Disp.

CLXXIX. Juniperus.

Κ. ΚΑΥΘΙΣ, Δ. ΝΕΥΤ &. Juniperus, Brunfens. Matt. Dod. Lon. Lob. nostras, Cam. vulgaris, Trag. Clus. hist. Minor, Fuchs. Cord. in D. Sylvest. Cast. Juniperus & Juniperus baccifera, Tab. Juniperus vulgaris fruticosa, C. B. I. German. VVeckholder, VVachholder, VVachholderbaum, Kramerbaum.

OFFICIN. NAT.

Lignum, Bacca, Gummi, Fungus.

Vires. Lignum calidum ac siccum est
3. suave olet (præcipue si Maio mense cadatur,) vnde & rasura eius non sine causa in cucuphis adhibetur, quippe cephalicum est, nervosumque genus insigniter roborat.

Bacca, Calf. 3. sicc. 2. discut. incid. atten. Vsus præcipui, in cienda urina, sudore, obstructis mensibus, obstructo liene, in affectibus capitis, nervorum, pectoris (tussis) in morbis à flatu, (ut colica) in mucilagine renum & vesica, &c. Suffitus vstitatissimus est tempore pestis, tum è baccis, tum è ramusculis suscitatus. Colliguntur bacca sole in virgine existente.

Gummi, Arab. Sandaraca vernix) truckner Firmis, calf. & sicc. 1. (aly 2.) condens. discut. Vsu præcipui in nervorum affectibus, resolutione, frigiditate, contractura, &c. conuenit & in capitis

affectibus reliquis, à frigiditate subortis.

N. 1. Vernix liquidus, factitius est liquor, ex gummi hoc, i. e. Sandaracha in oleo lini soluta. Valeret arabusta, lenit dolores præcipue hæmorrhoidum.

N. 2. Sandaracha Græcorum est Auripigmentum.

Fungus. Maio mense instar musci adnascitur, Inseruitaque ophthalmica.

PRÆPAR.

1. ∇ . Ex baccis sine præmissa fermentatione raro destillatur.

2. Spiritus. Fit ex baccis cum ∇ (ϕ 4. 5. fermentatis & per vesicam destillatis. Vide l. 2.

N. Alij loco ∇ æ sumunt cereuisiam, spiritusque copiam sibi persuadent maiorem: Verum enim verò maior illius pars cereuisia debetur.

3. Oleum ex baccis. In destillatione ∇ æ vel spiritus simul extillat.

4. Oleum ex ligno. Fit per descensum vel Retortam. Applicatur extrinsecus in morbis, ut supra diximus, nervinis.

N. Melius elicitur per vesicam, extillatque clarum.

5. Sal. Ex cineribus baccarum elicitur, tum quoque ex ligno combusto.

6. Rob. Juniperinum. Mel Juniperinum, Theriaca Germanorum. Fit coctioe cum ∇ , hinc expressione ac inspissatione.

N. Quercetanus macerat ac coquit cum Vno. Ph. Rest. c. 23.

7. Extract. gummosum. Ex ligno & cortice fit l. a. Quercetan. Ph. Rest. cap. 23.

8. Extract. è baccis siccis. Fit l. a. cum ∇ vel cum ∇ , i. e. Spiritu Juniperi. Dosis \mathcal{D} . \mathcal{D} ij.

Vires. Virumque Extractum excellens est sudorificum & Boxoarricum aduersus Epilepsias, pestes & affectus alios

alios contagiosos atque venenatos.

9. Elixir. Juniperium. ꝛ. Baccar. Juniper. maturar. ac electar. q. v. contendantur crasse, digeranturque affusa aliqua ∇ diuretica. Hinc exprime, abstrahendoque inspissa ad consistentiam mellis. Huius mellis Juniperi cochl. 10. 11. 12. &c. misce optime cum ∇a vitæ juniperina, digereque aliquandiu, lenissimo calore (Olis, & sim.) sic confecisti Elixir Juniperinum admirandarum virium, in calculo, quod insuper stomachicum

insigne est, aliasque facultates eximias obtinet, de quibus in baccis.

Dosis cochl. j.

N. Vir Generosus ac Nobilissimus Dn. Chun. Quirinus Schütke ab Holtzhansen, Illustriss. aula Darmstadina olim Marefchallus, vir in omni scibili solertissimus, iam morte immatura non sine plurimorum querela, ereptus, creberrimo Elixiris huius usu annos plurimos à calculi iniuriis, quibus alias obnoxius maxime fuit, liber vixit, eoque nomine id mecum communicavit.

L.

CLXXX. Lactuca.

Lactuca, { Hortensis }
Lattich, { capitata }
est { Sylvestris. }
 { vulgaris }
 { crispa }

Usuales sunt promiscue.

N. Nomen Lactuca Botanicis omnibus usuale est.

Solo gaudet pingui & stercoreato. Floret æstivo tempore.

OFFICIN. NAT.

Folia ac Semen.

Vires. Refrig. ad gradum usque 3. siccat mitius, conciliat somnum, bilis feruescentiam ac æstum compefcit, lac auget, aluum leniter mouet, ventriculo conuenit, multi ac laudabilis nutrimenti est, vnde & in acetariis usurpari crebrius solet. Extrinsecus sedat dolorem capitis, medetur ambustis, somnum conciliat (in lotionibus pedum,) &c.

Semen. Est ex seminibus frigidis famosis illis, que minora dicuntur. Valet ad Gonorrhæam virulentam, adurina ardorem, ut & ad reliqua quibus folia conuenire diximus.

PRÆPAR.

1. ∇. Ex foliis.

2. Succus inspissatus.

3. Caules conditi. Fiunt è stolonibus nostratis lactucæ, dum caulescunt.

CLXXXI. Lagopus.

E generibus Lagopi vtitatus est, quod inscribitur λαγώπυτος, Dioscorid. Plin. λαγώπυτος, Hippocr. Lagopus seu pes leporinus, Matth. Fuchs. Dod. Lob. (cui & lagopyton.) Lag. maior, Cas. minor, Cam. Lagopodium, Tab. Ger. Lepor. pes, Cord. in D. aliis trifolium leporinum, Germ. Hasenklee, Hasenpflein, Ratzenklee.

Crescit inter segetes. Viget Iulio potissimum.

OFFICIN. NAT.

Herba cum Spicis.

Vires, sicca, & adstring. vsus præcip. in profusio alui, vteri (fluore albo) in dysenteria, hamoptoei, stranguria, vulceratione vesicae, &c. Extrinsec. in hamorrhagia

V V u gia

gia hemorrhoidum. Vulnerum, in tumo- ad cutim Solis ardore induratum leni-
ribus inguinum & herniis, &c. Quin & endam adhibetur (lotione.)

CLXXXII. *Lapathum.*

Est vel {
 { Acetosum. Vide Acetosam.
 { Hortense. Vide Spinachiam.
 { Sylvestre { Angustifol. De quo hic.
 { Latifol. Vid. Rhabarb. Monachorum.
 { Aquaticum.

Dicitur Rumex acutus, Cord. in D. Oxylapathum, Fuchf. Matthiol. Cast. Germ. Oxylapathum, Dioscor. Lapathum acutum, Trag. Lob. Dod. Lapathum fatium, Cam. Lapathum seu Rumex, Lon. Cast. Lapathum folio acuto plano, C. B. 1. German. Mengelvurtz, Grindvurtz, Streiffvurtz, Bubenkraut, vilder Mangolt, vilder Ampfer, Lendenkraut.

Prouenit in locis incultis : Floret Maio ac Iulio.

Radix ac Semen sed raro.

Vires. *Lapathum temperata* censetur natura in actiuis, alias ad siccitatem inclinat. Semen aliu obstruit: Folia subducunt: Radix vsus crebri & precipui est in scabie extergenda ac siccanda, idque extrinsecus, potissimum in lotionibus.

PREPAR.

∇. stillat. Ex radice.

Vires. Commendatur maximopere ad cutis maculas & pustulas, alphas, iunthos, vitiligines & lichenas.

CLXXXIII. *Larix* seu *Larex.*

Λάριξ. Larix, Brunf. Matth. Dod. Fuchf. Lon. Lob. Cast. Clus. hist. Tab. Ger. Cam. German. Lerchenbaum, Lerchendammen.

Gaudet montanis, vnde & in Hel-

vetia ac territorio Tridentino vulgaris est, viget ac Floret vere.

OFFICIN. NAT.

Resina & Fungus trunco adnatus Agaricum dictus. Vide infra.

Resina fluit ex arbore ad medullam usque perforata, venditurque titulo Terebinthina vulgaris. De hac vide infra Terebinthina.

CLXXXIV. *Laurus.*

Λάριον, Lorberbaum.

Est {
 { Hortensis { Latifolia. Hac vsua-
 { Sylvestris. { Angustifolia, vulga-
 { ris. Hac priori sub-
 { stitui potest.

Dicitur (latifolia) Laurus latiore folio, Matth. Cast. L. Latifolia, Cord. in D. L. Latifolia mas, Tab. Lauros latifolia μαυρίνα Dioscor. C. B. 1. Angustifolia dicitur Laurus, Brunf. Trag. Lon. Lob. Laurus tenuifol. Matthiol. Cord. in D. Cast. Cam. Lauri altera species, Dod. Laurus mas, Tab. & Ger. Laurus vulgaris, C. B. 2.

Crescit sat copiose in Italia, apud nos non nisi in hortis colitur.

OFFICIN. NAT.

Folia & Bacca.

Vires. Calf. & sic. 3. (bacca paulo calidiores

calidiores sunt) emolliunt, resoluunt. *Vsu* precip. (baccarum) in mensibus & urinis ciendis, in affectibus nervorum, paralyfi, in colica, in dolore post partum, in eruditatibus ventriculi. *Extrinsicus* conferunt folia ad ictus vesparum, molliunt tumores, promouent menses (in suffitu ac balneo) leniunt dolores, odontalgiamque mitigant (gargar.)

PREPAR.

1. Electuar. de baccis lauri. V. D.
2. Emplastr. de baccis. V. D.
3. Oleum laurinum. Vel ex baccis recentibus exprimitur, vel coquendo elicitur. August.

4. Oleum stillat. v. Bacc. lb. ij. contulis superfunde v. tepida lb. iij. vel iij. Postquam aliquandiu steterint, destilla per x vel vesicam. Sic prodibit oleum ac v. per tritorium separanda.

Vires. Oleum hoc stillat. discutit insigniter flatu ac ventositates, precipue in spasmogruavidarum, vt & in colica, siderata membra illitu restituit, auribus inditum dolores compefcit, auditumque confortat, delet impetigines, lentigines & quasunque faciei maculas. Denique ichorosis capitibus vlceribus medetur, phtbriasi & rineas curat.

Dosis gr. ij. iij. iij. Videatur Tentzel. in Exeg.

5. Spiritus. Fit ex baccis cum v. fermentatis.

6. Essentia. Fit ex baccis que in spiritu infusæ, vires suas eidem comunicant.

CLXXXV. Lens palustris.

Lenticula lacustris, aquatica, Lenticula aquatica, Brunfels. Palustris, Math. Cord. n. D. Lon. Ger. Dod. Lenticula palustris vulgaris, C. B. 2. Germ. Wasserkraut.

OFFICIN. NAT.

Folia aquis supernatantia.

Vires. Refrig. humect. 2. *Vsu* precipuus ad extinguendas inflammationes astusq; sanguinis. *Extrinsicus* ad scabiem etiam malignam.

CLXXXVI. Lentiscus.

Exin. Dioscor. Lentiscus, Math. Dod. Lon. Clus. Cob. Cas. Cast. German. Mastirbaum. Arbor est baccifera, in Italia, Gallia Narbonensi, & precipue in Insula Chio copiose nascens.

N. Bellon. lib. 2. obseru. c. 8. Solas Lentiscos in Chio Insula Mastichen proferre asserit, cui *Experientia* reclammat. Nimirum ex donatione Affinis mei dilecti D. Joh. Glaseri, Pharmacopæi huius Reipub. solertissimi, frustulū obtineo mastiche ditissimum, quod sibi ex Helueticis alpibus transmissum fuisse asserit.

Exhibet officinis Gummi resinam Mastichen dictam, quam vide infra. Ex ligno fiunt vulgariter dentiscalpia, quæ reliquis laudem præripiunt

N. Hippocrates adhibet & baccas, quas xidas appellat.

N. 2. Exprimitur & oleum ex baccis, Clus. in hist. Verum nobis vulgare non est.

CLXXXVII. Leuisticum.

Ligusticum vulgare, C. B. 7. (inter Libanorides,) Laserpitium Europæum Germanicum, Leuisticum, Brunf. Lob. vulgare, Math. Dod. Ligusticum. Brunf. Cord. in D. Lon. Tab. fatiuum, Trad. Cord. hist. vulgare, Cam. Lybisticum vulgare, Fuchs. con. Laserpitium, Ger. Stuytnium. Fuchs. aliàs Hipposelium, Germ. Liebstäckerl.

V Vu 2 N. EH

N. Est & Ligusticum verum. V.d. Seceli offic. Est iidem Laserpitium aliud Dioscoridis, ex quo Laser Gummi, modernis incognitum.

Floret in primis Iulio mense, gaudet solo umbroso.

OFFICIN. NAT.

Folia. Radix. Semen.

Vires. Calf. & sicc. 3 incid. aper. alexipharmacum est ac diureticum, vulnerariumque. Ventriculum roborat, asthmatis subuenit, menses & lochia ciet, fetum mortuum eiicit (semen) tartarum lentum resoluit, doloresque inde natos sedat, Epatis, Lienisque obstructions referat, adeoque precipue Ictero conuenit. Extrinsecus vsus eius creberrimus est in balneis, cataplasmatibus (utero & vteribus dicatis) in Emplastris vulnerariis, & sim.

N. 1. Vulgus per caulem cauum potum haurire senuit, quo tussim sedatum iri, sibi persuadet.

N. 2. Radicem effossum, dum ☉ in V intrat amuleti loco appendunt in atrophia. Fel. Würtz.

PRÆPARATA.

1. ∇ stillat. Ex integra herba cum rad. ac flor. mense Iulio collectis.
2. Oleum stillat. Cum ∇ ascendit.
3. Sal. Ex cinere.

CLXXXVIII. Lichen.

Lichen petraeus, Lichen saxatilis, Muscus saxatilis, Hepatica, Brunfels. Lob. Lon. Tab. hepatica saxatilis, fontana, C. B. 1. Iecoraria seu hepatica fontana, Trag. Lichen, Matth. Fuchs. Dod. Cord. in D. Cast Lichen 1. petraea, Ger. Germ. Leberkraut, Steinleberkraut, Steinstechten, Mooskraut, Brunnenkraut.

N. Huic surrogatur muscus arboreus crustaceus. Vide Pulmonaria arborea.

Floret Maio & Iunio, floresque fert instar stellarum. Crescit locis vdis & umbrosis in puteis, iuxta fontes, & simil.

Vires. Refrig. & sicc. absterg. Epatica insignis est. Vsus praecipue in Epatis obstructione & Vesicis (quarum signaturam in foliis gerit.) Hinc in Hectica, in Ictero, in Scabie & Lichenibus, in gonorrhoea, in febre. Extrinsecus sistit sanguinem in vlnerebus.

PRÆPAR.

∇ stillat. Fit in fine Maij ac principio Iunij.

CLXXXIX. Ligustrum.

Küess, Ligustrum, Brunf. Matth. Fuchs. Cord. in D. Lob. Cast. Tab. er Ligustrum Germanicum, C. B. 1. vulgare, Trag. maius, Lon. Phyllirea, Dod. Arab. Kenne. German. Harriegel, Beinholtz, Reinwociden, Mundholtz.

Vulgare, quod officinarum & huius loci.

Est <

Myrtifolium	} officinis inusitata,
Foliis laciniatis.	
Ægyptiacum latifolium	
Angustifolium.	

Crescit passim in sepibus. Floret Maio Iunio.

OFFICIN. NAT.

Folia, Flores.

Vires. Refrig. & sicc. astring. incid. (folia efficacius, flores imbecillius) proinde conducunt ad inflammationes, putredines, exulcerationes oris & faucium, ad procidentiam & tumorem vnae, laxitatem

tem gingivarum (in collation.) Quin & intrinsecus ad scorbuti curam folia maxime facere compertum est. Adhiberi quoque possunt in profluviis sistendis. &c.

P R A E P A R .

1. ∇ stillat. E floribus.

N. Hæc commendatur præter diætas qualitates ad oculorum inflammationem & rubedinem.

2. Oleum infusum, sed raro.

C X C . Liliium.

Кышор, Liliium. Germ. lilien, Gilgen. Liliorum genera diuersa sunt, album scilicet aureum ac cruentum: Officinis tamen vticatius est album, quod insignitur liliium, Brunf. Matth. Cast. Liliium album, Trag. Fuchf. Lon. Tab. Liliium candidum, Cord. in D. Lob. Dob. Liliium album vulgare, Cam. Liliium album flore erecto & vulgare, C. B. 1.

Gaudet solo pingui stercorato ac umbrato, Floret Iunio.

O F F I C I N . N A T .

Flores, Radix, Stamina,

Vires. Flores moderatè calf. & humest. partium sunt diuersarum, & anodynæ, digerunt, maturant.

Radix, absterg. & sicc. 1. digerit itidem, emollit maturat. Vsu internus rarus est, externus crebrior, isque tumoribus maturandis & leniendis, in clavis pedum, &c. sanandis, in pudendis parturientium molliendis, in ambustis emendandis, &c.

Stamina exhibentur ad facilitandum partum cum ∇ verbenæ vel simili.

P R A E P A R A T A .

1. Conferu. Flor. alb.

2. ∇. Ex florum foliis recentibus, isque rùm solis, tum concisis cum radice.

Vires. Vsu est crebri in affectibus pulmonum, asthmate, tussi, & simil. Extrinsecus in facie dealbanda (cum camphora & oleo ☿.)

3. ☉ Liliium simplex. Ex floribus foliis in ol. oliuar. veteri infusis. Vide Disp.

4. ☉ Lilior. compos. Ex iisdem floribus ac aromatibus. Vide Disp.

C X C I . Liliium conuallium.

Liliium conuallium album, C. B. 2. Ephemereum non lethale, Fuchf. Caci- lia Liliium conuallis vel tylo. Brunf. Liliium conuallium, Trag. Matt. Dod. Cast. Tab. Ger. Clus. hist. Liliium conuallium vel vernum Theophrasti. Lob. Germ. Meyenblümlein.

N. Est & Liliium conuallium flore rubente, sed minus vstatum.

Gaudet solo humido, nemoroso, Floret initio Maij.

O F F I C I N . N A T .

Soli Flores raro Radix.

Vires. Calf. & sicc. cephalici sunt. Vsu præcipui in morbis capitis frigidis vt Apoplexia, Paralyfi, Vertigine, Epilepsia. Hinc & in Lypothymia. Insigne itidem errhinum exhibent puluerisati.

P R A E P A R .

1. ∇ simplex. Ex floribus.

2. Spiritus Vini Liliatus. Ex floribus cum Vino vel Maluatico destillatis.

3. Spiritus Lilior. Ex floribus fermentatis destill.

4. Conferua. Ex floribus.

5. Oleum. Ex infusion. florum recentium in oleo veteri.

6. Puluis sternutatorius. Ex floribus puluerisatis.

N. Sunt qui succum instar olei præparant. Floribus implent vasculum, occlu-

V V u 3 duntque:

duntque: hinc per mensem in formicarum aceruo sepeliunt, ut in succum liquefcant. Anodynum hoc cenfetur in figne antipodagricū, curatiūmque ferpiginis.

CXCII. Limonia mala.

Limonia Germ. Limonjen. Poma funt mali limoniae, C. B. 1. Videatur malus Limonia, Matth. Dod. Lon. Cast. Tab. Limones, Cord. in D. Bellen. Lob. Cluf. hift. Limon arbor ex citri genere, Cord. hift. Malus Limonia acida, C. B. 1.

Vires. Citri mali virtutes amulantur, nisi quod ut magis acidiufcula funt, ita & magis refrigerantia ac ficcantia. Vfus praecip. in febribus aliisque morbis calidis, in calculo & fim.

PRÆPAR.

1. Succus expreffus.
 2. Syr. de succ. expreff. & facchari.
- Vid. Disp.
3. ∇ Ex floribus quæ raro extat.
- N. Sumt qui cortices cum succo claufo vase macerant, & postea deſtillant.

CXCIII. Linaria.

Linariae genera plurima occurrunt, ex his solummodo inferuit Officinis, Linaria vulgaris luten flore maiore, C. B. 3. Olyris, Matth. Cord. in D. Lob. Cast. maior Tabinaria, (& pseudolinum.) Brunf. Ger. 1. Dod. Lon. Linaria vulgaris, Trag. Cam. Germ. Lemkraut, vilder Flachs, Hankraut.

Crescit locis incultis & cultis iuxta sepes. Floret Iunio, Iulio ac Augusto.

OFFICIN. NAT.

Folia.

Vires. Calf. & ficc. est diuretica, amari saporis. Vfus praecip. in Ichero &

obstructo Epate. In vrina difficultate, in hydropo. Extrinsecus imponitur abdomini in stranguria; ano, in hamorrhoidum dolore.

∇ stillat. Ex integra planta in fine Maij collecta.

Lingua Ceruina, vide Scolopendria.

CXCIV. Linum.

Linum s fatium. Hoc vsual.

Flachs, syluestre. Minus vsuale.

Dicitur Linum, Brunfels. Matth. Fuchs. Tab. Cord. in D. Lon. Cast. Linum fatium, Trag. Dod. Linum vulgare caeruleum, Lab. Linum fatium, C. B. 1.

OFFICIN. NAT.

Semen.

Vires. Calf. 1. in reliquis temperatum est, digerit, emollit, maturat. Vfus praecip. in tussi, pleurisi, phthisi. Extrinsecus maturat tumores, lenit dolores, fatum expellit.

PRÆPAR.

1. Mucilago. Fit coctione vel infusione seminis in ∇.

2. Farina.

3. Oleum expreffum.

Easdem vires retinet, quas semen. Prodest etiam ad pterigia oculorum, (instillatum) imprimis cum successu exhibetur pleuriticis atque dolore colico vexatis, in quibus & extrinsecus prodest, ut & in Liene duro.

Dosis ad ℥ij.

N. 1. Stupa & tela inferuunt nō raro aliorum medicamentorum susceptioni & applicationi. V.g. Tela recens anodynis nephriticis suscipiendis familiaris est.

N. 2. Huc oleum dictum è chartis combustis, videlicet charta accenditur, imponiturque lamina stannea ut comburatur.

buratur. Sic adhaerescit stanno liquor crassus, colligendus.

Vires. Anodynum est ac consolidatum. Hinc utile in odontalgia, lichenibus, &c.

CXCV. Lotus.

Lotus hortensis, Tab. hortorum odora, Lob. sylvestris, Matth. Cast. fatiua, Cord. in D. & hist. Cam. Trifolium Dioscoridis, Trag. Trifol. odoratum Fuchf. Lon Trifol. odor. alterum seu Lotus fatiua, Dod. German. Siebengezelt, quod septies in die odorem mutare dicatur, tamen Steinklee, Gartenklee.

Seritur in pratis. Floret Iunio, Iulio, Augusto, eiusdem anni quo fata est.

OFFICIN. NAT.

Herba cum floribus & Semen sed raro.

Vires. Calfac. temperate sicca, digerit, absterg. alexipharmaca, anodyna, diuretica ac vulneraria est. Usus precip. in pleuresi, dysuria, Epilepsia uterina, Hydrope incipiente, &c.

Extrinsec. in vutneribus ab inflamm. defendendis & consolidandis, eorum veneno corrigendo (fotu) hemorrhoidibus leniendis balneo vel fotu in oculorum umbeculis (succus instillatus).

PREPAR.

1. ∇. stillat. Ex herba cum floribus.
2. Ol. infus. Fit ex fol. & floribus in ol. comm. maceratis.

Vires. Ad vulnura glutinanda, Herniasque puerorum sonandas, tumoresque molliendos & maturandos plurimum commendatur.

N. Herbarum aridarum interponunt vestimentis ne à tineis rodantur.

CXCVI. Lupulus.

Bpior, Lupulus salictarius, Hopffen. Domesticus. Hic praefertur. Sylvestris.

Dicitur Lupulus, Brunf. Matth. Dod. Clus. hist. Tab. Lupulus fatiua, Trag. Lon. Cast. (mas) Cam. in Matth. Lupus salictarius, Fuchf. Lob. Lupulus mas, C. B. 1.

Floret Augusto: Solo gaudet pingui OFFICIN. NAT.

Flores & Iuli. Martio mense prorumpentes.

Vires. Flores calf. & sicca. 2. amari saporis, anodynique sunt, discutium. Usus precip. in obstructione Lienis ac Epatis & inde in Ictero, in hypochondriacis affectibus, &c. ciet menses & urinam. Extrinsecus sedat dolores, auxiliatur contusionibus, luxationibus, tumoribus.

Iuli (turiones, asparagi) mundificant sanguinem, adeoque à scabie praeservant (in acetariis assumpti.)

N. Nimius eius usus grauat caput: PREPARATA.

1. ∇ è flor.
2. Syrupus de lupulo. Ex succi turionum ante enata folia expressi, ℥ iij. succ. fumar. ℔ ij. cum saccharo.

M.

Macis & macer, vide Moschata.

CXCVII. Maiorana.

Αυδρακος, Σειμ. Λυγι, Maioran, Meseran, Masoron, Meyran.

peregrina. Vide Marum. Maiorana { latifolia vulgaris. } { fatiua { tenuifolia minor. } } { sylvestris.

Ex

Ex his vsualis est satiuā vtraque, è quibus tamen latifolia præfertur, C. B. 5. quam nostrates rubram vocant, eò, quod caulis nonnihil ad rubedinem inclinet.

Vocatur Maiorana, *Brunfels. Dod. Amaracus, Matth. Fuchs. Sampfuchus* siue Amaracus, Latinis Maiorana, *Cord. in D. hist. Amaracus vulgatiore, Lob. ico. maior, Cast. Sampfuchus, Lob. Maiorana vulgo, Maron. Diosc. Maiorana siue amaracus maior, Tab. Ger. Amaracus syluestris annua, Cam. Maiorana vulgaris, C. B. 5.*

Gaudet solo vmbroso, stercorato humido. Floret Iulio & Augusto.

OFFICIN. NAT.

Folia, Semen,

Vires. *Calf. & sic. initio. est partium tenuium, digerit, attenuat. Vsus præcip. in affectibus capitis ac neruorum, hinc & uteri & ventriculi: ciet menses (in pessario.) Confortat cerebrum, eiusque flatus discutit: errhina est & apoplegmatisans.*

PRÆPAR.

1. ▽. Ex foliis recentibus in MB.

N. *Præstat gemmas cū vino destillare.*

2. *Conserua. Ex foliis seu summit.*

3. *Confect. Sem.*

4. *Ol. stillat. Ex foliis.*

5. *Balsamus. Fit ex oleo destill.*

CXCVIII. Malabathrum.

Malabathrum, Matth. (cui & Folium,) Lob. Tab. Folium Indi seplasiariorum, Trag. Cassia folium, Cord. in D. Tamalapatra, Garz. Clus. Cadegi Indi, i. e. folium Indum, Arabibus, C. B. 1. German. Indianisch Blut.

Dioscorides folia hæc in aquis crescere locis aquisque innatare scribit, uti lens palustris. Garcias ab horto autem esse folia arboris ait, inueniri que copiose in India ac maxime in Cambaia, procul ab aquis. Vtrum ergo folium modernum cum veterum idem sit, est de quo ambigitur.

Eligenda sunt recentia, viridiuscula (non nigra.)

Vires. *Isdem facultatibus pollent, quibus spicanardi, sed fortioribus: urinam potenter mouent.*

CXCIX. Malua.

Malua { Syluestris { folio rotando } huius loci.
 { folio sinuato }
 Hortensis seu arborea. Loci sequentis.

Appellatur Malua, *Brunf. Matth. Cast. Malua vulgarissima, Trag. Malua syluest. pumila, Fuchs. Dod. Malua sylu. repens pumila, Lob. Ger. Malua sylu. supina, Cord. hist. Malua minor, Lon. sylu. minor, Tab. vulgaris minor, Cam. Malua syluest. folio rotundo, C. B. 1. Græc. μαλαίνα, Germ. Pappeln, Russ. pappeln, Hafs pappeln.*

Crescit passim inculta, gaudet solo

pingui ac humido: Floret Maio ac seq.

OFFICIN. NAT.

Folia, Flores, Semen, Radix.

Vires. *Herba (folia & flores) moderate calf. (aliis refrig.) humect. emollit, lenit dolores, laxat aluum, urina acrimoniam mitigat. Vsus præcip. in affectibus pulmonum, Vesicae, Intestini. Vteri. E.g. phthisi, tussi, raucedine, calculo, crosiore vesicae ac intestini. in duritie uteri,*

uteri, febris, &c. Extrinsecus in tinea capitis (dum urina in lixivium cocta) in tumoribus maturandis, doloribusque sedandis (cataplasma) in aluo lenienda, dolore nephritico mitigando (clyster.)

N. Semen & radix isdem pollent viribus, sed usus rarioris sunt. Praferuntur nihilominus in medicamentis intertis.

Radix cocta sursum capitis cadere facit (lotione.)

PREPARATA.

1. ∇ stillat. Ex fol. & flor. Maio collectis.

2. Conseru. flor. Verum rari usus est.

CC. Malua arborea.

Malua rosea folio subrotundo, Malua hortulana, Brunf. hortensis, Trag. Fuchf. Dod. Lon. Ger. Malu. maior, Matth. Malu. arborea, Tab. Malua Romana, Gesn. Malu. maior uncaulis, Matth. Cast. Malu. rosea fruticosa, Lob. Germ. Herbstrosen, Winterrosen, Erdrosen, Gartenpappel, Bavrosen.

Est flore simplici vel pleno, eoque coloris albi, purpurei, incarnati.

Crescit in hortis: Floret in fine aestatis, initioque autumnii.

OFFICIN. NAT.

Flores foli.

Vires. Calf. & hum. minus tamen quam vulgaris malua: substring. usus precip. in consillarum morbis oris putredine (gargar.) in fluxu menstruo. in reliquis, malua vulgari similis est.

CCI. Mandragora.

Μαδραγορῆς. Arab. Iabora. Hebr. Du-daim. Germ. Altraun, herba est baccifera, radicem habens, quæ hominis par-

tes inferiores aliquatenus representant.

Estq; mas vel femina, ille vsualior. Insigniturque Mandragora mas, Trag. Fuchf. Matth. Cord. in D. Lob. Cam. Mandragoras albus seu masculus, Cord. hist. Mandrag. mas vel alba, Cam. Mandragora fructu rotundo, C. B. 1.

OFFICIN. NAT.

Cortex radice, qui ad nos aliunde potissimum ex Italia asportatur.

Vires. Refrig. 3. sicc. 1. emollit mire, Narcoticus est ac saporiferus, rari usus intrinsecus. Extrinsecus usus eius est in oculorum rubore ac dolore, in Erysipelate, in tumoribus duris, struma, &c.

PREPAR.

Ol. Fit ex decoct. cortic. aliorumque narcoticor. succis, atque oleo. Vide Disp.

CCII. Marrubium.

Marrubium { Nigrum Ballote. Hoc minus vsuale.
Album, Hoc officinale est.

Dicitur Marrubium album vulgare, C. B. 1. Marrubium, Matth. Cord. in D. Fuchf. Dod. Cast. vulgare. Clus. hist. Lob. Tab. Ger. Marrubium femina, Brunf. Candidum, Trag. Germ. vveisser Andorn.

Crescit incultum iuxta vias. Floret Iulio.

OFFICIN. NAT.

Folia sola.

Vires. Calf. 2. sicc. 3. aper. absterg. atter. saporis amari. Usus prac. in obstruct. pulmonum Epatis Lienis, Uteri, adeoque in Phthisi, in expuitione sanguinolenta, in partu difficili, lochiisque remoratis. Extrinsecus usus eius rarior est.

XXX N. Vesica

N. Vesica ac renibus censetur noxium, correctum tamen Glyzyrrhiza ac pasfulis nihil nocere dicitur.

P R Æ P A R.

1. ∇ still. Ex integra planta, Iunio ac Iulio collecta.

2. Syrup. de prassio. Fit ex herbis pectoralibus, radic. aperient. emoll. &c. Vide Disp.

3. Spes. Diaprasii. Vid. Disp.

CCIII. Marum.

Planta est exotica, Maioranæ, in facultatibus ac figura similis, adeo ut pro vna eademque herba à nonnullis habeantur. Quamobrem cum maro hisce in regionibus destituatur, Maioranam vel Dictamnium Creticum substituere solemus.

P R Æ P A R A T A.

Pilula Marocostina Mindereri. Vide lib. 2.

CCIV. Matricaria.

Arthemisia tenuifolia, Tab. Fuchf. & nostras, Lob. Parthenium, Matth. Dod. Cord. in D. Cast. Amaracus, Galen. Matricaria parthenij 1. species, Brunf. Matricaria. Trag. Lon. Cam. Ger. Matricaria vulgaris. C. B. 1. Germ. Metram, Methran, Meter, Meterkraut, Mutterkraut, Feberkraut.

Crescit in hortis, floret Iunio Iulio.

O F F I C I N. N A T.

Folia cum floribus.

Vires. Calf. 3. sicc. 2. attenuat, incid. Vfus precip. in affectibus Vteri frigidis ac flatulentis, in obstruct. mensium, in impotentia Veneris, in hydrope (purgat per urinam nonnunquam & per aluum,)

&c. in febris puridis, in calculo renum, in vertigine. Extrinsecus in suffocant. matricis (decoct. cum + varibus applicatum) in mensibus ciendis (pessar.) in duritie mammæ. (catapl.) in æstu febrili mitigando (fricando dorsum) in arthritico dolore sedando, &c.

P R Æ P A R.

1. ∇ still. Fit ex integra herba mens. Maio & Iunio.

2. ⊖ Ex cinere.

3. Syr. de Matricaria. V. D.

4. Oil stillat. raro extat.

CCV. Matrisylua.

Matrisyluæ vocabulum, diuersis plantis attribuitur, Epatica stellate, 2. Caprifolio ac 3. Hormino. Vide suis locis.

CCVI. Melilotus.

Melilotus vera, maior vulgaris, Trag. Lotus Urbana, Matth. Syluestris, Fuchf. ico Tab. officinarum Germaniæ, C. B. 1. Melilotum maius, Brunf. Melilotus, Lon. saxifraga lutea, Fuchf. Loti siue trifolij species, Cord. in D. Melilotus Germanica, Lob. Cam. Ger. Trifolium odoratum, 1. & 2. Dod. Honigklee, Steinklee edler Steinklee.

Gaudet locis saxosis. Floret integra æstate.

O F F I C I N. N A T.

Flores seu integra Herba, Semen.

Vires. Calf. 1. emoll. disc. dolores mitigat. Vfus creberrimi precipue extrinsecus, in tumoribus, doloribus, oculis rubicundis, in clysteribus, & sim.

N. Quoties simpliciter Meliloti sit mentio, semen recipiendum.

1. ∇. Ex herba cum flore still.

2. Emplastrum

2. Emplastrum de Meliloro, V. D.

CCVII. Melissa.

Μελισσόφυλλον, Melissophyllum, Matth. Cast. Tab. Melissophyllum vulgare vel adulterinum, Fuchs. Apiastrum, Matth. Cord. in D. Lob. Citrago. Gesn. Melissa, Brunf. Dod. Ger. Mellilla domestica vel 2. Trag. nostras Cam. hortensis, Lon. & 1. C. B. Germ. Melissen, Ivenblat, Bienenaug, Mutterkraut.

N. Est & Melissa peregrina, qua à loco natali unde asportatur, Turcica, Italica, &c. dicitur, coliturque itidem nonnunquam apud nos in viridariis, sed manus ea est usualis.

Floret Iulio: crescit in hortis.

OFFICIN. NAT.

Vires. Calf. 2. sic. 1. Usus magni est in affectibus cephalicis, sardiis uterinis, hinc & in stomachicis, adeoq; in Melancholia, in somnis turbulentis, Paralyti, Apoplexia, Epilepsia, Vertigine, Lipothymia, cruditate ventriculi, remoratis mensibus ac lochiis puerperarum, suffocationeque uteri, emendat insuper fetorem anhelitus. Extrinsecus in uterinis balneis, cataplas. in ictibus venenatis, apum, vesparum, &c.

N. Recensentur inter herbas cordiales.

PRÆPAR.

1. ∇ still. Ex herba integra in M.
2. Ol. Ex herba sicca, raro extat.
3. Extract. Ex foliis.
4. Conserua. Ex floribus.
5. Syrupus simpl. Ex succ & sacch.?
6. Compos. Fernel. V. Disp. Noriberg.

CCVIII. Melo.

Πέπων, Melo, Brunf. Tab. Trag, Ger. Melo siue melopepo vulgi. Cucumis, Gal. Dod. Melo vulgi seu cucumis antiquorum, Melopepo Dioscoridis, Lob. Melo pepo, Lon. Pepo, Matth. ico, Fuchs. Cast. Pepo, grandis Melo, Cord. hist. Melo vulgaris, C. B. 1. Germ. Melonen, Pfeben.

N. Matthiolus maiores vocat Pepones, minores, melopepones,

Gaudent solo aprico & versus meridiem sito, pingui, æstateque serena. Colligendi sunt ante ortum solis.

OFFICIN. NAT.

Semen excorticatum & non excorticatum.

Vires. Ipse fructus seu pulpa refriger. & hum. nutrimenti est mali, putrescibilis, febribus ac torminibus generandis apti.

N. Minus nocet coctus, potuque vini & pipere correctus.

Semen, est è 4. seminibus frigidis maioribus, aperit ac abstergit, Epaticum est & nephriticum, ea propter confert tussi, phibisi & febribus medetur stranguria, ardorem urina, sitimque sedat, &c. Vide & reliqua semina frigida maiora, cum quibus in omnibus conuenit.

PRÆPARATA.

Melones conditi. Inciduntur melones nondum maturi, secundum longitudinem, maceranturque in +0 dies aliquot (10) hinc effulo + recens affunditur maceranturque denuo. Tandem exempta ac siccata in melle vel saccaro syrupifato sensum coquantur admistis aromatibus pro libitu.

Mintz, in dno C. Muntz, Balsam.

Est { *faciua* { *Acuta* } *huius loci.*
 { *Crispa* }
 { *Sarracenicæ Vide loco sequenti.*
 { *Sylvestris. Mentha caballina, mentastrum; minus officinalis est.*
 { *Aquatica. Vide silymbrium.*
 { *Cattaria. Vide Nepeta.*

Esti mentha utraque tam acuta, quam crispa earundem virium adeoque officinalis utraque sit, præfertur tamen à nonnullis Crispa seu nobilissima, siue verticillatam velis siue spicatum & potissimum cuius caulis ad rubedinem inclinatur, rubra inde vulgo dicta.

Videatur Mentha faciua seu crispa, *Trag. Cord. in D. Mentha faciua altera, Matth. Fuchs. Dod. Crispa, Lon. Cam. siue Balsamita. Mentha rotundifolia altera flore spicato, siue cruciata Mentha, Lob. Mentha faciua minor, Cast. Mentha rotundifolia crispa spicata, C. B. 5. Germ. Krausemintz.*

Mentha angustifolia spicata, C. B. 7. Mentha. Brunf. 1. Matth. Cast. faciua vel hortensis 3. Dod. Fuchs. acuminata, Lon. acuta, Tab. Roman. Lob. cruciata, Ger. odorata angustifolia, Cam. Germ. Spitzmintz.

N. Hec foliis est tum latioribus, tum angustissimis & longissimis.

Colitur in hortis: gaudet locis apricis non pringuis quidem, sed humidis. Floret Julio.

OFFICIN. NAT.

Herba cum floribus.

Vires. Calfac. & sicc. in princ. 3. partium est tenuium, substring. Vfus præcip. in ventriculi imbecillitate, cruditate, singultu, vomitu flatibus, ardore, Epatis obstructione, intestinor. dolore, capitis

vertigine, lactis coagulationem impedit. Extrinsecus corrigit ventriculi imbecillitatem doloresque colicos sopit (cataplas.) duritiem mammarum lactisque coagulationem, capitis achoros sanat, &c.

N. Mentha aquatica easdem cum faciua vires habet, adeoque in defectu substitui poterit.

PRÆPAR.

1. ∇ *stillat. Ex herba.*

N. Mulierculis vtilissima est, ad tormina ventris in infantibus compescenda.

2. *Syrup. de mentha minor. Ex succis menthæ granatorumque añ. Vide Dispens.*

3. *Syrup. de mentha maior. V D.*

4. *Conserua. Dx foliis.*

5. *Oleum stillat.*

6. *Oleum infus. Ex mentha crispa.*

7. *Balsamus. Rarus est.*

8. \ominus *Ex cinere.*

CCX. *Mentha Sarracenicæ.*

Balsamita, Brunf. Mentha Sarracenicæ, Cord. in D. Lon. Cam. Mentha corymbifera maior, Cord. hist. Costus hortorum, Lob. M. Græca, Matth. Cast. Alisma, Trag. M. hortensis Corymbifera, C. B. 1 (& 2.) aliis mentha Romana, Mentha S Mariæ, Germ. Iravenmintz, Marie mintz, Psammkuchenkrant.

Colitur in hortis & cæmeteriis.
Floret

Floret Iunio, Julio.

Officinalis quidem est, sed rarissime, non è re tamen esset, asseruare Folia grati odoris & saporis; vt & Radices.

Vires. *Calf. sicc. aper. artin. discut. absterg. auxiliatur vterinis affectibus, menses ciet, iecur corroborat, peculiari- que vt opij aliarumue venenorum ma- lignitatem retundere statuitur.*

Dosis ad ʒij. præcipue radix.

Extrinfecus adhibetur in balneis ad- ciendos menses, &c.

CCXI. Mercurialis.

Wasskraut, Germ. Bingelkraut, nostra- tibus, VVincergrün.

{ Mas testiculata, }
 { C. B. 1. } *vsurpantur pro-*
 { Fœmina spicata } *miscuè.*
 { C. B. 2. }

Mas insignitur Mercurialis, *Trag. Brunf. M. mas, Matth. Fuchf. Dod. Lob. Cast. Tab. Ger. Cam. Mercurialis mascu- la, Cord. Phyllon arthenogonon The- ophr. Cord. in D. Mercurialis testicu- lata siue mas, Diosc. C. B. 1.*

Fœmina dicitur: Mercurialis vul- garis & 1. *Trag. M. fœmina, Matth. Fuchf. Dod. Lob. Cast. Tab. Ger. M. spicata seu fœmina, C. B. 2.*

Nascitur in campestribus cultis, vinetisque. Floret per integram æsta- tem.

N. Est & mercurialis sylvestris seu montana, sed minus vsualis.

OFFICIN. NAT.

Folia.

Vires. Mercurialis *calf. & sicc. 1. ab- sterg. aluum mouet (bilem ac ʒas pur- gat.) Extrinfecus vulua adhibita men- ses & secundinas trahit, tumores emol- lit, creberrimi vsus est in clysteribus.*

N. Sunt è nostratibus mulierculis, qui Mercurialem infantulis cum pappo ex- hibent, vt aluum solutam retineant, tor- minaque præcaueant.

PRÆPARAT.

1. ʒ stillat. Ex herba florescente.
2. Syrup. de succo Mercurialis, & saccharo ʒ. Vide Disp.
3. Mel. Mercuriale. Ex succo & mell ʒ. Vide Disp.

N. Adhibentur potissimum in clyste- ribus.

CCXII. Mespilus.

Meißel, Mespilus, Brunf. Trag. Lon. Lob. Dod. Mespilus altera, Matth. Mespeli altera species sponte proue- niens, Cord. in D. Mespilus vulgaris, Clus. hist. Cam. Epit. Mespilus vulgaris Germanica folio laurino non serrato, C. B. 1. siue Mespilus syluest. Germ. Nespelbaum, Mespelbaum.

Crescit in hortis. Floret Iunio, Fru- ctus fert Octobri.

OFFICIN. NAT.

Fructus (*μεισπύλα*) Officula, Folia.

Vires. Fructus. (*meßpila*.) Refrig. sicc. saporis sunt austeri, astringunt, consti- pant valide, ventriculo noxia sunt. præ- cipue dum duriuscula adhuc extiterint, emollita enim astringunt lenius, nocent- que minus, ac facile putrescunt. Vsu esse possunt in diarrhaea, dysenteria, Extrinfecus in vomitu, fluxuque alui sistendo (cataplas. impositi.)

Officula (lapilli, acini) commendan- tur summopere ad calculum atteren- dum & expellendum.

Folia, similem vim cum fructibus obtinent, adeoque & iisdem induratio- nibus inserviunt. Et præcipue in garga- rismis, Balneis vterinis.

XXX 3 PRÆPAR.

P R A E P A R.

Condit. fructus: cum melle.

CCXIII. Meum.

M^v, Officin. Meum indeclinabiliter. Meum, Matth. Tab. Cam. Ger. Cast. Dod. Daucus, Cast. Tordylium, Cord. in D. Meum vulgare tenuifolium, Clus. hist. Daucus Creticus, Trag. Fuchf. Sefeli Creticum, Fuchf. Meum foliis anethi, C. B. 1. Beerwurtz, Bavwurtz, vilder Dill, Bärendill, Bärenfenchel, Mutierwurtz, Hertzwurtz.

Crescit copiose in sylva hercinia, aliisque locis montanis, vt & in montibus campestribus & apricis: apud nos non nisi in hortis cultum inuenitur. Floret Iunio ac Iulio.

OFFICIN. NAT.

Radix.

Vires. Calf. 3. succ. 2. atten. aper. flatus discutit, vsus præcip. in inflatione ac ructu ventriculi, in mensibus ac vrina ciendis, in vteri suffocat. in torminibus ventris, in catarrhis tartaroque Pulmonum expectorando. Extrinsecus in balneis, cataplasmatibus, &c.

P R A E P A R.

Multas ingreditur compositiones, vt & ipsam Theriacam.

CCXIV. Milium.

κλϋξϙ, Milium, Brunfels. Trag. Matth. Fuchf. Dod. Cord. in D. Lon. Lob. Cast. Tab. Milium aureum & album, Cam. Milium semine luteo vel albo, C. B. 1. Hirs, Hirschen.

Gaudet solo arenoso humido. Floret Augusto.

OFFICIN. NAT.

Semen ac Farina seminis

Vires. Refrig & sicc. 3. aluum constipat, est difficilis digestionis, plurimi tamen ac laudabilis nutrimenti. Decoctum sudorem ac urinam potenter mouet. Extrinsecus exiccat catarrhos, dolores capitis & ventris sedat (costum cum ☉ calidè vertici vel ventri impositum) consumit lac, pellit calculum renum (in baln.) Diarrhæam infantum sistit (cataplas.) cum decocto sumach.

P R A E P A R.

1. ∇ stillar. Ex herba florescente. Insigne præseruatium censetur in calculo.

2. Decoctum D. Ambrosit. ꝛ. Milij lbj. coq. in ∇ lbij. ad crepaturam, coletur.

Vires. Magnarum virium censetur in febribus, imprimis tertiana, si in declinatione paroxysmi exhibetur ad sudorem eliciendum.

N. Aliis vinum adhibuisse placet.

CCXV. Milium solis.

Λδδδϙϙϙ, Lithospermum, Brunf. Fuchf. Cord. in D. Lon. Lithospermum minus, Matth. Dod. Lob. Cast. Ger. Vulgare minus Cam. Lithospermum legitimum. Clus. saxifraga tertia, Brunf. Milium solis satium, Trag. Fuchf. Lithosper. aruense, Tab. maius erectum, C. B. 3. minus, Matth. Germ. Meerbirse, Steinsamen.

Crescit in hortis, inter fruges incultum. Floret Maio.

OFFICIN. NAT.

Semin. raro Folia.

Vires. Calf. & sicc. 2. calculum insigniter comminuit ac expellit, Renes abstergit, urinas ciet, partum pellit.

Dosis sem. ʒj. ad ʒij.

N. Sunt qui pro certo experimento iactant,

iafficiant, in febrī quotidiana ante inuasionem semen exhibere, idque vicibus iteratis.

PRÆPARATA.

▽ stillat. è foliis.

CCXVI. Millefolium.

Στρατιώτης ἢ ἰατρικόν, ἢ Stratiotes millefolia, Fuchf. Cast. millefolium terrestre maius, Tab. Cord. millefolium album, Brunf. millefol. vulgare, Trag. Achillea, Lon. dod. millefolium, Cam. millefol. stratiotes, Cord. in D. millefol. album, C. B. 2. German. Garbe, Tausenblat, Garbenkraut, Schaffgarbe, Schaffripp.

Crescit passim locis aridis iuxta vias in cæmeteriis, &c. Floret Iunio.

OFFICINALIA NATIVA

Folia cum floribus.

Vires. Exiccat, astringit cum temperato calore ac amarore: hinc medetur vulneribus, tumoribus ac inflammationibus sine repulsione. Vsu itaque interno conuenit, in hemorrhagiis ac fluxionibus omnis generis, narium, uteri, alui, vulnerum, scrotu sanguinolento, vomitu, vrina retenta, calculo, mictione sanguinolenta gonorrhœa, hemorrhoidibus, fluore uterino, mariscis, cruore, vulneribus. Extrinsicis adhibetur feliciter cephalalgia, pterigio oculorum, hemorrhagia narium, vulnerum, odontalgia (massificando vel Emplastrando) mensibus superfl. fluori albo, diarrhœa, vulneribus consolidandis, tumoribus hemorrhoid. Hernia, icthibus venenatis, contracturis, tumori penis,

N. 1. Sunt, qui herbam cum floribus in peste præseruanda & curanda, pro secreto peculiari venditant.

N. 2. Herba recens narium indita

hemorrhagiam causatur.

PRÆPARATA.

▽. Ex herba cum floribus.

N. Medetur putredini ginginarum quam optime.

CCXVII. Morordica.

Balsamina, Matth. Fuchf. Balsamina cucumerina punicea, Lob. Tab. Mas, Cam. Ger. Pomum mirabile, Trag. Pomum Hierosolymitanum, Balsamina rotundifolia repens seu mas, C. B. 1. Germ. Balsamapffel.

Colitur apud nos in hortis.

OFFICIN. NAT.

Folia & Fructus (Poma dicti.)

Vires. Refrig. parumque siccatur, vulneraria est, dolores ac præsertim hemorrhoidum mitigat. Extrinsicis sanctis confert neruis, hernia, ambustis, &c.

PRÆPARATA.

Oleum. Fit ex infusione & decoctione fructus (exempto semine) in oleo amygd. dulcium.

CCXVIII. Morus.

alba, album ferens fructum.
Morus Maul. } nigra, celsa; nigrum ferens fructum. Hac præfertur.
beerbaum.

Dicitur Morus, Trag. Matth. Fuchf. Dod. Lon. Tab. Ger. vulgaris. Cam. Morus nigra, Cord. in D. Cast. Morus celsa officinis, Lob. Morus fructu nigro, C. B. 1.

Maturescit fructus Augusto.

OFFICIN. NAT.

Cortex (præcipue radice,) Folia & Fructus exiccatu sed raro.

Vires. Cortex radice calf. & sic. amari

amari saporis est, absterg. adstring.
Epar ac Lienem aperit, aluum laxat,
tineas latas enecat.

Fructus nigri immaturi (mora im-
matura) refriger. & sicc. 3. valide astring.
Vfus precip. in omnibus fluxibus. E. g.
diarrhæa, dysenteria, fluxu menstruo,
expuitione sanguinis. Extrinsecus in
fauicium ac oris inflammationibus, ulce-
ribusque.

Mora matura, refriger. & sicc. parum
(aliis humect.) solum aluum (initio pa-
stus) sitim sedant, appetitum excitant.

N. Nutrimenti sunt pauci & putre-
scibilis.

Folia vel sola vel cum cortice cocta
odontalgiam sedant (gargar.)

P R A P A R.

1. ∇ stillat. Ex moris immaturis.
N. Raro prostat.
2. Rob. Diamoron simpl. Ex succ. &
mell. Vide Disp.
3. Diamoron Compos. Fit vt simpl.
addendo myrrh. croc. omphac. Vid.
Dispens.
4. Diamoron Nicolai Ex succo moror.
Celsi $\text{℥}\text{ss}$. mororum rubi $\text{℥}\text{j}$. mell.
 $\text{℥}\text{ij}$. sapæ $\text{ʒ}\text{ij}$. V.D.
- N. Hoc vfitatissimum est.
5. Diamoron Cordi. Ex succo moror.
Rubi, Rubi Idæi, Celsi, fragor. & melle.
V.D.
- N. Mororum succi ex immaturis
moris exprimendi sunt.

CCXIX. Moschata, Macis.

Nux moschata & muscara, Lon.
Lob. Fragos. Cord. Tab. Acof. Nux Aro-
matica, moschocaryon, moschocary-
dion, Nux myrista seu vnguentaria,
Marth. Cast. N. myristica, Clus. exot.
Nucista, Nux moscata fructu rotundo,

C. B. I. Germ. Muscatnus.

N. Clusius duplices statuit minores
(fæminas) maiores seu oblongas (mares.)

Crescit in Insula Banda Indiæ oc-
cidentalis.

Duplici cortice vestita est: altero
exteriori & crassissimo, per maturitatem
dehiscente, vt in iuglandibus; altero te-
nuiore, necleum proxime instar reticuli
ambiente, eoque primum coloris rube-
scentis, postmodum flauescens, & hæc
officinatum Macis est. Germ. Mus-
batliiht.

N. 1. Macer veterum est ligni cuius-
dam cortex lignosus, crassus, rubescens,
ex Barbaria afferri solitus, gustu valde
amarus & astringens, adeoque differt à
maci, quanquam interdum modernis
confundantur.

N. 2. Est & genus Maceris Insul.
Oriental. quod forsan idem cum vete-
rum. Vid. Christ. Acof. c. 12.

OFFICIN. NAT.

Nux ac Macis.

Eligenda Nux recens, grauis, pin-
guis & quæ acu puncta, succum oleo-
sum emittit.

Macis, probatur odore suauis, sapore
subacri, colore flauo.

Vires. Nux calf. & sicc. subastr. est
stomachica, cephalica, vterina, discutit
flatus, coctionem inuat, halitum foetidum
oris emendat, fatum recreat, lipothymia
ac palpitacioni cordis succurrit, Lienem
minuit, alui fluores compefcit, vomitum
sistit.

Maci eadem vires adscribuntur, quia
tamen partium tenuiorum existit, ideo
& operando efficacior & magis pene-
trans habetur.

P R A P A R A T A.

1. Condit Nucist. Condiuntur nu-
cistæ virides, integræ vt iuglandes,
conditæque,

conditaque, ad nos transportantur.

Condiuntur sine inuolucris.

N. Possunt & apud nos condiri. videlicet. 2. Nucistas quoad fieri potest recentissimas, macera in lixio forti, dies (9. 10) ut mollescant: dein abra de extremam cuticulam, lauaque donec lixiuo penitus exuta sint: hinc sicca ac cum saccharo syrupisato condito.

2. Confectio Macis.

N. Confiuntur ut Nucista, sed rarissimè.

3. Nucista. Parari potest ut Cynamomi. Vide lib. 2.

4. Oleum Nucista still. extillat vna cum ∇. Prodest in cardialgia, & sim.

Dosis gr. iij. iiij.

5. Ol. Nucista expressum. Exprimatur ex nucibus recentibus contulis & in sartagine feruefactis l. communi.

Vires. Prodest in torminibus ventris ac nephriticis (in liquore calido exhibitum. (Extrinfecus conciliat blande somnum (temporibus illitum) tormina infantum sedat (umbilico inunctum.)

N. Ex oleo expresso paratur corpus balsamorum.

6. Nucista. Ex remanentia incinerata elixiuatur.

7. Ol. Macis stillat. Eodem paratur modo.

Dosis gr. iij. iiij.

8. Ol. Macis expressum. Exprimatur itidem ut dixi.

9. Extract. 2. Ol. Nucist. express. q. v. extrahe secundum artem digerendo cum ∇ rectificatissimo: decanta, filtra & abstrah ad consistentiam olei.

Vires. Præter utilitates alias, Balsamo nucista conficiendo inseruit.

N. Album corpus post extractionem residuum, aliquoties ∇ calida abluatur, serueturque pro corpore Balsamorum.

quod præstat tamen, si extractio cum ∇ sato peracta fuerit.

10. Balsamus Macis. Fit ex oleo expresso additis guttulis aliquot destillati olei.

11. Balsamus Nucista. Fit similiter

CCXX. Muscus.

Sp̄er, Arab. Vinea, Moos.

Muscus { Arboreus. De quo hic.
Terrestris. De hoc sequenti loco.
Saxatilis. Vide Lichen.
Marinus. Vide coralline.

Muscus qui arboribus accrescit, figuræ ratione potissimum triplicis est fortis, i. capillaceus, i.e. habens formam capillorum, adnasciturque caudici, (C. B. 1. seu vsitatus officinarum.) 2. Fœniculeus, i.e. fœniculi folia æmulans, (C. B. 3. seu muscus arboreus cum orbiculis, Tab.) Muscus ramosus floridus & non floridus. Adnascitur ramis. 3. Crustaceus, habens formam crustarum, (C. B. 7. seu muscus pulmonarius, Tab. pulmonaria.) Vide pulmonariam arboream.

Ex his huius loci sunt priores, quorum vsualior primus, adeoque vinea officinar. dictus. Hic tùm tenuior est, tùm crassior: alias breuior aut prolixior: omnes candescentes, pauci rutilantes, quandoque nigri, Primæ nobilitatis sunt muscus lariceus, piceus, pineus & abietinus. Hinc populeus, sed candidus (nigricans enim improbatur) utilissimus omnium est quernus.

Videatur Muscus arboreus, Trag. Marth. Dod. Cast. Muscus. Cord. in D. Musc. arborum, Ion. Tab. Musc. quernus, Lob. Ger. Muscus arboreus: Vinea officinar. C. B. 1. inter species musci

YYy

musci arborei.

Colligendus est initio veris.

Vires. *Muscus* omnis astring. *Vsus* precip. in *ltero*, vomitu, diarrhaea, dysenteria, abortu præcauendo. *Extrinsicus* in laxitate gingivar. in sanguinis fluxu compescendo.

N. 1. Quia signaturam capillor. habet, ideo & capillis muscum dicatum esse volunt.

N. 2. Huius loci est muscus *Cranio adnatus*, quem peculiari vi commendant in vulnereum hemorrhagia & consolidatione, adeoque *Vnguentum magneticum* ingreditur. *Præstantissimum* itidem medicamentum exhibet in dysenteria, & simil. *Surrogari* autem eidem potest muscus aliis ossibus adnascens.

CCXXI. *Muscus terrestris.*

Musci terrestris variae itidem dantur species, è quibus in officinas solum venit, quæ repens vocatur, C. B. 10. seu muscus terrestris clauatus, muscus terrestr. *Trag. Matth. Dod. Cast. Lycopodium, pes Lupi, Tab. Pes Leoninus, Lob. Ger. Cui* tamen affinis est muscus terrestris ramosus, C. B. 2. muscus terrestris, *Tab. Germ. Berlapp, S. Iohannis Gürtel, Gürtelkraut, Neunheil, Teuffelsklavv, Lævenfusz.*

Crescit in syluis desertis ac myricetis. Floret Iunio.

OFFICIN. NAT.

Muscus, Flos citrinus & Farina.

Vires. *Refrig. & sicc. Vsus* precip. in calculo atterendo ac expellendo (laudatur summopere flos eius citrinus) in fluxu alui. *Extrinsicus* in laxitate dentium, in consolidatione & siccatione vulnorum (farina excussa, inspersa)

CCXXII. *Myrtillus.*

Myrtillus, Matth. Lon. Cast. Myrtill. vulgaris baccis nigris, *Clus. hist. vitis idæa, Tab. vitis idæa nigra, Cam. Myrtillus Germanica, vaccinia nigra, C. B. 1. seu vitis idæa foliis oblongis crenatis fructu nigricante. German. Heidelbeer.*

OFFICIN. NAT.

Bacca, Vaccinia seu Myrtilli Germanici.)

Vires. *Refrig. 2. sicc. & subastring. sedant sitim. Vsus* rari sunt, adhiberi tamē possunt in febribus, vomitu ac diarrhaea. *Alij* exiccant, inque dysenteria utiliter propinant.

CCXXIII. *Myrtus.*

Mupion & mupim, Myrtus & murtus. Germ. Myrtenbaum.

E variis myrtorū generibus usualior est *Myrtus, Tab. M. minor, Lob. & Tarantina, Clus. hist. M. Tarantina, Matth. Cast. Cam. M. minor vulgaris, C. B. 9.*

Huic substitui poterit *Myrtus foliis minimis & mucronatis, C. B. 8. M. prior, Do angustifolia 9, Lob. M. domestica fructu albo, Clus. hist.*

Crescit in regionibus calidis Italia ac Gallia Narbonensi iuxta ripas maris.

OFFICIN. NAT.

Folia, Bacca (Myrtilli officinarum) myrta.

Vires. *Vivaeque refrigerant temperatè, sicc. valide, astringuntque. Vsus* internus rarior est, nihilominus tamen adhibetur in fluxu alui ac expuitione sanguinis. *Extrinsicus vsus* utriusque crebrior.

Folia emendant fetorem sub axillis ac sanguinibus (pulvis aspersus: sudorem corporis immod. cum sistunt (frictio:)

membris

membris catarrhosis opitulatur, alui fluxui succurrunt, defensionum exhibent in herpetibus, putredinem oris sanant, hemorrhagiam narium sistunt, polypo medentur (cum melle ac vino.)

Baccæ mitigant oculorum inflammationes, iuuant luxatos articulos ac ossa fracta, subueniunt proci dentia vteri ac ani, capitis rineas, furfuraceaque excrementa abigunt.

PRÆPAR.

1. Syr. myrtillor. seu myrtinus. V. D.
2. Ol. myrtillor. Ex fol. myrti & ol. communi infusis.
3. Ol. myrtinum. Ex fol. myrti & ol. communi.

N.

CCXXXIV. *Napus.*

Bunias } sativa vsualis.
 } syluestris.

Vid. *Napus*, *Brunf.* *Matth.* *Dod.* *Cord.* in *D.* *Cast.* *Cam.* *Lon.* *Rapum* satiuū alterum, & *Napus* veterum, *Trag.* *Napus* *Bunias* satiuus, *Fuchs.* *Bunias* seu *napus*, *Lob.* *Napus* sativa, *C. B. 1.* *Germ.* *Steckrüben.*

N. Recensentur *Napi* in genere *Raporum*, quod caule, floribus, semineque *Rapa* emulentur, quanquam folio & radice *Raphanos* magis referant. Est autem genus plantar. satinar. notissimum, quod colunt non modo ob radicem vsu esculentum, sed & ob seminis oleum expressum, quo cum ferula impingunt, tum lampades instaurant.

Floret à vere in æstatem.

OFFICIN. NAT.

Semen.

Vires. *Cal.* sic. absterg. aper. digerit, atten. & incidit, venenis potenter resistit, (vndo & *Theriacam Androm.* in-

greditur) morbillos ac variolas peculiari facultate a centro ad circumferentiam corporis pellit, ideoque in febribus malignis & perichialibus crebri vsus est, (in emulsionibus.) Confert & in Ictero, vrina remouea, &c.

Dosis ʒj.

PRÆPAR.

Oleum expressum ad omnia vtiliad quæ semen. Vlitatum est plebeis, ad compescenda tormina ventris infantibus exhibere.

CCXXXV. *Nasturtium Aquaticum.*

Kardamin. *Nasturtium aquaticum* (& 2.) *Trag.* *Lon.* *Dod.* *Cressa*, *Lauca* odoratum, *Cord.* *Sylimbriem* *cardamine*, *Fuchs.* *Sylimbrium aquaticum* primum, *Tab.* *Sylimbriur* alterum, *Card.* in *D.* *Sion* *Cratææ*, *Sylimbr.* 2. *Diosc.* *Sion* *Cratææ* *Erucæ* folium, *Lob.* *Sium* maius, *Ger.* *Sifymbriū* *aquaticum*, *Matth.* *Cast.* *Nasturtium aquaticum*, *supinum*, *C. B. 1.* *German.* *Brunnenkress.*

Crescit in riuiis vel paludibus. Floret Iulio & Augusto. Viret perpetuo, adeoque hyemali tempore acertaria exhibet non vituperanda.

OFFICIN. NAT.

Folia seu herba cum floribus.

Vires. *Cal.* sic. & sic. 2. (exiccatum 3.) atten. aper. Vsus precip. in calculo ac sabulo, obstructione Lienis ac Epatis mensiumque, specificè in Scorbuto commendatur.

N. Præstat recens adhibuisse quam exiccatum, ob ⊖ volatile paulatim euanesceus.

PRÆPAR.

Sucus inspissatus.

Y Y y 2 N. Curs

N. Cum aceto naribus illitus, arce-
immoderatas vigilias. Polypum extir-
pat. succus naribus inditus.

2. ∇ stillar. Ex planta integra col-
lecta Augusto.

3. Spiritus. Ex herba contusa addito
cancillo fermenti, fermentata.

CCXXVI. Nasturtium hor-
tense.

Herba. } Latifolium.
Crispum vulgatum. Vsi-
tius.

Nasturtium, Brunf. Matth. Cast.
Tab. Nasturtium hortense, Trag. Fuchf.
Lob. Dod. Ger. Nasturtium hortense
vulgatum, C. B. 2. Gartenkress.

Colitur in hortis.

Seritur vere: floret æstate.

OFFICIN. NAT.

Vires, Semen & herba sicca calf. &
sicc. 4. (Herba viridis, mitior est) utrum-
que attenuat, aperit, abstergit. Vsius prac,
est in tumido Leone, mensibus obstructis
fœtuque mortuo expellendo, & ream mu-
cilaginem Pulmonum incidit; Scorbuto
confert, Vulgo iidem ad expellendos
morbillos inseruit semen. Extrinsecus
vsuvsnit in apoplegmatis, errhinis,
phœnigmis, furfures ac scabiem fœdam
capitis aliarumque partium sanat (tri-
tum aut frixum, cumque porci axungia
illitum.)

N. Nasturtium pratense (quem flo-
rem cuculi appellant alibi Iberim, Lepi-
diumve minus,) ut & Nasturtium mon-
tanum seu alpinum nec non & nastur-
tium hybernum (eruca lutea vel barba-
rea dicta) officinis incognita sunt.

CCXXVII. Nepeta.

Mentha felina, Tab. Ger. Cattaria,

Dod. Lob. Mentha non odorifera, Ne-
peta vulgaris, Trag. Nepeta fruticosa,
Cord. in D. herba gattaria, Matt. Cast.
Calaminthæ 1. genus, Fuchf. Nepeta
Germanica, Cam. Calamintha monta-
na, Lon. Mentha cartaria vulgaris &
maior, C. B. 1. Germ. Katzenkaut, Ra-
tzennept.

Crescit vt plurimum in hortis, tum
quoque iuxta vias: Floret Iunio, Julio,
Augusto.

OFFICIN. NAT.

Herba.

Vires, Calf. & sicc. 3. partium est te-
nuum, attenuat, aper. Vsius pracip. in
morbis vterinis (scil. obstruct.) sterilita-
te, fœtu pellendo, tum quoque in
pulmonum incidendo, &c. Extrinsecus
in balneis pro vtero.

N. Ob grauem odorem raro intrin-
secus exhibetur.

CCXXVIII. Lignum Ne-
phriticum.

Est ligni genus crassum & enode,
aquam infusione cæruleam reddens.
Germ. dici potest Grünfholz.

Videatur Lignum nephriticum seu
Lignum ad Renum affectiones & vri-
næ incommoda, Monard. Lignum ex
nouo mundo pyro simile, Fragos. Li-
gnum peregrinum aquam cæruleam
reddens, C. B. 4. Inter genera Fraxini.

Afferitur ex noua Hispania.

Vires, Calf. & sicc. gr. i. Vsius eius
receptus est ad Renum vitia, vrinæque
difficultates & incommoda. Hinc in
Epate & Lienis obstructionibus.

PRÆPAR.

Infusio, quæ in ∇ fontan. facta, non-
nullis potus est sat expetitus, tum ra-
tione saporis, quem ferè nullum exhibet

bet, tūm quoque coloris cærulei, adeoque amicabile. Potest illā dilui vinum.

N. Adulteratur alioligno simili, quod v̄m croceo colore inficit. Monard.

CCXXIX. Nicotiana.

Tabacum, Tobacum, Tabacca, Tubac, Petum. Herba sanctæ Crucis, sana sancta, Torna bona. *Indiansch. Beinwelle, Indiansch. Wundkraut, heilig Wundkraut, Toback.*

N. Ante annos aliquot ex America primum adferri capit, unde postmodum in nostris hortis colitur & copiose ab Hispaniis, qui officinas nostratas suo Tabaco sufficienter instrunt: Hinc tamen Indicum præferendum censemus ex Indica Occid. Insula virginica Florida seu patria genuina ad nos allatum.

latifolia seu femina,
 Est } Maior { C. B. 1.
 { angustifolia mas, C. B. 2.
 Minor, C. B. 3.
 Minima, C. B. 4.

1. Videatur. Nicotiana, Lon. Maior, Tab. Tabacum (ab eius nominis Insula,) Monard. Fragos. Tabac. latifol. Cam. Petum, Clus. ad Monard. Hyoscyamus Peruvianus, Dod. Cam. Epit. Sana sancta Indorum, Lob. Ger.

2. Tabacum seu herba sancta minor, Lob. Tab. angustifol. Cam. Petum angustifol. Clus. ad Monard. Hyoscyamus Peruvianus alter, Dod.

3. Petum 4. Clus. ad Monard. Hyoscyam. niger vel 3. Matth. Cast. Hyoscyamus luteus, Dod. Ion. Cam. Ger. Hyosc. Peruvianus, Tab.

4. Tabacum minimum, Cam. Tabac. seu sana sancta minima, Lob. Petum 3. Clus. ad Monard.

N. Nicotiana dicitur à Nicotio, Re-

gis Gallia Legato, qui herbam eam Vlissipona Zeelandia accepit & Florida allatam, postmodumque Gallis innotescere fecit.

Gaudet solo pingui ac lato, area plana, opaca, aqua mirè delectatur, frigoris impatientissima est. Seritur felicissime tempore verno, in principio April. (crescente, colligitur herba ☉ in 8. 15. gr. 18. 19. 20 ☾ decrecente, Semen ☿ rio & ♃ est dicatum.

OFFICIN. NAT.

Folia seu herba & Semen.

Vires. Herba recens calf. & sicc. 2. siccata 3. (aliis calf. 1. sicc. 2. aliis refriger.) abstergit, incidit, resoluit, aliquantulum astringit, resistit puritati. Sternutatoria est, apoplegmatica, anodyna, vulneraria, vomitoria. &c. V̄sus præcipue externi ad catarrhos cerebri exiccados, somnum inducendum, lassitudinem ex labore discutiendam, uteri strangulatum compescendum: à peste præseruat (in suffitu) sedat dentium dolores, discutit tumorem vula (ingargar.) medetur lichenibus, phthiriasi, porriginis, achoribus ac fauo, mundificat ac consolidat vulnera ac ulcera in veterata, sanat ambusta quoquomodo adhibita, (balneatione scil. vel sola impositione foliorum recentium nostratis Nicotiana, &c.) Nec tamen prorsus usum quoque subterfugit internum, dum pro vomitorio exhibetur (sat violento) qua ratione curat febres similesque morbos, sed cautione hinc opus est.

N. 1. Non adeo proficuum Tabaci v̄sus est inuenibus ac biliosis.

N. 2. Noui qui mictionem nocturnam vespertino Tabaci suffitu præcauebat.

PRÆPARAT.

1. ∇ Ex foliis.
2. Syrupus de Nicotiana.

Vires. Et aquam & syrupum cum
 Y Y y 3 successu

successu exhibent in asthma, pulmo-
numque ☐ ro, quin & in febris.

3. Ol. peti stillat.

4. per infusionem.

5. Sal. Ex cinere.

6. Unguentum de Nicotiana. Vid.
Disp. August.

N. Parari itidem potest ex solis fo-
liis recenter contusis, seu si manus ex
succo ac pinguedine.

7. Balsamum. Vide lib. 1.

N. Sunt qui folia minutissime incisa
(zerhackt) in vitro optime clauso dies
40. sepori, (e.g. fimi vel acerui formi-
carum) exponunt, atque hac ratione
Balsamum acquirunt. V. Vittich.

Peculiarem Tabacologiam conscrip-
sit Ioannes Neander, Medicus olim
Bremanus, & inde Alstedius in sua
Encyclopæd. Satis itidem prolixus in
descriptione Tabaci est Nicol. Monard.
in simpl. medic. hist. c. 14.

CCXXX. Nigella.

Med. d. S. Gith. melaspermum, Cuminum nigrum. Germ. schwarzer Co-
riander, schwarzer Kummich, Römischer Coriander, Nardenkraut.

Est	{	Aruensis corn uta, Raden.	}	flore carul.	{	maiore	{	simplici
		Hortensis satiu.				minore	{	pleno.
						Cretica.	flore candido	{
pleno.								

Ex his Nigella aruensis officinas
subit, & ex his præcipue flore candi-
do minore simplici, C. B. 5. Melan-
thium sativum, Matth. Dod. Cast. Tab.
1. Melanth. 1. Fuch. sco. Mel. seu Ni-
gella Romana odora, Lob. Melan-
rium, Ger. Mel. Damascenum, Cam.
Huic tamen & reliquæ surrogari non
nequeunt.

Non nisi Studiose culta nobis cre-
scit, gaudetque solo pingui. Floret
Iunio ac Iulio.

OFFICIN. NAT.

Semen solum.

Vires. Calf. & sicc. in princ. gr. 3. at-
ten. aper. V. sus præcip. in mucilage pul-
monum resoluenda & expectoranda la-
ete augendo, vrina ac mensibus ciendis,
morsibus venenatis corrigendis. Specifi-
cè in febris quartanis ac quotidianis.

Extrinfecus crebrius est in cephalia-
gia sedanda, catarrhis exiccandis (ster-
nutando, suffiando.) in cucuphis, Epithe-
mat. & c. applicatum.

Radix sistit proprietate sua hemor-
rhagiam, si dentibus masticetur, nari-
busque imponatur.

PRÆPAR.

1. Semen preparatum. Maceratur in
+ atque exiccatur.

2. ∇. stillat. Ex semine.

3. ∘∘ stillat. Ex semine.

CCXXXI. Nummularia.

Centummorbia, Hirundinaria,
Serpentaria, Egelkraut, Schlangen-
kraut, klein Natterkraut, Pfenning-
kraut.

Est

lidis. Italia, Hispania, &c. Gaudet locis siccis argillofis. Floret Iunio. Fructus decerpuntur mense Nouembri & Decembri.

OFFICIN. NAT.

Folia, Fructus (sed conditi.)

Vires. Folia refriger. & exiccant, astring. Vfus externus & prap. in fluxu alui, mensum, in herpetibus, & sim. Fructus immaturi siccant & astring. inprimis syluestros.

N. Exhibet itidem (tum olea, tum oleaster) lachrymam resinofam, resina Elemi non abfimilem, sed hac in vfu non est.

PRÆPAR.

1. Condit. Oliua. Condiuntur muria antequam plane maturuerint, in Hispania & Gallia Narbonensi: interdum etiam maturæ & nigrae.

Vires. Comesta initio pastus excitant appetitum, mouent aluum, humentem ventriculum exiccant ac confortant.

N. Rancida subuertunt ventriculum.

2. Oleum, (simpliciter ita dictum.) Exprimitur ex oliuis maturis, diciturque oleum (simpliciter,) oleum commune oliuarum, Baumel.

Vires. Calfac. & humectat moderatè. (N. Vetus calidius est recenti) emollit, digerit, vulnerarium est, aluum laxat (cum cereuisia calida assumptum ʒj.) ariditatem pectoris corrigit, tormina Venris mitigat, vrinarios meatus laxat, erosos abstergit & consolidat. Extrinsecus creberrimi vfus est in clysteribus, tumoribus calidis, &c.

N. 1. Cum ∇ tepida assumptum mouet vomitum.

N. 2. In patria mea Westphalia vfitatissimū est vulneratis quotidie exhibere oleum oliuarum cum cereuisia calida, quo adeo largè vruntur, vt quoque

sudor oleum redoleat.

4. Oleum omphacinum. Exprimitur ex oliuis immaturis.

Vires. Refrigerat, siccant, astringit, adeoque multis compositionibus inseruit.

5. Oleum Philosophorum. Fit destillando oleum oliuarum, cum lateribus ignitis mixtum ex Retorta Aug.

Vires. Discutit, maturat, emollit. Prodest tumoribus frigidis duris, &c.

CCXXXIV. Ononis.

Linneus, Dioscor. Dioscor. Theophr. Harvhechel.

Est } Spinosa { purpur. (flor.) Hac
 } } vsualior.
 } } lutea. (flor.)
 } non spinosa { purpur
 } lutea { maior.
 } } minor.
 } luteo variegata.

Videatur Recta bouis, Trag. Lon. Anonis seu Ononis, Matth. Tab. Anonis, Fuchf. Dod. Cast. Ononis, Cord. in D. Lob. Anonis, Ger. Anonis spinosa flore purpureo, C. B. 1.

Crescit in Campestribus, dumetis, aruis, iuxta vias. Floret Iunio & Iulio.

OFFICIN. NAT.

Radix ac potissimum huius Cortex.

Vires. Calf. & sicc. in princ. 3. absterg. atten. discut. Vfus prap. in diuresi, lithiasi, ictero, obstructione Epatis, in carnosorum ramice absumendo. Hemorrhoidibus cacis, mariscisue discutiendis (infusum aliquandiu bibitum.) Extrinsecus in putredine oris ac dolore dentium (gargaris).

N. Antequam spinas protudit conditur cum sale pro cibario.

PRÆPARATA.

∇ stillat. Ex integra planta cum radicibus

radicibus nouellis eruta.

CCXXXV. *Origanum.*

Origanum, Brunf. *Orig.* vulgare, *Trag. Matth. Lon.* *Origanum syluest.* *Dod. Cord. in D. Fuchs. Tab. Cam. Agri-* *origanum seu Onitis maior, Lob. Ori-* *ganum Anglicum Ger. Origanum sylv.* *Cunila Bubala Plinij, C. B. I. Ger-* *man. Dosten, VVolgemuth.*

Crescit in locis Campestribus opa-
cis. Ploret Iunio ac Julio.

OFFICIN. NAT.

Folia cum floribus seu Summitates.

Vires. Calf. & sicc. 3. aper. absterg.
astring. Vfus precip. in obstructione Pul-
monum. Epatis ac uteri & hinc intussi,
asthmate, Ictero, auget lac, ichorosa ex-
crementa per sudorem expellit (ante
balneum assumptum.) Extrinsicus vfu
venit crebriori, eoque in balneis uterinis,
cephalicis, totius corporis (contra scabiē.)

PRÆPARAT.

1. ∇ stillat. Ex integra planta cum
floribus.
2. Oleum stillat. Raro prostat.
3. Sex cinere. Raro itidem paratus.

P.

CCXXXVI. *Palma.*

Palma, *Trag. Matth. Dod. Al-* *pin. Cord. in D. Lob. Cast. Cam.* *Palma* *maior, Tab. Daçtylicum palma elate,* *Matth. Palma elate, Cord. in D. Dod.* *Caryotæ. Carotides, fructus palmæ* *daçtyli, Cast. Palmarum fructus siue* *daçtyli, Lob. Dod. Palma maior, C. B. I.* *Dattelbaum oder Dactelbaum.*

Crescit in Iudæa. Syria, Ægypto,
Africa, & sim. locis calidis.

N. Palmas feminas non siue asper-

sonē pulueris vel florum ē palmis ma-
ribus parere asserit *Alpinus.*

OFFICIN. NAT.

Fructus (officinis.) Daçtyli, Palmu-
læ, Datteln.

Eligendi magni flauī, parum rugosi,
molles, pleni, Carnosi carne sub dura
ad nucleum candicante, ad corticem ru-
bescēte, & qui concussimīnus sonant,
sapore vinoso. Deteriores sunt graciles,
flaccidi, duri & excarnes.

Vires. Daçtylorum maturorum pulpa
calf. subastring. (immaturi astringunt
fortiter.) asperitatem faucium leniunt,
fetum in utero roborant, fluxus ventris
sistunt, vitiis renum ac vesica succur-
runt. Extrinsicus conueniunt in cata-
plasmatis astringentibus, & simil.

N. Concoctu sunt difficiles, capiti do-
lorem inferunt. (in primis exiccati) cras-
sum ac melancholicum humorem gene-
rant.

PRÆPARATA.

1. Species seu Ele-
ctuarium Diaphani-
con. Fernelij.
 2. Diaphanicum
in solido, i.e. Tabellæ
El. diaphanic.
- Horum basis est
Turbith ac dia-
grid. Vid. D. &
Turbith. infra
de purgant.

CCXXXVII. *Papauer sa-* *tiuum.*

Moxar, Papauer (simpliciter,) Arab. *Thaxehax, Magsamen. Oelmagen,* *Oelamen, Mœn.*

{ Album, quod tutius intra corpus ad-
hibetur.

{ Nigrum, quod non equè tutum est,
Videatur prius; *Papauer, Brunf. Lon.*

papauer satium, Matth. Tab. papauer *album, Trigg. Dod. papauer album sa-* *tium, Lob. Cast. Ger. papauer satium.*

ZZZ seming

semine candido, *Fuchs. papauer hortense* semine albo, *C.B. 1.*

Nigrum vltatius inscribitur Papauer nigrum, *Brunf. Cast. Pap. satiuū 2.* vulgo nigrum, *Cord. in D. pap. sat. semine atro, Fuchs. papau. hortense nigro semine, syluest. Dioscoridi, nigrum Plinio, C.B. 2.*

Colitur in hortis. Floret media æstate.

OFFICIN. NAT.

Flores, Semen albi & nigri. Capita cum & sine semine.

Vires. *Refrig. & hum. 3. (ali. 4.)* Vires præcip. in somno conciliando, in affectibus pectoris ac pulmonum & imprimis in tussi, raucedine, phthisi. Hinc & in fluxu alui. Extrinsecus in dolore leniendo, somno introducendo (capite pedibusue adhibitum.)

PRÆPAR.

1. Succus inspissatus. Ex Foliis.

N. De opio ac Meconio, quæ succi sunt papauerum exoticor. Vide sis infra.

2. Extractum. Ex floribus siccis cum
▽ papau.

N. *Quercetanus in Pharm. Rest. c. 25.* parat hoc modo. *z. Capit. papau. q. ʒ.* (cum flores expandere incipit, præstatque papauer quod flores fert rubicundos, contunde ac digere in *MB* cum Hydromelire vinoso, vel Vino Canaria dies (12. 15.) ut liquor intensissime rubescat. Exprime fortiter, ut omnis virtus gummosa & resinosa eliciatur. Abstrahel. ▽ (*VB*) ad remanentiam gummosa & resinosa substantia, quam adhuc calentem si voles effunde in frigidam & subito coagulabitur. Et hoc, ait, est verum probatumque opium ac nullo modo sophisticum (intellige Germanicum,) quod loco opi exotici adhiberi potest, de quo

classe sequenti.

3. Aqua. Ex floribus vel capitibus florentibus.

4. Syrup. simpl. Ex decoct. capit. papau vtr. c. sem. an. & penidio. Vide Dispens.

5. Compos. Fit cum aliis pectoralibus. Vide Dispens.

6. Electuar. 1. *Diacodium simpl.* Ex Decoct. capit. papau albi & mille, (vel saccharo, vel sapa cum Glyzyrrhiza.

2. *Diacodium Montani, seu Syrupus de Siliquis.* Ex decoct. capit. papau. alb. siliquis. Rad. Alche. & Glyzyrrhiza, cum saccharo cando & penidio.

3. *Diacodium Aethuarij.* Hoc ex astringentibus.

4. *Diacodium insolido,* i. e. Rotulæ ex Emulsione & saccharo. Vide Disp.

10. *Loboch.* Vid. Disp.

11. *Oleum.* Ex semine exprimitur.

CCXXXVIII. Papauer Erraticum.

Μαίον πίον, Πόντος, Papauer fluidum. Papauer rubrum. Klapperrose, Rornrose, Ieldmagsamen, Grindmagen.

Fit & maius. Hoc officinarum est. & minus. Inusitatum.

Dicitur papauer Erraticum, *Matth. Cord. in D. Lon. Dod. Cast. Tab.* Papauer Erraticum primum, *Fuchs. Papauer Rhæas, Lon. Ger. Papauer Rhæas* siue flore caduco paniceo, *Lob. ico.* Papauer Erraticum maius, *C.B. 10.* inter spec. papaueris.

Crescit in aruis iuxta vias ac inter segetes. Floret Maio, Iunio.

OFFICIN.

OFFICIN. NAT.

Flores.

Vires. Refrigerat validè, somnum conciliat, dolorem sedat. *Vsus* pracip. in febribus, pleurisi (cui specificè prodest,) angina, aliisque morbis (in primis pectoris) refrigeratione opus habentibus. In inordinato mensium fluore (infus. flor. in *VJ.*) Extrinsecus sunt, qui herba Hepati imposita, hemorrhagiam, narium sistere conantur, quam vim & radici adscribunt.

N. Galenus semen multo frigidius esse ait, quam sem. papaveris sativi, unde & internum eius usum interdicat.

PRÆPAR.

1. *Stillat.* Ex floribus.
2. *Syrup.* Ex infusione florum triplici.
3. *Conserv.* Ex floribus.
4. *Extractum.* Cum propria aqua acuata *Spir. Aris. Quercet. Ph. Rest. cap. 26.*
5. *Acetum.* Ex floribus.

CCXXXIX. Parietaria.

EXEM. Parietaria, Vrceolaris, vitraria, herba muralis, *Tag und Nacht*, *S. Peterskraut*, *Glaszkraut*.

Maior vulgaris. *Hæc officinar.*

Minor *Tragi.*

Dicitur Parietaria, *Brunf. Cord. hist. Dod. Tab. Ger. Parietaria vulgaris & maior, Trag. Helxine, Matth. Fuchf. Lon. Cast. Cam. Helxine altera. Cord. in D. Perdicium Lob. Pariet. officinarum & Dioscoridis. C. B. 1.*

Crescit iuxta sepes, muros ac parietes. Floret Julio.

OFFICIN. NAT.

Folia.

Vires. Refrig. & humect. parum,

emollit, maturat, exterg. subastring. *Vsus* eius internus licet rarus sit, tamen prodest in pectoris macilagine & hinc in tussi, in renibus extergendis & hinc in stranguria & calculo. Extrinsecus crebrior eius est *vsus*, isque in tumoribus, erysipelate, ambustis, vulneribus & v. plurimum adhibetur in clysteribus & cataplasmi.

PRÆPAR.

Stillat. Ex integra herba mense Julio collecta.

CCXL. Herba Paris.

Herba paris, *Matth. Dod. Cast. Ger. Paris herba, Lon. Cam. Aconitum pardalianches, Fuchf. Aconitum siue pardalianches monococcon, Cord. in. D. Solanum tetraphyllum, Lob. Solanum quadrifolium bacciferum seu 10. C. B. Aconitum salutarium, Tab. Vva versa, Vva vulpina, Einbeer, VValffbeer.*

Crescit in sylvis opacis. Floret Aprili & Maio.

OFFICIN. NAT.

Bacca, raro Folia.

Vires. Bacce ac folia refrig. & sicc. *Vsus* baccarum internus est alexipharmacus in peste, venenatis morbis, venis que assumptis. (E.g. Arsenico.) Extrinsecus foliorum *vsus* est in bubonibus pestilentialibus, aliisque calidis tumoribus, in paronychia, in inueteratis ulceribus.

PRÆPARATA.

Pulvis Saxonicus. Vide D. A.

Pastinaca est tum $\left\{ \begin{array}{l} \text{Latifolia [Elaphoboscum]} \\ \text{Tenuifol.} \end{array} \right. \left\{ \begin{array}{l} \text{Sylvestris} \\ \text{Satiua} \end{array} \right. \left. \begin{array}{l} \text{minus} \\ \text{vsuales.} \end{array} \right.$

Satiua seu domestica, *Huius loci.*
Sylvestris. *Hec loci sequentis.*

Estque Past. $\left\{ \begin{array}{l} \text{lutea. Carota lutea, gelbe Mobren, gelbe Pastenach, gelbe Ruben.} \\ \text{alba, Carota alba, vveisse Pastenach, vveisse Nuben.} \\ \text{rubra. Carota (simpliciter), rothe Ruben.} \end{array} \right.$

Videatur Pastinaca satiua, 1. & 2. *Clus. hist. Pastinaca erraticum Plinio, Fuchf. 1. (& Elaphoboscum,) Tabern. Lon. Satiua Diosc. Lob. Cord. in D. tenuifolia (& latifol.) satiua, Dod. Ger. Pastin. 3. Daucus staphilynus altilis & hortensis vulgo Carota, Cam. hort. Carota ex albo flauescens, & pastinaca domest. Cast. nostra lutea, Cam. Staphylinus 1. & 2. Trag. Staphyl. satiuus & Daucus domesticus, Galeno. Sifer alterum, Matth. Tab. Pastin. tenuifolia satiua radice lutea vel alba, C. B. 5.*

De rubra vid. Pastinaca satiua, 2. *Fuchf. lat. rubens, Dod. Tab. atrorubens, Lob. Carota, Matth. radice rubra, Cast vulgaris, Lob. Staphylinus 3. Trag.*

OFFICIN. NAT.

Semen, raro Herba. (Radices culinariae sunt.)

Vires. Semen & herba calf. 3. sec. 3. *Vsus pracip. in vulneribus, singultu, plenrifi, torminibus ventris, calculo ac mensibus pellendis. Specificum habetur ad vteri suffocationem.*

Dosis feminis ℥j.

N. Paro planta hac in officinas infertur.

CCXLII. *Pastinaca sylvestris.*

Pastinaca tenuifolia: fylu. Dioscoridis, vel Daucus officinarum, C. B. 1. Daucus agrifitis Gelen. Dauc. vulgaris,

Clus. hist. Pastinaca erraticum Plinio, Fuchf. Cord. in D. Tab. Staphylinus syluest. Trag. Pastinaca fylu. Matth. Lon. Cast. fylu. tenuifolia, Dod. Ger. fylu. genuina Dioscor. Lob. Pastinaca 4. Cam. Germ. Bogelneest.

Crescit passim locis campestribus siccis & arenosis. Floret Iulio & Augusto.

Semen, raro Radix & Herba.

Vires. *Eisdem predita est virtutibus quibus Daucus Creticus, cuius quoque loco, in compositionibus adhiberi commode potest. Semen calfacit & sicc. 3. radix paulo imbecillius, herba adhuc minus; atten. aperit. Vsus pracipui in tussi, plenrifi, stranguria, reserat Epar, Lienem, vtereres, ciet menses & molas, sedat matricis suffocationes, stimulat Venerem. Extrinsecus conuenit radix pessariis, exiccat herba catarrhos (in loisionibus capitis) parturientium partum promouet (in suffitu.)*

PRÆPAR.

1. Confect. sem. sed raro.
2. ∇ stillar. Ex tota herba cum floribus ac radicibus Iulio collecta.
3. Ol. stillar. Ex semine.

CCXLIII. *Perfoliata.*

Perfoliata vulgatissima seu arvensis, C. B. 1. Perfoliata, *Brunf. Matth. Fuchf. Dod. Cord. in D. Lon. Tab. maior, Trag.*

Trag. perfoliatum vulgare flor. luteo, folio umbilicato, *Lob.* perfoliata vulgaris, *Ger.* Germ. *Durchwachs*, *Bruchwurtz*.

Crescit in locis sabulosis. Floret Iunio.

OFFICIN. NAT.

Folia & Semen.

Vires. *Calf. & sicca* (amari saporis) vulneraria est. *Vsue* precipui in vulneribus recentibus, Enterocelis (in primis umbilici) tumidis artubus strumis, sine intrinsecus sine extrinsecus adhibere volupe sit.

OFFICIN. NAT.

▽ stillat. Ex integra herba florente.

CCXLIV. Malus Persica.

Persicus, *Brunf.* persica, *Fuchf.* Cam. persica malus, *Lob. Tab. Ger.* malus persica, *Dod.* persica arbor & eius 1. genus, *Trag.* persica molli carne & vulgaris viridis & alba, *C. B. 1.* persicus alba & popularis, *Lon.* persica viridia & alba, *Matth. Cast. German.* *Pfersichbaum*.

OFFICIN. NAT.

Folia, Flores, Nuclei, Fructus sed raro, quippe hi facile putrescunt.

Vires. Fructus (mala persica, *Arab. Sanch.*) refrig. & humect. 2. nutrimenti sunt pauci, facileque putrescunt. Verum initio pastus laxant aluum. Exiccata constipant, laudanturque in fluxu alui, &c.

Flores, Folia ac Nuclei, *calfac. & sicca. absterg.* *Vsus* precip. (florum) in lumbricis infantum, in alui laxatione, mesenterij obstructione, seri purgatione, & sim. (Nucleorum) in diureticis ac lithonripticis, in obstructione Epatis, ardore Stomachi. Extrinsecus adhibentur crebro in Emulsionibus dolori capitis

dicatis, &c.

PRÆPARATA.

1. *Condit. fructus*, subtrahitur sc. exterior cuticula, hinc condiuntur. l. a.

N. Aptiora ad condituram censentur mala minora quam precocia.

2. ▽ Ex floribus.

N. Aluum infantum lubricam reddit, lumbricosque educit.

3. ▽ diuretica. Vide l. 2. c. 38. ▽ diuretica ex nucleis.

4. Syrup. de floribus persica. Fit ex iteratis infusionibus, vt syr. ex infusione violatum.

Vires Bilem ac serosos humores educit, mesenterium reserat, vermes enecat.

Dosis ad ʒij.

5. Conserua florum Persica.

6. Oleum. Fit expressione.

Vires. Sedat aurium, hemorrhoidumque dolores ac tumores, colicos inuat (assumptum.)

CCXLV. Persicaria.

Persicaria est { 1. mitis | maculosa & non mac.
2. vrens, hydropiper. Hoc officinale
3. angustifolia.
4. minor, pulicaria pumila.

Dicitur *apomacei*, *Hydropiper*, *Fuchf.* *Dod.* *Matth.* *Cord.* in *D.* *Cam.* *Cast.* *Ger.* persicaria, *Trag.* *Tab.* *Mas.* *Lon.* mascula, *Brunf.* *Perl.* vrens, *Lob.* aliis pulicaria. *Germ.* *Blähkraut*, *Wasserpfeffer*, *Muckenkraut*.

Crescit locis vdis ac palustribus.

Floret Iulio & Augusto.

OFFICIN. NAT.

Hydropiperis Folia.

Vires. *Calfac. & sicca.* *Vsus* precipui extrinsecus in vulneribus tumoribus,

Z Z z 3 induratis,

induratis, ulceribus in veteratis (in caplasim.)

N. 1. *Persicaria mitis* habetur frigida, sed officinis inusitata est, ut species reliqua.

N. 2. *Paracelsus* in *Hydropiperis* descriptione admodum prolixus est.

N. 3. Sunt qui hanc herbam, ad transplantationem morborum, praesertim in cantatione introductorum utuntur.

CCXLVI. *Petasites.*

Петаситъ, Pestilentzwurtz, Negenkrafft.

Maiores, mas flore luteo. Haec usualis est.

Minor, foemina, flore albo.

Dicitur *Petasites*, *Trag.* *Fuchf.* *Dod.* *Cord.* *Lob.* *Lon.* *Tab.* *Ger.* *mas.* *Cā.* *maior.* *Math.* *Cast.* *maior* & *vulgaris*, *C.B.* 1.

Crescit in locis humidis. Floret initio veris.

OFFICIN. NAT.

Radix quae gummosa est.

Vires. *Calf.* & *sicc.* 2. part. est tenuium, amari saporis: atten. aper. sudorifica est ac alexipharmaca in peste, in lipothymia uterina, morbis pectoris, a mucilage & rea oriundis. E.g. tussi, asthmate. Extrinsecus commendatur ad bubones & ulcera maligna.

N. Substitui potest *costo*, quippe viribus eidem equipollere compertum est.

PRÆPAR.

1. ∇. Ex Radicibus vel ex tota h.
2. Oleum stillat. sed rarum est.
3. Extractum.

CCXLVII. *Petroselinum.*

Apium hortense seu *petroselinum vulgare*, *C.B.* 1. *Petrosel.* *Trag.* *Brunf.*

Cord. *vulgare* seu *nativ.* *Lob.* *hortense*, *Math.* *Lob.* *Dod.* *Cast.* *Ger.* *fatium*, *Tab.* *Apium* *selinum* *Diosc.* *Petroselinum*, *perfilium* *oreseelinum*, *Fuchf.* *Arab.* *Karphi.* *Peterlin*, *Peterfilg*, *Garteneppich.*

N. *Petroselinum verum* seu veterum est *petros.* *Macedonicum* (quod sequitur.)

Gaudet solo humido, colitur in hortis. Floret Iunio, Iulio & Aug.

OFFICIN. NAT.

Radix, (colligitur vere.) Semen, colligitur August.) & Folia.

Vires. *Calf.* & *sicc.* in princ. 2. atten. aper. exterg. diuretica sunt, Epatica, & c. *Vsus* praecip. in obstructione Pulmonum Epatis, Lienis Renum ac Vesicae & hinc in tussi, Ictero, Cachexia, calculo, sabulo, mensibus obstructis, asthmate, & c. Extrinsecus resolvunt humores calidos (inprimis oculorum sugillationes) impediunt capillorum casum (cum *Abrotan.*) imminuunt lac (mammas imposita) adeoque mulierculis nostratibus vsui sunt in ablactatione infantum.

N. *Forest.* l. 16. 6. commendat ad tussim puerorum. *R.* *Succ.* *Petr.* *ʒʒ.* *Lact.* *muliebr.* *ʒʒ.* *Cumin.* *ʒʒ.* *M. da tepide.*

PRÆPAR.

∇ stillat. Ex integra planta cum radice, coll. initio veris.

CCXLVIII. *Petroselinum Montanum*

Προστίλιον, *Dod.* *Lob.* *Clus.* in *D.* l. 1. *Tab.* *Apium montanum*, *Cast.* folio ampliore, *C.B.* 1. *Elaphoselinum*, *polychreston*, *Cord.* *Bergpeterlein*, *Berg-eppich*, *Hirschpeterlein*, *vvilde Peter-silien.*

Crescit

Crescit in locis montanis, fabulosis, vt & in hortis.

OFFICIN. NAT.

Radix arque Semen.

Vires. Calf. & sicc. 3. est alexipharmacum, sudoriferum, diureticum, discutiens. Vsus precip. in calculo Renum & vesicae, in Peste (sudorem eliciendo) in morbis & flatibus, in stranguria.

CCXIX. Petroselinum Macedonicum.

Πετρίδιον Macedonicum. Matth. Lob. Cast. Dod. Tab. aliàs Apium saxatile, Peterlein, Steinpeppich, Steimpeterlein.

Colitur apud nos in hortis. Gaudet solo fabuloso ac saxoso.

OFFICIN. NAT.

Semen raro Radix.

Vires. Calf. sicc. (3.) absterg. atten. aper. alexipharmacum est, unde & Thoriaca compositionem ingreditur. Vsus precip. in urina ac mensibus cœndis; in reliquis cum viribus petroselinorum speciebus adscriptis convenit. Adhibetur & morbis veneficio introductis.

CCL. Peucedanum.

Πευκεδάριον. Peucedanum, Trag. Fuchf. Dod. Cord. in D. Lob. Lon. Ger. Tab. 1. Cam. Matth. Cast. Peucedanum, C. B. 1. & 2. aliis Fœniculum porcinum. German. Haarstrang, Sæwjenchel, Schwuchelwurcz, Himmelgall.

Crescit in montibus opacis. Colitur & in hortis: Floret Iulio.

N. 1. C. B. duplex facit Peucedanum alterum Italicum, alterum Germanicum: Verum enimvero promiscuè in usum accersiri poterunt.

N. 2. Radicem Peucedani officinis vsualem, non esse legitimam, Vid. ap. Matth. & Castor.

OFFICIN. NAT.

Radix colligenda, vere Autumno.

N. Radix impragnata est succo resinoso, qui tamen in usum medicum nondum venit, licet alias magnifiat.

Vires, Calf. & sicc. 3. aper. atten. expectorator, mucilaginem tartaream bilemque educit. Vsus precip. in affectibus pectoris, tussi, inflationibus (so die lung in den Hals steigt,) & sim. in obstruct. Epatis, Lienis, Renum, ciet urinam, calculum atterit & expellit. Extrinsecus in Hemicrania, aliisque generibus cephalalgia à catarrhis otium ducentibus, in tumoribus renitentibus, vlcibus inueteratis mundificandis, promouet cattillorum pronentum, &c.

PRÆPAR.

- 1. Sal. } quæ raro pro-
- 2. Oleum fiat. } stat officinalia.

CCLI. Pimpinella, Bipinella.

Πιπινηλίον, Bibinella, Bimpinella, Bibernell, Bibinell, Steimpeterlein, Bockspeterlein.

Bibi- } saxifraga { maior } promiscuè
 nella } sanguisorba, Italica. } vsuales.
 loco.

Maior est Pimpinella saxifraga maior candida, C. B. 1. Pimpinella, Cord. Lon. Trag. Fuchf. Lob. Cast. Pimpinella saxifraga, Matth. Cam. Pimp. Saxifraga maior, Dod. Tragoselinum maius, Tab.

N. 1. Huius radici adnascitur quibusdam in locis gramm rubrum, quo vuntur

tur Tinctores ad colorem Carmesinum, unde sunt qui pro cocco habent.

Minor, est pimpin. minor, C. B. 4. minor, Fuchs. pimp. saxifrag. minor, Cam. Tragofelinum petraeum, Tab. saxifrag. parua, Dod.

N. 2. Hec praestantissima est, petro, felini Macedonici loco compositiones ingredi potest, si id deficiat.

Gaudent solo pingui, sed inculto: Florent Iulio, Augusto.

OFFICIN. NAT.

Radix, Folia, Semen.

Vires. Calf. & sic. (maior in princ. 3. minor. compl. gr. 3.) atten. aper. absterg. sudorifica est, lithonriptica vulneraria, &c. saporis acris. Usus precip. in praecauendis ac curandis venenis ac contagiosis morbis, in reserandis obstructionibus hepatis, Renum, Pulmonum, mensium. In arena, calculo ac stranguria, in colicis

doloribus, tussi, aethmate, peripneumonia: in cruditate ac imbecillitate ventriculi: in lue venerea: Antidotus item est argenti vini. Extrinsecus valet: in maculis faciei abstergendis: in odontalgia: auget lac, maturat bubones, cancrasosque tumores, mundificat ac consolidat vulnera, tam recentia, quam inveterata.

PRÆPAR.

1. Condit. Ex Radice.
2. Confect. Ex radice vel ex semine.
3. Conserua. Ex semine.
4. ∇ stillat. Ex radice ac integra herba florente Iunio mense collecta.
5. Oleum stillat. Ex tota planta cum Radice.

N. Sunt qui in vino rubello semen macerant, rursum exiccant atque hinc oleum exprimere conantur.

6. Sal. Ex cinere.

CCLII. Pinaster seu pinus syluestris.

Satiua. V. de loco sequenti.

Pinus } Satiua. V. de loco sequenti.
 Syluest. } montana } 1. Fructifera.
 } } 2, 3. Steriles. } promiscue vsuafes.
 } } } 4. maritima maior & minor, &c. }
 } } } } plinum dictum.

Videatur Pinus sylu. Brunf. Trag. Lob. Matth. Cast. Dod. Tab. &c.

OFFICIN. NAT.

Cortex, Folia, Nuces, Resina.

Vires. Cortex & folia refriger. & sic. adstringunt. Vsu precip. (externi) in dysenteria, flore mensium (suffiundo.)

PRÆPARATA.

1. ∇ still. Ex conis viridibus.

Vires. Rugas faciet delet & mammas admodum in virginibus extuberantes cohibet (imposita cum lintecolis.)

2. Oleum. Fit ex ligno per descensum igne leni, vt oleum ex abiete.

N. Forsan hoc oleum est officinis Tem-

CCLIII. Pinus & Pinee.

Pinus. Pinus, Brunf. Trag. Dod. Cord. in D. Lon. Cast. Pinus domestica, Matthiol. Tab. Pinus satiuua, Ger. Pinus vulgatissima, Lob. Pinus Italica, Cam. Pinus satiuua, C. B. 1. Arab. Sonabar. Ischtenbaum, Hartbaum, Rinholz, Iorenholz.

OFFICIN. NAT.

Nuces

Nuces Pineæ, Cortex & Folia.

Vires. Nuces Pineæ (strobili, Coni coccali & conaria veteribus) caliditate temperata sunt & humidia, maturant, leniunt, agglutinant, resoluunt, impinguant, adeoque nucleorum Vfus precipuus est in phthisi, (quia nutriunt bene) tussi, stranguria ac acrimonia urinae mitiganda: seque excitant Venere, vlcera Renum mundificant, &c.

Cortices & folia viribus conueniunt cum cort. & fol. pini syluest.

PRÆPARATA.

1. Oleum, Exprimitur ex nucleis.
2. Confect. nucleorum.

CCLIV. Piper.

Πιπέρι, Arab. Fulfel, Filfel, Pfeffer.

Rotundum	}	Album: hoc omnium præstantissimum.
		Nigrum: succedit albo.
Longū. Ma cropiper	}	Oriente minus, Tab. Hoc vsuale.
		Occidentale ma- ius. Tab.

Album dicitur piper album Matth. Lob. Fragof. Clus. Cast. Tab. Piper rotundum album, Cord. hist. Piper rotundum album, C. B. 2.

Crescit rotundum in Malauar ac finitimis Insulis Iauæ, Sunda, &c. fructusque est plantæ cuiusdam, quæ arboribus instar conuoluuli circumducitur.

Eligendum recens, ponderosum plenum, acere non cariosum.

N. 1. Calf. & sicc. 3. incid. atten. aper. resol. Vfus præcip. in frigiditate ac cruditate ventriculi, colicis doloribus (præstat album). visus imbecillitate (quia flatus discutit.) Extrinsecus in apople-

gmatisms, gargarismis, sternutatoriis, sedat odontalgiam, columellam tumidam imminuit, neruorum affectus frigidos iuuat.

N. 1. Vus piperis volatilis valde est. Vitentur ergo præparationes in quibus volatile euanescit, e.g. Extractorum præparationes.

N. 2. Vulgus piper longum in paroxysmis febrium exhibere solet, id quod non nisi in principio locum habere potest.

PRÆPARATA.

1. Spec. diatrion pipeveon. V.D.
2. Tragea seu species fortes. V. l. 2.
3. Oleum piperinum stillat. Fit ex nigro, ad modum, quo ex reliquis aromaticibus.

N. Piper parçissime oleum dat (scil. lbj. dat ℥j. circiter) ideoque ∇ destillata aliquoties super remanentiam seu caput mortuum refundenda erit.

Vires. Admodum penetrabile est, flatus discutit, paroxysmum tertiana præcauet, si hor. 2. ante paroxysmum exhibeatur, purgato tamen corpore. Extrinsecus admiscetur inunctionibus dorsii febribus.

Dosis gr. ij. iij. iiij. &c.

4. Ol. de piperibus. V.D.

CCLV. Pistacia.

Πιστία. Pistacia, Matth. Cord. Lon. Dod. Lob. Cast. Cam. Tab. Ger. Terebinthus Indica Theophrasti, Lob. C. B. 1. Arbor est Indicæ Terebintho similis. Nascitur in Persia, Arabia, Syria, India. Quin & Italiæ indigena facta est.

OFFICINALI NATIVA
Fructus (Pistacia, phisticia, Picunia, Fistic, Pimpernißzlein.) Sunt nuclei

A A a duplici

duplici vestiti putamine, primò exteriori coriaceo, hinc lapideo, quod nucleum proxime continet, membranula rubella circumdatum.

Eligendi nuclei recentes, ponderosi, extrinsecus albi, intrinsecus virides, non rancidi, in apice aliquantulum parentes.

Vires. *Calf.* 2. *hum.* 1. *atten.* aper. *Ufus* precip. in mucilagine pulmon. obstruēt. *Epatis*, roborant stomachum, arcēt nauseam ac vomitum, excitant appetitum, bonum suppeditat nutrimentum.

PRÆPAR.

Oleum, exprimitur ex nucleis.

CCLVI. Plantago.

Ἀγρό, λουσι, *VVegetich.*

Species plantag. vsualiores sunt tres.

1. Dicitur plantago latifol. sinuata, *C.B.* 2. rubra, *Trag. Brunf.* maior & 1. *Lon.* maior, *Matth. Fuchf. Dod. Cast. Tab. Cam.* latifol. *Cord.* latifol. leuis, *Lob.*

2. Plantago latifolia incana, *C.B.* 3. *Plant.* maior, *Matth. Lon. Cam.* latifol. minor *Dioscoridis*, *Tab.* maior incana, *Lob.* Plantago media, *Fuchf. Dod.*

3. Plantago angustifolia maior, *C.B.* 1. plant. minor, *Fuchf. Dod. Lon.* media, *Cast.* plantago lanceolata, *Trag. Tab.* plantago longa, *Matth.* plantago quinqueruia, *Lob.*

Crescunt locis herbosis, Florent Majo & Iuio.

OFFICIN. NAT.

Semen, Folia, Radix.

Vires. Refrigerant & sicc. 2. absterg. in crass. epatica sunt ac vulneraria. *Ufus* precip. in fluxionibus cuiuscunque generis. E.g. alui, expuitione sanguinolenta, gonorrhæa, mictione involuntaria in

mensum profluvio, in febribus, & sim. *Extrinsecus* in mundificandis consolidandisque vulneribus ac ulceribus inueteratis.

PRÆPAR.

1. Succus inspissatus. Extractus ex foliis.

2. ∇ Stillat. Ex herba integra.

3. Syrupus de succo.

CCLVII. Pæonia.

Παονία, Arab. Feonia, Pæonia, Benigrosen, Pfingstrosen, Gichtrosen, Kængsblum.

Mas, *C.B.* 1. Hac præpoller.

Fœmina { flor. simpl. *C.B.* 1. & c.

{ flor. pleno, *C.B.* 1. 2. & c.

Mas dicitur: Pæonia nobilior vel

2. *Trag.* pæonia mas, *Matth. Cord.* in *D. Lob. Dod. Tab. Ger.* Pæonia folio nigricante splendido, *C.B.* 1. Fœmina nuncupatur pæonia, *Trag. Lon.* pæon. fœmina, *Brunf. Fuchf. Cord.* in *D. Lob. Cam.* pæonia fœmina altera, *Dod.* pæonia vulgaris fœmina. *Clus. hist.* pæonia communis vel fœmina, *C.B.* 2.

N. Discernuntur innicem Mas & Fœmina foliis & radice. Mas est foliis nigricantibus splendidis, iuglandis folia emulantibus, radice digitali crassa, alba, seu mas non una radice nixtus est, sed plures habet Fœmina variat colore foliorum. Est folio virinque virente & glabro, calice hirsuto, flore vel simplici, vel pleno, foliis helleborum emulatur, radicibus, seu balani longiores circiter octo aut sex adherent. Mas plures habet, & c.

Coluntur in hortis, Florent Majo.

OFFICIN. NAT.

Radix, Semen seu grana: Flores.

Radix

Radix effodienda est vere, (& de-
 crescente (3. & ante nouilunium.)
 Alij effodiunt ☉ existente in ♄ die-
 que ac hora solaribus, (& decrescente.
 Flores colligendi sunt Maio. Semen
 Augusto.

N. Paeonia flore multiplici raro se-
 men producit.

Vires. Calf. & sicc. 2. saporis est sub-
 dulcis ac subacris, seu amari; suba-
 stringit. Vfus precip. in affectibus Ce-
 phalicis, Epilepsia, incubo, & c. Vteri-
 nis, mensibus obstructis, lochus purgan-
 dis, doloreque post partum mitigando,
 Epatis obstructione. Extrinsecus suspen-
 duntur grana ac radix de collo pro ar-
 cenda Epilepsia.

PRÆPARATA.

1. ▽. Ex floribus additaque, si placet
 radice.
2. Syr. Ex infusione florum.
3. Extract. Ex floribus exiccatis.
4. Con seru. Ex floribus.
5. . Ex incinerata integra planta.
6. Fecula. Ex radice, l.a.
7. Oleum stillat. Ex granis elicitur
 cum ▽ fermentat. l. comm.

CCLVIII. Polygonum.

Maius, varij generis est, e
 quibus vsuale latifolium,
 C.B. 1.
 Πάλυρον, { Minus, variorum itidem
 generum, qua cuncta
 minus vsualia sunt.

Dicitur centum nodia, Lob. Brunf.
 Polyg. mas, Matth. Fuchf. Dod. Cord.
 Cast. Trag. vulgare, Cam. maius, Len.
 Tab. German. VVeggrasz, VVegdrirt,
 Deungrasz, Blukraut.

Crescit locis incultis, aridis ac iux-
 ta vias. Floret integra ferè æstate.

OFFICIN. NAT.

Herba.

Vires. Refrig. 2. (al. in princ. 3.) sicc,
 astring. vulneraria est. Vfus precip. in
 sistendis fluxibus quibuscumque, diar-
 rhæa, dysenter. Fluxu vier. vomitu. He-
 morrhagia narium. Extrinsec. prodest
 vulneribus, viceribus, inflammationibus
 oculorum, mamma tumorebus, febricit-
 tiana (carpis imposta.)

PRÆPAR.

▽. still. Ex herba collecta in prin-
 cipio Augusti.

CCLIX. Polygonatum.

Est { Latifolium, varij generis, e
 quibus vsuale vulgare, C.B. 1.
 Angustifolium, varij generis,
 qua minus vsualia.

Dicitur Sigillum Salomonis. latifo-
 lium, Trag. polygonatum. Matth. Cast.
 vulgare, Cā. latifolium. Fuchf. Dod. Tab.
 maius, Lon. German. VVeiszuritz.

Crescit in syluis & collibus, Floret
 Maio.

OFFICIN. NAT.

Radix, raro Folia, raro Bacca.

Vires. Temperamenti est mixti, sub-
 astr. exterg. saporis est subamari ac sub-
 acris. Vfus internus est in fluore albo
 mulier. Bacca pituitam mucilaginosam
 per vomitum ac secessum educunt. (Dos.
 n. 14. 15.) Idem dicitur & de radice
 (3j.) ac de foliis Extrinsecus faciei ma-
 culas abstergit, cutem dealbat, resoluit
 sugillationes ac tumores reuertes, lotione
 fugat lenticulos capitis, scabiemque in-
 fantum exiccat, cicatrices maculasque
 morbillor. emendat, & c.

PRÆPAR.

▽. Ex radice cum foliis ac flori-
 bus.

Mullis, Malus, Apffelbaum.

Poma sunt {
 Domestica
 Sylvestria. {
 acida.
 dulcia.
 subacida.

Vires. Acida sunt natura frigidioris ac astringentis. Verum cum butyro cocta cibum febricitatibus prebent commodum.

Dulcia. Sunt natura calidioris ac laxantis.

Subacida seu vinosa, natura sunt mixta, conueniuntque Ventriculo & Cordi.

Sylvestria. Astringunt.

Extrinsicus (dulcia sub cinere cocta) sedant dolorem oculorum, pleuritisidis (cum myrrha imposita).

PRÆPARATA.

1. Succus fermentatus, seu vinum pomorum, pomaceum.

N. Vulgatissimum est in Normannia Gallia Pronincia, adeo ut non modo potus loco habeant, sed & ex eodem in vita destillent, & aceta conficiant, qua vel cum Spiritu ac acetis ex vino, certare videntur.

2. Syrupus de pomis simpl. Ex succis pomor. dulcium ac vinosorum.

Vires. Succurrit affectibus cordis, syncopa, palpitat ac aliis ab arrabile eritis. Ventriculo gratus est, sedat situm, febribus auxiliatur.

3. Syrup. de Pomis Regis Saborum, V.D. & infra de Sena.

4. Extract. seu succus inspissatus pomorum dulcium fragrant.

5. Extract. è radice arboris fructus acidus ferentis fit. a. cum ex pomis propriis destillata.

Vires. Summum est medicamen. con-

tra omnia ventris profluvia, dysenteriam, lienteriam, diarrhaam, fluxum epaticum. Quercet. P.R.c.26.

CCLXI. Populus.

alba latifolia, vveisz Pappelsum, Asper.
 nigra, schwariz Pappelbaum
 Hac vsualis.

Alba dicitur, Pop. alba, Matth. Dod. Cord. in D. Lob. Cast. Tab. Ger. Populi albæ aliz species, Trag. C.B.1.

Nigra dicitur: Populus alba, Trag. Lon. Populus nigra, Matth. Dod. Cord. in D. Lob. Cast. Tab. Ger. C.B.3.

OFFICIN. N. T.

Cortex, Pop. albæ, sed rara. Oculi. Pop. nigra.

Vires. Vtraque natura est mixta, (sed humido sicca) ceterum ad frigiditatem inclinantis, abstergitque. Cortex pop. albæ præcipue adhibetur in dolore sciatico intus & extra, in stranguria, in ambustis. Oculi seu gemma (æspuata) pop. nigr. adhiberi solent a sexu multebri ad capillos ornandos & promouendos, profunt itidem ad dolores sedandos.

N.1. Est & Gummi pop. nigra, quod calfat. 2. sed minus id vsuale est.

N.2. Succus in foraminibus populi collectus, Verrucas ac impetigines curare creditur.

PRÆPARATA.

1. Oleum populinum. Ex oculis pop. nigr. (primo vere collectis) & oleo veteri. Vide Disp.

N. Alij addunt quoque vinum & coquant ad huius consumptionem.

2. Unguentum populcon. V. D.

Vires Refrigerat, somnum conciliat.

CCLXII. Porrum.

capitatum

{
}
 Domest. or Lauch { capitatum, Aesch-lauch.
 scitum { scetile, Schmitt-lauch.
 V suale syluestre.

Dicitur Porrum, Brunf. Cord. in D. Dod. Cast. Tab. Porrum commune, Matth. vulgare, Lob. portum capitatum, Fuchf. por. capitatum vulgare, Cam. porrum commune capitatum, C. B. 1.

N. Capitatum & scetile non differunt genere, sed solum cultura. Scetile enim dicitur, quod detondetur ad culinares vsus: capitatum, quod sine detensione linquitur & autumnno transplantatur, ut capitatum fiat.

Gaudet solo pingui. Seritur Martio & Aprili.

OFFICIN. NAT.

Rdaix, Herba, Semen.

Vires. Porrum calfacit insigniter siccatque, attenuat, aperit, incidit, resoluit. V su praec. in serpentium morsibus & vstionibus, mucilage pulmorum. Extrinsecus in aurium linitu ac suppurationibus, in venis haemorrhoidum tumidis ac dolentibus, &c. Semen urinam ciet.

N. Frequens eius vsus, somnos turbulentos inducit, visuique officit.

CCLXIII. Portulaca.

Arab. Backaleancha, Porcellana, Burtzel, Bortzel, Gensel.

Latifolia sativa. Haec praefertur.

Angustifolia syluestris.

Inscrbitur Portulaca, Lon. Cord. hortensis, Trag. Fuchf. Dod. Domestica, Matth. Lob. Cast. Tab. Ger. maior, Cam. Portulaca latifolia seu sativa, C. B. 1.

Floret Iunio: Crescit locis arenosis & sabulosis.

OFFICIN. NAT.

Folia, Semen.

Vires. Refrig. 3. sicc. 2. adstring. pauci nutrimenti est, lumbricos fugat & expellit. V su praecip. in mitigando feruore bilis, & hinc in febris putridis ac malignis, ardore urina, ut & in scorbuto, apprimè succurrit febricitantium astitui (folia recentia applicata Iecori, Renibus, &c.)

N. In tabe prodesse, succulentia & crassities foliorum arguunt.

PREPAR.

1. Succus inspissatus.
2. ∇ stillat. Ex herba.
3. Syrupus simpl. Ex succo.
4. Compos. Vide Disp.

N. Solet & condiri ad modum quo Cappares conduntur.

5. Conserua. Ex foliis.

CCLXIV. Primula veris.

Herba Paralysis, Cast. Brunf. vulgaris, Trag. primula veris, Matth. Tab. maior, fl. luteis odoratis, Dod. primula pratensis, Lob. verbasculum odoratum, Fuchf. Arthriticum, Gesn. simplex luteo flore, Cam. verbasculum pratense odoratum, C. B. 1. German. Schlüsselblumen, Himmelschlüssel, S. Peters Schlüssel, vvetſch. Betonien.

Crescit in campestribus ac syluis. Floret April.

OFFICIN. NAT.

Flores ac Folia.

Vires. Calfac. leniter, siccat fortius, saporis est subacris ac subamari subastring. Anodyna est. V su praecip. in affect. capitis Apoplexia, Paralysis. In articularum doloribus. Extrinsecus in Arthritide ac tumoribus qui Ictus venenatorum animalium subsequuntur.

A Aaa 3 N. Acetum

N. Acetum radicibus impragnatum ac loco errhini in nares attractum, odontalgiam mirabiliter sedat.

P R A E P A R.

1. ▽. Ex integra herba (caule, foliis ac floribus.)
2. Conserua. Ex floribus.

CCLXV. Prunella.

Brunella, Dod. Brunf. Lob. Brunella vulgaris & 6. Trag. consolida minor. Matth. minima, Cam. Prunella, Fuchs. Cam. Tab. Ger. symphytum petraeum, Lob. ico. Cord. in D. German. Brunellen, Gottheil, S. Anthoni-krant

Nomen ducit ab Angina, quam Brunellam alij vocant

Crescit in campestribus ac locis herbosis. Floret Iunio & hinc ferè integra aestate.

O F F I C I N. N A T.

Folia, Flores.

Vires. Calf. & sic. (subamara est) abstergit, consolidat, vulneraria est. Vsuu princip. in vulneribus imprimis Pulmonum, in sanguine coagulato. Extrinsecus vulneribus & creberrimè in angina, aliisque affectibus oris ac faucium (gargaris.)

N. Auctor est Crollius, radicem aridam denti dolenti affricatam. ut sanguinem susceperit, magnetica vi dolorem sopire, si salici indatur perforata, foramenque mox tubulo ex salice obturetur.

P R A E P A R.

1. ▽. Ex integra planta Augusto collecta.
2. Conserua. ex florib.

CCLXVI. Prunus.

Prunus } Domestica sativa, huius loci.
} Sylvestris, vide Acacia.

O F F I C I N. N A T.

K *Prunus* a Pruna, Pflaumen, (fructus pruni.)

Varij sunt generis colore, sapore, figura & magnitudine differentia. Sunt enim dulcia, subacida, acida. Sunt purpureo-nigra, rubra, lutea (cerea, Spillina,) alba: sunt oblonga, rotunda: sunt denique maiora, minora, &c. In officinis autem vltiora sunt pruna Damascena (Zverfchen,) cuius vicem subeunt pruna Vngarica, tam quoque nostratia dulciora in clibavo exiccata. Præterea sunt & Pruneola, (pruna de Brignioles, è loco natali in Galliis,) quæ enucleata & exiccata afferuntur, C. B. 15. pruna ex flauo rufescentia, mixti saporis, gratissima. Germ. Pflaumen, Prunellen.

Palma datur Damascenis, quæ ex Syria Venetias sicca afferuntur, nucleoque sunt longo & plano potius quam rotundo. Secundo loco sunt, quæ ex Pannonia; vnde Vngarica, dicta sunt, aliis etiam Damascena, Cord. in D. & Transylvania adferuntur, at Dod. Morauica magis ad aluum leniendam probantur. His 3. subiungi poterunt & nostratia, sed viribus ea minora sunt.

N. Est & gummi prunor. ad calculum arterendum vtile, sed vari vsus.

Vires. Pruna natura refrig. & humest. Recentia cruda, emolliunt aluum quidem, verum facile putrescunt & proinminus commodè (inprimis post cibum) esitantur, maxime si immoderatio vsus sit. Pruna Damascena esu aptiora sunt, laxant, acrimoniam humorum obtundunt, linguam (macerata in frigida

frigida ac ore retenta (humectant, sitim mitigant.

Prunella (seu prunella dicta) refrigerant magis quam reliqua, humectantque, sed citra alui commotionem, adeoque esus aptiora censentur, gratumque refrigerium in febribus exhibent.

PREPAR.

1. Conditio pruna (cereæ) cum mell. p.ij. & Vini p.j.

2. Pulpa prunor. Ex magnis acidis & vinosis fit, coctis scilicet perque setaceum traiectis & cum saccharo, circiter inspissatis.

3. Electuarium Diaprunis simp. Eodem modo paratur, ex pulpa & saccharo.

4. Diaprunum compositum. lenitium Diadamaſcenon. Vide Dispensat.

5. Diaprunum non laxativum. V.D. Norib.

CCLVII. Præmice.

Præmica, Matth. i. Fuchf. Lon. Cast. Lob. folio Taraxaconis, Lob. Prætenſis, Cam. Germ. Draco sylvestris lactarica, Dod. Tanacetum album seu acutum. Trag. (& millefolium 3.) Tab. Pyrethrum, Brunfaco, aliis Pseudopyrethrum, Dracunculus prætenſis serrato folio, C.B. 2.

Crescit in pratis, ut & arvis etiam incultis, aliisque locis saxosis. Floret Maio, Junio ac Julio.

OFFICIN. NAT.

Radix & Folia.

Vires. Calf. & sicc. sternuatoria sunt (ob acrimoniam,) sed rarioris usus.

CCLXVIII. Pulegium.

Pulegium } Latifolium } femina. Hoc vſitatus.
 } mas. Hoc ſubiungitur.
 } Angustifolium Ceruinum, cui ſubiungitur Creticum & Maſſiloticum, quæ minus vſualia.

Inſignitur pulegium, Brunf, Trag. Matth. Fuchf. Cord. Dod. Lon. Cast. Cam. Pulegium Regium, Lob. Pulegiū, latifolium, C.B. 1. Germ. Poley Fiwebkraut, (quia fumus eius pulices fugare creditur.)

Crescit locis cultis & incultis, humidis ac campeſtribus. Floret Julio & Augusto.

OFFICIN. NAT.

Folia, quæ eligenda caulibus ad rubedinem inclinantibus.

Vires. Calfac. & sicc. 3. (ſaporis ſubacris & ſubamari) partium tenuium, atten. incid. aper. reſolu. Vſus præcip. in menſibus ciendis, ſtuore albo, ſæpi eii-

ciendo, confert Epaticis ac pulmoniacis: nauſeam ac tormina ventris diſcutit, calculum ac vrinam pellit, Ictero ac Hydropi medetur. Extrinſecus, prodeſt capiti, ſomnum arceat, vertiginem diſcutit, doloribus arthriticis conuenit, ſentes abſtergit, pruriturum cutis curat, &c.

PREPAR.

1. Conſeru. è ſummit.
2. ∇ ſtillat. Ex herba.
3. ∇ bis deſtillata. Ex herba.
4. Ol. ſtillatitium.

Pulmonaria arborea.

Muſcus pulmonaria, Lob. C. B. 7. pulmona

pulmonaria, *Trag. Matth. Fuchf. Dod. Lon. Tab. prima, Cast. Germ. Lungenkraut.*

Adnascitur arboribus præsertim, v.g. Quercui & aliis: tum & petris; sed hic candidior est. Vide Lichen Petreus.

Vires. Refrig. & sicc. moderatè (aliis calefacit.) *Vsus* præcip. in affectibus pulmonum scil. erosione, tussi, asthmate, in profluviis alui, ac Vteri. Extrinsicus in vulnerum sanguine compescendo. Vide & Lichenem cum quo, ut figura ita & viribus ferè conuenit.

CCLIX. Pulmonaria.

Lungenkraut, } Latifolia.

Pulmonaria } Angustifolia (vulgaris, Schmalblatterich Lungenkraut. Plinij, Schmalblatterich Hirschmangolt.

Crescunt in dumetis opacis ac umbrosis. Florent Aprili.

Eligitur præ cæteris latifolia. Hæc insignitur symphytum maculosum seu Pulmonaria latifolia, C. B. 1. Pulmonaria altera, *Matth. Cast. maculosa, Lob. Cam. Tab.*

N. Foliis variat, quæ aliquando albis punctis notantur, aliquando carent: Floribus est communiter caruleo rubentibus, rarius albis. Sunt qui in marem & feminam distinguunt.

OFFICIN. NAT.

Folia.

Vires. Refr. & sicc. consolidant, conglutinant (al calf.) *Vsus* præcipuus in affectibus pulmonum phthisi, expuitione sanguinis. Extrinsicus in vulneribus.

CCLXX. Pyrethrum.

Πυρεθρον, Pyrethrum flore bellidis, C. B. 1. pyrethrum, *Brunf. Trag. Fuchf. Dod. 2. Matth. Cam. Tab. maius, Lon. verum, Cast. officin. Lob. Germ. Bertram, Zahnwurtz, Speichelwurtz, Geisewurtz.*

Crescit in Italia, aliisque locis calidis ac orientalibus, ut & in Helnetia, apud nos non nisi in hortis colitur.

N. Pyrethrum Germanicum seu pseudopyrethrum. V. Ptarmica.

OFFICIN. NAT.

Radix Sola.

Vires. Calf. & sicc. ultra 3. atten. incid. sudorem validè mouet. *Vsus* præcip. sed rari in viscoso phlegmate corporis, ac præcipue pulmonum, quod attenuat atque per expuitionem ac urinam expellit, ad Venerem stimulat, quartanam curat, Extrinsicus in Odontalgia frigida, in Bèrracho apoplegmatisans in signe est: iuuat & in Hemicrania: Paralyfin ac stupida membra sanat, rigores febris præcauet (inunctum dorso ac plantis pedum.)

CCLXXI. Pyrola.

Pyrola rotundifolia maior, C. B. 1. Pyrola, *Matth. Brunf. Dod. Lob. Cast. Tab. Limonium, Fuchf. Syluestre, Trag. Limonium & Pyrola, Lon. German. VVinterarün. VValdangolt.*

Crescit in syluis humidis. Floret Iulio.

OFFICIN. NAT.

Folia.

Vires. Refrig. & sicc. astring. consolidant, vulneraria sunt. *Vsu* interno & externo

externo celeberrima.

CCLXXII. Pyrus.

Απρ, Δαμ, Birnbaum.

1. Pyra { Domestica } 2. { Dulcia.
Sylvestria. } { Acida.
Acerba.

Vires. Refrig. astring. *δυσωπτα* sunt.
Cocta vero melioris nota censentur, &
ut schola Salernitana habet.

Cruda grauant Stomachum, releuant
pyra cocta grauatam.

Differre tamen viribus, prout sapore
differunt, non difficile est colligere, dulcia
laxant, acida & acerba adstringunt, &c.

N. Arefacta cocta & comesta com-
mendantur in fluxu alui.

P R A E P A R.

Ex pyris vulgaribus fit, 1. Pyraceum
vinum, Germ. *Birnwein*, quod rusticis
nostratibus loco vini inseruit, paratur-
que ad modum quo Vinum.

2. Ex eodem pyraceo fit acetum ru-
sticis nostratibus vulgarissimum.

3. Condita pyra muscatellina cum
decocto proprio.

Q.

CCLXXIII. Quercus.

Απρ, Quercus C. B. 4. Quercus
Matth. Fuchs. Dod. Trag. Lon. Tab. vul-
garia, Lob. Cord. Germ. *Eichbaum*.

OFFICIN. NAT.

Folia, Glandes, earumque Capula,
Cortex, Viscum, Fungus.

Vires. Folia, Grandes, Cortex, Ca-
pula glandum refrigerant, sicc. astring.
Vsu in fluxu alui, vteri, seminis. Ex-
trinsecus in Odontalgia, profluvio vte-
rino, &c.

Viscum, (quod pra reliquis visci ge-

neribus probatur,) calfac. moderatè, sed
paulatim emollit, discut. Vsu pracip. ac
specificè in Epilepsia. Extrinsecus matu-
rat tubercula, parotides, caterosque ab-
scessus (cum Resina ac cera mixtum.)

Fungus quercinus, haemorrhagiam na-
rium ac sanguinem vulnerum, non minus
ac betulinus cohibere dicitur.

P R A E P A R.

1. ∇ stillat. Ex foliis quercuum no-
uellar. Majo collectis.

2. Gluten. i.e. Extractum viscosum è
visco (Bogellein) quod ingreditur non-
nulla Emplastra.

CCLXXIV. Quinque-
folium.

Πεντάφυλλον, Quinquefolium maius
repens flore luteo, C. B. 1. pentaphyl-
lon minus, Brunf. vulgare, Trag. Dio-
scor, Tab. luteum maius, Dod. 1. & 2.
Lon. repens, Cam. Quinquefolium,
Matth. Lob. Germ. *Fünffingerkraut*,
Fünfflat.

Crescit passim locis arenosis, cam-
pestribus. Floret Majo & Iunio.

OFFICIN. NAT.

Herba colligenda cum floribus.
Radix colligenda vere.

Vires. Temperata est caliditate &
frigidityte, sicc. 3. astring. vulneraria
est. Vsu pracip. in affectibus à catar-
rhis oriundis, paralyti, phtisi, arthriti-
de, in vteri humiditate corrigenda, in
sanguinis exspuitione ac tussi, in Ictero,
in obstructione Fpatii & Lienis, obtun-
dit acrimoniam bilis adusta, sistit fluxus
alui, haemorrhoidum, haemorrhagiam
narium. Prodest in calculo ac erosione
Renum, in Hernia, in febribus. Ex-
trinsecus prodest in oculis inflammatis
(succus instillatus) in oris putredine, sa-

BBbb xitate

xitate dentium, abstergit ulcera etiam tam ad hemorrhagiam narium sedan-
maligna. dam commendant.

N. 1. In febribus tertianis exhibent
folia trina, in quaterna quaterna, &c.

PRÆPAR.

∇. stillat. Fit ex herba collecta

N. 2. Sunt qui radicem pugno deten-

Majo.

R.

CCLXXV. Raphanus.

maior orbicularis vel Raph. rotundus domesticus.
Huius loci.
niger. Idem hic cum priori.
Raphanus { minor oblongus. Est esculentus & minus officinalis.
Rusticanus seu marinus. Vide in sequenti.
aquaticus. Non est in usu.
sylvestris. V. Armoracia.

Paparis, papayōs, Arab. Fugell. Ra-
phanus magnus, Lob. Raphanus fati-
uus, Fuchf. Cast. Raphanus rotundus,
Lon. Tab. orbiculatus, Tab. & Ger. Radicula
fatiua, Dod. Raphanus maior orbi-
cularis vel rotundus, C. B. I. Rettich.

Crescit in hortis, gaudet solo hu-
mido.

OFFICINALIA NATIVA

Semen. Radix, sed raro, quia culina-
ris potissimum est.

Vires. Calf. 3. sicc. 2. aper. absterg. at-
ten. Vfus. precip. in calculo atterendo ac
expellendo, vrina ac mensibus ciendis,
in obstructionibus Epatis ac Lienis, &
tenuat mucilaginem viscosam in ventri-
culo, confertque ad distributionem chy-
li, chymique. Extrinsecus apponitur
plantis pedum in febribus, sicuti & Cer-
uici in capitis dolore febrium maligna-
rum comite.

N. De usu interno notandum quod
nauseam & ructus ciere soleat.

PRÆPARATA.

∇ stillat. Ex radicibus.

CCLXXVI. Raphanus marinus
seu Rusticanus.

Raphanus Rusticanus, C. B. 5. sylue-
stris Dioscor. Fuchf. Armoracia aut Ra-
phan. maior, Brunf. Raphan. maior,
Trag. marinus, Tab. vulgaris & rustica-
nus, Matth. Radicula magna, Dod. ru-
stican. Lob. Cam. Germ. Marrettich.

Gaudet solo humido.

OFFICIN. NAT.

Radix, effodienda Martio.

Vires. Calf. & sicc. ad gr. 3. incidit, at-
ten. easdemque cum priori qualitates
habet, sed fortiores: tartaream mucilagi-
nem incidit, ciere vomitum, (si succus vel
infuso in aceto cum melle tepidè assu-
matur & aqua superbibatur.) Specificè
scorbuticis prodest. Calculum pellit, men-
ses ciere. Extrinsecus prodest in febribus
(tertiana & quartana) succus cumo l. pi-
perino dorso inunctus, pulsibus cum ⊖
impositus, vel umbilico applicatus, do-
nec sentiat pruritus.

PRÆPARATA.

∇ stillat. è radicib.

CCXXVII.

CCLXXVII. Rapum & Rapa.

ῥαῖον, Rüben, Arab. Seliom, Selgem, Selgrem. Rapum Dioscor.

longum, femina: Est } rotundum, mas. (sylvestre, quod minus vsitatum.

N. Nomen Rapi omnibus vsuale est.

Vires. Calfac. 2. sicc. 1. Seminis vsus precip. in antidotis, Veneremiet, morbillos expellis, Dosis ῥβ. Radix magis culinaria est, sed ventriculo flatulenta. Succus & Decoctum, leniunt acrimoniam bilis ac asperitatem bronchiorum, aspera que arteria, &c. Extrinsecus imponitur Pernioni (cocta) adhibeturque in gargaris. Vide & Napum.

CCLXXVIII. Rhodia, Radix.

ῥοδία, Radix Rosea, Trag. Matthiol. Dod. Cord. Cam. Fuchf. Lon. & Tab. Germ. Rosenwurtz.

Crescit sponte in Alpibus, solo gaudet umbroso.

OFFICIN. NAT.

Radix sola.

Vires. Natura censetur temperata (Fuchf. calf. & sicc. 2.) cephalica est. Vsus precip. in dolore capitis (cum res. confusa.)

CCLXXIX. Rhodium Lignum.

Aspalathus, Rodiser Holtz.

Aspalathorum 4 quidem modernis innotuerunt genera. 1. Cortice cinereo, Ligno purpureo seu Dioscoridis. 2. Asp. colore buxi. 3. Aspalat. albicans torulo citreo. 4. Aspal. rubens Verum officinis nostratibus non nisi secundum & tertium suppetunt. Prius est Aspalati 1. genus. Lob. Posterius dicitur Rhodium Lignum, quibusdam Agallochum, oleaque Æthiopica, Cord. in D. Agallochum forte, i. e. xyloaloe solida, quibusdam Lignum Rhodium, Rhodifium & aspalathum, aliis oleastrum lignum, Cord. hist. Aspalathus roseus seu 3. Lob.

Vires. Dioscoridi & Galeno calfac. & sicc. & astringit, unde commendabile ad ulcera oris, ad nomas genitalium & sordida ulcera, ad alui fluxus. Verum enim vero an hac nostrati conueniant, cuius licet experiri, Vix enim modernis practicis in vsu est, nisi quod interdum ad renum calculos decoctis incoquatur.

PRÆPAR.

Oleum still. quod communiter pro oleo rosarum habetur.

CCLXXX. Rhapsonticum vulgare,

Rhapsonticum } folio in laciniis pures diuiso, C. B. 1. seu Centaurium maius } folio non dissecto, C. B. 2. Alpinum luteum, C. B. 3.

Ex his vsualius est primum, quod insignitur Rhapsontica, quæ hodie centauria maior, Trag. Cord. Centaurium maius, Lon. Lob. magnum, Matthiol. Dod. Cast. Cent. maius seu Rhapsonticum pharmaceuticum, Cord. in D. Cam. Tab. Germ. grosz tausent gulden Kraut, Rhapsontic.

Crescit in alpibus & vallibus pinguibus apticis, Apuliæ, Sabaudiæ.

OFFICIN. NAT.

Radix.

Vires. Natura est temperata sicc. astring. vulneraria est saporis subdul-

cis ac subracis. Vfus in fluxibus alui, Dysenteria: ciet menses, profluuiumque è contrario sistit: prodest in hernia sanguine coagulato, expuitione sanguinis in febribus stomachicis: Epar aperit ac roborat, summopere laudatus à nullis in obstructione venarum meseraicarum, & in morbis hinc ortis.

CCLXXXI. *Rhaponticum verum.*

Rheum, Rha. Dioscoridis, C. B. 3. Ponticum, Rha antiquorum, Lob. Rhapont. verum officin. Germ. Rhapontic.

OFFICIN. NAT.

Radix, quæ ad nos ex Asia aduehitur.

Eligenda quæ non cariola, rubeus, in ore lentorem referens,

Vires. *Calfac. & sicc. 2. seu mixtura temperata est, terrestris & ignea, saporis subacris. Stomachica, splenica ahepatica. Vfus præcipui in doloribus arthriticis, febribus, venenatorum animalium Itibus, &c.*

PRÆPARATA.

Extract. fl. c.

Vires. *Summum est Cardiacum. Quercet. Phar. Rest.*

CCLXXXII. *Rhus.*

Rhus folio vlni, C. B. 1. Rhus, *Matth. Tab. Rhus coriaria, Dod. Rhus obfo-nior, Lob. Cam. Sumach. Arabum. Lon. Cast. Rhu, Rhoe, Rhus culinarium. Germ. Ferberbaum, Schlingbaum.*

Gaudet solo petroso. Floret Iulio. Fructus fert autumnno.

OFFICIN. NAT.

Semen, Folia.

Vires. *Refrig. 3. sicc. 2. astring. Vfus præcip. in fluxu alui, uteri seu mensium: hamorrhoides compescit, bilem obrundit. Extrinsecus resistit putrefactioni ac Gangrene in paronychio.*

N. Gummi dentibus inditum odontalgiam sedat.

PRÆPARATA.

Succus *Sinnach, i. e. Pulpa sine of-feis feminibus.*

N. Alij *By. Decoct. Rhois ex ramu-sculis & Tamarind. conquassatis mace-rant ac coquunt ad consistentiam. Ta-bern. in Herbario.*

CCLXXXIII. *Ribes.*

Grossularia multiplici acino seu non spinosa, horrenlis rubra seu ribes officinar. C. B. 5. Ribes horrense, *Triag. vulgaris domestica, Matth. Cast. Ri-bes. Fuch. Lon. Tab. Vua Vrsi, Ribesi-um fructu rubro, Dod. Ribes Arabum- Lob. Germ. Johannisbeerlein.*

Rubra, *Huius bacca officinales.*

Nigra, *Vsualis non est.*

Alba. *Et huius bacca in officinas in-feruntur, gratioresque sunt gustu ipsis rubris.*

Coluntur in hortis, maturescunt circiter Festum S. Ioannis.

Vires. *Refrig. & sicc. 2. partium te-nuim: subastring. ventriculo conueni-unt. Vfus præcip. in profluuiis alui, dy-sent. choleram sedant, in febribus bilio-sis profunt, putredini resistunt, sitim re-stringunt.*

N. *Alba ut minus acida, ita minus frigida censenda sunt.*

PRÆPAR.

1. *Condita bacca, cum decocto pro-prio & sacch.*

2. *Rob. de Ribib. simpl. Est succus inspissatus*

inspissatus ad mellis consistentiam
 3. *Rob. de Ribib. compos.* Est syrupus
 ex succo & saccharo $\frac{1}{2}$.
 4. *Vinum*, i. e. succus liquidus.

CCLXXXIV. *Rosa.*

{ *Domestica* *πέδον*, *Rosen*, huius loci.
 { *Sylvestris*, *κνύπος*, *κνύρος*, *ισατος*. Vide
Cynosbatus.

Rosarum varia sunt genera, coloribus ac foliorum multiplicitate differentia. Sic est *Rosa* (*Millesia*) rubra, rubrapallidior, saturatius rubens, purpurea (hæc colorem carnis referens *Zeberina* dicitur.) *Versicolor*, alba, *moscata* seu *Damascena*, spinis carens, subviridis. &c. In officinis autem tria precipue genera vsualia sunt. *Rosæ* scil. rubræ (quæ præstantissimæ) pallidæ (quæ rubris succedunt) & albæ, quæ infimæ fortis. Omnibus tamen laudem præripiunt *Rosæ* *moscæ* s. *Damascenæ*.

Florent Maio & Iunio. Coluntur ubiuis in hortis.

OFFICIN. NAT.

Flores (rubri & pallidi asservantur exiccati.) *Anthera*, i. e. *capillamenta*.

Vires. *Rosæ* ut variant generibus: ita & qualitatibus. Sunt enim qui non sine causa *rosas* partim calidas & acres, partim frigidas volunt, caloremque residere in superficie à frigore scil. eo expulsam, qui in marcescentibus enanescat, in genere tamen omnes refrigerant, ac astringunt. *Spiritus vitales animalesque* recreant, ac roborant. *Pallidæ* seu incarnatæ laxant. *Rubræ* ac albæ astringunt (alba lenius, rubra fortius.) *Vsus* præcip. in fluxionibus, febribus, siti, appetitu prostrato, &c. *Extrinsicis* in vomitu, cephalalgia, vigiliis, dolore auri-

um, *gingivarum*, *sedis, recti intestini* (cum *Vino cocta* & *imposita*;) in ulceribus & inflammationibus oris, faucium, oculorum.

Flosculi lutei capillamenti in medio florum adhaerentes, (*Anthera offic.*) exiccati immiscentur *dentifricis* ad *ginginarum* astrictionem, fluxionumque exiccationem.

PRÆPARATA.

1. *Acetum*, è flor. rubris.
2. *Stillat.* è florib: pallidis (præferunt ad oculos, morbos.)
3. è florib. rubris.
4. albis.
5. *Balsamus*. Ex ol. stillat. & cera depurata.
6. *Conserua*, 1. *ros. rub. recens.*
7. 2. *antiqua.*
8. 3. *Ros. Rub. & ta.*

N. *Præstat ex tempore* tam hanc *conseruam* conficere, affusione scil. *gutricularum* aliquot, quippe que ad tempus asservantur, & amittit colorem & saporem mutat.

9. 4. *Conseru. ros. pallid.*
10. *Elect.* 1. *Rosatam Mesua.* V. D.
11. 2. *de succ. Ros. solidū*
12. 3. *liquidū* } Aug.
13. *Morselli*, i. e. *saccharum rosat.* Ex succo & sacchar.

N. *Morsuli de spec.* è succo rosar. sunt idem quod *Elect. solidius*.

14. *Rotula Manus Christi*, officinis dictæ, simplices & perlata.
15. *Ol. stillat.* ascend. cum spiritu.
16. *Ol. infusum* 1. *vulgare.*
17. 2. *omphacin.*
18. 3. *Compos.* Aug.
19. *Pilula Rosata*, i. e. de aloë rosata.
20. *Spec. Elect. de succ. rosar.* Aug.
21. *Aromatic. ros.* Aug.
22. *Diarrhod. Abb.* Aug.

BBbb 3 23. *Rosat.*

23. Rosar. nouell. Aug.
24. Spiritus, è rosis rubris fermentatis.

25. Syrupi, 1. rosatus simplex, seu laxatiuus simplex. Ex infus. 3. ros. rub.

26. 2. rosat. solutiuus Muscharum, (è Damascen.) Aug.

27. 3. Laxatiu. compos. seu elleboratus. Aug.

28. 4. sine elleboro. Aug.

29. 5. de rosis siccis.

30. 6. Rosatus regius seu Iulep. Rosatum.

31. Mel Rosatum Mesue.

32. simplex.

33. Cirratum.

34. Laxatiuum: fere idem est cum syr. simplici.

35. Tinctura. Fit ex ros. rub. sicc. ℥j. infusis in ∇ rosar. (vel fontanæ) repet. fact. ℔iij additis spir. ☉ vel ☿ris ℥ij. facta digestionem F. Expressio & si opus sit filtratio.

39. Trochise. Diarrhod. Aug.

37. Unguentum rosatum.

CCLXXXV. Ros solis.

Rorella, Saluara. *Sonnendauv*, *Sonthaou*.

Est { folio rotundo.
folio oblongo.

Ex his vsualis quidem, veruntamen non nisi rarissime maior, qui inscribitur Ros solis, *Dod. Lon. Casf.* Rorida siue Ros solis maior, *Lob.* Rorella minor. 1. Tab.

Crescit locis, cæpestribus & palustribus, inter muscum albicantem & subrubentem. Floret Maio.

OFFICIN. NAT.

Herba colligenda quando ☉ in ☉ (medio ☉is) crescente, die sereno ac

calido: asseruaturque sine lotionem. Item succus foliis instar sudoris adhærescens.

Vires. *Dodonæus* facit calid. & sicc. 4. unde internum eius vsus verat: verum enimvero, sunt qui è contra magni faciant, maximopereque commendent ad Phthisin a (quia calidissimo etiam tempore sudat) ad pestem, ad vulnera (in potu, &c.) ad Epilepsiam arcendam & precauendam. Extrinsecus promouere dicitur partum in puerperio (abdomini imposita) odontalgiam sedare (in ore detenta) affectum mitigare maniam (cum collo appensa) curare quartanam (pulsibus 6. horis applicata ac dein hor. 6.) aqua imposita: vicissim pulsibus applicata, idque multoties (10. 12. ies.) a *Forest. lib. 16. 58.*

N. Noni qui infusionem Rorella in aqua vita factam, pro cordiali vsitato habet.

Succus dicitur humiditas, quæ instar sudoris diebus quoque calidissimis, imò in maiori copia, quàm aliàs herbæ adheret, atque concutiendo in patellam suppositam colligitur

Vires. Confortat Cor, Epas ac ventriculum: capitis dolorem à causa calida sedat, pestem precauet ac curat. Extrinsecus adhibetur in affectibus oculorum, dolore, scil. inflammatione, &c.

PRÆPARAT.

∇ stillar. ex tota herba.

CCLXXXVI. Rosmarinus.

Λιβανωτίς, ροσarinu, Rosmarinus, *Brunf. Trag. Fragos. Lon.* Rosmarinum coronarium, *Matth. Lob.* Rosmarinus coronarius, *Cam.* Rosm. coronaris, *Dod.* Hortensis angustiore folio, *C. B. 1.* Libanotis coronaria, *Cord. in D. Germ.* Rosmarin.

Crescit

Crescit in locis apricis, Floret Maio, Iunio.

OFFICIN. NAT.

Folia, Flores (specialiter Anthos offic.) Semen.

Vires. Cal. & sic 2. lenta incidunt, saporis sunt mixti acris, amari: subastring. cephalica sunt & precipuis, ut & uterina. Usus precip. in affectibus Capitis ac Nervorum, Apoplexia, Epilepsia, Paralyssi, Vertigine, Caro, &c. Visum acuum, faotorem anhelitus emendant. Epatis, Lienis ac uteri obstructiones resoluunt, Ictero ac fluori albo mulierum medentur, corque confortant. Extrinsecus profunt, in catarrhis (suffitu) & exinde natis affectibus. In utero corroborando, &c.

N. Flores asseruari possunt per biennium.

PRÆPARATA.

1. ▽ E planta integra.
2. Ol. stillat. Vna cum ▽ exstill.
3. Balsam. Fit ex oleo l.c.
4. Conserua. Ex floribus Anthos.
5. Species. Dianthos.

CCLXXVII. Rubia.

Euphrasia, Rubia tinctor. fatiua. C.B. 1 Rubia, Cord. in D. Dod. Lob. Clus. Rub. fatiua, Brunf. Matth. Fuchf. Lon. Cast. Germ. Roche, Ferberæthe, Ferberwuriz.

Adfertur ad nos ex Silesia, vbi copiosè feri colique. solet. Gaudet solo pingui; floret, semenque fert æstate.

OFFICIN. NAT.

Radix sola, collecta Maio ac Iunio.

Vires. Cal. 2. sic. 3. (al. refrig.) aperit. disc. dissol. subastr. Vulneraria est. Usus precip. in obstruct. Epat. Lienis & in primis uteri. Proin in Ictero, Hydro-

pe, Urina obstructa, sanguine coagulato. Extrinsecus in obstructione mensium (in pessis.) &c.

N. Adhibetur & à Tinctoribus ad coloris rubri preparationem.

CCLXXVIII. Rubus.

Rubus officinalis est vulgaris. Huius loci idæus. Loci sequentis.

Insignitur: Rubus vulgaris seu iubus fructu nigro, C.B. 1. Bat. & græc. Sentis Latin. Rubus, Dioscor. & Plinio. Rubus, Brunf. Matth. Fuchf. Dod. Cord. in D. Lon. Lob. Cast. Rubus grandis & secundus, Trag. Rub. aruensis, Tab. Germ. Brombeer, Bromen.

Crescit inter dumeta. Florescit initio ætatis, maturescit in fine eiusdem.

OFFICIN. NAT.

Folia. Fructus (Mora rubi, mora bati, bati, Bérna.) Radix, sed raro.

Vires. Folia ac Fructus immaturus refriger. sic. astring. potenter. Fructus verò maturus caliditate est temperatus ac subastringens. Usus precip. in quibuscunque profluuiis, vomitu, fluxu alui, uterini. Extrinsecus in aphthis, aliisque oris affectibus abstergendis, in vulneribus astringendis, capillos nigrat, scabiem curat.

Radix lithonriptica censetur, sed rari usus est.

PRÆPARATA.

1. Rob. Diamoron. simpl. Ex succo fructuum immaturor.
2. Diamoron. compos. V. Disp.
3. Diamoron Nicolai vsitatum, Vid. Disp.

CCLXXIX. Rubus idæus.

Rubus

Rubus idæus { spinosus. *Hic vsualis.*
 { læuis.
 { fructu albo.

CCXCI. Ruta.

Inscribitur rubus idæus spinosus, C.B. 3. *Bat. & istia*, rubus idæus, *Trag. Matth. Dod. Lob. Lon. Cast. Tab.* Rubus idæus exilibus spinis, *Cord. in D.* Rubus id. vulgaris, *Clus. Germanicè Hindtbeer.*

Crescit ittdem inter dumeta. Floret initio æstatis, maturefcit Augusto, &c.

OFFICIN. NAT.

Fructus.

Vires. *Easdem vires obrinent, quas precedentia mera, cordiales tamen præiis peculiariter censentur.*

PRÆPARATA.

1. ∇ ex baccis.
2. Syrup. Ex succo fructus & saccharo.
3. Acetum. Ex fructibus infusis.

CCXC. Ruscus.

Özuvvshn, Ruscus, *Matth. Trag. Cord. in D. Lob. Cast. Cam. Tab.* Ruscum, *Dod. Myrthacantha, Lob (icon.)* aliis Bruscus & Bruscum. German. *Manszdorn.*

Crescit copiosè, in Italia, vt & quibusdam locis Germaniæ. Locis gaudet asperis. Primo vere turiones promit, autumno semen.

OFFICIN. NAT.

Radix.

Vires. *Calf. & sic. temperatè, saporis est austeri & subamari, incid. atten. aperit. Vfus præcip. in obstructione Epatis, vrina, (stranguria.) Mensium, &c.*

N. Recensetur inter 5. Radices aperientes.

Πύραρος, Ruta hortensis, *Rautens*, *VVeinraut.*

Ruta est C.B.	} Hortensis	} 1. latifolia.	} 2. tenuifolia.	} <i>huius loci.</i>			
					} Sylvestris	} 3. major.	} 4. minor.
		} 5. flore magno albo.	} <i>ra.</i>				

Ornat officinas hortensis vtraque è quibus vulgarior quidem est latifolia, caquq maior, cæsiq coloris: præstantior verò tenuifolia minor & nigricantior.

Latifolia inscribitur Ruta, *Brunf. Matth. Cast. Domestica, Trag.* Hortensis, *Fuchf. Lob. Cam. satiuua, Cord. in D.* graueolens hortensis, *Dod. latifolia, Tab.* Ruta hortensis latifolia, C. B. 1.

N. *Hac diligenti cultura arborefcere solet, cuius exemplum nobis præbuit huius Ciuitatis cuius è primariis Phil. leutvvein.*

Angustifolia insignitur Ruta hortensis altera, C. B. 2. Ruta hort. minor, *Trag. Ruta satiuua tenuifolia, Cord. in D.* Ruta tenuifol. *Tib.*

Gaudet solo arido ac calido: Floret Iunio.

OFFICIN. NAT.

Herba ac Summitates cum seminibus.

Vires. *Calf. & sic. 3. incid. atten. diger. discut. est alexipharmaca, cephalica ac neruina. Vfus præcip. in variis morbis, peste aliisque affectibus malignis præseruandis ac curandis, venem arcendo, visu acuendo, lasciuia reprimenda, pluritudine curanda, imbecillitate ventriculi corrigenda, colica distentanda, morsu canis rabidi debellando, &c.*

Extrinfecus

Extrinfecus in iētibus serpentum, carbunculis, in februm paroxysmis arcendis (in un. et. dors.) Cephalalgia ex crampula, hemicrania, in febribus malignis (pro Epithemate pulsum cum ☉ & ♃) in dolore capitis februm ardentium & malignarum. (Similiter pedum plantis adhibita.

N. Nihil vsus internus officit grauidis

PRÆPAR.

1. ∇ Still. Ex planta cum cauliculis Maio collectis.
2. Oleum stillat. Cum ∇.
3. Oleum infusum. Ex infusa herba in oleo communi.
4. Sal. Ex herba incinerata.
5. Acetum. Ex infusione.
6. Balsamus. Ex ol. stillat.

CCXCII. *Ruta muraria.*

Ruta muraria, C.B. Dod. Ger. Capillus ♀ is, Brunf. Trag. Adiantum candid. Cord. in D. & hist. Ad. album, Lon. Cam. Tab. Adian. nigrum. Casalp. Gesn. Saxifraga seu Empetron, Fuchf. Paronychia, Matth. Cast. Salvia vitæ, Lob Germ. Maurrauten, Steinrauten, Benschhaar.

Nascitur in parietibus ac muris iuxta aquas, locis videl. irriguis & non apricis. Viuax est toto anno, æstate tamen amplius viret, flore & semine caret

OFFICIN. NAT.

Folia seu herba cum caule.

Vires, Calid. & frigid. temperata est, siccatur, digerit, discutit. ☐ eam & viscosum mucilaginem in Pulmonibus, &c. incidit. Vsu præcip. in tussi, asthmate, pleuresi, iētero, obstruēt splenis. Valet ad Renum & vesicæ dolores, urinam clemēter ciet, calculosque expellit. Peculia-

riter præstare eam perhibet Matth. ad Enterocelas puerorum (& 40. pulvis exhibitus, & sim.)

Extrinfecus capillos crescere facit, ulceraque manantia capitis abstergit, strumas & abscessus digerit.

N. 1. Vbi Adiantum verum & Trichomanes desunt, aut vetusta sunt, hoc uti licet. Hec sumenda quoque vbi Medici recentiores Adiantum præscribunt à capillo ♀ diuersum, C.B.

N. 2. Matthiolus hanc Paronychiam Dioscoridis esse disputat, contra Dodonaum, qui id negat.

S.

CCXCIII. *Sabina.*

B. dydus, Sauina, Seurtbaum, Slebenbau. Sabina } Tamarisci. Hac vsualis.
folio } Cupressi. 1. & 2.

Dicitur Sabina, Brunf. Trag. Fuchf. Dod. Lob. vulgaris, Cam. Sabin. Myrtifolio, Cord. in D. Sauina, Lon. Sauina mas, Tab. Sabina folio Tamarisci Dioscorid. C.B. 1.

Colitur in hortis: Viret perpetuo.

OFFICIN. NAT.

Folia.

Vires. Calf. & sicc. 3. partium tenuium, incid. atten. discut. Vsu præcip. in mensibus fortiter ciendis, sætu eiiciendo, vrina pellenda, asthmate medendo. Extrinfecus in affectibus vterinis, ulceribus serpentibus arcendis, scabie præcipue capitis infantum exiccanda ac curanda (cum cremor. lactis.) in maculis faciei abstergendis.

PRÆPARATA.

∇. Ex foliis.

CCXCIV. *Salix.*

CCc

1710

It'as, VVeiden, VVeidenbaum.

Salix multorum est generum, quæ sine discrimine in vsum medicum accersi poterunt.

Crescunt in locis vdis: Florent Majo & Aprili.

OFFICIN. NAT.

Folia, Iuli, Cortex & Viscum.

Vires. Folia refrig. & sic. substring. citra morsum. Vsu præcip. in libidine arcenda. (Decoctum potum.) Extrinsecus in lotionibus pedum pro virgilitis ac astu febricitantium arcendo, in

hemorrhagia vulnerum, narium, & sim. abstringenda. In aere refrigerando (strata in panimento.)

Iuli sistunt hemorrhagiam quamcumque (impositi.)

Cortex similem facultatem habet. Insuper verrucas & clauos pedum corticum cinere (cum imposito) extrahi tradit Dioscor.

Viscum commendatur præ aliis ad partim facilitandum.

PRÆPARATA.

▽ stillat. è tollis

CCXCV. Salvia.

Ἐλισσαίον, Arab. Elissacos, Salben.

Maior, Breitsalben.

Est } Minor acuta, nobilis, Spitzsalben, Creutzsalben, } sunt vsuales, sed minor
Edelsalben. } præstantior est.

Syluestris. Hæc officinis ignota, aliàs conuenit viribus cum Hormino.

Major inscribitur, Salvia latifolia, Trag. Lon. Clus. Cam. Salvia major, Matth. Fuchs. Dod. Cast. Tab. Salvia, Cord. in D. major scabrior. Dioscor. Lob. C. B. 1.

Hæc variat in foliis & floribus: foliis est viridibus, iisque crispis & non crispis, purpurascens, versicoloribus: sic vel totis vel partim albidis, floribus communiter cæruleis, rarius candidis.

Minor vocatur. Salvia minor aurita & non aurita. C. B. 2. Salvia nobilis, Brunf. angustifolia & minor, Trag. Salu. minor, Matth. Fuchs. Cord. in D. Lob. Tab. pinnata Pena, Salvia acuta, Lon. angustifol. Clus. Salu. tenuifolia auriculat. Cam.

Variat foliis auritis vel pinnatis & non auritis: foliis aliquando Lauendulæ concoloribus, sed latioribus & grauioris odoris: rarius luteolis, flore

cæruleo, rarius albo.

Gaudet solo fecundato argilla, &c. Floret Iulio ac Augusto. Transplantatur Martio, cum ruta intermixta, quæ Serpentes & Bufones saluiæ viciniam amantes arceantur.

OFFICIN. NAT.

Folia, Flores.

Vires. Calf. 1. sic. 2. substring. absterg. Vsu præcip. & diureticus: menses ob crassitiam remoratos ciet, nimios emendat. Prodest in paralyti, vertigine, tremore, catarrhis. Extrinsecus aphthas oris abstergit (in gargaris.) &c.

PRÆP. R.

1. ▽. Ex herba cum floribus.
2. Oleum stillat.
3. Sal. Ex herba incinerata.
4. Conserua. Ex floribus.

CCXCVI. Sambucus.

Arti, Sambucus, *Holderbaum*, *Hollunder*.

§ *Vulgaris. Huius loci.*
§ *Humilis. Vide Ebulus.*

Insignitur, Sambucus fructu in umbella nigro, C. B. 1. Sambucus, *Brunf. Maith. Fuchf. Dod. Lon. Lob. Tab.* Sambucus vulgaris, *Trag.* Domestica, *Cast.* Sambucus Campestris seu vulgaris, *Cam.*

Gaudet locis opacis, sepibus, pomeriis & asperis vallibus. Floret Maio, Iunio, Iulio. Bacca maturefcunt Augusto.

OFFICIUM NAT.

Flores, Bacca, Liber, Spongia, Turiones.

Vires. Sambucus integra calfacit & siccatur, resoluunt, hydropicos iuuat.

Flores discutunt insuper, emolliunt, resoluunt, sudoriferi ac anodynii sunt. Vfus precip. intrinsecus in Erysipelate precauendo & abigendo, quartana curanda. Extrinsecus in colico dolore, in Erysipelate, combusti, &c. (impositi.)

Bacca sudorifera itidem sunt ac alexipharmaca.

Liber (cortex interior) educit serosos humores. Extrinsecus easdem vires habet, quas flores.

N. Ellgendi cortices radices.

Turiones & Germine adhibentur in acetariis, aluumque mouent & nonnunquam etiam vomitum, precipue si sursum decerpantur, idem facit & puluis.

Spongia (Auricula Inda) oculorum affectibus medetur (macerata in aqua propria & imposita.)

N. 1. Sunt qui infusum spongia bibunt ad hydropis curam.

N. 2. Sambucum, visci instar, in salice nascentem, pro peculiari commendant anti-epileptico.

PREPAR.

I. E FLORIBVS.

1. *Stillat.* Ex flor. l.a.
2. *Spiritus.* Fit rectificatione stillat. vel ex floribus in dolio querno fermentatis.

3. *Vinum.* Ex flor. in umbra exiccatur. ℥j. circiter, infundantur musti mensuris 8.

4. *Oleum infusum.* In ol. cydon.

5. *Oleum stillat.* Cum stillat, sed raro prostat.

N. Potest idem elici hoc modo. Ex Flor. q. v. macera cum Vino Maluatico vel Hispanico vitro bene ocluso calore solis per tempus (septim. 6.) hinc exprime fortiter, ac moderatè calfacito: sic supernatabit oleum. Blochvitz.

II. E BACCIS.

1. *Rob. Sambuci.* Ex pulpa baccar. maturarum.

Vfus est frequentissimus ad sudorem ciendum. Prodest & peculiariter in affectibus vterinis, assumptum. Extrinsecus imponitur ad refrigerandum: quin & plantis pedum in febribus inungitur.

2. *Tinctura ac Extractum.* Fiunt ex Rob. Sambuci (Quercetanus ex baccas umbra exiccata) beneficio V (qui acidulus redditus sit cum liquore acido aut C i aut A is.)

N. Dicitur Tinctura antequam V fuerit separatus. Extractum si idem V abstractus sit.

Vires. Suffocationi vterina succurrit. Dos tinctura, cochlear β. Extracti ℥j.

3. *Spiritus.* Fit è succo ex baccis maturis expresso vel ex baccis ipsis saltem contulis & fermentatis, l.a.

N. Sunt qui baccis exiccatis crasse qui contusis farina hordeac. addunt, Cccc 2 affusaque

affusaque ∇ feruente digerunt.

4. Oleum. Ex arillis baccar. post succi transcolationem in filtro relictis; videlicet hæc benè elotæ & in aëre exiccata, Vino albo irrigantur ac fortiter exprimuntur.

Vires. Est vomitium egregium.

Dosis \mathfrak{z} j. vel $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$. in cereuisia tepida, &c.

N. Non est officinale.

His \mathfrak{s} . addi potest *Tragæa granorum Aëtæ*, *Quercetani*: \mathfrak{z} . succum baccar. maturat. expressat. q. v. adde farinam secalinam, fac pastam & exinde panes exiguos, in furno ad duritiem biscocti coquendos. Hos puluerisa, puluerem cum eodem succo iterum impasta, atque ut prius in furno coque, idque tertio repetatur. Tandem puluerisa ac serua.

Vires. Specificum est arcanum aduersus dysenteriam.

Dosis. \mathfrak{z} j. cum Nucis \mathfrak{z} j.

N. Anatomiam Sambuci conscripsit Martinus Bloch *Witzius*, M. D. in qua & præparationes & vsus sambuci in plurimis affectibus curandis exhibet.

CCXCVII. Sanguisorba.

Pimpinella sanguisorba. Sorbaria, *Welsch Bibenell*.

{ Maior.

{ Minor { *Hirsuta. Hæc sola officinis cognita.*

{ *Læuis.*

Dicitur Pimpinella sanguisorba minor hirsuta, C. B. 7. Pimpinella, *Lob. Italica*, *Trag. Lon. minor Pimp. sanguisorb. Dod. minor, Matth. Cast. Cam.*

sanguisorba minor, *Fuchf. Cord. hist. Tab.*

Colitur nobis in hortis. Floret Maio & Iunio.

OFFICIN. NAT.

Herba cum floribus. Radix.

Vires. Refrig. moderatè sicca, astring. *Vulneraria ac pulmonica est, saporis grati. Vfus præcip. in catarrh. affectibus pulmonum, phthisi, ex erosione, in morbis malignis, in profluuiis, alui, hemorrhoidum: præcauet abortum Extrinsecus in hemorrhagia quacunquè utiliter adhibetur.*

PRÆPARATA.

1. ∇ stillar. Ex integra planta cum radice ac floribus collecta Iunio.

2. Syrupus. Ex succo & saccharo.

3. Conserua ex floribus

CCXCVIII. Sanicula.

Sannicula officinar. C. B. Sanicula, *Trag. Brunf. Cam. Tab. Dod. Lon. Diapensia, Branf. Matth. Cast. San. mas, Fuchf. Sanic. & diapensia. Lob. Ger. Germ. Sannickel. Sanickeil.*

Crescit in montibus ac vallibus: solo gaudet pingui ac opaco: colligitur Iunio mense cum floribus.

OFFICINALIA NATIVA

Folia raro Radix.

Vires. Calf. & sicca, astring. saporis est amari. vulnerari aque una ex præcipuis, utilis in consolidandis ulceribus, fistulis, rupturis, erosionibusque, tam interne quam externe adhibita.

PRÆPARATA.

∇ . Ex herba florente.

Santalum (Album, *Matth. Lon. Cord. hist. Cast. Garz. Tab.*
Rubrum, *Matth. Lon. Cast. Garz. Tab.*
Sandel, Citrinum, *Cord. hist. Lon. Flauum, Tab. Pallidum, Matth. Garz.*

Ligna sunt exotica ex Indiis ad nos transportata.

Præstantissimum est, citrinum, succedit album, infimas tenet rubrum, planè inodorum. Eligendum autem citrinum suauiter fragrans, magnam habens medullam, graue, nodosum. Huius in defectu recipi potest album.

Vires. Refrig. 3. (al. 2.) sicc. 2. aperiuunt, Epatica sunt, ac cardiac. Vfus præcip. in lipothymia, palpitatione cordis, obstructione Epatis, &c. Extrinsecus in catarrhis, Cephalalgia, Vomitu, Epaticis intemperie calida (in Epithemat. &c.)

N. Santalum rubrum magis refrigerat ac astringit, quam reliqua.

PRÆPAR.

1. Extractum Gummosum. Fit vt aliorum lignorum extracta cum ∇ .

N. Quercetanus parat Δ am ∇ aliqua Epatica. E.g. Agrimonia.

2. Spec. Diatrion Santal. V. Dis.

3. Unguentum Santalinum. V. D.

4. Cerotum seu Emplastrum Santalinum. Vide Disp.

5. Trochisci de Santalis. V. Disp.

CCC. Santonicum.

Abfynthiacum { Iudaicum.
Santonicum, { Alexandrinum. Hu-
 { ius semen officinale
 { solum.
Vurmkyant { Ægyptiacum.
est C. B. { Gallicum.

Insignitur Semen sanctum seu Sementina, *Matth. & Semen Zedoaria, Lob. Cast. Abfynthium Scriphium,*

Alexandrinum. Semen Cina, *Cord. Sementina, Dod. Tab.* (cui & Santonicum.) Santonicum & semen sanctum.) *Lon. German. Zidvvensamen, VVrmsamen.*

OFFICIN. NAT.

Semen quod affertur ex Alexandria Ægypti.

N. Sunt qui & ex absynthio (santon.) Ægyptio, semen zina colligi volunt. Hoc videatur apud *Matth. Dod. Lob. Tab.*

Vires. Calfac. & sicc. saporis amari est. Vfus in lumbricis cuiuscunque generis enecandis, fugandis & expellendis

PRÆPAR.

1. Semen santonicum præparatum. i. e. in \times . σ ρ (4. 5.) maceratum atque exiccatum.

2. Confectio seminis Cina, vberzogen *VVrmsamen.*

CCCI. Saponaria.

$\Sigma\tau\eta\delta\eta\tau\eta$, *Diosc. Fuchf. Lon. Saponaria, Trag. Dod. Lob. Tab. Cam. Ger. viola agrestis, Trag. Saponaria maior læuis, C. B. 1. German. Seiffenkrout, Speichelvurtz.*

Crescit passim iuxta riuulos & vias: Floret Maio.

OFFICIN. NAT.

Folia sed raro & Radix.

Vires. Calf. & sicc. strenuè attenuat, aperit, sudorifera est. Vfus in asthmate, utero, mensibus ciendis, lue Venerea. Extrinsecus ptarmica est, tumores ac præcipue prauos discutit.

CCC 3 CCCII.

CCCII. *Sarsaparilla.*

Salsa parilla, smilax aspera Peruuiana, C. B. 4. Tab. Ger. Zarcaparilla, Matt. Mon. Garz. Zarcaparilla Peruuiana, Dod. Zarza seu sarsaparilla, Cast. sarsaparilla, Lon. Trag. Lob.

Nomen accepit à similitudine quam cum smilace aspera (Hisp. Zarza parilla) habet.

Triplex est ea. (Nicol Monardo momento) adfertur scil. 1. Ex Hispania noua, quæ candidior ad pallorem tendens & gracilior. 2. Ex Prouincia Honduras, quæ cinerea nigrior & crassior, priorque melior est. 3. Ex Prouincia Quitto, locis Vrbi Guaiacil vicinis (vnde Zarcaparill. Guaiacillana dicitur,) quæ ex cinereo nigricans, maior & crassior adhuc est cæteris.

OFFICIN. NAT.

Radix lignosa, prælonga, fibrosa, vniformis.

Eligenda quæ coloris aliquantulum nigri, recens, (non cariota, grauis, flexilis, nec fragibilis.

Vires. Calfac. moderatè sicc. partium tenuium sudoriferaque. Vfus præcip in lue venerea, quam specificè cura, in Catharris atque inde natis affectibus, E. g. Arthritide, &c.

CCCIII. *Sassafras.*

Arbor est prægrandis, nascens in Florida, folio ficulneo, cortice ex fuluo nigricante, aliquantulum acri sapore, sed aromatico, odore fœniculum redolente.

Dicitur pauama seu sassafras, Mon. Frag.

OFFICIN. NAT.

Lignum & Cortex, qui præfertur

ligno, maxime si ex radice sit, quippe radix reliquis partibus præualet, adeoque & eius cortex.

Vires. Cortex calf. & sicc. ad gr. 3. Lignum calf. & sicc. 2. atten. aperit, discut. sudores mouet. Vfus præcip. in omnibus morbor. genere, præsertim obstructions tollendis, partibus internis roborandis, in sterilitate emendanda & venerea lue curanda.

N. Instar Panacea in Catarrhis habetur.

PRÆPARAT.

1. Extract. Fit. l. a. Vid. l. 2.
2. Ol. stillat. Vid. l. 2.

CCCIV. *Satureia.*

Θύμρα, Σύμρα, Saturen, Sengenkrant.

Satureia est C. B. {
 1. Hortensis seu cunila fatiua. Hac vsualis.
 2. Montana.
 3. Spicata.
 4. Cretica.
 5. Thymi folio.

Insignitur Hyslopus agrestis, Brunfels. Satureia, Trag. Lon. Dod. Lob. Tab. Cam. Sat. altera, Matth. fatiua, Eufsc. Cord. fyluestris, 2. Cast.

Colitur in hortis. Floret integra ferè ætate.

OFFICIN. NAT.

Herba cum floribus.

Vires. Saporis ac odoris est acris ac calidi, vnde & calida ac sicca censetur gr. 3. atten. aperit, disc. Vfus in affectibus ventriculi: cruditate, anorexia, &c. Pectoris: asthmate, vteri, mensibus obstructis: visum acuit. Externè secus discutit tumores, doloresque aurium sedat.

N. Pulices necare dicitur strata in Cubili.

PRÆPA.

P R Æ P A R.

1. ▽. Ex herba florente.
2. Oleum stillat. cum ▽a.

CCC. *Satyrium* seu *Orchis*.

Satyrium seu *Orchis*, Germ. *Rnabenkraut*, *Stendelwurtz*.

N. *Dioscor.* distinguit inter *Orchides* & *Satyria*, *orchides* que vocat, que radicem bulbosam habent, eamque geminam: *Satyrium*, quod unicam, *Plinius* vero utraque confundit.

Genera *Orchidum* seu *Satyriorum* passim quamplurima nascuntur, quæ etsi promiscue in usum accersi queant attamen eligunt officinæ præ reliquis *cynosorchim*.

Crescunt in *Campestribus*, *Syluis* ac *Vineis*: Florent *Aprili* & *Majo*.

O F F I C I N. N A T.

Radix cuius bulga distentior eligenda, rejecta flaccidiore. Colligitur incunte vere vel exeunte *Autumno*.

Vires. *Calf.* & *hum.* saporis dulcis.

Ufus *pracip.* (ex signatura *lascina*) ad virilem fortitudinem restaurandam. Sic & uerum confortare creditur & ad conceptionem disponere.

P R Æ P A R A T A.

1. *Condita Radix*. ꝑ. *Orbiculum* distentiosem, purga bene ac coque: hinc exicca ac confice saccharo.

2. *Electuar.* *Diasatyrium*. V. D.

3. *Extractum* seu *sanguis*: Fit ex radice conuassata & cum paneatque vino (V) digesta. Vide l. 2. & *Quercet.* in ph. R. c. 26 *Ab Heet.* obseru. 8. qui ita parat: ꝑ. *Rad. Satyr.* aquæ iniice, duobus quibus constat orbiculis diuisis, quæ fundum petierint (abiectis quæ supernant,) contuu-

de ac adde sensum *micas panis alb.* ac propter lentoris dilutionem *Ve maluatico*, ut irroretur. Dein digere in *MB* vase clauso septim (6.) Tum exprime, expressum iterum per mensen digere. Innabit liquor rubicundus, hunc inclinando collige abiectis fecibus. Hinc paratur *Extractum* compositum. *Vid. l. 2.*

CCCVI. *Saxifraga*.

Saxifraga, *Lon.* *alba*, *Trag.* *Dod.* *Fuchf.* (icon.) *Cam.* *Tab.* *Saxifraga*, *Brunf.* *major*, *Fuchf.* *Saxifraga alba chelidonides*, *Lob.* *Saxifr.* *alba tuberosa radice*, *Clus. hist.* *German.* *Steinbrech.*

Crescit in locis asperis ac sabuosis: Floret *Maio*.

N. *Sunt* & *alia saxifragarum genera*, verum officinis vel alio nomine ueneunt, vel iniustata sunt. Sic est *saxifraga lutea*. 1. *Melilotus rubra*. 2. *Filipendula saxifraga*, *Pimpinella*. *Vide suo loco.*

O F F I C I N. N A T.

Folia cum floribus, *Radix* quam *Semen* uocant.

Vires. *Calfac.* & *sicc.* euidentissime (3.) *diuretica* est, aperit. *Ufus* *pracip.* in *sabulo* ac *calculo Renum* ac *Vesicae* atterendo, & expellendo, tum & in *menstruagine* *corundem* attenuanda: in *mensibus obstructis*. *Extrinscus* in *balneis diureticis*.

P R Æ P A R A T A.

▽. Ex planta integra, *Majo* collecta.

Scabiosa } Pratenfis & aruenfis, va-
 C. B. est } riarum Specierum, ex
 } quibus *vsitata est*, C. B. 1.
 } Montana. Variarum spe-
 } cierum.
 } Capitulo globofo. Varia-
 } rum Specierum.
 } Stellata. Variar. Spec.

Dicitur scabiosa pratenfis hirsuta,
 C. B. Scabiosa, Lon. vulgaris, i. u. h. f. ma-
 ior, Cast. aruenfis, Tab. (cui & maior
 flore caeruleo purpureo.) Scabiosae 1.
 genus, Tab. Scab. segetum, Ger. German.
 Scabiosen, Apostem raut,
 Grindkraut.

Crescit in aruis. Floret Iunio.

OFFICIN. NAT.

Radix (colligenda vere.) Folia, Flores.
 Vires. Calf. & sicc. vsque ad 2. ab-
 sterg. atten. discut. sudorifera, alexiphar-
 maca ac pulmonica est. *Vsus* prap. in
 apostematibus (unde & nomen habet)
 pleureti, angina, tussi, asthma, peste, fi-
 stulosis seu manantibus ulceribus
 (mammarum, crurum, &c.) Extrinsicus
 in scabie, pruritu, impetigine ac prapue
 in achoribus ac tinea capitis (Erbgrind)
 in furfuribus ac lendibus capitis, in sug-
 gillatis, maculis faciei, dolore hemor-
 rhoidum (in suffitu vaporoso.)

N. Radix scabiosae maioris flore pur-
 pureo, specificè curare dicitur L. vene-
 ream, adeo, ut salsa parilla vel parum,
 vel nihil cedere censeatur.

PREPAR.

1. ∇. stillat. Ex integra planta cum
 radice ac floribus.
2. Sympus. Ex succo & saccharo.
3. Conserua. Ex floribus
4. Sal. Ex planta incinerata.

Σχινος, Σχινωδο, Lon. Iuncus odo-
 ratus, Matth. Lob. Clus. Cast. Squinan-
 thum officin. fenum Camelorum.
 Stramen Camel. Camelsheer, Camel-
 stroh.

Affertur ex Arabia.

OFFICIN. NAT.

Culmi seu furculi (stramen) Flores,
 Radix.

Vires. Calfac. subastr. tenuium est
 partium, discutit. *Vsus* prap. in obstru-
 ctis mensibus, Epate, Liene, in Ventricu-
 li inflatione, vomitu ac singultu, in vrina
 difficultate, Renum, Vesicae ac Vieri do-
 lore. Extrinsicus corrigit fatorem oris,
 roborat caput (lorione) discutit vula tu-
 morem, roborat ventriculum, &c.

CCCIX. Scolopendrium
 verum.

Σκολοπενδριον, Scolopendrium, Arab. Scolofen-
 drion, Ceterach Officinis, Scolopen-
 drium, Cord. vera, Trag. Lon. A splenum
 num & nion, Matth. Lob. Cast. Cam-
 Dod. Cord. in D. Germ. Miltzkraut.

{ Scolopendria vera. Hic describitur.
 { Vulgaris. Loci sequentis.

Crescit in rupium fissuris, locisque
 asperis sine floribus.

OFFICIN. NAT.

Folia collecta Septembri.

Vires. Calfac. & sicc. saporis acerbis,
 absterg. spleneticum est. *Vsus* prap. in
 duritie Lienis, Ictero, febris quartana:
 vrinam mouet, calculum comminuit,
 menses ciet, semen imminere creditur
 (illum nocte effusum.)

N. Dioscorides folia in + serue facta
 ac per dies 40. pota, Lienem absumere
 scribit.

PRÆPAR.

Syrupus de Scolopendria. Ex meris splenicis fit V.D.

CCCX. Scolopendria vulgaris.

Quod dicitur, Lingua ceruina officin. C. B. Scolopendrium, Brunf. Scolop. vulgare, Matth. Dod. Cord. Lob. Harmonitis, Fuchf. phyllitis seu lingua ceruina, Tab. Germ. Hirschzung.

N. Scolopendria vulgaris vel lingua ceruina dici potest, ad differentiam Ceterach.

Crescit in syluis, locisque umbrosis ac opacis, in puteis. Vitet per totum ferè annum.

OFFICIN. NAT.

Folia.

Vires. Refrig. ac sicc. subastring. at- ten. Splenica itidem ac Epatica sunt. Vfus præcip. in Liene tumido, fluxualui, expuitione sanguinis. Extrinsecus mundificant vulnera ac vulcera.

PRÆPAR.

∇. Ex foliis.

CCCXI. Scordium.

Scordium, C. B. i. Trag. Matth. Dod. Lon. Lob. Cast. Cam. Tab.

CCCXII. Scorzonera.

Scorzonera { 1. Hispanica. Hec vsualis.
Latifolia { 2. Germanica, Tab. Boemica, Matth. Lob.
3. Foliis neruosis, Germanica angustifol.
4. Humilis neruosa, Pannonica, Tab.
Angustifolia.

Dicitur Scorzonera, Dod. Lon. Lob. C. B. i. aliàs Viperaria, Schlangenmord. C. B. Hispanica, Matth. Cast. Tab. (cui & Germanica i.) Scorz. latifolia sinuata,

minus, Ger. Getm. Wasserbathenig, Lacken Knoblauch.

{ Maius, quod vsitatus est.
{ Minus.

Crescunt in locis humidis. Florent Iunio ac Iulio.

OFFICIN. NAT.

Folia.

Vires. Calf. & sicc. 2. absterg. atten. incid. putredini resistit, alexipharmacum ac sudoriferum est. Vfus præcip. in peste, pestilentialibusque morbis, febribus malignis (tam præseruando, quàm curando) in obstruct. Epatis ac Lienis, in Palmonibus purulentis ac mucilagine refertis. Extrinsecus mundificat vulnera ac ulcera: Lenit dolores podagricos.

N. Sunt qui in mensium profusio cum successu exhiberi velint.

PRÆPARATA.

1. ∇ stillat.
2. Succus inspissatus.
3. Syr. de scordio simpl. Ex succo & saccharo.
4. Compos. Hier Mercurialis. Vide Disp.
5. Conseru. ex fol.
6. Elect. Diascordium. Fracastorij. Vide Disp.
- Dosis a ℥j. ad ℥ij.
7. Sal. Ex cinere.

OFFICINALIA NATIVA

Radix.

DD d d Vires

Vires. *Calf. hum. i. alexipharmaca est. Usus pracip. in moribus serpentum, peste, melancholia, epilepsia, vertigine. &c. Quin commendatur maximopere ad uteri suffocationem.*

PRÆPARATA.

1. Δè radice.
2. Extractum.
3. condita Radix.

CCCXIII. Scrophularia.

Scrophularia, *Matth. Dod. Cast. major, Brunf. Lon. Lob. Cam. Tab. Ger. nodosa fœtida, C. B. i. Ocymastrum, Trag. Galeopsis, Fuchf. Aliis Ficaria, Ferraria, mille morbia Castrangula, Braurvvurtz, grosz. Feigvvuaritzenkraut Knodenkraut, Savvvurtz.*

Crescit in locis umbrosis, iuxta sepes ac in cœmiteris. Floret Iunio ac Iulio.

N. Est & fœmina dicta qui non nisi in locis palustribus nascitur, sed priori bonitate cedit.

OFFICIN. NAT.

Radix nodosa.

Vires. *Calf. & sicc. digerit, incidit, saporis amari. Usus pracip. in strumis seu serophulis, ficis & mariscis ani (unde & nomen accepit) in cancrois ac similibus serpentibus ulceribus malignaque scabie, extrinsecus in tumoribus venientibus, malignisque molliendis. E.g. serophulis, & simil.*

PRÆPAR.

Δstillat. Ex herba cum radice.

CCCXIV. Scilla.

Squilla, *Brunf. Scilla, Trag. Matth. Fuchf. Cord. hist. Lon. Cam. maior Pan- cratium, Dod. Tab. tubentibus tuni-*

cis Lob. Arab. Haspel. German. Meer- vvibel.

Crescit copiose in Apulia, Sicilia, Portugallia.

OFFICIN. NAT.

Radix bulbosa, quæ eligatur recens succi pleni, collecta Iulio.

Vires. *Calfac. sicc. 2. saporis acris & amari, atten. incid. absterg. discus. putredini resistit. diuretica est. vsus pracip. in obstructione Epatis, Lienis, meatus bilarij, mensium vrina: in mucilagine pulmonum, tussi, &c. Extrinsecus in achoribus capitis (infus. in el.) in per- nione.*

N. Veneficia ac incantationes arcere dicitur.

PRÆPARATA.

1. *Preparata radix.* Involuitur mas- sa panis atque cum eadem in Cliba- no coquitur: hinc eximitur atque exiccatur. Vide Disp.

N. *Preparatio hac instituitur ad ob- tundendam acrimoniam.*

2. *Syr. Oximel. scylliticum simpl.* Ex scyllitico & melle.

3. *Oxymel compositum.* Vide Disp.

4. *Loch. de scilla. Loch. ad asthma.* Ex succo ac melle.

5. *Acetum scilliticum.* Ex infusione radice in acere exiccatae (℞ 40.)

6. *Fecula. ℞. Syllæ* Cor incide minu- tim vel conquassa, digereque a iquod temporis spacium in ℞. Hinc transcola & inspissa. *Quercet. Ph. R. cap. 24*

7. *Extractum.* Vide *Querc. Ph. R. c. 24.* ubi & Saccharum seu conser- uam Scyllæ parare docet.

CCCXV. Sebesten.

Sebesten, *Trag. Prunus Sebesten. Matth. Sebestena, Myxæ, Myxaria, Tab.*

Tab. Alpina.

OFFICIN. NAT.

Μαζαρια, αμαζα, myxa, myxaria Sebesten *Brustbeerlein*. Sunt fructus arboris pruno similis, assimilati parvis prunis, referentes nucleum cortice triquetrolapideo inclusum

Asportatur ex Syria ac Aegypto,

Vires. *Sebesten* inter caliditatem ac frigiditatem temperata sunt, humectant, emolliunt, acrimoniam humorum obtundunt. *Vsus* precip. in catarrhis acris urina acris, febribus biliosis, alui obstructione: summam ut figura ita & viribus pruna *Damnascena* amulantur.

PRÆPAR.

Electuar. de Sebesten. V.D.

Vires. Purgat leniter, obtunditque acrimoniam humorum.

Dosis à ʒβ. ad ʒij.

CCCVI. Secale.

Farrago Rogga, Siligo, Briza, German. *Roggen Korn*, (nostratibus),

Est } Hibernum vel maius, C.B. 2.

Est } Vernum vel minus, C.B. 3.

1. Dicitur. Rogga siue secale, *Dod. Siligo Brunf. Lon. Veterum & Secale, Trag. Secale* (Secla,) *Matth. Fuchs. Lob. Tab. Ger. Secale & Farrago Plinij Cast. Olyra Cord. in D. Tiphia cerealis Portæ. C.B.*

2. Appellatur, Rogga seu Secale æstivum, *Dod. Siligo æstiva, Trag.*

N. *Veterum siliginem à secali nostro esse differentem, videbis apud Tabern. l. 1. f. 7. c. 1.*

Floret Iunio.

OFFICIN. NAT.

1. *Favina* 2. *Furfures*.

Vires *Secale* calefacit moderate, minus tamen quam *tritichum*, magis vero

pra hordeo. Vsus eius potissimus culinarius est, adhibetur tamen non raro favina extrinsecus ad tumores & dolores discutendos, adcoque imponitur Erysipelati, podagricis doloribus, & sim.

Furfures abstergunt, emolliunt, discutunt, (calidi impositi in sacculo.)

PRÆPAR.

1. *Panis*. Adhibetur in doloribus capitis & aliarum partium (impositus) in ventriculi imbecillitate, in cordis palpitatione, in factu roborando (tostus & vino aliove liquore convenienti imbutus, vel in micis redactus, & cum aliis impositus,) in tumoribus maturandis (masticatus cum butyro & impositus) in dentificiis (crusta tosta & trita.)

2. *∇ still. è pane*. Fit è micis panis vi *M*.

N. *Commendatur in Diarrhaa & Dysenteria.*

3. *∇ Siliginis officinarum*. Fit è gramine *M*.

4. *Emplast. De Crusta panis V.D.*

CCCXVII. Sedum.

Sedum { maius, arborescens, }
 { minus, }
 { inuisitatum, }
 { vulgare, hoc usuale. }
 { Minus Hæmatoides, &c. Officinis incogitum. }
 { Minimum, vide vermicularis. }

Insignitur semper viuum maius, *Brunf. Matth. Ger. Lob. Sedum maius, Fuchs. Cord. in D. Tab.* Semper viuum 1. *Lon.* Semperv. maius 2. seu Iouis barba, *Dod. Aizon maius, Cam. Sedum maius vulgare, Clus. German. Hauszwurtz, Donnerbart, Mawrpfeffer.*

OFFICIN. NAT.

Folia.

DDdd 2 Vires

Vires. Refrig. 3. astring. incrassat.
 Usus princip. intrinsecus in febribus bilio-
 sis, sedat scilicet sitim, compescit ardorem.
 Extrinsecus in Angina, &c.

N. Vulgare est plebi nostrati, expres-
 sum succum cum saccharo in febribus
 morbisque calidis propinare.

PRÆPARATA.

1. Ex foliis stillat.

2. Succus ex foliis expressus.

N. Adhiberi solet recens in febribus
 malignis & biliosis.

CCCXVIII. Senecio.

Senecium *ἡρῆρα* herba pappa
 Germ. Creutzwurtz, Grindkraut.

Est

C. B.	1. Senecio minor vulgaris,	} indiffe- renter vsuales.

1. Appellatur Senecio, Matth. Fuchs.
 Cord. in D. Lon. Lob. minor, Cast. vul-
 garis & 1. Trag. Tab. Erigerum minus,
 Dod. Verbena formina, Brunf.

2. Senecio 2. Tab. Erigerum, Ger.
 maius, Dod.

Nascitur passim in horris, in agris
 fecus vias, &c. maius syluosis gaudet
 & arenosis. Verè florere incipit, flo-
 resque per totam astatem producit,
 aliàs hyberno quoque tempore viret.

OFFICIN. NAT.

Folia cum floribus & caule.

Vires. Mixtas vires habet, refriger. ac
 simul modicè discut. consolidat. Usus
 princip. in cholera. Ictero, intemperie ca-
 lida Epatis, lumbricis, vomitu & expui-
 tione sanguinis. Ischatico dolore, fluore
 muliebri. Extrinsecus in mammis in-
 flammatis, scabie (capitis) struma, dolore
 ventriculi, Urina remorata, arthritide,
 vulneribus.

▽ still. Fit è fol. flor. ac caule, tota
 æstate.

CCCXIX. Serpyllum.

Ἐρπιδος, Diosc. Serpyllum, Brunf.
 Trag. Fuchs. Lon. Lob. vulgare, Dod. Ger.
 Serpyllum sylvest. Matth. Cord. in D.
 sylvestre alterum, Cast. Serpyllum mi-
 nus fl. albo & fl. purpur. Tab. Serp. vul-
 gare repens, Clus. hist. Serp. vulgare
 minus, C. B. 6. Germ. Quendel, Rünlin,
 Hünerzöl, vild Polen.

N. Sunt species plures, sed hac officini-
 nis vsitatio.

Crescit locis sabulosis, apricis. Flores
 Majo mense protrudit, integraque æ-
 state fouet.

OFFICIN. NAT.

Herba cum floribus.

Vires. Calf. & sicc. princ. 3. saporis
 acris, atten. aperit. Cephalica est, Vre-
 rina, ac stomachica. Usus princip. in men-
 sibus ac vrina cienda (balneo) in expui-
 tione sanguinis, spasm. &c. Extrinsecus
 arcet vigilias, cephalagias, vertiginem.
 Ciet menses (balneo.)

PRÆPARATA.

▽ stillat. Ex planta cum floribus In-
 niocollecta.

CCCXX. Sesamum.

Σάμπος Veterum, C. B. Sesamum,
 Alpin. Matth. Lob. Dod. Cast. Tab. ve-
 rum, Cord. in D. Cam. Germ. Leindotter.
 Flachsdotter.

N. Est & Sesamum, Myagrum di-
 ctum, ac officinis inusitatum.

OFFICIN. NAT.

Semen quod affertur ex Alexandria,
 Cret. & Sicilia.

Vires. Calfac. modicè humect. emollis,
 paregoricum,

paregoricum, viscosum pingue, adeoque
& Emplasticum est: nervorum duritiem
illius discutit, coli doloribus medetur.

PRÆPAR.

Ol. Expressum: Hoc eligatur candi-
dum, syncerum: adulteratur enim oleo
Nucum & Papaveris, qui dolus tamen
odore & sapore facile dignoscitur.

N. Olim solum ex Alexandria
Egypti Venetias, atque inde ad nos
comportabatur. Hodie & apud nos ex
sesamo paratur.

Vires. Moderatè calf. iridem emollit,
maturat, pulmonicum est. Vfus præcip.
in tussi ac asperitate pulmonum (lin-
ctum) in pleuritide: impinguat, semen
genitale auget. Extrinsecus in duritie
nervorum, aurium doloribus, in ulceribus
serpentibus ac malignis

N. Quia nauseam excitare solet, raro
internum usum subit.

CCCXXI. Sefeli Officinarum.

Λγυσιὰ, Diosc. Νιβησιὰ Gal. Ligusticum
quod sefeli officinar. C. B. 1. Silet
montanum, Trag. Lob. Dod. Clus. hist.
Ligusticum, Matth. Cast. verum, Tab.
Sefeli Massilioticum, Cord. in D. Sefeli
Italicum, Cast.

Crescit copiose in Liguria Italiae.

OFFICIN. NAT.

Semen.

Vires. Calfac. sicc. menses & urinas
ciet, flatus discutit.

CCCXXII. Sefeli Massi-
lioticum.

Σέπλι, σεπλις, Hippocr. σίλι, σίλι, Sile-
lios indeclinabiliter, Germ. Sefel. Se-
felkyaut, Massilischer Sefel, Roszküm-
mel, Zirner, Silermontan.

Est { ferulæ folio } promiscue
 { fœniculi folio } vsualia.

1. Dicitur Sefeli Massilioticum, Matth.
Lon. Cast. Tab. nuperiorum, Lob. Sefeli
Mass. ferulæ aut Dauci Cretici facie,
Lob. Siler montanum, Ger. C. B. 8.

2. Sefeli Massil. fœniculi folio, quod
Dioscor. censetur, C. B. 9. Lob. Sef.
Massil. Dod. Diosc. Clus. hist. nonnullo-
rum, Cam. Fœniculum petraeum, Tab.

Crescit sponte in Gallia ac Italia,
apud nos non nisi in hortis colitur; so-
lo gaudet fabuloso.

OFFICIN. NAT.

Radix atque Semen, quod verum in
modernis officinis prostat, secus ac an-
tea, vbi semen brancae vrsinae, monente
Tabernemontano, eius loco venū iuit.

Vires. Calf. & sicc. ad gr. vsque 3. in-
cid. aperit, discut. Vfus præcip. in morbis
capitis. Epilepsia (cui tota sua substantia
resistit.) in imbecillitate visus, spasmo,
& c. in Pulmonum ac pectoris affectibus,
tussi, catarrhis; in Epatis obstructiōne,
Hydrope, ventriculi cruditate ac infla-
tione; in calculo Renum ac Vesicae: in
mensibus obstructis. Specifica antidotus
est cicuta. Extrinsecus in spasmo, contra-
cturis, in lacte mammaram coagulato,
in vteri impuritate, ac obstructiōne.

CCCXXIII. Sefeli Cre-
ticum.

Τορδάλιον, Dioscor. Sefeli Creticum
minus, C. B. 4. Cam. Sefeli Creticum,
Lob. Dod. Cast. Tab. Ger. Pimpinella
Romana, vulgo Arab Arturtilon, Cre-
tischer Sefeli, Candischer Sefel.

Crescit sponte in Prouincia Galliae,
apud nos non nisi in hortis.

OFFICIN. NAT.

Semen.

DDdd 3 Vires.

Vires. Calf. & sicc. 2. est nephriticum, uterinum pulmonicum. Vfus precip. in stranguria, & urina remorata: dolores discut. menses ciet, catarrhorum expectorationem promouet.

concoctu est, difficilis.

CCCXX Sinapi.

Σινάπι, ὄνη. Arab. Cardel. Senff.

Sinapi { rapifolio: Huius
semen purpureum & vsuale
potissimum,
apij folio: Huius
semen rubescens,
& minus vsuale.
Syluestre, &c.

CCCXXIV. Sideritis

Σιδερίτις. Sideritis 1. Fuchf. Cord. in D. vulgaris, Cam. in Math. 2. Clus. hist. 4. Len. Sid. Heraclea, Cord. hist. Tab. Sideritis seu ferruminaria, Lob. Sid. vulgaris hirsuta eiecta, C. B. 4. Arab. Tetrahit. Sidrichis. German. Gliedkraut.

N. Matthiolus Marrubiastrum pro Sideritide Dioscoridis habet, cui contrariatur Tabern.

Crescit locis apricis montanis sabulosis: Floret Majo.

OFFICIN. NAT.

Herba sed raro.

Vires. Absterg. astring. vulneraria est intus & extra adhiberi apta. Vfus precip. in herniis.

N. Adhibetur itidem in morbis incantatione introductis.

CCCXXV. Siliqua.

Κεράτεια, Siliqua edulis, C. B. 1. Siliqua, Matth. Cord. in D. Lon. Cast. Cam. Ceratonia, Dod. Cerata vel Siliqua, Lob. Tab. Ger. Clus. hist. Sil. dulcis Carnub & Carnub. vocata, Alpin. Germ. Iohannisbrodt.

Crescunt in Regno Neapolitano, tum in Insula Creta & Syria.

OFFICIN. NAT.

Fructus (scil. siliquæ, cuius succus melligineus in vsum solum venit.

Vires. Siccat & astringit. Vfus precip. in ardore stomachi, tussi, &c. alias

Dicitur Sinapi, Cast. Matth. Sinapi hortense, Cord. in D. Lon. fatium prius, Dod. Sin. fat. Erucae aut rapifolio, Lob. Tab. seu. album, Cam. C. B. 1.

OFFICIN. NAT.

Semen.

Vires. Calf. & sicc. 4. incidit attenuat, rubificat. Vfus precip. in appetitu excitando chylicatione promouenda: in affectibus hypochondriacis ac quartana ex mucilagine tartarea, item in quotidiana (ante paroxysmum Dos. ʒj. exhibita) in calculo: caput purgat. Extrinsecus in sinapismis, in arcendo caro, (naribus inditum vel in sinapismo adhibitum) tumores maturos aperit, sternutationem mouet.

PRÆPARATA.

Oleum. Ex semine expressum.

Vires. Nervorum affectibus frigidis confert.

CCCXXVII. Sifaram.

Σιούρον, Sifar, Sifer, Brunf. Matth. Cord. in D. Lon. Cam. fatium, Fuchf. sifaram, Trag. (& Rapunculus hortensis,) Dod. Lob. Tab. Ger. Sifarum Germanorum, C. B. 1. Germ. Gierlein, Gierlin, Klingel Rüblein, Zuckervourz; Colitur.

Colitur in hortis : solo gaudet pingui.

OFFICIN. NAT.

Radix.

Vires. Calf. 2. saporis subamari, subastring. ventriculo conuenit, appetitum excitat, diuretica ac lithontripica est, bene nutrit, facile concoquitur, specifica antidotus censecur & vini.

N. Est vsus potius culinaris quam officinalis.

CCCXXVIII. Solanum.

Στρυχ. Solatrum, Nachtschatten, Sevrkraut.

Solani varia occurrunt genera, quorum alia baccifera sunt, alia pomifera. Verum officinis quod vltatius Solani Titulo, est solanum officinarum, C. B. 1. Solatrum, Brunf. vulgare, Trag. Solanum, Lon. hortense, Matth. Fuchf. Dod. Cam. Ger. fatium, Tab. Solanum nigrum, Cord. in D.

Crescit iuxta sepes ac vias: floret æstate integra.

OFFICIN. NAT.

Herba bacca.

Vires. Refrig. 2. reliquis temperata sunt, adstring. appellunt. Vfus precip. externè in Erysipel. in dolore capitis, in astu febrili mitigando (capiti ac pedibus applicata) in parotidibus.

PRÆPARAT.

▽ stillat. Ex herba cum floribus.

N. Sunt qui ante Biennium exhibere vetant.

CCCXXVIII. Sorbus.

С, 2, Sorbus, Sperberbaum.

Sorbus fatiua. Hac officinalis.

C. B. (syluestris

Insignitur sorbus, Brunf. Trag. Dod. Cord. in D. Lon. Tab. Ger. Sorb. Domestica. Matth. Lob. Cast. Sorbum ouatum, Fuchf. Sorbus legitima, Clus. hist. esculenta, Cam.

Crescit in hortis: maturos fert fructus autumno.

OFFICIN. NAT.

Fructus. (Sorbum. Speyerling, in.)

Vires. Refrig. & sic. astring. Vfus precip. in fluxionibus alui, uteri, &c. Extrinsecus adstringit vulnera (fructus puluerisatus.)

N. Sorba colliguntur potissimum immatura, exiccanturque tum in aëre, tum in Clibano: siccata puluerisantur pro vsu Medico, pauci enim sunt nutrimenti.

PRÆPAR.

Condit. Fructus cum melle.

CCCXXIX. Spica.

Spica mas.

Spica fœmina. Lauandula.

Non discrepant nisi magnitudine, quæ tam flor. quam foliorum in Spica major est, in Lauandula minor: odæ itidem Spicæ grauior est, Lauandulæ gratior, ideoque promiscuè vsurpari possunt.

Mas insignitur Lauandula latifolia, C. B. 1. Spica nardus Germanica, Trag. Nardus Italica, Matth. Lob. Germanica, Lon. Lauandula, Dod. major, Cord Pseudonardus, Matth. Cast. mas, Fuchf. at in icon: fœmina, Lauandula latioribus foliis 1. Cam. 2. longiore folio, Clus. Lavendel.

Fœmina dicitur Lauandula angustifolia, C. B. 1. Lauandula, Trag. Matth. vulgaris, Cord. in D. minor, Cord. hist. Pseudonardus fœmina, Matth. Fuchf. (at in icon. mas) Lauandula, Lob. Spi-

ca nardi, *Cam.* breuiore folio & Spica, *Clus.* *Spicanard.*

Colitur vtraque in hortis, nobisque vulgatio est Spica fœmina: Floret Iunio ac Iulio.

OFFICIN. NAT.

Flores vtriusque.

Vires. *Calf. & succ.* 3. (præualet tamen Spica) saporis subacris ac subamari, partium tenuium, cephalica est ac neruina. *Vsus* præcip. in catarrhis, paralyti, spasmo, vertigine, lethargo, tremore artuum. In urina, mensibus ac foetu pellendo (unde parturientibus exhiberi solet) in torminibus ventris flatulentis. Extrinsecus in lixiuiis, capitis ac artuum, in Masticatoriis (pro catarrho exiccando ac reuellendo ad palatum, ne ad pulmones defluat.)

N. Odore suo fugat pediculos.

PRÆPAR.

1. *Conseru.* Flor. Lauendulæ.
2. *Confect.* Flores.
3. ∇ stillat. Ex floribus irrigatis sc. vel vino vel aqua.
4. *Ol.* Spica stillat. cum ∇ ascendit.

N. Asportatur ad nos sat copiose ex Prouincia Gallia regione, ubi copiosè cre- scit. vteri motus ac dolores compefcit umbilico illitum.

CCCXXX. Spica Celtica.

Nardum Celticum, *Matth. Cord. hist. Lob. Cast. Cam. Tab. Ger.* Nardum Celticum Dioscor. C. B. 4. Nardus alpina seu Celtica. *Clus.* aliis, Romana, Galatica, Saliunca, Germ. *Celtischer Narden.*

Crescit in Liguria: in Catinthia, Styria, in alpihus Tyrolis, &c.

OFFICIN. NAT.

Radicula cum adnatis, colligenda

Iulio & Augusto.

Eligenda recens, iucundi odoris, radiculis numerosis, cohærens, non fragilis, & plena.

Vires. *Calf. & succ.* viriumque earrundem est cum Spica Indica, sed imbecilliorum, maiore tamen cum utilitate adhibetur in vrina cienda, ventriculo corroborando, flatibus descutiendis, Extrinsecus additur malagmatis, unguentisque calfacientibus.

CCCXXXI. Spica Indica.

Nardus Cord. in D. Lob. Nardus Indica, *Matth. Cord. hist. Lon. Cast. Ger.* Nardus seu Spica Indica, Spica nardi officin. C. B. 1. Arab. *Stumel. Indianisch. Spicanarden.*

Radix est officinalis ex India Alexandriam, atque inde Venetias & in Germaniam transportata. Dicitur autem Spica, quod Spicæ similitudinem habeat.

N. Est & Nardus spuria Narbonensis, ut & Nardus montana, valeriana non absimilis; Verùm officinis nostratibus peregrina.

Eligenda recens, leuis, longam comam habens, spicam vero breuem, colore flaua, aliquantulum redolens Cyperum, sapore amaro ac linguam siccante. quæ diu in sua odoris gratia permanet.

N. Madefacta dolosè vendi solet, qua frans deprehenditur, quod Spica sit candida, squalida, nulloque puluere obsita, filisue lane instar crinita.

Vires. *Calf.* 1. *sicc.* 2. *atten.* astring. nephritica & stomachica est. *Vsus* præcip. in urina ac mensibus ciendis, in ventriculi rosione, inflatione, in Jctero, &c. Extrinsecus in lixiuiis Cephalicis, balneis

balneis uterinis, &c.

PRÆPAR.

1. Oleum Nardinum simplex. Fit ex coctione in ol. communi, Vino ac Aqua.
2. Oleum Nardinum compos. Fit vt simplex additis nonnullis aromatibus.

CCCXXXII. Spinachia.

Spinachia, (Spinacia,) Brunfels. Fuchf. Dod. Tab. Lon. Cast. Matth. Lob. Ger. mas, Cam. vulgaris, Trag. Lapathum hortense seu Spinachia semine Spinofo, C. B. 2. German. Binetsch, Spinat.

Colitur in hortis: Floret vt plurimum Iulio & Augusto.

OFFICIN. NAT.

Folia seu Herba. Potissimum culinaria est.

Vires. Refrig. & hum. 1. utilis cibis in omnibus morbis, laxat aluum, lenit asperitatem pulmonum. Extrinsicus refrigerat ventriculū ac Epar (imposita.)

N. Continuus vsus melancholicum generat sanguinem.

CCCXXXIII. Staphisagria.

Staphisagria, Trag. Matth. Fuchf. Dod. Lob. Cast. Cam. Herba pedicularis, Cord. in D. Arab. Alberas, Leus kraut, Speichelkraut, Biszmüntz, Mausz, vnd Kattenpfeffer.

Crescit in Apulia, Calabria, Dalmatia Istria.

N. Crescit & apud nos species quadam, verum minus illa vsitata est.

OFFICIN. NAT.

Semen triquetrum & asperum.

Vires. Internus vsus purgatorius est, sed rarus. Extrinsicus eius vsus est apoplegmatisans in masticatoriis, garga-

ris, odontalgicis (cum +) ac abstergentibus, in ulceribus ac papulis, &c. Adhibetur & in phthiriasi.

CCCXXXIV. Stæchas.

Σταχάς, Stæchas, Trag. Matth. Lob. Lon. Cast. (Stichas) Fuchf. Dod. Stich. Arabica, Cord. in hist. Cam. St. breuioribus ligulis, Clus. hist. St. purpurea, C. B. 1. Arab. Astochodas, Kæmischer, Welscher fremder Rummel oder Thymian, Stechaskraut.

Crescit copiose in Insulis Galliae, quæ Stæchades dicuntur, optima tamen censetur Arabica (vnde ad compositiones recipere monent Arabiani.) Huic succedit Cretica.

OFFICIN. NAT.

Flores seu potius spicæ compressæ, inter florum ac seminum prouentum collectæ.

Eligendæ spicæ recentes odoratæ, & subamaræ, si haberi possunt Arabica.

Vires. Calfac. 2. & sicc. 2. absterg. atton. aperit. Vsus præcip. in affectibus capitis & nervorum, scil. in vertigine, Apoplexia, Paralyti, Lethargo. In morbis pectoris itidē præstat quod Hyssopus: insuper urinâ & menses ciet, venenis resistit, affectibus hypochondriacis succurrit. Extrinsicus in lotionibus capitis, suffitu, &c.

PRÆPARATA.

1. Syr. de Stæchade simplex. V. D.
2. Syr. de Stæchad. compos. V. D.
3. Syr. de Stæchad. Fernelij. V. D.

CCCXXXV. Stæchas

Citrina.

Ἐλιχρυσόν, Elichrysum seu Stæchas citrina angustifolia, C. B. 4. Stæch. citrina,

EEe trina,

trina, Matth. Gesn. Dod. Cast. Tab. Amaranthus luteus, Fuch. Lon. Coma aurea, Lob. aliis Tinearia (quod tineas abigat,) Germ. Rheinblumen, Mottenkraut.

Crescit locis aridis & fabulosis, & conuallibus frequens iuxta Rhenum. Floret Iunio.

OFFICIN. NAT.

Flores.

Vires. Calf. & sicc. incid. aperiunt diuretici ac vulnerarij sunt. Vsu prac. in obstructione Vrinae, Lienis, mensum: coagulatum sanguinem resoluunt, catarrhos exiccant, menses nimis fluentes siccando sistunt, lumbricos fugant: commendantur & imprimis ad exiccandas defluxiones acres Pulmonum, & Extrinsecus faciunt ad emolliendam uteri duritiem, (in balneo) lentes abigunt (in lixivio capitis) defluxiones siccant & discutunt (suffitu,) &c.

N. Sunt qui amuleti loco de collo suspendunt, lumbricosque ventris eo fugari volunt. Dn. D. Arnold. VVeichard. in Thesuro pharmaceutico.

CCCXXXVI. Succisa.

Succisa, Matth. Fuch. Dod. Cast. glabra, C.B. i. Iacæa nigra, Brunf. Morlus Diaboli, Trag. Lob. Lon. Tab. Germ. Abbisz, Teuffels Abbisz.

Crescit passim in campestribus, pratis ac iuxta arua: Floret Iulio, Augusto, Septemb.

OFFICIN. NAT.

Radix, Flores: nonnunquam & Folia.

Vires. Calf. & sicc. 2. amara, alexipharmaca ac vulneraria est, vt Scabiosa, cum qua & reliquis facultatibus conuenit. Imprimis celebratur in Epi-

lepsia, Peste, Uteri dolore, sanguine coagulato, abscessibus occultis, lue venerea, eiusque ulceribus, in vulneribus recentibus, &c. Extrinsecus in angina, tumoribus tonsillar. diuturnioribus, qui ad supurationem agrè perueniunt (gargaris.) in sugillationibus, buboni bus, &c.

PREPAR.

∇ stillat. Ex integra planta (cum rad. & flor.) collecta in fine Iulij.

CCCXXXVII. Symphytum.

	Officin. Huius loci.	
Symphy- tum	Maius tuberosa	Minus vsualia.
	radice	
	Minus tuberosa	
	radice	
	Minus borragi- nis specie	
	Maculolum, vi- de Pulmonaria.	
	Petræum, mi us vsuale.	

Insignitur consolido maior, Brunf. Targ. Cam. Ger. symphytum, Lon. maius, Matthiol. Cord. hist. Cam. Cast. Tab. magnum, Fuch. Dod. alterum, Cord. in D. Symphytum Alum & Alus, Lob. Consolida vulgo, Solidago, German. VValkwurtz, Schwartzwurtz, Schmeervurtz, Beinwell.

Crescit in pratis, & hortis, gaudet loco humido: Floret Maio & Iunio, floresque fert purpureos vel albos: illud marem vocant, hoc fœminam, quæ hoc tractu vulgatior, crescit.

OFFICIN. NAT.

Radix, Folia, Flores.

Vires. Caliditate temperatum est, sicc. 2. vulnerarium est & præcipuis celebrimum, mucilaginosum, incrassans, aerimoniamque humorum obtundens, imò

imò & incidens, adeoque partium mixtarum. *Vsus* *pracip.* in fluxionibus quibuscunque, in primis alui, in Erosione Pulmonum ac phthisi in herniis, ruptis venis, fractis ossibus, &c. *Extrinsecus* vulnerum sanguinem sistit, fracturas ossium ac vulnera consolidat.

PRÆPARATA.

1. ∇ . Ex herba cum radice.
2. *Conseru.* Ex floribus
3. *Condita Radix.* V. Renodæum.
4. *Syrup. de Symphyto.* V. Disp.
5. *Extract.* *Symphyti.* ꝛ. mucilaginem radicis coctæ inspissatam. *Extrahere* cum ∇ ac abstrahe.
6. *Extractum sanguineum.* *Sanguis.* ꝛ. *Rad.* recent. *simph.* maj. & min. conquassa in formam pultis. Hinc adde panis $\frac{1}{2}$. (scil. secalini vel triticei.) M. ac irriga cum Vino generoso, inde Phiolæ vitreæ occlusæ cera Hispanica, digere aliquandiu in fimo vel ∇ . Hinc exprime, digere, fecesque subsidentes separa, reliquum inspissa. Vide *Quercet Ph.R.c.* 26.

Vires. Præstat ad hernias & ulcera omnia.

Dosis \mathcal{D} j. ad dies pluresculos.

7. *Oleum stillat.* Ex radice sicca per Retortam elicitor.

N. *Oleum hoc ut per panicam elicitor, ita viribus pretiosum est, in herniis curandis intus & extra adhibitur.*

T.

CCCXXVIII. Tamariscus.

Tamariscus } 1. Germanica. *Hæc vsualis.*
 C.B. est } 2. Gallica,
 } 3. Ægyptia.
 Dicitur Tamariscus, *Brurf. Lon.*

fœmina, *Cord. hist.* Myrica, *Trag. Clus.* sylvestris seu Tamarix, *Matth. Cast. Dod. Tab.* Tamarix sylvest. fœmina, *Fuchs.* Tam. humilis, *Cord. in D. Myr.* sylv. altera, *Clus. hist.* Myr. altera in Germania, *Cam. Tam.* fruticosa folio crassiore, *C. B. al. Murica. Arab. Tarfa, Tamariscenholz,*

Frutex est arborefcens similis Sabinae, in tantam excrefcens magnitudinem, ut doliola inde fiant mensur. 1. capientia, quæ vulgaria sunt nostratibus.

Nascitur iuxta Rhenum & Danubium, tum quoque fecus paludes, solo gaudet saxoso.

OFFICIN. NAT.

Lignum, Radix, Cortex, (quæ maximè vsualis est, in primis radici detractus.)

Vires. Cortex calfac. & sicca. 2. (*lignum ad frigiditat, inclinat*) *atten, aper. absterg. subastring. diureticum est ac splenicus.* *Vsus* *pracip.* in obstructione ac tumore Lienis (quem absumere scribit *Diosc.*) in morbis ab atra bile ac sero oriundis, ut scabie, pruritu, in Ictero nigro, profluio albo mulierum, &c. *Extrinsecus* in primis in tinea capitis, & obstr. mensium (in seffu.

PRÆPAR.

1. *Extract.* è corticibus fit l.a. cum ∇ vel ∇ . v.g. flor. genistæ, scolopendriæ, & sim. *Querc. Ph.R.*
2. *Sal.* Ex incinerato ligno, l.a.

CCCXXXIX. Tanacetum.

Tanacetum C. B. } 1. vulgare luteum. *Hoc vsuale.*
 } 2. foliis crispis.
 } 3. minus, album.
 } 4. alpinum.
 Inodorum } minore,
 flore } majore.
 E E c c 2 Dicitur

Dicitur Tanacetum, Matricariæ
2. Species & parthenium, Brunf. Tanacetum vulgare, Trag. Tanacetum, Matth. Lon. Dod. Artemisia tenuifolia, Fuchs. Ambrosia quibusdam, Cord. in D. Tanacetum millefolij foliis, Lon. Athanasia seu tanacetum, Cast. Artemisia Diosc. Tab. Græcè Ἀρτεμισία λεπτοφύλλη & Athanasia, Tanasia. Germ. Reinfarn, Wurmkrant.

Nascitur locis arenosis incultis:
Floret Iunio & Iulio.

OFFICIN. NAT.

Herbacum floribus, Semen.
Vires. Calfac. & sicc. incid. discut. vulnerarium, vterinum & nephriticum est. Usus præcip. in lumbricis, torminibus, ventris, calculo impuritateque Renum ac Vesicæ, mensibus obstructis, flatibus, hydrope, &c. Extrinsicus iisdem affectibus adhiberi potest, lauando, cataplassando, &c.

PRÆPAR.

1. ∇ Stillat. Ex tota planta florente
2. Oleum stillat. quod raro prostat.

CCCXL. TARAXACUM.

Dens Leonis, Brunf. Matth. Dod. Lob. (& corona, caput Monachi,) Tab. Ger. Hieracium maius, Trag. paruum, Cord. in D. Hedipnos maior, Fuchs, Taraxacon minus, Lon. Dens Leonis latiori folio, C. B. I. German. Pfaffenblat, Mienchakopff.

Habetur & maior, & media quæ vulgarior est folio acutiore, aliquando obtuso.

Crescit in herbosis locis: Floret Aprili, Maio,

OFFICIN. NAT.

Radix, Folia.
Vires. Refrig. & sicc. 2. Saperis ama-

ri, absterg. aperit, Epaticum est, cum Endiuiâ conueniens, quâ tamen potentius operatur. Usus præcip. in febr. putrida, inueteratis, &c. Extrinsicus maculas abigit oculorum (lac ex disrupto caule, ter quotidie oculis inditum,) vulnera ac ulcera abstergit, &c.

N. Radix amuletice curare dicitur affectus oculorum, peculiari tamen modo, ut volunt collecta. Nimirum, sunt qui infrorsum per fossam subtus factam euellunt. Sunt qui quoquo modo fossam in nouem secant frustra, nouemque diebus de collo suspendunt. Alij integram radicem adhibent. Idem Amuletum & tertianam fugare dicitur.

OFFICIN. NAT.

∇ stillat. Ex planta cum radice, foliis ac floribus collecta initio Maij.

CCCXLI. Thlaspi.

Bavrensenff. Genera varia sunt, eaque promiscue vsualia. Præferuntur tamen aruensia.

Nomen Thlaspi Botanicis fere omnibus vulgare est.

Nascitur in locis incultis, saxosis, apricis, partietibus ac tectis. Floret Maio maturelci Iunio.

OFFICIN. NAT.

Semen & Herba.

Vires. Calf. & sicc. 4. abstergit. Usus præcip. in internis abscessibus rumpendis, mensibus sciendis, Ischiaticis affectibus curandis. Extrinsicus abstergit ulcera quacunque manantia, in superque ptarmicum est, sed minus vulgare.

N. Grauidis quia fetum necat, in-
fensum censetur.

CCCXLII. Teucrium.

Teucrium,

Teucrium, *Fuchf. Cord. in D. Lon. Lob. Cast. Teucrium 1. Tab. & C. B. 2. Matth. chamædrys 2. seu affurgens, Dod. Teucrium vulgare fruticans seu 1. Clus. hist. Teucri. latifolium, Ger. Germ. groß. Pathengel.*

Crescit locis herbosis asperis, aridis apricis: Florer Aprili, Maio.

OFFICIN. NAT.

Herba cum floribus, vel & herba antequam flores eruperint collecta.

Vires. *Calf. & sicc. 2. Epatica est, saporis amari, viribus omnino conueniens cum chamædri.*

CCCXLIII. Thymus.

- Thymus C. B. {
 1. Vulgaris, folio tenuiore. *Hec usualis.*
 2. Vulgaris folio latiore.
 3. Capitatus.
 4. Inodorus.

Dicitur Thymus, *Brunf. Trag. Matthiol. Fuchf. Cord. hist. Lon. Thymus durior, Cam. nostras, Cord. in D. Scpillum hortense, Dod. alias Thymura. Arab. Hasce. Germ. Romischer, VVel-scher Quendel. Thymian.*

Crescit nostratibus in hortis: Floret Iulio.

OFFICIN. NAT.

Herba seu Folia & Semen.

Vires. *Calf. & sicc. 3. saporis subacris, autem, incidit, discutit. Vfus precip. in affectibus Tartareis. 1. Pulmonum, ut asthmate, tussi. 2. Artuum, ut podagra, omnia viscera reserat, appetitum excitat. Extrinsecus in tumoribus frigidis, sigillationibus, inflationibus ventris, doloribus arthriticis.*

PRÆPAR.

1. Ex herba cum floribus.
 2. Spiritus

3. Oleum stillat.

CCCXLIV. Thymiana.

Thymiana (officinis corruptè Thymiana vel Thuris cortex, vel Thus Iudæorum, quod Iudæi in suffugiis frequenter eo vtantur) corticolum quid est ex India allatum Videatur Styx rubra, *Bellon. Nascaphtum, Cord. hist. Storax rubra officinarum. C. B. 3.*

Vires. *Constructionibus vulua ex suffitu prodest. Odoris iucundi gratia & suffimentis immiscetur. Vide Thuris cortex. Class. 2.*

N. Sunt & qui Ammoniacum electum, Thymiana appellant.

CCCXLV. Tilia.

Tilia, *Lin- Mas & sterilis. Hec nobis denbaum, inusitata. Fœmina flores ac semen proferens.*

Dicitur Tilia fœmina, *Brunf. Matthiol. Fuchf. Lob. Tab. Tilia, Lon. Dob. fatina, Trag. Phyllirea, Cast. Tilia fœmina fol. maiori, G. B. 5.*

N. Est & folio minori Talia *slucstris, Tiago, qua priori per omnia similis, nisi quod sit minor & nigrior.*

OFFICIN. NAT.

Flores, Folia, Cortex Semen, Lignum Vires, Flores *calf. & sicc. partium tenuium, discut. cephalici sunt. Vfus precip. in Epilepsia, Apoplexia, Vertigine.*

Folia ac Cortex siccant, repellunt, vrinam ac menses cient. Extrinsecus ambustis subueniunt (mucilago scil. extracta ac iuncta.)

Semen fluxionibus quibuscunque medetur, etiam hamorrhagia narium, (na-

ribus scilicet inditum.)

Lignum in titiones + i aspersione vadaatum sanguinem coagulatum fortiter resoluit.

Extrinsecus adhibentur folia in aphthis ac tumoribus pedum discutiendis: corticis mucilago in ambustis ac vulneribus magni est solaminis.

N. Humor defluens è medulla dissesta tilia capillorum defluvio succurrit.

P R A E P A R.

1. ∇stillat. Ex floribus.
2. Conseru.

CCCXLVI. Tormentilla.

Tormentilla } 1. Syluestris. Hac vsua-
C.B. } lis.
 } 2. Alpina } maior.
 } folio feti-
 } ceo.

Appellatur Tormentilla, Brunf. Matth. Dod. Cord. Lon. Lob. Cast. Tab. (cui consolidida rubra,) Ger. Heptaphyllum, Fuchf. German. Tormentill, Heitzvvurtz, Blatvvurtz, roth Guntzelroth Heilvvurtz, Ruhrvvurtz.

N. Sunt qui xvob pro Dioscor. esse velint.

Crescit passim in herbosis ac arenosis locis: Florere incipit Majo.

O F F I C I N. N A T.

Radix.

Vires, Siccat 3. sine insigni caliditate, astringit vulneraria, diaphoretica ac alexipharmaca est. Vsus precip. in peste, morbisque ceteris malignis imprimis si cum fluxu alui coniuncti sint, in catarrhis exiccandis, in lue venerea, in veneno hausto, in vulneribus. Summatim non est vegetabile, quod in fluxionibus quibuscunque (alui, vteri) vsitatus sit, quam hac tormentilla radix,

Extrinsecus iisdem adhibetur variis in affectibus, in vomitu, vulneribus, & sim.

P R A E P A R A T A.

1. ∇stillat. Ex herba tota cum floribus collecta Maio.

CCCLVII. Trichomanes.

Trichomanes, seu Polytrichum officinarum, C.B. Trichom Trag. Matth. Fuchf. Dod. Cord. hist. Lob. Cast. Cam. Trichomanes, Tab. Ger. Adiantum rubrū, Lon. Polytrichum vulgo Cesp. aliā capillaris Filicula, Germ. VViderrodr.

N. C. B. Ex Tabern. diuersa genera refert, verum promiscue singula in vsum accersi possunt.

Prouenit locis humidis iuxta aquas in vetustis parietibus ac muris. Virescit perpetuo, sterileque est.

O F F I C I N. N A T.

Flores seu herba integra.

Vires. Adianto (capillo Quis vs & Ruta muraria) facultatibus omnibus respondet, ideoque eo recurrendum. Peculiariter tamen monet Tabern. quod ∇stillat, imprimis proficua sitis, quibus lecur putrescere incipit.

CCCXLVIII. Trifolium.

Trifolij quamplurima passim occurrunt genera, nimirum planta quacunque folijs ternis germinantes hoc sibi met nominis iure natiuo vendicant. Ex omnibus tamen, non nisi species paucas. Officinis inseruire comperimus: hæ sunt.

Trifol. { Acetosum. Vide Acetosella.
 { Aureum. Vide Epatica nobilis.
 { Odoratum. Vide Lotus & melilotus.

CCCXLIX.

CCCXLIX. *Triticum.*

sum super laminam ignitam, vel torrent in sartagine ac exprimunt.

Triticum nobis vltatius est duplex, hibernum & æstiuum.

1. Dicitur hybernum aristis carens, C.B. 1. *Matth.* Triticum, *Brunf. Cord.* h. *Dod. Tab.* Trit. 1. genus, *Trag. Fuchs.* Lon. Siligo spica muticâ, *Lob. Trit. spica mutica*, *Ger. Tuck*, *Robus. Arab.* Henta, Henca, Hantha, *Germ. Weitz*, *Winterrweitze.*

2. Appellatur Triticum æstiuum, trimestre Setanium, *Galeno.* *Germ.* *Winterrweitze.*

Est & triticum terrestre, *Cord.* aliâs Zea amilea, vel Zoopyrum amyllum, C.B. 3. Trit. 2. *Trag.* Trit. amyllum, *Tab.*

OFFICIN. NAT.

Semen eiusque Farina & Furfures.

Vires. Moderatè calfac emollit, maturat, discutit, internus eius usus cibarius est, multum enim ac bonum nutrimentum supeditat, incrassat & obstruit. Extrinsecus adhibetur (farina in tumoribus molliendis, leniendis, &c. in oculorum inflammationibus & fluxionibus (cataplasmati forma imposita) in Erysipelate, podagricisque doloribus leniendis (sicca farina imposita.)

Furfures abstergunt squamulas capitis, leniunt dolores, (in cataplas. vel sacculis.)

Triticum trimestre inseruit amylo conficiendo,

PRÆPARATA.

1. ∇ Stillat. Ex pane in MB.

Vires. Sistit fluxus alui in infantibus, &c.

2. Oleum Tritic. Parari potest destillando per descensum, ex tritico contuso, sed inusitatum est.

N. Aly extendunt triticum contu-

CCCL. *Tussilago.*

Tussilago { Vulgaris. Hæc vsualis.
 { rotundifolia
 { glabra.
 { Alpina { rotundifolia canescens,
 { folio oblongo.

Dicitur *βύσσα*, *Diosc. Cord. hist.* Vngula Caballina, *Brunf. Trag.* Tussilago, (Bechium,) *Matth. Fuchs. Cord. in D. Lon. Dod. Lob. Cast.* Vulgaris *Cam.* aliis Farfara, Farfarella *Germ. Hufflattich, Brandtlattich, Roszhub.*

Nascitur in amœnis ac riguis locis crepidinesque fluminum amat: Floret Martio.

N. Dicitur & filius ante patrem, quia Februario & Martio foliis nondum egressis, repente floret, floresque fugacissimos ultra biduum fere cum caule non persistentes profert.

OFFICIN. NAT.

Folia, Radix.

Vires. Radices & Folia virentia temperatis proxima sunt, (al. refr.) siccata verò modicè acris & calida euadunt. Planta est thoracica. Usus precip. internè in tussi) unde & nomen habet) orthopnea, vomitibusque pectoris, quibus singulis & fumus eius ore hiante attractus mederi creditur. Extrinsecus profunt ulceribus calidis & inflammationibus (folia recentia imposita.)

PRÆPARAT.

1. Syr. de farfara, è succo foliorum.

2. Conserua, è flor.

3. ∇ Stillat. è foliis.

4 Succus 9. diebus bibitus quarta-

E E e e 3 nam

4. Succus 9. diebus bibitus quartanam tollere dicitur.

V.

CCCLI. Valeriana.

Valeriana { Horrensis.
vfuales } Syluestris { Major.
sunt } Minor.

Horrensis insignitur, Phu magnum. *Fuchf. Matth. Lon. maius, Matth. Corh. hist. vetum, Cord. in D. Ponticum, Tab. Valeriana vera, nardus agrellis, Trag. Valer. major, Lob. Cam. Valer. horrensis, Dod. Ger. C. B. 1. (cui & Phu folio olifatri Dioscoridis) Carpesium, Cast. Terdina Paracelso, grosz Baldrian, grosz Barten Baldrian.*

Syluestris major, C. B. 4. Dicitur Phu similitudine Elaphobolci Dioscoridi, valeriana Brunf. vulgaris, Trag. Cord. in D. Syluestris, Lob. Dod. Cam. Clus. hist. maior, Tab. Phu paruum, Matth. Cast. Phu Diosc. Brunf. vulgare, Fuchf. Tab. Phu Germanicum, Fuchf. grosz vwild Baldrian.

Minor appellatur Valeriana palustris (syluestris) minor, C. B. Valeriana exigua vel 4. *Trag. Valer. minor, syluest. Lob. minima, Dod. syluest. seu palustris minor, Cam. Phu minus, Lon. Tab. minimum, Matth. Cast. Cam. (Epit.) klein Baldrian.*

CCCLII. Verbascum.

⚥, Candalaria, Candela regis, Lanaria, VVullkraut, Rertzenkraut, Brennkraut, Himmelbrand, Vnholdenkertzen, Rönigskertzen.

Phu vetum colitur nobis in hortis, in Ponto & Creta sponte prouenit, nasciturque in pratis, aliisque locis humidis: minus, in campestribus vdis: Florent Majo, Iunio ac Iulio.

Optima censetur hortensis, cui succedit minor, ac demum major.

OFFICIN. NAT.

Radix præcipuè, tum & Herba Phu veri.

Vires. *Calc. & sic. 2. aten. aperiunt alexipharmaca, sudorifera ac diuretica sunt. Vfus præcip. in imbecillitate visus, peste, asthmate, pleritide, obstruct. Epatis, Lionis, Vreterum, Hernia, Ictero, & sim. Extrinsecus confortant visum, maculas oculorum abstergunt, cephalagiam sedant, menses cient, sudorem promouent (in balneis) exiccant catarrhos (suffitu) bubonum ac anthracum malignitatem corrigunt, globulos sagittasue infixas extrahunt, ulcera inveterata mundificant.*

N. Sunt qui radicem pro amuleto febris quotidiana habent, eamque de collo suspendunt.

PRÆPAR.

1. Ex integra planta (radice, caule ac foliis) in fine Maij.
2. *Extrah.* Itidem ex integra planta vel radice sola paratur.

Verbascum
C. B. {
 mas { latifolium luteum, C. B. 1.
 { angustifolium pallidum, 2.
 Album { fœmina { flore luteo magno, 3.
 { { flore albo, 4.
 { { lychnitis flore albo paruo.
 Nigrum { fol papau. corniculati.
 { flore ex luteo purpurascete.
 { Salui folium. Hoc singulate & rarum speciebus, 4.

Ex his vsualiora sunt: Verbas. mas latifolium luteum, cuius Vicarium est, Verbas. fœmina flore luteo.

Prius insignitur Verbas. mas, *Matth. Cord. in. D.*

Verbas. mas, *Lob. Cast. Tab.*

Verbas. candidum mas, *Lon.*

Verbas. latius, *Dod. Tapfus barbatus, Ger.*

Posterius, Verbas. seu candelaregia, *Trag. Verbas. nigrum, Fuchf. Lon.*

Verbas. maximum album fœmina flore subpallido, *Lob. Verbas. luteum, Tab.*

Verbas. lychnite minus, *Ger.*

Crescunt locis arenosis: Florent Iunio.

OFFICIN. NAT.

Folia, Flores, Radix, sed raro.

Vires. Calf. moderate ac sic. emoll. discut. dolores lenit. Vfus precip. in morbis pectoris, tussi, expuitione sanguinolenta, torminibus ventris,

N. Radix hemorrhoidum fluxum & dolorem sistere dicitur (dieb. 9. vel 10. continuis assumpta.

Extrinsecus sum flores ac folia precipue astimationis, in sopiendis doloribus quibuscunque & inprimis in affectibus ac tumoribus ani (hemorrhoidibus) in capillis luteo colore tingendis.

PRÆPAR.

1. ∇ stillat. Ex floribus.

2. Oleum. Ex infusione iterata flor. in ol. oliu.

N. Matthiols oleum parat ex flori-

bus solis, quibus vitrum repletum, beneque obturatum exponit soli, quæ ratione flore aliquatenus liquefcunt.

CCCLIII. Verbena

Peristereum, Verbenaca, Verbena. Arab. Beneran, Albea, &c. *Cisenkiant, Fisenrich, Fisenhart, Danbenkiant.*

Verbena { 1. Communis. Hac vsualis.
 { 2. Tenuifolia Verbenaca supina, *Tab.*
 { 3. Fœmina V. *Erysimon.*

Dicitur Verbena, *Lon. recta, Trag. mascula, Bruuf. communis & sacra recta, Lob. Verbenaca, Matth. Cast. supina (& fœmina,) Fuchf. Cord. in D. recta, Dod. Tab. fœmina, Cam. vulgaris, Clus. hist. al. Columbaris. Verbenaca communis caruleo flore, C. B. 1.*

Crescit passim iuxta muros & vias: Floret Iulio ac Augusto.

OFFICIN. NAT.

Herba seu Folia.

Vires. Calfac. & sic. saporis amari, astring. Cephalica ac vulneraria est. Vfus precip. in dolore, aliisque affectibus capitis (a frigidis humoribus) in affectibus oculorum, pectoris, in tussi in veterata, in obstruct. Epatis ac Lienis, Ictero, torminibus ventris, dysenteria, inprimis atterit ac expellit calculum, libidinem coarctet, febrim tertianam fugat, arthritidem mitigat, vulnera sanat, partum

FFFF facilitas

facilitat. Extrinsicus in cephalalgia, odontalgia, alopecia, melancholia, in oculorum lippitudine, imbecillitate, rubore, in Angina, in raucedine (collo circum plasmata) in tumore glandularum, in faucibus (gargaris.) in dolore Lienis (cum axung. porci.) ac podagrigo mitigando, in vulneribus astringendis ac putridis abstergendis, in procedentia ani, in mariscis, &c.

N. 1. Sunt qui febrim tertianā ac quartanam peculiari modo eā curant. Nimirum in tertiana recipiunt geniculum tertium (a terra) idque sursum decerptum propinant: in quartana quartum.

N. 2. Amuleticè strumam verbenā curari, sunt qui statuunt. Modum Marcellus Empyricus edocet: Radicē transversim in partes duas inbet dividere, inferiorem suspendere de collo, superiorem in fumo. Sic arescente parte superiore & strumā arescere ait. N. Quod si utraque pars p̄ modum in fluentem coniiciatur, malum recrudescere idem asserit.

N. 3. In dolore capitis sedando quantum valeat si de collo suspendatur, videre licet apud Forest. lib. 9. observ. 5 2.

PRÆPAR.

1. ∇ stillat. Ex herba cum floribus æstate collectis.

2. Est & Unguentum de Verbena, aliàs Unguentum Iouis dictum. Vide August.

CCC LIV. Vermicularis.

Sedum minimum, Tab. 3 Fuchf. Sedum minus 3 & Vermicularis, Trag. Lob. 3. Matth. Cast. Semper viuum minimum, Illecebra f. Semper viuum, 3. Dod. Lon. diLcor 3. Dioscot. diL. acre, Cord. hist. Portulaca 3. Brunf. Vermicularis siue Illecebra, Ger. German.

Mauvpfesser, klein Hauswurtz.

Crescit in muris, locisque arenosis. Floret maximè æstate integra.

OFFICIN. NAT.

Folia cum floribus.

Vires. Calf. & sic. validè, saporis acerr. bilemper vomitum insigniter educit. Vnde vsus præcip. in febribus. Extrinsicus in laxitate dentium (quorum signaturam refert) ac putredine gingivarum scorbutica (gargarism.) rubificat, Vesicatoria est, strumas discutit.

N. Sunt qui pro amuleto febrili 9. C. de collo suspendunt.

CCCLV. Veronica.

Fhrenpreis, Grundtheil.

Veronica C.B.	Mas	1. Erecta.	2. Supina & vulgatissima. Hac vsualis.
		Fœmina seu pratensis fetpyllifolia.	angustifolia.
			minor.

Insignitur Teucrium, Trag. Veronica, Tab. Veronica mas, Fuchf. Lon. Veronica mas serpens, Dod. Veronica vera & maior, Lob. (cui & maior, septentrionalium.) Cam. Ger. Veronica vulgaris supina, Clus. hist.

Crescit in Dumetis. Floret Iunio, floribusque est subcæruleis, rarius candidis.

Eligenda quæ circa quercuum radices nascitur.

OFFICIN. NAT.

Folia, Flores.

Vires. Calfac. & sic. saporis amari & astringentis, incidit, vulneraria insignis ac sudorifera est. Vsu præcip. in erosione ac obstructione Pulmonum, Lienis,

nis, hinc & imprimis in colica, Phthisi scabie, pruritu, peste, vulneribus, &c. Extrinsicus famosissima est in vulneribus abstergendis, astringendis, in duritie Lienis, in colica (clysmat.)

1. *Conseru.* ex summit.
2. ∇ . *stillat.* Ex herba cum incipit florere.
3. *Syr.* Ex succo & saccharo.
4. *Sal.* Ex cinere.

CCCLVI. *Victoralis.*

Mas longa. *Hac vsualis.*
 { *Fœmina; est species glandioli, C.B. 3.*
 Appellatur. Allium montanum, latifolium maculatum, C.B. 9. (inter allia.) Allium alpinum, *Tab.* (cui & Victoralis mas.) Allium anguinum, *Matth. Cam. Portæ, Serpentinum, Cast. Ophioscoridon, Lob.* Victoralis longa, *Clus.* (cui & maior.) German. *Siegvvurtz.*

Crescit in alpihus: Floret cum aliis speciebus allij.

OFFICIN. NAT.

Radix crinita.

Vires. *Calif. & sicc.* perinde ac allium agreste, cui & in facultatibus aliis per omnia similis existit.

N. Plebi nostrati, Iudæisque amuletum est familiarissimum, quo à spectris aëreque infecto se tutos fore persuasi sūt.

CCCLVII. *Vinca.*

Κημάτις λευκή, Singrün, Ingrün.

- Clematis Da-
 phnoides, { 1. Minor. *Hac vsualis.*
 { 2. Maior.
 C.B. { 3. Flore pleno.

Nominatur Vinca peruinca, *Brunf. Lob. Tab.* peruinca, *Trag.* clematis,

Matth. Cord. in D. Clem. Daphnoides, Dod. Fuchf. Lob. Cam. Tab. Clus. h.

Solo gaudet fecundo: Floret Aprilis, Maio, viret semper. Flores carulei sunt, quandoque candidi, rarius rubentes vel subpurpurascetes.

OFFICIN. NAT.

Folia.

Vires. *Refrig. sicc. & astringit* (Doda-
 nao calfacit sic. amplius.) *Vulneraria*
 insignis est. *Vfus* precip. in fluxionibus
 alui, dysenteria, hamorrhoidibus, Expul-
 sione sanguinis, vulneribus, seroso liquore
 manantibus. Extrinsicus in profluvio
 mensium, narium, in laxitate & dolore
 dentium: lac extinctum renocat.

N. Adhibetur quoque ad profigan-
 dos morbos incantatione introductos (in
 lotionibus, &c.)

PRÆPAR.

∇ *stillat.* Ex Radice foliis ac flori-
 bus principio veris collectis.

CCCLVIII. *Vinceto-
 xicum.*

*Κωνίμας, Dioscor. Hirundinaria
 Schvvalbenvurtz.*

- Asclepias { 1. albo flore & Gerard.
 { *Hac vsualis.*
 C. B. { 2. nigro flore } minus
 { 3. Cretica } vsualis.
 { 4. Virginea }

Insignitur Hirundinaria, *Brunf. Trag. Lon. Vincetoxicum, Matth. Dod. Cast. Asclepias, Fuchf. Cord. hist. Lob. Tab. Cam.*

Crescit in syluis, locisque petro-
 sis atque arenosis: Floret Iulio ac
 Augusto.

OFFICIN. NAT.

Radix, raro Semen.

Vires. *Calfacit atque sicc. moderatè,*
 FFFF 2 atten.

atten. alexipharmaca ac sudorifera est insignis. *Vsus* precipui in peste, aliisque venenosis affectibus, in obstructionibus mensium, in palpitatione cordis, ac lipothymia, in Hydrops. Semen commendatur ad calculum. Extrinsecus *vsus* tam florum, quam radicum ac seminis est in ulceribus sordidis ac malignis purificandis, ad icthum insector. venenator. in ulceribus mammarum, &c.

Dosis rad. ℥j.

PRÆPARATA.

1. ∇. Ex integra planta.
2. Extract. cum S.V.

CCCXLIX. Viola purpurea.

Ex variis violarum classibus, quæ apud Botanicos occurrunt, tres officinis potissimum considerandæ veniunt. Viola purpurea Martia, de qua hîc. Viola lutea, de qua in Cheiri, ac Viola tricolor, de qua in Iacea.

E violis purpureis martiis inferuntur in officinas odoratæ, neglectis in odoris.

Insignitur Viola, *Lon.* Viola fatua, *Brunf.* Viola Martia odorata nigra seu purpurea, *Trag.* Viola purpurea, *Fuchs.* *Matth. Cast.* Viola nigra, *Dod.* *Cord. in D. Ger. Clus. hist.* Viola martia purpurea, *Tab.* Viola præcox, *Lob.* Viola martia purpurea flore simplici odoro, *C. B.* 1. aliis violaria, German *Biolenkraut*, *Beilkräut*, *bräunne Biolen*, *Mertz.* *Biölē.*

Eligatur odora.

Solo gaudet umbroso ac aspero iuxta vias, sepes & muros, &c. Floret circiter finem Martij ac initium Aprilis.

OFFICIN. NAT.

Flores, Folia, Semen.

Vires. *Violaria* (precipue flos) refriger.

1. hum. 2. (flores exiccati refrigerant imbecillius siccantque) emollit, laxat, cordialis est ac pectoralis, expectorationem promouet. *Vsus* precipui ac creberrimi in bile. precipue atra mitiganda, in feruore febrium compefcendo, doloreque capitis inde nato, intussi, asperitate gutturis, catarrhis acibus, pleuritide, &c.

N. 1. Flores alium leniter subducunt. Extrinsecus adhibetur herba crebro in lotionibus, cataplasmatibus, clysteribus, & sim.

Seminis *vsus* rarus est, isque in obstructione Renum, ubi emulsiõni potissimum inseruit, de qua nota, quod plerumque vomitum ac secessum moueat.

Dosis ℥ss. ad ℥j.

N. Flores locum sibi vendicant inter flores illos cordiales famosos.

PRÆPARATA.

1. Syrupus violar. solutiuus. Ex multip. infusione florum recentium in ∇. Vires. Ex viribus supra enumeratis, maxime lenit alium.

Dosis ℥ij. ad iij.

2. Syrupus ex succo violar. (Syrupus violar. simpliciter dictus.)

3. Syrupus violarum compositus *Messua.* Ex decoct. flor. ℥j. sem. Cidon. Maluæ, iuiub. scbest. añ. N. xx. in ∇ cucurb. ℔. vj.

Syrupus violatus regius, i. e. Iulep. violar. ex ∇ flor. & sacchar.

5. *Conseru.* Ex floribus selectis à parte herbacea (alabastris.)

6. *Acetum.* Ex infusione florum.

7. *Oleum.* Ex floribus infusis in oleo omphacino.

8. ∇ stillar. Ex floribus.

9. E rota herba.

10. *Tinctura.* &c. flores macera in propria ∇, leuiter exprime & colo.

N. *Addi hic potest spir. D* i ut in Tinctura

Tinctura Rosar. ait Blückerat: verum vereor, ne color inde mutetur, quod tamen viribus nihil derogat.

N. 2. Eleganter quoque violarum Tinctura conficitur, si flores phlegmate $\text{Q}i$. (N. pluries, 8. vel 9. super Q cohobato) irrorantur, digeruntur ac exprimuntur.

11. Extractum. Ex succo lentissimo igne inspissato.

2. Flor. violar. $\text{lb}\beta$. inde cucurbitæ etiam sine conquassatione, affusaque $\text{v}\alpha$ lbj pone in MB tepidum, ut coloratur: exprime ac procede ut moris: nimirum expressum succum novis floribus affunde, macera, exprime, inspilla.

Dosis ʒj . Sala.

N. 1. Gemmas integras non reiectis alabastris (foliis exterioribus) adhibere licet. 2. Et si color ultra semestre spacium non durat, nihil tamen inde viribus decedit. 3. Si ex floribus exiccatis idem conficere volueris, ad eundem illum modum id prestare poteris, praterquam quod maior aqua copia requiratur.

12. Trochisci. Vide Disp.

CCCLX. Vitis.

Κίττος εινοςόπος , Vitis Vinifera. Arab. Harin. VVeinstock , VVeinreb .

Loca amat aprica: Flore Junio.

OFFICIN. NAT.

Folia, quibus adiungi poterit Succus (lacryma) ex amputatis palmitibus extillans, sic & Vinum, Omphacium, Tartarus, Vua, Acini vuarum Vua passa, Vinacea, quippe hæc omnia absque operatione officinali suppetunt:

Vires. Folia (pampini) capreolique refrigerant, astringunt valide. Vsu precip. in dysenteria, vomitu, pica, expunctione sanguinis aliisque hemorrhagiis si-

stendis, (succus expressus assumitur.) Extrinsecus refrigerant ac leniunt capitis dolores ac æstum, conciliant somnum in lotionibus pedum, ut & ipsi capiti adhibita.

Succus ex amputatis palmitibus extillans. (Aqua vitis, Lacryma Vitis.) Intrinsecus vim habere creditur attenuandi & expellendi calculum: oculorum caligini medetur ac rubodini, (oculis instillata) impetigines sanat, si locus affectus nitro antea fricatus, ea lauetur.

N. De Vino Omphacio, aceto ac Tartaro vide suis locis infra.

Vua immatura, (Agrestæ.) Refrigerant & siccant, astringunt. Proin poterit esse usus earum in febribus ardentibus, excitant scilicet appetitum, fluxum ventris sedant, astringunt sanguinem indigestum procreant. Vide etiam omphacium.

Vua matura. Calidæ & hum. i. recenter deglutita generant inflationes & cruditates ventriculi, diarrheam, & sim. magis tamen id faciunt albescentes, minus rufescentes. Exiccata vua ventriculo commodiores sunt, appetitumque excitant, aluum laxant.

Vua passa sunt vua matura vi caloris exiccata. siua calore solis exiccatio illa peracta sit, vnde passulae dulciores resultant: siue calore clibani, vnde dulcoacidæ. Prostant vuarum passularum potissimum genera tria. Passulae scilicet maximæ, seu Damascenæ Zibebæ dictæ. 2. Passulae maiores Germanicæ Rosinlein, è quibus sunt, quas vnas Massilioticas vocant Germ. blaue Rosinen 3. Passulae minores seu Corinthiæ, kleine Rosinlein, Corinthen.

Vires. Omnes calida sunt seu temperata, leniunt, aluum laxant, acrimoniam hebetant, ventriculo, pulmonibus ac Epatici grata sunt, tussim mitigant. Zibebæ

dicta exemptis acinis, (gigartis) in
 ▽ fontan. vel stillat. conuenienti infu-
 sa, potum agrotis exhibent sat gratum
 sitique conuenientem. Acini vim habent
 astringentiam, conueniuntque in vomitu,
 aluique fluxu, siue intrinsecus, siue ex-
 trinsecus adhibeantur (torrentur scil. ac
 teruntur.)

Vinacea, i. e. siliqua cum acinis in
 expressione musti residua, magnarum
 virium perhibentur in arthriticis dolo-
 ribus sedandis. Si membrum affectum
 Vinaceis per se calescentibus imponatur.

P R A E P A R A T.

1. Conis sarmentor.

Vires. Adhibetur ad cauteria, & fur-
 fures capitis extergendos.

2. Loch passulatum. Vid. l. 2.

3. Mel passulatum. Vid. l. 2.

4. Condit. passula laxatiua. V. A.

CCCLXI. Virga aurea.

- | | | |
|-------------------------------|---|---|
| Virga au-
rea C. B.
est | } | 1. V. A. maior seu Doria. |
| | | 2. V. A. latifolia ferrata.
Huius loci. |
| | | 3. V. A. angustifolia ferra-
ta. Hac & sarracenicam
dicitur. |
| | | 4. V. A. angustifol. minus
ferrata. Hac Serrata
surrogari apta est. |

Secunda dicitur Virga aurea, Cam.
 Epit. Ger. V. A. ferratis foliis, Tab. V.
 A. altera ferrato folio, Lob. V. A. mar-
 gine crenato, Dod. V. A. minor laci-
 niatis foliis, Cam. Germ. gulde WWund-
 kraut, ein ander Hrydnisch WWundkraut.

Quarta dicitur V. A. Matth. Dod.
 Lon. Cast. Villanouani, Lob. V. A. foliis
 non ferratis, Cam. Epit. V. A. maior, an-
 gustifolia, Cam. Symphytum petraeum
 3. Tab.

Crescit angustifolia vt plurimum

in syluis: latifolia in collibus, agrorum-
 que marginibus & vineis. Floret Iulio
 & Augusto.

O F F I C I N. N A T.

Folia & Flores.

Vires. Viraque calf. & sicc. 2. astringit,
 vulneraria est celeberrima, intrin-
 secus & extrinsecus adhibita, nec non
 & lithonriptica diureticaque non e po-
 stemis. Confert itidem diarrhae & dy-
 senteria, sanguinis exspuitioni medetur,
 mucilaginem Renum & Vreterum effi-
 caciter abstergit, purredinem gingiua-
 rum, dentiumque vacillationem curat.

P R A E P A R A T A.

▽ stillat. Ex herbacum flor. Iulio &
 Augusto collecta.

CCCLXII. Virga aurea, alias
 consolida Sarracenicam.

Solidago Sarracenicam. Trag. Fuchs.
 Dod. Lon. Lob. Consolida aurea, Tab.
 Herba Doria, Ger. icon. Virga aurea
 angustifolia ferrata, C. B. 5. Heydnisch
 WWundkraut.

Crescit in locis montanis, sed ma-
 gis vdis & depressis.

O F F I C I N. N A T.

Folia.

Vires. Astringit, amara est siccaturque
 euidentissime, vulneraria est insignis vsu
 interno & externo adhiberi apta, mede-
 tur & fistulis, vlcera maligna mundifi-
 cat ac sanat.

CCCLXIII. Vlmaria.

Barba Caprina 1. Lon. Barbi Capra,
 Lob. Barbula Caprina 1. Trag. Mede-
 fusium, Cord. hist. Regina prati, Dod.
 Ger. Vlmaria, Clus. Tab. Barba ca-
 pra floribus compactis, C. B. 2. Germ.
 Geisblat.

Geisblat.

Crescit locis vdis iuxta flumina, & sim. Floret Iunio, Julio.

OFFICIN. NAT.

Folia cum floribus & nonnunquam radix.

Vires. Refrig. siccant, astringit, sudorifera & alexipharmaca est, prosm conuenit in fluxibus omnis generis, in diarrhaa, dysenteria, fluxu menstruo nec non in expuitione sanguinis, resistit pesti. Extrinsecus sunt, qui radicem recentem contusam vulneribus imponunt, tum ad sistendum sanguinem, tum ad consolidanda vulnera.

PREPAR.

1. ▽ stillat. Ex foliis cum floribus.
2. Extract. Quod admodum Quercetano probatur in peste. Ph. Rest. cap. 26.

CCCLXIV. Vrtica.

Maxima }
 Vrens } Ha v-
 Minor } suaes.
 Romana }
 Fatua est Cannabis sylue-
 stris.
 Mortua, vide infra.

Maxima dicitur Vrtica major, Brunf. Fuchf. Lon. Tab. Vrtica vulgaris Vrens, 1. Trag. Vrtic. 2. Matth. Cast. Vrtica, Cord. in D Vrt. vrens, Ger. Vrt. vrens altera, Dod. Vrt. syluestris asperior, Lob. Vrt. communis seu maior & foemina, Lob. Vrtica vrens maxima, C. B. 1. Germ. grosse heisse Brennessel.

Minor insignitur Vrtica minor, Brunf. Fuchf. Cord. hist. Lon. Tab. Ger. Vrtic. 3. Trag. Matth. Cast. Vrtica vrens minima, Dod. Vrtica minor

acrior, Lob. Vrtica vrens minor, C. B. 3. heiter Nessel.

Romana dicitur: Vrtica legitima, Clus. hist. Vrt. Rom. Trag. Fuchf. Matthiol. Romana vel mascula, Lob. Cam. Tab. Ger. Vrt. 1. Dath. Cast. Vrtica vrens, 1. Dod. Germ. Rœmische VVelsche Nessel.

1. & 2. Crescunt passim locis arenosis iuxta sepes ac muros, &c. Prior potissimum syluas amat. 3. colitur in hortis. Omnes vigent ætate.

OFFICIN. NAT.

Vrticæ maximæ Radix, Semen) Iulio & Austusto colligendum,) Folia, minor. Herba, Romanæ, Semen.

Vires. Vrtica omnis calf. moderatè & sicc. 2. partium tenuium est, aperit, incidit, absterg. emollit, diu eti- ca est, & lithonriptica, peculiariter- que cicuta aduersatur, ut & Hyos- cyamo. Radix (vrtica maxima) com- mendatur maximoperè ad Ictorum. Herba vsus in gangrana (decocta & propinata.) Eadem in olerè sumpta soluit aluum, abstergit Renes, calculos expellit, expectorationem, morbillorumque eruptionem promouet. Semen (Roma- ne.) vsus crebri est in Pulmonum af- fectibus, asthmate, tussi contumaci, pleu- ritide, peripneumonia. Extrinsecus re- primit vrtica vuam inflammatam (in gargaris.) sedat hamorrhagiam na- rium (vrtica minor scil. contusa vel & succus eius expressus naribus inditus,) gangranam mundis. car.

N. 1. Nouerunt & Chirurgi vrentis vrtica fricatu sanguinem allicere, adeo- que atrophie subuenire.

N. 2. Prurigini ab vrtica introducte medetur oleum oliuarum.

CCCLXV. *Vrtica mortua seu
Galiopsis.*

Varia genera & vrticæ mortuæ passim observantur, colore, odore, figura, & sim. differentia. Datur fœtida & non fœtida: maculata & non maculata: flore purpureo, albo, luteo. Primas autem præceteris dant fœtidæ ac præcipue maculatæ, quam genuinam suspiciantur Galiopsis Dioscoridis, ex lacteo scil. ductu, qui folia media in longum intersecat. Huic surrogari tamen non nequit & fœtida non maculata.

Maculata insignitur Lamium alba linea notatum, C. B. 5. Vrtica lactea, Matth. Galiopsis Dioscoridis, Cam. Milzadella vulgo seu Lienaria (quod lieni conveniat.)

Non maculata est, quæ inscribitur Lamium purpureum fœtidum folio subrotundo, seu Galeopsis Dioscoridis, C. B. 1. Vrtica labeo mas, Brunf. Lamium, Trag. (vel vrtica 8. 9. 10.). Fuchf. Galeopsis, Cord. hist. Lon. 2. Tab. purpurea, Cast. Vrtica iners altera, Dod. non mordax, Lob.

Crescunt iuxta sepes, patietes, vias, in rudibus, &c. magna ex parte tota æstate florent.

OFFICIN. NAT.

Herba cum floribus.

Vires, Calfac. & siccat. præcipue commendatur Galiopsis fl. purpureo ad dysenteriam (decoctum propinatum) flores albi ad fluorem album specificè celebrantur. Extrinsecus medetur vrtica panno, &c.

PRÆPARATA.

Conserua. Ex floribus albis.

CCCLXVI. *Zedoaria.*

Zedoaria	$\left. \begin{array}{l} 1. \text{ longa} \\ 2. \text{ rotunda} \\ 3. \text{ tuberosa} \\ 4. \text{ Geiduar} \end{array} \right\}$	Hæc promi- sua vsuales,	
Zuurver,		$\left. \begin{array}{l} 3. \text{ nigricans} \\ 4. \text{ Geiduar} \end{array} \right\}$	inuisitata,
C. B.			

1. Insignitur Zedoaria, Lon. Matth. Lob. Zed. radice longa, Clusf. in Caroll. Zedoaria & veterum Arnabi, 2. species radice longa, Cord. hist. C. B. Zadura, Zaduvar, Zudar, &c. Fuchf. in comp. med.

2. Dicitur Zerumbet Serapionis, Lob. Zurumbethum, Cord. hist. Zerumbeth & Zedoaria rotunda, Fuchf. comp.

N. 1. Datas hæc Zedoarias non differre inter se, nisi sola forma, adeoque eiusdem radicis partes esse, videre licet apud Lobelium in aduers. & observ.

N. 2. Tabernaemontanus & Matthioli Zedoariam Auicenna nihil aliud esse, quam Antoram modernorum, probare nituntur, Dodonæus Zedoariam officinarum pro Zerumbeth Auicenna & Serapionis, habet.

Aduerhitur è Sinatum regione & ab extremis Indiæ finibus.

OFFICIN. NAT.

Radix sola.

Eligitur odorata, albida, amara, ponderosa, non cariola.

Vires. Calfac. & sicc. 2. incid. flatus discutit, amarissimi est saporis ac alexipharmaca. Vsus præcip. in doloribus colicis atque ventriculi: animalium venenatorum moribus opitulatur, lienteriam viam sistit, vomitiones reprimit, menses ciet, suffocationi vteri efficaciter succurrit, aluit in eas quascunque enecat, antidotis permiscetur.

PRÆPAR.

1. Condit. Zedoria. Conditur vt Zinziber.

Zinziber.

2. *Confect.* Zedoaria. Fit l. comm.

3. *Extract.* Fit cum ∇ .

N. Substitui poterit decoctum infusatum.

4. *Oleum stillat.* cum ∇ ascendit.

5. ∇ stillat.

6. *Balsamus.* Ex oleo & corpore olei nucista.

tica Arabica.

Vires. *Calsac.* potenter, sed non primo statim occursum, adeoque partium est crassiorum, earumque non terrestrium, sed aquearum, & consequenter humectantum: aperit, incidit, attenuat. Confert ventriculo, thoraci, aliisque visceribus. appetitum prostratum excitat, putredini ac malignitati humorum resistit.

PRÆPAR.

1. *Zingiber in India seu China conditum.* Conuehitur ad nos ex India, conditum sc. recenter saccharo, vel quodam mellis genere, quod quibusdam è siliquis exprimunt.

2. *Conditum nostrate.* Fit lege commun. Vide l. 2.

3. *Confectio Zingiberis.* Macera radices aliquandiu in ∇ vel lixiuio, postea scinde in tenues & oblongas particulas, exiccaque: hinc confice l. c.

4. *Zingiber laxatinum.* V. August.

5. *Spec. Diazingiber.* V. Disp.

6. \odot stillat. Fit lege commun. V. l. 2.

CCCLXVII. Zinziber.

Zingiber.

Zingiber, Zingiberis, Zingiberis, Zingiber, Lob. Monard. Zingiber & eius siliqua, *Matth.* Zinziber, *Lon.* Gingiber, *Garz.* ab H. Arab. Zingibel seu Lengibel, *Ger.* Imber, *Ingber.*

N. Reperiuntur apud Aromatarios radices albis & rubentes: hæc rubrica, illa sæpè creta infecta, quo a teredinibus quibus candidiores & molliores magis obnoxia præseruentur.

Aduenitur copiosum ex Calecut India Emporio, atque ex Troglodi-

CLASSIS II.

De Alterantibus secundariis, quæ sunt Succis, Olea, Lachryme, Resina, Gummi Resina, Gummata.

CCCLXVIII. Acetum.

(pomaceis, pyraceis) ex melle, &c.

Acetum est liquor aciditate terreficiori ac fixiori (\oplus licam vocant) imprægnata.

Delictus: Acetorum maxima diuersitas est, variantque naturâ, viribus ac præstantiâ, pro varietate rerum ex quibus confecta ea sunt. Sunt enim aceta ex Vino, Cereuisia, ex succis fructuum

Vsitiora autem sunt vinacea, quæ recipienda quoties aceti simpliciter fit mentio.

Hæc itidem variantia occurrunt. (Etenim vt vinum differt præstantia, ita & aceta exinde confecta.) Eligantur igitur quæ ex meliori ac generosiore vino, vt pote omnium vegetabilium principe & maximè omnium vitriolato,

G G g g confecta

confecta sunt.

N. Ad menstrua metallis solvendis destinanda, eligenda sunt imprimis aceta hydromelitura vinosorum, utpote quae cum manna caelesti (melle) naturam animale[m] praeter vegetabilem ex floribus induerunt, atque ita alia menstrua solvendi potentia superant. Et haec sunt aceta illa Philosophis usitata, unde & philosophica dici solent, de quibus amplius in menstruorum descriptione, l. 2. c. 57. Vide etiam Quercet in Tetrad.

N. De reliquis acetis cerevisiarum succ. pomaceorum aut pyraceorum immaturorum, viliorumque vinorum, uocatur, quod rerum metallicarum solutionibus minus sufficiant.

Vires. Substantia acetum est mixta, frigida ac calida (superat tamen frigiditas caliditatem) in reliquis siccatur: partium est tenuium attenu. penetr. astring. putredini resistit, sudorem ciet.

N. Acetum accedit proximè ad naturam D^i , primasque tenet praeceteris correctivis, quorum opera gummi calfacientia, succine venenaticorriguntur. Per se quoque singulare est remedium aduersus ictus serpentum, etiam venenatissimorum, quales sunt aspidos. Quercet. in Pharm. rest. c. 24.

PRÆPARATA.

I. ACETA DESTILLATA.

1. Acetum destillatum commune.

R^i . + fortissimum, destilletur ex cucurbita vitrea in B. M. vel cineribus leniss. calore: primo ascendit phlegma insipidum (fermè quarta pars liquoris,) quod phlegma ubi extillaverit, (acido odore & sapore id deprehenderis) muta recipiens, colligèque X (spir. +,) seorsim, continuando destillationem, donec spiritus omnes ascenderit.

N. 1. Si ad extracta usque medicos X destinetur, cauto opus est, ne nimium urgendo impetiosa concilietur: sin vero ad metallicos labores; urgendum erit donec rubri spiritus adtollantur, nihilque amplius spirituum exeat: id feliciter fiet in arena.

N. 2. Alyrethificanti aliquoties cohobando, tandemque partem aliquam phlegmatis leno M^c calore abstrahunt Sen. instit.

Vires. Phlegmatis usus esse potest in Extractionibus quibusdam, E.g. viridis aris pro conficiendo D^o Q^i & aliarum Tincturarum.

2. Acetum ex fecibus.

R^i . Feces +, (die Mutter vom V^e in-essig,) destilla per vesicam cum refrigeratorio ac prodibit X igneum.

Vires. Solut metalla, &c. Kesler. 4. c. 65.

3. Acetum Radicatum, seu alkalisatum.

R^i . Fecum, ex X destillatione relictarum I^b 3. vel 4. calcina ad siccitatem, dein affunde X , idque iterum abstrahere in arena, roties cohobando, donec omnis O cum X ascenderit. Sennert. Instit.

Aliter R^i . O + i volatilis (vide infra) p. j. X q. 4. confunde & destilla per arenam in Retorta, dando in fine ignem satis fortem. Destillatum destilla iterum supra O fixum cohobatis roties repetitis, donec omnes cum X ascenderit. *Beza in l. 2. c. 5.*

R^i . H^i mens. 1. affunde supra F calcin. I^b 3. O iij. destilla, cohobaque aliquoties, tandem que supra recentem F calcin. & O funde, destillationemque reitera. *Vide Kesler. 4. cap. 78.*

4. Acetum mellitum.

R^i . Mell. I^b 4. + ad emin. 4. digitor.

tor. destilla ex arena. Exit aqua acerba, quam rectifica.

Vires. Soluit Corallia, Margaritas, & reliquos lapidos pretiosos.

5. Acetum Terebinthinatum.

Fit ex aceto & Terebinthina per simul destillatis, hinc oleo & spiritu ab ∇ separatis. *Hartman.*

6. Spiritus Aceti S. Cloff.

Destillentur lb vi. + in **MB** paulo ultra tepidum incalescente, donec sexta tantum pars restet lbj . vix excedens, quæ vnâ cum cucurbitâ & X in cineres transportetur, & destilletur ad siccitatem vsque cum cohobio ter & quater super fæces repetito. Quod si adhuc fortiores exoptes, tunc ex crystallis fecum + cum boli f. q. globulos concinna, qui per O acti Δ nudo in Recip. quod prædictum + spiritum contineat, rectificatque igneum atque corrosiuum Lum dabunt, metallorum solutionibus aptissimum.

N. Sal X enanescit ab Extractis & Tincturis quibuslibet per putrefactionem cum V & abstractionem fortem in cineribus, Sic enim Sal fit volatile & z z z illius qualibet vice ascendit.

II. CRYSTALLI EX ACETO.

z . H ad mellis consistentiam inspissatum, reponere ad crystallifandum f . artem. Crystallus purifica soluendo (e. g. in phlegmate + abstracto,) & crystallifando. *Libanius.*

CCCLXIX. Gummi Ammoniacum.

ἁμμωνιακόν, ἁρμονιακόν, vel ἁμμωνιακόν

Dioscoridi Hammoniacum, Ammoniacum, Thymiana, Gutta ammoniaca, *Corâ. hist.* Ferula lacryma, *Galeno.* Ammoniaci lacryma, *Matth. vulgò* Ammoniacum. Arab. Altathur, Raxach, Aafach, &c. *Ger.* Gummi *Armoniac.*

Gummi est stillans ex ferula quadam, quam ad differentiam aliarum Ammoniaciferam vocant, alij Metopion. Dicitur autem Hammoniacum ab Hammonis oraculo, iuxta cuius delubrum colligitur.

Eligendum est sincerum, instar Thuris in grumos condensatum, odore Castoreum vtrunque æmulans, sapore amarum, digitis tractatum mollescens, bene coloratum (exterius flauum, interius candidum.) Et hoc σπῆρασμα , (chrauston Plinio, i. e. fragmentum) appellatur: sicut id quod terræ, calculorumve particeps est, φύραμα , (Phyma Plinio, i. e. mixta) dicitur.

Vires. *Calfac. 2. sicc. 1.* emollit, attenuat, resoluit, digerit, maturat, attrahit valide, ut quoque spinas carni infixas eliciat, aluum mouet, splenicum est. *Vsus* præcipuus est in doloribus arthritidis, in resoluenda mucilagine \square ea viscosa, crassa ac contumaci Pulmonum, Mesenterij & hinc in obstructionibus contumacibus Lienis, Epatis, Vteri, in calculo. Extrinsecus in scirrhis, panis, tophisque iuncturarum, in scrophulis, aliisque tumoribus durioribus resoluendis, &c.

Dosis à ʒj . ad ʒj .

GGgg 2 PRÆPAR.

PRÆPAR.

1. *G. Ammon. depuratum.* ℞. Gummi, q. v. solue, cola ac exprime, hinc inspissa.

N. Soluitur in quocunque liquore aqueo + Vino, succo, &c. Usitatus tamen per + depuratur.

2. *Ol. stillat.* Fit per X , vesicam vel Retortam. Vide supra.

Vires. Omnibus confert affectibus, quibus Gummi Ammoniacum.

3. *Oleum caruleum S. Cloff.*

Feliciter eliciuntur huiusmodi olea per O tribus fulcris è luto sicco statuminatam in capella sabulo & cineribus vacuâ, coopertâ tamen, dando Δ lentum. Rectificentur.

N. Simili modo eliciuntur olea ex Galbano & Sagapero.

4. *Pilula de Ammoniaco.* Vide l. 2.

N. Ibidem describuntur Pilula F res diuersæ, quarum non minima portio Ammoniacum existit.

5. *Extractum Resinosum seu Resina* Vide l. 2.

N. Conuenit viribus cum ipso *G. Ammoniaco.*

6. *Extractum viscosum.* Vid. l. 2.

Vires. Lenit asperitatem aspera arteria, incrassat acres ac tenues catarrhos, unde & utiliter linctibus commiscetur.

CCCLXX. Gummi seu Resina Animæ.

G. Ani-
mæ } 1. fuluescens & pellucidum.
2. nigricans & taurino glutini vel colophonix simile.
3. pallidum & retortidum.

1. Animæ est Resina pellucida ex albo citrinescens, in noua Hispaniola seu America ex arboribus quibusdam proceris incisus extillans, Thuri simil-

lima, quo tamen maiora grana refert. Et hæc nobis vsualis est.

N. Veteribus incognita statuitur. Amatus tamen pro cancro veterum habet. cui consentit Garzias.

Eligenda est albida seu flavescens, granulata oleosa, si frangatur Citrina, fragrantissima ac gratissimi saporis, carboni imposita facile liquefcens

2. Myrtæ quodammodo assimilatur.

Hanc esse Minæam Galeni vel Ammineam Dioscoridis & Serapionis idem vult Amatus, adeoque Animum Lusitanis dici. Vide Myrtæ.

3. Ex ea species, quam ex India Orientali afferunt, granis minoribus granulata. Hæc vt colore ac pelluciditate priori cedit: ita & viribus minor est.

Vires. Calfac. 2. hum. 1. atten. resolu. astring. discutit. cephalica est. Vsu præcipuus est externus in capitis ac neruorum affectibus frigidis, dolorificis, catarrhosis, flatulentis, in affectibus articulorum, paralyfi, contractura, laxationibus, contusionibus, &c.

N. Soluitur vt alie Resina in oleo, tum quoque in ∇ rectificatissimo.

PRÆPARATA.

Ol. still. Fit vt ex aliis Resinis, per Retortam ex arena. Vide l. 2.

N. Colligi possunt sigillatim oleum tenuius ac crassius. Sala in Hydrolog.

CCCLXXI. Gummi Arabicum.

Gummi simpliciter, Gummi Thebaicum, Gum. Babylon. Gum. Saracen. Gum. Acanthin. ex arbuscula quadam manat, quam Dioscorides Acaciam vocat. Estque Gummi naturæ prorsus aqueæ.

Eligendum

Eligendum vitri modo pellucidum, syncerum, in vermiculorum speciem contractum, candidum vel ad flavedinem inclinans. Reprobandum sordidum, resinofum, adulteratum. Adulteratur enim admixtione gummicerafor. prunor. & sim. vel ex resinarum quarundam, id quod cognoscitur solutione in ∇ , quia syncerum liquidissime ac limpidi-
 ssime soluitur, adulteratum non item.

Vires. *Calf. & hum.* 1. inspissat, poros cutis obstruit, acrimoniam medicamentorum ebundit, asperitati aspera arteria ac ruffi confert, ocularibus medicamentis & arteriatis commodissime adhibetur.

PRÆPARATA.

1. Pulvis.

N. Vi bene pulveretur, calfiant mortarium ac pila.

2. *Depuratum.* Soluitur in ∇ colatur ac inspissatur.

CCCLXXII. *Asa fetida.*

Onos un d nos, Suprados, (olin u p r a t u s,) Laser medicum, fetidum, Arab. Altit, vulgo Asa fetida. Germ. *Tensfelsdreck.* Succus est siue Lacthryma Laseris siue Sylphij in Media, Lybia ac Syria crescentis. (non Laserpitij Dioscoridis, cuius succus modernis incognitus est.) Et ex illius radice ac caulibus incisus colligitur.

Eligenda est syncera allij odorem ferè amulans, viscida: reprobanda adulterata. Adulteratur enim permixtione farinae, furfuris, sagapeni.

Vires. *Calf. 3. incidit, & c.* *Vsus* internus precipuus, in suffocatione vteri, peripneumonia ac vulneribus, aliàs raro adhibetur. *Extrinsicus* in tumido Lienis, vteri suffocatione, panerisio (cum

allio cui alb. suscepto.)

Dosis à ʒss. ad ʒj.

N. 1. Soluitur super prunis coquendo in ∇ , aceto aut vino.

N. 2. Si quis Epilepsia obnoxius senserit suffitum ex Asa fetida ac cornu caprino, paraxysmo actutum corripitur.

PRÆPAR.

1. *Pilula de Asa fetida.* ʒ. Asa fetid q. v. humecta, vel solue cum \times ac redige in massam.

2. *Pilula fetida.* Vide Disp.

B.

CCCLXXIII. *Balsamum verum.*

Balsamum Syriacum, Ægyptiacum, Balsamelæum, Opobalsamum, Bals. de Mecha; est liquor Balsameus, flauus instar Terebinthinæ, odoris fragrantissimi, saporis subamari & acris, sudans ex balsami tum fruticibus, quoad corticum vulneratis, tum ex ramusculis amputatis.

N. 1. Si guttula aqua tepida immittatur, per totam superficiem sese extendit, ac rursum aqua refrigerata sese contrahit, lacti instillatum id ipsum coagulat, in vestem laneam effusum non linquit maculam, secus ac alia.

N. 2. Tanta estimationis est, ut Princeps Arabia Felicit, cui etiam Mecha parer, singulis annis inter alia munera tres quatuorue libr. Turcarum Imperatori honorarij loco transmittat. Cayritidem Praefecto unam. Quin & Ducibus peregrinis idem ceu maximum honorarium presentat.

Vires. Inter olea quavis & balsama omnium est laudatissimum, praestantissimum, ac toto orbe maxime celebratum, vitpote quod vires habeat abigendis mor-

bis tam internis quam externis, nulli medicamento secundas. Confert febricitantibus, asthmaticis, iecoris obstructions soluit, menses mouet, stomachi dolores sedat, phibicos iuuat, appetitum excitat. Vide prolixius Balsamum de Tolu, & Clusium in Monard. vt & Petrum Bellonium in Observationibus suis. Alpinum de plantis Egypti, vt & in Dialogo de Balsamo peculiariter conscripto.

CCCLXXIV. Balsamum de Tolu, seu Tolutanum.

Balsamum de Tolu est liquor Balsameus, coloris rubei ad aureum tendentis, mediæ inter liquidum & densum consistentiæ, valdè glutinosus, & vbicunq; reponatur firmiter in hærens, saporis dulcis & grati, non nauseabundi (secus ac reliqua balsama) odoris excellentissimi, Limoniorumque fragrantiam, vel Iasmini quodammodo referentis, præsertim si paxillum in volâ manus fuerit fricatum.

Aduchitur ex Continentis quadam Prouinciâ, inter Cathaginem & Nomen Dei sitâ, Toluab Indis appellatâ: vbi colligitur ex arboribus Pino pumilæ similibus, iisque tum domesticis, tum syluestribus, quæ vulnerato cortice præstantissimum hunc liquorem fundunt.

Vires. Antecellere videtur facultatibus ei, quod è noua Hispania adducitur (Peruiani nomine) efficaxque est ad omnia, ad quæ Balsamum illud Egy-

ptiacum. Calfac. & sic. atten. resoluit, vulnerarium est, pectus expurgat, &c. Vfus præcip. in asthmate, phibisi, in ventriculi cruditate & dolore. Exvinsæcus doloribus à causa frigida quibuscunq; & in primis capitis, arthriticis & nephriticis; in deflexionibus ad oculos cobibendis, in paralyti, in ventriculi inbecillitate, dolore, inflatione (inurctum cum oleo nardino) in Hydrops (illitum cum Vnguent. aperitiuo,) in Lienis imbecillitate, in tumoribus quibuscunq; ac œdematibus, in contractura: parotides insuper seu serophulas cacas curat. Inprimis autem celebratur in vulneribus consolidandis, defendendis, præsertim si ossa quoque sint contracta, (quippe fragmenta expellit) in vulneribus articulorum, sectionibus neruorum, puncturis, contusionibus, &c.

Dosis gr. iij. iiij. &c. Nicol. Mon.

N. Balsamum hoc illud esse arbitror, quod nostratibus Balsamum de Honduras dicitur.

CCCLXXV. Balsamum Indicum.

Balsamum Indicum nouum, Matthiol. Balsami genus nouum, Fragos. Bals. Peruvianum, Germ. Indianisch. Balsam. Est liquor fragrans arboris cuiusdam Indicæ, Balsami dictæ (Indis xylo) coloris ex tum albo tum nigro rubentis, odoris suauissimi, saporis acriusculi & aliquantum amari. Affertur ex America seu noua Hispania Indiæ Occidentalis. Monard.

Limpidum subalbidum: Ex cortice arboris fauciato stillans: opobalsamum vocant, nostratibus officinis dicitur Balsam. Indicum verum. Germ. *Der vveisse Indianische Balsam.*
 Est Crassius. Ex segmentis truncatissimisque cum ∇ coctis supernatans: dicunt Xylobalsamum: nostratibus appellatur Balsamum Indicum, seu Balsamum Indicum vulgare, nigrum.

Prius præstat limpidius; posterior diligatur purpureum, suaveolens (ut vel optimo Stryraci calamitæ nihil cedat) cuius guttula, carboni instillata suavem suffitum præbeat. Reiciatur nigrum, crassum, odoris grauis.

Vires. *Calf. & succ. 2. discut. emol. substring. Vsus præcip. in asthmate, phthisi, nephritico dolore, mensibus obstructis, ventriculi debilitate ac dolore, Epate obstructo, utero squalido, atque inde ad concipiendum inepto, suffocatione ex utero, &c.* Extrinsicus lenit dolores ex humoribus frigidis ortos, discutit humores aqueos, roborat caput ac nervos, asperitates, contractionesque sanat, ventriculi flatibus discutit, cruditates tollit, lienem durum emollit, nephriticum dolorem mitigat, urinam remoratam promovet, arthriticis doloribus summè confert: in Chirurgia, proficuum est vulneribus recentibus (tum consolidando, tum noxia discutendo): inueteratisque, necnon & nervorum prodest contusionibus: febicitantibus confert, spinam ante paroxysmum inungendo, atque cum Vino guttulae aliquot exhibendo, idque iteratis vicibus.

Dosis gr. 4. 5. 6.

N. Tanta censetur efficacia, ut sint qui Opobalsamo seu Balsamo Syriaco substituere non vereantur. Nicol. Monard.

PRÆPAR.

Spiritus ac ol. still. Fit per arenam ex Retort. Δ . Sic extillat post roridam ∇ oleum clarum instar sacchari can-

di coagulabile (Spiritus.) 2. post flavescere incipit igne fortiori, (oleum:) 3. in retorta manet materia instar colophonæ.

CCCLXXVI. Bdellium.

Bdellium, Bolchon, Malathram, Maldacon seu Madelcon, Lachryma est arboris cuiusdam spinosæ nascentis in Arabia, India, Media. Videatur Matth. Cord. hist. Casalp. Frag.

Probatur gustu amarum, translucidum cum frangitur, pingue cum fricatur, odoratum, subamarum, facile mollescens, syncerum (Parthicum nominant.) Reprobatur sordidum, nigrum, in offas conuolutum, quod Adrobalon nuncupatur.

N. Sunt qui Anime legitimum Bdellium esse putent.

Vires. *Calf. & succ. (N. aliis calfac. 3. succ. 2. aliis calf. 2. hum. 1.) digerit, discutit, sudorem mouet. Vsus præcip. inter. in tussi ac pulmonum apostemate, calculo atterendo, urinacienda, mensibus immodicè fluentibus, ut & in fluore uterino sistendo, fœtu expellendo. Extrinsicus discutit hernias, mollit durities ac nervorum nodos, adeoque creberrimi usus est in Emplastris sticticis.*

N. Contusum soluitur affuso vino, aut aquâ calidâ.

PRÆPAR.

Pilula de Bdellio. Ex Bdellio & Myrobalanis.

N. Sistunt fluxum hemorrhoidum ac mensium.

mentum.

• CCCLXXVII. Benzoin.

Beniui, Garz. Beniinum, Belzoinum, Benzoinum, *Matth. vulgò Asa dulcis, Cord. hist. Germ. vvolriechend. Asand.* Resina est citrinescens vel flaua, ceu variis ex frustulis diuersorum colorum in massam redacta, bene odorata, facilis liquatu ac fractu. Stillat ex arboribus certis, magnitudinis proce-
ra, quoad corticem fauciatis.

Amygdaloides, quod maculas candidas refert instar amygdalar. delibratar. colligitur in Sion & Samaria.

N. *Hanc Myrrham Troglodyticam Dioscoridis, Amatus censet.*

Nigrum odorem suauissimum spirans. Exudat ex nouellis arboribus. Dicitur Beniui de Bonias, q. de floribus.

Nigrius parum fragrans, quod uilius.

N. *Commisceri solent, ut unà commodius vendantur*

Optimum censetur pellucidum, globulis candidis refertum, Thuris æmulum, suauissimè spirans, nec heterogeneis inquinatum.

Vires. *Cal. & sic, 2. incid. atten. pulmonicum est. Vnus precip. intrinsecus in affectibus pulmonum, catarrhosis, tussis, asthmate. Extrinsecus in cerebro per sternutationem expurgando, in odontalgia, (masticando) in tuberculis ac rubore faciei abstergendo: ob suanem in superhalitum creberrimè suffumigis commiscetur.*

N. 1. *Si suffitus ex solo Benzoino paratur, tussis excitatur.*

N. 2. *Soluitur in oleaginosi ac spiri-*

tu vini rectificatissimo, ut & in ossi albumine acri humido ad liquefendum exposito.

PRÆPAR.

1. *Magisterium.* Benzoin. solue in ∇ rectificatissimo. (NB. nisi ∇ fuerit omnis phlegmatis expers, nihil effeceris) solutioni affunde ∇ , & precipitabitur lactescens Benzoin: laua ∇ rosar. ac exicca.

N. 1. *Vnius hora spatio solutio hac absolui potest, calore N. saltem adhibito.*

N. 2. *Poteris itidem ∇ abstrahere sine affusione. ∇ a.*

N. 3. *Magisterium hoc non est nisi depuratum Benzoin.*

N. 4. *Solutio quam Tincturam nonnulli vocant, manus abstergit candidasque reddit.*

2. *Flores.* Benzoin trit. q. v. inde ollæ vitreatæ, desuper ponendo pyramidem ex charta duplici formatam, ad mouèque paulatim ignem lenem carbonum vel cinerum: sic sublimabuntur flores, charta que adhærescent, quos sepius exime, ne tursum decident.

Dosis à gr. iij. ad ℥ss.

N. *Sunt qui flores in ∇ rectificatiss. solunt, solutionemque pro Tinctura venditant.*

3. *Liquor.* Fit in albumine oui cocti, ut suprâ. Abstergit maculas, stigmatæque è lue venereâ contracta.

4. *Oleum.* Benzoin pulu. ℥j. spir. Vini lbij. (vel iij) digere \mathcal{C} (4. 5. 6.) dein adde sabulum purum vel scoriatum \mathcal{C} ℥iij destilla per Retortam ex arena vel cinere, igne gradatino: hinc separa oleum à Spiritu, *Panth, hygiast. Deodar.*

N. *Spir. Vini leniter abstracto, ascendet materia gummea, candida, solida, quam*

quam vocant Mannam Benzoin. Hac
albisicat cuprum.

Alij.

℞. Benzoi pulu. lbij. affundun +
ros. in olla benè clausa, committunt-
que igni vt fluant (odore id cogno-
sces) Hinc affundunt nouum. I. Hue-
réque sinunt continuò agitando; tan-
dem inspissari paulatim permittunt,
immiscendo pro libitu flores Roris-
mar. Lauend. Ros. Spic. Ind. vt & sant.
citr. in fine superfundunt. ¶ rectif.
ac destillant ex arena vel cinere. Med
destill.

Alius modus optimus.

℞. Benzoin pulu. q. v. misce cum sabu-
lo, ac imple Retortam ad medietatem:
destilla gradatim ex arena, & nancisce-
ris liquorem ac oleum crassum instar
butyri. ℞. huius (à liquore separati) p. j.
∇ plu. p. xij. destilla in cinere per
XX, & extillabit oleum clarum & fla-
uum, ad fundum subinde secedés. Post-
quam pars media ∇ extillarit, extin-
guatur ∇, effundaturque materia in
cucurbita relicta, in lebetem æneum,
calfiatque optimè super ∇, affuso su-
binde ∇æ calidæ quadruplo: filtratur
per panum, reponaturque filtratura ad
crystallifandum. Crystallinos collecta
exicca lento Δ calore.

N. 1. Oleum illud rectificari poteris
semel ac iterum ex XX cum ∇ f. sato,
& euadet odore saporeque gratius.

N. 2. ℞. Benz. præbet ol. (℞. B.) cry-
stall. seu florum (℞. j.)

Modum hunc cum aliis non paucis
acceptum refero viro solertissimo,
Iohan. Casp. Sparre, Pharmacopœo
huius Reip. Seniori, Affini meo, co-
lendo.

N. Sunt qui Beniuinum soluunt in
ol. mel. cera for. expr. solutionique admi-

scant ambram, muscum & Zibettam
& exprimunt ea perfumandas, vt aiunt
chirothecas.

C.

CCCLXXVIII. Camphora.

Κάμφορα, Camphora siue Caphura,
Matth. Cast. Vrab. Capur & Casur. La-
chryma est resinosa proceræ cuiusdam
ac peregrinæ arboris, (non bituminis
genus.) Germ. Kompffer.

Differentia dua. 1. Caphura de Bur-
neo, (Insulæ Oriental.) quæ rarò ad-
fertur, & omnium nobilissima. 2. Ex Si-
na in Europam adfertur, in panes or-
biculares coacta, Gariz. Acoft. Fragof.
(cui hæc Chinæ dicitur Chinichis, à
China vnde aduchi solet.) Sic alia ru-
dis est ignem non experta: alia elabara-
ta, quæ solis aut ignis calore cocta at-
que purgata, album colorem contraxit.
Nath.

Seligenda est alba, pellucida instar.
Crystalli, sincera (non maculata) odo-
ra, digitis friabilis, quæ accensa vix ex-
tinguibilis.

Distinguitur à supposititiâ, quòd
hæc calido panitricco (vti ex clibano
extrahitur) dissecto imposita torreatur;
vera autem liquefcet.

N. In tritura, mortarium ac pistillum
oleo aliquo e.g. amygdal. &c. est innan-
gendum.

Vires. Resistit putredini ac venenis,
vnde frequens eius vsus in peste mali-
gnisque morbis, febribus, &c. Veneris
quoque stimulum arcere, conceptumque
impedire creditum est; verum si experien-
tia ac obseruatio Scaligeriana fidem me-
retur veritatem, (nisi vsu continuato id
experiri quis velit) suffocationi uterina,
subnenis (scil. ∇ meliss. in quâ Campho-

HHhh

ra

ra extincta fuerit propinata.) *V*sus externus crebrior est, isque potissimum in Epithematis, s. Frontalibus refrigerantibus & paregoricis, quibus commisceatur, solui solet in *V*, vel conteri cum nucleis s. semine aliquo oleaginoso, e.g. pineis, sem. citrull. & sim.

De qualitatibus primis diuersitas haud leuis. Maiores ad gradum usque 3. frigidam statuunt. Recentiores e contra calidam, utriusque non sine ratione. His inservit 1. inflammabilitas, utpote qua aëreis non aqueis ac terrestribus propria. 2. Odor aromaticus ac sapor acris. 3. facilis euanescentia, quæ vel sponte aërem ceu chaos suum reperit. Illis vis venerem ac libidinem compefcendi, inflammationesque extinguendi. Verum triumphare videntur recentiores. Etenim quantum ad prius, posito quoddam venerem arceat, non tamen propterea necessario frigiditatem concludi posse, argumento sunt Ruta, Vitex, & sim. Nec firmiter ratio posterior, utpote ab operatione qua per accidens fit, desumpta. Quippe inflammatio aut mitigatio eo in casu non a qualitate frigida introducitur, sed a subtili penetratiua, exhalationibus calidis exitum referante, atque per sudorem insensilemque transpirationem discutiente.

P R Æ P A R A T A.

1. *Oleum Camphoræ*. ℞. Camphor. ℥iv. Terræ argillacæ, vel boli arinen. M. ij. (alij. ℞. Camph. part. j. Argill. p. iij.) Misce diligenter, & ex Massa mixta forma globulos, quos in sole vel umbra exiccatos, destilla in arena ex Cucurbita vel Retorta vitrea, (in excipulum, quod contineat, si libet, aliquid aquæ pluuiæ destillatæ.) Sic prodit primum quiddam album, mox aqua perspicua, tandem igne fortiori, oleum fragrantissimum. Ol.

hoc cum *V* bis rectificatum, autem colorem acquirit.

N. 1. Eodem modo destillari potest cum terra communi.

N. 2. Album illud sublimatum liquefcet in Alembico, & desluet in Excipulum.

N. 3. Non opus est formare globulos, sufficit enim materias solum miscuisse.

Vires. *Vires ex superioribus collige*. Optimum in super remedium est in gangrenis. Hoc oleum affusum super Talcum subtiliss. puluerisat. (melius calcinatum) biduana in MB maceratione albescit, virginibusque ad nitorem faciri egregie inservit. Senn. in Instit. Hartm. in pract. Tentz. Sala.

2. *Ol. Camph. Pauld aliter*.

℞. Camph. p. 1. Boli p. 2. Puluerisata misce, & destilla ex Retorta vitrea loricata, l. Δ. arenæ, & prohibet Camphora instar butyri. Huius ℞. part. 1. ♀ optimè calcinati p. ij. *V* ad eminentem digit. 3. Dest per MB, donec Camphora incipiat ascendere: quo dato signo, subtrahæ Δm, & effunde *V* qui extillauit, in vitram angusti orificij, affundæque *V* fontanæ quantitatem, sic lactescet *V*, oleumque Camphoræ supernabit, quod separa. Materie in Cucurbita relicta affunde denuò *V*, & destilla, separaque vt antea, idque toties reiterando, donec nihil Camphoræ ulterius ascendere conspiciatur, sic habes oleum Camphoræ quantitate quidem paucum (1.) viribus verò efficacissimum.

N. *V* rectificari poterit ad vsus alios.

Ex communicatione Ioh. Casp. Spar. Pharmac. huius Reip. primatij. *Aliter*.

Solue Camphoram in sp. ☉ i Antepileptico

tepileptico Hartmaani, (vel etiam in V.) & Camphora eleuabitur in forma \odot i ad superficiem. Hoc seorsim collige, atque cum terra sigillata, & paucis \ddagger forma globulos. Destilla per \odot m, & prodibit Ω seu \odot valde fugax. *Hartm. in pract.*

Aliter.

R. Camphor. el. ζ ij. \odot , ζ ij. Sal. ζ , ζ ij. terantur subtiliss. cum lacte in formam pulvis. Hanc macera in \odot 3. dein affunde vini Maluat, ζ ij. destilla per \times humilem recipienti firmiter annexum, idque l. Δ , prodibit aquosa & oleosa substantia, quam vtramque rectificare poteris.

2. *Liquor.*

R. Camphoræ q. v. inde vriali, ac impone desuper aliud vrialale inuertum, iuncturis bene clausis, sublima ex cinere, toties vrialia illa inuertendo, donec Camphora in \odot abeat, *Kesler. 4.c.66.*

N. Sunt qui in ∇ camphoram dissolutam pro oleo vendunt, cuius equidem usum internum nemini suadeo. Extrinsicus autem adhiberi solet in dolore dentium. Hoc \odot tempore rursus in camphoram coalescet. *Med. distill.*

Nonnulli in peste hoc depradicant.

R. Camph. el. ζ ij. Sal. absint. ζ ij. Ol. amygdal. ζ ij. M. diligenter, & macera per diem vnum ac alterum, vase el. Hinc destilla per \odot m, iterum Sal. absint. ζ ij. admisce, \odot rursus affunde per ζ 3. die ere, atque hinc de nouo per \odot m destilla.

Dosis gut, iiii. v. vj.

Atij.

R. Camph. p. i. Spir. Terebinth. p. ij. \S antequam bis cohobando.

3. *Essentia Camphora alexisteria.*

R. Camphoræ q. f. solue, cum \odot amygd. dulc. scil. digerendo; colaturam cum ∇ aliquamdiu circulatam destilla denuo, vt abstrahatur ∇ ; residuo adde tincturam croci, ad aureum colorem vsque inducendum.

Vires. Mirabilis est ad præcauendam & curandam pestem: item in suffocatione Matricis & Febribus.

Dosis gut. i. ac altera. Tentzel.

N. 1. Spiritus ille abstractus haud minori cum successu in usum accersiri poterit.

N. 2. *Quercetanus elici ex camphora essentiam cum ∇ vite tartarizata, Pharm. Rest. c. 26.*

CCCLXXIX. *Cancamum.*

Káxavov, Dioscoridi est Arabica arboris lacryma, Myrrha quodammodo similis, virosi gustus: ad suffimenta vsurpant.

Quoad vires, eidem splenetica, emmenagoga, & ophthalmica habetur.

N. De hoc Dioscoridis Cancamo diuersa hoc tempore Opiniones. Laccam dicunt alij, alij Resinam Anima faciunt, alij Beneuinum, nonnulli profus incognitum putant. Videatur Matth. Garz. Clusius in Garz, Amatus in D. & simil.

CCCLXXX. *Caranna.*

Caragna, Carana est Resina duriuscula, tenax, siue multa agglutinatione, Tacamahaca similis, nisi quod sit paulò odorator, splendidior, liquidior & densior. Assertur ex Carthagine Indiae Occidentalis seu nouæ Hispaniæ Prouincia, vbi ex vlneratâ arbore elicitur, atque illinc folijs tatis ac neruosis, instar arundinaceorum

HHhh 2 rum

rum foliorum inuoluta ad nos peruenit.

Vires. *Calfac.* & *sicc.* 3. viribusque pollet iisdem, quibus *Tacamabaca*, qua tamen operando citior & efficacior est, precipue in tumoribus, omnisque generis doloribus, maxime iuncturarum, tumores inueteratos dissoluit, defluxiones frigidas aut mixtas sistit, nervorum ac cerebri dolores sedat, vulnera recentia presertim nervorum & iuncturarum sola sanat, defluxiones in oculos & alias partes reprimis, (pone aures vel temporibus imposita.) *Monard.*

Soluitur in Oleo.

Preparatur inde Emplastr. anti-podagricum insigne.

℞. Carannæ ℥j. ceræ. flau. ℥β. cum Ol. verbasc. F. Emplastr.

CCCLXXXI. Colophonia.

Colophonia Officinarum, C. B. Pix græca, *Matth. Cord.* est substantia naturæ oleaginosæ, flauescens, arida ac friabilis, residua ex resinis abietina, strobilinaque coctione dum purgabantur, inspissatis ac frigore induratis:

Eligenda est pellucida, odorata, quæ *Thuris* fumum accensa æmulatur.

N. 1. Dicitur *Colophonia*, quod ex *Colophone* olim aducebatur.

N. 2. Friabilem illam flauamque substantiam in Resinarum singularum destillatione residuam, alij Resinam frictam appellant; alij eidem *colophonia* nomen imponunt.

Vires. Siquidem *Colophonia* portio est Resinarum, Resinarum quoque vires retinet, sed minus penetrabiles, calfacit itaque & siccit, mollit, glutinat, vsusque eius, quia pinguis soluitur, commodissimus est in Emplastris.

CCCLXXXII. Resina Copal.

Pancopal, *Copal*. Resina est duriuscula, admodum candida, vel ex albo flauescens, pellucida, bene odorata, in massam redacta. Asportatur ex India Occidentali, siue noua Hispania, vbi ex vulnerata arbore guttatim stillat. *Monard. Clus. in Monard. Fragos. Casalp.*

Vires. *Calfac.* 2. hum. 1. emollit, resoluat. Vsus precipue in affectibus cephalicis.

PRÆPAR.

Oleum tenuius & crassius. Eodem modo elici potest vtrumque, quo ex Resina Anime.

N. *Cepit* ab annis aliquot ex eadem India Occidentali, liquor quidem adferri olei de *Copal* yra appellatione, quod an ex Resina iam descripta sit, in dubio relinquit *Clusius* in *Monard.* commendari id ait ad vulnera recentia curanda: nostratibus ignotum est.

CCCLXXXIII. Elemi.

Gummi Elemi, *Elemnij*, *Helenij*, Resina est, siue lachryma pellucida albicans, cum flauis particulis intermixta, in massam redacta, suauem accensa halans suffitum, Asportatur ex *Æthiopia*, vbi stillat ex arbore, quam oleam nonnulli volunt (quod negat *Matth.*) alij *Cedrum*.

N. *Dioscoridi* flauum est ac scammoni quoque simile, mordaxque: nostrate non item; quare an verum habeamus, dubium. Damnatür *Ammoniaco* vel *Gummi Arabico* simile, colore nigricans.

Vires. *Calf.* temperatè, emollit, digerit, resoluat, maturat, dolorem sedat, capitis ac nervorum affectibus corundemque vulneribus, ac imprimis caluarie vulnerata

vulnerata specificis confert, contusionibus articuloꝝ prodest, menses ac urinam ciet.

Soluitur in oleaginosis, ut relique resina.

P R A E P A R.

1. Oleum stillat. Elemi. Fit ex Retorta per A vel vesicam ut ol. Anime. Vide supra.

Vires. Specificum pra aliis (ut & ipsa Resina) censetur in affectibus neuriticis, paralisi, contractura.

F.

CCCLXXXIV. Fuligo.

Fuligo est pars rerum combustibilium leuior, a partibus icrassioribus sub specie fumi eleuata, inque substantiam crassam nigricantem, vi frigoris compacta. Germ. Rost.

Delectus. Fuligo eligatur splendens instar succini nigri, quaeque fumarij parietibus proximè adhaereat (quo fornaci propior, eò melior) imo nec abs te foret, delectum quoque instituere, ratione materiae combustae, quae quanto Medicae intentioni conuenientior, tanto quoque fuligo praestantior censenda est.

Vires. Acris est, ex terget. rarique vsus per se, nec adhiberi eam memini, nisi quod intelligam, in suffocatione matricis à mulierculis plebens cum successu esse propinatam. Quin & cum aliis mixta carpiis imponitur ad arcendam febrim.

P R A E P A R A T.

1. Spiritus, 2. Oleum, & 3. Sal.

3. Fulig. el. q. v. imple ad collum vitreae Retortae vitreae lutatae & destilla ignis aperti gradibus successiue adhibitis, in Receptaculo. capaci. ut prodeant cum phlegmate Spiritus albi-

cantes, ac oleum flauum, ultimoque rubrum. Spiritum cum oleo aliquandiu digere, postea affunde medietatem V & destilla saepius prodit cum V , Spir. fuliginis & simul ol. rectificatiss. Caput mortuum incinera & extrahè sal more solito cum + .

Vires. Spiritus ac Oleum confortatiua sunt insignia, mirabiliter agonsantes exhibita refocillant.

Dosis Spiritus gr. vj. ad ℥℥ .

Olei gr. 2. 3. in Vinum vel alio vehiculo conuenienti.

Vires. Salis. Praestantissimum curatiuum est in cancro exulcerato, si in cella solutum cancris ulceribus semel ac iterum inungatur, venenositas instar vaporis visibiliter extrahitur. Tandem oleum (crassius) leni aspergine saepius illitum, crustam instar cuticulae superinducit, qua sponte spacio 5. vel 6. dierum decidens, vlcus consolidatum esse indicat. Hartm. in Præct.

G.

CCCLXXXV. Galbanum.

Γαλβανον, γαλβανον, Galbanum, (Matth. Cord. hist. Cas.) Est gummi (seu succus) fetulae Syriacae, (quam Metopium vocant, quo nomine aliis gummi idem venit,) inter se flauum vel albidum inflammabile; odore Opopanacem referens; colore Tacamahacae.

Optimum censetur cartilaginofum (alij granulatum volunt, sed rarissimè, ob mollescentem naturam in granis inuenitur,) flauum, syncerum, pingue non lignosum, quod inter retineat non nihil ex suis seminibus, & ipsis ferulae sarmentis, grauis & in grati odoris, nec nimis humidum, nec nimis aridum, cum accenditur flammam nutriens.

HHhh 3 Vires.

Vires. Calfac. sicc. 2. completè, emol-
lit. resoluit, extrahit.

Vsus precipue intrinsecus in mensi-
bus ac partu pellendis, in tussi inuetera-
ta oc Asthmate: Aduersatur toxicis.

Extrinsecus prodest in partu ac men-
sibus, suffocatione uteri, vertigine, in fu-
runculis ac lentiginibus: quin & glandi
impositum Emplastri vice Urinam pro-
uocare dicitur.

PRÆPARATA.

2. Galbanum depuratum: solue in li-
quore, exprime ac inspissa.

N. 1. Soluitur vt alia gummata fe-
rulacea, in quolibet liquore aqueo, + o,
succo, vino.

N. 2. Galenus suspendit in linteo su-
per V atque puram extillare facit.

N. 3. Dioscorides dimittit in ∇ m fer-
uentem, impuritatesque supernatantes
reiciit.

2. Oleum stillat. Fit l.a. per O m ex
addito sabulo, vel silicibus con-
tulis.

N. Sunt qui Galbanum cum + o in
formam mellis miscent atque destillant.
At exit primoliquor. dein O , adeoque
opus protrahitur citra necessitatem.

Vires. Maximarum est virium in
passione hysterica, intrinsecus exhibi-
tum vel extrinsecus umbilico illitum.
Maturat bubones & anthraces.

Oleum aliud Sam. Closs.

Solutio Galb. in + non est de nihilo,
præsertim vbi spiritus Galb. expecti-
tur, omnium optimè fit oleum cæru-
leum ex catino ferreo ad latus inclina-
to, cum O super tripodem terreum
imponitur, deinde pertuso operculo
obturatur, ita seruantur gradus Δ , exit-
que primo spiritus, mox, oleum, & bal-
samus ex pyreuma redolens.

3. Galbanetum, i.e. Balsamum Gal-

banetum, seu spiritus Terebinth. Galb-
netus.

℞. Galban. trit. lb. β. Spirit. Tere-
binth. lb. i. Digere & aliquot, dein de-
stillata ex cucurbita humili, vel O .

Vires. Summarum virium censetur
in contractura ex colica, extrinsecus il-
litum.

N. Est & aliud Galbanum Theophra-
sti dictum.

℞. Galb. lb. β. Gummi. Hederae ʒ iij.
trita seorsim, misce ac destilla per
 O m in ʒ iij. Sato adde Terebinth.
lb. i. Ol. lauor. ac spic. añ. ʒ j destilla
denuo.

Vires. Cephalicum est ac nutriti-
cum insigne, contracturas ac morbos si-
miles curans. Med. destill. part. 1.

4. Cerotum de Galbano, s. Ceratum
Matricale. vide August.

Gummi Hedera.

Vide Hedera, Class. 1.

H.

CCCLXXXVI Hypocistis

Hypocistis, germen seu plantula
est, è radice cisti fruticosi dum flore-
scit, ceu viscum ex quercu, profiliens:
Dicitur & Limodorum, aliis Robe-
thron. Ex hac itaque plantula, cum
floribus succulenta sit, exprimitur
succus, qui in sole exiccatur Glycy-
rhiza succo non absumilis euadit, at-
que ad nos, sed raro, asportatur. Di-
citurque Hypocisthis vel succus Hy-
pocistidis. Videatur Math. Dod. Cord.
in D. Lon. Cast. Clus. hist. Lob. Tab. Ger.

Vires. Refrig. (3.) siccatur, potenssi-
me astringit, condensat. Vsus precip. in
quibuscunque fluxionibus sistendi,
Diarrh. Lienter. Dysent. profusio uteri,
vomitu, & c. Vri & in excretionem San-
guinis

guinis ex lapsu casuue orta. Extrinsecus roborat viscera humidiora, ventriculū, epas, &c.

N. Quia rara est, eius loco succus Acaciae recipi potest, quippe qua analogas vires habet, quamuis imbecilliores.

PRÆPARATA.

Hypoc. depurata.

R. Solue in V, aut succo appropriato, cola & inspissa.

L.

CCCLXXXVII. Lacca.

D Lacca diuersæ Opiniones. 1. Fit Lacca cuiusdam mentio apud Arabes, quam Cancamum Dioscoridis esse volunt, quod inodorum planè & nobis incognitum est. 2. Lacca est vulgaris seu officinar. quam Garzias ab hortu fieri scribit ex succo arboris cuiusdam proceræ familiaris in Pegu, Bengala seu Balagvate & Martaba, Malauar Prouinciis scil. Indiæ Orient. Nimirum à formicis alatis succum quendam exugi ait, eumque in Laccam, (non secus ac mel ab apibus) redigi, ramisque arborum induci, vnde postmodum cum ramis ad nos transportetur. Alij sponte exudare volunt, atque circa ramos concretescere. Est autem resina sicca, Myrtæ rubræ similis, masticata saluam rubro colore tingens, accensa vel tusa, suaue olens. Dicitur Lacca Sumettri, à loco natali scil. Insula Sumettra, sicut ea quæ in glebis sine furculis affertur, Lacca comberti vocatur.

N. Est & genus lacca factitia terrestris, pictoribus familiare, quibus ad conficiendos inde colores inseruit. Laccam vocant globulatam seu rotulatam, quippe globorum plerumque venit formulis, colore minij, &c. Duplicis id generis est, alterumque vulgare Laccam infe-

toriam appellant: aliam Florentinam, qua carior & coloris saturatius rubri.

Vires. Calfac. (alii temperate, aliis 2.) atton. aperit, sanguinem purificat, sudorem ciet, diuretica est, vsus præcip. in obstruct. Lienis, Vesicae fellis, Epatis ac pulmonum, & hinc in hydropo, Ictero, Astmate, apostemate pulmonum: in expellendis variolis, morbillis atque pestilent. contagio, in ciendis mensibus, &c.

PRÆPAR.

1. Lacca lota seu preparata. Tota lacca lauetur in Decocto Aristoloch. & Scœnanti, quoad clarescat: hinc collige quod resederit.

2. Trochisci de Lacca. V. D.

CCCLXXXVIII. Ladanum.

Labdanum, Laudanum est liquor ex Cisti (Ledon appellati) foliis exudans, seu est massa non absimilis massæ pilularum, (in pilulas vel solam manu formabilis): friabilis, colore opaca cinerea, inflammabilis, accensa que gratum saporem halens, in soffitibus vltatissima.

Cistus illa familiaris est in Cypro, Lybia, Arabia. Videatur *Andr.* Ledum, *Mat. epist. Cast. Tab.* Lada & Ladon, *Cord. in D. & hist.* Ladanū *Lon.* Cistus Ledon latifolium, *Lob.* Ledū latiore folio Italicum, *Cam.* Cistus Ledum Matthioli, *Ger.* Cistus ladanifera, *C. B. 1.*

De origine Ladani scribit Dioscorides, quod hirci, frondes Cisti depascentes, succum illum barbibus suis colligant, vnde postea pectine decerpatur.

Laudatur odoratum, subuitide, leue, facile mollescens, pingue, resinofum, arenularum, aliarumque fordium expers, quale in Cypro gignitur, quod plerumque ceu ex gyris coagmentatum, asportatur. Arabicum vilius

vilius habetur, afferturque in massa vniiformi.

Vires. *Cal.* sicca, emollit, digerit, maturat, attenuat. aperit, orificia venarum referat, inspissat. *Vs.* precip. in capite humido ac catarrhoso, in dysenteria, &c. *Extrinsecus* eius usus est in Emplastris emollientibus, anodynis, tussim sedantibus, in Alopecia (inunge vel coque in vino & laua) in odontalgia, in cardialgia, doloreque ventriculi, (cum modico Bdeli faciunt pilulas dandas Num. 1. & 2. hora 1. ante pastum. Crato.) in suffocatione uteri (introrsum adhibitum:) cicatrices curat.

P R A E P A R.

1. *Ol. stillat.* Vide Medull. destillat. lib. 1.

2. *Pilula de Ladano.* V. l. 2.

N. 1. *Sala purificare docet in* id solvendo atque colaturam inspissando, Verum me hercle minus commode. *Etsi enim* coctione nonnihil in aqua solvatur, id tamen non nisi portiuncula minima est, relinquitur pars maior intacta, qua non minus quam illa commoda est.

N. 2. *Etsi inflammabile ladanum sit,* non tamen pinguibus solui potest.

CCCLXXXIX. Liquidambra.

Liquidambar, Liquidambra, (q. liquica ambra, ob odoris suavitatem,) Resina est oleaginosa suavissimi ac fortissimi odoris, effluens ex arbore quadam procera ac venusta, Oocol siue Oeosolt Indis dicta. Est que partim siccior, partim liquidior. Liquidior pars vel seorsim collecta, vel expressione, a sicciora separata, sigillatim venditur, dicta eodem nomine; Liquidambar, seu oleum liquidambar, oleumue de Ambra. *Videatur* Monard. *Cesalp.* *Lug-*

dunens. in hist. Mexic.

N. 1. *Effluxio hac incisione corticis* promouetur.

N. 2. *Arbor Oocol familiaris est in India Occidentali,* seu noua Hispania, unde paucos ante annos in Europam transferrit cepit.

Vires. *Cal.* 2. (oleum 3.) hum. 1. resoluit, obstructions expedit, emollit, maturat. *Vs.* precip. in utero obstructo ac indurato, tumoribus duris, &c. in suffitibus, & sim.

N. *Adhibetur mechanicè in perfurmandis (ut aiunt) coriis ac chirothecis.*

P R A E P A R.

1. *Oleum,* (ut dictum) vel seorsim collectum, vel expressione a sicciora parte Resinae separatum.

2. *Coctione ex ramis elicium,* Coquunt enim Indi ramulos in ∇ , supernatantemque pinguedinem nomine olei colligunt. Et hoc esse oleum illud officinarum nostratum, color arguit, rubro purpureus, quippe natua albicantiora esse solent.

N. *Resina nostratibus in usu non est.*

CCCXC. Lycium.

Lycium, Lycium Dioscoridi est succus extractus (coctione scilicet, & inspillatione) ex ramis ac caudice arboris eiusdem nominis. Hanc describit titulo Lycij, *Marth. Tab. Ger.* Lyc. alpini, *Lugd.* Pyxiacanthæ, *Dod. Lon.* Verum cum modernis incognitum sit, factum est, ut diuersæ inde subortæ sint opiniones, *Lob.* substituit suum ex Lucio Narbonensi extractum, *Garz.* suum Cate dictum; habet & suum proprium *Rauwolfius* in Itinerario, *Officina* suum Lycium communiter ex Peryclimeni baccis

baccis grauiſſimo errore conſiciant: alij ex Liguſtri fructu: alij ex prunis ſylueſtribus. Præſtaret tamen, monente id etiam C.B. in *Matth.* ſuccedaneum ex Oxyacantha aut Rhamno, aut Rhois ſucco compilare.

M.

CCCXCI. *Mastiche.*

Mastiche eſt Gummi-Refina ex albo vitina, pellucida, granulata, bene odorata, ex *Lentisco* arbore exudans.

N. De *Lentisco*. Vide claſſ. 1.

Delectus.

Optima cenſetur quæ in Inſula Chio prouenit, odorata, candida, inſtar cere albæ, ſplendens, adulta, retorrída, friabilis, ſyncera, ſtridens. Reprobatur nigra bituminis ſimilis, viridis, liuida, impura. Adulteratur Thure & Refina pini, ſed odore fraus ſtatim deprehenditur.

N. Quanto vetuſtior, tanto intenſius citrina agit.

Vires, *Calf.* & *ſicc.* 2. ſubſtr. emollit ventriculum roborat. *Vſus* præcip. in vomitu, nauſea ac fluxu alui compeſcendo. Obtundit & corrigit purgantium acrimoniam, reprimit exhalationes ventriculi, quæ caput alias ferire ſolent, (grana aliquæ poſt paſtum deglutita.) roborat caput, neruoſque genus, expuſionis ſanguinis ac uſſi medetur, emendat oris halitum, punitam è cerebro elicit (*masticando.*) Extrinſecus *Vſus* eius creberrimus eſt in dentiſtrictis; emplaſtris ac cataplaſmatis ſtomachicis.

N. Coquitur $\zeta\beta$. in γ lb. iiij. vel iiij, daturque pro potu ordinario in *Diarrhæa*.

P R E P A R.

1. Oleum ſtillat. ſ. flauum. 2. Oleum

rubrum ſeu *Balsamum*.

\mathcal{R} . *Mastic*. q. v. ſalis parum, ($\frac{1}{2}$) ſilic. contuſa, deſtilla per $\odot m$, primo extillat liquor albus cum $\odot o$, flauo, tandem Δe fortiori, $\odot o$ rubrum, rectifica per retortam paruum: flauum $\odot o$ ſerua ſeorſim, rubrum deinde & *Balsamum* nigricantem iridem ſeorſim.

Aliter.

\mathcal{R} . *Mastic*. lb. ij. Boli pulu. M. ij. ∇ q. ſ. impaſta, digereque \mathcal{Q} (14.) dein deſtilla per retortam Δe nudo, & prodibit $\odot o$ leue ſupernatans, tum quoque graue & ad fundum ſecedens, vtrumque rectifica cum bolo ac ſale.

N. 1. *Habes egregium modum Olei albi flauo & rubri in prima parte Glauber, p. 36.*

N. 2. *Et aliud ſub titulo Quinta Eſſentia cum ſpiritu Toereb. in Myrob. Fabri. Per ſe autem factum Oleum præbet in copiâ, quod ſi ſuper $\odot m$ rectificaueris, ac redinis alicuius erit particeps, additâ verò ∇ font. per B. habebitur Oleum flauum S. Cloſſ.*

3. *Oleum per deliq.*

Fit ic albumine oui cocti, aëri humido expoſito.

3. *Oleum Masticinum.*

Fit coctione *mastic*. in Ol. *Rofar. omphac.* Vide *Diſſ.*

4. *Spiritus Masticis.*

Eſt liquor albus, (qui in \mathcal{H} atione olei prodit,) rectificatus.

5. ∇ *Masticatum.*

\mathcal{R} . *Mastic*. cl. lb. i. ∇ rectif. lbſ. digere \mathcal{Q} (14.) poſtea affunde ∇ anat. & deſtilla in $\mathcal{M} B$. 1. prodit. \mathcal{R} . dein ∇ , quæ nullius uſus, \mathcal{M} in $\mathcal{M} B$ rectifica & ſerua.

N. Quod remanſit \mathcal{H} ari poteſt per retortam, ut profundat $\odot o$.

Vires. Maxime prodeſt in ventricu-

li imbecillitate ac cruditate, in colico dolore, &c.

6. Aqua Mastichina F.F.

℞. Mastich. ℞. ℞. Cariophyl ℥℞. Macis ℥j. vini albi generosi ℞ij. destilla per \mathbb{X} .

7. Pilula Mastichina. Vide Disp.

CCCCXII. Myrrha.

Europs. Dioscor. Bola Indis, Myrrha, Matth. Cord. in D. Car. Frag. Cas. Lot. Est resina gummea (concretus, gummi resinofus succus, cuiusdam arboris exoticae, quæ cortice vulnerato, Myrrham profundit, partim in substratas tegetes destillantem, partim circa caudicem concretescentem. Plurima affertur ex Arabia, tum etiam ex Regione Alexim, quæ Æthiopia est.

Delectus.

Laudatur friabilis, levis, vndiquaque concolor, minutis glebis, amara, acris, odorata, & quæ contracta, venas vnguium modo candidas & leues ostendit. Omnibus autem antefertur, quæ à loco vnde conuehitur, Troglodytica nuncupatur, colore pallens, seu sub viridis, splendens ac mordax. Inutilis est ponderosa & coloris piceæ s. nigra, (hæc myrrha animinea. Amati.).

N. Statim nihil aliud esse quam myrrham liquidam, testatur Dioscorides. Eius autem colligendi diuersos deprehendimus modos. 1. Sponte ex arbore non vulnerata exudat. 2. Exprimatur ex myrrha, ut oleum Liquidambar ex Resina eiusdem nominis.

Vires. Myrrha calf. & sicc. 2. (al. 3.) aperit, subastr. atten. maturat, discutit, purgedini resistit. Vsu præcip. in vteri obstructione, fati expellendo, in pulmo-

num & intestinorum mucilage, ac inde nata raucedine, tussi & angina, pleuritide, colica, lumbricis: compescit diarrheam ac dysenteriam, febrium rigorem, præcipue quartana arcti. Extrinsecus prædest in igne sacro, gangrana, tumoribus, vulneribus inueteratis ac recentibus, in primis capitis, unde in Emplastris sticticis, ut vocant, vsus creberrimus esse solet. Masticata ac subinde deglutita halitus faetorem emendat, cor, & amque curat, &c.

Dosis à ℞. ad ℞ij. vel ℥j.

P R A P A R.

1. Myrrha Depurata

Depuratur more solito: Myrrhæ subtiliss. trita affunde expressum succum, decoctum, vel infusum (intentioni tuæ appropriatum,) vel vinum ad eminent. digit. 2. digere in \mathbb{M} , ut mollescat, dein calide exprime & inspissa lente. *V. de Querc. Ph. Rest. c. 15.*

2. Myrrha Extracta.

Extrahitur cum \mathbb{V} rectificatiss. s. a. abstrahitur \mathbb{V} , inspissaturque extractū ulterius in vitro, vel vitreato vase ad consistentiam olei

3. Oleum Myrrh.

Destilla per \mathbb{O} m ex \mathbb{X} .

N. 1. Sunt qui myrrham cum serratura abietina macerant, ac postmodum per vesicam oleum eliciunt. Verum id aliqua ex parte abietinum est.

N. 2. Alij liquori myrrhæ \mathbb{V} affundunt, digerunt, ac per \mathbb{X} \mathbb{J} ant. Med. destill.

N. 3. Alij digerunt myrrham pidurisat. cum +. atque hinc \mathbb{J} ant.

N. 4. Neque per se, neque cum silicibus, arena, bolo aut farina laterum \mathbb{O} . profundit, sed solum \mathbb{N} um grauem & acidam aq. foetentem. Fiat igitur utroque modo, ut dixi de Mastiche S. Gloss

4. Liquor.

4. *Liquor Myrrha.*

Impone Myrrham pulueris albumi-
bi oui cocti adhuc calido, ac repono
in cellam ad liquefcendum, vel mix-
tam cum eodem albumine repono fu-
pra tabulam vitream vt liquefcant, de-
stillent in vitrum fuppositum.

Vires. *Abstergit maculas cutis, sti-
gmataque ex lue venerea contracta.*

5. *Trochisci de Myrrha.* Aug.

O.

CCCXCIII. *Omphacium.*

Agresta, *Agrest, Gall. du Verius.* Est
succus ex vuis immaturis expressus
colatus, inque doliis repositus, & vase
clauso asservatus.

N. 1. *Præstat vnas adhibere dies ali-
quot (4-5.) soli expostas.*

N. 2. *Tempore Dioscordis inspissaba-
tur calore Solis ad consistentiam Rob.*

N. 3. *Oleum acidulum ex oliuis im-
maturis expressum, ob saporis affinita-
tem, itidem Oleum Omphacinum ap-
pellari solet, de quo vide supra Olea,
class. 1.*

Vires. *Inferunt tam Esculentis, quam
Medicamentis. Refrig. 2. succ. 1. Substan-
tia est crassioris, saporis acido-acerbi.
Vfus præcipui ad hypochondria arden-
tia, stomachi ardorem, (orificio imposi-
tum) imo calidis morbis omnibus feli-
ciori iuuamento est, quam acetum, quod
præter refrigerandi vim & caliditate
acri pollet, secus ac omphacium.*

PRÆPARATA.

Syrupus de Agresta, vide Disp.

CCCXCIV. *Opium.*

Sunt, qui Opij ac Meconij nomina
confundunt, & pro vno eodemque

habent, sed male.

Opium enim lachryma est, quæ stit-
lavit ex capitibus papaueris, dum ma-
turefcabant, leuiter incisis.

Meconium è contra succus est ex
iisdem expressus, *Videatur Matthiol,
Cord. Garz. Frag. Bellon. Cord. in hist.*

Opium est triplex	{	1. Album, affertur ex Cairo, fortè est Thebaicum.
		2. Nigrum & durum, ex Aden.
		3. Flauescens magis & mol- lius, ex Cambaia & De- can.

Colligitur Plinio & Auicenna ex
pap. nigro, at Turcæ ex albo (docente
Bellonio, *lib. 3. obs. c. 15.*) leuiter inciso
eliciunt, quotidianoque vsu ad ʒʹ. vel
ʒj. nomine Maslac assumunt, ad con-
ciliandam scil. animositatem. Verum
quia hoc opio caremus (flauescens
enim id esse leoninorum pilorum mo-
do, ait Bellonius) de opio agemus no-
bis vsitato, quod vel adulterum, vel
meconium, potius quam opium.

Præstantissimum habetur nobis vsi-
tatū opiū Cambaianum, quod ponde-
rosum, densum, inflammabile & ardens
(non atra tamen flamma) odore sopori-
ferum (instar papaueris), ac graueolens,
sapore amarum & acre, colore ad aloen
accedens, cum frangitur, splendore
quodam nitens, facile solutu.

N. 1. *Dignoscitur ab adulterato, quod
hoc si diluatur, liquorem croceo colore
tingat, ob Glaucium admistum.*

N. 2. *Opium seu Meconium nostrate,
secundum Quercetanus, ex papav. no-
strati Extractum. Vide supra in papau.*

Vires Opij. *Vim possidet spiritus com-
motos, inquietos, seditiososque compefen-
di, facultati que animali peculiari qua-
dam proprietate torporem inducendo.*

Vnde somnus, sensibilitatis imminutio, &c. media sane maximi solaminis, in vigiliis, doloribusque intensis. Verum enim vero, nec & suis incommodis opium caret, nimirum, praterquam quod excretionis urina & fecum supprimit, malignitatem quoque exercere aptum est. Hac videlicet liuorem artuum, frigidofque sudores, respirationem paruum, ac difficilem, mentis alienationem, &c. inducit. Scribonius.

N. De caliditate & frigiditate maxime controuertitur. Plurimi tamen cum recentioribus calidum id probant, inducitur à marore, inflammabilitate acedine, vi exulcerandi, &c. Alij cum maioribus frigidum id demonstrant, virtuti scilicet insistentes narcotica, quam obtinet. Disputatio, me hercle, citra necessitatem. Etenim statuatur calidum, reputetur frigidum, quid inde? nec enim in copia adhibetur tanta, ut motuenda inde inferre possit incommoda. Verum tamen calidum potius dicendum esse quam frigidum, potiores enim nunc rationes: nec obstat vis narcotica, utpote que non à frigiditate, sed occulta qualitate procedit. Simile enim rōpōpō observare licet in nonnullis correptis peste, febribusue malignis & ardentibus. In quibus sane quicunque narcosin ad frigiditatem referre voluerit, igni frigiditatem attribueret.

P R Æ P A R.

1. Extractum Opii Quercetani.

℞ Opii tenacis (non emarcedi,) q. v. scinde in bracteolas tenues & exiguas ac in patina vitreata moderato calore (arenæ) exicca (cauendofumum) donec in puluerem digitis comminui possit & foetorem amittat. Sic ꝓ fecundum discussum, in quo omnis vis narcotica.

℞. Opium hoc ꝓ suo narcotico

exutum, extrahe f. a. Tincturam cum ꝓ fortissimo, (vel succo Limoniorum) abstrahe dein menstruum in MB ad melliginem seu extracti formans. Hartman Croll.

N. Fecesque post Tincturam extractam remanent inseruire possunt anodynis externis inde concinnandis, e. g. in Podagra, &c.

2. Aliud Quercetani Extractum Opii & Hyosciami, quod placet appellare.

Extractum Olij succati.

℞. Succū seu Extractū Hyosciami ꝓx. (vide Hyosciam.) opij præpar. i. e. ad ignem exiccati, vt dictum ꝓx. vel vj. Digerantur lento calore cinerum. Sic attrahit opium tantum succi, quantum sufficit, quod residuum erit ab attractione, seorsim separabitur per inclinationem & exhalationem. Ex eo autem quod coagulatum est extrahe Tincturam cum succo Limoniorum (s. a. donec animaduertaris succum non amplius colorari. Tinctos liquores decantatos digere denuo, vt crassiores feces subsideant, quas secerne.

N. Laudanum opiatum maius Quercetani ingreditur.

3. Extractum Opii Angeli de Sala.

℞. Opii in frustula concisi lb. ß. humectetur aceto ros. ꝓij vel iij. atque exponatur igni & sarragine ferrea, continuo agitando vt liquefcat, vaporque opij ꝓreus ac noxius vna cum + in auram abeat, opiumque refrigeratum friari ac puluerisari queat.

N. Ignis caute administrandus, ne ꝓpōpōpō contrahat.

Hinc ℞. opium illud puluerisatum ros lbij. stent in calore arenæ (saltem aliquot horis) vt soluat, dein cola

cola per colum linteum, cum expressione ac coagula. Hinc solue denuo in Qu. E. Sambuci rectificatissima: clarifica cum album. oui ac inspissa ad consistentiam pilulis aptam.

N. Sal + ros. operationem opij (cum quo iungitur) non modo mitiorem reddit, sed & vim eius diaphoreticam confortat, ut vel sudor haud sine leuamine subsequatur.

4. Extractum Opij Croliannum.

R. Opij (purgati prius in liquore hissiopi, vel aqua Sata,) q. v. extrahe sa. cum V decanta & abstrahe.

N. Croliana hac extractio non sine ratione reprehensionem incurrit, quia 1. illud, in quo vis narcotica latitat, humana natura inimica, per V tenuit, subtilius, adeoque ferocius redditur, Laudani compositionem deteriore facit. 2. Spiritus vini sua natura nihil praeter A extrahit, sale intracto, quod potissimum tamen requirimus. Praestat itaque cum aceto extrahere, quam cum V. Hartman. in Croll. Brendel.

5. Laudanum opiatum.

Laudanum opiatum, nihil aliud est quam Extractum Opij admixtione alexipharmacum, cordialiumue, & sim. correctum. Dicitur autem Laudanum, quasi laudatum medicamentum, ob insignes operationes, quas vel in grauissimis morbis praestat, quales sunt 1. dolores sedare. 2. somnum inducere. 3. omnes fluxiones sistere. 4. ardorem mitigare. 5. Naturam confortare, Inquietos spiritus in Phrenitide, Arthritide, Epilepsia, & sim. compescere. Variarum portio laudani huius descriptiones circumferuntur, quarum tamen praecipuae sunt sequentes.

6. Laudanum Opiatum.

R. Extr. Opij (Quercet. vel Sale) li-

quidi adhuc instar mallis ℥j. Magister. vel sal. corallor. perlar. an. ʒss. Extract, croci (cum V facti) ℥ij. M. omnia diligenter & serua. In fine addi possunt aliquot guttulae ol. Caryophyllorum.

N. Alij spir. A admiscant.

Hoc Laudanum est pene inculpabile & secura sine omni alicuius peregrinae affectionis metu potest administrari.

Dosis à gr. ij ad iij. Hart. in Croll.

7. Laudanum Opiatum Querc.

R. Extr. seu Essent. Opij, ℥ij

Extr. Croc. (cum aq. Limon.

fact.) ℥j.

His confusis adde.

Pulu. Hyacinthor.

Corallor. an. ʒss.

Terra sigill. ver. ʒj.

Bezoard. ver. (f. Extracti Bezoardici. V. l. 2. c. 57.

Vnicornu.

Ambr. gryf. an. ʒij.

M. exacte, continuo agitando ad V lentum, donec ex materia frige facta pilulae formari possint.

Vires. Insignes ac suspiciendas percipies huius anodynii effectus, quod te spe nunquam frustrabit. Nam confert citra molestiam & cerebri ullam perturbationem, aduersus omnis generis dolores, à quacunque causa subortos, contra omnes hamorrhagias, in quacunque corporis parte fuerint, contra omnes defluxiones & fluores ventris, dysentericos, hepaticos: lientericos, & sim. & ad inducendam gratam tranquillitatem in febribus ardentibus, in quibus ipsi rationis sensus laeditur, & in phrenesin eger plerumque delabitur.

Dosis pilula vna ac altera magnitudine grani pipetis. Querc. in Pharm. Rest. c. 25.

I I i i 3

8. Aliud.

8. *Aliud, Laudanum Opiatum Quercetani*, quod liber appellare.

Laudanum Opiatum maius Querc.

℞. Extract. Bezoard. Quercet. (non-
dum inspissat.) Dosi ut l. 2. c. 57.

Extr. Croci ex croc. ℥iij. cum ∇
℞ at. ex succo limon. vel pomot.
redolent. acuata cum $\text{N u } \oplus$,

vel $\text{O } \ominus$.

Extr. Myrrhy ac mumia, (ut se-
quitur)

Extr. Opii succati (quale & quantum
supra paratum,) ℥. ℥vj.

Misce & lento ∇ e religantur ad
consistentiam mellis.

Dein adde:

Succin. Citrin. preparat. (i.e. super
quo ∇ opt. aliquoties (4.) de-
stragrarit.) ℥iij.

Sar. Perlarum.

Corallorum. añ. ℥ij.

Terræ sigill. opt. ℥i℥.

Pulu Bezoard. ver.

Oss. de C. C.

Vnicorn. ver. añ. ℥j.

Ambr. gryf. ℥℥.

Misc. opt. in fine addendo
 $\text{O } \ominus$ Anif.

Fœnic. añ. gr. xij. vel xv.

serua pro vsu.

Dosis, est magnitudo piperis, vel
gr. ij. iij.

*Extractum Myrrhe ac Mu-
mia fit:*

℞. Vriusque añ. ℥℥. dissolue in hy-
dromelite vinoso ad Δ m, traicé-
que calide per chartam, quia visco-
sa est solutio.

9. *Aliud Laudanum Opiatum, Avo-
dynam specificum Paracelsi.*

℞. Opii Thebaic. ℥j.

Succ. aurant. acid.

Cydon. añ. ℥vj. (alii addunt

& ∇ spermat. Ranar. tantun-
dem.

Cinamom.

Cariophyll

Croci or. añ. ℥℥.

F. digestio leni calore Solis vel fornacis per \boxtimes m, dein exprimantur & im-
ponantur iterum:

Molchi ℥℥.

Ambra ℥iij.

Magist. Corall.

Perlar. añ. ℥℥.

Misce, digereque iterum per \boxtimes m
postea adde

Quint. Essent. auri. ℥℥.

Misce exacte.

N. *Hartmannus omissa Q. E. auri
remanentiam incinerare, atque Sal in-
de extractum priori mixtura admiscere
iubet.*

Vires. *Anodynum specificum est Pa-
racelsi ad auferendum quoscunque do-
lores internos & externos. Hartman. in
Croll. Sala in Opiolog.*

10. *Aliud.*

Nepenthes aureum Angeli Sala.

℞. Extr. Opii (Sala) ℥℥.

Croci (ut in laudan. opiat.
maior.) ℥ij.

Lap. Bezoar. seu Tinctua. auri,

℥ij.

Resin. ligni aloes.

Ambr. gryf. opt. añ. ℥j.

Misce & incorporentur simul in va-
se vitreo, eoque bene clauso seruentur.
Sala in Opiologia.

11. *Laudanum Opiatum Crollij.*

℞. Opii Thebaic. ℥iij. purgetur in ∇
hyssop. dein extrahatur cum ∇.

℞. Succ. Hyoscyam. debito tempore
collecti & in O inspissat. ℥i℥.

F. Extractio cum ∇.

℞. Spec. Diambra.

Diamosch.

Diamosch. añ. ʒii.ß.

F. Extract.

Hisc Extractis per ☒ ses 2. digestis admisce.

Mumie transmar. ʒß.

Sal. Perlar.

Corall añ ʒij.

Liquor. succin. per alcohol. vini extract.

Oss. de Corde Cerui.

Lap. Bezoard.

Vnicor. animal. vel minoral. añ ʒj.

Moschi.

Ambrae, añ. ʒj.

Est in defectu genuini auri potabilis, nullis corrosiuis inquinati, addantur in fine.

☉ Anisi.

Carui.

Arantior.

Citrior.

Nucist.

Caryophyll.

Cinamom.

Succin. añ. gr. xij.

F. Massa pilularis.

N. 1. Radices & Cortices Hyoscyami iuniores recentes, (abiecto interno trunco lignoso,) colligantur ☉ & ☾ existentibus vel in ♀, vel in ♂, ante plenilun. Alij colligunt, si fieri possit, in ipsa hora, quando ☾ in dictis signis renouatur. Expressus succus depuratus inspissatur ad consist. mellis, dein extrahitur cum ♀ inspissaturque l. Δ.

N. 2. Succus Hyoscyami & Opium (antequam reliquis misceantur,) prius reiiciant sua ♀a, & venena noxia, (qua spuma instar superficiem petunt.)

N. 3. Pro muliebribus propter suffocationem matricis omittantur Moschis & Ambra, vel corrigantur adiectione granorum aliquot Castorei.

N. 4. Ex remanentia incinerata Sal extractum mixtura misceatur.

N. 5. Extractiones illa digerantur per menses 2. dein abstrahatur ♀, addanturque pulueros.

N. 6. Oleis, quia difficulter extracto miscentur, prius in vicem mixtis, aliquot gutta ♀ affundi solent, & diligenter commisceri, ita facile compositioni miscentur.

N. 7. Compositio lenissimo calore per mensem fermentari poterit.

Dosis e gr. ij. ad iij.

12. Laudanum Opiatum Clar.

Sennerii.

ʒ. Opii purific. ʒj. F. Extr. cum ♀.

ʒ. Spec. Diamb. ʒj. F. Extr. itidem cum ♀.

Hinc affundatur Extracto Opii, (ad syr. consist. inspissato,) Tincturæ Diambrae pars dimidia & succ. extr. rec. purific. ʒvj. stent in digestionem ☉ 20 saepius agitentur, vbi ♀ maxima pars exhalauerit.

Adde

Extr. Castor.

Solut. Corall.

Perlar. añ. ʒß.

Essent. Croci ʒj.

Affund. Tincturæ Diambrae reliquum, lentoque ♀, ♀ exhalet.

Sub finem adde:

☉ Citri.

Cinamom.

Caryophyll. añ. gr. iij.

F. Massa instar Extracti.

Dimidia parti adde.

Moschi.

Ambrae añ. gr. vi.

Reliquum reseruetur pro fœminis.

13. Laudanum simplex Plater.

Laudanum simplex habetur in obseru. Plateti p. 455. ex ʒj. bdell. in succo

fucco plantag. emolliti & ℥j. opij in
 V soluti F. massula, cuius dosis gr. vj.

14. Aliud.

℥. opij super laminâ ferreâ exic-
 cat ℥ij.

Stryac. calamit.

Labdan. añ. ℥ss.

Ol. gacyoph. gutt. iiij.

Malaxentur in mortario calido & for-
 mentur pilulæ magnitudinis pisi pon-
 dere gr. 4. aut 5. decur vnica.

15. Laudanum liquidum.

Fit ex opij desiccata, super laminâ
 ferreâ ℥ss.

℥ opt. rectific. ℥vj.

℥ opt. ℥ss.

Croci Anglic.

Specierum diamb.

Diatomat. ros. añ.

℥iiij.

Ambr. gris. ℥ss.

Infundantur simul matraccio clau-
 so, digerantur calore lento per 20. &
 continuos, coletur per chartam & co-
 latura seruetur. Est is accommodatum,
 qui pilulas sumere nequeunt.

Dosis à gr. 4. ad 8. &c.

16. Laudanum solidum S.

Closs.

Totum Laudanorum artificium
 consistit in correctione opij. quæ fit per
 diutinam digestionem in X (sp. 8. die-
 rum) quæ ter cum nouo X repetenda
 venit, abstrahatur postea X à tincto li-
 quore ad consistit. Extracti.

℥ extracti Opiatici ℥ij.

Croci (in p. 8. aq. ros. &

spir. vin. parte vnâ fa-
 cti) ℥ss.

Castor. eodem modo pa-
 rati ℥j.

Extr. spec. Diabr.

Diamarg. frig. &c.

Diamosc. dulc. in X
 mixtum parat. ℥iiij.

Magisterij corallini ℥lati ℥vj. M.
 vt artis est. Seruetur in vitro ad dimi-
 dias solum pleno quia post paucas ho-
 ras fermentari incipit, quod dum fit,
 agitetur sæpè spatulâ ligneâ.

Dosi gr. iiij.

N. Essentia & cariora omnia que
 vulgariter Laudanis adduntur, pretium
 potius, quam virtutes augent.

17. Laudanum pectorale valde excel-
 lens Ang. Sala attributum.

℞. Extracti Opii liquidi in part. iiij.

V, & parte 1. aq. ros. per digestionem

3. 6. in B. parati ℥. Croci.

Florum Δ Benzoinat.

Aloës lucid.

Myrrh. el. añ. ℥ii. puluerifentur &
 M. calidè, addendo spiritus ℥i. (ad
 promouendam fermentationem.)

Hoc Laudanum tutissimè exhibetur
 phthisicis à Catarrho, Asthmaticis tus-
 sientibus, cum extracto succi glycyrrh.
 In Epilepsiâ aërea cum sanguinis effe-
 uescentiâ hæmorrhagiâ, capitis dolore.
 Indentiû dolore dissoluitur in + & ap-
 plicatur denti. Dosis eadem cum superiori.

N. Plures insuper Laudanorum de-
 scriptiones passim reperiuntur, vt in Al-
 chymia Libaniti, l. 2. cap. 1. in Opiolog.
 Cl. Dn. D. VV. inckleri, Freytagij, & sim.
 quo curiosum Lectorem remittimus.

12. Pilula Narcotica Plateri. Vid.
 lib. 2. c. 74.

CCCXCV. Opopanax.

Opopanax, Dioscor. Opopanax.
 Gummeus est succus ex panacis he-
 raclei sauciata radice effluens ac con-
 crescens.

Dicitur Opopanax & Opopana-
 cum,

cam, Cord. hist. Caf. Planta autem insignitur, *πανάξ ηρακλῆς*, Dioscor. Panaces Heracleum, Matth. Cast. Panax Heracleum, Lob. Dod. Ger. Pan. Her. culeum, Caf. primum, Tab. Panax Sphondylii folio, C. B. 3.

Vires. Calf. 3. sicc. 2. emollit, digerit, flatue discutit, purgat pituitam, crassam & lentam, a partibus remotis, cerebro, nervis, sensoris, iuncturis, Thorace, (de quo Class. 4.) vnucla delapsa opitulatur, (suffitu in osimmissio.)

N. Signa bonitatis, color extus flavus, intus albus, aut subflavus, sapor valde amarus, odor grauis, consistentia pinguis, facile in aqua solubilis, leuis, tenerrat, friabilis, galbani instar lactescens, dum resoluitur ad lacteum liquorem propius accedens, Improbatur Opopanax niger ac mollis.

PREPAR.

Opopanax, styrax cala, bdell. labdan. parum admodum olei profundunt.

P.

CCCXCVI. Pissasphaltos.

Πισσαφαλτός } Natium *Ερρυαχς*.
Πισσαφαλτός } Factitium.

Natium describitur a Dioscoride, quod nascatur in Apollonia Epirotar. Item quod ex Cerauniis montibus deuoluatur, & impetu fluminis raptum rursus aestu in litus expuatur, ibique concreseat. Hac ratione nihil aliud esse videtur quam *ἀραλτός*, de qua l. 3.

Factitium, est compositum quid seu mixtura ex pice ac bitumine (unde & nomen accepit,) videturque id esse, quod nostrates *ἀραλτόν* vocitant seu bitumen Iudaicum.

N. Sunt qui Pissasphaltos mumiarn Arabum dicunt, de quo lib. 5. in homine.

Vires. Calf. 3. & sicc. 2. dolori capitis, aliisque eius morbis a frigiditate obortis medetur.

CCCXCVII. Pix.

Πισσα. Pix, Pech. Est pars Resinosa ex accensis tædis, i. e. arboribus resinosis per senectutem nimia pinguedine q. strangulatis, colliquata.

Modus fiendi rusticis committitur, qui in nonnullis locis, vbi arbores resinosa abundant, inde victum lucrantur: fitque ad modum quo destillatio per descensum feri solet. Rogus scil. tedarum resinosa contegitur vndique termitibus, & terra, ne qua exhalatio fieri queat: hinc subdunt ignem per foramen relictum, quo fit vt resinosa pars colliquata in canales affabre subditos effluat, initio liquidior, hinc crassior, vltimo crassissima. Affertur autem copiose ex Finlandia, vbi rogos eiusmodi plures non citra oblectatione vice Juna & eadem conspexi, abietem enim ac Pinum copiose illa alit.

Dicitur Pix liquida, Pisselaxon, Dioscor.

N. Arbores resinosa sunt in primis Pinus, Abies, Larix, Terebinthus, Cedrus.

Pix illa vbi denuò coctione purgatur, seu si maui dephlegmatur, crassescit magis ac magis, diciturque Pix sicca, Palimpissa, Pix naualis (quod nauibus picandis adhibeatur, non quod a nauibus maritimis detasa sit, quippe hæc appellatur Zopissa.

Vires. Vt resinam sapit, ita & resinarum Vires obtinet, idque eo magis, quo liquidior pix fuerit, sicca enim exiccat fortius, facultatis itaque pix liquida est calfacientis, discutientis, mollientis, digerentis,

KKkk

gerentis, anodyna, &c.

P R Æ P A R.

Ol. stillar. Fitl. c. per Ret. per se, vel addito sabulo.

Vires. Maxime prodest ad vulnera capitis, & ad puncturas ex causâ frigidâ egregiè facit.

N. Multum olei fundit.

R.

*CCCXCVIII. Resina Terebinthi
s. Terebinthina Cypria*

Terebinthina in officinis Resina est liquidiuscula, referens balsamum siue oleum crassiusculum, colore ex albo flavescentes, sapore acris, lenta, cutique tenaciter adherens. Estque duplicis generis. Resina scil. Terebinthi & Resina Laticis. Resina Terebinthi *in officinis* Resina Terebinthina (Auicennæ gluten Albotin) est ea quam Officinæ Terebinthinam Cypriam Venetam, Paracelsus Lorcher appellant, Terebinthina Resina. *Matth. Ter. vera, C. B. 1.*

Optima censetur clara, pellucida alba, vitrei coloris in caruleum vergentis, acris & odorata. Præfertur item quæ ex Cinio Insula affertur, post hanc Lybica, tum Pontica; tandem Cypria, Syriaca, Iudaica, Arabica Terebinthus arbor est mediocri magnitudinis, in plurimis regionibus sponte familiaris, v. g. in Hispania, Syria, Sicilia, &c.

N. Terebinthinam veram officinis esse ignotam autumat Clusius, officinalemque esse resinam abiegnam e novellis abietibus collectam. Videtis class. 1. in abiete.

Vires. Facultates Terebinthina ex lib. 2. sub titulo de Resinis huic referre licet. Excellit enim Terebinthina, præ

reliquis Resinis, vnde & facultatibus præpoller. Confert intrinsecus præcipue in tussi aliisque pulmonum affectibus (cum melle,) in urina ac alno cienda: convenit Epati, Liemi, Renibus, Vesica, expectorationi purulenta ac phthisi incipienti succurrit, calculum pellit, arthriticos affectus inuat, uterum a saburra liberat. Extrinsecus vsitator est terebinthina laricea, qua huius vicaria in defectu esse potest, viribus iisdem pollens, sed imbecillioribus.

N. 1. Lauari solet in aqua appropriata, & hinc exhiberi.

N. 2. Exhiberi potest 1. per se, placentulis quas oblatas vocant, insoluta. 1. In aqueo liquore, adiecto tantillo Vitelli oui, sic lacteum scil. exhibet liquorem. 2. Inspissata aliquantulum & in pilulas redacta. Verum ob evanescentiam spiritus præstant modi priores, vel si placet, fermentur modo sequenti.

Pilula de Terebinthina cum Rhab. Pilula Podagrica.

R. Terebinth. Cypri. ℥j coq. in ▽ chamæpyt. dum albescat hinc adde Rhab. opt. ꝑpulu. ℥vj.

Iv. arthritic.

Succin. alb. añ. ℥ij.

Glycyrrhiz. ʒj.

M & F. Massa.

Vires. Faciunt ad remouendam materiam calculi & podagra.

Dosis ℥ʒ. ad ʒj. &c. Greg. Horst. part. 1. lib. obseru.

N. Crato easdem habet, sed paulo secus, cons. 143.

CCCXCIX. Resina Laricis. s. Terebinthina vulgaris.

Resina Laticis est, quam Terebinthinam vulgarem, seu Terebinthinam simpliciter

simpliciter ita dictam, vocant. Hæc quanto Terebinthinæ priori similior, tanto quoque præstantior æstimatur, adeoque optima, quæ purissima, odoratissima, aliquantum translucida, & quæ ab intincto digito contumaciter & æqualiter diffluit.

Vires. Calfac, emollit, abstergit, Vses præcipuus intrinsecus in pulmonibus expurgandis, in gonorrhæa sistenda (cum ∇ plantag. ac succino,) urinam ac aluum ciet. Extrinsicus Chirurgiæ usitatissima est, fereque in Emplastris omnibus adhibetur, mouet enim pus, maturat, scabi- ei cutis medetur.

N. Sunt qui Therebinthinam, in cereuisia infundunt atque simul deseruere sinunt, pro potu ordinario in præseruatione calculi, viscerumque obstructionibus.

PRÆPARATA.

Ex Terebinthina solâ vulgari fieri solent, ad quem modum tamen & reliqua tractari poterunt.

Suntque 1. Spiritus Terebinthina. }
2. Oleum Terebinthina. } Horû præparaciones.
3. Balsamus Terebinthina. } Vide. l. 2. de oleis.

N. Oleum ac balsamus rarò seorsim, crebro coniunctim extant.

4. Colophonia.

Vires. Spiritus calfacit, siccatur, attenuat, urinam ciet, tartaream mucilaginem resoluit. Hinc confert in tussi, aliisque Pulmonum affectibus tartareis, in Lienis & vteri obstructione, in calculo Renum & Vesicæ, in stranguria, gonorrhæa virulenta, ulceribus penis ex lue venerea.

Dosis à gr. iij. ad vj. & vltra.

N. Urina odorem Violaceum conciliat.

Balsamus calfacit, attenuat, mundificat, consolidat. Hinc adhibetur feliciter membris frigore rigidis, tumoribus scirrholosis, vulneribus inueteratis ac putridis, gangrana, fissuris pedum à frigore oriundis (pernionibus) quas efficaciter curare creditur.

N. Conrad. Ruutath commendat summè spiritum Terebinth. melitum, cuius guttulas 4. 5. 6. in liquore conuenienti quotidie exhibet ad calculum. Renum & Vesicæ atterendum, Paræ mellis puri part. 2. & Terebinth. p. 1. mixtis exacte, & per Ret. vel \times destillatis.

5. Oleum cæruleum Terebinth.

Fit S. S. S. in Vesicâ cupreâ ex scobe radicum pinguium abietinarum cum flore chamom. affusâ aq. q. s. fermententur per dies aliquot, donec Thereb. abieti inhærens tincturam φ is ad se attraxeri, quam in olei eius prolectatione secum in \times rapit, sibi que per omnia miscet. Est vulnerarium incomparabile, si Thurnhensero creditur.

6. Tinctura Therebinth.

Euaporet ol. flauū illius leniter in scutellâ, dū restet Colophonia rubentissima è quâ tincturâ cū ∇ trahitur, eoque remoto balsamus relinquitur quorenes inungatur in doloribus Nephrit.

7. Sal volatile Thereb. purgans.

Describ. in Myroth. Fabri.

8. Pilula de Therebinthina cum

Rhabarb.

Terebinth. cypr. ζ ij.

Coq. in aq. chamæpytios dum albescat.

Hinc adde Rhabarb. opt. pulu. ζ vj;

Iux arthetie.

Succin. alb. añ. ζ ij.

Extr. Glycyrrhiz. ζ j.

M. F. Massa.

KKkk

2

N. Crato.

N. Crato aliquot huiusmodi descriptiones exhibet, atque Rhabarbarum in minori quantitate immiscet.

Vites. Commendantur in praeservatione arthritidis, calculi, &c. Assumuntur singulis trimestribus, &c.

Dof. ad. ℥j.

Greg. Horst. lib. 1. obseru.

S.

CCCC. Saccharum.

Helmontius in Tractatu Pharmacopoeium modernum num. 30.

Willis in Tractatu de Scorbuto c. 10.

Etmuller in Commentario super hanc praesentem Pharmacopoeiam Schroederi omnino damnant

et afferunt semper esse perniciosum.

Σάκχαρον, σάκχαρον, μέλι καλοῦ γαιόν, ἀνδρῶν, Sacchar, Saccharum, Zucharium, Zacchar, Zaccharum, Succharum, mel Harundinaceum, mel Cannæ. Arabib. Zazar, Sudur, Sutter. German. Zucker. Vid. Matthiol.

Succus est plantæ cuiusdam arundinacæ, non solum in India, sed in multis Asiæ & Africæ locis, quinimo & in Europæ quibusdam Regionibus vernaculæ.

Exhibet autem Saccharum, partim incisione Trunci, vnde Saccharum instar Lachrymæ extillat, quod rarum est, partim elixatione porissimum medullæ ac radicis, donec f. saccharum in fundo instar salis concreuerit.

Planta illa saccharifera inscribitur Arundo saccharifera, C. B. 2. scil. inter arundines Indicas. Arundo saccharata, Dalech. in D. Arundo saccharina Indica, Lob. Ar. & Calamus Saccharinus, Lob.

N. Sunt qui saccharum Veteribus incognitum fuisse statuunt, sed falso. Mentionem enim sacchari faciunt sub nomine mellis in cannis concreti, mellis arundinacæ, Galen. 8. Meth. & 7. simpl. Dioscor. l. 2. c. 75. Hinc Paulus Aegineta, l. 7. c. 3. Salem Indicum vocare videtur, quod interdum superueniente Solis

calore induretur & concretum Salis effigiem referat. His 3. ad stipulatur Plinius l. 14. c. 18. Sic & Auicenna Fen. 1. Can. 4. tect. 2. c. 23. Salem scil. appellat, qui ex India aduectus, colore sal. dulcedine mel. representet.

Denominationes sacchari sumuntur tum à locis, vnde plerumque asportatur, tum ab elaboratione, qua depuratur, Officinisque communicatur.

A loco natali dicitur 1. Saccharum Madariense, vel Mederiense, à Medera Insula. 2. Saccharum Canariense, Canarium, à Canariis Insulis. 3. S. Thomasinum seu Thomæum, ab Insula S. Thomæ. 4. Sacchar, Maltanum, Melisium, siue Melitheim. Cibale, à Malta, seu Melitha Insula. Sic dicitur & 5. Valentinum à loco refinationis, qua Valentia Hispaniæ celebris est.

N. Madera, Canaria, S. Thomæ Insula, sunt Insulae in Atlantico mari sita, Africaque vicina.

Ratione elaborationis, saccharum, vel est non finum, vel refinatum, seu finum, vel Candifatum, vulgo saccharum Candi seu Candum, Non finum quod sola coctione in ∇ depuratum est. Adfertur ad nos partim in Pyramidales metas fufum, partim in formam pulueris ac grumorum crassiorum redactum. Non finum in puluere Materialistis Castonada vel Castonada vocari solet, forsan, à Cistis, quibus inclusum ad nos aduehitur, Cista enim Germanis inferioribus *Kast* appellatur. Aliis saccharum miscellaneum, quod ex diuersis saccharis commisceatur. Estque hoc saccharum tum minus excoctum, tum quoque minus purgatum, vnde & minus candidum, quippe quo magis depuratur, eo magis albescit. Hinc diuersi coloris exhibetur album, gryseum,

Seneca Epist. 84. de Saccharo loquitur quasi Romanis incognito.

gryseum, pallido citrinum, citrinum purpureo-nigricans, &c.

Non finum in metis, est pulueratum illud saccharum, ulteriori coctione in ∇ excoctum, despumatione (citra refinationem) clarificatum, in formulas pyramidales vsitatas effusum, qua ratione à sordibus feculentis per foramina formularum illarum destillantibus sequestratur.

Refinatum seu finum est, quod lixiuio (ex calce viua cum ∇ facto) solutum, excoctum, despumatum, & postmodum inspissatum, inque formulas effusum est, inferiori parte perforatas, ut feculentus glutinosus succus defluat.

Saccharum candidatum, vulgo saccharum candi s. candium, saccharum candidum, saccharum crystallinum, saccharum lucidum, Germ. Zucker. Candid. Est saccharum depuratum, candidando in crystallinam formam s. a. redactum, ad modum quo folia crystallifari diximus. Estque album vel rubrum: album fit ex Canariensi; rubrum ex Tomasio.

Delectus 1. Ex loco natali optimum habetur Mederienne, hinc Canariense, tertium locum sibi Melisum vendicat, vltimum Tomasiu. 2. Ex colore, purius aestimatur album, hinc gryseum & denique rubrum.

N. De Saccharo refinato, utrum non refinato praestet, dubium monetur. Negatiuam habet Tabernemontanus, Herbar. l. 1. c. 41. Affirmatiuam tuerit Angelus Sala in sua Saccharologia, l. 1. c. 4. Verum mallet ex Scopo rem decidere, quo refinatum, quia aliquantulum acrius est, praestat in attenuatione, incisione, absterfione; non refinatum in lenitione, lenigatione, adeoque in pulmonum

vitiis, & cat.

PRÆPARATA.

1. Saccharum Penidum. Hoc fit. \mathcal{R} . saccharum q. v. dissolue & clarifica per alb. oui. Hinc cola ac inspissa lentè, donec bullæ magnæ apparuerint. Hinc retrahere ab ∇ , ut bullæ resideant, effundeque in tabulam oleo amygd. illitam atque vbi nonnihil induruerit, de vnco suspende, manibus celeribus (amylo conspectis) distrahe in formam debitam ac repone.

2. Saccharum Rosatum. Fit ex sacchar. in succ. ros. soluto.

3. Saccharum Violatum. Fit eodem modo cum succo violar.

4. Aqua seu spiritus acidulus. \mathcal{R} . Sacchari (lbj.) destilla ex cucurbita vitrea fatata & ampla (quippe facile in altum attollitur,) Δ arenæ per gradus (NB. vel Retortam adhibere poteris,) sic extillat aqua acidula, cum oleo supernatante: Rectifica \mathcal{B} si placet, oleumque à spiritu separa.

Vires: Spiritum hunc in dissolutione lapidum, aliorumque crustaceorum adhibere licet, & est instar spiritus Guaiaci.

5. Oleum. Ex prioribus patet.

6. Sal. Ex relicto capite mortuo, vltius incinerato elixiuatur.

7. Liqueor seu syrupus. \mathcal{R} . Sacchar. cand. q. v. affunde ∇ ad eminent. digit. 1. accendatur, efflagretque ad consistentiam syrupi.

Vires. Prodest in tussi, aliisque affectibus pulmonum, incisione ac lenigatione opus habentibus.

N. Liqueor hic apud vulgum vsitatissimus est, magnaque aestimationis.

8. Liqueor alius. Inde Saccharum candidum albumini oui cocti ad duritiem, repone ad liquefcendum.

Vires. Exhibetur ad tussim & asperitatem gutturis infantum. Extrinsecus confert oculorum rubedini.

9. *Essentia & crystalli Sacchari.*

Essentiam & crystallos Sacchari paravit, ut reperies publicatum centur. 3. artic. 20. Kessleri. Addidi autem pastam ex sacch. & factam cochleare vnum aut alterum ol. $\text{F} \cdot \text{i}$, materiam relinquo indigestione cinerum per 24. horas, postea pro lbj . sacch. affundo V non rectific. mens. 8. digeratur, denuò, habebis Tincturam corroborantem.

Dos. cochl. ij. Sam. Closs.

CCCCI. *Sagapenum.*

Sagapenum, Diosc. Sagapenum, Saponium, Offic. Serapinum, Matth. Cord. hist. Cas. Sirapinsass. Est lachryma seu Gummi arboris cuiusdam ferulaceæ, eiusdem cum succo nominis, ex qua fauciatu educitur.

Nascitur in Media Regione, vnde Alexandriam, ac hinc Venetias atque in alia Europæa loco transportatur.

Optimum censetur syncerum translucidum, foris colore fuluo vel ruffo intus albido, gustuacre, odore graui, porriunque æmulans.

Vires. *Cal.* 3. *sicc.* 2. attenuat, aperit, substantia est tennis: tanta extrahendi vi pollere dicitur, ut quoque spicula ex carne eliciat: purgat lentos & crassos, imò & serosos humores, ex ventriculo, intestinis, utero, renibus, cerebro, nervis, iuncturis, pectore. Hinc prodest in hydrope, tussi inueterata, asthma, cephalalgia, spasmo, epilepsia, paralyxi, tremore artuum, in obstructione & tumore splenis, febribus intermittit, dolore colico, menses ciet, (sed fatum ene-

cat) urinam mouet. Extrinsecus conuenit in pleurisi, aliisque tumoribus ac doloribus. mitigatione ac resolutione opus habentibus. Fumus excitat Epilepticos, hordeola Ciliorum sanat.

Dosis à ʒʒ. ad ʒj.

N. 1. *Ventriculo ac Epati quia nõ adeo familiare est, corrigitur tertia parte Mastiches, Cinamom. Zinziber. &c.*

PREPARAT.

1. *Sagapenum depuratum.* Fit ut depuratum ammoniacum:

2. *Pilula de Sagapeno.* Vide Dispens. August. & Cordi.

3. *de Sagapeno Camilli.* Vide sis apud Quercet. & supra l. 2.

4. *fatida.* Vide Disp. Aug. &c.

5. *Oleum stillat.* Fieri poterit ut ol. Gum. Ammoniac. per XX in A .

CCCCII. *Sanguis Draconis.*

Æqua Spaxortia, Dioscor. Sanguis Draconis est Lachryma arboris cuiusdam, instar sanguinis exiccati, concreta. Soluitur quidem in V , quam lacteum quasi reddit, sed sine mixtione, quippe refrigerata V subsidet iterum, parietibusque vasis adhærescit, videatur *Cord. hist. Matth.*

Clus. Acosta, C. B. 7. (inter gumi Drachenblut.

Aduchitur ex noui Orbis Insula, cui nomen portus sanctus, ubi partim sponte, partim vulnere caudici illato, profluit, arboris illius fructus cerasis similes sunt, detractaque pelle dracunculæ exactissimè representant, vnde & nomen lachrymæ succo huic impositum est.

N. Sunt qui *Dioscoridis cinnabarim esse velint.*

Vires. Refrigerat (alii caliditate & frigiditate temperatus est,) exiccatur strenue,

ne, astringit, repellit, Vfus eius est praecipuus intrinsecus in exsiccandis cataractis, (impositus capiti) in haemorrhagia sistenda, vulneribus glutinandis, donibus laxis stabilendis.

N. Umbilico impositus quoque dysenteria prodesse dicitur.

PREPARATA.

Nulla inde prostant, depurari tamen potest, si in aqua decoquatur, & fecibus decantetur, & denuo inspissetur.

CCCCIII. Sarcocolla.

Σαρκοκόλλα est lachryma gummea in granulis, mannæ seu pollini Thuris similis, colore subrufa, (vel flava) sapore amara, dulcedinemque (Glyzyrrhizæ æmulam,) post se relinquente. Profluit ex arbore quadam exotica, spinosa ac nodosa, eiusdem cum lachryma nominis, quæ tum sponte, tum sauciata lachrymam illam profundit. Videatur Matth. Cord. in D. & hist. Caf.

Eligenda recens, coloris ad pallorem vergentis (vetusta enim rubescit,) saporis amari, substantiæ porosæ, viscosæ, glutinosæ, & quasi spumosæ, facillique in ∇ solutionis, &c.

Vires. Calfac. & sicc. i. astringit, consolidat, glutinat, coquit, maturat. Vfus præcipui in vulneribus extergendis consolidandis, cicatrice ol. ducendis, unde & nomen adepta est, &c. Mirifice prodest, & in oculorum fluxionibus, albugine, nubeculis, (maceratur in lacte asinino vel humano ∫ (5) postea cum ∇ Rosar. mixta, ciliis imponitur, addito si liber, tantillo sacchari,) in haemorrhagia narium. (anacollematis immiscetur.)

N. Sunt qui propinam purgandi gra-

tia, crassosque & viscosos humores, ex partibus dissitis, e.g. ab articulis, pulmonibus illa retrahi scriptitant:

Dosis ℥j. corrigenda est, ut sagapenum.

PREPARATA.

Pilula de Sarcocolla compos. Vide Dispens. August.

CCCCIV. Succolata.

Succolata est massa in placentas fat crassas formata, rubra saturatè, friabilis, sine odore, non æsimilis sanguini Draconis, præterquam sic coloris lucidioris.

Dicitur Chucalate, Chocolate.

Lenecorn. part. 9. l. 4. c. 22. Ind. Occid. Caca vate, Benz. part. 5. l. 2. c. 16. & 17. Ind. Occ. Clus. exot. l. 2. c. 28.

Fructus ex quibus Chocolate conficitur, dicitur Cacao, Clus. Tab. Amygdalis similis fructus Guatimalensis s. Auellana Mexiocana, C. B. 6. Iaco. Berrio, Mercatori in Hispaniola.

Fructus hic arboreus siliquis inclusus, amygdalarum speciem refert colore fuscus. Adfertur copiosus ex Guatimala, adhibeturque loco monetæ, pauperibusque eleemosyna datur. Parant ex hoc tum potum Indis vulgarem, tum massam hanc chocolaten dictam (& potus hoc nomine venit) quæ fit ex dictis granis contusis, & cum aromatibus mixtis.

N. Primus honor debetur ei quæ in America paratur, posterior, quæ in Hispania ex granis ad veltis conficitur, venustate paulatim vilescit.

Vires. Conferre dicitur ventriculo frigido, pectori, adeoque tussi, purulentæque imprimis, scæratui, vertigim. Quin & commendatur summè ad roborandum

dum vita Balsamum, veneremque pro-
ritandam.

Usus est, ut manè cum saccharo in
vino vel cerevisia calida diluta absor-
beat.

Dosis ℥ij. ad ℥ss. & ultra.

N. Fructus huius participem me fe-
cit, Ioh. Petrus. Materialista huius
Reip. celeberrimus.

CCCCV. *Styrax seu Storax
calamita,*

Στόραξ Styrax, duplicis generis in
Officinis prostat, siccus & liquidus.

Siccus Officinis Storax calamita,
(à Cannarum calamis sic dicta, in qui-
bus olim ex Pamphilia apportabatur.)
est arboris cuiusdam gummeus, resino-
susque succus concretus, aridus, odoris
suavissimi, videatur Matth. Cord. hist.

Crescit arbor illa Storaciflua, in
Syria, Silicia, Pamphilia.

Præfertur Styrax pinguis, lentus, fra-
gmentis albicantibus rufescens, vel
haustus odore perseveranti, qui dum
mollitur, melleum liquorem reddit.
Improbatur furfurosus, niger, cano situ
obductus, inodorus.

Vires. Calfacit, exiccit, emollit, con-
coquit, Cephalicus imprimis est & ner-
vinus: medetur tussi, catarrhis, raucedini,
gravedini, vulna præclusa duritiè la-
boranti, extra & intra datus convenit:
immiscetur cardiacis & latificantibus,
alium leniter mollit, si cum Terebin-
thina in forma catapotij assumatur.

Extrinsecus suffitu capiti adhibetur.

PREPAR.

1. Oleum stillat. Fit si Styrax cum
▽ Rosarum digeratur, postmodum
Ete ex X & etur primum Δe leni,
dein > quando ☉ stillare incipit,

fortiori.

Vires. Iisdem confert, quibus Styrax
sed maiori efficacia: gutta auribus in-
stillata sibilum discutit.

2. Oleum coctum. Vide August.

N. Occurrunt descriptiones medica-
mentorum in quibus & Storax calami-
ta & rubea distinctim præscribuntur,
vii sunt Diacastoreum Nicolai, Trochi-
sci Alipia moscata. In his igitur quid
per Styracem calamitatam arubea di-
stinctam intellectum velit Nicolaus,
diverse sunt opiniones: Sunt qui Thy-
miama per Styracem rubeam innui vo-
lunt, ut Euchs. in compos. Medic. &
Bauhinus in Pinac. Alij Styracem op-
timam, que in grana confluit, ut Au-
gustani & Cordus. Alij Styracem ve-
tustate rubefactam. Verum enimvero
cum in præscriptionibus optima quaque
eligenda sint, adeoque & Styrax in gra-
nis recipiendus, ubi calamita styracis
fit mentio, per rubram aliud quid in-
telligere vni que oportet.

CCCCVI. *Styrax liquidus.*

Est Liquor pinguis, instar Balsami
crassus, graueolens.

N. De Styrace liquido, magna inter
Auctores dissensio. Aliis videlicet ni-
hil aliud est, quam stacte, i.e. myrrha
colamen. [a] Aliis factitium quid ex
styrace calamita in oleo ac vino soluta
admistaque resina luricea, excocta, [b]
qua decoctio ubi refrigerit, styrax liqui-
dus ad fundum secedere dicitur, ad su-
perficiem mittens oleosam (substantiam
liuidiorem, (ali) expressu idem molitur.)
(Serapioni styrax liquidus, est ole-
um ex nucleis arboris storacifluae ex-
pressum; at cortex fructus, ex quo oleum
expressum est, styrax sicca eadem dicitur.

Auicenna

Avicenna styrax humidus fit per decoctionem corticis, estque colore nigro. Fex remanens eidem styrax sicca dicitur, lib. 6. c. 32. Dioscorides oleum styracinum appellat, quod ait componi in Syria ex Styrace. De hoc referi quod calfaciat vehementer & emolliat, verum caput dolore afficiat grauetque, & saporem adferat. Que facultates in styrace liquido deprehenduntur.

a] *Matth. in Diosc. lib. 1. c. 62. Bauhin. Pinac. lib. 12. sect. 6.*

b] *Fuchs. de comp. med. 1. 1. c. 11.*

T.

CCCCVII. Tacamahaca.

Resina est, ex iis, quæ ex noua Hispania non ita pridem adferri cœperunt. Colligitur ex vulnerata arbore instar populi procera, admodum odorata, cuius fructus ruber est, Pœoniæ semen æmulans. Resina autem colore accidit ad Galbanum, vnguibus est albis, vti ammoniacum, odorem ac saporem grauem refert, cutique tenaciter adhærescit. *Vid. Frag. Monard. & Indiæ Occid. part. 9. l. 4. c. 29.*

Vires. Calfac. in princip. 3. sicc. 2. valida astrictionis particeps, digerit, resoluit, maturat, tumores emollit, dolores ac status discutit: vterina imprimis est, nervina ac cephalica. Vsu præcipue externus est. Prunis iniecta naribusque admota, mulieres vteri suffocatione laborantes illico liberat. Umbilico Emplastri modo imposta merum suo loco retinet (usu familiarissimo.) Ventrículum roborat, defluxiones quascunque à capite defluentes reprimis, (limateo excepta, & post aurem alteram saltem vel utramque applicata, suffitine attracta.) Temporibus adhibita (cerati modo)

defluxiones in oculos aut alias faciei partes reuellit, dolorem dentium sedat, (dentibus etiam corruptis indita:) abdomini Emplastri instar imposita vteri fluxum cohibet: magna est efficacie in doloribus articulorum (coxendicis) iuneturarum ac nervorum vulneribus imposita eadem curat, nimirum statim suppurare facit & spasmodum prohibet. Monardes.

N. 1. *Adeo celebris est apud Indos, ut ad qualemcunque dolorem adhibeatur, nec aliud remedium norint, modo non adsint inflammationes admodum calide.*

N. 2. *Inueteratos cruris dolores Tacamahaca Emplastri loco imposita curatos vidi.*

PRÆPAR.

Empl. Stomachicum. Vide l. 1.

CCCCVIII. De Tartare.

Tartarus in Medicina pathologica est res naturæ lapidescentis, i. e. in lapides coagulari apta, vel iam demum coagulata: potissimum tamen viscosam ac lentam mucilaginem denotat, quæ nondum induritiem lapidis conuersa est. Hinc deducitur quoque ad officinam, denotatque sal terrestre ex vegetabilibus certis, vel per se, vel artificio separatum.

N. De Tartari origine non possum quin animi sensa communicem: Rerum principia primitus indigesta sunt, ac veluti, in choatica sua dispositione simplicia: hinc subinde cum maturitate in partes secernuntur crassiores & subtiliores. Crassiores ad elementalem vergunt statum, scilicet aquæo terrenum: Subtiliores & poriores exaltantur subinde seu (viti dicitur,) spiritualisantur, i. e. in

L L I I statum

statum spiritus euehuntur. Haec ergo ubi ad statum deducta fuerint summum, quem natura intendit, exhibent spirituales partes, si minus eadem sint digesta, vel cum tempore retrogressa ad statum crudiorum, exhibent Tartarum, constantem scilicet ex partibus potioribus aquae, terra & salis, adeoque Tartarus pollet viribus insignibus, spiritus vires amulantibus.

PRÆPAR.

Præparationes Tartari 1. Depuratum, 2. Destillatio, 3. Salificatio.

I. DEPURATIO.

Depuratio vel fit à sordibus externis, vel parte magis arenosa ac minus solubili: illa lotionem peragitur, hæc solutionem ac coagulationem.

Lotio seu ablutio: unde ♀ lotus.

℞. ☐ triti ac cribrati, q. v. affunde ∇ fontanam, calidam (vel lixiuium forte, e.g. ex cineribus clauellar.) agitaque optime, hinc sine residere ac refrigeret, postea decanta aquam vna cum impuritatibus, idque repete aliquoties, donec ♀m sit instar arenæ.

N. Si lixiuium adhibueris, edulcorare ♀m oportet.

Solutio & coagulatio, unde

1. ♀us depuratus Acidum ♀i, Cremor & Crystalli ☐.

℞. ♀i optime loti, q. v. affunde ∇ feruentis bonam quantitatem, agita spatula lignea, & soluentur particula ♀i, cola per manicam Hippocrati. dum adhuc calet (aliàs coagulatur rursus, quod solutum erat:) restanti o affunde aliam ∇m feruentem, agita & cola, idque reitera tantisper, donec nil nisi arena irresolubilis restet. ∇s has ☐o imprægnatas reponere ut refrigerent, & videbis ♀m putum, partim supernatante instar cuticulæ, partim instar

crystallosum vel ad fundum residere, vel parietibus ac bacillis immixtis adhære (vtrumque cuticulam scilicet & crystallos collige, exicca atque serua.

N. 1. Si nimia ∇a quantitas coagulationem impediens, evaporare aliquantulum sine.

N. 2. Sunt qui cuticulam supernatantem seorsim colligunt (nomine cremoris) & crystallos itidem seorsim (titulo crystallosum ☐) verum cum vtrumque eiusdem sit natura & efficacia, distinctionem hanc parui momenti autumo.

N. 3. Felicius adhærescent crystallosi vasi ligneo.

N. 4. Si depuratum hoc ♀m haud satis candidum sit, solue iterum in ∇ feruente, filtra & reponere ut ante, ad coagulandum.

Vires. Vfus huius ♀ depurati est, crassos tartareosque humores, præcipuè autem in prima ventris regione stabulantes incidere ac attenuare: commodè itaque adhibetur in obstructione Epatis, Lienis, Mesenterij, Renum, in affectu Hypochondriaco, &c. Hinc quoque sibi primas vendicat inter Digestiua vniuersalia, cuius rei gratia & cathartici præmitti plerumque solet. Quinimo ad laxandam aluum commodissimum medicamentum est, si saltem grano vno ac altero Diagridis vel Gummi de Gamandra acuat.

Dosis à ʒb. ad ʒj. vel ʒij.

2. Crystalli ♀ chalybeati, Acidum ☐, chalybearum ☐ Sale.

℞. Acidi ♀ ʒiiij. Magister. chalyb. i.e. cristall. ♂ per spir. ☉. (Vige in ♂) ʒij.

Crystallos ♂ solue in ∇ fumar. solutionem incorpora cum acido Tartari in mortario lapideo. Exicca iterum ac puluerifa: aromatizetur aliquot

quot guttis ol. Cinamomi.

Vires. Vtilissimum medicamentum est morbis chronicis, ut sunt obstructio Lienis, quartana, iustus uterque, cachexia virginum, hypochondriaca passio,

Dosis à ℥j ad ℥ij.

3. Cremor ☿ chalybeatus compendiosior S. Closs.

Vbi ☿ impragnata ☿ puluerifatur. ℞j. soluitur in ℞xv. aq. fluuiat. per ebullitionem fuerit resoluta, & ad decidenciam vnus quartæ euaporata, iniice in vas ℥iij. limat. ☿ tis moxque ab Δ remoue & cola calidè. Habebis cremorem præsoidem & summè deoppilatiuum.

N. Iniciatur limitatura dum ☿ feruet nec diu relinquatur, ne cremor reddatur vomitorius.

II. DESTILLATIO vnde

1. Spiritus ac oleum.

℞. ☿ albi crudi loti (vel quod melius depurati,) q. v. destilla ex Retort. vitrea in arena (vel igne nudo) Δ e gradatim adhibito: primò extillat phlegma, dein spiritus in forma nebulæ & tertio oleum pingue. Separa oleum à spiritu, vel beneficio chartæ ac filtrationis, vel tritorij gossypiiue auxilio.

N. Sunt qui spiritum ☿ terna vice supra colchotar rectificant.

Rectificatio spiritus ☿ i. Destilla ex MB tertiâ vel quartâ vice semper visa destillationi infertuientia optimè lixiuio forti eluendo.

Rectificatio ol. ☿ i. Affunde quantitatem magnam ☿ (vel ☿ ac destilla per MB separa oleum ab ☿ vt moris idque rectifica ☿ m scil. fragrantem aliquam addendo ac denuo destillando.

N. Ex residuo capite mortuo extrahi potest sal. Vide suo loco.

Vires. Spiritus vim habet, incidendi, attenuandi, resoluendi, discutiendi.

Hinc reserat obstructions viscerum, purgatque per sudorem ac urinam, ideoque vtiliter adhibetur in Hydropè, Tympanitide, Arthritide, Paralyfi, Scorbuto, lue venerea, impetiginibus, scabiè, contractura artuum (ex materia flatulenta & humoral. fluida, non ☿ ca coagulata & fixa.

Dosis à ℥j ad ℥ij.

Oleum intrinsecus adhibitum prodesse creditur aduersus dolorem colicum, suffocationem vterinam, &c.

Dosis gr. iij. iij.

Extrinsècus, admisceri potest vnguentis contra scabiem communem vel luis venereæ, &c. Vide Crollium, Sennert. in Institut. Salam. in Tartarologia.

N. Spiritum ☿ ex musto parat Forsterus p. 1000. de morb. ☿ reis, collectis scil. crystallis euaporatione lentâ in quibus spiritum ☿ i primaterialem remanere credit.

2. Spiritus Tartari compositus.

℞. ☿ purum, destilla vt moris, prodeatque phlegma spiritus ac oleum. Ex capite mortuo extrahe ☿ quod solutionibus ac coagulationibus purificatum coniunge cum phlegmate spiritu ac oleo: Hinc digere in MB vase clauso, donec ☿ rotus solutus sit, cum hoc liquore impasta argillam siccam formaque globulos & destilla ex Retorta, igne nudo (vt destillatur spiritus ☿ i,) prodibit cum spiritu & oleo, Sal totus spiritualiter in posterum à spiritu ☿ i inseparabilis: Oleum fetens separa à spiritu, vt moris.

Vires. Penetrantior & efficacior est priori.

3. Spiritus ☿ i ☿ latus seu spiritus. LLL 2 ☿ i

¶ *aperitiuus compositus.*

℞. Spir. ¶i (simplicis) lbj. ℥iij.
Misce & affunde colchotari: digere in
MB (℥ 8.) ac destilla per Retort.
adhibitis ignis gradibus omnibus.
Totum deinceps quod prodiit funde
super caput mortuum nigrum ¶i,
ex quo nimirum spiritus ille simplex
est prolectus. Digere ℞ 24. Tincturam
decanta, residuum calcica ad albedi-
nem, atque ex eodem extrahe Salcum
Tinctura illa decantata, in calido S.
(hor. 24.) relinquendo: Δm hanc per
filtrum purifica.

Vires. Exhibetur magno cum succes-
su ad contumaces obstructions viscerum,
ad fædos colores, febres diurnas,
Hydropem.

Dosis à ℥j. ad ℥ij. in aquis appro-
priatis.

Spiritus ¶ Philosophicus ad aurum
potabile, S. Closs.

Reuerberetur Sal ¶ super testâ
probatoriâ (in einer flachen Scherben,)
absque fusione tamen, per horas 24.
ita caruleum euadet sal, affunde X
quousque non tumultuet amplius, &
X 3. digitos super materiam emine-
at, digere, tingetur X saturato rubore
filtra & coagula. Hoc quater cum no-
uo X repete. Permixtis his 4. salibus
V rectif. suffunde & tincturam extra-
he tories, dum colotari desinat, salere-
stantem solue iterum in X iterum-
que cum V attrahe tincturam. Iam
omnes V tinctos, & in vnum colle-
ctos ℞a per MB in cucurb. cui
X infundibulo instructo imponatur,
extillatum V re affunde per infund.
fali tincto & cohoba totiens (24. vici-
bus ad minus) donec videas guttas
rubentes decidere, tum cessa. & liquo-
rem ex ℞a per Nleniter ℞a, ita tran-

sibit spiritus salis ¶, nebulosis cum
guttis rubris, superstite infundo
Qpulu. rubro. Illo vttere ad extractio-
nem O is.

Vires. In obstructione mesenterij, &
arthritide, dantur gutt. 4. 6. in vno, in
retentione mensium, si desis ter aut
quater iteretur, certo fluent menses.

III. SALIFICATIO vnde
1. Sal Tartari.

Sal Tartari elixiuatur ex ¶o ad al-
bedinem calcinato, (i.e. combusto,) non
secus ac ex aliis cineribus Sal extrahi
solet.

N. 1. Ex capite mortuo in destillatio-
ne spiritus residuo, itidem Sal elixiuari
potest, si ulterius comburatur. Prompte
enim ignem concipit, atque etiam extra
ignem comburi potest.

N. 2. Communiter calcinatur ¶ in
fornace figulina.

2. Ol. Tart. p. d.

Pone ¶ calcinatum in cella ad li-
quescendum, vel dissoluet tartarum cal-
cinatum in V communi, filtra & coa-
gula.

Vires. Optimum est remedium in
serpiginibus, ulceribus, tinea, scabie, &c.

N. Est porro huius olei eligans vsus
in Extractis vegetabilium purgantium
consciendis. Eius enim gutta aliquot
cum menstruo mixta, tum extractio-
nem faciunt, tum catharsin ipsam
promouent.

3. Magisterium ¶i seu S ¶i
alcoholisatus.

Impregna S ¶ cum Sale vola-
tili Vini, v.g. Salis ¶ purissimi, q.
v. affunde V ad eminent. digit. 1. dige-
re ac destilla lenissimo calore, iterum-
que V affunde, idque repete tories,
donec Sal ¶ totam spirituofam Vini
substantiam, seu omne sal volatile Vi-
ni

ni imbibet, quod ubi factum, sublima, habebisque sal vini sublimatione ab omni phlegmate & aquositate separatum. Sennert. in Institut.

4. Magisterium ☉ i purgans.

℞. ☉ i, q. v. imprægna aceto optimo, donec nihil amplius aciditatis retinere velit (vide correctionem flor. ☉ ij. Crollianam l. 3.) dein affunde V, eumque abstrahere aliquoties cohobando: tandem reponere ☉ ad liquefcendum & habebis oleum rubrum.

Vires. Purgat per inferiora, utile in omnibus morbis deploratis.

Dosis à gr. v. ad ℞.

N. Sal illud ☉ sufficiens im-prægnatum si in ☉ destill. (e. g. Borriginis) solutum atque s. a. crystallisatum sit, conueniens medicamentum euadit in morbis ☉ reus.

5. Tinctura seu ☉ i ☉ i.

℞. Sal ☉ optime purificatum, calcina igne violentiss. ad cæcilitatem: dein affunde V, extrahe rubedinem s. a. decanta, abstrahere ad consistentiam olei. Sic habes Tincturam ☉, quam si placet exaltare, digere aliquamdiu cum V recenti ad emin. dig. i. affuso.

N. 1. Sunt qui ex ☉ cum ☉ an. calcinato, Tincturam hanc extrahunt, sed prauales modus prior.

N. 2. Maxima pars ☉. decedit.

Vires. Vinam largiter ciet, confertque in Melancholia hypochondriaca, Scorbuto, Hydrope, aliisque Mesenterij ac Lienis morbis & obstructionibus.

Dosis gutt. aliquot 4. 5. 6. 7. 8.

6. Tartarus ☉ latus.

℞. Ol ☉ purissimi per deliq. ☉ iij. affunde guttatim Spir. ☉ ☉ ij. vel q. l. donec strepitus cesset, idque in vitro capaci sic fiet coagulum: sed data ebullitione euaporare sine humidita-

tem lento calore ad siccitatem.

Vires. Digestiuū est præstantissimū, Tartarum in corpore humano efficacissimè resoluens. Hinc utilissimè exhibetur in obstructionibus viscerum, venarum mesaraicarum, in omnibus febribus, præcipue in quartana, in obstructionibus mensium.

Dosis à ℞. ad ℞j. in conuenienti liquore, conuenientissimè autem propter saporis emendationem offertur in Hydromelite.

N. Eodem modo fieri quoque poterunt salia vegetabilium ☉ lata. Sic sal (e. g. absinthij) depuratum solue in ☉ absinthij, instilla spiritum ☉ li, procedeque, vt cum ☉ ☉ lato.

Tartarus ☉ lat. aiū.

℞. Magisterium Tart. purgans ad siccitatem euaporatum, affunde guttatim ☉ um ☉ li, donec strepitus omnino cesset, abstrahere phlegma in ☉ coagulum superstes reuertera per triduum, ita tamen vt sal non fundatur, sed in continuo isto calore velut fixetur. Vocatur à Parac. lib. 7. Archidox. specifi-cum purgatiuum.

Vires. Purgat benignè per inferiora, & sudores mouet in peste, scorbuto, hydrope.

Dos. ℞. in syr. de ros. de rhamno, &c. Excommunicatione S. Closs.

7. Tart. ☉ latus crystallisatus.

℞. Crem. Tart. ☉ iij. spir. ☉ ☉ ij. digerendo soluantur. Hinc affunde ☉ calid. vt penitus solutio fiat, abstrahere aliquantulum, & reponere ad crystallisandum.

8. Sal ☉ volatilifatum.

℞. ☉ Tartari purificat. q. v. affunde V rectificatiss. ☉ a ex ☉ per ☉ cohobando aliquoties (3) & adhærescet ☉ ☉ lateribus ☉ bici.

LLll 3 N. S.

N. Si per **MB** & aueris, non sublimabitur, sed exhibebit. Menstruum corallii solvendis idoneum.

Vires. Insigne est lithontripticum.

Dosis gr. v. vj. &c.

9. Liquor Tartari splenicus.

℞. Tartari ℥ij. ℞. (al. ℥ij.) Misc. exacte, imponeq; mortario, tartagini vel laminae ferreae ignitae vt calcinentur: Hinc pulveris ac affunde aquae feruentis ℥iij. digere in loco calido ☉ (6) quotidie agitando, postea colentur, vt omnis faldedo insit aquae. Huic aquae impragnatae tandem adde Tartari el. ℥ij. digerantur, ☉ (8) filtrenturque pro vsu.

Vires. Insigne est de oppilatiuum Lienis, aliarumque tartarearum obstructionum, mesenterium maxime infestantiū, adeoq; utile in hypochondriaca, scorbuticaque affectione ac mensum obstructione.

Dosis cochl. s. ad 1. cum aliis appropriatis vehiculis.

Terebinthina.

Vide Resina.

CCCCIX. Thus.

Alcas ☉, Dioscoridis, *Alkaxaton*, Olibanum, Arab. Louan. Conder. German, *VVebranch*. Resina est duriuscula, pellucida, profluens ex arbore Arabica Louan. Arab. dicta. Vide Thus, Matth. Cord. hist. Cas. Louan. & Conder, *Gar?*. C. B. 7. (inter gummata.)

Genera Thusis traduntur duo, masculinum scil. quod proprie Olibanum dicitur, seu Melax. (Arab. Melafon.) & femininum.

Masculinum ex albo hauescit, suapte natura rotundum est, guttarum formam referens, candidum intrus & pingue.

Fœmininum, resinofum magis est, ac molle, cito ardens, flauum.

Præfertur masculinum, vt quod ex arboribus montanis colligitur.

Vires. Calfac. 2. sicc. 1. substringit. Vfus præcipui intrinsecus ad varios capitis & pectoris affectus, vt & ad alui, vterique profluvia, ad tussim, (deglutitur vesperi frustatim,) vomitum, sanguinis excretionem, diarrhaam, dysenteriam mitigandam. Extrinsecus inservit sufficibus pro capite roborando, catarrhos discutit, cana ulcera carne replet, & ad cicatricem perducit, cruenta vulnera cephalica inprimis glutinat, pernioles (cum suillo adipe aut anserino) sanat, ulcera cacoethæ, tum sedis, tum reliquarum partium demulcet, (tritum cum lacte in lenimentum:) oculorum rubedini ac lippitudini medetur, (scil. ☉ Rosarum multiplici extinctione Thusis impragnata, lactique muliebri postmodum commixta, pro collyrio liquido verrucas incipientes & impetigines abigit, cum pice & aceto impostum.)

Cortex Thusis in Officinis corticosum illud vocatur, quod Thymiana supra appellauimus Cortex hic præfertur crassius, pinguis, odoratus recens, lauis minimè scaber. Vide supra.

Manna Thusis sunt micæ, fragmenta, (pollen ac farina) Thusis, quæ ex collisione, dum in faccis vehitur, colliguntur.

PREPAR.

1. Liquor. Fit in albumine oui cocti, summeque prædest ad maculas abstergendas, cavitatesque cicatricum explanandas.

2. El. Dioisbanum. Vide Disp.

CCCCX. *Tragacanth.*

Tragacanthum, Tragacantha, corrupte Tragaganthum, vel Dragaganthum, *Tragant.* Est gummi fruticis eiusdem nominis pellucidum, album subdulce, leue ac syncerum, in granis plerunque fragmentisue contortis.

N. ∇ calida soluitur, mucilaginemque exhibet aliis Medicamentorum formulis, e.g. trochiscis formandis conuenientem.

Dicitur Spina hirci, Arab. Chitinæ. Germ. *Bocksdorn.*

Exudat hoc gummi radice incisa, vel ut alii volunt sponte sua.

Præstat pellucens, gracilis, leuis, syncera & subdulcis.

Vires. Refrig. 2. (aliis temperata est) hum. 1. (aliis siccatur.) lenit, cutis spiracula obstruit, acrimoniam mitigat, incrasstat, vsus præcip. ad tussim inueteratam, ad fauces exasperatas, reuersas voces, ceterasque destillationes, (cum melle inde fit linctus, subditurue lingua, ut liquefcatur,) contra renum dolorem & vesicæ rosiones, (in passo vel brodio,) in dysenteria. Extrinsecus ad dysenteriam (in clysteribus,) ad rubedinem & acres destillationes oculorum (soluta in ∇ rosar. vel lacte,) ad palpebrarum scabritiem.

Dosis ℥j.

N. *Tragacantha* quo uetustior, eò calidior.

PRÆPARAT.

Spec. Diatragacanth. calida } Vide
Diatragacant. frigida } Disp.

CCCCXI. *Tubera Ceruina.*

Fungus Ceruinus, Ceruiboletus, *Math. Cam. Lon. Tab. Cord. in D. C. B. 2. German. Hirschbrunnst, Hirsch-*

schvamm.

Crescit in syluis, ut vulgo creditur ex libidine ceruorum, quippe nonnunquam formâ genitalis ceruini reperitur. Verum testibus Lonicero & Cordo, nec iis denegatur locis, ad quæ nec cerui, nec Damæ vnquam preuenerint. Inhiat autem iis Cerui ob odorem fortem, quo delectantur.

Vires. Rari vsus est, nec adhibetur, nisi quod nonnulli ad libidinis stimulum, lactisque incrementum id commendant, cui Lonicerus contradicit, qui e contra naturæ frigida & humida statuit, adeoque ad stimulum inepte. Extrinsecus commendatur ad uterinas ascensiones compefcendas.

N. His subiungi poterit & Fungus Chirurgorum, uidelicet Fungus orbicularis, ouatus, puluerulentus. Crepitus Lupi, Germ. *Bubenst. Veiberst, VVolffst, Pofst.* Videatur *Lon. Tab. Cast. Dod. Matth. Cam.*

Huius vires sunt adstringere, siccare, adeoque puluis eius ad intertiginas, & abrasa non inutiliter adhibetur. Chirurgi fructum imponunt sectæ venæ ad sistendum, sanguinem vulnusque solidandum.

CCCCXII. *De Vino.*

Anatomia Vini.

Vinum est succus vitis, fermentatione exaltatus.

Dicitur *Paracelso*, Sanguis Terræ, *Querc.* Omnium vegetabilium Princeps, & maxime vitriolatum.

Eligatur generosû, beneque maturum.

PRÆPARATA VINI SUNT
varia, pro diuersis scil. partibus. variantia.

Nimirum.

Vini

Vini partes sunt:

1. Essentia subtilissima, incorruptibilis, vulgo ∇ vitæ, ∇ ardens, ∇ , Δ Cœleste, Δ Bezoardicum vegetabile, menstruum cœleste, ∇ cœlica, Lullij cœlum, clavis philosophorum, corpus æthereum ex Δ & ∇ constans, Balsamus volatilis liquoris catholici. 2. Magna copia ∇ insipidæ corruptibilis. 3. Hanc sequitur Ω quidam fumidus, qui nihil aliud est, quam Θ vini volatile crassius, in forma fumi ascendens. 4. Huic mox subiungitur \circ quoddam vere pingue & vinctuosum combustibile, sed paucum. 5. Ex \circ extrahitur Θ quoddam cotrosium. 6. Post extractionem Θ is relinquitur ∇ limosa inutilis. *Sala in Anatomia*
 \circ ij.

Hinc 1. ∇ s. ∇ vita. Q.E.

Vini.

\Re . Vinum generosum, \mathcal{H} etur per vesicam, donec pars optima \mathcal{H} arit, (quod gustu facile cognoscitur,) destillarum rectificetur aliquoties per B. M. abstrahaturque saltem pars dimidia, tertia aut quarta, ut nihil humiditatis relinquat combustibilis.

N. 1. Rectificatio feliciter peragitur. 1. Si in rectificatione orificium cucurbita charta subtili triplici vel quadruplici, vel panno spissiori tegatur, quippe hac ratione penetrat solum pars spirituosior, aquosior in cucurbitam relabente. 2. Si rectificatio ex cucurbita colli longi, vel per phiolam serpentinamue perficiatur.

N. 2. Nonnulli obstruunt cucurbita vel phiola orificium, spōgia oleo imbuta, qua ratione solus Ω transit, ∇ in spongia remanente. Senn. Instit. Libau. in Alchym. Verum nemini suasero hunc modum, inficitur enim ab oleo ascendente ipse ∇ .

N. 3. Eodem modo paratur & ∇ ex fecibus vini, ut & ex siliquis vuarum, ex quibus vinum fuit expressum. Kessl. 1. cap. 70.

2. Aliter ∇ , subtiliss.

\Re . Vini generos. q. v. digere (14.) \mathcal{H} in fimo, vel alio lenissimocalore, postea per phiolam destilla, destillatumque aliquoties per eandem phiolam rectifica, donec ad summam subtilitatem pervenerit.

\Re . Huius Ω lbij. misce cum recentis vini lb. vj. destilla iterum per Θ m, ac prolice saltem lb. ij. affunde iterum recentis vini lb. vj. ac destilla denovo, ut dictum, idque repete septies vel plures ad lb. ij. colligendas.

N. Hic Ω adeo subtilis ac fugax est, ut guttatem \mathcal{H} ando ne ∇ m quidem attingere possit, quin in auram evanescat. Tentzel. Glückrath. in Bequin. l. 3. c. 2.

Vires. ∇ calidus est & siccus, penetrantissimus, incorruptibilis, resistit putredini, refocillat apoplecticos, comate oppressos, &c. Extrinsecus resolvit tumores, frigidus ac scirrhusos, arcet coagulationem sanguinis in contusionibus, cruoremque resolvit ac discutit.

N. Sunt qui ∇ circulatum ac toties destillatum, ut in oleaginosam abeat consistentiam, Circulatum Paracelsi autumant, sed malè Alij ∇ cum proprio sale, interuenientibus tamen digestionibus aliquoties destillant, ut sal tandem cum ∇ per Alembicum transferatur, vocantque Circulatum Maius. Libau. tract. de Igne Naturæ. Verum fallunt & falluntur.

3. Spiritus Vini alcalisatus.

\Re . Vini generosi Hispanici vel Hungarici, q. v. elice spiritum ac phlegma: separa eadem ab invicem: ex fecibus.

cibus calcinatis cum phlegmate extrahe Θ , idque per crystallisationem purifica, in spiritu solue Θ & habes ∇ alcalifatam.

4. Spiritus Vini acuatius Tart. seu Spir. Vini Tartarificatus.

℞. ∇ lb. ij. Tart. alb. crudi puriss. grossè contusi ζ j. destilla in balneo pleno scobe ligni ferrati, madefacta lenissimo ∇ ut ad quartum ferè pulsum guttula cadat: quando phlegma stillare inceperit, cessa, vel si phlegma quoque prodierit rectifica.

N. 1. Si subtilior adhuc exoptatur, denno ad huius lbj addatur Tartari ζ j. destilleturque ut ante. Sennert. in Instit. Tentzel. in Exeg.

N. 2. Ad cognoscendum, utrum spiritus prodeant nec ne, obseruentur strie, quippe quo spissioribus striis \times bicus referius fuerit, eo uberior semper spirituum fit, enaporatio & e contra.

N. 3. Oleum, quo lentahac destillatione peracta, guttis quibusdam enatare videbitur (quamuis vina in hoc valde inter se discrepent) vera vini essentia estimatur. Tentzel.

5. Aliis ∇ Tartarificatus sine ∇ Tartara calisatus.

Hic spiritus si super eundem Tartarum per Retortam cum cohobis rectificatur & in fine (phlegmate intermedio abiecto) fortiori igne vrgetur, spiritus vini Tartarificatus acquiritur. Sennert. Instit.

6. Spiritus Vini Tartarificatus seu ∇ philosophica.

℞. Tartarum in præcedenti spiritus Tartarificati præparatione post cohobia relictum (vel & Tartarum recentem) calcina ad viriditatem (cæruleitatem,) dein affunde spiritum illum Vini Tartarificatum, destilla & tandem propelle

igne fortiori. Tentzel.

Vel: Ex Θ Tartari ad cæruleitatem calcinato extrahe essentiam digerendo cum ∇ , (∇ habeat aliquid phlegmatis, cuius beneficio sal arripit) destilla gradatim, ad ignem fortissimum subinde progrediendo.

Vires. Spiritus hic longe præstantissimus est ad Tincturas & Extracta omnium purgantium in genere elicienda, ad conservandas metallorum & vegetabilium, animaliumque facultates

In Θ perita arcanum est ad plurimos affectus, imprimis tartareos, & ubi sal fixum ex deficiente coctionis Θ abundat, ut in Scorbuto, Tartareo Hypochondrio, Asthmate, Cachexia Epatis aut reliquorum viscerum obstructionibus, conciliat insuper somnum cum essentia croci propinatus.

N. 1. Spiritus vini hoc modo rite præparatus, est Ros Iouis amphibij vegetabilis ad parandum illud Biolychnium Burgeraui. Eiusdem beneficio fit & perpetuum mobile & Θ criteriū. Hartman. in pract. Tentzel. in Exeg. Qui plura de ∇ facultatibus voluerit, consulat Lemmum, Euonymum, Gesnerum, Libanum, Medull. destill.

N. 2. Hic ∇ tartarificatus in spagyrica cochlea Hermet. Cl. circulatus, è mero spiritu euadit Balsamus, è fragrantior, è crystallino carbunculario, haud secus ac cor sanguinem Epatis, continente pulsum circulo, in auream vite Balsamicam, viuendamque spirituum vitalium naturam exaltat.

Vires & Dosis. Huius essentia gutta 3. vel 4. calidum natium in Eclampsin euocant. Cum Croci essentia somnum conciliant, restorationemque membrorum conantur.

7. Spiritus Vini microcosmicus, i. e.

M M m cum

cum sale vrina volatili acuat.

℞. Spiritus Vini subtiliss. ac **S**is
vrina ad summam puritatem deducti
(vide in vrina) añ. mixti ponantur in
locum frigidissimum. Hinc digerantur
per lentum calorem **B** in Phiola
H. Cl. spatio 20. vel 30. **℞** & con-
vertentur in liquorem, qui si luber
per **MB** semel ac iterum rectificetur.
*Bequin. l. 3. c. 2. Hartm. in pract. & in
Croll. Senn. in Instit.*

Vires. Menstruum est **⊙** potabilis
preparationi inserviens: poterit quoque
intrinsecus adhiberi, ad reserandas ob-
structiones viscerum, ut **⊕** extrinsecus
ad dolorem compescendum.

8. Spiritus Vini **D**-latus.

℞. Spiritus vini opt. & spir. **⊕** i
rectificati añ. **℥**ij. **M**. & destilla per
℞ in cinere, primo lento igne, dein
fortiori, ut simul alembicum transeant:
reitera destillationem vice tertia: po-
stmodum circula per mensem simul,
habebisque spiritum odore & sapore
sat gratum.

9. Quinta Essentia Vini.

℞. Vini generol. alb. vel rub. q. v.
Gla ex **MB** rectificando donec **V**
evadat quali igneus (sit rectificatio-
nibus sæpius iteratis scil. 12. &c.) Spi-
ritus hic indatur vitro, quod bono lu-
ro vel mastiche **℞**e & album, oui
optime claudatur. Hinc circuletur **B**
per mensem, Postmodum aperi sen-
sum & si mirum oleat saporem, assecu-
tus ex vini **V**. Essentiam; sin minus,
claudere denuo vitrum & reponere in **B**
donec dictum signum senseris, sapo-
rem sc. siue odorem *evadat.*

N. Acquiritur scopus beneficio salis
proprij. Popp. in Hodoget.

Vires. Balsamus est efficacissimus,
nostroque balsamo naturali roborando

convenientissimus. Insuper antidotus est
certissima aduersus pestem intra 6. ho-
ris sanandam, si in primo illius insultu
gutta xij. exhibeantur ad mouendos su-
dores, Epilepticum paroxysmum an-
hilat eadem dosi fetum mortuum expel-
lit, in partu difficili illico, & ad miracu-
lum usque operatur si cochleare inte-
grum illius exhibeatur.

10. Aliud opus vegetabile ex commu-
nicatione **S**. Closs.

Cohaba **℞** super sal **♀** proprium
tantisper, donec tam acidum egredia-
tur, ac fuerat affusum, cumque suffici-
enter **♂**ibus suis acidis fuerit impræ-
gnatum. **℞**. Illius **℥**vj. **V** 7es. super sal
♀ proprium rectificati **℥**j Digere per
mensem **Δ** lampadis, vsque dum cor-
pus, suam receperit animam, imbibatur
rursus eadem quantitate olei ætherei
& desiccet per quindenam, his im-
bibitionibus ad sufficientiam fa-
ctis, detur **Δ** **♂**is, eleuabitur Sal can-
didissimum, relictis terreis aliquot
impuritatibus. Sublimatum reconde
in aliâ phialâ **H. C.** & **Δ** eodem
lampadis decoque ad albenimem vs-
que perfectam. Quo viso imbibatur
fixissima hæc materia **♂**u æthereo
suo siue animâ, idque toties interce-
dente digestionem fixatiuâ iteretur, do-
nec in igneum ruborem eleuata fuerit,
summam corporis nostri medicinam.

11. Magisterium Vini s. Lapis vini
vegetabilis.

℞. Vini generosi Hispanic. vel Vn-
garic. q. v. putrescat 40. **℞** in fimo
equino. Hinc destilla in **MB**, & pro-
dibit spiritus, ac tandem oleum: hæc
separa ab inuicem, spiritumque de-
phlegma. Oleum denuo in fimo equi-
no **℞** 40. putrescat ac destilletur.
Ex remanentibus fecibus beneficio
phlegmatis

phlegmatis extrahatur sal volatilius sine calcinatione. Vtrumque coniunctim s.a. purifica. Postea imprægna sal spiritu suo ac digere: hinc adde & oleum, digereque donec coloristandem rubei pulverem nanciscaris.

Vires. Grana (vel gutta aliquot, si maior liquidius) integra mensuram aqua vinosis qualitatibus per fundunt.

12. Menstruum Basilij Valentini, Aqua temperata, Temperatum Extractivum.

3. Spiritus vini subtiliss. q. v. eumque cum spir. ☉ digere ac terna destillatione per alembicum, vni. Sic dulcescit, acrimoniamque amittit. Vide spir. ☉ dulcem.

Vires. Soluit ☉ non radicaliter, sed tincturam eius extrahendo. Vide de ☉ Basil. in repetit. magni lapidis veterum. Senn. Instit.

N. 1. Alij ꝛ. V optimum, eumque cohobant multies (12.) supra ☉, ut essentiam ☉is secum euehat. Huic V essentiã ☉is imprægnato affundunt tantundem spir. ☉i rectific. digeruntque.

N. 2. Tenzelius ꝛ. V rectific. q. s. superfundit Sali Tartari philosophico ad emin. 3. digit. digeritque in Phiola longiss. colli aliquamdiu l. calore: postmodum destillat.

13. Sal. Tart. philosophorum.

ꝛ. Sal ex Cineribus Sarmentor. Extractum. reuerberetur Δ aperto (hor. circiter 3.) donec albescat. Dein solue in Δ & separa feces filtrando & coagulando. Sic habes Sal Tartari philosophorum. Tenzel. in Exeg. de ☉ potabili.

14. Cinis clauellatus.

ꝛ. ☉ ex destillatione fecum residuum, combure & elixiua.

C L A S S I S III.

De Purgantibus primariis.

CCCCXIII. Agaricum.

Agaricus s. Agaricum fungus est albicans trunco laticis adnatus. Vid. Brunf. Matth. Dod. Cord. in D. Lob. Cast. Tab. Ger. Cam. Lon. Porta. Bellon. Germ. Lerchenschvamm.

Estq; Diosc. 5 Mas, hic reprobatur.

☉ Plin. 2 Fœmina, hæc præfertur.

Mas rotundus est, & vndique sibi similis (Plinio) crispior amariorque. Fœmina rectas intus habet pectinum modo venas, & q. diuisuras (Plinio.) Fœmina solentior est; initio dulcis mox in amaritudinem transit.

Eligatur itaque Agaricus albus, leuis, valde rarus, velociter friabilis, sapore primum dulcis, mox amarus & stypticus. Reprobatur lignosus, longus, durus ac grauis.

N. 1. Pars exterior præstat interiori

N. 2. Multos in annos durabilis est, sine virium iactura.

N. 3. Adnascitur itidem Fungus Abieti, Pice sylu. Teda & Larici, sed solum Larignus intra corpus sumitur.

Vires. Pituitam educit tenuem aquosam, serosam & viscosam totius corporis, & imprimis excrementa mesenterij, tum capitis ac pulmonum. Urinam

MMmm 2- ciet

clet ac menses, calf. 1. sicc. 2.

N. 1. Quia ventriculo nauseabundus est, corrigitur stomachis, e. g. Zinzib. garyophyll. Spica Celtica, &c.

N. 2. Quia tardè operari solet, additur stimulus ex sale gemma, crystallis ♀ & similib.

Dosis à ℥j. ad ℥ij. In infusione à ℥ij. ad ℥v.

PREPAR.

1. Extractum Agarici.

℞. Agarici, q. v. Extrahe cum V. & cc. August.

N. Sala adhibet Agaric. Trochiscarum, extrahiturque cum V.

Alij aquam adhibuisse malunt, ac præ aliis aquam Anisi vel Cinamomi in qua Agaricum macerant (hor. 24.) exprimunt ac inspissant. Verum enimvero quia Agaricus nonnihil resinosi quoque in se continet, præstat V adhibere.

Dosis à ℥j. ad ℥ss. vel ℥ij.

2. Agaricus Trochiscatus.

℞. Agaric. limat. cum vino in quo maceratum Zinzib. additoque tantillo Tragacanth. vel Gummi Arab. F. Trochisci.

3. Trochisci de Agarico.

℞. Agar. lim. ℥ij. ℥, ℥ss. Zinzib. ℥ij. cum Oxymell. q. l. F. Trochif. V. D.

4. Pilula de Agarico. V. D.

Dosis à ℥ss. ad ℥ss.

5. Pilula Hiera cum Agarico.

V. Disp.

Dosis à ℥j. ad ℥ij.

CCCCXIII. Asarum.

Asarum, Diosc. Asarum, Brunf. Trag. Matth. Fuchf. Dod. Cord. in D. & hist. Lon. Cast. Tabi Ger. Cam. C. B. 1. Asarum baccaris seu baccatus, Lob. aliis. vul-

go, Haselwurtz.

Solo gaudet montano opaco, Viciniaque corylorum. Viter perpetuo, noua folia tamen vna cum floribus vere promit.

OFFICIN. NAT.

Radix colligitur vere, & folia.

Vires. Crassam pituitiam, bilemque utrumque per vomitum ac nonnunquam per secessum violenter expurgat. Calf. & sicc. 3. diureticum est, ac emmenagogum insigne. Epar, Lienem, vesicamque fellis aperit. Hinc utile in arthritide, hydrope, febribus præcipue tertiana & quartana, in ictero, &c.

Dosis Rad. à ℥ss. ad ℥j. in substantia, à ℥j. ad ℥ij. in infuso.

Folia exhibentur. N. 6. 7. 8. 9. infusa, cocta & expressa.

PREPARATA.

1. Extractum alcalisatum quod venit nomine coaguli Asari. ℞. Rad. ac folia Asari, extrahe cum V ac filtra. Hinc adde sal ex incineratis fecibus elixiuatum, & ad ignem fusionis calcinatum, solitione ac inspillatione purificatum, abstrahetque Vini spiritum ad consistentiam mellis. Vide Sennert. in Instit. Harum. in Pract.

Dosis ℥j. ad ℥ij.

2. Diasarum Fernelij. Vid. lib. 2. cap. 51.

Dosis à ℥j. ad ℥ss.

B.

CCCCXIV. Bryonia.

Κυπριος λευκος, Dioscor. Bryonia, Trag. Lon. Tab. Cam. alba, Dod. Ger. Vitis alba, Matth. Fuchf. Cord. in D. Lob. Cast. C. B. 1. German. Zaunrübe, Schmeppwurtz, Stäckwurtz, Scheißwurtz.

Est baccis rubris & nigris, utraque
usualis, præfertur tamen prior.

Crescit in dumetis: Floret Maio.

OFFICIN. NAT.

Radix collecta verno tempore.

Vires. Purgat validè serosos & pituitosos humores. Splenetica & Iecoraria est, utpote quorum obstructiones aperit. Calfac. & sic. 2. Hydropicorum aquas per vomitum ac secessum educit, menses ciet, fatum eiicit, suffocationes uteri arcet, asthmata sanat, podagricis conuenit (intus & extus.)

Dosis in substantia ab ℥j. in Infuso ad ℥ss. vel ultra.

Extrinsecus confert Hydropi, abdomini emplastrata cum sterc. caprillo, quin & quartanam curare dicitur artetis temporum & brachiorum affixa.

PRÆPAR.

1. Ferula Bryonia. Videl. 2.

Vires. Verina est, menses ciet, sed non citra nauis. am.

Dosis ad ℥j.

2. Nectar succosum S. Cloff.

Firax ℥j. succi bryon. per expressio-
nem facti, & ℥j. ol. ☉ vel ☽ M. Dos.
℥j. in vino albo.

N. Purgat aliquando per vomitum,
aluum & vrinam.

3. Unguentum Agrippa. V.D.

CCCCXV. *Carthamus.*

Krino, Dioscor. Kv. ☉, Plinij, Arab.
Karten. Cnicus, Math. Dod. Lob. Cast.
vulgaris. Clus. hist. satius, Cord. in D. &
hist. Lob. Cnicus urbana & satius, Theo-
phr. & Plinij. Carthamus, Brunf. Trag.
Fuchs. Lon. flore Crocco. Cam. Cnicus
satius seu Carthamus officinar. C. B.
1. alius, Crocus syluestris, Cnicus,
Germ. wild Saffran.

N. Floribus est croceis, variis albidis
illorum admistione adulterant Crocum

Colitur in hortis Italiae, Gallie.

Floret Iulio & Augusto.

OFFICIN. NAT.

Semen.

Vires. Semen pituitam viscosam ac
aquas vomitu ac deiectione purgat: con-
fert maximè pectori: Calf. & sic. 1. Sto-
macho aduersatur, ideoque corrigitur
stomachicis, anis. galang. Zinzib. &c.

Dosis in substantia à ℥j ad ℥ij. ℞.
(sed raro ita exhibetur ob viscosita-
tem) in infuso à ℥ij. ad vj. vel. ultra.

PRÆPAR.

1. Extract. Diacartham. f. Cnico-
pharmacum. Vide D. A.

Dosis à ℥ss. ad ℥ij.

2. Syrupus de Carthamo. V. D. Dosis
ab ℥j. ad ℥ij.

3. Electuar. Diacartham. Dos. ℥j.

4. Species Diacartham. Dos. ℥j.

CCCCXVI. *Cassia.*

Cassia, (Cassia) fistula, Arab. & Al-
pin. Cassia nigra, Alvario, Dod. Cord.
in D. Cast. Fragos. Tab. Ger. Cass. laxati-
ua, Lon. Cass. solutiua, Bell. Monard.
Garz. Siliqua aut Cassia purgatrix Ara-
bum, Lob. Cass. Ægyptia l. purgans,
Cam. alius. Canna fistula, Siliqua Indica
Cass. solutiua seu Ægyptia, siliqua,
Math. Cass. F. Alexandrina, C. B. 1.

N. Aduchi cepit & ex Brasilia, Cas-
sia purgatrix, cuius ℥j. plus purgat quam
℥ij. Cassia illius Ægyptiaca.

Cassia Arbor procera est, instar iu-
glandis ferens siliquas seu cannas lon-
gas, rotundas, exterius lignosas, intus
feminibus ac medulla prægnantes.

OFFICIN. NAT.

Siliqua f. Cannæ medullam inclu-
MMma 3 dentes

dentes. Hæ eligendæ ponderosæ, recentes, plenæ, quæque minime commotis intus seminibus resonent, splendentes, foris etiam ac in pulpa pingues.

Vires medullæ. Aluum lenit, clementerque sine torminibus feces educit, caliditate ac frigiditate temperata (Fernel. cal. j.) cetera humidior, unde nec humido ventriculo nec hypochondriacis ac flatulentis nisi stomachicis & carminatiuis, (E.g. Cinam. Mastich. sem. anis.) correctæ convenit. Potio eius grata correctæ convenit. Potio eius grata est pleuriticis.

P R Æ P A R.

1. *Cassia flos* (pulpa Cassiæ. Cassiæ extracta. Fit traiectione medullæ exemptæ per cribrum.

N. Vapor aquæ cribro subditur, ut medulla in cribro agitata, eò facilius transeat: debet autem fieri extractio actutum quando usus postulaverit, acciscit quippe pulpa cum tempore.

Dosis. Infantibus ad ℥iβ, adultis ad ℥iβ, in clysteribus ad ℥ij.

2. *Cassia extracta seu Cassiæ extracta communis* siue pro clysterio. Fit pulpam cum decocto, herbar. mollientium & melle ad consistentiam Electuarii coquendo. Vide Disp.

3. *Elect. Diacassia cum Manna*. Electuarium est & paratum ex pulp. Cassiæ, p. vj. Tamarind. j. Mannæ ij. Sacchar. Cand. j. Penid. j. Sacchar. Violar. iij. quæ suscipiuntur decocto prunor. & syrupo violar. V.D.

Dosis ab ℥j. ad ℥ij.

4. *Cassia Extracta sine foliis senæ*. Electuarium est ex pulp. Cass. ℥ij. Tamar. ℥j. sacchar. ℥ij. susceptis, decocto express. polypod. sem. cartha, herbar. pectoral. Vid. Disp.

5. *Cassia Extracta cum foliis senæ*. Fit ex prioris Electuarii p. xij. pulu. sen. p. j. Vide Disp.

3. *Extractum Cassi*, Vide Quercet. in Diet. & Ph. Rect.

Dosis ad ℥iβ.

7. *Aqua Cassiæ*. Fit ex pulpâ additis limon. paruis & ser. lect. q. f. Extrahitur aq. per B.M. dantur ℥vj. in nephrit. & inflammatione Renum.

8. *Syrupus de Cassi*. Describitur à Renod.

CCCCXVII. Cataputia minor.

Ααζοψι, Dioscor. Lathyris, Brunfels. Matth. Fuch. Dod. Cord. in D. Lob. Lon. Cam. Cast. Ger. Tab. Lathyris seu Cataputia minor, 2. Trag. Cataputia minor, Lob. Tab. Lathyris minor, C.B.

1. Granum regium minus, Mes. German. Springkærner.

Ratione ætatis, latiora vel angustiora folia habet, hinc apud Tab. Lathyris duplex, latifolia scil. & angustifolia, quæ promiscue vsuales.

N. Recensetur inter genera Tithymallorum, ut pote tota candido & lacteo succo turgens.

Colitur in hortis: Floret Iulio, fert femina Augusto.

OFFICIN. NAT.

Semen (s. grana) rarissime Folia.

Vires. Purgat cum violentia per vomitum ac secessum, humores inprimis serofos & biliosos, hinc phlegmaticos, calf. & sic. 3. Dosis à baccis vi. ad xij. Folia Num. 4. vel. 5. sed est rari usus. Extrinsicus vesicatorium exhibet & psilobrum, præcipue succus eius lacteus.

CCCCXVIII.

CCCCXVIII. *Colocynthis.*

Colocynthis, C. B. est } rotunda { maior.
} oblonga. { min. hæc vsualis
} pyriformis.
} pomiformis.

Dicitur *Κολοκύνθης* Dioscor. Colocynthis fructu rotundo minor, C. B. 2. *Femina, Tab. Coloc. fungosa & leuis, Cord. h. aliis cucurbita tyloestris, fructu rotundo minor, vulgo Colocynthis Sicyonia. Arab. Chandel, Handel & Handhal. Videatur & Colocynthis, Matth. Cord. in D. Lon. Lob. Dod. Cass. Cam. Ger. Vera, Trag. prima f. mas, Tab. Germ. Coloquintib.*

OFFICIN. NAT.

Fructus seu poma ac precipue medulla eius arida affertur autem ex Ægypto.

Vires. Pituitam crassam ac glutinosam ex profundioribus & remotioribus partibus expurgat, ut ex crebro, neruis, iuncturis, pulmonibus, unde cum commodo exhibetur Vertiginosis, Hamicranicis, Epilepticis, Apoplecticis, Scabie, Lueque Venerea afflictis. Calida est & secc. 3. verum ob vehementiam ac amarorem, & quia ventriculo ac intestinis noxia est, rarissime in substantia, & non nisi robustis, imo decenter correcta exhibetur. Corrigena illa sunt cuminum, tragacantha, mastiche, bdellium, & sim. cardiaca, hepatica, stomachica.

Dosis in substantia à gr. vij. ad ℥j. in clysteribus (in petia) ad ℥ss.

PRÆPARAT.

1. Trochisci alhandal. V. Disp.
2. Infusum Trochisc. alhand. Ω vite aureus Rulandi (nonnullis.)
3. Trochisc. Alhand. ℥ss. \forall Maluat. ℥v. vel ℥xij. Digere aliquandiu filtra & serua ad vsum.

Vires. Purgat per aluum absque periculo omnes humores viscosos, bilem vitramque ac serum si tertio quoque die mane propinetur.

Dosis à ℥ij. ad ℥j. vel ℥i℥. vel si placuerit inspissare ad consistentiam extracti, detur à ℥ss. ad ℥j.

3. Extract. Colocynth,

℞. Colocynth. pulpæ (reiectis seminibus) puluerisatæ, extrahie digerendo vase clauso cum \forall , aliquot septimanis (3) quo temporis spacio rotam acrimoniam amittet; filtra & si dulcius desideras, iterum digere, & dulcescet. Medicamentum euadēs optimum, ad pituitam & alios humores crassos à remotioribus partibus attrahendos, idque sine noxa. Corrigitur oleo Mastich. Nucist. Cinam. *VVecherus ex Querc.*

N. Sala. ℞. pulpæ coloc. sine semine q. pl. eamque subinde irrorando ∇ plantag. incidit, dein extrahit cum ∇ plantag. part. ij. \forall p. j. filtrat, defecat & inspissat ad consistentiam mellis.

Menstruum ex ∇ plantag. & \forall commiscet, ne quid ex parte resinosa ac viscosa, quibus Colocynthidem constare ait, intactum maneat.

Dosis à gr. iiii. ad. x. cum corrigentibus.

N. Præstat Extractum hoc cum aliis purgantibus miscere, ut illis stimulo sit quatu solum exhibere.

CCCCXIX. *Ebulus.*

De Ebulo actum est supra class. 1. Hoc loco ergo solum Ebuli partes purgationi interuenientes, perstringimus. Hæ sunt Cortex & Acin. s. seminula baccatum.

Vires. Ebuli cortices & seminula vim habent educendi ∇ m, conferunt igitur

igitur in Hydrope, Arthritide, caterisque morbis à sero natis.

N. Eliguntur cortices medij ac potissimum radices.

Semen Ebuli solutorium acquiritur hoc modo.

R. Baccar. Ebuli quantitatem magnam, exprime succum, (quem in Extractum redigere poteris ad normam datam l. 2. (acinulosque restantes à siliquis separa. aliquoties lauando, semperque quod supernatat reiiciendo, donec solos acinulos eosque puros natus fueris. Hos sicca ac serua pro usu.

N. 1. Dosis à ℥j. ad ℥ij. vel fiat emulso in dosi maiori. Sala.

N. 2. Ex hoc semine exprimitur quod ventri inunctum aluum laxare dicitur.

Aqua still. Sambuci aut Ebuli radicem, cuiusque ad ℥ij. sumpta per 30. dies, confert Hydropsi.

Arcanum Chamaeætes S. Closs.

Semina contusa pone in cucurb. affunde aqua limpida, agita materiam in calore remisso, donec in pulvem tenuem euadat, digere per 3. deinde cola torculari fortiter. Oleum mixtum erit cum aqua. Digere & quod supernatabit serua, in fundo habebis eiusdem sem. vnguentum.

Vires. Oleum hoc intrus sumptum purgat egregie pituitam si eius ℥b. cum far. amyli in corporetur, vel in iusculo exhibeatur. Extus podagra materiam influentem abigit, ingressam discutit durascentem emollit, in omnibus doloribus salutare est.

CCCCXX. Elleborus niger.

Vtitur non omnibus Ellebori ni-

gri speciebus, sed (monente Matthiolo. Helleboro nigro, flore roseo, C. B. 4. cui tamen alii substituunt Helleborum nigrum hertensem flore viridi. Alii eius loco cum successu vtuntur Elleboro nigro tenuifolio, Buphrthalmi flore, teste Bauhino in Matth. Germ. Schwartz. Miszvortz.

Prior insignitur Elleborum nigrum, Matth. (cui & Helleb. purpureo flore,) Cast. Cam. Helleborus niger, Lob. 2. Dod. verus. Ger. Veratrum nigrum, Dod. Legitimum, Clus. hist. Styriacum, Tab. C. B. 4.

Posterior nominatur Helleborus niger, Brunf. alter, Matth. 3. Dob. nostras, Cord. hist. Helleb. niger adulterinus domesticus. Trag. hortensis, Fuchf. Helleborastrum, Lob. Ger. Veratrum nigrum, Cord. in D. Clus. pan. & hist. Tab. C. B. 2.

Tertius dicitur Elleborus niger verus, Trag. Lon. Pseudo Elleborum, Matthioli. Buphrthalmum, Dod. Clus. Cam. Helleborine tenuifolia, Cord. h. Elleborastrum nigrum, Cam. Helleb. niger ferulaceus Theoph. Lob. Elleb. alterum, Cast. Hellebor. Hippocratis, Tab. C. B. 9.

Prior crescit copiose in Austria. Floret Ianuar.

OFFICIN. NAT.

Radix ac præcipue Cortex.

N. Colligendi tempus referunt (in aspectu felici cam ♀ aut ♂ existente sub ortu ☉, crescente ac peragrante signum Capricorni, Leonis aut Sagittarii. Heurnius.

Vires. Purgat potenter humores melancholicos, vrile per consequens medicamentum est, omnibus affectibus inde Originem trahentibus, qualis, Mania, insania, Hypochōdriaca, passio, Elephantiasis, Herpes, Cancer, Quartana, Vertigo,

tigo, Epilepsia, Apoplexia, Scabies. Sed cautè & non nisi robustis ob violentiam quam exercere aptius natu est, exhibere conducit. In decolto tamen minus periculi. Corrigitur mastiche, cinam. anis. fœnicul. & sim.

Dosis à ℥j. ad ℥ij. in infusione dant à ℥j. ad ℥ss.

P R E P A R.

1. Preparatio Ellebori officinarum.

Maceretur (reiecta medulla lignea) per ℥ 5. in Vino citonior. (alij in Maluatico) postea exiccerur. Aug.

Quercetano sufficit 24. hor. in + ros. macerasse. Ph. Rest. c. 26.

N. Alij radicem ita preparatam ulterius pomo cidonio infigunt, idque pacta panis obuolutum in clibano coquunt, postmodum radicem exemptam exiccant.

2. Preparatio Recentiorum.

℞. Rad. Elleb. nigr. pulueris. q. v. irro-raphlegmate \oplus i, & ad lenem calorem continuo lignea spatula agita, iterumque irrota & agita, donec fœtor omnis exhalarit, radicesque gratum odorem & colorem nigricantem acquifuerint.

Dosis ℥ss. ad ℥j. cum cortigentibus. Hartmann. in Croll. Sennert. Inst. Tent. ℞el.

N. 1. Alij irrigant aliquoties (3.) succo rosar. & in umbra exiccari sinunt, dantque ad gr. 10. vel. 12. imo ad ℥j.

N. 2. Non minoris virtutis sunt alia correctiones, quæ per macerationem radicum seu fibrarum helleb. teretum & minutularum ex Oriente allatarum sunt in lacte caprino, sero lactis, melitrato, & Oxymel. per tridium, veletiam modo sequenti.

3. Extractum Ellebori nigri.

℞. Cortic. rad. & fibrar. q. v. coque in

Vino albo generoso leni calore hor. 3. in fine Δ m augendo vt bulliant. Dein exprime, & coagula ad consistentiam Extracti.

Dosis à gr. x. ad xv. vel xx. cum ol. mastich. & sim.

N. Alij loco vini solâ aquâ pluuiali vtuntur, vt August. Alij aqua anisi, de qua oleum separatum, vt Heurnius in Meth. pract. vide & VVecker. vel aq. maior. aut Meliss. cum ol. \mathbb{F} per d. Hartm. in pract. alij \mathbb{V} , vt Beg. lib. 2. cap. 9.

4. Extractum Ellebori nigri Quercetani.

℞. Rad. & fibrar. (cum + rosar. præparat.) q. v. extrahe digerendo, cum succ. Limonior. part. 1. & succ. pomor. redolen. part. ij. (succ. prius sint bene depurati & clarificati, exprime. Fecibus affunde nouum succ. Rosar. pallidar. clarificatum, ac denuo digerendo extrahe colando & exprimendo. Vtramque Tincturam coniunctam digere in \mathbb{B} & defeca. Defecatam Tincturam l. Δ coagula ad formam extracti.

Dosis ad ℥j. cum stimulo aliquo vim ellebori vomitoriam obtundente, e. g. Extract. diagrid. & sim. Querc. in Pharm. rest. c. 26.

5. Aliud Quercet.

℞. Extr. elleb. nigr. (cum ∇ Anisi factum) affunde \mathbb{V} digerendo, extrahe, filtra, coagula. VVecker. ex Quercet.

N. Si viridem habueris Elleborum, extractum quoque parare poteris cum ∇ eius \mathbb{G} ata, ad modum in Esula extracto delineatum.

6. Extractum Elebori nigri Sala.

℞. Cort. ellebori nigri, ℥ss. ∇ borrag. ℥iij. \mathbb{V} ℥iij. digerendo extrahe, velle cl. decanta, ex fecib. combustis extrahe Sal, idque Tincturæ admisce, di-

NNnn gere

gere per ζ i. ac coagula. Dosis ad \mathfrak{z} ss. & \mathfrak{z} j.

7. *Extractum helleb. nigri* 8. *Cloff.*

Desicca fibras helleb. nigri flore purpureo in patellâ ferreâ, admoto subtrus Δ lento, quasi animus esset aliquid frigere, agita frequenter, ut vapor malignus, qui convulsionis causa est, inde exhalet, hoc facto tere radículas, & cum phlegmate \times tincturam extrahe, filtra & coagula.

Balsamus Elleboratus.

Herbas & rad. elleb. nigri munden- tur, conquassentur & ponantur in Vi- num molchatellinum rubr. mensur. 4. vase vitreo benè clauso per menses duos, postea exime & succum exprime, expressum filtra, filtratum pone super herbas & radices recentes añ. m. j. rol. rubr. m. v. garyoph. \mathfrak{z} vj. Ponantur ad di- gestionem per aliquot ζ , adde ∇ octavam partem, deinde exprimatur, ex- pressum seruetur. Tandem remanentiâ combure in cinerem, & s. a. salem præ- para, liquorem abstrahere in B.

\mathcal{L} . Salis præparati \mathfrak{z} ss.

Croci \mathfrak{z} j.

Ambar gris. \mathfrak{z} ij.

Mosch. \mathfrak{z} j.

Aloës epat \mathfrak{z} ss.

Spec. diambre.

Diagrid. añ. \mathfrak{z} j.

Ol. garyoph. \mathfrak{z} ss.

Soluatur extractum, deinde admi- sceantur hæ species, iterumque ad for- mam inspissentur, daturâ \mathfrak{z} j. ad \mathfrak{z} ss. & ultra. Ex communicatione Greg. Hor- stij habuit S. Cloff.

Syrupus Helleboratus Vlmensis.

\mathcal{R} . Myrobalan. omn. \mathfrak{z} iij ss. contun- dantur crassiori modo & fricentur manibus cum ol. amygd. Deinde in- fundantur per diem & noctem in aq.

fumar. lb. xij. Postea coque ad con- sumpt. tertiæ partis.

Adde cort. rad. helleb. nigri. præpar.

Glycyrrhiz, mund.

Polypod q. à. \mathfrak{z} j.

Sem. citr \mathfrak{z} ss.

Caryophyll. \mathfrak{z} ss.

Sum. fumar.

Fl. Cichor. mis.

Borrag.

Bugloss. añ. p. j.

Bulliant omnia ad remanentiam \mathfrak{z} v.

Postea adde. Fol. sen. el. \mathfrak{z} iij ss.

Epithym. cort. \mathfrak{z} ij.

Iterum bulliant, donec maneat \mathfrak{z} iij.

Addito sacch. \mathfrak{z} xxxij. coque ad consist.

Greg. Horst. in observ. lib. 1.

N. Syrup. Helleb. Quercetan. Vid. l. 2.

7. <i>Syrupus Elle- boratus</i> : In hoc continentur	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Cort. Elleb. } 3. \\ \text{Rhabarb. } 8. \\ \text{Fol. Senæ. } 16. \\ \text{Polypod. } 16. \\ \text{Helleb. alb. } 3. \end{array} \right.$	} partes.

Fit ex foliis helleborastri mense Se- ptembi vel Octobri collectis, (\mathcal{Q} à de- crescente, quæ in umbrâ perse exiccanda, vel in pane siliginoso.

Dos. à \mathfrak{z} ss. ad \mathfrak{z} j. in vino albo.

CCCCXX. *Elleborus albus.*

Elleborus albus flore subviri- di. C. B. 1. Ellebor. alb. Brunf. Trag. Fuchf. Cord. hist. Lon. Cam. Clus. hist. Helleborum album, Matth. Lob. Caji. Veratrum album, Cord. in D. mas

&

& foemina, Tab. Germ. vveiß Ni-
est(vvurtz.

OFFICIN. NAT.

Radix.

Vires. Ob violentiam purgationis,
quam per superiora & inferiora exer-
cet usum purgandi internum soli ferè
Elleboronigro linquit. Ingressitur tamen
cuius basis vomitorium Conradinum.
Extrinfecus sternutationes mouet, sca-
bies, imperigines & serpigines mundifi-
cat & sanat, Lethargicos excitat, (na-
ribus indita) menses proritat (subdita.)

PRÆPARAT.

1. Vomitorium Conradini.

℞. Rad. Bryon.

Cyclamin. à ℥ij.

Helleb. alb. ℥j.

Radices has probè mundatas, lo-
tas & exiccatas puluerifa, affundeque
ad eminent. dig. 2. stent in MB.
dein § la per M, feces exime & com-
minue, spiritum abstractum recaffun-
de, stentque aliquandiu vase clauso.
Postea filtra & habebis verum vom-
itorium.

Vfus. Penna extremas plumas intin-
ge & immitte in haustum Vini malua-
tici, eumque bibe & euomes. Vid. Hart-
mann, in Croll.

2. Vinum vomitorium.

Fit vinum ex elleb. albo. si radi-
cum illius crasse contuf. ℥ss. macere-
tur in lbj. Vini Hispan. exponaturque
Soli.

Vires. Est singulare Heurnij Expe-
rimentum pro mouendo vomitu coch-
leare vnum, ad alium vero ciendam
detur cochl. B cum aliis laxantibus.

CCCCXXII. Epithymum.

Επίθυμον, Dioscor. Epithymum,

Matth. Lob. Cast. Tab. Calliatha minor,
Dod. C. B. 1. Germ. Tymseid.

OFFICIN. NAT.

Integra Planta.

Vires. Purgat blande melancholicos
& serosos humores, calf. & succ. 3. Vfus
pracip. in scabie, ulceribus, affectibus
melancholicis, in hypochondriorum &
lienis passionibus & obstructionibus.

PRÆPAR.

Syrupus de Epithymo. V. Disp.

CCCCXXIII. Esula.

Esula herba est Linariæ conformis,
nisi quod hæc lacteo succo careat, quo
illa grauida est, iuxta versum:

Esula lactescit, sine lacte Linaria
crescit.

Diuerfa sunt eius genera iisdem
qualitatibus prædita. Ex his eligere
monent pineam, i.e. quæ foliis pinum
æmulatur.

Dicitur Esula vulgaris maior, 5.
Trag. Esula minor Officinar. Lob. Esu-
la minor, Dod. Tithymalus cupressi-
mus, 2. Tab. Tithymalus foliis pini, for-
tè Dioscoridis Pityusa, C. B. 1. Germ.
VVolffsinilch.

N. Eligenda non nimis recens.

OFFICIN. NAT.

Cortex præcipue radicis, hinc & fe-
lia, quibus addi potest & succus, sed
rarissimi vsus est.

Vires, Pituitam validissime præcipue
per inferiora purgat, unde & Rustico-
rum Rhabarbarum Esula audit. Est an-
tem acris, ignea & erodens adeo vt im-
pudentium mendicorum fraudi inser-
uiat, qui eius succo cutem sibi met exul-
cerant scabritiei specie.

Corrigitur eius feritas Bdellio,
Tragacantho, mucilagine Psyllij.

NNnn 2. Quinimo

Quinimo mitescit præparatione, i. e. tridua in + acerrimo ros. infusione ac exiccatione. *Vide August.*

N. *Quercetanus contentus est infusione 24. hor. in Pharm. Restit. Alij singulis diebus novum acerum affundunt. Nonnulli perficiunt eandem macerationem in decocto myrobalanor. cum modico cinamomi vel spica.*

P R Æ P A R.

1. *Extractum Esula minoris. Sala.*
 2. *Cortic. radices (in principio veris quando prodire incipit collect.) q. v. coque cum Vino albo generoso in diplomate: Exprime ac inspissa: Inspissatum liquorem solve iterum, in ∇ plantaginis, maceraque in \mathbb{M} 3. vel. 4. decanta, filtra, vel si opus, clarifica cum albumine oui, & coagula.*

Dosis à gr. xij. ad xx. vel plura.

2. *Aliud Extractum Esula, quod Rulandinum existimatur.*

3. *Rad. Esul. min. vt in officinis veneunt, q. v. coque lento Δ cum ∇ simpl. semper despumando, dum spumat, ∇ m inde cola & serua, aliamque superfunde & coque collectam ∇ , leniter coagula ad spissitudinem mellis, postea affunde ∇ ad eminent. digit. j. & vase clauso in loco calido, aliquandiu asserua. Tandem abstrahè leniter ∇ . Et relinquatur Extractum.*

Vires. *Feliciter ∇ intercutem pellit, &c.*

Dosis à \mathcal{D} j. ad \mathcal{Z} j. *Hartman. in Croll. Sem. in Inst. Tentzel.*

VVeckerus describit & Extract. Esulae ex foliis succis cum ∇ factum, idque per vomitum ac aluum expurgans.

3. *Extractum Esulae Quercetani*

Exprime succum ex radice & foliis, fecibus remanentibus affunde serum

lactis (vel ∇ m lactis \mathcal{B} atam) digere \mathcal{O} aliquot, dein exprime. Expressiones vtralque confusas digere in \mathbb{M} vt defecentur, nec quicquam amplius crassamenti deponant. Liquorem defecatum lento \mathbb{M} calore coagula ad consistentiam Extracti.

Dosis ad \mathcal{Z} ß. in forma pilular. vel in liquore dissoluta.

4. *Aliter eiusdem Quercetani.*

5. *Esulae viridis contus. q. v. destilla in \mathbb{B} (non tamen comburatur) fecibus affunde destillatamillam ∇ m, digere, vt extrahatur Tinctura. Tincturam decantatam separa ab aqua sua in \mathbb{M} : abstractam aquam reassunde fecibus prioribus, ex quibus parasti extractum, idque toties repetendo, donec non amplius tingatur: Vltimo exprime; expressionem prioribus Extractis adde.*

N. 1. *Si ex fecibus vtriusque præparationis (præcedentis atque huius) combustis Sal cum sua propria aqua extraxeris, idque extracto, proprio addideris eius purgandi vim & efficaciam validiorem reddes.*

N. 2. *Ad hunc modum Extracta præparabis ex Thymelæa, Mezereo & reliquis omnibus Tithymali speciebus, & ex ipso quoque Elleboro nigro, si in loco eo habitaueris, vbi recens colligi potest.*

5. *Pilula de Esula Fernelij. V. l. 2.*

CCCCXXIV. Frangula.

Alnus nigra, baccifera, C. B. l. frangula, *Marth. Dod.* Alnus nigra, *Lob. Cam.* Alnus baccifera, *Arbor fœtida, Lon. Trag.* Auornus *Crescentio, Herna. Faulbaum, Zapffholtz.*

OFFICIN. NAT.

Cortex interior, potissimum radice.
 Vires. *Purgat humores noxios omnes, maximè*

maximè serum, tam per vomitum, quam per secessum, idque sat violenter. Ea propter corrigi solet Cinam. Zinzibere sem. anis. fœnic. & sim. Extrinsecus coquitur cum butyro, ad scabiem & similes morbos.

Dosis ad ℥ij.

N. Rusticis familiare exhibet purgans in hydropè & sim. morbis.

CCCCXV. Gratiola.

Gratiola, Matthiol. Dod. Lob. Cast. Cam. Tab. Ger. Limmestum l. centauroides, C. B. alius, Gratia Dei. Gerin. vuid. Antin.

N. Veteribus ignota videtur, quamvis aliqui papaver spumeum Dioscor. alij Eupatorium Mesua, alij Beon album esse velint. Centaurida alij faciunt, nec male, cum centaurij minoris species esse videatur, & inter spurias Centaurij minoris appellationes quoque Helleborine extet, quæ ob vires cum Gratiola eadem esse videtur.

Crescit in Campestribus & pratis.

OFFICIN. NAT.

Folia.

Vires. Efficax remedium est in humoribus aqueis, lentis, biliosisque specificè euacuandis, quos vel ex remotissimis partibus trahit, atque tum per secessum, tum per vomitum expurgat. Hinc magnus eius usus esse poterit in Hydropè, Ictero flavo, &c. Et quia amaritudine insuper dotata est insigni, fugat lumbricos, eorumque saburram expurgat.

Corrigitur Cinamom. sem. anis. Glyzyrrh. &c.

Dosis foliorum puluerifatorum, ℥j. vel. in iasuso ad ℥ij.

N. Matth. exhibet folior Num. x.

PRÆPARATA.

Extractum seu succus inspissatus Gratiola.

℞. Fol. Gratiolæ, (Maio vel Autum. collect.) exprime succ. clarifica & inspissa.

Dosis à ℥j. ad ℥b.

CCCCXXVI. Hermodactylus.

Hermodactylus est vel { Iris tuberosa. Hermodactylus verus, Matth. & Tab. }
 { Colchicum } perniciosum. Inusitatum.
 { Satyrum } non venenatum. Hoc vsuale & huius loci.
 { Cyclamen } Hac Officinis ignota sunt.

Dicitur Colchicū radice siccata alba, C. B. 2. Colchicum album, Cord. hist. Hermodactylus legitimus, Dod. Hermodactyli non venenati Offic. Lob. Hermodact. Offic. Cam. Lon. Hermodact. albus, Serapioni. Hermodact. Orientalis, Casalpino.

N. Matthiolus & Tabernemontan. Hermodactylum in Officinis vsitatum esse volunt, radicem Iridis illius tubero-

sa, à quibus dissentiunt Dod. Lob. & alij.

OFFICIN. NAT.

Radix, quæ ad nos ex Syria affertur. Reperitur Hermodactyli Radix alba, ruffa & nigra, sed eligenda quæ foris & intus verè albo, grauis, compacta, quæ leni contusione in puluerem farinæ triticeæ similem facile redigitur, sapore suauis ac dulci.

Vires. Pituitam crassam, lentam, NNnn 3 aliosque

aliosque humores viscidos peculiariter à iuncturis efficaciter trahit, ob id articularum affectibus, chiragra, podagra, &c. conducit.

Dosis à ℥iβ. ad ℥iβ. in infusione à ℥ij. ad ℥β.

PRÆPAR.

Pilula de Hermodactylo. Vide apud Augustanos.

Dosis à ℥j. ad ℥iiij.

I.

CCCCXXVII. Ialapa.

Ialapa radix est, exterius nigricans, interius rufescens, radici Mechoacæ similis.

N. Incognita fuit maioribus, & non nisi paucos ante annos ex India ad nos transportari cepit.

Dicitur Gialappa, Chelopa, Celopa, Ialapium, vel Gelapo, (à Massiliensibus,) aliis Mechoacanna nigra, quod Mecchoacannæ assimiletur, C.B. Bryonia, Mechoacanna nigricans. Num. 7.

Vires, Expurgat valide humores noxios omnes, imprimis autem serosos, idque citra molestiam.

Dosis à ℥β. ad ℥β. in infusione à ℥iβ. ad ℥ij.

PRÆPAR.

1. Extractum Ialapa.

Extrahe cum V, s.a. decanta & abstrahere ad consistentiam.

Dosis à ℥β. ad ℥j.

N. 1. Extractum hoc quia resinosum est, in aquo liquore dissolui nequit.

2. Magisterium.

Extrahe cum V optimo, hinc affunde aquam & præcipitatur.

Dosis ad gran. xviiiij.

N. 2. Viscipurgatrix potissimum in re-

sina Ialappa consistit. Ideoque si Ialappam adhibere volueris, vel in substantiâ, vel in Extracto aut magisterio ure, vino enim si infundatur, vires suas pro voto non communicat.

CCCCXXVIII. Mechoacanna.

Mechoacan, Mon. Dod. Lon. Frag. 1. & 2. Tab. Ger. Mechoaca peruiana, Lob. Ger. Rhabarbarum Indicum, Cast. Bryonia, Mechoacanna alba, C. B. 6. aliis Rhabarb. album, vveiß Rhabarb.

OFFICIN. NAT.

Radix ex Prouincia nouæ Hispaniæ Mechoacan nomine ad nos allata.

Duplex habetur ratione loci: Prima ex Mechoaca Insula affertur, altera vero ex continente circa Nicaragua nata, quæ priore longe præstantior est. Eligatur recens intus albicans, extus cortice cinereo vestita, minus cariola.

Vires. Pituitosos, aquosos, serososque humores, ex toto corpore, ac imprimis ex capite, ac nervoso genere, pectoreque blande ac sine molestia educit. Vtilissimum itaque Remedium est in Catarthis, ac inde ortis affectibus, in Hydrope, in omnibus arthritidis speciebus, Lue Venerea, & sim. Quia tamen calida & sicca est, in calidis constitutionibus eius usus ne sit continuus.

Dosis Infantibus ℥j. præter propter, Adultis à ℥j. ad ℥ij. in infusione ad ℥β.

N. Conducit imprimis infantibus in cruditate ventriculi ac pectoris viscosa mucilagine expurganda.

PRÆPARATA.

1. Extractum Mechoacannæ.

Extractum vt alia extracta parari potest

potest cum ∇ , vel secundum Quercetan. (in Pharm. Rest. c. 26.) cum ∇ aliqua Epatica, e.g. Endiuia, succo Limoniorum vel Citriorum acidula redita. Alii parant cum +. Hartm. in pract. verum minus recte, quippe vis purgatrix hac ratione obrunditur.

Dosis ad ζj .

N. Nihil. lucri in hoc Extracto præpulvere habes, præterquam quod dissolui in liquoribus possit.

2. Extractum Mechoacanna compositum.

℞. Rad. Mechoac. el. non cariofax ζiij

Turperth. gummos. & alb. ζj .

Zinziberis albi ζij .

Polypod. querni ζij .

Incisis grosso modo, extrahe digerendo cum ∇ opt. & ∇ Beton. (quæ ab Aloe est abstracta, si adsit) añ ss . exprime fortissime, fecibus relictis aliam affunde ∇ m Betonica, macera iterum ac exprime, expressis liquoribus adde.

Mannæ puriss. ζij .

Scammon. mund. ζj .

Agitando misceantur, adde

\mathcal{N} Q i. g. v.

O Cinam. gr. iij.

Redige ad consistentiam extracti.

Vires. Panchymagogon est omnes humores noxios simul educens, præcipue autem serofos.

Dosis ʒj . plus minus. Hart. in Croll.

CCCCX XIX. Mezereum, Laureola f. Daphnoides,

Frutex est Mezereum Officinarum, cuius baccæ Officin. Cocci gnidii, f. grana cnidia vocantur.

Dicitur Chamelæa f. Mezereon

Trag. Germanicum, Lob. Chamelæa Germanica, Dod. Daphnoides, Fuch. Cam. (Epir.) flore purpureo, Tab. Laureola maior, Cast. Thimelæa, Cord. in D. Daphnis alterum, Lon. Laureola folio deciduo, flore purpureo Officin. Laureola femina, C. B. 2. Germ. Kellershals.

N. Sunt qui Chamadaphnen Dioscoridis faciunt. At alij Dioscoridi ignotam fuisse volunt.

OFFICIN. NAT.

Cortex, Folia & Grana.

Vires. Mezerei vis est ignea, acerrima, exulcerans, mordens, febres accendens, cordis principumque partium vires exoluens, validissime bilem, biliosamque serofitates purgans. Corrigitur macerando hor. 24. in aceto (ut elleborus ac Esula) succo mali punici aut Cydonij, portulacæ, mucilage sem. psylli.

N. Alij corrigunt infundendo in Vino. & iterum exiccando. Alij Iriduanam macerationem in + requirunt, singulis diebus novum + affundendo & tandem ∇ bene eluendo.

Dosis, Fol. ac Cortic. Mezerei optime præparatorum & correctorum (sine correctione exulare debent,) est gr. viij. ad xv. Grana à gr. vj. ad xv.

N. 1. Reiciantur fibra, dum teritur.

N. 2. Ob malignitatem rarissime in usum venit.

PRÆPAR.

Pilula de Mezereo. Videtis apud Augustan.

N. Est & Mezereum Chamelæa Tricoccus, C. B. 1. Chamelæa foliis magnis & tenuibus, Mesuao. Cham. latif. vel alba, Serapioni. Chamelæa. Matth. Dod. Cord. in D. Bellon. Lon. Clus. Tricoccus, Lob. Cast. Mezereon Arabum, Lob. Tricoccus, Tab. Chamelæa

mela vera, *Cam. Germ. Seidelbast.* Verum officinis nostratibus non adeo vulgare, quamuis sint qui pro Mezereo officinarum habeant.

CCCCXXX. *Myrobalani.*

Myrobalani fructus sunt ex numero prunorum exoticoꝝ, veteribus Græcis incogniti, ab Arabibus primum inuenti.

Suntque Myrobalani

}	Chebuli	}	omnes sunt usuales.
	Citrini		
	Bellyrici		
	Indi		
	Emblici		

Myr. Chebuli dicuntur *Quebolia* & *Quebuli*, *Arab. Mirobal. Cepula, Mes. Clus. Chepulæ, Altnario. Matth. Garg. Lob. Chebuli, Cord. h. Lon. Cast. Chebulæ, Tab. Ger. Myrobal. maximi oblongi, angulosi, C. B. 1.*

Citrini dicuntur *Azafar*, *Arab. Myrob. lutei, Altnar. flauæ, Garz. Lob. flaua, Matth. & lutea, Clus. in Cord. Myrob. citrea maf. citrini. Cord. hist. Lon. Lob. Cast. Ger. flauæ citrinæ luteæ, Tab. Myrobal. citrin. Bellon. Myrob. teretes citrini, C. B. 2.*

Bellyrici: *Belleregi, Bellilegi, Bellegu, Arab. Myrob. belliricæ, Matth. Cord. hist. Clus. in Cord. Garz. Lob. Tab. Ger. Bellirici, Lon. Cast. Myrob. rotundæ belliricæ, C. B. 3.*

Indi: *Aluar. Arab. Myrob. nigra, Altnar. Mes. nigri, Lob. M. Inda & Damafonia & nigra, Clus. in Coroll. Indicæ, Lob. Tab. Ger. f. nigra, Garz. Indi, Cord. hist. Cast. Myrob. nigra octangulares, C. B. 4.*

Emblici: *Embelgi, Emblegi, Ambeigi, Afab. Myrob. de Seni, Serapioni. Semitica, Auicenna. Myr. Empelica, Mast.*

Empelica f. *Emblica, Clus. in Cor. Emblici, Cord. hist. Lon. Cast. Emblicæ, Lob. Tab. Ger. C. B. 5.*

Eligendi sunt carnosiores, crassiores, ponderosiores.

Vires. *Myrobalani citrini seu flauibili flaua educenda apti nati sunt. Indi s. nigra, bili atra, chebuli, pituita ac postea bili, Emblici ac Bellyrici, itidem pituita,*

Dosis à ʒvj. ad ʒiſs.

OFFICIN. NAT.

1. *Pilula de 5. generibus Myrobal.*
2. *Extractum Myrobalan.*
3. *Genus Myrob. quodcumque volueris exemptis nucleis, tere partem carnosam subtiliss. Macera dies aliquot cum ∇ dein exprime & inspissa. Sala. N. Alij adhibent succum pomorum redolentium, indeque conficiunt Extractum Myrobalanorum pomatum.*

CCCCXXXI. *Polypodium.*

Polypodium

}	vulgare. <i>H. usuale.</i>
	minus. <i>Dod. 2. Matth. 1. Tab. & c.</i>

Dicitur *Polypodium*, *Brurf. Trag. Matth. Fuchf. Cord. hist. Lon. Lob. Cast. Cam. Tab. Ger. maius, Dod. C. B. 1. Germ. Engelsisz.*

Reperitur in Fago, Corylo, in antiquis & cæuis saltibus, in rudibus saxosis, præfertur tamen omnibus quod in *Quercu* nascitur.

OFFICIN. NAT.

Radix.

Vires. *Educit bilem adustam & pituitam lentam, Hinc utilissimum in obstructionibus Mesenterij, Epatis ac Lienis, & inde natis passionibus hypochondrior. scorbuticis. Raro autem solum datur, sed alijs purgantibus fere admisce-*

tur, & quia segniter lurgat, plerunque in decoctis vel infusionibus, raro in aliis formulis adhibetur.

CC CCXXXII. Pſyllium.

Psyllium
C. B.

Dioscorid. f. Indicum cre-
natis foliis.

supinum, 2. *Matth.*
Cast. Tab. & c.
erectum, hoc vsua-
le solum.

Minus.

Dicitur Pſyllium, *Trag. Matth.*
Fuchs. Cord. in D. & hist. Dod. Lob.
Cast. Ger. 1. Tab. Germ. Psyllien' raut.

Crescit sponte in Italia, locisque
nonnullis Germaniæ, solo gaudens as-
pero, nobis non nisi in hortis colitur.
Floret Iulio & Augusto.

OFFICIN. NAT.

Semen collectum Octobri.

Vires. Evacuat bilem flavam, mucil-
agineque sua acrimoniam humorum
obtusare aptum est. Hinc convenit ma-
ximopere in Dysenteria & Corrosione
intestinarum

Dosis à ʒiij. ad ʒvj. scil. ex his ▽
conuenienti extrahitur mucilago pro-
pinanda, sed raro.

N. Semen psylli hoc peculiare pra ca-
teris purgantibus habet, quod qualitate
refrigerandi sit praeditum, seruis ac Me-
sue statuit. Verum enim vero nec tamen
extrareprehensionem positum est, quam
incurrit ratione virulentia sua.

PRÆPAR.

Electuarium de Pſyllio.

Dosis ad ʒj.

R.

CCCCXXXIII. Rhabarbarum.

Ps ʒiij. Dioscor. Arab. Ravid. &

Rhabarbarum, Romanis Raponti cum
Rhabarbarum, Officin. C. B. 1. Rhabar-
barum. *Carz. Acost. Fragos. Lob. 3. Tab.*
2. Ger. Rhabar. Americanum. *Monard.*
Rhabarbarum f. Indicum, *Cord.*
Rheum f. Rha. *Dod.*

In China prouenit, vnde in Tur-
ciam, hinc Venetias defertur, & qui-
dem vel nauibus, quod citius corrup-
pitur, vel itinere terrestri, quod dura-
bilius.

Duplex venale prostat: alterum di-
citur Rhabarbarum de Leuantes, quod
flauius & melius: alterum Musco-
uiticum, quod obscure flauum & vi-
lius est.

OFFICIN. NAT.

Radix.

Vires. Purgat benigne bilem flavam,
pituitamque viscosam ac tartaream in
ventriculo, primaque regione stabulan-
tem. Epati specificè confert, adeo vt cor
Epatitis dicatur, curat Icterus, & quia
vim quoque astringentiam obtinet in om-
nibus morbis dissolutis, Dysenteria,
Diarrhea pra aliis commendatur.

Corrigitur: Cinam. Shenanthos.
Santal. Citrin.

N. 1. Partem tum purgantem, tum
astringentem obtinere creditur, quarum
prior facilius eximitur, posterior diffici-
lius. Hinc pro diuersa intentione, diuer-
simode quoque tractatur. Nonnulli leui-
tatione vim purgantem minui & astring-
gentem augeri sibi imaginantur, quod
alij improbant, nec immerito, etenim
cum vis purgans fixior sit, quam vt le-
ni rostione in auram enanescat, rostio illa
vix satisfaciet. Praestat itaque si astring-
entiam vim auctam velimus, reiecta
prima decoctio, & de nouo id coquere, ac
fortissima expressione exprimere.

N. Radix Rhabarbari Monacho-
rum,

OOOO

rum (alias *Lapathi domestici, hortensis sativi*,) eandem purgandi facultatem, cum vero *Rhabarbaro* habere creditur, modo in duplo usurpetur. Hinc sunt qui pro *Rhapontico* illud habent, sed male, *Rhaponticum* quippe verum & à *Rhabarbaro Monachorum* & à vero *Rhabarbaro diuersum* nonnunquam ad nos transportatur. *VVeckerus*.

Dosis *Rhabarbari* veri à $\mathfrak{z}\text{j}$. ad $\mathfrak{z}\text{ij}$. in infuso ad $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$.

N. 3. *Rhabarbarum* ex omnibus *catharticis* est vtilitissimum, sine vilo periculi metu omni aetate, atque ideo etiam pueris & *pregnantibus* conueniens.

P R A E P A R.

1. *Rhabarbarum* conditum.

Cuius dosis paulo maior est crudo.

2. *Syrupus de Cichorio cum Rhabarb.* (in qua solum *Rhabarbarum*,) V. D.

3. *Syrupus de Rhabarb. solutiuus*, in quo part. æqu. *Rhab.* & *fol. Sonæ*.

4. *Syrupus Diasereos*, in quo partes

	{	<i>Rhabarb.</i> 5.
	{	<i>Carthã.</i> 4.
	{	<i>Agaric. trochisc.</i> 2.
	{	<i>Fol. Sen.</i> 1.

5. *Trochisci de Rhabarb.* V. D.

6. *Pilule de Rhabarbari.*

7. *Extractum Rhabarbari.*

8. *Rhabarb. el. q. v.* extrahe s. a. digerendo cum ∇ dest. *Epatica.* (*Endiu. Cichor. Agrimon.*) affusis aliquot guttulis *ol. ꝑ* per d. decanta ac exprime, coagulaque ad formam *Extracti*.

Alij addunt quoque *corrigentia*, eaque simul extrahunt. Sic. *Quercet.* ʒ. *Rhabarb* ℥ss. addit *Cinamo.* ʒss. *Santal.* ʒj. Extrahitque cum ∇ *Endiu. succo Limonior. vel Citiorum acidula* reddita. *Pharm. Rest. c. 26.* Fit quoque *Extractum* per ∇ . Vide *VVeckerum*.

Dosis $\mathfrak{z}\text{j}$. ad $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$. ʒj. Acui tamen

potest *Diagrid. præparat. Gummi gutt. Elater. &c.*

N. *Melius est extractum simpliciter sine corrigentibus conficere, cui si opus sit pro intentione Medici oleum aliquod conueniens. E. g. Macis, anisi, & sim. admisceri potest.*

CCCCXXXIV. Ricinus.

Ricinus { *Vulgaris. Huius loci.*
Americanus. De hoc infra.

Dicitur *Kixi, Diosc. Plin. Ricinus. Trag. Matth. Fuchs. Dod. Cord. Lon. Lob Cast. Tab. vulgaris, Cam. C. B. 1. Catapucia maior, Fragos. Granum regium maius, Mesua, alii, Palma Christi, Arab. Alkatoa & Kerua. German. Wunderbaum.*

Colitur in hortis, tum ob raritatem, tum ob talpas, quæ eius præsentiam fugere dicuntur.

OFFICIN. NAT.

Semen seu Nuclei cortice suo triquatro echinato exuti.

Vires. Potenter bilem & pituitam

dra ʒ, ʒss pellit, calf. & sic. 3.

Dosis *Nuclei* N. xij. plus minus.

N. *Rarissimi* usdem vsus est.

P R A E P A R.

Oleum ex semine expressum, quod dicitur oleum de Kerua. V. D.

N. *Oleum hoc dicunt oleum ficus infernalis.*

CCCCXXXV. Ricinus Americanus.

Est & genus *Ricini*, quod ante annos aliquot ex *America* adferri cepit. vulgati paulo maius, cuius operimentum seu siliqua, quæ semina continet, tuberculis asperis non est obfusa,

ta, ut in vulgari, sed levis & cinerei coloris: ipsum granum siue semen vulgari simile est, nigrum tamen & non maculosum, nucleumque continet solidum.

Nominatur Ricinus Americus, Lob. Tab. Clus. in Monard. Ricinus Americanus, C.B. 2. aliis curcas. Vulgo Grana tiglia. Vbi tamen notandum Granadillam Monardo grana esse ab his diuersa & granati seminibus familia.

Vires. Valenter supernè ac infernè purgat.

Dosis. Nucleus vnus excorticatus, vel solum dimidium nuclei.

S.

CCCCXXXVI. Senna.

Senna } Alexandrina f. foliis acutis.
C. B. } Hac prestantissima
 } Italica f. foliis obtusis. Hac
 } priori substituitur.

Priori inscribitur Senna Alexandrina, Trag. Cam. Orientalis, Bellon, Lob. Tab. Ger. aliis Ægyptia, Syriaca.

Altera dicitur Senna, Hermolao. Sena, Matth. Fuchs Dod. Cord. h. Lon. Lob. Cast. Italica, Trag. Ger. Cam. altera media dicta, Bellon. aliis nostras.

N. Veteribus Græcis indicta videtur, primumque à Serapione descripta.

OFFICIN. NAT.

Folia, cum quoque folliculi, sed raro.

N. Folia prescribuntur vti plurimum seft. i. e. sine stipitibus, à quibus eligendo seligendoque separantur.

Vires. Senna interpurgantia vti rarissima est, adustos ac serosos humores & hinc flauam bilem pituitanique ex Capi-

te, Epate, Liene, continuatoque usu iuncturis sine noxa sat benigne educens. Excitat tamen nonnunquam tormina, id quod ex abundantia pituita vitrea seu mucilaginis acris euenire nonnulli volunt. Verum rectius sentire videntur, qui id crudiori ac magis terrestri sena particula, forti expressione prolecta, adscribunt. Quia autem calida ac sicca (1.) corrigitur flor. viol. Borr. ag. Prun. & quo minus ventriculo obesse possit, additur Cinam. Galang. Zinzib. &c.

Exhiberi potest omni ætati & vel ipsis prægnantibus.

Dosis in subst. à ℥ss. ad ℥i℥. in infus. à ℥ij. ad ℥ss. vel ad plures vices ℥j. ij.

N. Adhibetur & extrinsecus ad melancholiam capitis arcendam (in lorionibus capitis).

PRÆPAR.

1. Puluis sena Moni. g. V.D.
2. Syrupus folior. sena V.D.
3. Syrupus de pomis Reg. Sabi. V.D.

N. Potest Syrupus sena parari cum fructu, ut est in Pharmac. Poteris p. 122. Acui potest aque extrahens aliquot guttis Nus. Oli aut Fri.

4. Electuar. Diabel Remer. f. Sennatum Renod.

5. Passula laxatina. V.D.

6. Extractum.

℞. Fol. Senæ Alexand. ℥j. affunde ∇ simpl. fetuentem (acuatam si libet aliquot guttis ol. ℥ per d.) ℥vij. Extrahere, exprimeque leniter, clarifica, inspissa ad consistentiam iustam.

N. 1. Alij extrahunt macerando cum ∇ stillat. pomor. redol. Beguin. Quercet. Alij cum ∇ Lupuli. Scelopend. Borr. ag. Fumar. addita portione alia. Caryophill. Zinzib. sem. fœnic. August.

Dosis à ℥i℥. ad ℥j. & ultra.

OOOO 1 N.

N. *Extractionem ex iisdem foliis secundum ne repetas: grauia nimirum tormena excitare solet.*

7. *Tinctura Sen. aut Rhabarb. ex communicatione S. Closs.*

ꝛ. Fol. Orient. vel Rhabarb. ꝛß. Θ tantundem, reduc. in pulu. qui accens^o cum carbone ignito detonet in + lo, cinerem solue in \times aut \forall , solutum filtra & euapora, soluat^r denuò in aqua ros. filtreturque addendo ꝛij. thei aut fol. Sen. in pulu. redact. digere per 4. aut 5. horas.

Dos. huius tinctura sint cochl. ij. in iusculo. Ita reliqua purgantia in Tinctura adducuntur.

CCCCXXXVII. *Soldanella.*

Κρημὴν θαλασσία, Diosc. Soldanella, Dod. Lon. Lob. Tab. Marina, Ger. Brastica marina, Matth. Cord. Lon. Cast. Cam. Soldan. maritima minor, C. B. 2. Germ. Meerwinden.

Crescit in locis maritimis Italiae, Galliae, inferioris Germaniae. Floret aestate.

OFFICIN. NAT.

Herba seu Folia ad nos ex Gallia allata.

Vires. Calf. & sicc. 3. Aquam valide educit, adeoque confert in hydropse, scorbuto, &c. Corrigitur cum stomachicis Zinzib. Mac. Cinam. sem. anis. &c.

Dosis in substantia ꝛß. ad ꝛj.

PRÆPARATA.

Succus inspissatus.

CCCCXXXVIII. *Spina infectoria.*

Rhamnus Cataracticus, C. B. 6. Rhamnus solutius, Dod. Ger. Rhamni alia

species, Trag. spina infectoria, Matth. Bellon. Lob. Cast. Clus. hist. Tab. Cerui spina, Cord. hist. spina alba, Lon. Germ. Wedorn. Creutz beer.

Crescit iuxta fepes in syluis, aliisque locis incultis, amans scrobes & riuulos, familiarisque est tractui circa Rhenum. Floret Maio, fructus fert Autumno.

OFFICIN. NAT.

Bacc. collectæ in fine Septembris, aut initio Octobris.

Vires. Purgant bilem, pituitam ac maxime serofos humores, unde vsu præcip. in Cachexia, Hydropse, Arthritide.

Dosis baccar. à N. xv. ad xx. vel aridæ baccæ teruntur, daturque puluis à ꝛj. ad ꝛiß. in decoctione coquantur baccæ Num. 40. vel 60.

PRÆPAR.

1. *Succus ex baccis expressus.*

2. *Syrupus de spina infectoria s. Syrupus domesticus. Syr. de Spina Ceruina. Fit ex succo ac melle additis corrigentibus.*

Dosis ꝛj. ꝛiß. V. D.

N. Ex baccis immaturis fit luteus color, ex maturis; Viridis (Safforin)

3. *Extractum Rhamni & Tithymalorum omnium S. Closs.*

Contunduntur Rhamni baccæ, vel Tithymali cum toto, & inter pistandum irrorentur aceto rosat. succum exprime, clarifica, torturæ huius materiae retinimentum calcina, addito pari pondere Θ , & extrahe salem cum \times , quem succo remisce & ad Extracti consistentiam redige, quod longè purius erit, si denuò soluat^r in aqua. ros. addaturque ꝛß. ol. A campanarii, filtretur & euaporetur vt prius.

Dos. gr. viij. in iusculo.

N. Sic quoque Cucumer agrestis & Rad. Helleb. in Extracta redigi possunt, affuso

affuso vino alb. loco aceti, in quo rad. per horam unam aut alteram decoquantur.

CCCCXXIX. Staphisagria.

Staphis agria descripta est supra. Huius loci semen est, quod purgat per vomitum, sed rarissimi usus est.

Dosis gr. 12. vel 15.

I.

CCCCXL. Turpethum.

Turpethum { 1. Arabum s. Turbit. officinarum.
C. B. { 2. Indicū Turbit. Garz. Acof. Trag. Dod.
3. Garganicum s. pseudo Turpetum, Matth.

1. Dicitur Turbith. Mesuaxi, Matth. Turbitum s. turbit Arabum, Cord. b. 1. Alexandrinum. Lob. Ger. Cast. Thapsiæ radix, Fuchs. Turpetum. Tab.

N. Hoc est quod in officinis usitatum est, authores sunt, Clus. in Garz. Matt. & alij quam plurimi.

2. Dicitur Turpethum repens foliis Alhez. C. B.

N. Hoc esse verum officinarum Turbith defendit Garzias. & ex hoc Dodonæus, &c.

3. Nihil aliud est, (teste Matthiolo.) quam radix vel Thapsiæ, vel picyusa, ex Gargano Apuliæ monte allata, vel (teste Clusio in Garziam,) Scamoneæ Radix, loco veri Turbithi venundata.

OFFICIN. NAT.

Cortex seu Radix à medulla lignosa sequestrata.

Vires. Calf 3. crassos viscososque humores, sine pituitam, fortiter & à remotioribus partibus, iuncturisque elicit: unde & diuturnis morbis maximè conducit.

cit. Inprimis proficuum eius usus est in Arthritide, ventriculo pituita abundante, Asthmate, Lue venerea, Hydrope, Elephantasi, scabie, &c.

Quia ventriculo nauseam & vomitum procreare per se solet, corrigitur Zinzibere, Mastiche, Pipere, Cinam. Fœnicul.

Dosis à ℥ij. ad ℥iiij. in infusione à ℥i. ad ℥iiij.

N. Infantibus ac gravidis dare caueo.

PRÆPAR.

1. Species Diaturbith. C. Rhab. V. D.
2. Pulvis Stokstaldi, dictus. V. D.
3. Pilule de Turbith stomachica Mesuaxi. V. D.

4. Acetum de Turbith. Varij generis. Vires. Commendatur in Peste, fitque ex Turbith, ruta, myrrha, aloë, aliisque putredinem arcentibus in T infusis.
5. Extractum.

N. Quia Turbethum resinofum est, sue ut aiunt gummosum, convenit cum V. Extractum eius conficere.

Dosis huius Extract. à gr. vj. ad x. & plura.

CCCCXLI. Tamarindi.

Tamarindus Scrapioni. Tamarindi, Matth. Bellon. Garz. Acof. Fragof. Lob. Alpin. Tamarindi, dactyli Indi, Mesuaxi. Thamarindus, i. e. Acacia Indica, Cord. hist. Thamarindi, Cam. Epit. Palmæ syluest. fructus oxyphanica. Lon. Cast. Siliqua Arabica, quæ Tamarindus, C. B. 3.

OFFICIN. NAT.

Dactyli acidi (sic dicti ab Arabico Tamar quod dactylus est: dicuntur & ἄσπινα palmulæ acidæ, non quod fructus palmæ arboris sint. Ac-

OOOO 3 bct

bor enim Tamarindifera instar Fraxini procera est.)

Eligendi recentes, nigro-rufescentes, teneri, multis villis intertexti, pingues, acidi s. vinosi.

Vires. *Refriger. & sicc. 2. humorum acrimoniam & feruorem reprimunt, bilem ac adustos humores blande ducunt. siti succurrunt.*

Dosis à ℥ij. ad ℥iiij. in Decocto. Alij à ℥ss. ad ℥j.

N. Parum nutrimenti subministrant.

PRÆPAR.

Pulpa Tamarindor. V.D.

Dosis ab ℥j. ad ℥ij.

Sunt qui paulo aliter hanc pulpam depuratum conficiunt. Extractū Essentiamue Tamarindorū vocant. ℞ Tamarind. q. v. coque in s. q. aquæ Exprime, clarifica cum albumine oui ac inspissa.

Dosis à ℥ss. ad ℥j. & ultra.

N. Fit & ☐ ex Tamarindis l. a. sed minime purgat. Sala.

Electuarium Diaphanicum. V. D.

CLASSIS IV.

De Purgantibus secundariis.

A.

CCCCXLII. Aloë.

Aloë est succus sapore amarissimus, qui ex Arabia & Ægypto ad nos pellibus inuolutus, deportatur. Genera eius moderno tempore officinis in vsu sunt 4. quæ tamen non nisi puritate & impuritate discrepant. Nam *Aloës crassamentum* s. pars impurior arenosa, sordibus conspurcata & idcirco nigricans, dicitur *Aloë caballina*: pars paulo purior, colorem hepatis referens, *Hepatica*: adhuc purior, *succotrina* vocatur, quasi succo citrina; quod pulvis eius citrini coloris sit, vel succotrina ab Insula Socotra, vbi copiosè crescit: pars purissima, si adeo deperata vt transparent sit, *lucida* dicitur, quod scil. radiis solaribus obiecta pellucida instar vitæ appareat.

Optima lucida est atque sine vltiori præparatione in vsum medicum accersit apta. Lucidæ succedit Succotrina & Hepatica.

N. *Caballina, Caballis seu Equis exhiberi debet, non hominibus.*

Censetur Aloë bona, quæ pura, eximè amara, subflaua, difficilis solutu ac

fractu. Hinc, quando Aloë purior, amarior, flauior, tanto quoque melior est: nigra enim & fractu contumax, reprobanda, ceu adulterata.

Aloë, C. B.

}	1. vulgaris. <i>Huius loci.</i>
	2. folio in oblongum aculeum abeunte.

1. Dicitur Aloë, *Trag. Matth. Fuch. Dod. Cord. Lon. Lob. Cast. Garz. Clus. b.* communis, *Cam.* Ex hac exprimitur succus, qui inspissatus Aloë huius loci exhibet.

2. Est semperuiuum illud folio mucronato, quod de rabulatis canaliculorum suspensum diuine virefcit, præsertim si luto radix circumligetur & subinde irrigetur Dicitur Aloë Americana.

Vires. *Vim præter purgantem obtinet & exiccantem (gr. 3.) calefacientemque (gr. 2.) prouocat hæmorrhoides & menses, roborat ventriculum, enecat & expellit lumbricos, arcet putredinem, astringit, consolidat, extergit, adeoque vulneraria est insignis.*

PRÆPAR.

1. Aloë depurata, siue loca.

℞ Aloës q. v. pulueris. solue in ℥. quod arenosū subsidet, abiice: pinguisi-

INUM è contra & quod leue est, recipe.

N. 1. Sunt qui ∇ Endiu. vel Cichor Acetosæ adhibent. Alij vt augeatur vis purgatrix, decoctum purgans loco ∇ substituunt.

N. 2. Aloe constat parte resinosa & aqua: illa purgationi inutilis est, hac idonea. Expropter, si aloem purgantem expectis, neglecta resinosa, aquam collige, in ∇ solubilem, eamque à fecibus sequestrata.

2. Balsamus siue Extractum Aloe.
℞. Aloes succotrin. q. v. extrahe rubedinem, s. a cum ∇ rectif. decanta, filtra, coagulaque ad consistentiam aloë debitam, Pharmacop. August.

Vires. Ex superioribus collige.

Dosis à ℞j. ad ℞℞.

N. Aliam quoque extractionem scilicet cum \times & ∇ rosar. Vide si libet in Pharmaco. Augustan. sub Extracto Holagogo Andernaci.

3. Aloe violata.

℞. Aloes puriss. grossè contusæ ℞. i. infusionis violarum, (ex triplici infusione, vide Symp. violar.) ℞. iij. clarifica, digere, vt soluatur aloë, cola ac coagula leni calore ad consistentiam pilularem.

Dosis à ℞℞. ad ℞℞℞. Sala de Essentiis.

4. Aloe violata \square ea.

℞. Aloes violatæ ℞. j. Crystall. \square , ℞. ℞. misce.

N. Sala vocat Aloedarium \square pro violatæ.
Dosis à ℞℞. ad ℞j.

5. Aloe rosata.

Fit eodem modo (quo Violata) cum succo Rosar. & ex eadem cum vino F. pilulæ. Vide Pharm. August.

6. Aloe rosata Hieronymi ab Aqua pendente.

℞. Aloes patræ puluerif. q. v. impasta cum succ. Rosar. Damasc. seu provincia-
lium: exicca leni calore æstiuæ solis; iterumque impasta; idque toties, donec

Aloë sedecim succi partes imbiberit, referuetur dein in massa pilulari pro vsu.

Dosis ad ℞℞.

7. Eadem aliter.

℞. Aloes puriss. ℞. j. succ. Rosar. Damasc. ℞. ℞. coagulentur ad ignem, idque repetatur bis vel ter, sic habetur Aloë rosata optima.

N. Corrigitur quoque cum spir. \square .
Vide Scammonium.

8. Oleum Aloes purgans.

℞. Aloepat. ℞. j.

Myrrh. \square j.

Thuris \square ℞.

Destilla lento Δ in cineribus ex cucurbita humili.

Vires. Umbilico illitum purgat & expellit lumbricos.

E.

CCCCXLIII. Elaterium,

Ἐλατεριον. Elaterium succus est amarus, ex fructu cucumeris asinini expressus ac inspissatus.

N. Omnium succor. hic maximè durabilis est, adeo vt ultra centum annos efficax manere credatur.

Cucumis asininus describitur Cucumis agrestis, Brunf. Cord. in D. Cucumis syluestris, Trag. Matth. Fuchs. Dod. Lon. Cast. Cucumer Elaterii syluestri. Lob. Cucum. asininus, Tab. Ger. Elaterium quod leue & candidum & igne instar pinguedinis accenditur, Bellou.

Eligatur Elaterium vetustum, summe amarum.

N. Elaterium à bimatu ad decennium colore candido, utile Dioscoridi, Egineta, quod anno antiquius non est, & quod virefcit: Theophrasto optimum, quod vetustissimum.

Vires. Purgans est violentum humoris serosi: mouet menses, fatumque interimit, vnderariu eiu vsu, precipue

cum

cum nec malignitate careat.

PRÆPARATA.

1. Elaterium depuratum.
2. Elat. correctum.

N. Depurari potest, si in ∇ solvatur ac filtratur, quod facili fieri potest negotio, siquidem ut plurimum liquidum extet.

Corrigitur cum spir. ⊕ i & oleis, ut de Scammoneo dictum.

3 Fit etiam Extractum ex depurato succo per ∇ , ut & Fæcula ex succo cucumerum maturorum per subsidentiam, cuius vires vide in obseruat. *Henr. ab Heer.*

Dosis gr. j. ac ij.

CCCCXLIV. Euphorbium.

Ευφορίον, Euphorbium succus est cōcretus accerrimus, ex fauciata Lybica Ferula eiusdem nominis extractus.

N. 1. Modum extrahendi docet Dioscorid. Videatur Matth. Dodon. Lob. Lon. Tab. Ger.

N. 2. Dodonæus Euphorbium. (unde succus ille extrahitur,) plantam esse perhibet. Dioscorides arborem: contradictione haud difficili conciliatu. Sunt enim planta, qua temporis progressu, vel diligenti cultura arborescunt, cuius rei exemplum, & in hac civitate præbuit arborescens Ruta frutex.

Genera Euphorbii sunt duo:

1. Sarcocollæ modo pellucidum flavum, pisi magnitudine in guttas æquales densatum, modice cauernosum. 2. In utriculis, quibus excipitur, in massam densatur candicantem, aut vitri colore.

Dosis à gr. v. ad x.

N. Adulteratur admixtis Sarcocolla aut Gummi atque liquore Tithymalli.

Eligendum est purum, translucens, candidum aut flavum & acre, quod leuilinguæ contracta os accensum diu detinet. Annotinum, nimirum per ætatem perfectionem suscipere creditur, acrimonia cum tempore mitiore reddita. Recens improbandum, ceu vitium violentia suspectum.

Vires. Insignem quidem vim obtinet serum ac aquas ex toto corpore purgandi. Verum enim vero non sine violentia ac molestia, quam præter substantia proprietatem malignam, & vi inflama mandi (calidum est gr. 4.) exerit.

PRÆPAR.

Correctum Euphorbium.

Correctio Euphorbii consistit partim in partium acrium volatilium abolitione, partim in residuarum malignarum ac calidarum mitigatione, quod fit.

1. R. Euphorb purificati ab omnibus fecibus q. v. redige in exigua frustula ac inde pomo Citrio vel Limonio excavato, massaque panis obuoluto, coque in clibano: Euphorbium dein sic præparatum, (quod albissimum) vase vitreo serua. *Querc. Pharm. Rest.*

N. Augustana Pharmacopœa in initio Euphorbium cum Ol. Amygdal. dul. q. s. instar collyrii terere ac massam dein pomo imponere iubet.

2. Correctio Euphorbii.

Solve Euphorbium in +o rosato, cola & inspissa, abluque ∇ Rosarum.

3. Correctio præstantior.

R. Euphorbii (præstat quod prima correctione correctum,) q. v. affunde succum Limon. vel Granat. acid. depuratum, ad eminent. digit. 3. vel 4. solve digerendo in MP , filtra colide ac coagula. *Querc. Ph. R.*

4. Correctio præstantissima.

Solve

Solve Euphorbium cum phlegmate
 ☉i, totali & integro suo spiritu im-
 prægnato, vel cum aquis citonior. po-
 morum uè curti-pendulorum, oleo
 ☿is per C. vel spiritu ☽i acuat, *Querc.*
 decanta vel filtra & coagula. *Querc.*
dist. loc.

5. *Extractum Euphorbij.*

℞. Euphorb. opt. depurat. (vt supra
 cum + rosar.) extrahe cum ☽, decan-
 ta, coagula & denuo circula cum nouo
 alcoole (☽P 10.) dein separato mēstruo
 coagula Δ lento, addendo aliquod cor-
 rectorium pro libitu: fiat mixtura.

Vires. *Paralyfi, Arthritidi, Spasmo,*
Hydropique conducit, pituitam neruis
impastam expurgando ducit,

6. Ol. Euphorb. stillat.

7. Ol. Euphorb. commune.

℞. Euphorb. ℥ss. Ol. Cheirin. ℥v. vini
 generos. ℥v. coque ad consumptionem
 vini.

Præparata alia communiora, quæ
 Euphorbium ceu basis ingreditur sunt
Hiera Logadit.

Pilula de Euphorbio. &c. Vid. l. 2.

G.

CCCCXLV. *Ghitta, Iemou.*

Gutta Gamandra, Gummi gotta,
 Gutta gemau, Cattagauma vel gemu,
 Gummi Peruanum s. de Peru, de Iemu,
 de Gemandra; aliis succus Gambici
 vel Crambici.

Est succus concretus aut inspissatus
 (potius quam Gummi.) Cuius autem
 plantæ succus sit, nondum certò co-
 nstat. Sunt enim qui ad Esulam, ad cata-
 putiam maiorem, ad flores Ricini Indi
 originem eius referant, coloremque
 aliunde. (E.g. ex Curcuma) conciliatum
 volunt, alij Euphorbij succum censent

aliis ex Scammonio & Tithymalo com-
 positus est: nonnulli compositum ex
 Chelidonia maioris succo, Scammonea
 & Croco suspicantur: alij ex succo cot-
 ticus mediani Frangulæ. Nos præcipuè
 de Vsu solliciti, eligere suademus, pu-
 rum, flauique coloris.

Adfertur ex Sinarum regione, pri-
 mumque adferri cepit ante annos 40.
Videatur Clus. lib. 4. exor. cap. 8. succ. 11.

N. *Videtur esse Gummi contra poda-
 gram Monardi.*

Vires. *Expurgat per superiora & in-
 feriora, præcipue humores serofos &
 aquosos, tum quoque omnem saburram*
*vitiosorum humorum ex toto corpore edu-
 cit. Hinc usus eius creber est in hydro-
 pe, Febri, scabie, pruritu, & sim.*

Dosis à gr. v. ad xiiij.

PRÆPAR.

Esti crudum quidem, non citra com-
 modum adhiberi queat, attamen cum
 nauseabundam possideat qualitatem,
 operæ præcium duxerunt, hanc obtun-
 dere. Vnde.

1. *Ghitta Iemu correctum per spir.*

☉i aut ☽ Mindereri.

℞. Ghitta Iemu q. v. dissolue cum
 spir. ☉: abstrahatur dein spir. ☽
 residuumque exicetur, lentè, ne scil.
 nigrescat, sed colorem suum retineat.

N. 1. *Edulcorare si volueris ∇ ali-
 quoties abluè.*

N. 2. *Procedit feliciter correctio ad
 modum quem habes de Scammonio: vel
 Gummi Gutta terna vice cum spir. ☉
 aut + imbibe, tere & exicca.*

Dosis à gr. xv. ad xx.

2. *Extractum s. Magisterium.*

℞. Gitta Gemu pulu. ℥ij. ☽ opt.
 ℥viii. fiat solutio, digerendo in MB.
 aliquot (2. 3. 4.) decanta & filtra ca-
 lide, præcipita affundendo ∇ ros.) vel

PPpp aliam

aliam aliquam,) abstrahere & coagulare lente.

N. 1. *Melius succedet processus.*

℞. Ghitta Gem. ℥ij. V. opt. ℥v. ʒo
 ℥i ℥j. digere, & soluetur in ℥v breui tempore.

N. 2. *Sunt qui ℞. V. Santali tinctura impregnatum.*

3. *Magistorium G. G. S. Clossai, sive Gamandra correcta.*

Imbibatur pulvis Ghittæ Iemou ol. deliquioso, ita ut liquefcat instar pastæ, malaxetur diutissimè in mortario, terendo pistillo vitreo, donec colorem mutet, affunde V. ℥ fatum, macera per 15 horas in tali calore, qui colliquando soluendoque guttari non sit satis, decanta, malaxa ut prius, addito nouo ol. ℥ri, idque tertiâ vice reitera, tandem albescentem hanc materiam laua pluries aquarol. & ex illâ desiccâ Tabellas aut trochiscos finge.

Vires. *Leniter, & absque vomitus prouocatione operationes suas in plerisque absoluunt.*

Integrum doctumque Tractatum de Gitta Iemou conscripsit Clariss. Dn. D. Ioan. Petrus Lotichius, Marpurgi Med. Professor publ. amicus meus singularis, ad quem Lectorem remitto.

M.

CCCCXLVI. *Manna.*

ἄρ σίμαλι & ἀρ σίμαλι, Galen. [Mel ex aëre, cui cœlestis natura, Plinio. Men Siracost & Terniabin, Arab. Thereniabin & Trungibin, Terengibil, Serapioni & Auicenna. Manna purgatoria, Maith. Diosomeli, Corâ. hist.]

Est ros sine liquor suavis, qui ex aëre sublucanis temporibus decidens arborum ramis & frondibus, hinc

herbis lapidibus & solo interdum inuenitur inharere, breui tempore coalescens, grumofus instar gummi apparet.

Manna } Liquida Tereniabin, strictè
 itaque } Bellon. l. b. 2. obs. e. 65.
 tum } Du- } Granata } Ha Of-
 est } rior } Mastichina } ficin.

Pro diuersitate regionum est Manna Orientalis, l. Syriaca, Perfica, Calabrica, Goticiana, Tridentina, Brianfonsensis.

N. *Meminit & Garzias Manna granata instar seminis Coriandri, qua nobis penitus incognita, nisi intellectum velit graminis semen, Manna nomine veniens, de quo supra Class. 1.*

Ex his et si Syriaca laudem omnibus præcipiat: attamen nostratibus Officinis primas damus Calabriensi & præcipue granata, i. e. quæ granulis minoribus constat, vulgus Mannam foliorum vocat, quod scilicet de arboribus colligatur. Hac inferior est mastichina i. e. quæ granis maioribus & mastichis guttis propè æqualibus est. Dicunt mannâ corporis, quod de ramis colligatur vel impetu ventorum in terram delabatur.

Eligenda candida, recens, anno non vetustior: ruffa enim & fusca inueterata est. Adulteratur saccharo penidio, herbarum foliis circumuoluto. Sic quoque quæ Sênæ folia granis suis amplectitur factitia est, C. B. Fit quoque Manna factitia ex amylo Manna, Scammonea semine aliquo & radice lacticina, Christ. Acoſt. cap. 8.

Vires. *Temperata est ad caliditatem reclinans, gustur, asperam arteriam, thoracemque leniens, aluum blandè mouens, bilem serosofque humores educens.*

Dosis infantibus à ℥ij. ad ℥β. adultis

tis ab ℥iij. ad ℥iij. & ℥iij.

N. Quia facile bilefcit, in febris. nisi frigida admista fuerint, non adeo conueniens cenfcetur.

P R A E P A R.

1. Electuar. Diacaffia cum Manna. Vide Difp.

2. Elect. Lenitiuum de Manna. Vide Difp.

3. Manna Tartarifata f. Tabula de Manna.

Fiunt ex manna foluta & purgata, quæ more communi in tabula effunditur, additur ad Mannæ ℥j. Cremor.

℥j.

4. Manna liquida.

℞. Mann. Calab. ℥ij.

Crem. i ℥ij.

aq. stillat. pro libitu ℥v.

Tartarum primo aquis optimè foluatur, hoc factò, lento igne manna, quæ omnia calidè per linteum traicienda, & cum albumine oui clarific. in modum fyrup. Cui ad conciliandum gratum odorem aqua cinam. vel fimile quid affundi potefl.

Ex Communicatione Dn. D. Iohan. Kieferi.

5. Spiritus Manna.

℞. Mannæ el. q. v. defilla Δ lento ex Cucurbita, & habebis fpiritum infpidum.

Vires. Sudorificum infigne efl in febris tum peffilentialibus, tum communibus, sudorem propellens admodum fetidum.

Dofis ad cochlear. j.

Soluit itidem, vnde Tinctura f. is flana. Cl. Dn. D. Heluic. Dietericus, Medicus Electoris Brandeb. Princip. Dan & Holfat. amicus meus integerimus.

6. Spiritus Manna aliu.

Diffoluatur Manna rore Maiali, & tam diu cohobetur, donec fublime- tur in caput & ci inftar niuis. Hic ℥s in fpiritus fluidam naturam redactus fit folutiuum Solis mineralis, feponitâ omni vi corrofiuâ. Bickerus in Hermete redimuo.

7. Syr. de Manna laxatiuus.

Dn. D. Echoldi.

℞. Polypod. q. ℥vj.

Rad. Ireos Flor. ℥iij.

Pafful. min. ping. & incif. ℥ij.

Fl. Violar.

Borrag.

Bugloff. añ. p. j

Sen. f. fl. ℥iij.

Cinam. ℥iij.

aq. mult. ℥iij.

Coque omnia f. a. ad confumpt.

lib. i. Coletur & exprimat. In colatura diffolue.

Mann. calabr. ℥ij.

Sacchar. penid.

Cand. alb. añ. ℥j.

Coq. ad confist. fyrupi, addendo in fine aq. Cinamo. parum.

Dofis ℥j. ad ℥ij. & vltra.

CCCCXLVII. Opopanax.

Opopanax quid fit & quodnam optimum, vide fupra, hoc loco illius purgandi facultatem defcribemus, quæ educit phlegma craffum & vifco- fum, non folum è mefenterio f. regio- ne prima, fed & idem allicitâ partibus remotis & iuncturis, adeoque munda- ficat cerebrum, neruos, pectus: tuffi antiquæ confert: potum cum aceto hora vna ante acceffionem febrilem, arcet rigorem, maxime fi idem opopa- nax cum fucco apij ac oleo anethino fpinz illinatur.

P P pp. 2 Dofis

Dosis à ʒb. ad ʒj.

Corrigitur spica & mastiche.

P R Æ P A R.

1. *Opopanax depuratus*; Fit soluendo (in +) colando & inspissando.2. *Extractum*. Fit vt Euphorbij. Dosis à ʒb. ad ʒj.3. *Pilula de Opopanaco comp.* V. D. Dosis ʒj.4. *Oleum stillat.* (ex XX per cinerem.) *Sagapenum*. Vide class. 2.CCCCXLVIII. *Scammonium*.

Scammonium, *Scamnoneum*, *Scammonia*, *Scammonia*. Est succus ex radice *Scammonia*, plantæ lacteo succo plenæ, extractus & inspissatus. Extrahitur autem vel radicem adhuc crescentem incidendo (vid. *Dioscor.*) vel eandem (dubio procul cum foliis & caule,) prælo submittendo.

Scammonia ꝛ *Syriaca*, hæc huius loci. planta est ꝛ *Monspeliaca*, *Valentina*.

Dicitur *σναμμωνία*, *Diosc. Theophr.* *Scammonia*, *Muth. Lon. Cast.* *Scammonia*, *Cord. in D. Antiochena*, *Cam.* *Scammonium*, *Cord. hist. Dod.* *Syriacum*, *Lob. Syriaca*, C. B 1.

Oprimum est quod ex *Antiochia* affertur, dein *Armenium*, *Europæum* omnino prauum est. Probatum quod nitidum, splendidum, (instar gummi) rarū, cito liquefcens, friabile, colore cum frangitur, fuluo, non valde ponderosū, tactu linguæ lactescens, nec vehementer eam calefaciens, (nimirum hoc *Tichymalli* admisti argumentum est.) Quod ab his notis recedit, tantò peius existit, quantò longius recesseris. Improbantur glebæ ingentes, nigrae, graues, nimirum aut adulteratae hæc sunt, aut succus ex tota planta expressus.

Dosis à gr. v. ad x. vel xij.

Vires. *Expurgat valde humores biliosos, acres, serosos, adeoque creberrimi vsus est, non modo per se, sed & cum aliis permistum.*

N. *Cum magne sit acrimonia, intenseque caliditatis & siccitatis, infense malignitatis, mordacis flatulentia, excessiue attractionis, adeoque aptum natum, quod intestina erodat, viscera, cor, epas, &c. conturbet, ventriculorum flatibus mordacibus lacestat, vi sua calfactoria ac exicatoria (quas ʒ. gr. obtinet) inflammet, & consequenter febres producat, vi attractoria hypercatharses introducat, correctione opus habet, hanc alij aliter institunt. Hinc*

P R Æ P A R.

1. *Scammonium correctum per Cydonium*, i. e. *Diagrydium*.2. *Scammonium tritum*, coque in malo *Cydonio* excauato pasta circumdato, exemptum dein *diagrydium* ferua pro vsu.

N. 1. *Hæc elaboratio est Gal. l. 1. c. 1. dealiment, facult. vbi interna mali cotonij acetabula semini destinata excauat, eaque Scammonio replet ac coquit.*

N. 2. *Antiquum imbecillum est, ideoque flatulentum, bimum est optimum.*

N. 3. *Dicitur Diagrydium, Diagrydium, Diacrydium.*

2. *Scammonium defecatum per succum Citonior.*

Solve Scammonium (vel diagrydiū) in succo calido Citonior. Rosarumue pallidarum aut Damascenarum s. à decanta à fecibus ac coagula

N. 1. *Quercetanus veram Scammonij preparationem fieri cum succo Limoniorū ait, cum quo proceditur diē. Vide Pharmacop. c. 75. Alij cum succo Citri.*

N. 2. *Urollis imbibit Diagrydium puriss.*

puriss. succo clarificato Ros. pallidar vel
 (sive strium,) forte Damascenar. seu Pro-
 vincialium) addit spir. ☉ i guttam
 unam vel alteram, atque exicat calore
 solis vel retro fornacem, idque repetit
 multoties (20. vel. 30.)

Dosis à gr. vj. ad xij.

N. 3. Bredelius Scammonium in ▽
 destillata actu frigida. Sic subsidet picea
 quaedam substantia, à qua decantat li-
 quorem supernatantem: idque repetit,
 novam scil. ▽ affundendo, quoties ▽
 albicantem colorem contraxerit. Coagu-
 lat dein decantatas ▽ s leni calore ad
 siccitatem.

Dosis ad gr. xij. &c. Brendel. in Chym.

3. Extractum per spiritum Vini, Ma-
 gisterium s. Resina Scammonij,
 Pulvis Syrius.

℞. Scammonij purissimi grossè triti
 ℥ij. ▽ opt. ℥xij (vel ad eminent. dig.
 4) Digerantur in ME hora vna ac al-
 tera, sæpius agitando, vt soluantur: dein
 filtra calidè per chartam, filtraturæ af-
 funde ▽ frigidam Rosar. (vel aliam
 aliquam ▽ m) & lactescet liquor. Ab-
 stracto ▽ repone reliquum & reside-
 bit Resina quam à supernatante lacteo
 liquore decantationis beneficio separa-
 tam,) ter quaterue ▽ rosacea laua.

N. 1 Si Scammonium purum fuerit,
 vix pars tertia decedit. Sala de vogetab,
 Kessl. 1. c. 90. Tentzel. in Exeg.

Dosis à ℥ss. ad gr. xv.

Fit quoque Extractum Scammonij
 per ☿

Dosis gr. 8. vel. 12. Hartm. in Croll.

4. Extractum Diagridij aromati-
 satum FF.

℞. Cinam.
 Zinzib.
 Caryophyll.
 Macis.

Nucist.

Cardamom.

Cal. Arom.

Anis.

Cortic. Arant. añ. ℥i℥.

F. Extractum cum ▽ ℥ss.

2. ℞. Diagrid. ℥iij. Extrahe itidem
 cum ▽ s. a.

Vtrumque Extractum coniunctim
 digere. ▽ abstrahere ad consistentiam
 Extracti.

Dosis gr. xv. ad ℥j.

5. Extractum Scammonij Glycyr-
 rhizatum.

Verum Scammonij correctivum est
 succus liquiritiæ. Infundatur radic. gly-
 cyrrh. bona quantitas in aqua per 24.
 horas, eaque infusio novà semper gly-
 cyrrh. additione ter repetatur, coctione
 leui præmissâ. In hoc decocto Scam-
 mon. puluerisatum resoluatur filtratur,
 exhalet aqua sub finem lenissimo Δ
 (ne aduratur) vsque dum extractum in
 fundo resideat. Est S. Clossai.

6. Elixir Scammonij Crollianum s.
 Pilula Scammonij.

Ex Scammonio crebris imbibitioni-
 bus succi Rosar. (vt supra) impræгна-
 to, extrahe Tincturam s. a. digerendo
 cum ▽ opt. (in quo sem. anis. fœnic.
 cinam. & spica nardi macerata,) decan-
 ta & abstrahere ▽ ad consistentiam du-
 riusculam, vel quod melius præcipita
 cum ▽ Rosar. & laua.

℞. Huius Extract. ℥j.

Succi Citonior. depurati ℥iij.

Ros. rubr. depurat. ℥j

M. & coagula ad consistentiam
 pilul.

Dosis à gr. 10. ad 20.

7. Alia correctio Hartmanni: Scam-
 monium ☉ latum.

℞. Scammon. minutiss. triti q. v. imbibe
 P P P P 3 cum

cum pauxillo spir. Θ i vel ol. Φ is p. c. adfundendo guttas aliquot Ol. anif. vel fœnic. contere diligenter vt fiat massa instar picis viscida, quam serua.

Vires. Purgat leniter sine omni molestia.

Dosis à gr. xv. ad xxv. Hartman. in Croll.

N. 1. Eodem modo mitigatur & vehementia omnium succor. purgatiuum. Aloe, Elaterij, Gummi de Peru. Hartmann. in Croll.

N. 2. Quercetanus in Pharmac. Restit. c. 15. Chymici, inquit, qui elegantes illas & singulares Θ i proprietates occulte in eo delitescentes eruere norunt, haud verebuntur Scammoneam, Myrrham & ipsa etiam Gummi praparare & dissoluere cum phlegmate Θ i, toto suo spiritu impragnato. In hoc solo enim spiritu latet vera illorum simplicium praparatio, qua cum exuperante calefaciendi qualitate insignita sunt, & hac via exquisitè & perfecte corriguntur.

N. 3. Σ u, Θ li & Δ is comburunt Scammon. & in picem vertunt, ac proinde multum virtutis catartica deperdunt. Satius igitur erit Scammon. resolueri in Tinctura ros. cum Σ u Θ li perata vt moris est, resolutumque ad Extracti consistentiam reducere.

8. Scammonium Δ ratum.

\mathcal{R} . Scamm. minutiss. triti, q. v. (E. gr. \mathfrak{z} ij. vel \mathfrak{z} ij.) Extendatur supra chartam bibulam, detineaturque supra carbonibus viuis Δ re super iniecto humanibus, donec Scammonium (quod continuo mouendum) liquefcere incipiat vel albescat. Scammonium hac ratione optimè correctum exhiberi potest à gr. vj. ad vij.

9. Scammonium Rosatum.

\mathcal{R} . Scammon. vel Diagrid. q. v. Ex-

trahe cum spiritu Citonior, s. a. decantata, filtra & inspissa ad consistentiam mellis. Dein addead Scammon. \mathfrak{z} ij. succi Ros. Rub. recenter expressi. \mathfrak{z} ij. coagulentur simul ad siccitatem.

N. Si spiritum Citoniorum, infusione Santali tinctum, loco Menstrui extractioni huic adhibueris, non modo Scammonium colore elegantius, sed & Epatici minus noxium acquires. Et hoc modo paratum Scammonium rosatum extat in officina. Saltzvedeliana, incunda sua rubedine visum oblectans.

Dosis à gr. vj. ad xv.

10. Infusum Scammonij seu spiritus purgans.

\mathcal{R} . Scammon. el. p. iij. Succi Cydon. p. ij. mixta pone in locum calidum quotidie mouendo, donec induretur. Tunc affunde \mathcal{V} Maluatici, q. f. stentque aliquandiu in digestionem. Et fit spiritus purgans seu solutiuis.

Vires. Purgat sine vlllo fastidio ac molistia.

Dosis, variat pro Scammonij ingredientis quantitate.

N. Hac infusio ad annum circiter seruata, reicit ad superficiem guttulas olei rubei, instar picis liquidæ, in quo ferocia seu malignitas scammonij residere iudicatur. Tentzel. in Exec.

11. Diacydonium Lucidum Scammonatum seu laxatiuum.

\mathcal{R} . Gelat. Diacydon. lucidi, \mathfrak{lb} j. Extract. Diagrid. \mathfrak{z} vj. coque lento igne, (NB!) optime miscendo, ad iustam consistentiam.

Vel

\mathcal{R} . Scammon. \mathfrak{z} iv. extrahe Tincturam cum \mathcal{V} postea fiat s. a. Cydoniatum ex succi Cydonior. \mathfrak{lb} iij. sacchar. \mathfrak{lb} j. Tincturam paulatim succo affunde, misce exacte ac effunde in scatulas.

Dosis

Dosis à ℥j. ad ℥ij. & ℥iij.

N. Nisi mixtio exacte fiat fieri potest.
 ut diagyridium in uno loco parcius, in alio
 copiosius concreseat, inde purgatio in sto-
 lenior, hinc copiosior, adeoque hyperca-
 tharsis nonnunquam subsequitur.

12. Gelatina Cydoniorum Laxativa
 cum Turbith.

℞. Scammon. ℥ij.

Turbith. ℥iv.

Extrahe cum V, postea

℞. Decoct. Cydon. ℔vss.

Sacchar. ℥xviij.

Coq. f. a. & F. Gelatina, cui sub
 finem affunde Tincturam Diagridij
 & Turbit. spatulaque agitentur, do-
 nec V euanescat. Tandem repone
 pro usu.

N. Communiora preparata, quæ

diagridium cum basis ingreditur, ipse-
 met Tyro obseruare poterit.

Præcipua ex his sunt.

Confectio Anisi Laxatiui.

Elect. Benedict. Laxatiu.

De Citro solutiuum.

Diacydonites Laxatiu.

El. Episcopi s. Elefoph.

Confect. Hamech.

Indum maius.

Diaprunis solutiuum.

Rosatium.

De succo Rosarum.

Zinziber Laxatiuum.

Pilula Aggregatiua maiores.

Aurea.

De Fumaria.

De Hermodactylis.

Extractum Catholicum, &c.

*Et hac sunt quæ de Vegetabilibus scribenda
 fuerunt.*