

CAPUT II.

DE

USU CICUTÆ.

A multis Auctōribus cicuta externe applicata contra mammārum incrementum , scirrhosas indurationes, ischiadicum , & hæmorrhoidum dolorem commendabatur. Sic in dispensatorio viennensi emplastrum de cicuta, præstans remedium in scirrhis , & duris lienis tumoribus notatur. Pauci interne cicutam propinarunt. Verum a celeberrimis in arte viris , ut venenata , damnatur : ipse Cl. Geoffroy, Renalmi & Bowle experimenta recensens, monet, prudentiorem esse, qui ea abstinet.

De-

Demum celeberrimus Archiater Antonius Störck cicutam innocuam esse non solum demonstravit ; verum extracto ejusdem multos morbos , qui hucusque curatu impossibiles dicebantur , sanavit.

Exemplo ductus , plurimis in morbis medicamentum hoc felicissime exhibui.

Sic tumores scirrhosi , scrophulosi multi mihi occurrabant , quos cicuta curavi. Incipiebam ut plurimum a sex pilulis gran. iij. nycthemeri spatio. Neque quidquam incommodi inde sentiere ægri.

Externe fomenta cicutæ applicui , quibus ob negotia non licuit fomentis uti , emplastrum substitui.

Solebam omni secunda , aut quarta septimana purgans dare . Consultum

enim id duxi, ut crassum tumoribus in-
hærens, cicuta fusum, humoribus for-
te mistum, e corpore eliminetur, cum
usu cicutæ raro evacuatio sensibilis au-
geri observetur.

Quidam horum ægrorum 5^{ta}, 8^{va},
10^{ma} septimana sanabantur; nonnulli
4. 5. mensibus ad perfectam sanationem
usque utebantur.

Feminæ ut plurimum citius, ac vi-
ri curantur.

Tumores valde magni cicutæ usu
mox valdopere minuti, pertinacius non-
nunquam resistebant, ubi ad parvam
molem jam redacti erant.

Plurimis fundebantur tumores scirr-
hosí, paucis suppuratione bona con-
sumeabantur.

In-

Inter suppurationem acriter medicamentum continuavi.

CASUS PRIMUS.

Vir 32. annorum parotides, glandulas. que colli lapideas & adeo tumidas habens, ut surdus inde factus, difficilime deglutiret, ac respiraret, cicuta interne, ac externe applicata, 6^{ta} die jam melius audiebat, deg'utiebat, respirabat; moliores multo omnes erant tumores, spatio 15. septimanarum integre restitutus fuit.

CASUS SECUNDUS.

Expertissimus Doctor Polzter feminam 28. ann. ad me misit, schirrhosis magnis parotidibus, glandulisque submaxillaribus laborans; cicutæ extra-cto, & fomentis ejusdem 14. septimana curabatur.

CASUS TERTIUS.

Femina 44. ann. scirrhos in utraque mamma per plures menses habuit, quos neglexit. Sed dum dolores magni accedebant, consilium meum petiit, ope cicutæ 7. septimanar. tempore integre disparuere schirrhi.

Quatuor mensibus optime se habuit; dein vero tumores parotidum nascēbantur magni indolentes, cum respiratio ne paulum difficiliore, nullis tamen per plures hebdomadas medicamentis uti volebat. Dum vero ingenti dolore partium tumidarum corripiebatur, respiratio celeris, anhelosa fere ad suffocationem usque fiebat; me denuo in auxilium vocavit; ad cicutam iterum confugi, & omni hora cochlear sequentis mixturæ sumi jussi.

R. Extract. cicut. drachm. j β .

Solv. in unc. jj β . aq. font.

Add. oxymel. scillit. unc. β .

Syrup. diacod. unc. j.

Mf.

fomentis cicutæ partes dolentes continuo involvebantur. Dormivit jam magis placide, dolores minuebantur: pergebam itaque usu eorumdem medicamentorum, altera die dolores iterum mitiores, collum, quod antea inflexible fuit, parum movere potuit, respirabat liberius, tertia die omni trihorio cochlear mixturæ propinabatur; sputa crassa prodierunt; 9^{na} die, integre ab omnibus symptomatibus libera erat.

Cavendum est in scirrhofis, ne feminæ thoracibus arctioribus eos premant: pauperes monendi sunt, ut lin-

tea teneriora schirrhosis tumoribus imponant, quibus affrictus industi alperi impediatur.

Diaeta non adeo stricta requiritur, vidi pauperes, leguminibus & farinosis solum utentes cito, & integre curatos.

In cancro binis tantum vicibus cicatram tentare licuit.

CASUS QUARTUS.

Vir 50. ann. adeo foedum cancrum habuit ut cernens eum, totus horruerim: integra facies sinistra cum oculo exesa fuit, jamque in dextram partem malum serpebat, viribus & corpore maxime exhaustus in nosocomium deferebatur; delrabat: quare materiam morbosam ad interna encephali Jam delatam judicavi. In casu hoc desperatissimo quotidie binas drachmas

cor-

corticis peruviani, atque cicutam interne, & externe ordinavi. Potus erat ex binis partibus aquæ cum tertia lactis. Brevi tempore deliria cessarunt, appetebat, foetor minuebatur; omisi corticem, & sola cicuta pergebam. Post binos menses caro pulcherrima, nullus dolor, nullus ichor, sed optimum pus observabatur. Confabulabatur æger, vires in dies augebantur, & omnia sationem promittebant. Mirabar cum fratre Abdon egregio nosocomii chirurgo, cicutæ in hoc desperatissimo casu virtutem. Sed dein constitutione dysenterica superveniente, ea periit.

CASUS QUINTUS.

Femina 31. ann. 7. mensium spatio cancrum in naribus habens, post 16. septimanas cicuta integre curabatur.

Nunc Juvenem cancrosum in nosocomium recepi, qui licet 14. solum diebus cicuta utatur, tamen jam ulcus multum nitidius, non fœtens appetet.

In spina ventosa pulchros cicutæ effectus vidi, & primum juvenem 21. ann. spina ventosa laborantem curavi.

Phthisicos scrophulosos nonnullos cicuta sanavi, pro potu solebam dare infusum veronicæ, melle aut syrupo diacodii edulcoratum.

In his tamen ægris minori dosi cicutam exhibui, & a 4. solum pilulis nycthemeris spatio sumendis incepi.

Ubi effectum quandoque non adeo magnum observavi, sequens medicamentum præstans expertus sum.

R. Veron.

Virg. aur. a m. j

Ci-

Cicut. dr. iij

bulliant per horæ $\frac{1}{8}$ horæ, colat lib. j β
fortiter expressæ add. syrup. diacod.
unc. j β . Sumat omni trihorio unc. ii.

CASUS SEXTUS.

Viix 40. ann. multis ulceribus & tu-
moribus scrophulosis purulentis
laborans, phthisi corruptus, in no-
focomium transferebatur. In casu
hoc desperato cicutam interne dedi,
simulque infusum ex veronica melle
edulcoratum præbui, externe fomenta
cicutæ applicabantur. Spatio 3. men-
sium minora ulcera consolidata, ma-
jora pulchriora, nec foetida erant;
respiratio levabatur; sputa purulenta
in alba mutabantur; loquela vix antea
perceptibilis, distincta fiebat, vires au-
gebantur, & jam sanationis spes magna

B 5

erat.

erat. Verum æger impatiens nosocomium dereliquit, & appetitui nimium indulgens in dysenteriam incidit, qua, in nosocomium denuo portatus, mox periiit.

CASUS SEPTIMUS.

Miles e Regimine Equitum Principis de Lichtenstein, potui multum deditus; vagis arthriticis doloribus diu laboravit, demum integre emaciatus, tussi sicca corripiebatur, quam dein sputa purulenta exceperunt; dolor satis magnus totum occupavit pectus; pulsus debilis erat parum celerior; sudoribus nocturnis disfluebat æger. Sic in nosocomium translatus, solo cicutæ extracto convaluit. Mox primis diebus æger levamen magnum sensit a pilulis

ci-

cicutæ; quare me rogavit, ut usum eaurum continuare liceret.

Potus fuit ex 2. partibus aquæ & 1. parte lactis.

Id notare debeo, pectore levato, dolores artuum rediisse; sed & hi brevi cicuta fugati sunt.

In tussi sicca, sine causa manifesta, ubi schirrhosi pulmonis suspicio, infusum ex cicuta & veronica valde utille deprehendi.

CASUS OCTAVUS.

Juvenis 20. ann. , ob negotia scalas plurimas quotidie ascendere coactus tussi sicca, respiratione diffcili & anhe-losa diu jam laborans, me accessit. Supicabar schirrhosi quidquam latentis; quare cicutam exhibui. Continuato per tempus remedio sensit levamen, sed in-

te-

tegre malum non cedebat. Verum enim quinque lapillos, duos gran. iij. & tres minores tussi ejecit, externe gypsum referentes, ossea tamen duritie praeditos. Jussi postmodum cicutam adhuc dum continuari. Nunc optime valet.

In Arthritide recenti solum cicutæ extractum saepissime curam absolvit, & plures nunc in nosocomio decumbentes intra breve tempus restitui.

Sed & annosi arthritici, qui ad omnia exhibita non levabantur, cicuta curabantur.

Nonnullis simul infusum chamædryos & chamæpityos exhibui.

Neque sanatio infuso huic tribuenda erat; eo enim solo utentes non levabantur.

Citiores in hoc morbo effectum a cicutæ extracto , in aqua soluto , mixtuaræ forma hausto , quam in pilulas redacto obtinui. An quod citius massam humorum intret ; & minus a contentis in ventriculo ac intestinis alteretur ?

Ubi tumores arthritici admodum dolentes adsunt , nil fomento cicutæ melius.

Quandoque , dum hæc non mox levamen ferebant , partem affectam decocto cicutæ immergi jussi , maximo cum ægrorum levamine.

Duo tantum fuere , qui hæc fomenta ferre non poterant ; hinc abstinendum erat.

Ad leniendos podagræ dolores cicuta in - & externe applicata egregie prodest.

Non-

Nonnullos habui, diu pedum dolo-
ribus lacinantibus laborantes ; varia
medicamenta interna , & externa fru-
stra in usum vocarunt , solis balneis,
ex cicuta paratis liberabantur

Achores infantum feliciter fugantur;
dum eorum capita decocto cicutæ la-
vantur.

Oportet autem purgans interdum
exhibere, ut acre , forte sanguini mi-
stum e corpore eliminetur.

CASUS NONUS.

J uvenis 20. ann. tinea laborans varia ,
remedia frustra adhibuit. Petiit po-
stea nosocomium. Dedi tunc purgantia,
caput decocto tabaci lavabatur ; sed
incassum. Substitui dein decoctum ci-
cutæ, sat brevi malum fere integre ce-
debat. Timens autem æger, ne servi-
tium

tium perdat, nosocomio exivit. Brevi iterum malo aucto, me accessit: experimenti causa denuo eum in nosocomium reecepil, & cicutæ lavatione integre sanavi. Babit simul quotidie libram decocti bardanæ, &, cum adeo celerem mutationem vidissim, purgans sæpius exhibui, ne materia acris, forte resorpta malum aliud induceret.

Pessimæ scabies sola lotione ex cicuta tolluntur, neque unquam quidquam sinistri inde expertus sum.

CASUS DECIMUS.

Milites duo Regiminis Lichtenstein in nosocomium transferebantur. unus horum integrum sinistram pectoris partem cum brachio ejusdem lateris, alter vero utrumque pedem adeo foedum habuit, ut elephantiasin mentiretur.

Ulti-

Ultimus spatio 14. dierum , prior vero per 4. septimanas sola lotione ex cicuta integre curati sunt. Omni octiduo tantum purgans ex scamonio dedi.

Simili methodo puerum in eodem morbo brevi & integre curavi.

Ubi a scabie retropulsa mala oriuntur , egregium medicamentum est cicuta.

CASUS UNDECIMUS.

Sartor 24. ann. scabie valde affectus , unguento contra scabiem fugavit eam ; sed oppressione pectoris ingenti , & difficiili respirio corripiebatur : fudoribus nocturnis vehementer vexabatur ; sputa purulenta foetida ejecit . Cicuta interne sumpta integre convaluit.

In ulceribus serpentibus pessimis , contra omnia remedia rebellibus virtutem cicutæ multoties expertus sum.

Dum

Dum extractum propinavi, fomenta applicavi; vel quandoque lintea carpta, decocto matida ulceri imposui.

CASUS DUODECIMUS.

Femina 37. an. ulcera pedum per 7. annos habens, variis frustra adhibitis aptis remediis demum me accessit. Spatio 15. septiman. cicuta in & externe adhibita integre restituta est.

In ulceribus venereis annosis cicuta nonnunquam profuit, ubi ipse mercurius sublimatus spiritu frumenti solitus incassum adhibebatur.

In fluoribus albis malignis, gonorrhæis inveteratis egregium remedium cicuta est.

Scabiem venereum cum extracto & lotionibus nonnunquam sanavi:

C

Ulce-

Ulcera scorbutica , quæ adhibitis etiam antiscorbuticis non cedunt , non raro cicuta curantur.

Neque tamen is sum , qui ideo cicutam medicamentum universale in ulceribus statuam . Vidi paucos , qui cicutam ferre non poterant ; vidi aliquos , quibus non profuit , id solum contendeo , me non noscere medicamentum generalius , certiusque , ac cicutam , & eam saepissime effectum in similibus praestitisse optimum , ubi alia aptissima remedia incassum tentabantur .

CASUS DECIMUS TERTIUS.

Femina 42. ann. ab ultimo ante sexennium puerperio fluore laboravit uterino . Materies acris erat rodens , Vicinas partes excorians , pessime foetens , varia aptissima a prudentissimis in

arte

arte viris, sed frustra adhibuit reme-
dia. Pilulis ac abstersione partium cum
decocto cicutæ, infuso agrimoniae, spa-
tio 19. septimanar. integre curata est.
Quatuor solum vicibus eam senna pur-
gavi.

In fistulis & sinubus non minus effi-
cax est cicuta.

CASUS DECIMUS QUARTUS.

Vir 45. ann. fistula ani laborans,
operationem sustinuit. Verum post
eam dolores in intestino recto semper
sensit, & ichorosa materia per alvum
quotidie exiit, augebantur hæc mala
immaniter per 6. menses, demum, to-
tus emaciatus, febricitans, in nosoco-
mium deferebatur. Adeo immanes erant
dolores, ut mortem magis optaret æger,
quam tanta tormenta ferre. Mitigata

per corticem peruv. febre, varia reme-
dia frustra adhibui. Jussi dein clysmata
ex decocto cicutæ cum laðte ano in-
jici; verum injecta enemata mox iterum
exiere. Propinavi demum pilulas ex ci-
cuta, eo cum effectu, ut æger me ro-
garit ulteriorem pilularum usum :
cum solum remedium esset, ex quo le-
vamen perceperit. Pergebam itaque ala-
criter, & spatio 2. mensium eum in-
tegre restituì.

Ob dolores ingentes prægressos, for-
te & calamitates, totus stupidus ac me-
lancholicus evasit. Verum sine medi-
camentis ad se redeuntem adhuc dum
in nosocomio servo.

In Hæmorrhoidum doloribus, fru-
stra applicatis aliis remediis, virtutem
cicutæ expertus sum.

CA-

CASUS DECIMUS QUINTUS.

Vir 50. ann. sæpiissime hæmoroidibus cæcis, rarius fluentibus, laboravit. Hic ingentibus abdominis intestinorum crassorum doloribus, atque tenesmo intolerabili corripitur, alvus liquida frequens est, stranguria simul juncta.

Vocatus, clysmata ex lacte cum dia-
codio injici jussi; verum ea non reti-
nuit; paregorica data nil proficiebant;
sed de calore inde aucto conquerebatur
æger. Confugi igitur ad cicutam, &
drachmam extracti in aqua soluti spa-
tio 12. horar. propinavi. Mox prodibat
urina copiosa, dolores minuebantur;
solus tenesmus post quamlibet alvum
angebat ægrum. Continuavi igitur usum
mixturæ, simul enema ex decocto cicu-

tæ cum lacte injectum fuit; retinuit per
bihorium. Repetii mixturam; idem-
que clyisma servavit hoc in corpo-
re per 5. horas. Ita pergendo 6^a die
ægrum integre restitui.

Cataractæ progressum in aliquibus
cicuta impedivi, nullum tamen curavi.

Cum cicutæ a multis virtus genitu-
ram extinguendi adscripta fuerit, viro
30. & aliquot ann., cui castitas ex vo-
to est, tamen non nisi de matrimonio
deliranti largiter propinavi. Verum nul-
lam in eo mutationem deprehendi.

In indurationibus viscerum & mor-
bis inde pendentibus egregia est cicuta.

CASUS DECIMUS SEXTUS.

Adolescens 17. ann. longo jam tem-
pore nil appetens, ab ingestis par-
ca etiam copia, sumptis ingentes sen-
tiens

tiens anxietates, plurima vomebat: tumor in regione scrobiculi cordis durus & magnus notabatur, spatio 2. mensium cicuta integre curatus est.

Binos ictericos, tumorem durum in hypochondrio dextro gerentes, eodem medicamento cito sanavi.

Cardialgias chronicas ad omnia medicamenta non cedentes cicuta fugavi.

CASUS DECIMUS SEPTIMUS.

Vir 40. & aliquot ann. dolores per longum tempus inventriculo, & ab domine sentiens, non appetens, ab ingestis anxietates magnas patiens, stranguaria simul laborans, nosocomium petiti, eum examinans nil nisi epigastrium, & hypochondria justo duriora, & tumidiora, cum cachectica corporis constitutione inveni. Audivi, medicamen-

40 CAPUT II. DE USU CICUT.

ta plurima aptissima ab egregiis in arte
viris ei frustra ordinata fuisse, cicutam
itaque exhibui, & spatio aliquot septiman.
eum a doloribus, anxietatibus, strangula-
ria liberum, bene appetentem cum sat
bono faciei colore dimisi.

In colica pictonum, variis tentatis
non proficientibus, cicuta profuit.

Hæc jam sunt, quæ maturo, & diuturno
examine de cicuta concludere licuit.
Æquus Lector facile inde determinabit,
an medicamento virtus? an cancri cura-
ti, scirrhi resoluti, tumores annosi fusi,
ulcera pessima consolidata, cardialgiæ,
vomitus inveterati sanati solum naturæ
opus? An hæc aeris, vitæ generis, ali-
mentorum mutationi tribuenda? Certe
id horum morborum naturæ, & casto ra-
tiocinio repugnare videtur.

F I N I S.