

*Tabula indicans pondus liquidorum,*

quæ guttatum præscribi solent.

## ***De Dosibus Medicamentorum.***

Medicaminum doses expositæ sunt, quales ab aucto-  
ribus in genere determinantur; nihilominus tamen anim-  
adversione dignum est, easdem pro re nata augeri, aut  
diminui posse. Res circumstantes, quæ in remediorum  
efficaciam influunt, sunt sequentes: sexus, temperamen-  
tum, consuetudo, morbi indoles, idiosynerasia et ætas.  
Sexus sequior in genere minorem cujuslibet medica-  
menti quantitatem exposeit, quam masculinus. Homines  
temperamento sic dicto sanguineo prædicti, minorem  
dosin ferunt ac illi, qui melancholico obnoxii sunt. Con-  
suetudo plurium medicaminum in organismum anima-  
lem efficaciam minuere solet, imprimis narcoticorum et  
stimulantium, quæ et largiori interdum dosi impune

capi possunt, eorum nempe usu per longius temporis spatium protracto. Nec minus morbi indoles remedii dosin immutare sæpenumero cogit. Idiosyncrasia tandem plurimum in moderandam medicaminum efficaciam influit; nam quedam individua magna pollent receptivitate ad ea remedia, quæ in genere omnino parvum exserunt effectum; quum in aliis maxime activa remedia vix aliquam efficacitatem exerceant. Ætas in determinanda medicaminum dosi certiore omnino offert regulam, et sequens tabula, e clarissimi Gaubii operibus deprompta, junioribus Medicis inservire poterit.

<i>Ætas.</i>	<i>Quantitas proportionata.</i>	<i>Dosis relata ad ætatem.</i>
Pro adulto.	Supposito, dosim in genere esse = 1.	Drachma.
Infraannum	Requiritur solummodo $\frac{1}{2}$	gr. quinque.
Bimulo . .	" " " "	" septem et semis.
Trimo . .	" " " "	" decem.
Quadrimo	" " " "	" quindecim.
Septenni .	" " " "	Serupulus.
14 annorum	" " " "	Semidrachma.
17 " "	" " " "	Duo scrupuli.
21 " "	Dosis communis integræ	Drachma.
65 " "	" " " "	Duo scrupuli.