

Frangulae cortex. *Faulbaumrinde.* Rhabarbarum prolet. (*Rhamnus Frangula L.*)

Ein vorzüglich für die Armenpraxis geeignetes, höchst wirksames Abführmittel, welches die auch in der Senna und dem Rhabarber vorkommende Cathartinsäure enthält. Decocte von 2 Esslöffel Rinde auf 2 Tassenköpfe Wasser können sich die Kranken im Hause bereiten; für ein Infus rechnet man 15—30 Grm.; Zusätze sind Abführsalze.

Anw. Solche Faulbaumrinden-decocte werden besonders *Haemorrhoidariern* empfohlen.

622 Cort. Frangulae Grm. 25

Coq. cum Aq. font. q. s.

ad rem. colatur. „ 150

Inspissatum ad „ 25

adde

Spiritus vini diluti „ 20

S. *Des Abends 1—4 Kaffee-*

löffel. **Reich.**

Anw. *Als Laxans.*

623 Decocto Frangulae (e Grm. 25)

Grm. 150

adde

Natri sulfurici „ 15

M. S. *Früh und Abends*
1 Weinglas voll.

Gumprecht.

Anw. *Angenehmes Abführ-*
mittel.

Galbanum. *Mutterharz.* (*Ferula erubescens Boissier.*)

Form und Gabe: Innerlich zu 0,6—1,0 in Pillen, Bissen, Emulsion, nur selten als Expectorans; meistens ein Bestandtheil von Pflastern.

624 Galbani

Saponis medic. ʒā Grm. 7,5

M. F. pil. pond. Grm. 0,1.

Consp. Lycop. S. *Zweimal*
6—10 Stück.

Anw. *Gegen Amenorrhoe.*

625 Galbani

Saponis medic.

Extr. Rhei comp. ʒā Grm. 8

M. F. pil. No. 200. Consp.

Lycop. S. *Täglich dreimal*
5—6 Stück zu nehmen.

Jahn.

Anw. *Dieselbe.*

Galeopsidis grandiflorae herba. *Hohlzahnstengelspitzen.* (*Galeopsis ochroleuca Lamarck.*)

Liefert die Lieber'schen Kräuter, den Blankenheimer Thee; Volksmittel gegen *Lungenschwindsucht.* In Pharm. Germ. wieder aufgenommen.

Form und Gabe: Zum Thee 15—40 Grm. zu infundiren; Zusatz: *Radix Althaeae.*

Gallae. *Galläpfel.*

Path. Auswüchse auf Eichenblättern infolge des Stiches von *Cynips Gallae tinctoriae Olivier.*

Form und Gabe: Infus oder Macerationsinfus aus 15—30 Grm. auf 150 Colatur. Offic.: *Tinctura Gallarum* (1 Gallae: 5 Weingeist); 5—30 Tropfen.

Anw. *Als Antidot bei Vergiftungen mit Brechweinstein, Zink, Alkaloiden.*

626 Gallarum Turcicarum Grm. 12

Coque cum Aq. fontanae q. s.

per. 5 minut. ad

reman. colatur. „ 350

S. *Tassenweise zu trinken.*

Phöbus.

Anw. *In den oben genannten Vergiftungsfällen.*

627 Tr. Jodi

Gallarum ʒā Grm. 20

M. S. *Morgens und Abends*
aufzupinseln. **Sigmund.**

Anw. *Bei beginnender*
Angina; vorzüglich.

628 Gallarum Grm. 20
 Inf. cum Vini albi „ 180
 Stent per 24 horas in leni
 digestione. S. *Drei- bis vier-*
mal täglich umzuschlagen.

Radius.

Anw. Als *Vorbauungs-*
mittel gegen das Wundwerden
der Brustwarzen.

629 Gallarum Grm. 20
 Gummi Kino „ Grm. 15,0
 Aluminis depurati „ 7,5
 M. F. p. S. *Aufstreupulver.*

Vogt.

Anw. Zum Stillen *paren-*
chymatoeser Blutungen.

Gentianae rubrae radix.

Enzianwurzel. (Gentiana
lutea L.)

Nur innerlich, mit Wasser
 oder Weingeist infundirt: 4—15
 Grm. auf 120—180 Grm. Colatur
 nach den Indicationen der
 bitteren Mittel. Zu Pillen das
 Extract von Consistenz II.

1. *Extractum Gentianae.* 0,3—
 1,0 zu Pillen mit Chinin u. s. w.

2. *Tinctura Gentianae.* (1:5)
 20—60 Tropfen, oder

3. *Tinctura amara.* (Mit Tr.
 Aurant. immat., Herba Centaurii,
 Radix Zedoariae.) Ebensoviel.

630 Rad. Gentianae rubrae Grm. 15
 Spiritus diluti „ 30
 Vini gallici rubri „ 500

Macera per 8 dies. Filtra.
 S. *Enzianwein, ein Liqueur-*
glas voll bei jeder Mahlzeit.

Anw. *Gegen Dyspepsie.*

631 Extr. Gentianae Grm. 8
 Vini Xerensis „ 120
 Tr. cort. Aurantii „ 8
 M. S. *Dreistündlich 1 Ess-*
löffel. **Reil.**

Anw. *Als Stärkungsmittel.*

Glycerinum. Oelsüss. Glycerin.

Form und Gabe: Innerlich
 theelöffelweise als leichtes
 Abführmittel bei Kindern
 (Skoda), bei *Diabetes mellitus*
 (O. Schultzen) und bei *acutum*
Pharyngocatarrh.

Aeusserlich als deckendes
 u. zugleich feuchthaltendes Ver-
 bandmittel bei *Hautkrank-*
heiten. Als Lösungsmittel
 für Extracte, Alkaloide, Tannin
 und in Wasser lösliche Metallsalze.
 Officinell: **Unguentum Glycerini**,
 als Constituens für eine ganze
 Reihe von Salben (Glycérolés).

Graminis rhizoma. Queck-
enwurzel. (Agropyrum re-
pens Palisot de Beauv.)

Form und Gabe: 30—60
 Grm. auf 350 Grm. Colatur in-
 fundirt ganz nach Art der Sarsa-
 parilla zu Holztränken, die
 mit Rad. Glycyrrhizae versüsst
 werden.

Granati radiceis cortex.

Granatwurzelrinde. (Punica
Granatum L.)

Wenn frisch und gut das zuver-
 lässigste Bandwurmmittel.

Form und Gabe: Decoct
 aus 30—60 Grm. auf 100—200
 Grm. Colatur; dadurch wird die
 Taenie getödtet; zu ihrer Abtrei-
 bung sind dann noch Abführmittel,
 z. B. Ol. Ricini und Gummi Guttii
 oder Jalapa erforderlich. Weniger
 verlässlich ist **Extractum corticeis**
radiceis Granati (*Consist. II*), auch
 ein spirituöses giebt es; 3—12
 Grm. in Lösung; die Hauptsache
 ist immer, dass eine ächte, frische
 Droge vorhanden ist.

632 Cort. rad. Granati Grm. 30
 Macera in vase stanneo
 per horas 12 cum
 Aq. fontanae „ 350
 Dein coque ad remanent. „ 200

S. *Auf 2 Mal zu nehmen.*

Oppolzer.

Anw. *Gegen Bandwurm.*

633 Extr. rad. Granati quantum adeptum est ex rad.

Grm. 120,0
 Misce c. Aq. dest. ferv. „ 180,0
 adde
 Extr. Filicis aeth. „ 2,0
 Gummi resinae Gutt. „ 0,2

M. S. *Frühnüchtern 1 Ober-*
tasse voll, nach $\frac{3}{4}$ Stunden
ebensoviel, und wenn nach $1\frac{1}{2}$
Stunden der Wurm nicht ab-
geht, den Rest. Ist nach 3 Stun-
den kein Erfolg erreicht, lasse man
Ol. Ricini nachnehmen.

Küchenmeister.

Anw. *Gegen Bandwurm.*

634 Cort. rad. Granati Grm. 60-90

Macera in Aq. fontanae „ 1000
 per hor. 24 deinde
 coque ad reman. „ 500

Filtra et adde Sacch. albi
 q. s. ad gratum saporem.
 S. *Von halber zu halber Stunde*
 $\frac{1}{4}$ zu verbrauchen.

Radius.

Anw. *Dieselbe.*

Gratiolae herba. Gottes-
 gnadenkraut. (*Gratiola offi-*
cinale L.)

Ein jetzt obsoletes, aber immer noch officinelles, unsicher, jedoch oft sehr stürmisch wirkendes Kraut (Erbrechen, blutige Stühle etc.), welches am besten gar nicht verordnet wird. Ebenso überflüssig ist das **Extractum Gratiolae** von Consist. II (Dosis 0,1—1,0 Grm. l).

Form und Gabe: Zu 4—30 Grm. auf 180 Grm. Colatur mit Wasser infundirt; oder zu 8 Grm. mit 350 Grm. Rheinwein angesetzt und bei mässiger Wärme digerirt; zweistündlich 2 Esslöffel.

635 Extr. Gratiolae Grm. 2,0

„ Belladonnae „ 0,3
 „ Aq. Laurocerasi „ 15,0

M. S. *Dreistündlich 20*

Tropfen. Hufeland.

Anw. *Gegen Hypochon-*

drie.

636 Extr. Gratiolae

Pulv. herb. Gratiolae

„ Mucil. gi. Tragac. q. s.

M. F. pil. No. 60. Consp.

Lycop. S. *Dreimal täglich*
2—3 Stück. Radius.

Anw. *Gegen Melancholie*
von Unterleibsstockungen her-
rührend.

Guajaci lignum et resina.

Pocken- oder Franzosenholz
und Harz. (Guajacum offi-
cinale L.)

Form und Gabe: a. des
 Holzes: Grm. 30—60 auf Grm.
 500 Colatur abgekocht. b. des
 Harzes: Grm. 0,3—1,0 in Pul-
 ver, Pillen, Latwerge,
 Emulsion.

Tinctura Guajaci resinae. (1:5
 Harz) 20—60 Tropfen.

Tinctura Guajaci ammoniata
 (mit Liq. Ammonii caust.). 20—60
 Tropfen.

Extractum Guajaci (Cons. II).
 Zu Pillen; (theuer!).

Der alte Ruf des Mittels als
 Specificum der *Syphilis* ist dahin!
 Bestandtheil der *Species ad deco-*
ctum lignorum u. a. die Secre-
 tion antreibender Theemischun-
 gen.

637 Resinae Guajaci Grm. 4

Hydrarg. stibiato-sulfur.

Magnesia carbon. „ 1

M. F. p. S. *In 2 Tagen zu*
verbrauchen.

Pulvis purificans.

Hufeland.

Anw. *Gegen Hautaus-*
schläge.

638 Ligni Guajaci rasp. Grm. 30
Coq. cum Aq. commun. „ 500
ad reman. colaturam „ 200
Sub finem coctionis adde
Fol. Sennae
Fruct. Foeniculi ss „ 5
Rad. Liquiritiae „ 10
M. S. Den Tag über zu
verbrauchen.
Anw. Gegen Hautaus-
schläge.

639 Resinae Guajaci
Pulv. rad. Rhei ss Grm. 8
Extr. Taraxaci liq. q. s.
M. F. pil. No. 120. Consp.
Lycop. S. Dreimal täglich
5—10 Stück.
Anw. Gegen Syphilis und
Gicht.

640 Tr. Guajaci ammoniatae
Vini stibiat. ss Grm. 15
M. S. Abends 1 Theelöffel
voll. **Schubarth.**
Anw. Gegen Gicht.

Gutti. Gummigutti.

Von einer Species *Hebraden-*
dron in Siam, Cambodscha.

Form und Gabe: 0,015—0,2
als Pulver, oder in Oel gelöst
zur Emulsion. Gern zur Ab-
treibung des bereits getöde-
ten Bandwurms. Wirkt aber
auch diuretisch und treibt die
Frucht ab. Auch in den Mori-
son'schen Pillen.

641 Gutti
Hydrarg. chlor. mit. ss Grm. 1,2
Rad. Jalapae
Sacchari albi ss „ 4,0
M. F. p. Div. in 4 partes
aequal. S. Zweistündlich 1
Pulver.
(Schola clinica Vindobonensis.)
v. **Hildenbrand.**
Anw. Gegen Bandwurm.

642 Gutti
Pulv. fol. Digitalis
Bulbi Scillae
Stibii sulfur. aurant.
Extr. Pimpinellae ss Grm. 1,5
M. F. pil. No. 50. Consp.
Lycop. S. Zwei-bis dreistünd-
lich 1 Pille.
Pilulae hydragogae **Heimii.**
Anw. Bei Wassersucht.

643 Gummi resinae Gutti Grm. 0,3
Roob Sambuci q. s.
F. bolus No. 1. S. Auf ein-
mal zu nehmen.
Bolus drasticus **Brerae.**
Anw. Dieselbe.

Helenii radix. Alantwurzel. (*Inula Helenium* L.)

Form und Gabe: 10—15
Grm. auf 150 zum Infus. Extr.
Helenii (*Consist. II*) 0,6—2,0.

Anw. Zur Anregung der Secre-
tion der Bronchi u. anderer Ab-
sonderungen; fast obsolet.

644 Radicis Helenii Grm. 8,0
Coque cum Aq. font. q. s.
ad rem. colat. „ 180,0
adde
Ammonii hydrochlor. „ 4,0
Tartari stibiat. „ 0,05
Syr. opiat. „ 15,0
M. S. Zweistündlich 1 Ess-
löffel. **Radius.**
Anw. Bei verschleppten
Catarrhen.

645 Extr. Helenii Grm. 4,0
Pulv. fol. Digitalis
„ rad. Ipeca-
„ canhae „ 0,6
Opii puri „ 0,3
M. F. pil. pond. Grm. 0,12.
Consp. pulv. Iridis flor.
S. Dreistündlich 1 Pille.
Pilulae bechicae **Heimii.**
Anw. Bei Catarrhen.