

Ernährungsmaterial für das durch verschiedene Cynipsarten verursachte pathologische Product der Gallae oder *Galläpfel*, welche indess auch auf zur Familie der *Sumachinae* gehörigen Pflanzen der Gattung *Rhus* producirt worden; vgl. Gallae p. 88.

Ratanhae radix. *Ratanhawurzel.* (*Krameria triandra Ruiz und Pavon.*)

Gerbstoffhaltiges Mittel nach den Indicationen des Tannin.

Form und Gabe: Innerlich zu 0,5—1,0 in Pulvern, Pillen, Decocten 5—15 Grm. auf 100—150; auch äusserlich zu Gurgelwässern, Injectionen, Klystieren, Streupulvern. Officinell sind:

1. **Extractum Ratanhae** (aqua-sum). *Ratanhaextract.* Zu 0,3—0,5; äusserlich zu 1,0—2,0 auf 30,0 zu Pinselsäften.

2. **Tinctura Ratanhae.** *Ratanhatinctur.* (1:5 Weingeist.) Zu 20—30 Tropfen; kaum anders als äusserlich; selten!

1150 Decocti rad. Ratanhae (15) Grm. 200

Tr. aromat. acidae „ 7

Syr. Cinnamomi „ 25

M. S. *Stündlich 1 Esslöfel.*

Sundelin.

Anw. *Bei Metrorrhagien.*

1151 Infusi fol. Digitalis (Grm. 2) Grm. 180

Extr. Ratanhae „ 2-4

M. S. *Dreistündlich 1 Esslöfel.*

Clarus.

Anw. *Bei Haemoptö.*

1152 Decocto rad. Ratanhae (15) Grm. 200

adde

Tr. Myrrhae „ 5

Spir. Cochleariae „ 25

M. S. *Mundwasser.*

Clarus.

Anw. *Bei Angina.*

1153 Extr. Ratanhae Grm. 10
Mellis rosati „ 50
Aq. Rosarum „ 15

M. S. *Pinselsaft.*

Anw. *Bei scorbutischer Beschaffenheit des Zahnfleisches.*

Rhei radix. *Rhabarberwurzel.* (*Rheum officinale Bail.*)

Wirkt in kleinen (anticatarrhalischen) Dosen durch Rheumgerbsäure verstopfend und zugleich Appetit machend, in grossen durch Cathartinsäure abführend; da später auch letzteren Falles die langsam resorbirte Gerbsäure zur Wirkung gelangt, so lässt die als Laxans benutzte Rhabarber eine Neigung zu Verstopfung zurück.

Form und Gabe: Als antidyseptisches und anticatarrhalisches Mittel zu 0,05—0,2 Grm.; als Laxans zu 2,0—4,0 Grm. in Verbindung mit Calomel, Jalapa, Tartarus depur. etc., in Pulvern, Pillen, Latwergen und Abkochungen. Officinelle Praeparate sind:

1. **Extractum Rhei.** *Rhabarberextract.* Zu 0,3—1,0 in Pillen als Laxans.

2. **Extractum Rhei compositum.** *Extractum catholicum s. panchymagogum. Zusammengesetztes Rhabarberextract (Consist. III).* Aloë und Jalapenseife enthaltend, 0,3 als mittlere Dosis.

3. **Tinctura Rhei aquosa.** *Wässrige Rhabarbertinctur.* (1:10) Thee- und esslöfelweise.

4. **Tinctura Rhei vinosa.** *Wei-nige Rhabarbertinctur.* 8 Th. Rhabarber, 2 Th. Pomeranzenschale, 1 Th. kleiner Cardamom, 12 Th. Zucker, 100 Th. Xereswein. Zu 2—5 Grm. mehrmals täglich als Appetit beförderndes Mittel.

5. Syrupus Rhei. *Rhabarbersaft*. 12 Th. Rhabarber, 3 Th. Zimmetcassie u. 100 Th. Wasser macerirt und in 80 Th. der Colatur 144 Th. bester Zucker gelöst. Kleinen Kindern theelöffelweise als Abführmittel.

6. Pulvis Magnesia cum Rheo. Pulvis infantum s. antacidus. *Kinderpulver*. 15 Th. Rhabarber, 60 Th. weisse Magnesia u. 40 Th. Fenchelölzucker. Messerspitzenweise.

1154 Rad. Rhei
Tartari depurati ꝑ Grm. 2
M. F. p. S. *Auf einmal zu nehmen.*

Jahn. Fordyce.

Anw. *Als Laxans.*

1155 Rad. Rhei Grm. 0,3-1,0
Magnesia carbon. Grm. 0,3
Elaeosacch. Foeniculi Grm. 0,6
M. F. p. S. *Morgens auf einmal zu nehmen.*

Berends.

Anw. *Als Abführmittel für ein 5—8 jähriges Kind.*

1156 Rad. Rhei Grm. 2,0
Magnesia carbon. „ 8,0
Rad. Valerianae „ 0,5
Elaeosacch. Foeniculi Grm. 4,0
M. F. p. S. *Zwei- bis dreimal täglich 1 Messerspitze.*
Pulvis puerorum.

Hufeland.

Anw. *Als Laxans.*

1157 Rad. Rhei Grm. 2,0
Extr. Chinae q. s.
M. F. pil. pond. Grm. 0,15.
Consp. pulv. cort. Cinnam.
S. *Abends und Morgens 5—10 Stück.*

Berends.

Anw. *Mildes Laxans.*

1158 Rad. Rhei Grm. 2
„ Calami „ 6
Inf. Aq. fervidae q. s.
ad rem. colat. „ 90
adde
Liq. Kali acetici „ 30
M. S. *Esslöffelweise.*

Choulant.

Anw. *Bei Verdauungsschwäche.*

1159 Rad. Rhei Grm. 15,0
Flaved. cortic. „
Aurant. „ 7,5
Cort. Cinnamomi „ 4,0
M. F. species. S. *Mit 1 Flasche Rheinwein 24 Stunden zu digeriren und abzuschauen; zweimal täglich ein Weinglas voll.*

Anw. *Dieselbe.*

1160 Rad. Rhei
Ferri lactici ꝑ Grm. 0,25
Sacchari Lactis „ 3,5
M. F. p. Div. in 8 partes
aequal. S. *4 Stück täglich.*

Mayr.

Anw. *Bei Dyspepsie der Kinder.*

1161 Extr. Rhei comp. Grm. 3,0
„ Colocynthidis „ 0,5
M. F. ope Mucil. gi. arab.
pil. No. 25. Consp. pulv. sem.
Foeniculi. S. *Abends 1—3 Stück.*

Frerichs.

Anw. *Gegen habituelle Verstopfung.*

1162 Pulv. rad. Rhei Grm. 3,0
„ „ Bella-
„ „ donnae „ 0,2
Extr. Taraxaci liquidi q. s.
M. F. pil. No. 50. Consp.
pulv. sem. Foeniculi. S. *Morgens und Abends 2 Stück.*

Anw. *Bei Koliken.*

- 1163** Pulv. rad. Rhei Grm. 3
 Extr. Aloës „ 2
 „ Taraxaci q. s.
 M. F. pil. No. 60. Consp.
 Lycop. S. *Täglich dreimal*
2 Stück.
 Anw. *Als gelind abführendes Mittel.*
- 1164** Fellis Tauri inspissati
 Saponis medic.
 Pulv. rad. Rhei
 Extr. Taraxaci ss Grm. 5
 M. F. pil. pond. Grm. 0,1.
 Consp. Lycop. S. *Morgens*
und Abends 5—10 Stück.
Hufeland.
 Anw. *Gegen Gastroduodenal-Catarrh.*
- 1165** Pulv. rad. Rhei
 „ „ Zingiberis
 „ „ ss Grm. 5
 Syrupi Zingiberis q. s.
 M. F. pil. No. 40. Consp.
 Lycop. S. *Täglich 1—4 Stück.*
Moselley.
 Anw. *Dieselbe.*
- 1166** Pulv. rad. Rhei
 „ „ Jalapae ss Grm. 2
 Tartari depurati „ 4
 M. F. boli pond. Grm. 0,4.
 S. *Täglich dreimal 2 Stück.*
 (Hospitaler zu Lyon.)
 Anw. *Dieselbe.*
- 1167** Mannae electae Grm. 15
 S. in Aq. Foeniculi „ 50
 Tr. Rhei aquosae „ 15
 M. S. *Stundlich 1 Essloffel.*
 Anw. *Als Laxans fur Kinder von 2 Jahren.*
- 1168** Rad. Rhei conc. Grm. 10
 Macerent. in Cerevisiae „ 1000
 per septem dies.
 S. *Weinglasweise.*
Sydenham.
 Anw. *Als Abfuhrmittel.*
- 1169** Infusi rad. Rhei (Grm. 4)
 Grm. 150
 Natri bicarbonici „ 5
 Syr. Sennae cum „ 15
 Manna „ 15
 M. S. *Zweistundlich 1 Essloffel.*
 Anw. *Dieselbe.*
- 1170** Pulv. rad. Rhei Grm. 5,0
 Opii puri „ 0,1
 M. F. p. Div. in 4 partes
 aequal. S. *Vor der Mahlzeit*
1 Pulver. (Codex franc.)
 Anw. *Bei Cardialgie.*
 NB. Bei bestehender Pyrosis
 Zusatz von Magnesia carbonica.
- 1171** Tr. Rhei vinosae
 Elixirii Aurantii comp.
 ss Grm. 20
 M. S. *Dreimal taglich 1*
Kaffeeloffel.
 NB. Kann auch noch mit 20—
 30 Grm. Aq. Menthae pip. ver-
 setzt werden.
G. A. Richter.
 Anw. *Dieselbe.*
- Ricini oleum.** Oleum Pal-
 mae Christi. Oleum Casto-
 ris. Ricinusol. (*Ricinus com-
 munitis L.*)
 Ein zuverlassiges, aber leider
 widerlich schmeckendes Laxans,
 als dessen Corrigentien Pfeffer-
 minze, guter Kaffee und einige
 Tropfen Chloroform (Emulsionen
 zugesetzt) zu nennen sind.

Form und Gabe: Innerlich $\frac{1}{2}$ —2 Esslöffel mehrmals täglich in Fleischbrühe oder Kaffee rein, in Gallertkapseln (unter Zusatz von Ol. Crotonis). Schüttelmixturen oder Emulsionen; äusserlich zu Klystieren, Pommeden und zum Bestreichen *wunder Brustwarzen*. Als eröffnendes Mittel im 1. Stadium der *Ruhr*, *Cholera*, des *Typhus*, bei *Kothinfarct*, *Verstopfung mit Koliken*, *Bleikolik*, *Verstopfung der Wüchnerinnen*.

1172 Ol. Ricini Grm. 30
Pulv. gi. Mimosae „ 8
Aq. Menthae pip. „ 15
„ communis „ 60
Syrupi simpl. „ 30

M. F. emulsio. S. Morgens
auf einmal zu nehmen.

Purgirende Emulsion mit Oleum
Ricini. (Codex franc.)

Anw. Als Laxans.

1173 Decocto cort. rad. Granati
(Grm. 15) Grm. 150
adde „ 30-50
Olei Ricini „ No. 1
Vitell. ovi „
Succi Citri Grm. 8

M. S. Stündlich 1 Esslöffel.

Fuchs.

Anw. Gegen Bandwurm.

1174 Ol. Ricini Grm. 32
Aetheris „ 8
M. S. Ein- bis dreistündlich
1 Theelöffel. **Alibert.**

Anw. Dieselbe.

1175 Ol. Ricini Grm. 200
Cetacei „ 40-50
Calefact. M. S. Theelöffel-
weise in Oblate zu nehmen.

Anw. Als mildes Laxans.

1176 Ol. Ricini Grm. 30-45
Vitell. ovorum No. 2
Infusi flor. Chamom. „
Grm. 180

M. S. Zum Klystier.

Berends.

Anw. Bei starker Ver-
stopfung.

1177 Ol. Ricini
Mellis crudi \frac{ss} Grm. 30
Decocti Althaeae „ 300

M. S. Zum Klystier.

(Codex franc.)

Anw. Dieselbe.

Sabadillae fructus. *Saba-*
dillsamen. Mexican. Läuse-
samen. Capuzinersamen. (Sä-
badilla officinalis Brandt.)

Veratrin neben Sabadillin, Sa-
batrin etc. enthaltend.

Form und Gabe: Innerlich (0,05—0,2) ganz obsolet und durch Veratrin (vgl. Veratrinum) ersetzt. Aeusserlich im Aufguss oder in Salbenform (1:10) gegen *Kopfläuse*.

Sabinae summitates. *Sade-*
baumspitzen. (Sabina offic-
inalis Garcke. [Juniperus
Sabina L.]

Wirksam darin Sadebaumöl.
Ein als Pellens vielfach zu ver-
brecherischen Zwecken gemiss-
brauchtes Mittel, welchem ebenso
wie der Raute (*Ruta graveolens*)
ein gewisser Odium anhaftet, so
dass man — von der Gefährlich-
keit desselben ganz abgesehen —
am besten thut, es möglichst sel-
ten zu verordnen. Nur wenn
Menostase ex torpore gefährliche
Symptome (z. B. *Manie*; *Schroff*)
im Gefolge hat, wird man sich
zum Gebrauch der Sabina ent-
schliessen. Aeusserlich dient
Sabinapulver zum Bestreuen bez.
Aetzen von *Feuchtwarzen*.