

FRUCTUS, seu POMUM.

Q. Saporis aciduli. Pro varietate specierum varians.

V. Eccoprotica; refrigerans.

U. Forma cataplasmatis adhibetur in ophthalmiis et ulceribus putridis. Succus e pomis communibus immaturis, Britannis Crabs dictis, expressus, in Anglia sub nomine Verjus venumdatur. E succo paratur fermentatione vinum pomaceum, Cider dictum.

QUASSIA EXCELSA.

SIMARUBA EXCELSA.

Квассия высокая; — горькая.

Arbor procera Indiæ Orientalis, Surinami et Americae australis, præsertim Jamaicæ ac insularum Caribbeanarum, externa facie ad fraxinum excelsiorem accedens. Cl. Decandr. O. Monogyn. O. N. Simarubeæ. Perennis. Usuale est:

LIGNUM, durum, leve, ex albo flavescentia, interne striis tenuibus notatum, cortice ex albo cinereo, fragili, tectum; summe amarum. Frustula crassiora cortice tecta tenuioribus sunt præferenda. Lignum Rhois Metopii distinguendum cortice glabro, hinc inde maculis nigris obpresso, cuius infusum a solutione sulphatis ferri nigreredit.

Q. Lignum fere inodorum est; saporis pure amari, in cortice intensoris. Analysis a THOMSON et BRACONNOT instituta, ligno Quassiæ inesse docuit principium amarum, gummi, oxalatem, tartratem, et sulphatæ calcariae, nec non chloridum calcii. SEVERI olei ætherei vestigia ibidem observavit; WITTING et BORNCHARP præterea ammoniam et phosphatæ sodæ in ligno Quassiæ contineri asseverant. Principium peculia-

re, a MORIN *Quassinum* dictum, ex opinione THOMSONI resinæ intime junctum est.

V. Tonica, quin irritet, adstringat, nauseam moveat alyumque ducat; stomachica; anthelmintica.

U. In dyspepsia et diarrhoea, meræ debilitati organorum concoctionis ansam debentibus, aptum remedium. Hypochondriacis et hysterics, vel ex abusu spirituorum ægrotantibus, adfert levamen. In febribus intermittentibus et remittentibus (in stadio convalescentiae), arthrodynia, et sudoribus phthisicorum foetulentis, nec non in helminthiasi, forma infusi, cum aqua vel vino parabilis, vel extracti instar, adhibetur. Memoratum dignum, muscas infuso ejus cum saccharo necari, illudque tutius, quam cobaltum aut arsenicum, in clavibus ad eas delendas distribui.

D. Infusum, ex semuncia ligni concisi et aquæ libra parandum, saepius in die cochleatim propinatur. Extractum datur a granis quindecim ad scrupulum, vino solutum, vel pilularum forma.

QUERCUS INFECTORIA.

» » CERRIS.

Лубъ чернильноорпышковый.

Frutex arborescens, præsertim in Asia Minorí frequens; in Rossia copiose crescit in montibus Chersonesi Tauricæ, inter Baktschisaray et Inkerman, nec non in maritimis Bosphori Cimmeriensis et Anatolia, ita quoque in Caucaso, præsertim ad fluvium Ksani circa Achalgori. Cl. Monœc. O. Polyandr. O. N. Amentaceæ. Cupuliferæ. Usuales sunt:

GALLÆ QUERNE (*Gallæ turcicæ, Чернильные орпухи*) sunt tumores morbosi foliorum petiolorumque punctura Cynipis (insecti hymenopteri) in Quercuum variis spe-

ciebus, præcipue vero in Quercu infectoria (foliis ova-to-oblongis, sinuato-dentatis, glaberrimis, deciduis, fructibus longissimis, sessilibus), ut OLIVIER, itinerator sive dignus, adseverat, nec non in Quercu Ægilope et Esculo excitati. Quæ a Mosula ad Tigrim proveniunt, sunt coloris nigricantis, verrucosæ, nucleo fusco referatae et imperforatae, atque pro optimis habentur; haud minoris aestimandæ sunt, quæ adseruntur ex Aleppo, Smyrna, Magnesia, Karahisser, Diarbekir ac interiori Anatolia; viliores vero existimantur Europææ, in Quercu Cerri aut Robore repertitiae, rubicundæ, vel albidae, perforatae, intus spongiosæ. In usum medicum seligendæ sunt exiguæ, ponderosæ, compactæ, aculeatæ; levæ vero, porosæ, coloris flavescentis, rejiciendæ.

Q. Styptica, ab acido tannico (aliis seytodepsico) copioso, et principio extractivo derivanda; acidum vero gallicum, monente PELOUZE, potius qua productum ex acido tannico oxydato considerandum est. Sapor valde acerbus; odor nullus; masticatæ friables, linguam faucesque vehementius constringentes.

V. Adstringens; antiseptica.

U. In hæmorrhoidæ cœca, unguentum e gallis in pulverem subtilem tenuatis, cum tantillo opii et pari adipis suillæ, aut butyri portione illinitur; vel si sedes alta in intestino recto est, infusum gallarum quernarum saturatum injicitur, quod fomenti instar juvat in prolapsu uteri et ani. ALCOCK suadet decoctum gallarum **Quercus** saturatus ad destruendas genitalium verrucas. Gargarisma quoque, pro re nata, non alienum. Consiendo atramento peridoneæ sunt.

D. Semuncia gallarum decoquitur in aquæ bilibra ad sesquilibram. Intus a granis decem ad serupulum cum aromaticis et amaris exhibitæ fuisse dicuntur.

QUERCUS ROBUR.

” ” **PEDUNCULATA.**

Дубъ обыкновенный.

Per omnem Rossiam temperatam et australiorem passim nemora efficit, et arbustim fere ubique prove-
nit; in borealibus vero oris naturaliter deficit. Cl. Mo-
nœc. O. Polyandr. O. N. Amentaceæ. Cupuliferæ. *Usua-
lia sunt:*

CORTEX ramorum (*Дубовая корка*) planiusculus,
subligneus, undique cinereus, extrinsecus longitudina-
liter subfissus, sære conspureatus lichenibus. Tenel-
lorum ramorum præfertur. NUCES, seu GLANDES; FOLIA
(*Дубовые желуди, листы*).

Q. Styptica, ab acido tannico imprimis pendens.
Odor fere nullus; sapor admodum stypticus, acerbitate
permistus, cum a junioribus decerpitur ramulis.

V. Adstringens topicia; antiseptica.

U. In cynanche atonica, relaxatione uvulæ, tumo-
ribus œdematosi, prolapsu uteri et ani, profluviis san-
guinis passivis, leucorrhæa muliebri, forma gargaris-
matis, fomenti, aut injectionis prodest. In ulceribus
putescentibus et carie, nec non in gangræna a cu-
bitu cum acetate plumbi, addito pro re nata tantillo
spiritus frumenti, decoctum saturatius, extrinsecus ad-
motum, utile est. Cortex pulveratus, sacculis lineis in-
ditus et vino immersus, in hernia, præcipue infantum,
salutaris aliquando extitit. Glandes tostæ, instar potus
coffœ, in atrophia utiles perhibentur. Decoctum folio-
rum laudatur in pernionibus, needum exhalceratis, fo-
menti vel balnei instar.

D. Decoctum corticis paratur ex uncia, vel duau-
bus, cum libra aquæ, ad dimidium consumpta, et ex-

trinsecus adhibetur. Glandium tostarum semunciae adfunditur aquæ selibra, et infusum partitis vicibus exhibetur.

RHEUM.

R. PALMATUM; — COMPACTUM.

Pecenb.

Planta in montibus excelsis Tartariæ Mongoliceæ et septentrionalibus Sinensis Imperii provinciis crescens. Cl. Enneandr. O. Trigyn. O. N. Polygoneæ. Perennis. Usualis est:

RADIX, magna, carnosa, solidæ texturæ, cortice dilute fusco obtecta; extrinsecus, resecto eodem, ex luteo aut croceo rubet, intus iisdem coloribus, et interdum etiam albido, variegata. Tres ejus numerantur varietates: a) R. Ruthenicum seu Sibericum, a Bucharis e Kiachta Mosquam delatum, unde in totam Europam exportatur; b) R. Chinense seu Tartaricum, quod ex urbe Canton ab Anglis in Europam adfertur; crescit in declivitatibus montium Tartariæ, qui a Chinensi urbe Si-ning ad lacum Koko - Nor usque prope Thibetum extenduntur, unde flumen Chou-cho originem dicit; in provincia Chinæ Shen-see colitur, ubi appellatur Hainhoun; c) R. Gallicum seu Europæum. Ruthenicum, caeteris præferendum. Varia prostat forma, nunc rotunda vel plana, nunc longinseula, rubieundi coloris aut albidi, interdum flavi; saporis peculiaris ingrati, amaricantis, parum adstringentis; masticatum stridet inter dentes, et salivam mox colore croceo tingit; in fractura refert superficiem venis quasi flavis, rubieundis, interdum fuscis, marmoris ad instar, distinctam. Rheum Chinense Ruthenico proxime accedit, per mare tamen vectum depravari dicitur. Tureicum, a quibusdam me-