




Dv 1501⁶



Fäll bängen från vinklar höj

Ernst Norstedt ~~1846~~

**PHARMACOPOEA
SUECICA.**



EDITIO SEXTA.

STOCKHOLMIÆ, 1846.
P. A. NORSTEDT & FILII,
TYPOGR. REG.

Handwritten notes at the top of the page, including a signature and some illegible text.

PHARMACOPŒA
STOCKHOLM.

APOTHEK ELSEN
STOCKHOLM
20 JUNI 1873
KARL AVARÉN 22
ADOLF WINCKLER

REVISED EDITION

STOCKHOLM, 1846.
P. A. NORSTEDT & PUBL.
LITTAERISKA

LECTORI.

ANNI octo et viginti jam elapsi sunt, postquam Pharmacopoeæ Suevicæ editionem quintam in publicum emisit Regium Collegium Sanitatis. Magni per illud temporis spatium progressus in arte chemica et pharmaceutica facti sunt, qui, quo magis universæ naturæ cognitioni profuerunt, uberioraque et certiora in usum Medicinæ subsidia suppeditarunt, eo magis etiam desideratum ac necessarium reddiderunt novum Pharmacopoeæ codicem et emendatum.

His de causis, satis illis quidem gravibus atque idoneis, veniam **Sacræ Regiæ Majestatis** et petiit et impetravit Collegium, ut delectis viris, in quibus fuit Professor Lib. Baro BERZELIUS operis moderator, additique Collegæ Professores P. F. WAHLBERG, C. G. MOSANDER, C. W. H. RONANDER, M. HUSS, J. S. BILLING, atque Pharmacopolæ A. PRIPP et C. ÅKERSTRÖM, et cooptatus denique adjutor Medicinæ ac Philosophiæ Doctor N. J. BERLIN, qui consulta delectorum et placita litteris mandavit, negotium committeretur, ut Pharmacopoeæ denuo conscribendæ curam agerent, conscriptamque ad Collegium deferrent cognoscendam et percensendam.

Quod ab his viris confectum est propositumque opus, postquam primæ totius lineæ et argumenta non solum cum Societate Medicorum Suecica, sed etiam cum ceteris Medicis, quotquot

vel in Regiis Universitatibus vel in reliqua patria medendi munere funguntur, communicata sunt, eorumque tum monitis tum desideriis, qua par erat fide ac diligentia, consultum, Collegii denique iudicio ac recognitioni est subjectum et, comprobante **Sacra Regia Majestate**, jam typis expressum in lucem emittitur, ut Sexta hæc veteris in locum succedat editio Pharmacopoeæ.

Si hæc cum iis, quæ ante editæ sunt, Pharmacopoeis comparatur, facile apparet, multa vel simplicia medicamina in materia pharmaceutica, vel composita pharmaca ac præparanda, exclusa abesse, atque eorum in locum partim nova alia inserta, partim veterum et scribendorum accurati res formulas et præparandorum sollertiores vias rationesque esse inventas. Neque tamen tot tantasque res simul complecti atque perficere licuisset, nisi pharmaceutica studia adeo crevisset, ut arti medicæ operam, quæ major hodie et exquisitior flagitatur, possent præstare.

Collegium itaque, quum, quantum consilio, arte rerumque usu provideri potuit, codicem paravit locupletem, ubi omnia, quæcumque res tempusque postulet, pharmaca litteris consignata habeantur, sperat fore, ut justis expectationibus quum omnium omnino civium, tum imprimis Medicorum, ægris operam navantium, satisfactum summa cum fide et industria esse videatur.

DATUM STOCKHOLMIÆ CAL. JULII MDCCCXLV.

REGIUM COLLEGIUM SANITATIS.



PONDERA ET MENSURÆ.

1. Mensura PEDIS SUECICI talis est, ut simplex in Observatorio Holmiensi pendulum quodcumque, subductis rationibus revocatum ad spatium aëre vacuum atque mediam quæ dicitur superfici marinx altitudinem, ad temperaturam $+15^{\circ}$ C., in nycthemero medio solari 86400 oscillationes facit vel in minuti medii solaris sexagesima parte semel oscillat, sit 3.350649 ejusmodi pedes*).

2. Est CONGIUS LIQUIDORUM (suetice *Kanna*) parti decimæ cubi hujus pedis æqualis.

3. Pondus LIBRÆ CIVILIS (suetice *Marf* vel *Sfålpund*) tali ratione determinatum est, ut congius aquæ destillatæ, aëre atmosferico saturatæ, ad temperaturam $+4^{\circ}$ C. et aquæ et aëris, quum hydrargyrum barometri ad temperaturam

*) 3.350649 pedis suecici = 0.9948 metri gallici = 440.99 lineis parisiensibus.

1. pes suc. = 0.29690 metr. gall. = 131.61 lin. par.

1 metr. gall. = 3.36815 ped. suc. = 443.296 lin. par.

1 pollex decimalis suecicus = 0.029690 metr. gall. = 13.161 lin. par.

Duodecima pedis pars (1 *verftum*) = 0.024742 metr. gall. = 10.968 lin. par.

0° C. altitudinem 25.6 pollicum decimalium habet, ejusmodi libris 6.15221 pondere æqualis sit *).

4. Est LIBRA MEDICINALIS $\frac{7416}{8878}$ vel 0.838155 libræ civilis; ideo grammata gallica 356.2470 æquat.

LIBRA uncias duodecim continet.

UNCIA drachmas octo continet; libræ civilis 0.0698463 vel grammatis gallicis 29,68725 æqualis.

DRACHMA scrupulos tres continet; libræ civilis 0.00873078 vel grammatis gallicis 3.710906 æqualis.

SCRUPULUS grana viginti continet; libræ civilis 0.002910262 vel grammati gallico 1.236969 æqualis.

GRANUM libræ civilis 0.0001455131 vel grammatis gallici 0.0618484 æquale est.

5. LIBRA MEDICINALIS NORVEGICA continet uncias duodecim; uncia drachmas octo; drachma scrupulos tres; scrupulus grana viginti. Est libr. med. suec. 1.004486 vel gram. gall. 357.8452 æqualis. Granum = 0.062 gram. gall.

Mensura norvegica Pot = 2.71 libr. med. suec. vel 0.369 cong. suec. **).

6. LIBRA MEDICINALIS DANICA continet uncias duodecim; uncia drachmas octo; drachma scrupulos tres; scrupulus grana viginti. Est libr. med. suec. 1.004486 vel gram. gall. 357.8452 æqualis. Granum = 0.062 gram. gall.

*) Libra civilis suecica = 425.0369 grammatis gallicis. Congius aquæ, circumstantiis supra indicatis, = 7.34018 libris suec. med. = 2614.915 gram. gall.

Pollex decimalis cubicus aquæ = 0.0615221 libræ civilis = 0.0734018 libræ med. = 26.14915 gram. gall.

**) Libra mercatoria norvegica (= 32 Pot) = 498.1137 gram. gall. = 1.17193 libr. civil. suec.

Pes norvegicus (= 12 pollices) = 0.31374 metr. gall. = 139.0808 lin. paris. = 1.0567 ped. suec.

pulos tres; scrupulus grana viginti. Est 1.003977 libr. med. succ. vel gram. gall. 357.6639 æqualis *). Granum = 0.062 gram. gall.

Mensura danica *Œot* = 2.67 libr. med. succ. = 0.363 cong. succ.

7. LIBRA MEDICINALIS GALLICA (*livre métrique*) continet uncias (*onces*) sedecim; uncia drachmas (*gros*) octo; drachma scrupulos tres; scrupulus grana viginti quattuor. Est libr. med. succ. 1.40352 vel gram. gall. 500.000 æqualis. Granum = 0.054 gram. gall.

Mensura gallica *Litre* = 2.80 libr. med. succ. = 0.382 cong. succ.

8. LIBRA MEDICINALIS BORUSSICA continet uncias duodecim; uncia drachmas octo; drachma scrupulos tres; scrupulus grana viginti. Est libr. med. succ. 0.984664 vel 350.7835 gram. gall. æqualis **). Granum = 0.0609 gram. gall.

Mensura borussica *Quart* = 3.21 libr. med. succ. = 0.437 cong. succ. ***).

9. LIBRA MEDICINALIS BAVARICA continet uncias duodecim; uncia drachmas octo; drachma scrupulos tres; scrupulus grana viginti. Est libr. med. succ. 1.010535 vel 360.000 gram. gall. æqualis. Granum = 0.0625 gram. gall.

*) Eandem omnino habent libram *Hamburgenses*, quorum mensura medicinalis = 2.00 libr. med. succ. = 0.272 cong. succ., et *Schlesvigo-Holsati*; hac, quæ dicitur libra norimbergensis, parum inter se discrepantes utuntur etiam *Fenni*, *Hannoverani* et *Russi*.

***) Eadem utuntur *Saxones*.

****) Mensura olim usitata *Berlinæ*: *Quart* = 2.95 libr. med. succ. = 0.402 cong. succ.

Mensura bavarica *Maasß* = 2.99 libr. med. suec. = 0.408 cong. suec.

10. LIBRA MEDICINALIS AUSTRIACA continet uncias duodecim; uncia drachmas octo; drachma scrupulos tres; scrupulus grana viginti. Est libræ med. suec. 1.178980 vel gram. gall. 420.009 æqualis. Granum = 0.073 gram. gall.

Mensura Viennensis *Maasß* = 3.95 libr. med. suec. = 0.540 cong. suec.

11. LIBRA MEDICINALIS ANGLICA (*Troy Pound*) continet uncias duodecim; uncia drachmas octo; drachma scrupulos tres; scrupulus grana viginti. Est libr. med. suec. 1.047617 vel gram. gall. 373.2103 æqualis. Granum = 0.065 gram. gall.

Mensura anglica *Imperial Gallon* (= 8 Octariis vel *Pints* = 160 Fluidunciis) = 12.72 libr. med. suec. = 1.736 cong. suec. *)

*) Alia mensura, in Anglia olim usitata, *Wine-Gallon* erat, cujus octava pars *Pint* vel Octarius = 1.32 libr. med. suec. = 0.180 cong. suec.



CANONES.

Vegetabilia indigena et adventitia culta

quotannis recentia, tempore sereno, a rore vacua colliguntur, indigena vero spontanea, nec usquam culta; collecta mundantur; mundata loco aëri pervio, aut filis suspensa aut linteo papyrove subjecto tenuibus stratis diffusa, diligenter siccantur, et quidem succulenta modici caloris ope, cetera aëris temperaturâ, ita tamen, ut colore mutabilia nullo sole afficiantur; perfecte siccata cum ceteris vegetabilibus, loco sicco frigidoque, *vel in scriniis ligneis vel in vasis vitreis, murrhinis metallicisve bene clausis*, servantur, ut et lux atque humiditas partesque pulverulentæ, quæ aëri insunt, quantum fieri possit, defendantur, et suus cuique color, suus odor et sapor melius ac diutius constet. Pharmaca aromatiea, narcotica et alia, materie volatili prædita, in vasis vel scriniis ita servantur, ut nulla aëris mutandi fiat occasio.

E *Pharmacis exoticis*, quorum plures inveniuntur species, prima quæque et præstantissima comparantur.

Radices perennes e plantis bimis trimisve, tempore autumnali, herbâ jam marcidâ vel fo-

liis delapsis, optime colliguntur, quod idem vernali tempore ante foliorum evolutionem fieri licet; celeriter lotæ et mundatæ vel in aère, vel, si crassiores sunt atque succulentæ, incisæ filisque suspensæ, modici caloris ope siccantur. Radices spongiosæ, cavæ et, si fruticum arborumque excipias, lignosæ rejiciuntur.

Bulbi itidem ut radices collecti, in retibus suspensi vel sabulo probe sicco immissi, recentes servantur.

Cortices et Ligna tempore vernali ante frondescentiam colliguntur, cortices autem plerumque e ramulis fruticum arborumque bimis, trimis, quadrimis.

Herbæ et Folia bene explicata, paullo ante florescentiam, vel, si aromatica sunt, eo ipso tempore, quo florent, colliguntur, plantarum tamen biennium etiam sub finem æstatis primæ. Folia succosiora et narcotica, ut Digitalis, Belladonnæ, cet., singula a se disjuncta, herbæ vero in parvos fasciculos colligatæ, filis suspenduntur et siccantur.

Flores et Summitates florentes, ut primum explicantur, colliguntur et, quum citius quam ceteræ plantarum partes mutantur, summâ diligentia siccantur et conservantur.

Fructus et Semina, matura plerumque, eliguntur, fructus tantum succulenti paullo ante summam maturitatem. Hi integri vel incisi, ca-

loris modici ope, celeriter siccantur. Semina quædam in pericarpis conservare præstat. Aromatica et oleosa citius, farinosa serius depravantur.

Medicaminum quantitates pondere tantum æstimandæ, non mensurâ aut guttulis. (Excipe Aetherolea in Elæosaccharis parandis).

Pondera liquidorum specifica ad temperaturam $+15^{\circ}$ thermometri centigradi vel Celsiusiani exploranda sunt.

Inter ceteras libras, in officina necessarias, semper sit libra, non manibus habilis, sed apto suspensa firmamento tamque mollis, ut eâ possit grani pars octava ponderari accuratissime. Pondera hujus libræ potissimum platinea sint (aliud *granorum decem*, aliud *quinque*, aliud *duorum*, aliud *geminum grani unius*, aliud *dimidii* (gr. $\frac{1}{2}$), aliud *quartæ* (gr. $\frac{1}{4}$), aliud *sextæ* (gr. $\frac{1}{6}$), aliud *denique octavæ grani partis* (gr. $\frac{1}{8}$) et in theca, ne mutantur, sollicitè servanda.

Bina singularum librarum brachia ne sint in tenues producta hamulos, quibus adfigantur lances; eaque adeo sint ad æquum exacta, ut utracumque lancula rem ponderandam acceperit, idem omnino pondus significetur.




Signorum Explicatio.

- * Materiem denotat, cujus sufficientem usui officinarum copiam patria præbere facile potest.
- ✂ Materiem denotat non nisi Medico jubente vel permissu Superiorum distribuendam.



MATERIA PHARMACEUTICA.



*ABSINTHIUM. Malört. *Artemisia Absinthium*

LIN.

Summitates florentes.

*synonyma
Compositae
Carrionkijere*

*ACETUM. Ättifa.

Acetum commune. Wanlig Ättifa. E spiritu frumenti.

Acetum vini. Winättifa. E vino.

Sint tantæ aciditatis, ut uncix duæ sufficiant ad carbonatis kalci puri et sicci drachmam perfecte saturandam.

Acetum pyroxylicum. Trädättifa. Destillatione ligni arboris cujusdam frondiferæ.

ACIDUM CITRICUM. Citronsyra.

ACIDUM MURIATICUM CRUDUM. Saltsyra.

Acidum hydrochloricum commune.

Pond. spec. circiter 1. 18 erit.

ACIDUM SUCCINICUM, quod dicitur SUBLIMATUM, vel SAL SUCCINI. Bernstensyra.

ACIDUM TARTARICUM vel SAL ESSENTIALE TARTARI. Winsyra.

ACIDUM VITRIOLI vel OLEUM VITRIOLI.

Swafwelsyra. Vitriololja. *Acidum sulphuricum commune.*

Pond. spec. 1. 85 erit.

*ACONITUM. Stormhatt. *Aconitum Napellus* LIN. et *A. Cammarum* LIN. In Europæ, præsertim Helvetiæ, montosis.

Folia recentia et siccata. *Polyporus*

ADEPS vide AXUNGIA.

AERUGO vel VIRIDE ÆRIS. Spanfgröna. *Subacetas cupricus.*

AGARICUS. Lärkträdschwamp. *Polyporus officinalis* FRIES. In Larice Europæ australioris parasiticus.

Fungus epidermide liberatus.

*AGARICUS CHIRURGORUM vide FUNGUS QUERCINUS.

ALCANNA. *Anchusa tinctoria* LIN. Europa australis.

Radix.

ALKALI MINERALE vide SODA.

ALKALI VEGETABILE vide POTASSA.

*ALLIUM. Swittlöf. *Allium sativum* LIN. Apud nos cultum.

Bulbus recens.

ALOË HEPATICA. *Aloë vulgaris* DE CAND., cet. India occidentalis (Barbadoës), cet. Optima ex India orientali obtinetur.

Succus foliorum inspissatus.

ALOË LUCIDA. *Aloë arborescens* DE CAND., *A. spicata* THUNB. et *A. linguæformis* THUNB. Caput bonæ spei, cet.

Succus foliorum inspissatus.

ALTHÆA. *Althæa officinalis* LIN. Europa media et australis.

Radix decorticata.

*ALUMEN CRUDUM vel VULGARE. Mun. *Sulphas aluminico-kalicus.*

K'S + Al'S

346736

AMMONIACUM CARBONICUM vel SAL VOLATILE. Kolsyrad Ammoniak. Sesquicarbonas ammonicus.

AMYGDALÆ AMARÆ. Bittermandlar. *Amygdalus communis* LIN. var. *amara*. Regio mediterranea, cet.

Nuclei integri.

AMYGDALÆ DULCES. Sötmandlar. *Amygdalus communis* LIN. var. *dulcis*. Regio mediterranea, cet.

Nuclei integri.

*AMYLUM. Stärkelse. E seminibus *Tritici vulgaris*, cet. vel e tuberibus *Solani tuberosi* LIN.

ANGELICA. *Archangelica sativa* FRIES. (*Angelica Archangelica* var. *sativa* LIN., *A. sativa* MILL.) Europa media et australis.

Radix.

*ANISUM. Anis. *Pimpinella Anisum* LIN. Europa meridionalis, apud nos culta.

Semina (achenia).

ANISUM STELLATUM. Stjernanis. *Illicium anisatum* LIN. Japonia, China, cet.

Pericarpia cum seminibus.

ANTIMONIUM CRUDUM. Natio Swafswelantimon. Spetsglans. *Sulphuretum stibicum nativum*.

*AQUA FORTIS. Skedwatten. *Acidum nitricum commune*. Pond. spec. 1. 23 erit.

*ARGENTUM. Silfwer.

*ARGENTUM FOLIATUM. Litta Bladsilfwer.

*ARMORACIA. Pepparrot. *Nasturtium Armoracia* FRIES. (*Cochlearia Armoracia* LIN.) Europa media, apud nos cultum.

Radix recens.

*Tatarogranum
n. Crucifera*

*ARNICA. Hästfibler. *Arnica montana* LIN.

Flores vix explicati.

Radix.

ARROW ROOT. *Maranta arundinacea* LIN.

et *M. indica* Tuss. India occidentalis et orientalis.

Amylum, Arrowmjöl, e rhizomatibus tuberosis paratum.

ARSENICUM ALBUM. Hvit Arsenik. Hvit Råttgift. *Acidum arsenicosum*.

*ARTEMISIA. Gråbo. *Artemisia vulgaris* LIN.

Fibrillæ radices sero autumno colligendæ et, sine lotionemundatæ, in vase bene clauso servandæ.

ARUM. Dansff Ingefära. *Arum maculatum* LIN.

Radix recens vel siccata in vase diligenter clauso servanda.

ASSA FOETIDA. Dyfvelsträck. *Ferula Assa foetida* LIN. Persia.

Gummi-resina e radice sauciata effluens. In massis vel frustulis durioribus, homogeneis, extus roseis vel dilute testaceis, intus albis sæpe roseo-venosis, odore fortiori.

*AVENA. Hafre. *Avena sativa* LIN.

AURANTIUM. Pomerans. *Citrus vulgaris* RISS O. (*Citrus Aurantium* var. *amara* LIN.) Arbor Orientis, in zonis calidis culta.

Flores (ol. *Flores Naphæ*) saliti.

Folia.

Fructus immaturi (ol. *Poma Aurantii*). Pomeransknopp.

Cortex fructus maturi siccatus. Pomeransskal.

*Cortices Aurantium Curassavien-*ses, parte spongiosa tenuiori, optimi.

AURUM. Guld.

AURUM FOLIATUM. *Äfta Bladguld.*

*AXUNGIA PHOCÆ. *Skälspäck. Phocæ et Halichæri species (Phoca variegata NILS., Phannellata NILS., Halichærus griseus NILS., cet.) Pinguedo subcutanea.*

*AXUNGIA PORCI vel ADEPS SUILLA. *Ewinifter. Sus Scrofa. LIN. Pinguedo omenti.*

BALSAMUM CANADENSE. *Canadabalsam. Pinus balsamea LIN. America borealis. Resina ætheroleo soluta ex arbore vulnerata effluens.*

BALSAMUM COPAIVÆ. *Copaivabalsam. Copaifera multijuga MART. et plures Copaifera species. America meridionalis, præsertim Brasilia. Resina ætheroleo soluta ex arbore sauciata stillans.*

BALSAMUM PERUVIANUM vel INDICUM NIGRUM. *Swart Perubalsam. Myrospermum peruiferum RICH. (Myroxylon peruiferum LIN. FIL.), cet. America calidior, Nova Granada præsertim et Peruvia. Balsamum naturale e ramulis caloris ope elixum.*

BALSAMUM TOLUTANUM. *Tolubalsam. Myrospermum toluiferum RICH. (Toluifera Balsamum LIN.) America meridionalis calida. Balsamum naturale e cortice vulnerato liquidum prodiens, demum solidescens.*

*BARDANA. *Starborre. Arctium Lappa LIN., cet. Radix nondum lignosa vel spongiosa, aute caulescentiam colligenda.*

Handwritten notes:
Syringium
composita
Corymbifera

***BELLADONNA.** *Atropa Belladonna* LIN. In montosis sylvaticis Europæ mediæ et meridionalis, apud nos culta.

*Pentandria
Sclerocera*

Folia filis suspensa loco umbroso siccanda et vase bene clauso servanda.

Radix.

BENZOË. *Styrax Benzoin* DRYAND. India orientalis, Sumatra præsertim et Java.

*Dicentra
Styracina*

Resina sic dicta amygdaloides.

***BERBERIS.** Berberis. *Berberis vulgaris* LIN. *Ulex in Palæstina*
Baccæ recentes.

***BETULA.** Björk. *Betula alba* LIN.

Folia tenera recentia. *monoclea emutata*

***BILIS BUBULA** vel **BOVINA**, **FEL TAURI.** *Oxgalla.* *Bos Taurus* LIN.

Bilis recens in vesica propria.

BISMUTHUM. Wismut.

BOLUS ARMENA. Rödglut Bolus. Fossilis Europæ australis, Asiæ minoris. *Argilla species.*

BORAX. *Biboras natricus.* *B. N. + B. H.*

BUCCO. *Diosma crenata* LIN., *Empleurum serrulatum* AIT. (*Diosma unicapsularis* LIN. FIL.) et cet. Promontorium bonæ spei.

*Diosma
Empleuro*

Folia breviora oblongo-elliptica vel obovata a Diosma, longiora anguste lanceolata ab Empleuro obtinentur.

***BUTYRUM** vide LAC.

CACAO. Chokoladböna. *Theobroma Cacao* LIN., cet. America calida. *Polyadelphia*

Semina de Caracas. *1/2 Butner aged*

CAJEPUT vide **OLEUM CAJEPUT.**

CALAMINA vel **LAPIS CALAMINARIS.** Gallmeja. *Carbonaszincicus nativus.* Fossilis Europæ.

= L. G. + L. H.

- *CALAMUS VULGARIS vel AROMATICUS.
 Ralfmus. *Acorus Calamus* LIN. *Nelumbodia*
Radix decorticata. *nf. Aroides.*
- *CALX VIVA vel USTA. Bränd och öfläckt Ralf.
Calx caustica communis.
- CAMPHORA DEPURATA. Renad Kamfer. *Camphora officinalis* NEES. (*Laurus Camphora* LIN.) Japonia, China. *Emmeandria.*
Ætheroleum concretum. nf. Laurineid.
- CANELLA ALBA vel COSTUS DULCIS. Svit
 Kanel. *Canella alba* MURR. India occidentalis,
 præsertim Jamaica. *Dodebandria =*
Cortex. nf. Guttiferid.
- *CANNABIS. Hampa. *Cannabis sativa* LIN.
 Planta Orientis, in Europa culta. *Dioecia*
Semina (nuculæ). nf. Urticid.
- ♁CANTHARIDES. Spanska Flugor. *Lytta ve-*
sicatoria FABR. In arboribus fruticibusve Ca-
 prifoliaceis et Oleineis Europæ mediæ et au-
 stralis frequentes, apud nos rariores. *Colloptera.*
Insecta integra.
- *CARAGHEEN vide LICHEN CARAGHEEN. *Compositæ*
Algeid.
- *CARBONAS CALCICUS NATIVUS e forma-
 tione primitiva. Urkalf. Bergkalf.
- CARDAMOMUM MINUS. Kardemumma. *Al-*
pinia Cardamomum ROXB. (*Amomum repens*
 SONNER.) India orientalis, præsertim Mala-
 baria. *monandria nf. Amomid.*
Semina matura, capsulis inclusa.
- *CARDUUS BENEDICTUS. Kardbenedikt. *Cni-*
cus benedictus GÄRTN. (*Centaurea benedicta*
 LIN.) Europa meridionalis; apud nos cultus.
Folia. Syngenesia nf. Compositæ =
Carduaceæ.

*CAREX ARENARIA. Sandstarr. *Carex arenaria* LIN. In maritimis arenosis.

Radix. *Monocotylis n. Cyperaceæ*

CARICA vide FICUS.

*CAROTA. Morot. *Daucus carota* LIN.

Radix culta, recens. *Sintandria n. Umbellif. ferb.*

*CARVUM. Kummmin. *Carum Carvi* LIN.

Semina (achenia). *ut supra.*

*CARYOPHYLLATA. Nejlifrot. *Geum urbanum* LIN. *Sicotandria n. Ranuncul.*

Radix primo vere legenda. *Sintandria.*

CARYOPHYLLI. Kryddnejlifrot. *Caryophyllus*

aromaticus LIN. India orientalis, imprimis insulæ Amboina et Banda. *ut supra.*

Flores nondum evoluti, siccati.

CASCARILLA. Kassarill. *Croton Eluteria* SWARTZ.

America calidior, Jamaica, cet. *Sicotandria.*

Cortex. *n. Euphorbiaceæ.*

CASTOREUM CANADENSE. Båfvergåll. *Castor*

Fiber LIN. Zonæ Europæ, Asiæ et Americæ arcticæ. *glies.*

Materia in sacculis binis majoribus juxta anum utriusque Castoris sexus contenta.

Hygum Leguminosæ. GATECHU vel TERRA JAPONICA. *Acacia*

Catechu WILLD., cet. India Orientalis.

Succus (extractum) e ligno paratus.

GENTAURIUM MINUS. Tufengyllen. *Erythræa*

Centaurium PERS. In Europa media et australi frequens, in Suecia rara. *Sintandria*

Summitates florentes. *n. Gentianaceæ.*

*CEPA. Rödölöf. *Allium Cepa* LIN. Apud nos cultum. *Hexandria n. Liliaceæ.*

Bulbus recens. *daphn. de led.*

- *CERA. Wax. *Apis mellifica* LIN.
Cera alba, per aplicationem candefacta.
Cera flava, e favis apum liquata. *Hymenoptera.*
- *CERASA ACIDA. Kersbär. *Prunus Cerasus*
 LIN. Ex Oriente; in Europa ubique culta. *Scandria*
Fructus (drupa) recens et siccata. Varietas
 austera (Moreller) eligenda. *off. Rosacea Drupa*
ged.
- *CEREFOLIUM HISPANICUM. Spanst Korf=
 vel. *Myrrhis odorata* SCOP. (*Scandix* LIN.)
 Europa; apud nos culta. *Pentandria* *off. Umbelli-*
ferd.
Herba ante florescentiam colligenda.
- *CERUSSA ALBA. Blyhwitt. *Hydrocarbonas*
plumbicus. *Pl. C. + Pl. H.*
- CETACEUM vide SPERMA CETI.
- *CHAMOMILLA NOSTRAS. Kamillblomnor.
Matricaria Chamomilla. LIN. *Synonymia*
Flores nuper explicati. *Composita - Corym-*
- CHINA. Kinarot. *Smilax China* LIN. China, *Sifed.*
 Japonia. *Dialgia* *off. Smilacined.*
Radix ponderosa vel orientalis.
- CINA LEVANTICA vel SANTONICUM LEVAN-
 TICUM. Levantist Massfrö. *Artemisia Con-*
tra LIN., cet. Asia media, Syria, cet. *Synonymia*
Semina. (Flores nondum explicati.) *Composita*
Corymbifera
- CINCHONA vel CHINA GRISEA DE HUANU-
 CO. Grå Kina. *Cinchona glandulifera* Ruiz.
 Andes Peruviani. *Pentandria* *off. Rubiaced.*
Cortex.
- CINCHONA vel CHINA REGIA seu CALISAYA.
 Rungskina. *Cinchona angustifolia* Ruiz. An-
 des novæ Granadæ. *off. DIALGIA*
Cortex.
- CINCHONA vel CHINA RUBRA. Röd Kina. *Cin-*
chona colorata Ruiz., cet. Andes Peruviae, cet.
Cortex. *off.*

Heg.

CINNABARIS RUBRA. Cinnober. *Sulphuretum hydrargyricum sublimatum.* (In frustulis.)

CINNAMOMUM CEYLANICUM. Afta Kanel. *Cinnamomum ceylanicum.* NEES. (*Laurus Cinnamomum* LIN.) Ceylon. *Caneandria*
Cortex interior, tenuis. *Nf. Laurined.*

CITRUS. Citron. *Citrus medica* LIN. Arbor Orientis, in Europa meridionali culta.

Fructus recens. *Polyadelphia Nf. Aurantia*
Cortex fructus maturi, recens et siccatus. *4ed.*
Citronskal.

Succus fructus maturi, excorticati, expressus et colatus. Citronsaft.

Oleum de Cedro (ætheroleum flavedinis.)

COCCIONELLA. Konfionell. *Coccus Cacti.* LIN.

In Cacto coccionellifero, cet. Americæ calidæ.

Feminæ integræ siccata. *Hemiptera.*

*COCHLEARIA. Skedört. *Cochlearia officinalis* LIN. In maritimis spontanea, alias culta.

Herba recens. *Tetradynamia Nf. Crucifera*

COLCHICUM. Nafna Jungfrun. Tidlösa. *Colchicum autumnale* LIN. Europa media et australis; apud nos cultum. *Hexandria*

Semina. *Nf. Colchicacea.*

COLLA PISCIIUM vide ICHTHYOCOLLA.

COLOCYNTHIS. Koloquint. *Cucumis Colocynthis* LIN. Regio mediterranea et variæ Africæ partes. *Monocia Nf. Cucurbitacea.*

Pulpa peponis excorticati, siccata seminibusque liberata.

*COLOPHONIUM. Harts. *Pini* species, præsertim *Pinus sylvestris* LIN. et *P. Pinaster* AIT.

Resina, post destillationem ætherolei e balsamo nativo, remanens et iterum igne liquata.

Monocia Nf. Conifera.

COLUMBO. Kolumborot. *Cocculus palmatus* DE
CAND. (*Menispermum palmatum* LAM.) Africa
orientalis, Mozambique. *Diœgia*

Radix. *mf. menispermaceæ.*

***CONIUM.** Sdört. *Conium maculatum* LIN.

Herba recens et siccata. *Pentandria mf. Umbellifera.*

CORALLIUM RUBRUM. Röd Korall. *Isis no-*
bilis LIN. Mare mediterraneum. *Sophyte.*

Pars interna calcærea, animali remotâ.

***CORIANDRUM.** Koriander. *Coriandrum sa-*
tivum LIN. Europa australis, apud nos cultum.

Semina (achenia). *Pentandria mf. Umbellifera.*

***CORNU CERVI.** Hjorthorn. *Cervus Elaphus*
LIN., *C. Alces* LIN., *C. Tarandus* LIN. Prior
apud nos cicur, ceteri indigeni.

Cornua integra et rasa.

COSTUS DULCIS vide **CANELLA ALBA.**

CREOSOTUM. Kreosot. *Oleum empyreumati-*
cum sui generis.

***CRETA ALBA.** Arita. *Carbonatis calcici na-*
tivi species friabilis, tingens. Fossilis Europæ.

CROCUS ORIENTALIS. Saffran. *Crocus sa-*
tivus LIN. Ex Oriente, in Europæ australis
regionibus montosis, Austriæ, Italiæ, Hispaniæ,
cet. cultus. *Triandria mf. Tridid.*

Stigmata.

Œ**CROTON** vide **GRANA TIGLII.**

CRYSTALLI TARTARI vide **TARTARUS DE-**
PURATUS.

CUBEBAE. Kubeber. *Piper Cubeba* LIN. India
orientalis, præsertim Java. *Diandria*

Baccæ nondum maturæ. *mf. Piperinæ.*

CYDONIA. *Qwitten.* *Cydonia vulgaris* PERS.
(*Pyrus Cydonia* LIN.) Arbor Orientis et Eu-
ropæ australis. *Alexandria* *Uf. Rosaceæ*
Semina. *Pomaceæ.*

CYMINUM. *Spiskummin.* *Cuminum Cyminum*
LIN. *Agyptus, cet.; in Europa australi cultum.*
Semina (achenia). *Pentandria* *Uf. Umbellif.*
ferd.

*DAUCUS vide CAROTA.

*DIGITALIS. *Fingerborgsört.* *Digitalis purpu-
rea* LIN. *Europa media et Norvegia; apud
nos plerumque culta.* *Didynamia*
Folia locis elevatis, apricis collecta, petio-
lis costisque liberata. *Uf. Scrophularineæ*

DIOSMA vide BUCCO.

*DULCAMARA. *Qweswed.* *Solanum Dulca-
mara* LIN. *Pentandria* *Uf. Solanaceæ.*
Stipites (caules sarmentosi) hyeme vel primo
vere colligendi.

§ELATERIUM ALBUM. *Ecballion Elaterium*
RICH. (*Momordica Elaterium* LIN.) *Europa
australis; apud nos interdum cultum.*

Succus e fructu submaturo abscisso sponte
prodiens, inspissatus. *Monoglia*
Uf. Cucurbitaceæ.

*ENULA. *Ålandsrot.* *Inula Helenium* LIN. *Eu-
ropa; apud nos plerumque culta.* *Syngenesia*
Radix. *Compositæ Corymbulifera.*

§EUPHORBIIUM. *Prusiskåda.* *Euphorbia offic-
inarum* LIN., *E. antiquorum* LIN. et *E. cana-
riensis* LIN. *Africa, India et insulæ Canarienses.*
Succus lacteus e planta vulnerata stillans,
in aëre solidescens. *Dodecandria*
Uf. Euphorbiaceæ.

*FEL TAURI vide BILIS.

*FERRUM.

*FERRUM. Zern.

Rasura. Zernswarffspån. E ferro cuso tor-
nando parata.

Limatura. Zernsilspån. E ferro nec ori-
chalco nec ære adglutinato. Servatur in
vase bene clauso.

FICUS PASSA vel CARICA PINGUIS. Terra
Fison. *Ficus Carica* LIN. Arbor Orientis et
Europæ australis. *Polygamia* *uf* *Urticæd.*
Fructus (cœnanthium).

*FILIX. Drimbunke. *Aspidium Filix Mas* SWARTZ. *Leopltay.*
Radix (rhizoma cum basibus frondium). *Filices!*

*FOENICULUM. Fenfål. *Foeniculum officinale*
ALL. (*Anethum Foeniculum* LIN.) Europa
australis; apud nos cultum. *Pentandria*
Semina (achenia). *uf* *Umbelliferæ.*

*FRAXINUS. Äst. *Fraxinus excelsior* LIN.
Cortex ramulorum. *Polygamia* *uf* *Jasminæd.*

*FULIGO SPLENDENS. Glansfot.

*FUMARIA. Jordröf. *Fumaria officinalis* LIN.
Herba florens. *Dicladophia* *uf* *Fumariæsed.*

*FUNGUS QUERCINUS vel AGARICUS CHI-
RURGORUM. Snöfßwamp. *Polyporus fo-*
mentarius LIN., *cet.* In arboribus frondosis
parasiticus. *Cryptogamia* *uf* *Fungi.*
Pars interior præparata.

GALANGA. Galgorot. *Alpinia Galanga* SWARTZ.
India orientalis, præsertim Sumatra. *Monandria*
Radix minor. *uf* *Amomæd.*

GALBANUM. Galbanum officinale DON. Asia
media

Gummi-resina e caule sauciato effluens. In
granis flavescenti-semipellucidis, separatis
vel concretis. *Pentandria*

uf *Umbelliferæ.* 3

GALLÆ TURCICÆ vel ALEPPENSES NIGRÆ.

Swarta Galläpplen. *Quercus infectoria* OLIV.

Asia minor, Syria, cet.

Cynips Excrescentiæ ramulorum punctura et depo-
Lucas.) sitione ovorum a Cynipe Gallæ tinctoriæ
 productæ. *Monoclea n. f. amantata*
capulifera

GAMBOGIUM vide GUMMI GUTTA.

GENTIANA RUBRA. Baggsöta. *Gentiana lu-*
tea LIN., *G. purpurea* LIN., cet. Alpes Eu-
 ropæ, præsertim Helvetiæ, Tyrolia; *G. pur-*
purea etiam Norvegiæ. *Pentandria*

Radix. *n. f. gentianeæ.*

*GLACIES. Is.

GLYCYRRHIZA vide LIQUIRITIA.

*GRAMEN. Quidrot. *Triticum repens* LIN.

Radix. *Tritandria n. f. granisæ.*

GRANA TIGLII. Croton Tiglium LIN. et C.
Pavana HAMILT. India orientalis.

Semina. *Dodecandria n. f. Cuscuta*
pinged.

GRANATUM. Granatträd. *Punica Granatum*
 LIN. Africa, Asia et Europa calidior.

Cortex radices. *Tetrandria n. f. Gra-*
nateæ.

*GRAPHITES. Blyerts. Carbo natus. Fos-
 silis Europæ.

*GRATIOLA. Jordgassa. *Gratiola officinalis* LIN.
 Europa media et australis; apud nos culta.

Herba. *Dicandria n. f. Scrophulari-*
nææ.

GUAJACUM vel LIGNUM SANCTUM. Poc-
 fenholz. *Guajacum officinale* LIN. India oc-
 cidentalis, præsertim Jamaica et Domingo.

Lignum. *Dodecandria n. f. Rutaceæ.*

Resina e trunco et ramis. *Polypodiaceæ.*

GUMMI AMMONIACUM. *Dorema armeniacum*
DON. Persia, cet.

Gummi-resina e planta sauciata effluens. In lacrymis vel amygdalis distinctis, interdum conglutinatis. *Pentandria*
ref. Umbelliferæ.

GUMMI ARABICUM. *Acacia Seyal* DELILE,
A. tortilis HAYNE, *A. Ehrenbergiana* HAYNE,
cet. Arabia, Ægyptus, Africa calidior.

Gummi e trunco et ramis arborum sponte exsudans, album, in frustula minuta facile dilabens. *Polygamia* *ref. Leguminosæ*

GUMMI GUTTA vel **GAMBOGIUM.** *Hebradendron Cambogioides* GRAHAM. Arbor Indiæ orientalis. *Polygamia* *ref. Guttiferæ.*

Gummi-resina e ramulis foliisque decerptis profluens, in aëre exsiccata.

***HÆMATITES.** Blodsten. *Oxidum ferricum nativum.* Fossilis Europæ.

♂**HELLEBORUS ALBUS.** Hvit Prustrot. *Veratrum album* LIN. Alpes Europæ. *Polygamia*
Radix fibris resectis. *ref. Colchicæ.*

♂**HELLEBORUS NIGER.** Swart Prustrot. *Helleborus niger* LIN. Alpes Europæ australioris.
Radix. *Polyandria* *ref. Ranunculaceæ*

***HIPPOCASTANUM.** Håstkastanie. *Æsculus Hippocastanum* LIN. Asia borealis; in Europa cultus. *Heptandria* *ref. Hippocastanæ*
Cortex ramulorum.

***HIRUDINES.** Blodiglar. *Sanguisuga medicinalis* SAVIGN., *S. albipuncta* WAHLBERG et *S. officinalis* SAVIGN. In aquis stagnantibus Europæ; priores apud nos indigenæ.
Animalia viva. *Intestina*

*HORDEUM. Korn. *Hordeum vulgare* LIN.,
H. distichon LIN., cet. *Tricandria*
 Crimna. Korngryn.
 Farina. Kornmjöl. *nf. Gramineæ.*
 Maltum. Malt.

*HUMULUS vide LUPULUS.

HYDRARGYRUS vel MERCURIUS VIVUS.
 Zwickſilſwer. *Hydrargyrum.*

*HYOSCYAMUS. Bolnört. *Hyoscyamus ni-*
ger LIN. *Pentandria nf. Solanaceæ.*
Folia recentia et siccata.

*HYSSOPUS. Iſop. *Hyssopus officinalis* LIN.
 Suffrutex Europæ meridionalis, apud nos cultus.
 Herba florens. *Dedynamia. Labiata.*

*JACEÆ HERBA vide VIOLA TRICOLOR.

JALAPPA. *Ipomoea Schiedeana* Zucc. America
 media, Mexico, cet. *Pentandria*
Radix. nf. Convolvulaceæ.

ICHTHYOCOLLA vel COLLA PISCIIUM. Suß-
 bläs. *Acipenser stellatus* PALL., *A. Gylden-*
stedtii BR. et R. ATZ., *A. ruthenus* LIN., *A.*
Huso LIN. In fluviis Russiæ meridionalis,
 mare Caspico et nigro. *Gondropterygii.*
Membrana interna vesicæ natatoria præpa-
rata. Optima albida, subdiaphana.

*IMPERATORIA. Mäſterrot. *Imperatoria Ostru-*
thium LIN. In convallibus alpium Europæ
 mediæ et australis frequens, apud nos sæpius
 culta. *Pentandria nf. Umbelliferae*
Radix.

INDIGO vel PIGMENTUM INDICUM. *Indigo-*
fera tinctoria LIN., *I. Anil* LIN., *I. argen-*
tea LIN., cet. India orientalis et occidentalis,
 Ægyptus, cet.

Pigmentum e foliis paratum.

Diadelphica nf. Leguminosæ.

JODUM. *Jod.*

IPECACUANHA. *Kräfrot.* *Cephaëlis Ipecacuanha* RICH. America meridionalis calida, præsertim Brasilia. *Putamina of Rubiacæ.*
Radix annulata, grisea vel fusca.

IRIS FLORENTINA. *Biolrot.* *Iris florentina* LIN. Italia. *Triandria of Ericetæ.*
Radix decorticata.

*JUGLANS. *Walnöt.* *Juglans regia* LIN. Arbor Persiæ, cet., in Europa et Suecia quoque australiori culta.

Putamina (pulpa druparum immatura, viridis). *monoecia of Juglandæ.*

*JUNIPERUS. *En.* *Juniperus communis* LIN.
Baccæ immaturæ. *Dioecia of Coniferæ*
Baccæ maturæ. *Gambuliferæ.*
Lignum radicis.

KALI ZOOTICUM vel BORUSSICUM. *Blodluttsfalt.* *Cyanetum ferroso-kalicum.*

KINO. *Drepanocarpus senegalensis* NEES (*Pterocarpus* HOOK.) et arbor Indiæ orientalis nondum satis nota. *Drepanocarpus* est arbor Africae occidentalis, imprimis Senegaliæ. *Dioecia of Leguminosæ.*
Succus inspissatus. *of Leguminosæ.*

*LAC VACCINUM. *Konjöst.* *Bos Taurus* LIN.
Butyrum. *Smör.* Recens, non salitum.
Cremor. *Grädde.*
Saccharum lactis. *Mjölksocker.* E sero paratum.

LACCA IN GRANULIS. *Gummi Lacca* i forn. *Aleurites laccifera* WILLD., *Ficus indica* VAHL et *F. religiosa* LIN., cet. India orientalis.

Materia resinosa, in frustula redacta, quæ puncturâ feminarum *Cocci Laccaë* e ramulis arborum elicitur et insecta ramulosque incrustat. *Polygamia of Urticæ.*

- ☉LACTUCARIUM ANGLICUM. *Lactuca sativa*
 LIN. et *L. virosa* LIN.; illa apud nos culta,
 hæc in Europa media spontanea.
Succus lacteus e planta sauciata effluens, in
 aëre inspissatus. *Synonyma: Compositæ*
- *LAPATHUM ACUTUM. *Hästyra. Rumex*
obtusifolius LIN., cet. *Herandria*
Radix. n. Polygonæ.
- *LAPILLI CANCRORUM. *Kräftstenar. Asta-*
cus fluviatilis FABR.
Concrementa calcarea.
- *LAPIS SUILLUS. *Orsten. Carbonas calcicus*
bituminatus. Fossilis.
- *LAVENDULA. *Lavendel. Lavandula Spica*
 WILLD. (*L. vera* DE CAND.). Suffrutex Eu-
 ropæ australis, apud nos cultus. *Didyma*
Flores nuper explicati. mia = Labiatæ.
Oleum (ætheroleum florum).
- LAURUS. *Lager. Laurus nobilis* LIN. Europa
 australis, cet. *Cuscutaria*
Baccæ (drupæ) siccatae. n. Lauræid.
Oleum e drupis expressum.
- *LEDUM vide ROSMARINUS SYLVESTRIS.
- *LEVISTICUM. *Libsticæ. Levisticum officinale*
 KOCH. (*Ligusticum Levisticum* LIN.) Europa
 australior; nobis hortense.
Radix. Pentandria n. Umbellifera
- *LICHEN CARAGHEEN. *Sphærococcus crispus*
 AG. Ad littora Angliæ et Hiberniæ frequens,
 nec non Sueciæ occidentalis et Norvegiæ passim.
Planta integra. Cryptogam: Liches.
- *LICHEN vel MUSCUS ISLANDICUS. *Islands-*
moða. Cetraria islandica ACH. In montosis
 & sylvaticis Europæ borealis.
Planta integra.
Cryptogamia n. Lichenes.

LIGNUM CAMPECHIANUM. Campecheträd. *Hæmatoxyton campechianum* LIN. America calidior. *Leguminosa n. leguminosa*.
Lignum.

*LINUM. Lin. *Linum usitatissimum* LIN.
Semina. *Pentandria n. lineæ*.
Oleum seminibus expressum.

LIQUIRITIA vel GLYCYRRHIZA. Lakritzrot.
Glycyrrhiza glabra LIN. Europa meridionalis.
Radix excorticata. *Diadelphica n. leguminosa*.
Succus (extractum radiceis siccum). Lakritz.

*LITHARGYRIUM. Glete. Silfverglitt. Oxidum plumbicum ex argenti cupellatione.

*LUPULUS vel HUMULUS. Humle. Humulus Lupulus LIN. *Dioecia n. urticæ*.
Strobili cum seminibus.

*LYCOPODIUM. Gul Nicht. *Lycopodium clavatum* LIN. *Cryptogamia n. lycopodia*.
Semina vel Farina (sporæ). *sed*

MACIS vide NUX MOSCHATA.

MAGNESIA ALBA. Magnesia. Hydrocarbonas magneticus. *ingl. + myth.*

*MAGNESIUM NIGRUM. Brunsten. Superoxidum manganicum nativum. Fossile. *Mn*

*MALTUM vide HORDEUM.

*MALVA. Kattoß. *Malva rotundifolia* LIN. & *M. pusilla* WITH. *Monadelphica n. malvæ*.
Folia.

MANNA ELECTA vel CALABRINA OPTIMA.

Ornus europæa PERS. (*Fraxinus Ornus* LIN.)

Europa australis, Calabria præsertim et Sicilia.

Succus, sponte vel arboris vulneratione, e trunco ramisque exsudans et in aëre induratus.

Polygamia n. leguminosa.

- MARUM. Kattgräs. *Teucrium Marum* LIN.
Suffrutex Europæ australis. *Didymaria*
Herba florens. *Uf. Labiate*
- MASTIX vel MASTICHE. *Pistacia Lentiscus*
LIN. Arbor Orientis et Europæ australis.
Resina. *Dioecia Uf. Terbinthaceæ*
- *MEL. Honing. *Apis mellifica* LIN.
Materia saccharina e nectariis florum ab
apibus collecta et parata. E favis sponte
stillans.
- *MELILOTUS. Meloten. *Melilotus officinalis*
LAM. *Diadelphia Uf. Leguminosæ*
Herba cum floribus.
- *MELISSA CITRINA. Citron-Meliß. *Melissa*
officinalis LIN. Europa media & australis;
apud nos culta. *Didymaria Uf. Labiate*
Herba florens.
- *MENTHA CRISPA. Krußmynta. *Mentha crispa*
LIN., *cet.* (plurium Mentharum formæ crispæ,
imprimis *M. sylvestris* et *M. sativæ*, cultæ et
culturâ ortæ).
Herba, floribus nuper explicatis. *Uf. Labiate*
- *MENTHA PIPERITIS. Pepparmynta. *Mentha*
piperita LIN. et *M. Langii* STEUD. Anglia;
apud nos culta.
Herba efflorescens. *Uf.*
- MERCURIUS VIVUS vide HYDRARGYRUS.
- *MEZEREUM. Tibast. Källerhals. *Daphne Me-*
zereum LIN. *Oxyandria Uf. Thymelææ*
Cortex trunci et radice.
- *MILLEFOLIUM. Köllefa. *Achillea Millefo-*
lium LIN.
Summitates (corymbi) florentes.
Syngenesia Uf. Compositæ
Corymbulifera

MINIUM. Mönja. *Superoxidum plumbicum cum Oxido plumbico junctum. P⁶+20P⁶.*

MOSCHUS TUNQUINENSIS vel CHINENSIS.

Stifta Myss eller Deßman. *Moschus moschiferus* LIN. Alpes Asiæ mediæ, ut regni Tibetani, Chinæ.

Materia propria, folliculo sub ventre maris pone umbilicum posito inclusa. Folliculi integri, textu celluloso intersepti et moscho repleti.

*MUSCUS ISLANDICUS vide LICHEN.

MYRRHA ELECTA. *Balsamodendron Myrrha*

EHRENB., cet. Arabia, cet. *Pentandria Gummi-resina. n. f. Turbinthaceæ.*

*MYRTILLUS. Blåbär. *Vaccinium Myrtillus*

LIN. *Pentandria n. f. Vaccinæ*
Baccæ siccatae.

NAPHÆ FLORES vide AURANTIUM.

*NICOTIANA vel TABACUM. Tobak. *Nicotiana Tabacum* LIN. America calidior; apud

nos culta. *Pentandria n. f. Solanaceæ.*

Folia recentia et siccata.

*NITRUM CRUDUM. Rå. Salpeter. *Nitras*

kalicus communis. K. K.

NUX MOSCHATA. Muskot. *Myristica moschata* LIN. Arbor indiæ orientalis, insularum præsertim Moluccensium. *Dioecia*

Macis (arillus). Muskotblomma. *n. f. Myristicæ*

Oleum Macidis (ætheroleum arilli). *gineæ*

Nux (nucleus putamine liberatus).

Oleum. Muskotbalsam. E nucleis expressum.

¶NUX VOMICA. Råffaka. *Strychnos Nux vomica* LIN. India orientalis.

Semina fructus majoris baccati.

Pentandria n. f. Strychnæ.

OLEUM ANTHOS vide ROSMARINUS.

OLEUM BERGAMOTTÆ. Bergamottolja. *Citrus Bergamium* RISSO. Arbor Asiæ, in Europa australi culta. *Polyadelphus of aurant*
Ætheroleum e flavedine fructus. tiaged.

OLEUM CAJEPUT. Cajeputolja. *Melaleuca Cajeput* ROXB., cet. India orientalis.
Ætheroleum foliorum. Polyadelphus myrtacæ.

OLEUM CASSIÆ. Kanelolja. *Cinnamomum aromaticum* NEES. (*Laurus Cassia* AIT.) India orientalis, China. *Cineandria of Laurinæ.*
Ætheroleum corticis & florum.

OLEUM DE CEDRO vide CITRUS.

OLEUM JECORIS ASELLI FLAVUM et FUSCUM. Gul och brun Lefwertran eller Stockfistlefwertran. *Gadus Morrhua* LIN. aliæque Gadi species, Norvegia, cet. *Malacocephalus*
Oleum hepatis, optimum Bergense. sygdi

OLEUM LAVENDULÆ vide LAVENDULA.

OLEUM LINI vide LINUM.

OLEUM MACIDIS vide NUX MOSCHATA.

OLEUM NUCIS MOSCHATÆ vide NUX MOSCHATA.

OLEUM OLIVARUM. Olivolja. *Olea europæa* LIN. Arbor Europæ australis aliarumque regionum calidarum, ex Asia orta.

Oleum e drupis expressum. Diandria
O. commune. Bomolja. of Jamineæ.
O. florentinum vel provinciale. Matolja.

OLEUM ORIGANI CRETICI. *Origanum smyrnæum* LIN., cet. Regio mediterranea orientalis.
Ætheroleum e spicis paratum. Diandria

OLEUM PALMÆ. Palmolja. *Elais guineensis* JACQ. Guinea; in America calida, cet. culta.
Oleum e pericarpio expressum.

Diocgia of Palmæ.

OLEUM PETRÆ vide PETROLEUM.

OLEUM RICINI. Ricinolja. *Ricinus communis* LIN. Zonæ calidæ. *monoclea*

Oleum e seminibus expressum. n. f. Euphorbiacee

OLEUM SUCCINI CRUDUM. Bernsteinolja.

Oleum empyreumaticum Succini.

OLEUM TEREBINTHINÆ. Terpentinolja. *Pinus*

Pinaster AIT. (*P. maritima* LAM.) Eu-

ropa australior. *monoclea n. f. Coniferae.*

Ætheroleum crudum.

OLEUM VITRIOLI vide ACIDUM VITRIOLI.

OLIBANUM, ol. THUS VERUM. Biraf. *Bos-*

wellia serrata COLEBR. India orientalis.

Materia resinosa, sponte vel arbore sauci-

ata, e trunco prodiens et in aëre soli-

descens. D. Candria n. f. Terbinthacee

♁ OPIUM LEVANTICUM seu SMYRNÆUM.

Papaver somniferum LIN.

Succus lacteus e capsulis sauciatis stillans,

concretus. D. Candria n. f. Papaveracee.

*OSSA BOVIS vel PECORUM. Orben. *Bos*

Taurus LIN.

OSSA SEPIÆ. Svalstiffjäll. *Sepia officinalis*

LIN. In mare, præsertim mediterraneo.

Scutum dorsale. matronalis. n. f. Molluscorum

*OVUM GALLINACEUM. Hønsägg. *Gallus*

domesticus BRISS.

*OXYCOCCUS. Tranbär. *Oxycoccus palustris*

PERS. (*Vaccinium Oxycoccus* LIN.)

Baccæ recentes. D. Candria n. f. Vaccinæe.

*PADUS. Hagg. *Prunus Padus* LIN.

Cortex ramulorum.

Scandinavica n. f. Rosacee Dru-
fractæ

*PAPAVER. *Wassino.* *Papaver somniferum*
LIN. Ex Oriente; apud nos cultum.

Capita (capsulæ nondum maturæ, semini-
bus liberatæ). *Pentandria*

Semina matura. *Uff. Papaveraceæ.*

Succus concretus vide OPIUM.

PASSULÆ MAJORES vel UVÆ PASSÆ. *Ruß-*
fin. *Vitis Vinifera* LIN. Frutex sarmentosus
ex Oriente introductus, ab antiquissimis tem-
poribus in Europa media & australi, cet. cultus.

Baccæ maturæ siccatae. *Pentandria*
Uff. Ampelides.

PASSULÆ MINORES vel CORINTHIACÆ. *Rö-*
rinter. *Vitis vinifera* var. *apyrena* LIN. Fru-
tex sarmentosus, in insulis maris Ægei cultus.

Baccæ maturæ siccatae. *ut supra*

PECHURIM FABÆ. *Kryddböna.* *Ocotea Pu-*
chury major MART. (*Nectandra* NEES.) Amer-
rica calida, præsertim Brasilia. *Encandria*

Cotyledones majores. *Uff. Laurineæ.*

PETROLEUM vel OLEUM PETRÆ. *Bergolja.*
Ætheroleum nativum. Fossile Asiæ, Europæ.

*PETROSELINUM. *Verfilja.* *Petroselinum sa-*
tivum HOFFM. (*Apium Petroselinum* LIN.) Eu-
ropa australis; apud nos cultum. *Pentandria*

Semina (achenia). *Uff. Umbelliferæ.*

*PHELLANDRIUM. *Stäfra.* *Phellandrium aqua-*
ticum LIN.

Semina (achenia). *ut supra*

ÛPHOSPHORUS. *Fosfor.*

PIGMENTUM INDICUM vide INDIGO.

*PIMPINELLA. *Pimpinella Saxifraga* LIN.
Radix.

Pentandria Uff. Umbelliferæ. *PINUS.

*PINUS. Tass. *Pinus sylvestris* LIN.

Turiones (ramuli nondum explicati.) Tass.
strunt. Primo vere colligendi.

Colophonium

Pix

Resina flava

Terebinthina communis

} vide suis
locis.

Monocotyl. Conifera.

PIPER ALBUM. Hvitpeppar. *Piper nigrum*

LIN. India orientalis.

Semina matura, pulpâ remotâ. *Diandria*
sp. Piperinæ.

PIPER HISPANICUM vel INDICUM. Spanst

Peppar. *Capsicum annuum* LIN. America

calida, India; in Europa cultum. *Pentandria*

Baccæ submaturæ, siccatae. *sp. Solanacæ.*

PIPER JAMAICENSE. Kryddpeppar. Piment.

Eugenia Pimenta DE CAND. (*Myrtus Pi-*

menta LIN.) India occidentalis. *Tetrandria*

Baccæ nondum maturæ, siccatae. *sp. Myrtacæ.*

*PIX. *Pinus sylvestris* LIN.

P. liquida. Tjära. *Monocotyl. Conifera.*

P. solida vel sicca. Beck.

*PLUMBUM LAMINATUM. Balsadt Bly.

*POLYPODIUM. Stensöta. *Polypodium vul-*

gare LIN.

Radix. *Cryptogamia sp. Filices.*

*POMA ACIDULA. Sura Äpplen. *Pyrus Ma-*

lus LIN.

Fructus recens arboris cultæ. *sp. Rosacæ - Pomacæ.*

*POTASSA CALCINATA vel ALKALI VEGE-

TABILE FIXUM IMPURUM. Pottaska. Car-

bonas kalicus communis.

PYRETHRUM. Bertramörot. *Anacyclus Py-*

rethrum SCHRAD. Regio mediterranea; va-

rietas in Thuringia culta.

Radix.

Syngenesia sp. Compositæ

- *Corymbifera*

QUASSIA. *Quassia amara* LIN. et *Simaruba excelsa* DE CAND. Hæc Surinamensis, illa Jamaicensis.

Lignum. *Digandria* *vsq. Simarubæ.*

*QUERCUS. Cf. *Quercus Robur* LIN.

monœcia Cortex trunci, parte exteriori remotâ.

vsq. amentag. Glandes. *Osion.* Decorticatæ, siccata.

Cupuliferæ RANUNCULUS ALBUS. *Switzippa.* *Anemone nemorosa* LIN.

Herba recens cum floribus. *Polyandria* *vsq. Ranunculag.*

RATANHIA. *Krameria triandra* RUIZ et PAV., cet. Peruvia.

Radix. *Triandria* *vsq. Kramerag.*

Extractum, origine incertum.

REGULUS ANTIMONII vide STIBIUM.

RESINA ELASTICA. *Kautschuf.* *Siphonia elastica* PERS., cet. America calida, Brasilia, Guyana, cet. *monœcia* *vsq. Cuphorbiag.*

Materia propria, emulsionis formâ ex arbore vulnerata effluens, in aëre demum solidescens. Lagenæformis eligenda.

RESINA FLAVA. *Ljust Hartz.* *Pini species*, præsertim *P. Pinaster* AIT. *monœcia* *vsq. Coniferæ.*

Resina e balsamo nativo parata.

RHEUM vel RHABBARBARUM INDICUM vel CHINENSE. *Indisch eller Chinesisch Rhabarber.*

Rhei species nondum satis notæ (Rh. palmatum LIN.? Rh. australe DON?, cet.) Montes altiores Asiæ mediæ, Regni Tibetani, China, cet.

Radix mundata. *Emœndria* *vsq. Polygonæ.*

*RIBES NIGRUM. *Swarta Winbär.* *Ribes nigrum* LIN. *Pentandria* *vsq. Grossulariæ.*

Folia tenera.

Baccæ recentes, et conditæ calycibus liberatæ.

*RIBES RUBRUM. Röda Vinbär. *Ribes rubrum* LIN. *ut supra*
Baccæ recentes.

RICINUS vide OLEUM RICINI.

*ROSA DOMESTICA vel PURPUREA. Ättifrosor. *Rosa gallica* LIN. Frutex Europæ australioris, apud nos cultus.

Petala, ante perfectam explicationem collecta, unguibus resectis. *Rosandru* *ut Rosaceæ*

*ROSA MULTIPLEX vel INCARNATA. Dubbla Törnrosor. *Rosa centifolia* LIN. Frutex in Europa ubique cultus.

Petala recentia vel salita. *ut supra*

ROSMARINUS. Rosmarin. *Rosmarinus officinalis* LIN. Europa australis. *Dianthia*
ut Labiata.

Oleum Anthos (ætheroleum).

*ROSMARINUS SYLVESTRIS vel LEDUM.

Squatram. Getporå. *Ledum palustre* LIN. *Dianthia*
ut Crisicæ.

Summitates florentes (flores cum foliis).

*RUBUS IDÆUS. Hallon. *Rubus idæus* LIN.

Baccæ recentes. *Rosandria* *ut Rosaceæ - Gentiane.*

SABADILLA. Sabadill. Husarfrö. *Sabadilla officinalis* BRANDT, cet. Planta Mexicana.

Semina capsulis inclusa. *Polygonia* *ut Boraginæ.*

SABINA. Säfvenbom. *Juniperus Sabina* LIN. *ut.*

Europa australis. *Diccia* *ut Coniferæ - Galbuliferæ.*

Ramuli tenerrimi.

SACCHARUM. Socker. *Saccharum officinarum*

LIN. ex India orientali, nunc in omnibus fere regionibus calidis cultum, et *Beta vulgaris*

LIN. var. *saccharina.*

Saccharum album. Raffineradt Socker.

Saccharum candum. Bröjsocker.

Triandria *ut Graminæ.*

- SACCHARUM LACTIS vide LAC.
- SACCHARUM SATURNI. Blysocker. *Acetas plum-
bicus communis.*
- SAL ACETOCELLÆ. Harsyresalt. Bläckpulwer.
Bioxalas kalicus. Gecandria of Oxalided.
- SAL AMMONIACUM DEPURATUM. Salmiaf.
Chloretum ammonicum.
- SAL CATHARTICUM vel ANGLICUM vel SED-
LICENSE. Bittersalt. Engelsft Salt. *Sulphas
magneticus.*
- SAL COMMUNE vel CULINARE. Roffalt. *Chlo-
retum natricum.*
- SAL ESSENTIALE TARTARI vide ACIDUM
TARTARICUM.
- SAL GLAUBERI vel ALKALI MINERALE VI-
TRIOLATUM. Glaubersalt. *Sulphas natricus.*
- SAL SUCCINI vide ACIDUM SUCCINICUM.
- SAL VOLATILE vide AMMONIACUM CAR-
BONICUM.
- SALEB. *Orchidis species, præsertim orientales; ex
Europæis O. Morio LIN., O. mascula LIN., cet.
Radix (tubera). Gynandria of Orchidea.*
- *SALIX. Jolster. *Salix pentandra LIN.
Cortex ramulorum. Dioecia of Salicina.*
- *SALVIA. *Salvia officinalis LIN. Suffrutex Eu-
ropæ australis, apud nos cultus. Diandria
Folia. of Labiate*
- *SAMBUCUS. Fläder. *Sambucus nigra LIN.
Flores (cymæ florentes). Pentandria
Baccæ recentes. of Caprifoliaceæ*
- SANGUIS DRACONIS. Drackblod. *Calamus Dra-
co LIN., cet. India orientalis, Sumatra præ-
sertim. Hexandria of Palma.*

Resina e fructibus squamulosis sponte ex-
sudans.

In lacrymis vel baculis.

SANTALUM RUBRUM. Rödtt Sandelträd. *Pterocarpus Santalinus* LIN. FIL. India orientalis.

Lignum. Alexandria n. f. Leguminosae.

SANTONICUM vide CINA.

SAPO ALBUS HISPANICUS vel DURUS ALICANTINUS. Silfestwål. *Sapo natricus* ex Oleo Olivarum.

SAPO E BUTYRO vel AD OPODELDOC. Smörswål.

*SAPO MOLLIS NIGER vel VIRIDIS. Grön Såpa. *Sapo kalicus* ex Oleo seminum Cannabis et sevo.

*SAPONARIA. Såpört. *Saponaria officinalis* LIN. Europa media et australis; apud nos plerumque culta.

Radix. Alexandria n. f. Caryophyllaceae.

SARSAPARILLA. Sarsaparill. *Smilacis* species (*S. media* SCHLECHT., *S. syphilitica* HUMB., *S. officinalis* KUNTH, cet.). America media. *Dioecia n. f. Smilacineae.*

Radix. De Honduras eligenda.

SASSAFRAS. *Sassafras officinalis* NEES. (*Laurus Sassafras* LIN.) America septentrionalis.

Radix cum cortice. Alexandria n. f. Laurineae.

SCAMMONIUM ALEPPENSE. *Convolvulus*

Scammonia LIN. Asia media, Syria. *Alexandria n. f. Convolvulaceae.*

Succus lacteus radice sauciatae concretus. sed.

SCILLA. Sjölöf. *Scilla maritima* LIN. In maritimis regionis mediterraneae. *Alexandria*

Radix (squamae bulbi). Liliaceae - asphodel.

- *SCORDIUM. Gamander. *Teucrium Scordium*.
LIN. In Europa media et australi frequens,
apud nos rarius. *Dedynamia* *of Labiate*.
Herba.
- *SECALE. Råg. *Secale cereale* LIN.
Farina seminum subtilissima. Råginjöt.
- *SECALE CORNUTUM. Mjölöfa. Mjöldryga.
Spermoedia Clavus FRIES.
Semina secalis fungoso-morbosa, ante per-
fectam maturitatem e spicis in agro col-
ligenda. *Triandria* *of Gramineæ*.
- *SEDUM ACRE. Fettnopp, Hällegräs. *Sedum*
acre LIN. *Dicandria* *of Craspedalæ*.
Herba recens.
- SENEGA. *Polygala Senega*. LIN. America
borealis, Virginia imprimis et Pensylvania.
Radix. *Diadelphica* *of Polygalæ*.
- SENNA sic dicta ALEXANDRINA. Alexandrin-
ska Sennetsblad. *Cassia acutifolia* DELILE
(*C. Senna* var. α LIN.) et *C. obovata* COL-
LAD. Ægyptus, Nubia, cet.
Foliola utriusque plantæ ita mixta, ut præ-
ponderet *C. acutifolia*. *Dicandria*
of Leguminosæ.
- SERPENTARIA VIRGINIANA. *Aristolochia*
Serpentaria LIN., cet. America borealis, præ-
sertim Virginia.
Radix. *Gynandria* *of Aristolochiæ*.
- *SEVUM BUBULUM. Orttalg. *Bos Taurus* LIN.
- *SEVUM HIRCINUM. Bocktalg. *Capra Hir-*
cus LIN.
- *SEVUM OVILLUM. Fårtalg. *Ovis Aries* LIN.
- SIMARUBA. *Simaruba officinalis* DE CAND.
America meridionalis calida, Cayenne.
Cortex. *Dicandria* *of Simarubæ*.

*SINAPIS ALBA. Smit Senap. *Sinapis alba*
LIN. Europa media; apud nos culta.

Semina. *Tetradymia n. Crucifera.*

*SINAPIS NIGRA. Swart-Senap. *Sinapis nigra* LIN.

Semina. *ut supra.*

SODA DEPURATA. Renad Soda. Kolsyradt
Matron. *Carbonas natricus crystallisatus.*

SPATHUM PONDEROSUM. Lungspat. *Sulphas barythicus nativus.* Fossile.

SPERMA CETI vel CETACEUM Swalrat. *Physeter macrocephalus* LIN. In Oceano Atlantico.

Pinguedinis pars solidescens, in propriis loculamentis sub cute capitis et dorsi contenta. *Mammalia Cetacea*

*SPIRITUS FRUMENTI. Bränwin. Pond. spec. = 0.94.

SPIRITUS VINI GALLICUS. Franst Bränwin.

Pond. spec. = 0.933. = *0,933 sp. wigt*

SPONGIA MARINA. Badswamp. *Spongia officinalis* LIN. Mare mediterraneum.

Pars fibroso-cellulosa, materiâ carnosâ remotâ. *Sophyta.*

STANNUM MALACCENSE. Malacca Tenn.

STAPHISAGRIA. Staffansfrö. *Delphinium Staphisagria* LIN. Europa australis.

Semina. *Phyandria n. Ranunculaceae.*

STIBIUM METALLICUM. Antimon-metall.

*STRAMONIUM. Spikflubbsört. *Datura Stramonium* LIN. Europa media, cet.; apud nos plerumque culta.

Folia.

Semina.

Pentandria n. Solanaceae

STYRAX CALAMITUS. Storax. *Styrax officinalis* LIN. Frutex vel arbuscula præsertim Orientis. *Decandria of Symplicia*.
Resina e trunco inciso prodiens.

SUCCINUM FLAVUM. Bernstein. Litora maris Baltici, cet., imprimis Borussiae.
Resina fossilis.

*SULPHUR. Schwefel.
Sulphur citrinum. Stängschwefel.
Flores Sulphuris. Schwefelblomma. Sulphur sublimatum.

*TABACUM vide NICOTIANA.

TAMARINDUS-ORIENTALIS. Ostindisch Tamarind. *Tamarindus indica* LIN. var. *orientalis*. India orientalis. *Monadelphia*
Pulpa e lomentis deprompta, seminibus et fibris sæpius mixta. *of Leguminosa*.

*TANACETUM. Rensana. Tanacetum vulgare LIN. *Syngenesia of Composita*
Summitates (corymbi) florentes. *Corymbifera*.

*TARAXACUM. Mastros. *Leontodon Taraxacum* LIN.
Radix recens et siccata. *U. J.*

TARTARUS CRUDUS. Weinsten. *Bitartras kalicus communis*.

TARTARUS DEPURATUS vel CRYSTALLI TARTARI. *Bitartras kalicus depuratus*.

TEREBINTHINA COMMUNIS. Tjock Terpentin. *Pini* species, præsertim *P. Pinaster* AIT. (vide OLEUM TEREBINTHINÆ).

Balsamum sponte, vel incisionibus factis, e truncis exsudans. *Monodelpha of Composita*.

TEREBINTHINA VENETA vel LARICINA. Bessedisch Terpentin. *Pinus Larix* LIN. Arbor Europæ australioris, cet., apud nos culta.

ut supra

Balsamum vel sponte vel ex arbore vuln-
rata prodiens.

TERRA JAPONICA vide CATECHU. *Polygamia*

*TESTÆ OSTREARUM. Ostronskal. *Ostrea*
edulis LIN.

Valvæ conchæ.

*THYMUS. Timjam. *Thymus vulgaris* LIN.
Europa australis; apud nos cultus.

Herba efflorescens. Didynamia of Labiate.

†TIGLIUM vide GRANA TIGLII.

*TILIA. Lind. *Tilia europæa* LIN. *Polyandria*
Flores (cymæ florentes cum bracteis) of Silicose.

*TORMENTILLA. Blodrot. *Tormentilla erecta* LIN.

Radix. Symplocos of Rosaceæ - Lentiginos.

TRAGACANTHA ELECTA. Fin Dragant. *Astra-*
gali species (A. verus OLIV., A. gummifer
LABILL., A. creticus LIN.) Asia minor, Per-
sia, Syria, Græcia, cet.

Materia mucosa e trunco fruticuli sponte
prodiens. Diadelphica of Leguminosæ

*TRIFOLIUM AQUATICUM. Wattenklöfwer.

Menyanthes trifoliata LIN.

Folia. Pentandria of Gentianæ.

*TRITICUM. Swete. *Triticum vulgare* VILL.

Farina Seminum. Swetemjöl. Triandria
Amylum vide suo loco. of Graminæ.

*TUSSILAGO. Hästihof. *Tussilago Farfara* LIN.

Folia. Symplocos of Composite - Corym-
bifera.

VALERIANA MINOR. Wändelrot. *Valeriana*

officinalis LIN. *Triandria of Valerianæ.*

Radix locis siccioribus e varietate minori
colligenda et illota siccanda.

VANILLA. Banilj. *Vanilla aromatica* SWARTZ.

India occidentalis, Mexico.

Siliqua (capsula) nondum matura.

Gynandria of Orchidæ.

*VERBASCUM. Rungstlius. *Verbascum Thapsus* LIN., *V. thapsiforme* SCHRAD. et *V. phlo-moides* LIN. *Pentandria* *vsq* *Solana-gace.*
Flores (corollæ).

VINUM. Win. *Vitis vinifera* LIN. Frutex sarmentosus, in zonis mitioribus ubique cultus.
Succus baccarum fermentatus.

Vinum gallicum album. Gammalt hvitt Franskt Win. *Pentandria* *vsq* *Ampelidæ*

Vinum gallicum rubrum. Bordeaux=Win.

Vinum de Malaga. Malaga=Win.

Vinum de Oporto. Port=Win.

Vinum Rhenanum. Rhenskt Win.

Vinum de Xeres. Xeres=Win.

*VIOLA TRICOLOR vel HERBA JACEÆ. Styf= morsblomma. *Viola tricolor* LIN. *Pentandria*
Herba cum floribus. *Violarid.*

VIRIDE ÆRIS vide ÆRUGO.

*VITIS IDÆA. Lingon. *Vaccinium Vitis idæa* LIN.
Pentandria
vsq *Vaccinæ* *Baccæ conditæ et baccæ aquâ servatæ.*

VITRIOLUM DE CYPRO vel CUPRI. Kop= parvitriol. *Sulphas cupricus.*

*ULMUS. Alm. *Ulmus campestris* LIN.
Cortex interior (liber). *Pentandria*
vsq *Ulmagæ.*

*UVA URSI. Njöltonris. *Arbutus Uva ursi* LIN.
Folia. *Dicandria* *vsq* *Eriginæ.*


ZEDOARIA. Sittwer. *Curcuma Zedoaria* ROSC.
India orientalis.
Radix. *Monandria* *vsq* *Uromæ.*

ZINCUM. Zinf.


ZINGIBER. Zingefära. *Zingiber officinale* ROSC.
In India orientali spontaneum, in India occi-dentali cultum. *ut supra.*

Radix depurata (R. *Zingiberis alba*).

Radix condita (Conditum *Zingiberis*).



**PHARMACA
PRÆPARANDA.**



ACETAS CUPRICUS.

Aerugo crystallisata.

Ærugo, in pulverem redacta, *Acido acetico diluto*, *Aquæ destillatæ* sufficientem copiam addendo, solvitur. Solutum, per chartam colatum, additâ parvâ *Acidi acetici diluti* quantitate, leni calore vaporat, ut eliciantur crystalli, quæ, inter chartæ plagulas siccatae, in vase probe clauso ad usum servantur.

ACETAS KALICUS.

Alkali vegetabile acetatum vel Terra foliata Tartari.

Acido acetico diluto in vase vitreo capaci per vices admiscetur *Carbonatis kalici depurati*, quantum ad saturationem requiritur. Liquor hinc oriundus, in vase fictili vel porcellaneo vaporando ad dimidium consumptus, per chartam colatur et, addito *Acido acetico diluto*, acidus redditur; quo facto, inter continuam cum baculo vitreo agitationem, balnei vaporis calore iterum evaporat, donec exsiccetur. Sal concretus in vas vitreum, probe siccum et bene obturandum, statim ingeritur.

ACETAS MORPHICUS. ♂

Morphina, in pulverem redacta, *Acido acetico diluto* solvitur, et solutio colata in vase, ma-

gnam superficiem præbente, ad temperaturam + 40—50° C., ad siccum usque evaporat. Massa crystallina in vase vitreo, bene clauso asservatur.

ACETAS PLUMBICUS.

Saccharum Saturni purificatum.

Sacchari Saturni pars una in *Aquæ destillatæ* partibus duabus solvitur. Liquidum per chartam colatur et loco tepido, admixtâ *Acidi acetici diluti* parvâ copiâ, ut crystallos demittat, seponitur. E liquido remanente, iteratâ vaporatione ad dimidium consumpto, eodem modo crystalli formantur. *Acetas plumbicus*, hoc modo purificatus, chartâ bibulâ siccatur et, ne fatiscat, in vitro clauso servatur.

☞

ACETAS STRYCHNICUS.

E *Strychnina* pulverata, additâ *Aquâ destillatâ*, paratur, ut de *Acetate morphico* præscriptum est; atque eodem modo servatur.

ACETA MEDICATA.

Parantur macerando per præscriptum temporis spatium, humorem deinde exprimendo et, post subsidentiam, per chartam colando. In lagenis vitreis in cella asservantur.

Omnis maceratio ad temperaturam ordinariam fit, interdum agitando vel ipsum vas vel substantias, quæ in eo contineantur.

ACETUM AROMATICUM.

Acetum prophylacticum.

- Rec. *Caryophyllorum* contusorum drachmam, p. 1.
Lavendulæ florum incisorum uncam, p. 8.
Rosmarini foliorum,
Salviæ foliorum, singulorum incisorum un-
 cias duas, p. 16.
Aceti Vini libras quattuor p. 384.
 Macerantur per quattuor dies.
-

ACETUM ROSÆ.

- Rec. *Rosæ domesticæ petalorum* incisorum un-
 ciam, p. 1.
Aceti Vini libram p. 12.
 Macerantur per quatrimum.
-

ACETUM RUBI IDÆI.

- Rec. *Rubi idæi baccarum* recentium, mundata-
 rum et in pulvem redactarum, libras
 sex, p. 3.
Aceti Vini libras quattuor p. 2.
 Macerantur per dies quattuordecim. In lage-
 nis non amplis servatur.
-

ACETUM SCILLÆ.

Acetum scilliticum.

- Rec. *Scillæ radice*, siccata et minutim concisa,
 unciam, p. 1.
Aceti Vini libram p. 12.
 Macerantur per octo dies.
-

ACIDUM ACETICUM CONCENTRATUM.

Rec. *Sacchari Saturni*, leni calore in vase porcellaneo (ne pars quædam salis destruat, ab igne sæpius removendo) inter agitandum, donec sal aquam amiserit, calefacti et deinde pulverati, libras quinque, p. 10.

Acidi Vitrioli, coctione ab aqua excedente liberati et plane decoloris, uncias duodeviginti p. 3.

Saccharum Saturni in retortam vitream, tubulatam, siccam, adaptato lege artis excipulo vitreo, caute immittitur, ne collum retortæ inquinetur; acido deinde partitis vicibus per tubulum instillato, miscela ope baculi vitrei agitur, quo facto fit destillatio ex balneo Chlorreti calcici, quamdiu acidum prodit, quod in ampulla vitrea, epistomio vitreo instructa servatur. Pondus specificum 1.063 erit.

Si acido sulphureo inquinatum esset acidum, super

Magnesi nigri, subtilissime pulverati, uncias quinque p. 1.
rectificetur, necesse est.

ACIDUM ACETICUM DILUTUM.

Rec. *Sacchari Saturni* crystallisati libras quatuor, p. 48.

Acidi Vitrioli uncias tredecim, p. 13.

Aquæ destillatæ libris duabus p. 24.

diluendas. Miscentur in retorta satis ampla et, post digestionem per horas viginti quatuor, fit destillatio usque ad siccum, excipulo non plane clauso et ad finem destillationis sæpius mutando, ita ut illam acidi portionem, quæ acido

sulphuroso inquinata, prodit, separatim excipere liceat. Acidum purum, cujus pondus specificum 1.04 erit, in lagenis vitreis, probe clausis servatur.

Acidum, ab acido sulphuroso inquinatum, destillando super *Magnesii nigri* pulverem purificatur.

ACIDUM BENZOICUM.

Flores Benzoës.

Benzoë amygdaloides, grandiuscule pulverata, in sartagine ferream vulgarem immittitur. Supra orificium sartaginis charta bibula laxioris texturæ expanditur, marginibus ejus supra externam sartaginis oram glutine amylaceo agglutinatis. Supra sartagine et chartam expansam conus vel cylindrus e charta densioris texturæ construitur, funiculi ope supra sartaginis parietes fortiter alligandus. Sartago, tali modo præparata, in laminam ferream, strato arenæ intersperso, imponitur; quo facto ignis lenis sub lamina accenditur, per horas quattuor vel sex æquabiliter alendus. Tota supellectile post refrigerium subversâ et funiculo dissoluto cylindrus, acidum sublimatum continens, amovetur.

ACIDUM BORICUM.

Sal sedativum Hombergi.

Rec. *Boracis* pulveratæ uncias quattuor, . p. 2.

Aquæ destillatæ ferventis uncias decem p. 5.

In vase vitreo miscentur, ut Borax dissolvatur; tum solutioni etiamnunc fervidæ instillantur

Acidi hydrochlorici unciaë duæ p. 1.

Crystalli, e liquore post refrigerium depositæ, chartâ colliguntur et *Aquâ destillatâ* frigidâ abluuntur; deinde in parva aquæ ferventis quantitate liquescunt et, e solutione colata iterum depositæ atque aquâ frigidâ ablutæ, inter chartæ bibulæ plagulas exprimuntur et siccantur. In vase vitreo, clauso servantur.

Liquores, e quibus crystalli demissæ sunt, et aquæ lotionis, si evaporatione deminuuntur, parvam tradunt acidi borici quantitatem, ut jam præscriptum est, purificandam.

ACIDUM HYDROCHLORICUM.

Acidum muriaticum vel Salis.

Rec. *Aquæ destillatæ* uncias quindecim, . p. 5.

Acidi Vitrioli uncias quadraginta quinque, p. 15.

Salis communis, calore adhibito ab aqua in hærente liberati, libras quattuor p. 16.

Sal cum Acido, Aquâ antea diluto, in cucurbita ad dimidium replenda miscetur, quæ, tubo securitati inserviente instructa et supra balneum arenæ collocata, igne afficitur, ita ut mixtura ferveat. Quod gignitur gas, ope tubi vitrei, bifariam curvati et ad orificium cucurbitæ adaptati, in lagena, *Aquæ destillatæ* libras duas continente, colligitur, ubi tubus summam tantummodo aquam adtingit. Quo autem aqua, quantum fieri possit, gase saturetur, lagena aquâ frigidâ, nive vel glacie immixtâ, cingenda est.

Quando aqua lagenæ, tubo suppositæ, tantum gasis acidi absorbuerit, ut pondus specificum 1.19 ei sit, removenda est, et nova aquæ destillatæ portio in illius locum substituenda.

Quod si, opere peracto, aquæ pars quædam non perfecte saturata est, servatur, ut, quum eadem alias operatio repetitur, saturari possit.

Servatur acidum in lagenis vitreis, epistomiis vitreis arcte claudendis.

ACIDUM HYDROCYANICUM DILUTUM. §

Acidum Borussicum.

Rec. *Acidi tartarici* drachmas undecim, p. 11.

Aquæ destillatæ uncias novem . . . p. 72.

Fit solutio clara, quæ servatur.

Quum jussu Medici practici præparandum est Acidum hydrocyanicum,

Hujus solutionis drachma

cum *Cyaneti kalici* granis tribus et dimidio in lagena, statim obturanda, miscetur; mixturâ bene conquassatâ, lagena in aquam frigidam per semihoram immergitur, quo facto liquor clarus a crystallis tartari depositis caute defunditur et ponderatur.

Acidum hocce nullâ conditione servetur paratum, nec nisi ad præscriptum Medici, summâ cautione adhibitâ, paretur; ubi copia quædam ejus superest, hæc semper delenda.

Continet acidi hydrocyanici anydri trigesimam octavam circiter partem vel 2.66 partes centesimas.

ACIDUM NITRICO-NITROSUM.

Acidum Nitri fumans.

Rec. *Nitratis kalici depurati*, pulverati et siccati, libras quattuor, p. 2.

Acidi Vitrioli libras duas p. 1.

Nitrati, in retortam vitream, semireplendam immisso, acidum sensim affunditur; quod quidem, si deest retorta tubulata, epistomio vitreo claudenda, fit ope infundibuli, rostro longo incurvoque instructi, summâ tamen adhibitâ cautione, ne gutta quædam acidi collo retortæ adhæreat. Mox retorta in balneo arenæ calefacto collocatur; tum admovetur excipulum, siphone vel tubo incurvo ita instructum, ut crus siphonis interius in excipulum paullum modo intret; crus autem exterius in lagenam, paullum aquæ continentem, ut aquam adtingat, ingeritur, et commissura secundum leges artis clauditur. Destillatur deinde igne primum leni, dein sensim aucto, donec non amplius ulli vapores ascendant.

Quod in excipulo est acidum mox effunditur in vas vitreum, epistomio vitreo claudendum, et in loco frigido et obscuro servatur; pondus specificum 1.50—1.51 habebit.

In lagena manens liquidum est Acidum nitricum valde dilutum.

ACIDUM NITRICUM DILUTUM.

Acidum Nitri præcipitatum.

Rec. *Aquæ fortis* quantum vis;
cui *Nitras argenticus*, *Aquâ destillatâ* solutus, instillatur, quamdiu *Aqua fortis* inde fit turbida. Miscela deinde, bene conquassata, in retortam vitream, tubulatam, per tubulum infunditur, vel in retortam sine tubulo per infundibulum, caudâ longâ instructum, immittitur; in retorta vero paullum *Nitratis kalici depurati* et pulverati inest. Adaptatur deinde excipulum capax, et fit, commissurâ non clausâ, ex bal-

neo arenæ destillatio fere ad siccum. Quod primum prodit destillatum aquosum separatim recipitur; quod vero postea provenit acidum illo aquoso est diluendum, ut pondus ejus specificum 1.25 fiat.

In ampulla, epistomio vitreo bene clausa, loco obscuro servatur.

ACIDUM QUERCITANNICUM.

Rec. *Gallarum turcicarum*, grandiuscule pulveratarum, quantum vis,

Ætheris quantitatem sufficientem.

Tubus vitreus amplus, cujus altera pars in acumen educta est, altera aperta et epistomio claudenda, ope obturamenti suberei lagenæ cuidam ita infigitur, ut a fundo ejus satis distet tubi acumen. Orificio acuminis lanugine gossypii leviter oppleto, pulvis gallarum, aquâ paullulum humectatus, tubo immittitur, *Æthere* deinde replendo et claudendo. Post aliquot horas apertura tubi clausa returatur, ut liquor e tubo in lagenam decidat, ubi duo omnino strata formantur, unum inferius spissius, alterum superius tenuius; nova vero *Ætheris* copia tubo est infundenda, dum stratum illud spissius augetur, quod deinde, a superiore strato siphonis ope vel alio quodam modo separatum, exhalatione in balneo vaporis ad siccum reducitur. Massa residua, spongiosa, in vitro bene clauso servatur.

E strato tenuiori *Ætheris* quædam portio destillando recuperari potest.

ACIDUM SULPHURICUM DESTILLATUM.

Retortæ vitreæ ope infundibuli, rostro longo incurvoque instructi, infunduntur

Acidi Vitrioli libræ duæ vel tres;
 ubi cavendum, ne collum retortæ acido inquinetur neve retorta ipsa amplior sit, quam ut ad dimidium acido repleatur. Adaptato sine luto vel juncturis excipulo, retorta in balneum arenæ immergitur et mitrâ, e lamina ferrea confectâ, tegitur. Calor deinde balnei augetur ad ebullitionem acidi, quæ ne momento quidem cesset, cavendum est. Quando destillatione elicite sunt uncie circiter duæ vel tres, vas excipiens amovetur et aliud bene siccum et calefactum adaptatur, ita ut collum retortæ in medium excipuli promineat; quo facto destillatio continuatur, usque dum acidi duo trientes provenerint, qui in ampullam vitream, siccam et calefactam, epistomio vitreo probe claudendam, statim ingeruntur. Pondus specificum 1.845 erit.

Ad destillationem bene perficiendam non paullum conducit, fila platinica, ubi ad manus fuerint, spiræ modo flexa, acido immisisse.

ACIDUM SULPHURICUM DILUTUM.

Spiritus Vitrioli.

Rec. *Acidi sulphurici destillati* quantum placet,
Aquæ destillatæ quantitatem octuplam.

Sensim et caute mixta in lagena, epistomio vitreo munita, servantur.

ÆTHER.

Æther sulphuricus vel vitriolatus.

Rec. *Spiritus concentrati* partes duas,
Acidi Vitrioli partes tres.

Spiritui, vasi idoneo infuso, acidum, subtilissimæ instar chordæ, paullatim admiscetur, vas

interea sæpissime agitando, ut liquor sub instillatione in gyrum moveatur. Mixtura etiamnunc calida retortæ vitreæ, tubulatæ, ad dimidium replendæ, balneo arenæ impositæ et jam calefactæ infunditur, adaptato lege artis excipulo amplo, tubulato, ubi tubulus clauditur subere tubi vitrei deflexi, cujus crus externum in lagenam siccam intrat. Loco excipuli hoc modo instructi, collo retortæ adaptari potest canalis refrigeratorius e stanno puro. Tubulus retortæ epistomio subereo clauditur, quod longius complectitur siphonis crus, amplitudine internâ trium linearum; acumen hujus cruris, ad amplitudinem lineæ coarctatum, liquori immergitur, ut a fundo retortæ satis distet; crus vero brevius in lagenam, quantitatem Spiritus concentrati arbitrariam continentem, usque ad fundum intrat. Tali vel alio quodam modo efficiendum est, ut, ubi siphon Spiritu impletus sit, torquendo spiraculo æneo, ad crus longius siphonis applicato, affluxum Spiritus dirigere liceat.

His rite instructis junctisque, calor balnei caute augetur ad liquoris ebullitionem, quæ haud interrupta sustentatur, excipulo et tubo aquâ frigidâ vel nive continue refrigeratis. Liquori vero, decimâ circiter parte destillando imminutâ, tantum Spiritus per siphonem sensim additur, ut pristinum sui volumen recuperet, cavendo, ne cesset ebullitio; in quo faciendo pergendum, quamdiu Spiritus, ad præparationem ætheris designatus, lagenæ inest.

Præclarius quidem et facilius fit hæc operatio, si affluxus Spiritus ita disponitur, ut thermometrum una cum siphone in liquorem intrans, temperaturam liquoris coquentis $+140^{\circ}$ -150° C. semper monstret.

Quum circiter tres Spiritus consumpti quartæ partes in vase excipiente collectæ sunt, destillationi finis est imponendus. Destillatum deinde in lagena, subere claudenda, cum dimidia parte *Aquæ destillatæ*, *Calce ustâ* admixtâ, quæ aquâ adpersâ in hydratem conversa est, diligenter conquassatur, quo facto per horas viginti quattuor seponitur. Post hæc æther supernatans caute defunditur, in alia lagena cum *Chloreto calcico*, gradiuscule pulverato, conquassatur et, post quietem dierum aliquot iterum defusus, lenissimo calore rectificatur; excipulis sæpius mutatis, illa destillati pars, quæ pondus specificum 0.723 possidet, separatim colligitur et in lagenis, subere clausis, servatur ad usum; quæ autem majus habeat pondus specificum, iterata destillatione, calore blandissimo est rectificanda.

Residuum in retorta acidum præparationi *Ætheris*, alias instituendæ, inservire potest.

ÆTHER ACETICUS.

Rec. *Sacchari Saturni*, ut ad Acidum aceticum concentratum præscriptum est, aquâ liberati, uncias triginta duas, . . . p. 32.

Spiritus concentrati uncias novem, . p. 9.

Acidi Vitrioli uncias duodecim . . . p. 12.

Mixtura refrigerata e Spiritu et Acido, rite commixtis, Saccharo Saturni, in pulverem reducto, in retorta vitrea superinfunditur. Adaptato excipulo, non plane clauso et diligenter frigefaciendo, destillantur unciaë novem (p. 9), quæ ope *Hydratis calcici* ab acido excedente, et ab aqua ope *Chlorete calcici* ut in æthere purificando jam præscriptum est, liberatæ rectificantur,

cantur, ita ut pondus specificum 0.88—0.89 habeat destillatum. Servatur in lagena, subere probe clausa.

ÆTHER NITRICUS SPIRITUOSUS.

Spiritus Nitri dulcis.

Rec. *Spiritus concentrati* libras duas . . . p. 4.

-In retorta vitrea capaci paulatim adjicitur

Acidi nitrico-nitrosi libra dimidia . . . p. 1.

Adaptatur excipulum tubulatum, siphone, ut ad Acidum nitrico-nitrosium dictum est, instructum, et fit destillatio calore balnei vaporis, donec in excipulo, quod quam frigidissimum conservari oportet, collectæ sint uncix octodecim (p. 3.), quæ cum *Bicarbonate natrico*, in pulverem redacto, conquassantur, quamdiu acidi reactionem præbeant. Separatus post quietem liquor æthereus iteratâ in balneo vaporis destillatione rectificatur et in lagenis parvis, obturamentis subereis bene claudendis, servatur. Pondus specificum 0.84—0.85 erit.

ÆTHER SPIRITUOSUS.

Liquor anodynus mineralis Hoffmanni.

Rec. *Ætheris* partem unam.

Miscetur cum

Spiritus concentrati partibus duabus.

Servatur in lagenis probe clausis.

ÆTHEROLEA.

In ætheroleis parandis, ubi nihil aliud præscriptum fuerit, debitæ substantiæ, rei conve-

nienter deminutæ, imponuntur diaphragmati, ad cribri similitudinem perforato atque in superiori parte alembici ænei collocato, ubi aquæ fluvialis partes quattuor vel sex ad ebulliendum jam calefactæ sint. Adaptato statim capitello cum refrigeratorio, fit destillatio, quamdiu aqua ætheroleo gravida prodit, quæ in lagena vitrea, tubo laterali recurvato munita (excipulo Florentino) colligitur. In vitris parvis, inde repletis ac bene clausis, loco obscuro servanda sunt.

Quæ una cum ætheroleo transiit aqua, ætheroleo ex nova copia ejusdem generis substantiarum eliciendo inservire potest.

Aliâ quoque et quidem præclariori ratione peragitur hæc operatio, si elicitur ætheroleum, adjuvantibus aquæ vaporibus, qui ope tubi ex æheno quodam, aquam semper bullientem continente, usque ad fundum alembici continue deducuntur, ubi substantiæ, aquâ fervidâ humectatæ, collocatæ sunt. Alembicus vero vel balneo vaporis vel circumvoluto stramine calidior est conservandus.

ÆTHEROLEUM ABSINTHII.

Oleum Absinthii.

Paratur ex *Absinthii summitatibus*.

ÆTHEROLEUM ANISI.

Oleum Anisi.

Paratur ex *Anisi seminibus*; ubi cavendum, ne majori refrigeratione ætheroleum in vase refrigeratorio concreseat.

ÆTHEROLEUM CARVI.

Oleum Carvi.

Paratur e *Carvi seminibus*.

ÆTHEROLEUM CARYOPHYLLORUM.

Oleum Caryophylli.

Paratur e *Caryophyllis*, excipulo Florentino ita instructo, ut poscat pondus specificum ætherolei colligendi aquâ gravius.

ÆTHEROLEUM CYMINI.

E *Cymini seminibus* paratur.

ÆTHEROLEUM FOENICULI.

Oleum Foeniculi.

Paratur e *Foeniculi seminibus*; ubi observandum, quod de Ætheroleo Anisi jam monitum est.

ÆTHEROLEUM JUNIPERI.

Oleum Juniperi.

E *Juniperi baccis immaturis* paratur.

ÆTHEROLEUM MENTHÆ PIPERITIDIS.

Oleum Menthæ piperitidis.

E *Menthæ piperitidis herba* paratur.

ÆTHEROLEUM PIPERIS JAMAICENSIS.

Oleum Piperis jamaicensis.
Paratur e *Pipere jamaicensi*.

ÆTHEROLEUM SABINÆ.

Paratur e *Sabinæ ramulis*.

ÆTHEROLEUM TANACETI.

Oleum Tanaceti.
Paratur e *Tanaceti summitatibus*.

ÆTHEROLEUM TEREBINTHINÆ DEPURA-
TUM.

Oleum Terebinthinæ æthereum.
Rec. *Olei Terebinthinæ* quantum placet,
Aquæ fluvialis treuplam quantitatem.
Mixta destillantur, quamdiu prodit ætheroleum.

ÆTHEROLEUM THYMI.

Paratur e *Thymi herba*.

ÆTHIOPS ANTIMONIALIS.

Hydrargyrum stibiato-sulphuratum.
Rec. *Sulphuris sublimati eloti* uncias duas, p. 2.
Sulphureti stibici præparati uncias tres, p. 3.
Hydrargyri destillati uncias quattuor p. 4.
In mortario vitreo vel porcellaneo, ope pi-
stilli, basi dilatata præditi, simul teruntur, do-
nec globuli Hydrargyri oculo armato penitus
disparuerint.

ÆTHIOPS MINERALIS.

loco Sulphureti Hydrargyri nigri.

Rec. *Sulphuris sublimati eloti*,
Hydrargyri destillati, singulorum uncias tres
 vel partes æquales.

Miscentur, terendo in mortario vitreo vel porcellaneo amplo diligentissime et diu, donec Hydrargyrum oculo armato penitus evanuerit.

ALKOHOL VINI.

Spiritus concentratissimus.

Rec. *Spiritus concentrati* libras quattuor, . p. 8.

Carbonatis kalici depurati, plane sicci, libram unam et dimidiam p. 3.

In lagena, interdum agitanda, per horas duodecim macerantur. Spiritus deinde defusus super

Chloreti calcici, in frustula redacti, libras tres et semis, p. 7.

cum iis antea maceratus, e retorta vitrea rectificatur, ad siccum usque destillando.

Quæ primum prodeunt uncia separatim colligendæ sunt et, si aquosæ reperiantur, rejiciendæ.

Pondus specificum 0.794 habeat.

ALUMEN USTUM.

Rec. *Aluminis crudi* quantum vis.

In platina satis ampla, ferrea vel fictili nova, incalescit igne leni, sensim sed non nimis augendo, donec aqua abierit et residuum in massam spongiosam, levem, fuerit conversum. Servatur in vase bene clauso.

AMMONIACUM CAUSTICUM.

Spiritus Salis ammoniaci causticus.

Rec. *Salis ammoniaci depurati*,

Calcis recens ustæ, singulorum libras quinque p. 5.

Seorsim pulverata in olla e ferro fuso miscentur, cui statim, ope vinculorum et luti, e gypso farinaque confecti, adfigitur operculum duobus foraminibus instructum; quorum alterum subere integro obturatur, alterum vero subere perforato, tubum vitreum incurvum includente. Deinde per foramen, subere integro claudendum, affunduntur, partitis vicibus et agitando cum baculo ferreo,

Aquæ destillatæ libræ circiter quattuor vel tantum,

ut Sal et Calx inter destillandum semper humectentur, et fit, incenso inter hæc igne, non nimis augendo, destillatio. Gas, quod per tubum deducentem prodit, primum per lagenam inanem perducitur et deinde in alia lagena, librarum duodecim fere capace et

Aquæ destillatæ libras novem p. 9. continente, continue frigidissima conservanda, colligitur; tubus vero, cujus ope gas in aqua colligitur, ad fundum lagenæ prominat.

Ubi bullulæ gasis rariores finem destillationi imponendum significant, foramen subere clausum extemplo returandum est, ne inter refrigerationem liquores in ollam rēgrediantur.

Liquori, qui in lagena posteriori continetur, tantum *Aquæ destillatæ* additur, ut pondus specificum 0.95 habeat.

AMYGDALINUM.

Rec. *Amygdalarum amararum*, subtiliter contusarum, libras duas p. 2.

Oleo earum pingui iteratâ expressione et, si velis, leni calore, sed aquâ haud affusâ, remoto, placenta pulverata cum

Spiritus concentrati libris tribus p. 3.
decoquitur in vase idoneo, ne Spiritus in auras abiens perdat, sed colligi et in vas refundi possit; quo facto liquor, etiamnunc fervens, colatur, et massa residua cum

Spiritus concentrati libris duabus . . . p. 2.
eodem modo tractatur.

Amygdalinum, quod inter refrigerandum e liquoribus spirituosis deponitur, colo colligendum est, Spiritu concentrato frigido edulcorandum, inter chartæ plagulas exprimendum et denique siccandum. Quod si una cum Amygdalino deposito copia quædam olei pinguis subsederit, hæc a liquore spirituosus, ad Amygdalinum solvendum iterum calefacto, accurate separatur, quo facto Amygdalinum, e liquore refrigerato denuo depositum, colligitur.

Amygdalinum siccum in lagena oclusa cum *Ætheris* sufficiente copia quassatur et, *Æthere* defuso, iterum siccatur; quod si jam non plane album appareat, tale fit solvendo in Spiritu concentrati ferventis sufficiente quantitate, colando et refrigerando.

Liquor ille spirituosus, qui Amygdalinum primum deposuit, destillatione et refrigeratione novam exhibet ejus copiam, ut jam præceptum est, purificandam.

AQUÆ.

Aquæ, quæ destillatæ aromaticæ dicuntur, ope vaporum aquæ bullientis parantur, ut in ætheroleis jam monitum est, substantiis vel super cribrum, in superiori parte vesicæ destillatoriæ collocatum, immissis vel in vesica ipsa cum aqua commixtis. Quum prodierit præscripta destillati quantitas, hæc, bene conquassata, per nycthemeron seponitur et deinde, colando per chartam madidam, ab ætheroleo deposito vel innatante liberatur.

Servantur loco frigidus et obscuro in lagenis clausis, vitreis aut figulinis.

AQUA ACIDI CARBONICI.

Aqua aërata vel carbonica.

Aqua fontana, quam in vase clauso diu servatam non putrescere notum est, in apparatu idoneo, immixtâ *Glaciei* contusæ parte circiter quintâ, cum *Gase Acidi carbonici puro* (aëris atmosphærici experte et per aquam transadacto) tamdiu quassatur, quamdiu Acidi carbonici aliquid ab aqua absorbetur; quod dum fit, aëri, ex aqua expulso, sæpius dandus est evadendi locus.

Aqua, gase saturata, in lagenas vitreas jam frigefactas, quæ suberibus selectis rite obturantur, immittitur. Subera, vinculo apto lagenis infixâ, in *Colophonium*, cum *Sevi bubuli* sexta parte commixtum et supra ignem liquefactum, immerguntur.

☞ AQUA AMYGDALARUM AMARARUM CON-
CENTRATA.

Rec. *Amygdalarum amararum* partem unam.

Ex contusis et cum

Aquæ fluvialis partibus quattuor,
quæ inter agitandum partitis vicibus affundun-
tur, per horas viginti quattuor maceratis, de-
stillando elicitur pars una.

In vitris parvis caute asservanda est.

AQUA AMYGDALARUM AMARARUM
DILUTA.

loco *Aquæ Cerasi*.

Rec. *Aquæ Amygdalarum amararum concen-*
trate drachmam p. 1.

Aquæ destillatæ uncias duas p. 16.

Miscentur.

Paratur ex tempore.

AQUA AURANTII.

Aqua Naphæ.

Rec. *Aurantii florum, sale conditorum,* partem
unam,

Aquæ fluvialis quantum requiritur.

Destillatione eliciuntur partes dūæ.

AQUA CALCIS.

Rec. *Calcis ustæ* partem unam,

Aquæ destillatæ partes viginti.

Calce sensim *Aquæ,* interea quassandæ, addi-
tâ, in vase clauso seponuntur. Quum autem ex

præscripto Medici datur Aqua, optime conquisita per chartam cito colari et in lagena, bene obturata, servari debet.

AQUA CARVI.

Rec. *Carvi seminum* partem unam,
Aquæ fluvialis sufficientem quantitatem.
 Destillando eliciuntur partes sex.

AQUA CHLORI.

Aqua Superoxidi muriatosi.

Rec. *Salis communis* partes quattuor,
Magnesii nigri partes tres.

Pulverata et mixta in retortam percipacem vel cucurbitam, tubo deducente instructam, immittuntur. Tum admiscetur miscela frigida ex
Acidi Vitrioli partibus octo

et *Aquæ fluvialis* partibus quattuor, conjungiturque collum retortæ vel tubus cucurbitæ cum duabus tribusve lagenis Woulfianis, quarum prima parvam tantummodo continet *Aquæ destillatæ* quantitatem, ceteræ vero

Aquâ destillatâ ad duos trientes repletæ sunt. Juncturis rite clausis, lenissimo calore, gradatim augendo, evolutioni gasis consulitur, quod per Aquam perducitur, dum hæc saturata sit; tunc solutio flavescens, quæ lagenæ secundæ et tertiæ inest, in vitris parvis, minime pellucidis, inde replendis et bene obturandis, loco frigido servatur. Nova vero *Aquæ destillatæ* copia in illius locum est substituenda, ut etiam hæc saturetur; quod de novo fit, quamdiu Gas Chlori evocari possit.

Parari etiam potest Gas Chlori e
Magnesii nigri parte una
 et *Acidi muriatici crudi* partibus quattuor,
 commiscendis et in cucurbita blandissime cale-
 faciendis.

AQUA CINNAMOMI.

Rec. *Cinnamomi ceylanici corticis* contusi li-
 bram, p. 8.

Spiritus Vini gallici libras duas, . . p. 16.

Aquæ destillatæ, quantum satis ad evitan-
 dum empyreuma.

Destillando eliciuntur libræ sex (p. 48), in
 quibus solvitur

Sacchari albi uncia una cum dimidia p. 1.

AQUA CREOSOTI.

Rec. *Creosoti* drachmam, p. 1.

Aquæ destillatæ uncias decem p. 80.

Mixta per octo dies, interdum conquassando,
 reponuntur. Colatura in vase bene clauso servatur.

AQUA DESTILLATA.

Aqua fluvialis, admixtâ perparvâ quanti-
 tate *Calcis ustæ*, ex alembico æneo, qui capi-
 tello et refrigeratorio, Aquâ destillatâ antea di-
 ligentissime ablutis, instructus est, ad remanen-
 tiam sextæ partis destillatur; rejectâ, quæ pri-
 mum prædit, portiunculâ minus purâ.

AQUA FOENICULLI.

E *Foeniculi seminibus*, ut Aqua Carvi, paratur.

AQUA MENTHÆ CRISPÆ.

Rec. *Menthæ crispæ* herbæ partem unam,
Aquæ fluvialis quantum requiritur.
 Destillando eliciuntur partes tres.

AQUA MENTHÆ PIPERITIDIS.

E *Menthæ piperitidis* herba eodem modo,
 quo Aqua Menthæ crispæ, paratur.

AQUA PETROSELINI.

E *Petroselini seminibus* paratur, ut Aqua
 Carvi.

AQUA PICEA.

Infusum Picis liquidæ.

Rec. *Picis liquidæ* libram, p. 1.
Aquæ destillatæ libras quattuor p. 4.
 In vase ligneo mixta agitantur rudiculâ ligneâ;
 deinde per duodecim horas subsidere pix sinitur,
 et liquidum defusum per chartam colatur.

AQUA RANUNCULI ALBI.

Aqua Anemones.

Rec. *Ranunculi albi herbæ recentis* partes duas,
Aquæ fluvialis sufficientem quantitatem.
 Destillando eliciuntur partes tres.

AQUA ROSÆ.

E *Rosæ multiplicis petalis recentibus* vel sa-
 litis, ut Aqua Aurantii, paratur.

AQUA

AQUA SAMBUCCI.

E *Sambuci floribus* paratur, ut Aqua Aurantii.

AQUA SUBACETATIS PLUMBICI.

Aqua Saturni.

Rec. *Solutionis Subacetatis plumbici* unciam dimidiam, p. 1.
Spiritus Frumenti depurati unciam, p. 2.
Aquæ destillatæ libras duas p. 48.
 Miscentur.

AQUA SUPERCARBONATIS KALICI.

Aqua aërata alkalina.

Rec. *Carbonatis kalici depurati* uncias tres p. 1.
 Fit in Aqua solutio, quæ colata tantæ *Aquæ fontanæ* quantitati, *Gase Acidi carbonici* secundum regulas jam datas (vide ad *Aquam Acidi carbonici*) imbutæ, additur, ut, quum miscela gase ulterius perfecte saturata est, pondus librarum quinquaginta sex (p. 224) habeat.

AQUA SUPERCARBONATIS NATRICI.

Aqua Sodæ.

E *Soda depurata*, faticendo aquâ liberata, ut ad *Aquam Supercarbonatis kalici* dictum est, paratur.

ARGENTUM PURUM.

Argentum Acido nitrico diluto solvitur; solutio ejus, diluta et colata, solutione fervidâ

Salis communis præcipitatur. Quod fundum petit Chloretum argenticum, Aquâ destillatâ fervidâ bene lavatur et deinde siccatur.

Hoc præcipitatum, cum æqua portione *Carbonatis kalici depurati* mixtum, in crucibulum argillaceum ingeritur, quod igne paullo remissioni rubefit per horam dimidiam vel donec, massâ nondum liquatâ, argentum in statum metallicum reductum sit; tum calor augetur, ita ut omnia liquefiant, et argentum in unum coire possit.

AXUNGIA CURATA.

Adeps curata.

Axungia Porci, membranulis, venis et fibrillis exemptis, lavatur Aquâ et in balneo vaporis liquatur; denique, post humidi exhalationem, per linteum exprimendo colatur.

Curantur eodem modo *Sevi* variæ species.

BALSAMUM ADSTRINGENS.

Rec. *Acidi sulphurici destillati* drachmas decem, p. 5.

quibus in vase vitreo capaci et ampli orificii guttatim et per vices affunditur

Olei Terebinthinæ uncia dimidia . . . p. 2.

Effervescentiâ et calore cessantibus, caute admiscentur

Spiritus diluti uncie quattuor . . . p. 16.

Servatur in vase vitreo, bene clauso.

BALSAMUM AROMATICUM.

Linimentum aromaticum.

Rec. *Ceræ flavæ* unciam dimidiam, . . . p. 12.

Olei Nucis moschatæ uncias duas . . p. 48.

Calore balnei vaporis liquata colantur; non-
dum concretis admiscentur

Olei Succini empyreumatici rectificati scrup-
ulus, p. 1.

Balsami peruviani drachmæ duæ, . . p. 6.

Olei Lavendulæ,

Ætherolei Caryophyllorum, singulorum un-
cia dimidia p. 12.

Exactissime mixta in vase, bene obturato, ser-
vantur.

BALSAMUM SULPHURIS.

Rec. *Sulphuris sublimati* libram dimidiam, p. 1.

Olei Lini libras duas p. 4.

Oleo, in vase terreo vitreato aut ferreo, sa-
tis capaci et alto, ad + 200° C. circiter calefa-
cto, additur sensim Sulphur, agitando spathulâ
et cavendo, ne nova Sulphuris portio addatur,
nisi prius cessaverit effervescentia, neu tempe-
ratura + 250—260° C. superet.

BALSAMUM SULPHURIS TEREBINTHINA-
TUM.

Ætheroleum Terebinthinæ sulphuratum.

Rec. *Balsami Sulphuris* libram, p. 1.

Ætherolei Terebinthinæ depurati libras
tres p. 3.

Soluta in vase clauso servantur.

BICARBONAS KALICUS.

Carbonas kalicum.

Rec. *Carbonatis kalici depurati,**Aquæ destillatæ,* singulorum partes æquales.Fit solutio, quæ colata *Acidi carbonici Gase* in apparatu idoneo perfecte saturatur; crystalli, post hæc demissæ, inter chartæ plagulas siccantur.

Liquor residuus, blando calore evaporatus, novam crystallorum tradit copiam.

BICARBONAS NATRICUS.

Carbonas Natricum.

Sodæ depuratæ crystallisatæ pars una cum *ejusdem Salis,* fatiscendo in pulverem redacti, partibus tribus terendo intime commiscetur et, in apparatu idoneo, *Acido carbonico* perfecte saturatur.

BILIS BOVINA INSPISSATA.

Fel Tauri inspissatum.

Rec. *Bilis bovinæ recentis,* e vesicis nuper depromptæ, libram vel quantum vis, *Spiritus concentrati* par pondus.

Probe mixta et per linteum trajecta in balneo aquæ vaporando comminuuntur, donec residuum pondus specificum 1.20 habeat.

BOLUS PRÆPARATA.

Bolus armena, in mortario contrita vel super porphyritem levigata, sacco linteo, e filis tenuissimis (quorum 130 pollicem decimalem, vel 108 pedis duodecimam partem (1 werftum),

efficiunt) contexto, includitur, quo apte quassando pulvis subtilissimus a crassiore separatur; hic denuo tritus eodem modo tractatur, ille vero inpalpabilis servandus est.

CALAMINA PRÆPARATA.

Fit, ut Bolus præparata, e *Calamina*.

CARBO ANIMALIS.

Carbo Lixivii Sanguinis.

Rec. *Carbonatis kalici depurati* libras duas, p. 1.

Sanguinis bovini recentis libras decem p. 5

Mixta supra balneum arenæ evaporant, ut exsiccentur; quo facto in crucibulo ferreo tecto leni igne candefiunt, quamdiu vapores inflammabiles evolvantur. Massa refrigerata cum *Aqua destillata* in mortario teritur in pulverem tenuissimum, qui, Aquâ probe lotus, cum *Acido hydrochlorico* diluto coquitur et Aquâ destillatâ denuo edulcoratur. Carbo residuus levis siccat et in crucibulo, bene tecto, leniter excaudescit. Post refrigerationem in vas, probe claudendum, statim ingeritur.

CARBO SPONGIÆ.

Spongia usta.

Spongiæ marinæ frustula, ab arenulis purgata, in crucibulo cooperto, ut plane excaudescant et donec fumum emittere cessent, uruntur. Carbo exinde ortus in crucibulo, ex igne remoto, operculo etiamnunc remanente, refrigeratur et in vase clauso servatur.

CARBO VEGETABILIS PRÆPARATUS.

Carbo ligneus præparatus.

Quum ignis in fornace *Ligno Betulæ* alitur, carbones candentes, ubi aëres inflammabiles edere cesserint, in olla, operculo imposito, exstinguuntur et, etiamnunc calidi atque cineribus liberati, in pulverem rediguntur, qui in vase clauso statim servatur.

CARBONAS KALICUS DEPURATUS.

Subcarbonas kalicum depuratum.

Potassa depurata

Rec. *Potassæ calcinatæ* libras quattuor, . . . p. 2.*Aquæ destillatæ* libras sex p. 3.

Mixta, agitatione sæpius iteratâ, per triduum macerantur. Solutio clara post subsidentiam sordium defunditur et in vase ferreo mundo ad dimidium evaporat; tum, lixivio refrigerato, quod limpium est a crystallis, post diem unum alterumve depositis, decanthatur et in vase ferreo ad siccum vaporat. Residuum etiamnunc calens in pulverem redigitur et in vasis, optime obturatis, statim servatur.

CARBONAS KALICUS PURUS.

Alkali Tartari. Subcarbonas kalicum purum.

Tartarus depuratus, in pulverem redactus, in vas ferreum, ad rubedinem usque calefactum, per vices injicitur ibique ad plenam destructionem uritur. Massa alkalina, hinc orta, *Aquâ destillatâ* extrahitur, et liquor colatus in vase ferreo mundo vaporat ad siccum.

Servatur in vase, optime clauso. Si album non apparet, tale tandem fit ustione, dissolutione in Aqua destillata et evaporatione.

CATAPLASMA SINAPINUM FORTIUS.

Sinapismus aeris.

Rec. *Sinapis nigrae seminum pulveratorum* quantum placet,

Aquae destillatae quantum satis,

ut fiat cataplasma mollioris consistentiae, quod in vase vitreo, orificio amplo, epistomio vitreo claudendo, servandum est, ut promptum habeatur.

CATAPLASMA SINAPINUM MITIUS.

Sinapismus mitis.

Rec. *Secalis farinae* unciam unam, p. 1.

Sinapis nigrae seminum pulveratorum uncias tres, p. 3.

Aquae destillatae quantum satis,

ut fiat cataplasma mollioris consistentiae.

Paratur ex tempore.

CERATA.

Materiae pingues, in ceratis parandis, ope balnei aquae bullientis liquandae sunt ac miscendae.

Servantur loco frigido, non humido.

CERATUM ALBUM.

Rec. *Cerae albae* uncias duas et dimidiam, p. 5.

Cetacei uncias tres, p. 6.

Olei Olivarum communis uncias sex . p. 12.

Liquando miscentur. Massa, per linteum tra-
jecta, in capsulis refrigeratur.

CERATUM RUBRUM.

Ceratum labiale.

Rec. *Alcannæ radicis corticis* drachmas duas, p. 1.
Ceræ albæ unciam dimidiam, p. 2.
Olei Cacao unciam, p. 4.
Butyri recentis, nondum saliti, uncias
duas p. 8.

Simul liquefacta et mixta per linteum colan-
tur et in capsulis refrigerantur.

Servatur loco obscuro vel in vase non pel-
lucido.

CERATUM SABINÆ.

Rec. *Ceræ flavæ* unciam unam, p. 1.
Sabinæ ramulorum uncias duas, . . . p. 2.
Axungię curatæ uncias quattuor . . . p. 4.

In balneo vaporis per horam digeruntur; tum
per linteum exprimitur ceratum, in vase non
pellucido servandum.

CEREOLI.

Rec. *Olei Olivarum communis* partem unam, p. 1.
Ceræ flavæ partes sex p. 6.

Post lenem humidi evaporationem, e massa ab
igne remota fiunt cereoli, superficie lævi, vari-
antibus formâ et diametro, prout requiruntur.

CEREOLI PLUMBICI.

Cerei medicati.

- Rec. *Solutionis Subacetatis plumbici* drachmas
 duas, p. 2.
Cetacei drachmas tres, p. 3.
Ceræ flavæ libram p. 96.

In balneo vaporis liquefacta miscentur; e massa, nondum refrigerata, finguntur lege artis cereoli.

Parantur quoque, si requiruntur, cum *Solutionis Subacetatis plumbici* duplo vel quadruplo.

CHARTA AD FONTICULOS.

- Rec. *Terebinthinæ communis* uncias duas, . p. 4.
Sevi ovilli curati uncias quattuor, . . p. 8.
Ceræ flavæ libram dimidiam, p. 12.
Resinæ flavæ libram p. 24.

In balneo aquæ colliquatis atque etiamnunc calidis additur

Acetatis cuprici, in pulverem tenuem re-
 ducti, uncia dimidia, p. 1.
 et immerguntur in hanc miscelam colatam pla-
 gulæ chartæ tenuioris, albæ, tenacis, post re-
 frigerium servandæ.

CHLORETUM AURICO-NATRICUM.

Murias Aurico-natricum.

Auri ducatus vel pars una
 in *Acidi hydrochlorici* partibus quattuor
 et *Acidi nitrici diluti* parte una vel sufficiente
 quantitate, sensim addenda, solvitur. Liquidum,
Aquâ destillatâ dilutum, a Chloreto argenteo,
 in fundo remanente, separatur et cum solutione
 colatâ, e

*Sulphate ferroso et
Aqua destillata*

confectâ, miscetur, quamdiu oritur præcipitatum, colo papyraceo colligendum atque *Acido hydrochlorico* primum, dein *Aquâ destillatâ* lavandum et denique siccandum.

Auri tali modo purificati quantitas ponderata in *Acido hydrochlorico*, additâ quanta minima requiritur *Acidi nitrici diluti* copiâ, denuo solvitur. Solutioni, *Aquâ destillatâ* dilutiori factâ, ad *Auri* partes decem,

Salis communis partes tres adduntur; quibus solutis, liquor balnei vaporis calore ad siccum vaporat. Massa sicca in vase opaco ac bene clauso servatur.

CHLORETUM BARYTICUM.

Murias baryticum.

Terra ponderosa salita.

Rec. *Spathi ponderosi*, in pulverem subtilissimum contriti, libram p. 8.

Cum *Carbonis lignei* uncia sesquialtera . . p. 1.

et *Hordei farinæ* unciis tribus p. 2.

intime commiscetur et in crucibulo fictili, inde replendo, sub tegmine minoris crucibuli, Carbone contrito repleti, igne validissimo per horæ spatium vel amplius uritur. Crucibulo refrigerato et carbone rejecto, Sulphuretum baryticum cum

Aquæ destillatæ fervidæ libris tribus p. 24. in vase clauso, sæpius agitando, per horæ dimidium digeritur, et liquor ab insolutis colo separatur, quæ *Aquâ destillatâ* fervidâ abluenda sunt. Liquidis conjunctis caute instillatur

Acidi hydrochlorici

quantum ad saturandum requiritur. Tum liquor, post digestionem ad Sulphidum hydricum fugandum, ad siccum vaporat, massa residua in crucibulo per horæ dimidium uritur et postremo in Aquæ destillatæ ferventis sufficiente quantitate solvitur; solutio, etiamnunc fervida, per chartam colatur et loco frigido, ut crystalli formentur, seponitur. Liquidum remanens exhalatione minuitur, ut crystalli iterum formentur.

CHLORETUM CALCICUM.

Murias calcicum vel Calx salita.

Massa calcarea, quæ post præparationem Ammoniaci caustici remanet,

Acido muriatico crudo

saturatur. Solutio colata ad siccum vaporat, et massa sicca in crucibulo igni exponitur, donec omnis effervescentia cesset. Tum ignis augetur, ut quiete fluat massa liquata, quæ super laminam ferream effunditur et, quum etiamnunc calida in frustula est deminuta, in vase bene clauso servatur.

CHLORETUM FERRICO-AMMONICUM.

Murias ammonico-ferricum.

Sal ammoniacum martiale.

Chloreti ferrici uncia una p. 1.

et *Salis ammoniaci depurati* uncia sex . p. 6.

in *Aquæ destillatæ* sufficiente quantitate solvuntur; solutum, per chartam colatum, inter continuam agitationem, præsertim sub finem, in vase porcellaneo vaporat ad siccum. Servatur in vase bene clauso.

CHLORETUM FERRICUM.

Murias ferricum.

Rec. *Hæmaticæ præparati* quantum placet,
Acidi hydrochlorici triplum podus.

Digeruntur in phiala vitrea vel potius in retorta vitrea, excipulo adaptato, ut destillatum in retortam refundi possit, donec acidum saturatum sit. Liquidum rubicundum, colatione separatum ab Hæmatite non soluto, in patina porcellanea, evaporando ope balnei vaporis, ad syrupi tenuioris spissitudinem redigitur; tum patina, laminâ vel campanâ vitreâ tecta, in locum frigidum et humidum per hebdomadas vel menses seponitur, donec crystalli, in massam aurantiacam concretæ, crescere desinant, quæ muriâ liberatæ in lagenâ sicca, probe obturanda, servantur.

 § CHLORETUM HYDRARGYRICUM CORROSIVUM.

Murias hydrargyricum corrosivum.

Mercurius corrosivus albus sublimatus.

Rec. *Hydrargyri destillati* uncias sex, . . . p. 2.

Acidi Vitrioli uncias novem p. 3.

In vase porcellaneo decoquantur ad siccum.

Massa sicca pulverata cum

Salis communis siccati et pulverati æqua portione intime commiscetur, et e cucurbita vel lagenâ vitrea, plane sicca, in arenâ immersa et ad tertiam tantum partem repleta, fit, calore lenissimo, sublimatio. Massa crystallina, ad superiora

superiora cucurbitæ vel lagenæ hærens, a scoriis purgata, caute servatur.

CHLORETUM HYDRARGYROSUM.

Murias hydrargyrosus. Mercurius dulcis. Calomel.

Acidum nitricum dilutum

cum *Hydrargyri destillati* superflua quantitate coquendo digeritur, idque per horæ spatium fit post gasis rubicundi cessationem, vel usque dum solutio flavescere incipiat. Acidum Oxido hydrargyroso saturatum et etiam nunc fervidum

Aquæ destillatæ fervidæ partibus duodecim et *Acidi nitrici diluti* parte vel dimidiâ vel tantâ diluitur, ut liquor clarus evadat, qui, Aquâ destillatâ affusâ, non turbetur. Hic liquor, mox colatus, solutioni colatæ et ferventi, quæ

Salis communis partem, Hydrargyro soluto pondere æqualem,

in *Aquæ destillatæ* duodecuplo pondere solutam, continet, inter agitandum additur.

Quod fundum petit a liquido separatur et, Aquâ destillatâ fervidâ diligentissime elotum, in charta bibula leni calore siccat.

CHLORETUM STIBICUM.

Murias stibiosus. Butyrum Antimonii.

Rec. *Sulphureti stibici præparati*,

Acidi Vitrioli, singulorum partes æquales.

In patina porcellanea miscentur et ope caloribus ad siccum usque rediguntur. Quæ restat massa albida vel cinerea cum

Salis communis, siccati et in pulverem reducti, duplo pondere

commiscetur et in retortam vitream immittitur, ex qua, adaptato excipulo sicco, fit in balneo arenæ destillatio; interea cavendum, ne retortæ collum, si major admoveatur frigoris vis, destillato obstruatur. Destillatum, quod produci-
tur, in vase vitreo, epistomio vitreo instructo, asservatur.

CHLORETUM ZINCICUM.

Rec. *Acidi hydrochlorici* quantum placet.

Additur huic per vices

Zinci laminati vel granulati tantum, ut, ces-
sante effervescentiâ acidoque saturato, copia quæ-
dam *Zinci* intacta supersit. Liquor, per colum
trajectus, calore vaporat, donec refrigeratione
concreseat in massam salinam, quæ statim in
vitro sicco et probe clauso servatur.

CINNABARIS PRÆPARATA.

Præparatur *Cinnabaris rubra* ut Bolus præ-
parata.

CONDITUM AURANTII.

Aurantiorum cortices in *Aquam fluvialem*
fervidam immerguntur, donec mollescant, ita ut
culmo secalino perforari queant. Tum cortices,
ab albedine mundati, cribro subverso imponun-
tur, ut a humore superfluo liberentur. In vas
vitreum jam inditis affunditur *Syrupus Saccha-
ri*, qui eos contegat. Post diem unum alterumve
eximuntur cortices, qui syrupo, modico calore
spissato atque refrigerato, iterum immerguntur
et post aliquot dierum macerationem denuo exi-
muntur. Syrupus residuus, cum *Saccharo* iterum

ad justam spissitudinem reductus, postea corticibus affunditur, ut hos tegat.

Si e corticibus recentibus paratur conditum, maceratione non opus est.

CONFECTIO CINÆ.

Rec. *Cinæ levanticae*, a stipitibus aliisque quisquiliis optime mundatæ, partem unam.

Cacabo aheneo, amplo, super lenissimum ignem suspenso, immissæ affunduntur sensim

Sacchari albi, ad consistentiam tabulati cocti, partes quattuor vel quantum sufficit,

cacabum interea assidue agitando et massam spatulâ ligneâ probe intermiscendo. Semirefrigerata manu leviter teritur, ut globuli minuti formentur, donec omnia sicca appareant; tum partes pulverulentæ et semina, non satis incrustata, cribri ope ab incrustatis separantur, quæ servanda sunt. Cetera in cacabo, denuo mundato, eodem modo tractantur, donec saccharo rite obducta sint.

CONSERVA COCHLEARIÆ.

Cochleariæ Herbae, minutim sectæ et diligenter contusæ, admiscetur *Sacchari albi* pulverati duplum.

CONSERVA ROSÆ.

Conserva Rosæ rubræ.

Rosæ multiplicis petalis recentibus et diligenter contusis admiscetur *Sacchari albi* pulverati par pondus.

CORALLIA PRÆPARATA.

Præparatur *Corallium rubrum* eodem modo, quo Bolus præparata.

CORNU CERVI USTUM PRÆPARATUM.

Cervi cornua in fornace comburuntur, donec penitus albescant; deinde statim præparantur eodem modo, ac Bolus præparata, et in vase bene clauso servantur.

Præparatum ejusdem indolis fit etiam ex *Ossibus Pecorum*.

CRETA PRÆPARATA.

Præparatur eodem modo, quo Bolus præparata, *Creta albissima*.

CYANETUM FERRICO-FERROSUM.

Cæruleum Berolinense.

Rec. *Chloreti ferrici* uncias tres, p. 1.

Aquæ destillatæ libras quinque . . . p. 20.

Fit solutio, cui colatæ additur partitis vicibus solutio colata, e

Kali zootico

et *Aquæ destillatæ* sufficiente quantitate confecta, quamdiu præcipitatum cæruleum prodit; cavendum tamen, ne excedat Kali zooticum. Liquor, inter præcipitandum bene agitatus, per horas viginti quattuor seponitur, quibus preterlapsis, quod limpidum est defunditur; præcipitatum vero in vase alto *Aquâ destillatâ*, sæpius affusâ et subinde post quietem defusâ, perfecte elotum colo colligitur et siccat. In pulverem redactum in vase, bene clauso, servatur.

✕

CYANETUM KALICUM.

Rec. *Kali zootici*, in pulverem redacti, uncias
duas, p. 4.

Acidi sulphurici destillati,

Aquæ destillatæ, singulorum unciam . p. 2.

Sali, retortæ vitreæ tubulatæ indito, miscela refrigerata *Acidi et Aquæ* superfunditur, et fit, calore balnei *Chloreti calcici*, destillatio, quamdiu prodit acidum hydrocyanicum, quod per tubum vitreum incurvum, ad collum retortæ rite adaptatum, in lagenam perducitur, cui inest solutio clara, e

Hydratis kalici uncia p. 2.

et *Spiritus concentrati* unciis tribus et semis p. 7.

confecta; quod dum fit, tubus et lagena sollicitè sunt refrigeranda. Quæ, destillatione finitâ, lagenæ insunt crystalli, super colum papyraceum colliguntur, Spiritu concentrato eluuntur et, inter chartæ plagulas quam citissime siccatae, in vase optime clauso servantur.

DECOCTA.

Parantur (nisi aliud expressis verbis præscribitur) in vasis cylindricis altis, e stanno puro vel massa porcellanea confectis. Hæc vasa tegenda sunt operculo, cui est foramen, per quod tubus pure stanneus prope ad fundum demitti possit. Jam vero, ubi decoctum est præparandum, substantiæ, pro diversa singularum indole comminutæ, tantâ *Aquæ destillatæ* ferventis copiâ humectantur, quantâ opus est, ut, operatione peractâ, præscriptam habeas decocti quantitatem; tum, operculo admoto, vapores aquæ, in apparatu idoneo bullientis, per tubum deducuntur, ita ut liquor in vase ferveat.

Post horæ quadrantem, operculo tuboque sublatis, decoctum etiamnunc calidum exprimendo colatur. At vero, si colatura pondus præscriptum non expleat, residuum aquâ calidâ humectandum est atque iterum exprimendum, ita ut colatura habeatur ponderis debiti.

DECOCTUM ALTHÆÆ.

Rec. *Althææ radice* incisæ drachmas tres p. 1.
Fit decoctum libræ dimidiæ p. 16.

DECOCTUM CINCHONÆ.

Rec. *Cinchonæ cortice* (ubi nil certi statuitur, *Cinchona regia* adhibenda) contusi unci-
am. p. 1.
Fit decoctum unciarum decem p. 10.

DECOCTUM GUAJACI COMPOSITUM.

Decoctum Lignorum.

Rec. *Liquiritiæ radice* incisæ drachmas duas, p. 1.
Saponariæ radice incisæ unci-
diam, p. 2.
Juniperi ligni rasi unci-
am, p. 4.
Guajaci ligni rasi unci-
am unam et semis p. 6.
Fit decoctum librarum trium p. 144.

DECOCTUM HORDEI.

Rec. *Graminis radice* incisæ drachmam, . p. 1.
Hordei crimnorum, aquâ calidâ aliquoties
elotorum, drachmas tres p. 3.
Fit decoctum libræ unius p. 96.

DECOCTUM HORDEI ACIDULUM.

- Rec. *Oxymellis* unciam dimidiam, p. 1.
Decocti Hordei libram p. 24.
 Miscentur.
-

DECOCTUM SARSAPARILLÆ.

- Rec. *Sarsaparillæ radicis*, minutissime incisæ,
 uncias tres p. 1.
 Coquendo per horam fit decoctum librarum
 duarum p. 8.
-

DECOCTUM SARSAPARILLÆ COMPOSITUM.

- Rec. *Mezerei corticis* contusi drachmam et se-
 mis, p. 3.
Sassafras radicis rasæ,
Guajaci ligni rasi,
Liquiritiæ radicis incisæ, singulorum un-
 ciam dimidiam, p. 8.
Sarsaparillæ radicis, minutissime incisæ, un-
 cias quattuor p. 64.
 Fit, coquendo per horam, decoctum unciarum
 viginti et quattuor p. 384.
-

DECOCTUM ZITTMANNI FORTIUS.

- Rec. *Sarsaparillæ radicis*, minutissime incisæ,
 libram, p. 96.
Aquæ destillatæ, libras septuaginta
 duas p. 6912.
 Digeruntur per horas viginti quattuor. Im-
 missis deinde
Cinnabaris rubræ pulveratæ drachmâ, p. 1.
Chloreti hydrargyrosi drachmis quat-
 tuor, p. 4.

Aluminis crudi pulverati,
Sacchari albi pulverati, singulorum drach-
 mis sex, p. 6.
 commixtis et sacco linteo inclusis, in vase fi-
 ctili vitreato decoquuntur ad remanentiam li-
 brarum viginti quattuor (p. 2304); additis sub
 finem coctionis

Anisi seminum,

Fœniculi seminum, singulorum drachmis
 quattuor, p. 4.

Liquiritiæ radicis incisæ unciâ unâ et
semis, p. 12.

Sennæ alexandrinæ unciis tribus . . p. 24.

Exprimendo colatum, a sedimento defunditur
 decoctum et in lagenas, unius libræ capaces, datur.

DECOCTUM ZITTMANNI MITIUS.

Rec. *Residuum Decocti Zittmanni fortioris,*
Sarsaparillæ radicis, minutissime incisæ, un-
 cias sex, p. 16.

Aquæ destillatæ libras septuaginta
 duas p. 2304.

Decoquuntur in vase fictili vitreato ad rema-
 nentiam librarum viginti quattuor (p. 768); ad-
 ditis sub finem coctionis

Cardamomi minoris seminum,

Cinnamomi ceylanici corticis,

Flavedinis Citri, singulorum contusorum
 drachmis tribus, p. 1.

Liquiritiæ radicis incisæ drachmis sex p. 2.

Colatura, exprimendo facta, a sedimento de-
 funditur et in lagenas, librarum duarum capa-
 ces, datur.

ELÆOSACCHARUM CINNAMOMI.

Pulvis cordialis.

Rec. *Olei Cassiæ* guttas sedecim,
Cinnabaris rubræ pulveratæ drachmas
 duas, p. 1.
Sacchari albi pulverati unciam p. 4.

Miscentur terendo et in vase, bene clauso,
 servantur.

Eodem modo parantur, sed non nisi usu
 urgente et sine addita Cinnabari, e *reliquis*
Ætheroleis, Elæosacchara.

ELATERINUM.

Rec. *Elaterii albi* quantum vis,
Spiritus concentrati triplum pondus.

Digeruntur in vase clauso per nycthemeron;
 residuum non solutum, a solutione spirituosa
 colando separatum, cum nova Spiritus copia
 iterum digeritur, quæ colatur. Liquores spiri-
 tuosi in balneo aquæ ad syrupi spissitudinem
 vaporando rediguntur et, etiamnunc calentes,
 in *Aquam destillatam* bullientem infunduntur.
 Quæ inter refrigerationem aquæ deponuntur cry-
 stalli, primum *Aquâ destillatâ* frigidâ, dein
Æthere lavandæ sunt, siccandæ et servandæ.

ELECTUARIA.

Enixe terendo parata in vasis vitreis vel fi-
 gulinis natro vitreatis vel porcellaneis, bene ob-
 turatis, loco frigido reponuntur.

ELECTUARIUM MANNÆ.

- Rec. *Mannæ electæ*,
Sacchari albi pulverati,
Aquæ Foeniculi, singulorum uncias duas p. 16.
 Mixta exprimendo colantur; deinde admiscentur
Iridis florentinæ radicis, in tenerum pulve-
 rem tritæ, drachma, p. 1.
Olei Amygdalarum recentis uncia . . . p. 8.
-

ELECTUARIUM MYRRHÆ COMPOSITUM.

- Rec. *Myrrhæ electæ*,
Sanguinis Draconis,
Catechus, singulorum pulveratorum drach-
 mas tres, p. 3.
Saponis albi hispanici rasi unciam . . p. 8.
 Teruntur in mortario vitreo vel lapideo cum
 sufficiente *Spiritus diluti* quantitate, ut fiat massa
 uniformis, spissitudinis extracti mollioris; deinde
 adduntur
Caryophyllorum pulveratorum uncia, p. 8.
Mellis depurati uncia quattuor . . . p. 32.
 Miscentur, bene iterum triturando.
-

ELECTUARIUM SCORDII.

loco *Diascordii*.

- Rec. *Opii levantici* drachmam unam et semis, p. 3.
Tormentillæ radicis,
Pechurim fabarum,
Catechus, singulorum uncias duas, . . p. 32.
Scordii herbæ uncias tres, p. 48.
Mellis depurati uncias viginti et octo p. 448.
 Opium, cum *Vino de Malaga* tritum, additur
 Melli paullulum calefacto, cui cetera, in pulve-
 rem redacta, admiscentur.
-

ELECTUARIUM SENNÆ.

loco Electuarii lenitivi.

- Rec. *Coriandri seminum* pulveratorum unciam
 dimidiam, p. 1.
Sennæ alexandrinæ pulveratæ uncias quat-
 tuor, p. 8.
Syrupi Sacchari uncias octo, p. 16.
Pulpæ Tamarindorum depuratæ libram p. 24.
 Miscentur.

ELIXIR AMARUM HJÆRNERI.

- Rec. *Specierum amararum Hjærneri* uncias
 tres, p. 1.
Spiritus diluti libras duas p. 8.
 Per triduum inter agitandum digesta colantur.

ELIXIR STOMACHICUM TEMPERATUM
HOFFMANNI.

Elixir viscerale vinosum Hoffmanni.

- Rec. *Extracti Absinthii*,
Extracti Cardui benedicti,
Extracti Centaurii minoris,
Extracti Gentianæ, singulorum unciam di-
 midiam, p. 1.
Tincturæ Aurantii unciam, p. 2.
Flavedinis Aurantii concisæ uncias duas, p. 4.
Vini de Malaga libram p. 24.
 Per triduum inter agitandum digesta colantur.

EMETINA.

- Rec. *Ipecacuanhæ radices* pulveratæ partem unam,
Aquæ destillatæ, *Acido sulphurico destillato*
 paullum acidulatæ, partes sex.

Per diem noctemque inter agitandum digesta et deinde refrigerata colantur. Colatura, additâ

Calcis ustæ, affusâ Aquâ, primum in hydratem, dein in pulvem conversæ, parte unâ,

ope balnei vaporis ad siccum redigitur; massa sicca et pulverata cum

Spiritu concentrato

decoquitur, quamdiu aliquid ab eo solvatur, quod colatum, destillando et vaporando, ad formam siccam est redigendum.

Quæ sic obtinetur Emetina, minus pura, in parva quantitate *Aquæ destillatæ Acido sulphurico destillato* acidulatæ, solvenda est, coquendo cum *Carbone animali* a materia colorante liberanda et e solutione colata, vaporando concentrata, ope *Ammoniaci caustici* præcipitanda. Quod fundum petit, colo colligitur, Aquâ destillatâ frigidâ eluitur et siccatum in vase, bene clauso, servatur.

EMPLASTRA.

Parantur emplastra partibus, quibus conficiuntur, ad temperaturam $+100^{\circ}$ C. haud superantem, liquefaciendis ac miscendis; ubi major caloris vis in emplastro quodam conficiendo requiritur, ibi in formula ejus id expressis verbis præscriptum invenies.

Parata vel in capsulis refrigerantur vel, si id non præscriptum fuerit, etiamnunc mollia manibus, bene lotis et aquâ humectandis, in magdaleones formantur et in cistulis vel ligneis vel e ferro laminato albo confectis atque, quantum fieri potest, clausis, servantur loco frigido nec humido.

Illa,

Illa, quæ substantias herbaceas, Extracta vel Cantharides continent, priusquam servantur, aëris tepidi contactu siccanda sunt, ne mucorem contrahant.

Officinalis sive Margaritiferæ belyoid.

EMPLASTRUM ADHÆSIVUM.

Rec. *Cerussæ albæ* libram dimidiam, p. 2.

Lithargyrü præparati libram sesquial-
teram, p. 6.

Olei Olivarum communis libras tres . p. 12.

In aheno capaci mixta ad modicum ignem, spatulâ continue agitando et Aquam destillatam fervidam subinde cauteque admiscendo, coquantur, ut fiat emplastrum, cui, post humidi consuntionem, admiscentur

- *Resinæ flavæ* liquatæ et colatæ uncia novem p. 3.

EMPLASTRUM ASSÆ FOETIDÆ COMPOSITUM.

Emplastrum foetidum.

Rec. *Ceræ flavæ* uncias duas, p. 2.

Emplastri plumbici uncias novem . . . p. 9.

Simul liquefactis et paullum refrigeratis cribrando admiscentur

Assæ foetidæ,

Galbani, singulorum pulveratorum uncia
quattuor p. 4.

Fit emplastrum.

EMPLASTRUM CALAMINÆ.

Emplastrum e Calaminari lapide.

Rec. *Sevi bubuli curati,*

Terebinthinæ communis, singulorum drach-
mas sex, p. 3.

- Ceræ flavæ* uncias duas et semis, . . . p. 10.
Emplastri plumbici libram p. 48.
 Liquefactis et colatis adjicitur
Calaminæ preparatæ libra; p. 48.
 quibus mixtis fit emplastrum.
-

EMPLASTRUM CANTHARIDUM.

Emplastrum vesicatorium.

- Rec. *Ceræ flavæ*,
Resinæ flavæ,
Servi ovilli, singulorum uncias quattuor p. 2.
 Liquefactis et colatis inter agitationem perpetuam sensim et exacte admiscentur
Cantharidum recenter et subtilissime pulveratarum unciam sex p. 3.
 Per horæ quadrantem liquata habentur et inter agitandum refrigerantur.
-

EMPLASTRUM CANTHARIDUM CAMPHORATUM.

- Rec. *Camphoræ depuratæ*, cum guttulis *Olei Olivarum* terendæ, scrupulum, p. 1.
Emplastri Cantharidum unciam . . . p. 24.
 Miscentur. Paratur ex tempore.
-

EMPLASTRUM CANTHARIDUM CUM EUPHORBIO.

Emplastrum vesicatorium perpetuum Janini.

- Rec. *Terebinthinæ venetæ*,
Mastiches pulveratæ, singularum uncias sex p. 6.
 Liquatis et colatis admiscentur

Euphorbii pulverati uncia, p. 1.
Cantharidum pulveratarum uncia duæ p. 2.
 Fit emplastrum.

EMPLASTRUM CERÆ.

Emplastrum citrinum.

Rec. *Resinæ flavæ* libram dimidiam, . . . p. 1.
Sevi bubuli curati,
Ceræ flavæ, singulorum libram cum dimi-
 dia p. 3.
 Simul liquefacta et colata in capsulis refrige-
 rantur.

EMPLASTRUM CONII.

Rec. *Ceræ flavæ* uncias tres, p. 3.
Emplastri plumbici libram p. 12.
 Liquefactis et mixtis admiscentur
Extracti Conii spirituosi uncia duæ. p. 2.
 Fit emplastrum.

EMPLASTRUM GUMMI AMMONIACI SCILLITICUM.

Rec. *Gummi ammoniaci* pulverati libram, p. 1.
Aceti Scillæ libras duas p. 2.
 Gummi ammoniacum cum Aceto Scillæ dilui-
 tur et liquidum in vase fictili vitreato vel por-
 cellaneo inter continuam agitationem evaporat,
 donec justam habeat spissitudinem.

EMPLASTRUM GUMMI-RESINOSUM.

Emplastrum gummosum.

Rec. *Ceræ flavæ* libram dimidiam, p. 1.
Emplastri plumbici libras tres p. 6.

Simul liquefactis, ab igne remotis et paululum refrigeratis, cribrando admiscetur

Gummi ammoniaci,

Galbani, singulorum pulveratorum libra dimidia, p. 1.
ut omnium unitas fiat.

EMPLASTRUM HJÆRNERI.

Emplastrum saponaceo-plumbicum.

Rec. *Cerussæ albæ* pulveratæ uncias novem, p. 18.

Saponis albi hispanici uncias decem, p. 20.

Minii pulverati libram et semis, . . . p. 36.

Olei Olivarum communis uncias quadraginta et quinque p. 90.

Sapo rasmus in oleo liquatur; quo facto pulveres, cum oleo mixti, igni admoventur, usque dum soluti sint et massa colorem castaneum obtinuerit; tum demum adjicitur

Terebinthinae communis uncia cum dimidia, p. 3.
et fit emplastrum.

EMPLASTRUM HYDRARGYRI.

Rec. *Axungia curatæ* drachmas duas, . . p. 2.

Terebinthinae venetæ drachmas novem, p. 9.

Hydrargyri uncias tres p. 24.

Hydrargyro cum Terebinthina, donec majores Hydrargyri globuli evanuerint, contrito additur Axungia, quo facto omnia ad plenam Hydrargyri extinctionem conterantur; tum subigendo cum

Ceræ flavæ uncia una et semis, . . . p. 12.

Emplastri plumbici unciis sex, . . . p. 48.
simul liquatis, in unum coguntur.

EMPLASTRUM HYOSCYAMI.

Ut Emplastrum Conii ex *Extracto Hyoscyami spirituoso* paratur.

EMPLASTRUM MELILOTI.

Rec. *Olei Olivarum communis* uncias octo, p. 2.

Resinæ flavæ,

Ceræ flavæ, singularum libram p. 3.

Colliquatis colatisque ac paullum refrigeratis admiscentur

Meliloti herbæ pulveratæ uncia sedecim p. 4.

Fit emplastrum.

EMPLASTRUM PICIS.

Rec. *Terebinthinæ venetæ* uncias quattuor, p. 4.

Ceræ flavæ uncias octo, p. 8.

Picis solidæ uncias sedecim, p. 16.

Resinæ flavæ uncias viginti tres. . . . p. 23.

Simul liquata colantur et in capsulis, oleo unctis, refrigerantur.

EMPLASTRUM PLUMBICUM.

Emplastrum Oxidi plumbici vel commune.

Rec. *Lithargyrii præparati* partem unam, p. 1.

Olei Olivarum communis partes duas p. 2.

In ahenò capaci mixta, spathulâ continue agitando et Aquam destillatam ferventem, ne humidum deficiat, subinde cauteque instillando, coquantur ad modicum ignem, donec emplastrum factum sit.

EMPLASTRUM SAPONACEUM.

Emplastrum saponatum.

Rec. *Saponis albi hispanici* uncias tres, . . . p. 1.

Emplastri plumbici libras duas p. 8.

Simul liquata igni admoventur, usque dum colorem castaneum acceperint.

EMPLASTRUM STOMACHICUM.

Emplastrum aromaticum.

Rec. *Terebinthinæ communis* unciam, . . . p. 8.

Sevi ovilli curati uncias tres, p. 24.

Ceræ flavæ uncias quattuor p. 32.

Colliquatis colatisque ac semirefrigeratis immiscentur

Ætherolei Menthæ piperitidis,

Ætherolei Caryophyllorum, singulorum

drachma, p. 1.

Olei Nucis moschatæ drachmæ sex, . . p. 6.

Benzoës amygdaloidis pulveratæ uncia, p. 8.

Olibani pulverati uncia duæ p. 16.

Fit emplastrum in vase, probe clauso, servandum.

EMPLASTRUM ZINCICO-PLUMBICUM.

Emplastrum diapompholygos.

Rec. *Olei Olivarum communis* uncias sex, p. 12.

Ceræ flavæ libram unam p. 24.

Colliquatis subigendo admiscentur

Olibani pulverati uncia una et semis, p. 3.

Oxidi zincici uncia tres, p. 6.

Cerussæ albæ pulveratæ uncia quattuor, p. 8.

Graphitæ pulverati uncia sex p. 12.

Fit emplastrum.

EMULSIONES.

Quum, in emulsionibus parandis, materiæ emulgendæ cum liquido quodam diluendæ sunt, hoc tali modo efficitur, ut in mortario lapideo cum liquidi pauxillo primum in pulvem mollem terantur, cui deinde, quæ superest liquidi pars, inter triturandum sensim additur.

Omnes ex tempore parantur.

EMULSIO AMYGDALINA.

Emulsio communis.

Amygdalæ dulces Aquâ fervidâ infunduntur; deinde, post horæ quadrantem, vel quum, inter digitos leviter pressæ, cuticulam facile amittant, decorticantur.

Amygdalarum ita decorticatarum uncia una et dimidia p. 3.
una cum *Sacchari albi* pulverati uncia, sensim addenda, p. 2.

in mortario lapideo, affundendo *Aquæ destillatæ* unciam circiter unam et contundendo, in massam penitus pultaceam redigitur, cui inter triturationem additur

Aquæ destillatæ tantum, ut fiat, lenissime exprimendo, colatura libræ unius (p. 24).

EMULSIO ASSÆ FOETIDÆ.

Mixtura Assæ foetidæ.

Rec. *Assæ foetidæ* pulveratæ drachmas duas, p. 1.

Aquæ Menthæ piperitidis uncias quatuor p. 16.

Terendo fit emulsio.

EMULSIO CAMPHORATA.

loco Mucilaginis camphoratæ.

- Rec. *Camphoræ depuratæ* grana sex, . . . p. 1.
Gummi arabici pulverati drachmam dimidiam, p. 5.
Emulsionis amygdalinæ uncias sex . p. 480.
 E contritis fit emulsio.
-

EMULSIO CANNABINA.

- Rec. *Sacchari albi* pulverati unciam dimidiam, p. 1.
Cannabis seminum unciam et semis . . p. 3.
 Fit, ut de Emulsione amygdalina præscriptum est, emulsio libræ unius p. 24.
-

EMULSIO CORNUS CERVI USTI.

Decoctum album.

- Rec. *Cornus Cervi usti præparati*,
Gummi arabici, singulorum unciam dimidiam, p. 1.
Aquæ destillatæ libram p. 24.
 Paullum ebulliunt. Refrigeratis admiscetur
Syrupi Amygdalarum uncia dimidia p. 1.
 Datur sine colatura.
-

EMULSIO GUAJACINA.

Mixtura Gummi Guajaci.

- Rec. *Gummi arabici* pulverati drachmam, p. 1.
Guajaci resinæ pulveratæ drachmas duas, p. 2.
Sacchari albi pulverati drachmas sex p. 6.
 Optime contritis additur sensim
Aquæ Menthæ piperitidis tantum,
 ut fiat emulsio libræ dimidiæ p. 48.
-

EMULSIO GUMMOSA.

Emulsio Gummi arabici.

Rec. *Gummi arabici* pulverati drachmas duas, p. 1.*Emulsionis amygdalinæ* uncias sex . . p. 24.

Terendo miscentur.

EMULSIO GUMMI AMMONIACI.

Lac ammoniacum.

Fit eodem modo, ac Emulsio Assæ foetidæ,
e *Gummi ammoniaco* pulverato.

EMULSIO HYDROCYANICA.

♁

Rec. *Amygdalini* grana duodecim, p. 1.*Emulsionis amygdalinæ* uncias duas . p. 80.In lagena claudenda miscentur et per horam,
interdum quassando, macerantur.

EMULSIO MYRRHÆ FERRATA.

loco Mixturæ Myrrhæ Griffithi.

Rec. *Myrrhæ electæ* pulveratæ drachmam p. 12.

Diluitur terendo cum

Aquæ menthæ piperitidis unciis sex et di-
midia p. 624.

Dein colatis adduntur

Sulphatis ferrosi scrupulus, p. 4.*Carbonatis kalici puri* grana viginti et

quinque, p. 5.

Syrupi Sacchari drachmæ duæ, . . . p. 24.*Tincturæ lavendulæ aromaticæ* drachmæ

sex p. 72.

EMULSIO SALINA.

Rec. *Amygdalarum dulcium* excorticatarum et
contusarum unciam, p. 8.

Mellis depurati unciam unam et dimi-
diam p. 12.

Contrita cum

Aquæ destillatæ tanta copia
diluuntur, ut, solutis in emulsione

Tartratis kalici drachmis tribus, . . . p. 3.
fiat colatura libræ unius p. 96.

ENEMATA.

Quum jubentur, haud cunctanter paranda.

ENEMA COMMUNE.

Rec. *Avenæ crinnorum* uncias duas, . . . p. 1.

Aquæ fluvialis libras duas p. 12.

Coquantur ad colaturam libræ unius (p. 6),
in qua solvuntur

Salis communis pulverati unciaæ duæ . p. 1.

Huic decocto, semper in promptu habendo et
in cella servando, quum jubetur Enema, inter
quassandum addendæ sunt

Olei Olivarum communis unciaæ duæ . p. 1.

ENEMA NICOTIANÆ.

Rec. *Nicotianæ foliorum* comminutorum drach-
mam unam p. 1.

Infunduntur cum

Aquæ destillatæ fervidæ unciis octo, p. 64.
et per horæ quadrantem inter agitandum mace-
rantur; dein colantur.

∞

ENEMA OPII.

Rec. *Amyli* drachmas duas p. 4.

Cum exigua Aquæ copia trituratæ

Aquæ destillatæ ferventis uncis quattuor p. 64.

sensim et inter agitandum admiscentur. Quum in unum coierint, additur

Tincturæ Opii drachma dimidia p. 1.

EXTRACTA.

In extractis, summâ curâ parandis, id agendum, ut aquæ, ubi eâ opus sit, quam minima copia adhibeatur et inter evaporandum ille semper caloris gradus teneatur, quem præbet balneum vaporis. Quum ad justam spissitudinem redacta sunt (sub finem evaporationis, inter continuam cum spathula agitationem), etiam nunc calentia immittuntur in vasa vitrea, post refrigerationem epistomiis vitreis arcte claudenda et loco frigido servanda.

Vasa, in quibus fit evaporatio, porcellanea sint vel e stanno puro confecta.

EXTRACTUM ABSINTHII.

Rec. *Absinthii summitatum*, minutim concisarum, quantum placet.

Cum *Aquæ destillatæ* ferventis sufficiente quantitate in pulvem fluidam rediguntur et, in dolio tecto interdum agitatae, per horas viginti quattuor macerantur. Tum puls illa, sacculis linteis inclusa, prelo exprimitur; residuum vero cum *Aquæ destillatæ* fervidæ minori, quam antea adhibita fuerit, copiâ in pultis lentæ formam denuo redigitur exprimiturque post duodecim horarum macerationem. Quæ expressa

sunt liquida, in vasis figulinis vitreatis vel ligneis per noctem mixta relinquuntur, ut subsidat sedimentum; tum per pannum colantur et ad justam spissitudinem evaporant.

Fit etiam expressio sine sacculis et quidem commodius, prelo in dolium, apte ad id fabricatum, intrante.

✕

EXTRACTUM ACONITI.

Aconiti folia recentia, paullulum concisa, in mortario lapideo contunduntur, sub finem addendo foliorum libris singulis *Aquæ destillatæ* uncias duas, ut fiat massa pultacea, quæ, sacculis linteis inclusa, prelo fortiter exprimitur. Succus inde profectus leni igne ad ebullitionem calefit, per pannum traicitur et ad syrupi spissitudinem vaporando redigitur.

Hujus succi partibus duabus, in lagenam immisissis, *Spiritus concentrati* partes tres adduntur; quæ mixta optime conquassantur et per noctem seponuntur. Tum liquor supernatans primum, postea cetera colo chartaceo, antea madefacto, caute infundenda sunt et Spiritu edulcoranda; quæ vero colando clara facta sunt ad spiritum fugandum destillant. Liquor residuus, denuo colatus, ad extracti spissitudinem vaporat.

✕ EXTRACTUM ACONITI SPIRITUOSUM.

Rec. *Aconiti foliorum siccatorum* partem unam,
Spiritus diluti partes duas.

Folia grandiuscule pulverata in cucurbita vel lagena amplioris orificii per nycthemeron inter agitandum

agitandum cum Spiritu digeruntur. Expressione forti deinde institutâ, residuo

Spiritus diluti pars una et dimidia denuo superinfunditur; quæ, iterum digesta, bene exprimuntur. E liquoribus colatis Spiritus destillatione separandus est, et residuum denuo colatum lege artis inspissandum.

†X
EXTRACTUM BELLADONNÆ.

Paratur e *Belladonnæ foliis*, ut Extractum Aconiti spirituosum.

EXTRACTUM BETULÆ.

E *Betulæ foliis* recentibus, ut Extractum Absinthii, paratur.

EXTRACTUM CARDUI BENEDICTI.

Paratur, ut Extractum Absinthii, e *Cardui benedicti foliis*.

EXTRACTUM CASCARILLÆ.

Rec. *Cascarillæ corticis* contusi partem unam,
Aquæ destillatæ ferventis partes tres.

Post unicam ebullitionem lenem exprimendo colantur. Residuum iterum leniter coquitur cum *Aquæ destillatæ* partibus tribus et liquor exprimitur atque colatur; idque iteratur, donec aqua nullum saporem inde trahat.

Liquores, qui singulis ebullitionibus proveniunt, separatim ad syrupi spissitudinem vaporando rediguntur; tunc omnes commiscuntur et ad justam consistentiam vaporant.

EXTRACTUM CENTAURII MINORIS.

E *Centaurii minoris summitatibus* paratur eodem modo, quo Extractum Absinthii.

EXTRACTUM CHAMOMILLÆ.

Paratur e *Chamomillæ nostratis floribus* eodem modo, ac Extractum Absinthii.

EXTRACTUM CINÆ.

Rec. *Cinæ levantice* pulveratæ quantum placet, *Ætheris* sufficientem quantitatem.

In apparatu idoneo, ut de Acido quercitanico jam præceptum est, instructo, Cina *Æthere* ter quaterve extrahitur. E liquoribus æthereis commixtis et, si opus est, colatis, quod cito et per infundibulum, laminâ vitreâ tectum, fieri debet, *Ætheris* quinque circiter sextæ partes distillatione evocantur; residuum vero in patina porcellanea vaporando comminuitur, ut fiat extractum.

EXTRACTUM CINCHONÆ.

E *Cinchonæ regie cortice* paratur, ut Extractum Cascarillæ.

EXTRACTUM COLOCYNTHIDIS COMPOSITUM.

Rec. *Colocynthis pulpæ* uncias quattuor, p. 16.
Aquæ destillatæ libras quattuor. . . p. 192.

Modico igne decoquantur ad dimidium, et humor colatus balnei vaporis calore vaporat,

donec in mellis spissitudinem coierit. Tum admiscetur in pulverem tenuem tritorum

Caryophyllorum drachmæ duæ, . . . p. 1.

Scammonii aleppensis unciaæ duæ, . . . p. 8.

Aloës lucidæ unciaæ quattuor, . . . p. 16.

et miscela, vaporando exsiccata atque pulverata, servatur.

⌘
EXTRACTUM CONII.

(Extractum Cicutæ interdum dictum.)

Paratur e *Conii herba recenti* eodem modo, ac Extractum Aconiti.

EXTRACTUM CONII SPIRITUOSUM. ⌘

E *Conii herba siccata* paratur, ut Extractum Aconiti spirituosum.

EXTRACTUM DULCAMARÆ.

Paratur e *Dulcamaræ stipitibus*, ut Extractum Absinthii.

EXTRACTUM ENULÆ.

Rec. *Enulæ radice*, in pulverem grandiusculum redactæ, quantum placet.

Digerendo cum miscela e

Spiritus diluti

et *Aquæ destillatæ*, singulorum partibus æqualibus bis terve extrahitur. Liquores spirituosos colati, separato destillatione Spiritu, ad extracti spissitudinem rediguntur.

EXTRACTUM GENTIANÆ.

E *Gentianæ radice* concisa eodem modo paratur, quo Extractum Absinthii; sed Aquâ tepidâ extrahendum est.

EXTRACTUM HELLEBORI NIGRI. ☞

Ex *Hellebori nigri radice* incisa paratur, ut Extractum Cascarillæ.

EXTRACTUM HYOSCYAMI. ☞

Paratur ex *Hyoscyami foliis recentibus*, ut Extractum Aconiti.

☞ EXTRACTUM HYOSCYAMI SPIRITUOSUM.

Paratur ex *Hyoscyami foliis siccatis* eodem modo, quo Extractum Aconiti spirituosum.

EXTRACTUM JALAPPÆ.

Rec. *Jalappæ radice* contritæ libram, . . . p. 1.

Spiritus concentrati libras quinque . . p. 5.

Macerantur modico calore, inter agitandum, per triduum, et effunditur tinctura. Residuum cum

Aquæ destillatæ libris duodecim . . . p. 12.
decoquitur ad colaturam unciarum triginta duarum. Dein tinctura et decoctum, separatim colata, minuuntur, hoc evaporando, illa destillando, donec spissescere incipiant. Postremo, quæ restant, miscentur et, inter assiduam cum spatula agitationem, exsiccantur. Pulveratum servatur extractum.

EXTRACTUM JUGLANDIUM.

Juglandium putamina, mixta cum *Aquæ destillatæ* parva copia, contunduntur in vase lapideo vel ligneo. Liquor inde expressus vaporat, donec mellis spissitudinem habeat.

EXTRACTUM LIQUIRITILÆ.

Ut Extractum *Gentianæ* e *Liquiritiæ radice* parandum est.

EXTRACTUM LUPULI.

E *Lupuli strobilis* paratur eodem modo, quo Extractum Absinthii.

EXTRACTUM MEZEREI.

Rec. *Mezerei corticis* partem unam,
Spiritus concentrati partes tres.

Cortex, concisus et in mortario ferreo cum exigua *Spiritus* quantitate contusus, digeritur cum *Spiritu* per horas triginta sex, vas subinde agitando et sub finem in balneo aquæ paulum calefaciendo. Liquore post refrigerium decantato, residuum fortiter exprimitur et cum nova *Spiritus* copia digeritur, donec hic quam minimo sapore inficiatur. Liquores mixti et per chartam colati destillant ad remanentiam sextæ partis, quæ dein vaporat ad extractum.

EXTRACTUM MILLEFOLII.

Paratur e *Millefolii summitatibus*, ut Extractum Absinthii.

EXTRACTUM NICOTIANÆ. ☒

E *Nicotianæ foliis recentibus*, ut Extractum Aconiti, paratur.

EXTRACTUM NICOTIANÆ SPIRITUOSUM. ☒

Paratur e *Nicotianæ foliis siccatis*, ut Extractum Aconiti spirituosum.

EXTRACTUM NUCIS VOMICÆ. ☒

Fit, ut Extractum Mezerei, e *Nucibus vomicis* rasis.

EXTRACTUM POLYPODII.

E *Polypodii radice* paratur, ut Extractum Gentianæ.

EXTRACTUM POMORUM FERRATUM.

Rec. *Pomorum acidulorum excorticorum* libras duas, p. 6.

Limaturæ ferri uncias quattuor . . . p. 1.

In lebete e ferro fuso mixta, aquâ adpersâ, in pulvem tenuem rediguntur, quæ, interdum agitata, per dies quattuordecim ad viginti digeritur, aquam evaporatione dissipatam restituendo. Tum tantum *Aquæ destillatæ* affunditur, ut habeas pulvem tenuiorem, quæ post aliquot horas, sacculis linteis inclusa, prelo fortiter exprimitur. Residuo, adjectâ aquâ, denuo expresso, liquores juncti, quum seponendo et colando depurati sunt, in vase porcellaneo ad justam spissitudinem rediguntur.

EXTRACTUM RHEI.

Rhei indici radice, in taleolas minutas dissectæ, pars una

Aquæ destillatæ tepidæ partibus quattuor infunditur. Macerata per nycthemeron, sacculo linteo inclusa, preli ope exprimuntur. Residuo tres *Aquæ destillatæ* partes affunduntur et, per duodecim horas macerata, iterum exprimuntur. Liquores per chartam, subinde renovandam, colati, ad consistentiam massæ pilularis inspissantur.

⚞ EXTRACTUM STRAMONII.

Paratur e *Stramonii seminibus*, ut Extractum Aconiti spirituosum.

EXTRACTUM TARAXACI.

E *Taraxaci radice recenti* paratur, ut Extractum Absinthii.

EXTRACTUM TRIFOLII AQUATICI.

Paratur e *Trifolii aquatici foliis*, ut Extractum Absinthii.

EXTRACTUM VALERIANÆ.

Paratur e *Valerianæ minoris radice*, granditer pulverata, eodem modo, quo Extractum Aconiti spirituosum.

FARINA HORDEI PRÆPARATA.

Rec. *Hordei Farinæ* libras sex.

Immittuntur in sacculum linteum, ita colligandum, ut inter farinam et ligaturam nullum

sit spatium. Tum sacculus in aheno cupreo, stanno obducto et aquâ repleto, ita suspenditur, ut aheni parietes nusquam attingat. Coquitur deinde aqua per quattuordecim horas continuas, aheno aquâ semper repleto; quo facto massa globosa e sacco in patinam excutitur, et stratum ejus exterius, lubricum, cultri ope amovetur. Massa vero interior, modico calore siccata, conteritur et in vase clauso servatur.

FERRUM PULVERATUM.

Ferrum cusum, limando comminutum, in mortario ferreo in pulverem subtilissimum teritur, qui per linteum tenerrimum, ut ad Bolum præparatam præceptum est, a pulvere grandiori separatur.

Servatur in vase bene clauso.

FLAVEDO AURANTII.

Aurantii cortices in aquam fervidam immerguntur, donec mollescant; tum cultri ope ab albedine liberantur et, leni calore siccati, servantur.

FLAVEDO CITRI.

E *Citri corticibus*, ut Flavedo Aurantii, paranda est.

GELATINÆ.

Ad usum parantur.

GELATINA CARAGHEEN.

Gelatina Fuci crispi.

Rec. *Lichenis Caragheen* concisi drachmas tres, p. 3.
Aquæ destillatæ tantum,

ut, coquendo per horæ quadrantem, fiat colatura, quæ, solutâ in eadem

Sacchari albi pulverati unciâ dimidiâ, p. 4.
pondus habeat unciarum sex (p. 48). Refrigerando fit gelatina.

GELATINA CORNUS CERVI.

Rec. *Cornus Cervi* rasi, aquâ aliquoties eloti, uncias quinque, p. 80.

Aquæ destillatæ libras tres et dimidiam p. 672.

Modico igne coquuntur in vase tecto per septem vel octo horas. Liquor colatus, additis et permixtis

Albumine Ovi unius,

Succi Citri drachmâ sesquialterâ, . . . p. 3.

Sacchari albi pulverati unciâ sesquialtera, p. 24.

Vini rhenani unciis tribus, p. 48.
ter inter agitandum ebullit et, etiamnunc calens, per pannum laneum colatur. Refrigerando fit gelatina.

GELATINA LICHENIS ISLANDICI.

Rec. *Lichenis islandici præparati* uncias duas, p. 1.

Aquæ destillatæ sufficientem quantitatem.

Quibus per horæ quadrantem coctis, fit per linteum fortiter exprimendo colatura libræ unius (p. 6), quæ loco frigido, ut fiat gelatina, seponitur.

GLOBULI MARTIALES.

Tartarus martialis. Tartras kalico-ferricum.

Rec. *Ferri Limaturæ* uncias novem, . . . p. 3.

Tartari depurati pulverati libras duas, p. 8.

Aquæ destillatæ libras viginti quattuor p. 96.

In vase ferreo coquantur, agitando cum spatula ferrea, quamdiu Gas Hydrogenii evolvat; tum liquor una cum sale albicante, relicto ferro forte intacto, defunditur et in balneo vaporis eo usque vaporando comminuitur, ut exinde formari possint globuli uncix unius.

HÆMATITES PRÆPARATUS.

Præparatur *Hæmatites*, ut Bolus præparata.

HYDRARGYRUM CUM CRETA.

Rec. *Hydrargyri destillati* drachmas sex, . p. 3.

Cretæ præparatæ drachmas decem . . p. 5.

Assidue conteruntur, donec Hydrargyri globuli oculo armato non amplius conspiciantur.

HYDRARGYRUM DESTILLATUM.

Rec. *Hydrargyri* libras duas.

Immittuntur retortæ vitreæ firmæ, longo collo instructæ atque satis capaci, ita ut dimidia ejus pars vacua supersit; collum retortæ inseritur excipulo, tantâ aquæ copiâ replendo, ut superficiem aquæ fere adtingat. Retortâ deinde balneo arenæ impositâ atque strato arenæ tectâ, ignis caute intenditur, ut lente ferveat Hydrargyrum; et sic pergendum, dum uncix viginti hydrargyri transierint, quæ, ab aqua separatæ et siccata, per cucullum chartaceum perfunduntur et in vitro obturato servantur.

Quod si deest retorta, longo collo instructa, collum retortæ communis tubo chartaceo longius reddendum est.

HYDRAS FERRICUS IN AQUA.

Rec. *Chloreti ferrici* libram dimidiam . . . p. 1.
Solvitur in

Aquæ destillatæ libris decem p. 20.

Huic solutioni, si opus est, colatæ, solutio frigida e

Bicarbonatis kalici sufficiente quantitate et *Aquæ destillatæ* decuplo pondere confecta, diligenter agitando cum baculo vitreo, sensim admiscetur, quamdiu prodit præcipitatum; quod quum post quietem fundum petiit, solutio supernatans effunditur, et fit, Aquam destillatam diligenter affundendo, perfecta ablutio. Denique aquâ, quantum fieri potest decanthando remotâ, puls liquida in vasis vitreis obturatis servatur.

Observandum, quattuor saltem hujus pultis libras in officina semper paratas prostare debere.

HYDRAS KALICUS.

Causticum salinum.

Solutio Hydratis kalici, in olla ferrea, bene mundata et linteo mundo cooperta, vaporando supra ignem consumitur, usque dum guttulâ refrigerando perfecte solidescat. Quo facto in crucibulum ferreum vel potius argenteum effunditur, in quo, aucti caloris ope liquefit, donec massa intumescere cessaverit et, crucibulo ad rubedinem calefacto, olei instar leniter fluat. Tum in fistulas ferreas idoneas effunditur hydras, et refrigeratus in vitro optime clauso servatur.

HYPOCHLORIS CALCICUS.

Oxymurias calcicum. Calx oxymuriantica.

Rec. *Calcis ustæ*, aquâ affusâ in hydratem conversæ et per cribrum trajectæ, quantum placet.

Hydrochloroxydiz kalk.

Eu. Gt.

Immittitur, quantum fieri potest diffuse, in vas idoneum, in quod *Gas Chlori* (ut ad *Aquam Chlori* præceptum est extricandum et lavandum) lente inducitur, quamdiu Chlorum ab Hydrate calcico absorbetur, qui ne calorem graduum + 30° C. superet, cavendum. Peractâ saturatione, nova hydratis copia gasi exponenda est; quod vero jam saturatum est in vasis non magnis, bene obturatis, loco umbroso frigidoque asservandum.

INFUSA.

Fiunt infusa, nisi alia præparandi ratio præscribitur, *Aquam destillatam fervidam* affundendo substantiis præscriptis et rei convenienter comminutis, in vase idoneo e stanno puro, vitro vel massa porcellanea confecto, collocatis; fit deinde per præscriptum temporis spatium maceratio, vas operculo clausum interdum agitando. Quo autem evitetur nimia aquæ fervidæ inter affundendum refrigeratio, præsertim ubi copia ejus minor sit, rite agitur, si vas, *Aquam ferventem* affundendo et circumagitando et denique effundendo, ante præparationem Infusi calefiat. Infusum per linteum mundum leniter exprimendo colatur.

Ex tempore parantur.

INFUSUM AURANTII AROMATICUM.

Rec. *Caryophyllorum* contusorum,
Citri corticum concisorum, singulorum drachmam dimidiam, p. 1.
Aurantii corticum concisorum drachmas duas, p. 4.
Aquæ destillatæ ferventis uncias octo p. 128.
 Macerantur per horæ quadrantem.

INFUSUM

INFUSUM CINCHONÆ.

Infusum Kinkinæ.

Rec. *Cinchonæ regiæ* corticis contusi unciam, p. 1.*Aquæ destillatæ* ferventis uncias decem p. 10.

Per horæ quartam partem digeruntur, et colatur infusum etiamnunc fervidum.

INFUSUM DIGITALIS.

Rec. *Digitalis foliorum* comminutorum drachmam, p. 1.*Aquæ destillatæ* ferventis uncias octo p. 64.

Macerantur per horam dimidiam.

INFUSUM GENTIANÆ COMPOSITUM.

Rec. *Gentianæ rubræ radices*,*Aurantii corticum*,*Citri corticum*, singulorum contusorum drachmam, p. 1.*Aquæ destillatæ* ferventis libram . . . p. 96.

Macerantur per horam.

INFUSUM LINI.

Rec. *Liquiritiæ radices* concisæ scrupulos octo, p. 1.*Lini seminum* integrorum unciam, . . p. 3.*Aquæ destillatæ* fervidæ uncias sedecim p. 48.

Macerantur loco calido, inter assiduam quassationem, per horam.

INFUSUM MALTI.

Rec. *Malti* fumo haud inquinati, aliquantulum comminuti, uncias duas; p. 1.
macerantur per quattuor horas cum

Aquæ destillatæ fervidæ unciis quattuordecim p. 7.

INFUSUM RHEI.

Rec. *Bicarbonatis natrici* drachmas duas, p. 1.
Rhei indici radicis contusæ uncias duas, p. 8.
Aquæ destillatæ frigidæ libram unam et dimidiam p. 72.

In vase vitreo inter agitandum macerantur per duodecim horas; quo facto colatura, leniter exprimendo facta, ad ebullitionem calefit.

INFUSUM ROSÆ ACIDULUM.

Rec. *Acidi sulphurici diluti* drachmam, . . p. 3.
Rosæ domesticæ petalorum siccatorum scrupulos quattuor, p. 4.
Sacchari albi unciam dimidiam, . . . p. 12.
Aquæ destillatæ ferventis uncias tredecim p. 312.

Rosæ petalis Aqua superinfunditur in vase vitreo claudendo; dein, instillato acido, macerantur per horam dimidiam. Liquori colato adjicitur saccharum.

INFUSUM SENNÆ.

Rec. *Sennæ alexandrinæ* unciam, p. 1.
Aquæ destillatæ fervidæ uncias octo . p. 8.
 Macerantur per horam.

INFUSUM SENNÆ COMPOSITUM.

Rec. *Coriandri seminum* drachmam, p. 2.
Tartratis kalici drachmas duas et semis, p. 5.
Passularum minorum drachmas tres, p. 6.

Sennæ alexandrinæ drachmas sex . . p. 12.

Incisis et contusis affunditur

Aquæ destillatæ ferventis tantum,

ut, post digestionem per horam, fiat colatura
tanti ponderis, ut, solutis in eadem

Mannæ electæ unciis duabus et semis, p. 40.

liquor, exprimendo iterum colatus, pondus ha-
beat unciarum novem (p. 144).

JODETUM HYDRARGYRICUM. ♂

Rec. *Chloreti hydrargyrici corrosivi* unciam unam
et drachmas tres, p. 33.

Jodeti kalici unciam unam et drachmas quin-
que cum scrupulo p. 40.

Solvuntur separatim in sufficiente *Aquæ de-
stillatæ* quantitate, quo facto solutiones colatæ
miscentur, inter agitandum cum baculo vitreo.
Præcipitatum, hinc oriundum, colo colligitur et,
Aquâ destillatâ ablutum, leni calore siccatur.

JODETUM HYDRARGYROSUM. ♂

Rec. *Hydrargyri destillati* unciam, p. 8.

Jodi drachmas quinque p. 5.

In mortario porcellaneo miscentur diligenter
terendo, additis per vices *Spiritus concentrati*
tot guttis, ut massa semper humida sit, usque
dum Hydrargyrum disparuerit et massa ipsa
colorem flavescenti-viridem acceperit. Tum *Spi-
ritu concentrato*, quamdiu is aliquid solvat, ablu-
itur, leni calore, sine lucis accessu, siccatur et
loco obscuro servatur.

Cavendum, ne majores simul Hydrargyri et
Jodi quantitates conterantur, neve inter miscen-
dum exsiccantur.

JODETUM KALICUM.

Rec. *Solutionis Hydratis kalici* quantum placet.

Leniter calefactæ sensim additur

Jodum,

agitando cum bacillo vitreo, donec liquor colorem fuscum acceperit; quo facto ad siccum evaporat. Massa residua in crucibulo porcellaneo vel platinico tecto supra ignem, sensim augendum, liquatur et liquata habetur, quamdiu serveat; deinde effunditur, ut refrigescat. Post refrigerium deminuta in vase clauso statim servatur.

JULAPIUM E MOSCHO.

Mixtura Moschi.

Rec. *Moschi tunquinensis* grana quattuor, p. 1.

Sacchari albi,

Gummi arabici, singulorum pulveratorum
grana duodecim, p. 3.

Aquæ Rosæ uncias duas p. 240.

Teritur Moschus primum cum Saccharo, deinde cum Gummi, instillando paullatim Aquam Rosæ.

KERMES MINERALIS.

Hydrosulphuretum stibiosum.

Rec. *Sulphureti stibici præparati* unciam, . p. 1.

Sodæ depuratæ crystallisatæ libras duas, p. 24.

Aquæ destillatæ libras viginti p. 240.

In Aqua solvitur Soda depurata; solutioni in olla ferrea, munda, ebullienti, additur Sulphuretum, quo facto liquor, agitando cum spatula lignea, per horam dimidiam ulterius ebullit et, etiam nunc fervidus, in vas jam calefactum colatur. Refrigeratus a præcipitato sponte nato,

Sart Antimon præparat Quersulphurettum.

chartæ bibulæ ope, separatur, et Sulphureto residuo rursus affunditur, denuo per horæ dimidium decoquitur et percolatur. Præcipitata, his laboribus comparata, Aquâ destillatâ frigidâ sedulo abluuntur et ad gradum caloris + 25° C. haud superantem cautissime siccantur. In vase vitreo sicco, bene obturando, mixta servantur.

myothoyra ferrosus
 LACTAS FERROSUS. *Si*

Rec. *Sacchari Lactis* pulverati unciam, . . p. 1.
Ferri Limaturæ, oxido haud inquinatæ,
 unciam, p. 1.
Oxygalactos vaccini libras duas . . p. 24.

Digeruntur in lagena sæpius agitanda, cujus apertura clauditur subere, tubum vitreum in acumen eductum includente, ad temperaturam + 30°—40° C., per dies aliquot vel donec *Saccharum Lactis* evanuerit; cujus quum nova deinceps uncia addita est, totum ulterius digeritur, usque dum *Lactas ferrosus*, pulveris instar albidus, deponi incipiat. Tum liquor una cum depositis ad ebullitionem calefit et bulliens in lagenam, deinde claudendam, percolatur.

Quum *Lactas ferrosus*, e liquore refrigerato depositus, post dies quosdam non amplius crescit, liquor supernatans defunditur et crustæ crystallinæ, Aquâ frigidâ aliquoties elotæ, calore blandissimo inter chartæ plagulas citissime siccantur.

Servatur in vase, optime claudendo.

PAPILLI CANCRORUM PRÆPARATI.

Præparantur *Lapilli Cancrorum*, ut Bolus præparata.

LAPIS DIVINUS.

Cuprum aluminatum.

Rec. *Vitrioli de Cypro,**Nitratis kalici depurati,**Aluminis crudi,* singulorum unciam p. 16.

Pulverata et inter se mixta in vase fictili vitreato liquefiunt modico calore. Liquntis et ab igne remotis admiscetur

Camphoræ depuratæ drachma dimidia; p. 1. quo facto massa, super porphyritem effusa et refrigerata, in frustula diffingitur et in vase clauso servatur.

LICHEN ISLANDICUS PRÆPARATUS.

Rec. *Carbonatis kalici depurati* drachmas duas,*Aquæ* libras viginti quattuor.

Fit solutio, quæ

Lichenis islandici mundati libræ uni superinfunditur. Post macerationem per duodecim horas, quod liquidum est, decanthatur; lichen vero, aquâ frigidâ, quamdiu hæc sapore imbuatur, ablutus, siccatur et servatur.

LINCTUS.

Non nisi ad usum parantur.

LINCTUS BORACICUS.

Linctus Boratis natrici.

Rec. *Boracis pulveratæ* drachmam, p. 1.*Mellis Rosæ* drachmas decem p. 10.

Conteruntur, donec Borax soluta sit.

LINCTUS HYPOCHLORITIS CALCICI.

Linctus Oxymuriatis calcici.

Rec. *Solutionis Hypochloritis calcici* drachmam, p. 1.*Mellis depurati,**Aquæ destillatæ,* singulorum drachmas sex p. 6.

Agitando miscentur.

LINCTUS MELLITUS.

Rec. *Olei Olivarum provincialis* unciam, . p. 1.*Mellis depurati* uncias tres p. 3.

Miscentur.

LINCTUS OLEOSUS.

Mucilago oleosa.

Rec. *Gummi arabici pulverati* unciam dimidiam, p. 1.*Aquæ Amygdalarum amararum dilutæ,**Olei Amygdalarum recentis,* singulorum unciam p. 2.

In mortario lapideo trituro mixtis additur sensim

Syrupi Althææ uncia et semis, p. 3.
ut fiat linctus.

LINIMENTUM AMMONICUM.

Rec. *Ammoniaci caustici* unciam dimidiam, p. 1.*Olei Olivarum communis* unciam . . . p. 2.

Miscentur quassando. Non nisi ad usum paratur.

LINIMENTUM CALCICUM.

Rec. *Olei Lini frigide expressi,**Aquæ Calcis,* singulorum partes æquales.

Miscentur. Ad usum paratur.

LINIMENTUM SAPONIS CAMPHORATUM.

Rec. *Saponis albi hispanici* uncias quattuor, p. 16.

Spiritus diluti libras duas p. 96.

Digeruntur, donec sapo solutus sit; tum adduntur

Olei Rosmarini drachmæ duæ, p. 1.

Camphoræ depuratæ uncia p. 4.

Servatur loco, ubi temperatura gradibus +15° C. non est inferior.

Ser präparirt von A. Thylaxid.

LIQUOR ACIDUS HALLERI.

Elixir acidum Halleri.

Rec. *Spiritus concentrati*,

Acidi sulphurici destillati, singulorum uncias tres vel partes æquales.

Acidum sensim et caute in Spiritum instillatur, cavendo, ne nimis calefiat mixtura, quæ, post refrigerationem, in vase vitreo, epistomio vitreo munito, servatur.

LIQUOR AMMONIACI ANISATUS.

Spiritus Salis ammoniaci anisatus.

Rec. *Ætherolei Anisi* unciam dimidiam, . . p. 2.

Spiritus concentrati libram p. 48.

Solutis adduntur

Ammoniaci caustici uncia duæ et drachmæ sex p. 11.

Servatur in vase bene clauso.

LIQUOR AMMONIACI AROMATICUS.

Spiritus volatilis aromaticus.

Rec. *Olei Cassiæ* scrupulum dimidium, . . p. 1.

Olei de Cedro scrupulum, p. 2.

Ætherolei Piperis jamaicensis scrupulos
duos, p. 4.

Solutionis Carbonatis ammonici spirituosæ
uncias sex p. 288.

Miscentur, ut solvantur ætherolea, et servan-
tur in vase bene clauso.

LIQUOR AMMONIACI SUCCINATUS.

Alkali ammoniacum succinatum. Am-
moniacum succinatum. Aqua Lucis.

Rec. *Olei Succini empyreumatici rectificati* scru-
pulum; p. 1.

solvitur in

Spiritus concentrati uncia, p. 24.

et solutioni colatæ adjiciuntur

Ammoniaci caustici uncis quattuor . p. 96.

In vase probe clauso servatur.

Receptum ammoniacis i. H.

LIQUOR CORNUS CERVI.

Liquor Subcarbonatis ammonici.

Rec. *Cornus Cervi* rasi quantum placet.

E vase destillatorio ferreo apto, cui adapta-
tum est vas excipiens amplum cum tubo inter-
medio, fit destillatio, igne sensim ad summum
fere aucto. Transeunt *Liquor alkalinus*, *Oleum*
empyreumaticum et *Sal.* Liquor purificatur, quum
colando per chartam bibulam humidam ab oleo
et sale separatur.

Pondus specificum 1.06 erit; quod si majus
sit, liquor Aquâ destillatâ diluendus est, ut ju-
stam habeat densitatem. In vasis parvis, bene
obturatis, loco obscuro servatur.

Paratur etiam ex *Ossibus Pecorum* contusis
et, coquendo cum Aqua, a pinguedine liberatis.

LIQUOR CORNUS CERVI ACETATUS.

loco Liqueur Tartratis ammoniaci.

Rec. *Liqueur Cornus Cervi* libram, p. 48.

Acidi acetici concentrati quantum sufficit
ad saturandum.

Saturatione peractâ et Acido carbonico ope
lenis caloris fugato, inter agitandum adduntur

Olei Succini empyreumatici rectificati drach-
mæ duæ; p. 1.

et fit, post horas viginti quattuor, colatio. Ser-
vatur in vase bene clauso.

LIQUOR CORNUS CERVI SUCCINATUS.

Liqueur Succinatis ammoniaci.

Rec. *Liqueur Cornus Cervi* quantum placet.

Acidi succinici quantum ad plenam satura-
tionem requiritur.

Saturatione peractâ et Acido carbonico lenis
caloris ope fugato, post viginti quattuor horas
colantur et in lagena, bene clausa, servantur.

LIQUOR PYROTARTARICUS.

Tartarus crudus retortæ ferreæ aptæ im-
mittitur, ut hujus duas tertias partes occupet,
et igne sensim aucto fit destillatio. In recipiens
vas, quod capacissimum sit, transibit *Liqueur*
acidus una cum *Oleo*, ab illo per chartam bi-
bulam humidam separandus.

LITHARGYRIUM PRÆPARATUM.

Præparatur *Lithargyrium* eodem modo, quo
Bolus præparata.

MAGNESIA USTA.

Magnesia alba uritur in crucibulo, donec cum acidis dilutis non effervescat, et in vitro, sollicite clauso, servatur.

MEL DEPURATUM.

Rec. *Mellis* libras sex, p. 1.

Aquæ destillatæ libras duodecim . . . p. 2.

Aqua cum *Albumine Ovorum* sex in spumam agitata, cum Melle semel ebullit, quo facto liquor, per pannum laneum trajectus, evaporando in balneo vaporis, ad pondus specificum 1.44 redigitur. Loco frigido servatur.

MEL ROSÆ.

Rec. *Rosæ domesticæ petalorum* siccatorum unciam, p. 1.

Aquæ destillatæ uncias sex p. 6.

Macerantur per duodecim horas, et liquori colato admiscetur

Mellis depurati libra p. 12.

Servatur loco frigido.

MERCURIUS PRÆCIPITATUS ALBUS.

Submurias ammonico-hydrargyricum.

Mercurius cosmeticus.

Rec. *Chloreti hydrargyrici corrosivi*,

Salis ammoniaci depurati, singulorum partes æquales.

In *Aquæ destillatæ* pondere octuplo solvuntur; quo facto solutioni colatæ

Solutio Carbonatis kalici

additur, quamdiu aliquid præcipitatur. Quod fundum petit, a liquido separatum et Aquâ destillatâ non calidâ ablutum, siccatur et servatur.

§ MIXTURA ARSENICALIS FOWLERI.

Mixtura mineralis Fowleri. Solutio-
nis Arsenitis kalicæ loco.

Rec. *Arsenici albi pulverati*,
Carbonatis kalici puri, singulorum grana
sedecim, p. 4.
Aquæ destillatæ uncias duas p. 240.
Coquantur in vase vitreo, donec Arsenicum
solutum sit. Solutioni refrigeratæ admiscetur
Spiritus Lavendulæ drachma, p. 15.
Aquæ destillatæ tantum,
ut liquidum pondus unciarum quattuor (p. 480)
habeat. Cautissime asservatur.

§ MIXTURA MERCURIALIS.

Solutio Muriatis hydrargyrici cor-
rosivi.

Rec. *Chloreti hydrargyrici corrosivi*,
Salis ammoniaci depurati, singulorum gra-
na sex, p. 1.
Solvuntur in
Aquæ destillatæ unciis decem p. 800.
Solutioni colatæ adduntur
Syrupi Sacchari uncia duæ p. 160.
Vase clauso caute servatur.

MIXTURA PYROTARTARICA CAMPHO-
RATA.

Mixtura diatrion vel simplex.

Rec. *Acidi sulphurici diluti* unciam, . . . p. 4.
Liquoris pyrotartarici uncias tres, . p. 12.
Solutionis Camphoræ spirituosæ uncias
quinque p. 20.
Mixta

Mixta tinguntur

Myrtilli baccarum drachmis duabus; p. 1.
deinde colantur.

MORPHINA.

§

Rec. *Opii levantici* concisi libram, p. 6.

Aquæ destillatæ libras tres p. 18.

Macerantur sæpius agitando per biduum; quo
facto liquor defunditur et massa residua cum

Aquæ destillatæ libris tribus p. 18.

denuo maceratur; quod, liquore defuso, tertium
etiam fit vel donec Opium exhaustum sit.

Liquores commixti balnei vaporis calore ad
pondus specificum 1.02—1.03 rediguntur; tum
colantur. Colaturæ claræ adjicitur inter agitan-
dum solutio e

Bicarbonatis kalici unciis duabus . . . p. 1.

et *Aquæ destillatæ* unciis decem p. 5.

confecta. Mixtura, per dies aliquot seposita,
iterum colatur, et liquor clarus per horæ qua-
drantem ebullit; quo facto per dies quattuor
iterum seponitur.

Morphina, post hæc excreta, colligitur et ope

Acidi sulphurici diluti, guttatim et inter
agitandum addendi,

in *Aquæ destillatæ* libra p. 6.

solvitur. Solutio clara et paullum acida, ad-
mixtâ

Spiritus concentrati librâ, p. 6.

cum *Carbonis animalis* tanta copia, quanta suf-
ficit ad decolorandum,

digeritur et, denuo colata, cum

Ammoniaci caustici tanta copia

miscetur, ut id leniter excedat. Tum in vase
aperto per aliquot dies seponitur, ut Ammonia-

cum excedens avolet; deinde Morphina deposita colligitur et Aquâ destillatâ lavatur. Siccata servatur. Liqueor ille, qui Morphinam deposuit, vaporando novam ejus tradit copiam.

Si non plane alba est, repetitâ e Spiritu concentrato crystallisatione purificatur.

MORSULI AROMATICI.

Rec. *Sacchari albi* libram; p. 288.
cum *Aquæ destillatæ* parva copia
incoquitur, donec gutta excepta indurescat; tum
adjiciuntur

Zingiberis radices pulveratæ scrupulus, p. 1.

Cinnamomi ceylanici corticis contusi uncia
dimidia, p. 12.

Amygdalarum dulcium decorticatarum et
minutim concisarum,

Conditi Aurantii concisi, singulorum un-
cia p. 24.

Fiunt morsuli.

MORSULI CITRICI.

Rec. *Sacchari albi* pulverati uncias quattuor; p. 8.
leniter calefactis adjicitur

Citri Succ uncia dimidia p. 1.

Fiunt morsuli.

MORSULI STIBIATI.

Morsuli antimoniales vel restaurantes
Kunkelii.

Rec. *Cinnamomi ceylanici corticis* pulverati drach-
mas duas, p. 1.

Sulphureti stibici præparati unciam dimidiam, p. 2.

Amygdalarum dulcium, decorticatarum et minutim concisarum, unciam . p. 4.

Miscentur cum

Sacchari albi, in *Aquæ destillatæ* quantitate sufficiente soluti et ad debitam spissitudinem cocti, unciis septem p. 28.

Formantur inde morsuli æquales sedecim.

MUCILAGINES.

Non nisi ad usum parantur.

MUCILAGO CRETACEA.

Potio cretacea.

Rec. *Sacchari albi* pulverati drachmam et semis, p. 3.

Gummi arabici pulverati,

Cretæ præparatæ, singulorum drachmas duas, p. 4.

Aquæ destillatæ uncias sex p. 96.

Teruntur pulveres mixti cum parva *Aquæ* parte in pulvem tenuem, illâ, quæ superest, *Aquæ* copiâ diluendam.

MUCILAGO CYDONIORUM.

Rec. *Cydoniorum seminum*, aquâ aliquoties elotorum, drachmam p. 1.

Vitro injectis affunduntur

Aquæ Rosæ uncia octo p. 64.

Fit per quartam horæ partem quassando mucilago, quæ per linteum exprimendo colatur.

MUCILAGO GUMMI ARABICI.

Rec. *Gummi arabici* pulverati unciam, . . p. 1.

Aquæ destillatæ uncias duas p. 2.

Gummi cum Aqua, paullatim instillata, in mortario vitreo teritur, donec in mucilaginem abierit.

MUCILAGO SALEB.

Rec. *Saleb radiceis* pulveratæ drachmam, p. 1.

Aquæ destillatæ frigidæ uncias duas p. 16.

In mortario vitreo contritis et dein in lagenam capacem inditis adduntur

Aquæ destillatæ ferventis uncia decem p. 80.

Mixta conquassantur, donec refrixerint.

Salpetersyrat & Salfræssid

NITRAS ARGENTICUS. Ag H

Argentum purum

in *Acido nitrico diluto*

solvitur; solutio, si necesse est, colanda, ope balnei vaporis ad siccum vaporat. Massa sicca in patina porcellanea supra balneum arenæ liquata habetur, quamdiu ferveat; effunditur deinde et post refrigerationem in vase opaco, clauso, servatur.

Si autem massa liquata in fistulas ferreas idoneas secundum leges artis effunditur,

NITRAS ARGENTICUS IN BACILLIS,

Causticum lunare vel Lapis infernalis, vocatur.

NITRAS KALICUS DEPURATUS.

Nitrum depuratum.

Rec. *Nitri crudi* quantum placet;

in *Aquæ destillatæ* quadruplo pondere

solvitur; solutio colata et vaporando ad pelliculam consumpta cum *Aquæ destillatæ* frigidæ duodecima circiter voluminis sui parte commiscetur et quam citissime, inter continuam liquidi agitationem, refrigeratur. Pulvis crystallinus, hoc modo ortus, cum *Aquæ* frigidæ parva copia abluitur et deinde siccatur. Quod si non plane albus sit, denuo simili modo purificatur.

Qui in muria et aqua lotionis manet Nitras, vaporando et refrigerando recuperatur.

Oleum Amygdalarum
OLEUM AMYGDALARUM.

Rec. *Amygdalarum dulcium*, non rancidarum, quantum vis.

In mortario lapideo vel ferreo contusis et sacculo inclusis, exprimitur oleum, prelo primum frigido, postremo aquâ fervente calefacto, post quietem a facibus colatione separandum.

Oleum, frigide expressum, separatim servatur.

OLEUM CACAO.

Cacao de Caracas semina, quot placet, leni igne torrentur, ut eo facilius a cortice mundari possint. Dein in pulverem comminuuntur et in olla ferrea cum *Aquæ destillatæ* sufficiente quantitate coquantur, ut oleum separetur; tum, aquâ refrigeratâ, oleum concretum eximitur et loco calido per colum chartaceum trajicitur. In capsulis ferreis, stanno obductis, refrigeratum denuo concrescit.

OLEUM CANTHARIDUM INFUSUM.

Rec. *Cantharidum contusarum* uncias duas, p. 1.
Olei Olivarum communis uncias octo p. 4.

Digeruntur, ope balnei vaporis, in vase vitreo per horas viginti quattuor; colatur deinde oleum, primum exprimendo per linteum, tum per chartam, et servatur.

OLEUM CHABERTI.

Oleum anthelminticum. Oleum Cornu Cervi terebinthinatum Ph. Veterin.

Rec. *Olei Cornus Cervi empyreumatici* unciam, p. 1.

Ætherolei Terebinthinæ depurati uncias

tres p. 3.

Quibus retortæ vitreæ immixtis, adjuncto excipulo, destillatione eliciuntur uncie tres (p. 3), in vasa vitrea parva, bene obturanda, statim immittendæ atque loco obscuro servandæ.

OLEUM CORNUS CERVI EMPYREUMATICUM RECTIFICATUM.

Oleum animale Dippelii.

Rec. *Olei Cornus Cervi empyreumatici*,

Carbonis vegetabilis præparati, singulorum
par pondus.

Mixta in retortam vitream tubulatam injiciuntur, et oleum igne lenissimo destillat, quamdiu destillatum colore caret.

Quod destillavit, si flavidum habet colorem, modo præscripto iterum purificandum est.

In lagenis vitreis, perparvis ac bene clausis, loco obscuro, servatur.

∞

OLEUM CROTONIS.

Rec. *Granorum Tiglii*, in pulverem grandiusculum redactorum, uncias sex,

Spiritus concentrati quantum satis.

Grana Tiglii in apparatus idoneo, qualis ad Acidum quercitanicum præcipitur, Spiritu extrahuntur. E liquore spirituoso destillatione elicitur Spiritus, ad aliam talem operationem conservandus; quod vero restat oleum, per dies aliquot, ut Spiritus omnis avolet, seponitur et deinde colatum servatur.

OLEUM FILICIS MARIS.

Extractum Filicis Maris æthereum.

Rec. *Filicis Maris radice*, recens siccatae et in pulverem redactæ, quantum vis,

Ætheris sufficientem quantitatem.

Pulvis radice Æthere ter quaterve extrahitur in apparatus idoneo, ita instructo, ut ad Acidum quercitanicum jam monitum est. Æthere deinde e liquoribus æthereis per destillationem elicitum, residuum in balneo vaporis ad consistentiam mellis comminuitur et in lagena, amplo orificio prædita atque epistomio vitreo munita, servatur.

OLEUM HYOSCYAMI INFUSUM.

Rec. *Hyoscyami foliorum recentium* libram, p. 1.

Olei Olivarum communis libras tres p. 3.

Digeruntur leni calore, inter assiduam agitationem, per duodecim horas. Oleum exprimitur, colatur et servatur.

OLEUM LINI FRIGIDE EXPRESSUM.

E *Lini seminibus* eodem modo exprimitur, atque Oleum Amygdalarum, sed prelo semper frigido.

OLEUM OVORUM.

Ova gallinacea recentia, quot placet, coquantur, ut penitus indurescant; dein vitelli eximantur et comminuti, in lagenâ clausa, interdum agitanda, cum *Ætheris* sufficiente quantitate macerantur per horas duodecim. Solutione æthereâ defusâ, residuum cum nova *Ætheris* copia est macerandum, donec omnis, quæ quaeritur materia, evocata sit. Liquores commixti ad *Ætherem* recuperandum destillant; deinde quod restat in balneo vaporis liquatum detinetur et, quum ne vestigium quidem *Ætheris* observare licet, per chartam trajicitur. In lagenis haud magnis, bene obturatis, loco frigido servatur; ubi dabitur oleum, lagenâ antea calefacienda est, ita ut nulla olei pars concreta sit.

OLEUM SUCCINI EMPYREUMATICUM
RECTIFICATUM.

Oleum Succini crudum eodem modo, atque *Oleum Cornus Cervi empyreumaticum*, rectificatur.

§

OPIUM DEPURATUM.

Extractum thebaicum. Extractum Opii gummosum.

Opium levanticum, contusum et in frustula minuta dissectum, cum sextupla *Aquæ destillatæ* frigidæ quantitate per duodecim horas maceratur; *Opio* deinde, agitando cum spathula, quantum fieri potest, in liquorem dispertito, sit de novo per horas duodecim maceratio. Solutum, fortiter expressum, per linteam trajicitur; resi-

dum vero cum sextupla Aquæ copia iterum maceratur solutumque colatur. Solutiones mixtæ in balneo aquæ evaporant ad consistentiam extracti, quod in octuplo Aquæ destillatæ pondere denuo solvitur. Jam miscela, ut subsidat, seponitur, quo facto liquor denuo colatur, in balneo vaporis ad siccum redactus pulveratur et in lagenâ, probe obturanda, servatur.

OPODELDOC.

Linimentum saponato-camphoratum.

Rec. *Camphoræ depuratæ* unciam unam et dimidiam, p. 12.

Saponis e Butyro uncias sex, p. 48.

Spiritus concentratî libras tres. p. 288.

Digeruntur in vase clauso, interdum agitando; solutioni adduntur

Ætherolei Thymi,

Olei Origani cretici, singulorum drachma, p. 1.

Olei Rosmarini uncia dimidia, p. 4.

Ammoniâci caustici uncia duæ et semis p. 20.

Liquor, etiamnunc calidus, in lagenas altas, ore amplo præditas, colatur, quæ suberibus probis statim obturantur.

OXIDUM FERRICO-FERROSUM.

Æthiops martialis præcipitatus.

Rec. *Acidi Vitrioli* unciam unam et semis, p. 3.

Sulphatis ferrosi uncias decem, p. 20.

Aquæ destillatæ uncias viginti vel plures p. 40.

Calefiunt in vase vitreo vel porcellaneo amplo inter agitandum, usque dum ebulliant; tum sensim et guttatim admiscetur

Aqua fortis,

Ferronidæ oxidul.

donec color liquoris badius evanuerit et ferrum omne oxydatum sit, cavendo tamen, ne major, quam requiratur, Aquæ fortis copia addatur. Solutio deinde refrigerata Aquâ destillata diluitur et, additâ solutione, e

Sulphatis ferrosi unciiis quinque . . . p. 10.

et *Aquæ destillatæ* unciiis quindecim . . p. 30.

confectâ, cum solutione *Sodæ depuratæ* excedente præcipitatur; quo facto miscela, inter assiduam agitationem, in vase ferreo mundo coquitur, donec effervescencia cessaverit et præcipitatum in pulverem subtilem, nigrum, conversum sit, qui, colo collectus et bene lotus, exprimitur, celeriter siccatur et in vase clauso servatur.

§ *Mg* OXIDUM HYDRARGYRICUM.

Mercurius præcipitatus ruber.

Acidum nitricum dilutum cum *Hydrargyro destillato* coquendo digeritur, et solutio saturata in vase vitreo vel porcellaneo ad siccum vaporat. Massa sicca, in pulverem tenerrimum contrita, cum

Hydrargyri destillati duobus ponderis sui trientibus

intime et usque ad plenam *Hydrargyri* extinctionem conteritur. Quo facto massa in crucibulo argillaceo, inter carbones, qui jamdudum ab omni parte, ne nimis augeatur ignis, accensi fuerunt, uritur, inter continuam cum bacillo figulino agitationem, donec odorem *Acidi nitrosi* emittere cesset.

Loco obscuro vel in vitro opaco servatur.

☿ OXIDUM HYDRARGYRICUM PRÆCIPITATUM. Hoy

Chloretum hydrargyricum corrosivum, Aquâ destillatâ solutum, Solutione Hydratis kalici

præcipitatur, et præcipitatum cum superflua ejus quantitate digeritur, donec oxidum colorem habeat e rubro flavum. Tum colo colligendum et Aquâ destillatâ calidâ abluendum est, quamdiu hæc *Solutione Nitratis argentici* turbetur, et caute siccatum in vase cooperto, opaco, servandum.

OXIDUM HYDRARGYROSUM. ☿ Hoy

Mercurius solubilis Moschati.

Rec. *Chloreti hydrargyrosi*, nondum siccati, quantum placet.

Solutionis Hydratis kalici majorem quantitatem, quam ad *Chloretum* decomponendum requiritur.

Solutioni, in lagenam inditæ, *Chloretum* sensim et inter agitandum additur. Oxidum nigricans, quod per quietem loco obscuro subsederit, *Aquâ destillatâ frigidâ* diligenter abluitur et in loco, accessum luminis defendente, inter chartæ plagulas caute siccatur. In vase clauso, opaco, asservatur.

OXIDUM STIBICUM.

Oxidum stibiosum.

Antimonium crudum pulveratum in vase e ferro fuso vel argilla lato, inter agitandum cum baculo figulino et cavendum, ne massa, calorem nimis augendo, liquefiat, uritur, donec odorem

Antimonoxid St.

Acidi sulphurosi emittere cesset et in pulverem cinereum conversum sit. Oxidum, hoc modo exortum, in crucibulo ignis ope liquatur; si autem liquescere recusat, in pulverem tenerrimum teritur et cum *Antimonii crudi* pulverati vigesima vel sedecima parte commiscetur; quo facto, igne liquatur et liquatum effunditur, ut refrigescat.

Lm.

OXIDUM ZINCICUM.

Rec. *Sulphatis zincici* libram p. 1.
Solvitur in

Aquæ destillatæ libris viginti p. 20.

Solutioni *Gase Chlori* saturatæ et dein, ad Chlorum fugandum, calefactæ additur sensim et caute solutionis *Sodæ depuratæ* parva copia, quamdiu hæc præcipitatum non album efficit. Tum, præcipitato colatione secreto, liquor clarus inter agitandum miscetur cum solutione e *Sodæ depuratæ crystallisatæ* libra (p. 1) et *Aquæ destillatæ* libris decem (p. 10) confecta. Præcipitatum, per quietem demissum, colo colligitur et probe eluitur; siccatum deinde et in pulverem contritum in catillo argillaceo tecto, calore non nimis aucto, candefit, donec residuum cum *Acido hydrochlorico*, Aquâ satis diluto, non amplius effervescat. Servatur in vase clauso.

OXYMEL.

Rec. *Aceti Vini* uncias quattuor, p. 1.

Mellis depurati uncias octo p. 2.

Miscentur.

OXYMEL

OXYMEL ÆRUGINIS.

Linimentum Acetatis cuprici.

- Rec. *Æruginis* tritæ uncias quinque, . . . p. 5.
Aceti Vini uncias septem, p. 7.
Mellis depurati uncias quattuordecim p. 14.

Lento igne, inter assiduum cum spathula lignea agitationem, ad spissitudinem unguenti decoquantur.

OXYMEL SCILLÆ.

- Rec. *Aceti Scillæ* uncias quattuor, p. 1.
Mellis depurati uncias octo p. 2.

Miscentur.

PASTA ALTHÆÆ.

- Rec. *Althææ radicis* incisæ uncias sex, . . . p. 6.
Aquæ destillatæ ferventis tantum,

ut, post macerationem per horam, fiat colatura librarum sex (p. 72), quæ per diem noctemque seponitur. Liquidum deinde cautissime defunditur, in quo calefacto solvuntur

Gummi arabici pulverati libræ duæ cum dimidia, p. 30.

Sacchari albi pulverati libræ tres, . p. 36.

omniaque post horas aliquot per pannum laneum trajiciuntur et, continue spathulâ ligneam agitando, evaporant in balneo vaporis ad mellis spissitudinem. Massa, ab igne remota, agitur multum et celeriter, ut albescat; cui paulatim admiscentur

Ovorum albumina, in spumam quassata, viginti quattuor.

Exiguo adhibito calore continue agitur mas-
sa, donec manibus non adhæreat, cui denique
additur

Aquæ Aurantii uncia; p. 1.
quo facto formantur Pastæ, pulvere *Amyli* con-
spersendæ et loco calido exsiccandæ.

PASTA AMYGDALARUM.

Rec. *Amygdalarum amararum* decorticatarum
drachmas duas, p. 1.

Amygdalarum dulcium decorticatarum un-
cias sex p. 24.

Mixta contunduntur in mortario lapideo, ad-
jectâ sensim

Aquæ Aurantii sufficiente quantitate;
deinde admiscuntur

Sacchari albi pulverati uncia sex . . p. 24.

Fit massa, quæ, manibus tractata, eis non
adhæreat.

PASTA LIQUIRITIÆ.

Pasta Glycyrrhizæ.

Rec. *Liquiritiæ radice* incisæ uncias quattuor et
semis, p. 9.

Aquæ destillatæ fervidæ sufficientem quan-
tatem, ut, post macerationem horæ unius, fiat
colatura librarum quinque (p. 120), quæ per
dies et noctes duas seponuntur. In liquore lim-
pido, defuso et calefacto,

Gummi arabici pulverati

Sacchari albi, singulorum libra et semis p. 36.
solvitur. Post diem noctemque liquor limpidus,
iterum defusus, balnei vaporis calore sine agi-
tatione vaporat, donec gutta, in lamina vitrea

frigida excepta, gelatinæ instar concreseat. Tum, detractâ pelliculâ, in patellas, *Oleo Cacao* illitas, effunditur massa, calore modico siccanda.

PHOSPHAS CALCICUS STIBIATUS.

Pulvis Jacobi (James Powder).

Rec. *Antimonii crudi*, in pulverem crassum triti,
Cornus Cervi rasi, singulorum uncias sex.

Miscentur et injiciuntur ollæ ferreæ latæ, igne rubenti, et assidue agitantur, donec in materiam coloris cinerei urendo abierint. Massa, ab igne remota, in pulverem teritur et in crucibulum immittitur; huic crucibulum aliud inversum, cui parvum sit in fundo foramen, luto conjungitur, ignisque subministratur, ad incandescentiam sensim augeendus; post binas horas ab igne removetur, et massa frige facta in pulverem subtilissimum teritur.

PHOSPHAS NATRICUS.

Soda phosphorata.

Rec. *Cornus Cervi usti* vel *Ossium Bovis* ustorum
et pulveratorum libras quinque, p. 10.

Acidi Vitrioli libras quattuor et semis, p. 9.

Aquæ destillatæ libras viginti p. 40.

Mixta digeruntur in vase fictili vitreato per aliquot dies, mixturam sæpius agitando. Solutio, Aquam affundendo diluta, per linteum fortiter exprimendo colatur, et Sulphas calcicus remanens Aquâ destillatâ abluitur, quamdiu hæc sapore acido imbuatur.

Liquori colato, cum aqua lotionis mixto,
Gas Sulphidi hydrici (e *Sulphureto ferroso* et

Oleo Vitrioli, Aquâ diluto, extricatum) immititur, quamdiu hoc efficit præcipitatum, quod a liquore, dum odorem Sulphidi hydrici amiserit, calefacto, colatione separatur. Liquidum, vaporatione ad trientem consumptum, a sulphate calcico deposito colatione liberatur et

Sodæ depuratæ, in Aqua destillata solutæ,
tantâ copiâ

præcipitatur, ut alkali instar colorem chartæ exploratoriæ mutet. Tum iterum colatur et ad crystallos formandas vaporando et refrigerando cogitur. Sal concretum chartâ bibulâ celeriter siccatur et in vase clauso servatur.

PILULÆ.

In pilulis faciendis substantiæ, quæ jubentur, quotquot siccæ sunt et friabiles, tenuissime pulveratæ ponderantur et in mortario vitreo vel porcellaneo intime conteruntur; et quidem primum illæ, quarum minima jubetur copia, sive friabiles sunt sive non friabiles (e. g. extracta). Tum adduntur ceteræ substantiæ et, si præscriptum fuerit, materiæ cujusdam copulantis tantum, ut massa, diligentissime subacta, (ita ut omnia mixta sint, et nullum partium discrimen observare liceat), fundo mortarii nequaquam digitisque non multum adhæreat. Formantur deinde pilulæ, præscripto numero vel pondere, *Lycopodio*, nisi aliud dicitur, conspergendæ et in vase bene obturato asservandæ.

Major pilularum copia simul non est paranda, ne inter servandum exsiccentur vel vim amittant. *Pilulas Chloreti hydrargyrici corrosivi, Pilulas Nitratis argentici et Pilulas Sul-*

phatis cuprici ammoniacalis non nisi ex præscripto Medici parare licet.

Dantur in vase obturando.

PILULÆ ALOËS AMARÆ.

Pilulæ e *Gentiana crocatæ*.

Rec. *Extracti Gentianæ* drachmas duas . . p. 2.

Massæ Pilularum Aloës crocatarum drachmas tres p. 3.

Formantur hinc pilulæ trecentæ æquales.

PILULÆ ALOËS CROCATÆ.

Pilulæ Rufi.

Rec. *Myrrhæ electæ*,

Croci orientalis, singulorum drachmas

duas, p. 1.

Aloës lucidæ unciam dimidiam, p. 2.

Syrupi Sacchari quantum satis,

ut fiat massa, ex qua formantur pilulæ numero trecentæ æquales.

PILULÆ CHLORETI HYDRARGYRICI ☿ CORROSIVI.

Pilulæ e Hydrargyro corrosivo albo.
loco Pilularum Muriatis hydrargyrici
corrosivi.

Rec. *Chloreti hydrargyrici corrosivi*,

Salis ammoniaci depurati, singulorum scrupulum p. 1.

Solvuntur in

Aquæ destillatæ fervidæ quantitate sufficiente, ut, additis

Sacchari albi scrupulo, p. 1.
Althææ radicis drachmis duabus, . . . p. 6.
 fiat massa, ex qua formantur pilulæ numero
 centum et sexaginta æquales.

PILULÆ COLOCYNTHIDIS COMPOSITÆ.

Pilulæ catharticæ.

Rec. *Caryophyllorum* scrupulum, p. 2.
Extracti Jalappæ scrupulos duos, . . p. 4.
Chloreti hydrargyrosi drachmam, . . p. 6.
Extracti Colocynthidis compositi drachmas
 duas et semis, p. 15.
Extracti Absinthii drachmam sesquialteram
 vel quantum satis p. 9.
 Formantur pilulæ numero centum et triginta
 quinque æquales.

PILULÆ FOETIDÆ SUCCINATÆ.

Pilulæ foetidæ.

Rec. *Olei Cornus Cervi empyreumatici rectificati*
 scrupulum dimidium, p. 1.
Acidi succinici drachmam dimidiam, . p. 3.
Castorei canadensis,
Assæ foetidæ, singulorum drachmam unam
 et dimidiam, p. 9.
Tincturæ Myrrhæ quantum sufficit,
 ut fiat massa, ex qua formantur pilulæ numero
 centum et decem æquales.

PILULÆ GUMMI AMMONIACI THEBAICÆ.

Rec. *Opii levantici* grana sex, p. 3.
Scillæ radicis grana decem, p. 5.

Myrrhæ electæ drachmam dimidiam, p. 15.

Gummi ammoniaci drachmam p. 30.

Mixta cum guttulis aliquot *Spiritus concentrati* formantur in pilulas triginta æquales.

PILULÆ GUMMI GUTTÆ ALOËTICÆ.

Rec. *Gummi Guttæ*,

Gummi arabici, singulorum scrupulos
duos, p. 2.

Galbani drachmam, p. 3.

Aloës lucidæ scrupulos quinque . . . p. 5.

Cum *Ætherolei Carvi* scrupulo p. 1.

et *Syrupi Sacchari* quantitate sufficiente subiguntur in massam, ex qua formantur pilulæ numero octoginta æquales.

PILULÆ HYDRARGYRI.

Rec. *Hydrargyri destillati* drachmas duas, p. 2.

Conservæ Rosæ drachmas tres p. 3.

Mixtis et contritis, donec globuli Hydrargyri prorsus disparuerint, adjicitur

Liquiritiæ radicis drachma, p. 1.

et fit massa, in pilulas ducentas et quadraginta æquales statim dividenda.

PILULÆ MYRRHÆ FERRATÆ.

Rec. *Sulphatis ferrosi* drachmam dimidiam, p. 1.

Carbonatis kalici puri drachmam, . . p. 2.

Myrrhæ electæ drachmas duas p. 4.

Ex his cum parva *Mucilaginis Gummi arabici* copia formantur pilulæ sexaginta æquales.

PILULÆ NICOTIANÆ.

Rec. *Extracti Nicotianæ* drachmam dimidiam, p. 1.
Liquiritiæ Succii unciam dimidiam . . . p. 8.
 Cum *Aceti Scillæ* quantitate sufficiente fit massa,
 in pilulas nonaginta æquales dividenda.

PILULÆ NITRATIS ARGENTICI.

Rec. *Nitratis argentici* scrupulum dimidium p. 1.
 Solvitur in
Aquæ destillatæ sufficiente quantitate.
 Solutioni additis
Althææ radicis drachmis duabus, . . . p. 12.
 fit, si opus est cum exigua copia *Syrupi Sacchari*,
 massa, quæ in sexaginta pilulas æquales dividitur.

PILULÆ SAPONIS.

Pilulæ saponicæ.

Rec. *Extracti Betulæ* drachmam, p. 1.
Saponis amygdalini drachmas duas . p. 2.
 Formantur pilulæ sexaginta æquales.

PILULÆ STYRACIS THEBAICÆ.

Pilulæ e Styrace.

Rec. *Opii levantici* drachmam, p. 1.
Styracis depurati drachmas duas, . . p. 2.
Liquiritiæ Succii drachmas tres p. 3.
 Formantur pilulæ centum et octoginta æquales.

PILULÆ SULPHATIS CUPRICI AMMONIACALIS.

Pilulæ e Cupro ammoniaco.

Rec. *Sulphatis cuprici ammoniacalis* scrupulum
 dimidium, p. 1.

Solvitur in quantitate sufficiente

Aquæ destillatæ, cum

Ammoniaci caustici pari portione mixtæ.

Solutio optime subigitur cum

Extracti Gentianæ drachmis duabus, p. 12.
et *Cinchonæ regię corticis* quantitate sufficien-
te, ut fiat massa, quæ in pilulas æquales numero
sexaginta dividitur.

PULPA TAMARINDORUM DEPURATA.

Rec. *Tamarindorum pulpæ* libras duas, . . p. 4.

Aquæ destillatæ fervidæ libras quattuor p. 8.

Inter agitandum macerantur, donec refrixerint;
tum per linteum firmum exprimendo colantur,
et residuum cum

Aquæ destillatæ libris duabus p. 4.
eodem modo bis tractatur. Liquores collecti per
diem noctemque seponuntur, quo facto humor
clarus defunditur et per linteum colatur; deinde
in vase porcellaneo, additâ

Sacchari albi librâ dimidia, p. 1.
evaporat ope balnei vaporis, donec pondus spe-
cificum 1.50 teneat. Servatur in vase murrhino
vel porcellaneo, loco frigido.

PULVERES SIMPLICES.

Omnis materia, in pulverem redigenda, pri-
mum ab humoribus, quæ pulverationi officiant,
liberanda est, quod quidem siccando fit ita, ut
adhibeatur calor paullatim augendus nec un-
quam +100° C. superans.

Fit confusio in mortariis tectis, tali natis
materiâ, ut nec facile adedantur nec duritiâ ce-
dant iis rebus, quæ contundenda immittuntur.

Ad cernendum adhibentur cribra, filis bombycinis contexta, et ea, in ipso opere, supra infraque obiecta.

Quoties fit, ut pulvis, quum incipiat contusio, alius, alius, quum desinat, recipi soleat, tenendum est, ut omnis pulveris copia, antequam in vas suum ingeratur asservanda, bene commisceatur.

Omnes pulveres, simul atque contusi sunt et parati, in vasis bene clausis adservantur depositi, ne vario umquam aëre afficiantur. Quæ pellucida sunt pulveribus conservandis vasa, ita collocari oportet, ut ad ea, quæ immissa servantur, nullus sit radiis solis adeundi locus.

Accuratio singularum descriptio.

Classis prima.

Hac continentur eæ materiæ, quarum pulvis cernendus est cribro ita contexto, ut singuli pollices decimales capiant fila circiter 120 (hoc est, pedis duodecima pars (werftum) capiat 100) vel ut singuli pollices quadrati decimales 14400 foramina habeant (hoc est, pars duodecima pedis (werftum) quadrata habeat 10000).

A) Rediguntur in pulverem sine residuo.

Radix Filicis maris, quæ prius est decor-
tandanda.

Radix Jalappæ.

Radix Rhei indici.

Radix Serpentariæ.

Radix Valerianæ, quæ ope pistilli lignei
ab humo est purganda.

Cortex Cinchonæ.

Cortex Cinnamomi.

Cina levantica.

Guajaci resina.
Gummi Gutta.
Indigo.
Opium.
Sanguis Draconis.
Scammonium aleppense.
Succinum.
Colophonium.
Olibanum.

B) Rediguntur in pulverem cum residuo.

Folia Aconiti; ubi tantum pulveris habetur, quantum tres ponderis foliorum quartas partes æquat, contusioni finis imponitur. Exigua tantum hujus pulveris copia simul paranda est.

Folia Belladonnæ,
Folia Digitalis,
Folia Hyoscyami,
Folia Nicotianæ,
Folia Sennæ,
Folia Stramonii,
Herba Conii,

ut *Folia Aconiti.*

Radix Belladonnæ; contunditur; donec fasciculus quasi fibrarum relinquatur.

Radix Ipecacuanhæ; ejus nihil, nisi cortex radice, in pulverem redigitur.

Radix Zingiberis, ut *Radix Belladonnæ.*

Castoreum; cujus membranæ detrahendæ sunt.

Classis secunda.

Hac continentur eæ materiæ, quarum pulveris cernendus est cribro ita contexto, ut pollex decimalis fila capiat circiter 96 (hoc est, pedis duodecima pars (werftum) capiat 80) vel ut singuli pollices quadrati decimales 9216 fere foramina habeant (pars duodecima pedis (werftum) quadrata habeat 6400),

A) Rediguntur in pulverem sine residuo.

Radix Angelicæ.

Radix Artemisiæ ope pistilli lignei ab humo purganda.

Radix Ari.

Radix Calami.

Radix Chinæ.

Radix Columbo.

Radix Enulæ.

Radix Iridis florentinæ.

Radix Pyrethri.

Radix Saleb.

Radix Scillæ, in vasis parvis ac bene clausis asservanda.

Radix Zedoariæ.

Cortex Canelle albæ.

Cortex Cascarillæ.

Cortex Quercus.

Semina Anisi.

Semina Cardamomi minoris.

Semina Carvi.

Semina Coriandri.

Semina Cymini.

Semina Foeniculi.

Semina Petroselini.

Semina Phellandrii.

Semina Sabadillæ.

Acidum citricum.

Acidum tartaricum.

Agaricus.

Aloë.

Anisum stellatum.

Arsenicum album.

Assa foetida, et in frigore contundenda et pulverata loco frigido asservanda.

Aurantii fructus immaturi.

Benzoë.

Benzoë.

Camphora; contunditur additâ parvâ Spiritus concentrati copiâ.

Cantharides; pulveranti os velo madido obligatum esse debet.

Caryophylli.

Catechu.

Coccionella.

Crocus.

Cubebæ.

Elaterium.

Euphorbium; huc pertinet illud, quod de Cantharidibus monitum est.

Flavedo Aurantii.

Flavedo citri.

Folia Uvæ ursi.

Fuligo.

Gallæ turcicæ.

Graphites.

Galbanum,

Gummi ammoniacum, } ut Assa foetida.

Gummi arabicum.

Kino.

Lauri baccæ.

Magnesium nigrum.

Macis.

Mastix.

Myrrha.

Nux vomica.

Nux moschata.

Ossa Sepiæ.

Pechurim faba.

Piper album.

Piper hispanicum.

Piper jamaicense.

Ratanhiæ extractum.

Sales omnes.

Saccharum.

Saccharum lactis.

Sapo.

Secale cornutum; hujus ne habeatur jam pulverata major copia, et quod est pulveratum in vasis admodum parvis ac bene clausis asservandum.

Succus Liquiritiæ.

Sulphur citrinum.

B) Rediguntur in pulverem cum residuo.

Folia Aurantii; ubi tantum pulveris habetur, quantum tres foliorum quartas partes æquat, contusioni finis imponitur.

Folia Bucco,

Folia Cardui benedicti,

Folia Trifolii aquatici,

Summitates Absinthii,

Summitates Centaurii minoris,

Summitates Millefolii,

Summitates Rosmarini sylvestris,

Summitates Tanaceti,

Flores Arnicæ,

Flores Chamomillæ,

Flores Lavendulæ,

Herba Cerefolii,

Herba Fumariæ,

Herba Gratiolæ,

Herba Hyssopi,

Herba Mari,

Herba Meliloti,

Herba Melissæ,

Herba Menthæ crispæ,

Herba Menthæ piperitidis,

Herba Scordii,

Herba Thymi,

Herba Violæ tricoloris,

ut Fo-
lia Au-
rantii.

Radix Althææ; contunditur, donec fasciculus quasi fibrarum reliquus sit.

Radix Arnicæ,
Radix Caryophyllatæ,
Radix Galangæ,
Radix Gentianæ,
Radix Hellebori albi,
Radix Hellebori nigri,
Radix Imperatoriæ,
Radix Liquiritiæ,
Radix Ligustici,
Radix Pimpinellæ,
Radix Saponariæ,
Radix Senegæ,
Radix Tormentillæ,
Stipites Dulcimaræ,
Sabinæ ramuli,
Cortex Fraxini,
Cortex Hippocastani,
Cortex Padi,
Cortex Salicis,
Cortex Simarubæ,

ut *Radix Althææ*.

Classis tertia.

Huc pertinent eæ materiæ, quæ contunden-
do et trajiciendo per cribrum setaceum in fari-
nam redigendæ sunt.

Semina Lini.

Semina Sinapis nigræ; oleo antea expresso.

PULVERES COMPOSITI.

Parantur diligenter conterendo et intime
commiscendo partes, unde conficiantur, seorsim
pulveratas (Pulveres simplices) et ponderatas; in
quo faciendo tenendum est, ut illæ, quarum

copia minima præscripta sit, primum conterantur, ceteræ deinde admisceantur. Ubi in pulvere composito conficiendo præscribitur materia quædam haud friabilis, e. g. extractum, hæc cum friabilium parva copia primum conteritur, quo facto omnia miscentur, ut pulverem æquabilem habeas.

Non nisi exiguæ pulverum compositorum quantitates simul parandæ sunt, nec servandæ, nisi in vasis vel vitreis vel porcellaneis, arcte claudendis.

PULVIS ALUMINIS KINOSATUS.

Pulvis stypticus.

Rec. *Kino*,
Pulveris aromatici, singulorum drachmas
 duas, p. 1.
Aluminis crudi unciam dimidiam . . p. 2.
 Fit pulvis.

PULVIS AMARUS FERRATUS.

Rec. *Cardamomi minoris seminum*,
Sulphatis ferrosi, singulorum drachmas
 duas, p. 1.
Cinæ levanticiæ,
Tanaceti summitatum, singulorum unciam
 dimidiam p. 2.
 Fit pulvis.

PULVIS ARI ALKALINUS.

Pulvis Ari compositus.

Rec. *Carbonatis kalici puri* scrupulos duos, p. 2.
Canellæ albæ corticis drachmam, . . . p. 3.

Calami aromatici radices,
Pimpinellæ radices,
Ari radices, singulorum drachmas duas p. 6.
 Fit pulvis.

PULVIS AROMATICUS.

Rec. *Cardamomi minoris seminum,*
Zingiberis radices, singulorum unciam di-
 midiam, p. 1.
Cinnamomi ceylanici corticis unciam. p. 2.
 Fit pulvis.

PULVIS BICARBONATIS NATRICI TARTARICUS.

Rec. *Bicarbonatis natrici,*
Acidi tartarici sicci, singulorum partes
 quinque,
Sacchari albi partes sex.
 Paratur ex tempore.

PULVIS CHLORETI HYDRARGYROSI THEBAICUS.

Pulvis Muriatis hydrargyrosi thebaicus.
 Rec. *Opii levantici* drachmam, p. 1.
Chloreti hydrargyrosi drachmas duas, p. 2.
Sacchari albi drachmas septemdecim p. 17.
 Fit pulvis.

PULVIS ENULÆ AROMATICUS.

Rec. *Angelicæ radices* drachmas duas, . . . p. 1.
Pulveris aromatici drachmas sex, . . p. 3.

Enulæ radices unciam sesquialteram . p. 6.
Fit pulvis.

PULVIS GUMMOSUS.

Rec. *Althææ radices* unciam, p. 1.
Gummi arabici,
Sacchari albi, singulorum uncias duas p. 2.
Fit pulvis.

PULVIS GUMMOSUS STIBIATUS.

Rec. *Kermētis mineralis* drachmam, . . . p. 1.
Sacchari albi drachmas septem, . . . p. 7.
Pulveris gummosi uncias quattuor . p. 32.
Fit pulvis.

PULVIS HÆMOSTATICUS BONAFOUX.

Rec. *Carbonis vegetabilis præparati*,
Gummi arabici, singulorum unciam, p. 1.
Colophonii uncias quattuor p. 4.
Fit pulvis.

PULVIS JALAPPÆ HYDRARGYRATUS.

Rec. *Chloreti hydrargyrosi* drachmas duas, p. 1.
Jalappæ radices drachmas sex p. 3.
Fit pulvis.

PULVIS JALAPPÆ SALINUS.

loco Pulveris Jalappæ compositi.
Rec. *Zingiberis radices* drachmas duas, . . p. 1.
Jalappæ radices,

Gentianæ rubræ radices, singulorum un-
ciam, p. 4.

Salis cathartici uncias duas p. 8.

Fit pulvis.

PULVIS JALAPPÆ TARTARICUS.

Rec. *Jalappæ radices* unciam, p. 1.

Tartari depurati uncias duas p. 2.

Fit pulvis.

PULVIS IPECACUANHÆ THEBAICUS.

loco Pulveris Doveri.

Rec. *Opii levantici*,

Ipecacuanhæ radices, singulorum drach-
mam, p. 1.

Sulphatis kalici unciam p. 8.

Fit pulvis.

PULVIS MAGNESIÆ COMPOSITUS.

Pulvis galactopoeus Rosenii.

Rec. *Flavedinis Aurantii*,

Foeniculi seminum,

Sacchari Lactis, singulorum drachmas
duas, p. 1.

Magnesiæ albæ unciam p. 4.

Fit pulvis.

PULVIS MAGNESIÆ TARTARICUS.

Pulvis aërophorus.

Rec. *Acidi tartarici sicci*,

Magnesiæ albæ, singulorum unciam dimi-
diam, p. 1.

Sacchari albi uncias duas p. 4.
 Fit pulvis, cujus, quum ex præscripto Medici
 datur, unciæ cuique
Ætherolei Menthæ piperitidis guttæ duæ ad-
 miscendæ sunt.

PULVIS NITRI OXALICUS.

Pulvis nitrosus Ph. Suec. Ed. IV vel
 Pulvis refrigerans Rosensteinii.
 Rec. *Salis Acetosellæ* drachmas duas, . . . p. 1.
Nitratis kalici depurati drachmas sex, p. 3.
Sacchari albi uncias duas et dimidiam p. 10.
 Fit pulvis.

PULVIS NITRI TARTARICUS.

loco Pulveris nitrosi Ph. Milit.
 Rec. *Magnesiae albæ* drachmam, p. 1.
Acidi tartarici sicci drachmas duas, . p. 2.
Nitratis kalici depurati drachmas decem, p. 10.
Sacchari albi uncias tres et drachmas sex p. 30.
 Acidum tartaricum primo cum Magnesia teri-
 tur; dein Saccharum, et postremo Nitras addun-
 tur, et omnia teruntur, ut fiat pulvis.

PULVIS NITRI THEBAICUS.

Pulvis thebaicus vel sedativus.
 Rec. *Opii levantici* scrupulum dimidium, p. 1.
Nitratis kalici depurati scrupulos quinque
 et dimidium, p. 11.
Sacchari albi unciam p. 48.
 Fit pulvis.

PULVIS RHEI CUM MAGNESIA.

- Rec. *Magnesiæ albæ*,
Fœniculi seminum,
Sacchari albi, singulorum unciam dimi-
 diam, p. 1.
Rhei indici radiceis unciam p. 2.
 Fit pulvis.
-

PULVIS RHEI SALINUS.

Pulvis digestivus.

- Rec. *Rhei indici radiceis*,
Salis cathartici, singulorum unciam vel pa-
 res portiones.
 Fit pulvis.
-

PULVIS SACCHARI ACIDULUS.

- Rec. *Acidi tartarici* drachmam, p. 1.
Sacchari albi, *Flavedine Citri recente* con-
 fricati, unciam unam et dimidiam p. 12.
 Fit pulvis.
-

PULVIS SCILLÆ BORAXATUS.

- Rec. *Scillæ radiceis* grana sex, p. 1.
Boracis drachmam, p. 10.
Sacchari albi drachmas tres, p. 30.
Tartari depurati unciam p. 80.
 Fit pulvis.
-

PULVIS SCILLÆ COMPOSITUS.

- Rec. *Scillæ radiceis* drachmam, p. 1.
Pulveris aromatici drachmas duas, p. 2.
Nitratis kalici depurati drachmas tres, p. 3.

Tartari depurati unciam dimidiam . . . p. 4.
Fit pulvis.

PULVIS SENNÆ COMPOSITUS.

Rec. *Scammonii aleppensis* drachmas duas, p. 1.
Sennæ alexandrinæ unciam dimidiam, p. 2.
Tartari depurati unciam p. 4.
Fit pulvis.

PULVIS TARTARI COMPOSITUS.

Pulvis dentifricius.

Rec. *Coccionellæ*, cum guttis aliquot *Succi Citri*
tritæ, drachmam, p. 1.
Iridis florentinæ radiceis,
Myrrhæ electæ,
Kino, singulorum unciam, p. 8.
Tartari depurati uncias tres p. 24.
Fit pulvis, cujus, quum ex præscripto datur,
unciæ cuique admiscendæ sunt
Ætherolei Caryophyllorum guttæ quattuor.

QUERCITANNAS PLUMBICUS.

Rec. *Quercus corticis* contusi uncias sex . . p. 1.
Fit cum
Aquæ destillatæ sufficiente quantitate decoctum librarum quattuor et semis (p. 7), cui inter agitandum instillatur
Solutio Subacetatis plumbici,
quamdiu præcipitatum prodeat, quod, colo collectum et Aquâ destillatâ elotum, in lagenam amplioris orificii etiamnunc humidum inditur. Deinde affunditur

Chagarfayrad blyoxid.

Spiritus diluti tantum,
 ut is non nihil superemineat, clauditurque lagena.

SAL CORNUS CERVI.

Subcarbonas ammonicum empyreumaticum.

Sal, quod una cum Liquore Cornus Cervi prodit, cum *Carbonis vegetabilis præparati* quarta parte commiscetur, et, in apparatu idoneo, igne lenissimo sublimatur.

Servatur loco obscuro in vase bene clauso.

SAPO AMMONIACATUS.

Emplastrum Saponis ammoniaci.

Rec. *Salis ammoniaci depurati* in pulverem reducti,

Saponis viridis, singulorum partes æquales.
 Miscentur.

SAPO AMYGDALINUS.

Sapo medicatus.

Rec. *Sodæ depuratæ crystallisatæ* libram, p. 3.

Aquæ destillatæ libras quinque . . . p. 15.

Fit solutio, quæ cum *Calce usta*, in hydratem conversa, caustica redditur, ut ad Solutionem Hydratis kalici præceptum est. Liquor causticus, subsidendo in vase clauso depuratus, evaporat, donec pondus specificum 1.33 habeat.

Liquori frigefacto in vase figulino admiscentur

Olei Amygdalarum unciaë quattuor . p. 1.

Seponitur vas loco temperato, et massa per vices agitur spathulâ ligneâ, donec homoge-

Objyradt Natron.

nea appareat et spissescat. Tum effunditur in cistulas ligneas planas; indurata scinditur in talos, calore modico siccandos.

SERICUM ADHÆSIVUM.

Emplastrum anglicanum.

Rec. *Ichthyollæ* rase quantum placet.

Coquitur cum

Aquæ destillatæ sufficiente quantitate, ut solutio, ad calorem + 4^o C. refrigerata, vix concreseat et gelatina fiat.

Hac solutione, iterum calefaciendâ, *Sericum*, aut colorem faciei referens aut nigrum, tendiculæ ope expansum, illinitur, cavendo simul, ne solutio in aversam serici partem permeet; quo facto, loco mediocriter calido reponitur, ut siccetur. Quæ illinendi opera deinde duodecies vel sedecies repetenda est cum solutione tam calida, quam manus ferre queant.

Postremo aversa serici pars cum *Tinctura Tolu* illinitur.

SERICUM EPISPASTICUM.

Taffetas vesicatorium.

Rec. *Cantharidum* pulveratarum uncias tres, p. 3.

Resinæ flavæ uncias quattuor, p. 4.

Olei Terebinthinæ uncias sex. p. 6.

Resinæ, in vase cupreo liquefactæ, sensim additur Oleum; digeruntur deinde in lagena vitrea cum pulvere *Cantharidum* per horas duodecim. Cum liquido, per linteum colato, illinitur *Sericum* extensum coloris nigri; quod per quattuor dies, bis in die, faciendum.

Servatur

Servatur sericum in vase clauso inter chartæ
ceratæ plagulas.

SOLUTIO ACETATIS AMMONICI.

Alkali ammoniacum acetatum,
loco Spiritus Mindereri.

Rec. *Acidi acetici diluti* quantum placet.

℞ Additur

Ammoniaci caustici tantum,
ut liquor saporem acidum omnino perdat, quam-
quam acidi instar etiamnunc reagat. Servatur
in vase vitreo, bene clauso.

Non magna simul hujus solutionis copia pa-
randa est; si autem inter servandum alkalina
evaserit, id Acido acetico addito corrigendum.

SOLUTIO ACETATIS KALICI.

loco Mixturæ salinæ Ph. Paup.

Rec. *Carbonatis kalici puri* scrupulos octo, p. 1.

Aceti Vini quantum sufficit ad saturandum.

Saturatis adduntur

Syrupi Sacchari uncia, p. 3.

Aquæ destillatæ tantum,

ut solutio pondus habeat libræ unius (p. 36).

Ad usum paratur.

SOLUTIO ACIDI PHOSPHORICI.

Si in præparando Phosphate natrico *liquor*
acidus et ope *Sulphidi hydrici* a metallis libe-
ratus, loco Sodæ depuratæ, *Ammoniaco caustico*
saturatur, et colatura una cum Aqua lotionis
ad siccum vaporat, Phosphas ammonicus habe-

tur, qui in catillum platinicum, modico igne calefactum, per vices ingeritur ibique uritur, usque dum, igne ad rubedinem aucto, ammoniaci odorem emittere cessaverit, et massa liquata tranquille fluat. Tunc effunditur massa, quæ etiam nunc calida in

Aquæ destillatæ trecuplo pondere solvitur. Solutio colata servatur.

SOLUTIO CAMPHORÆ OLEOSA.

Oleum camphoratum.

Rec. *Camphoræ depuratæ* uncias sex . . . p. 1.

Solvuntur digerendo et agitando in

Olei Olivarum communis libra una et semis p. 3.

SOLUTIO CAMPHORÆ SPIRITUOSA.

Spiritus Vini camphoratus.

Rec. *Camphoræ depuratæ* unciam unam cum dimidia, p. 1.

Spiritus concentrati libras duas . . . p. 16.

Solvitur inter agitandum Camphora.

SOLUTIO CAMPHORÆ SPIRITUOSO-ÆTHEREA.

Liquor nervinus.

Rec. *Camphoræ depuratæ* uncias duas, . . p. 1.

Ætheris spirituosi libram p. 6.

Camphorâ inter agitandum solutâ, liquor in vitro optime claudendo servatur.

SOLUTIO CARBONATIS AMMONICI
SPIRITUOSA.

Spiritus Salis ammoniaci Ph. Suec.

Ed. 1.

- Rec. *Salis ammoniaci depurati triti,*
Carbonatis kalici depurati, singulorum li-
bram, p. 1.
Spiritus diluti libras duas, p. 2.
Aquæ destillatæ libram p. 1.
Destillant leni calore libræ duæ (p. 2), quæ
in vase probe clauso servantur.
-

SOLUTIO CARBONATIS KALICI.

Solutio Subcarbonatis kalici puri.

Lixivium Tartari.

- Rec. *Carbonatis kalici puri* uncias quattuor, p. 1.
Aquæ destillatæ uncias octo p. 2.
Solvuntur, et solutio per chartam colatur. Si
inter servandum turbida fiat, iterum colanda est.
-

SOLUTIO CHLORETI FERRICI ÆTHEREA.

Solutio Muriatis ferrici ætherea.

Æther martialis.

- Rec. *Chloreti ferrici,*
Aquæ destillatæ, singulorum drachmas
sex p. 3.
Solvuntur. Solutioni adduntur
Ætheris uncie duæ cum dimidia, . . p. 10.
quo facto, diligenter agitantur in lagena et con-
iuncta stant per noctem diemque. Solutio ætherea
defusa in vase bene ocluso, loco obscuro, ser-
vatur.
-

SOLUTIO CHLORETI FERRICI SPIRITUOSA.

Solutio Muriatis ferrici spirituosa,
loco Tincturæ Martis.

Rec. *Chloreti ferrici* unciam, p. 1.

Spiritus diluti uncias sex. p. 6.

Fit solutio, loco obscuro servanda.

SOLUTIO CHLORETI FERRICI SPIRITUOSO-
ÆTHEREA.

Solutio Muriatis ferrici spirituoso-
ætherea. Æther martialis spirituosus.

Rec. *Solutionis Chloreti ferricæ æthereæ* uncias
duas, p. 1.

Spiritus concentrati uncias quattuor . p. 2.

Mixta in vase vitreo, bene clauso, servantur
loco obscuro.

SOLUTIO CITRATIS KALICI.

loco Mixturæ salinæ Ph. Suec.

Rec. *Carbonatis kalici* puri scrupulos octo, p. 1.

Acidi citrici, in Aquæ destillatæ debita quan-
titate soluti, quantum sufficit ad sa-
turandum.

His admiscentur

Syrupi Sacchari uncia, p. 3.

Aquæ destillatæ tantum,

ut solutio pondus habeat libræ unius (p. 36).

Ad usum paratur.

SOLUTIO FULIGINIS ALKALINA.

Tinctura Fuliginis.

Rec. *Fuliginis splendentis contritæ* uncias duas, p. 2.

Carbonatis kalici depurati, uncias sex, p. 6.

Aquæ destillatæ libras tres p. 36.

In vase ocluso inter agitandum per triduum
digesta colantur. In colatura solvitur

Salis ammoniaci depurati triti uncia . p. 1.

SOLUTIO FULIGINIS FOETIDA.

Tinctura foetida Ph. Milit.

Rec. *Assæ foetidæ* pulveratæ unciam unam cum
dimidia, p. 1.

Solutionis Fuliginis alkaline libram . p. 8.

Conterendo mixta per nycthemeron in vase
clauso macerantur et per linteum colantur.

SOLUTIO GUMMI GUTTÆ ALKALINA.

Elixir Gambogiæ alkalinum.

Rec. *Gummi Guttæ* contritæ drachmas duas; p. 1.
diluuntur cum

Solutionis Carbonatis kalici unciis duabus p. 8.

SOLUTIO HYDRATIS KALICI.

Lixivium Saponariorum.

Rec. *Carbonatis kalici puri* libram, p. 1.

Calcis recens ustæ, Aquâ adpersâ, in hy-
dratem conversæ libram, . . . p. 1.

Aquæ destillatæ libras duodecim . . p. 12.

Macerantur in vase clauso, sæpissime agitan-
do, ad temperaturam + 15°—25° C., per diem
unum alterumve, vel donec lixivium causticum
redditum sit; id vero ex eo cognoscendum est,
quod Aquâ Calcis non turbetur. Deinde, quum
calx subsederit, liquor clarus defunditur atque
in vase ferreo mundo vel argenteo puro vapo-

Loos Kali hydrat

rat, donec refrigeratus pondus specificum 1.33 exhibeat.

In lagenis vitreis servatur, quæ epistomiis, *Sevi* portiuncula obductis, optime sunt claudendæ.

Sevi vinderchloridig kalk.

SOLUTIO HYPOCHLORITIS CALCICI.

Solutio Oxymuriatis calcici. *Sevi*

Rec. *Hypochloritis calcici* unciam dimidiam, p. 1.

Aquæ destillatæ uncias decem. . . . p. 20.

Conteritur in mortario vitreo vel porcellaneo Hypochloris cum aliqua parte *Aquæ*, quæ, Hypochloritis portione in *Aquam* bene disperstitâ, defunditur; tum affundenda est alia *Aquæ* pars, cum residuo terenda et deinde defundenda; in quo faciendo pergitur, dum sal omne in *Aquam* distributum sit. Liquores collecti subsidentia et colatione clarificantur.

Non nisi ad usum paratur.

SOLUTIO HYPOCHLORITIS NATRICI.

(Liqueur de Labarraque).

Rec. *Sodæ depuratæ crystallisatæ* uncias sex, p. 3.

Aquæ destillatæ uncias sedecim p. 8.

Fit solutio colata, in quam introducitur *Gas Chlori*, ut ad *Aquam Chlori* jam præceptum est, parandum ac lavandum, usque dum *Gas Acidi carbonici* cum effervescentia abire incipiat. Tum solutio in vitris, epistomiis vitreis obturandis, loco frigido servatur.

§ SOLUTIO NITRATIS HYDRARGYRI.

Rec. *Hydrargyri destillati* uncias duas et semis, p. 10.

Acidi nitrici diluti uncias sex et semis, p. 26.
Solvitur digerendo Hydrargyrum in acido; quo
facto, solutio evaporat ad remanentiam unciarum
et drachmarum sex (p. 27), quæ servantur.

SOLUTIO SUBACETATIS FERRICI.

Liquor Ferri acetici.

Rec. *Hydratis ferrici in Aqua* quantum vis;
colo colligitur et inter chartæ plagulas fortiter
exprimitur, quamdiu illæ humectantur. Tum
Hydras extemplo cum

Acidi acetici diluti pari pondere
in vase clauso macerantur, quamdiu acidum ali-
quid solvit. Solutio colata ad usum servatur.

SOLUTIO SUBACETATIS FERRICI SPIRITUOSO-ÆTHEREA.

Tinctura Martis Klaprothi.

Rec. *Ætheris acetici* drachmas duas, p. 1.
Spiritus concentrati unciam dimidiam, p. 2.
Solutionis Subacetatis ferrici uncias duas
cum drachmis duabus p. 9.
Mixta servantur in vase vitreo, optime clauso.

SOLUTIO SUBACETATIS PLUMBICI.

Acetum saturninum.

Rec. *Lithargyrii præparati* uncias tres, . p. 3.
Sacchari Saturni crystallisati uncias de-
cem, p. 10.
Aquæ destillatæ libras quattuor . . p. 48.
In lagena clausa, interdum agitanda, mace-
rantur, donec color sedimenti ruber plane eva-

*Beobacht. d. Lithargyrii u. d. Blei-
oxid.*

nerit. Tum colatur solutio et in lagenâ, bene obturata, servatur.

SOLUTIO SULPHATIS MAGNESICI CARBONICA.

Rec. *Salis cathartici* libras septem p. 7.
Solvuntur in

Aquæ fontanæ (indolis ad *Aquam Acidi carbonici præscriptæ*) libris triginta sex p. 36.

Solutio colata *Gase Acidi carbonici* saturatur et in lagenis vitreis, aquæ circiter libram capitibus, bene obturatis, asservatur.

SOLUTIO SUPERJODETI KALICI.

Solutio jodurata.

Rec. *Jodi* scrupulum, p. 1.

Jodeti kalici scrupulos duos, p. 2.

Aquæ destillatæ uncias tres p. 72.

Fit solutio. Paratur ex tempore.

SPECIES AMARÆ HJÆRNERI.

Rec. *Croci orientalis* drachmam, p. 1.

Zedoariæ radicis,

Agarici, singulorum drachmas duas, p. 2.

Rhei indici radicis drachmas quattuor, p. 4.

Gentianæ rubræ radicis,

Myrrhæ electæ, singulorum unciam, p. 8.

Aloës hepaticæ,

Theriacæ, singulorum uncias duas . p. 16.

Contusa et concisa miscentur.

SPECIES EMOLLIENTES.

Species ad Fomentum emolliens.

Rec. *Chamomillæ nostratis florum* unciam, p. 1.*Malvæ foliorum* uncias quattuor . . . p. 4.

Incisis admiscentur

Lini seminum pulveratorum unciaë duæ p. 2.

SPECIES PECTORALES.

Species ad Infusum pectorale.

Rec. *Anisi stellati* unciam, p. 1.*Verbasci florum* uncias quattuor, . p. 4.*Althææ radices,**Hysopi herbæ*, singulorum uncias octo, p. 8.*Cerefolii hispanici herbæ* uncias sedecim p. 16.

Incisa et contusa commiscentur.

SPECIES PRO VAPORIBUS ACIDI ACETICI.

Rec. *Acidi Vitrioli* unciam dimidiam, . . . p. 1.*Sacchari Saturni pulverati* unciam unam

et semis p. 3.

Separatim dantur.

SPECIES PRO VAPORIBUS CHLORI.

Species pro vaporibus Superoxydi
muriatosi.Rec. *Magnesiæ nigri* pulverati unciam unam, p. 1.*Acidi muriatici crudi* uncias quattuor p. 4.

Separatim dantur.

SPECIES RESOLVENTES.

Species ad Fomentum resolvens.

Rec. *Lupuli strobilorum* libram dimidiam, p. 1.

Menthæ crispæ herbæ,
Absinthii summitatum, singulorum li-
 bram p. 2.
 Incisa commiscentur.

SPIRITUS CINNAMOMI.

Rec. *Cinnamomi ceylanici corticis* contusi li-
 bram, p. 3.
Spiritus Vini gallici uncias octoginta, p. 20.
Aquæ destillatæ quantum sufficit ad prohi-
 bendum empyreuma.

Macerantur per horas viginti quattuor; tum
 lento igne destillant uncia octoginta (p. 20).

SPIRITUS COCHLEARIÆ.

Rec. *Cochleariæ herbæ recentis* concisæ libras de-
 cem, p. 5.
Spiritus Vini gallici libras octo . . . p. 4.
 Balnei vaporis calore destillant libræ quattuor
 (p. 2).

SPIRITUS CONCENTRATUS.

Spiritus Vini rectificatissimus.

Spiritus dilutus ex alembico æneo, capitello
 et refrigeratorio æneis instructo, leni calore de-
 stillat. Ea destillati pars, quæ primum prodit
 et pondus specificum 0.84 habet, excipitur et
 servatur in vasis clausis.

SPIRITUS DILUTUS.

Spiritus Frumenti, qualis vulgo in merce
 est, bonæ tamen notæ, supra *Carbonem vegeta-*

bilem præparatum, cum illo antea maceratus, rectificatur. Servatur illa destillati pars, quæ pondus specificum 0.90 habet.

SPIRITUS FRUMENTI DEPURATUS.

Rec. *Spiritus Frumenti* quantum placet.
Purificatur ope Carbonis vegetabilis præparati.
Pondus specificum 0.94 habebit.

SPIRITUS JUNIPERI COMPOSITUS.

Spiritus Juniperi.

Rec. *Foeniculi seminum*,
Carvi seminum, singulorum contusorum un-
ciam sesquialteram, p. 3.
Juniperi baccarum immaturarum contusa-
rum libram, p. 24.
Spiritus Vini gallici uncias octoginta, p. 160.
Aquæ destillatæ quantum sufficit ad pro-
hibendum empyreuma.

Macerantur per horas viginti quattuor; tum lento igne destillant uncia octoginta (p. 160.)

SPIRITUS LAVENDULÆ.

Rec. *Lavendulæ florum* libras duas et semis, p. 3.
Spiritus Vini gallici libras tredecim cum
unciis quattuor p. 16.
Balnei vaporis calore, destillando eliciuntur
uncia octoginta (p. 8).

SPIRITUS ROSMARINI.

Rec. *Rosmarini foliorum* uncias quadraginta, p. 1.
Spiritus Vini gallici uncias centum et sexa-
ginta p. 4.

Balnei vaporis calore destillant unciæ octoginta (p. 2).

SPIRITUS ROSMARINI COMPOSITUS.

Spiritus vulnerarius vel aromaticus.

Rec. *Millefolii summitatum*,

Thymi herbæ, singulorum uncias quinque, p. 1.

Rosmarini foliorum uncias quindecim, p. 3.

Spiritus Vini gallici uncias centum et sexaginta p. 32.

Destillando eliciuntur unciæ octoginta (p. 16).

SPONGIA CERATA.

Spongiæ marinæ tenues, siccatae et ab arenulis aliisque heterogeneis purgatae, immerguntur in *Ceram flavam* liquefactam et prelo calefacto fortiter exprimuntur. Refrigeratae servantur.

STANNUM PULVERATUM.

In pyxide commoda, Cretâ intus obducta, vel in mortario ferreo, paullum calefacto, *Stannum* igne liquefactum assidue agitatur, donec redigatur in pulverem, separandum a metalli particulis grandioribus, quæ, iterum liquefactæ, eodem modo tractantur.

⚞

STRYCHNINA.

Rec. *Nucum vomicarum* libras quinque, . p. 20.

Acidi Vitrioli uncias tres, p. 1.

Aquæ destillatæ tantum, ut superemineat.

Per duodecim horas macerata in vase leviter cooperto inter agitandum coquantur, aquam dis-
sibatam

sipatam semper restituendo, per horas octodecim ad viginti quattuor, vel donec nuces mollescant; tum in pulvem rediguntur, quæ, exprimendo separata a liquore, cum *Aqua destillata* iterum decoquitur et exprimendo colatur.

Liquores commixti, post subsidentiam defusi, in balneo vaporis ad dimidium vaporant et cum

Calcis ustæ, in hydratem conversæ, quantitate excedente

per horam digeruntur. Defuso post quietem liquore, præcipitatum, colo collectum, fortiter exprimitur et cum

Spiritu concentrato

iteratis vicibus decoquitur, quamdiu hic aliquid solvit.

Solutiones spirituosæ colatæ destillando et refrigerando Strychninam tradunt impuram, quæ, liquore supernatante defuso, cum *Alkohole Vini* in vase clauso bis maceratur et ope *Carbonis animalis* repetitâque e *Spiritu concentrato* fervente crystallisatione pura redditur.

Cautissime asservanda est.

STYRAX DEPURATUS.

Styrax Calamitus digeritur *Spiritu diluto*, quamdiu hic aliquid solvit; tum solum per chartam colatur et ope balnei vaporis ad extracti tenuioris spissitudinem vaporat.

SUBCARBONAS FERRICO-FERROSUS.

Crocus Martis aperitivus.

Rec. *Sulphatis ferrosi* quantum placet.

Solvitur in

Aquæ destillatæ sufficiente quantitate.

Liquor colatus instillando

Solutionem Carbonatis kalici, Aquâ destillatâ dilutam,

inter agitandum præcipitatur. Præcipitatum, Aquâ destillatâ calidâ sedulo ablutum, caute siccatur et in vase, bene clauso, servatur.

Barock Salpetersäure *Ullmann'sche*

SUBNITRAS BISMUTHICUS.

Magisterium Bismuthi.

Rec. *Bismuthi* in frustula comminuti uncias tres, p. 1.

Acidi nitrici diluti uncias novem . . p. 3.

Digeruntur, quamdiu aliquid solvitur; solutio, additâ caute, ne turbetur, *Aquæ destillatæ* parvâ copiâ, colatur et, vaporando in vase porcellaneo refrigerandoque, ad crystallos ponendas cogitur. Crystalli, muriâ liberatæ et pulveratæ,

Aquæ destillatæ fervidæ libris decem p. 40.

inter continuam agitationem superfunduntur. Quod hinc oritur præcipitatum, quiete demissum, a liquido supernatante separatur et, Aquâ destillatâ in liquoris locum ter quaterve et affusâ et defusâ, in vase lavatur; colo deinde collectum eluitur, quo facto, inter chartæ plagulas siccatum servatur.

SUCCUS AMORACIÆ COMPOSITUS.

Succus Armoraciæ cum Spiritu.

Rec. *Armoraciæ radiceis Succis expressi* unciam, p. 1.

Aceti Vini uncias duas, p. 2.

Spiritus Frumenti depurati uncias sex p. 6.

Miscentur.

SUCCUS BERBERIDIS.

Rec. *Berberidis baccarum recentium* quantum placet.

In mortario lapideo contunduntur ope pistilli lignei. Massa inde profecta, in cella per horas viginti quattuor seposita, per linteum exprimitur et succus expressus, subsidendo clarefactus, semel ebullit; deinde per linteum colatur et refrigeratus in lagenas immittitur, libras duas capientes atque suberibus selectis et Colophonio obturandas. Servatur in cella.

Parantur eodem modo:

SUCCUS CERASORUM

e *Cerasis acidis recentibus*, cum nucleis contundendis;

SUCCUS OXYCOCCI

ex *Oxycocci baccis recentibus*;

SUCCUS RIBIS NIGRI

e *baccis recentibus Ribis nigri*;

SUCCUS RIBIS RUBRI

e *baccis recentibus Ribis rubri*;

SUCCUS RUBI IDÆI

e *Rubi idæi baccis recentibus*.

SULPHAS CUPRICUS AMMONIACALIS.

Subsulphas ammonico-cupricum.

Cuprum ammoniacum.

Rec. *Vitrioli de Cypro* pulverati quantum placet,
Ammoniaci caustici quantum sufficit ad Vitriolum solvendum.

Solutioni colatæ et refrigeratæ additur

Spiritus concentratus,
 quamdiu aliquid præcipitatur. Sal præcipitatus,
 a liquido separatus, inter chartæ bibulæ plagu-
 las celeriter siccatur et statim in vas vitreum,
 optime obturandum, ingeritur.

Sulphuræ ferrosæ.
 SULPHAS FERROSUS. *Se 5'*

Vitriolum Martis vel Sal Martis.

Rec. *Acidi Vitrioli* libram dimidiam, . . . p. 1.

Aquæ destillatæ libras duas et semis. p. 5.

Caute mixtis in vase vitreo vel murrhino ad-
 jicitur

Ferri Limaturæ vel *Rasuræ* libra circiter
 dimidia vel major quantitas, quam
 quæ in acido, post digestionem per
 duodecim horas, solvi possit.

Liquor deinde, si opus est, adjectâ *Aquæ de-*
stillatæ parvâ copiâ, calefit, ut crystalli forte
 depositæ solvantur, et etiamnunc calens per
 chartam, *Acido sulphurico diluto* humectatam,
 colatur; quo facto, loco frigido seponitur, ut
 crystallos demittat, quæ, inter chartæ plagulas
 celeriter siccatae, in vase optime claudendo ser-
 vantur. Liquor remanens leniter vaporat, ut
 crystallos iterum deponat.

SULPHAS KALICUS. *Se 5'*

Tartarus vitriolatus vel Arcanum
 duplicatum.

Massa post *Acidi nitrico-nitrosi* destillatio-
 nem in retorta remanens, *Aquâ destillatâ* fer-
 vidâ soluta, colatur et vaporatione ad crystal-
 lisationem redigitur. Sal depositus, repetitâ in

Aquæ destillatæ fervidæ partibus quattuor solutione et crystallatione, refrigerando ab omni Bisulphate kalico depuratur.

SULPHAS QUINICUS.

Rec. *Cinchonæ regię corticis* pulverati libras quinque, p. 10.
Aquæ destillatæ libras viginti quinquæ, p. 50.
Acidi hydrochlorici libram dimidiam p. 1.

In vase figulino mixta inter continuam agitationem coquantur per horæ quadrantem. Liquor deinde defunditur, et residuum cum eâdem Aquæ destillatæ quantitate, *Acidi hydrochlorici* unciis tribus acidulatâ, pari modo tractatur; quod tertium etiam, cum expressione residui, est faciendum.

Liquores collecti in balneo aquæ coquentis vaporant ad remanentiam librarum circiter decem (p. 20), quæ, ut aëri opportunæ sint, per dies aliquot sepositæ, colantur. Tum admiscetur liquori claro inter continuam agitationem

Calcis ustæ, in hydratem recens conversæ et cum sufficiente Aquæ destillatæ copiâ in pulvem redactæ, tantum,

quantum requiritur ad perfectam Quininæ præcipitationem, inde agnoscendam, quod liquidum alkali instar reagat. Præcipitatum post subsidentiam colligitur et exprimitur; cum Aqua frigida humectatum iterum exprimitur et cum

Spiritus concentrati libris tribus . . . p. 6. in cucurbita longicollis vel retorta coquendo digeritur. Colato deinde liquore lotoque residuo insolubili cum *Spiritus concentrati* sufficiente quantitate, ex his liquoribus commixtis abstrahitur *Spiritus*, destillando in balneo aquæ co-

quentis; jam restat Quinina impura, Aquæ destillatæ frigidæ parvâ quantitate lavanda.

Quinina tali modo adquisita cum

Aquæ destillatæ libris quattuor . . . p. 8.
ad ebullitionem aquæ calefit; cui instillatur, inter agitandum, sensim et caute

Acidi sulphurici diluti, quantum ad Quinina[m] solvendam requiritur, nec plus; quo facto, solutioni adduntur

Carbonis animalis uncia[rum] duæ, vel quantum sufficit ad solutionem decolorandam, quæ per duo minuta coquenda est et, etiamnunc fervens, colanda.

Inter refrigerationem Sulphas quinicus in crystallos coalescit, quæ collectæ, inter chartæ plagulas, lenissimo calore, in umbra siccantur et in vasis, bene obturatis, loco umbroso servantur.

E liquore residuo nova Sulphatis copia evaporatione elici potest, quæ, si colorata est, cum Carbone animali iterum tractari debet.

SULPHAS ZINCICUS. *Zn S.*

loco Vitrioli albi purificati.

E *Zinco*, in frustula comminuto, paratur eodem modo, quo Sulphas ferrosus.

SULPHIDUM STIBICUM.

loco Hydrosulphureti stibiosi cum Sulphure Ph. Succ. Ed. V vel Sulphuris aurati Antimonii.

Rec. *Sulphuris sublimati eloti* uncias sex, . p. 1.
Calcis ustæ libram vel quantum sufficit,

Antimonpræfla. St.

Sulphureti stibici præparati libram sesqui-
alteram, p. 3.

Sodæ depuratæ crystallatæ libras quattuor
cum dimidia, p. 9.

Aquæ destillatæ libras viginti. p. 40.

Soda depurata in Aqua solvitur; dein solu-
tioni, in vase ferreo mundo ebullienti, additur
sensim Calx, affusâ Aquâ, in pultem redacta,
donec lixivium causticum fiat; tum Sulphure-
tum et Sulphur, intime mixta, lixivio etiamnunc
fervido adduntur, quod per tres horæ quadran-
tes inter agitationem continuam coquendum est.
Liquor, subsidendo et colando depuratus, eva-
porat, ut crystalli coalescant, quæ, exprimendo
inter chartæ bibulæ plagulas, a muria liberantur.

Harum crystallorum, nuper præparatarum,
uncie decem

in *Aquæ destillatæ* libris quinque
solvuntur; quæ solutio, colata, in miscelam re-
frigeratam, ex

Acidæ sulphurici destillati uncies tribus

et *Aquæ destillatæ* libris octo

confectam, inter strenuam agitationem infundi-
tur. Liquore post subsidentiam decanthato, præ-
cipitatum aurantiacum, Aquam destillatam ite-
rum iterumque et affundendo et defundendo, in
vase penitus eluitur et, colo denique collectum,
leni calore quam citissime siccatur.

SULPHOHYDRAS AMMONICUS.

Hydrosulphuretum ammonicum.

Ammoniaci caustici quantum placet
in lagenam vitream angustioris orificii inditur.
Tum

Wate praeparat Svafrclam
monuam.
A. H. H.

Gas Sulphidi hydrici, e Sulphureto ferroso et Acido Vitrioli, Aquâ diluto, paratum et per Aquam transadactum, tubi vitrei ope per liquidum alkalinum refrigeratum, dum saturatum sit, ducitur.

Servatur loco frigidus in vitris parvis, inde replendis, quæ epistomiis *Sevo* obductis arctissime claudenda sunt.

SULPHUR PRÆCIPITATUM.

Lac Sulphuris.

Rec. *Calcis ustæ* libras duas cum dimidia, p. 5.

Aquæ destillatæ libras viginti quinque p. 50.

Calci in ollam ferream, mundam et satis capacem, immisæ et deinde, *Aquæ* portione affusâ, in pulvem conversâ, affunditur quod superest *Aquæ*. *Mixturæ* ebullienti admiscetur per vices, inter agitandum cum spathula ferrea,

Sulphuris citrini pulverati libræ quattuor vel quantum solvitur.

Solutio, post subsidentiam colata, cum illa commiscetur solutione, quæ in residuo lavando acquiritur. *Liquoribus* commixtis in vase apto, vel fictili vel ligneo,

Acidum hydrochloricum, Aquæ destillatæ decuplo pondere dilutum,

sensim et inter continuam agitationem additur, donec portio quædam liquoris colata colorem subflavum habeat, cavendo semper, ne *Acidum* in excessu admisceas. Tum præcipitatum, quiete subsidens, colo colligitur et, *Aquâ destillatâ* probe ablutum, leni calore siccatur.

SULPHUR SUBLIMATUM ELOTUM.

Flores Sulphuris edulcorati.

Rec. *Florum Sulphuris* quantum placet.

Cum *Aquæ destillatæ* parva copia in pulvem redacti, *Aquam destillatam* ferventem iterum iterumque admiscendo et defundendo, lavantur, quamdiu *Aqua* defusa colorem chartæ exploratoriae coeruleæ mutat; tum Sulphur, colando et exprimendo, ab humore liberatur et siccatur.

SULPHURETUM FERROSUM.

Sulphuretum Ferri.

Sulphur citrinum, in crucibulum commune inditum, *rudiculâ e Ferro cuso*, igne vehementi ad albedinem calefactâ, ut scintillas spargat, agitatur; quæ, quum non amplius excandescit, igni iterum immittenda est et alia rudicula, similiter candefacta, in ejus locum substituenda, donec Sulphur consumptum sit; in quo faciendo semper cavendum, ne major vel superflua Sulphuris copia crucibulo simul indetur. Tum Sulphuretum post refrigerium eximitur et, si placet, contusum, in lagenâ bene clausa servatur.

Fit etiam Sulphuretum ferrosium, et quidem melius, frustula *Sulphuris citrini* supra *Ferri Rasuram*, in crucibulo ad albedinem calefactam, conjiciendo.

SULPHURETUM STIBICUM PRÆPARATUM.

Antimonium præparatum.

Eodem modo, ac *Bolus præparata*, ex *Antimonio crudo* paratur.

SUPERSTIBIAS KALICUS.

Calx Antimonii elota.

Superstibiis kalica.

Rec. *Sibii metallici* libram dimidiam, . . . p. 1.
Nitratis kalici depurati libram p. 2.

Pulverata commiscentur et in crucibulum candefactum sensim injiciuntur. Deflagratione peractâ in igne detinetur massa per horæ dimidium, cavendo tamen, ne liquetur; refrigerata teritur in pulverem, qui, *Aquâ destillatâ* frigidâ perfecte ablutus, siccatur et servatur.

SUPERSULPHURETUM KALICUM.

Sulphuretum kalicum vel Hepar Sulphuris.

Rec. *Carbonatis kalici depurati*,
Sulphuris citrini pulverati, singulorum partes æquales.

Intime mixta in crucibulo cooperto vel olla ferrea, operculo prædita, calore moderato calefiunt, usque dum massa liquata tranquille fluat. Tum massa effusa in mortario ferreo oblecto refrigerescit; refrigerata in vase vitreo, bene obturato, servatur.

SYRUPI.

Parantur syrupi, nisi alia præparandi ratio præscribitur, e Saccharo, quod, in frustula reductum, cum Infuso vel Succo ad unam ebullitionem calefit; quo facto, solutum per pannum laneum colatur.

Servantur in cella.

SYRUPUS ACETI.

- Rec. *Aceti Vini* libram dimidiam, p. 1.
Sacchari albi libram p. 2.
 Fit solutio.
-

SYRUPUS ACIDI SULPHURICI.

Syrupus vitriolatus Ph. Milit.

- Rec. *Acidi sulphurici diluti* drachmam, . . p. 1.
Syrupi Sacchari unciam p. 8.
 Miscentur.
-

SYRUPUS ALLII.

- Rec. *Allii bulbi* concisi libram, p. 1.
Aquæ destillatæ fervidæ libras duas . p. 2.
 Fit, macerando per horam in vase clauso, infusum, quod, exprimendo percolatum, in syrupum convertitur, addito
Sacchari albi duplo pondere.
-

SYRUPUS ALTHÆÆ.

- Rec. *Althææ radice* incisæ uncias tres, . . p. 3.
Aquæ destillatæ tantum,
 ut, post macerationem per horas viginti quatuor, fiat colatura librarum duarum (p. 24), quæ subsidentiâ et decanthatione depurata, cum
Sacchari albi libris tribus p. 36.
 in syrupum convertitur, cui refrigerato adjicitur
Aquæ Aurantii uncia p. 1.
-

SYRUPUS AMYGDALARUM.

- Rec. *Amygdalarum amararum* decorticatarum
 drachmas duas, p. 1.

Amygdalarum dulcium decorticatarum un-
cias tres p. 12.

Fit cum *Aqua destillata* emulsio unciarum
sex (p. 24), quæ cum

Sacchari albi libra p. 48.
in syrupum convertitur, cui, per pannum cola-
to, additur post refrigerium

Aquæ Aurantii uncia p. 4.

SYRUPUS AURANTII.

Syrupus *Aurantii corticis*.

Rec. *Flavedinis Aurantii* concisæ uncias tres, p. 1.

Aquæ destillatæ fervidæ quantum satis.

Fit, digerendo per horam, infusum libræ ses-
quialterius (p. 6), quod cum

Sacchari albi libris tribus p. 12.
in syrupum convertitur.

SYRUPUS CERASORUM.

Syrupus *Cerasi nigri*.

Rec. *Succi Cerasorum* libras duas, p. 4.

Sacchari albi libras tres cum dimidia p. 7.

Fit syrupus.

SYRUPUS CITRI CORTICIS.

Rec. *Flavedinis Citri* recentis incisæ unciam p. 2.

Maceratur per horam in vase clauso cum

Aquæ destillatæ fervidæ tanta copia,
ut fiat infusum libræ unius (p. 24), cui, cum
Sacchari albi libris duabus p. 48.

in syrupum converso, additur post refrigerium
Aquæ Aurantii uncia dimidia p. 1.

SYRUPUS

SYRUPUS CITRI E SUCCO.

- Rec. *Citri Succo*, recens expressi et defæcati, libram, p. 1.
Sacchari albi libras duas p. 2.
 Fit syrupus.
-

☞
 SYRUPUS EMETINÆ.

- Rec. *Emetinæ* granum, p. 1.
Syrupi Sacchari unciam p. 480.
 Conteruntur, ut unum fiant.
-

SYRUPUS HYDRARGYRI.

- Rec. *Hydrargyri destillati* drachmam, . . p. 1.
Gummi arabici,
Sacchari albi, singulorum pulveratorum
 drachmas tres, p. 3.
Aquæ Rosæ drachmas duas p. 2.
 Hydrargyrum cum Gummi et Saccharo, Aquam
 Rosæ sensim addendo, in mortario vitreo conteritur, donec globuli illius omnino visum effugerint. Deinde paulatim admiscuntur
Syrupi Sacchari uncizæ quattuor . . . p. 32.
 Non nisi ad usum paratur.
-

SYRUPUS JUNIPERI.

Roob Juniperi.

- Rec. *Juniperi baccarum maturarum*, paullum
 contusarum, quantum vis.
 Affusâ Aquâ destillatâ macerantur per diem
 unum alterumve in vase ligneo apto, cujus fundus foramine, obturamento clauso, instructus,
 bacillis ligneis et stramine mundo contactus est.
 Liquor deinde defusus toties superinfunditur, do-

nec baccæ exhaustæ sint; postremo colatur et in balneo vaporis ad mellis spissitudinem consumitur.

SYRUPUS OXYCOCCL.

Paratur e *Succo Oxycocci* eodem modo, quo Syrupus Cerasorum.

SYRUPUS RHEI.

Rec. *Infusi Rhei* libram p. 1.
Sacchari albi libras duas p. 2.
 Fit syrupus.

SYRUPUS RIBIS NIGRI.

E *Succo Ribis nigri* paratur, ut Syrupus Cerasorum.

SYRUPUS RUBI IDÆI.

Paratur e *Succo Rubi idæi* eodem modo, quo Syrupus Cerasorum.

SYRUPUS SACCHARI.

Rec. *Aquæ destillatæ* quantum placet, . . p. 1.
Sacchari albi duplum pondus p. 2.
 Fit syrupus.

SYRUPUS SAMBUCL.

Roob Sambuci.

Rec. *Sacchari albi* libram, p. 1.
Sambuci baccarum succi expressi libras octo p. 8.

In balneo vaporis rediguntur ad syrupi spissitudinem.

SYRUPUS SCILLITICUS.

Syrupus Scillæ.

- Rec. *Zingiberis radice* unciam dimidiam, p. 1.
Scillæ radice unciam, p. 2.
Hyssopi herbæ uncias duas p. 4.
 Contusa et concisa in vase clauso per diem
 noctemque macerantur cum
Aquæ Menthæ piperitidis tanta copia,
 ut liquor, exprimendo colatus, pondus habeat
 libræ sesquialterius (p. 36), ex qua cum
Sacchari albi libris tribus p. 72.
 fit syrupus.
-

SYRUPUS SENEGÆ.

- Rec. *Senegæ radice* concisæ unciam p. 1.
 Fit, secundum regulas supra traditas, decoctum
 unciarum decem (p. 10), cui adduntur
Sacchari albi uncie viginti, p. 20.
 ut fiat syrupus.
-

⌘ SYRUPUS THEBAICUS.

- Rec. *Tincturæ Opii* drachmam dimidiam, p. 1.
Syrupi Sacchari uncias sex p. 96.
 Commiscentur.
-

SYRUPUS ZINGIBERIS.

- Rec. *Zingiberis radice* contusæ unciam, . p. 1.
Aquæ destillatæ fervidæ tantum,

ut, post digestionem in vase clauso per horas sex, fiat infusum unciarum novem (p. 9), cum
Sacchari albi libra una et semis . . p. 18.
 in syrupum convertendarum.

TARTARUS BORAXATUS.

Rec. *Boracis* uncias duas, p. 1.

Aquæ destillatæ fervidæ libras duas p. 12.

Fit solutio, cui, etiamnunc fervidæ, adduntur per vices et inter continuam agitationem cum spathula lignea

Tartari depurati, in pulverem redacti, unciæ sex vel quantum solvitur . p. 3.

Solutio, post horas viginti quatuor colata, balnei vaporis calore vaporat, donec pars exempta et refrigerata in pulverem facile redigatur. Tum eximitur sal, qui, refrigeratus et per horas duas vel tres ad temperaturam + 30° C. siccatus, pulveratur et in vase, bene obturato, servatur.

Vandeyratt Kali

TARTRAS KALICUS.

Tartarus tartarisatus.

Rec. *Carbonatis kalici depurati* libram, . . p. 1.

Aquæ destillatæ libras quatuor . . . p. 4.

Lixivio ferventi sensim adjicitur

Tartari depurati pulverati quantum sufficit ad saturandum.

Liquor, etiamnunc calens per chartam colatus, vaporat in vase porcellaneo, donec dimidia ejus pars consumpta sit; tum, si Tartrate calcico turbida est, iterum colatur, si opus est, additâ Aquâ destillatâ, et in balneo vaporis exsiccat. Massa, plane sicca et in pulverem

redacta, servanda et in vase vitreo, bene obturato.

TARTRAS NATRICO-KALICUS.

Sal Seignetti.

Rec. *Sodæ depuratæ* libram, p. 1.

Aquæ destillatæ libras tres p. 3.

Lixivio fervido sensim adjicitur

Tartari depurati, in pulverem redacti, quantum sufficit ad saturandum.

Liquor, post horas viginti quattuor per chartam colatus, vaporat in vase porcellaneo, donec pellicula appareat; tum loco frigido seponitur, ut crystallos ponat, quæ siccatae servantur.

§ TARTRAS STIBICO-KALICUS.

Tartarus emeticus vel antimonialis.

Rec. *Tartari depurati*,

Oxidi stibici, singulorum pulveratorum uncias tres, p. 1.

Aquæ destillatæ libras duas p. 8.

In vase vitreo vel figulino coquendo digeruntur per quartam horæ partem; tum liquidum fervens percolatur et loco frigido seponitur, ut crystalli concrecant. Solutio remanens vaporatione et refrigeratione ad crystallos ponendas cogitur. Si Tartras calcicus, crystallorum instar minutissimarum, solutionem quasi gelatinosam faciat, hæ crystalli a Tartrate stibico-kalico, qui ad fundum et latera vasis adfixus manet, liquorem agitando et defundendo, facillime separantur. Quo facto liquor, antequam vaporat, per chartam colatur.

*Wingraat Antimonoxid.
kali*

Crystalli Tartratis stibico-kalici collectæ, si ope tubi ferruginarii exploratæ, arsenicales deprehenduntur, purificentur necesse est; quod quidem fit, solvendo in Aquæ destillatæ ferventis quanta minima requiritur copia, et solutionem, si opus est, etiannunc fervidam colatam, inter continuam agitationem refrigerando. Qui inter hæc demittitur pulvis crystallinus, colo colligitur, Aquâ destillatâ frigidissimâ aliquoties abluitur et inter chartæ plagulas exprimendo siccatur. Si, exploratione iterum institutâ, Arsenicum adesse senseris, sal eodem modo iterum est purificandum; quod denuo est faciendum, quamdiu aliquid redolet Arsenicum. Tartras denique purus in vase vitreo, bene clauso, servatur.

Qui in liquoribus solutus manet Tartras, vaporando et refrigerando recuperatur.

TESTÆ OSTREARUM PRÆPARATÆ.

Præparantur eodem modo, quo Bolus præparata, *Testæ Ostrearum*.

THERIACA.

Rec. *Opii levantici*,
Myrrhæ electæ,
Liquiritiæ Succis,
Croci orientalis, singulorum drachmam p. 1.
Zedoariæ radicis,
Cardamomi minoris seminum, singulorum
drachmas duas, p. 2.
Valerianæ minoris radicis drachmas
tres, p. 3.
Gentianæ rubræ radicis drachmas sex, p. 6.

Angelicæ radicis unciam, p. 8.

Mellis depurati uncias novem et drachmas
tres p. 75.

Liquiritiæ Succus, Myrrha et Opium, cum
Vino de Malaga diluta, primo miscentur cum
Melle, paullum calefacto; deinde inter conti-
nuam agitationem paullatim adjiciuntur cetera,
in pulverem tenuem trita.

Servatur in vase obturato.

TINCTURÆ.

Fiunt tincturæ fere omnes digerendo vel,
si jubetur, macerando substantias, rei conveni-
enter deminutas, cum copia præscripta Spiritus
in lagena vel ampulla vitrea, subere clausa et
interdum agitanda. Post digestionem vel mace-
rationem per triduum, solutum refrigeratum de-
funditur et residuum exprimitur; quo facto, li-
quores conjuncti, in infundibulo obfecto, per
chartam colantur.

Fiat omnis digestio ad temperaturam $+60^{\circ}$ C.

Ubi alia observanda est præparandi ratio,
ea expressis verbis præscribitur.

Servantur tincturæ in vitris obturatis loco
non frigido, ubi aër calorem saltim $+15^{\circ}$ C.
teneat.

TINCTURA ABSINTHII.

Rec. *Absinthii summitatum* incisarum libram, p. 1.

Spiritus Frumenti depurati libras sex, p. 6.

Fit tinctura.

TINCTURA ABSINTHII COMPOSITA.

Tinctura amara.

- Rec. *Cardui benedicti foliorum* incisorum,
Aurantii fructus immaturi,
Galangæ radice, singulorum pulveratorum
 unciam, p. 1.
Absinthii summitatum incisarum uncias quat-
 tuor, p. 4.
Spiritus diluti libras quattuor p. 48.

Fit tinctura.

TINCTURA ALOËS COMPOSITA.

Elixir Aloës saponaceum.

- Rec. *Croci orientalis* unciam dimidiam, . . p. 1.
Aloës lucidæ contusæ,
Acetatis kalici,
Bilis bovinæ inspissatæ,
Myrrhæ electæ contusæ, singulorum un-
 ciam, p. 2.
Spiritus diluti libram p. 24.

Fit tinctura.

TINCTURA ALOËS CROCATA.

Elixir aloëticum.

- Rec. *Myrrhæ electæ* contusæ,
Croci orientalis, singulorum unciam dimi-
 diam, p. 2.
Aloës lucidæ contusæ drachmas sex, p. 3.
Spiritus diluti uncias sedecim p. 64.

Fit tinctura.

TINCTURA AROMATICA.

- Rec. *Cardamomi minoris seminum* pulveratorum
 unciam dimidiam, p. 1.

Canellæ albæ corticis,
Cinnamomi ceylanici corticis,
Galangæ radicis, singulorum contusorum
 unciam, p. 2.
Spiritus diluti libras duas p. 48.

Fit tinctura.

TINCTURA AROMATICA ACIDA.

Tinctura aromatica vitriolata.

Rec. *Acidi sulphurici destillati* uncias duas, p. 1.
Tincturæ aromaticæ libram p. 6.

Sensim commixta stant per dies aliquot; postea tinctura colatur.

TINCTURA ASSÆ FOETIDÆ.

Rec. *Assæ foetidæ* pulveratæ uncias duas et dimidiam, p. 5.

Spiritus concentrati libram p. 24.

Fit tinctura.

TINCTURA AURANTIÆ.

Rec. *Flavedinis Aurantiæ* concisæ uncias tres, p. 1.

Spiritus diluti libram sesquialteram . . p. 6.

Fit tinctura.

TINCTURA BENZOËS.

Rec. *Benzoës amygdaloidis* contritæ uncias duas, p. 1.

Spiritus concentrati libram p. 6.

Fit tinctura.

TINCTURA BENZOËS ALOËTICA.

Balsamum e Benzoë vel traumaticum.

- Rec. *Aloës lucidæ* contritæ drachmas duas, p. 1.
Balsami peruviani unciam, p. 4.
Benzoës amygdaloidis contritæ unciam ses-
 quialteram, p. 6.
Spiritus concentrati uncias sedecim . p. 64.
 Fit tinctura.
-

TINCTURA CANTHARIDUM. ♂

- Rec. *Cantharidum* contritarum drachmam unam
 cum dimidia, p. 3.
Spiritus diluti uncias sedecim p. 256.
 Macerando fit tinctura.
-

TINCTURA CASCARILLÆ.

- Rec. *Cascarillæ corticis* contusi uncias duas, p. 1.
Spiritus diluti libram p. 6.
 Fit tinctura.
-

TINCTURA CASTOREI.

- Rec. *Castorei canadensis* pulverati uncias duas, p. 1.
Spiritus diluti libram p. 6.
 Fit tinctura.
-

TINCTURA CASTOREI THEBAICA.

Elixir foetidum.

- Rec. *Opii levantici* pulverati drachmam unam
 cum dimidia, p. 1.
Salis Cornus Cervi drachmas tres, . . p. 2.
Assæ foetidæ pulveratæ drachmas sex, p. 4.

Castorei canadensis pulverati unciam ses-
quialteram, p. 8.

Spiritus diluti libram p. 64.

Fit tinctura.

TINCTURA CINCHONÆ.

Rec. *Cinchonæ regiae corticis* contusi uncias
duas, p. 1.

Spiritus diluti libram unam et dimidiam p. 9.

Fit tinctura.

TINCTURA CINCHONÆ AMARA.

Elixir Whyttii.

Rec. *Gentianæ rubræ radicis*,

Flavedinis Aurantii, singulorum conciso-
rum unciam unam cum dimidia, p. 3.

Cinchonæ regiae corticis contusi uncias quat-
tuor, p. 8.

Spiritus diluti libras quattuor p. 90.

Fit tinctura.

TINCTURA CINNAMOMI.

Rec. *Cinnamomi ceylanici corticis* contusi un-
ciam, p. 1.

Spiritus diluti uncias decem p. 10.

Fit tinctura.

TINCTURA COLOCYNTHIDIS COMPOSITA.

Tinctura Colocynthis.

Rec. *Anisi stellati* contusi drachmam, . . . p. 1.

Colocynthis pulpæ minutim incisæ un-
ciam, p. 8.

Spiritus diluti uncias quattuordecim p. 112.
Fit tinctura.

☞ TINCTURA DIGITALIS.

Rec. *Digitalis foliorum* comminutorum unciam
sesquialteram, p. 1.
Spiritus diluti libram p. 8.
Macerando fit tinctura.

TINCTURA GUAJACI AMMONIATA.

loco Tincturæ Guajaci Ph. Suec. Ed. V.
Rec. *Guajaci resinæ* pulveratæ uncias duas, p. 1.
Solutionis Carbonatis ammonici spirituosæ
libram p. 6.
Macerando fit tinctura.

TINCTURA GUAJACI FOENICULATA.

Rec. *Ætherolei Foeniculi* unciam dimidiam, p. 1.
Guajaci resinæ pulveratæ unciam, . p. 2.
Spiritus concentrati unciam p. 2.
Resinæ et *Ætheroleo* per horas viginti quat-
tuor in vase clauso digestis *Spiritus* additur, et
tinctura colatur.

☞ TINCTURA HELLEBORI NIGRI.

Rec. *Hellebori nigri radice* concisæ unciam ses-
quialteram, p. 1.
Spiritus diluti libram p. 8.
Fit tinctura.

TIN-

TINCTURA HYOSCYAMI. ⚥

- Rec. *Hyoscyami foliorum* siccatorum et commi-
nutorum unciam sesquialteram, p. 1.
Spiritus diluti libram p. 8.
Macerando fit tinctura.
-

TINCTURA LACCÆ MYRRHATA.

Tinctura Laccæ composita.

- Rec. *Myrrhæ electæ* contusæ drachmas tres, p. 3.
Laccæ in granulis contritæ unciam, . p. 8.
Spiritus Cochleariæ libram unam cum di-
midia p. 144.
Fit tinctura.
-

TINCTURA LAVENDULÆ AROMATICA.

Spiritus Lavendulæ compositus.

- Rec. *Santali rubri* rasi drachmas tres, . . p. 3.
Cinnamomi ceylanici corticis,
Nucis moschatæ, singulorum contusorum
unciam dimidiam, p. 4.
Spiritus Rosmarini libram, p. 96.
Spiritus Lavendulæ libras tres . . . p. 288.
Fit tinctura.
Paratur etiam sine *Santalo rubro*.
-

TINCTURA LUPULI.

- Rec. *Lupuli strobilorum* uncias duas et dimi-
diam, p. 5.
Spiritus diluti uncias sedecim p. 32.
Fit tinctura.
-

TINCTURA MYRRHÆ.

- Rec. *Myrrhæ electæ* contusæ uncias duas, p. 1.
Spiritus diluti libram p. 6.
 Fit tinctura.
-

⚞

TINCTURA OPII.

Tinctura thebaica vel sedativa vel
 hypnotica.

- Rec. *Opii levantici* pulverati unciam, . . . p. 1.
Aquæ Cinnamomi uncias quattuor, . p. 4.
Spiritus diluti uncias sex p. 6.
 Fit tinctura.
-

TINCTURA OPII CAMPHORATA.

Elixir paregoricum.

- Rec. *Ætherolei Anisi* grana quindecim, . . p. 3.
Camphoræ depuratæ scrupulum, . . . p. 4.
Acidi benzoici,
Opii levantici pulverati, singulorum drach-
 mam dimidiam, p. 6.
Spiritus diluti uncias sedecim . . . p. 1536.
 Fit tinctura.
-

TINCTURA PIMPINELLÆ.

- Rec. *Pimpinellæ radiceis* concisæ uncias duas, p. 1.
Spiritus diluti libram p. 6.
 Fit tinctura.
-

TINCTURA RATANHÆ.

- Rec. *Ratanhiæ corticis radiceis* contusi unciam
 sesquialteram, p. 1.

Spiritus diluti libram p. 8.
Fit tinctura.

TINCTURA RHEI AMARA.

Elixir Rhei amarum spirituosum.

Rec. *Canellæ albæ corticis* drachmam, . . p. 1.
Gentianæ rubræ radicis drachmas duas, p. 2.
Rhei indici radicis unciam p. 8.
E contusis et concisis fit tinctura cum
Spiritus diluti libra p. 96.

TINCTURA SCILLITICA.

Tinctura Scillæ.

Rec. *Cinnamomi ceylanici corticis* contusi un-
ciam dimidiam, p. 1.
Scillæ radicis, siccatae et minutim incisæ,
uncias duas, p. 4.
Spiritus diluti libram p. 24.
Fit tinctura.

TINCTURA SENNÆ AROMATICA.

Rec. *Cardamomi minoris seminum* contusorum
drachmam dimidiam, p. 1.
Carvi seminum contusorum drachmam
unam et dimidiam, p. 3.
Sennæ alexandrinæ unciam unam et di-
midiam, p. 24.
Passularum majorum, demptis acinis, un-
cias duas, p. 32.
Spiritus diluti uncias sedecim p. 256.
Fit tinctura.

TINCTURA STRAMONII.

- Rec. *Stramonii seminum* contusorum unciam ses-
quialteram, p. 1.
Spiritus diluti libram p. 8.
Fit tinctura.
-

TINCTURA SUCCINI.

- Rec. *Succini flavi*, in pulverem tenerrimum tri-
ti, unciam, p. 1.
Ætheris spirituosi uncias quattuor . . p. 4.
Fit tinctura, macerando ad temperaturam cir-
citer +30° C. per octo dies.
-

TINCTURA SUCCINI AROMATICA.

Balsamum Vitæ vel nervinum.

Tinctura balsamica.

- Rec. *Ætherolei Caryophyllorum*,
Olei Cassiæ,
Olei Lavendulæ,
Olei Macidis, singulorum scrupulum, p. 1.
Tincturæ Succini uncias quattuor . . p. 96.
Solvuntur.
-

TINCTURA TOLU.

Tinctura Tolutana.

- Rec. *Balsami tolutani* unciam unam et dimi-
diam, p. 1.
Spiritus concentrati libram p. 8.
Fit tinctura digerendo, donec solutum sit Bal-
samum.
-

TINCTURA VALERIANÆ.

- Rec. *Valerianæ minoris radices*, recens pulverata, uncias duas, p. 1.
Spiritus concentrati libram p. 6.
 Fit tinctura, quæ concutiendo cum
Ætheris spirituosi unciis quattuor . . p. 2.
 miscetur.
-

TINCTURA VALERIANÆ AMMONIATA.

- Rec. *Valerianæ minoris radices*, recens pulverata, uncias duas, p. 1.
Solutionis Carbonatis ammonici spirituosæ
 libram p. 6.
 Macerando fit tinctura.
-

TINCTURA VANILLÆ.

- Rec. *Vanillæ siliquarum*, minutim concisarum, unciam, p. 1.
Spiritus concentrati uncias sex p. 6.
 Fit tinctura.
-

TROCHISCI BICARBONATIS NATRICI.

Tabulæ d'Arcet vel de Vichy.

- Rec. *Bicarbonatis natrici* unciam, p. 1.
Sacchari albi pulverati uncias novem, p. 9.
Tragacanthæ electæ, cum *Aquæ destillatæ*
 fervidæ octuplo pondere in mucilaginem conversæ, quantum satis.
 Bicarbonas et Saccharum, simul contrita, cum mucilagine in massam justæ spissitudinis coguntur, ex qua fiunt trochisci numero quadringenti octoginta æquales.
-

TROCHISCI IPECACUANHÆ.

Rec. *Ipecacuanhæ radice* pulveratæ grana sex, p. 1.
Sacchari albi pulverati unciam, . . . p. 80.
Tragacanthæ electæ, in mucilaginem con-
 versæ, quantum satis.
 Coguntur in massam, in trochiscos sexaginta
 æquales dividendam.

TROCHISCI LIQUIRITIÆ.

loco Trochiscorum Glycyrrhizæ.

Rec. *Extracti Liquiritiæ*,
Gummi arabici pulverati, singulorum un-
 ciam, p. 1.
Sacchari albi pulverati uncias quattuor p. 4.
 Cum *Aquæ destillatæ* guttulis fit massa æqua-
 bilis, ex qua formantur trochisci numero ducenti
 octoginta octo æquales, pulvere *Liquiritiæ radi-
 cis* conspergendi.

TROCHISCI LIQUIRITIÆ THEBAICI.

loco Trochiscorum Glycyrrhizæ the-
 baicorum.

Rec. *Opii levantici* grana triginta duo, . . p. 8.
Tincturæ Tolu drachmam, p. 15.
Extracti Liquiritiæ,
Gummi arabici pulverati, singulorum un-
 ciam, p. 120
Sacchari albi pulverati uncias duas p. 240.
 Opii cum Tinctura contrito adduntur cete-
 ra, quo facto, in massam coguntur, quæ in
 trochiscos centum monaginta duos æquales divi-
 denda est.

TROCHISCI MENTHÆ PIPERITIDIS.

Rec. *Ætherolei Menthæ piperitidis* drachmam dimidiam, p. 1.
Sacchari albi pulverati uncias octo, p. 128.
Tragacanthæ electæ, cum *Aquæ Menthæ piperitidis* in mucilaginem conversæ, quantum satis.

Fit, *Ætheroleum* sub finem addendo, massa justa, in trochiscos trecentos octoginta quattuor dividenda.

VINA.

Vina, quæ dicuntur, medicata parantur digerendo vel macerando in vase clauso per quadrimum et colando cum expressione.

In cella servantur, in lagenis clausis.

VINUM CINCHONÆ AMARUM.

Rec. *Gentianæ rubræ radiceis*,
Flavedinis Aurantii, singulorum concisorum drachmas tres, p. 3.
Cinchonæ regiæ corticis, minutim contusi, unciam, p. 8.
Vini de Malaga uncias decem, . . . p. 80.
Spiritus Vini gallici uncias duas . . . p. 16.
 Fit ex præscripto, jam dato, vinum.

VINUM COLCHICI.

Rec. *Colchici seminum* contusorum uncias duas, p. 1.
Vini de Xeres uncias decem p. 5.
 Per dies quattuor macerata colantur.

VINUM FERRATUM.

Vinum chalybeatum.

- Rec. *Cinnamomi ceylanici corticis* pulverati drachmas tres, p. 3.
Ferri Limaturæ unciam, p. 8.
Vini rhenani libram p. 96.
 Digeruntur per quadriduum; postea defunditur vinum.
-

VINUM GENTIANÆ COMPOSITUM.

Vinum Gentianæ.

- Rec. *Piperis albi* drachmam dimidiam, . . p. 1.
Flavedinis Aurantii drachmas sex, . . p. 12.
Gentianæ rubræ radiceis unciam . . . p. 16.
 Ex contusis et concisis fit vinum, digerendo cum
Vini de Malaga unciis decem . . . p. 160.
 et *Spiritus Vini gallici* unciis duabus . . p. 32.
-

VINUM IPECACUANHÆ.

- Rec. *Ipecacuanhæ radiceis* contusæ unciam unam et semis, p. 1.
Vini de Malaga libram p. 8.
 Fit vinum.
-

VINUM LIQUIRITIÆ THEBAICUM.

Vinum Glycyrrhizæ thebaicum.

Elixir Papaveris.

- Rec. *Opii levantici* pulverati,
Croci orientalis,
Extracti Liquiritiæ, singulorum drachmas duas, p. 1.

Vini de Malaga libram p. 48.
Per quadrivium digesta colantur.

VINUM OPII. ♂

Rec. *Opii depurati* unciam, p. 1.
Vini gallici albi uncias sex p. 6.
Macerantur per quadrivium; dein colatur
vinum.

VINUM OPII CROCATUM. ♂

Laudanum liquidum Sydenhami.
Rec. *Cinnamomi ceylanici corticis*,
Caryophyllorum, singulorum contusorum
drachmam, p. 1.
Croci orientalis unciam, p. 8.
Opii levantici pulverati uncias duas, p. 16.
Vini de Malaga libram p. 96.
Digestione per quadrivium factâ, fit, hume-
ctando residuum cum Vino et exprimendo, cola-
tura libræ unius p. 96.

VINUM RHEI AMARUM.

Elixir Rhei amarum.

Rec. *Canellæ albæ corticis* drachmam, . . p. 1.
Gentianæ rubræ radicis drachmas duas, p. 2.
Rhei indici radicis unciam p. 8.
Contusa et incisa per quadrivium digeruntur
cum
Vini de Malaga unciis decem, . . . p. 80.
Spiritus Vini gallici unciis duabus, . . p. 16.
et dein colatur vinum.

VINUM RHEI AROMATICUM.

Elixir Rhei compositum.

- Rec. *Cardamomi minoris seminum* contusorum
 unciam dimidiam, p. 8.
Rhei indici radiceis incisæ unciam unam et
 semis, p. 24.
Passularum majorum, acinis exemptis, un-
 cias tres, p. 48.
Spiritus Vini gallici uncias tres, . . . p. 48.
Vini de Malaga uncias quindecim p. 240.
 Post digestionem per quatrimum fit colatura,
 cui adduntur
Macidis pulveratæ drachma dimidia, p. 1.
Bicarbonatis kalici drachma, p. 2.
Extracti Enulæ uncia dimidia, . . . p. 8.
Sacchari albi uncia quatuor p. 64.
-

VINUM RHEI DULCE.

Elixir Rhei dulce.

- Rec. *Cardamomi minoris seminum* contusorum
 drachmas duas, p. 1.
Rhei indici radiceis incisæ uncias duas, p. 8.
Vini de Malaga uncias decem, . . . p. 40.
Spiritus Vini gallici uncias duas . . p. 8.
 Fit vinum.
-

VINUM SCILLITICUM.

Vinum Scillæ.

- Rec. *Zingiberis radiceis* contusæ drachmam di-
 midiam, p. 1.
Scillæ radiceis, siccatae et concisæ, unciam
 dimidiam, p. 8.
-

Vini gallici albi libram p. 192.
Fit vinum.

VINUM SENNÆ COMPOSITUM.

Vinum Sennæ. Elixir Sennæ.

Rec. *Coriandri seminum*,
Foeniculi seminum, singulorum contusorum
drachmas duas, p. 1.
Sennæ alexandrinæ comminutæ uncias quat-
tuor, p. 16.
Vini de Malaga libras duas cum dimi-
dia p. 120.
Digeruntur per triduum; tum adduntur
Passularum majorum, acinis exemptis, un-
ciæ tres p. 12.
Digeruntur iterum per diem et exprimendo
colantur.

VINUM STIBIATUM.

§

loco Vini antimoniati.

Rec. *Tartratis stibico-kalici* grana duodecim, p. 1.
Vini de Malaga tepefacti uncias sex p. 240.
Fit solutio.

UNGUENTA.

Parantur unguenta vario modo, ut exhi-
beat formula uniuscujusque; ubi tamen semper
cavendum, ne calor inter liquefaciendum +100°
C. unquam superet.

Servantur in vasis porcellaneis vel figulinis
vitreatis, loco non admodum calido.

UNGUENTUM CALAMINÆ COMPOSITUM.

Unguentum exsiccans Aerelii.

Rec. *Solutionis Camphoræ oleosæ* unciam unam
et semis, p. 3.

Sacchari Saturni pulverati,

Minii, singulorum uncias tres, . . . p. 6.

Cerussæ albæ pulveratæ,

Lithargyrii præparati,

Calaminæ præparatæ, singulorum uncias
sex, p. 12.

Olei Lini uncias sex et semis, . . . p. 13.

Sevi hircini curati libram p. 24.

Calamina et Plumbi præparata, inter se bene mixta, cum Sevo, supra ignem liquefacto, et Oleo intime commiscentur; paullum refrigeratis Solutio Camphoræ oleosa addenda est.

UNGUENTUM CANTHARIDUM.

Unguentum Cantharidis colatum Ph.
Succ. Ed. V.

Rec. *Cantharidum* pulveratarum uncias tres, p. 1.

Unguenti Terebinthinæ resinosi libram p. 4.

Digeruntur in vase clauso per triduum eo caloris gradu, ut unguentum semper liquatum sit; deinde per linteum colantur.

UNGUENTUM CEPÆ.

Linimentum Cepæ vel Unguentum
suppurans.

Rec. *Resinæ flavæ*,

Ceræ flavæ, singulorum uncias sex; p. 1.
liquefactis adjiciuntur

Saponis

- Saponis viridis unciae sex p. 1.
 Cepæ bulbi, sub cineribus assati, decorticati
 et contusi,
 Mellis depurati, singulorum libræ duæ cum
 dimidia p. 5.
 Mixta in balneo aquæ coquentis detinentur,
 donec humor consumptus sit; tum subiguntur
 bacillo ligneo, ut omnium unitas fiat.
-

UNGUENTUM CERUSSÆ.

Unguentum e Cerussa Ph. Milit.

- Rec. Cerussæ albæ, in pulverem tenerrimum tri-
 tæ, uncias octo, p. 2.
 Axungię curatæ libram p. 3.
 Miscentur triturando.
-

UNGUENTUM HELLEBORI ALBI.

- Rec. Hellebori albi radicis pulveratæ unciam, p. 1.
 Axungię curatæ uncias quattuor, . . p. 4.
 Olei de Cedro guttas decem.
 Miscentur triturando.
-

UNGUENTUM HYDRARGYRI.

- Rec. Sevi hircini curati,
 Axungię curatæ, singulorum uncias sex, p. 1.
 Hydrargyri destillati libram p. 2.
 Hydrargyrum cum Sevo et Axungia, quæ,
 ubi supra ignem liquata jam spissescunt, sen-
 sim admiscenda sunt, in mortario lapideo pa-
 ullum calefacto, diligentissime subigitur, donec
 oculo armato non cernatur.
-

UNGUENTUM LAURI TEREBINTHINATUM.

Unguentum nervinum vel Lauri compositum.

- Rec. *Olei Succini empyreumatici rectificati* unciam dimidiam, p. 1.
Olei Terebinthinæ unciam, p. 2.
Sevi ovilli curati uncias octo, p. 16.
Olei Lauri libram p. 24.

Sevo, liquefacto et ab igne remoto, adjiciuntur cetera, quo facto mixta subiguntur, ut in unum coëant.

UNGUENTUM MEZEREI.

Pomatum epispasticum.

- Rec. *Ceræ flavæ* unciam dimidiam, p. 8.
Axungię curatæ uncias quattuor et semis, p. 72.

Liquefactis et mixtis adjicitur

- Extracti Mezerei* drachma dimidia, p. 1.
in *Spiritus concentrati* uncia dimidia soluta p. 8.

In balneo vaporis detinentur, donec Spiritus avolaverit; tum colatur unguentum et servatur.

UNGUENTUM NITRATIS HYDRARGYRICI.

Unguentum Hydrargyri compositum vel citrinum.

- Rec. *Hydrargyri destillati* unciam, p. 1.
Acidi nitrico-nitrosi uncias duas p. 2.
Digeruntur in balneo arenæ ad solutionem, quæ, etiamnunc calidissima, bene miscetur cum *Axungię curatæ*, liquefactæ et in densitatem denuo coëuntis, libra, . . . p. 12.

ut fiat unguentum, quod in capsulas transfunditur.

UNGUENTUM OXIDI HYDRARGYRICI.

Rec. *Butyri recentis*, non saliti, unciam . p. 8.

Huic, leni igne liquefacto, additur

Oxidi hydrargyrici præcipitati drachma p. 1.

In mortario vitreo exactissime commiscentur, donec refrixerint.

Non, nisi requisitum, paratur nec datur, nisi in vase opaco.

UNGUENTUM PICIS LIQUIDÆ.

Rec. *Secalis farinæ* uncias duas; p. 2.
coquitur cum

Aceti communis unciis quattuor, . . . p. 4.

ut fiat puls, cui additur

Resinæ flavæ,

Picis liquidæ, singulorum uncia . . . p. 1.

In balneo vaporis coquuntur, miscendo et agitando cum spathula, usque ad justam spissitudinem.

UNGUENTUM ROSACEUM.

Rec. *Axungie curatæ* unciam, p. 8.

Continue instillando

Aquæ Rosæ drachmam, p. 1.

subigitur pistillo ligneo, donec Axungia niveam habeat albedinem.

UNGUENTUM SUBACETATIS PLUMBICI.

Unguentum Saturni.

Rec. *Ceræ albæ* uncias quattuor p. 4.

Liquefactis adduntur

Solutionis Subacetatis plumbici unciaë quattuor, p. 4.

Olei Olivarum communis unciaë novem p. 9.

Ab igne remota subiguntur bacillo ligneo, donec omnium unitas fiat.

UNGUENTUM TEREBINTHINÆ RESINOSUM.

Unguentum basilicum.

Rec. *Resinæ flavæ*,

Sevi ovilli curati,

Terebinthinæ communis,

Ceræ flavæ, singulorum uncias sex, . p. 1.

Olei Olivarum communis libras duas p. 4.

Simul liquata et mixta colantur.

TABULA,

exhibens proportionem medicaminum
efficaciorum in quibusdam Phar-
macis præparandis.

Acetum Scillæ;

ejus drachma continet quod solubile est e
Scillæ radice granis fere quinque.

Acidum hydrocyanicum dilutum;

ejus grana triginta octo continent
Acidi hydrocyanici anhydri granum,
vel grana tria grani fere duodecimam partem
(gr. $\frac{1}{12}$).

Ammoniacum causticum;

ejus uncia continet
Ammoniacy anhydri circiter drachmam.

Amygdalinum;

ex ejus granis septemdecim gignitur cum suf-
ficiente
Emulsionis amygdalinæ copia
Acidi hydrocyanici anhydri granum.

Aqua Amygdalarum amararum concentrata;

ejus uncia continet
Acidi hydrocyanici anhydri fere granum.

Aqua Supercarbonatis kalici;
 ejus uncia decem continent
Bicarbonatis kalici grana triginta et unum.

Aqua Supercarbonatis natrici;
 ejus uncia decem continent
Bicarbonatis natrici grana triginta et quattuor.

Cyanetum kalicum;
 ejus granum dimidium respondet
Acidi hydrocyanici anhydri grani quintæ parti
 (gr. $\frac{1}{5}$).

Electuarium Scordii;
 ejus scrupuli decem continent
Opii fere granum.

Electuarium Sennæ;
 ejus drachmæ duæ continent
Sennæ alexandrinæ fere scrupulum.

Emulsio Assæ foetidæ;
 ejus uncia dimidia continet
Assæ foetidæ grana fere quattuordecim.

Emulsio camphorata;
 ejus uncia continet
Camphoræ depuratæ fere granum.

Emulsio guajacina;
 ejus uncia dimidia continet
Guajaci resinæ grana decem.

Emulsio Gummi ammoniaci;
 ejus uncia dimidia continet
Gummi ammoniaci grana fere quattuordecim.

Emulsio hydrocyanica;
 ejus uncia continet
Acidi hydrocyanici anhydri grani fere tertiam
partem (gr. $\frac{1}{3}$).

Emulsio Myrrhæ ferrata;
 ejus uncia dimidia continet
Myrrhæ grana fere quattuor,
Sulphatis ferrosi, in Carbonatem transmutati,
granum ej ejus tertiam partem (gr. $1\frac{1}{3}$).

Extractum Colocynthis compositum;
 ejus grana septem continent
Extracti Colocynthis grani tres quartas partes,
Aloës lucidæ grana quattuor,
Scammonii aleppensis grana duo.

Hydrargyrum cum Creta;
 ejus grana quattuor continent
Hydrargyri granum et semis.

Julapium e Moscho;
 ejus uncia dimidia continet
Moschi fere granum.

Liquor ammoniaci anisatus;
 ejus drachma continet
Ammoniaci caustici grana undecim
vel Ammoniaci anhydri granum et ejus tres
octavas partes (gr. $1\frac{3}{8}$).

Mixtura arsenicalis Fowleri;
 ejus grana decem continent
Arsenici albi, cum Oxido kalico juncti, grani
 duodecimam partem (gr. $\frac{2}{12}$).

Mixtura mercurialis;
 ejus uncia dimidia continet
Chloreti hydrargyrici corrosivi grani quartam
 partem (gr. $\frac{3}{4}$).

Morsuli stibiati;
 eorum unus continet
Sulphureti stibici præparati grana quindecim.

Oxymel Scillæ;
 ejus drachma respondet
Scillæ radice grano fere et duobus ejus trien-
 tibus (gr. $1\frac{2}{3}$).

Pilulæ Aloës amaræ;
 earum quinque continent
Aloës lucidæ granum et semis.

Pilulæ Aloës crocatæ;
 earum quinque continent
Aloës lucidæ grana quattuor.

Pilulæ Chloreti hydrargyrici corrosivi;
 earum una continet
Chloreti hydrargyrici corrosivi grani octavam
 partem (gr. $\frac{1}{8}$).

Pilulæ Colocynthidis compositæ;
 earum quinque continent
Extracti Colocynthidis compositi grana quin-
 que et semis,
Chloreti hydrargyrosi grana circiter duo,
Extracti Jalappæ granum unum et semis.

Pilulæ foetidæ succinatæ;
 earum quinque continent
Assæ foetidæ grana fere quattuor,
Castorei grana fere quattuor,
Acidi succinici granum et ejus trientem (gr. $1\frac{1}{3}$).

Pilulæ Gummi ammoniaci thebaicæ;
 earum quinque continent
Opii granum.

Pilulæ Gummi Guttæ aloëticæ;
 earum quattuor continent
Aloës lucidæ grana quinque,
Gummi Guttæ grana duo.

Pilulæ Hydrargyri;
 earum duæ continent
Hydrargyri granum.

Pilulæ Myrrhæ ferratæ;
 earum quinque continent
Myrrhæ grana decem,
Sulphatis ferrosi, in *Carbonatem* transmutati,
 grana duo et semis.

Pilulæ Nicotianæ;
 earum sex continent
Extracti Nicotianæ grana duo.

Pilulæ Nitratis argenticæ;
 earum una continet
Nitratis argenticæ grani sextam partem (gr. $\frac{1}{6}$).

Pilulæ Styracis thebaicæ;
 earum tres continent
Opii granum.

Pilulæ Sulphatis cuprici ammoniacalis;
 earum una continet
Sulphatis cuprici ammoniacalis grani sextam
 partem (gr. $\frac{2}{6}$).

Pulvis Aluminis kinosatus;
 ejus scrupulus continet
Aluminis crudi grana decem.

Pulvis amarus ferratus;
 ejus drachma dimidia continet
Sulphatis ferrosi grana quinque.

Pulvis Chloreti hydrargyrosi thebaicus;
 ejus scrupulus dimidius continet
Chloreti hydrargyrosi granum,
Opii granum dimidium.

Pulvis gummosus stibiatus;
 ejus scrupulus continet
Kermetis granum dimidium.

Pulvis Jalappæ hydrargyratus;
 ejus scrupulus continet
Jalappæ radiceis grana quindecim,
Chloreti hydrargyrosi grana quinque.

Pulvis Jalappæ salinus;
 ejus scrupulus continet
Jalappæ radiceis grana fere quinque.

Pulvis Jalappæ tartaricus;
 ejus drachma dimidia continet
Jalappæ radiceis grana decem.

Pulvis Ipecacuanhæ thebaicus;
 ejus scrupulus dimidius continet
Ipecacuanhæ radiceis granum,
Opii granum.

Pulvis Nitri thebaicus;
 ejus drachma dimidia continet
Opii granum dimidium.

Pulvis Rhei salinus;
 ejus drachma dimidia continet
Rhei indici radiceis grana quindecim.

Pulvis Scillæ boraxatus;
 ejus drachma continet
Scillæ radiceis granum dimidium,
Boracis grana quinque.

Pulvis Scillæ compositus;
ejus scrupulus continet
Scillæ radicis grana duo.

Pulvis Sennæ compositus;
ejus scrupulus continet
Sennæ alexandrinæ grana fere sex,
Scammonii aleppensis grana fere tria.

Solutio Acidi phosphorici;
ejus scrupulus dimidius continet
Acidi phosphorici grana duo & semis.

Solutio Camphoræ spirituoso-ætherea;
ejus grana septem (guttæ 12—20 *) continent
Camphoræ depuratæ granum.

Solutio Carbonatis kalici;
ejus grana quindecim continent
Carbonatis kalici puri grana quinque.

Solutio Fuliginis foetida;
ejus drachma continet
Assæ foetidæ grana sex et duas tertias partes
(gr. $6\frac{2}{3}$).

Solutio

*) Numeros guttarum tales apposimus, quales variis experimentis invenimus, ut satis appareat, quam incertus hic quantitates liquidorum determinandi modus sit.

Solutio Gummi Guttæ alkalina;
 ejus grana octodecim (guttæ 18—20) continent
Gummi Guttæ grana duo.

Solutio Superjodeti kalici;
 ejus grana viginti quinque continent
Jodi grani tertiam partem (gr. $\frac{1}{3}$),
Jodeti kalici duos grani trientes (gr. $\frac{2}{3}$).

Syrupus Emetinæ;
 ejus drachma continet
Emetinæ grani octavam partem (gr. $\frac{1}{8}$).

Syrupus Hydrargyri,
 ejus scrupulus continet
Hydrargyri granum fere dimidium.

Syrupus thebaicus;
 ejus uncia continet
Tincturæ Opii grana quinque.

Theriaca;
 ejus scrupuli quinque continent
Opii granum.

Tinctura Aloës composita;
 ejus drachma dimidia (guttæ 80—110) continet
Aloës lucidæ grana fere duo.

Tinctura Aloës crocata;
 ejus drachma dimidia (guttæ 80—110) continet
Aloës lucidæ granum fere unum et ejus qua-
 drantem (gr. $1\frac{1}{4}$).

Tinctura Assæ foetidæ;
 ejus drachma dimidia continet
 Extractum spirituosum ex *Assæ foetidæ* granis
 quinque et semis.

Tinctura Cantharidum;
 ejus grana quinque (guttæ 10—15) respondent
Cantharidum grani decimæ sextæ parti (gr. $\frac{1}{16}$).

Tinctura Castorei;
 ejus drachma dimidia continet
Castorei grana fere quinque.

Tinctura Castorei thebaïca;
 ejus drachma dimidia (guttæ 50—60) continet
Opii fere granum dimidium.

Tinctura Colocynthis composita;
 ejus scrupulus dimidius (guttæ 20—25) respon-
 det
Colocynthis pulpæ grani duabus tertiis par-
 tibus (gr. $\frac{2}{3}$).

Tinctura Digitalis;
 ejus grana quattuor (guttæ 8—12) continent
 Solubile e *Digitalis foliorum* grano dimidio.

Tinctura Guajaci ammoniata;
 ejus drachma (guttæ 80—100) continet
Guajaci resinæ grana fere novem.

Tinctura Guajaci foeniculata;
 ejus scrupulus (guttæ 40—50) continet
Guajaci resinæ grana octo.

Tinctura Hellebori nigri;
 ejus grana octo respondent
Hellebori nigri radicis grano.

Tinctura Hyoscyami;
 ejus grana octo (guttæ 16—24) respondent
Hyoscyami foliorum grano.

Tinctura Lupuli;
 ejus drachma dimidia (guttæ 50—80) continet
 Extractum spirituosum e *Lupuli strobilorum*
 granis fere quinque.

Tinctura Opii;
 ejus grana decem (guttæ 15—20) respondent
Opii fere grano.

Tinctura Opii camphorata;
 ejus scrupuli duo (guttæ 60—80) continent
Opii grani fere sextam partem (gr. $\frac{1}{6}$).

Tinctura scillitica;
 ejus scrupulus (guttæ 40—50) continet
 Solubile e *Scillæ radicis granis tribus.*

Tinctura Sennæ aromatica;
 ejus drachmæ duæ respondent
Sennæ alexandrinæ granis decem.

Tinctura Stramonii;
 ejus grana octo respondent
Stramonii seminum grano.

Tinctura Valerianæ;
 ejus scrupulus (guttæ 40—50) respondet
Valerianæ radices gravis duobus et dimidio.

Tinctura Valerianæ ammoniata;
 ejus drachma dimidia respondet
Valerianæ radices gravis fere quinque.

Trochisci Bicarbonatis natrici;
 eorum unus continet
Bicarbonatis natrici granum.

Trochisci Ipecacuanhæ;
 eorum unus continet
Ipecacuanhæ radices grani decimam partem
 (gr. $\frac{1}{10}$).

Trochisci Liquiritiæ thebaici;
 eorum unus continet
Opii grani sextam partem (gr. $\frac{1}{6}$).

Vinum Colchici;
 ejus scrupulus continet
 Extractum vinosum e *Colchici Seminum gra-*
 nis quattuor.

Vinum Ipecacuanhæ;
 ejus scrupuli duo respondent
Ipecacuanhæ radices granis quinque.

Vinum Liquiritiæ thebaicum;
 ejus grana quinquaginta (guttæ 40—60) continent
Opium fere granum.

Vinum Opium;
 ejus grana septem (guttæ 10—15) continent
Opium depuratum granum.

Vinum Opium crocatum;
 ejus grana sex (guttæ 8—10) continent
 Solubile ex *Opium* grano.

Vinum Rhei amarum;
 ejus drachmæ duæ respondent
 Extracto vinoso e *Rhei radice* granis decem.


Vinum Rhei aromaticum;
 ejus drachmæ duæ respondent
 Extracto vinoso e *Rhei radice* granis circiter
 decem.

Vinum Rhei dulce;
 ejus drachmæ duæ respondent
 Extracto vinoso e *Rhei radice* scrupulo.

Vinum scilliticum;
 ejus drachmæ duæ continent
 Solubile e *Scillæ radice* granis quinque.

Vinum Sennæ compositum;
 ejus drachmæ duæ continent
 Extractum vinosum e *Sennæ alexandrinæ* gra-
 nis sedecim.

Vinum stibiatum;
 ejus drachmæ duæ continent
Tartratis stibico-kalici granum dimidium.



NOMINA ANTIQUATA et SYNONYMA.

	Pag.
Acetum prophylacticum	43.
— saturninum	167.
— scilliticum	43.
Acidum borussicum	47.
— muriaticum	46.
— Nitri fumans	47.
— Nitri præcipitatum	48.
— Salis	46.
Adeps curata	66.
Ærugo crystallisata	41.
Æther martialis	163.
— martialis spirituosus	164.
— sulphuricus	50.
— vitriolatus	50.
Ætheroleum Terebinthinæ sulphuratum	67.
Æthiops martialis præcipitatus	133.
Alkali ammoniacum acetatum	161.
— ammoniacum succinatum	121.
— Tartari	70.
— vegetabile acetatum	41.
Ammoniacum succinatum	121.
Antimonium præparatum	181.
Aqua aërata	60.
— aërata alkalina	65.
— Anemones	64.
— carbonica	60.
— Cerasi	61.
— Lucie	121.

	Pag.
Aqua Naphæ	61.
— Saturni	65.
— Sodæ	65.
— Superoxidi muriatosi	62.
Arcanum duplicatum	176.
Balsamum e Benzoë	194.
— nervinum	200.
— traumaticum	194.
— Vitæ	200.
Butyrum Antimonii	77.
Calomel	77.
Calx Antimonii elota	182.
— oxymuriatica	111.
— salita	75.
Carbo ligneus præparatus	70.
— Lixivii Sanguinis	69.
Carbonas kalicum	68.
— natricum	68.
Causticum lunare	128.
— salinum	111.
Ceratum labiale	72.
Cerei medicati	73.
Coculeum berlinense	80.
Conserva Rosæ rubræ	79.
Crocus Martis aperitivus	173.
Cuprum aluminatum	118.
— ammoniacum	175.
Decoctum album	96.
— Lignorum	82.
Diascordium	86.

	Pag.
Electuarium lenitivum	87.
Elixir acidum Halleri	120.
— Aloës saponaceum	192.
— aloëticum	192.
— foetidum	194.
— Gambogiæ alkalinum	165.
— Papaveris	204.
— pargoricum	198.
— Rhei amarum	205.
— Rhei amarum spirituosum	199.
— Rhei compositum	206.
— Rhei dulce	206.
— Sennæ	207.
— viscerale vinosum Hoffmanni	87.
— Whyttii	195.
Emplastrum anglicanum	160.
— aromaticum	94.
— e Calaminari lapide	89.
— citrinum	91.
— commune	93.
— diapompholygos	94.
— foetidum	89.
— gummosum	91.
— Oxidi plumbici	93.
— saponaceo-plumbicum	92.
— saponatum	94.
— Saponis ammonici	159.
— vesicatorium	90.
— vesicatorium perpetuum Janini	90.
Emulsio communis	95.

	Pag.
Emulsio Gummi arabici	97.
Extractum Cicutæ interdum dictum	103.
— Filicis Maris æthereum	131.
— Opii gummosum	132.
— thebaicum	132.
Fel Tauri inspissatum	68.
Flores Benzoës	45.
— Sulphuris edulcorati	181.
Gelatina Fuci crispi	108.
Hepar Sulphuris	182.
Hydrargyrum stibiato-sulphuratum	56.
Hydrosulphuretum ammonicum	179.
— stibiosum	116.
— stibiosum c. Sulphure	178.
James Powder	139.
Infusum Kinkinæ	113.
— Picis liquidæ	64.
Lac ammoniacum	97.
— Sulphuris	180.
Lapis infernalis	128.
Laudanum liquidum Sydenhami	205.
Linctus Boratis natrici	118.
— Oxymuriatis calcici	119.
Linimentum Acetatis cuprici	137.
— aromaticum	67.
— Cepæ	208.
— saponato-camphoratum	133.
Liqueur de Labarraque	166.
Liquor anodynus mineralis Hoffmanni	53.
— Ferri aceticæ	167.

	Pag.
Liquor nervinus	162.
— Subcarbonatis ammonici	121.
— Succinatis ammonici	122.
— Tartratis ammonici	122.
Lixivium Saponariorum	165.
— Tartari	163.
Magisterium Bismuthi	174.
Mercurius corrosivus albus sublimatus	76.
— cosmeticus	123.
— dulcis	77.
— præcipitatus ruber	134.
— solubilis Moschati	135.
Mixtura Assæ foetidæ	95.
— diatrion	124.
— Gummi Guajaci	96.
— mineralis Fowleri	124.
— Moschi	116.
— Myrrhæ Griffithi	97.
— salina Ph. Paup.	161.
— salina Ph. Suec.	164.
— simplex	124.
Morsuli antimonialia	126.
— restaurantes Kunkelii	126.
Mucilago camphorata	96.
— oleosa	119.
Murias ammonico-ferricum	75.
— aurico-natricum	73.
— baryticum	74.
— calcicum	75.
— ferricum	76.

	Pag.
Murias hydrargyricum corrosivum	76.
— hydrargyrosus	77.
— stibiosus	77.
Nitrum depuratum	128.
Oleum Absinthii	54.
— animale Dippelii	130.
— Anisi	54.
— anthelminticum	130.
— camphoratum	162.
— Carvi	55.
— Caryophyllorum	55.
— Cornu Cervi terebinthinatum Ph. Veterin.	130.
— Foeniculi	55.
— Juniperi	55.
— Menthae piperitidis	55.
— Piperis jamaicensis	56.
— Sabinae	56.
— Tanacetii	56.
— Terebinthinae aethereum	56.
Oxidum stibiosum	135.
Oxymurias calcicum	111.
Pasta Glycyrrhizae	138.
Pilulae catharticae	142.
— e Cupro ammoniaco	144.
— foetidae	142.
— e Gentiana crocata	141.
— e Hydrargyro corrosivo albo	141.
— Muriatis hydrargyrici corrosivi	141.
— Rufi	141.
— saponaceae	144.

	Pag.
<i>Pilulæ e Styrae</i>	144.
<i>Pomatum epispasticum</i>	210.
<i>Potassa depurata</i>	70.
<i>Potio cretacea</i>	127.
<i>Pulvis ætiophorus</i>	155.
— <i>Ari compositus</i>	152.
— <i>cordialis</i>	85.
— <i>dentifricius</i>	158.
— <i>digestivus</i>	157.
— <i>Doweri</i>	155.
— <i>galactopocus Rosenii</i>	155.
— <i>Jacobi</i>	139.
— <i>Jalappæ compositus</i>	154.
— <i>Muriatis hydrargyrosi thebaicus</i>	153.
— <i>nitrosus Ph. Mil.</i>	156.
— <i>nitrosus Ph. Suec. Ed. IV</i>	156.
— <i>refrigerans Rosensteinii</i>	156.
— <i>sedativus</i>	156.
— <i>stypticus</i>	152.
— <i>thebaicus</i>	156.
<i>Roob Juniperi</i>	185.
— <i>Sambuci</i>	186.
<i>Saccharum Saturni purificatum</i>	42.
<i>Sal ammoniacum martiale</i>	75.
— <i>Martis</i>	176.
— <i>sedativum Hombergi</i>	45.
— <i>Seignetti</i>	189.
<i>Sapo medicatus</i>	159.
<i>Sinapismus acris</i>	71.
— <i>mitis</i>	71.

	Pag.
Soda phosphorata	139.
Solutio Arsenitis kalica	124.
— jodurata	168.
— Muriatis ferrici ætherea	163.
— Muriatis ferrici spiri <u>t</u> uosa	164.
— Muriatis ferrici spiri <u>t</u> uoso-ætherea	164.
— Muriatis hydrargyrici corrosivi	124.
— Oxymuriatis calcici	166.
— Subcarbonatis kalici puri	163.
Species ad Fomentum emolliens	169.
— ad Fomentum resolvens	169.
— ad Infusum pectorale	169.
— pro vaporibus Superoxydi muriatosi	169.
Spiritus aromaticus	172.
— concentratissimus	57.
— Juniperi	171.
— Lavendulæ compositus	197.
— Mindereri	161.
— Nitri dulcis	53.
— Salis ammoniaci Ph. Suec. Ed. I	163.
— Salis ammoniaci anisatus	120.
— Salis ammoniaci causticus	58.
— Vini camphoratus	162.
— Vini rectificatissimus	170.
— Vitrioli	50.
— volatilis aromaticus	120.
— vulnerarius	172.
Spongia usta	69.
Subcarbonas ammonicum empyreumaticum	159.
— kalicum depuratum	70.

	Pag.
Subcarbonas kalicum purum	70.
Submarias ammonico-hydrargyricum	123.
Subsulphas ammonico-cupricum	175.
Succus Armoraciæ cum Spiritu	174.
Sulphur auratum Antimonii	178.
Sulphuretum Ferri	181.
— Hydrargyri nigrum	57.
— kalicum	182.
Superstibiis kalica	182.
Syrupus Aurantii corticis	184.
— Cerasi nigri	184.
— Scillæ	187.
— vitriolatus	183.
Tabulæ d'Arcet	201.
— de Vichy	201.
Taffetas vesicatorium	160.
Tartarus antimonialis	189.
— emeticus	189.
— martialis	109.
— tartarisatus	188.
— vitriolatus	176.
Tartras kalico-ferricum	109.
Terra foliata Tartari	41.
— ponderosa salita	74.
Tinctura amara	192.
— aromatica vitriolata	193.
— balsamica	200.
— Colocyntbidis	195.
— foetida	165.
— Fuliginis	164.

	Pag.
Tinctura Guajaci	196.
— hypnotica	198.
— Laccæ composita	197.
— Martis	164.
— Martis Klaprothi	167.
— Scillæ	199.
— sedativa	198.
— thebaica	198.
— tolutana	200.
Trochisci Glycyrrhizæ	202.
— Glycyrrhizæ thebaici	202.
Vinum antimoniatum	207.
— chalybeatum	204.
— Gentianæ	204.
— Glycyrrhizæ thebaicum	204.
— Scillæ	206.
— Sennæ	207.
Vitriolum album purificatum	178.
— Martis	176.
Unguentum basilicum	212.
— Cantharidis colatum	208.
— e Cerussa	209.
— citrinum	210.
— exsiccans Acrelii	208.
— Hydrargyri compositum	210.
— Lauri compositum	210.
— nervinum	210.
— Saturni	212.
— suppurans	208.

