

SERIES SECUNDÆ
 Lapidés Emmorphi ex Vegetabilium
 marinorum transmutatione
 CORALLIA, ET ALCYONIA
 Promiscuè
 à Fodinis calcariis, et Latomiis
 Julio - Montenibus.

N *ec* obscurus fierem Lithosophis, si novis
 nominib^{us} appellarem ea, quæ ē sinu
 Patriæ nostræ in lucem veniunt, Corallia; usus sum
 manuductoribus Cl. Carolo Linnæo, et Cl. Magno
 Bromellio, ex hujus Lithographiâ suecanâ, quæ Hol-
 miæ et Lipsiæ 1740 prodiit; ex illius verò amœ-
 nitatibus academicis, ibidem 1749 editis vocabula ci-
 vitate jam tum apud Historiæ naturalis Scriptores do-
 nata excerpens. Evidem nostro s^eculo indefessis suis,
 ut Linnæi Encomiis utar, observationibus Corallio-
 rum doctrinam illustrarunt alibi post Comitem Marfi-
 lium Tounefortius, Iussiæus, aliquie, quorum lau-

dibus addere malim, quam detrahere; Cùm verò nostra Iulio-Montensia in hunc diem ferè delituerint; hinc operæ præmium fore putavi, quod sanè non injundum fore suspicor Popularibus meis Lithophilis, si corundem species, ac miram varietatem accuratiù ad authopsiam depingendo singula, quæcunque per utrinque Ducatum ipsem laboriosè conquisiui, oculos ponerem. Sunt porrò sequentia.

N. 1. *Millepora* fili crassioris instar arctè adhærens Lapii calcario punctis minimis leviter excavatis distincto, ramis tereribus, dichotomis, è superficie variè et reticulatim coeuntibus. inveni prope Bensbergam.

Vid. Linnæi amœnit. acad. Tab. 4. Fig. 26

N. 2. *Matrepora* composita è stellis convexis, centro concavis, extremis partibus margine non nihil elevato, striisque utrinque dentatis, concurrentibus, et ultra lapidis planitiem paululum prominentibus, fortè sub dio erosis.

ibidem Fig. 9.

N. 3.

N. 3. *Alcyonium undosum*, poris contiguis in longum porrectis, nunc striarum, nunc punctulorum series in circulos coeuntes exhibens, fungite è centro prominente prope Bensberg-Conferatur cum Fig. 13. Cap. 8. *Bromell. Lith-Suec.*

N. 4. *Alcyonium sulcatum*, *Milleporam ramosam* punctatam supernè referens, fungite simplici, striato, supernè obtuso incurvè lateri adhærefcente. prope Bensberg.

N. 5. *Millepora subrotunda* è tubulis congestis conflata, sive corallium constructum è fistulis pluribus æqualibus, coherentibus, apice earundem paululum incavato, cæterùm massâ nigricante tubulos infarciente, prope Paffrath.

Vid. Linn. Tab. 4. Fig. 17.

N. 6. *Alcyonium rugosum* fibrillis flexuosis, striis et punctulis variis oberrantibus. è viciniâ Bensbergensi.

N. 7. *Millepora dichotoma*, constans ramulis filiformibus, divaricatis in lapidis superficie, cui

C 5.

inhæ.

inhærent, retis instar expansis, apicibus pertusis.
Chama, an pectunculus leniter striatus, zonâ
 nigrâ transversim cinctus medio lapidi immer-
 sus est. prope *Bensberg*.

Confer. cum N. 1.

N. 8. *Alcyonium* fluctuans, in superficie fungitem
 striatam, supernè stellam è centro concavo re-
 ferentem radiis elevatis, et milleporæ simplicis
 ramulum punctatum exhibens. *ibidem*.

N. 9. *Alcyonium* milleporeticum lineatum poris in-
 fernè per series digestis, fungite simplici utrin-
 que immerso, et suis gyris circumscripto, po-
 ris superiùs velut *Eschara* undique obductum.
ibidem.

N. 10. *Alcyonium* hinc milleporam ramosam et fun-
 gitas simplices ex incumbentibus sibi pororum
 seriebus; inde cavitatem striis oblongis à cæte-
 ro corpore distinctam exhibens. *ibid.*

N. 11. *Alcyonium* rugosum per series striatum, Mil-
 leporam ramosam punctatam è superficie con-
 cavâ expansam exhibens.

Confe-

Conferatur cum Linn. Tab. 4. Fig. 15.

et ejusdem descriptione in Amœnit. academ.

Pag. 98. et 99. è Viciniâ Bensbergensi.

N. 12. *Alcyonium undosum fimbriatum majoris moduli fasciis crebris distinctum, striis exaratum, seriebus punctatis intortis, et in gyros abeuntibus; ex alterâ parte Milleporâ reticulari dichotomâ obsoletè obductum.* *ibidem.*

N. 13. *Alcyonium flexuosum, Milleporæ ramis punctatis sparsim immersis, marginibus ejusdem lapidis veluti limbo septis.* *ibidem.*

N. 14. *Alcyonium sinuosum immersis fungitibus simplicibus supernè obtusis, stellam referentibus ornatum.* *ibidem.*

N. 15. *Fungites formæ obliquæ, et incurvè oblongæ, versus basin angustioris, supernè crassioris, margine cavitatis supremæ paululum contracto, striatus, incumbens Alcyonio rugoso, obsoletè poroso.* *ibidem.*

N. 16. *Alcyonium subrotundum milleporeticum* supernè *Millepora dichotomā*, repente, terete, poris axillaribus, infernè immerso fungite simplici in longum striato donatum, eidem lapidi basis, aut pediculi loco serviente. *ibidem.*

N. 17. Specimen hoc parùm differt à priori jam descripto, fungite duntaxat simplici inferiùs planè immerso, ac vix prominente. *ibidem.*

N. 18. *Alcyonium rugosum*, striis, porisque variis cum adnatis fungitibus simplicibus et Terebratula lævi lacunosa, rostro prominulo, lapidi immersa, ex alterâ parte *Millepora dichotomā* superficiem oberrante. *ibidem.*

N. 19. *Madrepora composita*, supernè stellas contiguas penta - vel hexagonas radiis è centro concavo prodeuntibus, infernè *Milleporam dichotomam* obsoletè referens. *ibidem.*

N. 20. *Madrepora composita*, ex utraque lapidis facie stellas centro concavas radiis eminentioribus confusè exhibens. *ibidem.*

N. 21.

N. 21. *Millepora reticulata* ramis divaricatis nunc angustioribus, nunc latioribus spatiis hinc inde expansis, *Alcyonio punctato* inhærescens.

ibidem. Conf. cum N. I.

N. 22. *Madrepora composita*, superiùs stellas contiguas, convexas, fundo paululum concavo, radiis, et steliarum marginibus non nihil prominulis; inferiùs fungites depresso, proliferos è basi versus marginem lapidis protuberantes exhibens. *ibidem.*

N. 23. *Madrepora aggregata* in *Calcario* stellis plurimque hexagonis, et inæqualibus, convexis, è tubulis parallelis undique connatis supernè prominentibus. *Prope Paffrath.*

N. 24. *Millepora composita* ramosa, muricata, fasciatim conjuncta, uno alteròve *Trochite* hinc inde adnato. *effossa haud procul Lirbach.*

N. 25. *Millepora tubularis* in *Calcario* coloris flavescentis, ex quo vegetatio corallina è fistulosis ex crescentiis, iisque sursum, ramulorum instar prominentibus apertissimè dignoscitur. *De scrip-*

scriptionem hanc ex Helv. Lith. 52. T. 5.

Fig. 7. apud Linnæum in Corall. Baltic.

mutuavi, cùm videretur accommodatissima. exhibet præterea *Milleporam* imbricatam, ramosam, hinc inde *Alcyonio* immersam,
prope Glabeck.

N. 27. *Madrepora aggregata*, stellas profundè concavas, sub dio erosas, è cellulis penta, aut hexagonis, quasi totidem intersepimentis, exprimens. prope Paffrath.

Vid. Linn. Amæn. acad. Tab. 4. Fig. 16.

N. 28. *Fungitarum depresso-rum coagulum in Calcario coloris fusco-cinerei* prope Aronsberg haud procul Hütgen ad marginem Rivuli ibidem interfluentis inventum.

Vid. ibid. Fig. 14.

N. 29. *Alcyonium milleporeticum reticulatum*, sive *Millepora teres*, repens, punctis axillaribus &c.
Conferendum cum N. 21. prope Bensberg.

N. 30. *Alcyonium Milleporam punctatam*, ramosam, fungitem simplicem, *Trigonellas*, et chama-

mularum typos exhibens.

& Viciniâ Bensberg.

N. 31. *Madrepora Composita* stellis inæqualibus, disjunctis, è centro erosis aliis, aliis farctis, marginibus elevatis, striatis ex adversâ parte politis.
prope Paffrath,

N. 32. *Millepora subrotunda composita* è tubulis cylindraceis, transversim striatis è basi peripheriam versus excurrentibus, supernè obtusis, in calcario lapide

Specimen hoc rarius deprehendi prope Nothberg
haut procul Eschweiler.

N. 33. *Millepora congesta* è fistulis minimis densè cohærentibus in lapide calcario sub dio eroſo, coloris flaveſcentis.

& Viciniâ Paffrath.

N. 34. *Coralliorum insigne specimen* : construitur tubulis cylindraceo-flexuosis congestis plurimis, in solido lapide exortis, in apice paululum, non toto corpore perforatis. prope Bleck haut procul Paffrath in Patr. Mont.

N. 35. *Madrepora composita* è stellis farctis distan-
tibus diversæ magnitudinis, centro incavato, ra-
dijs albicantibus in Calcario. conferend. cum

N. 31 prope Paffratb.

N. 36. *Millepora ramosa* muricata cum adnat is tere-
bratulis minoribus striatis, imbricatis.
è Viciniâ Bensbergensi.

N. 37. *Madrepora subrotunda*, oblonga, tuberifor-
mis, poris minimis, quasi aciculâ factis, con-
fertissimis, majorib[us]que crenatis, concavis, in-
vicem disiunctis notata. Erui prope Paffratb.

N. 38. *Madrepora simplex*, sive fungites striatus,
radiis supernè in stellam coeuntibus in Calcario
ex agro Paffradiensi prope Blech.

N. 39. *Millepora ramis vagis*, punctis sparsis, ra-
mulis genicularis, sine ordine dispersis, immixtis
fungitibus oblongè striatis. prope Paffratb.

N. 40 *Tubularia purpurea*, sive *Tubipora Musica*
Linnæi, Tubulis æqualibus cylindraceis, confertis,
Substantiæ arenosæ, colore subflavescente.

depre-

deprehendi hoc specimen prope *Nothberg* in
Patr. Julia.

N. 41. *Madrepora* in lapide spataceo-arenoso colo-
 ris ferruginei, stellis è fundo excavato superne et
 inferne conspicuis, è latere dissecto fibrillis, seu ra-
 diolorum seriebus coloris partim cinerei, par-
 tim flavescentis in longum vagè expansis.
 inveni prope *Sacell. S. Agathæ* haud procul
Wipperfürth.

N. 42 *Fungites* sive *Madrepora simplex* turbinata,
 in longum striata, superius incurvata, ac stellam
 concavam radiis lamellatis exhibens. è *Viciniâ*
Bensbergenfi.

N. 43. *Fungites*, vel *Madrepora simplex* Cyathi-
 formis, stella profundiore, cortice obsoletè in
 longum striato, colore flavescente.
 è *Viciniâ Bensberg.*

N. 44. *Columelli* lapidci simplices *Luidii*, sive fu-
 gitæ cylindracei, fasciis transversis, vel superne,
 vel inferne stellatis. *ibidem.*

- N. 45. *Madrepora ramosa*, stellata cum *Millepora dichotoma*. prope *Paffrath.*
- N. 46. *Alcyonium lamellatum*, ac bracteatum, squilla vulgo marina petrificata. prope *Fuersheim in Eifflid.*
- N. 47. *Alcyonium lamellatum* in Calcario. prope *Paffrath.*
- N. 48. *Alcyonium bracteatum*, lamellis sibi invicem incumbentibus irregularibus. prope *Eschweiler in Eifflid.*
- N. 49. *Alcyonium vermiculatum*, rugosum, sulcatum, striis transversis per calicem oberrantibus erutum prope *Paffrath.*
- N. 50. *Alcyonium lamellis invicem sibi incumbentibus irregularibus* in lapide calcario prope arcam nobilis et gen. D. D. L. B. ab Eis de Beusdahl. in *Zweibruggeu.*
- N. 51. *Madrepora substantiae Calcariae* stellis contiguis centro concavo. prope *Keldenich in Eifflid.*

- N. 52. *Madrepora* composita è stellis farctis, contiguis, basi concavâ. ex *Eifflia* prope *Sötenich*.
- N. 53. *Fungitæ* aggregati oblongi, radiis superne è basi prominulis centro excavato in Calcario. reperi perelegans hoc specimen prope *Dahlbenden* in *Eifflia*.
- N. 54. *Fungitæ* figuræ oblongæ *Raphani* majoris, nobis meer rettig formam æmulantes. ex agro prope *Keldenich*.
- N. 55. *Fungitæ* crassiores in apicem subito desinentes. *ibidem*.
- N. 56. *Fungitæ* rostriformes. *ibidem*.
- N. 57. *Millepora* ramosa muricata in Minerâ Martis. reperi prope *Keldenich*.
- N. 58. *Hipuritæ* et varii tubuli corallini in lapide Martiali, chainularum typis hinc inde conspicuis. è fodinis ferri *ibidem*.
- N. 59. *Fungites* porosus ramulis truncatis cum Cochleæ terrestris typo. ex agro prope *Dottern* versus *Keldenich* in *Eifflia*.

N. 60. *Millepora* ex agro prope *Keldenich* confatur cum N. 5.

N. 61. *Hipurites* Corallio Milleporeticco connexus, è *Conenberg* prope *Sötenich* in *Eiffid*.

N. 62. *Alcyonium Madreporeticum* 80 libratum pondere. deprehendi prope *Keldenich* ad petrum nuper effossum.

N. 63. *Alcyonium* fossile stigmatibus velut acu facitis punctulatum. vide Spec. Lith. Helv. Pag. 17. Fig. 21. reperi prope *Heistert* in *Eiffid*.

N. 64. *Millepora* composita punctata ramis confusè dispositis, Entrochis columnariibus hinc inde adhaerentibus. erui prope *Dablbenden* in *Eiffid*.

N. 65. *Sycoides*, Scheuchzero *Ficoides*, Wagnero apud Scheuchz in Specim: Lithograph. Helvet. Pag. 17. *Caricoides* dictus. deprehendi prope *Weier* in *Eiffid*.

Cæterum Emmorphum hunc lapidem cum Bajero Censoribus relinquo, futurum perinde, num ad fungitas, an ad alcyonia referatur.

- N. 66. *Madrepora simplex*, ē *Ludenberg prope Gerresheimum in Satrap.* Mettman.
- N. 67. *Globi Milleporetici* ex agris prope *Keldenich*, et *Döttelen in Eifflia*.
- N. 68. *Globuli Milleporetici*, ex *Tondorff in Eifflia*
- N. 69. *Millepora ramosa* confusè adnata lapidi calcario, ramulis variè mixtis, adhærescente eidem lapidi Entrocho septem articulorum. deprehendi prope *Nidecam Marcodurum* versus.
- N. 70. *Millepora ramosa Dichotoma* in *Calcario ex Eifflia* prope *Zinsheim*.
- N. 71. *Ceratites restus substantiæ calcariæ*. ex agris prope *Keldenich* *Vid. onomat. Hist. natur. Tom. 2. Pag. 766.*
- N. 72. *Ceratites incurvatus* ejusdem cum priori substantiæ. *ibidem. Vide onomatolog. Hist. natur. Tom. 2. Pag. 767.*
- N. 73. *Ceratitæ plures* sive resti, sive inflexi ē *Könenberg prope Sittenich in Eifflia* *Vid. Wallerii Mineralog. Berolini Edit. 1750. Pag. 443*

- N. 74. *Calices corallini*, sive fragmenta *Hipuritorum* crateriformia. *ibid.*
- N. 75. Fragmenta *Hipuritorum* corallinorum, quæ cornua recta minora referunt. *ibidem.*
- N. 76. *Hippurites* corallinus corporibus proliferis è disco pluribus. *ibid.* *Vid. Waller. loco cit.*
- N. 77. *Kymatites*, sive corallium figurâ fungiformi, gyris sinuosis lamellatis, aquarum undulationem simulantibus ornatum. deprehendi prope *Weier in Eifflâ.* *Vide Wallerii Mineral. Spec. 332. N. 6. Pag. 441.*
- N. 78. Corallium Figurâ conicâ articulatim coniunctum, superficie striatâ. è *Viciniâ Steinfeld in Eifflâ.* *Vide Waller. Spec. 333. Pag. 442. N. 7. ibidem.*
- N. 79. *Hipurites* sive corallium Figurâ cylindri flexuosi, superficie lævi, fasciis transversis. *ibid. Vide Waller. ibid. Pag. 443.*
- N. 80. *Hipurites* seu corallium figurâ cylindricâ inflexâ, superficie in longum striatâ. prope *Kel-*

Kellenig ad Sylvulam vulgo Boblenich.

Vid. Waller. ibi.l.

N. 81. *Hipurites*, radici Bryoniæ simile corallium ex Eifflia prope Zinsheim. *Vide Waller. ibid.*

Pag. 444. N. II.

N. 82. *Hipurites* oblongus, Rapheno majori, vulgo marino similior ex Eifflia prope Kellenig ad Ferrifodinas.

N. 83. *Fungitæ corallini*, formâ Agarici, è Viciniâ Bensbergensi. *Vide Waller. Pag. 447. N. 2. Spec. 335.*

N. 84. *Fungites* pezitiformis (an *Coralloides* undulatus Wallerii ?) *ibidem. Vide Waller loc. cit. N. 3.*

N. 85. *Fungites* formam Boleti referens. ex agris prope Dottelen in Eifflia. *Vide ibidem Waller. N. 5.*

N. 86. *Alcyonium* sive *Millepora* foliacea, Lamelata, et sulcata, colore flavescente: Insigne hoc specimen deprehendi in ferri fodinâ ad stratum

lapidi martiali impositum prope *Keldenig in Eif-
fia*.

N. 87. *Madrepora* composita in lapide martiali stel-
lis pyramidatè coavexis, extorsum declivibus,
inæqualibus. reperi *ibidem ad ferrifodinas.*

N. 88. *Millepora* in lapide minera Martis impræg-
nato, in quo fracto corallio sepimenta transve-
sa interrupta, perpendicularia verò integra appa-
rent. *ibid.* *Vid. Carol. Linnæi Anaxnat. aca-
dem. Pag. 102. Dissert. 4. N. 15.*

N. 89. *Millepora* dichotoma poris cylindraceis, ele-
vatis, singulis ramis poro recto insidente: ad-
hærescit hoc corallium alteri Madreporæ ramo-
tæ stellis concavis.

Eius hoc specimen prope *Paffrath in Patr. Mon-
tensi.*

N. 90. *Fragmenta Hipuritorum*, figuræ columnari-
tive *Corallium fasciatum*, conflatum è columel-
lis in longum striatis in lapide calcario. depre-
hendi prope *Steinfeld versus Keldenig.*

Vide Mineral. Wallerii Pag. 444. N. 10.

N. 91

N. 91. *Millepora subramosa*; poris ferè contiguis subrotundis, Entrochis hinc inde immixtis in lapide calcario coloris rubelli.

reperi prope *Dahlbenlen in Eiffliā*, versus abbat. *Steinfeld.*

N. 92. *Alcyonium*, corpore integro, poris contiguis, angulatis, ac farctis. ex agris prope *Sötenich in Eiffliā*.

N. 93. *Alcyonium*, sive *Millepora*, poris passim hexagonalibus farctis, non nihil erosis. *ibidem* versus *Könenberg.*

N. 94. *Madrepora composita*, stellis concavis, margine plano, radiis centrum cavum occupantibus, ac prominulis. reperi prope *Kall in Eiffliā*.

N. 95. *Millepora* ramis vagis, poris variis nunc sparsis, nunc contiguis, fundo acutiore, diversis testaceorum quisquiliis immixtis. reperi prope *Heistert in Eiffliā*.

N. 96. *Tubularia purpurea*, composita ex minutis tubulis, ordine invicem dispositis, aliis Ochra

farctis aliis concavis, transversis quibusdam crutis conjunctis, æquali ferè intervallo distantibus. reperi prope Dottelen in Eifflid.

Vide Ferrandi Imperati Histor. natural. Lib. 27. Cap. 3. sub finem, et ejusdem Figur. Pag. 822.

N. 97. *Madrepora composita*, stellis aliis obsoletis, aliis concavis centro prominulo, sive Columelli cylindracei fasciatim collecti, in lapide calcario. parum abludit hoc specimen à superius descripto N. 90. inveni in Danzberg prope Keldenig in Eifflid.

N. 98. *Madrepora aggregata* stellis erosis, tubulis maximam partem coalitis, in longum striatis. reperi prope Keldenig in Füngsel.

N. 99. *Alcyonium*, Fungi terrestris figuram emulans. erui prope Paffrath in Patr. Mont.

N. 100. *Hiparites* tortuosè inflexus. prope Weier in Eifflid.

N. 101. *Alcyonium* superficie porosâ. reperi prope Dahlbenden in Eifflid.

N. 102.

N. 102. *Madrepora eomposita*, stellis admodum concavis, radiis prominulis, margine lœvi.

ex Eiffia prope Zinsheim.

N. 103. *Millepora ramosa*, poris contiguis. *Hipurite*, *Eschara*, *Entrochis*, *Terebratula lœvi*, *chamulisque* striatis adnatis. deprehendi hoc specimen in Viciniâ Bensbergensi ad fodinas calcarias, in Patr. Mont.

N. 104. *Madrepora insignis*, stellis farctis, pentavel hexagonis, marginibus paſſim crenatis. reperi in agro vulgo Jüngsel prope Keldenig in Eiffia.

N. 105. *Millepora foraminibus contiguis* pertusa, corallii ramulis dispersis, Entrochis varii moduli usquequaque adnatis. erui prope Kall in Eiffia.

N. 106. *Madrepora subrotunda* stellis erosis, radiis prominentibus supernè et infernè Corallium distinguentibus. reperi prope abbatiam Steinfeld in Eiffia.

N. 107. *Madrepora aggregata*, stellis sive pentas
sive hexagonalibus concavis, radiis prominulis
ex agro prope Keldenig.

N. 108. *Millepora* punctis ferè contiguis, ramis va-
gis, chasmatis striatis et trochiscis immixtis.
reperi ibidem. Confer. cum N. 103.

N. 109. *Millepora* dissecta, et utcunque polita, ur-
interiores cellulæ, ac tota lapidis substantia tu-
bulosa, ac cavernosa magis appareat. Segre-
gantur Tubuli interseptimentis albidis, infernè
farcti massâ nigricante, superiùs cinerei coloris.
reperi hoc specimen in *Heldenkoff* prope Kel-
denig. Conferatur cum Bromell. Lith. Sp. 2.
22, et Helw. Lith. angl. 49. T. 4. f. 6. et vid.
Linnæi Anianit. academ. dissert. 4. N. 14. et
15. Pag. 100. et 101.

N. 110. Huic Seriei modum finit lapis martialis,
cui *Hipurites* ejusdem substantiæ est immersus,
quem Lithosophus quilibet vel libero distingue-
re oculo. erutus è ferrifodinis prope Keldenig.

Non pauca id genus, quæ mihi supersunt, specimen
mina ex locis notatis, et adjacentibus collecta
cùm sint jam assignatis aut similiora, aut quām
proximè accedentia, hic consūkò prætermisi, ad
Lusus Naturæ progressum faciens.

