


SERIES SEXTA.

Lapides Emmorphi ex transmutatione
animalium testaceorum univalvium.

sive COCHLITÆ sive CONCHITÆ

ē patriā Iuliacensi et Montensi.



In hac, et binis sequentibus Seriebus secutus
sum mutos Magistros Ioan. Iac. Bajerum in
eiusdem rerum fossilium in Territorio Norimbergensi
ejusque Viciniā observarum succinctā descriptione,
1758. Norimbergae recusā.

Cui præmiseram relectionem speciminis Lithogra-
phie Joan. Jac. Scheuchzeri, quod Tiguri Typis
Gesneri 1702. prodiit, nec non ejusdem Histor. na-
tural. Helvetiae, quæ 1752 ibidem secundō, et emen-
dator Typis Heideggeri fuit edita. Junxi iisdem My-
lium, Volckmannum, et Langii bistor. Lap. figur.
Helv. — Joan. Ernest. Emman. Walchii Eloq. et Pöes.

Profess. publ. systema Regni Lapide Hallæ 1762 edit.
nec non Onomatolog. Histor. natural. Tom. 2. Pag.
310, cuius tres Tomos priores ad usum mihi per-
quam gratiōsē obtulit Nob. D. L. B. de Wybe in
Reuschenberg. S. E. P. Consil. Intim. &c. &c.

N. 1. Cornu Ammonis non spinatum, plurium cir-
cumvolutionum, striis ferè à mediâ spirâ alter-
nis simplicibus. Specimen hoc unicum hucus-
que deprehendi prope Gerreshemium in satrap.
Mettman. in Patr. Mont. Lapii minerâ Mar-
tis imprægnato immersum, coloris ex flavo fer-
ruginei.

N. 2. Fragmentum cornu Ammonis striati striis
latrioribus in lapide præduro coloris ferruginei,
inventum prope Wipperfürth in Patr. Mont.

N. 3. Cornu Ammonis fragmentum in lapide are-
- noso coloris subfuscâ striis latioribus, aliis sensim
evanescentibus, aliis ad extimum spiræ ambitum
excurrentibus, cæterum Caprini cornu effigie-
erutum prope Düsseldorf ad fossam arena-
riam

riam secus viam novam, quæ Gerreshemium ducit.

N. 4. Fragmentum *Cornu Ammonis* in Quarzo, in quo lameilæ articulares ex fluore crystallino distinguuntur, intermedio spatio lapide calcario infarcto, opere foliaceo prominente signatum. è viciniâ *Bensbergensi*.

N. 5. Fragmentum *Cornu Ammonis* spinati spinâ prominulâ arcuratim striatâ, striis latoribus versus caput lapidis reflexis colore flavescente. inventum prope *Mülhemium ad Ruram Eßendiam* versus.

N. 6. Fragmentum *Cornu Ammonis* non spinati striis latis. erutum prope *Bensbergam* in Calcario.

N. 7. *Nautilites* fossilis exiguis in Calcario, coloris cinerei, orbibus in se convolutis valde globosus. reperi prope *Paffrath in Patr. Mont.*

N. 8. *Nautilites* minor marmoreæ duritiei priori haud assimilis, ex agris ibidem.

N. 9. *Nautilites* exiguis coloris grisei admodum Glo-

globosus, jam notatis similior. *è Viciniâ Bens-bergensi.*

N. 10. Nautilites minimus. ibidem.

*N. 11. Nucleus Nautili inhærescens Calcario.
ibidem.*

*N. 12. Cœchlites umbilicatus, orbiculatus in lapide
Calcario Bensbergensi.*

*N. 13. Cœchlites orbiculatus suâ adhuc testâ vesti-
tus in lapide candido friabili arenoso. prope
Paffrath in Patr. Mont.*

N. 14. Cœchlites minor in simili massâ. ibidem.

*N. 15. Cœchlites quinque spirarum in matrice.
ibidem.*

N. 16. Cœchlites umbilicatus minor. ibid.

N. 17. Cœchlites trochiformis. ibid.

N. 18. Cœchlites in Quarzo. inveni prope Keldenig in Eifflia.

*N. 19. Typus Cœchlitis umbilicati in lapide sub-
stantiæ calcariæ. prope Paffrath.*

N. 20.

N. 20. Nucleus Cochleæ seu trochi lapidei turbinati coloris cinerei quinque spirarum, orbibus rotundis. prope Mülheim ad Ruram. Vid. Scheuchzer. hist. nat. Helvet. pag. 275. fig. 58. Leibnit. Tab. 9. fig. 8. Bajeri Oryct. Noric. Tab. 3.

N. 21. Trochblites in lapide flavescente, perelegans. prope Excelsa Gerresheimum versus.

N. 22. Cochlea trochiformis sex spirarum coloris flavescentis. *ibidem.*

N. 23. Coblites trochiformis, coloris subflavi. erui prope Notberg in satrap. Eschweiler in Patr. Juliac.

N. 24. Cochlea quatuor spirarum in lapide calcario, è Viciniâ Bensbergensi.

N. 25. Nucleus Cochleæ trochiformis trium spirarum. *ibidem.*

N. 26. Cochlea gyris granulatis. reperi prope Kall in Eiflia.

N. 27. Cochlea in substantia calcaria terrestri similior,

- lior. *Vid. fig. 8. Tab. 9. Leibn. protog. ibid.*
- N. 28. Cochlea turbine in se reducto, quinque spirarum, in apicem valde obtusum desinente.*
ibidem. Vide Leibnit. ibid. Tab. 2. et 3.
- N. 29. Alia paulò minor. ibidem.*
- N. 30. Altera priori similiор. ibid.*
- N. 31. Coblites umbilicatus trium spirarum in calcario. erui prope Bensbergam ad fodinas Mercuriales.*
- N. 32. Coblites trochiformis mucrone acuminato in matrice substantiae calcariæ. inveni prope Bürvenich in Patr. Juliac. satrap. Nidec.*
- N. 33. Cochlea trium spirarum in lapide præduro, prope Porcetum reperi in vicin. Aquisgran.*
- N. 34. Convenit cum N. 25.*
- N. 35. Neritites trium spirarum primo orbe amplissimo, umbone aliquantulum eminente. ex agro prope Paffrath. in Patr. Mont.*
- N. 36. Neritites striatus striis transversis, trium*

spirarum, umbone nil eminente. inveni ad pagum Bleibur in Eifflid. prope fodinas plumbi.

N. 37. *Neritites* N. 35 æqualis ferè.

N. 38. *Neritites* jam notatis similior. *ibidem.*

N. 39. *Neritites* in Calcario parum discrepans ab

N. 36. inveni prope Keldenig. *Vid. Scheuchz.*

Oryct. Helvet. Pag. 215.

N. 40. *Neritites* apice obtuso. *Vid. Autb. Onomatologiæ hist. nat. Tom. I. Pag. 350.* sub nomine *Bullæ lapid.* prope Notberg. in Patr. *Juliac.*

N. 41. *Neritites* moduli minoris ex parte averrà depresso, in Calcario *ibid.*

N. 42. *Globosites* quatuor spirarum coloris lividi, orbe primo admodum ventricoso, umbone parum prominulo ex agro prope Sötenig in Eifflid.

N. 43. *Globosites* orbe primo maximè ventricoso spiris densè cohærentibus costâ nativâ in longum striatâ versus aperturam conspicuâ.

prope

prope Paffrath.

N. 44. *Globosites* in lapide calcario coloris subflavi.
prope Nothberg. in Patr. Juliac.

N. 44. *Globosites* quatuor spirarum in Calcario ci-
nerei coloris Cortice quarzeo obductus. reperi
in agro prope Paffrath.

N. 45. Fragmentum cochleæ majoris globosæ.
ibidem.

N. 47. *Globosites* in lapide ferruginei coloris.
reperi in Ludenberg prope Gerreshemium. in
Patr. Mont.

N. 48. *Globosites* minor cinereus inventus in vici-
niâ Bensbergenſi.

N. 49. *Globosites* paulò minor repertus in Lato-
miâ. *ibidem.*

N. 50. *Globosites* N. 48. perquam similis è patriâ
Juliacensi prope Nothberg.

N. 51. Cochleæ globosæ minores variæ ex agris.
prope Paffrath.

N. 52.

- N. 52. *Globosites minor*, inventus prope *Kelde-*
nig in Eifflid. prope *fodinas martiales.*
- N. 53. *Cochleæ globosæ trochiformes variae*,
 prope *Richterich* in viciniâ *Aquisgran.*
- N. 54. *Cochlites trochiformis*, coloris subcinerei,
 spiris nodosis. prope *Gladbach* in viciniâ *Bens-*
bergensi.
- N. 55. *Trochilites coloris flavescentis spiris nodo-*
sis. prope *Richterich.*
- N. 56. *Turbinites sex circumvolutionum erutus à*
monte vulgo Ludenberg haud procul Gerreshe-
mio in Patr. Mont.
- N. 57. *Turbinites haud multum absimilis jam in-*
dicato. è Viciniâ Aquisgr.
- N. 58. *Nucleus Turbinis è Viciniâ Aquisgr.*
- N. 59. *Strombites lævis quatuor spirarum à sinis-*
trâ ad dextram circumvolutus in lapide flave-
cente. è viciniâ Aquisgran.
- N. 60. *Strombus in lapide flavescente sulco pro-*
fundiore excavatus, quem duo veluti cingula

comitantur, fortassis est Nucleus. *Vid. Bonanni N. 113. et Scheuchz. hist. nat. Helvet. Pag. 284, ejusdemque Mus. diluv. N. 169. ibid.*

N. 61. *Strombi* nucleus spiris elatioribus. *ibidem.*

N. 62. *Strombites* transversim striatus orbibus vix existantibus. *ibidem.*

N. 63. *Strombites* transversim striatus et granulatus, striis nunc lajoribus nunc subtilioribus.
ibidem.

N. 64. Varia *Stromborum* fragmenta striis transversè secundum spiras excurrentibus. *ibid.*

N. 65. *Strombus* dense, et subtiliter striatus, orbibus veluti funiculo cinctis. *ibid.*

N. 66. *Strombites* in matrice substantiae calcariæ è viciniâ Bensbergensi.

N. 67. *Buccinites* in lapide calcario coloris flavescens, inveni prope Kall in Eiffiad.

N. 68. *Buccinites* compressus lævis in Calcario coloris grisei è viciniâ Bensbergensi.

N. 69.

- N. 69. *Buccinites* trochiformis ventricosus coloris
flavescens in lapide calcario. reperi in fodinâ
calcariâ olim exhaustâ prope *Nothberg*.
- N. 70. *Buccinitæ* in lapide præduro coloris sub-
fusci. prope *Richterich* in viciniâ *Aquisgran.*
- N. 71. *Cylindrites* coloris flavescens. Specimen op-
pidò rarum, erutum prope *Gerresheim.*
- N. 72. *Cylindri Cochlea* petrificata priori similli-
ma, rarissima, cuius quidem exemplar à Scheuch-
zero desideratur in ejusdem hist. nat. Helvet.
Pag. 288.
- N. 73. Subjungo huc terras *Cassides* reticulatas sub-
stantiae martialis, quas non itâ pridem è *Rotb.*
enberg obtinuit Frater, ac æmulus meus in hoc
Studiorum genere.
- N. 74. Accessere ad hanc Classem nuper admodum
varia, ac rariora Specimina è *Rothenberg*, *Lü-
dehberg*, *Galgenberg*, *Hartenberg*, *Gravenberg*,
in viciniâ *Gerresheimensi*, quæ nondum in or-
dinem digesta, propediem loculis suis inferentur.

N. 75. *Planitis*, sive *Auris marinæ* typus in lapi-
de minerâ martis imprægnato præduro, coloris
castanei. reperi ad Rhenum haud procul Düs-
seldorfio. *Vide Author. additamentorum ad bist*
natur. Edit. Altenb. 1774. idiom. german. pag.
115. *cum notis ibidem, et Onomatolog. bist.*
nat. part. 2. pag. 81. Lapis auricularis.

N. 76. *Patellitis* sive *Lepaditis* typus Basi amplâ;
et rotundâ. *ex monte Comitum in viciniâ Düs-*
seldorfienſi.

N. 77. *Lepadites* exiguus inhærens lapidi martiali;
intùs striis ex apice ad basim excurrentibus.
ibidem.

N. 78. *Patella* minima fossilis, colore ferrugineo.
ibidem.

N. 79. *Patella* lapidea immersa lapidi arenoso och-
raceo vertice integro, basi rotundâ, ac patulâ,
intùs lævis. *ibidem.*

N. 80. *Patella* striis tenuioribus denticulatis. è cen-
tro

tro ad peripheriam dense excurrentibus vertice clauso in matrice substantiae martialis cum Nucleo. è monte *Rothenberg*. prope *Gerresheim*.

N. 81. *Patellites* formam infundibuli referens, vertice clauso, striis alternis bi - tri - et quadrifurcatis è centro ad peripheriam vergentibus in matrice substantiae martialis. utrumque specimen nuper ad montem *Rothenberg* deprehensum à Fratre meo, *in patr. Mont.*

N. 82. Addi his meretur visa mihi nuperrime *patella Neritiformis*. Specimen perrarum, cuius Ectypon haec tenus non vidimus hic locorum, è Galliis calcinatas *de Courtagnon* si excepero.

N. 83. *Tubulorum simplicium typi* in lapide arenoso micaceo, coloris flavescentis. reperti prope *Erckrath* in satrapia *Mettman*. *patr. mont.*

N. 84. *Vermiculites* substantiae ochraceae in lapide flavo arenoso, minerâ *Marris* imprægnato. è *Rothenberg*.

N. 85.

N. 85. *Vermiculitæ variæ figuræ, sive tubuli solitarii.* *ibidem.*

N. 86. *Dentalia minuta* Lin. Syst. p. 786. plurima superficie lapidis calcarii confusè adhærescentia. reperi prope Bürvenich in patr. Julia. *Vide Onomatolog. hist. nat. Tom. 3. pag. 596.*

N. 87. *Tubulitæ polythalamii, sive Belemnitarum varia fragmenta* è viciniâ Aquisgranensi prope Nisweiler.

N. 88. *Belemnites diaphanus*, digiti ferè magnitudine, unde et eidem *Dactyli idæi* nomen obtigitse videtur ; aliis *lapis Lyncis*, *Lyncurius* olim, Wallerio petrificata *Holotburiorum*, *Ceratnii* species aliis apud Bajerum dictus. è viciniâ Aquisgran. baud procul à pago Richterich.

N. 89. *Belemnites formæ conicæ, foris tubulus filis* in lapide martiali. Confer. cum N. 18. Serie 7.

N. 90. *Belemnitis canaliculati*, ut Luidii phrasí apud Baje-

Bajerum utar, fragmentum in minerâ Martis,
coloris nigricantis. effossum prope *Olsbach*
in Patr. Mont.

N. 91. *Belemnitis pyramidalis* fragmentum, mag-
nitudinis palmaris, erutum prope *Erckrath* in
patr. Mont. *Vid. Leibnit. protog. Tab. 8.*

N. 92. *Belemnites oxyrrhynchus* apice acutiore, ef-
fossus in viciniâ pagi *Nothberg* haud procul à
fodinis *Eschweileranis* in *patr. Juliae*.

N. 93. *Belemnites circulis concentricis erosis*, colo-
re flavescente. prope *Eigelshoven* in *Patr.*
Juliacensi.

N. 94. *Belemnites immersus* *Calcario*, coloris ex
cinereo nigricantis. deprehendi hoc specimen
prope *Keldenig ad fodinas ferri ibidem*.

N. 95. *Belemnitis fragmentum cum Nucleo* mar-
gaceo, formæ conicæ. prope *Richterich.*

N. 96. *Belemnitis plani*, ac depresso, *Homalobe-*

lemnitis fragmentum, calice arenâ flavescente
martiali farcto. è viciniâ Erckrath in patr. mont.

N. 97. *Belemnitis* magis depresso, seu *Homalobemnitis* fragmentum arerâ ochraceâ cavitatem
opplente. *ibidem.*

N. 98. *Belemnitis* truncati particula, ex calice sepa-
tenos circulos et plures, concentricos, distinc-
tos invicem, exhibens. è viciniâ Aquisgran.

N. 99. *Belemnitis* fragmentum calice substantiâ py-
ritosa splendente farcto. è latomiis *Bensber-*
¹⁰¹*gensibus.*

N. 100. *Alveolorum* articuli, sive nuclei in thala-
mis *Orthoceratitorum* nati, siphone versus mar-
ginem conspicuo, substantiae seleniticæ. inveni
prope *Dablbenden* in *Eifflia.*

N. 101. *Alveoli* articulati conici, coloris ex lurido
cinerei. è viciniâ Aquisgran.

N. 102. *Alveoli* articulati paulò majoris moduli.
ibidem.

N. 103.

N. 103. *Alveoli*, sive articuli solitarii thalamorum Orthoceratitarum, siphone ad marginem locato.
ibidem.

N. 104. *Alveoli* articulati specimen, articulis catiliformibus quatuor constans, siphone marginem versus conspicuo. Longitudo basis inferioris est secundum pedem Rhinlandicum, sive Rhenanum Linearum $36 \frac{7}{11}$; latitudo $32 \frac{8}{11}$. Superior basis habet in longitudine Lineas $32 \frac{8}{11}$; in latitudine verò $28 \frac{88}{110}$. Crassities articulorum est linearum 2 cum dimidiâ. *Vide Baumer. part. 1. pag. 305. et 306. §. 4.* deprehendi illud ipsum prope *Kall in Eifflid.*

N. 105. *Alveoli* aliquot minoris moduli, articulati. prope *Dottelen* versus *Bleiberg.*

N. 106. *Alveoli* articulati depresso, formæ ovalis, non nihil erosi. è patr. mont. prope *Paffrath.*
ibidem rarissimi.

N. 107. *Alveoli* articulati. è patr. *Juliac.* prope *Notberg.* *ibidem* rariores.

N. 108. *Alveolus articulatus*, siphunculo è centro
prodeunte. inveni prope Keldenig in Eifflid.

N. 109. *Alveolus paulò major*. *ibidem*.

N. 110. *Alveoli minimi* è latomia obsoletà prope
Nothberg in Patr. Juliacensi.

N. 111. *Alveoli articulati siphunculo Centrum oc-
cupante*. è vicinià *Bensbergensi*. in *Patr. mont.*

