

SERIES SEPTIMÆ

Lapides Emmorphi ex transmutatione
animalium testaceorum bivalvium.

CONCHITÆ.

*N. 1. Solenites bivalvis minor in lapide martiali
arenoso coloris ferruginei, Valvarum verò cas-
tanei. reperi rarum hoc specimen in Luden-
berg prope Gerreshemium. Scheuchzerus in
Mus. diluv. Tiguri typis Henric. Bodmeri 1716.
edito pariter non nisi unicum specimen recen-
set Pag. 73.*

*N. 2. Discites auritus lævior in lapide Corneo.
reperi prope Sūchtelenam in satrap. Brüggen.*

*N. 3. Discites in lapide arenoso micaceo. reperi
prope Gerreshemium.*

*N. 4. Discitæ in lapide arenoso flavescente. ad
montem vulgo Galgenberg prope viam regiam
haud procul Gerreshemio.*

N. 5.

N. 5. *Pectinites* alatus, densè striatus. Striæ sunt creberrimæ, lineisque transversis quodammodo exasperatæ, in lapide ferrugineo. erutus è *Ludenberg* prope *Gerreshemium*.

N. 6. *Pectinites* margine pulchrè orbiculato, circellis quibusdam subtilibus fasciatus. *ibidem.*

N. 7. *Pectinites* alatus striis nunc subtilioribus, nunc latioribus in lapide friabili. *ex agro prope Hökeswagen.*

N. 8. *Pectinitis majoris auriti* matrix striis latioribus denuò subtiliter striatis in lapide arenoso duriore è *viciniâ Duisburgensi*.

N. 9. *Pectinites major* crustâ suâ nativâ passim vefritus in lapide præduro, striis latioribus, aliis veluti granulatis intercurrentibus. *ibidem.*

N. 10. *Pectinites major* alatus striis latioribus. prope *Mülhemium ad Ruram.*

N. 11. *Pecten* rarioribus striis lapidi arenoso, ac Martiali insculptis. prope *Gerreshemium.*

N. 12. *Chama pectinata* ab uno Cardinis latero val-

valde sinuosa in lapide præduro. è viciniâ
Mülheimensi ad Ruram.

N. 13. Typus *pectinis* majoris moduli striis majoribus inter se distantibus, densissimis aliis interjectis in lapide arenoso rubescente, fortassis adusto. *ibidem.*

N. 14. *Pectinis* fragmentum cum crustâ suâ albicante striis nunc crassioribus et clavioribus, nunc minoribus, ac magis depresso, erutum è fossâ margaceâ. prope *Castellum D. L. B. de Ritz.* in *Etgendorff. in Satrap. Cufster.*

N. 15. Typus *Pectinis* majoris striis latissimis in lapide ad chalybem scintillante. è viciniâ *Duisburgensi.*

N. 16. *Chama pectinata* striis eminentioribus, crustâ nativâ magnam adhuc partem lapidi præduro, pariter ad chalybem scintillanti adnata. è viciniâ *Mülheimensi ad Ruram.*

N. 17. *Pecten* major crustâ nativâ ex parte vestitus, striis prominulis, subtilioribus intermediis. prope *Mülheimum ad Ruram.*

N. 18. *Chama ventricosa pectinata, striata in lapide fluore crystallino obducto, prope Richterich in vicinitate Aquisgrani.*

N. 19. *Chama transversim fasciata, laevis in lapide martiali. è Ludenberg prope Gerresheimum.*

N. 20. *Chama pectinata ventricosa cum nucleo in matrice coloris castanei. ibidem.*

N. 21. *Pectunculites alatus ventricosus striis densioribus bifurcatis in lapide arenoso. ibid.*

N. 22. *Bucardites ob figuram sic dictus lapis, quem fusiūs describit Ferrandus Imperatus hist. nat. L. 24. C. 26. ipsam vero Concham additam effigie Phil. Bonanus pag. 110. Videtur esse ipse duntaxat Nucleus, sive materia quondam testae inclusa, quae jam evanuit. reperi hoc specimen in Ludenberg. ibid.*

N. 23. *Bucardites paulo minor in lapide arenoso coloris ochracei. ibidem. Vide Bajer. Oryctog. Noric. Tabul. 4. Fig. 21. Edit. 2dæ.*

N. 24. *Bucardites in matrice striata nucleo laevi.*
Bucar-

Bucardites hic, ut notat idem Jacob. Bajerus
in *Oryctographia noricâ* pag. 76. à nonnullis ap-
pellatur *Hysterapetra*, et *Hysterolithus* *ibid.*

N. 25. *Bucardites* valde ventricosus, lævis elegans
colore subflavo. *ibid.*

N. 26. *Bucardites* mediocris moduli, N. 22. de-
scripto similior. *ibid.*

N. 27. *Bucardites* minoris formæ cùm matrice in
lapide martiali arenoso micaceo è monte vulgo
Hartenberg in viciniâ *Gerresheim*.

N. 28. *Bucardites* ferme cum priore idem; non
tamen itâ ventricosus. *ibidem.*

N. 29. *Bucarditis* maximi nucleus in lapide arenoso
præduro, crustâ nativâ albicante magnam
partem obductus, è sabuleto effossus prope *Berg-*
beimerdorff in *Satrapia Bergheimensi*.

N. 30. *Bucardites* minor ventricosus lævis in lapi-
de arenoso minerâ Martis imprægnato ex *Har-*
tenberg prope *Gerreshemium*.

- N. 31. Valvæ simplex *Bucarditis* in lapide martiali
ibidem.
- N. 32. Valvæ plures *Bucarditis* in simili substanciâ. *ibid.*
- N. 33. *Chama ventricosa Bucarditi* similior in calcario lapide, reperta prope *Kall in Eifflâ.*
- N. 34. *Ostracites pectinatus*, striis radiisque laticibus utramque valvam oberrantibus, valvis ambabus connexis; sed parumper distortis. *è viciniâ Duisburgensi.*
- N. 35. *Ostracitis oblongi* nucleus in lapide coloris albicantis, particulâ crustæ nativæ affabre striatæ uni valvarum adhærescente. *è viciniâ Mülheimensi ad Ruram.*
- N. 36. *Ostracites pectiniformis maximus elegantissimus* testâ nativâ reticulatâ, radiisque prominentibus ac latis superficiem ornantibus in lapide præduro ad chalybem scintillante: incumbit ex parte ipsimet Ostreae *Chama striata major* (an peetën?) cuius apophyses videntur fracturam

turam passæ. è viciniâ *Duisburgensi.*

N. 37. *Ostracitæ rastellatae*, ac rugosæ valva petrefacta *Cristam Galli* exhibens, ac propterea à variis hoc nomine appellata. *ibidem.*

N. 38. *Ostracitæ rastellatae*, ac lamellatae eminentiis dorsibus acuminatis sulcatæ et transversim fasciatæ valva. *ibidem.*

N. 39. *Ostracitæ rugosæ oblongæ*, ferè à dorso versus oram rastellatae valva *ibid.*

N. 40. *Ostracitarum* ad oram extimam denticulatæ, majoris quidem oblongæ ad marginem crenatae, ac paulò minoris, sed crassioris, dorso sulcato, et imbricato cohærentium valvæ *ibid.*

N. 41. *Ostracites laevis*, transversim fasciatus in lapide calcario prope *Dablbenden* in *Eifflia* versus *Weier.*

N. 42. *Ostracites paulò minor* priori æqualis, erutus ex agro prope *Weier* in *Eifflia.*

N. 43.

N. 43. *Ostracites* lævis jam notatis similior fasciis paulò latioribus. *ibidem.*

N. 44. *Ostracites* minor lævis immersus calcario. *ibidem.*

N. 45. *Ostracites* lævis gyris transversis latioribus, qui quidem mihi nucleus ostreæ videtur. *in Viciniâ Duisburgensi.*

N. 46. *Ostracites* minimus, alias *Numulus* *Brautensburgensis*, sive *Ostracites numismalis*, *Conchites* etiam *parasiticus* à Stobæo nominatus, antiorem Calvariæ figuram referens, inventus prope Pomœria Abbatiaæ *Steinfeldenfis* in *Eiffliâ*. deprehendi unum, alterumve specimen in *Lithophylacio Fratris mei*, quæ quidem, utpote rarioribus Patriæ nostræ fossilibus jure adnumeranda, hoc loco præterire, nefas duxi.

Vid. Kilian. Stobæi opusc. Dantisci 1752. edit. pag. 11, et 30. Tab. I. Fig. 1, et 3. — et Wallerii Mineralog. Berolini 1750 edit. pag. 478. Spec. 388. N. 4. &c. &c.

- N. 47. *Gryphites* in Calcario coloris grisei. prope Sötenich in Eifflid.
- N. 48. *Gryphites* paulò minor, conferendus cum priore ex Könenberg prope Sötenich.
- N. 49. *Musculites* in lapide arenoso micaceo coloris ochracei ex Rodenberg prope Gerresh.
- N. 50. *Musculites* in lapide martiali. *ibidem.*
- N. 51. *Musculitis* majoris valva in lapide arenoso flavescente. *ibidem.*
- N. 52. *Musculites* minor coloris ferruginei. *ibid.*
- N. 53. *Musculites* immersus médiam partem lapidi minerā martis imprægnato. *ibidem.*
- N. 54. *Musculites* coloris flavescentis in lapide arenoso ē viciniā Aquisgr.
- N. 55. *Musculites* major satis ventricosus coloris castanei ex Rodenberg. in viciniā Gerresheim.
- N. 56. *Musculites* mihi hactenus maximus, substantia arenosa, arenā ad attractum deciduā, quod speci-

specimen vel ideo servari diu vix poterit.
Vidi penes Fratrem meum simile, minerâ mar-
tis magis imprægnatum. ex Rodenberg prope
Excelsa in viciniâ Gerresheim.

N. 57. *Musculites* coloris ferruginei satis ventri-
sus. *ibidem.*

N. 58. *Musculites* exiguus immersus lapidi arenoso
martiali. deprehendi in Ludenberg prope *Ex-*
celsa *ibidem.*

N. 59. *Musculites* sive concha fluviatilis mediocris
moduli, inhærescens lapidi arenoso coloris och-
racei. *ibid.*

N. 60. *Tellinæ*, (an *Mytilitæ Walbianæ?*) quas
inter et *Musculitas* hactenus satis distinguere nel-
ciebam. Aliquot ex Rotenberg Fratres bini
possidemus.

N. 61. *Terebratula* striata major subcinerea, ven-
tricosa, striis crassioribus bifurcatis, fasciisque
transversis distincta. è viciniâ Bensbergensi.

N. 62. *Terebratula* major cinerei coloris striis pau-
lo tenuioribus, fasciisque transversalibus, fortal-
sis

sis accretionem annuam notantibus. *ibidem.*

N. 63. *Terebratula* mediocris, striis bifidis in ortu suo tenuioribus, versus oram sensim latioribus. *ibidem.*

N. 64. *Terebratula* striis admodum tenuibus fasciisque transversis donata, adhaerente dorso aliâ minore. prope *Eckenhagen* in *Patr. Mont.*

N. 65. *Terebratula* ventricosa, sed latior striisque simplicibus ad extremam oram sine fasciis excurrentibus. prope *Bensberg*.

N. 66. *Terebratula* valde ventricosa, oblonga, striata, et fasciata. prope *Uckerath*.

N. 67. *Terebratula* ventricosa, striis latioribus, bifurcatis, fasciisque circinatis. prope *fodinas calcarias Bensbergenses*.

N. 68. *Terebratula* minor, colore cinereo, striis bi- et trifurcatis, valvâ inferiore nonnihil distortâ. *ibidem.*

N. 69. *Terebratula* minor striis subtilioribus, fasciisque transversis in arcum excurrentibus. *ibid.*

N. 70. *Terebratula* è majoribus, latior, superne
parum ventricosa, inferne planior, striata, et fas-
ciata. *ibidem.*

N. 71. *Terebratulæ* minores striis in ortu obsoletis,
versus oram bifurcatim excurrentibus. *ibidem.*

N. 72 *Terebratulæ* minores striis imbricatis ac cir-
cinatis latioribus. prope *Glabeck.*

N. 73. *Terebratulæ* mediocres oblongæ, striatæ,
nonnihil distortæ. prope *Paffrath.*

N. 74. *Terebratula* oblongior, densè striata, rostro
valvæ superioris prominente, inferius valde ven-
tricosa. prope *Paffrath.*

N. 75. *Terebratulæ* minores flavescentes striis im-
bricatis, bifurcatis, et fasciis circinatis. è vici-
niâ *Bensbergensi.*

N. 76. *Terebratula* mediocris striis subtilissimis, Ca-
pilaribus, corpore latiore, parte inferiore levi
lacunâ donatâ. haud procul *Herckenrath* prope
Bensberg.

N. 77. *Terebratulae* minores striis subtilissimis, non nihil distortæ, *ibidem.*

N. 78. *Terebratula* globosa rarer, utrinque ventricosa, striata. prope *Bensberg.*

N. 79. *Terebratulae* mediocres planiores, et latiores, striis nunc simplicibus, nunc bifurcatis, haud procul *Jmmekeppel.*

N. 80. *Terebratulae* rugosæ planiores, striis latioribus imbricatis. prope *Paffratb.*

N. 81. *Terebratula* striis versus oram latioribus superiùs ventricosa, infernè lacunâ donata.
ex agro *Paffradiensi.*

N. 82. *Terebratula* ex unâ parte convexa, ex alterâ planior, striis ferè alternis bifurcatis. è viciniâ *Bensbergenfi.*

N. 83. *Terebratulae* mediocres oblongæ, striis sulcisque latioribus. ad limites dynastiae *Schwarzenbergensis.*

N. 84. *Terebratulae* minores striis latis et bifurcatis.
ibidem.

N. 85. *Terebratula Coloris flavescentis globosa*, rostro prominulo, valvâ alterâ levi lacunâ donatâ, alterâ ventricosâ, et à Cardinis apice elongata, striis obsoletis. è satrapia Steinbacensi in Patria Montensi.

N. 86. *Terebratula* striis latissimis, flavescentis, valvâ alterâ dorso prominente, alterâ lacunâ donata, prope Paffrath.

N. 87. *Terebratula* ex unâ parte convexa, ex alterâ plana, striis ferè alternis bifurcatis. è vicinia Bensbergensi prope Merhem.

N. 88. *Terebratulae* mediocres oblongæ, striis sulsisque latioribus, ad limites Comitatus Homburgensis in Patria Montensi.

N. 89. *Terebratulae* minores striis latis, et bifurcam excurrentibus. ibidem.

N. 90. *Terebratula coloris flavescentis, globosa* rostro prominente, valvâ alterâ levi lacunâ donatâ, alterâ ventricosâ et è cardinis apice elongata, striis detritis, ac obsoletis. è satrapia Steinbacensi.

N. 91. *Terebratula* striis latissimis, flava, valvâ alterâ eminentiâ dorsali, alterâ lacunâ donatâ, rostro prominulo. prope Glabeck in vicinia Bensbergensi.

N. 92. *Terebratulae* alatae striis latis haud procul Wipperfürtb.

N. 93. *Terebratula* subflava, striis latissimis valvâ alterâ lacunata, et particulam testaceam referente. è vicinia Ruppigrath.

N. 94. *Terebratula* striata, lacunosa, punctis crystallinis obducta (an nucleus hysterolithi?) coloris flavescentis. prope Notberg in Patr. Juliacensi.

N. 95. *Terebratulae* lacunâ donatæ, distortæ, striis in lacunâ tenuioribus, rostro admodum prominente, valvisque ex cardine elongatis prope Glabeck.

N. 96. *Terebratula* lacunosa striis latioribus rostro pariter prominulo. prope Elberfeldt. colore cinereo.

- N. 97. *Terebratula anomia*, valvā alterā planiore, turgente alterā, fasciis, et striis tenuibus, nonnihil distortā ē viciniā *Bensbergensi*.
- N. 98 *Terebratula mediocris* planior, marginibus depresso, an distortis, striis leniter imbricatis. ex *Eiffeld* prope *Fversheim*.
- N. 99. *Terebratulæ mediocres ventricosæ* striis latioribus, tum simplicibus, tum bifidis. ex *Eiffeld* prope *Zinsheim*.
- N. 100. *Terebratulæ minores* striis latis imbricatis, fasciis transversis, colore rubescente. ex *Eiffeld* prope *Tondorff*.
- N. 101. *Terebratula obsoletè striata*, non admodum ventricosa, apice nonnihil à reliquâ valvâ dis juncta. prope *Lindlar* in agro *Heiligenhoveni*.
- N. 102. *Terebratula* striis subtilibus versus oram latioribus, cæterū ventricosa. *ibidem*. conferatur cum N. 69.
- N. 103. *Terebratulæ minores* striis subtilissimis ē viciniā *Bensbergensi*.

N. 104. *Terebratulae* minimæ, imbricatae, striatae prope *Lirbach* in agro *ibid.*

N. 105. *Terebratula minor* transversim striata, et lacunosa, corpore excavato, valvis nativis residuis prope *Heiligenhoven* specimen rarius.

N. 106. *Terebratula*, an peccunculus striatus ex utraque parte ventricosus. prope *Paffrath.*

N. 107. *Terebratulae* cohærentes, valvâ alterâ striatis capillaribus tenuissimis, alterâ paulò latioribus, utrisque ventricosis. è viciniâ *Bensbergensi.*

N. 108. *Terebratulae* rariores, Sinuosæ, Globosæ ventricosæ, striis ab initio subtilibus, deinde ad oram latissimis. prope *Glabeck.*

N. 109. *Terebratula major* latiore lacunâ donata rostro valde prominente, utrinque ventricosa, striata, valvâ à valvâ elongatâ prope *Paffrath.*

N. 110. *Terebratula major* parum lacunata, striata, medianam partem calcario an margaceo immersa, colore flavescente. prope *Notbberg.*

N. 111. *Terebratula* immersa margodi ex albo flavescenti, seu massæ arenosæ ac friabili, striis latioribus

- oribus, et levi lacunā donata. propè *Notberg*.
- N. 112. *Terebratula* major lacunā, et striis latioribus prope cardinem bifurcatim incisa. propè *Blech* in *Patr.* mont.
- N. 113. *Terebratulæ* an pectines minores in massa ocracea, minerā martis imprægnatā, striis latioribus prope *Wipperfürth*.
- N. 114. *Terebratulæ* minimæ hīc rariores, striis latiis, versus aperturam obtusæ, valvis fere æquilibus, parūm lacunosis è viciniâ *Bensbergensi*.
- N. 115. *Terebratulæ* mediocres, ex apice læves, striis dein versus oram in denticulos abeuntibus, ex unā parte lacunosæ, ex aliâ ventricosæ. *ibidem*
- N. 116. *Terebratulæ* an pectunculi sinuosí alati, striis variis è viciniâ. *Uckerath*.
- N. 117. Nuclei *Terebratulæ* striaæ alatae in massa friabili. propè *Wipperfürth*.
- N. 118. *Terebratulæ* læves minimæ. propè *Paffrath*. è fodinis calcarii obsoletis.
- N. 119. *Terebratulæ* læves oblongæ, coloris ex cinereo nigrantis. è viciniâ *Aquisgranensi*.
- N. 120.

N. 120. *Terebratula* lævis ventricosa in lapide arenoso coloris flavi prope *Gerresheim*.

N. 121. *Terebratulae* oblongæ læves, an nuclei caudam, colore fusco. è viciniâ *Solingensi*.

N. 122. *Terebratula* lævis, oblongior, in quâ gyri serpentiformes conspicuntur. vid. *Scheuchz Mus.* diluv. 958. ejusdem bift. *Helv.* pag. 528. etiam Tom. 3. 123. et 158.

N. 123. *Terebratulae* oblongæ læves, minores in massâ ochraceâ ad limites *Dynastiae Schwartzbergensis*.

N. 124. Nucleus *Terebratulae* ventricosæ, an hystero lithi, in lapide arenoso micaceo prope *Lindlar*, in *Patr. mont.*

N. 125. *Terebratulae* læves apice perforato, ac rostro parum prominulo, aliae compressæ, aliae magis ventricosæ. prope *Eckenhagen*.

N. 126. Vâlva *Terebratulae* lævis, ventricosæ, transversim striatæ, rostro instar *Bucarditis* magis in curvo. è viciniâ *Eckenhagensi*

N. 127. *Terebratulae* læves minores, rostro planiore, ex alterâ cardinis parte in acumen desinen-
tes

tes. ex agro Paffratbienſi.

N. 128. *Terebratulae oblongae minores in lapide arenoso subfuscō. prope Höckeswagen.*

N. 129. *Terebratula minima globosa, transversim striata ē lapide minerā Veneris viridi imprægnato cruta prope Wildburg.*

N. 130. *Terebratula lævis globosa subsphærica, rostro cuspidato ac prominente. prope Paffratb.*

N. 131. *Terebratula lævis, mediocris, oblonga, hinc inde distorta, rostro pariter prominente. ibidem*

N. 132. *Terebratulae minores læves, ventricosæ. prope Eckenhagen.*

N. 133. *Terebratulae læves oblongæ, an nuclei earundem in lapide arenoso, micaceo. prope Lindlar ē latomiis ibidem.*

N. 134. *Terebratulae læves minimæ, aliæ coloris subfuscī, aliæ ex flavo albescētis. prope domum Blech.*

N. 135. *Terebratulae læves, mediocres oblongæ coloris ex cinereo albicantis. prope Uckeratb.*

N. 136.

N. 136. *Terebratula* lœvis, mediocris rostro prominentulo, ab uno cardinis latere ad oram longior, colore cinereo. prope *Paffrathb.*

N. 137. *Terebratula* lœvis major, valde ventricosa apicibus invicem elongatis, rostro nonnihil eliso. ex agro *ibidem.*

N. 138. *Terebratula* lœvis mediocris, immersa lapidi margaceo friabili, coloris cinerei è viciniâ *ibidem.*

N. 139. *Terebratula* lœvis major, lata, valvâ alterâ planiore, rostro prominente, et admodum incurvo. prope *Musebbroich in Patr. Montenſi.*

N. 140. *Terebratula* major lœvis, nonnihil distorta, eruta è fossâ margaceâ; rostro incurvato, è vicinâ *Paffradiensi.*

N. 141. *Terebratula* lœvis mediocris ex alterâ Cardinis parte, alterâ breviore rotundiore. *ibid. Vid. Mus. dil. Scheuchz. N. 439.*

N. 142. *Terebratula* lœvis, major, oblonga, rostro in alteram valvam reflexo. *ibid.*

N. 143. *Terebratula* lævis, an bucardites inæquilaterus, valde ventricosus, in **Calcario** è viciniâ **Bensbergensi**.

N. 144. Fragmentum *Terebratulæ* lævis majoris fluore metallico perfusæ, rostro cuspidato. è viciniâ *Rupichratb.*

N. 145. *Terebratula* major lævis inæquilatera, **Cervirostra**, colore ferrugineo, ac minerâ martis imprægnata, cui altera minor inserta. prope *Gerresb.*

N. 146. *Terebratula* lævis è majoribus, æquilatera è cardine ad oram magis sejuncta, ventre demiso, et ad marginem sensim attenuato, parum per distorta in **Calcario Bensbergensi**.

N. 147. Valva *Terebratulæ* minoris rostro incurvo massæ margaceæ adhærens, striis transversalibus, prope *Paffratb.*

N. 148. Valva *Terebratulæ* lævis, mediocris adnata lapidi margaceo coloris cinerei *ibidem.*

N. 149. Valva *Terebratulæ* lævis inæquilateræ, inferne nucleo minoris immerso. è viciniâ *Aquisgradi*.

N. 150. *Terebratula* lœvis, rostro incurvo, æquilatera, infernè typo minoris transversim striatæ sese exhibente. *ibidem.*

N. 151. *Terebratula* lœvis minor, coloris flavecentis, valvis parùm distortis, quarum uni impressa *Asteria*. *ibidem.*

N. 152. *Terebratula* transversim striata, inæquilatera, ventricosa, (an *Bucardites* ?) colore fusco. prope *Eckenhagen*.

N. 153. *Terebratula* fermè cum priori eadem; sed magis ventricosa, ex eadem viciniâ.

N. 154. *Chama* cordiformis inæquilatera, striis transversis, et longis quasi reticulata, rostro minus incurvo, quam in aliis *Cartissis*. *Vid. Mus. Dil. Scheuchz. 370. Fig. 81.* prope *Paffrath*.

N. 155. Valva *Terebratulæ* lœvis levi lacunâ donatae, apice longius acuminato. prope *Lindlar* in agro versus *Heiligenboven*.

N. 156. *Chama*, an *musculus* transversim striatus,

ex utroque latere æque diffusus ad imam oram perparum attenuatus. Est hoc specimen unicūm, quod deprehendi in agro prope Latomias Lindlarienses.

N. 157. *Chama lœvis anomia*, utrinque valde convexa, oblonga, colore fusco, an bucardites inæquilaterus, spinâ et umbone cardinum eminente, atque incurvato, ventre crassiore, versus imam oram sensim attenuato, ac compresso.
Vid. Lang. hist. p. 139. Tab. 39. Fig. 4.^{et}
in hist. nat Helv. Schenckz. Fig. 88. Pag. 295.
è viciniâ Eckenbagen.

N. 158. *Terebratulæ striatae latæ alterius valvæ rostro admodum ab alterâ disjuncto, cavitate versus ginglymum intercurrente.* deprehendi ejusmodi specimina varii moduli *in viciniâ Steinfeldensi* versus pagum *Keldenig.*

N. 159. *Terebratulæ ventricosæ valde rugosæ, et squammosæ ibidem in Calcario.*

N. 160. *Terebratulæ densissimæ, et subtilissimæ striatae, quas reperi ad pagum Sötenich.*

N. 161. *Terebratulæ ad valvarum juncturas omnino obrusæ, densè striatae, neutiquam ventricosa.* inveni easdem prope pagum *Kall in Eifflid.*

N. 162. *Terebratula transversim striata prope Keldenig.*

N. 163. *Pectinis valva striis latioribus, immersa lapidi arenoso.* prope *Richterich.*

N. 164. *Pectinis valva striis capillaribus ac tenuissimis, fasciâ hemisphæricâ transversim ornata,* testâ nativâ superstite, immersa lapidi arenoso, aut margaceo. prope *Süchtelen* in monte *S. Jrmgardis*, haud procul à *Sacello.* *ibid.*

N. 165. *Pecten striis in ortu densis, dein latioribus, nativo cortice medium partem vestitus.* rarius specimen ex *Eifflid.*

N. 166. *Valva Pectinis non absimilis jam descripto, in lapide arenoso albescente.* differt in binis striarum radiis distortis sive loco motis, testâ reliquâ adhucdum integra. ex *Eifflid.*

N. 167. *Valva Pectinis minoris lapidi arenoso albican-*
K 2

bicanti immersa. prope *Eckenhagen in Patr. Montensi.*

N. 168. Valva *Chamæ* an pectinis striati, cui inverso ordine alia inhæret valva lævis, in lapide arenoso, coloris flavi. è viciniâ *Aquisgr.*

N. 169. *Chamæ* striatæ valva, cui intus adhærent muscularum lævium typi colore flavo in lapide arenoso. è viciniâ *Richterich* versus *Aquisgr.*

N. 170 *Pectunculus* pentagonus quinque striis latioribus, ac prominentibus distinctus, quarum inter singulas binæ, ternæve profundius exsculptæ sunt in lapide margaceo albicante.
prope *Paffratb.*

N. 171. *Pectunculi* hexagoni, sex striis latioribus ornati, quarum inter singulas binæ tenues striæ inter graciliores binas alias profundius exsculptæ notantur, testæ nativæ fragmentis lapidi virecenti arenoso adhærescentibus. è fodinis calcaris haud procul *Bensbergæ.*

N. 172. *Pectunculus* pentagonus striis latioribus, et ma-

er magis prominulis, quas inter ternæ striæ profundiūs sunt exsculptæ, Strombi fragmento adhærente, in lapide flavescente. prope Aquisgr.

N. 173. *Pectunculi* majores alati striati, in lapide calcario. deprehendi prope Sötenich.

N. 174. *Pectunculi* paulò minores jam notatis similimi. ibidem.

N. 175. *Trigonellæ* striatæ coloris castanei rostro acuminato prominulo. prope Keldenig.

N. 176. *Trigonellarum* specimina varia paulò majoris moduli. ibidem.

N. 177. *Trigonelle* ob alas expansas Papilioes lapidei à Ruriculis passim nuncupatæ. prope Sötenich.

N. 178. *Conchites Rhomboidalis anomius*. deprehendi prope Paffrath in ducat. mont. Conferatur cum Tabulâ 8vâ Fig. 43. et Fig. 44. in relationibus de rarioribus petrefactis Christian. Friedric. Wilckens germanicè Berolini et Stralsundæ 1759 edit.

N. 179. Nucleus ejusmodi *Conchitis anomii*,
inveni prope Hökeswagen.

N. 180. *Conchites bivalvis cucullatus*, anomites, sive testis inæqualibus, hic *Pilolithus* passim appellatus, à *Cucullo* ex græco desumptâ Nomenclaturâ. — sancè ante annos quindecim, et plures ex *Niderrebe*, aliisque etiam è locis ex *Eiffiae* tractu similes deprehendi in *Lithophylacio* Fratris, et Æmuli mei, nunquam aliter nuncupatos. Vocatur *Conchites* hic alibi *Calceus Muliensis*, fortassis à figurâ, cùm satè propriè calcei ejusmodi formam exhibeat; Calccamento tamen, quæ pars est calcei posterior, resecto, quapropter et fortè D. L. B, de Hüpsch eandem Concham *Sandaliolitbi* nomine placuit insignire. Vid. ejusd. Nouvelles découvertes de quelques Testaces petrifies rares, et inconnus &c. Edit. 1771 in 8vo; germanicè verò 1768 *Franfurti*, et *Lipsiæ*. Scio equidem, minus probari à *Lithosophis*, si novis indies pro cuiuslibet Genio nominibus Onomatologia historiæ naturæ

naturalis augeatur, uti recte notat Cl. Walchius
in præfatione *System. Regni lapid.* §. 5. Pag.
22. et 23; quis verò Lithophilum arguet, si *Con-*
chiti ubivis Anonymo distinetum dein nomen
indat sive à formâ, sive aliunde deductâ deno-
minatione?

Pilolithus noster hic certè *Pilolithus* manebit, quem
meâ pace alii deinde seriùs *Sandaliolithum* dix-
erint. Recenséo jam ex ordine varios ejus-
dem speciei varii moduli, et figuræ Conchitas,
quos per Eiffiam ipfem hinc inde reperi.

N. 181. *Pilolithus* minor, admodum planus abs-
que operculo, angustum verè Animalculo do-
miciolum. reperi prope Sötenisch.

N. 182. *Pilolithus minimus*, quem vidi, vix hanc V
latinorum Consonantem exæquans. deprehendi
omnino quinque ejusmodi. singuli nonnisi pa-
rùm magnitudine discrepant. prope Sötenisch in
Könenberg.

N. 183. *Pilolithus* cum Operculo, indicio mihi

quidem palpabili, nequaquam ad Fungitas, ut perperam Nonnullis placet; sed ad Conchas bivalves hoc specimen pertinere. deprehendi prope Keldenig in Heldenkopff.

N. 184. *Pilolitus*, ejusdemque valva planior, figurâ hemicyclicâ, quæ est operculum valvæ culiformis. quod quidem specimen optarem coram exhibere Celeberrimo Walchii Consil. auct. quem in additamentis ad Hist. natural. Altenburgi 1774 editis primum à Guettardo loc. ibidem cit. esse video, qui Corallis hanc bivalvem Concham accenseat. Tom. 3. hist. natural Petrefactorum Cap. 4. pag. 218. Collegi illud ipsum ex Ericeto prope Keldenig, quod Cespitate jam decorticato, et in Cineres redacto pro Eissiacorum more in alternam fermentem preparandum, et aratro subigendum erat.

N. 185. *Piloliti* valva cucullata, Gynglimi Characteribus, et striis regularibus Concham intrus eberrantibus, eandem è Coralliorum Albo prescribentibus, reperi prope Sötenich.

N. 186. *Pilolitbi* valva cucullata in apicem paulò inflexum desinens ad oram latior, intus capacious sine operculo. erui ex *agris ibidem.*

N. 187. *Pilolitbi* valva oblongior, et ad apicem non nihil incurva, intùs farcta substantiâ calcariâ, immerso eidem Entrocho selenítico. reperi prope *Heistert in Eifflia.*

N. 188. *Pilolitbi* valva cucullo admodum curto, atque obtuso, cæterà latiore. Operculi sive valvæ hemicyclicæ superioris fragmentum proximè adjacens sive ejusdem sive alterius ejusmodi Conchæ valvæ. deprehendi prope *Kibnengberg* ad pagum *Sötenich.*

N. 189. *Pilolitbi* valva striis transversalibus accretionis successivæ forsitan signis è dorso planiore, ac depresso conspicuis. inveni prope *Call in Eifflia.*

N. 190. *Pilolitbi* valva Cuculliformis longior absque operculo, intùs farcta substantiâ argillaceâ indurata, sive massâ Conchacea coloris cinerei ad affrictum fœrente, reperi plurima ejusmodi

Specimina in Himmelsberg prope Keldenig.

N. 191. *Pilolithi* valva Cucullaris arcuata, ac lamellata. *ibidem.*

N. 192. *Pilolithi* cucullaris valva, intus nitidissime striata, ac massa Conchaceâ tubulis, trochiscis, ac testae fragmentis farcta. reperi ad fodinas ferri prope Keldenig.

N. 193. *Pilolithus* Cuculli mediocris figurâ, valvis binis ita clausis, ut altera distingui ab alterâ commode à quovis possit. *ex dantzberg* prope Keldenig.

N. 194. *Pilolithi* valva cucullata brevior, ventre depresso. reperi in Viciniâ pagi Weier in Eifflia.

N. 195. *Pilolithus* minor, formâ trigonali, ventre magis depresso. *ibid.*

N. 196. *Pilolithus* cuello largiore, apice aduncus. *ibidem.*

N. 197. *Pilolithi* plures varii moduli, similes jam indicatis. *ibidem.*