

SERIES OCTAVA.

Lapides Emmorphi ex transmutatione
animalium testaceorum sive univalvium,
sive bivalvium.

in COAGULIS.

expatriâ Iuliacensi et Montenfi.

N. 1. Massa lapidea coloris subfusci confata ex strom-
bis oblongis diversæ magnitudinis nativo corti-
ce passim vestitis, chamis lævibus hinc inde im-
mixtis. deprehendi haud procul *Monjaviâ*
vulgò *auf dem Venn*.

N. 2. *Chame* læves in Coagulo cum typo Turbi-
nitis in longum, et transversim striati.
ad Rhenum prope *Düsseldorfium*.

N. 3. *Hysterolithus* alatus cum illorum typis in la-
pide fusco prope *Lülstorff in Patr. Mont.*

N. 4. *Pectunculorum* varii typi in lapide fissili et
micaceo. prope *Hökeswagen in Patr. Mont.*

N. 5.

- N. 5. *Pectunculi* in lapide arenoso micaceo.
prope *Wipperfürth*.
- N. 6. *Terebratulæ* ventricosæ striatæ ex unâ parte,
ex alterâ earundem typi in arenoso micaceo.
prope *Lindlabr*.
- N. 7. *Pectinum* typi in lapide fissili haud procul
Solingâ.
- N. 8. *Hysterolithus* cum *Pectinum* typis in areno-
so micaceo. prope *Bechen è duc. mont.*
- N. 9. *Turbinitum* typi in lapide arenoso martiali
è monte *Comitum* prope *Gervesheim*.
- N. 10. *Chamæ* læves cum typo *chamæ* striatæ in
arenoso flavescente è *viciniâ Aquisgranensi* pro-
pe *Grondbauff*.
- N. 11. *Pectunculi*, (an *terebratulæ* striatæ ventri-
cosæ, an illarum typi ?) in coagulo. prope
Wipperfürth.
- N. 12. Eorundem varii typi in arenoso. *ibidem*.
- N. 13. *Chamæ* læves (an *tellinæ* ?) in lapide are-
noso

nofo ochraceo, è fabuleto. prope *Fimmendorff*.

- N. 14. *Chamulæ* læves cum matrice in lapide arenoso. prope *Cürten in Patr. Montensi*.
- N. 15. *Buccinulæ* læves minimæ in Galagmitte. prope *Lülsdorff* ad Rhenum.
- N. 16. *Hysterolitibi* cum *pectuncolorum* typis in arenoso. prope *Wipperfurtum* versus *Gimborn*.
- N. 17. *Cocblea* terrestris spiris lævibus, et varii *pectinum*, ac *chamarum* typi in lapide minerâ Martis imprægnato. prope *Gerresheim* è *Laudenberg*.
- N. 18. *Pectines* alati diversæ magnitudinis, et eorum typi, nec non *chamulæ* variæ, in lapide ochraceo micaceo. prope *Gerresheim* ad *Excelsa*.
- N. 19. *Strombitæ* transversim granulati in coagulo, chamis lævibus adnatis in Calcario nigricante. deprehendi prope *Röttgen* in *Tractû Monjaviensi*.

N. 20.

- N. 20. *Chamae* laeves in Coagulo minimae.
 è viciniâ *Bensbergensi*.
- N. 21. *Terebratulæ* alatae cum crustâ nativâ in Coagulo haud procul *Wipperfürth* versus limites *Schwarzenbergenses*.
- N. 22. *Chamae* laeves distortæ in Coagulo *Mühlbe-
 mii ad Ruram*.
- N. 23. *Terebratulæ* striatae cum fragmentis Crustae nativae in Calcario. è viciniâ *Bensbergensi*.
- N. 24. Nucleus *Terebratulæ* laevis oblongae, et Trochitæ varii cum Entrochorum typis in arenoso coagulo. prope *Cürten*.
- N. 25. *Hysterolitus* crustâ crystallinâ scintillante obductus in saxo præduro filiceo ad chalybem scintillante. prope *Lülsdorff ad Rhenum*.
- N. 26. *Pectinites*, et diversi Conchiliorum typi in lapide flavescente. prope *Tegelen ad Mosam*.
- N. 27. *Chamarum* striatarum, et variorum conchaceorum coagulum, *Turbinite* mediam partem immerso. prope *Aquisgranum*.

- N. 28. *Trigonellæ* in Calcario haud procul *Wip-
perfürth*.
- N. 29. *Terebratularum*, et *pectinum* (an *hysteroli-
thorum* ?) nuclei in lapide arenoso *ibidem*.
- N. 30. *Trigonellarum*, et *terebratularum* striatarum
varii typi in fissili, prope *Hökeswagen*.
- N. 31. *Pectinites* alatus striatus, striis ad oram la-
tioribus, pectunculo altero leniter striato incum-
bente, chamarum etiam, et conchiliorum varii
typi in lapide arenoso flavescente. è vicinia
Aquisgranensi.
- N. 32. *Terebratulæ* oblongæ læves, an earum nu-
clei in coagulo arenoso. prope *Lindlabr* è la-
tomiis *ibidem*.
- N. 33. *Pectunculi* striati sinuosi cum *Entrochorum*
typis diversæ magnitudinis in lapide arenoso.
è vicinia *Hökeswagen*.
- N. 34. *Chame* læves crustâ crySTALLINâ obductæ in
Coagulo. prope *Aquisgranum*.

- N. 35. *Chama lævis*, et *pectunculus* adhaerentes
coagulo conchiliorum. *ibidem*.
- N. 36. *Pectinum*, *Terebratularum*, nec non *Hysterolithi* satis alati, striati, lacunosi typi in lapide
arenoso micaceo. *ibid.*
- N. 37. *Hysterolithi* distorti in lapide arenoso, et
Pectinum typi in eodem. prope *Hökeswägen*.
- N. 38. *Terebratula* striatae, et earundem varia vestigia in Calcario. è viciniâ *Bensbergenfi*.
- N. 39. *Cochlea* terrestris, spiris admodum ventricosis lævibus, et *Pectinum* vestigia in lapide arenoso, crustâ martiali obducto. prope *Gerresbhemium*.
- N. 40. Varii typi *chamarum*, ac *pectunculorum* in arenoso micaceo, flavescente. prope *Erkerath*.
- N. 41. *Hysterolithibus* suæ olim testæ fulcos et commissuras hiantes limo lapidescenti impressa exhibens. repertus prope *Wipperfürth* in *Patt-Montensi*.

- N. 42. *Hysterapetra*, quæ deperdito testæ involuero
inhærescit lapidi arenoso. prope *Hökeswagen*
in *Patr. Mont.*
- N. 43. *Chamæ* bivalves circa ginglymum lacunâ
donatæ, cæterâ ventricosæ, *Trigonellis* similiores.
prope *Keldenig* in *Eiffliâ.*
- N. 44. *Hysterolithus* distortus nonnihil, immerfus
argillæ induratæ. prope *Wipperfeld* in *Patriâ*
Montensi.
- N. 45. *Conchæ anomie* nucleus alis longioribus stri-
atis, variisque *Trigonellarum* ac *Hysterolitho-*
rum typi in lapide coloris rubro - fusci, inveni
ad Rbenum prope *Lülstorff* in *patr. mont.*
- N. 46. *Chamæ* ventricosæ sive *Bucarditæ*, variæque
magnitudinis *Pectines* biauriti in lapide arenoso
Martiali. è monte *Comitum* prope *Gerresbem.*
- N. 47. *Cochlea* minor terrestris adhærescens Cal-
cario, *chamis* lævibus adnatis, reperi in agro
ad pagum *Paffrath* in *patr. mont.*

- N. 48. *Buccinites* in lapide calcario flavescente, adhærescentibus variis Conchiliorum, et Coraliorum typis. erui prope *Notberg in Patr. Juliacensi*.
- N. 49. Nucleus *Turbinitis* in massâ conchaceâ variis Conchiliorum typis hinc inde conspicuis. è vicinâ *Aquisgranensi*.
- N. 50. *Neritites* in lapide calcario, fungite adhærescente à latere, immerfus alcyonio. reperi prope *Bensberg in Patr. Mont.*

