


1 an

CONTINUATIO
JULIÆ
 ET
MONTIUM
 SUBTERRANEORUM,
 SIVE
 SUCCINCTUS
MINERALIUM
 INDEX,

QUÆ
 per utrumque Ducatum hinc inde de-
 tecta, erutaque, ac magnam par-
 tem Collecta servantur

in Museo
 FRANCISCI BEUTH, S. R. E. P.

Missionarii Julio-Montensis
 Amicorum Nat. Scrut. Berolinensium
 Sodalis honorar.



Düsseldorfii

Typis J. A. Zehnpfenning, S. E. Palat. Cancellitæ

1779.

Quodsi Collectiones singulares, quæ non raro in Privatorum manibus sunt, diligentius enarratæ publicum in usum referrentur, profecto paucis post annis ampla fieret Mineralogix, & totius historiae metallicæ accessio.

S. R. J. Eques à Born Lithophilacium
in Præfatione ad Lectorem.

SERENISSIMO AC POTENTISSIMO

PRINCIPI, ac DOMINO,

D. CAROLO THEODORO;

COMITI PALATINO RHENI,

SACRI ROMANI IMPERII

ARCHI-DAPIFERO

ET

ELECTORI,

UTRIUSQUE BAVARIÆ

JULIÆ, CLIVIÆ, ac MONTIUM

DUCI,

PRINCIPI MOERSIÆ,

MARCHIONI MONTIUM AD ZOOMAN;

COMITI

VELDENTIÆ, SPONHEMIT,

MARCHIÆ, ac RAVENSEBURGI,

DOMINO

IN RAVENSTEIN,

&c. &c. &c.

MAJESTATI AC POTENTISSIMO

PRINCIPIS AC DOMINI

FRANCISCO JOSEPHO;

COMITI PALATINO RHENO

SACRI ROMANI IMPERII

ARCHIEPISCOPO

ET

PRINCIPIS

DUCHATUSQUE BAVARIE

ILLUSTRISSIMO AC NOBILISSIMO

DUCE

FRANCISCO MOSE

MAJESTATI AC POTENTISSIMO

COMITI

REVERENDISSIMO AC

REVERENDISSIMO

DOMINO

IN AUSTRIA

AC

SERENISSIME
PRINCEPS ELECTOR,
CLEMENTISSIME DOMINE!



Materiam ad pagellas hasce
conscribendas necessariam
suppeditârunt Juliae &
Montium ducatus. Hausi itaque è pro-
prio SERENITATIS TUÆ Fonte: id quod
vel unicum me, si non ex aliis plurimis
capitibus officii mei commonerer, ener-
gicè satis hortabatur, ut tenuem hunc
A 3 qualem-

SERENISSIME
PRINCIPIS ELECTORIS
CLEMENTISSIME DOMINI

qualemcunque conatum ad ELECT.
SERENITATIS TUÆ pedes, qua par est,
animi demissione deponerem, Flu-
entorum secutus indolem, quæ grata
quodammodo ad Oceanum redeunt, à
quo suas aquas mutuuntur.

Hunc ego fructum inde me collectu-
rum sperem, ut, dum Mineralium Pa-
triæ Thesaurorum Synopsis, facta mihi
ad id antè gratiosissimâ potestate, Sere-
nissimis oculis perlustrandam propono,
singul-

singularem ELECT. SERENITATIS TUÆ,
tanquam patriæ Patris gratiam sim con-
secuturus, quâ erectus, fultusque mayo-
ribus deinceps animis pergam perscru-
tari, quæ è fertilissimo patrii soli sinu
pronascuntur, Deum optimum maxi-
mum indies orans, ut ELECT. SERENI-
TATEM TUAM in feros annos seruet inco-
lumem, ac publicæ Subditorum sibi salu-
tis Conservatorem, & Protectorem, nec
non studii Physio-mineralogici Fauto-
rem,

rem, Promotoremque munificentissimum perenni fœlicitate in terris augeat, atque æternâ dein in Cœlis gloriâ Meritorum exornet,

SERENITATIS TUÆ
ELECTORALIS

DEVOTISSIMUS CLIENS
FRANCISCUS BEUTH.

LECTOR
ATTENTIOLOGE!



Tribus abhinc annis sumptu meo prodiit Syntagma Fossilium variorum per Julia & Montium ducatus hinc inde repertorum, in quo breviter recensita, & Descripta preposui Subterranea potissimum petrificata, quæ quidem tunc servabantur in Museo meo.

Verebar equidem censoriam virgulam, quâ non in unâ ex novem, in quas Collectanea mea Dispescueram,

Serie

Serie me notatum iri putabam à Criticis; Verùm evasi integer, ac Censorum inveni uti incorruptos, ità aequitatis amantes, faventésque, sive Erfurtensium Relationes anni 1776 pag. 421, sive Celeberrimi Schröteri, cui debitor sum, solvissemque dudum pro viribus, nisi tanto locorum intervallo distingueremur, Ephemerides, Tom. 4. pag. 33. Weimariae 1777 edit. sive additamenta ad hist. natur. Tom. 2. 1776 Altenburgi edit. aliosque curiosius perferuter.

*Tanta interea temporis factae sunt ad omnem Classem accessiones, ut tertium imò quartum tantum Lithospororum oculis valeam offerre, atque inter illa quidem ejusmodi, quae
mih*

mihî certè in hunc diem incognita ac
fortasse paucis Lithophilis hucusque
visa, palàm ausim pronunciare, de
quibus in itâ in antecessum cum aqvis
rerum aestimatoribus accuratiore dis-
quisitione Lucubratiunculam aliàs
meditor communicare.

Modò ex Amicorum Consilio, ac
Minerosophorum, quos inter hoc lo-
co non immeritò Nobilem Dom. in
Busch, L. B. de Weipeler, à quo,
quidquid mineralium in ejusdem Mi-
nerophylacio hactenus reconditum ex
utroque Ducatu latuit, mecum scrip-
to communicatum fuit, gratus recen-
seam, prænobilis etiam D. Döring
in re metallicâ S. E. P. à Consiliis
adjutus auxilio, Mineralia mea ana-
lecta

lecta Julio - montensia ad indicis me-
dum Minerophilis proponens, spe-
rem id pari, quo Petrificata descrip-
si, Succesu futurum.

Certè, quò securius, ac rectius pro-
grederer, ope, & operâ, si unquam
aliàs, indigebam. Suppetias pro-
inde petii non nisi à Viris in hoc stu-
diorum genere versatissimis, ac ubi-
vis ferme celebratissimis, C. Cron-
stedto, Linnæo, Wallerio, Wolters-
dorffio, Baumero, aliisque, quorum
meritis, ac laudibus nemo unus, ni-
si in mineralogicis plane rudis, de-
rogaverit.

Utque nihil Lectori Benevolo vi-
dear celare, id fateor ingenuè, me è
Lithophylaceo, quod perillust. Ig-
natus

natus S. R. J. Eques à Born Fra-
gæ 1772 typis vulgari curavit, Deno-
minationes à Clafsicis authoribus in
hoc genere receptas, ac vel ab eodem
ipfo Cel. Metallographo à tantis Vi-
ris mutuatas excerpisse, quibus,
quidquid minerarum hinc inde ope-
rosè comportavi, seu mutuis commu-
tationibus ab amicis acquisivi, seu è
minerophylaceo antè nominati Ger.
Domini in hunc indicem asterisco no-
tatum intuli, clarius describerem,
distingueremque, nihil anxius, prop-
terea Plagiarii nomine notari, si uno
quasi ex ore Minerophiti loquere-
mur.

Audacior quidem ego exinde pos-
sem videri, cum verò aliis graviori-

~~obnoxi~~

bus

bus officii mei curis distento horas duntaxat subsecivas mihi liceret in hoc indice compilando collocare, non erat, cur erubescerem, quod viâ Duces, & Manuductores elegerim, quorum premendo vestigia extra aleam verjaret aberrandi à recto tramite.

Quodsi alicubi per Decursum hujus indiculi cœspitaverim, id quisque velim secum, mecumque reputet, humani nihil à me alienum esse, neque me esse Metallurgum, qui quævis juxta metallica artis Canones, ac præcepta exactè sciam Depingere, aut Metallicum, qui subterraneos cuniculos, eorumque Diverticula permeando propriis oculis perlustraverim unquam, aut minero-
phicum examen aliquando subierim;
quando-

quandoquidem hoc praesertim, quo vi-
vimus, auro, Metallici ea, quae usu,
& exercitiis quotidianis didicere, ita
pertinaciter sibi retinere videantur, ut
nihil ad propria commoda praepedi-
enda magis idoneum, quam cum aliis
scientiam suam dicam, an artis peri-
tiam communicare; è contra nihil ad
lucra propria facienda, amplifican-
daque conferre posse arbitrentur, quàm
sibi solis sapientes esse Metallarios;
quocirca vel ipsorum rei metallica
Praefectorum hodieum compluribus,
nedum mihi, acquiescendum instituti-
onibus iis, quae vel in proborum scrip-
torum tractatibus mineralogicis tra-
duntur, aut à Viris hac in re exerci-
tatoribus, genuinisque Metallosophis
cretenus explicantur.

Cate.

Cæterùm nil dubitem, quin prudens Lector tenuem opellam hanc vel ex hoc capite probes, quod circa ejusmodi corpora indicanda versetur, quorum ut accuratiorem Descriptionem Provincia quævis Metallorum ferax, ac tum præcipuè, si ad negotiationem ærariam promovendam conferre ubertim possit, non modo cum Indigenis, publica Patriæ emolumenta cordi habentibus, sed & omnibus, quibuscumque commercia fiunt, imò florere aliquando abunde possent, Extraneis circumcirca communicaret, perutile, imo pernecessarium esse permultis rerum gnaris videtur; quam quidem animadversionem * è Nob. Danielis Tiliassii

* Histor. mineral. Sueciæ Parad. german Edit. Lipsiæ pag. 7. & 8. 1767.

sii oratoriâ delineatione Historia naturalis Sueciæ, quam Bruckmannus è sueco jdiomate germanicam fecit, inferendam hoc loco non abs re putavi.

Indicem Analectorum ad Calcem apponere supervacaneum videbatur, quandoquidem in hoc ipso triplici, in quem hæc folia dispertivi, indice ea ad numeros recenseam omnia, quæ aut è Juliâ, aut è Montibus aservo. In primo quidem metalla perfecta, imperfecta in altero, in tertio demum phlogista mineralia, exactissimis Metallosophis, ad quos Te quàm humanissimè jure remitto, minerologicas suas relinquens Definitiones, Divisionesque, quibus seu adderem, seu subtraherem, aque temerarius forem,

B

Exscrip-

exscriptas verò si repeterem, ut ac-
tum agens meritò insimularer.

Vale.

Düsseldorfii Mense Junio, Die 21^a
Anno 1779.

Franciscus Beuth.

Missionarius Julio-Montensis.





I N D E X P R I M U S.

METALLA PERFECTA.

AURUM.

Julia, ac Montium Ducatus sat facun-
dos Metallis esse, pauci sunt, qui nes-
ciant. Sanè è solis fodinis Wildbergicis, & Heid-
bergenfibus (neque enim de aliis hucusque expe-
riri certi quidquam potui) ab anno 1718, quo
prima Metallicorum manus admota fuisse fertur
eruendis ibidem metallis, uti in monumentis au-
thenticis me nuper admodum legere memini, us-

que ad annum 1771, ad quem pertingentes duntaxat Tabulas inspexi, supra sexcenta & octoginta sex millia, nongentorum ac sexaginta Florenorum proventum fuisse scimus:

Fæcunditate tamen metallorum nobiliorum auri & argenti Patriam nostram Bohemiæ, Hungariæ, Saxonie, aliisque hoc titulo celebratissimis Regionibus facile cedere, lubens æque hic fateor, atque ante me in sua Oryctographiâ * Cl. Jacob. Bajerus de suo Norico idipsum concessi. Expertem tamen omnino auri argenti que non esse Patriam nostram cum eodem ausim dicere.

Larvato, ** vel Pyrite mineralifato, *** vel in Zinci minerâ latenti, ac non nisi per ignem educendo, non exiguis impensis suis Minerophili aliquot admovere manum, fortassis nihil dubitantes de secundis successibus, spebus suis conceptis paribus; verùm non respondit sumptui labor.

Sed

* Oryctograph. Noric. Edit. Norimberg. MCCCIX. pag. 91. C. X.

** Vid. à Born part. I. pag. 67.

*** Ibid. pag. 68.

Sed neque de Nativo, quod Rhenus hinc inde projectat, emolumenta, quod sciam, quæ sint operæ pretium, hucusque traximus. Certè destitutum propterea à nonnullis haud ità pridem fuit ab ulteriore indagine, ne aurum mercari auro viderentur, quod effodiendis, & elaborandis aliis minus nobilibus, quæ è finu Patriæ copiosè satis eruntur, metallis impendi utilius poterat, quod hic obiter duntaxat meminisse sufficiat.

Ex analectis meis indico sequentia.

- N. 1. Aurum nativum Rhenanum particulis minimis in arenâ flavescente fragmentis silicinis nigricantibus mixtâ. * è Rbeno prope Mündelheim in Ducat. mont. Satrap. Angermund.
- N. 2. Aurum nudum arenæ fuscae granularim admixtum. ** è Rbeno prope Cæsaris Insulas.
- N. 3. Aurum nativum nudum solum arenæ granulis majusculis, sed rarius immixtum. è Rbeno prope Steinen.

B 3 2 N. 4.

* Vid. à Born part. 2. pag. 108.

** Waller. pag. 411. §. 131. Spec. 304.

N. 4. Aurum Rhenanum granulis malleabilibus compressis, rotundis colore vel pallido, vel plumbeo arenæ mixtum. *prope Düsseldorfium.*

N. 5. Aurum nativum admixtum globulis minere ferri retractorii arenæformibus, nigricantibus. *ibidem.*

* Ex ejusmodi auro Rhenano, ad normam conventionis cusus est anno 1767 nummus, valore Ducatum æquans, è cujus parte adversâ videre est Caput Serenissimi Electoris Palatini sinistrorsum respiciens, cæsarie ad cervicem fasciâ leniter colligatâ, ejusdemque cincinnis in humerum dextrum defluis cum Epigraphe: CAR. THEODOR. D. G. C. P. R. S. R. J. AT. & EL. ex averâ verò Mannheimium munimentis cinctum Sole supra urbem radios dextrorsum vibrante; ultra cis præterfluentem Rhenum Metallicos, Pusionum formâ præcinctos, arenam auriferam curricula convehentes, sæcurnentes, ac prope Tabernacula sua cribrantes, cum inscriptione: *Sic fulgent Littora Rheni.* Inferius ad norm. conv. 1767.

* Onomatolog. hist. nat. Tom. 2. pag. 107.

ARGENTUM.

A **Argentum** è nobilioribus metallis ab auro primum & unicum paulò liberalius è fodinis patriis, sed non nisi in galenâ * se se eruendum offert.

Intra annos supra indicatos è fodinis Wild- & Heidbergensibus in Satrapiâ Windecensi Ducatus Montensis è galenâ prodiere supra novendecim argenti (*brandfilber*) marcarum millia trecenta & octodecim cum semunciis duodecim.

Galena hæc eliquata obtulit supra novendecim mille centum quinquaginta novem marcas, tres semuncias argenti depurati (*fein*) ac præterea centum, & sexaginta tres marcas argenti cum decem semunciis in ære puro (*gabr kupfer*) ad officinam monetariam remissas, centum ac triginta supra trecenta & octoginta sex millia florenorum pretium. Asservo sequentia.

* Vid. onomat. hist. nat. Tom. 1. pag. 722. argenti minera impropr., & ibid. pag. 723.

- N. 1. Galena, seu minera Saturni argentosa granulata, areis minoribus micans. *ad Dornschächtergang è fodinis Wildbergensibus.*
- N. 2. Galena argento dives prismatica, ac lamellosa. *ad Scheurenschächtergang. ibid. in Parochiâ Odenspiel.*
- N. 3. Minera saturni galenica argentifera, spatacea, ochrâ luteâ obducta. *ibidem.*
- N. 4. Galena argentosa crystallifata, maculis nigricantibus tinâta. *ibidem.*
- N. 5. Galena argentifera spatacea cum ærugine nativâ. *ibidem.*
- N. 6. Galena argento & sulphure mineralifata granulata, squammis majoribus, & minoribus micans cum ochrâ luteâ. *ibidem.*
- N. 7. Galena argentosa striata, sulphure mineralifata cum minerâ veneris, & quarzo colore flavescente. *ad Dornschächtergang. ibidem.*
- N. 8. Galena punctata argenti particeps admixtâ minerâ veneris. *ibidem.*
- N. 9. Galena texturæ chalybeæ, argento, arsenico, & sulphure mineralifata. *ibidem.*

- N. 10. Galena argentifera arcis majoribus & minoribus mixtis micans cum minerâ veneris flavâ, & sulphure, ferroque mineralifata, colore aureo nitente. *ibidem.*
- N. 11. Galena spathacea texturæ chalybeæ argentosa. *ibidem.*
- N. 12. Galena argento dives particulis minoribus micans, mineræ martis albicanti immixta. *ibidem.*
- N. 13. Galena argentifera testulis minoribus obliquè micans. *è fodinâ, tres fere boræ quadrantes à Wildberg. diffitâ.*
- N. 14. Galena crystallifata, crystallis solitariis hinc inde ornata, argento dives. *ibidem.*
- N. 15. Galena argentosa tessuris maximis. *ibidem.*
- N. 16. Galena argentosa cum spato cellulari crystallifata, crystallis columnaribus albis prominentibus. *ibidem.*
- N. 17. Galena argentosa micans, venis spatosis intercurrentibus variæ texturæ. *ibidem.*
- N. 18. Galena granulata arcis minoribus, argento admodum dives, centumpondio quadraginta se-

muncias argenti tenente. *prope Bensbergam in
Ducatu Montensi è fod. Sigenianis.*

N. 19. Galena squammis majoribus & minoribus
permixtis micans, centumpondio decem semun-
cias argenti ferente. *è fod. Sigenianis. ibidem.*



Plumbum

PLUMBUM.


 e Galenâ, ut argentosâ factâ mentione, jam de eadem, utpote plumbi minerâ: è quâ ex fodinis superius indicatis eodem temporis spatio prodiere post eliquationem supra triginta duo grumorum (metallici *klumpen* appellant) millia quadringenti, viginti & unus, qui simul appenderunt centumpondia supra triginta quinque millia, trecenta, quadraginta quatuor, quadraginta & sex pondo, pretio supra ducenta & quadraginta millia quadringentorum, & quadraginta florenorum: profecurus indicem, noto sequentia è Juliâ, & Montibus.

N. I. Tessera galenica, tessulis vel fragmentis distinctis cubicis majoribus micans, oblecta quarzo squammoso, & lamelloso, saxo simplici apyro quarzoso firmiter conjuncta, superficie Drusa quarzosâ flavescente, & quarzo crystallato

stallifato irregulari ornatâ. è *Ducatu Montenfi,*
Satrapiâ Windeck prope Eckenbagen.

- N. 2. Tesserâ galenica, ochrâ luteâ obrecta cum
drusâ spataceâ lamellosâ vitreâ. *ad altenblei-*
berg infra Mittelacher.
- N. 3. Tesserâ galenica cubica, cubis immixtis spa-
to vitreo semipellucido croceo crystallifata,
partim decumbentes, partim erectas oblongas
cubicas, & prismaticas lamellas repræsentans.
ibidem.
- N. 4. Quarzum crystallifatum irregulare croceum
cum diversis Tesseris galenicis polygonis. *ibi-*
dem.
- N. 5. Galena ressulata diversimodè figurata cum
drusâ quarzofâ, & spato vitreo lamelloso. *ibid.*
- N. 6. Drusâ spatacea vitrea lamellosâ crocea, figu-
ras cubicas, aliasque sagittis, lanceisque similes
referens. *ibidem.*
- N. 7. Drusâ priori similior. *ibidem.*
- N. 8. Quarzum crystallifatum irregulare, flavescens,
cum spato vitreo lamelloso particulis
plumbeis immixtis. *ibidem.*

N. 9.

- N. 9. Quarzum crystallifatum jam descripto accedens. *ibidem.*
- N. 10. Minera plumbi albescens crystallifata, lamellis hinc inde prominentibus cum terrâ precipitatâ ochraceâ. *è Satrapia Montenfi Winddeck, Parochiæ Odenspiel, ad Scheurenschächtergang in Wildberg.*
- N. 11. Minera plumbi spatacea alba, rhomboidalis, maculis nigricantibus pellucens cum ochrâ luteâ. *ibidem.*
- N. 12. Minera plumbi rhomboidalis, prismatica, & lamellosa. *ibidem.*
- N. 13. Minera plumbi notatæ similior, spatacea, polygona, adhærente ochrâ luteâ. *ibidem.*
- N. 14. Minera plumbi spatacea crystallis rhomboidalibus consita, ochra flavescente, & inquinante obductâ. *ibidem.*
- N. 15. Minera plumbi crystallifata, maculis nigrescentibus tinctâ, lamellis prismaticis & polygonis mixtis prominulis obducta. *ibidem.*
- N. 16. Minera plumbi ex albo grisea, solida cum ærugine nativâ, & ochrâ rubescente. *ibidem.*

N 17.

- N. 17. Galena granulata, squammis majoribus & * minoribus micans, sulphure mineralifata cum minerâ plumbi albâ spataceâ, & ochrâ lureâ. *ibidem.*
- N. 18. Galena striata, & granulata, arcis diversis micans, sulphure, & cupro mineralifata cum quarzo fragili, colore ex flavo viridescente. *ad Dornschächtergang in Wildberg. ibidem.*
- N. 19. Galena plumbi punctata, sulphure & cupro viridescente mineralifata. *ibidem.*
- N. 20. Galena plumbi, texturæ chalybeæ, sulphure, & arsenico mineralifata. *ibidem.*
- N. 21. Galena plumbi granulata arcis majoribus, & minoribus micans cum minerâ cupri flavâ, sulphure, & ferro mineralifata, colore aureo, ac variegato nitente. *ibidem.*
- N. 22. Galena plumbi granulata arcis mixtis, mineræ ferri albæ immixta, spatiformis, *ad Dornschächter. ibidem.*

N. 23.

* Vid. Laur. Balek in Continuatione Selectarum ex amcenitatibus academicis Carol. Linnæi dissertationum Græcii edit. 1766. pag. 243.

- N. 23. Galena granulata texturæ chalybeæ particulis minoribus micans. *ibidem.*
- N. 24. Quarzum arenaceum, & cryftallifatum cum galenâ fragmentis distinctis cubicis majoribus micante, ærugine nativâ, & minerâ plumbi alba spatæa immixta. *prope Mittelacher ad Schulbüschgen.*
- N. 25. Minera plumbi rubescens, cubica. *prope Eckenbagen in Duc. Mont.*
- N. 26. Minera plumbi cryftallis pyramidalibus obsita. *ibidem.*
- N. 27. Minera plumbi tessulis obliquè splendentibus in quarzo fusco. *ibidem.*
- N. 28. Minera plumbi tessulis aggregatis, cryftallis spatæis obsita. *ibidem.*
- N. 29. Galena plumbi opaca cryftallis foliaceis largioribus, colore subflavescente. *ibidem.*
- N. 30. Drusâ mineræ plumbi, cryftallis spatæis nigricantibus obsita in matrice quarzosa. *ad Blumengang. ibidem.*

- N. 31. Minera plumbi opaca in quarzo, tesseriis majusculis cum lamellis spataceis, colore nigro & albo alternantibus. *ibidem.*
- N. 32. Chaos tessulare mineræ plumbi crystallis crassioribus pellucidis, adhærens marrici quarzosa. *ibidem.*
- N. 33. Drusa galenica crystallis albis sparosis capillaribus, longioribus erectis, aggregatis. *ibid.*
- N. 34. Galena plumbi tesseriis polygonis, granulis minimis in marice quarzosa colore è flavo fusco. *ibidem.*
- N. 35. Galena areis minoribus micans in lapide corneo albescente. *ibidem ad Fabrenberg.*
- N. 36. Drusa quarzosa cubis majoribus & minoribus mixtis, eorumque fragmentis quarzo immixtis. *ibidem.*
- N. 37. Galena plumbi particulis minimis cum plumbagine * *ad Wildberg.*

N. 38.

* Vid. Wall. pag. 377. Spec. 283. §. 125. N. III.

- N. 38. Pseudogalena picea cum galenâ granulatâ
areis minoribus micans. *è fodinis Sigenianis
prope Bensbergam in Ducatu Mont.*
- N. 39. Galena plumbi, granulis minoribus & ma-
joribus mixtis. *ibidem.*
- N. 40. Galena plumbi in matrice quarzi fusci.
ibidem.
- N. 41. Galena plumbi friata. * *ibidem.*
- N. 42. Plumbum sulphure & arsenico minerali-
satum in minerâ pinguiore fere malleabili. *ex
Obercaldenb. versus dinast. Schwarzenberg - Gimb.*
- N. 43. Plumbago metallica tessulis majoribus mi-
cans crystallis polygonis flavescens obdu-
cta. ** *prope Lintorff in Satrapiâ Angermund
in Duc. Mont.*
- N. 44. Galena plumbi areis minoribus micans.
ibidem.
- N. 45. Galena plumbi tessulis majoribus obliquè
resplendens in massa spatacea. *ad Beimesdorff
in Satrap. Mettman, Ducat. Mont.*

C

N. 46.

* Wall. spec. 282. N. 10.

** Vid. Waller. pag. 375. spec. 282. N. 1.

- N. 46. Plumbum adhærens, & immixtum fluori minerali albescenti pellucido polygono. è *Satrapia Angermund in Duc. Mont.*
- N. 47. Drusa mineræ plumbi viridis, mixta minerâ Cupri terræ. ex *Ericeto prope Keldenig in Satrap. Monast. Effl. Ducat. Juliac.*
- N. 48. Minera plumbi Spatacea involuta plumbagine. *ibidem.*
- N. 49. Minera plumbi Spatosa solida, argillæ intimè mixta, * colcre rubescente, fractura nitente. *prope Kall in Eiffia.*
- N. 50. Ejusdem varietates complures. *ibidem.*
- N. 51. Minera plumbi in spato, argillæ subflavescenti sensim admixta. *ad Lieberg prope Keldenig.*
- N. 52. Minera plumbi argillæ insensibiliter immixta colore ex flavo albescente. *ibidem.*
- N. 53. Minera plumbi albescens stratosa, dives centumpondio supra octoginta libras plumbi conferente. *ibidem in Ericeto.*

N. 54.

* Onomatolog. hist. nat. pag. 606. Waller. spec. 287. pag. 381. & seq.

- N. 54. Minera plumbi spatosa, argillæ pallidè rubescenti sensim mixta. *ibidem.*
- N. 55. Galena tessularis cubis irregularibus adherente quarzo ex flavo fusco. *prope Call in Eißliä.*
- N. 56. Galena tessularis in matrice squamosa calcaria. *ibidem ad Kallbach.*
- N. 57. Galena plumbi in lapide spatoso selenitico. *ibidem.*
- N. 58. Galena plumbi areis minoribus, minerâ Lunæ sulphuratâ mineralisata, ad chalybem scintillans. *è fodinis Meinerzbagensibus baud procul Bleibur in Eißliä.*
- N. 59. Galena plumbi sulphure & ferro mineralisata in matrice arenosa flavescente. *prope Sötenich in Eißliä.*
- N. 60. Galena plumbi cubis & granulis minoribus in matrice quarzosa, & arenosa. *prope Maelsbenden in Eißliä.*
- N. 61. Galena plumbi dives, in matrice quarzi fusci, areis majoribus, inspersis minoribus micans. *prope Heistert in Eißliä.*

N. 62. Galena plumbi particulis cubicis * exiguis
& granulatis mafsæ arenaceæ albefcenti mixtis.
prope Bleibur ad Bleiberg.

N. 63. Minera plumbi spatacea borryires argillæ
albæ intimè mixta. *ex Ericeto Keldenichio ver-*
fus Heiftert.

N. 64. Minera plumbi spatacea argillæ partim al-
bæ, partim ex flavo rubefcenti intimè mixta, **
ibidem. Metallici hic appellant *Leimerz-Blei-*
erde. Centumpondium dat plumbi libras 60.
ad 70.

N. 65. Tefseræ galenicæ cubicæ aggregatæ ex
Danzberg ochra Martis perfufæ. *in Eifflid.*

N. 66. Tefsera galenica cum minera plumbi alba
spatacea obliquè splendentè. *ad Krifch prope*
Call in Eifflid.

N. 67. Minera plumbi galenica mafsæ silicinæ
arenaceæ albæ granulatim infperfa. *ad Kuden-*
berg versus Bleibur in Eifflid.

N. 68.

* Waller. pag. 377. §. 125. animadver. post N. 10.

** Vid. Wall. spec. 287. pag. 381.


- N. 68. Complures ibidem variationes, particulis minimis disjunctis in massâ friabili arenosâ. *ibidem.*
- N. 69. Plumbum spatosum ponderosum crySTALLI-
fatum, crySTALLIS albis polyædris apice trunca-
tis, admixta crustâ martiali arenaceâ flavescente.
ad Callbach in Eisslâ.
- N. 70. Galena plumbi stratosa, è rimis petræ cal-
cariæ spatosæ eruta. *prope Notberg in Duc.*
Juliac.
- N. 71. Galena plumbi cubis majoribus lamellofis
aggregatis oblique micans, adhærente ochrâ
flavâ. *ibidem versus Gressenich.*
- N. 72. Minera plumbi in massâ verosimilius Vul-
caniâ spongiosa, insistentibus eidem crySTALLIS
hexagonis spatocis. *ad Gressenich in Duc. Jul.*
- N. 73. Minera plumbi areis majoribus, lamellosâ
ochra martis perfusa. *ad Duvelar prope Stoll-*
berg in Duc. Jul.
- N. 74. Galena plumbi cubis majoribus & minori-
bus mixtis hinc inde inspersis cum minerâ zin-
ci terreâ. *prope Stollberg.*

- N. 75. Galena plumbi tessulis polygonis accumulatis obliquè splendentibus. *prope Partbenonem in Wenau in Duc. Jul.*
- N. 76. Galena plumbi sulphure, & ferro mineralifata, particulis cubicis micans ochrà flavâ perfusa. *ibidem prope Wenau.*
- N. 77. Galena admixta pyriti martiali, five sulphuri ferro mineralifato. *prope Mausbach in Duc. Jul.*
- N. 78. Galena plumbi cæfio-nigra cubis minoribus splendens. *ad Fuschenkaul versus Mausbach.*
- N. 79. Minera plumbi galenica tessulis minoribus confusè aggregatis resplendens, sulphure mineralifata, ochra Martis luteâ perfusa. *ad Mausbacherhoff prope Eschweiler in Duc. Jul.*
- N. 80. Galena plumbi in Spato, Sulphure & ferro mineralifata, particulis fractis massâ ochraceâ confusè conglutinatis, fractura scabra. *ad Wolfart.*
- N. 81. Minera plumbi spatacea opaca cum minerâ zinci terreâ. *prope Mausbach.*
- N. 82. Minera plumbi cum ferro, & minerâ zinci flavescente. *ad Ortbusch.*

N. 83. Drusâ mineræ plumbi viridis, mixta minera cupri terrea, & ochrâ Martis luteâ. *prope Radt in Eifflid.*

N. 84. De Galenâ pauperum Linn. varias affervo portiones, passim effossas in Ericeto Kalenbergensi ad Siftig, Fohr, Höffling, Entensufs, Farbhaufs, Gluckstadt, quæ cum præter paucum plumbum vix quicquam contineant, non nisi ad vasa fictilia vitro incrustanda (*zu glafirungen*) * adhibentur.

N. 85. Subnecto hic Lythagyrum ** è minerâ plumbi Wild- & Heidbergensi proveniens, ex quo sive flavo vel Chrysite, sive albo, vel Argyrite spatio annorum superius notarorum prodiere nongenta sexaginta sex centumpondia, supra septem millia centum & quadraginta septem florenorum pretium.



Cuprum.

* Vid. Cronstedt. §. 189. pag. 207.

** Vid. Waller. pag. 571. §. 14. Spec. 27. N. 5.

CUPRUM.

Ducatus Minerâ Martis, quam in fodinis Ducatus Montensis mineræ Saturni passim conjunctam, ac paulò liberalius, quam in Ducatu Juliacensi se offerre; sed in hoc præ illo ad aurichalcurgiam magis conferre apud Stollbergenses nominatim deprehendimus, è fodinis jam sæpius laudatis supra mille ducenta, ac triginta septem centurumpondia, florenorum supra quinquaginta & tria millia ducentorum & quadraginta pretium profluxisse, in pugillaribus, & alibi notatum reperi, Callensium, Gressenichiorum, Vlattensium, aliarumque fodinarum in Juliâ ex Cupro Proventuum computationibus annuis heic silentio præteritis.

Adscribo ex Analectis meis sequentia.

N. 1. *Ærugo nativa terrea. è Ducat. Mont. Satripiâ Windeck. Parochia Eckenbagen.*

N. 2.

- N. 2. *Ærugo* nativa, five ochra Cupri viridis, *
in Matrice fuscâ quartzosa. *ex Mittelacher in*
Ducat. Mont.
- N. 3. *Ærugo* nativa opaca colore partim cæru-
lescente, partim viridi, in matrice spari albican-
tis. *ibidem.*
- N. 4. *Ærugo* nativa plumosa in minerâ cupri
terreâ colore subfusco. *ex Ruppichtrath in*
Duc. Mont.
- N. 5. *Ærugo* nativa plumosa in minera cupri
flavescente quartzosâ. *ibidem.*
- N. 6. Ochra Veneris solida crystallifata seu lapis
Lazuli. ** *prope Platten in Eiffliâ.*
- N. 7. *Ærugo* nativa solida, five Malachites. ***
prope Schmidten in Eiffliâ.
- N. 8. Cæruleum montanum immixtâ ærugine na-
tivâ in matrice arenosâ quartzosâ colore fusco.
ibidem.

C 5

N. 9.

* à Bern part. I. pag. 105.

** Vid. Baumer. part. I. pag. 407. & 408. §. 12.

*** Baumer. *ibid.* pag. 409. §. 14.

- N. 9. Cæruleum montanum superficiale, & granularum * *prope Platten. ibidem.*
- N. 10. Drusa æruginis nativæ virescens mixta cæruleo montano crystallis quarzosis adnatis. *ibid.*
- N. 11. Ærugo nativa solida nitens. *baud procul Nidecâ.*
- N. 12. Drusa opaca Veneris, sive æruginis nativæ colore cæruleo immixto cum ochra Martis lutea. *è Satrap. Monast. Eißl. prope Keldenig in Ericeto.*
- N. 13. Minera cupri flava cum Chryfocolla Agricolaë, sive ærugine nativa ** & cæruleo montano in Quarzo. *prope Ruppichtrath in Sa-traj. Blanckenberg.*
- N. 14. Minera cupri opaca, immixtis cupro lazureo plumoso, & ærugine in minera Veneris terrea colore subfusco. *ibidem.*
- N. 15. † Minera cupri flavescens opaca, in quarzo albo, & marmore griseo. *ibidem.*

N. 16.

* Vid. Waller. pag. 361. §. 123. Spec. 270.

** Waller. 358. Spec. 269. & Bajer. oryct. Nor. pag. 94.

- N. 16. Minera cupri viridescens cum æruginè in lapide quarzoso, & cæruleo montano superficiali. *ibidem.*
- N. 17. Minera cupri hepatica fulva, sulphure, & ferro mineralisata. è *Ducat. Mont. ad Wildberg. Scheurenschüchbergang. paroch. Odenspiel.*
- N. 18. Minera cupri viridis, æruginè nativâ plumosa admixta, sulphure, & ferro mineralisata. *ibidem.*
- N. 19. Minera cupri hepatica, ferro, cupro, plumbo spatoso, & sulphure mineralisata, aspersa æruginè nativâ, admixto pyrite Veneris ex flavo viridescente. * *ad Schulbüschgen è fo. linis ex adverso Mittelacher.*
- N. 20. Minera cupri flavescens, sulphure & ferro mineralisata, colore aureo nitens cum galena argentifera granulata, areis diversæ magnitudinis micans. *ad Wildberg Dornschüchbergang in Satrap. Windeck.*
- N. 21. Minera cupri, sulphure, arsenico & ferro mineralisata. *ibidem.*

* Vid. Cronstedt. pag. 213. §. 196.

- N. 22. Minera cupri flava solida cum minera cupri hepatica flava. è *Josina prope Mittelacher.*
- N. 23. Minera cupri subflava arsenicalis cum quarzo. *ibidem.*
- N. 24. Minera cupri colore jridis. *prope Lindlabr in Ducat. Mont.*
- N. 25. Minera cupri cum ochra ferri. *prope Lamersdorff in Monjaviâ.*
- N. 26. Minera cupri inspersa ærugine nativa cum minera ferri ochracea. Variationes plurimæ. è *Satrap. Nidecensi prope Keldenich.*
- N. 27. Quarzum irregulare colore flavo, maculis cupri, & plumbi granulis hinc inde aspersis. è *fodinis prope Bensbergam jam fere desertis.*



FERRUM.

Quanta sit hujus Metallī in Ducatibus Ju-
 liae, & Montium copia, abunde prodit
 fodinarum Caldenbacensium, Bornefeldensium, Stein-
 bacensium, Windecensium, aliarumque Multitudo,
 officinarum item ferrariarum apud Sohlingenses,
 Remscheidianos, aliósque per omnem latè Patriam
 Montensem frequentia. Ferrariae idipsum non mi-
 nus probant in Juliâ Fodinæ, quas per iudicis hu-
 jus decursum inditis eisdem, ac jam tum quasi pro-
 priis nominibus indigitavi, è quibus dives admo-
 dum Ferri minera circumcirca effosa ad fornaces,
 focos, melleósque Simonis-Callenses, Schevenhüt-
 tenses, Junckerlenses, Gemundanos jam à trecentis
 annis sub Wilhelmo, septimo Juliae, quarto Mon-
 tium Duce G. M. notos excoquenda, ac funden-
 da ingenti singulis annis copia convehitur, ex qua
 aliqua-

eliquatum dein, ac fufum Metallum aut in mollius, aut in durius temperatum, prout in ufus varios deftinatur, cùm aliud Enfes, aliud Limæ, aliud Arma in tutelam paranda sibi expoftulent, in milenarios, sive domesticos, sive agrestes ufus in centenis quaquaverfum officinis aptatur, in - & Accolarum commodo incredibili.

Specimina indico fequentia.

N. 1. Minera ferri alba spatofa. * *ad Wildberg è Dornschächtergang in Ducat. Mont. Satr. Windec.*

N. 2. Minera ferri albicans commixta mineræ cupri flavæ. *ibidem.*

N. 3. Hæmatites globularis borryitim concretus è *Satrap. Steinbâc. Paroch. Engelskirchen in Duc. Mont.* Ferrum inde elicatum post iteratam in foco ferrario recoctionem, chalybem præbet optimæ indolis. *am*

N. 4. Minera ferri solida globosa, fracturâ glabrâ. *ad Kauertz vulgò 15 Lomenphälen in Ober-*

* Vid. quæ L. B. ex Cl. Poda in Edit. græcensi 1766. in continuat. amænit. academ. Linnæi pag. 243. citat.

Obercaldenbach. in Duc. Mont. Centumpon-
dium fert libras 70 ad 80.

- N. 5. Minera ferri nigricans cum micâ martiali.
è fodinis *Litzianis. ibidem.*
- N. 6. Minera ferri albicans. *ad Eichenbövergang*
prope Remscheid, in Satrap. Bornefeld. Duc.
Mont. in crudam nihil agit Magnes, tostæ
vero pulveres ab eodem trahuntur.
- N. 7. Minera ferri è cinereo nigricans. *ibidem.*
binæ jam notatæ Mineræ Martis species igni
applicatæ facilius liquantur. in tigillis proba-
torii examinatæ dant libras ferri 60 ad 70.
paratur ex eadem optimæ notæ chalybs.
- N. 8. Hæmatites nigrescens cubis aggregatis mi-
cantibus. *prope Caldenbach.*
- N. 9. Hæmatites figurâ planâ, fracturâ fibrosâ
nitente. *ex Obercaldenbach. ibidem.*
- N. 10. Hæmatites turriculis, columnis, ac varia
textura oblitus, colore ex nigro nitente. *ibid.*
- N. 11. Hæmatites † nigricans, stiriacformis, cel-
lulis aggregatis. *ibidem.*

N. 12.

- N. 12. Hæmatites globosus colore cinereo-cæruleo. *ibidem.*
- N. 13. Hæmatites colore variegato, globosus fractura tum glabra, tum fibrosa. *ibidem.*
- N. 14. Hæmatites globosus solidus, fractura glabra. *prope Bendorff.*
- N. 15. Hæmatites globosus flavescens. *ex Kemmerich versus Gimborn.*
- N. 16. Hæmatites stiriæformis, tubulis aggregatis, croco fusco incrustatus. *è Duc. Mont.*
- N. 17. Magnesia * nitens colore è nigro-griseo *prope Wipperfürth in Ducat. Mont.*
- N. 18. Minera ferri figurata, sive hæmatites ** botryites. *ad Palmbaum è fodinis Callensibus in Satrap. Monast. Eißl. in Duc. Juliac.*
- N. 19. Hæmatites specularis *** contortus, crusta ochracea hinc inde rectus. *ad Mickenschaaf in Ericeto. ibidem.*

* Vid. onomat. hist. natural. Tom. 5. pag. 12. & Waller. pag. 345. §. 121. Spec. 264.

** Vid. Waller. pag. 337. n. 6.

*** Waller. Spec. 257. pag. 335.

- N. 20. Hæmatites niger globosus. *ad Kalb. ibid.*
- N. 21. Hæmatites cellulosus colore subrubescente
ad Niederlafs. ibidem.
- N. 22. Hæmatites cellulis aggregatis colore par-
tim rubescente, partim flavo. *ad Ginzenberg
ibidem.*
- N. 23. Hæmatites globosus globulis accumulatis,
fractura arida. *ad Lindenbaum. ibidem.*
- N. 24. Hæmatites cristatus, colore in superficie
flavo, fractura lamellosa. *ad Schürnerhoff ibid.*
- N. 25. Hæmatites in argilla indurata flavescente,
dendroides. *ad Renkessel. ibidem.*
- N. 26. Hæmatites solidus nigrescens, ochra fla-
vescente passim aspersus. *ad Pantertbier. ibid.*
- N. 27. Hæmatites bracteatus cellularis * *ad Kalb
in Ginzenberg.*
- N. 28. Hæmatites lamellosus cum spato crystalli-
faro colore flavescente. *ad Kirschebaum. ibid.*
- N. 29. Hæmatites globosus superficie glabra *ad
Schmidtgen ibid.* Centumpondium amittit to-
stione libras 40. D

* Waller. Spec. 258. pag. 337.

- N. 30. Hæmatites dendroides, fractura fibrosa.
ad Grünewald. *ibidem.*
- N. 31. Hæmatites turritus stillatitius nigrescens.
ad Glücksberg in Sylva. *ibidem.*
- N. 32. Hæmatites botryites, fractura arida. ad
Hülle prope Kappekul. *ibidem.*
- N. 33. Hæmatites testaceus fatiscens, fractura ari-
da. ad Kirschbaum prope Kappekul.
- N. 34. Hæmatites cellulofus lamellis sparosis in-
tercurrentibus, fibris aggregatis prominulis.
ad junge daube. *ibidem.*
- N. 35. Hæmatites crystatatus polymorphus, colore
partim rubescens, partim nigricans. ad Hof-
selkaul. *ibidem.*
- N. 36. Hæmatites stillatitius turritus fractura arida.
ad alten Pallaß in Sylva. *ibidem.*
- N. 37. Hæmatites cellulis specularibus, fractura
partim striata, partim arida, superficie fusca
ochracea inquinante. ad Mabl Mühl in Sylva
ibidem.
- N. 38. Hæmatites ætites callinis mobili. ad Has-
pelbaum. *ibidem.*

- N. 39. Hæmatites granulis prominulis obsitus, colore hyalino variegato. *ad Gallbach prope Call.*
- N. 40. Hæmatites fractura fibrosa, turriculis è superficie glabra surgentibus, colore nigro nitente. *ad Gutesstein. ibidem.*
- N. 41. † Hæmatites regulum Martis referens, ac cum eodem similis coloris, fractura glabra. *prope Heistert in Eiffliä.*
- N. 42. Hæmatites è nigro splendens, adhærens Brecciæ, fractura striata ac fibrosa. *ad Kubl-
bach. ibidem.*
- N. 43. Hæmatites scoriam referens, granularus, colore chalybeo. *prope Steinfeld.*
- N. 44. Hæmatites colore subfusco, pectiniformis ac cellulofus. *ibidem.*
- N. 45. Hæmatites figura plana, è superficie colorem jridis, seu caudæ Pavonis referens, in angulos rhomboidales definens, fluore albo crystallino obductus, fractura fibrosa. *ad Breidè
prope Keldenig.*
- N. 46. Hæmatites globosè in drusam ascendens. *ibidem.*

- N. 47. † Hæmatites drusiformis, rubescens, marginibus cærulefcens, fractura arida. *ibid.*
- N. 48. Hæmatites geodes, inclusa argilla alpicante indurata mobili, fractura glabra. *ex Ericeto prope Keldemig.*
- N. 49. Hæmatites polymorphus turritus, tubulis aggregatis, è quibus à latere striæ tenuissimæ transversim excurrentes se produnt. *ad Bergwerck. ibidem.*
- N. 50. Hæmatites colore cinereo, trochitarum typis hinc inde conspicuis, fractura arida. *ad Schmidtgen. ibid.m.*
- N. 51. Hæmatites dendroides, tritura cærulefcente inquinante, fractura arida. *ad Niederlass. ibidem.*
- N. 52. Hæmatites polymorphus cum typis milliporeticis. *ad Gluckauff. ibidem.*
- N. 53. Hæmatites Botryites fatiscens fractura arida, adhærente argilla indurata, colore purpurascens. *ad Finck. ibidem.*
- N. 54. Hæmatites turriculis accumulatis è lacunis hinc inde assurgentibus, ochra flavescente aspersus. *ad Büchenbäumen. ibidem.*

- N. 55. Hæmatites solidus particulis fibrosis aggregatis, variæ texturæ, colore jam nigro, jam flavo. *ad Breid. ibidem.*
- N. 56. Hæmatites globosus è rubro flavescens. *ad Fried. ibidem.*
- N. 57. Hæmatites botryites colore fusco fatiscens *ibidem.*
- N. 58. Hæmatites dendriticè pictus, cum argilla indurata, colore fusco. *ad Rothebeck. ibidem.*
- N. 59. Hæmatites hipuritibus, typis chamarum lævium, & striatarum, ac tubiporis circumcirca obsirus colore fusco - pullo. *ad Lieberg. ibid.*
- N. 60. Hæmatites globosus, globulis oblongis stilletatiis oberrantibus, crustâ ochraceâ flavescente obductus. *ad Fincken. ibidem.*
- N. 61. Hæmatites coralliis punctatis Escharæformibus in argillâ induratâ, minerâ Martis imprægnata colore fusco, & flavescente. *ibidem.*
- N. 62. Hæmatites globis majoribus solitariis, ac minimis accumulatis hinc inde vagè obsirus, fractura arida. *ad Kirschbaum. ibidem.*

- N. 63. Hæmatites botryites fractura arida, ad
Breidt. ibidem.
- N. 64. Hæmatites hemisphæricus fractura glabra
colore subflavescente. *ibidem.*
- N. 65. Hæmatites turritus, turribus, ac fistulis ag-
gregatis opus gothicum æmulantibus. ad *Frö-
ling prope Keldenig.*
- N. 66. Hæmatites cylindræus stillaritiis * cy-
lindris aggregatis. ad *Claus in Ericeto. ibid.*
- N. 67. Hæmatites solidus botryites, fractura gla-
bra, colore è pallido rubeſcente. ad *Pantber-
zbier. ibidem.*
- N. 68. Hæmatites turritus fractura lamellola, arse-
nico nudo albo protuberante. **
- N. 69. Hæmatites stillaritiis ochra perfusus, in-
quinans, cylindris aggregatis. ad *Brezel. ibid.*
- N. 70. Hæmatites fatiscens micans sulphure mi-
neralifatus, fractura arida. ad *Danzberg.*
- N. 71. Hæmatites cylindricus, cylindris dense co-
hærentibus, ochra flavescente obductus. ad
Kröjel. ibidem.

* à Born. part. I. pag. 120.

** Onomatolog. hist. nat. Tom. I. pag. 793.

- N. 72. Hæmatites botryites singularis, stylo ferreo læsus rubescit. *ad Blæser. ibidem.*
- N. 73. Hæmatites botryites solitarius, ochra pulverulenta inquinante obsirus. *ad Knörschelbeck. ibidem.*
- N. 74. Hæmatites cellulosus, porosus, quarzosa crusta obductus. *ad alte Brezel. ibidem.*
- N. 75. Hæmatites cærulescens, granulis prominulis micantibus, fractura resplendente. *ad Niederlafs. ibidem.*
- N. 76. Hæmatites subglobosus, fractura porosa: è fodinis Klermondianis prope Keldenig.
- N. 77. Hæmatites polymorphus, globulosus flavescens. *ibidem.*
- N. 78. Hæmatites ex unâ parte globosus, turritus ex alterâ, ochra subflavescente perfusus. *ex Ericeto. ibidem.*
- N. 79. Hæmatites turritus, turriculis densè sibi incumbentibus, texturæ fibrosæ, flavescens. *ibid.*
- N. 80. Hæmatites granulis lævibus colore nigro nitens, crusta ochracea hinc inde obductus. *ad Printer. ibidem.*

- N. 81. Hæmatites hemisphæricus solidus, fractura arida, colore tum nigro, tum flavescente. *ad Glückstein. ibidem.*
- N. 82. Hæmatites solidus botryites colore nigro splendente. *ad Wasserkaul. ibidem.*
- N. 83. Hæmatites lamellosus colore è nigro rubescente, fractura fibrosa. *ad Læbr. ibid.*
- N. 84. Hæmatites globosus colore rubicundo, fractura glabra. *ad pagum Keldenig.*
- N. 85. Hæmatites solidus globosus, globis nitentibus, fractura glabra, colore nigricante. *ibid.*
- N. 86. Hæmatites globosus, superficie nitente, fractura fibrosa. *ibidem.*
- N. 87. Hæmatites botryites fatiscens, fractura arida, tritura rubens, coloribus, nigro, cinereo, rubescente, & flavo mixtis. *ad pagum Dotten versus Keldenig.*
- N. 88. Hæmatites organiformis, fistulis majoribus, ac minoribus aggregatis. *ad Danzberg prope Keldenig.*
- N. 89. Hæmatites solidus niger superficie splendente, ochra flavescente reticulatim oberrante. *ad Heidenköpf. ibidem.*

- N. 90. Hæmatites rugosus, solidus micans, fractura arida. *ibidem.*
- N. 91. Hæmatites colore hyalino, tuberculis lævibus obsitus, particulis quarzi albi hinc inde adnatis, fractura porosa. *ex Ericeto. ibidem.*
- N. 92. Hæmatites, turriculis aggregatis obliquè è fundo surgentibus adinstar montis opere gothico turriti. *ad Danzberg. ibidem.*
- N. 93. Hæmatites solidus superficie crystallis polygonis obducta, fractura arida. *ibidem.*
- N. 94. Hæmatites subflavescens crystallifarus * crystallis cubicis obsitus. *ad Scheid. prope Mausbach in Satrap. Eschweiler.*
- N. 95. Hæmatites drusiformis, ochra flavescente, eidem incumbente crusta nigricante, & ærugine nativa obsitus. *ad Wasserkaul in Ericeto prope Keldenig.*
- N. 96. Hæmatites scoriæformis, globulis aggregatis obductus. *ad Printer. ibidem.*

N. 97.

D 5

* à Born. parl. 1. pag. 120.

- N. 97. Hæmatites sphaericus, ætites embrione mobili, ochra colore croceo inquinante obtectus. *ad Gallbach prope Call.*
- N. 98. Hæmatites nigricans superficie conis minimis aggregatis obsita, fractura fibrosa. *ibid.*
- N. 99. Hæmatites stillatitius, globulis granularis aggregatis, colore ex fusco flavescente, fractura rugosa. *ad Lohr. ibidem.*
- N. 100. Hæmatites drusicus dendroides prominentiis aristiformibus, fractura scabra. *ex Ericeto ibidem versus Soetenich.*
- N. 101. Hæmatites rugosè turritus fractura glabra, colore fusco. *ibidem.*
- N. 102. Hæmatites globosus botryites typis trochiformibus fundo nigricanti impressis obductus, *ad fodinas Klermondenses. ibidem.*
- N. 103. Hæmatites amorphus fractura arida, argentine nativa, & plumosa, & ochra Martis lutea hinc inde perfusus. *ad Gallbach.*
- N. 104. Hæmatites botryites colore rubescente fractura glabra. *ad Buchbäumgen. ibidem.*

- N. 105. Hæmatites amorphus fractura lamellosa, ochra rubra pulverulenta inquinante perfusus, crusta ochræ fuscæ induratæ hinc inde eandem obtegente. *ad Siffig. ibidem.*
- N. 106. Hæmatites ex nigro fuscus superficie cubis crystallinis quarzosis albis obsita. *ad Scheid.*
- N. 107. Hæmatites globosus globulis contiguus ochra flavescente & lutea obsitus. *ad alte daube. ibidem.*
- N. 108. Hæmatites amorphus porosus, fractura arida. *ad Anlauff. ibidem.*
- N. 109. Hæmatites solidus, superficie nitente colore hyalino, & nigricante, fractura fibrosa. *ad Höfling. ibidem.*
- N. 110. Hæmatites globosus, globulis stillaritiis aggregatis defluentibus, colore flavo, fractura arida. *ad Birnbaum. ibid.*
- N. 111. Hæmatites poriformis cellulosus fractura tum arida, tum fibrosa. *ad Ginzenberg.*
- N. 112. Hæmatites solidus, cristatus superficie splendente, colore nigro & rubro mixto. *ad Kirmesdienstag. ibidem.*

- N. 113. Hæmatites dendroides, superficie tuberculis sibi incumbentibus striis intermediis obducta, fundo ab argillâ aspersa rubefcente. *ad Nachtigall. ibidem.*
- N. 114. Hæmatites ochra flava indurata superficiem obducente, dendritibus nigricantibus, ac cæruleis prominentibus. *ad Palmaum. ibid.*
- N. 115. Hæmatites è fundo arido gemmulis aggregatis splendentibus, aliisque prominentiis cuspidatim excurrentibus admixtis ornata, fractura fibrosa. *ad Siffig. ibidem.*
- N. 116. Hæmatites globosus, globis oblongis, colore rubro, fractura arida. *ad Pürck in Kapekul.*
- N. 117. Hæmatites solidus striatus è fundo flavefcente. *ad Krapel. ibidem.*
- N. 118. Hæmatites stillatitius tubulis aggregatis fractura arida. *ad Husar. ibidem.*
- N. 119. Hæmatites globosus, globis solitariis. *ad Anlauff. ibidem.*
- N. 120. Hæmatites tubulis capillaribus aggregatis contiguis, colore cinereo. *ad Himmelsberg*

N. 121.

- N. 121. Hæmatites granulis, ac globulis confusus colore rubefcente, fractura arida. *ibidem.*
- N. 122. Hæmatites speculari superficie, colore hyalino, fractura lamellosa. *ad Krappel.*
- N. 123. Hæmatites cellulofus, turriculis aggregatis è fundo partim nigricante, partim flavefcente prodeuntibus, fractura arida. *ad Tauffstein. ibidem.*
- N. 124. Hæmatites mæandriticus, fractura fibrosa, ac lamellosa colore nigricante. *ad Dobm prope Krewinkel.*
- N. 125. Hæmatites superficie globosa nigra splendente, ochra colore rubefcente, & croceo mixto perfusus, fractura varia. *ad Schwarzgrub ibidem.*
- N. 126. Hæmatites globosus colore pallido-cinereo fractura porosa. *ad Fröschuichterweyer. ibidem.*
- N. 127. Hæmatites stratosus, lamellosus, stratis alternis ochra factis, superficie dendritica. *ad Viehterbenden prope Stollberg.*
- N. 128. Hæmatites turritus ochra rubra, & fava inquinante perfusus. *ad Rheinardsmabr. ibid.*

- N. 129. Hæmatites solidus botryites venis sparosis immixtis colore nigerrimo, fractura tum glabra tum micacea. *ad Bendelmahr prope Stollberg.*
- N. 130. Hæmatites tubiporeticus colore fusco. *ad Mahrkaulen. ibidem.*
- N. 131. Hæmatites ætites mutus, ochra flavescente obductus. *ad Ortbusch versus Gressenich.*
- N. 132. Hæmatites botryites fractura cellulari. *ibidem.*
- N. 133. Hæmatites globosus globis depressis, fractura rugosa, colore fusco. *ad Kreuzfeld. ibid.*
- N. 134. Hæmatites lacunosus superficie nitente fractura arida glabra. *ad Wasserkaul. ibidem.*
- N. 135. Hæmatites superficie speculari, fractura rubente. *ad Mausbüchacker.*
- N. 136. Hæmatites cristatus solidus, colore ex cinereo cærulefcente, fractura glabra. *ex Neuenberg. ibidem.*
- N. 137. Hæmatites botryites superficie partim splendente, partim ochra rubefcente tincta, fractura arida. *prope Bleibubr.*

- N. 138. Hæmatites superficie rugosa ac scabra, fractura arida. *prope Gemünd.*
- N. 139. Hæmatites superficie colorata, fractura fibrosa. *ad Daubenstein, & Höffelingsberg versus Nötben.*
- N. 140. Hæmatites crySTALLIS penta- & hexagonis aggregatis, texturæ spatulæ subtilissimè reticulatæ, crusta superficiem ornante. *ad Lieffingsberg versus Nötben & Gilsdorff.*
- N. 141. Hæmatites solidus squammis minoribus nitens colore jridis, fractura micacea. *ex Harzbeimerberg. ibidem.*
- N. 142. Hæmatites solidus, fractura fibrosa ac striata. *ad Jungenberg. ibidem.*
- N. 142. Hæmatites hemisphæricus, fractura arida, superficie exterius ochra flavescente obducta, intus granulata. *ad Deckersdahl versus Jversheim.*
- N. 144. Hæmatites globosus colore rubro, adherentibus particulis milleporæ punctatæ, fractura glabra. *prope Ripsdorff versus Bleibur & Berbur.*

N. 145.

- N. 145. Hæmatites globulosus, arena incrustatus
 colore pallido, fractura glabra. *prope Lamers-*
dorff in Duc. Jul.
- N. 146. Hæmatites fuscus cylindricus, cylindris
 aggregatis colore flavo. *prope Mausbach.*
- N. 147. Hæmatites bracteatus foliaceus versico-
 lor. *prope Gressenich.*
- N. 148. Hæmatites stiriaciformis, tubulis aggrega-
 tis ochra incrustatus. *prope Harzheim in Eifflid.*
- N. 149. Hæmatites foliaceus colore chalybeo. *pro-*
pe Harzheim.
- N. 150. Minera ferri squammosa, colore hepati-
 co, tubulis perforatis. *ibidem.*
- N. 151. Minera ferri squammosa cum hæmatite
 pectiniformi. *ibidem.*
- N. 152. Minera ferri nodosa colore chalybeo.
ibidem.
- N. 153. Minera ferri squammosa, scoriæ similior,
 antimonio & sulphure mineralisata. *prope Kree-*
winckel.

- N. 154. Minera ferri chalybea * crystallifata, prope Holzheim.
- N. 155. Minera ferri floribus martis cærulescentibus dendriticè picta, ad Lindenbaum in Eißl.
- N. 156. Minera ferri drusis cylindricis obsita, colore subfulco. ex Bilsen. *ibidem*.
- N. 157. Minera ferri nigricans solida, ** superficie planâ splendente. prope Trimborn.
- N. 158. Minera ferri nigricans punctulis micans *** prope Sötenich.
- N. 159. Minera ferri grisea granulata **** prope Solingam in Duc. Mont.
- N. 160. Minera ferri calciformis, friabilis ochracea ***** è Satrap. Steinbac. in Duc. Mont.
- N. 161. Minera ferri crustis ochraceis variis sibi incumbentibus obducta. *ibidem*.

E

N. 162.

* Vide Laur. Balck. in additam. ad amæn. acad. Linnæi pag. 250. & seq. &c.

** Vid. Waller. Spec. 254. pag. 331.

*** *ibid.* pag. 332. n. 2.

**** Vid. Waller. Spec. 255. pag. 333. n. 3.

***** Cronsted. mineral. §. 82. n. 13. apud L. B. in addit. ad amæn. acad. pag. 245. & 246.

- N. 162. Minera ferri conchiliorum typis, & mil-
leporiticis particulis ochrâ confertis adhæref-
centibus. *ibidem.*
- N. 163. Minera ferri flavescens, tubulis minimis
farctis protuberantibus, colore nigricante. *ibid.*
- N. 164. Minera ferri particulis arenaceis, & ar-
gillofis mixtis, è rubro flavescens obducta.
ibidem.
- N. 165. Minera ferri crySTALLIFATA, fluore albicante
hinc inde aspersa. *ibidem.*
- N. 166. Minera ferri cum hæmatite incrustato ex
meris stiriis conflata. *ibidem.*
- N. 167. Minera ferri subfusca, stiriis hinc inde
pendulis. *ibidem.*
- N. 168. Minera ferri palustris * spongiam refe-
rens, arenâ obducta. *ex Rurâ prope Gresse-
nich in Duc. Jul.*
- N. 169. † Calx martialis palustris phlogisto, hu-
mo paludosâ juncta colorem Cæruleo Beroli-
nensi

* Vid. Waller. Spec. 261. pag. 339.

nenſi ſimilem referens * è *fodinis Turfæ paluſtris prope Neuenbauſen in Satrapiâ Grevenbroich.*

- N. 170. Tophus ferro mineraliſatus ** *ibidem.*
- N. 171. Ardeſia ferro mineraliſata, arenofa, è *foſſâ arenariâ, prope Muchbauſen ad limites Pat. Juliac.*
- N. 172. Bolus ruber, ferro mineraliſatus effoſſus *prope Neuenbauſen in Satrap. Grevenbroch, in Turfæ fodinis ibidem *** à D.L.B. de Weipeler detectus 1776.*
- N. 173. Arena craſſior croco Martis mineraliſata colore flaveſcente. *prope Muchbauſen.*
- N. 174. Schiſtus martialis lamelloſus lamellis ferri lacuſtris perſtriatuſ. *ibidem.*
- N. 175. Flos ferri criſpatus candefcens. è *Ducat Mont.*

E 2

N. 176.

* Vid. Cronſtedt, pag. 220. §. 206. & Frid. Aug. Cartheuſer tract. Mineral, germanicè Gieſſæ edit. 1771. pag. 83.

** Vid. Waller. Spec. 261. pag. 339.

*** Vid. Cronſtedt. fol. 102. §. 86. n. I.

- N. 176. Flos ferri albicans spatiformis, germi-
nans. *ibidem.*
- N. 177. Geodes martialis massâ arenaceâ incrusta-
tus, adhærente poro igneo, sive Buddingstone
lapillis variis aggregatis conglutinatis. *prope*
Caster in Duc. Jul.
- N. 178. Geodes minerâ ferri imprægnatus calli-
mo mobili. *prope Tregaldenboven in Duc. Jul.*
- N. 179. Geodes martialis cavitatibus pluribus di-
stinctus ** *è Satrap. Aldenboven.*
- N. 180. Geodes oblongus figurâ ovali, callimo
intus mobili. *ibidem.*
- N. 181. Geodes compressus, oblongus. *ibidem.*
- N. 182. Geodes minoribus pluribus aggregatis, ar-
gilla albicante mobili inclusâ. *ibidem.*
- N. 183. Ardesia, sive saxum martiale crustosum
fracturâ micante, conchiliorum variis typis ob-
fitum, ad chalybem scintillans. *è Rheno prope*
Düsseldorfium.

N. 184.

* Vid. Waller. Spec. 253. pag. 330. n. 1. & L. D. in addit.
ad amœnit. acad. Linn. pag. 237. Coroll. 3.

** Waller. pag. 512. Spec. 457.

- N. 184. Geodes martialis superficie incrustata, & crystallis solitariis dodecaedris * planis irregularibus confita. ex *Obercaldenbach.*
- N. 185. Geodes in margâ induratâ ferro mineralifatus, terrâ inclusâ. è *Satrap. Aldenboven.*
- N. 186. Ochra ferri ligno petrificato intimè mixta. prope *Gerresheim ad Hardt.* **
- N. 187. Hæmatites Belemnites cavitate inani. è *Ducat. Mont.*
- N. 188. Tubipora musica Linnæi in minerâ ferri ochraceâ. è *Ducat. Juliac.*
- N. 189. Minera ferri retractoria *** in globulis arenæformibus, colore nigrescente **** è *Rheno prope Mündelheim.*
- N. 190. Ferrum retractorium in granis granaticis ***** solitariis. è *Rheno prope Casarivwerdan.*

* Vide à Born part. 1. Tab. 2. fig. 13.

** Vid. Waller. page 343. Spec. 262. n. 5.

*** Vide Cronstedt. pag. 223. §. 210.

**** Vide Gellert principia Metallurg. Chim. german. Lipsiæ 1750. pag. 38. §. 76. confer. cum eodem Wallerii Spec. 266. pag. 347. n. 1.

***** Vide Onomatolog. hist. nat. T. 4. pag. 43.

- N. 191.** Ferrum retractorium in granatis martialibus granulatis nigrescentibus * è *Rbeno prope Düsseldorfium.*
- N. 192.** Lapis arenaceus micans martialis incrustatus, colore tum fusco, tum flavescente, diversis *Chamarum, Pectinum, Turbinitum, Stromborum, Solenitum, Bucarditum,* aliorumque conchiliorum typis ac nucleis refertus, ustulati moleculas trahente Magnete. *prope Gerresheim, & Montem Comitum passim in Ducat. Mont.*
- N. 193.** Testudo in arenâ ferro mineralisatâ, sive arenâ martiali ** quam seriùs ad me venientem ultimo loco meritò reposui. *ad Montem Comitum. ibidem.*



Index

* Cronstedt. pag. 85. §. 69. & sequent.

** Vid. Waller. pag. 338. Spec. 260.



INDEX SECUNDUS.
 METALLA IMPERFECTA
 HYDRAR-
 GYRUM.


 uanquam Semimetallum hoc, * ut Mi-
 nerologi idipsum, non contemptâ à me
 facerosâ Cl. Cronstedtii animadversione ** nuncu-
 pant, quod plerumque Metallorum cæterorum om-
 E 4 nium

* V. Ebert. Edit. Carlsruh. 1776. pag. 63. & 64. §. 164. per-
 fectis id adnumerante Cramero. vide Edit. german. Holmie
 1746. pag. 14. §. 15. & apud Dan. Titius pag. 172. §. 83.

** Editio Haffn. & Lips. 1770. pag. 230. §. 218.

nium fundamentum habetur, è terræ visceribus avariis propinetur, quandoquidem, ut Cl. Wallerius notat, * quinquacuplo copiosius Aurum, nedum alia metalla ferme ubivis eruantur; Auri etiam, Argenti, Plumbi, Cupri, Ferrique fodinæ paucissimæ sint in Germaniâ nostrâ, & alibi, è quibus Hydrargyrum extrahatur; Patriam tamen nostram & hunc Thesaurum haud ignobilem præ aliis bene multis non ita absconditum sibi servare novimus, ut delitescere magis, quam vestigiis satis apertè præmonstratis in lucem prodire malit.

Id unicum duntaxat optandum summopere, ut plures, quorum interest, in faciendos sumptus symbolum suam conferrent, atque ita id vi unitâ fortiore per artem metallurgicam eliceretur, quod benignior Soli Natura proximæ præsertim Bensbergensium in Ducatu Montensi Viciniæ à Magnificentissimâ sub Serenissimo ac Potentissimo Principe Electore, Juliae ac Montium &c. Duce JOANNE WILHELMO gl. mem. exstructa ibidem

* Vid. Waller. Edit. Berol. 1750. pag. 286. animad. I.

arce ubivis celebratæ non illiberali manu concessit.

Hydrargyri Specimen unum alterúmve ex an-
lectis meis hîc subjungo.

- N. 1. Mercurius natus, virgineus, * guttula-
tim adhaerens argillæ compactæ. *ad Hard
prope Bensbergam.*
- N. 2. Mercurius, sive Hydrargyrum nativum pu-
rum conspicuum in argilla colore spadiceo. *ibid.*
- N. 3. Hydrargyrum nativum in argillâ latens
vel manuum calore proliciendum. *ibidem.*
- N. 4. Mercurius sulphure mineralisatus, sive Cin-
nabaris nativa in argillâ ad affricatum venutè
rubente. *ibidem.*
- N. 5. Minera Mercurii indurata ponderosa. *ibi.*
- N. 6. Minera Mercurii figuræ incertæ friabilis,
inquinans, non ità dives. *ibidem.*
- N. 7. Cinnabaris compacta in argillâ communi
induratâ, subrubefcente. *ibidem.*
- N. 8. Cinnabaris nativa in pyrite flavefcente **
ad Hartenknippen prope Bensbergam.

* Vid. Cronst. pag. 228. §. 215.

** Vid. Scopol. de Hydrargyro Stirienfi. pag. 21. Edit. Vener.
1761.

- N. 9. Cinnabaris in petrosilice, aggregatis minoribus silicibus, Anglorum vulgò *Buddingstone* similior. *ibidem*.
- N. 10. Hydrargyrum in lapide schistoso cum argillâ indurato. *ibidem*.
- N. 11. Hydrargyrum in argilla figuræ subsphæricæ, * colore roseo. *ibidem* è *fodinâ* modò *desertâ*.
- N. 12. Cinnabaris compacta colore è rubro spaldiceo. *ibidem*.
- N. 13. Cinnabaris superficialis in argilla induratâ, subscintillante ** colore rufo. *ibidem*.
- N. 14. Cinnabaris solida texturâ chalybeâ. *ibidem*.
- N. 15. † Cinnabaris nativa Mercurio & Sulphure mineralisata pulverulenta, recenter à Rustico fodiendo detecta *prope Lülsdorff in Satrap. Levenberg*.

Zincum

* Vid. Waller. pag. 285. Spec. 220. n. 2.

** à Born part. I. pag. 128.

ZINCUM.


 Mineræ Zinci * sive Cadmia, aut Lemerii Lapis calaminaris è fodinis Juliacensibus satis copiosè eruitur. Effossa maximam partem, vel cum minerâ Veneris mixta in Auricalchum conflat, vel Stollbergam, locaque Vicina in Ducatu Juliacensi advecta in laminas, aut fila ** in Cupri molendinis ibidem aptatur non sine emolumentis publicis, privatisque. Scio à Stollbergenfibus Cadmiæ Juliacensis quinquies mille sexcenta & quadraginta centumpondia, imo plura vel uno anno cœmpta in Fabricantium manus incidisse. Ejusdem mineræ Specimina servo sequentia.

N. I.

* Vid. Onomatolog. histor. natural. Tom. 7. pag. 381, & sequent. Baumer. Tom. 1. pag. 465. §. 8. Gothæ 1763.

** Vid. Waller. append. de mineral. artefact. §. 16. Spec. 33. pag. 582. &c.

- N. 1. Minera Zinci quarzo albicante incrustata,
ferro mineralifata, colore flavescente. *prope
Stollberg.*
- N. 2. Zincum mineralifatum ex albo flavum opa-
cum. *prope Notberg in Duc. Jul.*
- N. 3. Minera Zinci stillaritia granulata colore sub-
cinereo. *ex Frösch prope Mausbach.*
- N. 4. Minera Zinci opaca cinerea. *prope Aquis-
granum.*
- N. 5. Drusa Zinci pellucida. *prope Mausbach.*
- N. 6. Galena Zinci solida flavescens stillaritia. *ex
Weissenberg prope Gressenich.*
- N. 7. Galena Zinci ferro & sulphure mineralifata
colore flavescente. *ad Burgholtz. ibidem.*
- N. 8. Galena Zinci cellulosa ferruginei coloris.
prope Eschweiler.
- N. 9. Minera Zinci crustâ quarzosâ obducta. *ad
Diëpelingen prope Mausbach.*
- N. 10. Cadmia spatosa calciformis * cum croco
Martis. *prope Mausbach ad Stollenberg.*
- N. II.

* Vid. Cronstedt. pag. 239. §. 228. n. I.

- N. 11. Minera Zinci fusca, seu Cadmia sulphure arsenico & plumbø mineralisata crusta quarzosa obducta, fracturâ micante. *prope Gressenich.*
- N. 12. Ochra Zinci calaminaris, seu Cadmia ferro sulphurato mineralisata. *ad Dörrenberg.*
- N. 13. Zincum argillosum ponderosum stillatitium, colore vario. *ibidem.*
- N. 14. Pseudo-galena Zinci ferro, & sulphure mineralisata. * *ad Klorzdörrenberg.*
- N. 15. Calx Zinci martialis. *ad Dobm prope Kreewinckel.*
- N. 16. Porus cum ochrâ zinci induratâ * colore flavescente. *ad Weissenberg. ibidem.*
- N. 17. Zincum ponderosum calciforme, ferro ac sulphure mineralisatum, quarzo obductum. *ad Düstergaß prope Mausbach.*
- N. 18. Minera zinci in spato albescente, superficie dendritibus pictâ. *ad Brennessel. ibidem.*
- N. 19. Zinci minera foliis spataceis immixtis. *prope Kreewinckel. ibidem.*

* Waller. Spec. 249. pag. 321.

** Vid. Cronstedt. pag. 238. §. 226/

- N. 20. Minera zinci stallaëtica opaca solida, fractura nitente. *ad Ortbusch prope Mausbach.*
- N. 21. Zinci minera terrea * colore subfusco cellulosa. *ad Wirdel, ibidem.*
- N. 22. Minera zinci facie metallicâ, squamulis micante, sulphure, ferro, & plumbo mineralisata. *ad Wolfart Mohr.*
- N. 23. Lapis calaminaris spatofus albicans fracturâ micante. *ad Ortbusch prope Stollberg.*
- N. 24. Pseudogalena zinci spatosa particulis minimis micans, croco Martis perfusa. *prope Gressenich.*
- N. 25. Ochra zinci albescens friabilis, dives. *ad Barchboltz.*
- N. 26. Lapis calaminaris ex albo flavescens alcyonii formâ. *ad Wolfart, ibidem.*
- N. 27. Minera zinci granulata, ferro & sulphure mineralisata, fractura nitente. *prope Stollberg.*
- N. 28. Minera zinci ponderosa spatosa, fractura micante, ochrâ ferri perfusa. *ibidem.*

* Waller. pag. 320. Spec. 248.

- N. 29. Minera zinci incrustata superficie tum nigricante, tum flavescente, venis quarzosis intercurrentibus. *ad Mohr.*
- N. 30. Minera zinci lamellosa, colore ex albo flavescente. *ad Dörrenberg prope Mausbach.*
- N. 31. Minera zinci crystallis polyedris, & punctulis nigricantibus stellatis obsita, sulphure & ferro mineralisata. *ad Weissenberg.*
- N. 32. Lapis calaminaris porosus. *ad Wasskaul prope Mausbach.*
- N. 33. Minera zinci drusica botryites opaca, fractura nitente. *prope Eschweiler.*
- N. 34. Minera zinci lacunosâ, ochra ferri lutea perfusa, fractura scabra. *prope Stollberg.*
- N. 35. Cadmia nigrescens solida, ferro sulphurato mineralisata. *prope Wolfart.*
- N. 36. Lapis calaminaris cum drusâ quarzosâ fracturâ scabrâ. *ad Vicht haud procul Stollberg.*
- N. 37. Minera zinei cum plumbo spatioso immixtis venis quarzosis albis. *ad Düvelar. ibid.*
- N. 38. Minera zinci plumbo, & ferro mineralisata. Variationes plures. *è fodinis prope Stollberg.*

- N. 39. Minera zinci granulata, spatosa cum æruginè nativâ, *ad Diepelingen prope Mausbach.*
- N. 40. Minera zinci cum ejusdem ochra indurata, *ad Hoff am end prope Mausbach.*
- N. 41. Minera zinci cellularis scoriæformis, colore subfusco. *prope Eschweiler.*
- N. 42. Minera zinci porosa, colore luteo flavescente cum topθο martiali. *ad Fuchsenkaul prope Mausbach.*
- N. 43. † Zincum calaminare, sive cadmia spatosa calciformis nativa, colore cinereo immixtis cæruleo Veneris, & plumbi minerâ. *è fodinis prope Eschweiler.*
- N. 44. Cadmia ferro mineralifata, spato admixto. *prope Krauminckel.*
- N. 45. Cadmia superficie variis coloribus tincta. *ex Bünich.*
- N. 46. † Cadmia diversis texturis, & coloribus distincta. *prope Monast. S. Cornelii ad Jndam.*
- N. 47. Ochra zinci calaminaris pura & compacta. *ibidem.*

- N. 48. Ochra zinci in drusâ crystallis fuscis in
cellulas mirè ordinata. *ex Grenich. ibidem.*
- N. 49. Ochra zinci in drusâ crystallo albicante ob-
ducta. *ibidem.*
- N. 50. Ochra zinci in drusâ colore albo, admix-
to cæruleo cupri. *ibidem.*
- N. 51. Ochra zinci in argillâ fuscâ sulphure mi-
neralisata. *ibidem.*
- N. 52. Ochra zinci in pseudogalena squammosa
squammis minimis, adnatis tesseriis plumbi, &
ochra cupri cærulescente. *ibidem.*
- N. 53. Ochra zinci in drusâ argillacea nigrescen-
te. *ibidem.*
- N. 54. Ochra zinci in argilla indurata, colore fuf-
co. *ibidem.*
- N. 55. Ochra zinci in ochra ferri flava. *ibid.*
- N. 56. Ochra zinci in massas squammosa, Lavæ
Vulcaniæ similiar. *ibidem.*
- N. 57. Ochra zinci crystallis minimis micantibus
obsita. *ibidem.*

F

N. 58.

- N.* 58. Ochra zinci inter tesseras plumbi cum ochra Martis mineralifata. *ibidem.*
- N.* 59. Ochra zinci in pseudogalena, ochra Martis subflavescente, & crystallis spatosis mineralifata. *ibidem.*
- N.* Pseudogalena, seu sterile nigrum * zinci, quarzo albicanti immixtum. *ibidem.*



Index

* Vid. Cronstedt. pag. 235. §. 228. n. 3. & Waller. pag. 321. Spec. 249.



INDEX TERTIUS
 PHLOGISTA MINERALIA
 SULPHUR.
 PYRITES.

C
 onstat satis, in omni metallorum gene-
 re magnam sibi partem vindicare Sul-
 phur tanquam principium, * utpote quæ ferme
 omnia eodem mineralifata deprehendimus. Obiter
 ejusdem jamtum in anterioribus pagellis facta
 mentione, nunc tantummodo Phlogisti hujus mi-
 nera-

F 2

nera-

* Waller. pag. 278. §. 105. c) cum quo confer. Kircher-
 mundi subterr. L. 9. Sect. 3. C. 1.

neralis * nativi ac puri, Pyritis deinde, quippe qui è sulphure, & succis lapideis concrevisse videntur, ** etiamfi non adeo amplum apparatus ostentare potuerim, nihilominus qualis quantuscunquedemum fuerit, indicatis Speciminibus hic reposui.

N. 1. Sulphur acido Vitrioli conjunctum, pulverulentum, flavescens, opacum *** è *terris Bo-rectanis prope Aquisgranum.*

N. 2. Sulphur textura æquali glabra. è *terris Aquensibus.*

N. 3. Sulphur stillaritium è flavo pallidum. *ibid.*

N. 4. Sulphur crudum friabile pulverulentum **** particulis impalpabilibus, subflavum. è *Satrapia Angermund.*

N. 5. Sulphur colore citrino, textura granulata. *prope Lintorff in Ducat. Mont.*

N. 6. Pyrites crystallifatus, ferro & cupro mineralifatus. *ibidem*

* Daniel. Tirius Lipsiæ Edit. 1777. pag. 152. §. 76.

** Bajer. oryctog. noric. pag. 83. ex Andr. Libav.

*** Cronstedt. pag. 164. §. 150.

**** Baumer. pag. 46. Tom. I. 31.

- N. 7. Pyrites botryitum concretus * *in Sylva
versus Mintert in Duc. Mont.*
- N. 8. Pyrites sulphure, arsenico & mineraplum-
bi imprægnatus. *prope Angermund. ibidem.*
- N. 9. Pyrites ferro, arsenico & sulphure minera-
lifatus, lamellis latioribus aggregatis, oppositis
ordinibus. *prope Lintorp.*
- N. 10. Pyrites fuscus martialis polymorphus fra-
ctura scabra splendente. *prope Mintert.*
- N. 11. Pyrites figuratus, granulis obsitus colore
nigricante. *prope Landsberg versus Mintert &
scisso excussus.*
- N. 12. Pyrites sulphureo-arsenicalis fatiscens. &
Satrap. Landsberg.
- N. 13. Pyrites globosus superficie undulata. *ad
fodinas carbonarias prope Kettwig.*
- N. 14. Pyrites quarzo pellucido albo granulatim
adhærens. *prope Angermund.*
- N. 15. Drusa pyritacea crystallifata lamellis aggre-
gatis mira textura dispositis. & *Satrapia An-
germund.*

F 3

* Waller. pag. 274. §. 105. Spec. 216. n. 4.

- N. 16. Pyrites mineralifatus variæ structuræ in-
 sperfo quarzo. *prope Gerresheim in Duc. Mont.*
- N. 17. Pyrites arsenicalis pallescens. *ibidem.*
- N. 18. Pyrites ferro & sulphure mineralifatus cum
 efflorescentiis vitrioli. è *Satrap. Angermund.*
- N. 19. Pyrites lamellosus, lamellis prominulis
ibidem.
- N. 20. Pyrites martialis adhærens crustæ crystal-
 linæ quarzofæ marmoris nigricanti obductæ.
haud procul Ratbingâ in Duc. Mont.
- N. 21. Pyrites in Linthantrace. *prope Mülbem-
 um ad Ruram.*
- N. 22. Pyrites in globum compactus fractura
 striata, striis è centro ad peripheriam excur-
 rentibus. *prope Wülfrath in Duc. Mont.*
- N. 23. Pyrites in jaspide martiali nigro. *prope
 Düsseldorfium è Rbeno ejectus.*
- N. 24. Pyrites cupri griseus * *prope Eckenbagen
 in Ducat Mont.*
- N. 25. Pyrites cupri pallidè flavus. *ibidem.*

* Cronstedt. pag. 213. Spec. 196. n. I.

- N. 26. Pyrites cupri è flavo viridescens * *prope Mittelacher.*
- N. 27. Pyrites lithoyloides, five mineralifatum vegetabile pyritaceum ** *prope Bensbergam.*
- N. 28. Pyrites Lithoxyloides. *prope Mülbemium ad Ruram.*
- N. 29. Pyrites alveoli loco Belemniti conico immersus. *prope Steinbrech Bensbergam versus in Duc. Mont.*
- N. 30. Pyrites fistulosus. *** *ibidem.*
- N. 31. Pyrites cellularis. *ibidem.*
- N. 32. Pyrites bractearus. *ibidem.*
- N. 33. Pyrites oblongus nodosus, cubis minimis aggregatis. *prope Herzogenrath in Duc. Jul.*
- N. 34 Drusa pyritacea, five Marcasitæ in Congerie crystallina. *prope Monast. S. Cornel. ad Jndam.*

F 4

N. 35.

* Ibidem. n. 3. & Baumer. Minerolog. Tom. 1. pag. 45. §. 29. & pag. 411. §. 17. Chalcopyrit.

** Waller. Pag. 433. §. 140 Spec. 324. R. 14.

*** Waller. pag. 276. §. 105. Spec. 217. N. 13. &c.

- N. 35. Pyrites immixtus Lithanthraci fissili nigricanti. *prope Eschweiler.*
- N. 36. Pyrites in Lithanthrace solida nigra. *prope Badenbergr.*
- N. 37. Pyrites pallidè flavescens in Lithanthrace. *prope Willemstein.*
- N. 38. Pyrites in Lithanthrace. *prope Scheid versus Richterich.*
- N. 39. Pyrites depressus è fodinis carbonariis. *ad Scherberg prope Würfelen.*
- N. 40. Pyrites. è fodinis *prope Morsbach.*
- N. 41. Pyritæ cubis minimis solitariis argillæ induratæ rubescenti immerfis. *prope Badenbergr.*
- N. 42. Globuli pyritacci subsphærici superficie ochracea, cubis minoribus aggregatis & immerfis densè obsita, fractura fibrosa. *prope Grefsenich.*
- N. 43. Pyrites crySTALLIFATUS, cubo majori cubis minoribus imbricato * è *Monjaviâ.*

N. 44.

* à Born. part. I. pag. 57.

- N. 44. Pyritæ in congerie crystallina schisto argilloso nigricanti immersa. *prope Kaldenberg versus Riebslein in Monjaviâ.*
- N. 45. Pyrites, vel Marcasita tetraedrica in ardesia coloris è cæruleo cinerescens, tessera maxima * è *Monjaviâ.*
- N. 46. Pyrites tessellis minoribus solitariis in ardesia cærulescente. *prope Eikerscheid in Monjaviâ.*
- N. 47. Fluor, sive vena pyritacea in ardesia. *ibid.*
- N. 48. Cubi pyriticosi in Talco nephritico colore vario. *prope Simmerath.*
- N. 49. Marcasitæ ferro mineralisatæ in Talco è flavo-rubescente. *prope Conzen. ibidem.*
- N. 50. Pyrites cubicus cubis imbricatis in schisto argilloso flavescente ** è *Monjaviâ.*
- N. 51. Pyritæ cubici in schisto micaceo, colore vario mixto. *prope Reichstein.*
- N. 52. Pyritæ cubici in schisto arenoso micante. *prope Lammersdorff. in Monjaviâ.*

* Waller. pag. 275. §. 105. Spec. 217. n. 1. & seq.

** à Born. part. 2. pag. 105.

- N. 53. Pyritæ cubis minoribus in lapide fissili tal-
coso. *ibidem.*
- N. 54. Pyritæ cubis sine ordine nunc aggregatis,
nunc solitariis. *ibidem.*
- N. 55. Pyritæ immixtis cubis quarzo & Petrofi-
lici. *ibidem.*



LITHAN- THRAX.

Lithanthracum fodinæ Montenses cum Mulhemiensibus ad Ruram inter easdem feracissimis Montensi Ducatui, imò Viciniæ in Hycnem provident Carbones ad fornaces instruendas necessarios. In Ducatu Juliacensi Aquensium & Badenbergenfium fat celebres sunt fodinæ; Eschweileram tamen supra Jngam sita, uti Wern. Teschenmacherus * notat, Carbonum in vicinâ sylvâ erutorum & per totam Provinciam Juliam devectorum proventu nobilitatur. —

Adnoto Specimina sequentia.

N. I. Lithanthrax acido vitrioli imbuta pyritico-
sâ. *prope Mulhemium ad Ruram.*

* Wern. Tesch. Annal. Julæ & Mont. illustr. Christ. Dith. maro part. 2. pag. 367.

- N. 2. Lithanthrax fatiscens in focis ferrariis usualis. *ibidem*.
- N. 3. Lithanthrax fissilis * fractura glabra. *ibid.*
- N. 4. Lithanthrax superficie striata solida. *ibidem*.
- N. 5. Lithanthrax sulphure imprægnata, scissilis, minus solida, colore jridis nitens. *ibidem*.
- N. 6. Lithanthrax superficie colorata bituminosa. *in Ducat. Mont. Satrap. Angermund.*
- N. 7. Lithanthrax superficie splendente speculari picea, fractura micante. *prope Kettwig.*
- N. 8. Lithanthrax, seu Carbo facile inflammabilis bituminosus scissilis. *ibidem.* **
- N. 9. Lithanthrax oblique resplendens stratosa stratis alternis micantibus, fractura scabra, optimæ notæ. *prope Eschweiler.*
- *ad Plattbund & Feldend.*
- *ad Rapp.*
- *ad Hupp.*

ad

* Baumer. hist. nat. Regni mineral. Tom. 1. pag. 35. §. 14.

** Vid. Volckmanni Siles. subterr. pag. 272. §. 13. & sequ.
& Waldin. Edit. Marburgi 1778. pag. 20. n. 6.

- *ad Leimberg & Langenberg.*
- *ad Spierling.*
- *ad Makreel.*
- *ad Buring.*
- *ad Schlemmerig.*
- *ad Stock & Monum.*
- N. 10. Lithanthrax solida superficie speculari *
ejusdem cum priori notæ.
- *ad Gyr & Kayserbasch.*
- *ad Fcbenberg.*
- *ad Splies.*
- *ad Eul.*
- *ad Atscher.*
- *ad Birkengang.*
- *ad Huppenbroich.*
- *ad Knoch & Krebs.*
- N. 11. Lithanthrax particulis pyriticosis aspersa,
sub dio mox fatiscens. *prope Merödngen.*
- N. 12. Lithanthrax nitore asphaltino nigerrimo,
splendente * *prope Badenberga.*

* Mineralog. Histor. Vratislav. & Lips. Edit. 1775. pag. 36.

§. 37.

** Vid. apud Jacob Bajer in Oryctograph. Noric. pag. 81.

Cap. 9. quæ ex Libav. P. 3. L. 8. C. 8. citat.

- N. 13. Lithanthrax jam descriptis suppar. ad *Niederbardenberg*.
 — ad *Fürtber* - - primæ notæ.
 — ad *Kukum*.
 — ad *Drach*.
 — ad *Möck*.
 — ad *Mausfall*.
 — ad *Himmeling*.
 — ad *Klein & große mabl*.
 — ad *Kikert*.
 — ad *Bröchelgen*.
 — ad *Sandberg & Cranz*.
 — ad *Ath Ekelbeur*.
 — ad *Wölffgen. fatiscens, friabilis*.
 — ad *Burgweeg*.
 — ad *Kemmergen*.
 — ad *Lambour*.
 — ad *Schottleg*.
- N. 14. Lithanthrax compacta durior bituminosa.
 ad *Tüth haud procul Aquisgrano*.
- N. 15. Lithanthrax compacta pyrite adpersa. prope *Würselen & Morsbach*.
- N. 16. Lithranthracum crustæ argillacæ induratae, passim herbarum, & fruticum folia, & furcu-

furculos exhibentes * *prope rudera Arcis Wilhelmsteinianæ.*

- N. 17. Lithanthracum crustæ argillacæ sciffies phlogisto mixtæ, Surculos, Folia, & Flores exhibentes, quæ aliàs descripta breviter, & indicata sunt in Julix & Monrium Subterraneis ** fossilibus petrificatis. *Mühlbenii ad Ruram in Ducat. Mont. — prope Eschweiler, & Badenbergl, in Ducat. Julix. &c. &c. &c.*



Turfa

* C. F. Schultzen de Herbar. typis in regno lapid. german. Edit. Dresd. & Lips. 1775. §. 13. &c.

** Ser. I. pag. 8. & sequ.

TURFA.


 uandoquidem & apud Minerologos ple-
 rosque de Turfâ mentionem fieri in-
 veniam, de eadem hoc loco, tanquam hac in Pa-
 triâ non paucis in locis, ubi vel lignorum cæduo-
 rum penuria, vel carbonum advehendorum diffi-
 cultas major est, pauperiorum præcipuè hyemali
 solatio, ac foculorum suorum alimento filere nolui.
 — porrò è Turfifodinis Sequentibus collegi.

*N. 1. Turfa solida bituminosa aere indurefcens.
 prope Türnich in Duc. Jul. Satrap. Bergheim.*

*N. 2. Turfa intertexto ligno fossili bitumine im-
 prægnato, lutosa, pinguis. prope Schlenderbahn
 in Duc. Jul. **

N. 3.

* Daniel Titius §. 58. pag. 98. (L.) Edit. Lipsiæ 1777.

- N. 3. Turfa foliata immixto cespice * bituminoso, & arborum racemis. *prope Balkhausen.*
- N. 4. Turfa ericea levis nigrescens admixtis particulis humi caeruleo-friabilis. *prope Bofsem in Satrap. Bruggenfi.*
- N. 5. Turfa, five Bitumen rude terreum admixtis cespitibus, & ligno fossili, plerumque abiegno. *ibidem.*
- N. 6. Turfa lutosa pulverulenta bituminosa faecens. *ad Oberaufsem. in Satrapiâ Bergheim.*
- N. 7. Turfa lutosa paludosa nigricans. *prope Holzem.*
- N. 8. Turfa pinguis, fruticibus, ac ramis arborum, reliquiis etiam è Regno animali non paucis immixtis, è fodinis ad plurimum orgyrum profunditatem eruta *prope Gobr Satrap. Grevembroch.*
- N. 9. Turfa, five humus vegetabilis ** fibrosas *prope Gerrsheim & Roland ad Aap.*

G

N. 10.

* Vid. Valent. Kräuterman Reg. mineral. pag. 163. Edit. germ. Francof. & Lips. 1717.

**Vid. Cronstedt. pag. 261. §. 291.

- N. 10.* Turfa, five humus paludosa admixtâ umbrâ. è fodinis prope *Grevenbroich in Duc. Jul.*
- N. 11.* Turfa particulas ligni adusti, fortassis fagini lamellas includens bituminosa. *ad Dusselam prope Montem Comitum.*
- N. 12.* Turfa constata è ligneâ putredine, nucleis avellanis, glandibus, aliisque fructibus, integris quidem testis, seu putaminibus, colore nigricante; nucleis verò consumptis, ac mafsâ atrâ pulverulentâ repletis * ochrâ & argillâ admixtâ, bituminosa, cespitibus intertextis **
prope Excelsa versus Gerresbemium in Duc. Mont.



Synopsis

* Vid. Joan Taube additam. ad hist. nat. Edit. germ. Cella 1767. Tract. 1. &c. NB. Nucleis, quod miror, egerminantibus. ad 40 ferul. geometric. profunditatem.

** Onomat. hist. nat. Tom. 4. pag. 339.



SYNOPSIS EORUM,

QUÆ


EX JULIA ET MONTIBUS

in triplici hoc Indice continentur.

IN INDICE PRIMO

EX METALLIS PERFECTIS.

Aurum.	pag. 19.
Argentum.	pag. 23.
Plumbum.	pag. 27.
Cuprum.	pag. 40.
Ferrum.	pag. 45.



IN INDICE SECVNDO.
EX METALLIS IMPERFECTIS.

Hydrargyrum.	pag. 71.
Zincum.	pag. 75.




IN INDICE TERTIO.
EX PHLOGISTIS MINERALIBUS

Sulphur. Pyrites.	pag. 83.
Lithranthrax.	pag. 91.
Turfa.	pag. 96.

O. A. M. D. G. EX




Aurum.
Argentum.
Plumbum.
Cuprum.
Ferrum.



Errata.

Correcta.

<i>Pag.</i> 2. Eques	—	—	Equit.
<i>Pag.</i> 12. & 13. Lithophylaceum	—	—	Lithophylacium.
<i>Pag.</i> 15. facineda	—	—	facienda
<i>Pag.</i> 27. : :	—	—	()
<i>Pag.</i> 37. polyædris	—	—	polyedris
<i>Pag.</i> 50. crystatus	—	—	cristatus
<i>Pag.</i> 54. Hæmatites	—	—	Hæmatites
<i>Pag.</i> 61. fractarâ	—	—	fractura
<i>Pag.</i> 64. foliaceus	—	—	foliaceus
<i>Pag.</i> 72. Siymbolam	—	—	Symbolam
<i>Pag.</i> 80. Cæruieo	—	—	Cæruleo
<i>Pag.</i> 81. in mafsas	—	—	in mafsâ



EX METALLIS IMPERFECTIS

Hydrogenium	pag. 71	Correcta
Zincum	pag. 72	
Equit.		
Lithophysicum		
facienda		
()		
polyedris		
crillatis		
Hermiteis		
strata		
foliatus		
Symbolam		
Cernico		
in massis		

—————

