



I N D E X P R I M U S.

METALLA PERFECTA.

AURUM.

J uliae, ac Montium Ducatus sat fæcundos Metallis esse, pauci sunt, qui nesciant. Sanè è solis fodinis Wildbergicis, & Heidbergenisibus (neque eam de aliis hucusque experiri certi quidquam potui) ab anno 1718, quo prima Metallicorum manus admota fuisse fertur eruendis ibidem metallis, uti in monumentis authenticis me nuper admodum legere memini, us-

que ad annum 1771, ad quem pertingentes duntur
taxat Tabulas inspexi, supra sexcenta & octoginta
tex millia, nongentorum ac sexaginta Florenorum
proventum fuisse scimus:

Fæcunditate tamen metallorum nobiliorum aurum
& argenti Patriam nostram Bohemiæ, Hungariae,
Saxoniæ, aliisque hoc titulo celebratissimis
Regionibus facile cedere, lubens æque hic fareor,
atque ante me in suâ Oryctographiâ * Cl. Jacob.
Bajerus de suo Norico idipsum concessi. Ex-
pertem tamen omnino auri argentique non esse
Patriam nostram cum eodem ausim dicere.

Larvato, ** vel Pyrite mineralisato, *** vel in
Zinci minerâ latenti, ac non nisi per ignem edu-
cendo, non exiguis impensis suis Minerophili aliquot
admoveare manum, fortassis nihil dubitantes
de secundis successibus, spibus suis conceptis pari-
bus; verum non respondit sumptui labor.

Sed

* Oryctograph. Noric. Edit. Norimberg. MECCIIX. pag.
91. C. X.

** Vid. à Born part. I. pag. 67.

*** Ibid. pag. 68.

Sed neque de Nativo, quod Rhenus hinc inde projectat, emolumenta, quod sciam, quae sint opera pretium, hucusque traximus. Certè destitutum propriea à nonnullis haud ita pridem fuit ab ultiore indagine, ne aurum mercari auro viderentur, quod effodiendis, & elaborandis aliis minus nobilibus, quae è sinu Patriæ copiosè satis eruuntur, metallis impendi utilius poterat, quod hic obiter duntaxat meminisse sufficiat.

Ex analectis meis indico sequentia.

- N. 1. Aurum nativum Rhenanum particulis minimis in arenâ flavescente fragmentis silicinis nigricantibus mixtâ. * è Rheno prope Mündelheim in Ducat. mont. Satrap. Angermund.
- N. 2. Aurum nudum arenæ fuscae granulatum admixtum. ** è Rheno prope Cæsaris Insulas.
- N. 3. Aurum nativum nudum solutum arenæ granulis majusculis, sed rarius immixtum. è Rheno prope Steinen.

B 3. N. 4.

* Vid. à Born part. 2. pag. 102.

** Waller. pag. 411. &c. 131. Spec. 304.

N. 4. Aurum Rhenanum granulis malleabilibus compressis, rotundis colore vel pallido, vel plumbeo arenæ mixtum. *prope Düsseldorfum.*

N. 5. Aurum nativum admixtum globulis minerae ferri retractoriæ arenæformibus, nigranticibus, *ibidem.*

* Ex ejusmodi auro Rhenano, ad normam conventionis cusus est anno 1767 nummus, valore Ducatum æquans, è cujus parte adversa videre est Caput Serenissimi Electoris Palatini sinistrorum respiciens, cæsarie ad cervicem fasciâ leniter colligata, ejusdemque cincinnis in humerum dextrum defluis cum Epigraphe: CAR. THEODOR. D. G.

C. P. R. S. R. J. AT. & EL. ex aversa vero Mannhemium munitentis cinctum Sole supra urbem radios dextrorum vibrante; ultra cis præterfluentem Rhenum Metallicos, Fusionum formâ præcinctos, arenam auriferam curriculis convehentes, secernentes, ac prope Tabernacula sua cribrantes, cum inscriptione: *Sic fulgent Littora Rheni.* Inferius ad norm. conv. 1767.

* Onomatolog. hist. nat. Tom. 2. pag. 107.

ARGENTUM.

A **Argentum** è nobilioribus metallis ab auro primum & unicum paulò liberalius è fodinis patriis, sed non nisi in galenâ * se se eruendum offert.

Intra annos supra indicatos è fodinis Wild- & Heidbergensibus in Satrapiâ Windecensi Ducatus Montensis è galenâ prodiere supra novendecim argenti (*brandsilver*) marcarum millia trecenta & octodecim cum semuncisiis duodecim.

Galena hæc aliquata obtulit supra novemdecim mille centum quinquaginta novem marcas, tres semuncias argenti depurati (*fein*) ac præterea centum, & sexaginta tres marcas argenti cum decem semuncisiis in ære puro (*gabr kupfer*) ad officinam monetariam remissas, centum ac triginta supra trecenta & octoginta sex millia florenorum pretium. Astervo sequentia.

* Vid. onomat. hist. nat. Tom. I. pag. 722. argenti minera improp., & ibid. pag. 723.

- N. 1. Galena, seu minera Saturni argentoſa granulata, areis minoribus micans. *ad Dornſchächtergang & fodinis Wildbergenſibus.*
- N. 2. Galena argento dives prisnatica, ac lammellosa. *ad Scheurenschächtergang. ibid. in Parochia Odenspiel.*
- N. 3. Minera saturni galenica argentifera, spatacea, ochrā luteā obducta. *ibidem.*
- N. 4. Galena argentoſa crystallisata, maculis nigrantibus tincta. *ibidem.*
- N. 5. Galena argentifera spatacea cum ærugine nativâ. *ibidem.*
- N. 6. Galena argento & sulphure mineralisata granulata, squammis majoribus, & minoribus micans cum ochrā luteâ. *ibidem.*
- N. 7. Galena argentoſa striata, sulphure mineralisata cum minerâ veneris, & quarzo colore flavescente. *ad Dornſchächtergang. ibidem.*
- N. 8. Galena punctata argenti particeps admixta minerâ veneris. *ibidem.*
- N. 9. Galena texturæ chalybeæ, argento, arsenico, & sulphure mineralisata. *ibidem.*

N. 10.

- N. 10. Galena argentifera areis majoribus & minoribus mixtis micans cum minerâ vénérâ flavâ, & sulphure, ferroque mineralisata, colore aureo nitente. *ibidem.*
- N. 11. Galena spathacea texturæ chalybeæ argento sa. *ibidem.*
- N. 12. Galena argento dives particulis minoribus micans, mineræ martis albicanti immixta. *ibidem.*
- N. 13. Galena argentifera tessulis minoribus oblique micans. *è fodinâ, tres fere horæ quadrantes à Wildberg. diffitâ.*
- N. 14. Galena crystallisata, crystallis solitariis hinc inde ornata, argento dives. *ibidem.*
- N. 15. Galena argento sa tesseris maximis. *ibidem.*
- N. 16. Galena argento sa cum spato cellulari crystallaro, crystallis columnaribus albis prominentibus. *ibidem.*
- N. 17. Galena argento sa micans, venis spatosis intercurrentibus variæ texturæ. *ibidem.*
- N. 18. Galena granulata areis minoribus, argento admodum dives, centumpondio quadraginta se-

muncias argenti tenente. prope Bensbergam in
Ducatu Montensi è fod. Sigenianis.

N. 19. Galena squammis majoribus & minoribus
permixtis micans, centumpondio decem semun-
cias argenti ferente. è fod. Sigenianis. ibidem.



Plumbum

B 3

PLUMBUM.

De Galenâ, ut argentosa factâ mentione,
 jam de eadem, utpote plumbi minerâ:
 è quâ ex fodinis superius indicatis eodem temporis
 spatio prodiere post eliquationem supra triginta
 duo grumorum (metallici *klumpen* appellant) mil-
 lia quadringenti, viginti & unus, qui simul appen-
 derunt centumpondia supra triginta quinque millia,
 trecenta, quadraginta quatuor, quadraginta & sex
 pondo, pretio supra ducenta & quadraginta millia
 quadringentorum, & quadraginta florenorum: pro-
 fecuturus indicem, noto sequentia è Juliâ, & Mon-
 tibus.

N. 1. Tessera galenica, tessulis vel fragmentis di-
 stinctis cubicis majoribus micans, obiecta quar-
 zo squamoso, & lameloso, laxe simplici
 apyro quarzosof firmiter conjuncta, super-
 ficie Drusa quarzosa flavescente, & quarzo cry-
 stallifato

stallifato irregulari ornatâ. è *Ducatu Montenſi,*
Satrapia Windeck prope Eckenbagen.

N. 2. Tessera galenica, ochrâ luteâ obtecta cum
 drusâ spatacea lamelloſa vitreâ. *ad altenblei-
 berg infra Mittelacher.*

N. 3. Tessera galenica cubica, cubis immixtis spa-
 to vitreo ſemipellucido croceo crystallifata,
 partim decumbentes, partim erectas oblongas
 cubicas, & prismaticas lamellas repræſentans.
ibidem.

N. 4. Quarzum crystallisatum irregulare croceum
 cum diversis Tefferis galenicis polygonis. *ibi-
 dem.*

N. 5. Galena tefſulata diversimodè figurata cum
 drusâ quarzoſâ, & ſpato vitreo lamelloſo. *ibi-
 dem.*

N. 6. Drusa ſpatacea vitrea lamelloſa crocea, figu-
 ras cubicas, aliasque sagittis, lanceisque ſimiles.
 referens. *ibidem.*

N. 7. Drusa priori ſimilior. *ibidem.*

N. 8. Quarzum crystallisatum irregulare, flaveſ-
 cens, cum ſpato vitreo lamelloſo particulis
 plumbcis immixtis. *ibidem.*

N. 9.

- N. 9. Quarzum crystallisatum jam descripto accedens. *ibidem.*
- N. 10. Minera plumbi albescens crystallisata, lamellis hinc inde prominentibus cum terrâ præcipitatâ ochraceâ. è *Satrapia Montensi Windisch, Parochiæ Odenspiel, ad Scheurenschächergang in Wildberg.*
- N. 11. Minera plumbi spatacea alba, rhomboidalis, maculis nigricantibus pellucens cum ochrâ luteâ. *ibidem.*
- N. 12. Minera plumbi rhomboidalis, prismatica, & lamellosa. *ibidem.*
- N. 13. Minera plumbi notatae similior, spatacea, polygona, adhærente ochrâ luteâ. *ibidem.*
- N. 14. Minera plumbi spatacea crystallis rhomboidalibus consita, ochra flavescente, & inquinante obductâ. *ibidem.*
- N. 15. Minera plumbi crystallisata, maculis nigrescentibus tincta, lamellis prismaticis & polygonis mixtis prominulis obducta. *ibidem.*
- N. 16. Minera plumbi ex albo grisea, solida cum ærugine nativâ, & ochrâ rubescente. *ibidem.*

N. 17.

N. 17. Galena granulata, squammis majoribus &
 * minoribus micans, sulphure mineralisata cum
 minerâ plumbi albâ spatacea, & ochrâ luteâ.
ibidem.

N. 18. Galena striata, & granulata, areis diver-
 sis micans, sulphure, & cupro mineralisata cum
 quarzo fragili, colore ex flavo viridescente. *ad*
dornschächtergang in Wildberg. *ibidem.*

N. 19. Galena plumbi punctata, sulphure & cu-
 pro viridescente mineralisata. *ibidem.*

N. 20. Galena plumbi, texturæ chalybeæ, sulphu-
 re, & arsenico mineralisata. *ibidem.*

N. 21. Galena plumbi granulata areis majoribus,
 & minoribus micans cum minerâ cupri flavâ,
 sulphure, & ferro mineralisata, colore aureo,
 ac variegato nitente. *ibidem.*

N. 22. Galena plumbi granulata areis mixtis, mi-
 neræ ferri albæ immixta, spatiformis. *ad Dorn-*
schacht. *ibidem.*

N. 23.

* Vid. Laur. Balek in Continuacione Selectarum ex amoenita-
 tibus academicis Carol. Linnæi dissertationum Græcii edit.
 1766. pag. 243.

N. 23. Galena granulata texturæ chalybeæ particulis minoribus micans. *ibidem.*

N. 24. Quarzum arenaceum, & crystallisatum cum galenâ fragmentis distinctis cubicis majoribus micante, ærugine nativâ, & minerâ plumbi alba spatacea immixta. *prope Mittelacher ad Schuhbüschgen.*

N. 25. Minera plumbi rubescens, cubica. *prope Eckenbagen in Duc. Mont.*

N. 26. Minera plumbi crystallis pyramidalibus obsita. *ibidem.*

N. 27. Minera plumbi tessulis obliquè splendentibus in quarzo fusco. *ibidem.*

N. 28. Minera plumbi tessulis aggregatis, crystallis spataceis obsita. *ibidem.*

N. 29. Galena plumbi opaca crystallis foliaceis largioribus, colore subflavescente. *ibidem.*

N. 30. Drusa mineræ plumbi, crystallis spataceis nigricantibus obsita in matrice quarzosa. *ad Blumengang.* *ibidem.*

N. 31. Minera plumbi opaca in quarzo, tesseris majusculis cum lamellis spataceis, colore nigro & albo alternantibus. *ibidem.*

N. 32. Chaos tessulare mineræ plumbi crystallis crassioribus pellucidis, adhaerens matrici quarzoæ. *ibidem.*

N. 33. Drusa galenica crystallis albis spatoisis capillaribus, longioribus erectis, aggregatis. *ibid.*

N. 34. Galena plumbi tesseris polygonis, granulis minimis in matrice quarzosa colore è flavo fusco. *ibidem.*

N. 35. Galena areis minoribus micans in lapide corneo albescente. *ibidem ad Fabrenberg.*

N. 36. Drusa quarzosa cubis majoribus & minoribus mixtis, eorumque fragmentis quarzo immixtis. *ibidem.*

N. 37. Galena plumbi particulis minimis cum plumbagine * *ad Wildberg.*

N. 38.

* Vid. Wall. pag. 377. Spec. 283. §. 125. N. III.

- N. 38. Pseudogalena picea cum galenā granulatā
areis minoribus micans. ē fodinis Sigenianis
prope Bensbergam in Ducatu Mont.
- N. 39. Galena plumbi, granulis minoribus & ma-
joribus mixtis. *ibidem.*
- N. 40. Galena plumbi in matrice quarzi fusci.
ibidem.
- N. 41. Galena plumbi striata. * *ibidem.*
- N. 42. Plumbum sulphure & arsenico minerali-
satūm in minerā pinguiore fere mallcibili. ex
Obercaldenb. versus dinaſt. Schwarzenberg - Gim.
- N. 43. Plumbago metallica tessulis majorib[us] mi-
cans crystallis polygonis flavescentibus obdu-
cta. ** *prope Liniorff in Satrapia Angermund*
in Duc. Mont.
- N. 44. Galena plumbi areis minoribus micans.
ibidem.
- N. 45. Galena plumbi tessulis majoribus oblique
resplendens in massa spatacea. *ad Beimesdorff*
in Satrap. Mettman, Ducat. Mont.

C

N. 46.

* Wall. spec. 282. N. 10.

** Vid. Waller. pag. 375. spec. 232. N. 1.

- N. 46. Plumbum adhærens, & immixtum fluori minerali albescenti pellucido polygono. *è Satrapid. Angermund in Duc. Mont.*
- N. 47. Drusa mineræ plumbi viridis, mixta minerali Cupri terrea. *ex Ericeto prope Keldenig in Satrap. Monast. Effl. Ducat. Julian.*
- N. 48. Minera plumbi Spatacea involuta plumbagine. *ibidem.*
- N. 49. Minera plumbi Spatosa solida, argillæ intimè mixta, * colore rubescente, fractura nitente. *prope Kall in Eiffiad.*
- N. 50. Ejusdem varietates complures. *ibidem.*
- N. 51. Minera plumbi in spato, argillæ subflavescenti sensim admixta. *ad Lielerg prope Keldenig.*
- N. 52. Minera plumbi argillæ insensibiliter immixta colore ex flavo albescente. *ibidem.*
- N. 53. Minera plumbi albescens stratosa, dives centumpondio supra octoginta libras plumbi conferente. *ibidem in Ericeto.*

N. 54.

* Onomatolog. hist. nat. pag. 606. Waller. Spec. 287. pag. 381. & seq.

- N. 54. Minera plumbi spatoſa, argillæ pallidè ru-
befcenti ſenſim mixta. *ibidem.*
- N. 55. Galena tefſularis cubis irregularibus adhæ-
rente quarzo ex flavo fuſco. *prope Call in
Eiffiad.*
- N. 56. Galena tefſularis in matrice ſquammoſa cal-
caria. *ibidem ad Kallbach.*
- N. 57. Galena plumbi in lapide ſpatoſo ſelenitico.
ibidem.
- N. 58. Galena plumbi areis minoribus, minora
Lunæ ſulphurata mineralifata, ad chalybem ſci-
tillans. è fodinis Meinerzhagensibus haud pro-
cul Bleibur in Eiffiad.
- N. 59. Galena plumbi ſulphure & ferro minera-
lisata in matrice arenosa flavescente. *prope Sö-
tenich in Eiffiad.*
- N. 60. Galena plumbi cubis & granulis minori-
bus in matrice quarzoſa, & arenosa. *prope
Maelſbenden in Eiffiad.*
- N. 61. Galena plumbi dives, in matrice quarzi
fuſci, areis majoribus, inspersis minoribus mi-
cans. *prope Heiftert in Eiffiad.*

N. 62. Galena plumbi particulis cubicis * exiguis
& granulatis massæ arenaceæ albescenti mixtis.
prope Bleibur ad Bleiberg.

N. 63. Minera plumbi spatacea botryites argillæ
albæ intimè mixta. ex Ericeto Keldenichio ver-
sus Heistert.

N. 64. Minera plumbi spatacea argillæ partim al-
bæ, partim ex flavo rubescenti intimè mixta, **
ibidem. Metallici hinc appellant *Leimerz-Blei-*
erde. Centumpondium dat plumbi libras 60,
ad 70.

N. 65. Tesseræ galenicae cubicæ aggregatae ex
Danzberg ochra Martis perfusæ. in Eifflid.

N. 66. TESSERA galenica cum minera plumbi alba
spatacea obliquè splendente. ad Krisch prope
Call in Eifflid.

N. 67. Minera plumbi galenica massæ silicinæ
arenaceæ albæ granulatim inspersa. ad Kuden-
berg versus Bleibur in Eifflid.

N. 68.

* Waller. pag. 377. §. 125. animadver. post N. 10.

** Vid. Wall. spec. 287. pag. 381.

N. 68. Complures ibidem variationes, particulis
minimis disjunctis in massâ friabili arenosâ.
ibidem.

N. 69. Plumbum spatosum porderosum crystalli-
fatum, crystallis albis polyædris apice trunca-
tis, admixta crustâ martiali arenaceâ flavescente.
ad Callbach in Eifflâ.

N. 70. Galena plumbi stratosâ, è rimis petræ cal-
cariæ spatosæ cruta. *prope Notberg in Duc.
Juliac.*

N. 71. Galena plumbi cubis majoribus lamellofis
aggregatis oblique micans, adhærente ochrâ
flavâ. *ibidem versus Gressenich.*

N. 72. Minera plumbi in massâ verosimilius Vul-
caniâ spongiosa, insistentibus eidem crystallis
hexagonis spataceis. *ad Gressenich in Duc. Jul.*

N. 73. Minera plumbi areis majoribus, lamellofâ
ochra martis perfusa. *ad Duvelar prope Stoll-
berg in Duc. Jul.*

N. 74. Galena plumbi cubis majoribus & minori-
bus mixtis hinc inde inspersis cum minerâ zin-
ci terreâ. *prope Stollberg.*

- N. 75. Galena plumbi tessulis polygonis accumulatis obliquè splendentibus. *prope Parthenonem in Wenau in Duc. Jul.*
- N. 76. Galena plumbi sulphure, & ferro mineralisata, particulis cubicis micans ochrâ flavâ perfusa. *ibidem prope Wenau.*
- N. 77. Galena admixta pyriti martiali, sive sulphuri ferro mineralisato. *prope Mausbach in Duc. Jul.*
- N. 78. Galena plumbi cæsio-nigra cubis minoribus splendens. *ad Fuschenkaul versus Mausbach.*
- N. 79. Minera plumbi galenica tessulis minoribus confusè aggregatis resplendens, sulphure mineralisata, ochra Martis luteâ perfusa. *ad Mausbacherhoff prope Eschweiler in Duc. Jul.*
- N. 80. Galena plumbi in Spato, Sulphure & ferro mineralisata, particulis fractis massâ ochraceâ confusè conglutinatis, fractura scabra. *ad Wolffart.*
- N. 81. Minera plumbi sparacea opaca cum minerâ zinci terreâ. *prope Mausbach.*
- N. 82. Minera plumbi cum ferro, & minerâ zinci flavescente. *ad Ortbusch.*

N. 83. Drusa mineræ plumbi viridis, mixta minera cupri terrea, & ochrâ Martis luteâ. *prope Radt in Eifflid.*

N. 84. De Galenâ pauperum Linn. varias asservo portiones, passim effossas in Ericeto Kalenbergensi ad Sistig, Fohr, Höffling, Entensuss, Farbhauß, Gluckstadt, quæ cùm præter paucum plumbum vix quicquam contineant, non nisi ad vasa fictilia vitro incrustanda (*zu glasirungen*) * adhibentur.

N. 85. Subnecto hic Lythagyrium ** è minerâ plumbi Wild- & Heidbergensi proveniens, ex quo sive flavo vel Chrysite, sive albo, vel Argyrite spatio annorum superius notatorum prodiere nongenta sexaginta sex centuimpondia, supra septem millia centum & quadraginta septem florenorum pretium.

Cuprum.

* Vid. Cronstedt. §. 189. pag. 207.

** Vid. Waller. pag. 571. §. 14. Spec. 27. N. 5.

CUPRUM.

De Minerâ Martis, quam in fodinis Ducatus Montensis mineræ Saturni passim coniunctam, ac paulò liberalius, quam in Ducatu Juliacensi se offerre; sed in hoc præ illo ad aurichalcurgiam magis conferre apud Stollbergenses nominatim deprehendimus, è fodinis jam sæpius laudatis supra mille ducenta, ac triginta septem centumpondia, flotenorum supra quinquaginta & tria millia ducentorum & quadraginta pretium profluxisse, in pugillaribus, & alibi notatum reperi, Callensium, Giessenichiorum, Vlattenium, aliarumque fodinarum in Juliâ ex Cupro Proventuum computationibus annuis heic silentio præteritis.

Adscribo ex Analectis meis sequentia.

N. 1. Ærugo nativa terrea. è Ducat. Mont. Sa-
trapid Windeck. Parochia Eckenbagen.

N. 2.

- N. 2. Ærugo nativa, sive ochra Cupri viridis, *
in Matrice fuscâ quarzosa. *ex Mittelacher in Ducat. Mont.*
- N. 3. Ærugo nativa opaca colore partim cæruleo-
lescente, partim viridi, in matrice spati albican-
tis. *ibidem.*
- N. 4. Ærugo nativa plumosa in minerâ cupri
terreâ colore subfusco. *ex Ruppichtrath in Duc. Mont.*
- N. 5. Ærugo nativa plumosa in minera cupri
flavescente quarzosâ. *ibidem.*
- N. 6. Ochra Veneris solida crystallifata seu lapis
Lazuli. ** *prope Vlatten in Eiffliâ.*
- N. 7. Ærugo nativa solida, sive Malachites. ***
prope Schmidten in Eiffliâ.
- N. 8. Cæruleum montanum immixtâ ærugine na-
tivâ in matrice arenosâ quarzosâ colore fusco.
ibidem.

C 5

N. 9.

* à Born part. I. pag. 105.

** Vid. Baumer. part. I. pag. 407. & 408. §. 12.

*** Baumer. ibid. pag. 409. §. 14.

- N. 9. Cæruleum montanum superficiale, & granularum * prope *Vlatten.* *ibidem.*
- N. 10. Drusa æruginis nativæ virescens mixta cæruleo montano crystallis quarzosis adnatis. *ibid.*
- N. 11. Ærugo nativa solida nitens. *haut procul Nideca.*
- N. 12. Drusa opaca Veneris, sive æruginis nativæ colore cæruleo immixto cum ochra Martis lutea. è *Satrap.* *Monaſt.* *Eiffl.* prope *Keldenig in Ericeto.*
- N. 13. Minera cupri flava cum Chrysocolla Agricolæ, sive ærugine nativa ** & cæruleo montano in Quarzo. prope *Ruppichtrath in Satrap.* *Blanckenberg.*
- N. 14. Minera cupri opaca, immixtis cupro lazureo plumoso, & ærugine in minera Veneris terrea colore subfuscō. *ibidem.*
- N. 15. † Minera cupri flavescens opaca, in quarzo albo, & marmore griseo. *ibidem.*

N. 16.

* Vid. Waller, pag. 361. §. 123. Spec. 270.

** Waller. 358. Spec. 269. & Bajer, oryct. Nor. pag. 94.

N. 16. Minera cupri viridescens cum ærugine in lapide quarzoso, & cæruleo montano superficiali.
ibidem.

N. 17. Minera cupri hepatica fulva, sulphure, & ferro mineralisata. *è Ducat. Mont. ad Wildberg. Scheurenschächtergang. paroch. Odenspiel.*

N. 18. Minera cupri viridis, ærugine nativa plumosa admixta; sulphure, & ferro mineralisata.
ibidem.

N. 19. Minera cupri hepatica, ferro, cupro, plumbō spatoſo, & sulphure mineralisata, asperfa ærugine nativa, admixto pyrite Veneris ex flavo viridescente. * *ad Schubbüschgen è fodinis ex adverso Mittelacher.*

N. 20. Minera cupri flavescentes, sulphure & ferro mineralisata, colore aureo nitens cum galena argentifera granulata, areis diversæ magnitudinis micans. *ad Wildberg Dornschächtergang in Satrap. Windeck.*

N. 21. Minera cupri, sulphure, arsenico & ferro mineralisata. *ibidem.*

* Vid. Cronstedt. pag. 213. §. 196.

- N. 22. Minera cupri flava solida cum minera cupri hepatica flava. *è Josina prope Mittelacher.*
- N. 23. Minera cupri subflava arsenicalis cum quarzo. *ibidem.*
- N. 24. Minera cupri colore jridis. *prope Lindlabr in Ducat. Mont.*
- N. 25. Minera cupri cum ochra ferri. *prope Lamersdorff in Monjaviā.*
- N. 26. Minera cupri inspersa ærugine nativa cum minera ferri ochracea. Variationes plurimæ. *è S:trap. Nidecensi prope Keldenich.*
- N. 27. Quarzum irregulare colore flavo, maculis cupri, & plumbi granulis hinc inde asperfis. *è fodinis prope Bensbergam jam ferè desertis.*



Ferrum

FERRUM.

Qauanta sit hujus Metalli in Ducatibus Juliæ, & Montium copia, abunde prodit fodinarum Caldenbacensium, Bornefeldenium, Steinbacensium, Windecensium, aliarumque Multitudo, officinarum item ferrariarum apud Sohlingenses, Remscheidianos, aliósque per omnem latè Patriam Montensem frequentia. Ferrariae idipsum non minus probant in Juliæ Fodinæ, quas per jndicis hujus decursum inditis eisdem, ac jam tum quasi propriis nominibus indigitavi, è quibus dives admodum Ferri minera circumcirca effosa ad fornaces, focos, melleósque Simonis - Callenses, Schevenhüttenses, Junckerenses, Gemundanos jam à trecentis annis sub Wilhelmo, septimo Juliæ, quarto Montium Duce G. M. notos excoquenda, ac fundenda ingenti singulis annis copia convehitur, ex quâ aliqua-

eliquatum dein, ac fusum Metallum aut in mollius, aut in durius temperatum, prout in usus varios destinatur, cum aliud Enses, aliud Limæ, aliud Arma in tutelam paranda sibi expostulent, in milenarios, sive domesticos, sive agrestes usus in centenis quaquaversum officinis aptatur, jn - & Accolarum commodo incredibili.

Specimina indico sequentia.

N. 1. Minera ferri alba spatoſa. * ad Wildberg ē Dornſchächtergang in Ducat. Mont. Satr. Windce.

N. 2. Minera ferri albicans commixta mineræ cupri flavæ. ibidem.

N. 3. Hæmatites globularis botryitim concretus ē Satrap. Steinbac. Paroch. Engelskirchen in Duc. Mont. Ferrum inde elicitum post iteratam in foco ferrario refectionem, chalybem præbet optimæ indolis.

N. 4. Minera ferri solidæ globosa, fracturâ glabra. ad Kauertz vulgo 15 Lomenphälen in Ober-

* Vid. quæ L. B. ex Cl. Poda in Edit. græcensi 1766. im continuat. amænit. academ. Linnæi pag. 243. citat.

Oberkaldenbach. in *Duc. Mont.* Centumpon-
dium fert libras 70 ad 80.

N. 5. Minera ferri nigricans cum micâ martiali.
è fodinis *Litzianis.* *ibidem.*

N. 6. Minera ferri albicans. *ad Eichenbövergang*
prope Remscheid, in *Satrap. Bornefeld. Duc.*
Mont. in crudam nihil agit Magnes, tostæ
vero pulveres ab eodem trahuntur.

N. 7. Minera ferri è cinereo nigricans. *ibidem.*
binæ jam notatæ Mineræ Martis species igni
adPLICARÆ facilius liquantur. in tigillis proba-
toriis examinatæ dant libras ferri 60 ad 70.
paratur ex eadem optimæ notæ chalybs.

N. 8. Hæmatites nigrescens cubis aggregatis mi-
cantibus. *prope Caldenbach.*

N. 9. Hæmatites figurâ planâ, fracturâ fibrosâ
nitente. *ex Obercaldenbach.* *ibidem.*

N. 10. Hæmatites turriculis, columnis, ac varia
textura obsitus, colore ex nigro nitente. *ibid.*

N. 11. Hæmatites † nigricans, stiriæformis, cel-
lulis aggregatis. *ibidem.*

N. 12.

N. 12. Hæmatites globosus colore cinereo- cæruleo. *ibidem.*

N. 13. Hæmatites colore variegato, globosus fractura tum glabra, tum fibroſa. *ibidem.*

N. 14. Hæmatites globosus solidus, fractura glabra. *prope Bendorff.*

N. 15. Hæmatites globosus flavescens. *ex Kemmerich versus Gimborn.*

N. 16. Hæmatites stiriaformis, tubulis aggregatis, croco fusco incrustatus. *è Duc. Mont.*

N. 17. Magnesia * nitens colore è nigro - griseo prope Wipperfürth in Ducat. Mont.

N. 18. Minerferri figurata, sive hæmatites ** botryites. *ad Palmbaum è fodinis Callensiibus in Satrap. Monast. Eiffl. in Duc. Juliac.*

N. 19. Hæmatites specularis *** contortus, crista ochracea hinc inde rectus. *ad Mickenschaaf in Ericeto. ibidem.*

* Vid. onomat. hist. natural. Tom. 5. pag. 12. & Waller. pag. 345. §. 121. Spec. 264.

** Vid. Waller. pag. 337. n. 6.

*** Waller. Spec. 257. pag. 335.

- N. 20. Hæmatites niger globosus. *ad Kalb. ibid.*
- N. 21. Hæmatites cellulosus colore subrubescente
ad Niederlaß. ibidem.
- N. 22. Hæmatites cellulis aggregatis colore par-
tim rubescente, partim flavo. *ad Ginzenberg
ibidem.*
- N. 23. Hæmatites globosus globulis accumulatis,
fractura arida. *ad Lindenbaum. ibidem.*
- N. 24. Hæmatites cristatus, colore in superficie
flavo, fractura lamelloſa. *ad Schürnerhoff ibid.*
- N. 25. Hæmatites in argilla indurata flavescente,
dendroides. *ad Renkessel. ibidem.*
- N. 26. Hæmatites solidus nigrescens, ochra fla-
vescente paſſim aspersus. *ad Fantertbier. ibid.*
- N. 27. Hæmatites bracteatus cellularis * *ad Kalb
in Ginzenberg.*
- N. 28. Hæmatites lamelloſus cum spato crystalli-
fato colore flavescente. *ad Kirschbaum. ibid.*
- N. 29. Hæmatites globosus superficie glabra *ad
Schmidtgen ibid. Centumpondium amictic to-
ftione libras 40.*

D

* Waller. Spec. 258. pag. 337.

- N. 30. Hæmatites dendroides, fractura fibrofa.
ad Grünwald. *ibidem.*
- N. 31. Hæmatites turritus stillatitius nigrescens.
ad Glucksberg in Silvæ. *ibidem.*
- N. 32. Hæmatites botryites, fractura arida. ad
Hülle prope Kappekul. *ibidem.*
- N. 33. Hæmatites testaceus fatiscens, fractura ari-
da. ad *Kirschbaum prope Kappekul.*
- N. 34. Hæmatites cellulosus lamellis spatois in-
tercurrentibus, fibris aggregatis prominulis.
ad *junge daube.* *ibidem.*
- N. 35. Hæmatites crystalus polymorphus, colore
partim rubescente, partim nigricante. ad *Haf-
selkaul.* *ibidem.*
- N. 36. Hæmatites stillatitius turritus fractura arida.
ad *alten Pallaßt in Sylvæ.* *ibidem.*
- N. 37. Hæmatites cellulis specularibus, fractura
partim striata, partim arida, superficie fusca
ochracea inquinante. ad *Mablmühl in Sylvæ*
ibidem.
- N. 38. Hæmatites ærites callimœ mobili. ad *Hus-
pelbaum.* *ibidem.*

- N. 39. Hæmatites granulis prominulis obsitus, colore hyalino variegato. *ad Gallbach prope Call.*
- N. 40. Hæmatites fractura fibrosa, turriculis è superficie glabra surgentibus, colore nigro nitente. *ad Gutestein. ibidem.*
- N. 41. † Hæmatites regulum Martis referens, ac cum eodem similis coloris, fractura glabra. *prope Heistert in Eifelid.*
- N. 42. Hæmatites è nigro splendens, adhærens Brecciæ, fractura striata ac fibrosa. *ad Kublach. ibidem.*
- N. 43. Hæmatites scoriam referens, granulatus, colore chalybeo. *prope Steinsfeld.*
- N. 44. Hæmatites colore subfuscō, pectiniformis ac cellulofus. *ibidem.*
- N. 45. Hæmatites figura plana, è superficie colorē jridis, seu caudæ Pavonis referens, in angulos rhomboidales definens, fluore albo crystallino obductus, fractura fibrosa. *ad Breide prope Keldenig.*
- N. 46. Hæmatites globosè in drusam ascendens. *ibidem.*

- N.* 47. † Hæmatites drusiformis, rubescens, marginibus cæruleoscentibus, fractura arida. *ibid.*
- N.* 48. Hæmatites geodes, inclusa argilla albicante indurata mobili, fractura glabra. *ex Ericeto prope Keldenig.*
- N.* 49. Hæmatites polymorphus turritus, tubulis aggregatis, è quibus à latere striæ tenuissimæ transversim excurrentes se produnt. *ad Bergwerck. ibidem.*
- N.* 50. Hæmatites colore cinereo, trochitarum typis hinc inde conspicuis, fractura arida. *ad Schmidtgen. ibid.m.*
- N.* 51. Hæmatites dendroides, tritura cæruleoscente inquinante, fractura arida. *ad Niederlaß. ibidem.*
- N.* 52. Hæmatites polymorphus cum typis milleporeticis. *ad Gluckauff. ilidem.*
- N.* 53. Hæmatites Botryites fatiscens fractura arida, adhærente argilla indurata, colore purpureoscente. *ad Finck. ibidem.*
- N.* 54. Hæmatites turriculis accumulatis è lacunis hinc inde assurgentibus, ochra flavescente asperitus. *ad Büchenbäumgen. ibidem.*

- N. 55. Hæmatites solidus particulis fibrosis aggregatis, variæ texturæ, colore jam nigro, jam flavo. *ad Breid. ibidem.*
- N. 56. Hæmatites globosus è rubro flavescens. *ad Fried. ibidem.*
- N. 57. Hæmatites botryites colore fusco fatiscens *ibidem.*
- N. 58. Hæmatites dendriticè pictus, cum argilla indurata, colore fusco. *ad Rothebeck. ibidem.*
- N. 59. Hæmatites hipuritibus, typis chamarum lævium, & striatarum, ac tubiporis circumcirca obsitus colore fusco - pullo. *ad Lieberg. ibid.*
- N. 60. Hæmatites globosus, globulis oblongis stylatiliis oberrantibus, crustâ ochraceâ flavescente obductus. *ad Fincken. ibidem.*
- N. 61. Hæmatites coralliis punctatis Escharæformibus in argillâ indurata, minerâ Martis imprægnata colore fusco, & flavescente. *ibidem.*
- N. 62. Hæmatites globis majoribus solitariis, ac minimis accumulatis hinc inde vagè obsitus, fratura arida. *ad Kirschbaum. ibidem.*

- N. 63.** Hæmatites botryites fractura arida, *ad Breidt. ibidem.*
- N. 64.** Hæmatites hemisphaericus fractura glabra colore subflavescente. *ibidem.*
- N. 65.** Hæmatites turritus, turribus, ac fistulis aggregatis opus gothicum æmulantibus, *ad Fröling prope Keldenig.*
- N. 66.** Hæmatites cylindraceus stillatitius * cylindris aggregatis. *ad Claus in Ericeto. ibid.*
- N. 67.** Hæmatites solidus botryites, fractura glabra, colore è pallido rubescente. *ad Pantherthier. ibidem.*
- N. 68.** Hæmatites turritus factura lamellosa, arsenico nudo albo protuberante. **
- N. 69.** Hæmatites stillatitius ochra perfusus, inquinans, cylindris aggregatis. *ad Brezel. ibid.*
- N. 70.** Hæmatites faticens micans sulphure mineralisatus, fractura arida. *ad Danzberg.*
- N. 71.** Hæmatites cylindricus, cylindris densè cohaerentibus, ochra flavescente obductus. *ad Kröel. ibidem.*

* à Born. part. I. pag. 120.

** Onomatolog. hist. nat. Tom. I. pag. 793.

- N. 72. Hæmatites botryites singularis, stylo fer-
reco læsus rubescit. *ad Blæser. ibidem.*
- N. 73. Hæmatites botryites solitarius, ochra pul-
verulenta inquinante obsitus. *ad Knörschel-
beck. ibidem.*
- N. 74. Hæmatites cellulosus, porosus, quarzosa
crusta obductus. *ad alte Brezel. ibidem.*
- N. 75. Hæmatites cærulescens, granulis prominu-
lis micantibus, fractura resplendente. *ad Nie-
derlass. ibidem.*
- N. 76. Hæmatites subglobosus, fractura porosa.
è fodinis Klermondianis prope Keldenig.
- N. 77. Hæmatites polymorphus, globulosus fla-
vescens. *ibidem.*
- N. 78. Hæmatites ex unâ parte globosus, turritus
ex alterâ, ochra subflavescente perfusus. *ex
Ericeto. ibidem.*
- N. 79. Hæmatites turritus, turriculis dense sibi
incubentibus, texturæ fibrosæ, flavescens. *ibid.*
- N. 80. Hæmatites granulis lævibus colore nigro
nitens, crusta ochracea hinc inde obductus. *ad
Printer. ibidem.*

- N. 81. Hæmatites hemisphaericus solidus, fractura arida, colore tum nigro, tum flavescente.
ad Glückstein. ibidem.
- N. 82. Hæmatites solidus botryites colore nigro splendente. *ad Wasserkaul. ibidem.*
- N. 83. Hæmatites lamellosus colore è nigro rubescente, fractura fibrosa. *ad Læhr. ibid.*
- N. 84. Hæmatites globosus colore rubicundo, fractura glabra. *ad pagum Keldenig.*
- N. 85. Hæmatites solidus globosus, globis nitentibus, fractura glabra, colore nigricante. *ibid.*
- N. 86. Hæmatites globosus, superficie nitente, fractura fibrosa. *ibidem.*
- N. 87. Hæmatites botryites fatiscens, fractura arida, tritura rubens, coloribus, nigro, cinereo, rubescente, & flavo mixtis. *ad pagum Dottelen versus Keldenig.*
- N. 88. Hæmatites organiformis, fistulis majoribus, ac minoribus aggregatis. *ad Danzberg prope Keldenig.*
- N. 89. Hæmatites solidus niger superficie splendente, ochra flavescente reticulatum oberrante. *ad Heidenkopff. ibidem.*

- N. 90. Hæmatites rugosus, solidus micans, fractura arida. *ibidem.*
- N. 91. Hæmatites colore hyalino, tuberculis lævibus obsitus, particulis quarzi albi hinc inde adnatis, fractura porosa. *ex Ericeto. ibidem.*
- N. 92. Hæmatites, turriculis aggregatis obliquè è fundo surgentibus adinstar montis opere gothicò turriti. *ad Danzberg. ibidem.*
- N. 93. Hæmatites solidus superficie crystallis polygonis obducta, fractura arida. *ibidem.*
- N. 94. Hæmatites subflavescens crystallisatus * crystallis cubic's obsitus. *ad Scheid. prope Mausbach in Satrap. Eschweiler.*
- N. 95. Hæmatites drusiformis, ochra flavescente, eidem incumbente crusta nigricante, & aerugine nativa obsitus. *ad Wafferkau in Ericeto prope Keldenig.*
- N. 96. Hæmatites scoriæformis, globulis aggregatis obductus. *ad Printer. ibidem.*

N. 97.

D 5

* à Bern. parl. I. pag. 120.

- N. 97. Hæmatites sphæricus, ætites embrione mobili, ochra colore croceo inquinante obtectus.
ad Gallbach prope Call.
- N. 98. Hæmatites nigricans superficie conis minimis aggregatis obsita, fractura fibrosa. *ibid.*
- N. 99. Hæmatites stillatius, globulis granulatis aggregatis, colore ex fusco flavescente, fractura rugosa. *ad Lohr. ibidem.*
- N. 100. Hæmatites drusicus dendroides prominentiis aristiformibus, fractura scabra. *ex Eriecto ibidem versus Soetenich.*
- N. 101. Hæmatites rugosè turritus fractura glabra, colore fusco. *ibidem.*
- N. 102. Hæmatites globosus botryites typis trochiformibus fundo nigricanti impressis obductus,
ad fodinas Klermondenses. ibidem.
- N. 103. Hæmatites amorphus fractura arida, æragine nativa, & plumosa, & ochra Martis lutea hinc inde perfusus. *ad Gallbach.*
- N. 104. Hæmatites botryites colore rubescente fractura glabra. *ad Buchbäumgen. ibidem.*

N. 105.

- N. 105. Hæmatites amorphus fractura lamellosa,
ochra rubra pulverulenta inquinante perfusus,
crusta ochræ fuscæ induratae hinc inde eandem
obtegente. *ad Sistig. ibidem.*
- N. 106. Hæmatites ex nigro fuscus superficie cu-
bis crystallinis quarzosis albis obsita. *ad Scheid.*
- N. 107. Hæmatites globosus globulis contiguis
ochra flavescente & lutea obsitus. *ad alte dauer-
be. ibidem.*
- N. 108. Hæmatites amorphus porosus, fractura
arida. *ad Anlauff. ibidem.*
- N. 109. Hæmatites solidus, superficie nitente co-
lore hyalino, & nigricante, fractura fibrosa.
ad Höffling. ibidem.
- N. 110. Hæmatites globosus, globulis stillatitiis
aggregatis defluentibus, colore flavo, fractura
arida. *ad Birnbaum. ibid.*
- N. 111. Hæmatites poriformis cellulosis fractura
tum arida, tum fibrosa. *ad Ginzenberg.*
- N. 112. Hæmatites solidus, cristatus superficie
splendente, colore nigro & rubro mixto. *ad
Kirmesdienstag. ibidem.*

N. 113.

N. 113. Hæmatites dendroides, superficie tuberculis sibi incumbentibus striis intermediis obducta, fundo ab argillâ aspersa rubescente. *ad Nachtigall. ibidem.*

N. 114. Hæmarites ochra flava indurata superficiem obducente, dendritibus nigricantibus, ac cœruleis prominentibus. *ad Palmbaum. ibid.*

N. 115. Hæmatites è fundo arido gemmulis aggregatis splendentibus, aliisque prominentiis cuspidatim excurrentibus admixtis ornata, fractura fibrosa. *ad Sistig. ibidem.*

N. 116. Hæmatites globosus, globis oblongis, colore rubro, fractura arida. *ad Pürck in Kapkul.*

N. 117. Hæmatites solidus striatus è fundo flavescente. *ad Krapel. ibidem.*

N. 118. Hæmatites stillatius tubulis aggregatis fractura arida. *ad Husar. ibidem.*

N. 119. Hæmatites globosus, globis solitariis. *ad Andauff. ibidem.*

N. 120. Hæmatites tubulis capillaribus aggregatis contiguis, colore cinereo. *ad Himmelsberg*

N. 121.

- N. 121. Hæmatites granulis, ac globulis confusis colore rubescente, fractura arida. *ibidem.*
- N. 122. Hæmatites speculari superficie, colore hyalino, fractura lamellosa. *ad Krappel.*
- N. 123. Hæmatites cellulosis, turriculis aggregatis è fundo partim nigricante, partim flavescente prodeuntibus, fractura arida. *ad Tauffstein. ibidem.*
- N. 124. Hæmatites mæandriticus, fractura fibrosa, ac lamellosa colore nigricante. *ad Dohm prope Krewinkel.*
- N. 125. Hæmatites superficie globosa nigra splendente, ochra colore rubescente, & croceo mixto perfusus, fractura varia. *ad Schwarzgrüb ibidem.*
- N. 126. Hæmatites globosus colore pallido- cinereo fractura porosa. *ad Fröschuichterweyer. ibidem.*
- N. 127. Hæmatites stratosus, lamellosus, stratis alternis ochra farctis, superficie dendritica. *ad Vichterbenden prope Stollberg.*
- N. 128. Hæmatites turritus ochra rubra, & fauna inquinante perfusus. *ad Rheinardsmabr. ibid*

- N. 129. Hæmatites solidus botryites venis spato-
sis immixtis colore nigerrimo, fractura tum
glabra tum micacea. ad Bendelmahr prope
Stollberg.
- N. 130. Hæmatites tubiporeticus colore fusco.
ad Mabrkaulen. ibidem,
- N. 131. Hæmatites ætites mutus, ochra flavescent-
te obductus. ad Ortbusch versus Gressenich.
- N. 132. Hæmatites botryites fractura cellulari.
ibidem.
- N. 133. Hæmatites globosus globis depresso, fra-
ctura rugosa, colore fusco. ad Kreutzfeld. ibid.
- N. 134. Hæmatites lacunosus superficie nitente
fractura arida glabra. ad Wasserkaul. ibidem.
- N. 135. Hæmatites superficie speculari, fractura
rubente. ad Mausbäckbacher.
- N. 136. Hæmarites cristatus solidus, colore ex-
cinereo cærulecente, fractura glabra. ex Neu-
enberg. ibidem.
- N. 137. Hæmatites botryites superficie partim
splendente, partim ochra rubescente tincta, fra-
ctura arida. prope Bleibubr.

N. 138.

N. 138. Hæmatites superficie rugosa ac scabra,
fractura arida. *prope Gemünd.*

N. 139. Hæmatites superficie colorata, fractura
fibrosa. *ad Daubenstein, & Höfflingsberg ver-*
sus Nöthen.

N. 140. Hæmatites crystallis penta- & hexagonis
aggregatis, texturæ spatoſæ subtilissimè reticu-
latæ, crusta superficiem ornante. *ad Lieffings-*
berg versus Nöthen & Gilsdorff.

N. 141. Hæmatites solidus squamis minoribus
nitens colore jridis, fractura micacea. *ex Harz-*
heimerberg. ibidem.

N. 142. Hæmatites solidus, fractura fibrosa ac
striata. *ad Jungenberg. ibidem.*

N. 142. Hæmatites hemisphæricus, fractura ari-
da, superficie exterius ochra flavescente ob-
ducta, intus granulata. *ad Deckersdahl versus*
Fversheim.

N. 144. Hæmatites globosus colore rubro, ad-
hærentibus particulis milleporæ punctatæ, fra-
ctura glabra. *prope Ripsdorff versus Bleibur*
& Berbur.

N. 145.

- N. 145. Hæmatites globulosus, arena incrustatus
colore pallido, fractura glabra. prope Lamers-
dorff in Duc. Jul.
- N. 146. Hæmatites fuscus cylindricus, cylindris
aggregatis colore flavo. prope Mausbach.
- N. 147. Hæmatites bracteatus foliaceus versico-
lor. prope Gressenich.
- N. 148. Hæmatites stiriaformis, tubulis aggrega-
tis ochra incrustatus. prope Harzheim in Eifflid.
- N. 149. Hæmatites foliaceus colore chalybeo. pro-
pe Harzheim.
- N. 150. Minera ferri squammosa, colore hepatico,
tubulis perforatis. ibidem.
- N. 151. Minera ferri squammosa cum hæmatite
pectiniformi. ibidem.
- N. 152. Minera ferri nodosa colore chalybeo.
ibidem.
- N. 153. Minera ferri squammosa, scoriæ similior,
antimonio & sulphure mineralisata. prope Kree-
winckel.

N. 154.

N. 154. Minera ferri chalybea * crystallisata, prope Holzheim.

N. 155. Minera ferri floribus martis cæruleoscentibus dendriticè picta, ad Lindenbaum in Eifl.

N. 156. Minera ferri drusis cylindricis obsita, colore subfuscō. ex Bilsen. ibidem.

N. 157. Minera ferri nigricans solida, ** superficie planâ splendente. prope Trimborn.

N. 158. Minera ferri nigricans punctulis micans *** prope Sötenichb.

N. 159. Minera ferri grisea granulata **** prope Solingen in Duc. Mont.

N. 160. Minera ferri calciformis, friabilis ochracea ***** è Satrap. Steinbac. in Duc. Mont.

N. 161. Minera ferri crustis ochraceis variis sibi incumbentibus obducta. ibidem.

E

N. 162.

* Vide Laur. Balck. in additam, ad amænit. academ. Linnaei pag. 250. & seq. &c.

** Vid. Waller. Spec. 254. pag. 331.

*** ibid. pag. 332. n. 2.

**** Vid. Waller. Spec. 255. pag. 333. n. 3.

***** Cronsted. mineral. §. 82. n. 13. apud L. B. in addit. ad amænit. acad. pag. 245. & 246.

N. 162. Minera ferri conchiliorum typis, & mil-
leporeticis particulis ochrâ confertis adhæret-
centibus. *ibidem.*

N. 163. Minera ferri flavescentis, tubulis minimis
farctis protuberantibus, colore nigricante. *ibid.*

N. 164. Minera ferri particulis arenaceis, & ar-
gillosis mixtis, è rubro flavescentibus obducta.
ibidem.

N. 165. Minera ferri crystallisata, fluore albicante
hinc inde aspersa. *ibidem.*

N. 166. Minera ferri cum hæmatite incrustato ex
meris stiriis conflata. *ibidem.*

N. 167. Minera ferri subfuscâ, stiriis hinc inde
pendulis. *ibidem.*

N. 168. Minera ferri palustris * spongiam refe-
rens, arenâ obducta. *ex Rurâ prope Gress-
bach in Duc. Jul.*

N. 169. † Calx martialis palustris phlogisto, hu-
mo paludosâ juncta colorem Cœruleo Beroli-
nensi

* Vid. Waller. Spec. 261, pag. 339.

nensi similem referens * è fodinis Turfæ palustris prope Neuenhausen in Satrapid Grevenbroich.

N. 170. Tophus ferro mineralisatus ** ibidem.

N. 171. Ardesia ferro mineralisata, arenosa, è fossa arenaria, prope Muchhausen ad limites Pat. Juliac.

N. 172. Bolus ruber, ferro mineralisatus effossus prope Neuenhausen in Satrap. Grevenbroch, in Turfæ fodinis ibidem *** à D.L.B. de Weipeler detectus 1776.

N. 173. Arena crassior croco Martis mineralisata colore flavescente. prope Muchhausen.

N. 174. Schistus martialis lamellosus lamellis ferri lacustris perstriatus. ibidem.

N. 175. Flos ferri crispatus candescens. è Ducat Mont.

E 2

N. 176.

* Vid. Cronstedt. pag. 220. §. 206. & Frid. Aug. Cartheus tract. Mineral. germanicè Gießæ edit. 1771. pag. 83.

** Vid. Waller. Spec. 261. pag. 339.

*** Vid. Cronstedt. fol. 102. §. 86. n. I.

- N. 176. Flos ferri albicans spatiformis, germinans. * *ibidem.*
- N. 177. Geodes martialis massâ arenaceâ incruster, adhærente poro igneo, sive Buddingstone lapillis variis aggregatis conglutinatis. *prope Castor in Duc. Jul.*
- N. 178. Geodes mineralia ferri imprægnatus callimo mobili. *prope Freyaldenboven in Duc. Jul.*
- N. 179. Geodes martialis cavitatibus pluribus distinctus ** è Satrap. Aldenboven.
- N. 180. Geodes oblongus figurâ ovali, callimo intus mobili. *ibidem.*
- N. 181. Geodes compressus, oblongus. *ibidem.*
- N. 182. Geodes minoribus pluribus aggregatis, argilla albicante mobili inclusâ. *ibidem.*
- N. 183. Ardesia, sive saxum martiale crustosum fracturâ micante, conchiliorum variis typis obscurum, ad chalybem scintillans. è Rheno prope Düsseldorf.

N. 184.

* Vid. Waller. Spec. 253. pag. 330. n. I. & L. B. in addit. ad amenit. acad. Linn. pag. 237. Coroll. 3.

** Waller. pag. 512. Spec. 457.

- N. 184. Geodes martialis superficie incrustata, & crystallis solitariis dodecaedris * planis irregularibus consistit. ex Obercaldenbach.
- N. 185. Geodes in margâ indurata ferro mineralisatus, terrâ inclusâ. è Satrap. Aldenhoven.
- N. 186. Ochra ferri ligno petrificato intimè mixta. prope Gerresheim ad Hardt. **
- N. 187. Hæmatites Belemnites cavitate inani. è Ducat. Mont.
- N. 188. Tubipora musica Linnæi in minerâ ferrí ochraceâ. è Ducat. Juliae.
- N. 189. Minera ferri retractoria *** in globulis arenæformibus, colore nigrescente **** è Rheino prope Mündelheim.
- N. 190. Ferrum retractorium in granis granatis ***** solitariis. è Rheno prope Cæsarwerdan.

* Vide à Born part. I. Tab. 2. fig. 13.

** Vid. Waller. page 343. Spec. 262. n. 5.

*** Vide Cronstedt. pag. 223. §. 210.

**** Vide Gellert principia Metallurg. Chini. german. Lipsiæ 1750. pag. 38. §. 76. conser. cum eodem Wallerii Spec. 266. pag. 347. n. I.

***** Vide Onomatolog. hist. nat. T. 4. pag. 43.

N. 191. Ferrum retractorium in granatis martia-
libus granulatis nigrescentibus * è Rheno pro-
pe Dusseldorfum.

N. 192. Lapis arenaceus micans martialis incrusta-
tus, colore tum fusco, tum flavescente, diver-
sis Chamarum, Pectinum, Turbinatum, Strom-
borum, Solenitum, Bucarditum, aliorumque
conchiliorum typis ac nucleis refertus, ustulati
moleculas trahente Magnete. prope Gerresheim,
& Montem Comitum passim in Ducat. Mont.

N. 193. Testudo in arenâ ferro mineralisatâ, sive
arenâ martiali ** quam seriùs ad me venien-
tem ultimo loco meritò reposui. ad Montem
Comitum. ibidem.

Index

* Cronstedt. pag. 85. §. 69. & sequent.

** Vid. Waller. pag. 338. Spec. 260.