

Coriandri,
 Carui,
 Cumini,
 Fœniculi dulcis,
 Santolinæ seu contra vermes,
 Item fructus vt amygdalæ,
 Pinei,
 Pistacia &c.

Cum in hac vrbe ad Pharmacopolas non spectent, sed vulgariter in pluribus officinis crustulâ sacchari vendantur obducta, conficere nō docemus.

TRACTATUS QUINTVS

De Electuarijs, Speciebus, & Pulueribus Purgantibus.

Innumeræ ferè sunt apud Authores Cathartico-
 rum Compositorum descriptiones, multiplex
 forma, multusque parandi modus: quæ omnia tra-
 dere, non solum superfluum, sed & Medicis, Phar-
 macopolis, ægrotis, & Reipublicæ nocuum. Ex
 his selectiora, præstantiora, & vsu maxime proba-
 ta damus: atque ea, in Electuary liquidi, vel solidi,
 & Pulverum siue Specierum formâ.

Electua-

Electuaria mollia purgantia, sunt Medicamenta composita ex simplicibus virtute purgatrice præditis, quæ mixta cum Melle, Syrupo, vel aliquo æquiualente, constituuntur in formam mollem, non fluidam tamen.

Solida verò quæ Tabellæ, Rotulæ, vel Lofyngæ vocantur, ex aquâ conueniente, & saccharo, aliove vicem gerente, simul coctis, aliquotque ex simplicibus Medicamentis, quorum aliqua purgatiuâ vi sunt prædita. Sicuti Pulueres siue species purgantes compositæ, sunt plura Medicamenta simplicia, quorum vnum, vel plura purgant in pulueres tenuissimos redacta, ac sibi inuicem bene permixta.

Pulueres, & Species Laxatiuæ.

Puluis Sennæ Montagnana.

℞. Fol. Sennæ Alexandrinæ mundate. ʒj. ꝑ.

Gingiberis,

Macis, ana ʒiij.

Cinnamomi,

Tartari, ana ʒj. ꝑ.

F. Puluis.

R 3

Species

Species Hyera simplicis.

℞. Cinnamomi,
 Macis, *vel* ligni Aloës,
 Rad. Afari,
 Spicæ Nardi Indicæ,
 Croci,
 Mastiches, ana ʒiij.
 Aloës socotrinæ succidæ, ʒvj. & ʒij.
 F. Puluis.

Species Hieræ Logadij.

℞. Trochiscorum Alhandali,
 Polypodij, ana ʒij.
 Euphorbij,
 Polij montani minoris,
 Semin. Thymelex, ana ʒj. ʒ. & gr. vj.
 Absynthy,
 Myrrhæ, ana ʒj. gr. xij.
 Centaurij minoris,
 Agarici,
 Ammoniaci,
 Folij, *vel eius loco* Macis,
 Spicæ indicæ,
 Scyllæ præparatæ,
 Diagrydy, ana ʒj.

Aloës

Aloës,
 Comarum Thymi,
 Chamedrios,
 Cassiæ lignæ,
 Bdellij,
 Marrubij, ana ꝑj. gr. xiiij.
 Cinnamomi,
 Opoponacis,
 Castorij,
 Aristologiæ longæ,
 Trium Piperum,
 Croci,
 Sagapeni,
 Petroselini Macedonici aa ʒ ꝑ.
 Ellebori nigri,
 albi, ana gr. vj.
 F. Puluis.

Sp. serum Diacarthami.

Descriptio habetur in Electuario solido, omissis
 Melle, & Mannâ.

Species Diaturbith cum Rhabarbaro.

℞. Turbith,
 Hermodactylorum, aa ʒ ꝑ.

Rha-

Rhabarbari, 3 v.

Diagrydij, 3 ij.

Santali rubri,

albi,

Flor. violarum,

Gingiberis, ana ʒ ij gr. v.

Mastiches,

Anisi,

Cinnamomi,

Crocī ana. gr. xv.

F. Puluis.

Species Elefchopi.

℞. Diagrydy,

Turbith, ana ʒ iij.

Caryophyllorum,

Cinnamomi,

Gingiberis,

Myrabolanorum,

Nucis Moscatae,

Polypody, ana ʒ iijʒ.

F. Puluis.

Puluis falsæ Laxativæ.

℞. Salsæ electæ, ʒ jʒ.

Folior. sennæ electæ, & mundatæ, ʒ j.

Her-

Hermodactylorum,

Turbith,

Ialappæ, ana ʒ ʒ.

Diagydy,

Tartari albi, an ʒ ij.

Thuris,

Anisi, ana ʒ j.

F. Puluis.

Puluis Panehymagogus.

℞. Scammoneæ Sulphure præparatæ, vti in Scammoneæ præparatione dicitur.

Antimonij, sequente modo præparati, ana ʒ j.

Cremeris Tartari, ʒ ʒ.

M. F. Puluis.

Antimonium hoc modo præparetur.

℞. Antimonij optimi puluerisati, ʒ j. ʒ.

Salis Nitri puluerisati, & lento igne parum exsiccati, ʒ iiij. ʒ.

Inspergatur primò Nitri ʒ j. in fundo Crucibuli, vel alterius profundioris vasis, deinde Antimonium, cum reliquo Nitri benè mixtum, superaddatur: accensa carbone ignito in loco aperto deto-

S

nent;

138 PVLVERES ET SPECIES LAXATIVÆ.
nent; Cauendum benè à fumo. Sic combusta fi-
nantur per vnum, vel alterum diem in caueâ: Affu-
sa post aquâ tepida benè solutis, & mixtis, crassio-
res partes paulatim ad fundum subsidentes, per de-
cantationem reiteratis vicibus separentur à flori-
bus, qui (crassa materiâ abiecta) aquâ tepida dul-
corati, ad fundum subsidentes, aquâ per inclina-
tionem, vel filtrationem separata, sole, vel lento
igne exsiccentur, & vsui seruentur.

Puluis ad Vermes.

R̄. Sem. Zedoariæ,
Corallinæ ana ʒvj.
Sem. Caulium,
Mali citri mundati, ana ʒij.
Cornu Cerui sine igne calcinati,
Scordij,
Dictamni Cretici, ana ʒj.ʒ.
Fol. Sennæ elect. & mundatæ,
Rhabarbari electi, ana ʒʒ.
Cinnamomi, ʒʒ.
F. Puluis.

Puluis

Puluis Paracelsi.

℞. Hermodactylorum,
 Turbith optimi,
 Diagrydy,
 Fol. Sennæ elect.
 Rasuræ cranij, vel ossium human.
 Sacchari an. p. e. M. f. Puluis subtilis.

Puluis Quercetani.

℞. Rad. Aaronis præparat. ʒj.
 Acori vulgaris,
 Pimpinellæ an. ʒʒ.
 Semin. Nasturtij,
 Oculor. cancri calcinat. an. ʒij.
 Cinamomi ʒj.ʒ.
 Salis Absynthy,
 Iuniperi an. ʒʒ.
 Sacchari rosati q. s. ad gustum.

Puluis Errhinus Rulandi.

℞. Semin. Nigellæ,
 Ellebori albi an. ʒj.
 Maioranæ,
 Rorismarini,
 Saluix an. ʒʒ. M. f. Puluis.

S 2

Electua-

Electuaria Purgantia.

Diacassia.

℞. Folior. Violarum,
 Maluæ,
 Mercurialis,
 Betae,
 Parietariae,

Flor. Violarum, ana M. ꝑ.

• F. Horum viridum decoctio in aq. comm. v .
 bulliant ad dimidij consumptionem, colaturâ benè
 expressâ, extrahatur Cassia, & ad singulas libras
 pulpæ addantur Mellis despumati, z vj.

F. s. a. Electuarium.

Electuarium Lenitium.

℞. Radic. Polypodij Quercini recentis,
 Passularum mundatarum, ana z ij.
 Hordei mundati, M. j.
 Capillorum Veneris,
 Florum Violarum, ana M. j.
 Iuiubarum,
 Sebesten, ana n^o. xx.
 Prunorum enucleatorum,

Tamo-

Tamarindorum, ana ꝑj.

Sem. Feniculi,

Glychirifæ rasæ, ana ꝑß.

Fol. Sennæ mundatæ, ꝑij.

Coquantur s. a. in aquæ comm. q. s. ad consumptionem duarum partium. Cola, Particulâ Colaturæ extrahe,

Pulpæ Cassiæ,

Tamarindorum,

Prunorum, ana ꝑiiij.

Reliquum colaturæ coquatur in Syrupum cum Sacchari, ꝑj.ß.

Sacchari violati, ꝑß.

Tunc adde pulpas extractas,

Fol. Sennæ mundat. puluer, ꝑiiij.ß.

F. s. a. Electuarium.

Diacatholicum.

R̄. Polypody Quercini, ꝑß.

Sem. Fœniculi ꝑß.

Benè coquantur in aq. ꝑvj. ad tertiæ partis consumptionem, & in parte colaturæ madescant

Tamarindorum,

Pulpæ Cassiæ, ana ꝑiiij.

S 3

In

In altera parte colaturæ dissolue Sacchari ꝛ iiii.
coque in Syrupi consistentiam : cum quo misce
pulpas prædictas, & sequētia puluerisata separatim,

Fol. Sennæ mundatæ ꝛ iiii.

Rhabarbari optimi,

Polypody Quercini, ana ꝛ ij.

Sem. Anisi, ꝛ ij.

Penidiorum,

Sacchari candi,

Flor. Violarum, ana ꝛ ij.

Sem. Quatuor frigidorum maior. mund, ana ꝛ iiii.

M. f. s. a. Electuarium.

Solent aliqui huic electuario medullam semi-
num Carthami inserere, vt sic verè viuersale, seu
Catholicum euadat, verum cum compositionem
hanc ingrediantur Rhabarbarum quod bilem fla-
vam, folia Sennæ quæ atram, radices Polipodij
Quercini quæ semel in infusione, iterumque in pu-
luere sufficienter pituitam, & reliqua omnia quæ
sanguinem mundant & expurgant, illam, vel omisso
Carthami semine, *Catholici* nomen iudicamus pro-
meræri. Cinamomū autem quod addunt, cum tan-
tum sua astringentiâ nocere, quam corroboratione
sua prodesse natum sit, non est quod consumma-
tam veterum compositionem immutet.

Dia-

Diaprunum simplex.

R. Pruna Damascena n^o. C. coquantur in aquæ quantum fieri potest minima quantitate, florum pulpa per cribrum traijciatur, & libra vna per se inspissetur.

In colato iure decoque florum Violarum, ʒ i ʒ.
Cola: in huius colaturâ madescant

Tamarindorum,

Pulpæ Cassiæ, ana ʒ j.

Sacchari clarificati, ʒ ij.

Agitata simul coquantur ad spissitudinem: deinde insperge sequentia separatim puluerifata:

Rhabarbari, ʒ j.

Santalorum alborum,

Rubrorum,

Spodij de Ebore,

Cinnamomi, ana ʒ iij.

Rosarum,

Violarum,

Sem. Portulacæ,

Scariolæ,

Berberis,

Succi Glychirifæ,

Gummi Tragacanthi, ana ʒ ij.

Sem. quatuor frigid. maior. mund. ana ʒ iij.

M. f. s. a. Electuarium.

Di-

Diaprunum solutivum.

R̄. Diapruni lenitiui iam descripti ad huc
calentis, ℞ j.

Scammonij præparati, ℥ ß.

M.F. Electuarium.

Diaphanicum.

R̄. Pulpæ Dactylorum mundatorum, ac in ace-
to infusorum, coctæ, ac cribro cretæ,
Penidiorum, ana ℞ ß.

Amygdalarum dulcium expurgatarum, ℥ iij. ß.
his contusis, permixtis, & per cribrum transa-
ctis, adde :

Mellis despumati ℞ ij.

Paulum coquantur : & deinde insperge Sepa-
ratim puluerisata :

Gingiberis,

Piperis,

Macis,

Cinnamomi,

Fol. Rutæ Siccorum,

Sem. Fœniculi,

Dauci, ana ℥ ij.

Tur-

Turpethi tenuissimè triti, ℥iiij.

Diagrydy ℥j. ꝑ.

M. f. Electuarium.

Electuarium de Succo Rosarum:

℞. Succu Rosarum rubrarum,

Sacchari albi, ana ꝑ. j. ꝑ.

Coque s. a. in fine inspergendo puluerifata.

Diagrydy, ℥j. ꝑ.

Santali rubri,

albi,

citrini, ana ℥vj.

Spodij de Ebore, ℥ij.

Camphoræ, ꝑ. j.

M. f. s. a. Electuarium.

Caryocostinum.

℞. Caryophyllorum,

Costi candidi, *vel in eius penuria,*

Rad. Fnulæ campanæ ficcata,

Gingiberis,

Cumini, ana ℥ij.

Hermodactylorum cortice mundatorum,

Diagridij, ana ℥ ꝑ.

T

Mel-

Mellis optimi ex vino albo despumati, & cocti
triplum, vel $\bar{3}$ vj.

F. f. a. Electuarium.

Diacydonium fernelij.

R̄. Poma Cydonia à corticibus, & semine
bene mundata, $\bar{3}$ j x.

Succi Cydoniorum, $\bar{3}$ iij.

Sacchari albissimi, $\bar{6}$ j.

Coque in Mellis crassitiem.

Inspergendo sub finem,

Cinnamomi triti, $\bar{3}$ ij.

Ginziberis,

Macis,

Caryophyllorum, ana $\bar{3}$ β .

Diagrydij, $\bar{3}$ j.

M. f. f. a. Electuarium.

Electuarium Benedictæ laxativa.

R̄. Turbith,

Sacchari, ana $\bar{3}$ x.

Rad. Esulæ aceto preparatæ,

Hermodaestylorum,

Diagrydy,

Rosarum rubrarum, ana $\bar{3}$ v.

Gin-

Ginziberis,
 Galangæ,
 Caryophyllorum,
 Cardamomi,
 Calami aromatici,
 Piperis longi,
 Macis,
 Spicæ Nardi,
 Croci,
 Sem. Apij,
 Carui,
 Fœniculi,
 Saxifragiæ,
 Milij solis,
 Pulpæ ex seminibus Asparagorum,
 ex Sem. Rusci,
 Salis Gemmæ, ana ʒj.

Purgantia grosso modo puluerisentur, semina
 verò, & reliqua omnia subtilius. Mixta diligenter
 in mortario, excepto Diagrydio, paulatim exci-
 piantur Mellis despumati adhuc calentis, ʒj.ʒ.

In fine addendo Diagrydium.

M. f. s. a. Electuarum.

Confectio Hamech.

℞. Cortic. Mirabolanorum Citrinorum, ʒ ij.
 Chebulorum,
 Nigrorum,
 Florum Violarum,
 Colocynthydos in nodulo ligati,
 Polypodij Quercini, ana ʒ j. ꝑ.
 Absynthy,
 Thymi, ana ʒ ꝑ.
 Anisi,
 Fœniculi,
 Rosarum rubrarum. ana ʒ iij.

Contusa omnia macerentur in seri Lactis, ʒ ij. ꝑ.
 Deinde coquantur ad ʒ j. & ʒ iij.

Fricentur manibus & exprimantur, huius colaturæ seruetur particula ad extrahendas sequentes Pulpas.

Reliquo adde succi fumarix, ʒ ꝑ.

Sacchari albi, & Mellis despumati, ana ʒ j.

Decoctis ad Mellis crassitiem, & percolatis adde Pulpar. præcedente decocto extractar.

Prunorum,

Vuarum passarum, ana ʒ ꝑ.

Tamarindorum, ʒ iij.

Castix

Cassia ꝑ ij. ꝑ.

Mannæ præcedente decocto dissol. ꝑ j.

Inspergendo sub finem sequentia puluer.

Agarici Trochiscati,

Fol. Sennæ elect. & mund. ana ꝑ ij.

Rhabarbari, ꝑ j. ꝑ.

Epithymi,

Diagridy, ana ꝑ j.

Cinnamomi,

Ginziberis, ana 3 ꝑ.

Sem. Fumariæ,

Anisi,

Spicæ Nardi, ana ꝑ j.

M. f. f. a. Electuarium.

Passule, & Pruna Laxativa.

℞. Fol. Sennæ elect. & mund. ꝑ iiij.

Cinnamomi,

Ginziberis, ana ꝑ iiij.

Aq. Endiuia,

Vini albi, ana ꝑ xiiij.

Infundantur; deinde leuiter ebulliant, & exprimantur, colaturæ adde

Sacchari albi ꝑ iiij.

Coquantur simul, ferè ad consistentiam Syrupi, iniiciendo tum Passularum, vel Prunorum repurgatorum, ꝑ j.

T 3

Et

& facta diuturna maceratione, & vna vel altera
ebullitione, ut Artis est seruentur.

Confectio Hieræ Picræ Galeni.

℞. Aloës soccotrinæ lucidæ, ꝯ j. & ʒʒ.
Cinnamomi,
Ligni Aloës,
Radic. Afari,
Spicæ Nardi,
Crocī,
Mastiches, ana ʒ vj.

Mellis despumati triplum seu ꝯ iij, & ʒ iij.

Hiera Diacolocynthidos.

℞. Stæchados,
Marrubij,
Chamed. virid.
Agarici,
Colocynthidos, ana ʒ v.
Diagrydij, ʒ ij.
Opoponacis,
Sagapeni,
Sem. Petroselini,
Aristologiæ rotundæ,
Piperis albi,

Cin-

Cinnamomi,
 Spicæ Nardi,
 Myrrhæ,
 Croci, ana ʒij.
 Mellis despumati, ℞ j. ʒ.

Primò soluantur Gummi in Vini, vel hydro-
 mellis q. s. colentur: parum cocta, calentia mis-
 ceantur cum Melle: cui adde paulatim ceteros pul-
 ueres, in fine Colocynthidem, & Agaricum sepa-
 ratim puluerisatum,

M. f. s. a. Electuarium.

*Diacarthamum, sive Diacnicum
 solidum.*

℞. Medullæ sem. Carthami,
 Hermodactylorum,
 Species Diatragac. frig. recenter dispens. ana ʒij.
 Turbith, ʒiij.
 Gingiberis,
 Mannæ granatæ, ana ʒj.
 Diagrydy, ʒj. ʒ.
 Sacchari Candi,
 Carnis Cydoniorum siccata,
 Mellis Rosati, ana ʒ ʒ.

Sac.

ELECTVARIA PURGANTIA.

Sacchari albi, ꝥ iij. & ꝥ ij.

Coquantur in aq. Rosarum ꝥ iij. aut q. s. ad consistentiam: Misce pulveres

F. f. a. Electuarium in Tabellis.

Suppositoria.

Conficiuntur ex Melle cocto dumt crassescat, nec amplius inquinet digitos. Acuuntur speciebus Hieræ simplicis, vel diacolocynthid, vel Trochiscis Alhandal, ex præscripto Medici.



TRA.