

CLASSIS SEPTIMA.

Continens Pulveres solutivos.

Pulvis Catholicus.

- ℞. **D**iagridii drach. IX.
*Antimonii per trinam detonationem
 cum tertiâ parte nitri parati & non
 edulcorati drach. VI.*
Tartari crystallini drach. III.
 Misce f. Pulvis.

Pulvis Dia-Carthami.

- ℞. *Medulle seminis Carthami,*
Hermodytylorum mundatorum,
Specierum Dia-tragantbi frigidi an. Unc. ℞.
Turbith optimi drach. VI.
Diagridii drach. III.
Zinziberis,
Cinnamomi an. drach. II.
 Misce, & f. T. a. Pulvis.
 Nota, quod *Diagridium* semper sit per
 se terendam, postea aliis immiscendum.

Pulvis Dia-turbith cum Rheo.

- ℞. *Rhabarbari optimi drach. X.*
Turbith albi & gummosi,
Hermodytylorum mundator. an. Unc. I.
Diagridii Unc. ℞.
Zinziberis,

Santali albi,
rubri,

Florum Violarum an. drach. I. β.

Mastiches,

Semin. Anisi,

Cinnamom.

Croci an. drach. β.

Misce, & f. f. a. Pulvis.

Pulvis Hermodactylatæ Venetæ.

℞. *Hermodactylorum à cortice superiori mundatorum Unc. I. β.*

Turbith alb. & gummosi Unc. I.

Glycyrrhizæ rasæ,

Mechoacæ albæ an. drach. VI.

Diagridii drach. III.

Zinziberis drach. II.

Misce, & f. f. a. Pulvis.

Pulvis Sennæ Montagnæ.

℞. *Fol. Senæ Orientalium mundator, Unc. II.*

Cremoris Tartari Unc. β.

Semin. Fœniculi dulcis drach. II.

Salis gemmæ,

Macis,

Cinnamomi an. drach. I.

Misce, & fiat Pulvis.

Pulvis pro Suppositoriis.

℞. *Albës drach. II.*

Cumini,

Rutæ,

Salis gemmæ an. drach. I.

Misce & f. Pulvis qui cum f. q. mellis
cocti subigatur & f. Supposit.

Si fortiora desiderentur potest addi

Trockis, alhandal drach. I.