

PILVLÆ.

*Iliacæ Rasis, nono ad Almanforem,
capite de Colico dolore.*

℞. Colocynthis & Sagapeni ana ʒ x.
Scammonia ʒ ii). (aliis ʒ iij. & tertiam, ut
sint ʒ iij. ʒ j). Sed certe delendum est [&
tertiam,] & Arculanus Rasis Commentator
non agnoscit)

Forma Pilulas.

Sagapenum vino dissolvendum, colan-
dum; & eo reliqua excipienda. Eorum usus
nonnunquam necessarius in colica biliosa, Pieta-
viensi dicta, ubi alvus lemoribus Cathart: cis sur-
da non respondet, & vi paulo validiore metastasis
in brachia per alvum revocanda.

Indæ Haly, apud Meluem. In quibus Lapis
Lazuli diligenter lavetur, sed non uratur.

Ex Pulvere Hieræ Pachii, incorporato cum
Syrupo Rosato solutivo.

Auræ Nicolai, non diminuto Scammonio.

Cocciæ Rasis, cum suo Scammonio toto: que
prima descriptio est apud Silvium, contra
sententiam Iouberii: ut habeas quas deso-
bustioribus, & minore quantitate.

De Agarico, Mesuræ.

Lucis maiores, Mesuræ.

Fortidæ maiores, Mesuræ.

E e 7

De

De Hermodactylis maiores, Mesuæ.
De Thymelæa, Mesuæ, *vel potius* De Esula
Fernelii; *quarum descriptio sequitur.*

Pilula de Esula Fernelii.

℞. Corticum Radicum Esule minoris, macerata horis vigintiquatuor in Aceto & Succo Portulacæ, ʒ ij.

Grana Ricini expurgata & torrefacta num. xl.

Myrobalanorum citrinorum ʒ j. ꝑ.

Chamædryos Chamæpityos

Spicæ Nardi Cinnamomi ana ʒ ij.

Omnia tenuissime trita excipiantur uncia una Tragacanthi Aqua Rosarum soluti: & fiat massa. Esula menses octo ante sit collecta, non recens.

Valde turbant: sed sunt efficaces in corporibus robustis. Minus exsiccabuntur, sed & minus efficaces erunt, si excipiantur Syrupo Rosarum soluti-vo, non mucagine Tragacanthi.

Aggregativæ Mesuæ; in quibus par quantitas Scammonii, Turbith, & Aloës, scilicet ana ʒ ij.

De Hiera, cum Agarico.

Ruffi, seu cōmunes, Melle Rosato comprehensa.

Pilula Scaligeri.

℞. Aloës (bis Succo Endiviæ, & bis Succo Rosa-

Rosarum lotæ, & iterum bis imbutæ
 expressione drachmarū sex Rhei electi
 infusi in Aqua Endivię, cum tertia parte
 Vini albi, & ℥β. Spicæ Nardi) ℥ij.β.

Galangæ ℥ ij.

Succi Absinthii latifolii inspissati, &

Salis Gemmæ ana ℥℞.

Fiat massa.

Mercuriales (si quando usus venerit) paranda
 in modum sequentem, ut sunt apud Renodorum.

Pilule Mercuriales.

℞. Hydrargyri in Succo Limonum pri-
 mum extincti, & postea in Succo Salvię
 nutriti ℥ vj.

Aloës optimæ ℥ v. Rhabarbari ℥ iij.

Diacydii ℥ ij. Agarici ℥ j.

Styracis calamitæ Cinnamomi Macis

Santali citrini Salsæ Parilliæ

Sassafras Moschi ana ℥β.

Mellis in decocto Guaiaci despumati, &
 ad aquæ consumptionem cocti, quod
 sufficit. Fiat massa, digitis paucis O-
 leo Terebinthinæ imbutis tractanda
 aliquam diu, ac postea usui reponenda.

Pilula ex Aristolochia Fernellii.

℞. Radicum Aristolochiæ rotundæ ℥ j.

Radi.

Radicum Gentianæ

Myrrhæ electæ ana ʒ iiij.

Aloës Cinnamomi ana ʒ ß.

Zingiberis ana ʒ j.

Omnia exquisitissime trita excipiantur

Oleo Amygdalorum dulcium recenti.

Paranda in rem præsentem.

De Cynog'osso, Mesux, addendo Syracis
 ʒ iiij. *Reliqua quæ à quibusdam adiecta fue-
 runt, humores attenuant, quos incrassare con-
 silium est; ideoque omittenda. Nostrium Cyno-
 glossum non est malum veri Cynoglossi anti-
 ballomenon.*

A Q V Æ D I S T I L L A T Æ.

Tartari.	Nymphææ.	Euphragiæ.
Vitrioli.	Papaveris	Salviæ.
Sulphuris.	rubri.	Maiorana.
Vitæ.	Graminis,	Melissæ.
Scabiosæ.	Solani.	Scordii.
Endiviæ.	Plantaginis.	Cardui bene- dicti.
Acerosæ.	Herniariæ.	Vlmaria.
Cichorii.	Buglossi.	Cuciata.
Violarum.	Botaginis.	Aluminosa.
Rosarum.	Tussilaginis.	Cinnamomi.
Lactucæ.	Betonica.	
Pimpinellæ.	Absinthii.	
Portulacæ.	Fœniculi.	

Aqua