

FRANCISCI DISSALDEI
D. Medici Parisiensis Regii

PHARMACONETES,

five

PHARMACITIS BIBLOS:

Liber continens PHARMACA tam
Simplicia quam composita, quæ
in Officinis parata habere debent
Pharmacopœi.

Apud Galenum lib. 6. Comp. Med. Gen.
cap. 7. reperias Andromachum scripsisse
librum *Φαρμακωνίτην*, de Remediis que ex-
trinsecus corpori admoventur. Sed legen-
dum, vocabulo non admodum usitato,
Φαρμακωνήτην, ut sit Liber comparā dorum
Remediorum: ad eum modum quo apud
Pollucem citatur ex Dinarcho *ἀντισητής*.
aut vocabulo usitatissimo *Φαρμακίτην*.

POPVLO SALMVRIENSI

FR. Diffaldeus Medicus

S. P. D.

CONQUESTI sunt apud me sæpius vestri pharmacopœi (Civæ optimi,) quod in tanto Medicamentorum, tam Simplificium quam Compositorum pelago hærentes, quæ in medicum usum parare, quæ omittere debeant, ignorent. Unde fit, ut Officinis, copia alioquin Remediorum laborantibus, ea sæpe desint quæ ad morborum curationem sint necessaria. Hinc quanta agris perniciës oriatur, Cuiusmodi in vobis non difficile dictu est; non parvo etiam ipsorum Pharmacopœorum damno, qui necessarii dum sæpe carent, multa inutilia sibi sibi corrumpi experiuntur. Ego itaque ex longo usu, multumque trita, quam vestri habeo, experientia, agrorum bono publico hæc exaravi, ut in posterum nec medicis desit quod præscribant, nec pharmacopœis, quo medicorum præscripta exsequantur: & venia locus non sit, si eorum Officina aut necessarii carent, aut pravis sciant. Volo præterea, ut hoc perpetuo meminerint Pharmacopœi, hæc sibi Pharmaca tantum esse, hoc est, si ex suo arbitrio abutantur, venena præsentissima; sin ex arte ac methodo à peritis medicis in usum traducantur, remedia efficacissima: atque ut pie simul ac eleganter

D d 4

ab

ab Herophilo olim dictum, ad restituendam sanitatem $\chi\epsilon\gamma\alpha\varsigma$ $\eta\epsilon\omega\upsilon$. Ne ergo eorum usum sibi permittant temerarii; aut, si permiserint, severe in eos à iudicibus, quibus publica salutis cura tradita est, animadvertatur. Servari autem in his scribendis eam temperiem, ut ex simplicibus ea tantum enumerarem, qua in Officinis asservari solent, iis qua ex tempore colligi possunt omissis, & iis etiam qua ad illustrium tantum & magni nominis Compositionum dispensationem comparanda veniunt; quod ea satius sit recentia habere, quam carie exesa & vetustate exsoluta, ex Officinis in usum producere. Ex Compositis autem, ea etiam sola in unoquoque genere recensui, quae & selectiora sunt, & usu frequentiora, & magis ad salutem egrorum comparanda necessaria; iis qua in vulgatis Dispensatoriis descripta habentur, solo digito, ut aiunt, indicatis: iis autem qua vulgo non extant, integris adscriptis. Sic factum spero, ut hic Medicamentarius libellus, & mole minor multo, & suis tamen numeris omnibus ornatiores cumulatior prodeat. Notas etiam huc illuc adpersi, lectoris, nisi me animus fallit, non inutiles futuras. Hac si publice profuerit, satis superque mihi est; qui in hoc mustaceo laureolam non quare. Vivite, ac valete.

Φαρμακωνηλις η Φαρμακωπις Γιβλο.

hoc est,

MEDICAMENTARIUS LIBELLVS,

seu

LIBER CONTINENS PHARMACA,

TAM SIMPLICIA QUAM COMPOSITA,
quæ in Officinis parata habere
debent Pharmacopœi.

MEDICAMENTA SIMPLICIA.

TERRENA & MARINA	Arfenicum.
Bolus Armena.	Ærugo.
Terra sigillata.	Cadmia, seu Lapis
Fragmenta pretiosa	Calaminaris.
Lapis {	Pompholyx.
	Cerussa.
	Sulphur { Vivum
Bezoardicus	Excoctum
Sanguinalis	Flores Sulphuris.
Iudaicus	
Lazuli.	
Bitumen Iudaicum	Alumen.
Ambarum Griscum	Sal gemmæ.
Corallium.	Chalcanthum.
Margaritæ.	Vitriolū Romanū.
Succinum.	Chryfocolla noſtra,
	ſive Borax, res fa-
METALLICA.	citia.
Lithargy- {	
Auri	
Argentii	
	D d s Argem-

Argentū vivum	} Simplex Sublima- tum Præcipi- tatum.	Salvia.
		Vitex, seu Agnus. Sena.
		Epithymum Cuscuta.

P L A N T A R U M

Folia, cum surculis.

R A D I C E S.

Summitates Rubi	Angelicę
Equisetum	Afari
Herniaria	Aristolochiarum
Absinthiū latifoliū	trium.
Ceterach	Althęæ
Artemisia.	Capparum, cortex.
Calamintha.	Acori vulgaris.
Euphrasia	Galangę
Caryophyllata, cum radice.	Helenii
Mentha,	Pyrethri
Origanum.	Pęonię
Pulegium	Tussilaginis
Betonica	Ireos Florentinę.
Verbena	Acori veri, sive Ca- lami aromatici
Periclymenum seu Caprifolium.	vulgaris. Cyperii.
Chamędrydys	Spicę Nardi.
Chamępitys	Sinarū, seu Chinę.
Centaureum minus	Salsę Parillię.
Hypericum	Ellebori { Albi. Nigri.
Melissa	

Rhabarbari.	Macis.
Polypodii.	Fraxini.
Agarici. <i>Fungus est</i>	Sambuci.
<i>inter radices adnu-</i>	Mali Citrii.
<i>meratus.</i>	Mali Aurantii.
Hermodactylorum.	Cupulæ Glandium.
Turbith.	Malicorium.

Glycyrrhizæ.
Pentaphylli.
Bistortæ.
Tormentillæ.
Plantaginis.

FLORES

LIGNA.

Aloës	Verbasçi albi.
Guaiaci	Rosarum Rubrarum
Nephriticum	Violarum
Visci quercini	Cichorii
Sassafras	Nymphææ,
	Ba austiorum.
	Cytinorum
	Buglossi.
	Boraginis.
	Croci.
	Betonicæ.
Santali { Albi	Caryophyllorum.
{ Rubri	Rorismarini.
{ Citrini.	

CORTICES.

Guaiaci.	Agui.
Tamaricis.	Præoniæ.
Radicū Capparum.	Sambuci.
Thuris.	Anethi.
Cinnamomi.	Chamæmeli.
	Meliloti
	Genistæ.

Dd 6

3E-

SEMINA.

Cydoniorum.

Ptyllii.

Acetosæ.

Hyoscyami { albi
nigri.Quatuor } ma-
semina frig. } iora.
 } mino-
 } ra.Capita Pa- } albi.
paveris } nigri.

Hordei excorticati.

Berberis.

Malvæ.

Althææ.

Raphani.

Atriplicis.

Cnici.

Periclymeni.

Bombacis.

Goriandri.

Vriticæ.

Cumini.

Sinapi.

Ocymi.

Citri.

Nigellæ Romanæ,
Præniæ.

Agni, seu Viticis.

Lini.

Fœnigræci.

Lithospermon.

Saxifragæ.

Lupini.

Orobi.

Fabæ.

Quatuor se } ma-
mina calida } iora.
 } mi-
 } nora.

FRUCTUS.

Amygdala { dulcia.
 } amara.

Ficus.

Gallæ.

Nuces Cupressi.

Nuces Moschatæ

Dactyli

Sebesten.

Iuiubæ.

Tamarindi.

Passule } Damasce-
 } na.
 } Corinthia-
 } ca.
 } Vulgares.
 } Cassia

Cassia cathartica.

Halicacabi.

Quadruplex genus

Myrobalanorum:

ad bilem, Citrina;

ad melancholiam

Inda; ad phlegma

Cepula & Empe-

litica. *Quintum ge-**nus Beletzscorum ad**densanda tantum**coria usurpari ait**Garcias ab Horto.**Vetat tamen omitti**sincera sedulitas in**Compositionibus in**quibus prescribun-**tur.*

Colocynthis.

Lauri

Myrti

Bacçe } Iuniperi, in

vino rubro

generoso

præparatæ.

Grana Kermes.

Rotū-

dum. } al-

ni-

grū

Manna Arabum, five

Mel acrium.

Piper } Long-

gum.

Succi inspissati.

Absinthii latifolii.

Græco-

iū, seu

Agri-

monia.

Mesua,

seu A-

gerati.

Avicē-

næ, seu

Canna-

binæ.

Glycyrrhizæ.

Chelidonii maioris.

*Exfoliis, caule, radi-**ce, exprimitur suc-**cus inente astate: in**areo vase cum melle**prunis decoquatur.**Servetur ad ocula-**ria remedia.*

Cremor Tartari.

Sapa.

Ladanum.

Asa fœtida.

Opium.

Aloë.

Manna Arabum, five

Mel acrium.

D d 7

Scam-

Scammonium.

Mel.

Saccharum

Cera.

SUCCE LIQUIDI,

superfuso Oleo.

Lupulorum

Rosarum

Cydoniorum

Berberis

Ribes.

Cichorii.

Citri, seu Limonū.

VINA.

Absinthites.

Euphrasium.

Passularum.

GUMMI ET RESINÆ.

Tragacanthum.

Arabicum.

Caphura.

Sandaracha Arabum.

Bbellium.

Galbanum.

Myrrha.

Mastiche.

Thus.

Styrax { Solida.

Liquida.

Benzoinum.

Ammoniacum.

Terebinthina.

Euphorbium.

Sagapenum.

Opopanax

Pix.

ANIMALIA,

et eorum partes ac ex-
crementa.

Cantharides.

Pulmo Vulpis.

Hepar lupinum.

Adeps { Gallinæ.

Anseris.

Anatis.

Castorium.

Dens atri.

Vnicornu.

Ebur.

Cervi { Genitale.

Cornu.

Sebum.

Medulla.

Oscordis { Bovis.

Cervi.

Cra-

Cranium hominis non sepulti. Vngula { Alcis.
Afni.

Hirci { Sanguis.
Sebum. Moschus.
Zibettum.

Sericum { Crudum. Reliqua sedula diligē-
Intinctū tia comparabunt Phar-
iucco Ker macopai in dispōsatione
mes. Sericū singularū Cōpositionum:
in quibus conficiendis
vulgatū Cra advocabunt Medicos.
mesinum ve Quæ vero recentia, at-
nenatū est. que (ut vocant) viridia
& Arsenico colliguntur, ut refrige-
infidum. rantia atque humectan-
Leporis { Coagulū tia fere omnia, ea ex
Pili è vē tempore, pro usu ac ne-
tre. cessitate parabuntur.

COMPOSITA.

Decocta, quæ vulgo à Medicis nomine tenus indicantur.

Decoctio Clysteris carminativa.

℞. Seminum Anisi Fœniculi
Cumini ana ʒ β.
Baccarum Lauri contularum ʒ iij.
Florum Chamæmeli & Anethi ana M. β.
Coque in aqua communi ad dimidias.
De-

*Decoctione communis Clysterum
remollientium.*

℞. Malvæ Violariæ Parietariæ
Betæ Mercurialis ana manip. j.
Foliorum Liliorum alborum M. β.
Seminis Fœniculi ℥ β.
Coque in aqua sufficiente.

Decoctione pectorale simplex.

℞. Hordei mundati ℥ j.
Capilli Veneris Scabiolæ Tussilaginis
ana M. j.
Hyssopti M. β.
Passularum mundatarum ℥ vj.
Sebesten, Iuiubarum ana num. xv.
Dactylorum num. vj.
Caricarum pinguium num. iiij.
Glycyrrhizæ ℥ β.
Fiat decoctio ex arte in ℥. iiij. Aquæ flu-
viæ, ad consumptionem libræ unius.

*Decoctione pectorale compositum,
cum Sena.*

℞. Foliorum Senæ mundatæ ℥ ij. β.
Parum bulliant in Decoctione superioris
colati libra una & dimidia. Infundantur
sex horas: postea exprimantur leviter.

Deco-

*Decoctum commune medicina,
cum & sine Sena.*

℞. Radicum Polypodii quercini ℥ ℞.
 Passularum mundatarum ℥ ij.
 Sebesten Prunorum ana num. xij.
 Florum Boraginis Violarum Rosarum ru-
 brarum ana ℥ ij.

Fiat decoctio secundum artem.

Vt fiat compositum,

℞. Foliorum Senæ mundatorum ℥ ij β.
 Parum bulliant in decocti superioris
 lib. j. β. addita Caryophylloꝝ ℥ j. In-
 fundantur sex horas: postea leviter expri-
 mantur.

Lac Virgineum, ut est apud Weckerum.

℞. Aluminis crudi ℥ iiij.

Aquæ fluvix lib. ij.

Decoquantur ad tertias. Postea

℞. Lithargyrii lib. ℞.

Aceti optimi lib j. β.

Coquantur, donec remaneat libra una.

Ambæ aquæ colatæ misceantur, & agi-
 tentur, donec lactis colorem adipiscantur.

Potio vulneraria, sive Decoctum

Sclopetarium, ut vulgo paratur.

℞. Cancrorum fluviatilium ustorum, &
 sub-

subtilissime pulverifatorum ʒ ij.
 Radicum Aristolochiæ rotundæ, & Con-
 solidæ maioris

Foliorum Prunellæ

Baccarum Lauri ana ʒ j.

Contundantur crasso modo: includan-
 tur linteo raro, & bulliant in Vini albi li-
 bris tribus, donec tertia pars consumpra
 sit: addendo circa medium decoctionis
 Vincæ Pervincæ pugillum unum.

Fiat colatura.

ALIA COMPOSITA.

Saccharum Rosatum tabulatum.

Saccharum Penidiatū, ex aqua Hordei.

Baciki Bechici, vulgo

Rebecha dicti.

℞. Pulveris Diæreos, Diatragacanthi fri-
 gidi ana ʒ ij.

Pulveris Glycyrrhizæ ʒ β.

Sacchari canditi ʒ iiij.

Sacchari Tabarzeth, hoc est albissimi,
 lib. j. β.

Cum Gummi Tragacanthi aqua Rosa-
 rum soluto fiat pasta, ex qua parentur Ba-
 culi, ad usum reponendi.

Mel

Rosarum.

Violatum.

Anthosatum.

Mercuriale, *ex succo non decocto paratum: quod quidam pessime faciunt.*

CONSERVÆ.

Rosarum { Liquida
Solida

Violarum.

Nymphææ

Cichorii.

Boraginiis.

Anthos.

Radicum { Inulæ.
Symphyti.
Eryngii.

Surculorum tenerorum Absinthii latifolii exorticorum.

Diacynorrhodō cū pauco Saccharo paratū
Cydoniatum.Corticum { Arantiorum.
Citriorum.Fructuum { Cerasorum, Berberis, Ribes,
Omphacii, Cornorum,
Mororum semimaturorum.

SYRVPI.

Rosarū pallidarū, novem { Simplex &
ad minimum infusionū { Cōpositus cum
Agarico.
Rosa-

Rosarum rubrarum siccarum, ex libra una
Rosarum, horis viginti quatuor infu-
sarum in aquę repidę lib. iij. & expres-
sione cocta cū Sacchari albissimi lib. ij.

Violarum { Violatus,
Laxativus, ex novem infu-
sionibus.

Floribus arborum Perficarum.

De Symphyto.

Florum Nymphææ simplex, ex duabus in-
fusionibus, apud Ioubertum.

Cydoniorum { Cum Saccharo.
Sine Saccharo excoctus.

Malorum granatorum *acido-dulcium: vel ex
aquis partibus acidorum & dulcium.*

Berberis.

Aciditatis Citri.

Syrupus è Corticibus Mali Citrii.

℞. Corticum Malorum Citriorum re-
centium, in aqua maceratorum & præ-
paratorum lib. j.

Coquantur in aquæ lib. vj. donec lib. ij.
super sint: & cum lib. iij. Sacchari albi
fiat Syrupus.

Condiatur pars una Syrupi Moschi gra-
nis duobus, Ambre griseę grano uno.

De Pomis Simplex, & Compositus, Sa-
boris Regis. Isque duplex: scilicet cum
simplici Senna, & cum triplicata Senna.

Iu-

Iuiubinus.

De Tuffilagine

De Glycyrrhiza. *See pro aqua Rosarum acci-
pe aquam infusionis Rosarum pallidarum, ex
Fracrum Minorum consilio.*Adiathinus { Communis.
 { Monspeulensis, prout ha-
 { beri poterit.

De Althæa.

*Syrupus de Stœchade, descriptionis
Fernelii.*℞. Florum Stœchados ℥ iiij.
Thymi Calaminthes Origani an. ℥ j. β.
Salviæ Betonicæ Florum Rorismarini
ana ℥ β.Sem. Rutæ Pæoniæ Fœniculi ana ℥ iiij.
Coquantur in aquæ libris decem ad di-
midias. In colatura adde Sacchari & Mel-
lis ana lib. ij. Fiat Syrupus, aromatizatus
Cinnamomi, Zingiberis & Calami aro-
matici ana ℥ ij. raro liateo ligatis, & in
Syrupo appensis.De Absinthio Mesuz. *Ex Absinthio nostra-
re latifolio, prius seorsim in aqua tepida ma-
cerato.*De Artemisia. *In quo cur pro Buglossa neces-
sario substituendum sit Albugilissa, ut vo-
luit Ioubertus, non video: cum Buglossum
verum, quæ nostra Borago est, vel solo flore*

menses potenter moveat, & succo etiam secundas deiciat. Attamen *Archusa* primavera-dix (qua *Arabum* *Albugilissa* est) apud *Dioscoridem* vulva indita etiam fetus mortuos extrahere dicitur. Ita ut parum referat, utram ponas, *Anchusam* aut *Boraginem*. Verum correctior multo est & melior descriptio Syrupi de *Artemisia* apud *Fernelium*: eamque sequendam puto.

Syrupus de Artemisia Fernelii.

℞. *Artemisia* manipulos ij.
 Rad. *Helenii* Rubiæ *Pæoniæ*
Levistici *Fœniculi* ana ʒ ß.
Pulegii *Origani* *Calaminthæ*
Nepitæ *Melissophylli* *Sabinæ*
Sampfuchi *Hyssopti* *Prasii*
Chamædryos *Chamæpityos*
Hyperici *Parthenii* *Betonicæ* ana
 manip. j.
 Seminis *Anisi* *Petroselini* *Fœniculi*
Ocymi *Dauci* *Rutæ* *Nigellæ* ana ʒ iij.
 Contusa maceretur horis viginti quatuor
 in *Hydromelitis* libris octo.
 Coquantur ad lib. v. & cum *Sacchari*
 lb. v. percoquantur in *Syrupum*, conditum
Cinnamomi uncia una, *Spicæ* drachmis tribus.

De *Mentha* simplex, cum *Saccharo* para-

Simplex, ex succo Cichorii,
& Sacchari dimidio.

De Cichorio } Compositus, Nicolai Flo-
rentini, (non Prapostiti, qui
Rheum octuplum ponit.)

Ex capitibus utriusque Papaveris.

Papaveris Rhœadis.

Diamoron Mesuæ.

Oxyfaccharum simplex.

Oxymel simplex dilutum.

Oxymel Scilliticum merum, & sine aqua,
aut saltem

Acerum Scilliticum, ex quo in rem presentem
posset Oxymel parari.

Syrupus Diachelonon, seu de Te-
studinibus.

℞. Carnis Testudinum ℥ iiij.

Hordei mundati ℥ ij.

Carnis Dactylorum ℥ j.

Passularum Damascenarum

Glycyrrhizæ rasæ ana ℥ vj.

Sebesten Iuibas ana num. xij.

Seminis Bombacis Melonum

Cucumeris Citrulli ana ℥ β.

Sem. Lactuæ Papaveris albi ana ℥ ij.

Vngulæ caballinæ Pulmonariæ an. man. j.

Florum Violarum Nenupharis ana ℥ β.

Fiat decoctio, ut decet.

In colatura clarificata, ad lib. iiij. adde

Sac-

Sacchari albissimi lib. ij. Sacchari Rosati & Diatragacanthi frigidi ana ꝑ̄v. Fiat Syrupus perfecte coctus.

Testudinum caro (amputatis collo, cauda & pedibus) à sordibus repurgetur incidatur in frusta simul cum reliquis coquatur. Deinde colaturæ adde Saccharum Rosatum, & Diatragacanthum. Loco Diatragacanthi quidam subiiciunt Saccharum Penidiatum. Vtrumque non male.

PVLVERES.

Lumbricorum.

Diamargaritum frigidum	} Cum Ambra & Moscho.
apud Silvium	
	} Sine Ambra & Moscho.

Triasantali Nicolai.

Diarrhodon Abbatis, apud Nicolaum.

Aromaticum Rosatum Gabrielis, apud Mesuem.

Diambra.

Diatragacanthum frigidum Nicolai.

Diairis simplex Mesuæ.

Diacarthami Arnaldi de Villa nova apud Silvium.

ELE.

ELECTVARIA

PVRGANTIA MOLLIA.

Diacassia Nicolai Præpositi, *additis æquis
partibus Cassia & Mellis, ac non decocta
Cassia.*

Catholicum { Ex pulveribus
Ex infusione pulverum,
Sena & Rheo duplicatis
sic parandum, ut sequitur.

*Catholicum ex infusione pulverum,
Sena & Rheo.*

℞. Rad. Polypodii semisiccati
Foliorum Senæ mundatorum ana ℥ vj.
Vioiarum ℥ iij.
Sem. Anisi & Fœniculi dulcis ana ℥ ij.
Glycyrrhizæ rasæ
Quatuor Sem. frigidorum maiorum mun-
datorum ana ℥ j

Contusa omnia (exceptis Sena, Semi-
nibus frigidis maioribus, & Floribus Vio-
iarum) macerentur horis xxij. in aquæ
fluviz quâtitate sufficiente (vel ℔ v.) po-
stea coquantur leniter in balneo Mariæ.
Paulo antequam ab igne removeantur, ad-
de Senam, Semina frigida maiora, & Vio-
larum

℞ e

larum

larum Flores. Macerentur calide aliquot horas in balneo. Vbi refrixerint, linteolo colentur, & exprimantur leviter. Colaturę pars una servetur pro infusione Rhabbari: Altera iterum coquatur, donec in consistentiam Mellis crasset: adiectis Sacchari albi lib. viij. & addendo in fine decoctionis infusionem unciarum viij Rhei electi, seorsim factam in parte reservata decoctionis Polypodii. Iterum coquatur, sed lento igne.

Postea ab igne remotis adde Florum Cassię (extractę ad vaporem decocti præscripti) & Tamarindorum an. ζ viij. Sacchari Candi, & Penidiorum ana ζ β .

Fiat Electuarium.

Tryphera Persica Mesurę, ex correctione Fratrum Minorum, apud Ioubertum.

Diaprunis \int Simplex.

Nicolai. \int Solutivus. *Et quia brevi acescit, quo tempore Pruna recentia desunt, paretur ex Pulpa decoctionis Prunorum, potius quam ut acidum in usum recipiatur.*

Confectio Hamech maior, apud Mesuem. *Huic cur minorem, minus efficacem, præferat Ioubertus, non video. Ingrata est: sed non detur delicatis. Neque reprobandum puto Serum lactis, quod longis infusionibus acescat (parcant mihi docti viri.) Nam Serum non ideo reiciculum, quod acidum. Tale enim & tenuius*

nuius est, & magis refrigerat; ideoque magis domat acrium acrimoniam, & feliciter eorum quae infunduntur vires elicit. Denique cur in hac Compositione improbabitur Serum acidum, cum in Tryphera Persica & Diaphanico feratur Acetum? Verumtamen, si displicet quod in hac Compositione multa sine arte & confuse traduntur: Nam cur Rhabarbarum coquitur? (coquitur quidem Mesia; sed recens, puta, compactum ac validum: at nostrum inveteratum, laxum, proptereaque evanidum, constat coctione vim catharticam amittere. An non Cassia & Manna cum Tamarindis cocta corrumpuntur? An non Dacrydii vires coctione exsolvuntur? praterquam quod sic aliis non facile Dacrydium commiscetur, ita ut in omnibus Compositionis partibus par facultas non reperiat?) si cui, inquam, hac displicent, praferatur ea, quae ex Fernellii censura & artificiosior & efficacior est; cuius descriptio sequitur.

Confectio Hamech, ex censura
Fernellii.

℞. Corticum Myrobalanorum citrinarum $\frac{z}{ij}$.
Myrobal. Cepularum Myrob. Indarum
Violarum Colocynthidis
Polypodii querni ana $\frac{z}{j}$ β.
Absinthii Thymi ana $\frac{z}{j}$ β.
Seminum Anisi Fœniculi
Ee 2 Ro.

Rosarum rubrarum ana ꝓ iij.

Tusa omnia macerentur per diem in lib. ij. Seri lactis: deinde coquantur ad libram unam. Fricentur manibus, & exprimantur.

Colaturæ adde

Succi Fumarix Pulpæ Prunorum, & Vvarum Passarum ana lib. β.

Sacchari albi Mellis despumati an. ℥. j. Coquantur ad consistentiam Mellis: inspergendo sub finem

Agarici & Senæ pulveratorum ana ꝓ iij.

Rhabarbari triti ꝓ j. β. Epithymi ꝓ j.

Diacrydii ꝓ vj.

Cinnamomi ꝓ β. Zingiberis ꝓ ij.

Sem. Fumarix Anisi Spicę Nardi an. ꝓ j.

Fiat Electuarium.

Benedicta laxativa Nicolai Alexandrini.

Hiera picra simplex, mellita, Galeni.

Hiera diacolocynthidos Pachii, ex Scribonio Largo, bono medico, in usum revocata.

Hiera Lagodii, Nicolai Myrepsi.

Caryocostinum Garyoponti, apud Ioubertum capite de Benedicta.

Hydragogum Fernelii { Maius.
Minus.

Nullum vulgo extat Hydragogum in Officinis. Ideo duo hac hic addenda existimaui. Minus mitius est, ita ut gravidis etiam dari possit: Maius validius, & non nisi paulo robustioribus idoneum.

Hy-

Hydragogum minus Fernelii.

℞. Succī Rosarum pallidarum ℥̄ β.
 Sacchari albi Mellis optimi ana ℥̄ xv.
 Coquantur dum expumaverint & crasse-
 scant. Tum adde
 Succī radicū Ebuli lib. j.
 Prassii ficci Sem. Fœniculi tritorum
 ana ℥̄ ij.
 Acinorum Ebuli & Sambuci ana ℥̄ ij.
 Cinnamomi ℥̄ vj.
 Macis Galangæ ana ℥̄ iiij.
 Coquantur igne lento, in Mellis cras-
 sificem.

Hydragogum maius Fernelii.

℞. Serī lactis lib. viij.
 Sacchari albi Carnis Cydoniorum ex
 aceto coctorum ana ℥̄ x.
 Mannæ Calabrinæ ℥̄ v.
 Coquantur igne lento, ad Mellis consi-
 stentiam. Sub finem adde
 Foliorum Laureolæ præparatæ ex Oleo
 Amygdalarum dulcium & Aceto ℥̄ ij.
Præparatio Laureolæ sic faciendâ: Folia
 Laureolæ macerentur horis xxiiij. in Ace-
 to & Succo Portulacæ, vel Mali Granati:
 modice coquantur: exprimantur, siccen-
 tur, terantur. Deinde affunde Aquæ Ro-
 sarum
 ℞ 3

farū lib.ß. Olei Amygdalarū dulciū ʒj.ß.
 Bulliant rursus ad consumptionem aque.

Pulvis cum superstitute Oleo addatur in
 Compositionem.

ELECTVARIA PURGANTIA, SOLIDA.

Diacarthami Arnaldi de Villa Nova,
 apud Silvium. *Hoc Electuario nullum in usū
 frequentius; nullius descriptio in Dispensariis mi-
 nus constant.*

De Succo Rosarum Nicolai Præpositi,
*cum suo Scammonio toto, contra sententiam
 Silvii; ut vere sit Calcar medicinarum.*

De Citro solutivum Guidonis, apud Iouber-
 tum. *Nam in aliis fere Sena omittitur.*

ELECTVARIA VOMITORIA.

Electuaria vomitoriæ. { Mitius.
 { Validius.

*Nulla extant in Officinis & Dispensatoriis
 vulgaribus vomitoria composita. Ideo & hæc
 hic addere, optimum putavi. Scio parari posse in
 rem presentem, sed que careant beneficio fermenta-
 tionis.*

Mitius, Diasarou dictum Fernelio, sic
 paratur.

Dia-

Diasarou Fernelii, vomitivum mitius.

℞. Syruporum Menthæ & Violarum
ana $\frac{3}{4}$ viij.

Coquantur ad consistentiam Mellis. Sub
finem, subducto igne, insperge

Rad. Peponis arefactæ

Sem. Raphani & Vrticæ, maceratorum in
aqua Rosarum, arefactorum & tritæ
rum ana $\frac{3}{4}$ j.

Radiciis Afari tritæ & cretæ $\frac{3}{4}$ ij.

Cinnamomi Sem. Fœniculi ana $\frac{3}{4}$ iij.

Fiat Electuarium.

Validius, imo validissimum Dielleborou,
in morbis contumacibus, robustis corporibus, ac
thoracis ampli, facile vomentibus, atque corpore
rite preparato usurpandum.

*Dielleborou Fernelii, vomitivum
validum.*

℞. Caryophyllorum $\frac{3}{4}$ ij.

Fibrarum Ellebori albi siccarum & incisa-
rum lib. j.

Aquæ lib. xiiij.

Fiat infusio per tres dies. Hinc fiat deco-
ctio ad consumptionem mediæ partis:
& facta diligenti expressione, abiciat-
ur Elleborum. Tum adde

Mellis lb. vij.

Ec 4

Sy-

Syrupi de Nymphæa lib. j.

Succi Raphani ꝓ iiij.

Reperatur coctio, donec reducatur ad consistentiam Mellis.

Electuarium vitreo vase excipiat; & condatur ad usus.

ELECTVARIA ALTERANTIA.

Electuarium contra vermes.

℞. Farinæ Lupinorum ꝓ iiij.

Corallinæ Dictamni albi ana ꝓ j. ꝑ.

Cornu Cervi, Sem. Caulium, ana ꝓ j.

Rhabarbari ꝓ β.

Fiat pulvis, dividendus in duas partes.

Utraque pars coquatur seorsim, cum Sacchari in aqua Graminis dissoluti ꝓ iiij.

Sed uni parti adde Diacrydii ꝓ ij. Trochiscorum Alhandal gr. vj.

Diacodium solidum.

℞. Caputum Papaveris albi cum suis seminibus, quantum voles: Coque: fortiter exprime. Decocti expressi libra una coquatur cum altera libra Sacchari, ad consistentiam Confusionis Manus Christi, rudicula aliquamdiu agitando.

Ser-

Servetur ad distillationes ferinas.

Potest parari canaidius & suavius ex solo semine, sed minus efficax.

Philonium Persicum Mesuæ.

Pilonium Romanum Nicolai.

De Baccis Lauri Rasis.

Diasatyrium. (Nam & huius usus sapiusculum necessarius est.) Ex tribus autem eius descriptionibus, sequens refertur Fernelio.

Diasatyrium Fernelii.

℞. Radicis Satyrii, recentis ac solidæ

Rad. Pastinacæ sativæ Rad. Eryngii

Nucis Indicæ Strobilorum

Pistaciorum ana ℥ j. ℞.

Caryophyllorum Zingiberis Anisi

Sem. Erucae Sem. Fraxini ana ℥ vj.

Cinnamomi Caudarum Scincorum

Seminis Buii ana ℥ ij. ℞.

Moschi gr. vi.

Mellis optimi despumati ℥ iij.

Radices tusæ coquantur ex melle, &

subigantur: Deinde Nux Indica, Strobili

& Pistaciæ tusæ similiter adiiiciantur. Po-

stremo etiam reliqua exquisite trita.

Theriaca trium ætatum.

Mithridatium Damocratis.

Alkermes Mesuæ, ex infusione Serici crudi,
& Syrupo Kermesino, cum Ambra tota. Ne
cum illis erres, qui falsis ducti rationibus, di-

Ec 5 midia.

mediatam tantum ponunt, & Compositionem reddunt minus efficacem; & ut ita dicam, minus spiritualem. Calor Ambra, inquit, in regionibus Septentrionalibus & frigidioribus metuendus est, quia in his interna magis calent. Rîdicule. Certe interna magis calent, sed calido innato, hoc est, temperato & humido; non acri & sicco. Quod si hac Ambra quantitas in regionibus Meridionalibus, ubi calor & acrior & sicciore est, calore non nocuit, multo minus in nostris, ubi mitior calor est, & humido temperatior, ac quantitate tantum excedens, non qualitate. Nî hac vera sint, astate quam hyeme calida convenientiora; & male Hippocrates libro De diata idiotarum dixerit, Hyeme parcius & meracius bibendum; astate largius, sed dilutius. Eadem enim ratio regionum, quæ temporum.

De Hyacintho, descriptione Iouberti, quæ hæc est.

*Electuarium de Hyacintho Iouberti,
ad obstructions hepatis & lienis.*

℞. Limaturæ Chalybis ustæ in crucibulo donec rubeat, & diligenter in mortario tritæ, sine extinctione, ℥ iiij.

Diarrhodon Abbatis

Aromatici Rosati ana ℥ j.

Thymi Epithymi Cinnamomi ana ℥ β.

Ex una parte, additis pulveris Hieræ picræ ℥ vj. cū Syrupo de Artemisia fiat massa

Pilu-

Pilularum : ex altera , cum octuplo Saccharo fiant tabellæ ponderis drachmarum duarum aut trium. Saccharum coquatur cum parcissima aqua. Vbi optime despumatum fuerit, pulveres indantur, & continue agitentur, ne Chalybs in imum resideat. Mediocriter cocta, & paulo minus quam Saccharum Rosarum, defundantur supra marmor aut chartam; manibus subigantur, aut spathula agitentur; & formentur tabellæ; ne, si immotæ refixerint, cavæ reperiantur.

Restat Electuarium unum, Resumptivum dictum, ad restorationem virium, in iis qui diuturno morbo contabuerunt. Sic autem descriptum à Fernelio.

Electuarium Rosarum Fernelii.

Rz. Rosarum rubrarum
 Glycyrrhizæ ana ʒ ij. gr. v.
 Gummi Arabiei
 Tragacanthi ana ʒ ij. ʒ ij.
 Santali rubri & albi ana ʒ iiij.
 Succi Glycyrrhizæ Amyli
 Seminis Papaveris albi
 Portulacæ Lactuæ Scariolæ ana ʒ iiij.
 Quatuor seminum frigidorum maiorum
 Sem. Cydoniorum Malvæ Bombacis
 Violarum Strobilorum
 Pistaciorum recentium

Ee 6

Amy-

Amygdalarum dulcium

Pulpæ Sebesten ana ʒ ij.

Caryophyllorum Spodii

Cinnamomi ana ʒ j.

Croci gr. v.

Penidiorum ʒ β.

Terantur: excipiantur triplo Syrupo
Violaceo. Fiat Electuarium molle.

TROCHISCI.

De Agarico.

Alhandal, sive de Colocynthide.

De Karabe.

De Myrrha Nicolai.

Albi Rafis { cum Opio.

} sine Opio.

Gordonis apud Bauderonem.

Trochisci Andronis.

℞. Cytinorum ʒ i.

Gallarum ʒ j.

Myrrhæ Aristolochiæ rotundæ ana ʒ β.

Chalcanthi Aluminis scissilis

Mysios Cyprii ana ʒ ij.

Excipiantur passo. *Antiballomenon, sive
Succedaneum Mysios sit Vitriolum vetustum,
ustum.*

PILVLÆ.

*Iliacæ Rasis, nono ad Almanforem,
capite de Colico dolore.*

R. Colocynthidis & Sagapeni ana ʒ x.
Scammonia ʒ ii). (*aliis ʒ iij. & tertiam, ut
sint ʒ iij. ʒ j.* Sed certe delendum est [*&
tertiam,*] & Arculanus Rasis Commentator
non agnoscit.)

Forma Pilulas.

Sagapenum vino dissolvendum, colan-
dum; & eo reliqua excipienda. Eorum usus
nonnunquam necessarius in colica biliosa, Pieta-
viensi dicta, ubi alvus lemoribus Cathart: cis sur-
da non respondet, & vi paulo validiore metastasis
in brachia per alvum revocanda.

Indæ Haly, apud Meluem. In quibus Lapis
Lazuli diligenter lavetur, sed non uratur.

Ex Pulvere Hieræ Pachii, incorporato cum
Syrupo Rosato solutivo.

Auræ Nicolai, non diminuto Scammonio.

Cocciæ Rasis, cum suo Scammonio toto: *que
prima descriptio est apud Silvium, contra
sententiam Iouberii: ut habeas quas deso-
bustioribus, & minore quantitate.*

De Agarico, Mesuræ.

Lucis maiores, Mesuræ.

Fortidæ maiores, Mesuræ.

E e 7

De

De Hermodactylis maiores, Mesuæ.
De Thymelæa, Mesuæ, *vel potius* De Esula
Fernelii; *quarum descriptio sequitur.*

Pilula de Esula Fernelii.

℞. Corticum Radicum Esule minoris, macerata horis vigintiquatuor in Aceto & Succo Portulacæ, ʒ ij.

Grana Ricini expurgata & torrefacta num. xl.

Myrobalanorum citrinorum ʒ j. ꝑ.

Chamædryos Chamæpityos

Spicæ Nardi Cinnamomi ana ʒ ij.

Omnia tenuissime trita excipiantur una Tragacanthi Aqua Rosarum soluti: & fiat massa. Esula menses octo ante sit collecta, non recens.

Valde turbant: sed sunt efficaces in corporibus robustis. Minus exsiccabuntur, sed & minus efficaces erunt, si excipiantur Syrupo Rosarum soluti-vo, non mucagine Tragacanthi.

Aggregativæ Mesuæ; in quibus par quantitas Scammoni, Turbith, & Aloës, scilicet ana ʒ ij.

De Hiera, cum Agarico.

Ruffi, seu cōmunes, Melle Rosato comprehensa.

Pilula Scaligeri.

℞. Aloës (bis Succo Endiviæ, & bis Succo Rosa-

Rosarum lotæ, & iterum bis imbutæ
 expressione drachmarū sex Rhei electi
 infusi in Aqua Endivię, cum tertia parte
 Vini albi, & ℥β. Spicæ Nardi) ℥ij.β.

Galangæ ℥ ij.

Succi Absinthii latifolii inspissati, &

Salis Gemmæ ana ℥℞.

Fiat massa.

*Mercuriales (si quando usus venerit) paranda
 in modum sequentem, ut sunt apud Renodorum.*

Pilule Mercuriales.

℞. Hydrargyri in Succo Limonum pri-
 mum extincti, & postea in Succo Salvię
 nutriti ℥ vj.

Aloës optimæ ℥ v. Rhabarbari ℥ iij.

Diacydii ℥ ij. Agarici ℥ j.

Styracis calamitæ Cinnamomi Macis

Santali citrini Salsæ Parilliæ

Sassafras Moschi ana ℥β.

Mellis in decocto Guaiaci despumati, &
 ad aquæ consumptionem cocti, quod
 sufficit. Fiat massa, digitis paucis O-
 leo Terebinthinæ imbutis tractanda
 aliquamdiu, ac postea usui reponenda.

Pilula ex Aristolochia Fernellii.

℞. Radicum Aristolochiæ rotundæ ℥ j.

Radi.

Radicum Gentianæ

Myrrhæ electæ ana ʒ iiij.

Aloës Cinnamomi ana ʒ ß.

Zingiberis ana ʒ j.

Omnia exquisitissime trita excipiantur
Oleo Amygdalorum dulcium recenti.*Paranda in rem præsentem.*

De Cynog'osso, Mesux, addendo Syracis
ʒ iiij. Reliqua quæ à quibusdam adiecta fue-
runt, humores attenuant, quos incrassare con-
siliū est; ideoque omittenda. Nostrium Cyno-
glossum non est malum veri Cynoglossi anti-
ballomenon.

A Q V Æ D I S T I L L A T Æ.

Tartari.	Nymphææ.	Euphragiæ.
Vitrioli.	Papaveris	Salviæ.
Sulphuris.	rubri.	Maiorana.
Vitæ.	Graminis,	Melissæ.
Scabiosæ.	Solani.	Scordii.
Endiviæ.	Plantaginis.	Cardui bene-
Acerosæ.	Herniariæ.	dicti.
Cichorii.	Buglossi.	Ulmariæ.
Violarum.	Botaginis.	Cuciata.
Rosarum.	Tussilaginis.	Aluminosa.
Lactucæ.	Betonica.	Cinnamomi.
Pimpinellæ.	Absinthii.	
Portulacæ.	Fœniculi.	

Aqua

Aqua Theriacalis optima.

℞. Radicum Gentianæ Enulæ Campanæ
 Tormentillæ Angelicæ
 Imperatoriæ ana ζ j.
 Cyperi Ireos Florentinæ ana 3 vj.
 Zedoariæ
 Corticis Citri ficci, & Arantiorum
 Cinnamomi Caryophyllorum
 Seminis Cardui benedicti
 Corymborum Hedera
 Granorum Iuniperi ana ζ β .
 Dictamni Scordii Melissæ
 Calendulæ ana manip. β .

Macerentur diem integrum super cineres calidos, in vase oris stricti, optime obturati, cum Vini albi lib. vi.

Die sequente adde decoctionis Ulmaria, Betonica & Nenupharis libras ij. Deinde bulliant parum, lento igne. Postea fiat expressio: in qua dissolve & infunde per noctem Theriacæ optimæ ζ iiij. Ponantur in alembico vitreo, & fiat distillatio in balneo Mariæ.

Aqua distillata seruetur.

Facultates omnes recreat: qualitates pestilentes & venenatas domat: syncopæ, cordis palpitationi, vertigini, lethargo, epilepsiæ, apoplexiæ, & paralyfi succurrit.

Aquæ

Aqua vitæ aurea, magna & vere Empirica compositionis (Thomæ Erasti:) quam nos, rebus non immutatus, in paulo meliorem ordinem rededimus.

Aqua vitæ aurea Thomæ Erasti.

℞. Rosarum ℥ j. β.
 Caryophyllatæ Baccarum Iuniperi
 Florum Lavendulæ ana ℥ j.
 Salviæ minoris Origani Bistortæ
 Rutæ Radicum Petroselini ana ℥ vj.
 Betonicæ Rorismarini Maioranæ
 Pulegii Bismalvæ Valerianæ
 Pimpinellæ Succisæ Menthæ crispæ
 (an *Mentha hortensis*? Certe non errabit qui
 eam accipiet)
 Menthæ silvestris Verbenæ Keiri
 Radicum Levistici Tormentillæ
 Polypodii ana ℥ β.
 Absinthii Hyssopi ana ℥ ij.
 Magistratiæ (hoc est Mei, seu Imperatrici) ℥ j.
 Contusa omnia crassiuscule, macerentur
 in tribus mensuris spiritus Vini (accipe
 quantitatem sufficientem, ad iam præscriptorum
 & sequentium infusionem rite peragendā) quin-
 quies distillati in vase bene obturato, per
 dies tres. Postea diligenter distillentur.
 Aquæ huic distillatæ infunde
 Anisi Glycyrrhizæ
 Conservæ Rosarum ana ℥ j. β.

Cin

Cinnamomi Garyophyllorum Malo-
rum Granatorum (*coricis scilicet*)

Zingiberis albi

Nucis moschatae Macis

Galangae Calami aromatici

Zedoariae Aristolochiae rotundae

Mechoacae Foliorum Lauri

Seminis Coriandri Cardamomi

Nigellae Romanae Sacchari Candi

Manus Christi Perlatae ana $\frac{z}{j}$.

Cubebaurū Baccaturū Lauri excorticatarum

Cumini (*seminis scilicet*)

Rhaponici (*radicis*) Corticis Arantiorū

Theriaca ana $\frac{z}{ij}$.

Granorum Paradisi Rhabarbari

Croci ana $\frac{z}{j}$.

Piperis longi Piperis nigri ana $\frac{z}{j}$.

Mellis optimi despumati lib. j.

Contusa omnia crassiore modo in vase
stanneo obturato relinquuntur per dies
decem. Singulis diebus agitentur bene.
Postea distillentur denuo: & huic aquae
distillatae adde

Sacchari albissimi, tenuissime pulvera-
ti $\frac{z}{j}$.

Moschi Alexandrini

Ambrae griseae an. $\frac{z}{j}$.

Caphurae $\frac{z}{j}$.

Relinquantur ita per triduum aut qua-
triduum. Postea colentur per pannum ra-
rum, & in loco frigido, vase argenteo aut
stann-

stanneo purissimo (*nam vitrea vasa vis aqua eximia frangit*) usu reservetur.

Mire confortat partes principes: Præstantissima ad apoplexiam, epilepsiam, convulsionem. Præservat à peste Venenis adversatur. Syncopæ præsentissimum remedium.

Aqua divina, ad ulcera, Fernelii.

℞. Sublimati optimi (*ex Mercurio scilicet*) gr. xij.

Aquæ Plantaginis ℥ vi.

Coque super calidos cineres in phiala vitrea ad dimidias.

OLEA.

Philosophorum	Tartari
Sulphuris	Caryophyllorum
Terebinthinæ	E Nucibus moschatis
Cerei	Laurinum Mesuæ.

Oleum contra vermes, præstantissimum.

℞. Myrrhæ electæ ℥ vij.

Mastiches ℥ ix.

Aloës hepaticæ ℥ xiiij.

Salis communis ℔ j.

Contusa omnia per retortam igne lento

to

eo diligentissime distillentur. Exhibit primo Aqua, deinde Oleum admirandum.

Gutrolâ arteriæ in carpis manuum, & regio umbilici irrigantur. Etiam præstantissimum Balsamum est ad vulnera recentia. *Manavit hoc Oleum ab Italis.*

E Spica Lavendulæ.

Gagatinum.

Keitinum.

Chamæmelinum.

Anethinum.

Liliorum, simplex.

Perforatę, compositum.

Abſinthii.

Rutaceum, cum Oleo simplici, non omphacino
*contra sententiam Silvii. sic enim ἐπιχέλωμασ
melius respondebit.*

Castorei simplex, Nicolai Prępositi.

Irinum Mesuę.

Lumbricorum.

Scorpionum simplex, Mesuę.

Capparinum compositum.

Mastichinum Mesuę, apud Ioubertum.

Myrtillorum.

E floribus & capitibus utriusquę Papaveris, oleo infusis.

Violatum.

Rosatum { Simplex
Complectum
Omphacium.

Om-

Omphacinū artificiale, apud Bauderonē.
Cydoniorum, Mesuæ.

CERATA & VNGVENTA.

Santalinum Mesuæ.

Stomachicum Galeni, apud Ioubertum

Rosatū { cum Opio.

Mesuæ { sine Opio.

Populeum Nicolai.

De Turia, pro oculis.

Desiccativum rubrum.

Nicolai Præpositi, duplicato Oleo Rosaceo omphacino, & omisso Oleo Violato.

Resumptivum primæ descriptionis apud Ioubertum.

Comitissæ.

Album, Rasis, sine additamentis.

Diapompholygos, ex Silvii castigatione.

Citrinum: ubi pro Amentho repone Lapidem Amiantum; pro Gersa Serpentaria, Cerussam Serpentariam, seu Amylum Serpentariæ, ex Silvii consilio.

Cerussam autem Serpentariam sic parabis: ℞. Radices Avi, initio Veris, antequam folia mittant, collectas, ablutas, & exteriore cortice mundatas. Contunde in mortario lapideo. Succus per expressionem extrahatur: limbea sectus, sole exsicceetur, aqua Rosacea lavetur.

Rur-

Rurſus exſicceetur & reponatur. Verum ſatius eſt huius Vnguenti pulverem paratum habere, ut poſſit ex tempore Vnguentum conſicè in uſus neceſſarios. Inveteratum enim minus idoneum eſt.

Aureum Meſuæ.

Nutritum, ſeu Triapharmacum ſimplex, Meſuæ.

Baſilicum, ſeu Tetrpharmacum minus, Meſuæ.

Mundificativum de Reſina, Iouberti.

Marriatum Nicolai, excenſura Iouberti.

De Althæa, Nicolai.

Enulatum { Cum Mercurio.

{ Sine Mercurio.

Ægyptiacum Meſuæ.

De Arthanita maius Meſuæ, vel potius

De Lathyride, Fernellii, cuius deſcriptio ſequitur.

Vnguentum de Lathyride Fernellii.

℞, Succı Lathyridis lib. β.

Succı Eſulæ ℥ iiij.

In quibus diſſolve

Radicum Cyclaminis ℥ ij.

Scammonix ℥ β.

Granorum Ricini & Lathyridis expurgatorum ana ℥ j. β.

Sem. Fœniculi Rutæ & Anethi

Baccarum Lauri ana ℥ j.

Trita

Trita omnia macerentur in succis diem unum. Postea Axungia vii Cere ꝓ iiij. liquefiant. & in his sensim omnia dissolvantur, & coquantur igne non acri, donec totus humor absumptus sit, & omnia in Unguentum coeant.

EMPLASTRA.

De Mastiche, apud Ioubertum.

De Cerussa, ex æquis partibus Olei Rosacei & Cerussa, prout emendata est a Iouberto.

Contra rupturam, Nicolai.

Diachylum { Album.
Ireatum, ex Oleo Irimo.
Magnum.
Cum Gummis.

De Mucilagibus, Nicolai Præpositi.

Diapalium a Galeni, agitando cum baculo Quercino recenti, pro Palmo.

De Meliloto, Mesuæ.

Oxyroceum, Nicolai.

De Ianua, Nicolai.

Apostolicum, Nicolai.

De Ranis, { cum Mercurio.
Vigonis { sine Mercurio.

Pro matrice, Nicolai.

Duo sunt Emplastrorum genera apud Galenum libro quarto de Comp. medicam general. quo

rum sapiuscule mentionem facimus Commentario nostro in librum Hippocratis De vulneribus capitis, à paucis annis, magno medicina commodo ab Italis in usum revocata; Emplastrum Isis, & Emplastrum Barbarum.

Isis Emplastrum vide apud Galenum libro 5. medicamentorum generalium, cap. 2. & 3. & apud eundem, per paucis immutatis, libro 4. secundum locos, ex Asclepiade, ubi dicitur Isis cephalica. Sic autem descriptum est ab Aëtio.

Emplastrum, Isis cephalica Galeno dictum, ex descriptione Aëtii.

Viride, quod Isis appellatur, à quibusdam Hermoni-sacerdoti Isidis tribuitur.

℞. Cerae ℥ xij. β.

Terebinthinae ℥ xxv. (al. xij. β.)

Ammoniaci Aëris usti

Aristolochiae longae

Squamæ Aëris usti Aëruginis

Thuris Salis Ammoniaci ana ℥ j.

Myrrhae Aloës

Galbani ana ℥ j. β. [al. ℥ β.]

Aluminis scissilis (vel Aluminis Rocha) ℥ vj.

Olei antiqui ℥ x. Aceti quod sufficit.

Emplastrum hoc Polychrestum est, ad omnia vulnera, præcipue capitis, cum ossium fractura: Item ad puncturas & aculeos infixos extrahendos: Ad hominum

Ff &

& canum morsus, item viperæ, ac scorpionis: Ad artuum fracturas cum vulnere, quia citius callum obducit: Ad fistulas recentes & inveteratas: Ad mammarum & axillarum abscessus, tum ne fiant, tum ut facti curentur: Ad Stromas: Ad fistendas oculorum fluxiones, fronti impostum: Ad ecchymoses, gangrænas, & putredines carniū arcendas.

Hoc Emplastrum, inquit Aëtius, absolute Isis appellatur (vel Isis Hermonis:) sed aliud est Emplastrum Isis, quod Epigono tribuitur; quod etiam recipit radicis Dracunculi unciam unam. Eoque Galenus se usum dicit; quia sola Dracunculi radix, per se tusa, ac probe trita in pulverem, maligna ulcera curat. Ad ulcera sordida adhibentur Emplastri pars una, Cerati Rosacei liquidi partes dua: Ad ulcera vero qua medica extersione opus habent, Emplastri pars una, Cerati Rosati partes tres. Hoc autem Ceratum Rosaceum sic paratur: ℞. Olei Rosacei ℥ xij. Cera candida ℥ iv. Fiat Ceratum. Ceratum Rosaceum & Emplastrum proportione dicta liquantur, miscentur, rudicula lignea agitantur; sed non diu, ne coloris gratia pereat. Loco Cerati Rosacei potest sumi Vnguenti Rosati Mesue tantumdem.

Vt formetur Emplastrum Isis, Cera, Terbinthina, & Oleum simul liquefiant: dein addantur Galbanum & Ammoniacum, Aceto soluta: atque ad ignem commixtis addantur ceteri pulveres. Vel metal-

tallica cum Aceto in mortario terito; deinde reliqua tuta & cibrata adii cito: liquabilia liquata in mortarium affundito, subigito, unito; & forma magdaleones.

Nepites (inquit Galenus) *Emplastrum* variare, pro varia inscriptione, cum scilicet inscribitur $\Gamma\epsilon\gamma\acute{o}\nu\epsilon\iota\varsigma\ \&\ \alpha\delta\acute{\upsilon}\tau\omega\upsilon$, vel $\eta\ \text{H}'\rho\omega\upsilon\varsigma$ & $\iota\epsilon\gamma\gamma\epsilon\mu\mu\alpha\tau\acute{\iota}\varsigma$, vel $\eta\ \text{E}'\pi\iota\gamma\acute{o}\nu\epsilon\iota\varsigma$. Nam idem est. Certe *Epigoni Emplastrum* ab *Hermoneis Emplastro* variat sola radice *Dracunculi*, quam accipit. Itaque male *Londonenses* eius radice adiectionem tribuunt *Fallopio*: & male quoque *Isim* sine *Dracunculi* radice *Isim Epigoni* vocant, quoniam *Hermoneis* sit potius. Addit *Galenus*, quibusdam putari hoc *Emplastrum* ex adytis templi *Vulcano* in *Aegypto* dicati desumptum. Disces ab eodem *Galeno*, *Epigonum*, cui postrema *Isidis Emplastri* descriptio tribuitur, carcere conclusum, cum hoc *Emplastro* quendam divitē curasset, fuisse dimissum.

Aliud etiam est *Isis Emplastrum* apud *Galenum* lib. 4. *Compositionis medicamentorum* per genera, $\kappa\iota\pi\acute{\rho}\delta\upsilon$, hoc est, flavum dictum, cum superius viride dicatur *Aetio*.

Emplastrum Isis, flavum dictum,
Galeno.

℞. Argenti Spumæ ʒ c.
Minii Synopici ʒ viij.
Diphrygis Cerae Chalciidis combu-
stæ ana ʒ j. (al. ʒ β.)
Ff 2 Chal.

Chalcitidis crudæ ʒ iʒ.

Olei heminas, seu corylas duas.

Argenti Spuma & Oleum coquuntur donec bis ac tertio effervescent: postea Aquæ modicum digitis adspargitur: mox Diphryges, Chalcitis tosta, pulverata inspergantur, sub manu aquam instillando, donec non amplius medicamentum inter coquendum strepat. Vbi cōstitit, Ceram indito. Chalcitis cruda, & Minium ex Oleo modico conterantur, & sub finem immittantur, continue movendo. Tandē in mortarium coniecito, atque subigito. Reponē, ac utere.

Molle conficiendum est, quia indurescit repositum.

Valet ad ulcera diuturna fluentia, maligna, ac vix curabilia, maxime in tibiis & partibus extremis.

Barbara Emplastra dicuntur Galeno, quacunque Bitumen recipiunt pro basi. Sed inter alia duo potissimum commemorat, quibus uti solitus erat. Primo quidem ad maxima vulnera; Altero ac minorā. Ideo primum Maius dictum, alterum Minus.

*Emplastrum Barbarum maius,
Galeni.*

℞. Picis lib. viij.

Ce

Cera lib. vj. $\frac{3}{4}$ viij.
 Resina Pini lib. v. $\frac{3}{4}$ iiij.
 Bituminis lb. iiij.
 Olei puri lb. j. $\frac{3}{4}$ vj.
 Spuma Argenti Cerussa
 Aeruginis ana $\frac{3}{4}$ ij. β .
 Thuris $\frac{3}{4}$ vj.
 Aluminis liquidi $\frac{3}{4}$ j. β .
 Aluminis scissilis $\frac{3}{4}$ iiij.
 Opopanacis Squamae Aeris
 Galbani ana $\frac{3}{4}$ j. β .
 Aloes Opii Myrrhae an. $\frac{3}{4}$ β .
 Terebinthinae $\frac{3}{4}$ xiiij.
 Succi Mandragorae $\frac{3}{4}$ vj.
 Aceti heminas vj. Fiat Ceratum.

Tempus conficiendi Emplastri Barbari maioris, est cum viger Mandragora; circa mensem Augustum scilicet.

Bitumen pulveratum, & cribro transactum, ponatur super chartam. Postea Thus, Squamma Aeris, Aloë, & Myrrha trita per stamen excutiantur, & seorsim seponantur. Squama autem super marmore accurate lavigetur.

Opopanax & Galbanum, Aceto soluta, ita ut parte Aceti combibita, lentore suo adhuc cohaereant, per linteum exprimantur.

Alumen tum liquidum tum scissile in pulverem tenuissimum lavigentur.

His ita preparatis, Pix, Cera, Resina

Ff 3

Pini

Pini ad ignem liquefiant: & si quę sordes sunt, per pannum exprimendo colentur.

Oleum cum Cerussa & Lithargyro ad consistentiam Vnguenti excoquatur.

Mox indantur Resina, Pix. & Cera, ac super igne non acri commisceantur.

Calentibus adhuc, Bitumen iniicito, & spatula diligentèr subigito.

Post hæc Terebinthina, cum Lachrymis, non nimis calida addatur.

Tandem Alumen, & post hoc reliqui pulveres inspersi, accurate cõmilceantur. Fiant magdaleones.

Ærugo cum Oleo Lithargyro & Cerussa coquenda est, ut color Emplastri magis gratus sit. Cõstione enim Ærugini coloris gratia augetur potius, quam minuitur.

Valet, ut ait Galenus, ad solidanda vulnera ciuenta & recentia: ad ulcera antiqua & sinuosa: ad canum & hominum morsus; & ad podagram incipientem.

*Emplastrum Barbarum minus
Galenii.*

℞. Picis Resinæ Pini
Resinæ cõctæ, Bituminis ana ℥b. j.
Spumæ Argenti ʒ x.
Cerussæ Æruginis, ana ʒ vj.
Opopanacis ʒ iij.

Olei,

Olei, tempore hyberno, ℥ ix; æstivo ℥ vj.

Liquanda liquefiant: & tritis terendis,
confice in mortario, cum Aceto.

[Eadem præstat quæ maius, sed non
tam efficaciter.]

Quodsi mitius, & magis anodynum
desideras, adde Succi Hyoscyami ℥ β.
Opii tantundem.

Fiat Ceratum.

*Ceterum Pharmacopœi, ad dispensationem &
emfectionem Compositionum tum purgantium,
tum alterantium, itemque Unguentorum & Em-
plastrorum, aliorumque magni nominis medica-
mentorum, quæ in Officinis asservari debent, Me-
dicos advocabunt; in eos sua fidei & diligentia
testes oculatos habeant, & operis directores.*

Ff 4

TY-