

Succi Hypocistidis	ʒ	iiiij.
Ireos	ʒ	β. Ə ij.
Seminis Fœniculi	ʒ	j.
Folii [aut succedanei eius]	ʒ	iiij.
Radicis Ponticæ [id est, Rhabarbari]		
Rosarum siccaram Glycyrrhizæ		
Florum silvestris Punicæ		
Cinnamomi ana	ʒ	iiij.
Nardi Celticæ	ʒ	j.
Mellis despumati ℥ vij.	ʒ	ix.
Myrtham & Hypocistidem in vino dis-		
solve modico: Tragacantham vero per se		
etiam dissolve; & confice secundum artē.		
Actuarius ponit absurdum conficiendi		
modum, quem non sequimur.		

Mameru loco sume Doronicum Romanum.
Florum silvestris Punicæ, i. florum Balaustio-
rum.

CONDITA.

Caro Citri Cortices Citri Flores Citri
Arantia integra Cortices Arantiorum
Flores Arantiorum Limones.

Limones conditi frequenter pro Chebulis condā-
tū venduntur. Sed facile deprehenditur dolus. Nam
Chebuli unum tantum magnum & lignosum ha-
bent nucleus; Limones vero multa semina, &c.
Chebuli Myrobalani Bellerici Myro-
balani
Emblici Myrobalani Citrini Myrobalani
Indi

Indi Myrobalani.

*Omnis quinque Myrobalanorum species iam
afferuntur ex India condite.*

Nuces moschatae integræ, ut ex India af-
feruntur.

Iuglandes Cironia Mespila

Pyra moschatella Cerasa

Pruna silvestria Caryophylli

Piper in racemis, ut ex India afferuntur.

Calamus aromaticus [id est, verus Acorus]

Galanga Zingiber Enula campana

Secacul [id est, Siser: Germanice Gritzelmorn,
Clingelmorn]

Eryngium

Pimpinella [nostra]

Crethami [agrestis radix.]

C R E T H A M U S agrestis herba est, Eryngii
propemodum foliis: Germanice vocatur Sichel-
moren, & Sichelkraut: nascitur in agri pingui-
bus.

*Omnia diligenter Saccharo clarificato con-
diantur secundum artem.*

CONSERVÆ.

Anthos [id est, flos Rosmarini]

Boraginiis Buglossi

Cichorii Fumi terræ Lavendulæ

Maioranæ Melissæ Menthæ

Nymphææ seu Nenupharis