

SIROP D'HYSOPE SCILLITIQUE. (ams.)

Pr. Hysope sec. deux onces = 61 gram.
 Scille sèche. une once = 31 gram.
 Gingembre. une demi-once = 15 gram.
 Eau d'hysope. deux livres = 739 gram.

Exprimez au bout de vingt-quatre heures, ajoutez quinze parties de sucre sur huit de colature, et faites fondre à une douce chaleur.

EAU D'HYSOPE.

Hydrolat d'hysope; Aqua hyssopi. (a. ba. f. fo. fu. ham. he. li. o. p. pa. par. po. pr. s. sa. sl. t. gi. gu. pid. sv. vn.)

Pr. Sommités d'hysope une partie.
 Eau quatre parties.

Distillez deux parties.

IMPÉRATEUR.

Imperatoria Ostruthium, L.

Meisterwurz, Kaiserwurz, Ostranz (Al.); *master wort* (Ao.); *mesedob* (Bo.); *masterurt* (D.); *imperatoria* (E. I. Por.); *master wortel* (Ho.); *masterat* (Su.).

a. ams. an. b. ba. he. br. c. f. fe. fu. g. gr. han. he. li. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. be. bc. g. m. pid. sp. z.

Plante \mathcal{Z} (pentandrie digynie, L.; ombellifères, J.), qui croît dans les régions tempérées de l'Europe. (*Fig. Flore médic.* IV, 200.)

On emploie la racine (*radix Imperatorice s. Ostruthii s. Magistrantice s. Astrantice*), qui est grosse, ramée, presque tuberculeuse, comme améléc, garnie de longues fibres, d'un brun grisâtre en dehors, et blanche en dedans. Elle a une odeur forte et aromatique, une saveur âcre, amère et désagréable.

Excitant, carminatif, diaphorétique, siagogue, qu'Hoffmann appelait *divinum remedium*, mais qui n'a rien de bien particulier, et dont on se sert peu aujourd'hui. — Dose de la poudre, vingt à trente grains = 1,06 à 1,6 gram.

POUDRE MASTICATOIRE. (sp.)

Pr. Racine d'impéreur,
 Ecorce de sureau, de chaque, une demi-once = 15 gram.
 Feuilles de laurier. un gros et demi = 6 gram.
 Semences de montarde,
 — de staphysaigre, de chaque, un gros = 4 gram.
 Girofle. quatre scrupules = 5 gram.
 Myrrhe six gros = 22 gram.

Dose, un scrupule = 1,23 gram., dans un nouet.
 — Contre l'aphonie et la paralysie de la langue.

POMMADE ANTICANCÉREUSE DE MILIUS. (ph)

Pr. Poudre de racine d'impéreur,
 une once et demi = 45 gram.

HUILE ESSENTIELLE D'HYSOPE.

Oléole d'hysope; Oleum hyssopi æthereum, Ætheroleum hyssopi. (fe. w. cot. gi. gu. ta.)

Pr. Feuilles d'hysope. à volonté.
 Eau. quantité suffisante.

Distillez, et recueillez l'huile qui surnage le produit.

ESPRIT D'HYSOPE.

Alcoolat d'hysope; Spiritus hyssopi. (bl. cot. gu.)

Pr. Feuilles fraîches d'hysope,
 Eau d'hysope, de chaque une partie.
 Alcool (43 degrés). trois parties.

Après quatre jours de macération, distillez trois parties.

I.

Teinture d'impéreur. une once = 30 gram.
 Axonge deux onces = 60 gram.

Mélez. — On l'applique sur le cancer, en la renouvelant soir et matin.

EAU DISTILLÉE D'IMPÉRATEUR.

[*Hydrolat d'impéreur; Aqua ostruthii.* (ta.)

Pr. Racine d'impéreur une partie.
 Eau quatre parties.

Distillez deux parties.

HUILE ESSENTIELLE D'IMPÉRATEUR.

Oléole d'impéreur; Oleum ostruthii æthereum, Ætheroleum ostruthii. (gi. ta.)

Pr. Racine d'impéreur à volonté.
 Eau quantité suffisante.

Distillez après vingt-quatre heures de macération.

INDIGO.

Indicus color, Pigmentum Indicum.

Nil (Ar. Cy. Duk. Pe.); *cham nha ta* (Co.); *tarum* (Mal.); *anil* (Por.); *nili, nilini* (Sa. Tal.); *nilum* (Tel.).

br. w. a. be. g. sp.

Pâte tinctoriale en petites masses solides, cassantes, d'un bleu d'azur très foncé, sans odeur ni saveur, prenant un éclat cuivré par le frottement.

On retire l'indigo des *Indigofera Anil, argentea* et *tinctoria*, L. (diadelphie décandrie, L.; légumineuses, J.), cultivés dans l'Amérique méridionale. L'*Isatis tinctoria* en donne aussi, mais en quantité bien moindre.

Il contient, avec plusieurs autres substances diverses, un principe particulier, l'*Indigotine*, qui entre pour près de moitié dans le bel indigo du commerce.

Les pharmaciens l'emploient quelquefois, mais rarement, pour colorer certaines préparations.

POUDRE ANTISPASMODIQUE DE ROTH. (*rad.*)

Pr. Indigo. une demi-once = 15 gram.
Poudre aromatique un demi-gros = 2 gram.

Une cuillerée à café, trois ou quatre fois par jour, dans l'épilepsie.

ÉLECTUAIRE ANTISPASMODIQUE DE ROTH. (*ph. rad.*)

Pr. Indigo. une demi-once = 15 gram.
Poudre aromatique un demi-gros = 2 gram.
Sirop de sucre. une once = 30 gram.

A prendre dans la journée. — Certains malades en ont consommé jusqu'à deux onces = 60 gram. par jour.

SOLUTION D'INDIGO. (*ham.*)

Pr. Indigo. une partie.
Acide sulfurique concentré neuf parties.

Étendez un gros et demi = 6 gram. de cette solution dans vingt onces = 600 gram. d'eau distillée.

IODE.

Iodum, Iodina.

b^t. ha. f. fe. ff. p. sl. t. cot. gi. gu. ma. so. vm.

Pr. Eaux-mères de soude de varech à volonté.

Versez-y de l'acide sulfurique concentré, en excès, et faites bouillir doucement la liqueur, dans une corne de verre garnie d'un récipient; recueillez les aiguilles brillantes qui se rassemblent dans ce dernier, lavez-les avec une petite quantité d'eau froide, et faites-les sécher à une douce chaleur.

Stimulant, irritant fort énergique, poison à haute dose, qui, dans certaines circonstances, exerce sur les glandes mamillaires, et principalement sur la thyroïde, une action très remarquable, par suite de laquelle ces organes s'atrophient d'une manière plus ou moins complète. On l'a conseillé dans le traitement des scrofules et du goître, dans les gonflements lymphatiques de toute espèce, la gonorrhée, même aiguë, la leucorrhée chronique, les engorgements du testicule, etc. — On l'emploie à l'intérieur et à l'extérieur, mais il ne faut l'administrer qu'avec circonspection, et en cesser l'usage dès qu'on voit survenir de l'amaigrissement, qui est, en général, dit-on, le premier indice de son action nuisible. — Dose, depuis un huitième de grain jusqu'à un grain entier = 0,006 à 0,1 gram., deux fois par jour, en pilules.

POUDRE HYDRAGOGUE DE JAHN. (*ph. rad.*)

Pr. Iode un seizième de grain = 0,0039 gram.
Calomélas,
Digitale pourprée,
de chaque, un demi à deux grains = 0,031 à 0,12 gr.
Sucre. un gros = 4 gram.

A prendre toutes les trois heures, dans l'hydrocéphale.

PILULES D'IODE.

Pilulae iodatæ. (fe. b.)

Pr. Iode un grain = 0,05 gram.
Régisse un scrupule = 4 gram.
Rob de surreau quantité suffisante.

Faites deux pilules.

PILULES D'HELMENSTREIT. (*rad.*)

Pr. Iode six grains = 0,35 gram.
Extrait de gentiane un gros = 4 gram.
Mucilage de gomme arabique. quantité suffisante.

Faites vingt-quatre pilules — Trois, quatre fois par jour, dans la salivation scorbutique ou mercurielle.

TEINTURE ÉTHÉRÉE D'IODE.

Éthérolé d'iode, Ether ioduré; Tinctura iodii ætherea. (fe. p. bl. ca. fo. ma.)

Pr. Iode une partie.
Ether sulfurique douze parties.

Faites dissoudre. — Trente gouttes contiennent un grain = 0,03 gram. d'iode.

TEINTURE D'IODE.

Alcoolé d'iode; Tinctura iodii. (b^t. ha. du. f. fe. ff. ham. han. he. s. sl. st. bo. ca. cot. fo. gi. gu. ma. pie. ra. so. ta. vm.)

Pr. Iode une partie.
Alcool (36 degrés) douze parties.

Faites dissoudre. (f. fe. ff. ham. han. he. p. sl. bo. ca. cot. fo. gi. ma. ra. so.)

s. prescrit six parties d'alcool; — bl. sept; — pie. huit; — vm. dix; — du. st. et gu. onze; — b^t. dix-huit; — ha. et gr. dix-neuf; — ta. quarante-huit.

Vingt gouttes de la première formule contiennent environ un grain = 0,03 gram. d'iode. — Dose, pour les adultes, quatre à dix gouttes, trois fois par jour, en augmentant progressivement, jusqu'à vingt et plus.

EAU IODÉE DE LUGOL. (*ma.*)

Pr. Eau pure. cinquante litres.
Sel marin soixante-six grammes.
Teinture d'iode,
cinquante, soixante-quinze et cent grammes.

Ces trois eaux renferment, la première un demi-grain = 0,023 gram., la seconde deux tiers de grain = 0,036 gram., et la troisième un grain = 0,05 gram. d'iode par demi-bouteille ou livre = 500 gram. d'eau salée. — Lugol les emploie dans le traitement des scrofules.

LAVEMENT IODÉ. (*ca.*)

Pr. Gomme arabique quatre gros = 15,5 gram.
Eau six onces = 184 gram.

Ajoutez à la solution :

Teinture d'iode cinq gouttes.

Dans l'aménorrhée, la dysménorrhée, et les scrofules.

LINIMENT CONTRE LES ENGELURES. (ca.)

Pr. Teinture d'iode un gros = 3,8 gram.
 Laudanum de Rousseau deux gros = 7,6 gram.
 Huile d'amandes douces,
 Eau de chaux, de chaque deux onces = 6r gram.

Mélez avec s'in.

LOTION IODÉE. (fo.)

Pr. Iode un à deux grains = 0,05 à 0,1 gr.
 Alcool un gros = 3,8 gram.

Ajoutez à la solution :

Eau une livre = 500 gram.

Pour laver les plaies scrofuleuses.

POTION IODÉE. (fo. rad.)

Pr. Teinture d'iode quatre-vingt-dix gouttes.
 Décoction de quinquina dix onces = 300 gram.

Deux cuillerées, trois fois par jour. (rad.)

Pr. Teinture d'iode dix gouttes.
 Eau de savonaire quatre onces = 122 gram.
 Sirop de fleurs d'orange une once = 30 gram.

A prendre par cuillerées. (fo.)

Dans les ulcères scrofuleux.

IODURE D'AMIDON.

Pr. Iode vingt-quatre grains = 1,55 gram.
 Amidon une once = 30 gram.

Triturez l'iode avec un peu d'eau, et ajoutez peu à peu l'amidon.

Dose, dix grains = 0,5 gram. — Buchanan dit être parvenu à donner ainsi, sans inconvénient (! ?), plus de soixante-douze grains = 5,8 gram. d'iode par jour, c'est-à-dire trois onces = 92 gram. d'iodure d'amidon.

POMMADE D'IODE.

Unguentum iodatum. (du. fe. ff. par. t. b. gi. gu. so. ta.)

Pr. Iode une partie.
 Axonge seize parties.

Broyez, et mêlez exactement. (ff. t. gi. gu. so. ta.)

du. fe. et b. prescrivent vingt-quatre parties d'axonge ; — par. soixante-quatre.

POMMADE MERCURIELLE IODURÉE. (rad.)

Pr. Onguent gris seize parties.
 Iode trois parties.

En frictions dans l'hydropisie de l'ovaire.

CHLORURES D'IODE.

On connaît deux chlorures d'iode.

PROTOCHLORURE D'IODE.

Protochloruretum iodii. (cot.)

Pr. Iode à volonté.

Agitez-le rapidement, en excès, dans un flacon contenant du chlore gazeux sec.

PERCHLORURE D'IODE.

Perchloruretum iodii. (cot.)

Pr. Iode à volonté.

Mettez-le dans un flacon, et faites arriver dans celui-ci un courant de chlore gazeux sec, jusqu'à ce que la masse refuse d'en absorber.

CYANURE D'IODE.

Cyanuretum iodii. (ma.)

Pr. Cyanure de mercure deux parties.
 Iode une partie.

Triturez ensemble dans un mortier, introduisez le mélange dans une fiole à col un peu large, et chauffez graduellement ; dès qu'il commence à se condenser une matière blanche à l'orifice de la fiole, introduisez le col de celle-ci sous une grande cloche de verre soutenue par une plaque de verre, et recueillez les flocons légers qui se forment.

Magendie présume que ce composé doit jouir d'une action très énergique, dont la médecine peut tirer parti.

SULFURE D'IODE.

Sulphuretum iodii. (cot.)

Pr. Iode une partie.
 Soufre huit parties.

Faites fondre le soufre dans un matras, et ajoutez-y l'iode.

IPÉCACUANHA.

Brechwurzel (Al.) ; *ipecacuan* (An.) ; *hipecacuana*, *bejuquillo* (E.) ; *ipekakuany* (Po) ; *krakrot* (Su.).

a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. dd. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. par. po. pp. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. wu. be. br. c. g. m. pa. pid. sp. z.

Le véritable ipécacuanha est la racine du *Cephaelis Ipecacuanha*, Rich., plante h (pentandrie monogynie, L.; rubiacées, J.), qui croît dans les forêts du Brésil. (Fig. *Dict. des sc. méd.* t. XXVI, pl. 1.)

Cette racine (*radix Brasiliensis*) présente trois variétés dans le commerce.

1° *Ipecacuanha gris, annelé, gris noirâtre, brun* ; il ne dépasse pas le volume d'une plume à écrire, offre des anneaux irréguliers et d'un gris noirâtre à l'extérieur, et a l'axe ligneux plus petit que la portion corticale ; sa cassure est blanchâtre et résineuse, sa saveur amère et un peu âcre.

2° *Ipecacuanha gris rougeâtre, gris rouge, ou gris*, qui a une teinte rougeâtre à l'extérieur, des anneaux irréguliers, une cassure résineuse, d'un blanc un peu rosé, et une saveur un peu plus amère que celle du précédent.

3° *Ipecacuanha gris-blanc, blanc, ou annelé majeur*, qui a des anneaux peu saillants et presque réguliers, une teinte d'un gris blanc, une cassure résineuse et blanchâtre, une saveur amère, et une épaisseur plus grande que celle des deux précédents. Ceux-ci entrent, le premier pour deux tiers, et l'au-

tre pour un tiers, dans l'ipécacuanha du commerce, qui présente assez rarement le troisième.

Une foule d'autres racines portent aussi le nom d'*ipécacuanha* : on le donne en Amérique, selon Decandolle, à toutes celles qui jouissent de la propriété émétique. On distingue, dans le nombre, celle du *Psychotria emetica*, Mut., arbuste du Pérou (Fig. Flore médic. IV. 201), appelée *Ipécacuanha noir, strié, gris cendré, glycyrrhisé*. Elle n'a pas ou n'a que très peu d'anneaux irréguliers, mais présente des stries longitudinales. Sa cassure est résineuse, mais moins compacte que celle des précédents, et d'un gris noir très marqué, surtout quand on l'humecte. Sa saveur est nulle. Elle vient du Pérou, et on la rencontre peu dans le commerce. D'ailleurs, elle est peu estimée.

Il est fait mention aussi de l'*Ipécacuanha blanc* ou *amylacé*, racine du *Richardsonia Brasiliensis*, Gom. (p. sl. m.), qui présente des anneaux irréguliers, demi-circulaires au plus. Cette racine a le volume d'une plume de pigeon. Elle est ridée, tortue, d'un gris blanc, sans saveur. Elle exhale une odeur de moisi. Sa cassure est blanche, amylacée, et nullement résineuse.

On ne la trouve jamais dans l'ipécacuanha du commerce.

Le véritable ipécacuanha contient, d'après Pelletier, une matière grasse, de la gomme, de l'amidon, et surtout un alcaloïde, appelé *Emétine*, auquel il doit ses propriétés. Cet alcali est moins abondant dans la racine du *Psychotria* que dans celle du *Cephaelis*, et il y en a très peu dans celle du *Richardsonia*.

Irritant, qui détermine le vomissement et des déjections alvines, ou qui seulement jouit de propriétés stimulantes ou toniques quand on le donne à faible dose. — Dose, comme stimulant, un à quatre grains = 0,05 à 0,2 gram.; comme vomitif, douze à trente grains = 0,6 à 1,6 gram., dans quatre onces = 122 gram. d'eau.

SACCHARURE D'IPÉCACUANHA. (bl. qu. so.)

Pr. Teinture d'ipécacuanha au quart. une partie.
Sucre. seize parties.

Faites sécher, et pulvériser.

Un gros = 4 gram. représente un grain = 0,05 d'ipécacuanha.

POUDRE D'IPÉCACUANHA COMPOSÉE. (du. lo.)

Pr. Ipécacuanha,
Opium, de chaque. une partie.
Sulfate de potasse. huit parties.

Faites une poudre.

POUDRE ALEXITÈRE. (fu.)

Pr. Ipécacuanha,
Extrait d'opium, de chaque. une partie.
Sulfate de potasse. trente parties.

Dose, dix grains = 0,6 gram.

POUDRE ANTI-ÉMÉTIQUE DE VOGLER. (rad.)

Pr. Ipécacuanha. une partie.
Sucre. cent vingt parties.
Crème de tartre. quarante parties.

Une demi à une cuillerée à café, pour apaiser le vomissement.

POUDRE ANTIDIARRHÉIQUE DE FRANK. (sm.)

Pr. Ipécacuanha. deux grains = 0,1 gram.
Sucre. une demi-once = 15 gram.
Huile de muscade. deux gouttes.

Partagez en quatre paquets, à prendre en vingt-quatre heures, dans de l'eau sucrée.

POUDRE BÉCHIQUE. (e. pa.)

Pr. Ipécacuanha. six grains = 0,4 gram.
Myrrhe. douze grains = 0,8 gram.
Nitrate. un demi-gros = 2 gram.

Faites quatre paquets. — Un, tous les quarts d'heure.

POUDRE CARMINATIVE. (pic.)

Pr. Ipécacuanha. un grain = 0,05 gram.
Succin. douze grains = 0,6 gram.

Faites une poudre.

POUDRE ÉMÉTO-CATHARTIQUE. (e. ra.)

Pr. Ipécacuanha. vingt-quatre grains = 1,27 gram.
Rhubarbe. douze grains = 0,6 gram.

Faites une poudre. (ra.)

e. double la quantité de rhubarbe.

POUDRE EXPECTORANTE. (b.)

Pr. Ipécacuanha. un grain = 0,05 gram,
Gomme arabique,
Sucre, de chaque. un scrupule = 1,27 gram.

A prendre toutes les deux heures, dans les catarrhes chroniques.

POUDRE EXPECTORANTE DE KOPP. (rad.)

Pr. Ipécacuanha,
un sixième à un quart de grain = 0,01 à 0,015 gram.
Sel ammoniac. douze grains = 0,7 gram.
Suc de réglisse,
Sucre de lait, de chaque. six grains = 0,35 gram.

A prendre toutes les deux heures, sur le déclin de la péripneumonie.

POUDRE EXPECTORANTE DE MURSINNA. (ph.)

Pr. Ipécacuanha,
Soufre doré d'antimoine, de chaq., un grain = 0,06 gram.
Camphre. trois grains = 0,2 gram.
Poudre gommeuse. un scrupule = 1,25 gram.

A prendre toutes les deux heures, dans la péripneumonie, quand les crachats se suppriment.

POUDRE FÉBRIFUGE DE WICHMANN. (sm.)

Pr. Ipécacuanha. un scrupule = 1,27 gram.
Carbonate de magnésie. une once = 30 gram.

Partagez en vingt-quatre paquets. — Un, toutes les trois heures.

POUDRE NAUSEUSE DE RICHTER. (au.)

Pr. Ipécacuanha un quart de grain = 0,015 gram.
 Sucre quinze grains = 0,9 gram.

A prendre toutes les deux heures, dans la hernie étranglée.

POUDRE VOMITIVE. (au. rad.)

Pr. Ipécacuanha,
 Sucre, de chaque un scrupule = 1,25 gram.

Partagez en quatre paquets. — Un, tous les quarts d'heure, jusqu'à ce que le vomissement survienne. (au.)

Pr. Ipécacuanha,
 Oléosure de fenouil, de ch. deux scrupules = 2,5 gram.

Partagez en quatre paquets. (rad.)

Pr. Ipécacuanha,
 Gomme arabique, de chaque un demi-gros = 2 gram.

Partagez en quatre paquets. (rad.)

Pr. Ipécacuanha,
 Sucre, de chaque quinze grains = 0,9 gram.
 Soufre doré d'antimoine cinq grains = 0,3 gram.

Partagez en quatre paquets. (au.)

Pr. Ipécacuanha,
 Sucre, de chaque quinze grains = 0,9 gram.
 Tartre stibié un grain = 0,06 gram.

Partagez en quatre paquets. (au.)

POUDRE VOMITIVE DE SUNDELIN. (ph.)

Pr. Ipécacuanha un demi-gros = 2 gram.
 Oléosure de citrou un gros = 4 gram.
 Oxyde de zinc douze grains = 0,7 gram.

Faites six paquets. — Un, tous les quarts d'heure.

EXTRAIT ALCOOLIQUE D'IPÉCACUANHA. (l. gu. so.)

Pr. Ipécacuanha en poudre deux parties.
 Alcool (21 degrés) sept parties.

Traitez la poudre par lixiviation, distillez la teinture, et évaporez le résidu au bain-marie.

EXTRAIT AQUEUX D'IPÉCACUANHA. (so. vm.)

Pr. Ipécacuanha à volonté.
 Eau tiède quantité suffisante.

Traitez la poudre par lixiviation, et évaporez la teinture aqueuse.

BOLS ANTIDYSENTÉRIQUES. (ca. fo. sm.)

Pr. Ipécacuanha deux grains = 0,11 gram.
 Thériaque un scrupule = 1,27 gram.
 Craie préparée quantité suffisante.

Faites huit bols. — Deux, matin et soir.

BOLS ASTRINGENTS. (pie.)

Pr. Ipécacuanha un grain et demi = 0,079 gram.
 alun six grains = 0,3 gram.
 Dioscorium quantité suffisante.

Faites un bol.

Pr. Ipécacuanha un grain et demi = 0,079 gram.

Laudanum de Sydenham un grain = 0,05 gram.
 Conserve de cyborrhodon quantité suffisante.

Faites un bol.

BOLS DIAPHORETIQUES. (ph.)

Pr. Ipécacuanha deux grains = 0,12 gram.
 Opium un grain = 0,06 gram.
 Extrait de douce-amère un scrupule = 1,25 gram.
 Poudre de douce-amère quantité suffisante.

Faites quatre bols. — Un, matin et soir.

BOLS DIGESTIFS. (ca. sw.)

Pr. Ipécacuanha deux à quatre grains = 0,100,2 gr.
 Poudre aromatique dix grains = 0,5 gram.
 Sirop de cannelle quantité suffisante.

Faites deux bols. — Un, le soir, dans la dyspepsie.

BOLS VOMITIFS. (ph. ra.)

Pr. Ipécacuanha un scrupule = 1,25 gram.
 Emétique deux grains = 0,12 gram.
 Extrait de charbon-béuit quantité suffisante.

Faites un bol. (ph.)

Pr. Ipécacuanha,
 dix-huit à vingt-quatre grains = 0,96 à 1,27 gr.
 Miel quantité suffisante.

Faites trois bols. — A prendre de demi-heure en demi-heure. (ra.)

PILULES ANTISPASMODIQUES DE REIM. (ph.)

Pr. Ipécacuanha,
 Digitale, de chaque un demi-gros = 2 gram.
 Opium cinq grains = 0,3 gram.
 Extrait d'année quantité suffisante.

Faites soixante pilules. — Une, toutes les trois heures; dans l'asthme convulsif.

PILULES EXPECTORANTES. (e.)

Pr. Ipécacuanha,
 Extrait de cigoné, de chaque dix grains = 0,65 gram.

Faites quatre pilules. — Dose, deux à la fois.

PILULES LAXATIVES. (e. rad.)

Pr. Ipécacuanha deux scrupules = 2,5 gram.
 Savon médicinal quatre scrupules = 5 gram.

Faites quatre-vingts pilules. — Dose, trois à six le soir, dans la constipation.

PILULES NAUSEEUSES. (b.)

Pr. Ipécacuanha six grains = 0,3 gram.
 Rob de sureau quantité suffisante

pour faire six pilules. — Une, toutes les deux heures.

PILULES STOMACIQUES. (rad.)

Pr. Ipécacuanha,
 Extrait de petite centaurée,
 de chaque, quinze grains = 0,9 gram.
 Rhubarbe un demi-gros = 2 gram.

Faites trente pilules. — Une, matin et soir, dans le cas de faiblesse d'estomac.

Pr. Ipecacuanha cinq à dix grains = 0,3 à 0,6 gr.
 Rhubarbe un demi-gros = 2 gram.
 Mucilage de gomme adragant quantité suffisante.

Faites vingt pilules. — A prendre comme les précédentes.

PASTILLES D'IPECACUANHA.

Tablettes ou Trochisques d*ipecacuanha*; *Tabellæ de ipecacuanha*. (an. b. ba. be. e. f. fe. gr. ham. han. he. s. sl. su. t. bl. br. ca. cot. gi. gu so. to. vn.)

Pr. Ipecacuanha une once = 32 gram.
 Sucre quarante-sept onces = 1460 gram.
 Gomme adragant cinq gros = 20 gram.
 Eau de fleurs d'orange quatre onces = 125 gram.

Faites des tablettes de douze grains = 0,6 gram. contenant chacune un quart de grain = 0,015 gram. d*ipecacuanha*. (f. ca. cot. fo. gu.)

Aux proportions près, la formule est la même partout, excepté dans ham., qui donne la suivante :

Pr. Sucre blanc,
 — de lait, de chaque, trois onces et demie = 105 gram.
 Gomme arabique,
 Ipecacuanha, de chaque, une demi-once = 15 gram.
 Mucilage de gomme adragant quantité suffisante.

Faites neuf cent soixante pastilles.

Pr. Saccharure d*ipecacuanha* seize onces = 500 gram.
 Mucilage seize gros = 61 gram.

Faites des tablettes de dix-huit grains = 0,96 gram. (b. bl.)

PASTILLES D'IPECACUANHA COMPOSÉES. (b.)

Pr. Ipecacuanha un scrupule = 1,25 gram.
 Sel ammoniac une demi-once = 15 gram.
 Clivolat une once et demie = 45 gram.
 Gomme arabique deux gros = 7 gram.
 Sirop de capillaire quantité suffisante.

Faites quatre-vingts pastilles.

TABLETTES DIAPHORÉTIQUES. (ph.)

Pr. Ipecacuanha trois grains = 0,2 gram.
 Opium un grain = 0,06 gram.
 Sucre un gros et demi = 6 gram.
 Mucilage de gomme adragant quantité suffisante.

Faites huit tablettes. — Deux, matin et soir.

TABLETTES STOMACHIQUES. (f.)

Pr. Ipecacuanha une once = 32 gram.
 Chocolat à la vanille douze onces = 368 gram.

Faites des pastilles de treize grains = 0,69 gram.

TABLETTES STOMACHIQUES DE CHOLANT. (rad.)

Pr. Ipecacuanha un gros = 4 gram.
 Réglisse,
 Sucre, de chaque, deux gros = 7 gram.
 Mucilage de gomme adragant quantité suffisante.

Faites trente tablettes. — Une, matin et soir.

TABLETTES STOMACHIQUES DE DAUBENTON. (ph. rad.)

Pr. Ambre gris trois grains = 0,2 gram.
 Ipecacuanha un gros = 4 gram.

Cachou deux gros = 7 gram.
 Sucre une once = 32 gram.
 Mucilage de gomme adragant quantité suffisante.

Faites soixante tablettes. — Une par jour, en augmentant peu à peu. — Dans la dyspepsie et la disposition à la diarrhée.

TABLETTES STOMACHIQUES DE RICHTER. (ph.)

Pr. Ipecacuanha un gros = 4 gram.
 Chocolat une once = 32 gram.
 Mucilage de gomme adragant quantité suffisante.

Faites soixante tablettes. — Une, deux fois par jour.

ÉLECTUAIRE VOMITIF. (au. ph.)

Pr. Ipecacuanha un demi-gros = 2 gram.
 Tartre boraté,
 Rhubarbe, de chaque, un gros = 4 gram.
 Musc quatre grains = 0,25 gram.
 Soufre doré d'antimoine dix grains = 0,6 gram.
 Miel quantité suffisante.

Une cuillerée à café dans la coqueluche. (au.)

Pr. Ipecacuanha un demi-gros = 2 gram.
 Extrait de chardon béni deux gros = 7 gram.
 Eau quantité suffisante.

A prendre en deux fois. (ph.)

MARMELADE PECTORALE. (bo.)

Pr. Ipecacuanha douze grains = 0,6 gram.
 Fleurs de soufre un scrupule = 1,25 gram.
 Iris de Florence un gros = 3,8 gram.
 Sirop de guimave,
 Manne, de chaque, deux onces = 61 gram.

Une cuillerée à café, deux ou trois fois par jour, dans la coqueluche.

INFUSION D'IPECACUANHA.

Infusum ipecacuanhæ. (fu. li.)

Pr. Ipecacuanha deux gros = 7 gram.
 Eau bouillante six onces = 180 gram.

Passer au bout d'un quart d'heure.

DÉCOCTION D'IPECACUANHA. (so. sp.)

Pr. Ipecacuanha deux gros = 7,6 gram.
 Eau douze onces = 367 gram.

Partagez l'eau en trois doses, dont chacune sert successivement à faire une décoction. Le produit total est de six onces = 184 gram., à prendre en trois fois, dans la dysenterie.

POTION ANTIDIARRHÉIQUE DE HOOPER. (fo.)

Pr. Ipecacuanha cinq grains = 0,37 gram.
 Sirop de pavot un gros = 3,8 gram.
 Esprit de cannelle deux gros = 7,6 gram.
 Mixture de craie treize gros = 50 gram.

A prendre en une seule fois, toutes les demi-heures.

POTION ANTIDYSENTÉRIQUE. (fo. rad.)

Pr. Ipecacuanha un gros = 4 gram.
 Eau de fontaine quatre onces = 120 gram.

Faites bouillir pendant dix minutes, et ajoutez à la colature :

Sirop de fleurs d'oranger. . . une demi-once = 15 gram.

Une cuillerée tous les quarts d'heure. (*rad.*)

Pr. Ipécacuanha. . . un gros à un gros et demi = 3,8 à 6 gr.

Eau. quatre onces = 122 gram.

Faites bouillir pendant dix minutes, passez, et ajoutez :

Sirop de fleurs d'oranger. . . une demi-once = 15 gram.

Par cuillerées toutes les dix minutes. (*fo.*)

POTION ANTIDYSENTÉRIQUE DE JAHN. (*ph.*)

Pr. Ipécacuanha. un gros = 4 gram.

Rhubarbe. trois gros = 11 gram.

Eau bouillante. quantité suffisante

pour obtenir six onces = 180 gram. d'infusion. Ajoutez à la colature :

Gomme arabique. deux gros = 4 gram.

Sirop de guimauve. six gros = 22 gram.

Une cuillerée toutes les heures.

POTION ANTI-ICTÉRIQUE DE RICHTER. (*rad.*)

Pr. Ipécacuanha. un scrupule à un gros = 1,25 à 4 gr.

Eau bouillante. quatre onces = 120 gram.

Passez au bout d'un quart d'heure, et ajoutez à la colature :

Sirop de guimauve. une once = 30 gram.

Sucre. une demi-once = 15 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures.

POTION ANTIVOMITIVE. (*sm.*)

Pr. Ipécacuanha. deux à quatre grains = 0,1 à 0,2 gr.

Sous-carbonate de soude. . . dix grains = 0,5 gram.

Sirop diacode. une once = 30 gram.

Eau de menthe. six onces = 184 gram.

Par cuillerées, dans le vomissement spasmodique.

POTION FÉBRIFUGE. (*ca. sm.*)

Pr. Ipécacuanha. un gros et demi = 6 gram.

Ecorce d'orange. deux gros = 7,6 gram.

Crème de tartre. une demi-once = 15 gram.

Eau. quatre onces = 122 gram.

Faites bouillir, et ajoutez à la colature :

Oxymel scillitique. une demi-once = 15 gram.

A prendre par cuillerées.

POTION INCISIVE. (*bo. ca. gu.*)

Pr. Ipécacuanha. un gros = 3,8 gram.

Follicules de séné. deux gros = 7,6 gram.

Eau bouillante. six onces = 184 gram.

Faites infuser pendant douze heures, passez, et ajoutez :

Oxymel scillitique,

Sirop d'hysope, de chaque. . . . une once = 30 gram.

A prendre par cuillerées. (*bo. gu.*)

Pr. Ipécacuanha. quatre grains = 0,2 gram.

Séné. un gros = 3,8 gram.

Eau bouillante. six onces = 184 gram.

Faites infuser, passez, et ajoutez à la colature .

Liquueur ammoniacale anisée. . . un gros = 3,8 gram.

Sucre. une once = 30 gram.

A prendre par cuillerées à bouche. (*ca.*)

POTION PECTORALE. (*ams. b*. ph. vm.*)

Pr. Ipécacuanha. un gros et demi = 6 gram.

Ecorce d'orange. deux gros = 7 gram.

Eau bouillante. cinq onces = 150 gram.

Au bout d'une demi-heure, ajoutez :

Crème de tartre. deux gros = 7 gram.

Passez la solution refroidie, et ajoutez :

Oxymel scillitique. une demi-once = 15 gram.

Dose, une à deux cuillerées tous les quarts d'heure.

POTION TONIQUE. (*pie.*)

Pr. Ipécacuanha. dix grains = 0,5 gram.

Ecorce d'orange amère,

lichen d'Islande, de chaque. . . deux gros = 7,6 gram.

Eau. six onces = 184 gram.

Faites bouillir pendant une demi-heure, puis infuser dans la liqueur :

Polygala de Virginie,

Hysope, de chaque. une poignée.

Passez, et ajoutez :

Sirop de bourrache. une once = 30 gram.

Par cuillerées, dans les affections catarrhales. (*pie.*)

Pr. Ipécacuanha. vingt-cinq grains = 1,3 gram.

Ecorce d'orange amère. un gros = 3,8 gram.

Eau. quantité suffisante

pour obtenir six onces = 184 gram. de décoction. Ajoutez à la colature :

Sirop de fleurs d'oranger. une once = 30 gram.

Une cuillerée à bouche, avant le repas. (*bo. ph.*)

POTION VOMITIVE. (*b*. ff. fu. bo. ca. cot. sp. gu. ra. ph. sm. sw.*)

Pr. Ipécacuanha. douze grains = 0,6 gram.

Eau. quatre onces = 122 gram.

Mélez. (*ra.*)

ff. et *bo.* prescrivent vingt grains = 1,06 gram. d'ipécacuanha.

Pr. Ipécacuanha. vingt grains = 1,25 gram.

Huile d'amandes douces. une once = 30 gram.

Mélez. (*b*.*)

Pr. Ipécacuanha. vingt-quatre grains = 1,27 gram.

Eau. sept onces = 214 gram.

Sirop de sucre. une once = 30 gram.

Mélez. (*cot. gu.*)

sp. prescrit dix grains = 0,5 gram. d'ipécacuanha, quatre onces = 122 gram. d'eau, et une = 50 gram. de sirop.

Pr. Ipécacuanha. . . un à deux scrupules = 1,25 à 2,5 gram.
Eau de mélisse. deux onces = 60 gram.
Ether acétique. huit gouttes.

Une cuillerée toutes les dix minutes. (ph.)

Pr. Ipécacuanha. vingt-cinq grains = 1,5 gram.
Oxymel scillitique. un gros = 3,8 gram.
Eau. une once = 30 gram.

Mélez bien. (sw.)

Pr. Ipécacuanha. un demi-scrupule = 0,6 gram.
Eau. six gros = 22 gram.
Oxymel scillitique. deux gros = 7 gram.

Une cuillerée toutes les dix minutes, pour un enfant de douze ans. (ph.)

Pr. Ipécacuanha. un scrupule = 1,27 gram.
Oxymel scillitique,
Sirop de framboises,
Eau, de chaque. une demi-once = 15 gram.

Une cuillerée à café tous les quarts d'heure, chez les enfants. (ca.)

Pr. Ipécacuanha. dix grains = 0,5 gram.
Kermès minéral. un grain = 0,05 gram.
Eau de canelle orgée. une demi-once = 15 gram.
— pure. six onces = 184 gram.

Mélez. (sm.)

Pr. Ipécacuanha. vingt grains = 1,06 gram.
Émétique. deux grains = 0,1 gram.
Eau. quatre onces = 122 gram.

Mélez. (ff.)

Pr. Ipécacuanha. un scrupule = 1,27 gram
Émétique. un grain = 0,05 gram.
Sirop de miel. une demi-once = 15 gram.
Eau. quatre onces = 122 gram.

Mélez. (ra.)

Pr. Crème de tartre. un demi-gros = 2 gram.
Eau bouillante. quatre onces = 120 gram.

Ajoutez à la colature encore chaude :

Ipécacuanha. deux gros = 7 gram.
Écorce d'orange amère. un gros = 4 gram.

Filtrez au bout de quelque temps. — A prendre par cuillerées. (fu.)

POTION VOMITIVE DE CASPER. (ph.)

Pr. Ipécacuanha. . . un gros à un gros et demi = 4 à 6 gram.
Eau bouillante. quantité suffisante

pour obtenir une once = 30 gram. d'infusion. Ajoutez à la colature :

Vin stibié. deux gros = 7 gram.
Oxymel scillitique. une demi-once = 15 gram.

Une cuillerée tous les quarts d'heure.

SIROP AQUEUX D'IPÉCACUANHA.

Syrupus ipecacuanhæ aquosus. (f. gr. li. p. par. s. t. bl. cot. gi. gu. so. ta. vm.)

1° Pr. Ipécacuanha. une once = 30 gram.
Eau. quatorze onces = 420 gram.

Faites bouillir, et à la colature ajoutez :

Sucré. deux livres = 720 gram.

I.

Laissez fondre à une douce chaleur. (gr. p. par. s. ta.)

Pr. Ipécacuanha. huit onces = 245 gram.
Eau tiède. deux livres = 1 kilogr.

Exprimez au bout de vingt-quatre heures; traitez le marc de la même manière; ajoutez aux deux liqueurs réunies :

Sirop de sucre bouillant. . . dix-huit livres = 9 kilogr.

Mélez bien. (so. vm.)

Pr. Ipécacuanha. une demi-once = 15 gram.
Eau. cinq livres = 1800 gram.

Faites bouillir pendant huit ou dix minutes, passez, et ajoutez :

Sucré. deux livres et demie = 900 gram.

Versez dans le sirop :

Eau de fleurs d'orange. une once = 30 gram.

Mélez bien. (li.)

2° Pr. Ipécacuanha. quatre onces = 122 gram.
Alcool (22 degrés). deux livres = 1 kilogr.

Faites digérer à deux reprises, au bain-marie; filtrez les teintures réunies, distillez l'alcool, évaporez le résidu à siccité, et versez dessus :

Eau distillée. une livre = 500 gram.

Chauffez un peu, filtrez à froid, et ajoutez :

Sirop de sucre. neuf livres = 4 kilogr. 1/2

Chauffez jusqu'à trente degrés bouillant. (l. cot. gi. gu.)

Pr. Extrait alcoolique d'ipécacuanha, une once = 32 gram.
Eau. huit onces = 250 gram.

Ajoutez à la solution :

Sirop de sucre bouillant. . . . neuf livres = 4 kilogr. 1/2

Évaporez convenablement. (f.)

Pr. Saccharure d'ipécacuanha. . . . seize onces = 500 gram
Eau. huit onces = 250 gram.

Dissolvez à une douce chaleur. (bl.)

SIROP EXPECTORANT. (fe. ca. ta.)

Pr. Ipécacuanha. deux onces = 60 gram.
Quinquina. quatre onces = 120 gram.
Opium. deux scrupules = 2,5 gram.
Eau. sept livres = 2520 gram.

Faites macérer pendant deux ou trois jours, à plusieurs reprises, jusqu'à ce que l'eau ne se colore plus, filtrez les liqueurs réunies, et ajoutez-y :

Sucré. neuf livres = 3240 gram.

Évaporez convenablement au bain-marie.

Dose, deux à quatre gros = 8 à 13 gram., dans la coqueluche.

SIROP PECTORAL DE COURTI. (bo. pie.)

Pr. Ipécacuanha. un gros = 3,8 gram.
Iris de Florence. deux gros = 7,6 gram.
Quinquina rouge. une demi-once = 15 gram.
Lichen d'Islande,
Polygala de Virginie, de chaque, deux onces = 61 gram.

Eau. quantité suffisante.
Sucre. deux livres = 1 kilogr.

Faites un sirop.

SIROP INCISIF. (*bo. pie. sw.*)

Pr. Ipécacuanha. deux gros = 7,6 gram.
Iris de Florence,
Lichen d'Islande, de chaque. une once = 30 gram.
Sucre. deux livres = 1 kilogr.
Eau. quantité suffisante.

Faites un sirop. (*sw.*)

bo. et *pie.* prescrivent une once = 30 gram. d'iris, autant de polygala, et une demi-once = 15 gram. de lichen.

SIROP CONTRE LA COQUELUCHE. (*ca.*)

Pr. Sirop d'ipécacuanha,
— diacode, de chaque. deux onces = 61 gram.
— de fleurs d'orange. une once = 30 gram.
Oxymel scillitique. une once et demie = 46 gram.

Mélez. — Deux cuillerées à bouche, d'heure en heure.

VIN D'IPÉCACUANHA.

Oenolé d'ipécacuanha; Vinum ipécacuanhæ. (am. ans. an. b. be. du. ed. fi. li. lo. p. s. si. su. *br. c. cot. gu. so sw. sm.*)

Pr. Ipécacuanha. une partie.
Vin d'Espagne douze parties.

Filtrez au bout de dix jours. (*s. bl.*)

ams. b. be. ed. p. si. *br.* et *sw.* prescrivent quinze parties de vin; — *cot.* et *gu.* seize; — am. du. lo. et *c.* dix-huit; — *so.* et *vm.* trente-deux; — fi. lo. et su. huit.

Pr. Ipécacuanha. une partie.
Alcool (50 degrés). trois parties.
Vin blanc. douze parties.

Filtrez au bout de plusieurs jours. (*an.*)

VIN D'IPÉCACUANHA COMPOSÉ. (*b. ham. wu. ta.*)

Pr. Ipécacuanha. six parties.
Écorce d'orange. une partie.
Vin généreux. quarante-huit parties.

Filtrez au bout de quelques jours. (*ham. wu.*)

Pr. Ipécacuanha. trois parties.
Anis étoilé. deux parties.
Alcool seize parties.

Filtrez au bout de huit jours. (*ta.*)

Pr. Ipécacuanha quatre parties.
Sucre. deux parties.
Alcool (32 degrés). vingt-quatre parties.

Faites digérer pendant huit jours, et ajoutez :

Vin blanc. quatre-vingt-seize parties.
Anis étoilé. une partie.
Sucre. quatre parties.

Filtrez au bout de six jours. (*b.*)

SIROP VINEUX D'IPÉCACUANHA. (*bl.*)

Pr. Saccharure d'ipécacuanha. seize onces = 500 gram.
Vin d'ipécacuanha dix onces = 306 gram.

Dissolvez, et filtrez.

SIROP BALSAMIQUE PECTORAL. (*ca.*)

Pr. Teinture de baume de Tolu. trois gros = 11,5 gram.
Vin rouge. une livre = 500 gram.
Infusion de coquelicot.

une livre et deux onces = 561 gram.

Ipécacuanha. deux gros et demi = 10 gram.

Faites macérer ensemble. Ajoutez à la colature :

Sucre. deux livres = 1 kilogr.
Extrait d'opium. vingt grains = 1,06 gram.

Une once à une once et demie = 30 à 46 gram., dans la colature.

SIROP PECTORAL DE DÉSESSARTS.

Sirop d'ipécacuanha et de séné composé. (*f. b. br. ca. gu. so.*)

Pr. Ipécacuanha,
Serpolet, de chaque. une once = 32 gram.
Sulfate de magnésie,
Séné, de chaque. trois onces = 48 gram.
Fleurs de coquelicot. quatre onces = 125 gram.
Vin blanc,
Eau de fleurs d'orange, de chaque
une livre et demie = 750 gram.
Sucre. quantité suffisante.

Faites infuser le séné et l'ipécacuanha dans le vin, puis le marc, avec le coquelicot, le serpolet et le sel, dans six livres = 5 kilogr. d'eau bouillante; mélez les deux liqueurs, ajoutez-y le double de sucre et l'eau aromatique.

Dose, une à deux onces = 30 à 61 gram., dans la coqueluche.

SIROP PECTORAL DE GARDANNE. (*ca. pie.*)

Pr. Ipécacuanha. cinq gros et un scrupule = 21 gram.
Vin blanc. une livre = 500 gram.

Au bout d'un quart d'heure, ajoutez :

Séné. quatre onces = 125 gram.;

puis au bout de deux heures :

Eau bouillante quatre livres = 2 kilogr.
Crème de tartre. quatre onces = 125 gram.
Serpolet. six gros = 25 gram.
Écorce d'orange amère.

cinq gros et un scrupule = 21 gram.

Passer au bout de quatre heures, et ajoutez :

Sirop de guimauve. deux livres = 1 kilogr.
Eau de fleurs d'orange. douze onces = 367 gram.

Deux cuillerées à café par jour, aux enfants.

TEINTURE D'IPÉCACUANHA.

Alcoolé d'ipécacuanha; Tinctura s. Essentia ipécacuanhæ. (*f. ham. p. bl. cot. gi. so. ta.*)

Pr. Ipécacuanha. une partie.
Alcool (21 degrés). quatre parties.

Filtrez au bout de quinze jours. (*f. p. bl. cot. so.*)

gu. et *ta.* prescrivent huit parties d'alcool; — *gi.* douze; — *ham.* cinq.

TEINTURE ANISÉE D'IPÉCACUANHA. (bo. ca. ra.)

Pr. Ipécacuanha. une partie.
Esprit d'anis. quatre parties.

Faites digérer.

Dose, une à deux onces = 50 à 64 gram., dans les rhumes. Un demi-gros à un gros = 2 à 4 gram. aux enfants.

SIROP ALCOOLIQUE D'IPÉCACUANHA. (an. be. ham. ta.)

Pr. Ipécacuanha. une once = 30 gram.
Alcool (20 degrés) neuf onces et demie = 283 gram.

Faites macérer pendant huit jours, et ajoutez à la colature :

Sirop de sucre. une livre = 360 gram.,
par cinq onces = 134 gram. de liquide. (an. be.)

Pr. Teinture d'ipécacuanha. une partie.
Sirop de sucre. trente parties.

Mélez. (ham. ta.)

ÉLIXIR SUDORIFIQUE DE WILLIS. (ca.)

Pr. Ipécacuanha.
Baume de Tolu, de chaque. une demi-once = 15 gram.
Fleurs de benjoin,
Opium,
Safran, de chaque deux gros = 7,6 gram.
Huile d'anis. un gros = 3,8 gram.
Camphre. deux scrupules = 2,55 gram.
Alcool. deux livres = 2 kilogr.

Dose, un à deux gros = 4 à 8 gram.

IRIS.

Les pharmacopées indiquent plusieurs espèces de ce genre de plantes. Ici nous citerons les suivantes :

1° *Iris fétide*, *Glayeul puant* ; *Iris foetidissima*, L.

Waldwasekraut, *stinkende Schwerdtlille* (Al.) ; *stinking gladwyn* (An.).

f.

Plante 2 (triandrie monogynie, L.; iridées, J.), d'Europe. (Fig. Blackw. Herb. t. 158.)

On emploie la racine (*radix Xyridis s. Spathulæ factidæ*), qui a une odeur désagréable et une saveur âcre.

2° *Iris de Florence* ; *Iris Florentina*, L.

Florentinische Schwertel, *Florentenwurz*, *Feilchenwurz* (Al.) ; *florentine orris* (An.) ; *ussul*, *assosunul*, *asman junie*, *irsa* (Ar.) ; *flulowy koren* (B.) ; *florod* (D.) ; *lirio de Florencia* (E.) ; *irza* (H.) ; *florentynse iris* (Ho.) ; *iride di Firenze* (I.) ; *korzen flol-kowy* (Po.) ; *irio de Florencia* (Por.) ; *florod* (Su.).

a. am. oms. an. b. ba. be. br. d. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. gr. ham. han. li. o. p. po. pr. r. s. sl. su. w. wu. ww. a. be. br. c. g. m. pid. sa. sp. z.

Plante 2, du midi de l'Europe. (Fig. Flore médic. IV. t. 204.)

On emploie la racine (*radix Ireos s. Iridis Flo-*

rentinae), qui est épaisse, noueuse, compacte, brunnâtre en dehors, blanche en dedans. Elle a une saveur âcre, amère et persistante. Communément on la débite, après avoir enlevé l'épiderme, en morceaux cylindriques, aplatis, tuberculeux, d'un blanc rosé, presque insipides, et d'une odeur très suave, analogue à celle de la violette.

Elle contient, d'après Vogel, de la gomme, un extrait brun, de la fécule, une huile fixe, une huile volatile, solide et cristallisable, et du ligneux. Toreri y a découvert de l'émétine.

Purgative, dans l'état frais, cette racine est aussi réputée incisive et sternutatoire. On la prescrit quelquefois dans les catarrhes. — Dose de la poudre, un scrupule = 1,27 gram ; du suc, une à deux onces = 50 à 64 gram., dans quatre onces = 122 gram. de vin.

5° *Iris variée* ; *Iris versicolor*, L.

Blue flag (An.).

am. c.

Plante 2, de l'Amérique septentrionale. (Fig. Hort. Elth. tab. 153. fig. 187.)

on emploie la racine, qui est fibreuse.

ESPÈCES DIAIREOS. (an. b'. b. pa. w. sp. vm.)

Pr. Racine d'iris de Florence,
Sucre candi blanc,
Espèces diatrageanthès froides, de chaque. parties égales.

Faites une poudre. (br. pa. w. sp.)

b'. prescrit quatre parties d'iris, deux d'espèces et autant de sucre ; — vm. une d'iris, une d'espèces et une et demie de sucre ; — han. quatre d'iris, deux de gomme adragant et autant de sucre.

POUDRE CITRINE.

Pulvis puerorum citrinus. (br.)

Pr. Racine d'iris de Florence. cent vingt-huit parties.
— de réglisse. douze parties.
Anis,
Fenouil, de chaque. six parties.
Safran. trois parties.
Sucre blanc poids égal au tout.

Faites une poudre.

ESPÈCES POUR PARFUM.

Species pro odoramento. (sp.)

Pr. Fleurs fraîches de roses rouges. une demi-once = 15 gram.
— de lavande. deux gros et demi = 9 gram.
Bois de Rhodes. une demi-once = 15 gram.
Racine d'iris de Florence deux onces = 60 gram.
Herbe fraîche de basilic,
— — de calament de montagne,
— — de marjolaine, de ch. deux gros = 7 gram.
— — de menthe poivrée.
quatre scrupules = 5 gram.
— — d'origan,
— — de pouliot,
— — de sauge,
— — de saricette,
Écorce d'orange,
— de citron, de chaque. deux gros = 7 gram.

Cannelle,
 Romarin,
 Girofle,
 Macis, de chaque. trois gros = 11 gram.
 Feuilles de laurier. une demi-once = 15 gram.
 Musc. deux grains = 0,12 gram.
 Ambre gris. quatre grains = 0,25 gram.

Faites une poudre grossière.

ESPÈCES CÉPHALIQUES.

Species cephalicæ. (br. pa. w. sp.)

Pr. Racine de souchet rond,
 — d'iris de Florence, de ch. une demi-once = 15 gram.
 Fleurs de lavande,
 — de romarin,
 — de roses, de chaque. six gros = 22 gram.
 Bois de Rhodes,
 — de santal citrin,
 — d'aloès, chaque. une demi-once = 15 gram.
 Girofle,
 Cannelle,
 Muscade,
 Succin,
 Syrax, de chaque. trois gros = 11 gram.

Coupez, écrasez, et mêlez. (br. w.)

Pr. Iris de Florence. trois onces = 90 gram.
 Lavande,
 Marjolaine, de chaque. une once = 30 gram.
 Bois de Rhodes,
 Santal citrin, de chaque. six gros = 22 gram.
 Cannelle. deux gros = 7 gram.
 Écorce d'orange. une demi-once = 15 gram.
 — de citron. une once et demie = 45 gram.
 Girofle. deux gros et demi = 9 gram.
 Benjoin,
 Mastic,
 Storax,
 Succin, de chaque. une demi-once = 15 gram.

Coupez, écrasez, et mêlez. (sp.)

Pr. Iris de Florence. une once et demie = 45 gram.
 Bêtoine,
 Marjolaine,
 Romarin, de chaque. une demi-once = 15 gram.
 Sauge. deux gros = 7 gram.
 Roses rouges. une once = 30 gram.
 Lavande,
 Fleurs de giroflée jaune, de chaq. deux gros = 7 gram.
 Storax,
 Succin, de chaque. trois gros = 11 gram.
 Nard des Indes,
 Santal citrin,
 — d'aloès,
 Girofle,
 Souchet rond,
 Cannelle,
 Benjoin, de chaque. quatre scrupules = 5 gram.

Faites une poudre. (pa.)

EXTRAIT D'IRIS.

Extractum iridis. (sa. w.)

Pr. Iris de Florence. une partie.
 Eau. six parties.

Faites infuser, puis bouillir, exprimez, et évaporez la colature.

RÉSINOÏDE D'IRIS DE FLORENCE. (so.)

Pr. Iris de Florence en poudre,
 Éther sulfurique, de chaque. parties égales.

Préparez une teinture par la méthode de déplacement, versez-la sur une assiette, laissez évaporer et conservez le résidu de consistance de miel.

FÈCULE D'IRIS.

Fæcula ireos. (g. pa. gu. ta.)

Pr. Racine fraîche d'iris. à volonté.

Râpez-la, et renfermez la pulpe dans un sac, pour l'exprimer; laissez reposer le suc, décantez la partie limpide, et faites sécher la fécule à une douce chaleur.

CONFECTON D'IRIS. (vm.)

Pr. Racine d'iris de Florence. une partie.
 Sucre. trois parties.

Broyez ensemble.

MARMELADE D'IRIS. (stw.)

Pr. Racine de Florence. une livre = 360 gram.
 Sous-carbonate de potasse. une once = 15 gram.
 Scille. un gros = 4 gram.
 Eau. quatre livres = 1440 gr.

Faites ramollir sur un feu doux, passez à travers un tamis, et ajoutez à la pulpe :

Sucre,
 Sirop de sucre, de chaque. trois livres = 1080 gr.

Évaporez en consistance de gelée épaisse.

Dose, quatre à six cuillerées par jour, dans les catarrhes chroniques.

TABLETTES D'IRIS.

Rotulæ diaireos. (br. w. gu.)

Pr. Poudre d'iris. une once = 30 gram.
 Sucre. dix-sept onces = 530 gram.
 Mucilage de gomme adragant. quantité suffisante.

Faites des tablettes de dix-huit grains = 0,96 gr. (gu.)

Pr. Espèces diaireos. une once = 30 gram.
 Sucre cuit en consistance. doux onces = 360 gram.

Faites des pastilles. (br. w.)

PÂTE D'IRIS DE FLORENCE. (vm.)

Pr. Racine d'iris de Florence. une once = 30 gram.
 Eau froide. seize onces = 480 gram.

Après quelques heures d'infusion, passez; faites chauffer la colature avec

Gomme arabique. vingt onces = 600 gram.,

et après la solution, ajoutez :

Sucre candi. quinze onces = 450 gram.

Clarifiez au blanc d'œuf, passez, évaporez en consistance de gelée, et coulez sur un marbre huilé.

TEINTURE D'IRIS.

Eau de violette; Aqua violacea. (gu. so. sp.)

Pr. Racine d'iris de Florence. une partie.
Alcool. huit parties.

Faites infuser pendant quinze jours.
Cosmétique.

HUILE D'IRIS.

Oleum iridis s. ireos s. irinum. (br. e. pa. sa. t. ta.)
Pr. Racine et fleurs d'iris. une partie et demie.
Huile d'olives. trois parties.

Faites digérer pendant plusieurs jours, et répétez l'opération trois fois sur de nouvelles herbes. (sa. t. ta.)

Pr. Racine et fleurs d'iris,
Huile d'olives, de chaque. parties égales.

Faites cuire doucement jusqu'à consommation de l'humidité. (pa.)

Pr. Racine fraîche d'iris. une partie.
Huile d'olives. deux parties.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, puis digérer sur des fleurs d'iris, et cuire de nouveau. (e.)

Pr. Suc d'iris,
Huile d'olives, de chaque. parties égales.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité. (br.)

ONGUENT PECTORAL.

Unguentum pectorale s. irinum. (sa. t. w. sp.)

Pr. Huile d'amandes douces. . . . quatre onces = 120 gram.
— de camomille,
— de violette, de chaque. . . . trois onces = 90 gram.
Beurre. six onces = 180 gram.
Graisse de poule,
— de canard, de chaque. . . . deux onces = 60 gram.
Cire blanche. trois onces = 90 gram.

Ajoutez à la masse fondue :

Poudre d'iris de Florence. . . . deux gros = 7 gram.
— de safran. un demi-gros = 2 gram.

Mélez bien. (sa. w. sp.)

Pr. Huile d'iris,
— d'amandes douces,
Beurre frais, de chaque. . . . six onces = 166 gram.
Axonge. quatre onces = 111 gram.
Cire blanche. cinq onces = 138 gram.

A la masse fondue et un peu refroidie ajoutez :

Poudre d'iris de Florence, une once et demie = 42 gram.
— de safran. une demi-once = 14 gram.

Mélez avec soin. (t.)

Recommandé jadis chez les enfants qui toussent et respirent avec peine.

VINAIGRE AROMATIQUE. (fe.)

Pr. Racine d'iris,
Pétales de roses,
— d'oillet, de chaque. une once = 30 gram.
Cannelle,
Muscade,
Girofle, de chaque. deux gros = 7 gram.
Écorce d'orange,
Storax,
Benjoin, de chaque. deux gros = 7 gram.
Marjolaine,
Menthe,
Dictame de Crète,
Thym, de chaque. une once = 30 gram.
Vinaigre. six livres = 2160 gram.

Distillez après un mois de digestion.

IVETTE.

Ivette commune; Teucrium Chamæpitys, L.

Schlagkraut, Feldyresse, Erdweihrauch (Al.); *ground pine* (An.); *ywa, poloj cypr'is* (B.); *camepitos, pinillo oloroso* (E.); *veid-yress* (Ho.); *camepizio* (I.); *iwinka, piznowa* (Po.); *chamepite* (Por.).

ams. an. b. ha. be. br. e. fe. fu. g. li. r. s. w. wu. be. br. g. m. sp. z.

Plante ☉, qui croit dans toute l'Europe. (Fig. Zorn, *lc. pl. t. 120.*)

On emploie l'herbe fleurie (*herba Chamæpitys s. Ivæ arthriticæ s. Chamæmori*); elle se compose d'une tige rameuse, velue, garnie de feuilles divisées, jusqu'au-delà de leur moitié, en trois découpures linéaires, et de fleurs jaunes, sessiles, solitaires dans les aisselles des feuilles supérieures. Elle a une odeur résineuse et faiblement balsamique, qui se perd par la dessiccation. Sa saveur est âcre, amère et styptique.

Tonique, stomachique.

EXTRAIT D'IVETTE. (sa. ta.)

Pr. Herbe fraîche d'ivette. une partie.
Eau. quatre parties.

Faites bouillir, exprimez, et évaporez la liqueur. (ta.)

Pr. Herbe fraîche et pilée d'ivette. . huit livres = 2656 gram.

Faites digérer pendant trois jours, dans un alambic, puis tirez environ deux onces = 35 gram. d'eau, par la distillation au bain-marie; versez le triple d'eau sur le résidu, et faites réduire au tiers par la coction; clarifiez et passez la liqueur, évaporez jusqu'en consistance d'électuaire, et ajoutez l'eau à celui-ci, quand il n'est plus que tiède. (sa.)

J.

JALAP.

Convolvulus Jalappa, L.

Jalappe, Jalappwurzel (An.); *jalapa* (An.); *galapa* (B.); *jalap*

(D.); *jalappe* (Ho.); *scialappa* (I.); *jalappa* (E. Por. Su.) *jalapy* (Po.); *tzalmapa* (T.).

am. ams. an. b. ba. be. br. d. dd. du. e. ed. f. fe. ff. ff. g. gr. han. he. li. lo. o. p. par. po. pp. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. be. br. c. g. zi. m. pa. pid. sa. sp. z.