

TINCTURÆ.

TINCTURA ARNICÆ.

℞. Radicis Arnicæ montanæ uncias duas.
Alcoholis diluti libram unam.
Digere per octiduum, sœpius agitato vase;
dein cola.

Usus *internus*: Dysenteria. - *Forma lotionis*,
fotus, gargarismatis: Ulcera putrida, gan-
grænosa; ulcera faucium putrida (angina
gangrænosa cum scarlatina).

TINCTURA ASSÆ FÆTIDÆ.

Usus : Ulcera putrida, atonica; caries.

TINCTURA BALSAMICA.

℞. Balsami Myroxyli Peruferi unciam unam.
Alcoholis libram unam. Misce.
Digere per triduum et cola.

Usus : Ad vulnera et ulcera laxa exsiccanda
et consolidanda.

TINCTURA BENZOES COMPOSITA.

Usus idem fere ac præcedentis : Ulcera

atonica. — Item ad vulnera ab accessu
aëris defendenda.

TINCTURA CATECHU.

Usus : Gingivarum laxitas ; ulcera scorbu-
tica ; hæmorrhagia.

TINCTURA CINCHONÆ.

Usus : Gangræna ; vulnera aut ulcera pu-
trida.

TINCTURA COSMETICA.

¶. Balsami concreti Styracis-Benzoin un-
cias sex.

Styracis officinalis un-
ciam unam.

Pulverisatis affunde

Alcoholis libram unam.

Digere vase clauso per quatuordecim
dies ; dein cola.

Usus præcipuus pro lotione cosmetica.

TINCTURA EUPHORBIAE.

VIRTUS : Corrosiva.

Usus cautus : Ad limites cariei ponendos ;
ulcera sordida , atonica.

TINCTURA GINGIVALIS.

R. Gummi-resinæ Myrrhæ,

— — — Mimosæ cathechu pulv.
ana unciam unam.

Balsami Myroxylī Peruiferi drachmam
unam.

Simul tritis affunde

Alcoholis,

— — — Cochleariæ officinalis, ana
uncias tres.

Digere per octiduum, saepius agitato
vase; dein cola.

Usus: Laxitas et ulcera gingivarum vel
faucium scorbutica.

TINCTURÆ LITTÆ VESICATORIÆ.

SYN. *Tinctura Cantharidum.*

Usus internus et externus: Arthrodynia,
aut myodynæ rheumatica; debilitas par-
tium; paralysis; enuresis juniorum habi-
tualis; enuresis ex debilitate sphincteris
vesicæ; hydarthrus.—*Forma injectionis*
Drachmæ tres—quatuor ad libram unam
aqueæ: Sinus et fistulæ ita ut suppuratio
callositatis excitetur.

TINCTURA MURIATIS FERRI.

N. Oxydi ferri rubri libram unam.

Acidi muriatici concentrati quantum satis.

Ut fiat solutio saturata, saepius agitato vase, ita ut pars ferri in fundo maneat; dein cola et adde

Alcoholis pondus triplum.

Usus *forma fatus*: Scirrus mammæ; carcinoma.—Item ad verrucas aliasve excrescentias.—*Internus*: Dosi guttarum decem saepius repetendo: Dysuria ex coarctatione urethræ spasmodica. **CLINE.**

TINCTURA MYRRHÆ.

Usus: Ulcera atonica, putrida; caries.

TINCTURA ODONTALGIA, Ph. DAN.

N. Rasuræ ligni Guajaci officinalis, Corticis Laurus-Sassafras pulv. ana unicam unam.

Radicis Anthemis-Pyrethri drachmas sex,

Foliorum Nicotiana-Tabaci drachmas tre.

Herbæ Thymus-Serpylli,
— Origani vulgaris, ana drachmas
duas.

Camphoræ drachmam semis.

Opii scrupulum unum.

Concisis et contusis affunde

Alcoholis libras duas.

Digere per octiduum, saepius agitato
vase; dein cola.

Usus: Odontalgia cariosa aut rheumatica.

(Gossypio exceptam denti carioso im-
ponendo; vel leniter calefactam simpli-
citer instar collutorii adhibendo) — Para-
lysis linguæ.

TINCTURA SEDATIVA.

R. Opii unciam unam.

Alcoholis diluti libram unam.

Digere per octiduum, saepius agitato vase;
dein cola.

Usus: Ulcera syphilitica rebellia; herpes;
serpigo; dolores spasmodici in variis
corporis partibus; odontalgia; otalgia;
ophthalmia.

TINCTURA TURIONUM PINUS-ABIETIS.

R. Extracti Turionum Pinus-Abietis uncias duas.

Alcoholis Cochleariae officinalis uncias decem.

Misce ut fiat solutio.

Usus : Scorbatus; hæmorrhœa gingivarum, aliave vitia oris scorbutica.

TINCTURA VULNERARIA COMPOSITA.

R. Tincturæ Cinchonæ officinalis,
— Myrrhæ, ana unciam unam.

Misce.

Interdum cum successu additur,
Olei volatilis Terebinthinæ Pinus-Laricis uncia semis.

Digere leni calore.

Usus : Vulnera tendinum aut nervorum; vulnera aut ulceræ sordida, cariosa.

TINCTURA VULNERARIA SIMPLEX.

SYN. *Tinctura Mastiches.*

R. Resinæ Pistacia-Lentisci (vulgo *Mastiche dicti*) unciam unam.

Alcoholis diluti libram unam.

Digere leni calore per triduum, saepius agitato vase; dein cola.

Usus: Vulnera membranarum, tendinum aut ligamentorum, sedata inflammatione; denudatio et vulnera ossium.

A C E T A.

ACETUM AROMATICUM.

Usus *præcipuus*: Pro odoratu aut lotione ad effluvia aëris putrida et contagiosa corrigenda; syncope.

ACETUM CAMPHORATUM.

R. Camphoræ unciam unam.

Alcoholis quantum satis.

Ut fiat solutio, cui adde terendo,
Aceti vini uncias decem.

Usus: Emphysema putridum; gangræna;
ulcera faucium putrida, atonica.

ACETUM COCHLEARIA-ARMORACIÆ.

R. Radicis Cochlearia-Armotaciæ recentis rasæ unciam unam.