
FOTUS s. FOMENTA.

FOTUS ADSTRINGENS.

℞. Corticis Quercus-Roboris pulv. libram
semis.

Florum (vel corticis) fructus Punica-
Granati pulv. uncias tres.

Aquæ libras sex.

Coque et colaturæ librarum trium adde
Aluminis drachmas sex.

Vel :

℞. Gallarum pulv. unciam semis—unam.

Aquæ fervidæ libras duas.

Digere per horam et cola.

Usus : Metrorrhagia, hæmorrhagia recti;
leucorrhœa; prolapsus.

FOTUS ALUMINOSUS.

℞. Aluminis drachmas duas.

Dissolve in

Aceti libra semis; dein adde

Alcoholis diluti libram semis.

Usus *egregius* : Pernio; tumores et dolores genu aliorumve articulorum. — Linteum hoc liquore constanter madidum parti affectæ applicando.

FOTUS AROMATICUS.

℞. Foliorum Artemisia-Absinthii,
 ——— Lauri Nobilis,
 ——— Rosmarini officinalis, ana un-
 cias duas.

Aquæ libras decem.

Coque vase clauso ad colaturam libra-
 rum octo. — Quandoque, loco aquæ, sumitur
 vinum rubrum.

Usus : Contusura; luxatio; debilitas localis.

FOTUS EX BRYONIA.

℞. Radicis Bryoniæ albæ concisæ uncias duas.

Aquæ libras quatuor.

Coque et colaturæ librarum duarum adde

Aceti libras duas.

Muriatis sodæ quantum solvi potest.

Usus : Tumor genu; contusura; tonsillitis
 inflammatoria.

FOTUS COMMUNIS.

Vesica suilla repleatur ad dimidium aqua, lacte, aut oleo quovis fixo calido, et applicetur parti affectæ.

Vel:

Pannus laneus porosus aquæ fervidæ immersus, dein expressus applicetur, renovando quoties frigescere incipit.

Hic fodus egregius est in febribus si eodem pedes involvantur omni semihora. CULLEN.

FOTUS E CONIO.

℞. Foliorum Conii maculati pulv. uncias tres.

Aquæ libras tres.

Coque ad libras duas.

Usus idem ac cataplasmati e conio.

FOTUS DISCUTIENS.

℞. Muriatis ammoniacæ unciam unam.

Alcoholis Rosmarini officinalis libram unam. Misce.

Usus: Tumor lacteus mammarum (mox initio morbi) JUSTAMOND. — Lintea hoc

liquore madida mammæ tumenti constanter applicentur, sæpius renovando.

Vel:

℞. Acetatis ammoniacæ,
Alcoholis,
Aquæ, ana uncias quatuor. *Misce.*

Vel:

℞. Aquæ libras duas.
Aceti,
Alcoholis diluti, ana libram unam.
Muriatis ammoniacæ drachmas sex—
octo. *Misce.*

FOTUS OLEOSUS.

Pannus laneus porosus (nostratibus *Flannel* dictus) Oleo Lini aut Olivarum calido immergatur, dein leniter expressus applicetur parti affectæ, superponendo lintea calida, et renovando quoties frigescere incipit.

Usus: Dolor violentus ex inflammatione aut spasmo; præprimis Enteritis, metritis, peritonitis, ischuria, etc.

FOTUS AD PERNIONES.

℞. Aquæ libras quinque.

Aluminis pulv. libram unam (vel quantum solvi potest).

U^SUS: Manus vel pedes in hanc solutionem, eo gradu calefactam ut æger ferre possit, omni nocte ante decubitum immergantur donec refrigeratus sit liquor.

Quandoque utiliter additur alcoholis libra semis. Rugæ cutis superstites vino tepido lavando tolluntur.

N^B. In Silesia eodem scopo cum successu utuntur decocto herbæ Hyosciami nigri aut Thymus-Serpylli.

FOTUS REFRIGERANS s. RESOLVENS
(RICHTER).

℞. Aquæ libras viginti.

Aceti libras duas.

Nitratis potassæ uncias octo.

Muriatis ammoniacæ uncias quatuor.

Misce.

U^SUS: Contusura; ecchymoma; luxatio; fractura; vulnera capitis violenta; concussio cerebri (Raso capite et deligato vulnere); orchiocele. — Lintea quadru-

598 EMBROCATIONES.

plicata aut sexduplicata hoc liquore madida omni hora frigide applicando.

FOTUS SEDATIVUS.

Vide *Solutio et Lotio Sedativa*.

Usus: Dolor aut irritabilitas magna partium inflammatarum aut ulceratarum.

EMBROCATIONES.

Liquor medicatus ex alto guttatim vel continuo rivulo in partem affectam depluens. — Quo altius depluit liquor, eo efficacius partem ægrotam commovet et concutit; Aquæ minerales hoc scopo sæpe idonee adhibentur.

NB. Embrocatio itaque et a fotu et a linimento differt cum quibus hodie a pluribus male confunditur.

Liquor pro stillicidio modice calefactus et vasi apto immisus ex altitudine successive aucta destillet in partem affectam nudam, quæ eodem tempore simul leniter perfricetur. Sub parte affecta supposita sit

pelvis, quæ liquorem munere suo functum excipiat. Stillicidium initio per quadrantem horæ et post aliquot dies per mediam et tandem per integram horam, siquidem æger ferre possit, continuetur. Dein pars affecta vesica aqua calida ad dimidium repleta aut fotu alio idoneo undique circumdata foveatur, ægro in lecto calido deposito, ut aliquot horarum spatio sudet. Denique fricetur pars scopa propria aut pannis laneis siccis, calidis, iisdemque obvoluta a frigore defendatur, continuando hoc modo per mensem unum aut alterum.

EMBROCATIO AMMONIACALIS.

℞. Carbonatis ammoniacæ liquidi unciam unam.

Alcoholis uncias sex.

Aquæ libram unam—duas. *Misce.*

Si, loco alcoholis, sumitur alcohol camphoratum, habetur:

EMBROCATIO AMMONIACALIS CAMPHORATA.

Quandoque, loco alcoholis, adduntur:

Acetatis ammoniacæ unciae duæ.

600 CATAPLASMATA.

EMBROCATIO DISCUTIENS.

℞. Herbarum aromaticarum libras sex.

Coque cum Aquæ quantum satis, vase clauso, per quadrantem horæ; et in colaturæ librarum viginti quatuor dissolve

Muriatis (vel Acetatis) ammoniacæ uncias quatuor.

Alcoholis Juniperi libras duas.

Usus: Physconia viscerum abdominalium, præcipue hepatis, lienis, ovariorum; paralysis; tumores articularum; arthrodynia rheumatica aut podagrica; anchylosis; contractura.

EMBROCATIO STIMULANS.

℞. Linimenti stimulantis unciam unam—
duas.

Aquæ libram unam. Misc.

CATAPLASMATA.

CATAPLASMA ACETATUM.

℞. Farinæ cujuscunque (vel Micæ Panis) quantum opus.